

HISTORIA
PLANTARVM
VNIVERSALIS, NOVA,
ET ABSOLVTISSIMA,
CVM CONSENSV ET DISSENSV
CIRCA EAS.

Auctoribus

IOH. BAVHINO ILL. CELS. VVIRT.
ARCHIATRO.

ET

IOH. HENR. CHERLERO PHILOS. ET
MED. DOCT. BASILIENSIBVS,

Quam recensuit & auxit

DOMINICVS CHABRÆVS MED. DOCT.
GENEVENSIS.

Iuris vero publici fecit

FRANCISCVS LVD. A GRAFFENRIED.

Dominus in Gertzensee &c.

Continens

DESCRIPTIONES STIRPIVM EXACTAS, FIGVRAS NOVAS, EX IPSO

Prototy po maxima ex parte depictas : earundem Satum, Cultum, Mangonia : item Vires omni-
genas : Præparationes, Extractiones, ac Distillationes præcipuas : Exoticarum Orientis atque
Occidentis, aliarumq; ante nostrum seculum incognitarum supra mille Historias novas.
Synonima: Equiuoca : Succedanea : præcipuarum linguarum appellationes.

In primis vero

PLACITA VETERVM GRÆCORVM, ARABVM, LATINORVM
& posterioris seculi Scriptorum.

INTERPRETATIONES AC CORRECTIONES SENTENTIARVM
obscurarum & deprauatarum.

In qua præterea

Notantur ERRORES eorum qui de Plantis scripserunt; Ac continentur
pleraque omnia, quæ

THEOLOGI, IURISCONSULTI, MEDICI, PHILOSOPHI, HISTORICI, POETÆ,
Grammatici, Geoponici, Architecti, alique de Plantis promulgarunt.

Vt meritò omnium Herbariorum vicem supplere queat.

ΟΤ ΔΟΚΕΙΝ ΑΛΛ' ΕΙΝΑΙ.

EBRODVNI.

cl^o. l^o. cl.



AVTHORES

AD LECTOREM.



ET VS verbum est, amice & erudite Lector: VINO VENDIBILI NON OPVS ESSE HEDERA SVSPENSA. At contra, illud & necessarium hodie dicimus, & nobis ita bene placitum: quippe, quod in Rempub. proficuum, & tibi volupe futurum, pro certo ac indubitato asserere non dubitamus. Nam quis tibi, aut alteri dicat, quid totis istis annis, imò tot annorum lustris, in tot prouinciarum, tot dissitarum Mundi plagarum, montibus, præruptis, niualibus, nudis cautibus, collium cespitibus, confragosis, saxosis, crepidinibus, cochlacibus, speluncis, opacis, apricis, syluosis, segetibus, veteretis, vernactis, aruis, glareosis, pratis, riguis; riuis, littoralibus, mari ipso, parietinis, ruderibus, hortensianis, hortis Adonidis, etiamq; Regiis, subgrundiis, rudectis, frutectis, neglectis, sed nobis perspectis, atque in ipso etiam Musæolo nostro, per diu, pernox, è tot voluminibus, tot codicibus, tam variè inter se contrariis, imò ex ipso adeò nostro cerebello vindemiauerimus? Quod, ut ne nescias, accede bonis auib; ingredi, aspice, gusta, imò sapias, vt in hoc saltem sapias, & quid fons ipse, quid ipsa contineat cella, obiter tantum subolfacias. Cautum est nostro edicto, ne vina hæc iniqua sint vestris capitibus, sed placida, jucunda, proficua: vt tandem intelligatis, non esse, quod Adagio circumfertur:

Aliud in scripto seu titulo

Aliud in pixide.

VOS IN HANC REM

ô POSTERI

TESTIMONIUM PERHIBETOTE,

ΠΟΤΕΡΟΝ Η ΠΟΤΕΡΟΣ.



GENEROSISS. NOBILISS. SPLENDI-
disimis, Excellentissimisq; Viris

DN. FRANCISCO LV-
 DOVICO AB ERLACH
 LIBERO BARONI
 IN SPIETZ, &c.

DN. NICOLAO DACHSEL-
 HOFFERO, POTENTISSIMAE
 BERNATVM REIPVBLICAE
 CONSVLIVS perpetuis:

Ut &

EIVSDEM REIPVBLICÆ QVÆSTORIBVS,
 atque TRIBVNIS:

*TOTIQVE SENATVI FOELICI, INCLYTO,
 Dominis gratiosissimis.*



ABET, PROCERES ILLVSTRIS-
 simi, In quo sibi gratuletur Aetas
 nostra, eorum Compos quæ nouis-
 simis saluam mouerunt. Trige-
 minos enim quos per quinque Lu-
 stra parturiuit foetus Vrbs vestra E-
 BRODVNVM enixa est. In procin-
 ctu est SAPIENS DIVITIARVM *Seneca epist.*

NATVRALIVM QVÆSITOR ACERRIMVS. Orbi ^{119.}
 nouum accedit Iubar. Cimmericæ secedunt tenebræ. De-
 cussâ papyrorum syluâ facilis in Memphyticam Abaton
 aditus. Mystis Apollineis omnis excutiendæ caliginis conce-
 ditur *διχαυγία.*

Obscurè de plantis scripserat Theophrastus: barbarè Ara-
 bess

Stalig. de
Diosc. judi-
cium.

bes: oscitanter interdum Dioscorides: infulsè nonnunquam ex
aliis Plinius: per transennam tantum Galenus: Millies lapsi
erant Recentiores, etiam *δαφνοφάτοι*: ac quotusquisque ab alio
non dissidebat. Prodit natator Delius, conjector Oedipus, e-
munctæ naris Censor, integer differentiarum Conciliator.
Prælis submittitur nostris O P V S, cujus immensitas omnes
huc usque Typographos deterruit: utilitas infinita vota exci-
tauit: varietas & elegantia maris & terræ opes, *Ἐσπερίδων μύλα*,
exhibet. *Ἀκέρσεος ἡ Ἐλικῶν ἔργον*. O P V S, inquam,
IOANNIS BAVHINI, in quo perficiendo conse-
nuit Vir iudicij acris, exactæ memoriæ, studij indefessi. Qui,
cùm Epimenidis Poëtæ attigerit annos, ejus tamen non dor-
miuit somnum: sed, vt Aristò Scepticus, semper in quærendo
aut considerando fuit. O P V S certè eximium, vtile, jucun-
dum. O P V S, quod non immeritò incomparabile dicatur,
siue dictionem spectes, siue affabrè pictas & sculptas Icones
innumeras. Sed *Ἐπιμενίδεον δέσμα*, quod diu admodum Tinea-
rum & Blattarum esca fuerat, tandèmq; omnino in illarum
cessisset escam, si non à situ, à mucore, & ab Abderitarum for-
te vindicassemus.

Benedictio & MAIESTAS sit sacrosanctæ & inenar-
rabili Trinunitati, quæ in hac cadauerosa Mundi canicie &
seculorum senectâ, inter fatales rerum mutationes, Helueticis
Laribus tuta impertiri voluit Halcyonia, quibus ponerentur
hæc Oua, hi educerentur Pulli. GLORIA sit Vobis,
PROCERES ILLVSTRISSIMI, ob Potentis-
simæ Reipublicæ ad cuius clauum sedetis, in ancipiti valdè sta-
tu ab omni injuria vindicias: & quòd eâ sitis erga Literas Lite-
ratósque propensione, vt meritò jam in vestris Collibus Mu-
sæ suum quærant Helicon, in vestris Lymphis Gratia suum
Fontem Acidalium. HONOS maneat perpetuus Nobi-
lissimis, Amplissimis, & Splendidissimis DN. MANVE-
LIBVS, DIESBACHIIS, STEIGERIS, cæ-
terisq; qui in hoc laudabili Instituto nobis glaciem fregère, a-
peruere viam. Perennet LAVS magni illius Genij: contin-
gat ejus scriptis eadem veneratio quæ olim Accij Tragicis: su-
spi-

spiciant Medici **BAVHINI NOMEN**, plurimum illi debet Ars Apollinea. Nec illaudatus abeat Gener eius **CHERLEVS**, egregiam in hoc opere navavit operam: & (quod de Caelio Oratore Quintilianus) longiore vita dignus erat.

NOBIS verò si quid debetur honoris & laudis: Totum id Vobis, **PROCERES ILLVSTRISSIMI**, facrum esse volumus: Primum hunc **HISTORIAE VNIVERSALIS PLANTARVM** Tomum, in quo non discerptum Absyrtum, sed numeris omnibus absolutam **ΔΕΝΔΡΟΛΟΓΙΑΝ** exhibemus, splendidissimo **NOMINI VESTRO** submissè inscribentes. Quibus enim alius? Apud Vos inchoatus est, de Vestro crevit, in Vestro nascitur. Quibus aliis Cuius vester, cuius tota Prosapia Vobis obstricta: cui tot Prouincias concedidistis, in quem tanta beneficia contulistis? Quibus aliis Cuius Geneuēsis, Urbis vobis foederatae, quem non ita pridem, nec leui gratiae argumento, in re ardua sustinere dignati estis: Qui vestram in gerenda publica re admiratus Prudentiam & Foelicitatem: Aulæ verò pertæsus, nec amplius Mauortios ferens fremitus, quum Colonus vester fieri exoptasset, benignè admodum ac munificè, tum ab Amplissimis harum Ditionum Praefectis, tum à vestris Ebrodunenſibus exceptus est.

Trita incedentibus via hîc vestris esset locus laudibus: verum illis recensendis superſedemus: Cui enim ad id luppetat dicendi flumen? Præterea insignes quibus eminentis Dotes prædicat Orbis: permanebunt illæ in animis hominum, in æternitate temporum, in fama rerum. Commendatione eget **Δενδρολογία**, nostra, non vos, **PROCERES ILLVSTRISSIMI**: Ac sic, ne quid **πάρρηγον**, ad rem redimus.

Admittite igitur Sacrariis vestris **AETERNVM SVAE GRATITVDINIS & OBSERVANTIAE MONVMENTVM** appendere volentes. Suscipite tenellum Foetum cui tamdiu in ouo fauistis. Fouete illū in vîculis partus. Sereno vultu facite animum ad reliqua. Vestris Auspiciis manumittatur in publicos vsus.

Vestrae

Vestre Autoritatis munimine comitatus micantiùs sese omni-
bus offerat. Timeant malè feriatì homines arrodere tanto præ-
sidio redimitum. Cæterùm in secula floreat Inclyta BÉR-
NA cum toto suo imperio: Vósque, PROCERES
ILLVSTRISSIMI, quàm diutissimè CONSV-
LES, QVAESTORES, TRIBVNOS, PA-
TRIAE PATRES, RECTORES FOE-
LICISSIMOS habeat. Nobis verò cultu & obsequiis
nostris apud vos gratiam detur promereri.

Hæc sunt XAPHΣTHPIA, hæc Vota.

Vobis

PROCERES ILLVSTRISSIMI

Devotissimorum

FRANCISCI LYDOVICI & GRAFFENRIED
gratiosa concessione vestra Ebrodunensis disionis pro tempore Praefecti,

ET

DOMINICI CHABRÆI M. D.
*Illustriss. Celsit. VVirtemb. à Consiliis Medicis,
Vrbisq. Ebrodunensis Medici ordinarij.*

Dabant Ebrodun. Idib. Septemb. anno à partu Virginis M. DC. L.



EPIGRAMMA

In Botanicum Bauhinianum Fausti ominis ergo scriptum.

Ad Lectorem.

QVæ spectas Plantas in mole VOLVMINIS hujus,
Non illas Solus prolicis ardet humo,
Conspicis non illas tellus, non cornula crudunt
Ponsi, non valles, non iuga celsa ferunt:
Non illas peperit felix quondam hortus Edenis,
Illas Hesperidum non aluere sata:
Sculptorum ne te frustretur Dextera solers,
Non vivunt, quas tu vivere sorte putas.
Non te decipiat Scriptoris pagina docta,
Natura certans cognitione sua.
Illa non sunt planta, Plantarum at Dadala signa,
Quasq. illas oculis restituisse valent.
Quas spectas cunctas in mole VOLVMINIS hujus,
Sive illas Solus prolicis ardet humo,
Educat aut tellus sata, vel maris intra recondunt,
Aut valles humiles, aut iuga celsa ferunt.
Quasque aluere olim pulchra viridaria EDENIS,
Et quas HESPERIDVM læta iulere sata,
Hic cunctas spectas, & ni pigmenta desjcent,
Ars te consilijs redderet ambiguum.

Scriptit GEORG. MÜLLER Phil. Prof. Lausann.




HISTORIAE GENERALIS STIRPIVM SIVE PLANTARVM

LIBER PRIMVS.

QVI CONTINET POMIFERAS, ET EAS, QVÆ MHARA GRÆCIS DICTA


proferunt: Item Pyra, & quæcunque ad hæc aliquo modo
possunt referri, tam indigena,
quàm exotica.



IOTIVS natura Botanica (quanta quidem hactenus invenit) historiæ pro virili traditur, arborum honores primùm celebrasse conveniat. Exordium itaque fiat à Pomiferis arborum vulgatissimis. Quid si & dignioribus careris, vilissimis, atque aded humani generi primo cognitis: quippe quarum fructus (cuiuscunque tandem generis Pomus fuerit) primùm illi d' primi hominis desiderium, quamvis à summo Opifice verisum, commoverit, qua fundi nostri est calamitas. Quamobrem sequi par est ordinem naturæ, ac ipsius aded vitæ, ac DEI OPT. MAX. honoribus primordia ingerere. Sed & ordo d. Strina, qui vel maxime nobis, quantum per varietatem licebit, in hoc opere spectandum, consentire videtur, nempe ut à vulgarissimis, ac nobis prius cognitis incipiamus. Sic studiosis quoque, quibus potissimum noster hic labor dicatur, hand parùm consultum videbitur. Quid enim vulgatius Pomis in genere ductis in toto hocce tractu Europæ? Ac ipsa quidem copia, varietasque, eam statim vel cunctis cordato ingratas difficultatem, ut existimet, vix omnia à quæquam tradi posse. Sed nostrum est, & ab aliis tradita in ordinem cogere, & ex propriarum observationum cognitione, quanto possumus maximo studio, opus nostrum ducere. Deus adspice capitis.

DE MALIS

CAP. I.



Etymon.

Summa fa-
bulæ.

Descriptio
Mali uni-
versalis.
Cortex.

Materia.

ERgo agmen pri-
mum ducant Mali
scu Pomus, quarum
haud temerè aliud ge-
nus suppetet varia-
tem. Et sanè blanditur
suo operi humana
quoque industria, maio-
remque viridiorum
fructiferis arboribus
honorem tribuit, inter
quas sine dubio emi-
net Pomus, restricta
laxiore vocabuli signi-
ficatione, quam can-
dem Malum vocant,
ex Græco fonte dedu-
cto nomine, nam enim
& uariè dicunt Græci,
quam nos Malum:
Cuius summa fastigia
duo; sylvestre & domesticum. Illud neglectum suæ
spontis est: hoc culturæ experitur, ut notius ita utilius,
compluriumque specierum. Sic ut unicuique ferè
provincia suæ sint, quas alia vix agnoscat, differen-
tiæ: quibus ferè commune, ut tamis magis patula ple-
rumque sit, quàm alta arbor, cortice scabro, sæpè
muscoso oblecta, foris cinereo, intus flavo, ac lævi
potius quàm aspero, materie alba vel candidate, medio-

criter dura, & variis utensilibus præsertim domesticis
parandis, atque ad torni artificium haud incommo-
da, radice non valde multa, nec admodum profunda,
sed in summo ferè terræ obhærente. Folia ex rotundo Polia.
oblonga, vel obtusa, vel acuminata, infernè villosa ma-
gis, quàm supernè, præsertim nova, in ambitu crenata.
Flores simul multi, ex breuibus tomentosis pediculis, Noto.
suaueolentes, candidi vel purpurascens, ex quinque
foliolis congesti, apicibus in medio sufflavis. Ipsa verò
Mala aded variant forma, magnitudine, colore, sapore,
ut dinumerare haud sit facilè. In genere tamen Malum fructus.
fructus est, magnitudine & figura varius: quippe, aliud
rotundum, aliud turbinatum, aliud sessile, quædam
etiam angulosa. Sunt etiam quæ ad pugni gemini ma-
gnitudinem accedant, sunt & parva, & mediocria, Mali fructus
tunicâ omnia contexta vel pallidâ, vel flavescente, in-
terdum & rubra, aut ex toto, aut ex parte, rariùs subci-
neræ, aut ad glaucum vergente, cui caro seu pulpa
sobest mitis, odorata in maturis, in imimaturis &
sylvestribus durior: sapore vel dulci, vel subacido atque acer-
ba. Pediculo suo quodque hæret, eo ipso longitudine
& crassitudine diuerso, in parte inferna atque, ut pluri-
mum causta, rariùs piominente, emerfo: in cuius op-
posito, parte nimis supra est, id quod mada qui-
dam vocant ex Polluce, alijs *umbiculus* nempe
seu cavitatis quædam, cui inutile illud floris residuum
incidet, nigrum & foliaceum, quod Germanis *hans* di-
citur, quali res nihil & reiectanea. In ipso fructus ma-
A

Mali fructus
descriptio
generalis.

Pediculus.

Pythones.

Galenus dicitur Galenus *γάρτα, αὐτὸν γὰρ, ὡς ἴσται, ὡς ἴσται, ὡς ἴσται*: hoc est, dulcia, austeria, acerba, acida, exoluta & aquea, quæ postrema quis non insubidè, nostro iudicio, *ἴσται* dixerit, vel insipida. His addes ea, quæ *ἴσται* vocat, quædã tenera Platanorum folia gustu quodammodo representent, qualia apud se & in multis Asiæ locis subus proici testatur, quod minùs laudat sint bonitatis. Transeamus ad Latinos, neq; enim omnia ex omnibus Græcis, sed ex præcipuis tantum, & qui ex professo aliquid de plantis prodiderunt, referri par est. M. Cato de re Rustica meminit malorum Scantianorum, quæ & alia in doliis condi solebant, item syluaticorum, quotannis condi solitorum. Varro Mali bifere, agri Consentini. Conditua hæc recēset: Struthæa, Cotonea, Scantiana, Quiriniana, Orbiculata, & quæ antea Mustea vocata, postea Melimela dicta sint. Columella ista: Orbiculata, Sextiana, Melimela, Matiana, Scandiana, Pelusiana, Amerina, Syriaca, Cydonia; quorum tria genera facit: Struthia, Chrysomeliana, Mustea. Palladius quoque Malorum plura genera scribit, quæ tamen numerare superfluum putauit. Speciatim Rotunda tantum nominat, quæ & Orbiculata dici ait. Celsus trium tantum meminit, Orbiculatum, Scandianorum & Amerinorum. Virgilius in Eglogis Malorum atque Pomorum, siue Malorum in genere tantum meminit. ----- *sunt nobis mista Poma*: Item

Cui pendere sua pateris in arbore Poma:

Vbi tamen quidam Mala legunt cuius & alibi meminit idem Poeta.

Mala me Galatea petit lasciuia puelle:

quos versus ad Malum, de quo hoc capite agimus, referunt, quamuis alij aliter interpretentur. Mistia sanè Poma quàm optimè dicuntur, hæc nostra, quod epitheton haud felicius alteri cuidam Pomorum

generi dicaueris. Quæ verò sint Cana illa Mala, quorum idem in iisdem Eglogis meminit, dubitatur. Io. Frisius in annotationibus suis in easdè, *ἄνθη δὲ* interpretatur quasi propriè sine Mala. Sed ex ipso met Virgilio satis patet non veram esse illam interpretationem, quippe qui lanuginem habere dicit, quam sanè in nostro Malo propriè dicto non videmus. Nos alio referimus. Martialis Melimela celebrat in Epigr.

Su ribi Cecropio saturata Cydonia melle

Ponent, ar, dicas hac Melimela licet.

Item: *Dulcibus aut certant qua Melimela favis.*

Sed reliquis hinc Poetis, naturæ potiùs miraculum, Plinium consulamus, qui paulò curiosius de his prodidit, Malorumque plura genera tradidit. Penè petegrina sunt (inquit) in vno Italici agro Veronensi nascencia, (Tubera intelligit Hermolaus: nos ad Mala referimus) quæ Lanata appellantur. Lanugo ea obducit, Struthæis quidem Persicisq; plurima: histamen peculiare nomen dedit, nulla alia commendatione insignibus. Ergo (Mala) habent originem à Matio, Gestioque & Manlio, item Claudio. (Cestiana vocat Galenus l. 13. Meth. c. 14. vide num legendum Cestio. Dal.) Quibus Cotoneo insito (Cotonea insita. Vet. Quin & Cotoneo insita. Dal.) ab Appio è Claudia gente, Appiana sunt cognominata. Odor est his Cotoneorum, magnitudo quæ Claudianis, (Scandianis Ch.) color rubens. Ac ne quis id ambitu valuisse claritatis & familiaritatis putet, sunt & Sceptiana ab inuentore libertino, insigni rotunditate. Cato adiicit Quiriana, & quæ tradit in doliis condi, Scantiana. Omnium autem nuperrimè adoptata sūt parua, gratissimi saporis, quæ Petisia nominantur. Patrias nobilitauere Camerina, & Gracula: (Temeriana & Gracula. Ch.) vel vti Columella, Ameriana) Cetera è causis traxere nomen, germanitate coherencia & Gemella, nunquam singula in fortu, colore Serica, cognatione Melappia. Mustea à celeuitate mutescendi: quæ nunc Melimela dicuntur, à

sapore melleo. Orbiculata, à figura orbis in rotundi. tatem circumscripti. Hæc in Epiro primùm prouenisse, argumento sunt Græci, qui Epirotica vocant. Mammæarum effigie Orthomastica (Orthomastia. Ch.) A conditione castrati seminis, quæ Spadonia appellat Belgæ. Melosyllis (alij Melophyllis habent) folium vnum, aliquando & geminum etumpit è latere medio. Celestimmè in rugas marcescunt Pannucea. Stolidè tuent Pulmonca. Sunt quibus sanguineus est color, origine ex Mori insitu tracta. Cuctis verò, quæ fuerunt à sole, partes rubent. Sunt & parua gratia saporis, atq; etiam acutiora odore syluestria. Id peculiare improbitatis & acerbitalis conuitiù, & vis tanta, vt aciem gladij perstringat. Dæcis fermè vilissimū nomen quāquam primis aduentu, decerpique propterantibus. His annumeranda Cadiua, quorū idem Plin. alibi meminit: & addit: Amerina maximè durare: (vbi tamen Camerina legendum putat Dal. vt paulò antè) Melimela minimè. Et rursus alibi: Biferæ & in Malis ac Pyris quædam, sicut & præcoces. Malus syluestris Bifera. Sequens eius fructus post Arcturum in apricis maximè. Marcus Varro autor est, fuisse biferam Malum in agro Consentino. In genere, Malis in senecta cadit cortex, quibus breuissima est vita: & in his præcocius breuior, quàm serotinis; dulcibus, quàm acutis. Malis odor acutus. Persicis dilutus, dulcibus nullus. Reliqua quæ passim de Malorum natura habet Plinius, ex Theophrasto desumpta sunt, quæ iam suprà recensuimus. Non temerè tamen iurantur aliqui cur Plinius non hic memorarit *ἴσται* illa, minuta illa, sed quæ tantum in amoribus conciliandis valere crediderunt, vt feminas posse iis pellicere ad concubitum sperarent. Coronæ ex illis Bacchi statuer imponerantur. Theophrastus.

Μῆλα δὲ ἔσται, ὡς ἴσται, ὡς ἴσται, ὡς ἴσται

Eius sortis generis fuerunt Mala, quæ manibus tenentem Nanaam Nympham concepiisse tradit Ar. nobis: quò fortassis pertinet hic versus ex Annalibus Attij apud Nonium,

Mala manu retinens gravidæ concepit in aluo.

Io. Scalig. Sed mittamus Græcorum fabulas, & perquiramus potiùs quænam sint illa Plinij Malorum genera, & nunquid eorum quædam ad nostram etiam ætatem peruenierint? Dalechampius diligentissimus Plinij interpretes, vult, Cestiana esse Capaudu Gallis dicta, nobis Curtipédica, quæ infra describemus: Petisia, vulgò *Ἀπιολες* dicta, quasi Apiolina dicas, Serica, *Ἰσται*: Melapia, *Ποιρεπ. mme*, vel *Π. mme-poire*, quasi Malopyra, aut Pyromela dicas, vulgò Gallis *Ἰραντε*: Mustea siue Melimela, quæ prima omnium maturescunt, nunc Poma S. Io. iisdè vulgato idiomate dicta: aliis Poma amotis autore Scaligero.

Orbiculata, *Ῥομφαία*: Orthomastica, *Ῥομφαία*: Spadonia, Belgis *Passépomme*, Allobrogibus Sabaudis, *Pommes Grillottes*: Pannucea, *Pannetes*: Pulmonca, *Follanes*, quod & ipsum stolidorum nomini conuenit: Sanguinea *Grosse Pommé rouge*: Camerina *Granoi*: cæque omnia Malorū genera etiam nū hodie circa Lugdunum esse frequentia. Pannucea quidam putant, quæ Provinciales vocant *Pommes geles*. Et sanè Melapia haud malè quadrat cū voce Melopyra, si nomen specles, atq; unde etiā à Plinio nomen inditū volunt, quod Malorū & Pyrorū specie quædā habeat, illaq; ellè cognationē à Plinio ea voce indicatā. Pannucea verò Turnebus tradit dicta, quasi in pannos fathiscencia, & rugarum plicas, Persio Pannucea Baucis, vel tumida & præpinguis ac suffarcinata, vel pannis multis conglobata, & conglomerata. Hætenus quæ ex Plinio & ad eius explicationem. Athenæus quoque quasdam ponit Malorum differentias, ex Mnesitheo cuiusdam Atheniensis libro de Eculiis desumptas. Primùm Mala Delphica dicta. 2. Orbicata, quibus restrictio cū dulcedine. 3. Setania

Orbiculata.

Epirotica.
Orthomastica.
Serica.
Spadonia.

Pannucea.
Pulmonca.
Sanguinea.
ex Mori insitu.

Syluestria.

Dæcis.

Cadiua.

Malibifera.

Malotum.
zias.

Mala Serica.

Veterum
Mala nōllit
accommodantur.
Mala Capaudu.

Ἀπιολες.
Ἰσται.
Ποιρεπ.
Pommes pot.
Malopyra.
Ποιρεπ. mme.
Pyromela.

Pomme rose.
Ῥομφαία.
Passépomme.
Pommes.
Grillottes.
Pannetes.
Follanes.
Grosse pommé rouge.

Pommes geles.
Sellec.

Pannucea.
cypnos.

Malorum
differentiæ
ex Athenæo.
Delphica.
Orbicata.
Setania.

Platanis.
Mordiana.

& Platanis, succi bonitate commendata. 4. Mordiana dicta, quæ optima speciosissimaque nascuntur Apolloniz, quam Mordiam nominant: proportionem respondere orbicatis. Glaucides inquit, omnium fructuum esse præstantissima Mala Cydonia, Struthia, & Phaulia. His addit Verna Mala: quæ ex Philotimi libro de Alimentis, Pyris ægrius coquuntur: Excellentia quidem mala nascuntur in Sidunte agri Corinthij vico, ut autor est Euphorion, siue Archytas, in Græc, his verbis.

Elegans ut Malum quod in argib' sis ripis.

Siduntis parua purpureum alitur.

Purpurea.
Laconica.
Siduntia.
Lanuginosa.

Vernat Malos (id est) Laconicas & Siduntias lanuginosas (id est) appellat. Ego verò, inquit Athen. omnium maximè admiratus sum Mala Romæ venalia, nomine Matiana, (quidam esse volunt nostra Curtipendula) quæ aduehi ferunt è quodam pago, sito in Alpibus propè Aquileiâ. Illis bonitate non multum cedunt, quæ in Gangiis vrbis Paphlagoniæ gignuntur. Miror (inquit Goropius) quid Natali de Comitibus venerit in mentem, ut Battiana in Athenæo verteret pro Matianis, vel hæc sunt, vel horum loco edi possunt quæ nos *fructus*, Hispani Camozar vocant: apud quosdam vitiosè legitur Martiana, quæ adinodum & apud Macrobius. Idem Athen. l. 3. Malorum Delphicorum meminit: sed ea minùs probare videtur. Ex recentioribus Hæraclæus præter ea, quæ ex Plinio transcripsit, pauca de suis adiecit: speciatim Matianorū quoque meminit, ex vico Aquilienti sub ipsas Alpes, quibus similitudine respondeant Gangeris Paphlagonie vrbis nascentia, nunc Hispaniæ vernaculo vocabulo Matiana in commune esse Mala omnia. In nomine esse & Gestiana siue Sextiana, siue, ut Græci scribunt, *genia*: quoniam & Cestomela vocantur ab Ætio, quanquam ridiculè à Cestoid est, loco dicta quidam interpretum existimant, cui similia sunt cortice. Hæc ipsa & Pezomela vulgo dicunt & austera prædicant. Austera è dulci sicut Aphitatomela: Odorata hæc, & pulpâ habent asperâ & squalidè, ut Cidonis. Cuius partim, ex aliis, partim ex sua observatione hæc habet: Columella lapidosa vocat, in quibus reperiuntur calculi. A colore Særicata, Rubra Macrobio, quæ & Rubelliana, cortice sanguineo, carne intus friabili, non ingrato sapore, & ex austero subdulci, nec citò fugientia. Melimela arbitrantur quidam Mitia à Virgilio in Bucolicis vocari. A Celeri prouentu Macrobio Præcocia. Columellæ & Macrobio Scandiana, Cato Scantiana vocat: hic etiâ Quiriana: ille verò addidit Conimela, & reliqua, de quibus supra. *Id est* Martiana, Agrana, Profina, Situtia. Polluci quædam *id est* dicta, alij Delphica vocant: Syrica etiam Macrobio Tiburneriana, siue Tiburtia, ut ait Plinius, quæ Picenis cedunt, ut hic ait:

Picenis cedunt Pomis Tyburia succo.

Nam facie præstant.

Canamela.

Paradisiaca.

Mallapia.

Petelia.

Rosea.

Pyromela.

Malapyra.

Rubelliana.

Purpurea.

Cornea.

Gestiana.

A sapore dulci Canamela siue Canamila, magnitudine media, colore, cum maturuerint, luteo, saporis iucundissimi atque odoris gratissimi. Paradisiaca apud Lutetianos parua sūt, fugacia & dulcia. Appiana olim vocata nunc existimantur, quæ addito Mali nomine, Mallapia vocantur. Præstantissima nunc quoque existimatur, ut de his vulgè decerneretur, omne Malum præter Appiū Malū. Nescio nū sit illud genus, quod Plinius Petelia, Hetruria nunc Rosea vocat. Apud nos tamen & Rosea & Melappia distinguuntur. A Pyro quoque dicitur & à duplici genere Pyrorū & Malorū, Pyromela & Malapyra. Rambures prægrandia, rotunda, callo fragili, tenera, minimè fugacia: apud Ambianenses in Gallia Belgica præcipua: alibi Rubelliana vocantur. An ea verò sint, quæ Columella Purpurea vocat, dubitarim. Cortice rubro, carne intus friabili, sapore non ingrato. A cornea similitudine Cornea vulgus Italicum vocat. Alia Castiniana

gustu austiore, oblonga, mediocri magnitudine, dura, ut castaneæ cartilagine, unde nomen sumptum. Alia Francerina, rotundo habitu, & amplo, durior collo, modica acerbitate grata, quæ in dulcedinem degenerat. A tempore maturitatis Ioannina vocamus, quod circa D. lo. Bapt. maturitate eius sint. Parua sunt, albertia, citò fugacia, nulla alia dote prædita, quæ quod prima edantur. Didia in honore sunt, ampliora, rotunda: Follana etiam plurimum, albo callo, carne molli, ac grato sapore, Blandurella, pulchra, rotundior forma, colore albo, nitente cute. Sunt ab Augusto mense, alij Præpomum vocant, quod alia Pomorum genera præcellat, sapore suaui & odoratori: Oblongum est, à pediculo in acumen tendens, Patriam nobilitauit quod Sulinum dicitur, à Sufa oppido Italiæ: paruum hoc, orbiculatum, à latere per lineas rubens, gratissimi gustus, Rosea nonnulli existimant, quæ antiquis Pyrotica dicebantur, Sulinis maiora, à colore rubro, sic appellata. Apud Allobroges Girodeta celebrantur: parua sunt in latitudine rotunda, & in rubrum rufa, multum fetidina. Monachi in Mesuen celebrant dulcia, acetosa & Muza dicta. Sic illi vocant: adduntque Mesuen per dulcia Mala intelligere Apia nuncupata, in quorum defectu substitui posse aiunt Maciana, seu Mala Derij, seu alia dulcia. Pro acetosis siue acrisbus syluestria recipi possit. Muza verò Mala esse media inter dulcia & acris. Elach. Tab. 2. Poma dulcia, *Id est* ex Ierusalē sunt optima, ceteris temperatiora. Sequuntur Fotani & Malui. Tū Poma acida: *Id est* Tab. 3. Poma dulcia Paradisiaca, Melonib. dulcibus similes habent vires. Qualia autem ista sint omnia, & quæ, fatemur nos ignorare. An verò Heronis bonæ perquirant diligentes. Gallis ut scribit Rv l. 1. v. s. Pomorum differentia propè innumere, quando etiam veteres hæc genera Malorum annotauerint, per se itas miscella institutione antiquitatem longè vitat. In Gallia principatum obtinent, quæ Capendua vulgè vocant, sui saporis, verum aded grati, ut & trans maria vñcant: gelatum plus quàm alicui fere credibile, ut letant in tanta suauitate minimè fugacia, magnitudine media, colore, cum maturuerint luteo, friavi odore, sed angusto, quo tamen animum exhilarent: cartilagine corporis dura, ut quæ possint in annum protelari. Sæpè & bina vidimus. Secundas partes sibi vendicant, quæ ab Ambianensi municipio Rambura vulgus nominat, prægrandia, rotunda, callo fragili, tenero, ut quæ ventorum flatu deturbata in partes desiliant, mira & suauitate gustus & tenacitate, ita ut in ore frustra liquecant, sed ut fugientia, diu seruari non possunt, neque ferè ad exitum Autumnus prorogantur. Proxima sunt, nec eis suauitate cedentia, quæ vulgè Passipoma nominantur, quod cum reliquis omnibus de primatu certarent, nisi tam fugacia noscerentur, inde vernaculum nomen ductum est, mediocri magnitudine, turbinatior figura, carne suavi, præteneta, gustu per quædam iucundo, semine per maturitatem in vtero sonante. Sed ut mirè placent, ita citò fugiunt. Accedunt, quæ Paradisiaca, quæ si ex lictis missa nominantur, præparua, mellea dulcedine præcoci celeritate, quasi verna, concreta paucis ea malacis prægnantem expectantur, omnium ferè Pomorum fugacissima. Alia dulcia, callo corporis durior, rotunda, quæ ob sui nimiam dulcedinem, à palato morosiore laborantium fastidiuntur, ea putauerim esse, quæ Melimela dicuntur, à melleo sapore eadem à celeritate mitescendi, Mustea, ut inquit Varro, vocabantur. Mustea sanè veteres appellabant, id quod nos præcocia. Acida vulgus nostrum Malacia à saporis acrimonia nuncupat, oblongiora, dura carne, ex acerbis leniter accedente. Annis hæc sæpius durant, ægris ad inuitandam elanguescentem appetitiam nonnunquā concessa.

Alia

Francerina.

Ioannina.

Didia.
Follana.
Blandurella.

Præpomum.

Sulinum.

Rosea.

Pyrotica.

Girodeta.

Monachi orū
in Mes. dif-
ferentia.
Muza.
Apia.
Maciana.
Mala Derij.

Poma Ieru-
salem.
Fotani.
Malui.
Acida.
Paradisiaca.

Ruellio Po-
morum dif-
ferentia.

Capendua.

Rambura.

Passipoma.

Paradisiaca.

Dulcia.

Melimela.

Mustea.

Acida.

Malacia.

DE MALIS.

§

Castanea. Alia Castinia, austiore gustu, dura, velut castanea, cartilagine, mediocri magnitudine, oblonga. Alia vulgò Francetina, rotundo habitu & amplo, duriore callo, grata acerbitate, quæ tandem in dulcedinem degeneret, ea diu seruari possunt, & annicula sæpè reperiuntur. Sed & Rubelliana, sanguineo cortice, carne intus friabili, sapore non ingrato, & ex austero subdulci, nec citò fugientia. Melimela verò, quorum antea aliquoties meminimus, nullam in antiquis longiorem habent historiam. De Epiroticis autem, quæ Romani Orbiculata dixerunt, facile erit (inquit Marcellus) genus & formam coniecere, si perpenderit, quales Orbiculi sint in Trocleis. Nam si ad Palladij attendamus verba, qui ait: Mala rotunda, quæ Orbiculata dicuntur, sine cura toto anno se seruire possunt, facile nobis indicabunt hæc Mala esse, quæ Rosea appellantur ita nota, à Colord.

Cordo Potumum differentia. Præ ceteris Botanicis CORDVS diligenter tradidit differentias Malorum Germanicorum, quashic lubet proponere cum suis descriptionibus.

Pulmentaria lata. *Μαλ-Ἀπφελ-ερε* id est, Pulmentaria lata, satis magna sunt, latitudine altitudinem superant, nam quadrantem altitudine non attingunt, aut rarò, cum latitudinis diametro trientem nonnunquam excedant. Colorem habent rubentem & modicè purpureiscentibus vibicibus mixtum, carne constant miti, *αριστερῇ* & omnis succi experte: facili in ore, dissolubilique gustu, in dulci subacida, & suavi, odorem verò iucundum spirant. Copiosus eorum est Illebijs prouentus.

Απφελ-ερε id est, *απφελ-ερε*, sic dicta sunt, quod figura protuberantes & ferè acuminatas puellarum mammillas imitentur, tam exquisita similitudine, ut etiam pythmen eorum, papillas aspectu referant: longitudo iis est sextantal, à qua latitudo basis nihil, aut parùm differt, iuxta pythmena in obtusum, latum, & umbilici figura cæterum micro-nem desinunt. Colorem habent flauum, carnem verò teneram, succosam, gustu suauem, subacidam, vinosamque: odorem, reposita, gratum spirant, maturescunt Autumni initio, & ad Hyemis principium vsque durant, vel paulò diutius. Illebijs agros copiosè proueniunt.

Pulmentaria rotunda. *Μαλ-Ἀπφελ-ερε* id est, Pulmentaria rotunda, ut plurimum globosa, aut rotunda sunt; interdum tamen latitudine longitudinem superant, & e contra, longitudine latitudinem. magnitudine etiam inter se differunt, quantum ad indiuidua attinet; specie autem minimè. Ut plurimum autem quadrantem cum semuncia lata sunt, sed altitudine quadrantem vix attingunt, inueniuntur etiam multa maiora. Colorem habent vndique ferè rubentem; longis & in purpura roseis ceu vibicibus, distinctum. Carne constant miti in dulci modicè accecente, facili in gustantiam ore liquecente, mediocriter succosa, gustu suavi, vinosaque. Odorem habent iucundum. Maturescunt Autumni principio, & ad Hyemis initium vsque durant, aut aliquantò diutius. Habentur VVitembergæ.

Pulmentaria minora. *Μαλ-Ἀπφελ-ερε* id est, Pulmentaria minora, rotundis Pulmentariis forma & colore similia sunt, multò tamen minora, oblongioraque, carne etiam teneriore, succosiore, sapore suavi, vinoso & subacido. Odore iucundo. Maturescunt cum rotundis, similiterque durant. Proueniunt in agro VVitembergensi.

Pulmentaria flaua. *Μαλ-Ἀπφελ-ερε* id est, Pulmentaria flaua, maximis rotundis Pulmentariis æqualia sunt. Colorem habent flauum, ab vna parte raris vibicibus colore sanguineis conspersum. Carne constant suavi, dulci, vinosaque, veluti rotunda Pulmentaria. Odorem bo-

num spirant. Autumni initio perficiuntur & in Hyemem vsque durant. Magnus eorum est Illebijs prouentus.

Ἀπφελ-ερε id est, dulcia minora, formà & colore minoribus Pulmentariis similia sunt, sed multò minora; nam rarissimè Coretichiorum magnitudinem excedunt. Carnem habent teneram, succosam, gustu vehementer dulcem & gratam. Odorem spirant suauem. Maturescunt hæc etiam Autumni initio, & in Hyemem vsque durant.

Ἀπφελ-ερε id est, Paterniana, lata & plana sunt, altitudine sextantem cum semuncia æquant, latitudine verò quadrantem nonnunquam excedunt. Colorem habent flauum, sanguineis vibicibus, Pulmentarium instar, maculosum. Carne constant tenera, mediocriter succosa, gustu subacida, vinosà & vehementer suauis. Odore pulmentaria æmulantur. Maturescunt cum prædictis, durantque similiter. Proueniunt in VVitembergensi agro.

Ἀπφελ-ερε id est, Orbiculata, Paternianis similia sunt figura, odore, & sapore, plerumque tamen paulò minora, pauloque magis in latitudinem compressa. Colorem habent pallidum, interdum flauum in crocco, paucisque vibicibus, iisque sanguineis pictum.

Ἀπφελ-ερε id est, oblonga sunt, & in medio, aut inferius aliquantulum tumidiora, quorum pythmen profundiusculè insidet superius, veluti lacuna. Colore sunt in spadiceo rufi, aut fusci: ab altera interdum parte pallidiora, ac rubentibus vibicibus maculosa. Longitudinem habent multò plerumque maiorem quadrante, latitudinem verò quadranti æqualem. Carne constant tenera, miti ac rara, fungosa, & tamen aliquantulum succosa. Gustu subacida, suavi & in ore facili dissolubili. Maturescunt cum prædictis, atque post medium Hyemis vsque durant. Habentur in omnibus Germaniæ regionibus.

Ἀπφελ-ερε id est, *Ἀπφελ-ερε* vel Biscope, vel Episcopia, omnium dulcium Malorum nobilissima sunt. Figura eis est ut plurimum rotunda, colorem habent ab vna parte suauiter tenuissimis, contiguis, roseisque vibicibus rubentem, ab altera verò in candido pallidum, vix euentibus, dilutisque vibicibus conspersum, incertum, & descriptu difficilem, vnde etiam Cartechianorum nomen inuenerunt. Odorem spirant gratum, ac iucundum, longitudine quadrantem cedunt, latitudine verò eundem æquant. Carne constant tenerissima, succosa, niueaque. Gustu supra modum suavi, dulci atque miti. Maturescunt Autumni initio, & in Hyemem vsque durant. Habentur in omnibus ferè Germaniæ nationibus.

Ἀπφελ-ερε id est, Duracinà alba, rotunda sunt atque modicè in latitudinem compressa, altitudine sextantem, latitudinis verò diametro sextantem & semunciam excedunt. Colorem habent vna parte, qua solem exceperunt in flauo rubentem, altera autem viridi candicantem: intus albescentibus maculis, per cutim transparentibus aspersa sunt. Carne constant tenera, & tamen solida, succosa, gustu acida, vinosà & suauis. Odorem, reposita, aliquandiu spirant iucundum. Maturescunt Autumni initio, & in Hyemem totam durant. Habentur vbique ferè in Germania.

Ἀπφελ-ερε id est, Potstorfiana, eandem habent, quam Duracina alba figuram & proportionem, paulò tamen minora sunt, colore quoque non multum ab eis differunt. Siquidem ab vna parte pallent, ab altera verò suauiore insipientes rubore delectant. Carne constant iam dictis duracinis simili, gustu vehementer suauis & generoso, veluti si quis Duracina Cartechianis commisceat. Odorem

Dulcia minora.

Paterniana.

Orbiculata.

Oblonga.

Episcopia.

Cartechiana.

Duracinà alba.

Potstorfiana.

LIBER PRIMVS

spirant gratum. Coluntur in Misnia, vbi propter sa-
poris nobilitatem ceteris omnibus præferuntur. Ma-
turefcunt cum duracinis, & fimiliter ferè du-
rant.

Presiliana. *Presiliana* id est, Presiliana aspectu sunt pulcher-
rima, figura rotunda & globo similia, colore ro-
sea, atque presilij materiz dilutum prouocantia,
magnitudine quadrantem vt plurimum æquant, non-
nunquam etiam excedunt. Carne constant tenera,
subsolida, gustu dulci, simulque accescente & suavi.
Maturefcunt Autumni initio, & vsque ad hyemale
solstitium durant. Magnus eorum est Hildeshey-
mij prouentus.

Crocina. *Crocina* vel *Harstete* id est, Crocina, è nobilissimis
haud quaque sunt postrema, figuram habent globo-
sam propemodum, tam longitudine, quam latitudine
sesquiuncialis, latitudo eorum longitudinem non
raro excedit, paululum tamen, in summa Corethij
ferè æqualia & similia. Colore sunt inter viridem fla-
uum crocique dilutum medio, quem serenis & sa-
lidis æstatibus puniceæ crocæque maculae tenuer-
que vibices distinguunt, eo insigni pluuiosis æstatibus
constituuntur. Carne consistunt tenera, gustu dulci, ali-
quantulum subacida, suavi & aromatico quodam ha-
litu gustantis palatum commendante: quin etiam sua-
uiter & iucundè redolent. Maturitatem adipiscuntur
Autumni principio, & vsque ad æquinoctium ver-
num durant, frequenter etiam longius. Ha-
bentur Hildesheimij, præsertim in hortis Mo-
nachorum in Sulta extra urbem sito Cœno-
bio.

**Crocina ru-
benta.** *Crocina rubenta* id est, Crocina rubentia, Crocinis figu-
ra & magnitudine æqualia sunt, colore verò pulmen-
tariis & dulcibus minoribus: nam similiter sangui-
neis vibicibus roseam superficiem distinctam ha-
bent. Carnis substantia, saporis qualitate, mature-
scendi, durandique tempore Crocinis respondent.
Proueniunt autè in Saxonia Hildesheimij ac Hono-
ueræ.

Pulmonea. *Pulmonea* mala quæ Romani Pulmonea olim no-
minabant, omnium dulcium maxima sunt, figura
globosa, diametri quoque versus non raro trientalis,
colore flaua, nonnunquam etiam in viridi pallido,
præsertim vbi frigidiori humidiorque ætate enata
fuerint. Carne constant rara, fungosa, instar pulmonis,
vnde etiam nomen sortita sunt: ea digitis confricata
& auribus admodum strepitum edunt. Saporem ha-
bent dulcem, non insuauem, nulla alia qualitate
mixtum, maturitatem consequuntur Æstatis exitu.
Durare aliquandiu possunt, nunquam tamen aut raro
hyemale solstitium attingunt. Proueniunt copiosè in
Hassia.

**Pulmonea
salici inserta.** *Pulmonea salici inserta* id est, Pulmonea salici inserta, Pulmo-
neis iam dictis æqualia & similia sunt. Carne constant
paulò rariore, gustu dulci atque aliquantulum ama-
rescente. Æstatis exitu hæc quoque maturefcunt, & si-
militer modico tempore durant, coluntur à quibus-
dam in Hassia. Possunt horum ad exemplum etiam
alia salici inseri, præsertim dulcia & alioquin rare
substantiz, auctuque facilia.

Vinea. *Vinea* id est, vitrea, pulmonis similia equaliaque
sunt, non tantum figura, verum etiam colore,
præterquam quod superficiem, nonnunquam etiam
carnem habent obscuri vitri modo pellucidam, quod
horum Malorum proprium est, idem si alijs Malis
contingat, viciū censendum est. Carne constant
dulci, suavi, modicè vinosa. Maturefcunt Æstatis exi-
tu, diu autem durare minimè valent. Nascuntur Co-
burgi in Franconia.

**Duracina
ruffa.** *Duracina ruffa* id est, Duracina ruffa, figuram habent
orbiculatam, interimque globosam, magnitudinem
verò neque omnia, neque ubique eandem, vt pluri-
mum tamen altitudine sextantem, latitudine sextan-
tem & semunciam attingunt: colore sunt roseo, san-

guineis longisque vibicibus vndique distincta. Car-
ne constant admodum solida & densa, attamen valdè
tenera, succosa in gustu, acetosa, cū peculiari suauita-
te. Odorem spirant non ingratiū. Maturefcunt
autem Autumni initio atque omnium diuissimè du-
rant: nonnunquam enim vsque ad Æstatis medium
atque non raro diutius, protogantur. Proue-
niunt ferè in omnibus totius Germaniz poma-
riis.

Oenoximela. *Oenoximela* id est, Oenoximela, Orbiculatis fi-
gurâ & quantitate similia sunt, paulò tamen altiora,
nec vsque adè in planum compressa. Colore ab
vna parte in viridi pallidoque candicante, ab altera
leuiter interdum rubescente. Carne constant ad-
modum solida duraque, interim tamen delicata &
tenera, succosa gustu vinosaque suauitate, tenue,
austum, sincerumque vinum æmulante. Matur-
ritatem adipiscuntur Autumno ineunte, & vsque
post æquinoctium vernum durant. Abundant in
Hassia.

Angulosa longa. *Angulosa longa* id est, Angulosa longa, ab angulis nomen
inuenerunt, à pediculo enim vsque ad pythmenâ vn-
dique angulis crassioribus fuscantur, qui tamen
iuxta vtrumque caput eminentiores sunt, in medio
verò, hoc est, ventre, non tam evidentes. Lon-
gitudinem habent quadrantalem, latitudinem sex-
tantalem, nonnunquam tamen in maiorem ado-
lescunt. Colorem autem flauum, sanguineis vi-
bicibus, densè conspersum. Caro eis tenera, suc-
cosa & mitis, gustu inter dulcem atque acetosum
saporem media, & suavis valdè. Maturefcunt Au-
tumni principio, ac vernum vsque ad æquino-
ctium durant. Proueniunt in Hassia ac Mis-
nia.

Angulosa rotunda. *Angulosa rotunda* id est, Angulosa rotunda, angulo-
rum eminentiis, colore, carnis substantia, sapore,
maturefcendi, durandique tempore, Angulosi lon-
gis similia sunt, in hoc tantum ab ijs differunt,
quod vt plurimum globosam figuram habeant, ma-
gnitudine sunt quoque versus quadrantali, non
raro tamen maiora, quanquam frequenter e-
tiam minora inueniantur. Proueniunt in Mis-
nia.

Prasomela. *Prasomela* id est, Prasomela, figuram habent ob-
longam, latitudinem sextantalem, longitudinem
autem semunciam maiorem, colore sunt in viridi
pallido. Carne constant tenera, gustu suavi, dul-
ci, simulque acetosa. Maturefcunt Æstatis exitu,
& totam Hyemem durant. Proueniunt copio-
sè in Hassia Marpurgensi agro, ac in vici-
nia.

Gothardina alba. *Gothardina alba* id est, Gothardina alba, Gothar-
dinis figura, carnis teneritudine, sapore, matu-
rescendi, durandique tempore similia. Magnitudi-
nem verò inter Prasomela ac Gothardina mediam
habent. Colorem autem in viridi candicantem.
Frequens eorum est Marpurgi in Hassia prouen-
tus.

Augustina. *Augustina* id est, Augustina, parua sunt atque
propemodum globosa, sesquiunciam tam latitudi-
ne, quam longitudine raro excedunt. Colorem
habent flauum, carnem teneram, gustu dulcissi-
mam & valdè suauem. Odorem gratum & iucun-
dum. Maturefcunt Augusto mense, vnde norden
inuenerunt, eadem fugacia sunt, minimeque du-
rant. Nascuntur vbiq; ferè in Germania, sed in
Hassia, copiosissimè. Saxones ea *Eyden* vo-
cant.

Rosacea. *Rosacea* id est, Rosacea, Presilianis magnitu-
dine & colore similia existunt, carnem habent pau-
lò dulciorem, figuram verò non vsque adè glo-
bosam. Maturefcunt Æstatis exitu & ad Hye-
mem vsque durant. Proueniunt Coburgi in
Francis.

Quædam

Sanguinea. *Stus d'f'f'id est*, Sanguinea, figura sunt globosa, quantitate sextante paulo maiore, colorem habent foris roseum. Carnem verò teneram veluti in sanguine maceratam, roborisque gratissimi: gustu dulcem, aliquantulum subacidam & suavitissimam. Maturescunt æstatis exitu. Magnus eorum est Coburgi in Francia prouentus, quamvis & alibi non desint.

Paleia ma. *Guspe'f'f'id est* dulcia magna, Pulmoneis figura & quantitate æqualia sunt, paulo tamen minora, rotundioraque. Colorem habent in viridi flavescentem, ex altera parte subrubentem. Carnem mediocriter solidam, gustu dulcem, suavitique. Odorem spirant gratum ac Martubio simillimum. Maturescunt æstatis exitu: abundant in Hassia.

Oximela maiora. *Saurap'f'f'id est* Oximela maiora, dulcibus magnis colore, magnitudine, figuraque similia sunt, in hoc tamen differunt à dulcibus, ferè omnia acetosa, quod candicantia exiguaque puncta per cutim transpareant. Carne constant solida, tenera, gustu acetosa, vinosa suauisque. Maturescunt æstatis exitu, durantque in Hyemem. Proueniunt in Hassia.

Parelia. *Pare'f'f'id est*, Parelia, Omnium maxima sunt, figura globosa, modicè compressa, colore in roscio alicubi flavescente, sanguineisque vibicibus consperso. Carne constant tenera, sapore inter dulcem ac accescentem medio, estque hic non mediocriter suavis. Odorem spirant iucundum, maturitatem consequuntur Autumni initio, durantque ad Autumni ferè exitum. Colitur Islabij, vicinisque tractibus.

Oximela minora. *Saurap'f'f'id est*, Oximela minora, Duracini ruffis æqualia similiaque sunt, paulo tamen oblongiora, colore in viridi candidoque flavescente, punctisque candicantibus per cutim translucentibus conspersa. Carne, sapore, maturescendi, durandique tempore Oximela maiora imitantur, paulo tamen acetosiora existunt. Prouentus eorum est in Hassia magnus.

Glycymela. Idem Cordus apud Diosc. scribit Melimela siue Glycymela facile sibi persuasurum esse ea, quæ Germanis *Hem'f'f'id* & *Hag'f'f'id* vocantur, si alia accederent. Esse enī admodum dulcia & suauia, & pueris & delicatis mulieribus expeti. Idem alibi Epicotico- rum meminit, sed qualia sint, non addit.

Tragi differētia. *Trag'f'f'id est*, qui Argentinae scripsit, Germaniæ quædam pomorum genera describit: Quæ (inquit) apud nos prima maturantur, S. Ioannis Poma vernaculo

Præcocia. idiomate, Lat. Præcocia Mala dicuntur. Quæ Augusto mēse, rubris vibicibus quasi notata & dulcia

Glycymela. *Hag'f'f'id* vocamus Græcè *γλυκύμηλα*. Quæ Autumnō maturescunt ac alia quidem incana, alia lutea, alia coloribus variegata apparent, omniaque dulcia,

Aromatica. *Burg'f'f'id* quasi Aromatica Mala, à iucundissimo nimirum odore, tum sapore nominamus, Capendua alius dicta. Poma verò ea, quæ magna sunt, alba & dulcia, in quorum vterō semina per maturitatem sonant,

Paspoma. Ruellio Paspoma appellantur. Sunt deinde magna quoque & similiter dulcia, rubro colore maculata, quæ Germani *Schagen'f'f'id* aut *Hem'f'f'id* nuncupant. Alia dulcia, candida & turbinata & oblonga reperiuntur, orthomastica nuncupata. Germ. *Stredelung* & *Odus'f'f'id*. Sunt & Paradisiaca vocata, Germanica *Paradies'f'f'id*. Acidorum Pomorū infinitus est numerus quorum vulgarissima, *Rot'f'f'id*, *Wem'f'f'id*, *Hröf'f'id*, *Hermelung*, *Ettemung*, *Speertung*, *Hemmelung*, *Draven'f'f'id* &c. Videtur verò Tragus vulgi secutus opinionem, credidisse Malum, de qua hoc capite agimus, cam fuisse arborem, quæ à summo Ichouah interdicta fuerat primo patenti Adamo, ne ea vesceretur. Sux namque figuræ serpentem appingi curauit & caluariat, his

Orthomastica. *Paradisiaca.* vti que notis, deceptionem Diaboli insinuans, & mortem; de qua re iudicent eruditi. *Hiz'f'f'id*. Brunich.

An Malus Adamo interdita.

Hier. Bruns.

Paradies'f'f'id Poma Paradisi vocat, in quibus morsus Eux & Adam apparet, Latine Musa: confusè & igno- rante Musa cum Pomis vulgaris confundens. Et in quo tandem Pomi genere morsum vidit. Nos alibi suo loco indicabimus, qualem eam existimemus fuisse arborem. Lonicerus verò præter serpētem etiā Adam & Eux effigiem appinxit, quasi hoc genere Pomi sui oblii officij, comederint. Cornarius apud Dioscor.

Vernorum tantum meminit. & Germ. *Stränge'f'f'id* dicitur. MATTHIOLVS de Malis Italicis pauca hæc habet. In Hetruria, ait, principatum obtinent Mala,

quæ Appie & Melerosæ vulgè vocantur, quandoquidem hæc duo genera cum suauiter oleant gustuique arrideant, cum naribus & palato maximam incunt gratiam. Eaque propter non longè cum aberrare putauerim, qui dixerit, Appia esse Diosc. Melimela. Ro-

sea verò quæ eidem Epirotica & Lat. Orbiculata dicuntur. Quæ verò adeò rubent, ut cruore perfusa videantur, & acido gustu sunt prædita, non alia de causa ita rubescunt, (si rei agrariz auctoribus credimus) nisi quod ex Mali & Mori nigra insitione suam traxerint originem. Celsiana non sunt Aurantiz Mala, ut

Cornarius putat.

Sed nec suæ patriæ Malorum oblitus est GESNERVS diligens omnis naturæ peruestigator, & alter quidam Heluetiz Plinius: Nam, inquit, Malorum quamplurima optimaque in hortis & prædiis nostris (Tigurinis & Helueticis) proueniunt: præcocia, media, serotina. Horum aliqua decant tribus, quatuor, aut pluribus mensibus: quædam usque in sequentem annum, donec alia maturescant, commodè reposita.

Malorum genera quædam (non quælibet tamen) ramis & brachiis suis in latitudinem diluci ab elegantiz studiosis solent, ut brachia vndique in superficiem ferè planam extensa, lecti cuiusdam speciem, pedamentis in orbem digestis sustentata, præ se ferant. Eiusmodi non pauca apud nos priuatis, publicisque locis visuntur, in quo arborum excolendarum studio Basilienses sanè & totius ferè tractus Alsatici incolæ triumphant.

Idem Gesnerus Malos humiles duorum facit generum: vnam, cuius fructus Poma Adam vocat, vtraque scutem potius, quam arbor. Itē Malus nana, *Burg'f'f'id*, Matthiæ Curtio Lindauiz, Poma fert Paradisiis vulgè dictis non dissimilia, albicantia: quæ sub finem Iulij maturescunt. Arbustum non supra quatuor cubitos assurgit, fruticans à radice. Item: Curtio eidem Malus quædam ex Italia: cuius Poma magna & rugosa in precio sunt: Pampin vocant. Scaliger quoque meminit Malorum Pumilarum, quæ breuis admodum sint vitæ, & quarum aliquæ annuis mortibus hortulos deformant. Item eorum, quæ Apiola Italis dici ait, dulcia illa quidem, tam iucundè fragrantia, ut vniuersas Indias sua superent suauitate. Lacuna apud Diosc. refert, inter Mali genera in Hispania præcellere Camuesæ: & Amatus ex dulcibus & odoriferis Camusia & Regalia dicta celebrat atque odorifera & cordialia esse, ut si eorum cortices ignitis prunis iniiciantur, ex se odorem referant moschatum. Arabibus Poma musa esse medijs saporis.

paraphrasia & ymimonia Piusdem esse Galopomella, Melomella. Carolus Stephanus in opere suo Geoponico Germ. Paradisiaca inter alia peculiaria habet, aromatica, alba, dulcia, Franca boni odoris & saporis. Item, Gallis dicta d'Hetoet, de Malingre, de Rabure, & Mala *Menseria'f'f'id* & *Malingraut'f'f'id*.

Germanis dicta: lo. VVitrichius, Poma Porsdorffiana, quæ ad febres Epidemicas cum Mania commendat. Dodonæo est *paraphrasia* quædam, siue humilis Malus, fruticis modo adolescens, quæ non propter infirmitatem, sed naturâ sua Poma fert præcocia, mediocriter dulcia colore admodum distutè flauo albicantia. Brabantia vulgè Poma Paradisi, aut Poma D. Ioannis nominant. Lon. & Pena, Mala quamplurima, cultu digesta, in Anglia, Belgio & Northmania, esse tradunt

Mali humilis. *Poma Adam.* *Malus nana.* *Burg'f'f'id.* *Matthiæ Curtio.* *Malus nana.*

Pampin. *Malus Pumila.* *Apiola.*

Camuesæ. *Camusia.*

Musa Poma. *Galopomella.* *Melomella.* *Car. Steph.* *differeutiæ.*

paraphrasia & ymimonia Piusdem esse Galopomella, Melomella. Carolus Stephanus in opere suo Geoponico Germ. Paradisiaca inter alia peculiaria habet, aromatica, alba, dulcia, Franca boni odoris & saporis. Item, Gallis dicta d'Hetoet, de Malingre, de Rabure, & Mala *Menseria'f'f'id* & *Malingraut'f'f'id*.

Germanis dicta: lo. VVitrichius, Poma Porsdorffiana, quæ ad febres Epidemicas cum Mania commendat. Dodonæo est *paraphrasia* quædam, siue humilis Malus, fruticis modo adolescens, quæ non propter infirmitatem, sed naturâ sua Poma fert præcocia, mediocriter dulcia colore admodum distutè flauo albicantia. Brabantia vulgè Poma Paradisi, aut Poma D. Ioannis nominant. Lon. & Pena, Mala quamplurima, cultu digesta, in Anglia, Belgio & Northmania, esse tradunt

Mali humilis. *Poma Adam.* *Malus nana.* *Burg'f'f'id.* *Matthiæ Curtio.* *Malus nana.*

Pampin. *Malus Pumila.* *Apiola.*

Camuesæ. *Camusia.*

Musa Poma. *Galopomella.* *Melomella.* *Car. Steph.* *differeutiæ.*

paraphrasia & ymimonia Piusdem esse Galopomella, Melomella. Carolus Stephanus in opere suo Geoponico Germ. Paradisiaca inter alia peculiaria habet, aromatica, alba, dulcia, Franca boni odoris & saporis. Item, Gallis dicta d'Hetoet, de Malingre, de Rabure, & Mala *Menseria'f'f'id* & *Malingraut'f'f'id*.

Germanis dicta: lo. VVitrichius, Poma Porsdorffiana, quæ ad febres Epidemicas cum Mania commendat. Dodonæo est *paraphrasia* quædam, siue humilis Malus, fruticis modo adolescens, quæ non propter infirmitatem, sed naturâ sua Poma fert præcocia, mediocriter dulcia colore admodum distutè flauo albicantia. Brabantia vulgè Poma Paradisi, aut Poma D. Ioannis nominant. Lon. & Pena, Mala quamplurima, cultu digesta, in Anglia, Belgio & Northmania, esse tradunt

Mali humilis. *Poma Adam.* *Malus nana.* *Burg'f'f'id.* *Matthiæ Curtio.* *Malus nana.*

Pampin. *Malus Pumila.* *Apiola.*

Camuesæ. *Camusia.*

LIBER PRIMVS

Northmani-
ca inus &
loria Cucco-
nea.
Diferentia.
Gerardi.
Carbonaria.
Carbonaria
onga.
Regale.
Reginale.
Platomela.

quæ foris intusque Coccineo succo & aspectu mi-
cant. Ad Anglica quod attinet, Gerardus in suo Her-
bario Anglico hæc recenset. 1. Malus Carbonaria,
The yome water tree. 2. Malus Carbonaria longo fructu,
The yome water tree. 3. Malum regale, The King of
Apples. (Tabern. icon. p. 1007. Rel Semper Disting) 4.
Malum reginale The King of Apples. (Tab. ic.
p. 1007. Mala rubentia, Eremius) 5. Platomela, siue Pyra
æstiva, The Summer Pearmaine (Tab. ic. p. 1004. Platomela,
Disting) 6. Platarchia siue Pyra hyemalis, The winter
Pearmaine (Tab. ic. p. 1004. Platarchia) 7. Chamæma-
lus Londini, The London Apple tree or Paradise Apple. Hæc
Gerardus, qui ex viginti Tabernamontani figuris qua-
tuor tantum assumpsit, nec tamen ipsa describit. Mi-
rum etiam cur ex duobus Pomis siue Malis faciat Py-
ros, nulla eius rei appositæ ratione? Item cur Chamæ-
malum recenset inter Sylvestria Poma?

Taberna-
montani
diferentia.

Taberna-
montani
diferentia.

Taberna-
montani
diferentia.

Casalpini
diferentia.
Mc. appia.

Rosæ.

Sanguinea.

Orthomasti-
ca.
Calamagna.

Pulmonia.

Testa.
Orbiculata
parua.

Daca.
Verna.

Sylvestria.

Aug. Galli
diferentia
Italica.
Pomi dol-
ciani.
Poma D.
Petri.

Pomo rosso.

Pomum Pa-
radisi.

quæ foris intusque Coccineo succo & aspectu mi-
cant. Ad Anglica quod attinet, Gerardus in suo Her-
bario Anglico hæc recenset. 1. Malus Carbonaria,
The yome water tree. 2. Malus Carbonaria longo fructu,
The yome water tree. 3. Malum regale, The King of
Apples. (Tabern. icon. p. 1007. Rel Semper Disting) 4.
Malum reginale The King of Apples. (Tab. ic.
p. 1007. Mala rubentia, Eremius) 5. Platomela, siue Pyra
æstiva, The Summer Pearmaine (Tab. ic. p. 1004. Platomela,
Disting) 6. Platarchia siue Pyra hyemalis, The winter
Pearmaine (Tab. ic. p. 1004. Platarchia) 7. Chamæma-
lus Londini, The London Apple tree or Paradise Apple. Hæc
Gerardus, qui ex viginti Tabernamontani figuris qua-
tuor tantum assumpsit, nec tamen ipsa describit. Mi-
rum etiam cur ex duobus Pomis siue Malis faciat Py-
ros, nulla eius rei appositæ ratione? Item cur Chamæ-
malum recenset inter Sylvestria Poma?

Tabernamontanus, qui postremus est eorum qui
quidem Herbarium scripserint ex professo, ista propo-
nit. 1. Mala præcocia, & Ioua. 2. Mala augustea,
Magdalen. 3. Mala præcocia rubra, & Ioua. 4. Mala Carbonaria,
Rel. 5. Mala Carbonaria longa, long. Rel. 6. Mala æstiva, Comm. 7. Ma-
la Orbiculata, Disting. 8. Glycomela, Sup. 9. Gly-
comela 2. Sup. Rel. 10. Oenomela, Disting. 11. Oximela, Disting. 12. Hymotomela, Disting. 13. Plato-
mela, Disting. 14. Platarchia. 15. Platomela alia, Disting. 16.
Melapia, Disting. 17. Melapia. 18. Melapia. 19. Melapia. 20. Melapia. 21. Mala rubentia, Eremius. Et
ante ista, Hymotomela Duracina alba dicit, & Persicis ad-
iungit, quàm bene, notunt, quibus nomen Hymotomela
cognitum est. Et quid voluit inanitatem suam, quàm em-
ptoris impensa tot figuras dare sine vllis descriptio-
nibus?

CASALPINVS Medicus Romanus, in opere suo
Botanico sua veteribus accommodare studet, sic: Me-
lappia parua sunt, nucem vix excedentia, rotunda, ex-
terius tantum pallida, odoratissima, sapore dulci. Vide-
rentur hæc Appiana esse apud Plinium, ab Appio &
Claudio genere inlito Cotonco, quibus odor est Coto-
neorum, magnitudoque: sed cum obster magnitudo,
melius dicitur apud Dioscoridem Melimela à sapo-
re melleo, esse, quæ à multis dulcia Mala vocantur.
Nullum enim in genere Malorum illis dulcius est.
Rosæ medix magnitudinis sunt orbiculata colore
rubenti, qua parte sol aspexit: odor inest suavis: sa-
pore dulci subacido, tota Hyeme seruantur incorru-
pta, meliora sunt, cum rugas contraxerint. Dioscori-
des Epirotica & orbiculata vocat stomacho utilia. Plini-
us ex Epito primum allata putat ob nominis argu-
mentum. Sanguinea rosæis similia, minus odorata, insi-
pidioraque. Plinius colorem sanguineum ex insitu
Mori, tractum putat, in hoc genere quædam oblon-
giora, figurâ Mammæ, acidi saporis. Plinius Orthoma-
stica vocat. Calamagna, quali pulchræ magnitudinis
Mala, colore rubente: sapore magis aquoso, Plinius
Pulmonia videtur appellasse, quæ stolidè tument.
Quædam colore quasi ferrugineo; solidiori carne; sa-
pore dulci ex austero, vulgè Testa vocant, figura Stru-
theorum. Quædam parua humili frutice, orbiculata,
virentia adhuc, gustu non ingrata. Plinius inter vilissi-
ma Dacca vocat, quæ prima aduentu decerpi properant.
Dioscorides per verna hæc videtur intellexisse: omni-
no damnata. Sylvestria similiter parua, quæ præ acer-
bitate ingustabilia, Dioscorides Vernis similia scri-
bit. August. Gallus Lombardiz quædam Poma recen-
sens, meliora apud Brixianos ait, esse dicta Poma dol-
ciani, parua & media, eodem tempore cum Pyris mos-
chatellinis matura. Proximè sequuntur D. Petri Mala,
Pomi di S. Pietro: nec nouit aliud genus matureman-
te Autumnum. Malum quod dicitur Pomo rosso gros-
so, gratum est, quia carne est tenera: optimum tam
crudum, quàm coctum cum saccharo, sanis & ægris.
Verum non diu durant. Probatum & Pomum paradisi

fatis diu durans, quod optimum est post natalitia.
Eius duo genera, vñ longius altero. Malorum dicto-
rum Pomi ruggimenti duo genera. Præteruntur aci-
da dulcibus: dulcia edulia sunt, paulò post natalia
Domini. Iis prætereuntibus bonitatis perfectionem
acquirunt acida in aliquot menses duratura: maiora
sunt prædictis, firmiora, sapidioraque. Omni tempo-
re conditi possunt, Pomi Calamini dicta Mala, om-
nibus placent, sapidissima, nec minus durant cæteris.
Pomi Papini dicta in pretio sunt, cum propter bonita-
tem, tum propter diuturnitatem. Mala dicta Pomi
rostaroli, grata sunt, quia pulchritudine & liquore su-
perant omnia alia: ut mirum non sit in bacchanalibus
tanto pretio inuenibus vendi, præsertim iis, qui per
vibes, compita, & choreas debachantur. Pomi Appioli
quod genus magni fidebat ab antiquis, recentioribus
quoque hodie habentur in pretio, quippe quæ omni-
bus reliquis delicatiora.

Nec Hispanica sua penitus indicta voluit Lacuna.
Vulgè Mancana Camuefa omnibus cæteris præfer-
tur, quod præter aromaticam gratiam, quam habent,
gustum & liquorem sunt gratissimo. Nec sibi visum hoc
Pomi genus putat extra Hispaniam & aliqua Flandiæ
loca: Flandrica tamen multum Castellanis cedere.
His succedunt Mala dicta Pomopero de uelido. Se-
quuntur Melapta Italorum. In Hispaniæ partibus non
cognoscuntur Diole. Melimela & Epirotica, ut idem
tradit. Redeamus in Germaniam.

Coterus in suo distio Oeconomico, pauca quidem
affert, attamen ab aliis non prolata, aut saltem non
istis nominibus, ut eo ipso eius diligentia proban-
da videatur. 1. Mala. 2. Mala. 3. Mala. 4. Mala.
5. Mala. 6. Mala. 7. Mala. 8. Mala. 9. Mala. 10. Mala.
11. Mala. 12. Mala. 13. Mala. 14. Mala. 15. Mala. 16. Mala.
17. Mala. 18. Mala. 19. Mala. 20. Mala. 21. Mala. 22. Mala.
23. Mala. 24. Mala. 25. Mala. 26. Mala. 27. Mala. 28. Mala.
29. Mala. 30. Mala. 31. Mala. 32. Mala. 33. Mala. 34. Mala.
35. Mala. 36. Mala. 37. Mala. 38. Mala. 39. Mala. 40. Mala.
41. Mala. 42. Mala. 43. Mala. 44. Mala. 45. Mala. 46. Mala.
47. Mala. 48. Mala. 49. Mala. 50. Mala. 51. Mala. 52. Mala.
53. Mala. 54. Mala. 55. Mala. 56. Mala. 57. Mala. 58. Mala.
59. Mala. 60. Mala. 61. Mala. 62. Mala. 63. Mala. 64. Mala.
65. Mala. 66. Mala. 67. Mala. 68. Mala. 69. Mala. 70. Mala.
71. Mala. 72. Mala. 73. Mala. 74. Mala. 75. Mala. 76. Mala.
77. Mala. 78. Mala. 79. Mala. 80. Mala. 81. Mala. 82. Mala.
83. Mala. 84. Mala. 85. Mala. 86. Mala. 87. Mala. 88. Mala.
89. Mala. 90. Mala. 91. Mala. 92. Mala. 93. Mala. 94. Mala.
95. Mala. 96. Mala. 97. Mala. 98. Mala. 99. Mala. 100. Mala.


Atque hæc sunt ferè Malorum genera, ab autoribus
vel nomine solo, vel etiam descriptione consignata:
vnde patet hanc nostram ætatem Malorum (vñnam
non & malorum) prouentu, prisco illo æuo longe su-
periore. Patet etiam quosdam studuisse sua prisco-
rum titulis accommodare, alios sua simplicitate con-
tentos, in præsentibus conuenisse. Et cautiùs ut no-
stra quidem fert sententia. Nam cum Pomorum varie-
tas ex insitionum maximè varietate sit orta, & etiam-
num singulis oriatur annis, quæ tandem fieri queat di-
ligentiâ, quo iudicii acumine, hæc nostra istis prisco-
rum aptari, aut eadem esse cum iis pronunciari
queant, ut non sat sani hominis (si quid Goropij ma-
ximi viri iudicio tribuendum) esse videatur, si quis
huius ætatis vel Mala vel Pyra, vel alterius generis di-
uersa ex insitione Poma (qualia hodie ferè sunt plera-
que) ad veterum nomenclaturas cogere ac pro iisdem
vendicare

DE MALIS.

venditare nitatur. Non isle cuiusque succos, eo iudicio, quo simplices medicamentorum facultates sunt examinanda, id verò dignum iudicamus in quo laboretur. Habuerint sanè Romani Orbiculata delicatissima, habuerint Melimela, Mattiana, Scadiana, Picena, Amerina, Syriaca, Pelusiaca, Quiriniana, Sertania, Platania, Muslea, & si feminis placet, etiam Pannacea, nunquid ideo nobis ob hanc diuersitatem, laborandum? Scimus Sestiana Poma, siue, vt Columella habet Sextiana, non verò Cestiana, vt malè apud Galenum vocantur, inter ea numerari quæ astringendi vi magnam vtilitatem habent. Ea tamen de caasaminimè nobis disputandum, quæ sint Sestiana Poma, ne nobis vana querentibus, illud quod Cornario (nisi memoria fallat) in hoc Pomo accidat, vt Sestiana Hesperidum Mala credamus, & tandem cum Matthianis etiam confundamus, à quibus credi posset Hispanos hoc tempore omnibus Malis nomen mutuari. Hoc agendum, vt inueniamus Mala, quæ astringendi facultate non cedant Sestianis, qualia quamplurima reperiuntur, (& nos mox describemus quædam appositis picturis) & nisi inuenirentur, aliis Malis Cotoneo insitis fieri possent. Ecquam ergo nos sportulam aduehemus ad istud Malorum Empiorum? inueniuerò sanè, talia qualia accepimus, decerpimus, vidimus, gustauimus, partim etiam coluimus ipsi, conferemus, breui, sed exacto singulis appposito lemmate, & eicône ex ipsomet prototypo ad singulorum magnitudinem parato, ne nostro nos, qui nunc hoc agimus, officio defuisse videamur. Placebit, speramus, non herbarum tantùm studiosis, sed & Pharmacopœis (quorum etiam hæc nouisse interest) & hortorum cultoris, & omnibus denique bonis Oeconomis.

Ergo & nostras Pomonæ Vertumnique opes, quas partim ex ducato VVirttembergico, partim ex agro Basiliensi, Burgundico atque Alsatico, quatum haud temerè alia loca maiorem suppeditent varietatem, conquisimus, tandem promamus.


Malum VVirttembergicum Wettich sufflaum.



In ducatu VVirttembergico, & speciatim iuxta Balneum admirabile circa Bol, Pomum hoc Wettich dictum Alatum etiam è pago Wirsbach, vbi Guttentich vocari tradunt.

Magnitudinem figura docet, vt & reliquorū quæ sequuntur, sicut & formam extrinsecam, quam figuram vocant. Est ex albo luteolum, pediculo satis longo. Sept. 20. nondum perfectè maturum: carne tamen iam sublutea, dura, acida. Delatum Montbelgardum ad Febr. durauit.

Malum Wettich 2.




Stem Wettich. ex Bol pago eiusdem Ducatus VVirttemberg. Multum habet albidu, cum luteolo mixturalicubi rubellum: nonnihil angulosum, pediculo mediocri.

Septembris 20. carne erat alba satis tenera, acida, grata. Diu durare aiunt, nec grandescere, fragran-


temque matura spirare odorem. Montbelgardum delatum, mense Febr. integrum adhuc fuit, & spem exhibuit longioris durationis.

Malum Wettich 3.



pago Bolleni vicino. Sept. 20. carne erat alba, satis dura, sapore acido, nec dum maturum videbatur.


Malum Wettich italicum maius & minus.



MALA Wettich Wettich dicta, ut quasi Italica, pulchra sunt, in Bol & nonnihil angulosa: colore alba, superne pulchre rubentia, in medio punctata: aliquando nonnihil luteola:

pediculo longiusculo, quem non exprimunt pictura. Durare aiunt ad Aprilem. Sept. 20. Caro intus alba, tenera, acida, sapida, dicuntur diu durare, etiam per totam Hyemè. Montbelgardum translata bona aduc fuerunt Maij medio sequentis anni. Magnitudinem figura exprimit.

Oenamelum VVirttembergicum.



Wettich dictum, Pomum vinosum vulgè dictum, elegans, candidum, umbilico tenui parum angulosum

Wettich dictum.

Pomorum
primo xui
receptula-
ne.

Cora. nota.
Hesperidum mala.

Antoribus
obseruans.
Pomorum
differentia.


Wettich
dictum.

Wettich
dictum.

Durare perhibent vsquē ad Aprilem. Coluntur in
Mans & alibi. Multum habet similitudinis cum
precedenti, minori præsertim, quo tamen pau-
lò habitius est, colore albo, ad pediculum non,
nihil luteolo.

Malum Dentis viridans.


Ornamentis



Ornamentis ex
Mans, in lu-
teolo sub-
viride, pedi-
culo satis
lògo. Mom-
pelgardū de-
latum, inte-
grum adhuc
Maij medio.
Vnicum tā-
tū nacti

famulis, quod adseruatū diu, sed negotiis impediti,
nec Pomi, nec saporis designandi meminimus. No-
rint id incolæ. Verūmīle tamen est, prioribus gustu
non multū esse dissimile, siquidem communi
conueniat nomine.


Malum Virgineum, acidum.



Jundstam.
d, fct.

Jundstam d, fct., quasi dicat Virgineum po-
mum, sessile, colore ex albo subluteo, aliquot striis
& maculis subentibus decoratum, pediculo satis
longo, tenui. Caro a ba, dura, acida nondum edulis
Sept. 20. grata tamen, etiam ante perfectam maturi-
tatem.


Duracinum album, Zellenf.



Wetp
Harting.



Wetp Harting, Duracinum album, ex Jm, medio-
cre Pomum, album cum luteolo intermixto, parte
præsertim superiore ad umbilicum, ad pedicu-
lum verò rubello. Angulosum est, carne du-
riuscula & firma, (vnde nomen) sapida. Aiunt
durare ad Pascha ac etiam vsque ad oporan. Nobis
adseruata, integra adhuc fuerunt medio Maio, se-
quentis anni.

Duracinum album Bollenf.



Wetp Harting d, fct., quasi duriusculum album Bol-
lenfibus dictum, quod diu duret, vt ij retulerunt, qui
in get obtulerunt: nonnihil angulosum, coloris
albi subrulei. Accepimus ex Mans paulò ma-
iora. Sed hoc idem existimamus cum præce-
denti, & bis pictum, aut certe quā minimū
variare. Hortulanus Ill. E. C. Montbelgar-
densis eadem significatione *blanc-dure* vocat Gal-
lico idiomate, & in horto E. C. Montbelgardi
prouenire ait.

*Pomum Pentagonum perelegans, acido
dulce, utrinque sessile.*



Elegas hoc rarum-
que Pomum, ab Ill.
Ducissa VVitem-
bergica, Principissa
nostra Clementis-
sima missum, cum
aliis quibusdā exo-
ticæ elegantie na-
turalibus dono ac-
cepimus: Mediocre
est, & figura magni-
tudinē non adæ-
quat: quippe trium
aut quatuor uncia-
rum lantum, sescun-
cia nō altius com-
pressum, utrinque
sessile. Parte super-
na, qua Pythmene,
impressum. Angu-
lis quinque protu-
berantibus conspi-
cuum est, maiori parte luteis, reliqua eleganter rubi-
cunda, punctis tamen luteis notata. Februario
sectum carne satis molli erat, acidodulci, ac
penē vinoso. Surculos ab eadem E. C. missos in
horto E. C. quem Montbelgardi colimus, inseri
curauimus. Figura utramque faciem oppositam
exprimit.

Poma quadrata vulgò dicuntur Montbelgardi
Pommes carrees, propter angulos. Sunt tamen com-
muniter pentagona, interdum Hexagona aut He-
pragona, angulis nimirum per longitudinem protu-
berantibus, quorum pars suprema, propter umbili-
cum, in gibbos & tubercula eleuatur: totumque
adēd Pomum angulis scatet. Quatuor uncias alta,
tres lata, sessilis, pediculo breui, flana, punctis
araneosis nigricantibus conspersa. Mense Oct.
lecta, odorata sunt, sapore vinoso, acidulo, gra-
to: carne tamen adhuc duriuscula. Ex horto E. C.
Montbelgard.

Pomum
quadratum
Montb. acti-
dum, flans.

Malum




Malum turbinatum ex flauo virescens, punctatum.



Scuckardie *Wannepffel*, & Basileæ, *Spitzapfel* vocant, quasi naturæ acutæ dicas quod delatum esset. Montbelgardum, Decembr. 13. carne dura ad. huc & acida deprehensum. At *Wannepffel* integrum adhuc erat Febr. carne duriuscula, subacida, vinosa. Ad medium Maij esui aptum, cum aliqua aciditate.


Malum turbinatum, lactescensibus punctulis conspersum.




Wannepffel *Wannepffel* Bollenfibus & VValdensibus dictum simile satis *Wannepffel* & pileo turbinato vocato. Eadem enim forma fere colorque, sed minus hoc. In colore tamen hoc discriminis animaduertimus, quod licet sit ex albo subluteus & virescens, multa tamen habet puncta candida. Quædam etiam aliquid ruboris habent diffusi. Pediculus quidem brevis est, sed crassior. Videntur & angustiora, quam exprimat eicon. Aiunt durare vsque ad Ver, interdum etiam vsque ad æstatem. Sept. 19. nondum erant esui apta, carne dura, sapore vinoso austero, luteola. Tali adhuc erat Octob. Montbelgardum delatum, integrum adhuc Maij medio.

Wannepffel ex *Walden*, Pomum album, supernè turbinatum, infernè sessile. Diindurate aiunt. Punctulis planè lacteis aspersum est. Eiusdem generis aliud ex *Walden* accepimus, sed isto multò maius, & supra quinque digitos altum, quinque crassum: in cæteris simile, acidum est. Prouenit etiam in *Walden*, & aliis multis in locis, vt aiunt. Bonum adhuc & sapidum Montbelgardi 10. Febr.

Malum turbinatum maius, virescens.



Malum Vlmense.



Wannepffel *Wannepffel*, iisdem nuncupatum, quodd Pileum turbinatà formà referat, quibusdam *Wannepffel*, quasi Prasina dicas, fortè à colore. Pomum oblongum, basi latiore, in angustum fastigium exeunte, peciolo breui, crassiusculo. Durant vsque ad Febr. vt aiunt. Sept. 18. nondum erant esui apta. Sapor vinosus, Color ex albo subluteus & virescens. Quædam etiam aliquid viroris habent versus basim. Zellenfes hyemalis vocat, *Wannepffel*, vernacula lingua. Aiunt & *Wannepffel* dici, hoc est, exacuta. Oct. 25. carne adhuc dura, acida, necdum esui apta. Suspiciamus esse id, quod

Wannepffel *Wannepffel*, Vlmensia pomà, ex luteo subalbida, vna parte strias aliquas rubentes habent. Eadem fere latitudo quæ longitudo: pediculus longiusculus crassus. Pomum hoc quod vnicum accepimus contortum erat & veluti in medio bipartitum, nescimus an cætera talia.

Mala speciosa alba Fontis Admir.

Magna hæc & speciosa Mala in Ducatu VVirtzb. circa fontem Adm. proueniunt. Figura variant, iccirco








LIBER PRIMVS

16

Matth.
ap. 16.


Aprilē vsque durare aiunt. Idem Pomum datum
in Germanice *Matthias*, hoc est, Matthiae Pomum, aci-



dum quoque, & durabile, quod & ipsum erat per ru-
bedinem punctatum. Decembri. 12. cum iam putredi-
nis nota adesset, duram adhuc carnem, albā, acidam-
que deprehendimus. Duravit tamen ad Maij me-
dium vsque.

Malum rubellum VValdense.

Matth.
ap. 16.




Matthiae qua-
si Rubellū
dictum, in
Matth. Pul-
chellū Po-
mum, cu-
ius superior
pars valde
ruber, infe-
rior hinc in
de albicat,
cū pulchris
striis, & ve-
luti guttis
rubris. Pe-
diculus me-
diocris, cras-
sus sculis. V-
nicum tan-
tū acci-

pius ex illo loco, quod nonnihil erat angulosum.
Aiunt durare diu, vsque ad Quadragesimam. Datum
nobis in 8^{to} eodem nomine Pomum, sed maius, qua-
tuor digitos altum, crassitudine eadem: Color idem,
nisi quod non tantum rubebat: pediculo paulo lon-
giori. Hic tamen prius exhibemus. Quaedam etiam
ex iis, quae in 8^{to} nacti sumus, minora sunt. In 8^{to}
eadem vidimus, nisi fallimur nomine *Matthiae*, quae
Montbelgardum delata, duravit vsque ad finem
Febr. carne tenera, saporis subacidi, valde grati.

Phrygionum friarum.

Matth.
ap. 16.

Matthiae quasi friarum opportunitum aptum-




que, Bollenfibus dictum. Simillimum est *Matthiae*

dicto. Duo accepimus, quorum alterum quatuor
ferē vncias altum, crassum totidem, alterum depres-
sius, ad tres tantum vncias, quatuor ferē crassum.
Parte altera rubet, cum striis item saturatius ruben-
tibus: altera sublutea est, intercurrentibus quo-
que striis rubentibus. Durum est Pomum, pediculo
crasso admodum & breui. Montbelgardum dela-
tum integrum adhuc Febr. quo tempore adhuc car-
ne erat dura, acida, grata.

Malum Bollenfibus Zellensibus.

Bollenfibus Zellensibus dictum, durabile Pomum *Bollenfibus*
est, ut aiunt, mediocre. Vna parte rubet intercurran-




tibus striis, magis rubentibus: ceterā luteum. Pedi-
culo est satis breui. Admodum simile est hoc Pomo
paulo antea descripto, quod & strias rubras habet,
Sed hospes noster, in discernendis fructibus solers,
diuersum ait. Montbelgardum delatum, integrum ad
Februarium vsque, putredinem non sensit.

Malum Bollenfibus dictum.

Matth.
ap. 16.

Ita Bollenfibus & Zellenses appellat apud quos pro-
uenit. Pulchrum genus est, multumque rubens, stria-



tum: intercurrentibus nonnullis partibus luteolis
& virentibus. Multum habent similitudinis cum
Matthiae & cum *Bollenfibus* striatis & cum *Matthiae*. Pedi-
culo sunt longiusculo: carne acida, durabilia. Va-
riant inter se, Alia virent sine multo rubore: alia
parua, pediculis ipso ferē Pomo longioribus. Vi-
rore quidam distinguunt à *Matthiae*. Septembr. 10. non-
dum edulia, carne alba duraque, acida valde. Circa
Pascha primum maturantur, cunctique fiunt apta.
Montbelgardum delata, mense Maio, integra adhuc
& abunde grata erant.

Matthiae







LIBER PRIMVS



Fenestring.

precedenti, pediculo longiori. Anni diu durare. Vt amque expressimus.

Malum preciosum dictum.Rostfing
ap. H. l.


Rostfing id est, precio-
sum Pomum
in Ducatu
Vintemher-
gico vocant
circa fontem
Adm.

Angulo-
sum est, ex
luteo albidu,
quædam e-
tiam vna par-
te rubent, pe-
diculo bre-
ui. Durant
vsque ad A-
prilem, carne

satis tenera, dulci. Ex horto nostri hospitis, qui se so-
lum habere putabat. Habentur tamen etiam in
Bavaria, Saxonia, & Silesia. Id est, dulcissima vo-
cant. Hospes ille noster rapaces veritus manus, pau-
lo tempellius sub Augusti finem collegit. Illud
autem quod ex Saxonia accepimus maius fuit isto, ni-
mirum uncias quatuor altum, crassum quatuor &
semillem. Octob. 4. adhuc bona. & Montbelgardum
delata integritatem suam seruabant vterius.

Mala liquefcentia & sonora dicta dulcia.


Quædam, quasi dicas, facile liquefcentia Poma,
forè quod ob carnis teneritudinem facile in ore
diffuant, ex Saxonia & Silesia, nonnihil sunt angulosa, ex

Saxonia
ling.

albo & luteo pallida: pediculus non ita brevis. Ali-
quandiu dicuntur durare. Sept. 20. gustata, dulcia
quidem, sed non ita grata, carne tenera, alba. Eius-
dem generis datum etiam in Saxonia nomine Rostfing,
id est, sonorum, dulce quoque & durabile. Interdum

Rostfing
ling.

valde magna inueniri aiunt. In Saxonia oppido Lant-
fing vocant, alias Rostfing, a sonantibus grana, & ling.
durare aiunt ad Quadragesimam. Quidam etiam Rostfing



Rostfing vocat à latitudine, ita vt prædicta nomina
omnia sint Synonyma vnius Pomi. Varietas tamen
nominum & aliqua etiam formæ moris, vt duas fi-
geras heri curauerimus. Ac posterius, quod Rostfing
vocant, denud ita describerimus. Magnum est, latu,
depressum, pediculo breui, nonnihil angulosum, ex
pallide luteo albicans. Sept. 20. gustatum sapore
dulci, gratu, tenerum. Quidam vocant Saxonia
ling. Delata Montbelgardum ad finem Ianuar. nondum
putrida erant: carne tenera, dulci. Quod verò
Rostfing nomine datum in Saxonia, Montbelgardum ad
Febr. medium durauit, carne dulci.

Saxonia
ling.Saxonia
ling.*Pomum Orbiculatum Vt Alderling.*

Alderling id est, rotundum Pomum, ex Saxonia
albo luteolum, aspectu elegans. Sept. 20. carne tene-
ra, alba, dulci. Habentur etiam in Saxonia, & ad Ianua-

Saxonia
ling.

rium durare aiunt. Montbelgardum delatum ad me-
dium Febr. vsque durauit.

Fragrantis odoris præcox Pomum angulosum
dixit vulgi consensus, quod sub Augusti mensis
principium maturum, Montbelgardum mensis inferri
conuenit, quod vltimum interdum comprehendas, alias
altero tanto grandius, thorulis ab umbilico secun-
dum

Malum pre-
cox angulo-
sum acido-
dulce.









Pomum. faccus expressus admisto pauxillo Croci exhibitus, veneno aduersatur, & ventris animalia pellit. Pū-
Pomus. tionibus lateris Camerarius Cataplasma inducit
 ex pomo dulci, cui thus contusum induitur, vt si-
Pomum la- mul assentur. Idem ad pulueris Pyrii empyreu-
teru ma extinguendum, pomum dulce in Plantaginis
ad vlti- latifolij aqua coquit ad tabitudinem, dein cum
um lacte facto cataplasmate vulnere inducit. Parci ex-
 perimentum est, si Pullo vermiculus (quem
 Obrenmstel siue Obrengrübel Germ. vocant,
 Galli *perce-oreille*) itrepsit in aurem, applicetur
Pomus in media pars Pomi dulcis, cuius odore illectus pro-
ore. dibit vt rodat, & auris liberabitur vermiculo. Nos
Quidam in quotidiano vsu habemus, & magni facimus ex-
summatio perimētum quod ē pomis in aqua coctis paratur,
 & pulmenti specie oculorum inflammationibus
 imponitur. Possunt & ex lacte coqui vel caprino
 vel muliebri, vel ex aqua rosea, euphrasie, aut alia aqua
 frigida. Cuius rei testis est Arnold. de cur. morb.
 ad dolorem, inquit, oculorum, calorem, ardorem,
 & ex calida causa humorem, Malum bene matura-
 rum adiectis seminibus in aqua diligenter coqua-
 tur, tundatur, & addito lacte mulieris supra pan-
 num lineum extendatur, clausisque palpebris su-
 pra oculos ponatur. Ego tamen feliciter sepius
 hoc medicamentum expertus sum etiam sine la-
 cte. Hydropicus Alciticus corripiebatur anhelan-
 di difficultate, suffocationis periculum præ se fe-
 rente, eaque non tam inter comedendum, quam
 per somnum, vel dum obdormiscere conaretur:
 at is sedari sibi [ex Schenck. Obs.] statim symp-
 toma hoc affirmabat, quamprimum crudi Pomi
 frustulum vnum atque alterum deuoraret. Hinc
 Gesn. in vitis pulmonis, & dyspnoæ Malum
 assum, excavatū & drachma Thūnis repletum
 scilicet cum successu comedendū dedit. Comendun-
 tur & Pomorum cortices siccati & accensi ad cor-
 rigendum acrem tempore pestis. Ipsius verd ar-
 boris folia cum astringendi & refrigerandi dote
 polleant, incipientibus inflammationibus cata-
 plasmatas specie contrita, itaque concocta vtiliter
 adhiberi possunt. E floribus aqua stillatitia elici
 potest, qua abluta sepius ac in multos dies
 facies, & rubedine & maculis rubris seu pustu-
 lis liberatur, vt scribit Tabernamontan. Paratur
 etiam eadem arte aqua ex ipsis pomis ad Cos-
 liacos & Dysentericos affectus vtilis. Tragus quo-
 que annotat ē æreo cortice Milorum cocto, ad-
 dito alumine colorem luteum confici ad tinctu-
 ras. Rustica gens Silesiaca ē tulsis & aqua per-
 fusis pomis, atque expressis potum conficit,
 quem *Apffeltrank* vocat: Schwenckfeldius. I-
 dem & in aliis locis parari solet, & apud Hel-
 vetios nostros, etiam sine aqua. Et quod ad Ma-
 lorum quodque historiam faciat, mirum quod an-
 notat Curius auduisse se à præclaris viris, apud
 Tholofates hominem non plebeum fuisse, coram
 quo si poma cruda apponerentur, statim defice-
 re solitum: nonnunquam etiam cum vitæ pericu-
 lo, nulli extemplo succurreretur. Nos quoque
 quibus afferrent Mala fastidium plures nouimus.
 Sed harum rerum causas neque nos scimus, ne-
 que ferre labores tu. Insignem antipathiam ad-
 uersus Poma obseruauimus in Nobili Ill. E. C.
 VVitemb. Alfato. Ita enim horrebat Pomorum
 odoratum, vt ne ferre quidem posset habentes:
 qua arte speciatim eg. [Bauhinus] vt eluderem ca-
 sci amorem, quo ipse delectabatur ego verd hor-
 reo simili antipathia Poma postulabam, illo pete-
 re calesco. Ita mutua vtriusque cautela res ea-
 que aduersaria deuicta. E contra tam mirè delecta-
 tur Pomis, Medicus quidam haud vulgaris, iam

sexagenarius & amicus singularis, vt singulis pa-
 stibus, quotiescunque offerebantur, aliquot ma-
 la innoxie voraret. Ast meo sanè periculo didi-
 ci fungosam pomorum substantiam ventriculo
 frigidiori atque etiam intestinis haud esse com-
 modam, nam præterquam quod diu in ventricu-
 lo obhærescit, status excitat atque dolores. Quæ
 res tandem effecit, vs & coctis, & crudis in to-
 tum abstinere. Pyra siue cruda siue cocta faci-
 lius fero, meliusque digero. Summè recreabatur
 pomis Domitianus Imperator. Ad satietatem
 enim pransus non temerè quicquam super cenā
 præter Martianum Malum, teste Suetonio, &
 modicam in ampulla potiunculam sumpsit. Mo-
 nendi principes, si præsertim qui insidus obno-
 xii, ne temerè & inconsideratè comedant Poma,
 ne illis eueniat, quod Clarinda quondam Prin-
 cipissæ Mantuanæ. Quippe Adlon Princeps Ita-
 liæ nescio qua zelotypia commotus ega D. d'A-
 legres Gallum, diu multumque, maximèque sum-
 ptibus modum intoxicandi hunc querens, tandè
 hunc inuenit, vt per pediculi Pomi virus im-
 perceptibile inderet, Pomumque præcipue ele-
 gantia offerret. At is Pomi venustate potius,
 quam dolo commotus abstinit ab eius morsu ac
 prædictæ principissæ offert. Illa subito comedens
 paulo post multis cruciatibus sangata fractaque
 miserè interit. Fertur sanè Ill. Christoph. VVit-
 tembergicum fuisse Pomo intoxicatum. Modum
 inferendi venena Pomis vel adhuc arboribus suis
 hærentibus, nec annotare lubet, nec scriptis pro-
 dere integrum. Facile inueniet modum indendi
 cui veneni parandi virus notum, nec odore, nec
 sapore aut colore se prodens &c.

Nunc quod reliquum est, si velimus iudicium
 ferre de vino Pomorum, [Cidre] habenda (teste
 Nic. Abr. è Framboisier) ratio gustus, ætatis, &
 compositionis. Gustus non solum pendet à Po-
 mis ex quibus paratur, dulcibus, aut acidis, aut a-
 cerbis: verum etiam ab ætate. Succus enim con-
 seruatus mutat cum tempore saporem, postquam
 defæcatus acquirit alium, quàm habebat primò.
 Vinum Pomorum dulce, propter dulcedinem,
 quæ prouenit à colore temperato, mediocriter
 calefacit, & minùs ætatis refrigerat, plùs nutrit,
 estq; salubrius, potissimum illis, quibus ventriculus
 frigidus est & siccus. Acidum verd siue confectum
 sit ex Pomis acidis, siue successu temporis acidum
 redditum sit, quia valde aquosum & nonnihil ter-
 restre, adstringens & corroborans, nihilominus
 tamen tenue & penetrans, singulare est pro tem-
 perando calore ventriculi & hepatis & sanguine
 feruido & bitioso: ad vomitum compescendum
 & defluxiones biliosas, ad sedendam sitim, ad in-
 cidendum humores crassos & viscidos. Asperum,
 quia valde frigidum, & siccum non vtile nisi cum
 successu temporis, ubi acerbisatem derelinquit,
 & magna frigiditas & siccitas, mutata in minorè
 frigiditatem cum aliqua humiditate mixta, vt dul-
 cedine aut aciditate. Roborat quodam modo ven-
 triculi languidum & relaxatum, compescit ni-
 mium vomitum, & omnes alui fluores, sedat pal-
 pitationem cordis & lipothymiam, concoctio-
 nem iuuat potum in fine partus, dilutum pauca
 aqua, vt minuatur pondus & distributionis tar-
 ditas. Quod ætatem attinet Vini Pomorum. In-
 salubre nuper paratum, adhuc turbidum & non
 defæcatum cædit ventriculum, excitat dolores ca-
 pitis, obstructions generat. Vetussum & acef-
 cens non minùs nocuum prædicto, id igitur bi-
 bendum, quod repurgatum & mediocris ætatis.
 Compositionis habitū consideratione, id semper

Malum
Martia-
nū cana
Domitiani

Cantio.

Historia
dani Ger-
ni in poma.

Vins po-
morum.
Cidre.

Pomorum
succus.

Vinum
Pomorum
dulce.
Vires

Acidum.
Vires.

Vinum
asperum.

Vires.

Actat.
Recenti-
um.
Vetussum
maximum.
Delectus
Vini po-
morum.

melius & salubrius & concoctu facilius, quod paratum ex Pomis bene maturè suo tempore collectis, non diu reſeruatīs & ſine aqua: ea enim admixta, naturalem ſaporē admittit, ac in cauſa eſt, vt aſceſcat & facile corrumpatur, & non diu aſſeruari poſſit. Omnium peſſimum ex Pomis ſylueſtribus cum aqua compoſitum.

*Vinum ex
Pomis ſilv.
Pomorum
delectat.*

Poma montana, auctore Scaligero, maxima ex parte, pro cibis, ſucco ſunt aptiora: campeſtria dilutiora, minùs ſapiunt, celerius corrumpuntur: minùs alunt propter aqueæ materiæ ineptitudinem: ſicuti montana propter terreſtrem ſiccitatem. In genere præſeruntur odoratiора, guſtu aſromatico, dulci aut ſubacido vel vinoſo, temperatiue lecta, ritè aſſeruata. Malos, quæ fructus ſuos tanquam ſteriles, dare reuſant, ſecundas effeceris, ſi plumbeo circulo earum caudicem altitudine pedis à terra ſtriſſimè concluderis, ante florum aduentum, & cum Mala cœperint adoleſcere, ſoluto vinculo eas libertate donaueris, vt reſert Matth. Et ſi vſu veniat, vt tota arbor degreuaſſa pondere ſortium, laborare videatur, ita vt non nunquam etiam rami ſcendantur. Sicut canit Ouidius:

*Mali ſe
ſunt ſe-
cunda.*

*Aspice curuatos Pomorum pondere ramos,
Vt ſua, quæd peperit, vix ſeruat arb. r. onus.
tunc rami oneri impares furcis ſuppoſitis ſul-
ciuntur. Ita namque ipſe:*

*Pomaque laſſeſſent matrem niſi ſubdita ramo
Lingæ laboranti furca tuliſſet opem.*

In Italia ſic Mala diligenter lecta, & ſelecta reponunt. In vas vinarium vel aliud paleis interſerunt, ne ſe mutuo contingant. Tum vas optime obturatur, ne aer penetrare queat, & in loco frigido collocatur. Hac ratione ad Quadrageſimam & Palchatis feſtum vſque, [inquit Aug. Gallus] tam vegeta & recentia adſeruantur, ac ſi modò ex arbore lecta eſſent. Vide etiam quæ poſt hiftoriam Mali ſylu. tradita ſunt. Si verd Poma quandoque congelentur, ea [vt ſcribit Leu. Lemn.] in ſig. dam aquam demerſa, ad naturam ſuam redeunt, totaque illa glaciata concretio liqueſcit ac reſoluitur.

*Ut poma
congelata
ad ſuam
reſoluantur
naturam.*

DE MALIS SYLVESTRIBVS.

Scaliger ex Platonis Timæo alicubi ſcribit, ſatiſ ſuas omnes arbores olim fuiſſe ſeras, neq. à ſciſſis, niſi cultu diſſerre, tranſlatamque Malum agreſtem ex ſeris locis, cultu miteſcere, quod non fieret, inquit, ſi natura eſſet ſterilis. Vero tamen cor. ſentancum eſt, Deum Opt. Max. ſolum & vnicum re. um omnium Creatorem, tales homini condidiſſe arbores, quib. & frui & commodè veſci poſſet atque enutrir, cum homo herbis & fructibus nutrir debuerit. Aut certe dicendum [quod & ſanctis & grauiffimis quibuſdam placuiſſe nouimus] longè aliam olim ſylueſtrium frugum fuiſſe conditionem, quàm ea quæ nunc eſt, & ante diluuium vniuerſale, vel vnicum Pomum omnem Indiam qualis nunc eſt, immò [vt quidam ait] omnem Pharmacopolarum medicamina ſua uitate ac viribus ſuperaiſſe. Id aded ex hac re in mentem venit nobis, quidd ſciamus Malum agreſtem, quemadmodum & eius fructum, ita diſſerre à Mitum genere, vt merito velut diſtincta ſpecies haberi poſſit, ſuſque de que habentes, naturam ipſa, an cultuæ neglectus ſit in cauſa.

Deſcriptio

Eſt enim Malus ſiue Pomus agreſtis, minùs ferè procera quàm ſatiua, tortuoſior, ramoſior, ſtrigoſior: materiæ, vti putatur, firmiore. Multi-

plex illa ramorum, & ſurculorum incondita diſpoſura, agreſtem & incultum habitum facile oſtendat. Sed & ſtolones tam è caudice, quàm radici- bus luxuriantes, vt neglectum cultum, ita & propria rigiditate ſylueſtrem naturam producit. Folia, quàm ſatiua, magna ex parte minora, conſtrictiora: flores ſatiuiſ ſimiles, ſed ferè minores, egregiè odorati, interdum ſubrubelli. In fructu differentia præcipua, qui paruus, & rarè iuglandem æquans, magnitudine ferè Meſpili, ſed figura rotundior, longiuſculo ac tenui pendet pediculo, cortice ſeu cute vitidi, tandem & flauelcente: quorundam etiam pulchrè rubente. Sed nec ſubſtantiæ mollitiæ, nec ſaporis conuenientia vſquam ad ſatiua accedunt, ac ne quidem ad infimæ notæ acidiffima vel auſtera. Tanta pollent adſtringendi facultate, tantæque acerbitate, vt eſui planè inepta, nec vſquam ſiant apta. De eorum ſucco poſtea dicetur.

Mali

Flor.
Fructus

Malus ſylueſtris Plinio, & Herbariis ferè omnibus, ſeu Malus agreſtis, *μᾶλ' ἀγρὴ* Theophr. *μᾶλ' ἀγρὴ* Theophr. ſicut & Dioſcor. *μᾶλ' ἀγρὴ* Theophr. *μᾶλ' ἀγρὴ* Theophr. id eſt, montana Mala. Nec de ſylueſtribus tantùm præcipere Dioſcoridem, quando ait, ad adſtringendum immaturis opus eſſe, quod ex Plinio Barbarus vertit, ſed in vniuerſum de omnibus acerbis, Marcelli ſententia eſt. Dodon. ſylueſtres Malos eas dicit, quæ culturæ expertes ſunt. Scal. cultu tantùm diſſerre ait, & à ſyluiis in hortos & viridaria educta, cultu miteſcere, Germ. *Holzſpffel*. Gall. *Pomme ſauage*, quorum genus quoddam Car. Steph. *Eſtranguilliers* vocat, quaſi ſtranguatoria dicas: ob vehementem enim acerbicatem guſtantes velut ſtrangulare videntur: quorundam etiam tanta vis vt aciem gladioſum perſtringant, vt Hermol. ex Plinio tradit, ob id & conuiſio dicata. Angliſ in Meridionalibus *Grabtree*, in Septentrionalibus *Starbtree* auctore Turnero. Valcones *Auerca* vocant, vt annotat Scal.

*Nomina &
Synonyma*

*Montana
mala.*

*Strangulans
coria.*

Auerca

Veteres de Malorum agreſtium differentiis nihil annotarunt, quantum hætenus quidem obſeruauerimus. Et quamuis, inquit Curtius, inter ſe magnitudine, ſacie, aut colore, nonnullis que etiam aliis inuicem diſcrepent, per genera tamen non diſtinguuntur. Illis enim nomen tantùm vnum remanſit. At diligentior Tragus ſylueſtria Mala nō vnius generis eſſe tradit, & tria annotat quæ ſibi maximè probari ait, nempe ea quæ vocant *Brandwurgſpffel*: poſthæc *die gelen heis melting*: poſtremo quæ *Hermelting* vocat. Tabernamontanus has habet. 1. Malus ſylu. maior alba, *Weißgroßholzſpffel*. 2. Mala ſylu. rubentia, *Holzſpffel*. 3. Malus ſylu. minor, *kleinholzſpffel*. Omnium trium figuras addit quidem, ſed more ſuo, deſcriptiones nullas. Gerardus Angluſ iſtas. Malus ſylu. rubens, *The gerat wilding* or red *Grabtree*. 1. Malus ſylueſt. alba, *The witte wilding* or *Grabtree*. 3. Malus ſylu. minor, *The Schmeller Grab tree*. 4. Malus duracina ſylu. *The E hoking leant Grabtree*. [Tab. Icon. pag. 1002. Oenamela *Weinſpffel*. Verum miramur cum figuras omnes quatuor habeat ex Tabern. & ſine deſcriptionibus quoque, cur quartum genus, quod cultum eſt, [ipſi etiam Tabern.] faciat ſylueſtre. In noſtris regionibus etiam aliquot proueniunt ſpecies ſylueſtr. Pomorum.

Florent cum cæteris ferè, & pauld etiam tardius, quemadmodum & tardiùs maturantur, nempe Octobri, vt & Geſn. annotauit.

Proueniunt ferè in tota Germania, tam planis quàm



tantum placita recenset. Notat tamen Aleman-
num Struthium minus dixisse, ex sententia A-
pollodori & Solibii. Hermol. sic habet: Gene-
ra eorum Chrysomela, hoc est aurea mala, inci-
sura distincta. Nostra candidiora sunt, odoris
præstantissimi. Neapolitana ex eodem genere mi-
nora, odore vibrantia, prouentu serotino, quæ
Struthea nuncupentur, sicut quæ celeriter ma-
tescunt & præcocia sunt mustea. Vides cum Plin-
ii lectionem & sententiam secutum. Aëtius:
Struthea, inquit, dicuntur, quæ magna sunt &
suauiora, minisque acerba. Eiusdem sententia &
Theophrastus fuisse videtur ante hos omnes.
Nam ubi de arborum degeneratione scribit, ait
ex Struthis fieri Cotonea, quemadmodum Py-
rum vitium migrat in Pyraltrum. Eiusdem sen-
tentia & Mir. Virg. est. Nam postquam Herm.
Barbarum reprehendisset, quod *αανδρὴν*, id est,
quæ vera Cotonea sunt [id enim *αανδρὴν* signifi-
cat] ventisset Alethina, quasi genus quoddam pri-
uatum indicaret, ait: nullibi hæc id à se in-
uentum, quod nec ipse inuenisse se testetur: Nos
[addit] ex communibus vocis in Græcis signi-
ficatione vertimus: præbati quæ vera Cotonea
sunt: nam Struthia cognata magis, quam eadem
sunt. Nec aliud inter Cotonea vera & Struthia
discrimen esse ostendit, quam ex forma, magni-
tudine & odore. Mettruna Pyri & Mali discretis
appellationibus indicat: quæ rotundiora & nu-
nora sunt, à consimili figura, Mala: quæ verò
maiora & oblongiora, Pyra appellans. Licetque
in his variare Antiqui Scriptores videantur, vna
tamen omnium ratio est, & quæ tota hæc referat:
indicatque id Theophr. lib. 2. de Plant. insti.
qui cum de plantarum degeneratione in aliud ge-
nus ageret, inter cetera dixit Pyrum in Pyra-
strum degenerare, & dulce Malum in acidum,
& ex Struthio, id est, maiore & oblongiore Co-
toneo, Cydonium fieri minus, & sessilis rotunde-
tatis Pomum, quale Dioscorides *αανδρὴν* dixit, &
in medicina vsu magis probat. Hæc itaque Mar-
celli sententia est. Sed mirum quomodo fatium,
aut nobilius in verum degenerare possit. Aut cur
verum dicatur id in quod aliud nobilius aut præ-
stantius degenerat: Dicendum: Dioscoridem ad
vires maxime respexisse: idcircoque verum appel-
lasse id quod minus est, quia maiorem habeat ad-
strictionem, quæ in hoc pomo desideratur, &
cuius etiam nomine in medicina celebratur: dein-
de quod acutius vibret odorem, uti putatur.
Porro in differentibus designandis non conuenit
inter Neotericos.

Ruellius tria apud se inueniri genera scribit:
quædam minora, rotunditatis in orbem circumscri-
ta, odoratius spirantia, quæ peculiariter *cognæa*
vocat. Aliæ grandiora, amplitudine pincarum nu-
cum, pauciori lanugine canescentia, colore tam
intus, quam exterius aureo, odorem non tam la-
te iactantia, quæ *cognæa* quasi Cotoneæ vul-
gò vocari tradit. Aliæ mediò habitu, sibi Cotoneo-
rum nomen detorquentia.

Cordus in assignandis Cotoneorum differen-
tiis à seipso dissentit. Nam apud Diosc. ait: quæ-
dam maiora & Malis similia esse: quædam verò
minora, & Pyra modo turbinata, maioraque etiam
segiunda dici. At in Historia sua sic habet: Coto-
neum, siue Malus, Cydonia siue Cotonea, vnum
maius, alterum minus, id est Struthium.

Tragus Cydonia, Cotonea & Chrysomela i-
dem dicit, Struthia verò vult esse maiora, Gros-
fæthen apud Aëtium: alia dicit Mustea Miscella,
Mellita, & Melimela in Diosc. quæ intelligit de

melle conditis, quomodo condienda docent Co-
lumella, & Palladius. Quod verò Cydonii genus
sit Phaulum Athenæo, ingenue fatetur se nesci-
re. Mirum tamen quod idem scribit, Cydoniorum
genus vnum tantum in Germania extare, & id
passim vulgatum, quod & nullo negotio proue-
niri soleat. Forè eius tempore maiora nondum
erant conquisita. Vt & ea hodiè habentur in lau-
tionibus Germaniæ hortis, ut postea specialius do-
cebimus appositis descriptionibus.

Curtius sic distinguit: Struthia, siue velut vo-
lunt Struthea, Dioscoridi, Galeno & sequacibus
magna sunt, & suauiora. Nam minori placent a-
cerbitate, minus tamen vitia, serotino proue-
ntu. At ex hoc genere sunt sylvestria, odoratissi-
ma, in sepibus crescentia. Chrysomeliana siue
Chrysomela, incisuris sunt distincta, colore in au-
rum inclinante, unde illis nomen, de quibus Vir-
gilium intellexisse volunt, aurea Mala vocitan-
tem. Cydoniorum Malorum tria in Italia inue-
niuntur genera. Palma illis quæ peculiariter Ma-
la Cotonea cognominantur, pressa, incisuris in-
terfecta Mesopeponum modo, colore ad aurum
inclinato, lanuginosa & longè ceteris odoratio-
ra. Proximum locum fortuantur, quæ maiore ad-
modum corporis mole proueniunt, Dioscor. &
Gal. Struthia vocata. Hetrusci hæc Pyra Cotonea
vocant: quippe quod formâ magis Pyra, quam
Mala referant. Pulpa ac succo ceteris prævalent,
colore tamen, suauolentia ac viribus cedunt.
Postremo Plinio Miluiana sunt, quæ nonnullis
nothadicitur, quod tantum proueniant ex Co-
toneis Malis, quæ Strutheis insitæ fuerint, vel ex
Strutheis, quæ Cotonearum succulos receperint.
Hæc Malis grandiora, Pyris verò siue Strutheis
minora videntur: formâ verò, ac facultate inter
vtrumque medijs.

Calto. Durantes: Tres species in Italia, Me-
lecotogne parua, quæ *αανδρὴν* sunt. Secunda
Struthia & Pere Cotoghe, maiora minus efficacia.
Tertia, Miluiana & Bastarde. Calsalpino Coto-
neorum duo genera: quædam orbiculata, & v-
trinque depressa, Mala cotonea dicta: Quædam
oblonga, vtriusque in vertice tenuiora, quasi
figura maximæ amplioris molis, Pyra cotonea
vocalur. Priora Dioscor. vera: posteriora Stru-
thia.

Satis confidenter Anguill. scribit, omnes spe-
cies à Plin. traditas, nostro adhuc seculo cogno-
sci in Italia, ea quæ collis distincta Melonum mo-
do, Græcorum esse Chrytomela, & Latinorum
Aurea mala. At aliter Lacuna, qui Membriles vo-
cat: Legitima Dioscor. aut Chrytomela Plin. vult
esse parua lutea, rotunda, valde odorata. Aliam
differentiam esse Pyris similia, Tertium dictam
Plinio cotonea Miluiana. Hæc esse Cydonia spu-
gia, nasci ex infectione veræ Cydoniæ insertæ in
Struthia, aut è contrario.

Gesnerus quoque Plin. secutus Struthia dicit
ea, quæ minori sunt amplitudine, serotino proue-
ntu, & odoratius vibrant. Maiora verò esse ea,
quæ Struthia dicuntur, de Cognasset. Malum
Musteum è Cotonearum genere præcocius &
celeriter mitescens, unde & Melimela appellen-
tur ab Atheniensibus: hoc est mellita & dulcia
Mala, itemque Mellita, quod fiant ex insitione
succi Mali dulcis & commutatis in Malo cydo-
nia & ab his distinctum ponit, quod etiam
de genere cydoniorum apud Athen.

At in horto idem Gesnerus Magna VVoifello
dicit esse Pyra cotonea Struthia. Galeni videri ait,
pulcherrima & maxima. Camer. Cydonia Mali
su-

Chrysomela.

Neapolitana.
parua
Struthia.
atque.

Barb. virg.

Discrimen
inter coto-
nea &
Struthia.
Cotonea
Mala
Cotonea
Pyra.Cur verum
dicitur
tanquam?

Cognæa.

Cognæa
Cotonea
simpliciter.Cordus er-
ror.

Melimela.

Phaulum.

In Germ.
vnum.

Struthia.

Sylvestria.
Chrysomela.Cotonea
pressa.

Struthia.

Pyra cog-
nea.

Miluiana.

Melecotogne
Pere cotoghe
Bastarde.
Cotonea
Miluiana.

Cognæa.

Cognæa.

Cognæa.

Cognæa.

Cognæa.

Cognæa.

Cognæa.

Cognæa.

Cognæa.

Cognæa.

Cognæa.

Cognæa.

Cognæa.

Cognæa.

Cognæa.

Cognæa.

Cognæa.

Cognæa.



*Infans in
distrum &
mofcatus.* pragnantem quæ cydonia mala crebris elitaue-
nit, parituram esse infantem & industrium atque
ingeniosum, ut refert Simeon Sethi; qui & ipse
scribit, post cibum sumpta ventrem mouere: sed
quibus sit imbecilla facultas ventris retentrix &
excretrix valida, eos plus cibi inde capere.

*Ardu tri-
na.* Matth. de Gradibus in ardore vrinæ cum vlce-
re, & sine eo à Cydoniis cauendum suadet, quod
interdiuretica ab authoribus [ut Io. Mich. Palcha-
sio, qui ex eorum elu Regem Neapol. Alphonsu-
m in diabetem incidisse scribit] referantur.

Leuiga. Diosc. sanè *duum* dicit. At qui idem & *syrenus*
& *cyrenus* dicit, quæ contraria sunt. Nisi quis fortè
nobis hic obtrudat proprietatem aliquā occultā.
Videndum igitur, an effectus respondeat. Quan-
quam non videamus quid præstare queat occulta
illa facultas, cui contrariæ sint qualitates manife-
ste. Malimus iis uti in Diabete ac fluxu seu mictu
sanguinolento. Interim perpendant etiam docti,
quæ ratione Cotonea rectæ ceruice spirantibus &
hydropicis conferre queant, ut Brunfels. ex aliis
sublegens prodidit.

*Hamib.
rhagia.
Sennae.
ulabafio.* Mollèrius lanuginem Cotoneorum ad hæmor-
rhagiam commendat.

Augina. Est & feminibus sua præstantia. Ea siquidem
cum aqua rosacea madefacta ac mollita, lento
crasque humore ambustis igni, & linguz ga-
leque ardori [Germani dic Brehne vocant] illi-
tu medentur, quod remedii genus vel vulgo
hodie cognitum nouimus, & Tragus quoque in
scripta retulit. Succum ex optimis Cydoniis ex-
pressum bibunt manè Hispani ad pestis præser-
uationem, & quod admiratione non caret, fu-
dorem præsertim senibus prouocat. Potest idem
contra anginas Gargarizari.

Ex Cydoniis quoque destillatur aqua cuius, non
ut vulgò sit, in quibusvis febribus vsus esse debet,
observatione Camerarii.

Porro quamplurima ex Cydoniis tam à Vete-
ribus, quam à Recentioribus parantur, & ad me-
dendi vsum, & ad palatum. Veteres vinum para-
bant, quod Melinum siue Cydonites vocabant:
Melomeli siue Cydonomeli, quasi vel Cotonea-
tum dicas: hydromelum, Cydonites siue pulmē-
ta à Cydonio, Melinum oleum, Melina Empla-
stra, & vnguentum Melinum dictum, quorum
quædam hodie ex vsu recesserunt, ut Vinum Cy-
donites seu Melites, cuius parandi rationem Dios-
cor. hanc præscribit. Ex Malis Cotoneis exem-
pto semine concisis, minas duodecim in musti
metretam addies triginta immittito. Deinde ex-
colatum reponito. Paratur & sic. Post contusa &
expressa mala Cydonia, ad duodecim sextarios suc-
ci ipsorum, mellis sextarius vnus admiscetur, &
sic reponitur. Adstringit, stomacho commodum
est, dysentericis prodest, hepaticis, nephriticis, & in
vrinæ difficultate. Palladius duos alios modos pa-
randi vini Cydonitis habet, hos. Abiecto corio ma-
la Cydonia matura in breuissimas ac tenuissimas
particulas recides, & proiicies durum, quod ha-
betur interius: dehinc in melle decoques, donec
ad mensuram mediam reuertatur, & coquando Pi-
per subtile consperges. Aliter. Succu Cydoniorum
sextarios duos, aceti sextarium vnum semis, &
mellis duos sextarios miscebis & decoques, donec
tota permixtio pinguedinem puri mellis imite-
tur. Tunc triti Piperis atque Zinziberis binas
vncias admiscebis. Plinius vini à Cydoniis me-
minit quidem, sed modum parandi non tradit.

*Hydromel-
lum.* Hydromelum Dioscor. quoque, quomodo fiat,
docet. Melomelitis ex Cydoniis parati metreta
vna (Plin. Cadum vocat: sunt Congii decem)
ad duas metretas aquæ decoctæ admiscetur, & in

ardoribus sub cane insoletur. Et huius vis eadem,
quæ superiorum est. Duos etiam præparationis
modos tradit Paulus quos ex eius scriptis peten-
dos Lectori relinquimus.

Melomeli seu Cydonomeli parat Dioscor. Malis
Cotoneis exemptis seminibus in mel plurimum
coniectis, ut planè coarctentur. Fit gratum post
annum, vino mulso simile, conueniens ad eadem,
ad quæ Vinum Cydonites. Columella scribit, Mel
in quo condita fuere Cydonia, Melimeli appella-
tum sine noxa posse interdum dari febricitanti-
bus: intellige à pituita corrupta, aut in quibus
metus est defluxionis in nobile aliquod viscum.
Sed placet etiam eiusdem Columellæ descrip-
tionem adicere. Nihil ætius, inquit, aut melius
expertis sumus, quàm ut Cydonia maturissima, in-
tegra, sine macula, & sereno celo decresciente
luna legantur, & in lagena noua, quæ sit paton-
cissimi oris, detera lanugine, quæ Malis inest, cõ-
ponantur leuiter, & laxè, ne collidi possint. Dein-
de quum ad fauces vsque fuerint composita, vim-
ineis furculis sic transuersis arctentur, ut modicè
mala comprimant, nec patiantur ea, quum liquo-
rem acceperint, subleuari. Tum quum optimo
& liquidissimo melle vas vsque ad summum ita
repleatur, ut pomum submersum sit. Hæc ratio
non solum ipsa Mala custodit, sed etiam liquorem
mulsei saporis perbet. Posset & hodie parari, &
Quitten honig, mel Cydoniatum appellari, que-
mad. & mel rosatum.

Melini olei atque vnguenti confectioes habes
apud eundem Dioscor. & Actium, & Melinum
Emplastrum apud Galenum: quæ cum ad Medicos
& pharmacopæos potissimum pertineant, exinde
desumi possunt. Nam & compendii nobis ratio
habenda, & ea interim exhibenda, quæ & rei
Medicæ, & æconomice ex equo prodesse possint.
Præscripta igitur etiam multas maximasque utilita-
tes habeant, tamen hodie pleraque ab vsu reces-
sisse videntur: Et eorum loco à Recentioribus re-
seruata sequentia, ut miua Cydoniorum, quæ ni-
hil aliud est, quàm decorticatum Cydoniorum,
& ex aqua & melle vel Saccharo, addita etiam par-
te vini, ad suauitatem decocta caro, atque Con-
dita. Vel ex succo fit Cydoniorum cum vino co-
cto, addito melle optimo, despumato.

Domestici nostri Cydoniorum & maioris cur-
tipendulorum partes æquales sumunt: decortica-
ta, & in frustra confecta ex aqua addito melle vel
saccharo & modico vini in crassam & suauissi-
mam consistentiam decoquunt, & in scatulis vel
fistilibus vitreatis adseruant, magno vsu ad ple-
raque prædicta, potissimum alui fluxiones diuer-
sas, & ventriculi robur. Alii ex mero vino deco-
quunt, & addito Saccharo vel Melle ita pa-
rant.

Conduntur & segmenta integra, Cydonia Con-
dita in officinis vocant, ad eisdem vsus. Segmen-
ta ex aqua pura coquunt, cocta reponunt: aqua
verò quæ eorum vim magnam exorspit, cum
melle vel Saccharo in syrupi consistentiam deco-
quunt: tum prædicta segmenta cinnamomi fru-
stulis in ea defixis in eo syrupo condiunt. Dia-
cydonium Officinis dictum sic paratur. Cydonia
recens ab arbore decerpta [ut vult Math.] de-
corticata & à seminibus repurgata atque concisa
in aqua coquuntur, in qua soluta fuerint Saccha-
ri libræ tres, agitantur conterunturque pistillo
ligneo inter coquendum, quoad spissitudinem
mediocrem acquirant: tum demum ab igne re-
mota decoctio in formulas effunditur. Vel Sac-
chari albi lib. ij. Succu Cydon. depurati lib. iij. si-
mul decoquuntur ad spissitudinem, posteaque in

Cydoni
meli.Melimeli.
Febru.Mel Cydo-
niatum.Melinum
oleum &
Vnguentum.
Melinum
Emplastrum.Mina Cy-
don.Cydonia
condita.Diacydo-
nium offic-
inale.

*Diahyd. in
Antid.* Non vitrum in succo macerare audent, ut reddatur purgans, & ita in Diacydonium coquere cum Saccharo, quod eius gustus magis celetur, quam scammonii: & hoc pro insigni secreto habent. Sed habeant quantum velint: non invidemus. Fuimus prolixiores in exaggerandis Cydoniorum viribus diuersisque eorum pręparandis modis, eam ob eorum pręstantiam atque nobilitatem, eam verò ob communem eorum vsum, quem habent & in arte, & in vita œconomica.


DE COTONEA SYLVESTRI.

Descriptio **C**otonea Malus sylvestris, satius per omnia similis existit, à qua ramis distat minoribus tantum, caudice assurgens magis recto, iuxta terram minus fruticoso, sed singulari frequentius: eadem numerosioribus scaturit floribus, & largius frutificat. Fructus serò perficit, qui etiam satius fructibus multo sunt minores. Nascuntur in Danubii Petrosi ripis, & collibus, plurimumque supra Ratisbonam & Keilheymium oppidum, usque ad Petras fauces, per quas Danubius labitur: frequenter inter petras atque in vinearum sepiibus, autore Cordo.

Locu. Mala Cydonia sylvestria, odoratissima, in sepiibus nascentia, Plinio. Atque de his Virgilium quoque intellexisse, sunt qui putent. Curtius scribit, sylvestria esse de genere *Struthiarum*, quod mirum est, si *Struthia* sint maiora, ut ex Dioscor. & Galeno ostendimus, atque Sylvestria vel ipsis parvis & vulgariis magnitudine cedant. Cordus Cydonii tertium genus, sua sponte proveniens vocat apud Dioscor. Et in hist. *Cotoneam Malum sylvestrem*. Cam. *Struthia* & *Cotonea* sylv. *no Syria* *maximè à Syria*. Germ. *Wilde Büttenen*. Gal. *Coings sanguis*. It. *Gorogno saluatico*.

Nomina & Synonyma. Est adstringendi vi multò efficacius ceteris Cotoneis. Cordus.

Vires. Quomodo Malus Cotonea ferenda sit, & quando: quomodo colenda, putanda, inserenda habes apud Plinium lib. 17. cap. 19. Colum. de arb. cap. 25. & de re rust. l. 12. cap. 45. Multa præclare quoque de his scripsit: Cat. Stephanus in sua Agricultura: & Colerus in suo diario œconomico: & nos antea quædam annotauimus.



lut in Pyramidem fastigiata, in qua tamen figura multum euaniant, carne quàm Malorum densiori, satis succosa, sed plerumque acerosa, præsertim circa media: ubi semina foris nigra, intus alba qualia Mali, cellulis coriaceis distincta continentur: pediculo serè quàm Pomorum longiori. Colore multum variant, quemadmodum

& sapore. In genere, non tam vividus his color ut Malis: neque cuti tam læui contexta, sed aliàs virenti, aliàs araneosa, aliàs viridi aut subflava, rarius rufescente, ut plurimum obsoleta & leuiter scabra. Sapor vel dulcis, vel acidus, vel austerus, vel acerbus. Arbor caret spinis. Radicem habet profundè actam, ut scribit Theophrastus, qui de Pyro diffusè hæc serè habet.

Pyrus in senectute fecundior redditur. Minus diu tamen vivit quàm Piraster seu Pyrus sylvestris. Flores profert foliatis: folia orbiculata: fructum succo aquoso constantem, semina congesta, putamine inclusa. Corticem habet ex neruo carne & humore constantem. Rarè ex ramis creleat. Facile amittit fructum, ob molem & pediculi tenuitatem. Plagis debilitatur, ideòque minus recidi postulat. Vermibus obnoxia est. Reliqua quæ Theophrast. habet, suis quoque locis dicentur.

Pyrus, ut annotat Scaliger, interdum pullulat ab imo: verum ex eadem radice nullis prognatis radicibus, sed radicis brachiata promotione quæ brachia serè tandem radículas emittunt. Dicta est quidem *anagone*, hoc est, vni stipis, sed *anagone*, id est à radice emittens pullum: huic enim longè etiam subter terram productis radicibus, stolones enascuntur. Cultura gaudet, & si ne ea nequit proficere. Salsis offenditur. Fructus verò eius habet quod elui sit aptum & generationi. illi pulpa, huic semen. Ac pulpa quidem non tantum ob cibum data est, sed etiam ad seminum præsidium: quæ etsi coriaceo amictu donata sint, melius tamen & felicius intra pulpam vel putridam etiam, totà conseruantur hyeme, quàm exempta. Eademque ratio valet, & in Malis, & in Poniis, & in vniuersum in fructibus omnibus quibus Pulpa data est, vel aliud quoduis experimentum ad seminis tutelam. Porro eidem Theophrasto frutificat Pyrus ex annotinis surculis, germinat ex cacumine & latere: serotina est, quippe quæ hyeme magna ex parte sua perficiat Poma: quoddam genus Autumno. In trimatu serè incipit, & interdum antè, autore Plinio. Dioscor. scribit Mali Medici semen simile esse semini Pyri, vel ut Sarracenus reddit, Pyri semen habere: Græcum habet, *σπίρα ξιν άτιν ίσιν*, quod consideratione dignum. Nostorum enim Pyrorum semina non multum nobis respondere videntur seminibus Malorum Medicorum vel Citiorum.

*Sententia
Theophr.
de Pyro.*

Pyrus pullulat.

*Cultura
gaudet.*

*Cur pulpa
Pyro datur.*

*Mali Medici
semen.*

DE PYRIS.

CAP. IV.

Descriptio **P**yrus satius crasso eoque recto & simplici assurgit caudice, & altius quàm Malus, sed minus sit patula, ramisque plurimis, surrectis potius quàm laterosum extensis: Cortice quàm Mali scabriore, materie firma, satisque tractabili, præsertim ad typos & sculpturas apta, (ex qua & nostrarum harum figurarum pars maior parata, item ad tornum & alia, ex pallida rufescente, quæ siccata magis etiam rutila sit. Folia circinata serè vel ex circinato oblonga, eorum figurà pro specierum diuersitate variante, longiusculo pediculo harentia, supernè læuia, virentia, infernè asperiuscula, albicantia. Flores serè, quales Malo, Pentaphylli, albicantes apices purpurei. Fructus, hoc est, Pyra, penè omnia turbinata, circa Pythymena crassiora, iuxta pediculum tenuiora, & ve-

Materies.
folia.

Flares.
fructus.

Pyra differant a pomis.

Bymon.

Peloponnesus apia dicta

Indigita.

Orchus.

Regia. Vrb.

Pyramida.

Pyra, inquit Plin. à Pomis hoc differunt tantum, quod usque aded orbiculata non sunt, neque perfectæ rotunditatis, sed turbinatioris & oblongioris formæ ac figuræ: quod mihi non satisfacit quum plura genera Pyrorum non sint minus orbiculata Pomis. Pirus, vel Pyrus, utrum rectius scribatur, nondum convenit inter auctores. Qui Pyrum scribunt, à Pyramidis figura derivatum volunt, quod in exacutum saltigietur, cuius sententiæ quamplurimos eosque gravissimos in lingua Latina videmus esse auctores. Ita apud Poetas legas, & apud Herbanos plerosque, immo apud ipsum quoque emundissimæ natis in lingua Latina Scaligerum. Columella & ceteri Geoponici modò Pirum habent, modò Pirum, sed Gaza homo Græcus passim & semper Pyrum & nostri seculi doctissimus Latinus Hadrianus Iunius. In Pyramide nihil ventriosi, sicut in Pyris omnibus. Adhuc in veteri nostro Plinii codice, semper Pirum legitur. Et omnis literaturæ gnarus Hermolæus ubique etiam ita scribit. Si tamen quis à Metæ similitudine, quod è lato in acutum spectet, & in mucronem turbinetur, tractum velit Pyrum, per nos licet. Quid si Pirum à Græco deductum sit dempta litera A & interposito R, & ex eo factum sit Pirum. Ita multas voces Latinas mirabili transpositione aut mutilatione à Græco deductas esse, norunt docti, & summus ille Scaliger abundè docuisset in Originibus, nisi fata diuinum illud opus posteritati inuidissent. Goropius à Germanico tractum vult, Pyri nomen, inquiens, quasi à πύρι derivaretur, per πύρι scribunt, sed mea sententia aliunde nomen duxit. Nos Peer vocamus, à Πύρ, propter primam sylvestriam naturam. Pyrus urbana dicitur, & cultiva, hortensis, edomita Hermolæo, ad differentiam sylvestris, quam quidam volunt cultu miscere, de quo postea. Vetus Græcus, ut Theophrasto & Dioscoridis. Athen. Theophrasto & aliis plerisque & πύρι ipse fructus, à quorum prouentu copioso Peloponnesus quoque ipsa quandoque dicebatur Apia, ut Ister affertur in rebus Argolicis, licet quidam ab Apia Phoronei filia terram eam ita nominatam putent. Apud Athen. dicitur & πύρι & πύρι, pro eodem, nempe pro fructu. Et apud Plutarchum in Problem. πύρι dicitur & πύρι, quæ tamen vox propriè Pyrum sylvestrem denotat Theophrasto. Curtius & Dodon. arborem πύρι quoque Græcis dici scribunt. Scribitur & πύρι & πύρι. Dodonæo, A Tarantino in Geoponicis, πύρι. Hermol. ait fructum quoque Adipion vocitari, quam tamen vocem nusquam inuenimus, fortè Apidion dicere voluit. Poeta sunt, inquit Hermol. qui Pyrum Ochren vocant, sylvestrem Achrada. Et Had. Iunio quoque & πύρι Pyrus est quemadmodum & πύρι: quæ tamen utraque vox Theophrasto Pyrum agrestem denotat, ut dictum est enim & πύρι apud eundem simuliunguntur, quamvis Gaza Pirum solum reponat. Constantino quoque in Lexico πύρι Pyrus agrestis est. Est igitur πύρι omnium Pyrorum hortensium nomen generale: unde tractum adagium πύρι πύρι, Apio mollior, vel, ut alii vertunt, Pyro maturior, quamvis aliqui de Raphano intelligi velint, minus scitè. Hebræi teste Eliæ Leuitæ nomenclatura, Eggas vocant. Sclauon. Bsubsta fruschiw. Arab. Hamech 12 sunt Pyra, ut est apud Serap. Cirmetre, seu kemari. German. Biren & Birn. Siendbaum. Gall. Poirier, Poire. Ital. Pero. Hisp. Castil. & Portug. Pera. Catal. Pera. Angl. Pear. Belg. Perre & Pecre. Bohem. Prusky. Vngar. Bortnelysa. Fructus Herbarius

quoque omnibus Pirum dicitur & Pyrum, ut dictum, de quibus Virgil.

In fere Daphni Pyros carpent tua Poma nepotes.

Item:

Ornithoglossum alba flore Pyric

Multiplex Pirorum differentia, atque nomenclatio varia, qua Malis neuiquam cedunt. Theophrastus duo Pyrorum summa genera agnoscit, satiuam & agrestem, & πύρι, & πύρι: Gaza Pyrum reddit & Pyrastum. Verba sunt: πύρι πύρι πύρι πύρι πύρι πύρι, hoc est, sylvestria longioris sunt vitæ hortensibus, velut Pyrus sylvestris, quam satiuam. Idem & πύρι satiuas dicit, & πύρι sylvestres intelligit, quamvis utrumque a libi Pyrum sine discrimine significet, ut annotat Scaliger. Inter Pyri satiuæ species Theophrastus habet, Pyrum Phocensem, quam ait mutilatione fieri meliorem: & Pyrum Caryæ, quod domesticum esse scribit, & lanugine tam salsa obdutum, ut nisi ablueretur aqua, edi neuiquam possit. Dioscorid. quoque aliam satiuam facit, aliam sylvestrem, quod facile ex iis verbis colligere est, quando ait: πύρι πύρι πύρι πύρι πύρι πύρι, quod sit πύρι πύρι πύρι πύρι πύρι πύρι. Hoc est, Achras Pyri sylvestris species est, quæ tardè maturefcit. Vm habet adstringentiorum Pyro. Idem tradit, multa Pyri esse genera, sed omnia adstringere.

Difficile verò iudicare est, an utramque intellexerit Aristoteles, aut qualem, quando ait: πύρι πύρι πύρι πύρι πύρι πύρι: sus Pyris pinguefcit. Videtur tamen intellexisse sylvestria Pyra, quibus etiamnum hodie in defectu glandium lues saginari solent. Quando verò idem præcipit πύρι πύρι πύρι πύρι πύρι πύρι, seri iuxta apum aluearia, videtur satiuas intellexisse, atque ita Græcam vocem promiscuè usurpasse: quamvis utriusque hos apibus grauius sit, neque multum refert, utram utrobique intelligas, nam & satiuas Pyris egregiè saginabuntur lues, si quis dñe volet, & licitum sit Pyrum agrestem iuxta aluearia ferere, si quis non magis delectetur satiuis. Non dubium tamen Aristotelem utramque agnouisse.

Cato nominat Volema, Aniciana, Tarentina, Sementina, Mustea, Cucurbitina. Idem quoque inter prædicta Sementinorum meminit, & M. Varro, & Macrobius, quæ sic vocari à semente arbitratur Curtius, quod per sementem maturefcant. Columella multiplices differentias recenset. Curandum ferentia, est inquit, ut quàm generosissimus Pyris pomaria conferamus. Ea sunt Crustumina, Regia, Signina, Tarentina, quæ Syria dicuntur, purpurea, superba, hordeacea, [Plin. hordearia vocat] Aniciana, Neuiana, Fauoniana, Lateritana, [aliè Lateritiana, alii Laterana habent] Dolabelliana, Turrianiana, Volema, Mulsa, Præcocia, Venerea, & quedam alia, quorum enumerationem ait esse longam. Virgil. hæc celebrat.

Crustumina Syrisque Pyris, granibusque Volema.

Macrobius ut Mala, ita & Pyra diuersorum quidem nominum esse dixit: sed qualia quæque essent, non adiecit. Seruus Crustumina ab oppido nominata, rubere quadam parte: Syria, nigra: Volema Gallica lingua bona & grandia interpretatur: quod si verum est, an sit Goropius, vox composita est, à Volheim, id est, à plena domo. Alii Volema dicta volunt, quod Volam impleant, vulgò Libralia: de quibus, ut & ceteris differentiis, sic Plinius. Quidam è Pyris libralia appellata, amplitudinem sibi ponderis nomine allerunt. Et pauld post alio capite. Eadem causa [nempe celebritatis, quod præcocia sint & decerpi properent]

Differentia Theoph.

Pyrum Phocense. Pyrum Caryæ.

Colum. d. f. la multiplices differentias recenset. Curandum ferentia.

Crustumina. Regia. Signina. Tarentina. Purpurea. Superba. Hordeacea. Aniciana. Neuiana. Fauoniana. Lateritiana. Dolabelliana. Turrianiana. Volema. Mulsa. Præcocia. Venerea. & quedam alia.

Differentia Plin. Libralia.

*Superba.
Crustumina.
Falerna.*

Syn.

Decimiana.

Pseudode-

amiana.

Dolabelliana.

Pompeiana.

Luceriana.

Seueriana.

Tyranniana.

Fauoniana.

Lateriana.

Amiriana.

Tiberiana.

Onychina.

Myrapi.

Laurea.

Nardina.

Ampullacea.

Græca.

in Pyris taxatur superbis cognomine. Parua hec, sed ocyssima. Cunctis autem Crustumina gratissima. Proxima his Falerna, à potu, quoniam tanta vis succi abundat. Lactea hæc vocantur: in hisque alia colore nigro donantur, Syna. Reliquorum nomina aliter in aliis atque aliis locis appellantur. Sed confessis verbis vocabulis autores suos nobilitante Decimiana, & ex eo tractum quod Pseudodecimianum vocant. Dolabelliana longissimi pediculi. Pompeiana cognomine Mammosa, Liceriana, Seueriana: & quæ ex his nata sunt Tyranniana, (Turrana Colum.) longitudine pediculi distantia. Fauoniana rubra, paulo superbis maiora. Lateriana, Amiriana Postautumnalia acidulo sapore iucunda: Tiberiana appellantur, quæ maxime Tiberio principi placere. Coloratur magis Sole, grandescuntque: alioquin eadem essent, quæ Liceriana. Patris nomina habent, scilicet omniunum Amerina, Picentia, Numanina, Alexandrina, Numidiana, Græca, & in his Tarentina: Signina, quæ alià colore testacea appellant, sicut Onychina, purpurea. Ab odore, Myrapi, Laurea, Nardina. A tempore, Hordearia: à collo, Ampullacea: & à Corio, Coriollana. Brutæ gentilitatis Cucurbitina, aciduli succi. Incerta nominum causa est Barbaricis Venerisque, quæ Colorata dicunt. Regis quæ mirino pediculo fessita, Patricis, Vocomis, viridibus oblongisque. Præterea dixit Volema Virgilius à Catone sumptum: qui & Sementina & Mellea (Mella Colum.) nominat. Pars hæc vitæ iam pridem peruenit ad culmen, expertis cuncta hominibus. Turbinator Pyris figura. In his ferotina ad hyemem usque ad matrem pendent, gelu maturefcentia, Græca, Ampullacea, Laurea.

His Plinii Pyrorum differentiis Dalechampius & Had. Iunius curiosè diligentia huius seculi quædam Pyra accommodare studuerunt. Sunt & nunc (inquit Dalech.) quoque variis Pyrorum generibus sua hæc nostratibus nomina. Superba, petite Muscadelle. At Hadrianus Iunius Muscatellinum vult esse Plinii Hordearium, ab odoris fragrantia Muscatellinum recentioribus dictum, quod perperam [ait] Superbum vocat Grapoldus. *Crustumina.* G. Moscatelbirn. B. Moscatelpeere. G. Poire musquette. Superbum verò idem H. Iun. vult esse id Pyri genus, quod Belgæ Watterpeere / tyepecken / dirdgen / appellant. Basileæ sanè Wasferburn, id est aqua Pyra vocant Pyri genus paruum, & ocyssimum, quale Plinius ait esse Superbum. Crustumina, Gal. Poire perle, gratissimum, & ex parte rubet, Seruio teste Belg. Sint Jacobs peere. Filerna, à potu sic dicta, quoniam vuarum modo magna succi vi abundant, quæ apud Falernum proueniunt, unde Vinum Falernum olim celebratissimum. Gal. Bergamotte. Belg. Fransch Bangerweelen. Pyra Lactea, Gall. Blanchetise. Pyra Dolabelliana, Gal. Poire muset, Belg. Engelschebratpeere. Hæc longitudine pedali Hermolaus dicit. Pyra Pompeiana, vel Pomponiana, Gall. Bouchrestien. B. Tafelpeere. Fauoniana Gal. Grosse Muscadelle, id est, Muscatellina maiora, dicta putant, quod Fauonio flante statim formetur. Lateriana, Poire preuost. Tiberiana, Gal. Poires forés. Signina, Gall. Poire char. B. Rietpeere. Myrapi, Gal. Caluarosot. (Hæc Had. Iun. vult esse Muscatellina vulgò dicta, ut modò antè dictum.) Nardina, Gall. Poire d'argent. Hordearia, G. Poire de S. Jean: Dalech. At H. Iunio quæ sint, paulò prius dictum. Ampullacea, Poire d'anguisse, B. Engelsche tafeltree. Coriollana, G. Poire de salouffe. Cucurbitina, ab oblonga cucur-

Tom. I.

bitæ figura, G. Poire Courge: Dal. At Had. Iun. G. Poire de farreau, ou de Campan. Venteria G. Poire Accole. B. Venter peere. Regia, G. Poire Carmagnole. B. Ostpeerecken / nuspelpeere. Voconia, G. Poire farreau. Onychina, G. Poire cuisse Madame, quasi femur muliebre dicas. Hæc Plin. purpurea interpretari videtur, quod onyx tegumentum conchylis sit, ut ait Dioscor. purpurarum operculo simile. Pruna onychina Columellæ sic purpurea exponunt. Ego verò, inquit Dalechamp. quia Alabastrites lapis, Onyx dictus est, onychinum hic interpretor Pyrum, alabaistro colore simile, vulgò Poire cuisse Madame: purpureum hic genus ab Onychino diuersum esse reor, non autem Onychini vel epitheton, vel interpretationem. Eodem modo apud Columellam Onychinon exponendum arbitror. Scaurianorum mentionem facit Marcellus, ut aut illic ex Plinio legendum sit Seueriana, aut ex eo apud Plinium Scauriana, Postautumnalia. Dal. eadem suspicatur, quæ & acidula post memorata ab eodem Plinio. Eiusdem sententia H. Iun. acidulo sapore iucunda. B. Deboute. Volema, Macrobius Volumna, quod volum manus implant, Virgilio & Plinio dicta putantur, ut ait Seruius. Virgilius etiam Gravia vocat. Dal. eadem putat quæ & Libralia paulò antè dixerat Plinius. H. Iun. vult esse Sementina Catonis, vel Mellea. *Crustumina.* Vlaemsche sinoutpeere. Sementina à Sementinis feris [qua voce Varro vititur lib. 1. c. 2.] quæ inclinante æstate sationis causa celebrantur. Pyrum verò Librale H. Iun. est *Crustumina.* B. Anguisse peere. Gal. Poire de ban Chrestien: Poire de linte, Budzo. Pyrum Amerinum, scilicet omnium maximèque durans. Belg. Sint Thomas peere.

Lubrica sanè res est, huius seculi fructus, post tot temporum interualla, in tanta locorum distantia, post tot rerum mutationes, insitionumque vicissitudines, referre ad priscillius æui fructus, aut eadem putare. Laudanda tamen eorum diligentia & conatus eorum, qui istud tentant, ut si non eadem, at sanè non planè dissimilia hodie nobis esse constet, vel specie, vel gustus suauitate: qualia nos infra, partim ex aliorum, partim ex nostra obseruatione specialius describemus, & eorum quidem plurima, quorum modò facta est mentio & his etiam longè plura & Plinii fortè seculo nondum cognita. Ut ceteris idè suo ceu edicto proclamare, Partem hanc vitæ iam pridem peruenisse ad culmen, expertis cuncta hominibus, nec quicquam amplius excogitari posse.

Memorabile verò quod idem tradit: tot semodis insitam arborem vidisse iuxta Tiburtes Tilias [Tiburtes Tiliam Vet.] omni genere Pomorum onustam, alio ramo nucibus, alio bacis, aliunde vite, ficis, Pyris, Punicis, malorumque generibus. Sed huic breuem vitam fuisse.

Crustumina, siue Crustumina à Crustumio Thuscis oppido dicta sunt. Ex parte enim rubet. Glatiola nunc in Italia vocari existimantur. Picentia olim Romæ celebratissima, quibus contenderet Signina & Syria, si Iuuenali credatur Satyr. 11.

Signinam, Syriamque Pyrum de coribus isidem:

Aemula Picentis.

Syria nunc apud Italos creduntur, quæ Corcæla vocantur: alii putant dici Tarentina. Nonnulli etiam à Colore testacea: iam supra diximus Seruium Nigra interpretari. Græca, Græcula vocat Macrobius. In nomine quoque sunt, & à Curcio citantur, præter prædicta, Lolliana, Meuiana, [fortè Nouana Colum.] Tulliana, Septima-

Onyx

*Onychina
Pyrum.*

*Emendat
Plin.
vel Mar-
celli.
Postau-
tumnalia.
Volema
Gudo?*

Librale

Amerina

*Una arbor
varios fru-
tus ferens*

*Crustumina.
Glatiola.
Picentia.
Signina.
Syria.*

*Corcæla.
Tarentina.
Testacea.
Nigra.
Græcula.
Lolliana.
Meuiana.
Tulliana.
Septimana.*

D

Titiana. na: fera sunt. Idem habet, Titiana, Turriana, *Turrana.* [Turrana forte Colum.] Antiana, [Aniciana, *Antiana.* Cato.] Præciana, Valeriana & turbinata. A causa calculosa dicta, quod vitium est huius generis. *Præciana.* Solus, quod sciam, Critorum, Ceruiseorum, Timosorum, meminit Macrobius. Antiphon in libris de Agricultura, Phocidas quoque inter Pyrorum genera recenset, ut refert Athen. Reliqua quæ idem Pyrorum nomine proponit, Amamalides & Epimelides, Pyra non sunt, sed illud Amelanchier Herbariorum, hoc Mespili genus, de quibus suo loco. Quæ verò Aristoteles Apembloadas nominat, insitui generis intelliguntur, inquit Herimolans. Quæ Cato, Virg. & Plinio Volema dicuntur, Macrobius, Volemia dicit, qui & Ceritia & Ceruisa, & Calculosa, & Lolliana, & Lavinia & Milesia & Myrtea & Orbiculata & Præciana, & Rubilia, Tuliana, Titianaque nominat. Item Mespilaceum & Valerianum indicavit, Clostrum secutus.

Macrobius differentia. Hæc ferè sunt, quæ de Pyrorum generibus differentis & appellationibus ex Antiquis Scripturibus promere debuimus, & qua ratione Recentiorum quidam huius seculi Pyra vel eadem cum his esse putauerint, vel saltem ad ea referre studuerint, quamvis nullum Veterum nomen, quod equidem sciamus, apud nos remanserit, quod & Curtius facit. Genera tamen aliqua superesse minimè ambigendum putat, nec interisse: forsitan etiam nulla, sicut nec alias arbores, verum tantum nomina immutata, quæ non prætereunda, ut non tam antiquitatis observatores, quam nostræ ætatis amatores esse videamus.

Fontes de Pyrorum & reliquorum seu Arborum nomina de prompta. Neque prætereundum est, Pyrorum genera, nunc quoque nomina ex eisdem causis, ut antiqua, accepisse. A tempore, ab autore vel cultore, à loco, odore, colore, sapore, figura & similibus. Ergo & nostratum, hoc est, nostri seculi Pyrorum vindemiam celebremus, primam sportulam impoſitante Curtio. A tempore enim vel præcocia vel serotina appellantur, addita interdum cuiusdam diui appellatione, quæ ex tempore solet celebrari, ut Ioannina, quæ festinantiùs, & in festiuitate natiuitatis Diui Iohannis Baptistæ matura sunt. Huius autem generis plures differentiæ, quæ omnia persequi difficile. Sequuntur & Laurentiana, & ferius Maruniana. Bergomaria vero Bergamum Italix oppidum insigniuit sua pergrinatione. Nunc in Gallia in pretio habita, succo saporeque egregia, rotundior forma, colore herbaceo, qui nec dotem referat. Per Autumnum siue cruda, siue cocta eduntur, utriusque esui præstantissima. Ab autore dicta Dameriana: præcocia hæc, colore ex parte altera rubeo, ex altera croceo. Mariana, aquosa & dulcissima, tenerissimaque, sed fugacia. Vbertina apud Belgas, & tota Gallia, pretiosa, & præcocia, satis grandia, à colore iucunda croceo. A colore rubeo, nunc etiam Rubellina dicta, & ab auro Aurea, asperiore carne, duriorique, nec priusquam gelu experiantur, edomitâ durius, mitescent: scissima hæc sunt Rosatis totus odor nomen dedit. Callianis odor præcipuus, orbiculata, ex parte rubentia, & ex alia viridia, molli carne. A figura bicipitia, quod gemino capite videntur. Singularem commendatione, succo grato, qui etiam palatum morosum recreet, minime calculosa. A natura verò Strangulonea. Hæc enim mansa, tantâ acerbitate duplicent, ut deuorari nequeant, & strangulare videantur, unde sic dicta: pulchritudine tamen prædita, colore rubro, & maturitatis indicium præbentia, ut prætereuntes ad legendum

Indurina.

Laurentiana.

Marianæ.

Bergomaria.

Dameriana.

Mariana.

Vbertina.

Rubellina.

Rosata.

Calliana.

Bicipitia.

Strangulonea.

Indurina.

Laurentiana.

Marianæ.

Bergomaria.

Dameriana.

Mariana.

Vbertina.

Rubellina.

Rosata.

Calliana.

Bicipitia.

Strangulonea.

Indurina.

Laurentiana.

Marianæ.

Bergomaria.

Dameriana.

Mariana.

Vbertina.

Rubellina.

Rosata.

Calliana.

Bicipitia.

Strangulonea.

Indurina.

Laurentiana.

Marianæ.

Bergomaria.

Dameriana.

Mariana.

Vbertina.

Rubellina.

Rosata.

Calliana.

Bicipitia.

Strangulonea.

Indurina.

Laurentiana.

Marianæ.

Bergomaria.

Dameriana.

Mariana.

Vbertina.

Rubellina.

Rosata.

Calliana.

Bicipitia.

Strangulonea.

Indurina.

Laurentiana.

Marianæ.

Bergomaria.

Dameriana.

Mariana.

Vbertina.

Rubellina.

Rosata.

Calliana.

Bicipitia.

Strangulonea.

Indurina.

Laurentiana.

Marianæ.

Bergomaria.

Dameriana.

Mariana.

Vbertina.

Rubellina.

Rosata.

Calliana.

Bicipitia.

Strangulonea.

Indurina.

Laurentiana.

Marianæ.

Bergomaria.

Dameriana.

Mariana.

Vbertina.

Rubellina.

Rosata.

Calliana.

Bicipitia.

Strangulonea.

Indurina.

Laurentiana.

Marianæ.

Bergomaria.

Dameriana.

Mariana.

Vbertina.

Rubellina.

Rosata.

Calliana.

Bicipitia.

Strangulonea.

Indurina.

Laurentiana.

Marianæ.

Bergomaria.

Dameriana.

Mariana.

Vbertina.

Rubellina.

Rosata.

Calliana.

Bicipitia.

Strangulonea.

Indurina.

Laurentiana.

Marianæ.

Bergomaria.

Dameriana.

Mariana.

Vbertina.

Rubellina.

Rosata.

Calliana.

Bicipitia.

Strangulonea.

Indurina.

Laurentiana.

Marianæ.

Bergomaria.

Dameriana.

Mariana.

Vbertina.

Rubellina.

Rosata.

Calliana.

Bicipitia.

Strangulonea.

Indurina.

Laurentiana.

Marianæ.

Bergomaria.

Dameriana.

Mariana.

Vbertina.

Rubellina.

Rosata.

Calliana.

Bicipitia.

Strangulonea.

Indurina.

Laurentiana.

Marianæ.

Bergomaria.

Dameriana.

Mariana.

Vbertina.

Rubellina.

Rosata.

Calliana.

Bicipitia.

Strangulonea.

Indurina.

Laurentiana.

Marianæ.

Bergomaria.

Dameriana.

Mariana.

Vbertina.

Rubellina.

Rosata.

Calliana.

Bicipitia.

Strangulonea.

Indurina.

Laurentiana.

Marianæ.

Bergomaria.

Dameriana.

Mariana.

Vbertina.

Rubellina.

Rosata.

Calliana.

Bicipitia.

Strangulonea.

Indurina.

Laurentiana.

Marianæ.

Bergomaria.

Dameriana.

Mariana.

Vbertina.

Rubellina.

Rosata.

Calliana.

Bicipitia.

Strangulonea.

Indurina.

Laurentiana.

Marianæ.

Bergomaria.

Dameriana.

Mariana.

Vbertina.

Rubellina.

Rosata.

Calliana.

Bicipitia.

Strangulonea.

Indurina.

Laurentiana.

Marianæ.

Bergomaria.

Dameriana.

Mariana.

Vbertina.

Rubellina.

Rosata.

Calliana.

Bicipitia.

Strangulonea.

Indurina.

Laurentiana.

Marianæ.

Bergomaria.

Dameriana.

Mariana.

Vbertina.

Rubellina.

Rosata.

Calliana.

Bicipitia.

Strangulonea.

Indurina.

Laurentiana.

Marianæ.

cognomine; non ob hoc solum, quod in eximia suauitate librare pondus æquent, sed quia in teneritudine tanta, ut à gustatu vel ipso ore statim eliquescant, & perennent, gestatūque tolerant, ad Neapolim vsque delata, Carolo octauo ibi res gerente, à felici illa Campania iis dotibus adoptata. Proxima magnitudine sunt iis *Mariana*, vulgò duz *Mariz* Pyra dicta, [*Poires de nostre Dame*] a quosda dulcedine suauia, miraque teneritudine placent, sed fugaciora multò. Minima omnium sunt *Muscata*, quæ nomine alio *Chia*, *Poires muscates*, *poires de Chia* vulgò dicuntur, baccas corporis mole non excedentia, quina, senave, sæpè plura, ab vna origine longis dependent pediculis, odorata, moschi iucunditate, ob hoc nomen contraxerunt. Condiuntur saccharo à *algamariis*, ut in sequentem annum prorogentur. Media magnitudine sunt *Calliana*, [*Poires de caillieu*] carne iucunda, dulci, odorata, friabili, à præstantia Pyris Græcum nomen vulgus emendicauit, quasi dixeris meliora. *Rosata* odor nomen dedit quod *Rosæ* oleant [*poires d'aur rose*]. *Dicipitia*, [*poires à deux testes*] quod gemino capite visantur, singulari sunt commendatione, corpore suauis, non lapidoso, succi grati, palatum etiam morosum recreant. Turbinatiora omnibus *Cerealiæ*, quæ *Campanica* alio nomine dicuntur. Ea in metæ forma mucronantur, hyemem tolerant, duriore corporis callo, mira suauitate, succo pulcro. Ea prunis tosta fugacium ad veris exitum suppleunt inopiam. Condiuntur & saccharo adiecta *Cinnamomi* portuncula, ut cœnas claudant. Alia item *Martiana* [*poires de S. Martin*] quæ ad hyemem vsque in parente propendant, suauis gustu, firmiuscula carne, quæ non nisi cocta ferè mandantur. Vbi gelidiora senserit, teneriora multò: a etiam hybernas mensas simunt. Quæ *Finora*, [*poires de fin or*] Gallicè nominantur, quod atripuri colorem referant, asperiore carne, durioræque, nam prius quam gelu experiantur, edomita duritie miscunt. Ea diut siliuè durant, quamuis in eo genere æstiuas inueniantur & præcociæ. Magnopere commendantur *Bergamota*, seriparum nostrorum memoria coëpta, & sapore & succo præstantia. Non sunt omittenda Pyra quæ ut pulchritudine & rubio colore & luteo, quasi maturitatis indice, prætereuntes inuitant ad carptum, mansa tamen tanta displicent acerbitate, ut deuorari nequeant, sed demorsa protinus respuantur, ob id *Strangulanea* vulgò dicuntur. [*poires d'estranguillon*]. Carol. Steph. pyrorum de par de S. Rualo main, & de S. Rualo [præter citata] Gallis dictorum, meminit.

Matthioli Italiz Pyra recensens, Hetrusci nostri inquit, Antiquorum consuetudinem secuti, variis nominibus, à diuersis inditis causis sua Pyra vulgò appellant. 1. *Muscata*, 2. *Gugiale*, 3. *Ciampolino*, 4. *Roggie*, 5. *Ghiaciale*, 6. *Spinose*, 7. *Quadrane*, 8. *Carouelle*, 9. *Papali*, 10. *San. Nicolo*, 11. *Durelle*, 12. *Zuccale*, 13. *Campane*, 14. *Vernareccie*, 15. *Gentili*, 16. *Portine*, 17. *Sementine*.

Horum quædam & *Catallpinus* habet, & quædam alia, sed breuiter describit, & Plinianis accommodare conatur. Inter æstiuas, inquit, sunt *Moscatula*, ab odore Moschi appellata, parua & dulcia, ex viridi flauescencia: fortè apud Plin. *Superba* cognomine: parua hæc sed ocysissima. Paulò post succedunt *Iuniola* appellata, quia mense Iunio maturantur, paulò *Moscatulis* maiora, colore virentia, succosa multum, quæ videtur Plinius *Falerna* vocasse à potu: quoniam tanta vis succi abundat. Hinc turba sequitur, sed in iis *Glaciola*.

Tom. I.

præferuntur in acutum longius producta pyramide, lacteo intus colore: vnde lactea vocat Plinius. Et *Rudia*, turpi quidem colore, sed sapore cæteris dulciori, *Glaciolis* crassiora, breuioraque. In genere Autumnalium *Sementina* vocamus crassa & breuia, rubentia, præsertim quæ Sol aspicit, sapore subacida, quæ appellatio etiam apud Catonem & Plinium reperitur, quia in tempore se mentis maturantur. *Tiberiana* eadem, quod *Tiberio* principi placuerunt. *Hyemalia* magna ex parte crassiora sunt, cæteris veliora, quia per totam hyemem asseruantur, & pleraque grauiori etiam succo constant, quàm fugacia. In his *Carouella* crassa, & oblonga, breui pediculo, colore ferrugineo: quæ Plinius *Tessalea* à colore appellata scribit, ut nos in genere malorum *Testa* vocamus, colore simili. Sunt *Papalia* grandia, & breui pediculo sessilia: qualia Plinius *Regia* vocat. Sunt *Bergamota*, magis depecta & *Branchia*, oblonga, omnia colore viridi. Sunt *Cucurbitina* sic etiam à Plinio appellata, ingenua, sed ignauia. Multa alia sunt nomina apud nos, quemadmodum apud Antiquos, &c. Hactenus *Catallpinus*. Ex quibus constat Plinii & antiquitatis nomina apud Italos & Hetruscos [vbi hæc scribit Cæsalp.] nondum esse deleta, sed in hanc vsque diem permansisse, etiam apud vulgus. Fortè & ea ipsa sunt Pyra, ab Antiquis celebrata. Nisi si *Fœniculum*, *Napus*, *Morus* & similia Antiquis celebrata perpetua successione ad nos pertigere, & quidem ea ipsa specie, ut à nemine dubitatur, cur non & eadem specie Mala vel Pyra? Sed pergamus.

Aug. Gallus, natione Italus, in opusculo suo Geoponico Italicè conscripto, hæc Italicæ & Lombardiz Pyra refert. 1. *peri muscatellina*, matura Maii fine: quæ licet gustui valde grata sint, Medici tamen spernunt, quia vix collecta statim corrumpuntur. 2. *pericanalleri*, Pyra *Equestris*, Iunii principis matura: digna hoc nomine, quia & gustui grata, & nihil insalubre habent. 3. *peri ghiaciale*, prædicta sequuntur, cruda esui gratissima. 4. Iis prætereuntibus sequuntur, *peri cicognini*, Pyra *cicogniarum*, pulchra quidem, sed non bona. 5. Paulò post his similia, sed minus pulchra, verum suauitate gustus & odoris, qui moschum refert præstantia. 6. Mox Pyra dicta *peri de gramella*, magna, copioso grato succo abundantia. 7. Pyra *moscatellina* maiora, non minora equestribus, quibus sapor & odor moschi, & suauissimus. 8. Pyra Autumnalia, dicta *peri Bergamoti*, quæ saporis iucunditate, fortè omnia alia superant, verum diu non referuantur, nisi colligantur nonnihil immatura, & commodè reponantur. 9. Pyra Autumnalia dicta *peri garzignoli*, pretiosa cruda, & cocta post natalitia, verum arbori infestis vermes, qui subtili ferro perquirendi. 10. Pyra Autumnalia dicta *bazanarefchi*, magna sunt, grati saporis, durabilia. 11. Pyra Autumn. b. *Christiani*, quia bona cruda & cocta, hortis vulgaris. 12. *peri garzignoli*, omnibus placent, quia grata cruda, & durant adhuc toto mense Martio. Hæc sunt Pyra laudata Venetiis, & vicinis urbibus. 13. Pyra spinula, *peri di spina*, magnifacio, quia quotannis abundant: grata cocta & condita melle vel saccharo. Earum arbores præ cæteris excrescunt, & fructu turgent. Hactenus de Pyris Italicis.

Nec lux Germaniæ deesse voluit Cordus, quominus eam à variorum Pyrorum prouentu celebraret. Eius igitur diligentis sequentia debentur. Ipsorum fructuum, quæ Pyra nuncupat

D 2

*Rudia.**Semen ita.**Tiberiana.*
*Hyemalia.**Carouella.**Tessalea.**Papalia.*
*Regia.**Bergamota.**Branchia.*
*Cucurbitina.**Antiquorum*
Pyra etiam
*nam citata.**Aug. Gallus*
Pyrorum Ital.
ital. catalog.
*Maycatellina.**Equestris.**Ghiaciale.*
*Cicognini.**Cicognini*
moscat.
Peri de
*gramella.**Moscatellina*
*maiora.**Bergamoti.**Peri garzignoli.**Peri Bazanarefchi.**Peri boni*
*Christiani.**Peri garzignoli.*
*Peri di spina.**Pyrorum*
diff. Cordus.

mus infinita sunt genera, ex quibus aliquot in Germania proueniunt describemus: adiectis etiam Germanicis eorum nominibus, quae tamen secundum diuersas Prouincias variant.

Præposita
no. 1

1. *Propstbirn*, id est, *Præpositana* ex lata basi, iuxta pediculum in obtusum mucronem delinunt, longitudinem habent quadrantalem, latitudinem verò paulò minorem, color is est in viridi pallescens, viridibus maculis ceu punctis conspersus: gustu adstringunt, & succi abundantia sitim extinguunt, maturescunt Autumni initio, & citò putrescunt, propter frigidioris & aquei succi abundantiam. Habentur copiosè *Islebi* prope *Herciniam Saxoniz*.

Lardina

2. *Speckbirn*, id est, *Lardina*, in medio crasso ventre intumescunt, à quo subito in mucronem desinunt, longitudinem habent tribus vnciis maiorem, latitudinem verò quadrante paulò minorem, colore sunt pallido, & *Præpositanorum* modo, viridibus punctis conspersa, gustu admodum miti & suau, & porcini adipis modo in ore liquefunt, vnde etiam nomen inuenerunt, atque succi abundantia sitim restinguunt, cum excorticantur suauem spirant odorem, maturescunt Autumni initio, & *Præpositanorum* modo facile putrescunt.

Globosa

3. *Baulbirn*, id est, *Globosa*, globi serè rotunditatem habent, nisi iuxta pediculum in obtusum & vix euidentem turbinem fastigiarentur, longitudine duas vncias vix, & rard excedunt, latitudine verò longitudinem modicè superant, colore sunt in viridi pallescente, sapore & odore *Latidina* æmulantur, cum quibus etiam maturescunt: facile & hæc putrescunt. Habentur *Islebi*.

Cannabina

4. *Banffbirn*, id est, *Cannabina*, *Globosis* similia sunt, sed paulò maiora, colorem habent viridem, maculis ceu punctis distinctum, sapore *globosis* respondent, non tamen adeò in ore liquefunt, simul cum illis maturescunt, & facile putredine corripuntur. Habentur & hæc *Islebi*.

Campana
Pyra

5. *Glockenbirn*, id est, *Campana*, à sessili basi in angustum veluti collum coarctantur, à quo deinde in obtusum ceu caput delinunt, habentque omnino campanæ figuram, vnde etiam nomen inuenerunt. Colore sunt omnino flauo, punctisque maculoso, longitudine quadrante paulò minora, latitudine verò duas vncias non assequuntur, odorem spirant non insuauem, maxime excorticata, gustu *Cannabinis* respondent, pariterque cum eis maturitatem consequuntur, & facile putrescunt. *Islebi* proueniunt copiosè.

Regalia

6. *Königebirn*, vel *Regelbirn*, id est, *Regalia*, grandia sunt & ventrosa, longitudinem habent interdum quatuor vnciarum, latitudinem verò paulò minorem, colore sunt caesio, eà autem parte, quæ Solem acceperunt, leuiter rubescunt. Gustu adstringunt, & copioso succo eoque suau, & aliquantulum vinoso sitim sedant. Maturescunt Sole in libram ingresso, nec adeò facile putrescunt.

Turgida

7. *Blunfbirn*, id est, turgida, duplicis sunt differentiae, veramque tamen genus *Regalibus* proportionaliter forma respondet, sed quantitate illis cedunt, differentia in colore est: vnum siquidem genus, caesium habet colorem, alterum in caesio rubentem, succum habent *Regalibus* gustu similem, fortius tamen adstringunt. Maturescunt cum *Regalibus*. In *Saxonia* magnus eorum est prouentus, maxime *Hildesheimi*.

Bonnana

8. *Bonnebirn*, id est, *Bonnana*, à *Bonna* op-

pido, *Rheno* imposito sic appellata, vnde in alias regiones translata sunt, figuram habent serè globosam, nisi modicè in obtusum mucronem iuxta pediculum desinerent, longitudine sunt quadrantali, latitudine paulò minore. Coloris ab vna parte viridis aut pallescens, ab altera, quæ Sole tacta fuerunt, rubens: gustu modicè adstringunt, succo abundant copioso, eoque serè a quo, actu vehementer os refrigerante. Maturescunt Sole ad *Scorpionem* properante. Abundant *Marpurgi* in *Hassia*.

9. *Schmalgbirn*, id est, *Schmalz*, sic dicta, quod adipis aut liquaminis cuiusdam instar, in ore liquefunt, fructus sunt serè in ima parte tumidi, ac paulatim iuxta pediculum in angustum collum desinunt, vt cucurbitæ: longitudine quadrantali, aut plerumque maiori, latitudine verò sextantem excedunt semuncia. Colorem habent in pallido flauum, odorem spirant iucundum: gustu autem strenuè adstringunt, non sine admixtione præcipui & vinosi saporis, non satis matura, nec bene confecta dentibus, & nimis auidè deuorata, in faucibus aliquandiu manent & anhelum remorantur, alioquin matura ac bene mansa in ore adipis modò liquefunt. Maturescunt antequam Sol in *Libram* transeat. Habentur in *Hassia*, præsertim *Frankoberge*, vbi magnus est eorum prouentus.

Virginea
maiora

10. *Jungfrauenbirn groß*, id est, *Virginea* maiora, turgidis similia sunt odore & forma, quantitate verò paulò minora. Gustu efficacissimè adstringunt, adeò vt sauces exasperent, atque labra in angustum, instar *virginis osculi* contrahant, succum habent aquæum, veluti vino austero mixtum, Maturescunt æstatis exitu. Brundis in *Saxonia* copiosè proueniunt.

Virginea
minora

11. *Jungfrauenbirn klein*, id est, *Virginea* minora, à tumido ventre in angustum collum desinunt, longitudinem habent quadrante paulò breuiorem, latitudine verò sesquiunciam aliquantulum excedunt: colore sunt pulchro, veluti si quis cereum rubenti ac puniceo miscet: insuper etiam punctis conspersa sunt, gustu adstringunt, similique facile in ore resoluantur. Maturescunt Autumni initio. *Islebi* maxime coluntur.

12. *Bamelßwensie*, id est, *Bamelß*, nomen ab eo inuenerunt, quod veruecum ventriculos tumore æmulantur, & crasso veluti ventre turgent, longitudine quadrantem æquant, & sæpè etiam excedunt, latitudine verò quadrante minora sunt. Colore sunt caesio, eo autem latere, quo Sole in aspexerunt, subrubente, Saporem habent valdè cum gratia quadam & vinoso succo adstringentem. Maturescunt æstatis exitu. Habentur *Simesulus* in *Hassia*, & vicinis pagis, ibique reliquis *Pyris* præferuntur.

Leonina
Hofsauch

13. *Löwenbirn*, id est, *Leonina*, à præstantia sic appellata, ea in *Turingia* & vicinis locis *Hassia* nominantur, insignes sunt fructus, inter omnes Autumni dotes principatum, propter durationem & saporis succique bonitatem, obtinentes. Sunt autem inferius tumida & plerumque inæqualia, longitudinem habent quadrantalem & frequenter maiorem, latitudine verò sextantem non raro excedunt. Colore sunt caesio sub viridi & modicè rufo. Saporem habent adstringentem, cum præcipua suauitate. Succo abundant, copioso, vinoso, odorato, & actu refrigerante: vnde sitim confestim sedant, quin & ipsa *Pyra* vehementi & aromatico odore murum in modum ægros recreant. Maturescunt Sole in *Libram* ingresso. Reposita in longum tempus du-

fast.

rant, abundant in Hassia, maximè Marpurgi, Eadem Francobergæ, Schörrersbirn / id est, Tontoriana vocantur, à tonsore quodam qui ea primus ed transtulit.

Tonsoria
20.

Pendula

14. Hangelbirn / id est, pendula, Steatapiis figura, colore, & quantitate æqualia sunt, pediculo depedent longo, vnde etiam nomen sortita sunt, gustu à Steatapiis differunt, non enim ita vinoso constant succo, nec adeò adstringunt, nam simpliciorum saporem habent, nec ex tot qualitatibus compositum, cum iisdem tamen simul maturescunt. Coluntur & hæc in Hassia.

Margarethana

15. Margarethen birn / id est, Margarethana, sic dicta sunt, quod circa festum diuæ Margarethæ maturescant, Sole in Leonem ingrediente an oblongum collum fastigiantur, longitudine quadrantem, latitudine verò vix sextantem assequuntur. Colorem habent in cereo rubentem. Carne constant tenera, succosaque, gustu vehementer suauis, & in ore facillè resolubili, odore sunt admodum grato. Abundant Brunsvici in Saxonia.

Hyemalis

16. Winterbirn / id est, Hyemalis, ex rotundo modicè turbinatur, longitudine quadrante minora sunt, latitudine verò sextantem parùm superant. Colorem habent viridem, turbinatam verò durissimam, ut vix dentibus cedant. Gustu strenuè adstringunt & refrigerant, succo aqueo simulque aultero sunt sedana. Maturescunt sepius autumno, post omnes alios fructus, postquam pruinis & gelu tacta fuerunt. Habentur Francobergæ in Hassia.

Ossa

17. Knochenbirn / id est, ossa, à duritie nomen inuenerunt, ex tumido ventre paulatim in breue & angustum collum desinunt, longitudine sextantem, latitudine verò sesquiquintam rariò excedunt. Colorem habent subrubentem, substantia sunt adeò dura, ut cruda mandi non queant, sed cocta tantum. Gustu valdè adstringunt, maturescunt autumnii initio. Coluntur Francobergæ in Hassia.

Augustana

18. Augstbirn / id est, Augustana, serè rotunda essent, nisi in breuem mucronem desinerent. Longitudine sextantem parùm excedunt, latitudine verò paulò minora sunt. Colorem habent flauum interdum in pallido rubentem: gustu adstringunt: cum peculiari succi suauitate, maturescunt tempore Augusti mense, vnde etiam nomen inuenerunt. Eadem fugacia sunt nec diu durant. Abundant in Hassia ubique.

Mellea
maiora

19. Honigbirn groß / id est, Mellea maiora, in oblongum desinunt turbinem, longitudine quadrante semuncia minora sunt: latitudine verò sextantem serè assequuntur. Colorem habent in flauo cæsum, & superficiem non adeò glabram, gustu adstringunt, succoque abundant suauis, maturescunt Autumnii initio, aliquandiu durantes. Habentur VVittenbergæ in superiori Saxonia.

Mellea
minora

20. Honigbirn klein / id est, Mellea minora, turbinata sunt, longitudine sesquiquintam non excedunt, latitudine verò paulò minora sunt, colore habent subrubentem, saporem valdè dulcem & suauem, vnde nomen inuenerunt. Liquecent facillè in ore gustantium, maturescunt paulò post Augustana. Abundant in Hassia.

Muscata
glauc.

21. Muscatellerbirn / id est, Muscatellina, parua admodum sunt & turbinata, longitudine vnciam paululùm excedunt, latitudine verò vncia paulò minora. Colore in vindi rubente, saporem habent suauissimum & aromaticum, veluti modico musco condita essent, vnde etiam nomen sortita sunt. Facillè in ore liquecent, odorem quoque iucun-

Tom. I.

dum spirant. Maturescunt Iunio mense. Coluntur studiosè in Misnia.

22. Schafbirn / Melleis maioribus similia sunt quantitate, figura & colore, paulò tamen oblongiora & angustiora. Saporem verò habent vehementer suauem, modicè adstringentem, facillèque propter carnis & succi teneram molliem in ore resoluuntur. Maturescunt Sole ad Libram properante. Habentur Francobergæ in Hassia.

23. Warbirn / id est, Cereæ, inferius ventrosa sunt, superius in turbinem desinunt: longitudine quadrantem paululùm interdum superant, latitudine verò sextantem rariò excedunt. Colorem habent flauum aut cereum, vnde nomen illis inditum: ab ea etiam parte, quæ Solem receperunt, grato & maculoso rubore intuentes ad comedendum se inuitant. Saporem habent suauem modicè adstringentem: carne constant mui, & facillè in ore liquecent. Maturescunt Sole in Virginem ingresso, fugacia sunt, nec diu durant. Habentur Marpurgi in Hassia.

24. Rostbirn / id est, Rostia, in medio ventrosa sunt, & vtrinque in angustum desinunt, longitudine quadrantem semuncia excedunt, latitudine verò sextantem cum semuncia æquant. Colorem habent flauum, cælis punctis conspersum: gustu sunt admodum mui & suauis, ac facillè in ore liquecent: eadem propter nimiam molliem minimè durant. Maturescunt autumnii initio. Coluntur Illebi & vicinis oppidis.

25. Aschenbirn / id est, cinerea, nomen habent quod cineris modò mollia sunt, & facillè in ore dissoluant. Rostia, figura, colore carnis, substantia & sapore, æmulantur, paulò tamen minora sunt, magisque in vnam partem versus pediculum turbinata, quamvis interdum Rostiorum modò in medio ventrosa sunt. Maturescunt cum Rostiis, coluntur Illebi.

26. Erindebirn / id est, rēnū, sic dicta sunt, quod alicuius potus instar sibi arceant, in medio tumunt & in obtusum mucronem desinunt, longitudine sextantem parùm superant, latitudine verò sextantem serè æquant. Colore sunt omninò flauo, rubescunt tamen ea parte, quæ Soli exposita sunt. Saporem habent suauem, carnemque teneram & largo potabilique succo abundantem, maturescunt cum Rostiis, & similiter ut illa, citò putrescunt. Coluntur in agro Islebi.

27. Eyerbirn / id est, Ouata, à figura nomen inuenerunt, quæ illis est vtrinque, brevis oui instar turbinata, alioquin etiam à potimis proportionem & forma non multum differunt, paulò tamen minora existunt: colorem habent flauum, punctis conspersum sapore Rostia æmulantur, simulque modicè adstringunt: odorem spirant admodum suauem, maturescunt cum potimis, citòque putrescunt. Habentur & hæc Islebi & vicinis oppidis.

28. Pfalzgrävisch birn / id est, Palatina, quæ in Hassia Mosbirn vocantur, fugacium omnium generosissima sunt, æqualiter plerumque in turbinem desinunt, longitudine quadrantem, semuncia demptà æquant, latitudine verò sextantem rariò excedunt. Colore sunt inter croceum, puniceum & rubentem medio, carne tenera, succosa, sapore supra modum suauis, & veluti aromatica. Odorem habent tam integra, quam incisa suauissimum, quem nullum Pyrorum genus bonitate superet. Maturescunt Augusti

D 3

HISTORIAE PLANTARVM

41

exitu, Sole in Virginem ingresso. Habentur in Rhenano tractu, Francia, Halia, & multis aliis regionibus.

Rambacca. 29. Spindelbirn / siue Rantenbirn / id est, Rambacca, Rostis figura, colore, & magnitudine similia sunt, paulo tamen angustiora, substantia verò & sapore ab illis differunt, durior siquidem carne constant, ideoque diutius durant: saporem habent adstringentem simulque suauem. Maturescunt cum Rostis. In agro Illebiaco coluntur.

Zacharina. 30. Zieserbirn / id est, Zacharina, longitudine sextantem paululum excedunt, latitudine verò eundem vix aut rard attingunt: colore sunt viridi. Carne constant tenera, facili, instar Zachari, in ore liquecente, gustu suauis & dulci. Maturescunt cum Rostis nec diu durant. Coluntur in agro Illebiaco.

Pachlemiana. 31. Pachlemusbirn / id est, Pachlemiana. Zacharinae quantitate & figura similia sunt, colorem habent viridem & caesium, superficie aliquantulum tunc scabra, carne constant dura, succosa & adstringente, maturescunt cum Zacharinis, & si iniuncta absit, non facile putrescunt, sed aliquandiu durare possunt, sicut pleraque alia, quae dura carne & adstringente succo constant. Coluntur in agro Illebiaco.

Kirchmossbirn. 32. Kirchmossbirn / rotunda & ventrosa sunt, & versus pediculum in longum angustum & valde attenuatum mucronem desinunt: longitudine tunc semuncia breuiora sunt, latitudinis verò dimidio sextantem excedunt, quamvis etiam minora nascantur, colore sunt flauo, carne constant tenera succosaque, gustu simul Palatina & Potina referunt. Maturescunt Autumno, durante ferè donec Sol Sagittarium ingreditur. Habentur VVirtembergæ.

Tumida, Alia flaua. 33. Anapfibirn / siue Gelbe Honigbirn / id est, Tumida, & Mellea flaua, latam habent basin, atque Turgidorum instar tumida & subrotunda sunt, iuxta pediculum in breuem, obtusum ac rotundum mucronem desinunt, tam longitudine, quam latitudine, sextantem cum semuncia interdum excedunt, sed raro, colore sunt flauo atque punctato, circa Pythmenam plerumque Melleorum maiorum colorem & asperitatem affectant, carne constant subdura, succosa, & circa seminum receptacula lapidosa. Saporem habent inter Mellea maiora, & Leonina medium, estque hic admodum gratus. Maturescunt Autumno, & nonnunquam ferè vsque ad hyemale Solstitium durant. Coluntur VVirtembergæ vicinis locis.

Cornubiana. 34. Blosserbirn / id est, Cornubiana, inæquali ventre turgent, & iuxta pediculum turbinantur, longitudine quadrantem attingunt, ac latitudine quoque non multum cedunt, colorem habent flauum, & viridibus punctis conspersum, substantia eis est subdura, & aliquantulum lapidosa. Gustu mediocriter adstringunt, & modice glutinosa cum suauitate existunt. Maturescunt cum tumidis, illisque similiter durant. Habentur in agro VVirtembergensi.

Virens. 35. Glasbirn / id est, vitrea, rotunda sunt, & modice turbinata, longitudine sextantem cum tertia plerumque vnciae parte æquant, latitudine verò sextantem paululum excedunt, colorem habent in flauo modice virentem: caro iis est tenera succosa, gustu adstringens, suavis & vinosa. Maturescunt cum Rostis, paulo ante Autumni initium. Illebiis copiosus eorum est prouentus, vicinisque oppidis: durant vsque quò Sol Sagittarium ingreditur.

36. Kirchbirn, id est, Templaria, oblongam & ouatam habent figuram, magis tamen quam ouum in turbinem desinunt, longitudine sextantem æquant, latitudine verò sesquunciam aliquantulum excedunt. Colore sunt ab vna parte in flauo viridi, ab altera autem, quæ Solem receperunt, rubente. Carnem habent duram, modice acetosam, ac vehementer adstringentem. Maturescunt æstatis exitu, diuque durant. Horum quoque magnus est Illebiis prouentus.

Cornubiana. 37. Quittenbirn, id est, Cotonearia, Cornubiana, norum modo inæquali ventre tument, iuxta pediculum in breuem mucronem, veluti turbinata Cotonea, desinunt, pariterque tuberosa existunt. Vnde etiam nomen illis factum est: sextantem cum tertia vnciae parte, tam latitudine quam longitudine excedunt. Colorem habent viridem, carnem verò duram, succosam, gustu modice vinosam & mediocriter adstringentem. Maturescunt Autumni initio, durantque vsque in hyemem. Habentur Illebiis.

Parisiensis. 38. Parzibirn, id est, Parisiana, inferius rotunda sunt, & superius in mucronem desinunt. Longitudine sextantem cum semuncia æquant, latitudine verò sextantem non excedunt, aut rard. Colorem habent ab vna parte flauum, ab altera autem, quæ Solem senserunt, purpureum. Caro iis est succosa, gustu cum suauitate adstringens. Maturescunt cum prædictis, durantque in hyemem vsque. Copiosus eorum est in agro Illebiaco prouentus.

Thelyphona. 39. Weybersterben / id est, Thelyphona, rotunda essent, nisi iuxta pediculum in breuem obtusumque mucronem fastigiatentur, sextantem tam latitudine, quam longitudine plerumque excedunt. Colorem habent flauum, & iuxta basin croceum, & puniceis punctis conspersum. Carne constant dura, aliquantulum lapidosa, succo, gustu modice acetoso & valde adstringenti, quemadmodum Templaria, cum quibus etiam maturescunt. Durant in hyemem vsque. Coluntur in agro Illebiaco.

Brassicanus. 40. Bölsbirn / id est, Brassicana, magna, subrotunda & turbinata sunt, longitudine quadrantem æquant, cui etiam latitudo eorum respondet, si semuncia, aut tertia vnciae pars detrahatur. Colorem habent in viridi pallidum, ab altera parte modice rubentem & punctis conspersum. Carne constant duriuscula, succosa, gustu aliquantulum acetoso & fortiter adstringente: quemadmodum Thelyphona, cum quibus etiam maturescunt, & similiter durant. Illebiis coluntur.

Bohemia. 41. Bölsperer, id est, vasta: magna, ventrosa, inæqualia & turbinata sunt, longitudine quadrantem cum semuncia interdum excedunt, latitudine autem longitudinem ferè æquant. Color iis est viridis. Carnem verò habent succosam, gustu vinosam, modice acetosam, & Brassicanis fortius adstringentem. Maturescunt Autumni initio, diuque vsque in hyemem durant. Frequens est eorum in agro Illebiaco prouentus.

Succulentus. 42. Saffibirn / id est, Succulenta, vastis similia sunt, paulo tamen minora, minusque inæqualia, colore in viridi flauo, carne constant solida, quæ incisa copioso succo manat, eadem manducata ferè tota in succum transit, nimium enim quiddam remanet sicci, cum deglutitur succus, qui gustu frigidus, subacidus, vinosus, & adstringens est. Maturescunt Autumni initio, diuque durant. Habentur VVirtembergæ.

Oualis. 43. Eierlinger / id est, Oualia, à forma ouali nomen acceperunt, mediam habent inter Potina

LIBER PRIMVS.

et ovata figuram ac magnitudinem, color iis est flavus punctisque subruftis in fusco confertus. Carne constant dura, succola, gustu acida, vinosa & astringente. Maturescunt autumni initio diuque durant. Proueniunt V Vittemberge.

Turbinata 44. *Bruselbirn* / id est, Turbinata, figura turbinem, quem pueri funiculo inuolutum in terram proiciunt ut vertatur, amulantur: longitudine quadrantem attingunt, latitudine autem sextantem semuncia excedunt. Color iis est inter viridi pallidus, multis viridibus maculis seu punctis confertus, carne constant solida, succola, gustu valde adstringenti, aliquantulum acetosa & suauis. Durant vsque Sol. Aquarium aut Piscis superauerit. Abundant in Misnia.

Brachia 45. *Brachirn groß* / quæ etiam *Fregelbirn* / id est, quæ frigendo sunt, omnium ferè maxima sunt, nonnunquam enim minam cum dimidia pendet, figura sunt globosa, interimque turbinata, & frequenter inæqualia, colore inter viridem, pallidum rufamque medio, & ex altera parte magis ruffo. Carne constant cum suauitate succi adstringente, aliquid acetosi participante. Proueniunt in Misnia, præsertim Leisnichi & Colditz.

Cineracea 46. *Gravchen* à colore nomen inuenerunt, siquidem cineracea simulque subuitidia sunt, figura globosa paruaque, vnciam tam latitudine quam longitudine æquantia, aspectu à syluestri quibusdam nihil differunt, gustu sunt tenera, mitia, dulcia & suauia cum adstrictione aliquandur post Solstitium hyemale. Proueniunt in Misnia Lipsensi agro.

Punicea 47. *Gelbrotchirn* / id est, Punicea oblongam pyramidalem figuram habent, quadrantem longitudine paulò minùs quàm semper attingentes latitudine uerò sextantem. Colore sunt ab una parte citrino, ab altera croceo & puniceo. Carne constant tenera, gustu adstringente, suauis, subacido & aquoso, maturescunt utrumque initio, & vsque ad Solstitium hyemale durant. Proueniunt Hildesheimii in Saxonia.

Prasina 48. *Grünlingen* / id est, Prasina, satis magna sunt, siquidem quadrantem nonnunquam longitudine excedunt, latitudine uerò sextantem figuram habent oblongam & pyramidalem, colorem viridem, carnem succolam, non leuiter gustu adstringentem. Maturescunt autumno incuntes, & vsque post Solstitium durant: prouentus eorum Hildesheimii magnus.

Hydrapia 49. *Wasserbirn* / id est, Hydrapia, quantitate Prasina amulantur, figuram habent ventrosam in medio, & vtrinque in mucronem desinunt, iuxta pediculum oblongiorem acutioremque, propè pythmæna uerò breuiorem & obtusior, Colorem ab una parte pallidum, punctisque confertum, ab altera rubentem, & per oram pallore dilutum. Carne constant succola, gustu aquosa, cum suauitate aliqua. Matura sunt, cum Prasinis nec vsque aded durant. Proueniunt Hildesheimii.

Conaria 50. *Regelbirn* / id est, Conaria pinei coni figuram habent, è latiuscula enim basi in mucronem desinunt, longitudo eis quadrantalis, latitudo autem sextantal, colore sunt ex vna parte viridi, ex altera uerò rubescante. Carne constant succola, gustu austera, maturitas eis contingit Autumni initio, à quo tempore vsque ad hyemale Solstitium durare possunt. Nascuntur Hildesheimii. *Haltenu Cerdus*.

Tragidisferentia *Pirum*. Tragusitidem apud Germanos nascentium horum meminit. Piramquit, quæ Germ. *Neschersling* / *Schmalzhiren* / *Fleischbiren* / *Bodsbiren*

aut *Bengenbiren* vocant fortè ad Crustamina & Falerna Barbari referri possunt. Sunt enim saporis iucundissimi succola admodum & fugacia. At Pira præcocia seu æstiuæ quæ & ipsa non vnius sunt generis, cum in illis succola, alia exucca reperiatur, ad Superba Barbari pertinent, quo loco & ea habenda sunt, quæ Germani *Berien* oder *Pfaffenbiren* / hoc est, Pira dominorum aut sacrificorum vocant. Inter ea uerò quæ Autumno proueniunt, *Regelbiren* uacata primas obtinent. Hæc fortè Dolabelliana Veterum fuerint. Sunt & quæ Latini Pomponiana & Mammosa vocant, ut interim ea præteream, quæ Germ. *Frauenbiren* / *Kirchenbiren* / *Winterbiren* / *Leonhartsbiren* / *Schiffersbiren* / *Wasserbiren* / *Mullingabiren* / *Lenlosen* / *Muscaterbiren* &c. At uerò Pitorum illæ nomenclaturæ, quas Herimol. Barbari putat Tragus, Barbari non sunt, sed Plinii, ex quo Barbarus transcripsit, more suo, non citato Plinio.

Gesnerus in horto, Pitorum genera diuersa dicit Lindauiz, in quibus præcipue commendantur Muscatellina. Maturescunt in fine Iulii, Superba, Chia, Myrapidia, præcocia. Item Virginea [*Jungfrauenbirle*] grato & dulci sapore, quæ liccata placent, & maiora quæ Regulana (*Regelbiren*) è Curia Rhetorum aduecta. Hæc quidem apud se [*Tiguri*] rara esse, sicut & Libralia à pondere vnciarum xv. & amplius quandoque inæqualia, tuberosa, succi plena. Sed hæc diu seruari non possunt. Item alibi: Pira à scænis, *Schreibbiren* dicta, *Berrenbirn* / *Schürbirn* / & quæ Tigurinis *Grauwengsteler* / Pira Strangulanea, & syluestria, matura Octobri. Sunt & *Tellbiren* / *Winterbirn* / *Marmebirn* / *Steinbirn* / *Clausbirn* / à Sebizo Medico Argentinenfi nominata apud Carol. Steph.

Tabernamontanus ista recenset. 1. Pira Regalia, *Regalbirn*. 2. Palatina, *Alandbirn*. 3. Præcocia, *Frühbirn*. 4. Iacobæa, *Jacobsbirn*. 5. Cydonia, *Bütenbirn*. 6. Rotunda, *Scheibbirn*. 7. Superba, *Bragelbirn*. 8. Prasina, *Bräuling*. 9. Prasina hyemalis, *Winterbirn*. 10. Muscatellerbierlein, Muscatellina. 11. Saccharapia, *Süßsternbirn*. 12. Trochapia, *Gellgatterbirn*. 13. Keesbirn. 14. Bodelbirn. 15. Seidlinger. 16. Pedicularia, *Leisbiren*. 17. Strangulatoria, *Strengling* aut *Ritterbirn*. Sed quis ex solis & nudis istis nominibus intelligit, quæ & qualia sint illa Pira, & num rectè suas figuras accommodat. Inquinis ista non traduntur, Sed peregrinis. Notasigitur breuiter apponi par fuisse.

Catalogus Pitorum Silesiacorum hunc dat Schneekf. 1. Silesiaca Pira præcocia, *Frühbirnen*. 2. Auenaria, *Haberbirnen*. 3. Fannacea, *Neelbirnen*. 4. Mariana, *Margenbirnen*. 5. Muscatellina, *Muscaterbirnen*. 6. Mellea, *Melapia*, *Hosnigbirnen*. 7. Saccharia, *Süßerbirnen*. 8. Lardina, *Speckbirnen*. 9. Nobilium *Jundersbirnen*. 10. Hyemalis serotina, *Winterbirnen*. 11. Strangulatoria, *Strengelinge* / *würgende Birnen* / *Ritterbirnen*. 12. Adiposa, *Schmeersbirnen*. 13. Hydrapia, *Wasserbirnen*. 14. Pira Coccinea succo & aspectu, *Blutbirnen* / quorum postremorum ante ipsum meminit Camer qui præter alias Pitorum differentias quas Norimbergæ habeant, esse etiam scribit, quæ eleganti rubore carnis interioris placeant. Item, quæ comesta ventrem subducunt. Ex dictis quædam in horto Lusatiæ coluntur, & præterea ista, nisi nominibus tantum euariant. 1. *Mönchsbirn*, id est, Monachorum Pira. 2. *Zapffelbirn*. 3. *Böckers*

Dolabelliana Veterum Pomponiana Mammosa *Herimol. Barbari Tragus non tamur.*

Gesneri differ. Muscatellina Superba Chia Myrapidia Præcocia Regulana Pira scæni.

Tabern. differentia

Tabern. non alit.

Silesia Pitorum recensio.

Pira Coccinea carnea. Pira Semivirens laxa.

birn/Scholzenbirn/quæ & Parisiana vocat, quorum & supra mentio facta. 5. burgbirn. 6. römische birn. 7. bachbirn. 8. Dapperzenbirn. 9. schenbergerbirn. 10. faulbirn. Rotunda, &c.

Colerus inter alia, nondum dicta, maldbirn/hafenbirn/zappenbirn habet.

*Pira Germanica
frem la-
xantia.
Turneri
Anglia Pi-
ra
Superba.*

*Dolabel-
lia
na.
Fauonia
Autumna-
lia.*

Turnerus Anglus non modò suæ Prouinciæ Pyra quædam celebrare voluit, sed & Priscis restituere nominibus conatus est, sic pote. 1. Pyra superba Plinii, id est Proud peares / parua celerimè maturescunt. 2. Falerna alicubi Anglis wates rypeares / aut woylpeares vocantur. Dolabel-
liana longo sunt pediculo, non memini quo nomine apud Anglos appellentur. Fauonia rubent, paulò maiora superbis. Autumnaia, Septembri primùm maturantur, gustu suauis, acido. Angl. Peares of the autumn. Volema, Anglis vulgò mardens, si aditinctionem habeant, & tosta rubeant, durèntque in Febr. aut Martium vsque. Nomen videntur adepta à duratione: id enim Germania warten vocat, vnde nostrum derivatur. Serotina ad hyemem vsque in arbore sua pendent, gelu maturantur. Ea sunt parum warden nobis dicta, partim Germanis winterbiren nominata, quæ & Anglicè winterpeares appellare liceret.

*Gerardi
Pirorum
Anglia c-
numeratio.*

Gerardus itidem Anglus tutius vulgi appellationibus hærendum existimauit, & in Anglia hæc prouenire tradit. 1. Pyra præcocia. Thegenmetting peare. 2. Iacobæ. S. James peare. 3. Regale. The peare Royall. 4. Palatinum. The Burgomot peare. 5. Pyrum Cydonium, The Quince peare. [hoc Tabern. p. 997. Malus Cydonia dictum.] 6. Pyrum Episcopatum, the Bishop's peare. [Tabern. fochelbirn.] 7. Superba, siue Catharina, the Bathern peare tree. 8. Pyrus Hyemalis, the winter peare tree. 9. Pyrus strangulatorium maius. the great Choke peare. 10. Pyrus pedicularia, the Lonsie wilde peare. 11. Pyrus Cornina, the Crowe peare tree. [Tabern. Scidlinger] Nihil hic quoque describit, figuras ex Tabern. habet, nec tamen omnes. Mirum verò cur tres ex his species syluestres dicat.

*Gerard.
m.*

Habes Pyrorum differentias tam à Priscis quàm à Recentioribus [quos quidem nos inspeximus] propositas, & non pauca annotata, quæ ad Priscorum cum nostris collationem illustrationemque faciant: æquum est, vt & à nobis obseruatorum Pyrorum syluulam prodamus, quamuis quædam fortè & ab aliis iam priùs dicta sint: dicenda tamen, vt constet, & nostris regionibus ea largitam naturam, & vt specialiori lemmate adhibito, Lectori clariùs pateant, exorsi à Moscatellorum genere, quòd odore, suauitate gustus atque prouentus prioritate præ aliis superbiant. Hactenus vnicum eorum genus tantùm dictum à singulis qui de iis tradiderunt, nos eorum aliquot differentias obseruauimus.

*Ambrosius
obseruata
Pirorum
differentia.*

*Pira Mos-
catellina
minima.*

1. Pira Moscatellina minima, valdè parua, extrasa domestica vix superant, rotunda, longiusculo pediculo, odore præsuauis, sapore vino Moscatellino seu Apiano simili. Basileæ muscateller birn vocantur. Abundant Lugduni, vbi poires muscades perites vocantur: vnde etiam Guil. Rouilius, Typographus insignis aliquando fureulos ad nos misit, quos Geneuæ inserendos curauimus: Item Montbelgardi in horto E. C. Velutio missos ab amicis. Habentur & in Alsacia, speciatim in Gebviller.

*Moscatelli-
na rubra.*

2. Clareuallæ ad Dubim, oppido Excels. C. V. Vir-
temb. principio Augusti gustauimus. Pira admodum lapida & Moschum haud obscurè redolen-

tia, prædictis maiora, vncias duas fere longa, turbinata, parte Soli obuersa saturè rubentia, altera flauentia, pediculo vncia longiore, carne tenera, albida & nonnihil flauescens. Pira Iesu vulgò poires de Iesu vocant. Montbelgardi iisdem figuræ & magnitudinis similia habent, sed non sunt rubra, verùm albicant potius, gustu suauis, & dictis non admodum dissimili, sicut nec odore.

*Poires de
Iesu.
Horum
vires.*

3. Maiora Moscatellina in horto E. C. V. Vir-
temb. Montbelgardi celebramus, habentur nostrà curâ inserta.

*Moscatelli-
na maiora.*

4. Serotinum Moscatellinum genus, magnitudine variat, alias tres vncias altum, & plusquam duas crassum, alias vix duas vncias altum, sefcunciam crassum, pediculo vnciali, cortice ex leui rubore flauescens, punctato, carne mediocriter solidà, ex albo in buxum vergente, grumosa, odore moschi fragrantissimo, sapore dulci, vinoso. Tugax est hoc genus, neque diu asseruari potest. Habentur in pretio in horto arcis Granduillæ, Montbelgardo vicinæ. Mignotus Medicus Burgundus dicebat in Burgundia, speciatim oppido Villaffan dicto, poires d'or vocari, id est Pira aureola: & Lutetia poires d'amidon, id est, Pira Amyli. Esui gratissima sunt, Septembri matura.

*Moscatelli-
na maiora
Autumna-
lia.*

*Pira au-
reola.*

Amyli pira.

5. Habetur Piri genus Montbelgardi, quod Calueium vocant: rotundum est, satis magnum, minimè fugax, moschum redolens, quod manibus contrectatum etiam odorem ingeminat, suauis & lapidum. Nostrà curâ inserti furculi in horto E. C. quorum partem quoque Illustr. Principi Landgrauio Hassiæ, omnis virtutis, & rerum etiam naturæ studiosissimo misimus. Vocant vulgò poires caluer, & poire à vin. Aiunt durare vsque ad Maium, nec ante commodè edi, cocta tamen esui esse suauissima. Duo horum genera descripta. Aliud enim quod non ita Moschum redolet, sed maius, tenerius, quod commodius edi potest crudum, rotundum & sessile, colore serè cum piro Campanæ: Mense Nouembri mihi non iniucundus esset. Hoc maius vocant Caluer basile.

*Pira rotunda
da Moschum
redolentia.
Vulgo Cal-
ueia.*

6. Basileæ & in Alsacia paruum quoddam Pirigenus satis frequens est, quod hembirle / hoc est, Fœnata Pira, sic dicta, quo ipso Fœniscio maturecant, nempe Iulio mense. Moscatellinis quodammodo similia, sed in oblongum vergentia, cute luteola, pediculo longo, carne dulci, solida, sic satis. Variant hæc eodem nomine. Alia parua, crocea, pediculo breui, odorata, iucundi saporis, carne solida. Alia carne molliore, in ore liquecente, lutea, prædictis maiora, minus odorata. Alia denique longo pediculo, carne grandinosa, externè flaua. Considerandum an aliquod horum genus sit id, quod Lugdunenses Pira Sancti Ioannis vocant, de quibus etiam supra.

Pira Fœnata.

Piristia.

7. Perdetto Burgundis Pira obseruata nobis in Dampierre arce Montbelgardo non longè distante: matura Septembris initio, viridia, vnde nomen, non pulchra, suauis tamen, & odore & sapore, & aliquid etiam Moschi inter comedendum redolentia.


*Pira Viri-
dissima.*

8. Vinosum dictum nonnullis Pirum elegans est, paruum, non totas duas vncias altum, paulò magis vnci crassum, cortice partem maximam ex flauo rutilante, cæteroquin flauescens, carne sapida, vinosà, mediocriter firma, & circa membranosos seminum loculos, granulis multis grumosa. In horto Montbelgardi matura Augusto. Quidam Vinete vocant, à vinoso sapore. Germ. weinbirn dicere possis.

*Pira Vineta
sa parua
V. V. c. m. m.*

Hydrasja.

Hydrasja.



In Rauraca in toto tractu Alsatice Aquosa Pira dicta, comorfa, tanto succo fauces opplet, ut haud vanè vulgato Idiomate Wasserbirn dicta putres. Minora paulò Gallinaceo ovo, quædam etiã æqualia, circa pediculũ turbinata, opposita parte sessili. Mox hic fructus, & totius durationis tempus vix menstruum, Iulio &

Augusto diuissim. Quia eundem planè putamus fructum què Ulmerwasserbirn vocant in Ducatu VVirtemb. idè ex iis paratam figuram hic adiacere placuit.

Pirum Onatum.

Elegans hoc Piri genus in deliciis habent Basilienses, & totus ferè tractus Alsatice, quod à figur. Eyerbirn id est, onatum Pirum vulgò nuncupant. Qui enim specie vtrinque turbinata, & in medio ventricosum. Maiora anserinum ouum facile æquant. Cortex ex viridi siue chloro flavescens, punctis araneosis & ferrugineis conspersus, umbilico prominulo, pediculo longo. Carnis substantia mollis, succosa, sapida, ex dulci vinosa, & veluti in ore colliquefcent, non sine præcipua, & ipsi propria quadam suauitate. Sub Iulii mensis vel Aug. initium matura. Facile fracescunt, & tandem putrescunt. Rariùs hæc occurrunt apud Montbelgardenses habentur tamen. Argentineses etiã Bessbirn appellant, quo nomine tamen aliud Piri genus habetur Basileæ, quod iam describemus.

Pira viti-
ma Basili-
ensium.

11. Haud temerè optima Basiliensibus vulgò dicuntur Pira, quemadmodum & Argentinesibus eorumque vicinis, quod gustu suauissimo esse putentur. Carne quippe sunt molli, in ore facile dissolubili: & quamvis aliquid granulosi habeant: nihilo tamen minus gustu, (nescio quid commendationis præ reliquis Piris præ se ferente) magis quàm moscatellina quadam dulcedine fauces delectat. Magnitudo iis penè aui maioris vel anserini, sed umbilico tenuis sessilia ferè, opposita parte turbinata, pediculo vnciali vel maiori. Aestiuæ sunt, & fugaciæ. In Vineis Basiliensibus habentur, haud alibi temerè ita obuiæ. Maturescunt Iulio, & Augusti medium vix attingunt.

Pira viti-
ma Basili-
ensium.

12. Treubelbirn/ Basil. id est, vuarum Pira vulgò dicta videntur à tempore, quo matura sunt. Cum suis enim maturescunt circa umbilicum angulosi, ventre subrotundo, superne leuiter turbinata: cute recta flaua, & ut alia multa, stigmatus crebris

punctata, pediculo ipsam Pirum longitudine facile æquante: Fragrantis odoris, gustus sapidi, dulcis, carne primùm firma, succosa tamen, & quæ mox in molliem illam abeat, putrilagini præuiæ obque talia eò magis à vulgo in deliciis haberi solita. Vix Nonas Septembris attingunt, aut certè cum iis euanescent.

13. Lugdunensibus Poires Brachmarr dicta, mediocres sunt magnitudinis, longa, ventre circa medium protuberante, parte inferna quodammodo turbinata, aut certè minus sessili, tota lutea cute, pauca tamen aliquid habent rubedinis, carne constant satis odorata, dulci, tenera, in qua sunt quædam fibre lætez, & circa seminum loculos nonnihil granulosi. Matura sunt Iulio mense.

Pira Brach-
marriana.
Lugdun.

14. In Maslinster oppido, vbi prænobile Monialium sanum vel Abbatia, quam vocant, Pira habentur vulgò Genschenbirn / quasi Chirothecarum Pira dicas; fortè quod Chirothecarum odoratarum instar, ob elegantiam odorisque suauitatem manibus gestari tractarique soleant. Pediculo hærent vel ipso Piro longiori, circa quæ turbinata parte opposita, alia sessilia, alia in gibbum protuberantia. Tam altitudo, quàm latitudo lvarum ferè vnciarum. Ceterùm saturationi ac quodammodo sanguinea rubedine magna ex parte tincta, non sine granulosis punctis, odorata sapore grato cum quadam adstrictione. Augusti fructus est, sub cuius fine in mollescit: sed mox corrumpuntur ob carnis tenebritudinem.

Pira Chi-
rothecaria.

15. Meminimus iam suprà huius Piri ex Dalech. Ruellio & Curtio, qui posterior solus descriptionem posuit, Suspiciamus autem idem esse cum Bergamotus antè descriptis. Et sanè, si quod aliud Piri genus, hoc odoris fragrantia præcipua nariis placet. Mediocra sunt, rotunda ferè, tantillum turbinata, circa pediculum impressa & ferè umbilicata, cortice tenuissimo, stigmatis punctato, alioqui viridi, etiam si matura sint. Pediculo hærent vnciam longiore, satis firmo. Caro tenerissima, grata, succulenta, sapore quodam modo, muscatellino. Octob. medio gratissima, & cruda & cocta: verùm sub cineribus calidis tantum coquenda, alioqui gratiam amittere putantur. Menses Gallorum in agrum Montbelgardensem transplantata ferunt. Habentur etiam in horto E. C. Mense Martio etiam gelu etiam passa, erant adhuc bona. Surculos Epamandoduro & ex Lotharingia importatos in horto Montbelg. inferi curauimus.

Pira Ber-
gamota
Gallia.


16. Colmariensibus vulgò nota, Germ. Pfaffenbirn dicta, præcocia, Iulii principio maturescunt. Ex longo satisque gracili hæret petiolo. Ipsa verò inferiore parte sessilia, superiore turbinata duas vncias longa, totidem lata, vnâ parte maculis rubris eiusdemque coloris striis saturationibus intercurfantibus donata, altera luteola. suauissimè olent, & carne sunt præsuavi, dulci, ac molli: verùm circa seminum loculos aliquantulum acerosa. Fugaciæ. Nunc ducatus VVirttembergici & circa Fontem Admirabilem, locisque vicinis Pira celebramus.

Pira Regia Bollenfium.


Bönigobirn / id est, Regia Pira in agro Bollenfi Ducatus VVirtemb. dicta; fortè à gustus grata, parua globosa ferè, ex viridi rubentia, punctis notata. Magnitudinem figura exprimit. quemadmodum & sequentium ferè. Sept. 17. non-

HISTORIAE PLANTARVM

dum erant matu-
ra, sed dura valde
lapidosa. Intra o-
cto dies mature-
scunt, & breui
mollescunt. Oct.
25. adhuc bona &
sapida. Sed No-
uemb. fine mol-
lescere & fracida
esse incipiebant.




Pira Angelica.



Engelsbirn in Boll, parua sessilia, crassiora,
quam aluora: coloris obscuri, pallidi, & non ni-
hil inaequalia. Mollescunt facile, & cito facessunt.
Gustu sunt lapido. Medio Septembri adhuc inte-
gra.


Pira Brumalia.



Reiffacherbirn, quasi Brumalia, quodd non
prius maturescant. Minus sunt precedentibus
sessilia, lutea, alicubi rubentia cum punctis & a-
speritate quadam ad tactum. Durant usque ad
Ianuarius. Medio Septemb. gustu valde aspero,
intus lapidea. Sunt quaedam pictura maiora,
subrotunda. In VValde & in Zell. & in Blien-


spach etiam maxima obseruimus; ad tres vn-
cias alta, totidem crassa. Oct. 14. sapida, dulcia, &
quae cruda edi possent. Putamus idem quod Bas-
lez & Reinsfeld. Staffeln vocant. Durant
adhuc Ianuar. gustu dulci succulepto.

Pira Bohemica.



Böhemisch. Bohemica Pira, turbinata, ventrio-
sa, luteola, & albicantia, punctis notata. Matura
fine Aug. Sept. medio fracida, dulcia, sapida, odo-
rata, etiam sine feminibus, sapore aromatico ferè,
Sept. fine incipiunt mollescere.

Pira decerpta.



fracida, bona, & satis.

Brechbirn, quasi
decerpta dicas:
Parua, ex luteo ni-
tida, & altera par-
te rubore multo
perfusa, inferne
sessilia, superne
turbinata. Din du-
rant. Sept. 17. licet
semina nigra, car-
ne tamen dura
valde, sicca, sapore
aspero, non ingra-
to tamen. Oct. 17.
data in Boll lutea
iam erant, sed po-
stea licet, lapido-
sa. Montb. delata
Decemb. medio,


Pira Coriacea.

Ederbirn/Coriacea, in Boll, hand durabilis
nec admodum grata, nisi sint mollia, facile autem
mollescunt, Lutea vna parte, ab altera rubent.
18. Sept. gustu: quaedam mollescebant, austera ta-
men cum aliqua dulcedine, utique grata, gra-
nulosa. Montb. delata ad finem Nouemb. integra
adhuc.

Pira Leywarne dista.

Leywarnebirn in Boll. Figura ferè sunt ovali,
superne tamen magis turbinata: lutea, carne satis
solida, dulci. Septemb. 17. bona adhuc, necdum
mollia.

Pira La-

Pira Laterum.

Ziegelbirn/Pira laterum, à colore lateritio, & quod diu durent ita dicta, ad oualem accedunt figuram altera tamen parte magis turbinata, altera ferè sessili. Magnitudine variant, vti figuræ docent, maxima & minima exprimentes. Aiunt durare ad Oporan vsque Oct. 25. gustu adhuc austera. Montb. delata Ian. exeunte adhuc inuictæ duritiei. Aiunt durare vsque ad quadragesimam, nec edulia fieri priusquam nigrescant. In Kirchen etiam Winterbiren vocant, id est, hyemalia pira, & nomine prædicto.

Pira Picea globosa.

Pechfuglen (quasi piccos globos dicas) vocantur in Schierbach pago Vvirtemb. Globi figuram quam proximè æmulantur, interdum etiam nonnihil torosa: ex luteo virescentia, insigniter ab vna parte rubentia, punctis albicantibus multisque etiam striis rubentibus intercurrentibus. Montb. delata Ian. exeunte adhuc inuictæ duritiei. Aiunt durare vsque ad quadragesimam, nec edulia fieri priusquam nigrescant. In Kirchen etiam Winterbiren vocant, id est, hyemalia pira, & nomine prædicto.

*Pira Herilia.*

Berrenbiren/Herilia agustus fortè præstantia, in Boll, eadè cum *Speckbiren* formâ, sed media parte minora. Color quibusdam vni. formis, luteo. lus: aliis alterâ parte rubens, intercurrentibus striis. Caro mollis saporis aciduli, grati. Facile mollescunt. Matura Aug. fine. Integra adhuc Sept. 16. Fortè eadem quæ supra ex

Trago citauimus, qui & *Berrenbiren* & *Pfaffensbiren* id est, dominorum & sacphicorum Pira vocat, & ad superba Antiquorum refert. Sed quia non describitur, difficile est iudicare.

Pira Cydoniata.













51. Valida adeo his adstringendi vis, ut cruda comesta, praesertim à delicatioribus, eos in strangulationis periculum coniciant: quapropter cruda edi vix possunt, absque molestia. Optima tamen sunt cocta & exsiccata. Bollenles Sufelbiren vocant. Non diu durant. Sub finem Aug. maturescunt. Quidam vocant Mansbiren, id est, virilia Pira. Repentuntur & maiora, tum alibi, tum Basilex, ubi Kannenbiren, [quasi Canthari Pira dicuntur] vocantur, à figura. Ibidem in segmenta concidunt Oeconomiæ rei studiose matronæ, atque siccat vel torrefaciunt etiamque integra, & interdum in aliquot annos asseruant. Habentur enim hæc Pira torrefacta præ aliis optima. Tubingæ quoque proueniunt. Eleganti flauedine placent. An verò sint Strangulanea supra ex Curtio & Ruellio descripta, difficile indicare est. quodd figuram non doceant. Sed quia rubrum colorem in his commendant, fortè ab his diuersa, quæ omnia aut certè magna ex parte lutea sunt.

Sufelbiren.

Mansbiren.

Kannenbiren.

52. Pira acuminata.

Spitzbiren.



Pira Campanacea Montbelg.

Spitzbiren VVirttembergensibus, id est, Acuminata Pira, ex figura ratione vocata videntur. Etenim si quod aliud Piri genus, certè hoc ad Pyramidis figuram accedere, non obscurum. Lutea sunt, habentur & hac figura maiora. Præcocia sunt, & fugacia. Septemb. 17. mollescebant Caro a lioni sat tenera, lapida, dulcis.

Pira Campanacea Montbelg.

53. Sunt & nostris atque Burgundis sua Campanacea, à Campanis [Cordo dictis] Pitis, ut nobis quidem videtur diuersa, licet figura & nomine conueniant. Ille enim sua omnino flaua dicit & facile putrescere: nostra obsoleti coloris sunt, & ad aridorum foliorum, emicante tamen viridi, non parum accedentia. Diceret viridem ferrugineo conspersum. A pediculo longiusculo & parte turbinata ita in latum se pandunt, ut manifestum argumento nomen indepta videantur. Quinque vel sex uncias altitudine æquant, latitudine vix quatuor. Nec facile putrescunt hæc nostra, ut illa Cordi, sed diu durant, & demum mense Novembri edi inania: alioqui hyeme cocta fugacium vices supplere possunt, cum Certolinis vel Campanicis Ruellii. Leguntur ex hortis Montbelg. Principis, Septemb. fine, quo tempore, carne firma, non multum succosa, adstringente, cum quadam dulcedine, quæ omnia spectant longioris durationis. Poire cloche vulgè vocant.

Pira Cloche.

Pira curta. Stumpf.

54. In Than & Entzen Alsatia superioris oppidis, habentur Pira, quæ Stumpfing vocant, quasi, curta vel manca dicas: volam quædam imple, alia etiam minora sunt, aliquid commune habent cum opatis dictis Eysbiren, adeo carne sunt molli, dolci, atque suauis, verum non vtriusque turbinata sunt ut illa, sed ad pediculum

tantum, ut circa Pythmema lata & sessilia, rubentia, punctata, pediculo aliis breui, aliis longiusculo. Ex his maiora pauca aut nulla habent semina, quasi horum materia in Piri alimentum & incrementum esset absumpta.

55. Range Vacum Lotharingi Pirum vocant, nobis ab hortulano radicatam, speciosum magnitudine & figura, quatuor ad minus uncias altum, duabus lauius, turbinatum, sed turbine obtusiori, pediculo laterosum [quod peculiare huius Piri esse videtur] inserto, cortice scabro, dilute croceo, sed vna parte saturè rubro, ac quasi sanguineo. Carne firma, admodum est, succo dulci, odorato, subadstringente: Novembr. nondum edule, est enim hybernium Pirum diuque durans. Decembri gustu apta cocto, mollescebant, sapore & odore suauissimo, verum granosa lapillisve abundantia. In hort. Ill. E. Cels. V. V. Montb. inserta.

Rubra Pira.

56. Pira saccharina dicta, Zuckerbiren originatur Leoberge Silesiorum vrbe, in prædio sububanano, aspectu non inithendo, stris sanguineis cum virore aspersa. Pira Spectbiren dicta magnitudine referentia, arbore decerpta saporis paulo acerbioris, lapidosa, quatuor verò deinceps, vel quinque dierum spatio ita mitescunt, ut Sacchari instar commansa in ore liquecant, à sapore nomen indepta. Surculi alio translati in situone nulla traducuntur, quæ causa subit, vernitasne? an alia ratio ex Sole petenda? an verò prima plantatio artificiosa, naturalisve, in dubio est. Hoc genus Piri tradere videtur Schvvenckfeldius inter stirpes Silesiacas sine descriptione his verbis: Saccharapia Zuckerbiren.

Saccharina Pira.

In nomine sunt & alia multa apud Alsatos, ut Creuselbium Mallocomi, Pira Raparum [fortè à figura] Rübörn, & alia quæ nondum à nobis descripta sunt: item Schilbiren / Geiglebiren / Grammen oder Gschübiren / Flugbiren / Weißbiren / lingbiren &c.

Saccharia Pira.

Creuselbium Rübörn.

In Burgundis oris ferè hæc habentur, de quibus omnibus descriptos surculos etiam in hortum Montb. Ill. E. C. inseri curauimus, ut constet posteritati, potissimum Montbelgardiacæ, de nostra diligentia & inuandi studio. Nomina sunt hæc. Pira nigra, poires noires, Pira dicta de Rausel, optima cocta. 3. Pira S. Laurentii. 4. Pira Augusti mensis, poires d'August, ex Barmont arce Burgundica. 5. Pira Saccharina vindita: poires noires sucrées: ex Barmont. 6. Pira poma, poires pomes: ex Barmont: forte eadem cum Poma Pira. 7. Pira magna dicta d'arbe: ex Barmont. 8. Alia magna dicta, poires magnées: ex Barmont. 9. Pira hortensia, poires de hortel, ex Grange, arce Exc. Celsitud. VVirtemb. 10. Pira operaria, poires ouvrieres: ex Grange. 11. Pira Charie: ex Gr. 12. poires de Grammont: ex Gr. 13. Pira Germanica, poires d'Allemagne. 14. Pira Campanæ similia, poires comme doche. 15. Pira campanacea alia, poires de cloche, vtriusque ex Gr. forte alterutrum horum est id quod paulo ante descriptum. 16. Pira dicta poires de pament, quasi apparentia dicas ex Gr. 17. Pira strangulatoria, poires d'angisse, forte eadem cum antea descriptis. 18. Pira domini, poires Monsieur: ex Clareomles oppido Exc. Celsitud. delata ex Taramiso, & alia multa aliunde illata, præter supra descripta. Faxit Deus Opt. Max. ut posteritas admittendis istis illius operibus aliquando cum gratiarum actione stent.

Pira Burgundica. Varij generis in hortis translati.

Cur surculos longos in Pira cum

Sed satis iam satis Pirorum ostentationi indulgam, nec tamen omnia dicta: Ecquis enim possit

In tanta hominum institutionumque confusione: Hoc tantum volumus, ut Germani & opulentiam cum sit illis, Gallie (quas & ipsi aliquando suis partem locis vidimus, & gustauimus) atque Anglie Gazis cōsortemur, & curiosis ingenij, quibus anguli illustrium harum nationum hodie perstreperant, etiam hac in re satishat. Nunc ad reliqua pergamus.

Locus & Tempus. Satius Pirus auctore Theophrasti. pauca admodum in locis calidis, ut in Aegypto, & vitata ob temperamentum contrarietatem. Eadem in plano melior provenit eam materie, quam fructu. Loca specialia ex supradictis facis patent. In genere omnes laram solum amant. Gaudet iis Italia. Nihil frequentius Germaniz, Gallie, & præsertim Septentrionis plagis, Belgio, Northmanniz, Anglie, ubi Cidre & Pire admodum suaves potiones vini vicarias facit, ut annotat Lobelius. Florent mensibus Aprili & Maio: Aestate & Autumno fructus maturefcit. Quæ tardè floret, tardè fructificat, Pirus Trago ante Malum cum Ceraso plerumque & Pruno florem fert. Pirus etiam si non pluit, sed fiat Austrinum cælum, aut nubilum, amittit florem & primos fructus, si cum desolante tales dies fuerint, ex Theophrasti & Plinio. Item: quæ citò occidunt, velocia sunt, & tamen antecedunt diutius, ut Malus & Pirus. Magis apud Plin.

Tempus. Pirus non eodem tempore omnia seri iubet, quoniam non æquè florent. Eadem oblonga, aut secunda ab occasu [ab ortu Dal.] Vergilium ad brumam. Reliqua genere media hyeme, ab occasu Sagitte, Subolanum aut Septentrionem spectantia. Serendi vel inferendi tempus, & culturam habet apud Geoponicos, potissimum apud Carol. Stephanum, qui docet quomodo inferenda vetitius vel tardius proveniant, ut fructifera reddantur, & acquirant odorem, aliæque multa præclara. Communis quidem Italiz ratio serendis vel inferendis Pirus autumnum tribuit, ita ut brumam xv. nec minus diebus antecedant, ut tradit Phaulk. Et Scaliger Pirus & Malum Autumnopositis seri suadet, quod hybernas impressiones melius tolerare valeant, quam æstivas. Hæcque fortè ratio cur Pirus calidis regionibus, ut Aegypto malè habeat.

Denique Pirus, ut & Malus, in montibus brevis, nodosa, spinosaque: in planis amplior, pulchrior visu, meliorque tam materie, quam fructibus. In Calabria tamen, regione calidissima copiosum haberi Pirus vel ex Horatio discimus, ut dicetur infra. In historiis Indici legimus, in insula Palmæ ita proficere Pira, ut à sedecim ad triginta uncias ponderent: Eorundem etiam meminit Cædanius, sed quod genus Pitorum sit, non docent.

Vires & Virtus. Dioscoridi Pitorum genera omnia adstringunt. Quare compenienter adduntur Cataplasmatibus repellentibus. Decoctum siccatorum, & ipsa cruda, aluum sistunt: ieiunos tamen citata laxant. Quam sententiam & Plinius confirmat. Pitorum omnium, inquit, cibis etiam valentibus onerosum, ægris quoque vini modo negatur. Decocta eadem mirè salubria & grata, præcipuè Crustumina. Quæconque verò cum melle decocta, stomachum adiuvant. Funt Cataplasmata è Pitis, ad discutienda [leg. repellenda, ex Dioscor.] corporum vires: & decocto eorum ad duritias utuntur. Ipsa adterantur Boletis atque fungis, pellaneque pondere, & pugnante succo. Quod postea Dioscor. de Pitis sylvestribus scribit, (de quibus supra) quemadmodum & hac. Pitorum ligni

cinis contra fungos etiamnum efficacius proficit. Mala, Piraque portatui iumentis mirè grata sunt, vel paucæ. Remedio sunt esse, si prius edenda dentur aqua, aut utique ostendantur. Conduunt verò Pira, ut vix, ac totidem modis. Pitis ut & Pitis, proprietates vini, similiorque in ægris medentes cauent: Hæc Plin. Idem & Plutarchus refert, & Lucianus in Asino aureo. Quod verò de iumentis ait, consideret lector, an rationi & experientiz sit consentaneum: nisi forte dedè molesta sint, quæ ferant id, quæ fini nequeant, odorque identidem illicitea, etiam ad molestiam usque. Neque enim facile crediderimus odorem per se iis molestum.

Galenus Pira est stomacho grata sunt: quin & vim habent exiccandi: atque sylvestribus magis exiccandi vis inest. Quæ de Malis diximus, si omnia ad Pira & Punica transferantur, nihil nouo alio super his sermone opus est. Nam in iis quæque alia austera tantum, vel acerbæ apparent, veluti quædam acida, quædam dulcia, quædam denique ex horum mixture composita: sunt quæ nullam penitus huiusmodi qualitatem exuperantem habent: quo fit: ut eum aquea sint acerbæ, nulla roborandi vi polleant. Talis igitur omnino Pitorum usus, qualis Malorum. At Pitis, præsertimque grandibus, quæ apud nos Meniz vocantur, aliqua alendi facultas donata est. Proinde ea secula in tenues orbiculos, siccataque reponunt. Quibus coctis per hyemem & Ver, cum fames est, ciborum parum nutritium vice videntur. Et in libris simplicium: Piri folia, inquit, pariter ac turiones austera sunt: fructus dulcedinis quiddam obtinet aqueæ: ex quibus clara quoque temperies est, inæqualis secundum partes: Nam pars una terrea est, alia aquea, ceteram utraque frigida, tum alia temperata. Proinde Pira est stomacho grata sunt, & sitim prohibent. Illita autem desiccant, & modicè refrigerant. Nam ego us illis vulnus glutinasse memini.

Serapio ex Aben Mesuai. Proprietates Piri tam domestici quam sylvestris est, ut si coquatur quodcumque eorum cum fungis, emendent illorum malignitatem. Maioribus vis potior, quam parvis, magisque nutrit Pira quam Cydonia. Succus Pitorum inspissatus cohibet fluxus biliosos, & ventriculum sanat, sed colicam causare solet. Remedio est, si post, hauriatur vinum mellis paratum cum aromatis.

Albertus scribit Piri radicem à muliere portatam Conceptum impedire: Fructum idem posse, si iuxta, vel supra se habeat. Id etiam à nonnullis creditum, à latentibus in parturientis lecto Pitis, aut illuc transportatis, partum tardari, aut difficiliorem fieri. Sed hæc fabulis, quam experimentis sunt similes, quibus Alberti scripta scetera. Illud verò similis, quod sicuti Plinius ait: iis qui buprestem hauserint, prodesse Pitorum genus omne comedisse.

Sunt, inquit Curtius, qui absolute, primo ordine refrigerare Pira dicant, & secundo desiccare: alii verò matura calefacere, humectare & mungere. Quod sanè intelligendum erit ex saporum vi, ac natura, ut dulciora calefaciant. Quæ autem inter dulcorem & aciditatem naturæ sunt composita, parum caliditatis & siccitatis habent, ut omnium denique vires ex saporum generibus metiri sit. Ante cibum verò sumpta, ventrem sistunt, maxime cruda. Grana, quæ in illis sunt, peculiari quadam proprietate pulmonis viis medentur, sed renibus officiant.

Ligni vi
Pira iumentis
grata sunt

Stomacho
grata.
Pitis
qualitas

Stomacho

Folia

Stomacho

Pitis

Succus
Colica

Radis
Conceptus

Partum

Albertus
metiri

Pitis Pira
rum in sa-
pore metiri
de off.



hodie à nostris serui solent in cella vinaria, vel conclavi fornicato repositi. Diutius adiectuabis, si mutuo sibi non incumbant, ac se ne contingant quidem. Adhuc diutius si ex filo suspensi pendean. Alii statim lecta cum tenacibus suis pectus vrceis condiderunt, & onibus vasculorum gypso vel pice clausis, ipsa sub dio obruta sabulone tegunt, quem modum hodie quidam pro secreto habent. Alii Pira quæ se non contingere in melle seruantur. Aliqui aquam salisam cum ceperit vndare calfacta, despumant: & ei post iam frigida Pira seruanda demergunt: tunc exempta post tempus exiguum condunt vrceo, & eius lito ore custodiunt: vel diu nocturne in frigida salina melle pauntur, post in aqua pura biduo mactant, deinde sapa vel passo, vel dulci vino mactant. Sed Pira quæ huic negotio destinantur, ceteris diligentius electa integra debent esse, placido die, crescente luna, manu decerpta, vegeto Solis calore. Dura tunc & aliquantulum viridia vase claudantur, quod tegatur operculo: & in lecto d. orsum ore, breui obstruat serobe loco iuxta quem perennis aqua desinit. Item quæ dura sunt in carne & cute prius in aceruo posita, ubi se mollire ceperunt, in fictile pectus ponuntur, & operculo superueniente gypso linuntur: vas breui seroli demergitur, loco qui quotidie Sole tangatur. E. Plin. o. Nostris isto conseruationis apparatu non egent, sed serotina & hyemalia dicta, iam dicta ratione facile adseruant, ita ut quouis fere anni tempore haberi possint & soleant integra. At vel integra vel in segmenta concila & granis purgata Sole siccantur: vel si non sufficiat, in fumo, postquam exempti fuerint panes, deinde sacis aut calis excepta in sicco loco, ne fiant mucida, in annos etiam adseruant, non sine compendio economico.

Pira verò vel ante Columellæ tempora condite consuetum erat, ut ex eo patet sic scribente: Pira cum immatura, non tamen petrucla legeris, diligenter inspicito, ut sint integra, sine vitio aut vermiculo, tum in fictili pectus fideba componito, & aut passo, aut defruto completo, ita ut omne pomum submersum sit, operculo deinde imposito, gypso.

Illud in totum præcipiendum existimavi, nullum esse pomi genus, quod non possit melle seruari. Itaque cum sit hæc res salutaris ægrotantibus, censeo vel pauca poma Piræque in melle custodiri, sed separato generatim: nam si commisceas, alterum ab altero genere corrumpitur.

Qui plura de hac re, quemadmodum & de Piri cultu, in genere, & in specie volet, Consulat Columellam, Constantinum, Palladium, Petrum de Crescent. Conradum Herespach, & Carol. Stephanum, & Celerum in suo Diario economico. Vnicum illud Grataroli quondam Medici Basilienensis haud ignobilis experimentum addamus. Si, inquit, suspicio est ne vinum aqua dilutum sit, Piritum in vino imposueris indicabit: nam si supernatauerit, merum est vinum, si fundum petat, mixtum aqua est.

Memorabile est & illud, quod est apud Suet. de Claudio Cæsar. Drusium filium Pöpei impuberem amisisse Piro per lulum in subline factato, & hiatu oris excepto strangulatum. Nec prætereundum & illud quod de Vulpe traditur, eum Piritum, nisi carnis cibis defuerit, non edere, atque illud difficulter, & non nisi in fame. Vnde apud Plautum à Tranione dictum, idque adagialiter in Mustellaria.

Tam facile vinctus, quam Piritum vulpes comest.

In eos enim dicitur, qui rem perdifficilem aggrediuntur, ve annotat Curtius.

DE PIRASTRO SEV PIRO

SYLVESTRI.

Pirus Sylvestris minus procera fere est arbor, quam sativa: verum surculosa admodum & ramorum extremis spinosis, caudice rimoso, & huius cortice, materie rutila, & quam sativæ durior, ideoque discos & tabellas ex ea conficiunt, quoniam ut in molli retunditur, ita in duro ferrum auitur, ut scribit Theophrastus. Primum emergunt flores, instar umbellæ, ex eodem surculo multi, lanuginosis pediculis insidentes, quinque foliolis cinctantes, albis, rotundis, cochlearis modo concavis, inter quorum singula intercedit subiecti hirsuti umbilici radius, in viridi canescens: apices in medio multi, purpurei. Folia florentis arboris subulis & in ambitu cana lanugine obrita, foliorum Cotonei instar, supernè virentia, splendida: aliis utrinque glabra, lucida, subrotunda, crassiuscula. Fructus non vni formes, sed aliis rotundi & modice compressi, aliis ex rotundo leuiter turbinati & longiusculi, austeri & acerbi valde, nec edules, donec staccant, quod fere fit Octobri, semen intus continentes Pomorum seminibus simillimum. Extrema alioqui facie Piri speciem facile representat. Verum à radice statim numerosos emittit stolones valde spinosos, cortice rubicundo vestitos: Copia & rigiditate spinarum facile discernuntur à stolonibus Malorum sylvestrium.

Theophrasto Piraster, quam Achrada vocat, aculeos fert in ramis: facilius germinat, quam sativa: cum enim pluribus minoribusque internodiis diuidatur, principia illa germinandi agiliora, propensioraque ad germen, opera cæli ambientis redduntur. Nec non & siccitas non nihil cõferre videtur: sic namque humoris relinquitur. Quod autem minus est humidum, ad motum promptius: quapropter & germinatio sylvestrium citior, quemadmodum sativarum melior. Pirastro longior vita, quam Piro. Tardè admodum maturitatis est: prius amittit folia, quam fructum percoquat.

Resistit frigori propter densitatem. Domestica ex semine lata, viciatum oritur Pirastrum. Pirastrum autem Pirus fieri non potest. Cui postrema sententia contradicere videtur Scaliger, qui scribit Piritum sylvestrem è sylvis in hortos aut viridaria cultu miscere. Theophrasto subscribit Ruelius, Pirastrum, inquit, Piritum fieri prorsus reculare. Scaligero verò Porta Neapolitanus: Pirus, inquit, seris translata locis adhibito cultu deponit agrestem illum habitum simul cum aculeis, quos adulta tulisset, simulque & laxatur illa densitas, quæ verba ex Scaligero transcripsi: nec tamen omnia: nam addit Scal. quæ videtur in eius popularibus, vnde transportata fuit, ad naturam meliorem. Porro Pirastrum miscere duobus modis intelligi potest: vel insitione sativæ in sylvestrem, qua ratione ex sylvestri mitem fieri apud hortulanos translatum est: vel ex ipsa met arbore culta: absque insitione alterius, quod voluisse videtur Scaliger, de qua re amplius cogitandum.

Pirus sylvestris seu Piraster, ex Aristoteli, Nomi & Synonyma

Pira com-
munda mo-
dus.

Legendi
quædam.

Pira im-
matura
Pira-

Pira im-
matura
Pira-

A Pira
Strangula
Larus Dro-
pica.

An Pira-
ster mitis
sit.

Nomi &
Synonyma

Theophrasto & plerisque Graecis. Esti verò Dioscoridi *ἀχράς* species est *ἀχράς* vel *ἀχράς* *ἀχράς*, tamen Theophrastus multis in locis simpliciter *Πιράστρου* *Αχράδα* appellat. Cordus quoque *Αχράδα* vocabulo quemcunque *Πιράστρου* significari censet: sunt enim diuersae eius differentiae. Et tam *Πirus* arbor, quàm fructus *ἀχράς* est *Κορνάριον*. Dicitur & *ἀχράς* *Θ*, ut scribit Curtius: & Colum. aspera syluis *Αχράδος*, cuius etiam meminit Aristophanes. Quid autem *Αχράδες* *Ελιανο*, quas in cibo primùm *Τυρυνθίους* habuisse memorat, nondum compertum, [inquit Hermol.] Nisi quis non *Αχράδας* sed *Αχράδας*, hoc est, *Πira sylvestria* in eo legat. Nam, idem author inquit: ante *Πanis* usum *Αργίους* esitasse *Πira*, ut *Αθηνιenses* *Φίκος*: *Γάνδη* *Αρκαδίας*: *Ινδι* *Αρουνδινέ*: *Καρμάν* *Παμύλας*: *Μίλιον* *Σαρματῆ*: *Τερεβινθόν* *Ναύστύλον* *Περσῶν*. *Αχρά* certe *παλεὰ* significat: nec video quàm sit verisimile *παλεὰ* quemquam vesci potuisse, quasi veterinum, etiam si *Αχράδας* radicibus herbarum & arborum foliis recentibus ante glandis *Φαγινῶν* usum à *Πελαγῶ* traditum, victitasse creditur. Idem Herm. *Αχρόν* *Πirus* syluaticam, *Αχράδα* dicit, & apud quosdam, ut & apud se urbana fertiliorem prædicari. *Νικάνδρῳ* *Ἰατρῶν*, ut citat *Η. Ιουν.* quo nomine putatur usus fuisse *Virgilius* in 3. *Αeneid.*

Victum infelicem haccas, lapidibusque corna.

Ἀχράς Theocr. Schol. quomodo in *ἔχρη* pro sylvestri *Πiro* accipitur, apud eundem & apud Poetas quosdam alios, atque aded apud ipsum quoque Theophrastum, ut iam supra dictum. Had. Iun. in suo Nomenclatore mutato, in *Α* scribit dici. [nisi sit mendum scriptura, nam ita scriptum apud nullum alium inuenimus: dixerat tamen idem iam prius *ἀχράς*, ut hac ratione ipsum legisse haud vana sit coniectura] Aliis *ἔχρη*. Ita *ἔχρη*, *ἀχράς* *ἔχρη*, in Epigram. Graecorum. Vtraque vox *ἀχράς* *ἔχρη*, ut idem Theocr. annotat, hoc est, à suffocando. Vnde fortè nostrum *Angst*, & Latinorum *angustia*, qualis euenit iis, qui *Πira sylvestria* comedunt & strangulatoria. *Γορπίος* diceret vtramque vocem tractam à Germanico. Sic *Thra* *ϕυβύλος* cum deberet sententiam de re consulta suam dicere, à *Lacedaemoniorum* legatis munere corruptus, simulauit se *Πira sylvestria* comedisce, & præ angustia oris non posse loqui, ut refert *Zvingerus* in suo Theatro.

Nomina linguar. Germ. *Ein wilder birnbaum*, *wildebirn* / *holzbirn* & *stambirn* *Loniceto*. *Selbbirn* *Silesia*. Belg. *wildepeereboom* / *wildepeeren*. Gall. *Poirier sauvage*. Ital. *pero selvatico*. Hisp. *Guadapero*, à *Peruetan*. Angl. *wild pear tree*. *Chouffe pere tree* / *wory pear tree*.

Distributio Ex Diosc. verbis facile est colligere ipsum plures *Πiri sylvestris* species agnouisse, quando ei *ἀχράς* species tantum *ἀχράς* est. *Trago* *Πira sylvestria* varii generis sunt, inter quæ minutissima quæ dura & lapidosa sunt. Germ. *Geißbonen*.

Tab. *Πira sylu. trium generum facit*. 1. *Πira sylvestria* simpliciter, *holzbirn*. 2. *Πira sylu. maiora*, *großholzbirn*. 3. *Πira sylu. minima*, *kleinholzbirn* / *Geißbonen*.

Gerardus Anglus ita distinguit. 1. *Πirus* strangulatorium minus, *the small cheefe pear*. 2. *Πirus sylu. the wildebedge pear tree*. 3. *Πirus sylu. minima*, *the wilde ceab pear tree*. Cur autem tres figuras *Πirorum* satiuorum *Tabernamontani* ponerit inter sylvestres, & sex faciat, non indicata vel differentia, vel causa, ipsi excusandum relinquitur.

In *Silesia* quoque duo genera obseruata *Sch...*

feldio, maiora & minora. Apud nos *Montbelgardi* in syluis aliquot differentiae obseruantur, potissimum in fructibus conspicua, maiores, mediae, paruae, rotundae, turbinatae: pediculo longo & breuiori: sapore etiam differunt, quidam acerbiores, quidam magis edules.

Passim occurrunt in Germania, & locis circumiacentibus, praesertim in syluis, sepibus, & ad aruorum margines. Item in montosis. Neque his caret Gallia & Italia. Quin & in regione Graeciae *Απία* dicta nasci *Αχράδες*, vnde & *Απύ* vocentur, *Scaliger* scribit. Et ex Theophrasto, *Πirus* sylu. in calidis malè haberi, ut in *Αgypto*, ubi etiam mites *Πiri* & *Μαλί* nihilo melius. Nullam prorsus syluestrem ibi in *Πirorum* genere, quod germen nequeant emittere: mitem autem raram. In *Heluetia* montosis & asperis frequentes admodum sunt. Vix ante Octobrem fructum perficiunt. Florent cum ceteris, & plerumque etiam ante. *Diosc.* & *Plin.* tardissime eius fructum maturescere scribunt.

Πirus sylvestris auctore Theophrasto natura est terrena, acerba, solida. *Dioscor.* *Αχράς* sylvestris, vim *Πiro* satiuà adstringentiorē habet, & ad eadem conducit. Adstringunt & folia eius. Ligni verò ipsorum cinis efficacissime his auxiliatur, quoque fungi strangulant. Aiuunt Fungos, si syluestria *Πira* cum eis coquantur, innoxios fieri. *Πirus sylvestre*, inquit *Plin.* conciditur, suspensumque siccatur ad sistendam aluum, quod & decoctum eius potum praestat. Decoquantur & folia cum pomo ad eodem vsu. *Galeno* quoque *Πira sylvestria* magis, quàm reliqua adstringunt & desiccant: & proinde sanè maiora vulnera glutinant, fluxusque repellunt. Folia *Πiri sylvestris*, æquè ac domestici, ad vuluæ proidentias, aliæque mala vtilia sunt, notante *Trago*. *Πiraster*, teste *Curtio*, eadem cum *Πiro* satiuà vires habet, verum longè efficaciores. Fungi quoque innocentes tutioresque fient, si in *Πirastri* vel fructu vel folio cocti fuerint. Prostant etiam contra eodem *Πira* confestim sumpta, nec non etiam lixuria ex cinere eius arboris lacta, & cum sale, posca, vel nitro epota.

Sed eruditus atque in arte versatus hoc loco considerandum relinquitur, antequam sit vsus *Πirorum* sylu. cum Fungis, ut non noceant, vel ut nocumentum tollant. Nam quis credat ab iis venenatam qualitatem in Fungis malignis retundi? Imò censemus *Πira* eorumve folia, etiam cum salubribus fungis prorsus inutilia. Quippe Fungi cuiuscunque tandem generis sint, quod citius à natura deiciuntur & extra corpus pelluntur, ed salubrius, quum ventriculum grauent, aut lancinent vexentve, ac ut *Diosc.* ait, *ἀχράς* *ἀχράς* *ἀχράς*, omnes spiritus via quasi laqueo interclusa praefocant. At *Πira* & eorum folia, potissimum syluestrium, cum polleant adstrictione non parua, ac certè ne modica quidem, sed magna, superius ventriculi os coarctant, quominus per vomitum reici queant, similiter & aluum constringendo eorundem expulsionem difficiliorē reddunt, contra *Aph. Hippoc.* Quod natura vergit, eò ducere oportet. Atqui natura in iis, qui assumpserunt venenatos Fungos, vel etiam non venenatos copiosius, conatur eos per vomitum vel aluum roicere. Enimvero sanè si aliquis *Πirorum* syluestrium eorumve foliorum ad assumptos fungos vsus esse possit: hunc potissimum esse putamus in iis, qui fortè ab eorum esu in *ἀχράς* *ἀχράς* *ἀχράς* inciderint. Vomitum tamen praescribit, quem ipse quoque *Diosc.* praescribit, dicens: Confestim succur-

Locus & tempus.

vires. & vsus.

Folia. Ligni cinis.

Alui fluxus.

Vulua praesentia.

Πira filia. ad fungos nihil contra quatuordecim opinionum.





Lonic. re-
prehend.

Ornus.

Fraxinus
aucup.
Sorbus
sylu.
Sorbus
torm.H. Lugd.
montan.Dalech.
repreh.Sorbus rari-
or.Locus &
Tempus.Vites &
viti-
ad aucu-
pia.Adag. de
Sorbo.
Lignum.
Baccarum
tempor.

Verum non bene Fraxini loco posita. Nec quie-
quam nos farinacei aut puluerulenti obseruau-
imus in Sorbo aucuparia. Rectius ab altera par-
te candicantibus foliis nomen tractum putasset,
quod tamen nondum asserimus. Gesnero ornus,
grosser Albalum / Wiclâstb / vt ille interpreta-
tur, Ornus aucuparia. Eidem alibi, Fraxinus au-
cuparia qui & Sorbum aucup. Bellonii vocare so-
lebat. Lob. & Penz Sorbus sylu. alpina: Gall. Cor-
mer Sanguage. Cast. Dur. idem. Hist. Lugd. Sor-
bus Torminalis, sylvestris arbor à sequanis Tor-
migne nominatur, magna nonnunquam spectatur:
& addit, Plinium quartum hoc Sorborum genus
constituere. Et alio loco eidem: Sorbus sylu.

Matthiol. Torminalis vera. Atque sic, ne careret
multitudine, duas icones posuit unius arboris, &
quidem locis diuersis: nec videmus cur veram di-
cat Torminalem, & Plinii quartum genus: quan-
do quidem Plinius eam dicit foliis penè Platanis,
quo folio hæc, de qua & illa & nos agimus, mul-
tùm diuersa: vt suspicionem nobis iniiciat, ei nec
Platanum nec Sorbum Torminalem probè fuisse
cognitam. Clusio Sorbus aucuparia. Germ. Dor-
gelbeer / vel Nassbeer dicta. Vngaris Dorosbers
finye. Nec (addit idem) cur Dalechamp. Tormi-
nalem censeat, vllam video causam, cum eius
brbis baccis nemo Velcatur, sed folis Turdis aliis
que syluiculis auibis, Gallinagine præsertim ex-
petatur. Cæsalp. Sorbus sylu. in Alpibus, baccas
ferens rubentes, similes Sorbo Torminali. Cal-
ceolar. Sorbus racemosa. Camer. Sorbus aucu-
pialis: & aucuparia Thalio. Tabern. in Icon. Sor-
bus sylu. Wildsporn / Wildersperrverbaum:
Et in hist. Sorbus 2. sylu. Schvvencks. Sorbus
montana aucuparia. Eberschenbaum. In du-
caru V Virtemb. & circa Boll. vocant Adelsbeer /
& Sperbeeren: Quidam & Strinckbeer. In
Rhætia vocant Wielefsche. Burgundi, Agullon.


Crescit Vliginosis & opacis syluis, & in valli-
bus, & secus ripas torrentium, quibus maximè
locis gaudet. Thalio scribit passim in Marcynia
Saxonothoringica prouenire. Prouenit etiam in
altissimis montibus, vt in monte Baldo quem &
Fractum vocant autonibus Gesnero & Calceola-
rio. Floret Maio & Iunio. In Silesia quoque [vt
annotat Schvvencks.] arbor notissima, montibus
propria: vbi flos in Corymbis luto, fructus se-
quitur primùm viridis, deinde ruber, qui perfi-
citur Septembri. Colitur etiam Goppingæ in horto
Ill. E. C. V. Vitt. Iacobus Cargillus Medicus doctis-
simus & aliquando conuictor noster & amanu-
sis, testatur in Scotia in insigniter proceras arbo-
res adolefcere: baccas venales nonnunquam in
forum adferri. Prouenit etiam in montibus Alfa-
ticis, Burgundicis, in monte Salene, propè Ge-
neuam: circa fontes acidos Griesbachianos, in
& Münchenstein propè Basileam. Nostra cura etiam
plantata fuit in hortum Montb.

Aucupes Germani fructu eius auibis insidiant-
tur. Baccæ à Merulis, Turdis & eiusmodi auibis
hyeme magnoperè quaruntur: nos etiam baccas
eius inuenimus in ingluuie Attagenis [Baselbun
vocant] & Turdi visciuoni, quem Trosteln vocat,
itemque Merulæ, quæ Bergamsel dicitur. Sapor
tamen earum tam ingratus est, vt gustantem ca-
peret frontem cogant: vnde in morosos & qui-
bus frons nubila, diæterium vulgi apud Scotos, in-
gratiora esse quàm sint Sorbi aucupariæ baccæ,
vt referebat D. Cargillus. Aiunt lignum vtile ad
clauos, qui rotarum molarum alas retinent. Fal-
luntur, inquit Turnerus, Londinenses qui pro
corticibus Tamaricis, Sorbi dictæ Whidenree
Torm. I

corticibus vtuntur. Baccæ Matthiolo adstringunt,
siccant & repellunt, quæ per hyemem ad aucupia
asseruantur: ea enim Turdis gratissima sunt, vt
dictum. Villicis virgæ eius, quod solide robustæ-
que sint materiæ, pro stimulis bouum expetun-
tur.

DE SORBO TORMINALI, ET CRATÆ-
GO THEOPHRASTI.

CAP. VII.



Torminalis
autem Sor-
bus figurâ dif-
fert à vulgari si-
quidem folia, *Folia.*
sambuci aquati-
ca folia æmulâ-
tur: acutius ta-
men & argutius
incisa atque ser-
rata, pedis an-
serini formâ,
excurrente in
singulos angu-
los neruo, vtrius-
que penè gla-
bra, potissimum
autumno: appa-
rent tamen pilis
in pediculis vi-
cialibus & les-
quiuncialibus;

sapore subadstringente, interdum etiam in iis
quædam tubercula. Florum dispositio, quæ in *Flora.*
vulgari, ex pallido candidi, Cordo faracei, can-
didi quibus succrescunt fructus rotundi umbilica-
ti, quales Oxyacanthæ vulgaris, coloris ferrugi-
nei, punctulis albidis notati, cum sunt molles sa-
poris primùm austeri, tandem vbi mollescunt
acidulo, grato: in quibus callus vel crusta bina *Fructus.*
vel terna semina continens Piti seminibus simi-
lia, minora, penè triangula, coloris ferè castaneæ,
nonnihil subaustrera, medullâ albâ. Cortice te-
guntur rami spadiceo subluteo, adstringente,
amaricante: caudex verò albicante, læui: (Cor-
dus flavo cortice vestitam, & Piro æqualem ar-
borem dicit) Materies alba, durâque. Oculi im-
bricatas conorum scandulas æmulantur, rotundi *Semina.*
ferè, non acuti, vt in Sorbo Alpina. *Cortex.*

Hanc arborem quidam Crategum Theophras-
ti dicunt: quapropter quæ ad eius descriptio-
nem faciant, ex eo hic consignanda. Crategus in-
quit, quam & Cratægonâ vocant, folium habet
Mespili, (*μειλίαν*) nempe Aronix Dioscor. An-
thedonis Theophrast. [eius enim solum folia de-
scripsit Theophrast. non aliarum. Dal.] rigidum,
[*πικρὸν*: quam vocem & de Anthedonis folio v-
surpat] sed maius, latius, longius, eius modò
laciniatum: [legendum enim: *τὸ δὲ χαρὰν ἔχον*
ὑπερβαίνει: non verò *τὸ δὲ χαρὰν ἔχον* & c: vt
vulgati codices habent.] Arbor ipsa, haud valdè
procera, nec crassa. Materies vana, solida, flaua,
cortice recta læui, sicut Mespilus. Communiter
vnicam radicem in profundum agit. Fructum ha-
bet rotundum, magnitudine Corini [Athen. *κί-
νον*]: habet: vulgati codices, *κίνον*] qui matu-
rescens flavescit, [*κίονος γίνεται*, non vt Ath. *κίονος*]
& quodammodo nigrescit: (*κίονος γίνεται*) succo
F 2

Mesp. syl. & gustu, qualis Mespili. Vt proinde Mespilus syl-
uestris videri possit.

Nomina & synonyma, authorum-que sententia. Magna est authorum diuersitas de hac arbore aliquid scribentium, in nominibus. Theophrastum citans Athan. in mendosis exemplaribus *αράμυρος* habet. Est verò idem Theoph. *αράμυρος* vel *αράμυρος*, vti patet ex loco citato, Porro Sorbum de qua hic agimus Plin. quartum genus terminale appellat, remedio tantum probabile, assiduum prouentu, minimè nque pomò, arbore à reliquis Sorbis dissimili, foliis penè [planè alii.] Platani. Plinius [inquit Dal.] Sorbi syluestris, quam Aucupariam Herbarii vocant, Sequani verò lignatores *Tormignus*, & quæ vera Torminalis est, nulquam meminit: Cratægi verò folia cùm sortè vidisset, ea stric- tum & negligenter descripsit, Torminalisque Sorbi esse credidit, nunquam alibi facta Cratægi mentione, præterquam cap. 8. lib. 27. vbi Cratæ- gum, quem Cratægonon seu Cratægonon vocat, inconsideratè Aquifoliam [*ακισφύλλον*] Italo- rum esse tradit. Genus id Sorborum Androma- cho dictum, volunt *επισπινος* [vim cohibendi ha- bens] quamuis nonnulli legant *επισπινος* libr. 9. x^o *νίτρος* Gileni in curatione dysenteriz. Idq; à Plau- to significatum volunt in *Pœnulo*.

Genus 4. terminale

Tormignus

Plin. aut.

*Cratægo-
num*

*Adap. de
Sorbo.*

*Sorbus ter-
minalis.*

*Mespili ge-
nus.*

Sorbus syl.

*Tragum-
tatur.*

*Sorbus ter-
minalis.*

*Aquifolia
folio deci-
duo Plinij.
Epimelis.*

*Magale.
Rob. Corf.*

*Anamalis
Hipp.*

*Mespili ge-
nus.*

*Vnedo.
Plin. error.*

Corn. aut.

*Hem mibi iam video propter te visitandum Sor-
bils.*

Nempe Torminali: tormenta scilicet multa, & cruciatus esse perferendos. Quo etiam significatu vulgò Gall. *poires d'anguisses*, id est, Pira anxietatis dicunt.

Cordo *Sorbus terminalis*, qui addit Romana au- thoritate Plinium quartum statuere Sorbi genus, quod terminale vocat. Theoph. è Mespilorum ge- nere putat, nec immeritò: æmulatur folio veram Mespilum, proprio nomine eam *αράμυρος* Theo- phrast. appellat. Germ. *Elzenbaum*: fructus *Elz- becr*.

Trago in Hist. Germ. *Aresel* / *Eschröfel*, est, [Sorbus syluestris] wild *Sperwerbaum*, videli- cet quartum genus Torminale. Et in Hist. Lat. idem dicit, & Ruellium suæ sententiæ suffragari testatur. Ac meminit quidem Ruellius Sorbi Tor- minalis ex Veterum sententia, verum an hanc arborem, de qua hic agimus, vel aliam intellex- rit, nescimus, nec apparet ex loco à Trago cita- to.

Anguil. *αράμυρος*, Cratægi eadem planta est cum Sorbo Torminali Plinii. An Bellonio Sor- bus tormalis, quam Galli *Alisier*, nominant? So- lerius: Cratægi Theophrast. Prouincialibus *Ali- gner*, Delph. *Alisier*, est Plin. Aquifolia folio deci- duo. Cratægi Theoph. fructus dicitur à Diosc. E- pimelis. Idem Soler. putabat Sorbum tormali- lem Plin. esse Philyram feminam Theophr. ad- dens dici Delphinaubus *Terlier*, de qua postea Atheni verba de Cratægone sunt cap. de Cera- so, quia eandem existimauit cum Theoph. Ceraso. Rob. Const. dicit Cratægonem vulgò dici *Magale*: quam autem plantam intelligat eo nomine, nondum nobis constat. Vix putamus ipsum Ma- chaleb putasse. Gualth. *Hyff*. Epimelis, Vnedo: *αράμυρος*. Cornar. Mespili 2. genus & Epimelis Diosc. & Gal. cui & Vnedo dicitur. Galenum se- centus Paulus. Sed Plin. Vnedonem, quæ Gal. & Paulo Epimelis est, cum Memecylo Arbuti fru- ctu confundit. Gal. in glossis notat, Hipp. *αράμυρος* dixisse Epimelidas à Diosc. appellatas. Hipp. de morb. mul. *αράμυρος*. Verum Cornar. opinio- nes nobis non placent, ut apparebit suis locis.

Turneto Sorbus Torminalis Plin. folio Platani: Angl. est *setuisc tree*, quasi, dicas sorbus tree. Qui

rei herbariæ studiosi sunt, [vt scribit Bruer.] apud Gallos Lugdunenses Loton eam esse arborem existimant, quam vulgus Alysiæ cognomi- nat.

Matth. in Diosc. Sorbus syl. altera. Sorbus Tor- minalis Plin. non est [ait ille] Cratægi Theoph. vt existimant Anguillara: Cratægo folium Mespili prolixum, maius, latius, oblongius, nec ferra- tum: huic Sorbo ligni materies nec versicolor, nec valida, nec flaua, qualis Cratægo esse debet. Miramur verò apud quem Theophrastum vel al- lium quemuis authorem Matthiol. legerit Cratæ- gon.

Du Choul nascitur ad latera montis Pilati, *Treilly* vulgò dicta arbor, quam Tiliam feminam nonnulli vocant, alij Sorbum Torminalem, alij Loti speciem esse dicunt.

Gesnero Sorbus tormalis, in diuersis locis. Item in Cit. Pl. Vnedo Epimelidis fructus est, di- uersus à Memecylo Arbuti fructu.

Lonic. Sorbum tormalalem dictum putat: quia medetur torminibus, d³ *ist/das Grimmen* / vt ille ait: Verum lectori considerandum relinquimus, an intellexerit Lonicerus, quid sint tormina, quasi verò Colicæ medeantur Sorbo, & non potius Dy- senteriz. Cist. Dur. Sorbi syl. alia species. Dod. Sorbus syl. & Plin. tormalis. Lob. & Pen. Sor- bus tormalis, folio Aceris, vitis, aut Populi al- bz. Clus. Sorbus torm. Plin. & Herbariorum vul- gò, Germ. *Adlaaber*: Vngaris, *Barfocza* fa.

Hist. Lugd. Cratægi Theophr. Hypomelides Palladi quidam esse opinantur. Arborem hanc Cratægum esse Theophrasti non obscure quis existimauerit, etsi reclamante Matthiolo: oratio namque Theophrasti satis aptè exprimit plantam hic adpictam. Matthiolus Sorbum tormalalem esse putat, cui Plinii autoritas vtcunque fauere videtur. At Plinius hic dormitasse videri possit, nusquam enim is alibi neque Sorbi syl. quæ pro- culdubio tormalis est, meminit, neque Cratæ- gi, arboris vtriusque crebrè ab authoribus me- moratæ, præter quàm eo loco, in quo Theophra- sti Cratægum, quem Cratægonum siue Cratæ- gona [vti prius dictum] vocat, Aquifoliam esse Italorum perperam scribit. Quare facillè fuit Plinium pro Cratægo, Sorbum Torminalem no- minasse. Sed eadem Hist. Lugd. alio loco eiusdem arboris aliam figuram, & sic duas vnius, propo- nit, Sorbum syluestem siue Torminalem. Matth. & Cratægum Theoph. vocitans.

Cesalp. quoque Sorbum tormalalem ait videri esse Cratægum Theophr. folio Mespili, id est, *A- zardis* Italorum: & cum Mespilo magis conue- nire, quàm cum Sorbo, quod fructus ossiculum habeat.

Camerar. Sorbus tormalis siue Cratægus Theophr. vt peritissimi quique volunt. Goro- pius in Sorborum genere ait esse tormalia di- cta, quod torminibus siue Dysenteriz medean- tur.

Tabern. in Icon. Sorbum tormalalem: in Hist. Sorbum tormalalem tertiam vocat.

C. Bauh. subscribit iis qui Cratægum Theophr. dicunt. Basileæ & locis vicinis *Elshbirle*, alij *delobirle* vocant. Burgundi & Montbel. arborem *Anier* & *Aigretier* fructum verò *Anates*. Fert & Vi- scum, vbi obseruauimus.

Nascitur vt plurimum in locis montanis, solo pingui, aut interdum etiam saxoso, inter Fagos lo- cis syluestribus, quamuis in hortos transplantata nullo negotio proueniat. Plurima prouenit ad Hercyniam syluam, & circa Ienam autore Cordo, Frequens

*Lorus
Alysiæ*

*Anguil. re-
prehen-*

Matth. aut.

Tilia fem.

*Lorus. Sor-
b. torm.*

Vnedo.

Lonic. torm.

*Sorbus syl.
torm.*

*Hypomeli-
des Pallad.*

*Cratægum
esse Sorbū
torm.*

Matth. aut.

*Plin. vtr.
preh.*

*Hist. Lugd.
aut.*

*Mespilus
Azardis*

*Sorb. torm.
endo.*

Viscum

Sorbo.

*Locus &
tempus.*





Epimelis.
di epilum.
Zaror.
Epimelis.
Zaurum.
Nespilum
vulgare.
trā Monachis in Mesum, Mespilus Setania siue Epimelis est vulgare Nespilum, scilicet ut illi aunc, Mespilum italicum de quo Dioscor. Serapioni alia species Zaror, quam multi vocant Epimelidem. Hali Abbatis filio Zaurum vel Zarura citrinum, est vulgare Nespilum italicum. Per Nespilum in Italia, absolute intelligitur Nespilum vulgare. Anguil. Nespulo Setaneo & simpliciter Nespulo in Italia vulgarissimus.

Setania.
Epimelis.
Matthiolus: Nostrates Nespili non sunt Diosc. prima Nespilus. Quæ verò Mespili aliquibus Setaniz & Epimelides appellantur, vulgaribus nostratibus collata, nihil inter se dissentire compertuntur. Quapropter nihil mirum Dioscor. alterum hoc Mespili genus, copiose in Italia nasci. Verumtamen Galenum Epimelidis appellatione aliam arborescentem à nostratibus Mespilis diuersam fuisse, liquidò constat, quoniam lib. 6. simpl. scribit eius fructum acerbum esse, & ventriculo noxium. Epimelida autem à rusticis Italiz Vnedonem nominari. Hoc insuper illud confirmat, quod Gal. de utroque Mespilorum genere seorsum diuersis capitibus tradiderit. Hæc Matthiol. Nec tamen citat Galeni verba de secundo, nec vbi extet ille locus hætenus nobis constare potuit præter locum de Epimelide & Vnedone, olim pinxit Mespilum folio serrato: nunc non serratum pingit, quasi non utraque specie habeatur.

Penticoce.
Epimelis.
Gal. ut.
Nespilus
alba.
Amatus in Diosc. Mespilum secundum genus vniue, inquit, vulgatum est, Penticoceum dictum, Setaneum. Epimelis à Diosc. dicitur, quam Epimelis apud Gal. Vnedo sit fructus Comari. Io. Agric. Mespilus cum quinque lapidibus est fortassis secundum genus Mespili, Epimelis, & apud H. p. & Gal. Amamelides nuncupatum. Comarum & Memecylon Theophrasti, Galenus falso Epimelida vocat: Est enim Arbutus, de qua suo loco. Idem scribit in Corcopal India Prouincia Mespilum esse colore albo, Mali magnitudine, de quo nos cap. de Guaiava.

Sitanium.
Dodon. Mespilus 2. Græcè *ἐπιμήλις*, eademque Diosc. quibusdam *Σιτανίον*, Sitanium aut Setanium: Maior species Gallicè *Nesfle cultivée*: Brabantis *poten Nesplen*, *usarian* Theoph. eidem. Sub Mespili voce haud alterius quam Tricocci meminit: atque Sitanion Theophr. conuenire cum Mespilo vulgari.

Goropius in Vertumno. Mespila nostratia eo sunt sapore ut non vnum tantum sed complura etiam edere soleamus.

Lob. & Pen. Mespilus Diosc. de qua cecinit Politianus:

Regum imitator coronas Mespila, &c.

Item Mespilus domestica iisdem, edit. Belgica, ac utrobique folio non serrato pingunt, sicut & Camer. qui & *επιμήλις* & *καταύριον* dici ait, & eam, quæ maioribus est fructibus, Gallicam.

Mesp. Gal.
lica.
Cæsalpinus verò aliam plantam Gallicam facit, in ceteris cum Dod. consentit, sicut & Clus. & alii. Quidam tamen cautiore Mespilum nostratem seu vulgarem appellare maluerunt, metuentes fortè ne quid temerè in re dubia pronunciarent.

Mespilus
serrato fo-
lio.
Epimelis.
C. Baub. Mespilum folio serrato cum hoc titulo ad nos misit. Sorbus ex qua Epimelis: Epimelis Galeni, Mespilus 2. Diosc. Vnedo rusticorum Itolorum. Idem in Animaduers. in Hist. Lugd. Mespilum Setaniam statuere nostram esse vulgarem, cui folia nonnihil per ambitum serrata tribuit. Tragus tamen minimè serrata dicit: & sanè Germanica serratis foliis non est. Quare Matthiolan maioribus icon. Trag. Lob. & Dod. foliis integris

pingunt. At in epitome sua exhibet Matth. foliis serratis qualem & nos in Italia collegimus. Dal. ab his dissentit, qui vulgarem Mespilum existimant Setaniam siue Epimelidem Diosc. folia ait non habere Mali similia, nec minora, qualia Epimelidis esse dicit Diosc. quin potius Lauro similia, & foliis Mali maiora, fructum non rotundum esse, ut Epimelidis, sed oblongum, infernè graciliorem, supernè latiore siue turbinatum, ex rufo liuescere. Ex vnica autem lacunosi umbilici nota in Mespilo nostrate valdè perspicua, quam etiam Epimelidi Dioscorides assignat, inductos fuisse Herbarios, verisimile esse, ut crederent Epimelidem esse. Epimelis autem siue Setanios Diosc. & Gal. siue Mespilus Anthenoides Theophr. alia est arbor Dalech. de qua post. Clus. contrè asserit, vulgarem nostram Mespilum esse Diosc. Epimelidem, quam & *επιμήλιον* appellari ait.

Lubet subnectere quæ olim Manardus de Mespilo vulgè vocata scripsit. Pomum id, inquit, continetur sub secundo Mespili genere, Setanion & Epimelis vocato: de quo fortè ait Theoph. Setania fructum grandiolem, candidiorem, lignumque intus mollius habentem, &c. Mespilum nostram magnitudine ita superat Azarolum, ut ad iusti Mali crassitudinem aliquando accedat: colorèque est, si non plenè candido, ad candorem tamen plus quàm Azarolum deuergente, maturum facilius soluitur, ut suctu etiam ab edentulis succus eius possit forberi: lignum intus mollius.

Martellus Hermolaum carpit, quod *επιμήλις* Martellus *μαλακώτερον*, acinos molliore ligno conuerterit, *not.* quum *επιμήλις* nucleum, non acinum significet. Sed Hermol. taxari in hoc non potest, nisi pariter & *επιμήλις* Plin. accusetur, qui lib. 15. c. 20. eisdem omnino verbis locum illum Theoph. in suam transcripsit historiam.

Avic. lib. 2. cap. 153. Zarur siue Alzarur secundum genus vocari à Græcis dicit Tefelinon & Sentalium pro Setanio & Epimelide, facere capitis dolorem & esse malum stomacho: quæ ratione carent, bonis Authoribus aduersantur, nec experimento comprobantur. Ea enim quæ adstringunt, quum vapores deprimunt, caput potius iuuant, & villa adstringente ventriculum roborant. Causa erroris Avic. fuisse putat Monar. quod Comari vel Arbuti fructum, rem quidem à Mespili utroque genere diuersam, nomine verò similem [nam & ipsa Epimelis à Galen. & Paulo dicta est] cum Mespilo confundit. Cur verò Comarum siue Arbutum Manardus effigie quoque cum utroque Mespili genere similem dicat, non videmus: nobis plurimùm differre videtur. Illud etiam considerandum an Gal. & Paul. non malè Epimelidis nomen applicuerint Comaro. [si modo idem esse voluerint: nondum enim planè constat nobis.] Et cur non potius secuti sint Dioscoridem. Quo etiam loco Paulus meminerit Setaneæ, si id non fiat lib. 7. sub Epimelide, sub litera E. nondum inuenimus. Idem dicimus de Galeno à quo Paulus desumpsit. Ut aperte quod sentimus exponamus. Existimamus sanè cum Cordo, Epimelidi siue Setaneæ, nescio quā incuriā attribui vires quibus caret, nempe Arbuti siue Comari, quæ fortè melius Latine dicta Vnedo à Plin. quàm Mespilus Setaneæ, ut quidam volunt. Non propterea excusamus Avic. qui perpendere debebat vires Mespili Setaneæ siue Epimelidis. Illud addimus, si Comarus à Gal. & Paulo Epimelis dicta est, ut vult Manardus, ad quid illa repetitio in utroque, vnius plantæ duobus locis, nempe sub K. & sub E. Paulus quoque non magis quàm Avic. excusari potest. Apud Gal. fortè itre-

Gal. scripsit









superius virente, fimbria alba, latitudine & proportionem quam icon repræsentat, quæ & vitæque folii faciem ostendit, cum costæ diuisurâ.

Diligens Philatros D. Ioan. Henricus Frolich. Basil. anno 1608. duo mihi folia obtulit. Vnum magnitudine nostræ iconis, cum pediculo longitudinis vnciæ vnius & semis. Alterum in omnibus erat multò maius.

Periti considerent, quantum à modò descripta differat, planta ab Hon. Bello ex Creta missa Clusio, quam sic describit: pulcherrimus frutex, cuius semina etiam mitto, ad duorum cubitorum altitudinem assurgit, in orbem diffunditur, perpetuòque viret. Folia habet longa, rotundiucula tamen instar foliorum Mali, firmiora, latissimè virentia superne, inferius verò alba quadam lanugine obducta, ut argentea videantur, cauliculos albos, lanuginosos, quos folia utrinque ambiunt, in quorumque extremitate flores cernuntur specie thyrsi, ut in Saponaria vulgari dispositi, sed figura Cyani, colore phæniceo, calyce tamen longiore quàm Cyani, squammato, albo & rubro colore prædito. Flores in pappos resoluuntur. Semen longius quàm Cymini, calicèque sunt perennes. In altissimis præcipitiis inter saxa prouenit. Quo nomine autem vocetur, nondum se scire potuisset ait.

DE DIOSPYRO.

CAP. XVI.

Descriptio **P**luchere est frutex, & qui multos à radice statim stolones edat, homine etiam proceriores, eosque ramosos, cortice intectos spadiceo. **Folia.** Folia primo pullulatu ex oculis plura simul proueniunt, incanâ lanugine subtus pubescentia, superne viridia, quæ adultiora decussa, penitus utrinque glabra sunt, Piri foliis similia, magnitudine varia, vnciam aut sesquicentiam longa, latitudine semunciali, aut etiam plusquam vnciali, per extremum rotunda, circumquaque crenata, pulchris frequentioribus nervulis obliquis à medio recto donata. Flores inter lanuginosorum foliorum rudimenta oriuntur plures iuncti, candidi, è quinque foliolis longiusculis compositi, in odori ferè: quos hæc excipiunt violacei vel nigri coloris, umbilicæ, quinque laciniis coronatæ, sapore dulci, suavi, in quibus semina plura [dena aut interdum plura Clus.] oblonga, nigricantia, Pitorû seminibus similia.

Synonyma **An Ficus Idæa Theophrasti?** Quam sic describit: Ficus Idæa fruticosa est, nec proceræ sed crassa, ut vel cubiti spatium in ambitu habeant fruticantes rami, ligno contorto, lento, inferius læui, enodi, superius in orbem comolo, colore tam folii, quàm corticis liuido, figurâ foliis Tiliæ simili, molli, latòque, magnitudine pari. Flos Mespili, & cum Mespilo floret. Fructus quem Ficum vocant, rubet, magnitudine Oliuæ, sed rotundior, gustu Mespili. Crassas agit radices, ut Ficus urbana, lentâque: Arbor hæc non putret, cui cor solidum, & absque medulla. Hæc ille.

Ficus Alexandr. Flos & fructus satis accedunt. Folia potissimum difficultatem iniiciunt. At docti norunt, Theophrastum plerâque sua ex relatu aliorum de plantis prodidisse: ut tantò facilius cum ratione coniectantibus venia sit danda. Non enim statuiamus, sed considerandum relinquimus Doctioribus.

Conferant etiam periti adductam Theophrasti.

Tom. I.

descriptionem cum Sorbo Alpina, de qua superius traditum.

Athen. Ficus Idæa meminit ex Theophrasti de Ficorum generibus loquens: Idæa inquit, rubet, oliuæ magnitudine, rotundior tantum, sapore Mespili, Alexandrinam hancibi vocant (at hoc Theophrasti non de Ficu, sed de Lauro) crassitudine cubitali ramosam, materie validam, lentam, sine lacte (hoc de suo addit) cortice viridi (at *χρῶμα τι φαιὸν πάλιν* esse dicit) folio Tiliæ, sed molli. Profectò (inquit Scal.) vanos mortales. Nihil Ficus obtinet, non colorem, non folium, non fructum. Flores hæc: non floret Ficus: postremo lignum dissimile tum constitutione, tum natura. Bellon. Agriomelea: in Creta fert parua Poma, Pitis similia: in Gallia reperitur tantum in rupibus Fontainebleau, Regiz arcis dictæ. Gesl. Diospyros eruditorum circa Rixarium lacum Pira S. Ioannis: Bernenses Flübiren: Videtur ad Sorborum aut Mespilorum genus pertinere. Sic describit: Arbutula foliis semè Rosæ, venosis, fructu rubente, umbilicato, magnitudine & figura Cerasi, per maturitatem ad subcæruleum primum, deinde nigrum colorem tendente, floribus albis. Cubitos alta quatuor aut quinque: quanquam etiam octo cubitos proceræ inueniuntur, trunco non crassiori baculo. Idem alibi: Sorbis etiam cognata videtur Diospyros, si fructum respicias, nam foliis plurimum differt. Et alibi specie & figura omnino vitis Idææ dicit, aded ut vel Lotus Alpina dici mereatur. A Germanico Flübirle / etiam Pyrastrum Idæam, vel petram vocare poterimus. Et rursus alibi: Fruticem quem Chamæmispilum nomino, Itali, ni fallor, Pirum Ceruinam (vulgò Peto Ceruino) vocant: ut ex ramulo quem Aldron ad me misit faciliè concipio, etsi Bellonius cum apud me Chamæmispilum hæc videret, similem potius Piro Ceruinæ, quam eandem existimabat. Nascitur & Italorum Pirus ceruina in Alpibus. Bellon. Chamæpirum nominabat, quam vocem non probo. Chamæpion potius dixerim. Verum existimamus Gesnerum tunc cum suam describeret Chamæmispilum, quæ eadem facimus cum Cotoneastro (ut iam diximus in præcedentibus) non dislinxisse bene Diospyron quorundam, seu Pirum ceruinam, à suo Chamæmispilo: & rectè monitum fuisse à Bellonio. Erroris causam diximus cap. de Cotoneastro. Et alibi: [in epist. ut præcedentia pluraque.] Quem Itali fruticem Pirum ceruinum vocant, ego quia antiquum nomen non inuenio, Myrtomelidem, aut Petromelidè tantisper nominabo: Idem scribit Diospyron in Creta Codimalon, Bernensibus Flübirle, Tigrinis Wildfüttenen dici. Sed posterius hoc nomen, quod cotoneam syluestrem sonat, nequiquam probamus, quod nec folia, nec florem fructumve similem habeat Cotoneæ. An verò sit Codimalon Cretensium, nos latet: & tamen non esse existimauerimus. Si considerentur Bellonii verba, sortè apparebit non esse. Neque iis assentiri possumus, qui Diospyron Theophrasti faciunt. Bacca sunt potius Myrto similes, quàm Ceraso, umbilicatæ: nec durum continent nucleum, quæ duo requirit Theophr. in sua Diospyro.

Cum essemus Parauli, Nobilis Botanicus Cotusius appellabat Vitum Idæam Anguillaz. Quiddam circa Lugdunum Meleques vocant. Ben. Aretius, Pyrastrum. Lob. & Pena Amelanchier Galloprovinciæ montanæ: An eadem Alifler Gallorum sit dubitant. Amelanchos vulgò, quasi mel-leas dici baccas, propter saporem. Amelanchies

Agrymonia

Diospyros

Pira S. Ioan.

Sorbi generis

Descriptio

Gesl.

Diospyros

Lotus Alpina

Pyrastrum

Idæa

Chamæmispilum

Pirus Ceruina

Idæa

Chamæpion

Chamæpion

Idæa

Gesl.

Pirus Ceruina

Idæa

Myrtomelide

Petromelide

Codimalon

Idæa

Gesl.

reprob.

Diospyros

non est.

Amelanchier

Idæa

Amelanchies

Aucula- Lingua Gettorum. Dalech. Atheni *αμυγδαλίς* & *ε-*
Hamame- *μυρτιάς*. Myrtomelis Cordo. Etiam Allobrogum
id. vulgus *Aux archier*, perinde ac si *μυρτιάς*, id est,
Hamamelis. Melleum pomum dicere vellet, aut Hamamelida:
Alphitome- Nantuatenfes, *Manternier*, quæ vox ex Alaterno
id. videtur esse deprauata, cum tamen Alaternus ef-
Al. vernus. se non possit. Non est vt quidam autumant [Lob.
Lob. 17. & Pen.] Gallorum *Alifler*. Vitis Idæa. Clus. Tertia
Pen. reprob. [inquit] ab Italis vitis Idæa. Theophr. censetur.
Vitis Idæa. Rustici montani Austriaci *fliegenber* vocant,
aut quoddam muscæ eius Gntum ob dulcedinem ap-
petant, aut quoddam neglecta ab arboribus, muscis in
pabulum cedat. Simlerus *Flüßrlin*, hoc est, Pi-
rum petreum, nisi fallor, appellat. Idem Clusius ait
Gesnerum huic in epistolis varia tribuere nomi-
na, [si modò hanc intelligat] quam paulò antè
diximus. In post. H. A. addit Clus. Dalechampium
Epimelidem vocare, ac Cotonastrum Gesneri
esse putare. Deinde alio loco *αμυγδαλίς* seu *ομυγ-*
αίς Athen. eundem Dalech. dicit. Sed in eo fallitur
Clus. quando Cotonastrum Dalech. eundem cen-
set cum sua Vite Idæa. quando quidem duæ sunt
diuersæ plantæ.

Differen- Gesnerus duas species dicit, vnam foliis obtu-
iz. sis: alteram acuminatis: cuius diligenter succe-
scens Dalech. duas figuras potuit: vnam latiore, al-
teram angustiore folio, quamuis reuera variatio
tantùm sit eiusdem speciei, vt nobis quidem vi-
detur.

Locus & Locis montanis, præruptis & saxosis potissi-
tempus. mùm gaudet. Nec vllus est locus paulò asperior
montanz Galloprovinciæ, cui desit huius fructus
prouentus. Sic Helueticis, Austriacis, Sabaudicis
ac Burgundicis, aliisque montosis variarum re-
gionum locis prouenire solet. Floret Maio aut
etiam Aprili. Fructum maturat Iunio & Iulio
mensibus. Speciatim perelegans prouenit ad sa-
cellum quoddam, vix binis Basilea distans leucis,
in viuo saxo exsculptum, quod *zu vnserer frayven*
im Stein vocant, in rupe proxima. Eam ali-
quando delatam ex monte iuxta Oppidum &
Castellum Claræ Vallis, in hortum transplanta-
uimus, sed curam respuebat: Gesnerus quoque
euulsam in horto plantare frustra se conatum
scribit. E semine aut tenellula aliqua plantula in
locum suæ naturæ competentem, fortè melius
proueniret.

Vitis & fac. Suavis est eius fructus. & ita aptus stomacho, vt
Stomachus. qui copiosè etiam ingesserit, non grauetur, vt
testatur Gesnerus. Iam suprà dictum sapore esse
dulci, & propemodum melleo. Virgis in scopas
vinetis vtuntur, ad areas verrandas, authore Lo-
belio.

Scopa.

MALVS PVNICA.



Punica Ma- Descript.
lus in iustā
etiam arborem
excrefcit, ramis
tenuibus angu-
losis brachiata,
quos armant
spinæ rigide ali-
quot, cortex ob-
ducit rubescens:
in his folia in-
condita, Myrti
vulgaris æmula,
vel etiam maio-
ra, non ita acu-
ta, ex viridi in
leuem quādam
rubedinem ver-
gentia, auersā
parte nervosa,
odore graui,
præsertim si ma-
nibus contrectata
naribus admoueantur. Ex ra-
morum lateribus flores emicant puniceæ, quin-
que foliis constantes, quorum medium occupant
complura stamina Cytho insidentia, siue calyci,
qui puniceo etiam colore fulget, vnciā longior,
corticofus, in plures lacinias mucronatas facies-
cēs, quæ umbilicum postea pomi succedentis co-
ronant. Est autem Pomo magnitudo varia, omni-
ferè ampla, & maximis ferè Malis æqualis, ro-
tunda ferè, nisi quoddam vtrinque leuiter compressa.
Cortex mediocriter crassus, duriusculus, fragilis
tamen, ante maturitatem viridis ac lauis, post pu-
niceus & rugosus, qui tandem etiam ad spadiceum
accedit, intus luteus, gustu adstringens, nu-
merosis acinis plenus, vino abundanti ebriis dul-
ci aliàs, aliàs acido, interdum medio, sauiorum
modo dispositis, carnosissimis membranisque disse-
pimentis seu parietibus intergerinis circumsc-
ptis, amaris, modò candidis: modò purpurascen-
tibus: ipsis verò granis gygartorum vitis simili-
bus, quæ constant ligneo cortice & nucleo ama-
ro, non tamen sine adstrictione. Alii hortus
Stutgardianus Punicam, flore quidem illam mul-
tiplicato, sed longè minùs densò quàm sint Ba-
laustia, à quibus & cyrinus dispescit longus, vt
Punicæ iam descriptæ, quemadmodum & apices, quibus
Balaustia carere videntur.

Malus Punicæ Theophrasto non benè proue-
nit semine, sed ex virga, quin & cultura vno cau-
dice, cæteris abscissis feliciter adolescit. Auctu-
facilis est: Innocentissima arbor, quia paucam nec
numerolam agit radicem, paucòque eget nutri-
mento, citò senescit: rigationes tamen amat, &
vmbra. Caudice est breui atque contorto, me-
dullā carnosa, ramis aculeatis, foliis angustis. Fa-
cilè annuat flores, quod tenui ac debili petiolo
appenti sint: supra debilitatem fertilissima arbor
est: inulta tamen sustinet, nec *παρὰ* tantum, sed
& *πρὸς* tantum, discissionem inquam, & fissionem. Mu-
lulatione durior redditur. Fructum fert, ex liquo-
re & cortice constantem: semina congesta, puta-
mine inclusa: succo acido, aliàs dulci. Flos huic
foli Puniceus, fructui insidens. Ex dulcibus aci-
nis vilis prodit, [legendum enim *ἐκ γλαυκῆς*, non
γλαυκῆς: non enim glaucis acinis reperitur, vt &
Czsalp. annotat] ex enucleatis dura, & plerum-
que acida. Huic frigus non nocet: dulcescunt suil-
lo ster.

DE MALO PVNICA.

CAP. XVII.

Dicta sunt Mali & Piri genera vulgata, & his
adfinitate vel specie vel natura iunctæ ar-
bores: ordinis nostri ratio flagitat, vt reliqua
Mala persequamur, transitu facto ad Malum Pu-
nicam, inter notam & ignotam ferè mediam, do-
nec ordine quodam succedant exotica & ipsa Po-
mi nomine comprehensa. Nam & doctissimus
Czsalp. Punicam partim cum Malis, partim cum Ci-
tro conuenire scribit.

Theoph. scilicet
tenuis de
malo Puni-
ca.

lo stercore. Punica Aegypti & Ciliciz mutato solo meliora redduntur: Euadunt enim altera dulces & vinosae, altera sine nucleo, magnoque acino apud Pitarum annum fructificant.

Porro ut & de dignitate huius arboris aliquid dicamus, fuit olim Malum Punicum in sacris Hebraeorum ceremoniis, lege etiam plurimum honoratum. Nam sacerdos sacrum tabernaculum ingressurus, vestem gestabat, in cuius imo margine, atque per ambitum alternatim Mala Punica, & tintinnabula pendebant, non sine mystica ratione, uti nos docuerunt sacri interpretes. Fuit etiam apud Ethnicos in illorum diuinis percelebre. Celebre fuit & eo ipso Hæreum templum insula Euboeæ, in quo Iunonis simulacrum ex auro & ebore, Polycteti arte factum, altera manu Punicum, leopetum altera gestabat: quam Punicis gestatorem Pausanias leopetorem dicit, quàm ut vilius sermone explicari debeat, Istoris quoque per se ipse estimationis vel apud ipsos etiam Reges fuisse docetur. Darius rex, cum ingens Punicum gestaret, rogatus, cuiusnam rei granorum illius numerum desideraret, respondit tot Zopyros, hoc est, tot viros probos, qualis fuit Zopyrus Dario familiarissimus, quantum hanc historiam paullo aliter recitet Herodotus. Eserus, inquit, Darius mala Punica, simul ac primum Malum aperuit, à fratre Artabano percunctatus, nunquid tantumdem hominum sibi optaret, quantum illic acinorum esset: respondit, sed malle tot sibi fore Megabylos, quàm Granatam subditam. Is enim eius exercitus dux fuit. Milonem Crotoniatem ferunt inter ea, quæ fortitudinis egregia facinora peregit, malum Punicum manu sua continuisse, ut nec ullo conatu eripere permiserit, nec ponum ipsum premendo collum sit, quod tamen amissam, quæ eo colludentem nullo negotio fecisse perhibent: æquidem non possit amori.

Nota est Græcorum fabula, quæ Iupiter Cereri à Plutone rapta, restitutionem promiserat, sed ea lege ac omne, ut si nihil apud Inferos illa degustasset: sed huiusmodi conditionis haud recepta, tribus (ut Ovid. ait in 4. Fastor.) vel septentis (ut idem ait in 4. Metam.) Punici granis ieiunium soluerat. Hoc autem detexit Alcæphus Orphnes & Acherontis, vel, ut alii volunt, Stygis filius quare in Auen Bubonem mutatus. Ad multas autem matris querelas, illi postremum indulgentum est, ut sex menses cum illa esset, totidem cum viro Plutone. Sed id non sine quadam mythologica ratione fictum, ut ab a pleraque Græcorum signenta. Proserpina enim ipsa, Luna est, quæ toto anno sex mensibus crescit, sex etiam deficit: videbatur ut per singulos menses quindecim diebus crescens apud superos, apud inferos autem deficiens esse videretur. Sed cur Punicum malum introducit potius præ aliis? An quia acini eius, quam minimam nutriendos, ieiunio tamē ceterorum ciborum ferendo sufficere queant, saltem ad tempus: ita laudatissimum probamus morem Italorum, suis ægotantibus, quibus quidem ieiunium prodesse possit, ut aliud vulgentium præscribentis, quàm Punici acinorum cum aqua solutorum, vel eorum tantum liquorem, quo simul ac famem & sitim ægotantis solant, atque aded causæ morbisæ, calidæ quidem alterando, frigida & crassa, incidendo, attenuando, & nutrimenti defectu, consumendo resiliant.

Non referemus hic fabulam ex Arnobio, quomodo ex Agdestis virili membro se priuantis est.

Tom. I.

fluente multo sanguine, quem terra exhibet, nata sit arbor mali Punice cum Pomis, quæ cum Natæ legisset, ac in sumpo posuisset, conceperit Avum, si credere fas est. Nos utiliora sectamur, & quæ ad Punici naturam declarandam propius accedant.

Punica malus à Theophrasto. & Dioscor. vel ut alii malunt: quibusdam & iuxta. Flores autem Punici cortex à Dioscor. & Malcorium Latinis. Sylvestris Punice flos, Bar. ad idem. Ba. laustium Lat. de quo postea. Arbor ipsa dicitur & Sida nonnullis: ad idem dicit Hipp. Alibi tamen sicut phloxem habet. Nicandro quoque Sida dicitur.

Ipsam verò Malum à Carthagine, ubi laudatissimum proveniat, nomen accepisse volunt: à granis verò quæ intus continentur, Granatum, quamvis alii Granata etiam à regione Hispaniæ dicta velant, alii ab urbe Granata: sed malè, inquit Lacuna, ab ea urbe Granata dicta putantur, in cuius sinibus pauca proveniunt: ut videant quid faciat, qui temerè ex mera conjectura de sibi ignotis & peregrinis tradunt vel docuerunt. Ut tamen dicamus obiter: potuisset & sicut sola bonitas, non multitudo, nomini originem dedisse à loco, si modò talia ibi nascerentur quod obferuent diligentiores. Sed quid iuvat nominis originem aliunde expiscari, cum umberrima suppetat in ipso Pomo, & iam ante Catonis & Varronis tempora ita inde fuerit nuncupatum? Nempe Granatum à granorum sacro dictum putamus.

Rhodia & Apyena mala Thales in lib. qui est de aeris inferibatur, ut refert Stobæus. Boetius autem Sida. Nam & Sida terra Boetica dicitur. Quo argumento Athenienses ab Epaminonda in Sida regionis quæstione victi memorantur. Nempe referente Atheno, orta inter eos contentione, quid Sidam appellarent: Epaminondas à dextra protinus conditum depromens malum sciscitatur quonam modo malum hoc vocitarent: responderunt Rhodiam. Sed nos, inquit, Sidam. In eo tractu, de quo fuit contentio, plurima sunt Mali Punice, indeque pricipio nomen est inditum. Sic Epaminondas causam obtinuit. Pro Sidas tamen aliqui Sidam legunt: Sic Athenienses regionum fines appellabant. Epaminondas ita causam obtinuit. Sida verò Dioscori est mali Puniceorum, & putamen. Ad idem Boetius quoque Punicea Sidas nominari idem Athen. scribit. Est & Rhodion, exiguum Punicum apud eundem. Empedocles Obligosa vocabat: immo & sicut ea voce maturitatem indicans. Nam nisi frigus, Solis feruidam vim, humidam & imbecillam reddiderit, eius fructum haud commodè concoqui tradunt. Et Theophrast. hanc arbores melius ac celerius sortum suum in umbra maturare prodidit: & sicut ea voce quidam volunt, à florida & virida vi: alii à crasso de quoniam non est disputandi locus. Geoponici alias Mala Granata alias Punica Mala vocant.

Plinius quibusque Punicam Malum quibusdam Granatum appellari scribit. Quæ posterior sanè appellatio hodie frequentior est, tam apud vulgus, quàm apud officinas, atque in ipsis aded Practicorum libris. Quas ambas tamen indifferenter usurpant Herbarii. Punicum tamen frequenter appellantes. Notandum verò apud Theophrast. ubi agit de Sida [quam Dalechamp. Nymphaem putat] eiusque caput Malo Punice confect, semina verò dissimilia dicit, pro nō sicut legendum esse nō sicut, non sicut, in Gaza

At alii Punica ea sanguine nata.

Nomina & Synonyma. Malum Punica.

Granatum

Rhodia Apyena Sida.

Rhodia

Obliqua

Hypopitum

Granatum

Theophr. loci restituit.

Gaza

HISTORIAE PLANTARVM:

Auctores. Lingua Gettorum Dalech. Atheni *μυρμελιδες* & *μυρμελιδες*. Myrtomelis Cordo. Etiam Allobrogum vulgus *Ame Aubier*, perinde ac si *μυρμελιδες*, id est, Melleum pomum dicere vellet, aut Hamamelida: Nantuatenses, *Mancernier*, quæ vox ex Alaterno videtur esse deprauata, cum tamen Alaternus esse non possit. Non est ut quidam autumant [Lob. & Pen.] Gallorum *Alisier*. Vitis Idæa. Clus. Tertia [inquit] ab Italis vitis Idæa Theophr. censetur. Rustici montani Austriaci *Fliegenber* vocant, aut quoddam muscæ eius fructum ob dulcedinem appetant, aut quoddam neglecta ab auiibus, muscis in pabulum cedat. Simlerus *Flüßbirn*, hoc est, Pirum petreum, nisi fallor, appellat. Idem Clusius ait Gesnerum huic in epistolis varia tribuere nomina, [si modò hanc intelligat] quam paulò antè diximus. In post. Hist. addit Clus. Dalecham pium Epimelidem vocare, ac Cotonastrum Gesneri esse putare. Deinde alio loco *μυρμελιδες* seu *Ομυρμελιδες* Athen. eiusdem Dalech. dicit. Sed in eo fallitur Clus. quando Cotonastrum Dalech. eundem censet cum sua Vite Idæa, quandoquidem duæ sunt diuersæ plantæ.

**Differen-
tiaz.** Gesnerus duas species dicit, vnâ foliis obtusis: alterâ acuminatis: cuius diligentia succrescens Dalech. duas figuras posuit: vnâ latiore, alterâ angustiore folio, quamuis reuera variatio tantùm sit eiusdem speciei, vt nobis quidem videtur.

**Locus &
tempus.** Locis montanis, præruptis & saxosis potissimum gaudet. Nec vllus est locus paulò asperior montanæ Galloprovinciæ, cui desit huius fructicis prouentus. Sic Helueticis, Austriacis, Sabaudicis ac Burgundicis, aliisque montosis variarum regionum locis prouenire solet. Floret Maio aut etiam Aprili. Fructum maturat Iunio & Iulio mensibus. Speciatim perelegans prouenit ad sacellum quoddam, vix binis Basilea distans leucis, in viuo saxo exsculptum, quod *Zu vnsferer frassen* im Stein vocant, in rupe proxima, Eam aliquando delatam ex monte iuxta Oppidum & Castellum Claræ Vallis, in hortum transplantauimus, sed curam respuebat: Gesnerus quoque eundem in horto plantare frustra se conatum scribit. In semine aut renellula aliqua plantula in locum suæ naturæ competentem, fortè melius proueniret.

**usus & fac.
Stomachus.** Saporis est eius fructus, & ita aptus stomacho, vt qui copiosè etiam ingesserit, non grauetur, vt testatur Gesnerus. Iam supradictum sapore esse dulci, & propemodum melleo. Virgis in scopas vinetis vtuntur, ad arcas verrandas, auctore Lobelio.

MALVS PYNICA.



Punica Ma- Descript.
lus in iustâ etiam arborem excreuit, ramis tenuibus angulosis brachiata, quos armant spinæ rigide aliquot, cortex obduci rubescens: in his folia in- Polia
condita, Myrti vulgaris æmula, vel etiam maiora, non ita acuta, ex viridi in leuem quâdam rubedinem vergentia, auersâ parte nervosa, odore graui, præterum si ma-

nibus contrectata nanibus admoueantur. Ex ramorum lateribus flores emicant punicei, quin- Flores
que foliis constantes, quorum medium occupant complura stamina Cytino insidentia, siue calyci, qui puniceo etiam colore fulget, vicia longior, corticosus, in plures lacinias mucronatas facies, quæ umbilicum postea pomi succedentis coronant. Est autem Pomo magnitudo varia, omni ferè ampla, & maximis ferè Malis æqualis, rotunda ferè, nisi quoddam vtrinque leuiter compressa. Cortex mediocriter crassus, duriusculus, fragilis tamen, ante maturitatem viridis ac leuis, post puniceus & rugosus, qui tandem etiam ad spadiceum accedit, intus luteus, gustu adstringens, numerosis acinis plenus, vino abundanti ebriis dulci alius, aliis acido, interdum medio, sauiorum Sapor
modo dispositis, carnosissimis membranisque dispimentis ceu paneibus intergerinis circumscriptis, amaris, modò candidis: modò purpurascens Gramen
tibus: ipsis verò granis gygartorum vitis similibus, quæ constant ligneo cortice & nucleo amaro, non tamen sine adstrictione. Alit hortus Stutgardianus Punicam, flore quidem illam multiplicato, sed longè minus densa quàm sint Balaustia, à quibus & cytinus dissepit longus, vt Punicæ iam descriptæ, quemadmodum & apices, quibus Balaustia carere videntur.

Malus Pynica Theophrasto non benè pronunciat semine, sed ex virga, quin & cultura vno caudice, cæteris abscissis feliciter adolefcit. Auctu facilius est: Innocentissima arbor, quia paucam nec numerosam agit radicem, paucòque eget nutrimento, citè senescit: rigationes tamen amat, & umbras. Caudice est breui atque contorto, medulla carnosâ, ramis aculeatis, foliis angustis. Facile amittit flores, quoddam ac debili petiolo appensi sint: supra debilitatem fertilissima arbor est: inulta tamen sustinet, nec tamul tantum, sed & diuisionem, discissionem inquam, & fissionem. Mutatione durior redditur. Fructum fert, ex liquore & cortice constantem: semina congesta, putamine inclusa: succo acido, aliis dulci. Flos huic foli Pyniceus, fructui infidens. Ex dulcibus acinis vilis prodit, [legendam enim in γλαυκῶν, non γλαυκῶν: non enim glaucis acinis reperitur, vt & Cæsalp. annotat] ex enucleatis dura, & plerumque acida. Huic frigus non nocet: dulcescunt folio ster-

DE MALO PYNICA.

CAP. XVII.

Dicta sunt Mali & Piri genera vulgata, & his ad finitatem vel specie vel natura iunctæ arbores: ordinis nostri ratio flagitat, vt reliqua Mala persequamur, transitu facto ad Malum Punicam, inter notam & ignotam ferè mediam, donec ordine quodam succedant exotica & ipsa Pomi nomine comprehensa. Nam & doctissimus Cæsalp. Pynica partim cum Malis, partim cum Citro conuenire scribit.

lo steterit. Punica Aegypti & Ciliciz mutato solo meliora redduntur: Euadunt enim altera dulces & vinosae, altera sine nucleo, magnoque acino apud Pitarum amnem fructificant.

Porro ut & de dignitate huius arboris aliquid dicamus, fuit olim Malum Punicum in sacris Hebraeorum ceremoniis, lege etiam plurimum honoratum. Nam sacerdos sacrum tabernaculum ingressurus, vestem gestabat, in cuius imo margine, atque per ambitum alternatim Mala Punica, & tintinnabula pendebant, non sine mystica ratione, uti nos docuerunt sacri interpretes. Fuit etiam apud Ethnicos in illorum diuinis percelebre. Celebratum fuit & eo ipso Harteum templum insula Euboeae, in quo Iunonis simulacrum ex auro & ebore, Polydecti auctoritatem, altera manu Punicum, sceptrum altera gestabat: quam Punicis gestationem Paulinas secretorem dicit, quam ut vilius sermone explicari debeat, Historiis quoque praecipue estimationis vel apud ipsos etiam Reges fuisse docetur. Darius rex, cum ingens Punicum gestaret, rogatus, cuiusnam rei granorum illius numerum desideraret, respondit tot Zopyros, hoc est, tot viros probos, qualis fuit Zopyrus Dario familiarissimus, quamvis hanc historiam paulo aliter recitet Herodotus. Eserus, inquit, Darius mala Punica, simul ac primum Malum aperuit, a fratre Artabano percunctatus, nunquid tantumdem hominum sibi optaret quantum illic acinorum esset: respondit, sed malle tot sibi fore Megabylos, quam Graecam subditam. Is enim eius exercitus dux fuit. Melonem Crotoniatem ferunt inter ea, quae fortitudinis egregia facinora peregit, malum Punicum manuata continuisse, ut nec ullo conatu eripere permiserit, nec pomum ipsum premendo collum sit: quod tamen amissam capite eo colludentem nullo negotio secisse perhibent: quicquid enim non possit amor?

Nota est Graecorum fabula, quae Iupiter Cereri & Plutone raptae, restitutionem promiserat, sed ea lege ac omine, ut si nihil apud Inferos illa degustasset: sed huiusmodi conditionis haud reperta, tribus (ut Ouid. ait in 4. Fastor.) vel septenis (ut idem ait in 5. Metam.) Punici granis ieiunium soluerat. Hoc autem detexit Alcibiades Orphines & Acherontis, vel, ut alii volunt, Scygis filius quare in Auein Bubonem mutatus. Ad multas autem matris querelas, illi postremo indulgentum est, ut sex menses cum illa esset, totidem cum viro Plutone. Sed id non sine quadam mythologica ratione fictum, ut ab a pleraque Graecorum signimenta. Proserpina enim ipsa, Luna est, quae toto anno sex mensibus crescit, sex etiam deficit: videlicet ut per singulos menses quindecim diebus crescens apud superos, apud inferos autem deficiens esse videatur. Sed cum Punicum malum introducit potius praeter alia: An quia acini eius, quamminimam nutriendos, ieiunio tamen ceterorum ciborum ferendo sufficere queant, saltem ad tempus ita laudatissimum probamus morem Italorum, suis agrotantibus, quibus quidem ieiunium prodesse possit, vix aliud vulgentium praescribentia, quam Punici acinorum cum aqua solutorum, vel eorum tantum liquorem, quo simulacram & sitim egrotantis fallant, atque adeo causae morbosae, calidae quidem alterando, frigidae & crassae, incidendo, attenuando, & nutrimenti defectu, consumendo resistant.

Non referemus hic fabulam ex Arnobio, quomodo ex Agdestis virili membro se priuantis est.

Tom. I.

fluente multo sanguine, quem terra bibit, nata sit arbor mali Punice cum Pomis, quae cum Natia legisset, ac in signum repositisset, conceperit Atum, si credere sit est. Nos utiliora sectamur, & quae ad Punici naturam declarandam propius accedant.

Punica malus sive Theophrasto. & Dioscori, vel ut alii malum sive quibusdam & sive. Flores Punice. Pomi cortex sive Dioscori & Malicorium Latinis. Sylvestris Punice flos, sive autem eadem. Balustium Lat. de quo postea. Arbor ipsa dicitur & sive nonnullis: sive autem sive dicit Hipp. Alibi tamen sive sive habet. Nicandro quoque sive dicitur.

Ipsam vero Malum à Carthagine, ubi laudatissimum proueniat, nomen accepisse volunt: à granis vero quae intus continentur, Granatum, quamuis alii Granata etiam à regione Hispaniae dicta velint, alii ab urbe Granata: sed male, inquit Lacuna, ab ea urbe Granata dicta putantur, in cuius finibus pauca proueniunt: ut videant quid faciat, qui temere & ex mera coniectura de sibi ignotis & peregrinis tradunt vel docuerunt. Ut tamen dicamus obiter: potuisset & fructus sola bonitas, non multitudo, nomen originem dedisse à loco, si modo talia tibi nascerentur quod obseruent diligentiores. Sed quid iuvat nominis originem aliunde expiscari, cum vmberrima suppetat in ipso Pomo, & iam ante Catonis & Varronis tempora ita inde fuerit nuncupatum? Nempe Granatum à granorum sive dictum putamus.

Rhoia & Apyena insula Thales in libro qui de insulis inscribitur, ut refert Stobaeus. Boetius autem Sida. Nam & Sida extra Boetica dicitur. Quo argumento Athenienses ab Epaminonda in Sida regionis questione victi memorantur. Nempe referente Athenaeo, orta inter eos contentione, quid Sidam appellarent: Epaminondas à dextra protinus conditum depromens malum sciscitatus quoniam modo malum hoc vocitarent: responderunt Rhoam. Sed non, inquit, Sidam. In eo tractu, de quo fuit contentio, plurima sunt Mali Punice, indeque principio nomen est inditum. Sic Epaminondas causam obtinuit. Pro Sidas tamen aliqui Sidam legunt: Sic Athenienses regionum fines appellabant. Epaminondas ita causam suam obtinuit. Sive vero Dioscori est mali Punice eorum, & putamen. sive Boetius quoque Punice Sidas nominari idem Athen. scribit. Est & Rhoidion, exiguum Punicum apud eundem. Empedocles Obisgonia vocabat: sive sive: tardam ea voce maturitatem indicans. Nam nisi frigus, Solis seruidam vim, humidam & imbecillam reddiderit, eius fructum haud commodè concoqui tradunt. Et Theophrast. hanc arborem melius ac celerius sortum suum in umbra maturare prodidit: sive sive vero dicta quidam volunt, à florida & vinida vi: alii à cortice crasso de quodam non est disputandi locus. Geoponici alias Mala Granata alias Punica Mala vocant.

Plinius quoque Punicam Malum quibusdam Granatum appellari scribit. Quae posterior sane appellatio hodie frequentior est, tam apud vulgus, quam apud officinas, atque in ipsis adeo Praedictorum libris. Quas ambas tamen indifferenter vsurpant Herbarii. Punicum tamen frequenter appellantes. Notandum vero apud Theophrast. ubi agit de Sida [quam Dalechamp. Nymphaeam putat] eiusque caput Malo Punice confert, semina vero dissimilia dicit, pro non sive legendum esse sive sive, non sive sive, in Gaza

Malum Punice ex sanguine nata.

Nomina & Synonyma. Malum Punice.

Granatum.

Rhoia, Apyena, Sida.

Rhoia.

Obisgonia.

Hypophloea.

Granatum.

Theophrast. loci restituit.

Gaza.

legit. Lectionem illam Athen. insinuat, atque ipse adeo verborum sensus, rei que natura. Nam totum quidem Sidæ caput Malo Punico simile dicit Theophr. grana vero intus conclusa mali Punici granis distincta: quidam etiam Malogranata vocant.

Hebraeis *Rimon*, teste Trago. Chaldeis *Rimmona*. Arab. & Serap. *Kuman*: sunt tamen quidam prauatē scriptum putent pro *Ruman*. Alii utrumque ponunt, & *Ruman* quoque pro eodem. G. Graenbaum / *Granat* apud Mariæ Magdalēnensē opffel Belg. *Granat* apud pelbodin, *Granat* appell. G. P. *Pomme de grenade*, *grenadier*, *Pomme de grenade* & *Algrana*. Ital. *Pomi granato*, *melagrano*, *granata*. Hisp. *Granada*, *granada* *Romanus*, Castil. *granada*, *Catalina*, *Portug.* *Roman*.

Sed opere pretium est etiam partes eius paulo speciosius explicari, quod plerumque vltus in Medicina sit maximus.

Sunt qui primum arboris germen erumpens Rhicinum vocitent.

Folium Apuleius ampullaceum dixit, forte quod sit quasi calathi effigie.

Plerisque authoribus situm flos, Cytinus dicitur, in cuius capite & ambitu futurum pomum iam tum continetur, & quasi conceptus acinorum, & factus ad maturitatem clauditur sic Græcis dictus: *cytinus* enim illis sinus, venter vel cavitās est.

Aurelianus Cytinum Ampullagium vocat, ab ampulla tamen line quadam, quæ lectio magis probatur, quàm quæ alio loco extat, Ambulacium, auctore H. Iunio, Sylvestris florem, *exanthema*, Balustium esse voluit, potissimum Diosc. & alii.

Plinius verò ab his dissentiens primum Pomi partem, cum iam florere incipit Cytinum vocat, tam sativæ, quàm sylvestris. In ipso verò Cytino ante, quàm Malum ipsum prodeat, Balautia vocat. Alii ut Columella & Apuleius balautia: alii Balanthium vocant, eadem caducum, ex Græco extorquentes, ut annotat Curtius. Sed & suam opinionem habet Cordus. Nam postquam Dioscor. nomina & significationes proposuisset: nos [inquit] arbitramur alio modo differre. Cytini sunt Punice tenelli fructus, qui statim post flores decidunt. Quod Diosc. scribit Cytinum florere, intelligimus de parte quæ fructus rudimentum est. Hæc etiam Balautia nomine in Pharmacopoliis cognoscitur. Balautium verò est flos sylvestris Punice, qui decidit sponte, quoniam inter pediculum & floris folia non habet caput, ex quo fructus fiunt. Tales abortivi flores in multis arboribus & herbis videntur, præsertim in cucurbita & cucumeratis. Possunt tam in sylvestri quàm Sativa Punice & Cytini & Balautia nasci. Hæc Cordus apud Diosc.

In historia verò suoblitus, eandem cum Dioscor. cantat cantilenam: *scilicet* flores Balautia: Sativæ Cytinos dici affirmans. Et sanè multas Malis Puniceas vidimus in diuersis regionibus, tam sativas, quàm sylvestres, nunquam tamen animaduertere potuimus diuersos flores, hoc est deciduos & non deciduos in eadem arbore, cucurbitarum modo, nec etiam ferentes Balautia. Si is vidit Balautia in Sativa Punice nasci, cur non indicat? scimus quidem Plinium citra distinctionem tam sylvestris quàm sativæ florem Balautium vocare, atque ita etiam indiscriminatim ipsas etiam Officinas Balautia nominare atque usurpare, quippe quibus Cytinorum appellatio de

Cytinorum flore sit incognita: sed an verè ac distinctè illud dicatur, de eo ambigitur: in qua tamen te potius Dioscoridem sequendum arbitramur.

Cortex siue putamen mali punice Dioscor. & Græci *Sidon*, vel *Sidon* in plurali Galeno: Plinius & cum secuti sunt Latini, atque adeo officinæ, Malicorium, quod vulgus ex eo corium parare nouit: ob id Malicorium Medicis dictum putat Plinius: Immo inquit Dalec. quod Mali putamen & tanquam corium sit cortice durius, nucis inuolucro tenerius: quin & corrupto ex Græco nomine Psidia, & cortex Psidæ passim iisdem officinis dicitur: sunt tamen qui putent Arab. Psidias dici: potuit & ab his corrupti vox Græca: cautiorebus cortex granatorum, *psidia* & *psidia* *Nicandro*: aliis ut lo. Agricola *psidia*, vel *psidia* *Marcellus* Med. caliculos Punici vocat.

Sunt & Acini & granarubra, in quibus succus, quem vinum Granatorum vocant, quorum nuclei Acini semina Celso, *psidia* Diosc. Acini tunicæ Varroni.

Membrana acinos discriminans Cicus vel Cicum Varroni. Capitula Mali Punici Celso Cytinos vocauit lib. 5. in descriptione emplastri Rhypodis. Nec illud tagendum Cytinum Dioscoridi etiam impropiè dici Hioscyami: propriè enim tantum mali Punice est.

Mali Punice summæ & generalissimæ differentia, *Mista*, vel sativa, & *agrestis*: & tertio ea quæ *Balaustia* sive iudem sylvestris. Agrestem illam vocamus, quæ passim sua sponte fructu in sepibus Narbonensibus, spinosior sativa. De Balaustifera agerur postea. Minus alia *quædam* Athen. dicta, seu durum nucleum continen: alia *quædam* cui vel nulli, vel certè quàm minimi, & vix effatè digni nuclei: utrumque genus agnoscit Theophrastus & Plinius. Sclerococca sapore distinguuntur & magnitudine, suntque vel dulcia, vel vinosa Theophrasto: Dioscoridi, dulcia, acida, & vinosa: Galeno dulcia, acida & austera. His plura adiecit Plin. & quinque facit species: dulcia, acida, [austera Galeno] mista, acida, vinosa, quæ tamen tria genera facit ad tria Diosc. possint reduci. Recentiores uia quoque tantum celebrant præter *quædam* dicta, Sapore quoque distincta, dulcia, vinosa, & quæ Muza, quali *muza*: Et Montpelianum hodie Mezanis vocant. Perperam verò apud Plin. lib. 2. c. 6. nouem esse genera scribitur, cum hoc nuppiam apud vllum authorem extet. Ergo ex eodem, pro nouem, vox quinque substituenda, vel sanè utraque omittenda.

Nostro hoc tempore Galli Prouinciales & Narbonenses dulcia celebrant, acida, & acido dulcia quæ nos vinosa putamus Diosc. Hæc vulgò *Viani* vocat Hetturia, quæque alibi *Ghani*, & alibi *di Mezo* sapore Italico idiomate appellantur.

Sed & magnitudine distinguuntur: dulcia enim sunt multo maiora & speciosiora, teste Lacuna. Quin & Casalp. dulcia ut plurimum esse grandiora scribit, & granis maioribus, *quædam* vocat Theophr. qualia proueniunt apud Pinarum amnem. Quibus verò parvus nucleus inest, his natura protinus vnam & vinum, non equidem multum aperuit.

Perhibentur etiam dulcia ceteris magis scabro esse cortice. Sativa & Egyptia distinguuntur Erythrococcis & Leucococcis, auctore Plinio. Magis enim placet hæc lectio, quàm illa, Erythrococcis & Leucococcis, quàm tamen plerique secuti sunt, excepto doctissimo Dalechamio. Ut sen-

Correa
Sidon
Malicorium
Psidia
Cortex psidia

Cortex granatorum
Psidia
Nicandro
Marcellus

Cicus vel Cicum

Differentia

Plin. lib. 2. c. 6.

Viani

Callioco

Erythrococcus
Leucococcus
Plin. lib. 2. c. 6.
Erythrococcus
Leucococcus

his sic Samiorum & Aegyptiorum Punica alia rutilis esse granis, alia candidantibus vel albis.

Athen. Punica sic distinguit: Ex Punicis grana sunt alia dura, alia tenella & molliuscula, quae Apyrena vocant, quorum & Aristoph. meminit in *Agricolis*, & in *Nauphysiente*. Apyrena Plinius dulcia dicit lib. 13. At in 13. *apryna* vocat, non quidem dulcia, sed quibus blandiores sunt acini, natura candidiore, minusque amaris distincti membranis: talia fieri ait Celiciana, mutato solo, qui eiusdem mutatione dulcia in acida, & vicissim, haec in illa transmutari scribit. Seneca autem apyrinon dici vult, non cui nulla sit nuclei durities, sed quibus minima, de quibus Martialis.

*Non tibi de Libi is tuberes, & Apyrina ramis:
De Nomentanis sed damnis arboribus.*

Amatus Pomus Granata lignoso acino carentia Hispanis *Capharita*, Italis *Alusi* vocari scribit, per quae nos Apyrenam intelligimus.

Cesalp. tradit in dulcium genere reperiri Punica adeo paruo osse, ut eo carere videantur, quae forte & ipsa ad Apyrena refertiqueant.

Seneca in epistolis: sic sapiens imperturbatus dicitur, quo modo Apyrena dicuntur: non quibus nulla inest duritia granorum, sed quibus minor.

Non praetereunda hoc loco Punica apyrena Scaligeri. In Agro Babylonio sunt Punica Mala, non magna, cortice valde tenui. Quo ablato manduntur, ut Pira. Non enim veluti nostra distinguuntur carnis dissipationis, nisi perquam parum in imo medio. Duorum sunt generum. Partum lignum pyrena habent adeo tenerum, ut inensum pro nihilo habeatur. Partum nullum habent. Sunt igitur vera *apryna*, sicut *apryna* Manucodiata. Prior autem species *apryna* sicut *apryna* Vespersiones, & Cypseli. Apud Baetias Thebas, atque in tumulis Moeoni Creontis filii Punica nata (ut scribit Plinius) cuius pomum sanguineum intus colore repraesentat. Haecenus de differentiis.

Amathre arbor solum Cretosum, melleum: sed in pingui quoque provenit. Regio ei est apta, quae calida est. Et tamen umbras amat, rigationes, & frigus non nocet, ut ait Theophrastus. Sed intelligendus de frigore moderato. Nam si intantum frigus non noceret, etiam in Germania & Septentrionalibus regionibus prodiret, quemadmodum in calidis. In Germania non nisi magnatum hortos nobilitat, & id raro, hyeme curiosè reponenda ne vi frigoris laedatur. In parte Africae, quae Antiquis dicebatur Punica, sub qua comprehenditur Carthago & Tuncelius fructus optimus & copiosissimus prodiret: in finibus Granatae parcae, quicquid scribat Matthioli. nam hac in parte maiorem fidem habemus Lacune Hispano. Optima habentur in Regno Neapolitano & Valentino. Et hodie quoque Malograna ta suppetunt in Brasilia, ex orbe nostro illata, ut ex historiis Indiarum discimus. Coluntur in hortis Italiae & Galliae Narbonensis omnia tria genera, sapore differentia: speciatim Pataui, & Veronae perelegantes vidimus, à *Frati di S. Iohanne de Monty*. Genes in hortis colunt, ubi facile à frigoris vi deperditur, quemadmodum & apud nos, nisi caveatur. Pulchellam tamen arborem in multis iam annos colimus, vix floris gemmas protrudentem estatis calidioribus. Stuckardiae in E.C. horto pulcherrimè florent Iunio & Iulio, inter quas quaedam flores plusculis foliolis constantes exerunt, ut perhibet hortulanus, in ca-

lidioribus regionibus citius floret. Platero magni nominis Medico, amico nostro, etiam fructu ad notabilem magnitudinem producit Basileae. Fructum maturant tardè & vix ante Autumnum: forte citius in regionibus calidioribus.

Graeci fabulantur & hic, more suo: satà nempe primum Punicam à Venetis, in Cypro.

Sylvestre genus in planis & maritimis provenit, in Galba Narbonensi & Prouincia passim, gustu valde acerbo ut Mompeli in sepibus. Non temerè in montibus visa est arbor Punica: colles tamen non planè respuit. Pataui etiam ad aquas crescit. Perdit facile ante maturitatem fructum, & florem quoque rotibus nimis atque pruinis: quae de causa inflectunt ramos eius, ne subrecti humorem infestum excipiant atque contineant.

Malum Punicum autore Palladio, vere, usque in Calendas Apriles rectè scribitur: Locis quidem temperatis, Martio vel Aprili: calidis verò & siccis, Nouembri. Scribitur plantis de matrum radice deuulsa. Sed quamvis multis generibus feratur, melius ramus eius cubitalis incisus manubri crassitudine, & capite utroque acuta falce laungatus, scrobi velut obliquus immergitur, prius tamen porcino stercore & in capite, & in imo oblinatur, vel in crudo solo malleo cogatur ad inferiora defigi. Melius proveniet, si ponendus ramulus geminata iam matre sumatur. Sed qui in scrobe deponit, si tres apillos in ipsa radice constituat, prouidebit, ne oia fundantur.

Lemnos incolae, teste Bellon. Neri flores spargunt & obligant ramis Granatorum, sibi persuadentes vim esse ut floribus impediuntur defluxum florum: affirmant etiam impedire, ne findatur poma. Nos ista vix superstitione carere putamus. Sanè perlibenter hic aliquem Philosophum hariosantem audiremus.

Curandum in primis virgulta inuersa deponas. Nobis etiam ex semine provenit in horto Montbelgard. Creduntur acida fieri, si rigentur assidue: nam siccitas in iis suauitatem praestat ac copiam. Circumfodi autumno & verè debet. si dum pendunt in matre Poma, surculos semel vel iterum intorseris, ad ver usque integritate vegeta custodiantur.

Diophanes in suis Georgicis scriptum reliquit, rubra creari Mala, si glandium cinere radices aspergantur.

Democritus testatur Punicam Myrtumque mutua consuetudine mirum in modum oblectari quod si inter se societate ac consorcio fruantur, fertiliores reddi: radices quoque etiam aliquantò distent intervallo, mutuo complexu exhilarari.

Sine nucleis nasci scribit Africanus, si dempra, ut in vite, medulla, surculus adobruatur, & dum comprehenderit, amputetur quod emergit. Cinis cum lixivio circa Punici truncum frequenter infusus, lata & fructuosa reddit arbuta.

Asserit Martialis, candida in his grana fieri, si argillae, & cretae quartam partem gypsi melleas, & toto triennio hoc genus terrae radicibus eius adiungas.

Idem tradit mirae magnitudinis poma protuberare, si olla fictilis obruatur circum arborem, in eaque ramus cum flore claudatur, ne resiliat ad palum ligatus: tum operta olla contra incurtus aquae muniatur, autumno patefacta suae magnitudinis poma exhibebit.

Multa in punico ipse asserit Punica nasci, si Tithymali & Portulacae succus bene commistus

Tentat

Satio:

Vo melius
proveniat.Ne poma
fundantur.Vi sunt
acida.Vi seguta
feruntur
punica.Vi rubra
creatur
punica.Punica Cy
MyrtiSympathia
Vi Punica
sine nucleis
nascantur.Vi lata
sunt Punica
ca arbuta.Vi Punica
sunt can
didat.Vi Punica
sunt mag
na.Vi nascant
ex multa.

arboris trunco antequam germinet adlinatur.

In singulis
Punicum ma-
lus aqua de
numero ef-
se grana-
infuso.
Acinos eodem granis numero in singulis affirmat Aphricanus, etiam si magnitudo variet, modò ex eadem arbore legantur.

Punica in-
fusio pe-
culiare.
Variè, vt Græci produnt, inseritur, in se, & a his arboribus. Martialis inseri posse affirmat de ramorum connexionem, vt medulla vtrique diuisa se iungat. Caudex itaque flexilis, qui possit ad terram vsque deduci, obruitur, ita vt ramulorum connexionem medulla vtrique diuisa se iungat: deinde vinculis distinctus ligatur, ne possit in suam sedem resilire, demùm amurel suffunditur. Sed infecto trunco furculus quàm recentissimus statim debet infigi, ne mora exiguum, qui est, siccet humorem, alia tamen scitu non indigna quàm ceteris, ratione. Nam in Punica furculus iam oculis gemmascens accipi debet, in aliis verò prius quàm germinent. Lxtatur hæc Myrti coniugio, vt refert Didymus: ideo infusa Myrto Punica, multò plurima poma largietur. Salici item & Cierio, vt idem testatur inseri consuevit. At huc & Græcis contradicit Palladius, qui scribit, in se tantum inseri posse circa Aprile Calendas. Vnde hi eius versus:

Punica non alios vnquam dignata saporis

Mala, nec extremis associata comis.

Ipsa suas augens mutato semine gemmas,

Et sibi cognato pila rubore placent.

Qui plura de his vult, legat Palladium ex quo hæc pleraque desumpta, & Columellam. Item Rucium, qui de his multa præclara ex Veterum monumentis congeffit. Consulat etiam Plinium & reliquos Geoponicos, tam Piseos quàm Neotericos.

Vires & v-
luc.
Contra
leucæm.
Nunc vires perpendamus ex Diosc. Gal. Plinio & aliis, Punicum malum refrigerandi atque exsiccandi secundo ordine facultatem habet. Quare omnia Venens impetus excidunt, eorum inprimis, quæ frigida temperata sunt. Nam non eadem in omnibus vis exuperat. Nempe ex saporum discrimine vires ad augeri vel minui oportet.

Dulce.
Stomachus
affluant.
Nam dulce nunquam refrigerat: austerum valentiùs, sicciùsque est, & stomacho magis amicum, maxime æstuanti auxiliatur. Acidum quoque dulci magis frigefacit, ac maiorem etiam incidendi facultatem possidet. Eadem quoque in adstringendo facultates ex saporum differentia habet, quæ extrinsece in omnibus sunt. Dulce pectus adiuuat, succique boni est, non nihil coloris habens.

Apyrina.
Acidum in-
na.
Sub dulcium verò appellatione apyrina veniunt, utiliora: inflammationes tamen pariunt, coloremque gignunt, quam obrem febribus abdicantur. Acria vinam ciunt, & ad morbos fluxus bilis, & ad ventriculi iecorisque calores plurimum prosunt, atque ad stomachi lacerationes, quæ propter malos humores eueniunt: ori ingrata, gingivæque lædunt. Vinosa medias sortiuntur vires, stomacho prosunt, dumtaxat pauca, citraque satietatem, aluum sistunt: cauentur in vomitionibus ac bilem reicientibus, nec acinorum carne, nec succo utilis. Omne verò malum Punicum boni succi est & iucundi saporis, & stomacho accommodatum, sed vix vilius alimentum authoribus Diosc.

Pomum in-
sum.
& Gal. syncope auxiliatur etiam, vt Rufus ait. Pomum verò in olla noua positum, indito operculo, ac in furno tostum, post contritum, & in vino potum, aluum sistit, tormina discutit & tinea pellit. Alii contritum & ex tribus vini heminis, ad heminam vnam decoquunt. Dulce autem coctum & tritum, atque illitum, mirabilem, multiplicemque præstat effectum aunt, cum ad

Alnus Tor-
mina. Tri-
ma.
Flora.
capitis naturaliumque vlcera, tum ad ea, quæ to-

tum corpus excruciant, & ad oculorum inflammationes. Nam vlcera celeritè ad cicatricem adducit. Acidorum nucleus in Sole siccatus, & ob-

sonis inspersus, ac cum iis etiam decoctus, æstui

stomachique fluxionem sistit. Aqua verò cele-

sti maceratus, sanguinem excreantes potu iuuat, & ad infusus dysentericorum, profluuiæque labo-

rantium accommodatur. Porro succus ex acinis ipsis, vt Dioscor. acerbis vt Plin. expressus si co-

quatur melli admixtus, periculis fuerit ad oris, genitalium & sedis vlcera, nec non ad digitorum

pterygia, nomas, & quæ in vlcibus excreant: itemque ad aurium dolores & narium vitia: ma-

ximè verò si ex acidi punici granis exprimitur, vocaturque hoc medicamentum genus stomatice Plin.

Mala ali suberudiora triginta confringunt, & in dolum coniciunt, vinique nigri ac austeri con-

gios tres superinfundunt, quo post triginta dies ad Dysenteriam vtuntur. Diuiditur etiam ma-

lum, & celesti aqua tertis fere diebus madefcit. Hæc enim aqua celiacis frigida bibitur. [hoc Diosc.

cor. de acinis Punici.] Contra Leporem mari-

num hoc modo: Acinis detracto cortice tubis, suc-

coque decocto ad tertias, cum croci & aluminis

fissi, myrrhæ, & mellis Aetici scilicet. Alii & hoc modo faciunt. Punica acida myla traduntur: suc-

cus in cacabo nouo coquitur mellis crassitudine, ad virilitatis & sedis vitia, & omnia quæ Lycio, aut

hypocythide curantur, aures spurulentas, Epiphora incipientes, rubras maculas. In manibus ra-

mi Punicorum serpentes fugant, Autore Plinio, quod ante cum scripsit Nicander. Sed hoc ob

occultam potius [vt Greun. de venenis existimat] quàm manifestam qualitatem habent. Mi-

rum Dioscoridem huius non meminisse, cum non facile quicquam eorum, quæ de herbarum facul-

tatibus Nicander memoria prædixit, silentio præterierit. Porro dulcis Punice succum, sorbi-

tionis modo sumptum, bonum colorem facere, author Aegineta. Mris etiam potus ventrem cit,

& bilem fluxum sine molestia euacuat, venterque roborat. Aduersus vulnere dolores, & inflammationem prodest.

Hippoc. verò scribit acere Punicum quid æstui-

sum habere, vinosum minus, austerum magis refrigerare. Aeris verò liquor cum melle oculis illi-

tus, acutum vitum reddit, maxime autem si vulnerauerit. Cum polenta cardiacis bibendus offertur succus: vt propterea Hipp. & stomachi ardoribus, ob deprauatorum multitudinem humo-

rum dandam præcipiat. Acidi cum mastiche frequentius sumptus, nauseam seu vomitum compescit, iecorisque inflammationes à violentia sedat: idem adstringit, siccatur & mundat. Cum cibis sumptus superfluitatem in ventriculum de fluere non sinit: utilis etiam ad feminatum fluxiones. Ad fluxorem enim muliebrem rubrum, aut mali Punici dulcis assati succum cum vino nigro propinat, aut radicem, aut malum ipsum in vino nigro decoquit, & detracto cortice, quod intus est, tritum cum polenta polline ex vino nigro potui exhibet. Si adultior infans, vt solvatur venter, mali Punici acidi nucleum [potus orens xanthus] melle & hordeacea farina ammixta. Sic quidem legunt exemplaria omnia, sed & Plin. cum Cornario legit Fæsius. Idem ex malis Punicis vinosis [sic dicitur] succo detracto, eo polentam subigit, ac siccatur, deinde tenuiter tritam ex vino bibendam dat. Sic & mali Punici dulcis assati drachmam tritam ex vino propinat. Eiusdem etiam interiorem partem pari aquæ portione admixta, in potu offert. Corticem quoque & maliconia ex vino propinat.

Nucleum.

Stomachi.

Aust.

Spur. sang.

Dysenteria.

Diarrhea.

Ulcer. vtr.

Or genit.

Lum.

Pterygia.

Noma.

Aurium.

Dolor.

Narium.

Vitia.

Stomatice.

Medica.

Mentum.

Contra le-

Porem ma-

rinum.

Sed. vtr.

Pudendo.

Ulcer.

Aures pu-

rulentas.

Epiphora.

Macula.

Aduerus.

Serpentes.

Bonum color.

Valium.

Inflamm.

Sto.

Acere Pun-

icum.

Ad Gifum.

Cardiac.

Nausea.

Vomit.

Iecoris infl.

Fluxor mul-

iebri.

pinat. Sed hæc non videntur nobis inter veteres purgantia reponenda: suspicamus transpositos titulos & multa confusa.

*Adversus
vires a-
rarium.
Cultra
Siquet.*

Aranei murei morui acinorum dulcis decoctum, emplastri modo appositum aduersatur. Scopos inquit Aelianus, Punice grano pereunt. Addamus & hoc ex Theophr. Punica inquit, natura est humida, minusque calida quam Laurus. Dulcia citius putrescunt, quam acida, nam succus eorum dulcis facilius mutationem recipit, quoniam imbecillior acido. Ex malis Puniceis confusis cum suis corticibus exprimitur succus, qui purgat bilera flavam ut scribit Celsus. Quod forte alicui videatur mirum, præsertim cum constet eorum corticem valde adstringere, & à Veteribus, sicut & ipse succus ad variis generis fluxiones commendari, & ubicunque adstrictione & condensatione sit opus, uti patebit.

*Purgans.
Celsus.
aspicitur.*

Sed inuitabitur lector, ad assensionem si succum dulcium maximè intelligat, aut acrium: si consideret in cortice non esse tantum adstrictionem, sed & amaritudinem quandam, in qua vis purgatrix esse potest, quoniam admodum & in Rhabarbaro. Nec dubitamus esse illud experimentum doctissimi viri & cæterorum sagacissimorum Medicorum Italiz. Ideo placuit experimento adiungere rationem, quæ duo sunt maxima tutissimaque artis Medicæ fulcra. Quando verò Plinius scribit de vinosis, cauere æquè vomitionibus ac bilem reicientibus, videtur contra Dioscoridem facere, qui ait, mederi acinos vomitionibus. Verba sunt: *καλὴν, ἡ ἐκ τοῦ χυμοῦ πικρὰ τοῦ ποτῆτος* Apud Port. Acini mali punici verè dentes representant: ad gingivarum vitia, & dentium firmitatem, valere eius decoctum, testantur Auctores. Ut vox corroboretur ac clara reddatur, experientia compertum esse scribit Bapt. Codronch. maximè ex usu esse si grana media vinosa, à Dioscor. dicta Punica seu Granata, saccharo albissimo inspersa, & simul calefacta & in ore retenta, illorum succus paulatim glutinatur. Ex Turn. Punica acida pro-

Plin. nat.

Dentes.

Vm.

Ca. dial.

Vinum

Granato-

rum.

Punice

modus.

Alius.

Alius.

Eius Vires

Febri.

Stoma. bon

Alus flu-

rum.

Vinum

Granato-

rum.

Syrupus

granatorum.

sunt cardialgia, ex bili nato animi deliquio, inflammationibus hepatis, appetentia excitanda. Syrupus Granatorum gravidis mulieribus utilis. ut ventriculo & iccori cōstuantibus.

Fit & vinum è Malis Granatis hoc modo, tradente Palladio. Grana matura purgata diligenter in palmeam fiscellam mittis, & in cochlea exprimis, & lentè coques, usque ad medietatem, cum refrigerit, picatis & gypsatis vasculis claudes.

Alii succum non excoquunt, sed singulis sextariis libram mellis singulas miscent, & in prædictis vasculis ponunt & custodiunt. Dioscor. Rhætes hoc vinum vocat, à Græca Pomii appellatione: ex apyrinorum maturorum acinis expressum succum simpliciter, aut ad tertias decoque, postea repon-

ne. Efficax est ad fluxiones internas, & febrium alui profluuium exortam; stomacho accommodatum. Aluum adstringit, & urinam mouet. Contra pestem quoque utilissimum. Hodie acini maturi diligenter à cortice & membranis purgati prælo committuntur, ac exprimuntur: mox vinum lactis ad id accommodatis percolatur, & in vasculis id excipientibus desidere sinitur, defæcatum reponitur affuso oleo, ne vapescat aut ace scat. Sic Itali & Galli medici suos Pharmacopæos paratum adseruare iubent, in prædictos usus, præcipuè verò ad siem febrientium, quibus frequenter exhibent Itali vel per se, vel admixta aqua aliqua conuenienti destillata, aut simplici fontana.

Habetur & Syrupus è Granatorum succo pa-

ratus in instructionibus Italiz, Galliz & Germaniz Pharmacopoliis: sed malè faciunt qui indifferenter dulcia cum acidis miscent. Rectè igitur à Cordo factum, qui vtrumque seorsim conficiendum præcipit, quod diuersis morbis, morborumque accidentibus medeantur. Syrupi quidem dulcium vsus ad tussim, & pleuritidem. Acidorum verò, ad siem, febres biliosas, aut etiam pituitosas si magnus calor adsit: ventriculum & viscera magis corroborat, vomitiones & animi dejectiones sedat. Vtriusque descriptionem habes apud Aetium, & in Dispensario Cordi. Paratur quoque ex Punice floribus, hoc est, ex internis Cytinorum, puniceis, ac tenuibus foliis Saccharum, perinde ac ex puniceis rosis, admirabilis facultatis, ad vtrasque vteri fluxiones, si semuncie pondere sumatur ex vino rubro austeriusculo, aut ex Puniceorum acidorum succo, aut ex aqua in qua ferrum, quod Græcis *σάκερα* vocant, extinctum fuerit. Præstat quoque magno sanè præsidio, ad Gonorrhæam, ad Cæliacos & Dysentericos: quo medicamento plurimè adiuta sunt mulieres, quæ diuturna vteri fluxione laborant, ut testatur Matth.

Punice flores, qui & Cytini vocantur auctore Diosc. & ipsi quoque adstringunt siccant & cohibent: cruenta vulnera glutinant & quas Puniceum ipsum præstant utilitates. Eorum decoctum ad gingiuas humore flaccidas dentetque mobiles colluitur, & ramices ex intestini prolapsu Cataplasmatis inditum agglutinat & restringit.

Sunt qui tradant toto anno lippitudinem non passuros, qui tres, quantumvis exiguos Cytinos deuorauerint. Ex iis velut ex hypocistide succus elicitur, ad eadem valens ad quæ Hypocistis. Galenus Cytinos cortici facultate similes dicit. Morum miras obseruationes dicit Plinius, plurimorum experimentis. Quæ verò Dioscor. de lippitudine tradit, ea Plinius paulò superstitiosius proponit, idè studio omittimus. Dicamus meliora & rationi congruentia. Siccati Cytini, tritique, excrecentes carnes cohibent: ginginis & dentibus medentur: vel si mobiles sint decocto succo. Ipsi autem triti, vlcerebus, quæ serpunt, putrescunt, ue, illinuntur, & oculorum intestinorumque inflammationi. Aduersantur scorpionibus.

Ipsi quoque cortices vim adstringendi prætipuam habent, & quos Cytini præbent vsus. His ex acerbis magnus vsus. Vulgus Coria maximè proficere illis nouit: Succo verò efficaciores sunt. Etenim refrigerant, & ipsis etiam Cytinis & acinis virtute valentiores. Spissandi vim efficaciter obtinent. Vrinam cieri iisdem à medicis affirmari tradit Plinius, quod falsum. Dioscor. quidem acida dicit magis vrinam cieri, quam dulcia: Nihil verò tale de corice. Expetitur gravidarum malaciz, quoniam gustatu moueat infantem. Hoc Dioscor. de Mali succo aut cortice potius. Ex vino autem decoctus & impositus, petniones sanat. Fumo eius culices abiguntur.

Quin & nucleos ipsos acinorum expetiri non piguit. Tosti tusique stomachum iuuant, cibo aut porioni inspersi: de quibus plura antea ex Dioscor. iisdem ebibitis, aqua, quæ cutem subiecit siccatur. Radix decocta succum remittit, qui tinea necat, seu latas ventris tancias, eisdemque expellit. Sylvestris verò radix, quam tenuissimè trita phalangiorum iectibus imposita prodest. Quæ verò rubro cortice sunt, denarii pondere potè somnos faciunt. Termitè Mali punice, venenatæ bestiz, ac serpentes etiam fugantur: propterea, stibadis, toros, & ategias, hac pestilenti lue

*Syrupus
dulcium
granato-
rum & vteri
vires acidis.*

*Vires Cy-
tini seu.
Flores Gra-
natorum.
Vulnera.
dentes.
Ruptura.*

*Lippitudo.
Siccus Cy-
tini.
Hypocisti-
dis Succo
dantem.
Plin super-
sticiosus.*

*Gingiuæ.
Vlcera.
Inflammationes.
Scorpionibus.*

*Malicarii
(en Cortice
granatorum
vires & sim.*

Plin. nat.

Malacia.

*Perniones.
Culices.*

*Nucleus
en.
Stomachus.*

*Hydrops.
Radix
en.*

*Radix
en.
Termitè
en.*

Tinea. putant vindicari. Ex Plinio & Curtio. Scribit Constat in libris de cognosc. morb. Malicorium vino decoctum ac potum omnes ventris tineas e-
Ascarides. necare, maximè eas, quas Ascaridas nominant, addens omnibus malis Punicis peculiarem vim tineas ventris eugendi inesse. Idem contusos flores, & in puluerem redactos ac ieiuno stomacho sumptos, vnicè ad frigidam facere tussim, & catarrhum alletit. Corticis cum ipsis granis contusi succus, si inspilletur, Polypum narium delect: reprimat enim carnem supererescens, & tenellam absumit: inest enim in cortice cum adstrictione amaritudo quædam, ut annotat Cæsalp.

Tussis. Nec dubium foliorum contusorum, aut deco-
Cataractus. rorum magnam quoque esse vim ad multa præ-
Polypus. dicta, præsertim ad lotiones, infusus, infusiones, ubi adstrictione opus. At illud nobis nemo persua-
Euchar. debeat, quod Euchar. notat, Granatorum ma-
Res nos. lorum cortices, si edantur, cor roborare & palpi-
 tationem eius tollere.

Porro ut & in Pharmacopolarum gratiam ali-
 quid addamus, qui in multos dies Punica asseruare
ut Punica conantur: Punica mala, ut Græci tradunt, ad hy-
mala le- bernos usus reseruanda leni manu, ne tactu aspe-
genda & riore vitentur, aut vulnus sentiant, interlegi de-
adseruanda. bent, nam illa putrilaginis originem adferunt, & in cocta pice mergi, refrigerataque suspendi. Co-
Punica cum lumella luadet Punica & in genere omne Pu-
suas prædica- nicam, quod in vetustatem reponitur, cum pedi-
in & ror- culis suis legendum esse, & si sine arboris noxa
ma legen- fieri possit, etiam cum ramulis, nam ea res pluri-
da. mum ad perennitatem confert. Multi cum ramu-
ut dicunt lis suis arbori detrahunt, & creta figulari cum di-
radiantur. ligenter mala obruerunt, in Sole siccant: deinde si rimam creta facit, luto linunt, & assiccata frigi-
 do loco suspendunt. Palladio Punica feruantur, si
 picatis pediculis ordinata suspendas. Longo cu-
 stodiuntur tempore, si in feruentem aquam intin-
 gantur, & protinus erepta, in arena sicca compo-
 nantur, aut Tritici cumulo in umbra dum rugas
 contraxerint recondantur. Aliter. Lecta integra
 in aqua marina, vel muria feruente mergantur,
 ut combibant. Post triduum Sole siccantur, ut
 sub die nocte non maneant, post in loco frigido
 suspendantur. Cum volueris uti aqua dulci prædie
 macerabis. Feruntur hæc poma recentia æ-
 mulari. Item si tactu inuicem separata paleis ob-
 ruantur. Plures modos habes apud Palladium &
 Columellam, qui & cultum Punicæ diligentissimè
 describit lib. 12. de re rustica cap. 44. quem consule.
ut rugata Acida Punica mitescere & dulcia fieri, scribit
recentibus Matth. si suillo, aut humano stercore foueantur
fractis simi- arboris radices, & vetere vrina læpius irrigentur.
lia. Si flore n arbor non continet, vrinam veterem
ut acida cum pari aquæ mensura temperare, & ter per an-
mitescant. num radicibus infundere efficacissimum est re-
ut flores medium.
non decedat

DE PUNICA BALAVSTI- FERA.



Placet de hac specialius agere, tum quod di-
 uersa sit à vulgata, & nunquam fructum ferat,
 tum quod à Theophrasto Botanicorum Pon-
 tifice maximo & vetustissimo manifestè distin-
 guatur, uti patebit: tum denique quod à Diosc.

Balaustia sylvestris Punicæ esse dicantur,
 quæ tamen à nostris sylvestribus
 differunt.

BALAVSTIA HISPANICA.

Pro Hispanicis importantur plurimum Bala-
 ustia, quæ Punicæ cuiusdam flores sunt ampli, densissimo foliorum purpurascens fæctu stu-
 pati, gustu adstringentes, non Cytino oblongo,
 ut in sativa pomifera Punica, aut etiam Stuttgar-
 diana, flore multiplicato insidentes, sed compres-
 solato suffulti, cui color ex flauo purpurascens,
 corium durum lignosum, in lacinas quoque di-
 uisum. Sicca Balaustia nonnihil simile habent
 cum Rosarum spongiosis.

De his utique intelligendus Theophrastus in
 primo histor. scribens: esse ge-
 nus quoddam
 & vitis & Puni-
 cæ, quod fru-
 ctum perficere
 nequeat, sed cu-
 ius ad florem vs-
 que tantum ge-
 neratio perue-
 niat: qui densus
 & plenus, &
 amplitudinem
 quodammodo
 Pomi æmulatur.



Nostræ sen-
 tentiæ subscribit
 Cæsalpinus: Re-
 peritur, inquit,
 in Punicarum
 genere sterilis,
 sed peregrina in

Italia, [at non est peregrina sylvestris commu-
 nis] flores tantum ferens, aded multiplici folio
 conitantes, ut Rosæ videantur centulix, colore
 saturato.

Eiusdem Hesychius meminit, ita scribens:
 Βαλαύστιος ἡ ποῖα πλεονεκτήσας ἀπὸ τῆς ποῖας. Vbi
 miramur quid in mentem venerit Constantino in
 lexico hunc citanti locum, dicentique Hesychium
 nugari. Ipsemet potius nugatur Constantinus,
 cui Syriacum Balaustum incognitum, nihilomi-
 nus animo fugillandi prurit. Rectè dictum ἡ ποῖα
 ποῖα, ut distinctum ostendat à vulgatis Punicis.

Incogitante verò Plinius [& merito à Dalec.
 reprehensus] scribit: Cytini flosculos alibi à se
 balaustia vocatos. Nam tam latius, quàm sylue-
 stris Punicæ florere incipientis, [delinens le-
 gendum suspicatur Coanar.] primum partum,
 Cytinum vocare videtur: balaustum verò floscu-
 lum vtriusque, antequam malum prodeat, in ipso
 erumpentem Cytino. Confundit igitur Balaus-
 tium cum Cytino, hic enim flos est sativæ Puni-
 cæ: Balaustum sylvestris ex Dioscoride. Nam si
 quis Balaustiorum figuram consideraverit, depre-
 hendet, ea non Cytino aut oblongo vasculo si-
 mili tuberculo, ut sativæ flos, sed dilatata veluti
 suâ basi foliola sua complecti, atque in eo rosæ
 non admodum dissimilia.

Cordus quoque simili errore lapsus, quando
 ait: Punica sylvestris, sativæ per omnia similis est,
 incultior tamen, spinis que horridior, cuius Balaus-
 tia ac Cytini in sativa Punica navis efficaciora
 sunt: Punicam, inquam, malum, ferentem Balaus-
 tia non distinguere videtur à sylvestri vulgata.

Monspeli sylvestris frequens, & tamen fructi-
 fera: sed Balaustia non fert. Stuttgartiæ in horto
 M.E.C. est malus Punica instructifera, cui flores
 sunt

Gal. quidem pleni, sed non tales nec tali figura aut specie, quales Balaustrorum. Nam & Cytinum habent, seu Calycem oblongum, de quo supra.

Gal. quoque licenter, vtriusque florem Balaustrum dicit cum Plinio, qui tamen ferendus, quod ex professo de us non egerit, potuisset tamen distinguere ex Dioscoride.

Matthiol. scribit Landatissimos sativorum flores, colore perquam rubro ex Creta & Cypro hoc quoque Venetias importari, aspectu quidem specioso, & viribus ceteris prestantiores. Sed & mangonio fieri in Italia peregrinis non dissimiles, non tamen usque aded prestantes. At sane non videmus quomodo ex Cytinis fieri possint Balaustra: debebat Matthiolus demonstrare discrimen inter vera & mangonio facta, si talia nouerat, aut fiant: suspicamus enim ei non fuisse nota, quia non descriptis, aut certe non esse Balaustra.

Balaustra *Balaustia* Dioscor. & Græcis: à *βάλαν* verbo tractum nomen putat Cordus. *Balaustia* Colum. Inuenimus & *Balausa* scribi. Quidam simpliciter *Balaustia* dicunt, alii flores Balaustrorum: quibus nominibus omnes Herbarii videntur. *G. wild* Granatopffel blüthe: vel ut alii, simpliciter Granatblust. Belg. de bloem oft bloeyfel van eenen wilden Granatappelboom. It. Fior di pomogranato. Sed Doctus à Græco mutuato nomine, *Balausti*. Hisp. Flor del granado. Angl. The flowers of the wilde Pomegranate tree.

Balaustrum differentiarum solus, quod equidem sciamus, meminit Dioscor. colore discrepantium: Balaustrorum inquit, compluta sunt genera: reperiuntur enim candidum, rutilum & colore rosaceo: *πύρρινον* Græcum habet: Orib. *πύρρινον*, alii vtrunque legunt. Quæ ad nos importantur sunt ferè colore roseo: candida nondum vidimus nec est inter Herbarios qui se vidisse scribat.

Rauolthius scribit circa Tripolim provenire in sepibus Granatos sylvestres cum pulchris floribus plenis. Proveniunt, inquit Anguill & in Syria circa Alepum in sylvestribus sponte: non crescit in Italia. In hortis quibusdam plantata visitur, ut Ferrariæ in Nigrosoli, Arminii, Pharmacopœi Iulii Moderati. Venetias magna copia ex Syria, Cypro & Creta importantur. Cordus tradit, nasci in Africa ac in Hispania freto vicina sponte, Regno hoc ob id Granati cognomento gaudente. Nos sicca habemus elegantia & è multis selecta. Habentur & in plerisque Pharmacopoliis. Siccum rimum Patavii vidimus apud Cortusum, vulgato non valde ab similem. Hortus Stutgardianus, pulchras alit Puniceas malos, & inter eas rannullas flore pleno, minis tamen, quam Hispanicas: ab ex Hispanica Balaustrifera facta, nescimus.

Balaustra Mali Puniceæ quino similia sunt, & ex his quoque succus elicitur hypocistidis modo. Vis ei adstrictoria, eadem efficiens, quæ hypocistis & Cytinus, autore Dioscoride.

Curtius tradit & potenter adstringere, mirâ efficacitâ & refrigerandi facultate. Vnde affectum & contritum, & intertriginibus reliquisque vlcibus iniectum, celerrimè ad cicatricem absque erosione perducit, & destillationes cohibet: quo præsidio ad sanguinis excretaiones, ad Dysenterias, & ventris profluvia, & vteri nemo terè medicus est, qui iugiter non utatur. Plin. medicis idonea sunt Balaustra. Sunt, & tingedis vestibis, quorum colorande nomen accepit: nempe puniceus, qui & Balaustrinus Scaligero. Aduersantur Scorpionibus. Sistent potu menses formi-

narum: sanant oris vlcera, (vlcera capitis Dioscor. *ἐχέου*) tonsillas, vnam, stomachi solutiones, gentialia, vlcera quacunquē in parte manantia. Siccauere etiam experti, ut sic quoque experientur, inueneruntque tuforum farinâ dyntericos à morte reuocari, & aluum fisti. Possint & plerisque antè dictis de Granatorum visibus accommodari, cum eadem facultate polleant ferè, quæ illorum Cortex.

Tuberosi.
Adversus.
Scorp.
Menstr.
Tonsilla.
Vna.
Stomach.
Dysent.

DE ARBUTO.

CAP. XVIII.

Arbutus: Comarus Theophr.



Vix aliis modis

Descriptio

referas Arbutum quam quidam arborem dicunt: plurimum tamen nil fructus, quatenus observauimus, cœtortis stolonibus scabro cortice interiectis: in quibus perpetui vitoris folia, Laurinis similia, & patia sepe, crassa, virentia, per externum tantillum purpurascencia, circumquaque crenata.

Folia.

Flores tanquam ex amento racematim penduli, pulchri similes ferè floribus Lili conuallii, concaui, albi, odore iucundi: hos excipiunt fructus, Fagus similes, sed multò maiores, exactè rotundi, acorosi, antè maturitatem lutei, maturi autem rubentes, sapore valde grato & dulci præditi. Semen non bonè observauimus. Cuius ait Milio non multò esse maius, inque fructus medicullio contentum, nihilominus tenui obductum esse membranâ.

Flores.

Fructus.

Hanc Theophrastus Comari nomine sic describit. Comarus, quæ Menæcyon fert esculentum, non est admodum magna arbor. Corticem habet tenuem, Tamarici similem: folium inter Lilicem & Laurum: medium. Floret mense Pyanepsione [quem Gaza Comar. & Dalec. Iulium vertunt, cum potius Nouember sit aut October: Cæsep.] Flores prodeunt ab vna appendice extrema parte racematim, & quisque similis est Myrti bacce oblongæ forma & magnitudine, non foliatus, sed velut ouum exalpinum, ore aperto. Quum desloruit, etiam retinaculum, [apertum] quo adhæret perforatum est. Quod desloruit, tenue est, sicut verticillum circa solum aut Doricæ columnæ capitulum. Fructus annuo spatio maturefcit, ut simul contingat & hunc haberi, & alterum flore sponderi. Idem alibi dicit eius corticem radicis speciem habere, & perpetuò virere. Sed quando ait: *ἀνὰ* folia inferiora dimittit, cuminumibus perpetuò virentibus, Gaza vñedinem reddidit: fortè legit *ἀνὰ*. Porro tria habet nomina Theophrastus, quasi tria essent genera di-

Descriptio
Theophr.
Menæcyon.
Gaza Comar.
Dalec. Iulium.
Cæsep.

Gal.

Matthiol.

Nomina & Synonyma liguar.

Differentia.

Locum.

Punica repleta.

Vires & visus.

Temperamentum.

Intertrigines.

Vlcera.

Dysenteria.

Stomach.

Vteri.

Scorpiones.

Arbutus. *Arbutus* est nostra: *Arbutus*, de qua postea, & *Arbutus*, ut acutissime legitur Ruell. & Scal. vel *Coggygian*, quæ tamen parum commune habet cum predictis, & *Arbutus*, de qua sub capite de Corno.

Differen- *Czalspinus* etiam modicam quandam differen-
tia. *Arbutus* obleruatur in fructu: nam quidam parui ma-
li amplitudinem implet, rubore magis nigricante:
mollior & suavior, in mediterraneis proueniens:
quidam Auellanz magnitudinem non excedit,
flauior & asperior, in maritimis tractibus magis.
Virgil. horridam arbutum dixit.

Diosc. *Dioscoridi* Comarus seu Arbutus, arbor est,
descriptio. *Cotonez* malo affinis, tenui cortice, licenim
Diosc. emend. legendum nempe *Arbutus*, non *Arbutus*: non
enim folia Arbuti sunt tenuia, sed cortex fructum
proferens Rami magnitudine, nucleo carentem
quoniam Memecylon vocant, quique ubi
maturum subfaluus aut rubicundus conspicitur:
in etia cerosus. Pater itaque satis liquidè, ut equi-
dem arbitramur, Arbutum esse Veterum *Arbutus*.

Qui Arbuti mali Cotenei assignat folia, in-
quit Scal. non norunt alterutrum. Etenim à Lau-
ro ad Illicem si transeas, Arbutum inuenies, & Sù-
bet. Rectè Theoph. Lauro & Illici contulit. Dio-
scorides verò illa sua collatione quosdam in suspi-
cionem coniecit, quæ crederent Arbutum eius &
Theoph. differre.

Nomina & *Et quædam Theoph. Diosc. Gal. cæterorumque*
synonyma. *Græcorum.* Lat. Arbutus. Fructus eius *Arbutus*,
authoritas. vel ut alii legunt *Arbutus*, alii *Arbutus*. Sarrac.
Arbutus apud Diosc. *Arbutus* ut legitur, & memecylum verum,
Arbutus si quo auctore non addit. Diciturque *Arbutus*,
Memecylon & in istis genere apud Ath. cum sit femin. apud
Theoph. Hinc *Arbutus* apud Aristophan. A-
uibus, ut annotat Const. Scal. legitur *Arbutus*. A-
then. ex variorum Scriptorum autoritate *Arbutus*.
Arbutus Sunt denique tam è Græcis, quam Latinis,
qui fructum & Memecylum, & Comarum, & V-
nedonem vocitent. Fructum verò Virg. Arbutum
in neutro, ut Georg. i.

--- Cum iam glandes, atque Arbuta sacra
Defuerent sylua.

Et in secundo:

--- Dani Arbuta sylua.

Et de arbore:

Et quævis rara viridis tegit Arbutus umbra.

Hic tamen Arbutum semper gen. posuisse vo-
lunt, hoc latamine:

Impun. tamen per nemus Arbutos
Quædam latentes

Arbuta pascuntur apes dixit Virgil. 4. Georg.

Arbuta matura Lutetia.

Ouidius:

Arbutus factus, in tantisque fraga legébant.

Idem de arbore:

Pomum oncrata rubenti Arbutum.

Vallæ Arbutus ea est arbor, quæ Pomum inter Ce-
rasorum seu Fragorum fert. Plinius de ea tradit
duerfistocis: Alia, inquit, acinis caro, alia Mo-
ris: alia Vnedonibus. Aliud corpus est terrestri-
bus fragis, aliud congeneri eorum Vnedoni: quod
solum Pomum simile fructui terre gignitur. Ar-
bor ipsa fruticosa: fructus anno maturefcit: pari-
terque floret subnascens, & prior cogitur [co-
gitur M. colligitur Vet.] Mas sit an femina ste-
rilis, inter auctores non constat. Pomum inhono-
rum, ut cui nomen ex argumento sit vnum tan-
tum edendi. Duobus tamen hoc nominibus ap-
pellant Græci, Comarum & Memecylon, quo ap-

paret totidem esse genera & apud nos. Alio no-
mine Arbutus vocatur. Iuba auctor est, quin-
quagenum cubitorum altitudine in Arabia esse
eas. Nec Plin. Verum quando ait: solum hoc Po-
mum simile fructui terre gigni, non recordaba-
tur [inquit Dal.] Adrachnes fructum, quem simi-
lem Memecylo Theoph. esse tradit, fructum quo-
que terre nempe Frago similem esse. Idem Pli-
nius Vnedoni folium mali Ailyrix seu Medicæ
tribuit, eundemque inter syluestres arbores Græ-
cæ cum Adrachnes recensens, perpetuifoliam di-
cit. Ergo Plin. quatuor has voces, Vnedonem,
Comarum, Memecylon, Arbutum, vni arbori ac
fructui tribuit. At verò Vnedonem fructum Ar-
buti non esse, sed Epimelidis arboris Gal. scribit
his verbis: ex syluestrium plantarum genere est,
& frutex quæ in Italia fert. Appellatur autem is
fructus in Italia Vnedo, stomachoque nocet, &
capiti dolorem adfert, acerbisque est admodum,
cum exigua quadam dulcedine. Comarus quidem,
& Canitubus fructu, & glandibus, & memecylonis [sic
autem Comari fructus appellatur,] rustici passim
vescuntur: reliquarum autem arborum aut fruti-
cum fructibus non admodum vtuntur. Ex quo
Galeni loco apparet eundem fructum esse à Plinio,
cui Vnedo, ut dictum, Comari fructus est: Gale-
no autem Epimelidis, ut & in libro de simplici-
bus tradit, licet eadem vires attribuat utrique,
hoc est, & Comaro & Epimelidi: eundemque se-
cutus est Paulus.

Quorum fortè autoritate motus Dalech. apud
Plinium scribit hunc infusè & negligenter *Arbutus*,
fructum Arbuti, cum Vnedone
fructu Epimelidis confundere binis locis: negli-
gentius etiam Memecylon fructum cum Coma-
ro, sive Arbuti arbore sua. Et addit Dalech. Vne-
donem fructum esse Epimelidis. Nec tamen sibi
constat. Sed huius sum opinionis oblitus, aut fortè
Palinodiam canens apud Athenan. notis suis mar-
ginalibus annotat Arbuti fructus esse Vnedo-
nes.

Sed ante ipsum dixerat Cornarius, Plinium V-
nedonem, quæ Galeno & Paulo Epimelidis est cum
Memecylo Arbuti fructu confundere, & addit a-
libi: Galenum manifestè inter Comarum arbo-
rem, cuius fructus Memecylon appellatur, & in-
ter Arbutum aut Sentem potius, quæ Epimelidis
fert, & in Italia Vnedo appellatur, distinguere: ut
certum sit duo diuersa genera Vnedonem & Me-
mecylon esse, sed tamen iidem viribus prædita.
Latet tamen, haud facillè esse pronuntiare quis
sit fructus Arbuti, Memecylo dictus, & quæ ar-
bor illum proferat. non dubitare tamen se hanc
in Germania nasci, & iis, qui sylvas scrutantur,
notam, & fructum adeo in vfu esse: sibi tamen
nucleo carentem nullum tale fructum cogni-
tum. Sic de ignotis decernit bonus ille vir, & Cornar.
nullius autoritate motus, Plinium reuertente
tam, approbans Galeni.

Eidem subscribit Lonicerns, nec alia solius ra-
tione. Quin & Constantinus, hisque subscribit
& Sarracenus in suis Scholiis ad Diosc. atque illi
Plinium quando ait, Memecylon Vnedonem vo-
cari.

At verò Plinio quidem sui desunt adscri-
ptores, siquæ viri maximi, & in re Herbaria non
contemnendi Scriptores. Hamolans sanè omnis
bonæ literaturæ alumnus Pomum huius arboris
[Arbuti] & Comarum & Memecylon Græcis dici
ait: Latinos Pomum & arborem quoque ipsam
Vnedonem & Arbutum. Sentque, inquit, qui
duo genera constituant, Theophrastum fortè se-
cuti.

Arbutus *Vneda*. *Comarum*, id est *Arbutum*, & *Mimecydon*, id est, *Vnedonem*, à Theophrasto *Neliam* vocatum: defluo & hoc cortice: foliis quoque. Sed imà tantum parte deciduis, virente perpetuo corni. Montana fraga nominantur à Poëtis, ut à terrestribus distinguerent. Differt *Comarus* à *Comaro*: ut in *Paliuri* mentione diximus. Testandum est & illud, Grammaticos Græcos esse, qui fructum *Arbuti*, *Acylon* vocari tradunt falsò, cum *Memecylon* eum dici constet: *Acylon* verò ligna glans sit. *Hec Hermol.* Sed *Cordus* liberè, nullaque circuitione vltus, *Galenus* inquit, non assentimur, *Epimelidi*, *Memecili* vitia adscribenti: proculdubio insinuare volens vel diuersa esse, vel saltem non iidem prædita viribus, de qua re infra. A natus quoque, nonnulli (inquit) differentiam faciunt inter plantam istam quum frutescit, & eam quæ in arborem crescit, in quam sententiam Theophrastus nire & animaduertit, cum *Comaron*, id est, *Arbutum* ab *Vnedone* arbore, lib. 1. de hist. Plant. ubi corticis differentias enarrat, diuersam facit: quamquam tamen idem Theophrastus nunquam de *Vnedone* sermonem priuatum, quod eundem obseruauerit, habuerit: *Galenus* tamen illum imitatus, vno in capite de *Vnedone* fructu sermonem fecit: alio verò de *Arbutu* siue *Comaro*, ut lib. 7. videre est. Postea addit: *Mra* tamen sententia, *Vnedo* ab *Arbutu* siue *Comaro* in nulla se differt, quum eadem sit arbor (specie, & utrinque fructus *Vnedo*, siue *Memecylus* dicatur. Sed in eo tamen fallitur *Amatus*, quod ait, Theophrastum de *Vnedone* prius in egresso, & *Arbutum* ab *Vnedone* arbore facere diuersam: Nam ne meminit quidem vnquam *Vnedonis* Theophrastus, sed *Gaza*, illius interpret, *Vnedonem* dicit, & *arbutum* idem. Vnde *Scal.* *Habes*, inquit, eiusdem generis *Arbutum* & *Vnedonem*. *Arbutus* Latine arbor est, fructus autem *Vnedo*. Ac *Neliam* apud Theophr. *Vnedonem* vertit quidem *Gaza*, sed an bene nescimus: Et cur *Nelia* sit *Arbutus*, aut eius species, nondum nobis constat, nec nullus est, qui explicet, quamuis *Clus.* etiam dicat *malum* apud Theophrastem significare *Vnedonem*. sed cur hoc dicitur aut cuius autoritate? aut quid est *malum* Theophrasti? Fortè rectius legis *malum*, id est, *Malum* cum *Const.*

Potè *Gazam* reprehendens *Scaliger*, quod apud Theophrast. *malum* *Pomum*, nimis communi appellatione sic interpretatus, addit: *Vnedo* est. Et in exerc. *Cardanum* reprehendens, quod potius *Ederam* & *Arbutum* esse idem posset, subdit: Est *Arbutus* satis grandis, folio *Lauri*, crispior, & ad *Suberinum* haud ita parum accedente, à *Calabris*, nisi me fallit memoria, *Cerasus Marina* dicitur. Huius *Vnedo* fructus. *Comaron* & *Memecylon* audis apud Theophrast. apud *Gal.* falsò *Epimelida*. *Arbutus* vocatur à *Pyrenæis*.

Eandem sententiam sequuntur *Lob.* & *Pena* in adu. *Camer.* & alii. *Dod.* veluti fluctuans ex aliorum potius sententia loquitur quam declarat suam: *Arbutus*, inquit, quibusdam *Vnedo* *Gal.* subdit tamen: fructus quibusdam *malum*, Lat. *Vnedo* & *Memecylon* *Gal.* sed prof. Ad suspecta nobis videtur *Galenus* sententia, quem scimus in Italia fuisse peregrinum, ideòque *Plinio* qui *Italus* fuit, citius falli potuisse. Si autoritatem spectes, utrinque ferè par pondus: At profectò, non placet *Galenus* *Epimelidi* *Vnedonis* facultates & vitia tribuens. Nam si *Epimelis* sit *Mespilus*, ut

plerisque doctis persuasum scimus, quis dicat eius fructum noxam afferre capiti aut stomacho esse molestum, quem tamen plerique Medici stomacho familiarem dicunt.

Non prætereunda opinio *Constantini*, qui peritioribus considerandum proponit, quæ sit ea arbor, de qua sic scribit *Palladius* in Decemb. *Hypomelides* *Poma* sunt (ut *Martialis* asserit) *Sorbo* limilia: [intelligit *Const.* magnitudine] mediocri arbore nascuntur, & flore candidulo. Dulcedo huic fructui cum acuto sapore commista est. Omnia hæc probè *Arbutu* conueniunt. Repugnat verò quod infra ait: nucleis feri, & *Poma* asseruari. Denique etiam *Solerio* *Arbuti* fructus nunc *Vnedo*, nunc *Memecylon*, nunc *Comarum* vocatur. Quod verò *Ruell.* scribit, *Galenus* & *Paulus*, *Arbutum*, *Comarum*, *Vnedonem* à rusticis *Italiæ*, scripsisse, neuiquam verum: quin potius illi clari & manifestis verbis *Arbutum* ab *Epimelide*, cuius fructum *Vnedonem* dixere, distinxerunt, ut liquet in præcedentibus: sed an bene doctorum iudicium esto. Nec placet quod eadem putet, quamvis eandem *Galenus* & *Paulus* illi vim reddiderint: difficile siquidem probare à foliis viribus. Multa sunt viribus similia, quæ tamen nec forma, nec genere eadem.

Sed quid de *Arbutu* *Athæneus*? nimirum ceu in alium nos ducens horum. *Asclepiades*, inquit, *Myrleanus* arborem quandam *Chamæceratum* nominans, in agro *Bithyniæ* gigni ait, radice parua: quin & arborem ipsam non magnam, sed *Rosarum* arbori parem: (sic enim legit *Natalis de Comitibus*, & *pro eo* quod in nostro & vulgaris codicibus mendosè legitur, & *pro eo* quam priorè lectionem etiam *Dalechamp.* sequitur) cætera fructum omnino *Ceraso* similem, quo largiore si quis utatur, non aliter quam vini potu caput dolore, & graue esse. Hæc quidem *Asclepiades* scripsisse putat de *Memecylo*, id est *Arbuti* fructu: (non de *Sorbi* fructu, ut *Nat.* de comitibus vertit) Talem enim fructum, addit, arborem illam gignere, & qui plura septem ex ea poma comederit, capitis dolore vexari.

Theopompus huius fructus meminit hoc versu.

Myrti bacis vescuntur, maturisque Memecylo.

Et *Crates*:

Longè formosissimæ sunt marmæ, quale est *Malum*, aut *Memecylon*: aurum rotundæ, globosæ, paruulæ, colore subrutilo nitentes, qualis est *Memecyli*. *Amphis*: Quid vides, *Morus* *Mora* fert, illex *acylos*, *Arbutus* *Memecyla*. *Muarum* quâ confidentiâ *Natalis de Comitibus* his locis citatis apud *Athen.* in *Sorbium* cenerent. Præstitisset retinuisse Græcam vocem.

Potè *Arbutus* omnibus ferè *Herbariis* recentioribus dicta: *Arab.* *Hutladi*: vel ut alii scribunt, diuissim, *Hutl Adib*. Qui *Germanicè* *Bagapffelbaum* / & *Belg.* *Bagappelboom* vocant, ut *Hellæus* & alii, satis id licenter faciunt: non enim sunt *Poma* vel *Mala* sepium, ut illis nomina sonant: nec in *Germaniâ* proueniunt. Præstaret nominare *Erdbeerbaum* / id est *Fragorum* arborem. *Goropius* scribit *Comarum* dictam à *Camborum* *Com-ar*. Sed quæ *Etymologiæ* ratio? *Gal.* *Albanus*, fructus *Arbutus*: *Ital.* *Albarro*: & *Raffæ* de secretis teste, *Arbuti* alijs *Romani*. *Hisp.* *Castil.* *Madrona*: *Catal.* *Arbut*: *Portug.* *Medronbeyro* aut *Medronho*. *Angl.* *Arbutree* / vel *Sorame-berrytree* / quasi dicas *Fragum* arborem.

H

Tom. I

Turner. Sed nouas turbas nobis mouet Anguillara, qui putat Arbutum à Theoph. descriptam à Dioscor. Arbutum differre, quodd Theoph. dicat, solum Arbutum inter Illicem & Laurum: Dioscor. verò arborem similem Cotoneæ, foliis paruis. Ostendit [inquit] hic Diosc. non esse dissimilem arborem, foliis, ramis, & trunco malo Cotoneæ. Itaque fortè intellexit de Portulaca Theoph. quæ folia habet minora, & similia folio Cotoneæ, nec non reliqua. Quamobrem dici posset, Arbutum Theoph. ac eam quæ hodie Italix familiarissima est, vocaturque *Arbari* & *Comari* in ditione Patina, ac Portulacam esse Arbutum Diosc. quæ hodie vocatur in Græcia *Andracos*.

Huius sententiæ, inquit Clusius, non possum non subscribere, cum hætenus mihi obseruata Arbutus nihil cum Cotonea malo similitudinis habeat. Sed bonus interdum etiam dormitat Homerus. Nec inuaduerunt hi viri, alioqui stirpium peritissimi, Dioscoridem, dum Arbutum Cotoneæ malo comparat, non de foliis, sed de cetero modo, arborisque forma intelligendum esse. Dioscor. enim, quod folii angustiam denotare videtur, non paruitatem: quamuis non desint, qui non legèdū censeant, vtspecialius dicetur postea. Præterea non dicit Diosc. folia Arbuti esse similia Cotoneæ, sed arborem, cum teste Theoph. Adrethne sit folio Arbuti simili, nec ullam similitudinem Cotoneæ folii attribuit. Diosc. autem dicere arborem esse similem Cotoneæ, non mirum: solet enim interdum similitudines minus proprias habere: quamquam si nulla esset alia similitudo, hæc esse posset, quodd vtræque arbores vtplurimum parue maneat, ac à radice natos emittant stolones, ita vt speciem ferè fruticis præbeant vtræque. Certum est Theoph. & Diosc. in descriptione fructus, quem vtræque Memecylon vocat, sicut & Plin. conuenire: vt flet inconcussa etiam ex peritiorum indicio, sententia, Arbutum Theoph. & Diosc. vnam planè eandemque esse Arborem. Rectè igitur Matth. Etsi [ait] Arbutus Diosc. reddatur malo Cotoneæ adsimilis, magis tamen putauerim ab eo arboris proceritatem repræsentari Cotoneæ, quàm folia & caudicis corticem. Vel deprauatus fortasse [vt magis suspicatur] est hoc in loco Diosc. codex: quandoquidem Serapio, Diosc. ipsius testimonio, Arbutum non describit in vniuersum Cotoneæ malo similem, sed eam tantum proferre folia malo Cotoneæ minora: Nec scribit tenuia habere folia, vt vulgus habet Diosc. lectio. Siquidem, vt palam est, Arbuti folia insunt Laurinis & Ilignis crassiora. Proinatur igitur Matthiolo, quodd legimus apud Diosc. cum apud Orbasiam: cui ad stipulatur etiam Socrates, idque ex lectione & autoritate Theoph. veram antè dictum.

Amat. Arbutus loca montana: Hinc Aristoph. apud Athen. In montibus hinc Montem lian iscentur per multa. Crescit & in soluis Italix & Gallix Narb. Abundat Præstis, Sienæ, & Genæ, circa Neapolim & in montibus Euganeis. Copiose, inquit Clusius in cultis Bætiæ & Lusitanix inter Myrtum, Cistum, & alios frutices, semperque ferè, aut florens, aut fructu onusta conspicitur, imò interdum & flore & fructu abundans: solet enim degido flore novum gerimen extremæ ramis pro-

ferre, in sponsonem alterius floris. Idem testatur apud se [in Belgio] creuisse ex semine, & nonnullis in scilicet ali, & cum aliis perpetua fronde virentibus diligentissime seruari. Scribit Bellonius in montis Athos, tantoperè præcis celebrati, vallibus vicinis, Arbutos [qui vtplurimum aliis locis fruticent] in vastæ magnitudinis arbores euadere. Speciatim etiam prænotat in ylua Aigremont dicta, propè Monspelium, in montibus Calcaris fructum ferentem & florentem simul obseruamus mense Septemb. & Oct. Lugduno, & Monspelio, accersitas arbutusculas in hortos Sentgardianum & Montb. E.C. VVirtem plantandas curauimus. Luteæ & Bononiæ quidam magnos in hortis aliquando colebant. Creuit Camerario ex semine intus latente, in ipso fructu, non ex paruis granis, quæ fructui, vt fragis exterius adherent. Floret potissimum mensibus Julio & Aug.

Obseruata etiam florere Septembri, aut etiam tardius: postquam integrum annum fructum detinuit atque concoxit, tandem maturat.

Arbuti fructus Dioscor. dicitur esse, hoc est, in esu acerosus, vel, vt alii vertunt, velut poleas linguæ offert, ventriculo incommodus, & capitis dolorem inducens. Plinius ait Arbutum fructum ferè difficilem concoctioni, & stomacho inutilem. Gal. eadem dicit quæ Diosc. & præterea, arborem cum fructu qualitatis esse acerbæ. Et alibi: vitare oportet non solum in dolore capitis per consensum stomachi oborto, sed omnibus etiam aliis, circa caput obortis affectionibus, Arbuti fructus Memecyla dictas. Et rursus alibi, quæ glande Quercina ad omnia est deterior, exiguum quidem habent alimentum, verum pauci sunt succi, & stomachum lædunt, ob id suum sunt pabulum, & eorum quidem non domesticorum, sed qui vitam in montibus degunt: his enim nutrimentum ab his & similibus, fructibus plurimum accedit. Iam suprà ex Athenæi sententia diximus, eum qui plures septem Arbuti fructibus comederit, capitis dolore vexari. Mihi sanè speciatim [Balthus] quoties comedi, dolorem causarunt ventriculi, Clusius annotat se longè plures quàm septem ab aliis deuorari obseruasse, cum per Bætiæ & Lusitaniam proficisceretur, & semel multos edisse sine ulla noxa. Verum quidem est non esse adeò grati saporis velut fraga, sed interim dulci, cum proprio & peculiari quodam gustu acerbo, quem vix exprimas. Quod si vim habeat capitis dolores mouendi, necesse fuerit eam esse ab occulta aliqua proprietate potius quàm manifesta: nisi fortè quibuscumque ventriculum molestando etiam caput in consensum rapiant per accidens. Scribit tamen Amatus, hunc fructum non ita notum in Hispania provenire, quum eum multi audire, quum par sit, comedant, & tamen in nullum corporis documentum incurrant: idèd & à tenui fortuna hominibus admodum expeditus, Vlyssipone, & aliis quibuscumque locis venalis à mulierculis in foro proponitur. Idem Amatus de Arbuti foliis & floribus aquam vitæis organis elicit tradit, eamque seruari tanquam sacratissimum aduersus pestem & venena antidotum. Et Rosellus præsentat radices Arbuti aduersus pestem. Eam verò aquam statim ipso morbi initio propinandam. Curtio adstringendi vi pollet & arbor & fructus. Folia etiam Coriariis expectantur, & hædis quoque teste Virgilio. Fructu etiam delectantur Turdi, & Merula, quo fit, vt hoc illicio, hyeme visco, retibus, aut aliis decipulis facile capiuntur. Ex ligno carbonem optant sunt, quip-

Tempus.

Temperamentum & vicia.

Stomachus.

Cap. dolor.

Sui cibum.

Dolor ventriculi.

Folia. Floret. Aqua. Potest venena Radix. Tempera. Coriariis. Arbuti. Lignum. Carbonem.

pe

pe solidissimi, viles ad argentum excoquendum. Arbutio palci apes supra ex Virgil. dictum. Apud eundem discimus Crates olim ex Arbutio fieri folitas cum ait: *Arbuta Crates & Myrica Van. lachi.* Alii legunt Vallus.

ADRACHNE THEOPHR.

CAP. XIX.

Descript.



Comato facie proximè accedit Adrachne, ideo eiusdem historice immediate subiicienda imitatione Theophrasti. Nobis verò quia foliū tantum est, & ramulū visus apud D.C. Bauh. inferunt hoc loco descriptio Doctissimi Medici Hon. Belli, apud Cretenses Celeberrimi, quam Chrysus proponit his fere verbis. Potulaca seu Adra-

chne Theophrasti, fruticis potius, quam arboris modo prouenit: perpetua fronde vitet, foliaque habet Laurinis adeo similia, ut solo odore dignoscantur: nam Adrachnes folium odore caret: caudicis & ramorum omnium cortex adeo laevis, rubens & splendens est, ut corallii ramū esse videatur. Aestate rumpitur cortex, & in tenuissimas bracteas decidit, quo tempore neque rubens, neque splendens cernitur, sed medium quemdam inter pallidum & cineraceum colorem acquirit. Florem & fructum his, ut Arbutus profert, & hanc quidem adeo similem, ut alterum ab altero nullo modo dignoscere queas. Dissert tamen arbor huc ab Arbuto: quoniam tantum prouenit in montibus, neque folium serratum habet, neque corticem caudicis scabrum. Ligni materies durissima est, fragilis tamen, quia flecti non potest. Folium verò quod habemus, substantiā quidem ipsa Lauri folio simile est, sed figurā subrotunda, & altera parte, nempe dorso scabra, & quodammodo ad incanum vergente, opposita leui & splendicante. Nerviū medium seu costam fibræ utrinque laterorum ordine quodam stipat, nec tamen ad folii ambitum vsque excurret. Pediculus longiusculus habet, & veluti ex prædicta costaque fibrarum concursu compaſcitur. Sed operæ pretium est eius pouissimum audire verba, qui primus hanc arborem descripsit. Sic autem ait Theophrast. Virent perpetuo ex syluestribus Adrachne, [vulgata exemplaria *adrachne* habent: priorem tamen lectionem etiam probant Hon. Bellus & Clus.] Arbutus &c. Et mox: Adrachne & *gaza* [Gaza verut Vnedo, forte legit *gaza*] folia inferiora amittunt, summi autem rami (nam assidue nuntius gignunt) semper virent. Adrachne quoque folio Arbuti [vulgata *adrachne*] similis est, magnitudine haud procerā, cortice albo, & circumrupto folio. (vulgata *adrachne*) Fructum Arbuti similem

parit: maturatur primus cum vna dulcescit, postea cum floret. Bis enim fructum dare videtur, excepta Adrachne, quæ tamen & ipsa, vehementius pressa, aut germine luxato, moritur. Itaque verum forte, excepto Sabere, dixerim: hanc enim & iuuari potius, cortice detracto, assueuerant, scilicet tam externo, quam carni proximo, sicut etiam Adrachnem. Geminare incipit cum Vrbani arboribus, solum habet simile Malo Medicæ, & penè æquale. Plin. verò sic de ea tradit. Adrachnen omnes fere Græci portulacæ nomine interpretantur, cum illa sit herba, & Adrachne vocetur, vnius literæ diuersitate. Ceterum Adrachne, est syluestris arbor, neque in planis nascens, similis Vnedoni, folio tantum minores & nunquam decidente: cortice non scabro quidem, sed qui circumgelatus videri possit, tam tristis aspectu est. Bisera est æquæ ac Apharce. Quando autem sit circumgelatus, apparet eum legisse *adrachne*, cum potius legendum sit ex Theophr. *adrachne*, circumruptum: quam etiam lectionem Gaza sequitur & Hon. Belli observatio confirmat.

Idem Plin. alibi: Cortice in orbem detracto, non offenditur Adrachne, si non simul incidatur & corpus. Hermol. libere tradit falsò Adrachnen Portulacæ nomine quosdam interpretari, cum illa sit herba & Adrachne vocetur. Idem tamen Hermol. lectionem Plinii, quæ legitur *adrachne*, hoc est, circumgelatum veniorem putat. Sed non est amplius putandum, quâdo experientia Theophrasti veniorem dicit, ut patet ex observatione Belli. Corticem quoque candidum Gaza reddidit, quia *adrachne*, vix existimat Hermol. legere. Idem Hermol. verò, id est, squarrosū, labrumque legit, Plinium secutus. Nec omittenda hoc loco alterius loci apud Theophrast. corruptæ emendatio: quo loco legitur, *adrachne*, *adrachne*, *adrachne*, &c. emendandum *adrachne*, ut intelligatur *adrachne*: vel indandis casu sequentes voces legendæ, & ita scribendæ: *adrachne*, *adrachne*, *adrachne*. nam ex eo loco & de cortice loquens Plin. dixit: Quibusdam etiam cadit, ut Malo Vnedoni: quare malè transtulit Gaza inquit, Quibusdam etiam cadit, ut Portulacæ, Vnedoni, Arbuti. Vbi verò Theophrast. habet Malum Medicam siue Persicam [quam & Plin. Assyriam] folio esse *adrachne*, vel ut in vulgatis legitur, *adrachne*, Plin. lib. 12. cap. 13. habet Vnedonis. Et quid quæso Portulacæ (quæ *adrachne* est) vel cum Malo Medica, vel cum hac arbore communis? Quod aduertens Gaza Adrachnen apud Theophrast. Portulacæ reddidit, eruditus, ut decernit Hermol. quam feliciter: quanquam equidem non videamus quid eruditionis in ea voce esse possit, quæ nusquam apud nullum mortaliū scriptorem extet, nisi quis dicere velit iuris retributionē Pythagoricam Gaza fuisse toguli. Etenim quia in Adrachne *adrachne* demptū animaduertit, quod habet Adrachne: Portulacæ ab ipso conuersa, nec malè æquum duxit, ut seruat lectionis etiam literulā aliquā careret dictio Latina. Idem Potulacam dixit Adrachnen. Portulacam, Adrachnen. Aded Pythagoreorum illud *adrachne* seruari nouerat Gaza, etiam in vocabulorum dispensatione. Magis nobis placet vox Adrachne, cuius specimen quoddam etiam nunc hodie extat in Creta, vbi Andreeles vocant, si Dalechamp. credendum. & *adrachne* tamen Cretensibus tū Vniuersa fere Græciæ, & Bello, ut equidem par est. Sic & apud Theophrast. vbi quæ de arbore agit, pro *adrachne*, legendum *adrachne*.

Portulaca arbor. *Andrachne.* *Anguill. m.* *ym.* Quamlectionem etiam sequuntur Ruellius; Curtius, Cornar. Constant. Scalig. Dalech. Gorzrus, Bellonius, Clusius, & Bellus. Quamvis Anguill. in epist. scribat Andrachnen siue Portulacam arborem Theophrasti, quæ hodie in Græcia corrupto vocabulo dicatur *αἰσχάρα*, eandem esse cum Arbuto, Dioscor. diuersam facit ab Arbuto Theoph.

Verum cum ex precedentibus satis pateat, quid sit Arbutus Diosc. quæ eadem cum Arbuto Theophrast. non opus hic pluribus Anguillaram conuelleret, si rectè legeretur apud Theoph. Andrachne, etiam ille ferri posset, dicens Arborem Portulacam.

Dodon. *Αἰσχάρα* quædam arbor syluestris est: nondum enim ei innotuerat. Ex Plinio tamen facile didicisset non temerè Gazam quoque Andrachnen legisse, us nempe locis, ubi Portulacam reddidit. Ceteris Europæis linguis, hætenus ferè incognita arbor.

Locus. Frequens prouenit Andrachne in Creta, montibus Leucis, & alibi inter saxa, teste Bellon. In Helicone etiam frequentem esse Pausanias tradit, ubi suauissimum potum ferunt. Eandem multis locis in sua peregrinatione obseruauit Bellonius: scribitque iter facienti Halepo Antiochiam, in tumulis nascentem sibi conspectam, cuius ramos suo fructu munitos, quilibet eorum, qui comitabantur, abstulerit, ut in itinere ederet: maturus enim erat, elegantique suo colore singulos ad edendum inuitabat. Racematim autem coherebat, magnitudine & colore fructus Rubi Idæi, molliorque, ut Arbuti fructus. Eadem, ut & Apparea, anno biferà, priorem fructum perficit [inquit Theophrastus] cum variat uua, [Plinius, cum pubescit] alterum cum floret uua.

Vitis. Lignum eius mulieribus ad opus textorium utile, authore Theophrast. H. Bello verò teste, rusticis Cretensibus igni struendo seruit, & ad verticilla conficienda mulierum suis appendenda. Et conem eiusdem diligentiz debeamus Clusio transmissam.

CHARAMEI ACOSTÆ FOLIO PIRI.

CAP. XX.



Genera duo descriptio

Folia Piri.

Sapor.

Eti Piri sit *foliis exotica* hæc arbor, tamen quia perpetua fonde viret, placuit Andrachnes historiz ex Acosta subicere. Huius arboris duo sunt genera: Vnum Mespili magnitudine, foliis Piri similibus, dilute virentibus, fructu Auelanis simili, admodum flauo, eleganter in multos angulos desinente, sapore Omphacii, &

grata aciditate, quem vel immaturum vel matu-

rum, vel sale conditum vulgariter edunt. Alio-
rum genus eiusdem est magnitudinis, foliaque
habet Miso minora, fructum verò priore maio-
rem: cuius decocto cum santalis aduersus febres
venunt Canarici Medici. Crescit in sylvis &
montibus procul à Mari diffusis.

Charameis vulgò, vocantur in Canariis Decan, Arzauali, Arab. Persis & Turcis Ambela, authore Acosta, ex quo & Hist. Lugd. habet nomine Charamei.

E primi generis, quodd secundum aquas nascitur, arboribus, seligunt Decanini & Canarini eam, quæ longiora marinis abest. Huius radices corticem [cui lacteus succus inest] quatuor digitorum longitudine sumentes cum drachmæ sinapi probè terunt, & asthmaticis exhibent: valenter enim purgat per aluum, & vomitum. Quod si immodica subsequatur euacuatio, Carambolas fructum vnum viridem edunt, vel acetum Canarini haustum sumunt [quod nihil aliud est, quam aqua decoctionis orizæ vno aut altero die reternata, donec acefeat, Cananinis acetum vices præbens, & medicum vsum præstans.] & si profluuium non cessat, ægris caput frigida ablunt. Magnus est horum Charameis vsum in illis Prouinciis, & ad orexim ciendam edere solent immaturos, maturos, salitos, vel sale & aceto conditos, ut antè dictum, aut aliis edulis quibus aciditatem conciliare volunt, admiscant. Sed quis nostris delicatulis in nimio profluuiò ansit caput frigida lauare. Aut quæ huius medelæ possit esse ratio?

IAMBOLOINS INDICA.

FOLIO ARBVTI.

CAP. XXI.

Iambolins incolis [inquit Garcias] nascitur *Descriptio*
[spontè frutex quidem in agris Indicis] Myrti effigie, sed foliis Arbuti. Fere is fructum maioribus
Oliuis persimilem. Sed gustu admodum adstringentem. Muria conditur Oluarum inodo. Ceterum neque hic fructus, neque laca admodum salubres ab eius regionis incolis æstimantur. Eiusdem arboris historiam & Acosta refert. Huius arboris materies, inquit, cortice integitur ferè eisdem cum Lentisci cortice, folia Arbuti similia habet, sed Myrti virentis foliorum sapore: fructus Cordubensibus Oliuis maturis similes, adstringentis gustus, & sauces contrahentis. Nul-
lum vsum in medicina obtinent, sed eduntur cum
Orizæ cocta: nam appetentiam excitant. Vulgus Iambolins appellat, quo nomine & Hist. Lugd. ex Acosta proponit. Clus. Iambolins vertit.

CARANDAS INDICA,

ARBVTI FACIE.

CAP. XXII.

Carandas dicta Indicis Arbuscula est Arbuti *Descriptio*
magnitudine, foliis similibus, copioso flore, odore Periclymeni: fructu exiguis foliis persimili, nigricante per maturitatem, gratissimo vuarum sapore, ex quo à nonnullis vinolus succus exprimitur. Fructus autem virens magnitudine est nucis Ponticæ cum suo putamine, interdum maior, succum nonnunquam exstillans viscidum & lacteum. Editur à nonnullis fructus maturus cum sale. Solet tamen, cum viridis est, muria aut aceto

Sapor. admodum acido. Inuenitur interdum fons nigricans [qui color maturitate conciliatur] nec addo aculeus, uti superior, qui tamen non minus, quam ille intus rubeat. Multorum palato sapidus est hic fructus, meo vero [inquit Garcias] minime, ob nimiam aciditatem. Eo tinctores vtuntur. Cortex vero adseruatur, atque mari alio transuehitur, aceti conficiendi gratia: quod à Lusitanis quibusdam etiam in Lusitania factum est.

Placuit ita hæc exotica hoc loco inferere, tum quod poma quoque ferrent, tum quod ad antedictarum arborum, maximè vero Arbuti naturam & similitudinem quodammodo accederent.

DE MALIS MEDICIS SIVE PER-
SICIS, QUAE ETIAM CITRIA DI-
cuntur, Veterum & Recentiorum
sententia & differentia
in genere.

CAP. XXV.

*Infructu
vario.* NE eadem sepius repetere, & Veterum plati-
tis lectorem in diuersis locis obtundere co-
gamur, præsertim quod difficilis & tetrica sit il-
lorum dogmatum ad nostri seculi obseruationes
accommodatio, lubet ea summam proponere.

*Locum na-
talem.* De his itaque Theophrast. primum consuli par-
est. Omnino, inquit, plaga ad ortum spectans at-
que Meridiem, ut animalia, ita & plantas præ ex-
tens locis peculiare terre videtur, ut Media re-
gio & Persis, cum alia multa profert, tum quod
malum Medicum & Persicum vocant. Habet hæc
arbor solum fructu, & penè æquale Adrachnæ
[non id præterit ut vulg. habent, quid enim Malo
Medicæ tum Pomulacæ? Ridendi verò etiam ii,
qui præterit id est, araneorum telæ, si diis placet,
simile, legendum censent.] Aculeos quales Pirus
[dicitur] aut Oxyacanthus, sed leues & admodum
validos. Pomum alioqui non manditur, sed odore
præstat, quemadmodum & solum. Ipsum verò
Malum vestibulis interpositum, inoffensas [dicitur]
conferuat. Vtile etiam, cum lethale quis pharma-
cum hauserit & odoris halitum commendat: quip-
pe si quis interna [dicitur] vid. num legendum
est. Nam cuticulis gustu potissimum, non pul-
pe, aut seminis, halitus laudabilis redditur] in
iure aut alio aliquo humore concocta in os ex-
presserit & sorpserit, suauem reddet halitum. Semen
exemptum, Vere sulcis [dicitur] feritur di-
ligentissime cultis, rigatur deinde quarto aut
quinto die. At iam mascula reddita, transplan-
tatur rursus in molle rigumque solum, nec valde
tenue: tale enim amat. Ferè poma omnibus ho-
ris, aliis cadentibus, aliis florentibus, aliis matu-
rescentibus. Floribus hic tantum fructus nasci-
tur, qui, ut dictum, [in lib. i. Hist.] veluti scapum
aut stylum quandam extantem, [colum vocant]
in sui medio habent: Quem quæ habent, secun-
dæ: quæ verò non habent, infecundæ sunt. Serit-
ur etiam fistilibus in vasis perforatis, veluti Pal-
ma. Hæc ut dictum, Persici Medicæque peculia-
ria sunt. Mali Medicæ germinare, florereque si-
mul, aliis tamen atque aliis sui partibus possunt,
nec ided maiorem quandam & ceteris magis pe-
culiarem sortiuntur facultatem, siquidem id agere
possunt perpetuo. Hæc Theophr. de Malo Medico.

*Ad reme-
dia ha-
bitum.* Dioscor. & Plinius præcipue in dextera, & ad equina,
Romanæque, omnibus nota sunt. Est enim

Sapor. *Cultura.* *Medica
gratia. Per-
sica. Garro-
pina.*

mnis anni temporibus fructifera, alii æque aliis
malis vicissitudine perpetua sibi inuicem succre-
scentibus. Ipsum verò Malum oblongum est, tu-
gosum, aurei coloris, cum grauitate quadam o-
doratum, semen habens Piro simile, [dicitur seminis.] Persicum.
Sic illo. At sane vix ullam, immò nullam penitus
videmus similitudinem seminis Citiorum, aut
eius differentiam, cum Piri seminibus. Istud etiam
quod paulò antè Theophrast. dixit, Pomum non
mandi, non leuem nobis præbet coniecturam eius
Mala Medica seu Persica esse Aurantia nostra, ut
specialius declarabitur postea suo loco.

Medicorum dictorum Malorum aliquos
meminit Varro & Palladius: Ille Libycæ citium
nominat: hic specialiter & Persicum & Citium
& Assyrium, atque de hoc particulatim sic ait: Al-
ferit Martialis apud Assyrios pomis hæc arbo-
rem non carere, quod ego in Sardinia & in terri-
torio Neapolitano in fundis meis comperi, [qui-
bus solum & ætulum tepidum est & humor exun-
dans] per gradus quoddam sibi semper poma suc-
cedere cum maturis se acerba substituant, acer-
borum verò ætatem florentia consequantur, or-
bem quendam continuz fecunditatis sibi mini-
strante naturâ. Ergo Malus Assyria etiam à re-
gione dicta, uti Theophrasto Persica & Media ab
eodem.

Diphilus etiam Persica pruna vocat. *Persica
pruna.*
Anistophanes verò Grammaticus à Lacedæmo-
niis Oxymela Persica à sapore, ut coniectura est,
acido, quibus & deos coronent. Probus autem
in Media Rhododaphnen vocari scribit, propter
Lauri similitudinem, ut suspicatur Curtius & na-
sci in Italia, non tamen eiusdem facultatis. *Oxymela
persica.
Rhodo-
daphne.*

Eandem & Virgilius celebra. ut nomine Felcis
Mali Medice, hoc carmine:

Media fere tristes succos, rardumque saporem.
Felcis mali: quo non præsentem ullum
(Pocula si quando, sana iussit, & iussit, & iussit.)
Misenerumque herbas, & nonnulla verba.)
Auxilium venit: ac membris agit atra venena.
Ipsa ingens arbor, faciemque simillima Lauro:
Et, si non alium lare iactaret odorem,
Lauro erat: folia baud ullis labentia ventis:
Flos apprimere tenax: animas, & olentia Medis
Ora sonent illo, & sensibus medicantur anhelis.
*Felix ma-
lum. Medea.
Lauro folio.
Semper ve-
rens.
Flos tenax.
Citius.
Thya.*

Oppius apud Macrobius Citium etiam dicit vo-
catam arborem putat, & de illa versum hunc Ho-
meri exponendum:

Θύα τῃ Νύκτι προῖον ἔσθῃσιν ἐπαχύνει.
Abi Thuion pomum dicit: & dicit eidem, non re-
tinetur, Ruellio: sed id quoque de ligno potest
audiri. Quidnam verò id sit, cuius eius florem ap-
primere tenacem esse Virg. scribit, habes diligenter
explicatum à Victorio, c. 3. 2. Obseru.

Fructum huius arboris aureum Malum dictum
volunt, inquit Scal. cuius meminit Orpheus, cre-
pundia Bacchi & suppellectilem infantium enu-
merans:

ἄνθος χρυσοῦς, ὃν τὰν καὶ χρυσοῦς ποῖα,
ἡνία τῇ Χρυσῇ καὶ τῇ ἰατρικῇ χρυσοῦς ποῖα.
De Citro Pomos, inquit Athenæus Deipnoso-
phistis oborta est magna quaestio, an eius mentio-
nem Veteres fecerint: Myrtulus enim nos id per-
serutantes, velut ad capras syluestres [dicitur]
[dicitur] quasi rem obscuram, & inuentu
perquam difficilem inuestigaremus: vide Eras. in
Adag.] relegans, inquit: Hegesandem Delphum
in suis Commentariis eius dictionis meminisse,
sed locum in præsens memoria non tenere. Huic
ingrans Plutarchus, At ego, inquit, assero,
quod non Hegesandrum ea voce sum fuisse, per-
lectis,
*Citium
malum.
An Citro
mali præ-
ter memo-
riam fecerint.*

lectis, venientem, talis eius Commentariis: cum ex amicis quispiam alius ita se habere affirmaret, cuiusdam scriptoris non incelebris adnotationibus & scholiis adductus: quare iam tempus est, testem alium tibi, o Myrtille, perquirere. Tum *Emilianus*, iubam, dixit, Mauritaniz regē, virum doctissimum, suis de Libya cōmposita citri mentione scripsisse apud Lybias id vocari *Thiophrastum*. [Medica & Persica Mala hanc *Theophrastus* vocat: Medica *Virg. Dal.* Hinc *Herculem* in Græciam transtulisse, aureaque vocata eius arboris Mala, ob coloris speciem. *Aesclepiades* lib. 60. Rerum Aegyptiarum memorie prodidit in Iouis & Ignotis nuptiis arborem illam à terra edita fuisse. Hos sic loquentes *Democritus* commodum intutus: si quid horum, inquit, iuba narrat, valeto cum libris suis Libycis, prætereaque *Hannonis* erroribus (Cathaginensium Ducis, iussi ambitum Africæ explorare Paniceis rebus florentibus lux navigationis *Commentaria* ille scripta reliquit: *Dalechampsius*) ego veto pernego Citri non exte apud Veteres: at ipsas res descriptas proflus ab *Eresio Theophrasto* in plantarum historia, credere me cogit, Citrium esse quod oratione sua ille significat: Verba *Theophrasti* antea citata sunt. Variat vērò *Athen.* in eo vulgata locutione, quod folium Mali Medicæ non tantum folio *Adrachne*, sed etiam *Lauri & Nucis* Simile dicit, quod apud *Theophr.* non legitur. Præterea *Athen.* rationem reddit, cur veneno haui: confectum, quia potus ē vino succus, alium deturbat, & venenum exigit, quod & cinum non habetur in *Theophrasto*. His subdit *Athen.* *Theophrasti* verbis impulsus, & ea perpendens, quæ scripsit de odore, & foliis, designatum ab eo fuisse totum malum, quod Citrium vocamus. Vestrū autem neminem in aduersionem trahat, quod ille prodidit, pomum non mandī, quādoquidem aduque memoriam aurum nostrorum nullum comedat, sed cum vestibus in arce reponēbatur, ut res quedam ingentis pretii, & thesauro digna. Quod autem ex Asia superiore (Media, Persia,) plaga in Græciam tenera stirps ea descendit, scriptum à *Comiciis Pœtis* inuenitur, qui de ipsius *Pœtis*, cum aliquid dicunt, de Citris Malis videntur id tradere. *Antiphanes* in *Bœotio*:

A. De opifinis quidem flatum est quidpiam apud eos dicere, Tanquam insatiabiles: sed hac accipe, b. virgo, Mala. B. Pulchra sane A. Pulchra quidem, d. b. Nuper semen hoc peractum Athenas, à magni Persarum rege. B. Ab Hesperidibus credidit, si mihi Lusi ferat propitia sit: Aurea ha Mala triasse in quibus Tantum modò. A. Paucum est quid pulchrum, & vobis in hunc.

Eriphus in *Melibœa* præpositis iam illis verbis, *Antiphani* stylo ac elegantia maxime propriis, subdit: Et vbi.

In honore: pro his obulum, quod malum non est.

Impensum numero: Rationes postego suppabo.

Hic si quis reluctetur, & quod Citrium vocamus, locis à me citatis indicatum minime fuisse contēdat, citiora testimonia proferat, quibus sententiam suam tueatur. Phantas tamen *Eresius* inicit nobis suspicionem, Citrium à Cedro [sive Cedro] tanquam Cedrium, nominatum fuisse. Cedrus enim, velle scribit, libro 7. de plantis, citra folia spinas erit: id autem in Citria malo videri, nemo est qui ignoret. Athenzum tamen putant quidam apud Phaniam hæc recte non le-

gisse, idēque fuisse esse coniecturam illius: meliorēque esse hanc lectionem, utpote quæ, nō autem vel *scilicet* ut *scilicet*: ut sensus sit, foliorum loco spinas habere Cedrum, quod est de oxycedro verissimum. Sed si nostra Citrus vel Malus Citria est genuina antiquorum, recte ab *Athenzo* dictum: *scilicet* ut *scilicet* ut *scilicet*, hoc enim (ut recte *Dalechampsius* & *dicubi Scal.* annotant) proprie significat, foliis minime aculeatis, spinas in ramis aculeatis exterre, quod de Cappari & Tribolo dicit *Theophrastus*: & nos æque in Citris. Medicis ac Aurantiis malis nostris videmus. Quid si quis dicat Citrium rectius deductam à Cedro, propter odorem, idēque dictam Cedrium? Sed nihil astruimus.

Videamus potius quid *Plinius* de his tradat. *Peregrinus* [inquit] & *Gerasi* Persicæque, & omnes quorum Græca nomina aut aliena: in præsentia exterris persequuntur, à salutari maxime orsi. Malus Assyria, quam alii vocant Medicam, venenis medetur. Folium eius est Vnedonis, intercurrentibus spinis. Pomum ipsum aliis non manditur: odore præcellit foliorum quoque, qui transit in vestes vna conditus, arcetque animalium noxas. Arbor ipsa omnibus bonis pomifera est, aliis cadentibus, aliis maturefcentibus, aliis vero subnascentibus. Tentare gentes transire ad sese propter remedii præstantiam fidelibus in vasis, dato per cavernas radicibus spiramento: qualiter omnia transitura longius, feri arctissime transferrique meminisse conueniet, ut semel quæque dicantur. Sed non nisi apud Medos, & in Perside, nasci noluit. Hæc est autem, cuius grana (cortice *Dalechampsius* & rectius) Parthorum proceres incoquere diximus estulentis, commendandi halitus gratia. Nec alia arbor laudatur in Medis: & Citrus arbor, à Græcis Medica dicitur. Mirum tamen cum *Plinius* iam adducto loco salutarem maxime dicat Medicam arborem, (Citriam siue Assyriam utque intelligens, ut & iudicat *Dal.* & verborum series ipsa satis insinuat) dicere Malum ferre execratum aliquibus odore & amargitudine, aliis etiam expetum, domos etiam decorans, nisi eadem id licentia fecerit quæ *Virg.* de eadem dixit: Media fert tristes succos & c. ut paulo ante dictum. De eadem quoque scribit *Macrobius* ex *Oppio*, in libro de sylvestribus arboribus, his verbis: Citrea item Malus, & Persica altera generantur in Italia, & Media. Et paulo post, de Citro loquens, ait: Est autem odoratissimum, ex quo interiectam vesti, tincas necat. Fertur autem venenis contrarium, quod tritum cum vino purgatione virium suarum bibentes seruat.

Vides hic [ut ille ait] & Citrium vocari, & omnia signa poni, quæ de eo *Virgilius* dixit, licet nomen citri ille non dixerit. *Seruius* tamen, *Appuleius* in libris, quos de arboribus scripsit, citans, aliud arboris genus citrum esse ait. Nec *Solino* indictum citrium.

Et *Galenus* [inquit] *scilicet* ut *scilicet*, inquit, Malus Medica, cuius fructus non amplius Malum Medicum, sed ab omnibus citrium nuncupari adsolet. Narrat *Pamphilus* in linguis, citrum apud Romanos appellari.

Hæcenus Veterum placita de Medica, Assyria & Citra Malo, earumque fructu potulimus, verum quamnam intelligant ex citris aut Medicis hodie nobis vocatis, nondum quis temere concludat, quāvis ad nostra citria magna satis bene accedat, quæ tantum abest, ut hodie non comedantur, ut de suis tradant Veteres, ut ea hodie præ cæteris omnibus in maximis deliciis habeantur: ut illi, si

Malus Assyria & Medica

Citrum arbor

Citrea Malus, Persica Malus

Citrium

Malus Medica, Malum Medicum, Citrium

Aurantium, indicum, Veterum placitum

ad hoc respiciamus, de Aurantiis Pomis videantur intelligendi, nisi quis malis probare rationem Atheni, non idem abstinuisse Veteres à Citriorum esu, quod non fuerint edulia, sed quia in alium vsum, tanquam rem magni pretii, potius adferuanda duxerint. Hodie faucibus & stomacho omnia prostituta, etiamque margaritæ & aurum, si modò iusticerent. Manet tamen ea difficultas ex Diosc. quia semen Pini Citromelis inesse scribit: in qua comparatione vel falli, vel sanè licentiosius pronunciare potuit, nisi mendum sit in Codice.

An verò Aurea vel Hesperica mala cognita fuerint Columellæ & quo nomine haud obuium iudicatu, meminit ille quidem Aureorum malorum ad Hesperidas in cap. lib. 2. de re rust. Sed longè alio significato per aurea enim mala secundum antiquam consuetudinem, Capras & Oves quas Hercules in Græciam exportauit intelligi scribit. Ea enim inquit, sua vocè Græci appellauerunt *μῆλα*. Habes ergo Aurea mala quaternis antecedentia pedibus.

Sed quid Recentiores quoque scribant nunc videamus.

Ac Hermolaus quidem nouas nobis inlicit difficultates. Nam is, postquam ex Iuba dixisset, primum Hesperidum & Hespericum malum ab Hercule translatum in Græciam, & Aëreum malum vocatum, addit: sibi videri de iis Virgilium intellexisse, cum dixit. Aurea mala decem: [sed hæc opinio refutatur cap. de malis Cydoniis.] Nuptiale pomum intelligi hoc volunt, qui editum à tellure fabulantur, nuntiato Iouis & Iunonis connubio. Non mandebatur [inquit idem] pomum Theoph. ætate, sed sic Plinii quoque, [vt arbitror.] Plutarchi certè auctorum memoria gustabat nemo, [vt iam ex Athen. dictum,] Nunc à Palladii ferè temporibus promiscuum expetimus cernis.

Quamquam Apuleus negauit eandem esse malum Assyrium siue Medicam, quod Citrus exiguum esset genus arboris, Medica verò, vt Maro scribit, ingens.

Pamphilus Citrum Cricum à Romanis etiam dici, parum peritus homo scripsit.

Nunc translaticia & triuialis ferè arbor, vt pluribus generibus Citrea Italiæ ferè tota geminant feliciter, quamcunque imaginem reddentia. Hæc ex insitione Mali quoties proueniunt Citromela propriè dicuntur ab aliquibus.

Mensis Citrez Veteribus & Plinio decantata, præsertim Ciceroniana, non fuerant ex hac Citro decipiuntur Grammatici, quicunque id arbitrantur.

Plinius: Alia, inquit, [Citri] est arbor eodem nomine nullum ferens, exaceratum aliquibus. Quod & sensisse Macrobius videtur: hodièque Mauritanii malum Medicam, & pomum eius *Arrogi* vocant, à *Tragete* vocabulo parum deslexo: alioquin *μαρτυρία*, non, quia mandi posset, sed *μαρτυρία*, quia mandari non possit, appellatum censuerim. Malum quoque Medicam in Mauritania fuisse certum est, cum plena sint Poëtarum omnia volumina.

Marcellus apud Antiquos non Cedromela sed Citromela, quasi Citrea mala legendum esse vult: nihil enim Citro esse cum Cedro: & à Romanis Citria hæc vocari, iam pridem receptum esse.

Non sine ratione dubitat Manardus, an Theophrastus per mali Persicæ & Medicæ arborem Citra ferentem intellexerit, an vocata Arantia: nec sciri hoc possit, quæ proceritas arboris non

ineminit, quæ his magna, illis ita parua, vt arbutus potius videri possint, quàm iustæ arbores. Sed nec figuram pomo dedit, quæ in Arantio orbicularis, in Citro oblonga est.

Virg. in Georg. & versibus quidem supra positis, sub Medicæ arboris nomine ferentem Arantia descripsisse videtur. At Diosc. eodem nomine vsus, non eadem cum Virgilio, hoc est, Arantium, sed Citrium intellexit. Gal. proculdubio intelligit quod Dioscor. carnem quippe edi dicit, sicuti corticem, quod de Arantio intelligi nequaquam potest, carnem vel non habente, vel si habet, non talem, quæ mandi possit.

Auicenna de Citro eadem scribens, quæ Dioscor. & Gal. ostendit, non de alia re scripsisse, quàm de qua illi.

Ruellius Virgiliana & Pliniana de malo Medicæ scripta, omnia cum Theophrasto conuenire tradit.

Palladii diligentia in Italia primum coaluit: hunc solers imitata posteritas cum Gallis Hispanique communicauit.

Cultus [vt idem ait] mangonium in plures digressit formas, ita vt remissiori sapore vehementiorque item dilutioni saturationique colore differrent. 1. Quæ auri colore relucens Poma *Aurengia* vulgus appellat. 2. Quæ ex viridi in luteum languescunt *Citrea* & tandem Citrula nominant. 3. Quæ ouata specie turbinatur & luteo colore nitent *Citrangula*, priuatim Citrea vocant. 4. Si herbaceo colore virent *Limones* dicunt. 5. Si prægrandia modo Melonum orbiculata facie turgent *Ponteria* vulgò, quæ si cetera, vel potius Citrea poma dicunt. Citrum porro duam generum idem scribit: vnum Cedri, ex qua mensis dedolantur: alterum Citri eius ex qua malum Medicum prodit.

Ac paulò antè ostensum, Cedro vel Cedrio nihil cum Citrio esse commune, & ex illa, non ex hac tabulas parari, vt specialius docebitur suo loco. Quæ verò Veteres de malo Medico seu Persico scribunt, odorata esse, vestes conficere, venenis resistere, perpetuà vicissitudine florere, atque succrescere, de nostrate Citro dici, euidentiùs esse ait Ruellius quàm vt probari desideret. Porro sæpiùs iam citata illa nomina, Medicum malum, Assyrium, Persicum, Citrium, Cedromalum, & Citrium grande & oblongum &c. promiscuè ab authoribus Recentioribus vsurpantur. Sic Cordus, præmissis iis nominibus: sunt huius generis, [inquit] limones, Poma Adami & Aurengia. Habetur ænigmaticum de his malis carmen, quod est:

Medica mala quidem nec mala, nec medica.

Botanicorum diligentissimus Clusius ex Hispanorum sententia sic tradit. Medicorum malorum sunt varia genera: Alia enim Hispanis *Cidras* dicuntur, alia *Limones*, alia *Limes*, alia *Nerantia*, alia *Terrania*.

Quæ Citria siue Cidras fert, Cidrea dicta, breui trunco est, longis ramis firmis, crassis & acutis spinis, foliis magnis, latis, & per ambitum serratis aliquantulum. Fructum fert magnum & oblongum, Meloepomis amplitudinem interdum æquantem, cortice per maturitatem sauescente, densa carne, candida, firma & eduli, nullo ferè interiore succo: odor mali fragrantissimus flores sunt candidi, sæpiusculè forinsecus purpurascetes, odorati. Semper hæc aut flores vel fructu onusta est. Sunt qui fructum nascentem figurinis formis varias figuras exprimentibus includunt, atque ita relinquunt donec finitus maturitatem

Diosc.

Hespericum malum.

Aureum malum. Hermolaus. Nuptiale pomum. Non mandebatur.

Apulei opinio.

Citrum. Pamphilus.

Locus.

Citromela. Mensis Citrea.

Grammatici.

Cicero.

Alia Plin.

Malum Medica. Arrogi.

Malum Mauritanicum.

Cedromela.

Citrula.

Citria.

Aurengia.

Cur diff. citri ex pl. vobis qua sine pippid mala virent. Anst. quædam ex nostris. Virg. cit. Diosc. non idem mal. la. m. d. d.

Differencia.

Aurengia.

Citrula.

Citrangula. Limones.

Ponteria. Citri duo.

Malorum Medicorum differentia Clusio.

Citria descriptio.

terem consequatur: cum demum formas auferat, ut malum natuum colorem adsciscat, iucundo tandem spectaculo.

Limonera Citria seorsimilis est, quam ipsi *Limonera* appellant, cuius fructus minoribus citris pares, oblongi, satis densa carne & multo succo acido præditi, nullis aut perpaucis inens acinis: folia citris breviora, flos purpurascens foris, spinæ minores & breviores, quam in *Limera*. Huius generis reperiuntur etiam dulces, minores tamen, & oblongis *Limis* similes. Audio & eius genus prægnans reperiri, alium suum in unorem in se continens, incola sua lingua *Limones preñados* vocant, verum id genus non est mihi conspectum. Doctus vir S. de Fouat ex Fortunatus Insulis delatus scribebat in Indis sui horti, quem ad me mittebat anno M.D.XCV. & aliud genus se alere totum ferè carnem, quod varias figuras representat, eam ab eadem ab Hispanis *Limones de figuras* appellari. Quartum autem genus omnium maximum conspiciebam Hæz Comitum apud Batavos anno M.D.XCIII. Ill. H. Boiaz Principi de Cuthay, à Doctore uero Bernardo Paludano Medico missum: id enim citri mali grandioris magnitudinem æquabat, corticem verdè munda dentum, & aurum fulgentem habebat: gemmas etiam interiores similes acidis, quàm reliqua genera.

Quamvis *Limonera* runcupant, magno candore affert, granisque habet tenuiores, longos, sitis longis, virentibus spinis armatos, folia per ambitum nonnihil serrata, florem candidum, fructu paulo minus in *Limonera*, oblongiusculum, ubi maturum flavescentem, cortice tenui, ut nil nisi succum ferè continet, citrique acidissimum. Semper flore & fructu onusta conspicitur. Aliud porro eius est genus per omnia ferè simile, nisi spinis caret, vel eas perquam exiguas haberet & alius fructu rotundus esset, summa parte quasi corona aut umbilico insignitus. Vnusque acini seu grana oblonga sunt.

Aurea Malus reliqua huius generis magnitudine superat. Malo vulgari non inferior ferè folio, tametsi humilis interdum reperitur: firmos habet ramos, spinas pæneas & breves, folia viridia, minime per ambitum serrata, flores candidos odoratissimi: fructum, *Nararia* Hispani vocant, maturitate aurei coloris, succo prædictum aut dulci, aut vinoso, aut acido, in quo grana frequentia, rotundiora, quam in Limonibus. Habet etiam hæc arbor sui generis pumilionem, qui insitione vel inoculatione propagatur. Liberabor est hæc ferendis floribus & malis etiam in frigidis regionibus, modò sit curetur.

Eiusdem generis, quod dulci est succo, Hispani apud Christianos (Hispani *las citras* nominant) trās Batum flomen, binas arbores conspexi, que fructum ferebant, carne multo firmiore præditum, Armeniacorum ferè modò, licet similiter Camerulis distinctum & meculentum, ut reliquorum, cuius cortex ut æm carne & succo labilantia mandebatur: cortex color insigniter aureus est, Hispani *Nararia axel* vocant. Aliud insuper genus, cuius succus acidus, vnicum granum consuebat.

Quæ vulgò Poma Adam dicuntur, ea Galli *Puncres*, Bæci *Toronia*, Lusitani *Zambas* appellant. Arbor ipsa interdum humilior est, citrix perquam similis, magna tamen ex parte celsiorem Malum æquat: breves habet spinas, folia limonæ: florem candidum, odoratum, fructu rotundum, triplo maiorem Aurea malo, maturitate flavescentem, cortice inæquali, denso, crasso

& fungosa carne, quæ à nonnullis cum cortice simul editur, succo brevibus folliculis ut & mali Aureæ comprehenso, (in reliquis enim generibus folliculi siue vesiculae succum continent oblongiusculæ sunt), grans subrotundis. Nonnulli *Assyrium malum* vocant.

Ceterum præter *ANTARIAM* malum eduli cortice, decem mali Medici genera apud Hispanos inueniri ex altero Indice, quem anno M.D.XCVI. eruditissimus vir de Simon de Fouat mittebat, intelligebam: accipiebam enim ab illo semina illius quod Hispani *Zambas* appellant, deinde *Limones de carne*, *Limones de figura*, *Limones preñados*, *Limones pures*, *Limones citres*, *Limones dulces*, *Limas dulces*, *Limas agrias*, *Limones de Indis*, vel *Limas del Superador*, quoniam, inquit, ab Imperatore Carolo v. ex Vngaria in Hispaniam primò delata hæc planta fertur, cuius quidem opinio fidem augere videtur, quod ultra cetera mali Medici genera, hæc frigoris patientissima existat. Est autem eius fructus edulis multo suaviore gustu præditus quam *Aurantia axel*, succus verdè eius maximè ad acidum dulcem accedens, ideoque omnium mali Medici generum acidorum suavissimum. Omnium porro folia perpetuò viridia sunt, multique velut foraminibus, si soli obiciantur peritura, insit foliorum Hyperici, iunctura quædam pediculo inhaerentia: sola mali aureæ folia secundum iuncturam tanquam appendices habent.

Corn. Citriorum generis esse & Poma Arantia statuit. Eiusdem generis & Limones siue Limonia mala, omnibus ferè persuasum esse, ipsaque ad citria Hispanos *Limones* appellare. Suspicio tamen est, eum citrum & Limonem vulgò dicta Poma confundere, tantum abest ut differentias tradat, quod se fecisse putat.

Monardes putat Aurantia è Citria, primùm acri vel acida, atque aded inculta, peraratos & acetosos fructus proferente, prognata: sicque & alia citriorum generum insitione multiplicata fuisse, unde reperias tot genera Limonum & alia, quæ citro nec Limonibus conueniant, *Zambas*, *Toronia*, *Limas*, *Limones*, (Nebrassensis vocat cidras, *Nararias*, *Toronias*, *Limas*, *Limones*,) quæ omnia, inquit, nec Prisci cognouerunt.

Et Lacuna: Mancana Medici hisp. quæ sub se comprehendunt *Cidras*, *Limones*, *Limas*, *Toronia* & *Nararias*. Dioscor. cognovit tantum *Citrum*: *Limon*, *Tima*, & *Toronia*: catent propriis nominibus *Citrus* & *Latinis*. Valentia vocant *Nararia*, id est *Aurantia*, *Toronia*, licet *Toronia* sit species diuersa, & *Cidra* satis similis.

Raimundus à Vinario, Malorum Medicorum nomine *Arantia*, *Limones* & *citria* comprehendit.

Sic Turn. Malus Medica, quæ & *Assyria*, & *Citrus*. Angl. *Citron tree*: sub qua comprehenduntur & *Arantia*, Angl. *Orange tree* / & *Limonia* Angl. *Limon tree*.

Dodæ distinguunt. 1. Malum Medicum ac citrū. 2. Medici alterum genus Limonium. 3. Anaranthum aut Anaranum. 4. Assyrium vulgò Ital. *Lemon*.

Lob. & Penz, Cedrus Theophrast. Dioscor. Medica Mala, siue *Cidra* mala: *Arantia*, *Citria*, *Lima* & *Pomum Assyrium*. Antiqui (inquit) à solo Medo Medicum, ab odoris fragrantia Cedrum & Citri dixerunt, quasi Cithyon odoramentum Diuisibandum: tametsi hæc in Africa sit sylvestris & Olbiæ Galloprovinciæ ædè familiaris in afflatu oræ maritimæ: ut sempervirentium lucorum amœnitate & Pomorum fertura perenni nequiquam iniquina videatur.

Assyrium
malum

Medici
mali *genera*

Aurantia

Limonera

Citria

Corn. nat.

Aurantia

Citriorum
differentia

Prisci non
omnes *hæ-*
rum *ans* *Ci-*
tiorum

differentia
cognita

Limon

Lima

Toronia

Nararia

Cidra

Medicum

Limonium

Anaranthum

Assyrium

Citrus

Sylvestris

Citrus.
Limon.
Aurum.

Cassip. sic distinguit. Citrus fructu grandissimo, quem Citrum vocant, aliquando magnitudine Melopeponis. Limon Citro similis. Aurantia arbor Limone maior. Melangula, quam alii Citrangulam vocant, fuit & fructu similior Citro.

Ponzerus ambigit inter Limonem & Aurantium.

Limon.
trunc.

Citrum.
mutabile.


Aug. Gallo, Congenerum fructuum quinque species. Cedri, Limoni, Aram, Pomi d'Adami, Limone fructus minor vulgaris, medius inter Limonem & Pomi d'Adami. Mentat & Limocitri, seu Limoni cedromali, propterea ex iniunctione citri in Limonia: penitus tamen inferiorem Limonias citris, ut specialius docebitur postea. Etiam cum alterius generis Staffegiani dicti, figura mirabilis, arboris minus frugifera, de quo etiam mox.

Hæc sunt Veterum & Recentiorum de Malis Medicis, citris, atque Assyris placita, & differentia, confusè patius, quam exactè distincta [excepit Clus. qui omnium distinctissimè de iis prodidisse videtur] cum omnes à plebisque sub Medicorum nomine & titulo comprehendantur, neque tamen hæcenus pro certo constat, quodnam eorum sit Medicum Theoph. aut citrium Diosc. & Gal.

Proponamus nobis observatas differentias ordine quodam, vulgi nominibus, ut hodie in usu sunt, insignitas. de quarum cum Præcorum collatione quilibet statuatur prout libuerit.

CITRIA MALVS CVM FRVCTV MAGNO ET MEDIOCR.

Descriptio.



Cortex.

Succus.

Arbor.

Folia.

Flor.

Descriptio.
Monard.

ingrata. Arbor ipsa haud magna, foliis Laurino, & tunc to, forammulento. Rami spinis rigidiusculis, flexilibus tamen, & non valde infestis armati. Flos albidus, odoratus, perpetuus, duobus modis progeneratus, cum colo, qui fecundus: qui colo caret, infecundus. Raro hæc arbor fructu caret etiam apud Magnates Germaniæ, ubi colitur. Talem & Cl. Felix Plat. aliquando coluit, qui & fructus maturos, & alios lubnascentes, & flores novam prolem spondentes ostentabat.

Citrus, inquit Monard. [in epist. ad Quad.] quæ mala Citria ferebat. Veteribus nimis est, omnibus nota, omni tempore pomifera, semper prægnans fecundaque, ut unum annorum fru-

ctum habeat: Flores emittit iucundissimos, pomum oblongum, interdum rotundum, aliquantulum rugosum, colore autem, odore gratum. Arbor non multæ proceritatis, folio Lauri consimilis, aculeos habet acutos, vehementes & rigidos.

Curiolus descripsit Cordus his verbis. Citrus arbor est scuticosa, veluti Cotoneus, ramos habet virguli glabræque vellitos cortice, ferendæ ferunt moli valde impares & ad terram pronos, idcirco subiectis per transversum hastilibus, furcisque fulciendos. Folia Lauri similia, densiora tamen, multoque maiora, & ad iuglandis magnitudinem accedentia, oblonga, utrinque acuminata, egregie viriditatis splendorisque, præsertim superne, inferne enim pallidiora existant. Tota hyeme arborem suam exornantia, odoris

acerum, late spirantis, qualis in Melissophyllo sentitur, cum gravitate quadam cinicem amittente. Spinis armatur sub omnium foliorum annexibus, longitudine vncialibus, rectis, acutis, ac viridibus. Flores & virentes gemmarum, calicibus emittunt oblongos, candicantes, & quorum duplex est genus, videlicet sterile & fructiferum. Sterile nullum post se tuberculum producit. Fructiferum vero, præterquam quod à sergo fructus rudimento sibi annexo comitetur, etiam in medio aliud insignis exerit penum colo involutum æmulans, quod Theophr. quoque novit. Fructus

florem sequuntur singuli, longitudine non raro dodrantali, figura ovata, superficie rugosa tuberosaque, colore primum viridi, in maturitate vero aureo seu citrino: nec solum ovata nascuntur figura, tum etiam globosam consequuntur habitum, utrumque eisdem est odoris ac foliorum similis. Cortice ambiuntur gustu amaro, seruido, similique tenui, cui subest caro cartilagineæ duræque consistentiæ, colore candido aspectu, atque acetofo sapore, conditæ capitæ Brassicæ truncos referens: In medio malo cavitas quedam est, succo vehementer acetofo, lurs membranæ contento plena, cui innixa sunt oblonga & semina, utrinque ferè acuminata, cute

fortis flava striataque. Intus candido duplicique nucleo constant, quibus amarus, tenuis & mediocriter feruens est sapor, præsertim cutis: nucleus enim dulcedinem quandam admixtam habet. Radicibus nititur copiosis & tenuibus.

Latina & Græca Synonyma Citri mali supra pleraque dicta sunt: Annotat tamen Blad. lun. quibusdam dicta. Particulariter vero quæ huius species sint nomina videndum.

Serap. arbor. id est, Citrum. Gal. Fructus huius arboris nominatur Græcè Pomum æque. Auic. Citrum, id est, malum Medicum. Bellinentis in marg. Alar. Arugi, seu Arrugi, vel Arrangi. Scalig. malum Medicum Theophr. & Citrium præter senen totum et sculentum. Cur autem Scal. citria potius ad mala Medica referat, quam Aurantia, vide cap. de Aurantius ex Scaligeni verbis, cuius tamen ratio non usquequaque nobis satisfacit. Citria minor videntur respondere descriptioni Dioscor. quamvis similitudo seminis cum semine Pini non nihil claudicare videatur, ut ante dictum. Manard. citrium Diosc. Gal. Serap. & Auic. & Eluchas. Citria mala.

Cord. medicum malum, Assyrium, Persicum, Citreum, Cedromalum, & Citrinum à colore corticis: in cedro non nascitur arbor. Citrus eadem.

Trag. eadem nomina dat, & præterea addit, Elic Pini Theophr. & Virg. & conicit ex Assyrii ad Indros

Varietas. Indezos Male citria fuisse olim allata. Variat, nonnunquam (inquit) grandius, quandoque magis exiguum apparet, effigies operata rugis, prælonga: interdum rotundior: odor plusquam iucundus, & qui Martias Violas ferè referat.

Hadar. Hebræi *Hadar* arborem esse volunt cuius fructus *Ethrogim*, vulgò *Citra* dicuntur, quam vocem Paraphrastes posuit. *Hadar* autem propriè pulchrum, formosum & decorum significat, sicut & septuaginta verterunt *ἡδαι* *ἡδαι* *ἡδαι*, id fructum arboris pulchrum. Similiter & vulgata editio habet: fumerisque vobis de primo fructum arboris pulcherrimæ. Quia autem citrium speciosissimus fructus est, sed pro citro arbore *Hadar* interpretatur, atque eo fructu citium hodie Iudei in suo festo celebrando vtuntur, & ex Massilia Prouinciz accersunt. Celebratur autem octaua Septembris ea dies cum magnis solemnibus, vocaturque *Chag Arasa*, id est *Festum Palmarum*, in quo sumuntur fructus quos *Ethrogim*, id est, *Citra* vocant, & spatula *Palmarum* ad innuendum, quod Deus deduxerat eos per desertum in deliciosa terram. Circumeunt etiam septimo dies septem altare, portantes Palmas, in memoriam depopulatz Hiericho ex annotat. Pauli Fagii. Ex his (addit Kyberus) facile liquet Hebræis *Ezchadar* Citream arborem, fructum verò eius Chaldaeis

Ethrogim. *Ezrog* seu *Ethrog* significare, quæ vox nihil, quod ad substantiales literas attinet, (nam in punctis tantum, quæ Hebræis, Chaldaeis & Arabibus vice vocalium inserviunt, apparet, sed leuis mutatio.)

Abrog. ab *Abrog* Serapionis Arabico nomine differt. Unde cum Arabica & Chaldaica lingua (quæ Iudeorum à rediva ex Babilone vernacula fuit, ut multis noui testamenti vocibus patet) in hac voce cōfentiant, nemo in posterum dubitare debet, quin *Ethrog* Chaldaeorum citrius sit, maxime cum Serapio sub voce *Abrog* ea dicat, quæ Gal. & Diosc. de citro iam ante eum scripserant. Decuit hæc adduci hoc loco, quod & ad historiam & dignitatem citri facerent, ne tantopere in sacris celebratum literis, in sua historia quæ debuit esse amplissima, suo honore priuaretur.

Ethrog. Ceterum quæ Cornarius de Malis Medicis tradit, ad Citria Mala, de quibus hoc loco agimus; potiss. referenda videntur: suspicamus tamen ei non cognitum descimen inter citrium minus & Limonem.

Chryseum. Angul. quoque eius sententia est, citria hodie dicta *Citroni*, esse *χρυσίνη*. Græcorum & Aurea Mala Athen. Medica Dioscor. Medica & Persica Theophrast. Assyria Plin. & hespericum Veterum.

Chryseum. Agricola ad Theophrast. Amatus ad Virg. refert, & ait: cum exactè & arborem & fructum citri supra allegatis versibus descripsisse. Prioribus etiam subscribit Lonic.

Chryseum. G. Ryff. & Cæsalp. Dod. Medicum & hesperidum dicit. Antiquorum plus satis citata nomina huic tribuunt quoque Tab. Casp. Bauh. & plerique alii herbarii qui id nominibus Veterum diuersis condecorare studuerunt.

Chryseum. Vulgata nomina sunt, *Citria*, *Citrea*, *Citrome*, *la*. Germ. *Citronspffel* / *Citronen* / *Citrinen*, *Citronaten*, *Citronaten* & *Judenapffel*, id est, Iudeorum Poma, qui quotannis in festo Palmæ tenentur habere. Belg. *Citroen* / *Citronen*. Gal. *Citron*. It. *Cedri* & *Citroni*. Hesp. *Cidras*. Ang. *Citron*. Bohem. *Citronen* / *Yablska*.

Chryseum. Huius obseruatur quædam differentia: Nonnulla enim, inquit Matthiol. in tantam excrescunt magnitudinem, ut Melopepones adæquent, cuiusmodi sunt quæ ex Liguria Hadriatici Aegeique pelagi insulis adferuntur. Alia his paulò minora: alia verò Limonum magnitudine, a: paulò maiora, cuiusmodi quæ in lacu Benaco comportantur. Hæc principem in cibis locum obtinent: Nam etsi ceteris pumiliores sint, maiorem reliquis in ore ineunt gratiam. Atqui quæ grandiora sunt, etsi speciosa magnitudine excellent, cum tamen insipida gustu non multum placeant, in cibis recentia non æquè atque illa præstant: verum, quod pulpa copiosiore consent officinis expetuntur, Saccharo vel melle adseruanda.

Chryseum. Cardanus scribit in Lombardia ad pondus librarum decem quandoque prouenire, licet rarò. Sunt qui existiment magnitudine potius & loco natali variare, quàm genere, quod iis considerandum relinquimus qui ea loca, ubi proueniunt, inhabitant.

Chryseum. Quicquid sit, earum differentiam perspicue docent Pena & Lob. in Citri tribu [aiunt] Medicum Dioscor. Malum tres amplexum est varietates: vulgatus est similis Limonio, oblonga ovis effigie: sed maiore, cute rugosiore, magisque operata, odoratus est, medicatus, antidotis commendatus: Pulpa & succo in acetanis multò gratius. *Limo* autem quæ dicuntur, illis duplo ferè maiores sunt, calloso carnosio corio, pollicem interdum crasso, oblonga cucumeris aut Melonis effigie, superficie concolore Limonio aut citrio: puluillis & torulis rugosis papillatim extubecante, ut citri sapore concito, & crudo grato. Tertium *Assyrium*, Adami vocatum, de quo postea.

Chryseum. Aug. Gallus has differentias facit. Primum Pulchrum Lombardum. Magnum Genuesem: cum glande. Primum genus delicatius & magis cardiacum, inter omnia quæ in Europa nominis pluris sit, quò maius, longius, costis elationibus. Arbor eius fructus fert modò paucos, modò plures interdum forma rotunda, interdum sine costa, interdum diuersarum & monstruarum figurarum. Genuesense genus valde grande est, & saporis dulcioris, sed non ita iucundi, nec tam graui odoris. Citrium cum glande præstantissimum omnium, sed minus: ideo minus vulgare: quasi vtilitas in magnitudine posita sit vel numero.

Chryseum. Si citria hæc sint illa Antiquorum, ià supra satis indicatum, in quibus proueniât regionibus. Amat verò Cælum calidum, hibernis iniuriis minimè obnoxium, quod si nactum fuerint, aut sub paulò tolerabiliore etiam diligenter colatur, flores, adulescentes, maturescentes, maturòsque fructus simul producant, non solum æstate, verum hyeme. Magnus est huius arboris malorumque eius in regno Neapolitano & Hispania prouentus. Seritur etiam in Germania, sed frustra, nihil enim præter folia producit, ut testatur Cordus. Vidimus & florentem, & fructus ferentem Basileæ in horto D. adrianis nostri & eiusdem vrbs consulis primarii, Hieremias Felschii, in pulchra & pereleganti arbore, de cuius fructu maturo decerpito etiam comedimus. Erant magnitudine Limonibus similia, videbanturque primi generis Matthiol. & Penz. Gustus tamen suauitate Italis & Prouincialibus cedebant, quemadmodum & carnis teneritudine. Alioquin in Germania frigore siderata facile perit, ideoque diligenti cura à Principibus à frigore custodiri solet præsertim Stuckardiz & Cassellis, in verè Regiis & qui nec Italicis quidem illis cedant, hortis, si plantarum cultum, copiam, artificium topiarium, edificiorumque magnificentiam spectes: non item si aëris & soli

Citri tribus. Varietates. **Vulgatus.** **Deliciæ.** **Limo.** **Assyrium.**

Citri tribus. Varietates. **Vulgatus.** **Deliciæ.** **Limo.** **Assyrium.**

Citri tribus. Varietates. **Vulgatus.** **Deliciæ.** **Limo.** **Assyrium.**

Citri tribus. Varietates. **Vulgatus.** **Deliciæ.** **Limo.** **Assyrium.**

Citri tribus. Varietates. **Vulgatus.** **Deliciæ.** **Limo.** **Assyrium.**

Citri tribus. Varietates. **Vulgatus.** **Deliciæ.** **Limo.** **Assyrium.**

Citri tribus. Varietates. **Vulgatus.** **Deliciæ.** **Limo.** **Assyrium.**

Citri tribus. Varietates. **Vulgatus.** **Deliciæ.** **Limo.** **Assyrium.**

Citri tribus. Varietates. **Vulgatus.** **Deliciæ.** **Limo.** **Assyrium.**

Citri tribus. Varietates. **Vulgatus.** **Deliciæ.** **Limo.** **Assyrium.**

Citri tribus. Varietates. **Vulgatus.** **Deliciæ.** **Limo.** **Assyrium.**

Citri tribus. Varietates. **Vulgatus.** **Deliciæ.** **Limo.** **Assyrium.**

Citri tribus. Varietates. **Vulgatus.** **Deliciæ.** **Limo.** **Assyrium.**

Citri tribus. Varietates. **Vulgatus.** **Deliciæ.** **Limo.** **Assyrium.**

genium. Quapropter illata in cauedis aut cellaria, vel studio ad hoc extructa ex lignis ædificia, annos multos viuunt: qualia sanè vel Ferraria & alibi circumiacentium locorum in eundem vltum, ipsis etiam Italis erigi solitis nouimus.

Cum fructificat substructis iugis hastibus, furcisque fulciendam suadet Cordus, ne maiorum pondere incescente detracta succumbat, ac fracta prosternatur. Verum hoc in Germania timendum minimè est, in qua vix frondes ab hyemis seuitia vindicari queunt, quantumvis tepidis specubus foueantur.

Porrò in Galloprovinciæ quibusdam tractibus maritimis, tam frequentem obseruauimus, vt integra Citrea potius eaque peramœna iudicauerimus, quàm multo studio vel cura conquisitas vel custoditas malos citrias.

Tempus.

Floret diuersimodè Patuui, Februario florentem vidimus, & quidem cum floribus purpureis in ædibus nobilis alicuius. Item Romæ tam flore quàm fructu ripatam Maio. Denique in calidioribus regionibus rarè floribus aut fructu viduam videas: nobis sanè talis nunquam visa, quæ non vtrumque iugiter ostentaret.

CITRVM MONSTROSV DE MAXIMIS.

Descriptio



Citri maioris Carboem vidimus Stugardix in horto Ill. Duc. V. Virtemb. qui hyeme regitur, & cum hypocausto calefit, eamque florentem Anno 1599. Ex qua arbore postea Montbelgardum vsque ad nos misit Ill. E. C. decerptum fructum, monstroræ raritatis, corulis canulatum, calceum Polonicum aut Turcicum referentem: in acumen enim delinens, aduncum,

sursum recuruum, lacunam largiorem ostendit, parietibus vtrinque prominentibus, è media lacuna colla longa surgitur elatiuscula, declinibus in parietes circumiectos lateribus. Merebatur figuræ. monstroræ raritas eiconem, quæ eleganter & picta & sculpta.

Fortè huius aut consimilis alicuius varietatis meminit Aug. Gallus in suo lib. de Agricult. Italicè conscripto. Memini [inquit] vidisse Citri alcerum genus, quod prouenit Stæfegiani, quod propter diuersas formas visu mirabile: æquè bonum atque præcedentiæ genera: verum cum arbor paucos fructus producat, rarè plantatur. Nostrium hic depictum fructum integrum exiccatum adferamus inter nostra naturalia.

Marantha quoque hic silentio prætereundus non est, qui multas ex Theophrasto plantarum differentias enumerat, quæ cultu vel adhibito, vel neglecto non faciem solum variant, sed in aliis etiam species permutantur. Tradit enim hic

inter alia lib. 2. Meth. cognosc. simpl. c. 11. quod mala Medica operoso cultu ita efformant, vt & maris & foeminae sexu distinguant: rem certè admirabilem, & visu iucundissimam. Maris enim pomum adnatum habet quoddam veluti infantis genitale, eiusdem cum pomo corticis & coloris: foeminae muliebri pudendum ad veram eius effigiem efformatum videtur, quo simile magis sculptor non singat. Mala citria ad formam peponis, aut cucumeris, aut cydonii, aliorumque quorundam fructuum ita effingunt, vt nihil amplius pristinae figuræ, præter colorem & substantiam retinere videantur. Mala etiam Medica & Limunculos vocatos & dulces & mediū saporis ex acidis conficiunt.

LIMONIA MALVS.



Iam verdè Limonibus facies paulò alia quam Aurantiis, ad Citria in specie dicta propolis accedentibus, color pallidior languidior croco ungitur. Forma Pomo oblonga, turbinata, rugosa & tuberculis inæqualis, sed minus quàm Citria, minori quoque, à quibus & in eo differunt, quod cortice pulposo tenuiore minusque carnoso, succo autem

tem vberiore donantur, eoque acidior: semen non multum ab simile amareat: folium autem non gemellum, vt Aurantiis, sed simplex, longius, latiusque, crenatum, serratumve, foraminulentum tamen illis consimiliter. Spinae & hic quoque reperiuntur, virorque ille perpetuus. At flores purpurei sunt.

Cordus paulò specialius sic describit. Limon ex Citri est genere multò tamen minore ac fruticosiore arbutio, pluribus ab vna radice virgis exeuntibus, cum largè fructificat, subiectis hastilibus ac furcis fulcienda est. Arbusto, cortices ramos, vestiunt priorum instar vitides. Folia multò minora producit, Pri coroneique foliis æqualia, rotundiora tantum, densa, viridia ac glabra. Spinis armatur veluti Citrus atque Arangius, minimè tamen rectis, sed aliquantulum hamatis, multoque pluribus quàm illæ, quo fit vt eius virgæ ac ramuli aduncis aculeis quandam Rubi imaginem referant. Flores Citrio figura non dissimiles profert, paulò tamen minores. Fructus verdè Citreis ac Arangis aspectu, odore ac sapore non dissimiles.

Eorum quadruplex ad nos peruenit genera. 1. Primum asperum cui formam ac magnitudinem habet, odore inter Citriam atque Arangiam maius medio. 2. Secundum globosum, minusque prædicto, vtriusque capite veluti eminente umbilico insignè, ceterà sui parte tuberosum. 3. Tertium oblongum est, gallinarum oui quantitate, & figura. 4. Quartum tertio æquale est. Sed globosum,

Descriptio
fructus.

Quo differt
rat à Limonia

Semen

Folia

Flora

Descriptio
Cordis

Differen-
tia.

Oblongum

maius

Globosum

Oblongum

maius

Globosum

globosum

bofius, & fperitio magis equali. Omnibus
crassior, ac auripannus cortex, qualis Arantia:
odori vehemens gustu amarus, terribilis ac tenuis.
Reliquum corpus caro est, rara exuenaque
per longitudinem membranis quibundam inter-
lecta, acutissima sunt, citris similia, figura, colore
angustissima, minora tantum. Succus pecto-
ram carnem diffusus est largus, saporis vehemen-
ter acetosi, ac dentes hebetantis. Radicibus ni-
scit qualibus Citrus ac Arantia.

Matthiol. maiora & minor facit, succi suau-
tate differentia, & corticis crassitudine. Nam quæ
grandiora sunt, & succo & cortice carneque lon-
ge sunt crassiora.

Amantiss. dicit, Hispaniam ferè Limonia aci-
da duplicata, & mediisaporis: figura item varia:
quidam enim, vel Celsalp. teste, cortice sunt cras-
siori, oblongiora asperioraque, citris magis simi-
lia, ut quæ in Gaeta nascuntur: alia leuiori cor-
tice tenuiorique, succo acidiori.

Probantur quæ crasso cortice constant, tehe-
riorque, succo dulcior, quos dulces Limones
vocant.

Quoddam præterea genus in Hispania habet
tur minimo fructu, vix nucis amplitudine, odo-
re ceteris præstantiori, excelsiore arbore.

Aug. Gallo, Limones quidam communes, qui
tamen & ipsi variant pulchritudine & bonitate:
quidam dicuntur cedronati, quia pueri cedro-
rum forma, sed minores, quamuis in citris arbo-
res inserti. Genus est quoddam Genus nascens,
delicatissimum, dulcedinis Arantiorum, cum so-
leant Limones esse. Adhuc multas producit
spinas, potissimum in iunioribus. Inuenitur tamen in
Maderno non spinosa, quorum magna commodi-
tas. Præterea enim quædam spinæ acerrime pun-
gere soleant, habent aliquid ænonati aut mali-
gni præ aliarum arborum spinis. Limor es me-
iores, quæ maturiores ac teneriores succulentiores
sunt. Hæc ceteris, etiamque reliquæ Italix. Lo-
bardicæ Limonibus præstant Genuæ, quia diu-
tius relinquantur supra arbores, nec ita citò col-
liguntur, non nocente frigore, ut in Lombardia.

Limonia quamuis eiusdem bonitatis cum Li-
monibus, rarior tamen eorum usus, quia pulchri-
tudo minor.

Limonia [vox hæc arborem aut fructum de-
notans,] haud temerè apud vllum probatum au-
torem vel Græcum vel Latinum inuenias, vide-
turque posterioris seculi esse inuentum: tantoque
magis mirari subit quæ autemate Matth. ol. Græ-
ci *Λιμόνια* dici scribat, nisi forte hæc in Græ-
cia ita vocentur, quod tamen ille non docet. Ple-
rique & hæc ad æterum Malum Medicam refe-
runt. Medici Mali genus, *Λιμόνιον* Cordo: Limon
ex citri genere eidem. Limones & Limonia om-
nes penè Herbarii cum vulgo & Pharmacopæo-
rum officinis vocant. Citrez species dicit Ama-
nus. Ryff. Mali Medicæ & citrez secunda spe-
cies. Dod. Ant. Musa ait, Italos vocare Citrium
Malum. Celsalp. verò & Aug. Gall. non citrium,
sed Limonium Citrio similem dicunt. Et sanè Li-
mones hodie dicti fructus, vel a Præcis non de-
scribuntur, vel sub nomine citri comprehendun-
tur, ut æstimat Agricola. Gerst. Limonen / Limon.
Bois. Linden. Gal. Limon. It. Limone. Hisp. Limonza.
Angl. Limontree. Boh. Limunmy. Porro Limonia
nes hoc propriè dictos non esse posse Medicæ vel
Persicæ Theophrast. & antiquorum, ex eo satis
patere arbitramur, quod facillimè putrescat, ideo-
que vitiis inueni ad arendas inanis commo-
de non posse, quod tamen in Medico Malo ve-


Tom. I.

rum apparet desideratur.

Gaudet Limones eodem modo calido cura, ac
citra. Quapropter in hispanis Italia & Gallo-
provincia frequentes habentur, & ad Lacum Be-
paciū ferè vique viciaria habentur, tam his,
quam reliquis Malorum Medicorum arboribus con-
tulis, ubi in eam se attollunt proceritatem, quæ
alios in locis Salices & Viti, ut Celsolarius testa-
tur, etiamque ferè anno fructibus onusta spectan-
tur. Ex prædictis locis terra marique vehemen-
ter in Germaniam, partim recentia, partim
mura condita. Coluntur & Stutzgardia in
E. C. hortis, ubi Nouembri fructibus onustis
vidimus, & nonnulli quando arbutulam colum-
mus in hortis. Pulcherrimas colit & suamet manu
magna nobilitate inserit D. Fol. Platensis Basileæ.
In rudibus Cari propè Baulas, Limones sylue-
stres, fructu nunquam maiore ouo columbino
meminit esse Bellon. In Zeilam Limones proue-
niunt sua specie pusilli, qui nullum propè capiunt
incrementum, sapore dulcissimo. Syluestrium
Limonium arbores in Syria, Aegypto, Africa fre-
quentes, hominis admodum exiguis, acidissimis,
ut refert Scal. Meminerunt quidem Amatus,
Celsalp. & A. Gallus, ut antè demonstratum, Li-
moniorum dulcium, verum paruos non tradunt.
Celsalp. minimos scribit in Hispania prouenire,
verum quo sapore sint non indicat.

An huius generis parui Limones, qui in dolio-
lis interdum importantur ad nos muria conditi,
cum carnibus & piscibus coquendi, iucundi sa-
poris.

ARANTIA MALVS.



Pardiso-
rum nostri
seculi, ubi ad
solum & Cæ-
lum concedit
delicia sunt,
Medicorum ma-
lorum species,
æterna fron-
dis virore, &
fructuum vbe-
re quouis tem-
pore luxuria,
aliis primum &
floribus, elu-
cantibus, aliis
adulescentibus,
aliis maturis,
atque his qui-
dem simul om-
nibus plerun-
que placentes.

Notissima verò reliquæ vulgatiores sunt Arantia
dicta, quibus aureus ille & citius corticis fulgor
nomen dedisse potuit. Hæc aliis magis orbicu-
lata, nonnihil compressa, parum rugosa & fora-
minulento lateo cortice, interius tamen albican-
te, non multum spissa, (feminas vocant) vel
crasso, (mares dicuntur) amarissimo & euidenter
calido teguntur, quæ tamen antè maturitatem
vitis ægide cortex. Sapor succo pro maturatio-
nis progressu aut generis varietate, acidus, dulcis,
aut mediocris, seminibus æqualibus multa medulla
fartus, amarus. Folio peculiaris forma, semper vi-
renti, & hyperici instar infinitis propemodum

Loca.

Limones. 3
Pusilli dicit
est.

Pusilli dicit
est.

Arantia
Sude.
Descriptio

Ma
sem.

Sapo

Julia

foraminulis peroto, quippe quod gemellum vi-
deri possit, maiori Laureolae cuneato, nec crena-
to, alio ceu circulo subiecto. Flos vt & fructus
fragrantis odoris. [qui Cordi cuneum vni-
us nonnihil rodolere videtur] coloris candidi. Ita-
minulis multis mediis obsidentibus, pulchrior
quam in citro, & odorator, in eis subciti-
nus, per oram vero lumbi purpurascens. Ar-
bori quae multo maior quam citri, cortex vitidis,
spinis rigida sed rare. Monstrosa natura ludentis
in Auranti nobis obseruata luxuries, quae can-
tarum deliciarum conscia non se habuit spinis
arborescens armasse, nisi & fructui cornuum ter-
ramenta adiungeret. Solet & haec superflorare,
quemadmodum & malus citria & Limonia.

**Номинал
символа.**

Aurantia dicta volunt ab auri colore : alii ab oppido : quo abundant : *Orange* sanè Gallorum æquiuocum est & ad Pomum hoc, & ad oppidum Galloprovinciæ. Sed aliud est oppidum Achaiz, Arantium à quo dicta volunt : vel Arania à Gente eius nominis in Persia. In officinis tamen Arantia dicuntur. Hæc Marardus putat esse Virgillii Medica mala & Auic. citrangulum. Hier. Brunfels. citranguli. Brunfel. citria, Arantia dicta. Cordo Medici mali genus *Arangia*, ab Italis *Narancia* : & sapor *Arangiu* eidem. Trago dicuntur etiam *Citria*, medica, *Aurea*, & *Hesperica mala* : In Nicandro Alexiph. *ῥοδονδὶκον* : *ῥοδονδίκιον*, eidem : à qua voce Germanica appellatio *Pomerangen* quasi *Poma nerantia* derivata videtur. Amatus etiam *Rancidum* vocat : & Auic. citrangulum dicit : Alii & huius & Meluci citrangulum. Cornarius cum prætorio quodam edicto de citriorum genere *Poma Arantia* vulgò dicta, *Mariana*, & *Cristiana mala* à Plinio & Galeno dici, in comment. med. à se ostensum tradit. Motus autem hic maxime ad hanc opinionem capeſſendam, quod ea frequenter Galenum cum malis Punicis coniungere animaduertet.

Care, Inc.

Ast verò, cùm Theophr. & Plin. dicant malum Medicum non comēdi, quòd vel maxime de Aurantibus dici posset, quæ non comeduntur nisi in condimentis, ex Suetonio verò constet T. Fl. Donatianum non temerè super cornam præter Manianum malum simplicissimè, non sic verisimile, fuisse malum Aurantium, nisi fortè habuerit dulcia, aut tota edulia, de quibus mox dicemus. Sed Plinius ipse eam opinionem ei eximere debuit, quia ait, à Cestio Cestiana, sicut à Matio Mariana, quemadmodum & alia, ab inventoribus, à Romanis fuisse cognominata. Quare Gal. cum ex auctoritate Apollonii tradidit in capitis dolore ex ebrietate cestiana mala Romæ sic appellata, in cibis cocta conferre, Aurantis intelligere non potuit, tum quòd Apollonio & Galeno incognita fuisse censentur, tum quòd ea nunquam cocta exhibentur, [vt Dalech. annotat] saltem non per se, & quatenus cibis, sed quatenus in edulia seu condimentum. Eandem tamen opinionem Cornarii & Montanius secutus videtur, & Agricola.

Inter Citria referunt Buch. Manard. Ryff. Lou-
bertus, Saracenus & alii multi. At Dodonxo
malis Medica, cuius prima species
Antiquis *χρυσαίντι*, Aureum malum, & malum
Hespericum, Neotericis *Aprium* & *Aran-
tium*, ab aliis *Aurengium*.

Lonicera Poma nerantzia, genus Cui, Pomum aureum Hesperidum Pomarum.

А. А. Мухоморов
Иерусалим
Август 1918

Lobel. & Pen. Gled. & Cedri Theophrast. species.
 Had. Iun. & Cedri Aithen. & Cedri Nicand. Schol.
 & Turca. Quoad id Pinguis. Aethiopia voluit
 differre à Cedris, le gantillud Nicandri in Alexiph.

quandam *quandam*, *terrestris* *terrestris*. *Neroliaceam* *Neroliaceam*. *Saracc-* *Saracc-*
na *na*, *quae* *quae* *eodem* *eodem* *Aurea* *Aurea* *vel* *vel* *Hesperica*. *Hesperica*.
quibusdam *quibusdam*, *aliis* *aliis* *chrysea* *chrysea* *;* *Pomum* *Pomum* *Arantia* *Arantia* *Hisp.*
Lugd. *Lugd.* *Aurea* *Aurea* *Virgili* *Virgili* *C. Balth.* *C. Balth.* *de* *de* *quibus* *quibus* *non* *non*
pra *pra* *alio* *alio* *loco*. *Idem* *Idem* *suspiciatur* *suspiciatur* *esse* *esse* *Marchallum*
Succoni *Succoni* *in* *in* *Dominiano*. *Ceterum* *Ceterum* *plurique* *plurique* *di-*
bant *di-* *&* *&* *Præci* *Præci* *Arantii* *Arantii* *vel* *vel* *Aurantii* *Aurantii* *nomine* *nomine*.
signant *signant*. *Græc.* *Pomerantzen*. *Gal.* *orange*, *pomme* *pomme*
d'orange. *Belg.* *Arantie* *appel*, *appelvan* *aransen*.
Ital. *Arancio*. *Hisp.* *Naranjo*, *naranyu*, *melaranzo*.
Angl. *Orange* *tree*.

Sed dubium hoc loco ventianandum ex Scaligero. Medici mali Theophr. vñum nullum scribit inter cibos: ideo [inquit ille] quod cunctiores, vñum esset de quo scriberet, Arantia an citium. Nam citium præter semen totum osculentum est. Non animadvertere [addit] folii figura tolli respondendi cunctationem. Non enim est Arantia Lauri solum, sed peculiare quoddam, nempe duplex. *Hæc ille.* Quasi verò appendix ille folii impediat, quominus folium dicatur Laurino simile, quemadmodum reuera est: non quod inde velimus asserere, esse reuera Medicæ Theophr. mala, quæ nobis Aurantia dicuntur: nam & reliqua citiorum genera solum similia habent, sed ut constat Scaligeriana subtilitate nondum sublatam respondendi cunctationem. Et iam rursus Scaligerum, vel alium aliquem subtilitatis procellorem sine cunctatione respondentem perlibenter audiremus: Aurantia vel in multos annos exicata, suum tamen odorem non amittere, non facile corrumpi, & vel corrupta, tamen tandem licari, & odorem seruire, ideoque vestibus interponendis ad arcenda noxia aptissima esse. Citia verò et sic licantur quoque, qualia & nos habemus, esse tamen evanida, ideoque nec odore nec vsu commendabilia.

Porro plerique Herbarii duas Aranciorum differencias agnoscunt, acida & dulcia. Matth. tris in Italia genera nasci tradit: acida, dulcia, & vinolenta siue musta, quæ & Cæsalp. & Aug. Gallus referunt, & vinolenta mediæ saporis vel medioeria nuncupant: hicque addit, non dignosci posse nisi comedendo. Periti tamen Medici & Hortulani optimè discernunt ex foliis & corticibus fructuum. Semper verò meliora sunt Genuensium Lombardicis: quanquam hæc si non colligerentur propter frigus antè perfectam maturitatem nondifferrent, quemadmodum nec Limones. Prouinciales ad Genuenses bonitate quàm proximè accedunt. Scal. scribit se in Prouincia Narbonensi, eiusdem arboris Arantia nonnulla acida, quædam dulcia degustasse, eodem tempore, quibus tamen nihil defuit ad perfectionem. Ex quamuis iam alibi scripserat, neque Aranium, neque citrium, neque Limonium distantes fructus edere in eadem arbore, nisi illud fiat per insitionem, neutiquam verò per proptia & connata principia: hic tamen rationem tribuit materiei diuersitati, quæ non æqualiter coqui potuerit. At qui si non æqualiter coqui potuit, quomodo aliter ceruetro nihil deesse potuit ad perfectionem? Si diuersi fructus non nascuntur in eadem arbore, nisi per insitionem, [quod facile concedimus] quid opus ex coctionis gradu rationem petere, quæ nulla est in hoc negotio, cum abundè suppetat ex mixto & gemino ex eadem arbore diuersorum fructuum principio. Dicamus ideo diuersi saporis Arantia, quæ Scaliger ex eadem arbore gustauit, aut ex uita fuisse, aut eadere illam, non posse diuersos fructus ex eadem specie arbore prodire: cuius sententiæ & nos sumus.

mus: idēque ex insita arbore diuersa decerpisse Scaliger. quamuis illud neuiquam infinet, minus verò etiam sic intelligere videatur.

Poma aurea.
Genera complora.

Græci, autore Monarde, Aurantias *Poma aurea* vocant. Persuasum habet per insitionem aduonisse complura genera, & sic magnificatum esse insitionis vsum, vt aliquæ corticem habeant dulcem, quæ totæ comedi possint. Quanta diuersitas saporum in eis degustatur communi relinquit iudicio, fatesse conuolens, constare multa fieri posse per insitionem, quæ in monumentis Antiquorum non menioentur. Enatam esse Aurantium ex insitione Citri arboris in Malo punica idem assent. Et hinc Aurantium Malo Citrio non absumilem scribit, & cum Malis Punicis in rotunditate & colore, corticēve satis conuenire tradit, quinimò Malis Punicis urgente necessitate in eorum penuria substituendam censet. Id nondum constare ait an Aurantia sint Citranguli ab Auiacen. & Mæne commemorati.

Aurantia
Sede ena.

Punicorum
substitutum.
Citrangula.

Locus.

Gaudet Aurantia insilem locis & regionibus, quibus Mala medica vbi passim abundant in vitiis & hortis, manumis præsertim tractibus. Abundant in tota Campania Apulia, Calabria, & aliis regni Neapolitani locis, quemadmodum in Germania arbores domifera. Iisdem scaturit & Liguria, Galloprovincia, & totus Benaci lacus tractus vbi paulo curiosius coluntur, quam locis prædictis: parcius etiam fundit Gallia Narbonensis, præsertim superior. Frequentius verò hodie etiam in Gallia Septentrionalis & Germaniæ magnatum hortus colitur, quam vllum reliquorum Citriorum genus, vel quoddam communiore sint, vel quoddam cæli initionis genus paulo facilius tolerent.

Differentia
completes
in horto ill.
C. I. I. I.
genera
adans.

Quapropter Scutgardie in horto Ill. C. V. V. magna copia præ aliis exoticis arboribus coluntur, vbi mensis Nouemb. pomis grauidas, tam maturis, quàm immaturis, magna copia, iucundissimo spectaculo, dulcibus, acidis, subacidis, magnitudine variantibus, cortice tenui, crasso, amaro, eduli, magis & minus acii, videmus & gustauimus, vbi & toto anno abundant. Ac eo vique eas habendi cupiditas excreuit, vt & nobiles, Doctores plerique, ipsique aded pharmacopœi colere incipiant, in multis Germaniæ & Galliarum locis. Nos etiam plures coluimus, insitione & fatu, nam ex semine facile nobis proueniunt, tam dulci, quam acido. Sed hic Montbelgardi ad fugem nondum peruenire. Doctor Platerus Basileæ plurimas habet fructiferas, & instructiferas, quas syluestres vocat ex semine natas, & suamet manu (quæ industria eximie pollet) inserit, & fructiferas reddit, quæstumque haud contemnendum inde facit. In horto Principis in reitersheim aurea mala pulchra, rugosa & polita matura Septembri obseruauimus. Scribit Lobelius Africa syluestrem & Olbia Galloprovinciæ aded familiarem in afflatu ora maritima, vt temperuerentium lucorum amenitate & Pomorum futurâ perenni, neuiquam iniqua videatur. Recordamur sanè doctum & insignem Pharmacopœum Io. Rossetot Montbelgardi Ill. C. V. V. inferuentem narrasse nobis, se in adolescentia sua penè fame periisse quondam in Hispaniis agentē, inter syluas Arantiorum syluestrium. Tantam enim earum fuisse aciditatem vt in plures dies offensus auidius seu stupore dētes masticationi omnino ineptos haberet. Sed vt hoc obiter moneamus, facile mederi potuisset mansu Portulacæ, id suadente Arist. & plerisque Medicis. Aut si hæc defuit panis calidus, caseus, nuges Pineæ, Aucellanz, Juglandes, sal aut mel calefactū affricatum, amur-

Sporaxia

Aurantia
lylo.

Stiper ab
audis du-
rantis, &
collator.

Tom. I.

ca in æneo vase cocta ad mellis spissitudinem, oleum immatura oliuæ infricatum, vices eius suppleuissent.

Floret Arantia Aprili, Maio, tardius aut citius pro loci conditione, præcipue commendationis odore. Flores decerpi etiam per maria in longinquas regiones perferuntur: & aqua quoque quam *Nassam* vocant, fragrantissimi odoris, ex his parata arte destillatoria. Apud Germanos hyeme diligenter contegendæ, & extractis in eam rem ædificiis atque hypocautis fouendæ aduersus hyemis iniurias.


Tempus.

Aqua
Nassa.

Non tacendum hoc loco, quod mirifica subtilitate, acutissimus præliat Scaliger. Arantii, inquit, quod gelu perisset, triennio post effossi radicem mirati sumus, non solum viuere, sed etiam lætissimam. Sed si superuixit, & quidem læta, ergone perierat? Atqui, dicit ille, arbor perierat, hoc est, truncus cum ramis & foliis, non item radix. Atqui, inquam non igitur perierant, superbite vitæ etiamnum fonte, ex quo pristinus vigor promanare possit. Nondum igitur tota perierat arbor. Sic bonus quoque interdum dormitat Homerus.

Mirabilia
Scaligeri
obseruata.

POMA ADAMI.



Proxima Aurantia sunt quæ Adami nuncupant poma, si fructum spectes orbiculatum illud quidem & aureum æquabili Aurantiorum superficie, sed multis numeris maiorem, & nonnunquam ad umbilicum velati ambeum, colore magis fuluo, quam Aurantia, & odore Citris simili, sed gustu insuauis, multo interim succo pragnantem, sapore Aurantiis affini. At verò folium in Limonum aut Citriorum familiam cooptare iubet, vt cui nulla subiecta pinnula: nam pori, quibus perunditur, omnibus communes sunt, veluti & spinæ, vi orque pertinacis vitæ folii. Flores Citri, Omnes partes satis bene & eleganter expressit pictor.

Descriptio

Quæ differat
ab Aurantia.

Caro

Sapor.

Foliorum

Florum.

Medica
antiquarum
Erymen

Hanc & plerique ad Medica Antiquorum referunt. Pomum verò Adami dictum volunt, quod in superficie seu intus dentium vestigia habere videatur, quasi ab Adamo primo homine commorsum fuisset, quo nomine & ab Italis agnoscitur.

Sic Matthiol. Adami poma vulgò vocata, nos *Lumie* dicimus, & *Poma d'Adamo*. Aurantiis duplo triploque maius, rotundum, cortice non admodum crasso, inæquali fissuris quibusdam apparentibus, perinde ac si dentibus demorsum esset, vnde illi nomen, quod putet ignarum vulgus, hoc illud esse pomum, quod ab Adamo in Paradiso demorsum fuit. Medici mali genus, Poma

Nomina
& Synonyma.
Adami Po-
ma Lumie.

Id edici
mali generis

I 2

Pomum Af-
syrium.
Medicum.
Malus Af-
syria.
Limes Me-
langula.
Citrangula.

Poncirum.

Nemini
linguat.

Locus.

Locus ma-
lorum in
generis.

Medicam
malum
Gracia non
vult.

In Crusa.

Succi Visus

Inferio et
cultura ma-
lorum Me-
dicorum.

Adami, Cordo. Amarus quoque Citri speciem fa-
cit. Pomum Assyrium quartum, etiamque Medi-
cum Dod. Pomum Assyrium, Adami vocatum,
Malus medica Diosc. tertia varietas Pen. & Lob. Ma-
lus Assyria Tabern. & Gerard. Poma Adami Hist.
Lugd. & Neotericiis plerisque. Solerius Limes
vocabat. An Casalp. Melangula, quam alii Ci-
trangulam vocant: frutice & fructu similior Ci-
tro, ingenti fructu, omnium maxime tuberoso &
crispo: colore pallido, sed rotunditate & succo
interno Aurantiae: cortice quoque similiter fun-
goso, sed tenero & dulci, cum leni quadam ama-
ritudine. Poncirus ambigit inter Limonem &
Aurantiam: non enim oblongus, ut Limon, nec
omnino rotundus, ut Aurantium: utrisque am-
phor: cortice crasso & laui, colore ad Aurantium
vergete, dulci cum quadam amaritudine, succo
inter Limonis. Considerent perin an citrangula
Casalpini, non sint poma, quae vocant Adami: &
Poncirus differentia quaedam citri maioris. Ita
saltem descriptio insinuare videtur.

Gerard. Idam. Opffel. Gall. pommes d'Adam &
poncirus, iisdem teste Lob. Hisp. & Lusit. Azambou.
Angl. The Assyrian Apple tree Gerardo.

Non ubique haec obuia, in Lusitania tamen &
& Hispania colitur: item in Calabria, authori-
bus Amaro & Cordo. Ad Benacum lacum toto
anno ferè perpetua fronde virent & florent, teste
Calzolario. Vidimus nos Lugduni aliquando, &
in horto Ill. C. V. Viat. Stuardiano, ubi arbor pul-
cherrima, magna ferens poma, nec pauca.

Quod in genere de loco omnium malorum
Medicorum dictum sit, abundant ea hodie al-
Giffi. Argel, ubi multo maiora, quam in Lusita-
nia item in insula S. Helenae. In Brasilia & aliis
non orbis partibus, à Lusitanis ex nostro orbe
illata, multiformia mala Medica hodie suppetunt,
videlicet ex hisloris & navigationibus Indicis
Habli. Miffel. & aliorum. Citrus apud Medos &
Perlas in paucis frequens, deinde Palladii dili-
gentia in Indiam translata fuit: postea verò in
vltim deuenit, ut nemora & campos occupa-
ret.

Merum, quod scribit Scaliger apud Theophras-
tum: Arbor Medica tota Gracia [sepius enim]
nulla videtur. Hæc enim eius sunt verba. Et in In-
dicis eius annotationes in Theophr. his repeti-
tur, inulm Medicam in Gracia non videri. Quod
si verum est [de quo tamen vehementer dubita-
mus] frustra sanè à prius in Graciam inuenta
creduntur, ut in precedentibus dictum. Mirari
porro subit, quare non sint ibi, aut esse possint,
perfectiorum cum nec terra fertilitas, nec cæli re-
pugnet temperies. Sed iudicium penes eos esto,
qui Graciam incolunt, aut perlustrarunt. Nisi
forte barbaries Tarctica, quæ iam ante Scaligeri
seculum Graciam inieperat, easdem vel negle-
xit, vel penitus exterminavit. In Caeta sanè,
teste Bellonio, maximæ sunt arbores Arantio-
rum, citiorum, pomorum Adami & Poncirio-
rum. Græci, eodem referente, succum expri-
munt, doba eo replent, vendunt Turcis Con-
stantinopoli & aliis locis, quod deuchunt. Eo enim
Turci frequenter eunant loco Omphacii.

Operæpretium nos facere existimamus [si]
antequam de viribus malorum Medicorum aga-
mus, aliquid dicamus de eorum simi, cultu, insi-
tione, & si quæ talia sunt, quæ ad eorum con-
seruationem facere possint, idque in Germatio-
rum & Septentrionalium potissimum gratiam,
quos hodie tanto studio eas arbores colendi &
propagandi ardere videmus. Præcepta igitur da-

bimus ex probatissimis & diligentissimis earum
cultoribus, potissimum, Varrone, Palladio, Aug-
Gallo, & obseruatione nostra.

Ergo mense Martio citri arbor quatuor modis
feritur, semine, ramo, talea, claua. Amat terram
rarioris naturæ, cælum calidum, humoremque
continuum. De Medica imprimis obserues, ne in
terram nimium aridam, sed temperatam semen
demittas. In iugum vnum, si est naturæ tempe-
rata terra, scribunt opus esse Medicæ sesquimo-
dio. Id feritur ita, ut semen iactetur, quemad-
modum scilicet eum pabulum & frumentum se-
ritur. Si igitur grana velis serere, ita facies: ter-
ram in duos pedes fodies, cinerem miscebis, bre-
ues areas facies, ut utrinque per canales aqua dis-
currat. In his areis palmarem scrobem manibus
aperies, & tria grana deorsum verso cacumine
iuncta constitues, & obruta quotidie rigabis, ut a-
nimata semina melius adulescant. Citius proce-
dent, si beneficio aquæ tepentis utaris. Natis
germinibus semper proxima herba runcetur. Po-
test hinc citra planta transferri. Acres medul-
las mutant, si semina per biduum mulsâ mace-
rentur. Si ramum velis ponere, non amplius
scilicet pede debebis immergere, ne putrescat.

Claua feri commodius est, longitudine cubi-
tali, utraque parte lenigata, nodis & aculeis re-
cisis: sed integra summitate gemmarum, per quas
spes futuri germinis erumpat. Diligentiores & fi-
mo bubulo adlinunt utrinque, quod summum
est, vel marina Alga vestiunt, vel argilla subacta
utrinque extrema cooperiunt, atque ita pasta-
to solo deponunt. Talea & gracilior & breuior
esse potest, quæ similiter ut claua mergetur. Sed
talea palmis duobus superfit, claua omnis obrui-
tur. Non debet aliis arboribus annecti. In spa-
tio non desiderat interualla maiora. Calidis, sed
irriguis & maritimis maxime gaudet locis. Sed si
quis hoc genus, ut in regione frigida nutriatur,
extorquet, loco vel parietibus munito, vel in me-
ridianam partem disponat hanc arborem. Sed hy-
bernis mensibus totam stramine velet agresti, aut
aliis tegetibus vel sportulis munit à frigore.

Iuari creditur maxime circumsciz cucurbitæ fla-
gellis, quarum cineres volem quoque citri arbo-
ribus materiam præbere. Gaudet assidua fossio-
ne, hinc proueniunt Poma maiora. Nisi quæ ari-
da sunt, rarissime debemus abscondere. Illud quo-
que scitu dignum, quod arbor citri similis erit,
quæ beneficio inoculationis coalescit. Diuites,
& qui dant operam genio, fornices concame-
ratis ad Solem spectantibus, reponunt, aut etiam
fornace intus exstructa, fouent. Vbi æstas resul-
serit, fornices apertos, Sole sinunt illustrari, &
eius tepore soneri: omnino aëri nuda & libera
reddenda, sed eatenus ut secuta sit. Nam hæc ar-
bor, potissimum citius, utpote suapte natura te-
nerior, si paucam glaciem experiat, syderata
contabescit. Talea, siue claua eius calidissimis re-
gionibus, & per Autumnum ponitur. Frigidissi-
mis Iulio & Augusto positas, & quotidianis ri-
gationibus animatas, usque ad poma & magna
incrementa perduces.

Inferitur frigidis locis Maio: calidis Aprili,
non sub cortice, sed hîso trunco circa ipsas radi-
ces, de quo postea specialius. Iisdem temporibus
etiam feritur.

Calidis regionibus partus non alternat, nec re-
stibili, sed perpetua fertilitate pomificat: aliis pu-
bescentibus, aliis adultis, aliis maturitate caducis.
Sic gradatim succedunt Poma. Maturis se substi-
tuunt acerba, hæc florentia consequuntur, orbem
quæ-
quæ-

Quatuor
modi.
Locis.

Satis gra-
uissimum.

Rami/a-
tam.
Claua fo-
tio.

Talea/6
tam.

Si poma
maiora
fiant.

Inferio

quendam continuæ fecunditatis sibi ministrante natura, quæ hanc ferturam non interpellat.

Inferuntur etiam ex Piro, vt quidem volunt, & Moro & Punice Malo: sed insiti surculi qualo desuper omnino muniendi sunt, vel fictili vasculo: De situ & insitione hos verius condidit Paladina.

*Nec non & Citrii pariuntur munda rami
Pignora, quæ granida Cortice Mors alit.
Pomaque pasturi blanda redolentia succo
Armaris mutans spicula nota Piris.*

Plantatio
quæ hodie
in vsu.

Posteritas quoque semine ferit, sed voluptatis potius gratia, quam utilitatis: tardè quippe fructus producunt. Plantandi potius bacelli cuiuscunque prædictarum specierum, longitudine palmi, politi. Ad quatuor digitos decradenda exterior cuticula, & terræ insigendi, præseruandi à magno æstu & frigore. Spatium sit palmi inter singulos, quos oportet extra terram ad duos aut tres digitos eminere: sæpius circumfodiendi. Facilius proueniunt, si propagentur. Arantiz tamen minus feliciter, quia ligno sunt firmo, quod non facile radicat. Ex igitur seminandæ, & quia tardiùs fructificant, inferendæ Pomis Adami, Citri, Limoniz: ita & plures proferunt fructus, & citius, & meliores.

Arantia
seminanda

Hortulani Italiæ nunc diligenter designant bacillos Pomorum Adami propter insertionem, quia commodè prouenit, earumque fructus cæteris hodie serè rarior. Qui Citriam inserere vult, melius faciet, si nobiliores ignobilioribus inserat. Sunt qui Citrias Limonibus inserant: peritiores tamen inserunt Limonias Citriis, quia sic fructus nascuntur pulchriores, quos *Limonias* vocitant Itali, quique ventriculo melius conueniunt, quam Limones, qui vehementer refrigerant. Inferuntur etiam Citri & Limones Arantiis: sicque plures ferunt fructus quam in propriis truncis, & frigori magis resistunt. Ad Lacum Bennacum in parte Solindiana Arantiz arbores ferunt hyemem non tectæ. Archipresbyter de Maderno in Citretis suis arborem habet Arantiorum magnorum, ex vnius fistulæ insertionem comparatam. Habet etiam Limonias quamplurimas, quæ æquè ac Arantiz etià non tectæ per hyemem frigus ferunt. Fructus tamen eius loci ad bonitatem Gendensium & reliquorum locorum maritimorum Italiæ neutiquam accedunt, vbi haud ita frigoris iniurias pati solent. In deliciis habentur præ aliis Arantiz mediæ saporis, quocirca hodie sæpius inferuntur, quam dulcia & acida. Quoniam verò Aranciorum & Pomorum Adami arbores fructiferos flores copiosos ferunt, Citriorum autem multos infertiferos, Limones etiam plures, ideo hæc duæ inferi solent Arantia, & Pomis Adami.

Inferio-
nis modus

Inferuntur autem per scutum, olearum modo: nimirum non sub cortice, sed fisco trunco. Diligentiores insertos surculos cera diligenter oblinunt, ne aer aut humiditas aliqua penetrare possit. Verùm adimendi omnes oculi superflui, etiamque superuenientia Germia. Sic relinquatur ramus supra inoculationem, si appendatur vasculum terra plenum, ita adaptatum vt radices agere possit in eo, & sequenti anno plantari.

Inferio-
nis rem-
pus.
Sursursum
sive modus.

Inseriones autem fieri par est interlunio, mensibus prædictis, aut etiam tardiùs, dummodò lignum sit succulentum. Mundandæ arbores sine Martii & principio Aprilis, vbi frigus cessauit. Tum designantur baculi seu clauæ: & ramis vascula applicantur cum terra, parte per vasculum transmissa prius scarificata vt promptius radice-
retur.

Tom. I.

Quæ granis sit satio, tardissimè ad frugem peruenit, speciatim Aranciorum, non ante duodecimum annum, etsi rectè curentur. Citri & bacellis uel taleis sæpè fructum ferunt tertio aut quarto anno. Limones quinto.

Tempus
satura.

Terra sit pinguis, petris vacua. Locus vbi consistit sunt à Boreæ afflatu sit immunis. Ex simis præstat equinum, ouinum, sed benè putridum, quo obruantur & muniuntur contra frigus. Aestiuo tempore sæpius rigandæ, singulis mensibus circumfodiendæ: Magna diligentia putandæ tollendæque spinæ, ne arbori noceatur. Hieme siccas esse oportet, antequam recondantur.

Qualis
terra deli-
genda.

Periti hortulani, & ad rem attentiores, metuentes ne flores hyeme percant, priusquam Citros tegant, vt quæ frigoris magis impatientes, flores, fructuum rudimenta & teneras summitates tollunt, & sale condiunt atque aceto, ad cibum tempore quadragesimali, & toto anno.

Flores &
rudimenta
fructuum
quando col-
ligenda.

Cauendum ne villo stillicidio rami madescant: virgente frigore, accendatur ignis in loco vbi repositæ sunt, ex lignis ficcis, aut carbonibus, rursi adsit hypocæustum. Interdum miciori celo existente aperiendæ fenestraz, vt fruuantur in aliquot horulas, potissimum circa meridiem, radiis Solaribus. Ex Limonia rariùs & minus decerpuntur flores quia plerumque fructifera: Aranciorum verò & Pomorum Adami semper. Arborea hæc supra fidem durare putantur, aunt in valle Salodiana & circa Lacum Bennacum extare nonaginta & centum: Romæ quoque Aranciorum arborem in templo S. Sabinae à D. Dominico satam tradunt quæ etiamnum delicatissima ferat poma: Possit ergo esse 400. circiter annorum. Fructus ii demum perfecti creduntur, qui per annum durarunt in arbore, & qui nullum senserunt frigus. Minus probantur qui sua sponte cadunt. Aranciæ arbores vix amittunt folia, reliquæ faciliùs, potissimum Citrus quæ cæteris delicatior. Verum primo vere facile recuperant noua ac etiam flores & fructus.

Acta di-
borum Cæ-
triarum
& Medi-
catum.
Antiqua
à D. Do-
minico sa-
ta.

Vt caueas ne flores ferant inanes, præcidendi rami superflui, cauendumque ne ultra modum excrecant: ita copiosos edent, & fecundos. Diguis intissimè ramulorum multitudinem decerpes potissimum vere, & interlunio, idque ordine quodam, quo apparent: iplas etiam gemmas abundantiores demes.

Ne flores
ferant in-
anes.

Quum transplantandæ aut transferendæ, Vere quoque faciendum, considerato etiam situ eodem, quo erant antea positæ, singulis partibus, sibi consuetas cœli plagas respicientibus.

Transpi-
tatio.

Magnè sanè harum arborum damno, præsertim in vasis repositarum, negligitur situs ratio cum educuntur. Si tamen Septentrionales rami cæteris essent teneriores, etiam consuetum situm mutari, haud improbauerimus. Transplantatio fiat potissimum circa vespæram in bona terra, quo etiam tempore probatur rigatio, si sit opus: In Briziano agro quidam meridiem plantant & Soli etià expositis locis, non tamen mutato situ, in vasis ligneis aut terreis, qui etsi non tam miti fruuntur Cœlo vt Riuerani, culturâ tamen & diligentia interdum meliores pulchriorésq; habent fructus. sunt qui capsis vtantur à ligno Lariceo, quod melius resistat aquæ, suffultus altitudine palmi, ne terræ corruptelâ aut situ inficiantur. Latitudo & longitudo capsarum serè vix vnius & semis esse solet: terram quotannis renouant, admixto stercore columbino, gallinarum, equino aut etiam cloacarum. Circa D. Martinum sub porticibus & tectis collocant, ne prius lardantur, ita tamen,

Situs.

Hora trans-
plantatio-
nis.

Modus
Brizianus
exempli
gratia præ-
ponitur.
Culturæ
diligentiâ
multum
prodest.
Vasa.

I 3

ut Sole fruantur. Ad diem D. Catharinæ reponunt in domos, ut à frigore conseruentur per hyemem. Virgente summo frigore accenditur ignis carbonum: cum opus est etiam rigantur, Mense Martio paulatim educuntur, ut aëre fruantur liberiore & Sole etiam. Circa D. Georgium omnino aëre exponuntur, similiterque rigantur, si videatur opus. Eductus aut educendis ad quatuor digitos superficiei tenus detegitur terra, & radicum superficiales fibræ excinduntur. Arbores quas colunt in vasis terreis, sunt præcipue pulchritudinis, & aspectu mirabiles ob insignem fecunditatem.

In Cassi
terreni cul-
tura.

Viti stipendium, arbusculam, cubito aut sesquicubito non altiore, in vase cubito non altiori, cuius fundum palmo non latius, cum maximis Citriis onustam, tantæque copia, ut plures sint fructus quàm folia. Citrii itaque, Limones, Arantii, Limonii, ponendæ in parua vasa terreæ, sed profunda, cum pauca terra valde pingui, & accendæ à Boreali vento. Sic fructum ferent intra triennium, exceptis Arantiis, quæ duriori ligno.

Ut Arantii
citrii ferat

Ut autem citius ferant, inseruntur Citriis vel potius Adami pomis, sicque ipsa etiam Arantia euadent maiora.

Ut diu conseruentur

Ut diu conseruentur, tertio vel quarto quoque anno eximendæ, & tollenda terra, secandæ radices, ut ad tres vel quatuor digitos tantum relinquantur longæ: detur terra noua, qualem antea diximus: diligenter præscindantur ramuli luxuriantes: arceantur à nimia siccitate & calore, & statim temporibus rigentur. Sic & bonas & diuturnas efficiet, neque spem sui fallent Agricola.

Dicamus etiam aliquid de Mangonia.

De Man-
ponio ma-
lorum Me-
dicorum.
Ut arceat
fiant dulces

Feruntur acres medullas mutatae dulcibus, si per triduum aqua multa semina ponenda macerentur, vel ouillo lacte, quod præstat. Aliqui mense Februario truncum obliquo foramine ab imo torebrant, ita ut altera parte non exeat: ex hoc humorem fluere permittunt, donec poma formentur: tunc foramen tunc replent, Sic quod est medium fieri dulce confirmant. Citreum & in arbore potest per totum annum propemodum custodiri. Melius si vasculis quibuscunque claudatur. Si pubescens malum fictili vel vitro claudatur, per incrementa formam vasis contrahet, & tanta magnitudine, quanta vas, extuberabit. Ad hoc autem Pomum videtur incumbere: sed cauetur foramen, per quod aër inspiret, si subacta gypso pomum oblinas, noxis omnino non patebit.

Ut varia
figura cres-
cant.

Ut non pa-
teat noxi.

Ut bonitas
aut arboris
in malis
imaginem.

Africanus scriptum reliquit modum, quo vel humanam, vel animalis alterius induet imaginem, si gypso vel luto siccescente hanc obducens, mucronis acie bipertito, videlicet in anteriorem & posteriorem dissecueris, ut ea iterum apte possint coniungi, postea in fictilia posueris: cumque pomum ad dimidium peculiaris incrementi peruenit, his formulis claudes, diligenterque vinculis distinges, ne obuoluti pomi peractum fictiles typi diuellantur: & siue Citrium, siue aliud quodvis mali genus fuerit, breui has exprimet effigies, nec non has animalium figuras representabit, quorum & habitum & imaginem mentiri placeat.

Ut rubra
fiant Citria

Si rubra Citrii poma voles efficere, sarcolum Moro inserto, & malum rubrum dabit. De Citriorum & Limonum cultu consule etiam Iouianum Pontanum in hortis Hesperidum.

De poma-
rum

Si velis legere atque seruare mala Medica omnis generis, nocte Luna latente debebis cura ra-

mis foliatis carpere, & secreta à se invicem disponere. Diu integra à putredine præseruantur, præsertim Citria, si reponantur loco non nimium frigidus aut calidus, in vas in quo hordeum bene exiccatur. Cauendum tamen ne se mutuo contingant. Sotum rei rusticæ celebris auctor, iubet poma Citrii subacta gypso studiosè perlini, ut toto anni curriculo, inoffensâ integritate, illata omni vitio seruentur. Citria mala non putrescere promittit, quæ aceruis Hordei fuerint obruta. Alii singula vasis singulis claudunt, vel gypso adlinunt, & opaco loco ordinata custodiunt. Plerique in Cedri scrobe, vel in straminibus minutis, vel in paleis recta seruant.

Ut diu conseruentur

Notanda & hæc antipathia, quam Citriis accidere scribit Fracast. quod scilicet in ipso in eorum cumulum pane putrescant. Attrahere enim panem eorum humiditatem, quæ de causa necessarii paulatim flaccescant.

Utilitas ex cultura.

Sed quæ utilitas tam diligentis culturæ redundat in cultorem? Maxima sanè: Nam et si delectatio ipsa, & tam saluberrimarum arborum cultus, pro utilitate sit habendus, vsura tamen inde diligentioribus & copiosis colentibus redit non contemnenda. Multæ primum acquiruntur pecuniæ ex venditione arborum, quæ multiplicari possunt: florum Citrii pro acetariis, pro condiendis aceto, melle, & saccharo: florum Aranciorum, pro pretiosissima aqua Naphæ, quam vocant: fructuum immaturorum, pro condituris: Aranciorum pro globulis & corollis, quæ grati admodum odoris: maturorum pro conuiuiis, pro ægrotis & medicamentis: corticum Aranciorum pro bona sinapi confectura, & aliis condituris, ut pane aromatico, etiamque corruptorum propter succum & semina: Aranciorum seminantur, Citriorum venduntur Pharmacopœis. Solent verò Mercatores emere hos fructus mense Septembri & Octobri. Separant maturos ab immaturis. Immaturos vehunt in Germaniam, Hungariam, Poloniam, ac etiam Moscouiam, qui suam interea acquirunt maturitatem, & crudi edi possunt, in quibus locis magni venduntur. Et hæc ipsamet die [Octobr. 14.] qua hæc commentamur huc Montbelgardum attulerunt geminæ differentie Arantia. Italica non perfecte matura, & Provincialia satis matura: hæc ciues, illa Pharmacopœi [imatura respicientes, quod diu seruari non possint] coemebant, dicentes maturitatem acquisita suo tempore rectè custodita. Tum sibi futura Aurancia, cum defuerint aliis. Maturos, quæm ceteris possunt, diuendunt Itali hortulanæ Pharmacopœis ad condituras. Vidimus vnicam arborem Citrii, satis tamen elegantem, Basileæ centum florenis diuenditam. Ipsa etiam folia quibusdam in locis venduntur, quæ cum cibis decoquant ad odoris gratiam. Denique nihil hic quod non vile & frugiferum suo cultori, quoniam modo esse possit. Scribit Calzolanus, ex vno tantum terræ ingero malorum Medicorum circa Lacum Benacum diuersi generis arboribus confito, centum & quinquaginta, & quandoque plures etiam ducatos, annuum colonos recipere.

Iam quis vsus in Medicina, quanta commoditas, quæ gratia? Charta prius deficeret, quàm omnia persequi possemus. Fas sit tamen, institutæ nostræ Methodo satisfaciens, ex probatissimis quibusque authoribus malorum Medicorum omnium vires & vsus recitare.

vires & vsus.

Iam supra ex Theoph. diximus, quæ sit Malorum eius Medicorum utilitas. Diosc. malum Medicum in vino bibitum venenis resistit, aluum subdu-

Malorum medicorum in genere et species. Vires.

Abducit: decocto aut succo colluto suauitatem oris facit: estur verò maximè à mulieribus contra malaciam, quam picam vocant. Arcis quoque uestigiis impositum eas ab erosionis vitio vindicare creditur.

Tempera-
mentum.
Gal. nerf.
amend.

Galeno Mala medica in semine (et in cortice) sunt, succolam medullam, semina ambientem intelligimus) quidem vincentem habent qualitatem acidam & siccam, ut ipsum tertii sit ordinis refrigerantium refrigerantiumque: in cortice verò itidè deficcationem temperiem sunt sortita, non parum tamen habentem acrimoniae: Proinde deficcata hic secundo excessu, non tamen frigidus est, sed aut temperatus, aut paulò infus.

Cortex Aetio in tertio excessu excalescit, deficcaturque in secundo. Variat tamen calor corticum pro ratione amaritudinis: estque Aranciorum ceteris calidior: Citriorum temperatior.

Porro caro Mali medici, Galeno crassi succi est, & pituitosa [id est pituitosum humorem generans] frigidaque. Nam & ipsa editur sicut & cortex. Semen omne edineptum est, tum humidum illud & acidum, de quo modò dictum, & nucleus qui in eo inuenitur, id quod reuera semen est. Hic amarus est, & digerendi videlicet siccandique facultatem obtinens, secundo quodammodo ordine à temperatis recedens. Folia denique exiccandi ac digerendi vim obtinent.

Semen.

Folia.

Venenae.

Malacia
Stomachi.

Experimen-
tum vari-
um. Mirabi-
lis antipa-
leus.

Plinio Citrea contra venenum in vino bibuntur, vel ipsa vel semen. Faciunt oris suauitatem decocto eorum colluto, aut succo expresso. Horum semen edendum praecipunt in malacia praegnantibus: ipsa verò contra infirmitatem stomachi, sed non nisi ex aceto facillè manduntur: Item alibi: Citreis odor acerrimus, sapor asperimus: Rursus alibi: Malum execratum aliquibus odore & amaritudine, aliis expetitur, quod sanè verissimè esse. Nobiliss. matronè à Ryschach exemplo nobis compertum, quippe quæ diuturna ventriculi imbecillitate & nausea vexata, pro remedio, quod illi opportunum & salutare (nec sine ratione & experimento quotidiano) putabamus, corticis citri vel crudi vel conditi, non aliud ei praestantius vomitorium fuit: quippe cuius vel odore solo nausea concepta, paulò post multoties eruperit in vomitum. Quod de semine ait Plin. aduersus Malaciam: id de succo potius aut cortice intelligendum, ex Diosc.

Calor sto-
machi.
Proprio
Cardiacus.
Vomitus
aliqui flu-
xus.
Tremor.
Nouus.

Serap. ex Aben: Magna vis carnis citri ad restringendum calorem stomachi: succi illius, impetigo tollitur. Eiusdem decoctum cardiacum confert, appetitum excitat, incidit bilem flauam & crassam, vomitum compescit, fluxumque ventris. Calorem hepatis restinguit, & à proprietate quadam tristitiam abigit, praesertim eius syrupus. At succus eius pulmone nocet & nervis, propter nimiam suam acerositatem. Grana resistent venenis drachma pondere sumpta ex aqua tepida, & loco infecto imposita. Ventrem etiam emolliunt.

Auic. 200.

Porro de Citri seminis temperamento sibi nequitiam constare videtur Auic. quod lib. 2. suae medicinae, calidum: ad in comment. de viribus cordis frigidum & quidem in tertio ordine facit. Dicendum illud priore loco locutum de seminis inuolucro: posteriore de nucleo quem tamen non temerè frigidum dixerimus tantò minus ordine tertio. Attamen sic quidam euadendum censet Avicennistis, quos vocant. Alii Corticem Citri calidum dicunt ordine primo, siccum in fine secundi, in quo à Gal. dissentiant, qui temperatum dicit, aut certè temperato proximum. Monard.

sanè semen calidum dicit in tertio gradu, & communem theriacam aduersus venena, acidum verò succum frigidum & siccum in tertio: robur addere Cordi, & scorpionum, serpentumque ictibus & morsui resistere. Cum lingua in tantam molem increuerit, ut ore retineri nequeat, fricanda est citriorum acido succo, aut Malo punico, donec multa salua defluerit. Citri cortex est ex veteris theriacalibus & & latificantibus, cui accedit flos & folium, sed subtilioris sunt substantiae. Caro Citrorum inflat, sed folia inflammationem compescunt. Quare cdm paulò tardioris sit digestionis, satius conditam sumere: Esti verò cortex quoque difficilius coquatur ob suam duritiem, additus tamen cibariis concoctionem adiuvat. Qui citrum deuorare vult, solum comedat per se, & extra alios cibos. Qui ad colicum dolorem proclives sunt, caueant ab eius succo. Ex eodem factum Collyrium Icterus oculorum obstergit. Acidus eius succus nocet quidem sed in syrupum concinnatus, prodest gutturi & pulmonibus: subaudi, pituitoso infarctu oppressis. Incidendo enim sputum & blennam excretu faciliorem reddit. Succus acidus Citri Ictero confert, & choleeram morbum sedat. Semen haemorrhoidibus confert, in quo etiam est vis purgantium: succus corticis viperæ moribus aduersatur bibitus: ipse verò etiam cortex emplastri forma impositus.

Colicū
dolor
Icterus &
colorum.
Pulmones.

Icterus.
Haemorrhoides.
Purgans.

Historiam
experimenti-
um Citri
aduersus
Venena.

Athen. experimento iam dudum innotuit, sumptum Citrium ante quodvis alimentum, siccum pariter & humidum omnibus venenis resistere, quemadmodum se satius nouisse scribit, à suo ciue id edoctum, cui Aegypti mandata fuerat administratio. In maleficio deprehensos quosdam ille id serpentum morsus damnauerat, quos oportebat eius nodi bestiis obici. Productis illis, & ad theatrum euntibus destinatum latronum supplicio, in via fortè euphonia quadam misericordia commota, quod in manibus tum habebat, Malum Citrium dedit. Acceptum verò illi comoderunt: & paulò post ingentibus ac ferocissimis anguibus oblatis, commorsique ab aspidibus, nihil lani sunt: qui tandem cum illorum custodem militem interrogasset, num quid bibissent aut edissent, ut id comperit quod acciderat, nimirum absque dolo Citrium illis traditum fuisse, postmodum alteri rursus dari iussit, alteri minimè: percussus hic contestim periit, illi altero qui Citrium comederat. Indeque multis & expertis cognitum est Citrium aduersari venenis omnibus. Quod si quis Citrium integrum, & quale naturā est, cum semine, in Attico melle coquat, donec liquatum tabescat, & eius liquoris matutino tempore haustulum sumat, tutus erit à venenatis omnibus medicamentis.

Aduersus
venena
medica-
menta.

Scribit etiam Theopompus Clearchum Hecaleorum Ponti tyrannum infinitos veneno sustulisse, sed longè plures, si populum praestantis Citri vis latuisset. Ex quibus patet Citrio praecipuam esse ad arcenda venena facultatem, quod ad futura, non etiam iam sumpta quidam arbitrantur: alii contra: ut perspicuum sit amuletum, & praesentissimum contra iam ebibita. Rei veritas solo constare potest experimento.

Igitur cum vino contra venena bibitur, vel semen ipsum, praesertim verò contra scorpionum ictus, & etiam appositum, ut dictum. Per se menses educit, sed embryonem in matrice enecare creditur. In aqua decoctus cortex, pedibus in tumore vtiliter additur. Arcet pestilentia contagia omnia quocunque modo usurpatus. Proinde recentiores medici ad febres pestilentes syrupis ex his confectis, praesertim ex Citrio, feliciter

Scorpionū
ictus
Menses.
Embryo.
Feb. pestil.

*Syrupus de
paraf. Citri
Syr de cor-
tice Citri.*

vtantur, syrupus de acetositate Citri inflamma-
tionibus & zstibus succurrit, & valet ad omnes
morbos biliosos, & qui aliquam malignitatem
præ se ferunt, & ad sitim extinguendam. Est etiam
alcer non incelebris syrupus qui è corticibus Ci-
triorum aut Limonum conficitur, cuius vsus est
ad cerebri & cordis affectus frigidos & pituitosas
agritudines. Pro quo, si desit, Citriorum condi-
tura ut poteris, quæ & facilius stomacho obedit
quàm cruda, ventriculūque nihilominus corro-
borat, quamvis in cibo Itali cruda præferant, præ-
sertim cum carnibus assatis esitata. Condiendi
modum cortices postea docebimus.

*Limonio-
rum comp.*

Limonia verò cum gustu omnibus reliquis spe-
ciebus sint acidiora, idè succo & frigidiora &
sicciora esse probabile est. Valent ad eisdem vs-
us, ad venena tamen, ut minus efficacia, ita ad
zstuentes morbos potentiora habentur. Et hos
quidam comedunt, sed integra & asperso multo
saccharo, sed neque hæc facili obediunt coctioni,
quia cortice quàm ipsa Citria sunt duriora, licet
multò tenuiore. Condiuntur & parua integra ad
varios vsus, etiam medicinales.

Condita.

Syrupus.

Syrupus de succo Limonum magni sit ad cal-
culum & obstructionem renum, item ad sitim &
zstum, in febribus ardentibus. Cordi robur ad-
dit, præsertim verò officio ventriculi, bile qua-
cunque obfesso: idèque haud infeliciter imbeci-
litates, lipothymias, fluctuationes, vomitus &
singultus, febribus ardentibus superuenire solitis
curat.

*Arancio-
rum comp.*

Arantia, quia diuersi sunt gustus, diuersarum
quoque esse virium censendum: dulcia in omni-
bus partibus excalesciunt, cæterorum verò suc-
cus refrigerat: acidum non editur. Paulus ta-
men, & Aelius Antiquos succum tantum deglu-
tere, & corticem ore solum detinere, & carno ves-
ci solitos, scribunt. Nos verò hodie acidorum
succo tantum vtuntur ad delicias, cortice verò ad
obsonia.

*Syrup. A-
rantii ex
condita-cort.*

Vermes.

Tantò calidiorum corticem Aranciorum esse
statuendum, quantò cæteris gustu amarior
deprehenditur. Paratur & ex horum succo syru-
pus: & cortices condiuntur, verminantibus pue-
ris optimi futuri, nisi amatorem respuerent. Se-
mina quoque vtiliter iisdem dantur. Ex semine
terre commisso arbusculæ primo anno prodeunt,
quæ in acetarii modum comestæ, admodum pala-
to sunt gratæ, ventriculum insuper corroborant,
& appetitum excitant, auctore Dod.

*Arantia
ex foliis.
Ventricu-
lus.
Ad hanc
stuid.*

Ad acerbissimos hæmorrhoidum dolores mi-
rabile est experimentum Amaci, & est tale. Aran-
cium excavatum oleo rosaceo & pseudonardi seu
lauendulæ dictæ semine reple, & ad cineres cali-
dos tepesactum applica, & sæpè indoua, & est
mirum. Succus ex Arantiis dulcibus expressus,
potu somnum prouocat, potissimum verò cum
succo violarum in Pleuritide & similibus morbis
calidis.

Somnus.

*Florum G-
fusi ex qu-
li.*

Stillatius quoque liquor ex floribus Arancio-
rum paratur, rarè aut nunquam serè ex aliis. Aran-
tiorum quippe flores odore primi, pomorum A-
dami secundi, Limonum tertii, Citriorum sem-
per vltimi, ut scribit Aug. Gall. quod mirum. An
quia nobilior pars abit in fructum? nam & Citria
cæteris odoratiora, si recentia. Ea multò suauis-
simæ fragrantiz, & præcipua diligentia sit Neapo-
li & Lucæ, ut testatur Camerarius, ubi Naphæ &
Angelica aqua nuncupatur, aliis Naphæ. In offi-
cinis & à Medicis communiter aquæ florum Ci-
trangulorum appellatur, Lacunæ de Azahar. Ad
paula vtilis propter odoris fragrantiam. Hispani

*Aqua Ne-
phæ.*

infantibus in graui partu propinquant, maxime cum
pauxillo aquæ Pulegii. Sed in hunc vsum longè
efficacius est oleum è corticibus confectum, quod
& cordi amicum est, & in multis morbis vtilissi-
mum compertum. Pestis tempore, vtile est ab-
luere faciem, manus, axillas, pudenda, aquâ flo-
rum Citrangulorum: eadem & sudores mouet,
auctore Platero.

*Partem.
Oleum è
corticibus.*

Destillatur etiam aqua ex ipso Citrio pomo to-
to, gustu suavis, admodum cordi & cerebro con-
ferens, cuius vsus est in febribus putridis & mali-
gnis cum conserua acetositate Citri.

*Aqua Ci-
tri.*

Huius semina ut & Aranciorum & Limonum
cum cortice ad 40. vel plura comesta alium sol-
uunt, quod & Diosc. notauit: & Brasauola in tra-
ctatu de purg. med. verum esse asserit.

Purgant.

Aqua verò quæ è Limonum sicut & Citrio-
rum succo per B.M. vitreis organis elicitur, excel-
lens est ad decorandam mulierum faciem, quâ
plurimum vtuntur in Italia, in potu exhibita pue-
ris lumbricos perimit, sed & extrinsecus vitiligi-
nes, vbicunque sint, & totius corporis maculas
emendat, varos delet, & acaros interimit.

*Aqua Li-
monum.
Facies.*

*Imperigo.
Macula.
Febres.*

Syrupis admista in febribus acutis & contagio-
sis mirè succurrit, id quod etiam præstat succus
recenter expressus, vnciæ pondere potus, auctor
Matth.

Flores Aranciorum sedulò decerpuntur ab vn-
guentariis ad varia odoramenta conficienda. A-
qua verò, inquit Dalec. quæ inde elicitur ad pesti-
lentes febres cum exanthematibus corpus obsi-
dentibus. Nam sexunciarum pondere hausta,
putres humores ab internis ad exteriora attrahit,
per sudores, quos valenter euocat, cordique plu-
rimum confert. Succus Limonum ex vino Creti-
co haustus mirificè calculos pellit. Aliqui succum
Aranciorum vino commiscant, ita citius inebriare
credentes.

*Exanthema-
mata.*

Sudorifici.

*Calculus.
Ebricitas.*

Porro ex historiis Navigationum discimus ad
Scorbutum hodie in Indiam nauigantibus nul-
lum præstantius remedium malis Aurantiis & Ci-
triis, ut quidam etiam solo esu crudorum diutur-
no curati perhibeantur. Quidam cortices Aran-
tiorum præscribunt ad fures & lendes. Mo-
nard. Nonnulli tanquam magnum arcanum, a-
quæ stillatiæ florum mali Aurantii tepidæ qua-
drantem præbent: nam vomitum prouocat, &
occulta facultate veneni vim exunguit. Insigni-
ter vtile aduersus venena Aranciorum in Citro
infertorum semen.

Scorbutus.

Fures.

*Auranti-
um aqua*

Vomitum

mauer.

Semen ad

uq. s. ven-

ena.

*Vires Ci-
triorum à*

figura seu

*charactè-
ris.*

Porta Neapol. noua sua philosophandi ratio-
ne, vult mala Medica, potissimum Citrium idè
potissimum ad cordis agritudines prodesse, quod
eiusdem figuram representet: Item quod imite-
tur superfætationes leporum, idè eorum virtu-
tes esse mutuas: denique quia flauis sint cortices
Citriorum & Aranciorum, idè flauam bilem re-
stinguere. At melioret, si quis flauus est re-
stinguit cortex, ipsa eiusdem pars, quæ maxime
flaua, maxime restinguet, quæ cum sit acris &
amara, non nobis persuadebit Porta bilem re-
stinguere.

Porta me.

Oleum quod ex Citriorum & Auranciorum
corticibus exprimitur forte est, ut Auic. scribit,
nos igne penè qualitatis esse comperti sumus,
quod facile patebit ei qui corticem recentem
iuxta candellam presserit, ut exiliant guttulæ in-
star rotæ, videbit, strepitum & scintillas flam-
meas excitari ac si puluerem sulphureum adhi-
buisset. Sunt qui eximent eodem modo expres-
sos cortices in oculos, clarificare visum. Sequi-
tur quidem dolor breuis, sed mox oculi clario-
res.

*Oleum cor-
ticum.*

*Claritas
visus.*

*Oleum flos-
rum* res, & visus penetrantior reddi videtur. Oleum
factum ex floribus debilius est ad omnia, ex eo-
dem Auic. quod tamen hodie ferè non est in vsu.
*Vfus Oles
Corticum
Lumbrici.* At oleum ex corticibus Arantiorum extortum, &
Citriis stillatum necandis lumbricis & terebinti-
bus idoneum, teste Oliuo in Museo Calceolarii.

*Vfus Po-
morum
Adami* Fiunt & ex tenellis deciduisque Arantiis glo-
buli, qui vel ornatus vel odoris gratia de collo
suspenduntur, quod frequens hodie in Gallia, vbi
à sceminis omnis penè conditionis gestantur.
Scabiei. Scribit tamen Dalechamp. Pomorum Adami suc-
cum ad ea omnia valere, ad quæ Limonia, quæuis
minore efficaciam. Peculiariter autem valent ad Sca-
biem, si per medium secta, & tenuissimo pulue-
re aspersa, deinde cinere feruente calefacta, cor-
pori scabioso affricentur.

*Foliorum
Citræ & Sij* Folia M. Idorum Medicorum siccandi discutien-
dique vim obtinent: quamobrem variis medici-
nis addi possunt, vel per se usurpari, vbi tales
vires postulantur.

*Rosatum
ex foliis
Citræ* Palladius Rosatum fieri docet sine rosa, hoc
modo. Folia citri viridia sporta palmea missa in
musti nondum feruentis vase depones, & clau-
des, & exemptis quadraginta diebus melle addi-
to, ad modum rosæ cum placebit, vtæris.

Restat vt modum condiendi Citria breuiter
doceamus. Condiuntur autem Limones ferè in-
tegræ, sed minores: Caro Citri: Cortices Citri, &
Arantiorum: Arantia integra: flores Citri & Ar-
antiorum, sed hi prævalent. Citrium exempli gratia
sic condiatur. Recens per longitudinem in qua-
tuor partes lectum, mundetur ab acetositate &
semine. Coruces macerentur in aqua addito sa-
le crasso, per dies septem: ita salis vi & acrimo-
nia quasi constrictiores apprebunt: hinc den-
ta omni salsedine & ablutis, affundatur alia limpi-
da & dulcis, sepè mutando, & gustando donec
perfectè dulcorentur, omnisque salsedo abierit.
Tum accipe mellis boni, part. j. aquæ, part. ij. eà
quantitate vt coeperiantur cortices, & in vase ter-
reo, sed vitreato decoquantur, igni lento, horis
duabus: deinde eximantur cortices & refrigescant.
Sequenti die ebullito & despumato prius melli
prædicto iniiciantur rursus, & serueant bullitione
vna & recondantur in vasa cum suo Syrupò, qui
ad perfectionem coctus esse debet. Hunc modum
prescribit Auisenna, & etiam aromata addit: ha-
betque etiam alium modum, isto laboriosiore,
cum Saccharo & melle, prius in aqua à frigore
hyems aliquandiu gelatis corticibus, quem con-
sulat Lector, si volet. Commendat ad debilitatem
stomachi, & ad iuuandam digestionem. Hodie
ferè conduntur Saccharo clarificato, cum Syru-
pò & absque eo: priores cortices conditi simpli-
citer: posteriores, Cortices conditi sicci à seplasia-
riis appellantur, eodemque modo & Limones, &
Arantiorum cortices condiuntur. Horum specia-
tim vsus præstantissimus ad quæuis frigidas affe-
ctiones stomachi.

*Stomachus
frigida.* Cum Mospelii ageremus, obseruauimus na-
ues Aurantiis onustas aduectas, & multò minori
pretio diuenditas, quàm vulgaria Mala. Aliquan-
do 24. pro vno asse regio coemimus. Lugdunum
quoque tanquam ad celeberrimum totius Galliz
Emporium magna copia conuehantur ac inde in
varias provincias distribuuntur. Quum redundat
vel corrupti incipiunt: cortices detrahunt pro bella-
riis saccharatis: succum diuendunt tinctoriis se-
rici: eo enim vtuntur sicut & succo Limonum.
Huic tanta vis, vt corallium etiam dissoluat.

*Litorea co-
culia.* Succo Aurantiorum scribuntur literæ occultæ,
quæ igni adnotæ manifestantur. Limonum acido

succo tam elegantem purpuram conferre rosarum
conculabis, vt nihil supra. Variat & in eandem
elegantiam conferuam florum Violarum, alio-
rumque diuersorum, vt quisque pro libitu ex-
periri poterit.

Cdm ego [Bauh.] iam ante 40. annos in dira
& leuissima illa peste quæ Lugduni 5000. homi-
num extinxit, publico stipendio medicinam fa-
cerem, & frequentissimè Mala Aurantia præscri-
berem, horumque succum, tanta eorum an-
nonæ caritas oborta, vt singula testili carius, ter-
na aut bina etiam non raro aureo diuenderen-
tur.

Vidit Ioach. Curcus Venetiis succo Limonum,
signum Indicum, Guaiacum appellatum, emol-
liri, vt ex Saccharo deinde condiri posset. Idem
quoque succus calculos renum potenter frangit.
Antiquitas (ex sententia Manard.) non velleba-
tur Citro, sed odoris causa in vsu erat, & magnà
hominum curâ ex acri dulcem cibum fieri docuit.
Alexipharmacà etiam virtute pollet, quanquam
Marcellus dubitet an semen, aut pomum sit: quo-
niam Dioscor. relatiuum, tam ad semen, quàm ad
pomum refertur, sed Plinii doctrinâ monitus, tam
semini, quàm pomo attribuit virtutem. Theophr.

verò totam vim integro pomo assignauit, cuius
vestigia Paulus secutus est: Contra omnia venena
est præsentaneum remedium, & contra ictus ani-
malium venenatorum. Ad diuersas regiones pro-
pter remedii præstantiam deuenerant Citria, &
cùm non velcerentur propter odorem, medica-
menta tantùm erant in vsu, quod Plutarchus
retulit & Athenæus affirmat. Tunc enim inculta
erat arbor & maximam amaritudinem & acetosi-
tatem Citria habebat, vt non absque ratione So-
crus Plinii finit, miræ amaritudinis esse scribat,
quod homines magna cura peruerterunt, & Co-
stantinus Cæsar docuit: nam in ouillo lacte semina,
priusquam ponerentur, maduerunt, sic autem
ad dulcedinem mutata sunt. Et non amiserunt in
totum suam amaritudinem, nam cortices huius
primi, intensam amaritudinem adhuc possident.
Non autem omnia Citriorum genera amaritudi-
nem intensam nobis habere videntur, quinimò
scribunt de Arantiis, quibus cortex dulcis in Zel-
lam Insula.


*Limoni
succus de-
rissima
corpora e-
molliet.
Oder Citri
Vteribus
commenda-
tur non so-
lus.
An virtus
Alexiphar-
mace in
pomo vel so-
mine.*

*Pires con-
tra venena*

*Amaritudo
insignis
quomodo
mutatur.*

DE CARCAPVLI.

CAP. XXIX.



Egressi ex Descripti-
hortis & vi-
ridatis Euro-
pæis, Exotica
Pomatia quo-
que spectemus.
Primo sese si-
militudinis cu-
iusdam præro-
gatiuâ offert
Carcapuli, quæ
(autore Acolta)
vastæ magnitu-
dinis arbor, fru-
ctum ferès Ma-
lo aureo, cui
cortex exam-
ptus sit, magni-
tudine & forma
simplicem, ex gra-
mis ordinem

Fructus.

Cortex.
Sapor.

constantem, [sed non separabilibus ab invicem, ut in malo Aureo] tenui, lauique & splendenti cortice tectum, non admodum sicco, colore pallido, at ubi maturuit aureo: gustu admodum austero, sed quadam adstrictione grato.

Carcapuli Malabaribus, Carcapuli Canarinis, Costæ ex quo & Histor. Lugdun. habet, in appendice.

Nomina &
Synonyma

Locus.

Vires. &
Vitis.

Ad profu-
m
Cibus.

Appetit.
Ad viles.
Ad secura-
das
Ad gene-
rat lactis.

Partus.

Effusio.

Locus.

Arbor.

Differen-
tia.

Bry fratres in iconibus Indiarum Or. Carcapuli, inquit, in Insula Sunda crescit, fructus est suavis, magnitudine Cerasi. Ergo differt Carcapuli eorum ab hac, in eo, quod fructus dicat magnitudine tantum Cerasi: verum figura eorum quam proponunt, non multum differt ab hac.

Ex utuntur [addit Acosta] in cibis, magnaque apud incolas illius est laus in curationibus: sed inter omnes, quæ experientia comprobata sunt, primas obtinet profluuii alui cuiuscunque generis constructio, in his præsertim qui nimio Venæris usu hoc malum contraxerunt. Editur verò aut ipse fructus maturus, aut eius fructus cum oxygala sumitur, aut illius exiccati pulvis. Cum oxygala autem mixtus & cocta oryza, mirifice appetitum deiectum reuocat. Vtilis etiam est eius succus, & exiccati pulvis, in oculorum caliginibus & suffusionibus. Familiaris est fructus pulvis obstetricibus, puerperis enim exhibere solent ad pellendas secundas, & ad purgationes, atque lacus ubertatem præstandam: tum etiam ad facilitandum partum, magnâ, ut aiunt, efficaciam. Succus eius cum albis plantis mixtus, vngui maioris digiti pedis imponitur, eodem latere quo quis aut caliginem, aut suffusionis initium in oculo habet, vtilē, quæ esse perhibent. Transfertur hic fructus siccus ex Malabar in alias Prouincias.

Carcapuli fructus, teste Linschott. in laua ad litus Sunda crescit, aliquot intus continens lapillos. Gustu est admodum austero, magnitudine Cerasi. Ipsa etiam arbor Ceraso nostro similis est. Huius fructus, eodem autore, variae sunt species & differentiae. Aliqui enim sunt albi, aliqui spadicei, aliqui incarnati, qui præ cæteris gustu sunt commendabiles.

MELO CORCOPALI: ARBOR CYDONII FACIE

CAP. XXX.

Descriptio Corcopal Indiarum Prouinciæ est, in qua Cydonii magnitudine & foliis arbor prægnantem gerit fructum, Melonis figura, eodemque sulcatum modo. Intra quem terna quaternave grana acinorum vix facie, acore Cerasi. Melo hic & edendo est, & ad medicinas vtilis.

Gram. Theuetus in Promontorio Comari fertilissimo tradit arborem Melo Cydoniæ magnitudine & foliis similem, cuius fructum Corcopal vocant, est grauius, gustu suauissimum, quo etiam agrotantes vtuntur, quia prauos humores per aluum expurgat. Hist. Lugd. Melocorcopali Scaligeri vocat. Verum considerandum relinquimus an hæc arbor non sit eadem cum prædicta.

Corcopal.

Vitis.

ARACYNAPPIL, AVRANTIIS PARVIS SIMILIS FRUCTVS.


CAP. XXXI.

Descriptio Inter fructus Exoticos Ill. C. V. Virt. sel. record. Stutgard. 1608. fuerunt duo fructus uterque

perforatus, transmissumque filum, appendebat schedula, cui erat inscriptum nomen manu D. Paludani Aracynappil, quod si non fuisset appensum, ego nihil aliud iudicasset, quàm parua mala Aurantia, sunt enim eo modo orbiculares rugosi & nigricantes, sapore eodem. Maiorem referuam, minorem reliqui Ill. Principis.

AVRANTIO SIMILI FRUCTV ARBOR.

CAP. XXXII.



Descriptio Palmaris [te- ste Clusio Exot.] ramulus anno 1595. visus apud C. V. Paludanum, è regione Nigritarum allatus, quadrangulus, rugosus nodis distinctus fragilibus, bini semper ex aduerso innascebantur huic ramulo surculi, sustinentes breui crassoque petiolo fructus è calyce veluti quatuor squamis cōstante prodeuntes, vncialis vt

plurimam magnitudinis, orbiculatæ formæ, rugosos, nigros, inftar Arantii parui resiccati: intus plenos fungosâ quadam pulpâ [cui commixta parua nonnulla grana penè vt in ficibus] adstringentis initio saporis. Nulla porò in eo ramulo foliorum vestigia apparebant, vt dubitari possit an hæc arbor ex illarum sit numero, quæ pediculo siue ramulo æquos suos flores & fructus profert, vt aromatici caryophylli.

FRUCTVS BRAS. OVALIS FIGV- RÆ INSTAR LIMONIS.

CAP. XXXIII.

Descriptio Fructum ex Brasilia allatum asserebat Paludanus, vt testatur Clusius Exot. l. 2. c. 7. penè ovali figura, instar mali Citrii seu Limonis. Superna tamen parte magis mucronatus, tres vncias longus, eius ambitus sex vnciarum erat: duro lento tamen cortice præditus, intus verò pulpa nigra continebatur, quæ propter vetustatem in pollinem prorsus resoluta erat. Cæterum hunc fructum lectum fuisse arbitror, antequam maturitatem adeptus esset, quando quidem rugoso erat cortice, plerisque locis veluti in lacunas contracto.

CITRA INDIS LIGNVM.

CAP. XXXIV.

Descriptio Rustula olim ad nos misit Coldenbergius, ligni arboris, quæ Citra Indis nominetur, pectinibus

De Certeau
Foucault

Description

Admission:
\$1.00

Description

Order.
 Folio.
 Pages.
 Paper.

С. 47. XXXV.

Definição

7/20/20

Сл. XXXVII

Order.

*Indicador de
moneda de
dólares.*

1/12

CAP. XXXVIII.

Scripture

С. Р. XXXIX.

1974.

CHLORAL L.

Descriptio
Folia.
Flora.
Fructus.

Nomina
Synonyma
Maracot
de Benga
la
Male Cy-
donia
dum per-
siana.
trifida.
Aeth.
Locus.

crisifolia melos de Bengala, Benisifolos & Cotognos Bengaleses vocat.
Vires Fructu maturo pulpa sine medulla eximitur, quam in taleolis sectam saccharo condiunt. Aut tener adhuc & immaturus muria adseruatur in vltum. Solent Guzarateses Medici vti hoc fructu tenero adhuc & immaturo, aceto vel saccharo conlito, in inueteratis alui proflumis sistendis adstrictionem enim illam semper conseruant, tameti maturi. Retulit mihi Garcia verba sunt clarissimus vir Dymas Bolque, Valentinus Medicus, rei herbarie peritus, sc. cum castra Illustr. Principis D. Constantini in India pro Rege sequeretur in Iapanapatan, magno & admirabili succellu xum esse in profliganda dysenteria, quae vniuersum eius exercitum affligebat, cum ad manum non essent visitata remedia. Etenim nunc ex huius fructu & saccharo, miltam parabat, quam agris daret. Hunc pulpa eius eniplastri modo ventriculo & aluo applicabat: modo pulpam saccharo exceptam, vt in Cydoniis solet, agris exhibebat interdū fructum assum inperso saccharo: nonnunquam cortices exempta pulpa decoquebat, atque id decoctum per clysteres iniiciebat. Similem verò effectum praebebant, qualem balaustrorum aliorumque adstringentium medicamentorum, quibus vti solemus, decocta praestare solent.

Dysenteria At silentio praetereundum non est, quod eadem castra sequenti contigisse refert. Dederat Seruo Aethiopi bina eiusmodi Mala assanda, vt quidam militi dysenteria laboranti edenda praeretur: verum dum assantur, crepuerunt: itaque pulpa Aethiopis faciem, pectus & brachia sic adussit, vt puluere tormentario vstulatus videretur: quod contigisse puto ob pulpae lentorem & visciditatem simul & adstrictionem, quae semel accensa vehementius vnt, quam sicca aliqua materia, quemadmodum ferrum incensum magis, quam lignum aut stupam vrect videmus.

ARBOR FRUCTVM MELONIS FACIE PROFERENS.

CAP. XL

Descriptio Ellahae est Arbor, in Insula S. Mariae Indicae proveniens, ex qua crescunt fructus, Melonistae, cortice duro atque lignoso, plurima intus continentes grana, vitida, lata, aluum ctenia. Linschoet.

GVAYAVA INDICA, FRUCTV MALI FACIE.

CAP. XLI

Descriptio Vayavas fructus, inquit Monardes, quem Indi & Hispani ita vocant, arbor est mediocri magnitudinis, ramis sparsis & folio Laurino, flore candido, Aurex mali floribus simili, aliquantū tamen maiore, odorato. Facile nascitur quocunque loco feratur, adeoque luxuriat & seipso. Et in terra vitiorum numero habeatur, nam plurimorum agrorum gramen quod depastuissent greges corumpit, nimio, vt Rijbi, implexu. Fructus nostris Malis similis est, eorum magnitudine, quae ab Hispanis Camueles vocantur, viridissimus, & per maturitatem auratus, pulpa interior alba, interdum etiam



rosea. Diuisus quatuor conuerationes aut vascula habere conspicitur, in quibus semina semina reconduntur. Mespilorum seminibus similes, colore fusco, durissima, omnino olea, medulle & saporis expertia.

An de hoc i. Guayava. pla arbore Scil. ad Card. quando ait Guayava Malorum nostrorum congenerem faceret

si notam habuisses. Est enim arbor, tum fructus, Mali facie: sed color fructui candidus, in quo semen nigrum, minutum, rotundum, eximit ipsum ex illatum natura.

Considerandum quantum differat etiam ab his fructibus, Mespilum Indicum Scalig. de quo ait: Corcopal Indiae Prouincia est, in qua Mespilum colore albo, Mali magnitudine. Quando etiam quidam describitur, quae eadem videtur cum Guayava, vt & Hist. Lugd. censet.

Varia, inquit Gamara, Guayauanos genera, eademque varietas est in fructu, qui plerumque Pomis Hispanicis, Camueles appellatis, similis est, modo rotundus, modo alia forma, omnino viridis, foris coronatus vt Mespila, intus albus aut rubescens, in quatuor partes diuisus quemadmodum Iuglandes, & in singulis partibus multa grana continens. Maturus saporis est, immaturus verò asper & adstringens Sorborum modo. In nimium maturo color perit & sapor, vermescque generantur. Clus. scribit Guayaua arboris ramulum ad se misisse eruditissimum Simonem de Tothar, addito ipsius arboris fructu, sed prorsus rugoso, & vtile putat, immaturo, quem pluribus describit.

Idem Clus. apud Garciam. Fragosus tradit in sua Rhapsodia [& alii ante eum], in Guatimala fructum nasci Guayauas ab incolis nuncupatum, non minus adstringentem, quam praedicta Cydonia Bengalsia, cumque ad similem morbum [nempe dysenteriam, qui incolis eius regionis admodum familiaris est] propinari solere, sed prorsus tollum.

Petrus Martyr de rebus Oceani & noni orbis tradit Guayauam Darienses colere, arbores quae fructum ferat Citiorum generi, quos vulgò Limones appellant, simili sapore, acri, dulci commixto. Dubitamus an Scaligeri sit Guayava, quod minutum semen dicit in sua: An forte eiusdem Mespilum sit album, iam supra dubitatum. Guayavos Godar. Guayavas Monar. Guayabos M. Fumec. Guayanus Benzoni, qui arborem tradit Persici aut Armenii specie, solus vt Lauri, sed crassius & longioribus, celerrimè senescere. Fructum eius Mespili similitudine sed multo crassiores, pendentes in arbore maturare, nisi maturius decerpatur, vermes pignere. Hos fructus multa semina & grana clausa habere. Purpureos candidos praestare, & optimi saporis esse.

Linschoet. refert, crescere in Insula Iaua, S. Ma.

Arbor Mali facie.

Mespilum Indicum ex Corcopal.

Guayaua rō genera.

Mespili facie.

Sapor.

Descriptio rami Guayavae.

Nomina diuersorumque arborum sententia.

Descriptio Benzoni.

Descriptio.

rix dicta, fructum quendam nostris Pomis similem, colore aureo, lapides intus continet quales Mespilorum.

Hist. Lugd. b. s. habet locis diuersis. Primum sub nomine Guaiua Scalig. secundo in app. nomine Guaiuas Indorum & Hispanorum.

Locus. Vulgaris est per totam Indiam: fructus tam Indis: quam Hispanis celebrati.

Vires & Vitis Fructus eduli solet, prius dempto cortice palato gratus est, sanus & facilis concoctionis. Viridis in alui profluuiis utilis est, nam valde adstringit. Præmaturus aluum soluit, At medius, hoc est, neque immaturus neque præmaturus, si assetur, valentibus & ægris confert: nam ea ratione paratus sanior est, graviorisque saporis. Præstantior autem is est, quem domestica & cultæ arbores ferunt. Foliorum decocto Indi vilitur tumentia crura lauant: eodem Lienis obstructions tolluntur. Fructus frigidus esse videtur: Propterea febrientibus assatus datur. Monardus.

DE GVANABANO SCALIG.

CAP. XLII.

Descriptio **G**uanabanus, qualem vidimus apud Ill. nostrum Princ. Virt. fructus est Cucurbitæ forma, cubitalis ferè longitudinis, pugillaris crassitudinis, cuius cortice Cucurbitino nimum duro detracto, medulla in conspectum se dat, ex albo tantillum pallescens, non ingrata aciditate prædita, in puluisculum vetustate satiscens, cui semina immerguntur pertinaciter hærentia, turgida, renum figuram imitata, cortice si vngue radatur obducta nitidissimo, coloris nigri, quibus nuclei insunt candidi, callosi, saporis strobili dulcis, tenui pellicula obuoluti. Ceterum grana adhuc medulla inuoluta, filis appenduntur tenuibus, quanquam semina sola nequaquam obseruamus fibrillis illis annexa.

Descriptio arboris. Arborem, inquit Alpinus de Baobab, quæ hos fructus fert, vidi in quodam viridario, foliis magnitudine ac figura Arantis valde similibus.

Folia arboris. Scalig. ait suam Guanabanum arborem Pini stipite, proceram, folio magno, oblongo. Fructum Melonis magnitudinis, Cortice coloris viridis, splendore Cydonii, digitalis crassitudinis: Carcinitus candidam, dulcedine lactis coacti, semina continere satolacea.

Nomina & synonymia. Bern. Paludanus, Medicus insignis, & omnis naturæ sine zûulo perscrutator sagax, fructum hunc misit Ill. E. C. VVirt. cum hac inscriptione: Guanaban, Alpino dictus Baobab. Alpinus etiam Bahobab dici tradit, fructum magnitudine Citri.

Guanaban. An Cucurbita arbor Petro Martini lib. de reb. ocean. & noui orbis de qua ait: In Xaquara habet cucurbitæ arbores ad potus ferendi vsum. Eas vocant H. buero. Benzo: Patere [inquit] in Nicaragua, quæ Cucurbitæ speciei est certis arboribus per omnem Indiam enascuntur: in salinationibus præstant cucurbitam lapillis plenam.

Cardi. Tradit Osonius in sua Hist. Portug. Brasiliæ hos piscatores pellere pisces in magnas cucurbitas cauas. Brasilianorum dominatores ferre cucurbitam cui facies humana: imponere ignem: herbarum vaporem excipere naribus, unde quasi ebri reddantur. De qua re vide plura in historia Nicotianæ. Considerandum verò an illæ cucurbitæ ad Guanabanum sint referendæ.

Tom. Scaliger Guanabanum vocitans, Cardanum

reprehendit, quod non in dyodecimuro librum cum Manuici fructu retulerit: item quod eius pulpa liquorem appellat, sædo errore.

Gelnero. Guanabans fructus fortan Scaligeri Coldenbergio. Scaligeri Guanabanum dicunt Lobel. Hist. Lugd. Scholasticæ historiz arom. Ind. *Guanabani medulla & semina* Clusio, lco. Plant. Idem Clusio apud Garciam. *Guanabanum* inquit, cuius meminit Scal. puto esse cum qui superioribus annis ex Aethiopiæ Mozambique Antuerpiam allatus est, fructus crassus &c.

Huic simillimum fructum describit Theuet. c. 10. lib. singul. Americæ, foliis tamen ab hoc diuersis. Sed & alium fructum apud Canibales Theuetus & alii tradunt, cuius historia non malè nostro (inquit Clus.) fructui quadrare videtur. *Maraka & Tomaraka* nuncupant de quibus nos possea.

An M. Fumei hist. gen. Ind. Gallicæ: Cucurbita in Nicaragua quæ maturefcunt 40. diebus, quarum magnus usus victoribus ad ferendam aquam?

Porro Guanabanum ab Ill. nostro Principe E. C. VVirt. cum aliis quibusdam exoticis dono accepimus. Item à Perussiano stirpium Robino hortulano Regio, Lutetiæ. Alpinus scribit in Aethiopia nasci. Scimus aliquoties, sed frustra. Clus. tamen ex suis plantulas foliis Laurus similibus Antuerpiæ produisse scribit, quæ tamen subsequente hyeme perierint.

Bahobab fructus, Alpino, recenter ab arbore excisus, gustui admodum gratus est, in Aethiopiæ inflammatis locis, acido sapore, quem contemperant diuites saccharo: sitim valenter extinguit, multumque refrigerat. Ibi eo vtuntur ad omnes calidos effectus, febresque omnes putridas, præcipueque ad pestilentes, tum eius pulpam cum saccharo comedentes, tum succum expressum cum saccharo potantes, vel ex eo paratum syrupum accipientes. Cayri etiam quo loco recentes fructus non habentur eius pulpam in puluerem redacta vtuntur, quæ est veluti terra rubra, adstringenti acidoque sapore, gustum ferens qualis in terra Lemnia obseruatur: estque apud multos familiarissimus illius usus ad pestiferas febres, tum ad sputum sanguinis, ad Lienteriam, Dysenteriam, cruentumque hepaticum fluxum, nec non ad vteri menses firmandos. Alii eiusce terræ in subtilissimum puluerem redacta drachmâ cum aq. plantag. dissolutam, ad eadem exhibent, alii decocto, alii infuso vtentes. De eius succo eadem ferè scribit Paludanus in suis obseruationibus.

ABAVVS AETHIOPICVS FRV.

CTVS BELLO.

CAP. XLIII.

Fructum quendam peregrinum nomine Absuo amicis Cayro misit è Zeila Aethiopiæ emporio, extra Erythrazum mare sito allatum: magnitudine mali Citri mediocris, denso duroque cortice vt Cucurbitæ, vetustus, nullis excurrentibus sulcis, sed tantum extremâ eius parte mucronatâ, quâ arbori adhæret pediculo crasso & firmo, sulcorum rudimentum cernitur, in quibus lanugo quædam inest, quemadmodum in Cydoniis malis videre licet, reliquo corpore leuissimè alterâ non in mucronem, sed in obtusam rotunditatem desinit, vt primo aspectu Cucurbita sicca appareat colore fusco: pulpam continet subrubram, friabilem, vt facile in pollinem resoluitur, acidam, ori gratam, adstrictionis expertem, per quam sparsa sunt semina rebus animalium similia, seminum An-

Locus

Maraka
TomarakaCucurbita
arbor.Locus &
Tempus.Vires &
Tempera-
mentum.

Syrupus

Pulvis.

Sputum
sanguinis
Lienteria
Dysenteria
Menstr.

Descriptio

Cortex
Cucurbitæ

Lanugo.

Pulpa.


Femina

gyndis æmula, duro cortice, qui rubente quadam membrana tegitur, quâ dempta, semina fusca, ad nigrum inclinata, & splendentia cernuntur, intus medullam albam continentia, edulem, Auelanæ gustu: verùm semina ex umbilico fibræ non fuspe duntur [licet per pulpam multæ fibræ recte excurrant] ut semina fructus quem tu Clusi [inquit Honor. Bell.] Guanabano Scaligeri similem ex Mozambique allatum spectandum proponis. Conuenire autem multum mihi videtur cum fructu, quem Guanabano similem ex Theveti Americae describis solo Fici: sed hic longe minor est. Affinitatem etiam habet cum *Bahobab* ab Alpino descripto paribus internis, sed formâ differt: nam *Bahobab* utique mucronatus est pulpa nque conuinet [ut ille scribit] non acida tantum, ut hic, sed adstringentem Lemnizæ sartzæ instar, quæ nota in hoc consideratur. Plantæ ex semine enate descriptionem graphicam secundum omnes eius partes habet idem Honorius Bellus ex quo petenda.


Differentia inter A-bauum & Bahobab.

BAOBAB, SIVE ABAVI CLVS.

CAP. XLII.



Bahobab.



Alpinus.

Descript.

curabam, maioreo quæ exhiberi videbatur, ut qui pedem Romanum longus esset, decem & sex unguibus in ambitu crassus, sulcis quibusdam, sed vix

Elegantiss. Hic est & magnus fructus quem Londino ad me mittebat, anno 1591. Iac. Gareus [inquit Clusi in Exot.] à nautis qui ex Æthiopia redierant redemptum. Hunc verò, tametsi nullum nomen additum, simulatque conspicietur. Cl. V. Prosperi Alpini *Bahobab* esse iudicabam: per omnia enim serè respondere comperebam cum fructu quæ ex appellatione depingebantur: faciem picturam tantum cum foliis exprimenter, non magnopere moror: licet huius fructus historiam satis negligenter describere videtur, exceptus his quæ de eius facultatibus sunt.

Hic autem quem à perito pictore exprimi-

apparentibus, secundum longitudinem distinctus iuxta pediculum mitis crassus, & in extremo mucronatus, cortice deriso & crasso præditus, fragili tamen, si nimium comprimatur, & breui quadam lanugine, seu flore virecente [nisi ubi deterius erat] obfuso, truncatus pediculo, interdum tamen [quemadmodum in hoc fructu longè meo minore obtenta am leuitali, crassitudine digitali, valdè fibroso. Multos habebat hic fructus interna parte neruos, ab infimo, siue à parte quæ pediculo inhererat, ad summam fructus partem excurrentes, & fibras in latera sparsas, inter quas pulpa siue substantia satis triabilis, alba, gustu acida, in qua latebant semina ex humorem formam referentia, duro fuscòque putamine tecta, nucleo albo, non ingrati saporis, prædita: sed & tenuis quædam fibræ veluti cincinni per albam illam pulpam sparse erant, etiam nonnullæ ipsorum seminum umbilico inhererant, ut ex eis suspensa viderentur, quemadmodum in his aut ternis huiusmodi fructibus obseruabam. An verò substantia illa siue pulpa quam continet, humida sit dum recens est ut Alpinus suo *Bahobab* tribuit, me latet, siquidem nullum recentem fructum conspicerem nisi hactenus conuigent: certe rubram esse non arbitror, cum in his quos habui fructibus candidam & valdè friabilem rececerim: verum quidem est, in vetustis magis fuscam esse, qualem in eo fructu quem C. L. V. Honorius Bellus *Abano* nomine ad me postea mittebat, deprehendebam, sed omnium pulpa ut est friabilis, non lenta, sic etiam acida est. Itaque nihil mirum, si Æthiopes utuntur ad extinguentiam sitim, sitque utilis ad ea quæ Alpinus eade *Bahobab*, lib. de plantis Ægypti tradit.

Pulpa acida & semine humido.

ad sitim.

Sed in eo quod pulpa saporem, quem ipse acidum fatetur, cum terræ Lemnizæ ore comparat, fallitur, meo quidem sententiâ adstringit: certe illa habetque omnes eas facultates quas ipse illi tribuit, aciditatem tamen nunquam in illa deprehendi, tametsi selectissimum, ab aliquot Cæsareis Legatis quos Turcarum Imperator abinuenere atque alius, siue legatione descendentes prosequi solet, dum in Cæsaris aula emebam aliquoties acceperim, Augustio Busbi quo videlicet, Cardo Rimro, Diuide Vnensio, & S. Iudo Prynoro Frederici, [qui suæ legationis tempore Constantinopoli obit] scire, cum eis faceret receperit: nec etiam ullam adhibere nemine huius fructus & terræ pulpa peterebam. Cuiusmodi portò foliis sit prædita illa arbor in qua hic fructus natus, ignoravi diuina tamen esse ab his arbitror, quæ Alpinus suo *Bahobab* arbori tribuit: sed adpingit, nisi recens semine natam contingerit. Non Bellus *Abano* plantas habuit semine raras, ut ex quarta epistola ad me data apparet, quatum prima folia mali quidem Citri foliis si nihil simile scribebat, nullo pediculo subnixæ, ac ubi eadem pedalem altitudinem natæ fuisset, in ramos spargi cepisse, foliaque adquisuisse longiore pediculo prædita, & illa non singularia, sed inobina, deinde ternæ, quaternæ, & tandem quinæ ex eodem pediculo prodeuntia, quemadmodum in Pentaphylli, Lupini, Castanæ equinæ foliis videre licet, quorum medium folium reliquis maius est, deinde illi utrinque proxima: reliquas notas ex prædicta eius epistola petere ne sit graue.

Alpinus fuliginosus.

Terra Lemnizæ.

Fol.

Et sanè, eius *Abano*, ab hac, quem exhibeo, fructu differre non arbitror, tametsi is quem illa appellatione ad me mittebat, extimam partem non mucronatam ut meus sed obtusam haberet: pulpa

pulpa tamē præter colorem [quia fortē vetustior] similis substantiæ, friabilis, & semina prorsus similia nec dissimili nucleo prædita: eius autem longitudo vnciz octo cum semisse, crassitudo vnciz duodecim.

Alia def.

Sed alium eiusmodi fructum, quadriennio aut quinquennio pōtē iam dicto Garetō accipiebā, cuius longitudo vnciæ decem, crassitudinis ambitus vnciæ nouem duntaxat, ut etiam in eadem arbore fructuum magnitudo sæpe dispar: hic pulpa omnium candidissimam habebat, semina aliis similia pleraque (pulpa attrita & in pollinem comminuta) ad umbilicum à fibris dependentia.

Fructus similia.

Calabac.

Similem præterea fructum apud amicum conspicebam à Gorgadibus anno à Christi natiuitate 1600. allatum, & à Lusitanis istuc habitantibus, ut intelligebam, *Calabacera* appellatum, propter similitudinē quā cū cucurbita habet: sed is minis crassus erat illo, quem propono, & graciliore mucrone præditus, non dissimilis illi qui in scholio ad caput 2. lib. 2. Historiæ aromatum Garciz ab ortu pro *Guanabano* Scaligeri fortē positus: pediculi autem longitudo binos pedes Romanos æquabat.


Fici folia arbor Theueto.

An portō affinis non est fructui eius arboris cuius Theuetus cap. 10. lib. Singularium Americæ meminit his verbis: Tres sunt insulæ ad Aethiopum promontorium, *Caput viride* vulgō appellat, in quarum vna, arbor inuenitur folio nostratis fici (an rectē obseruant foli formam nescio) fructu Cyprius cucurbitus haud absimili, duorum fere pedum longitudine, & crasso. Nonnulli eo fructu veltuntur ut Melonibus: continet verō semina fabæ magnitudine, leporinis renibus similia. His quidam simias alunt, alii monilia ex iis collo aptanda faciunt: siccata enim & bene maturæ aspectu pulcherrima sunt. Cæterum Abano folia, qualia in plantis semine acquisitis, sibi nata, Bellus cum fructu ad me mittebat, in adposita tabella exprimenda curabam, singulania, gemina, quina, & illa quidem contractiore formā, quam natus quæ accipiebam.

SAMACA.

CAP. XLIV.

Descriptio



rem hanc eidem descriptionem tanē sper subire placuit, donec aliquid specialius de eadem addiderimus. Folia sunt arboris Iudæ foliis similia,

Tom. I.

Samace nomine arborē Indiæ depictā, & tabulis æneis exsculptam, in hist. Indiæ orientalis exhibent Bry fratres. Sed præter figuram & nomen nihil habent: nec nos quicquam aliud de eo nomine apud quēquam obseruauimus. Fructus, qui arbori adpictus, Guanabani figuram repræsentare videtur quāuis folia discrepent: quam ob


quinque, sex, septem, plus, minūque ramis hærent, ad quorum exortum flos singularis breuissimo pediculo hæret, quadrifolius. Succedit fructus instar Cucumeris, sed ventriosior. Alpinus habet iconem satis similem plantæ nomine Baobab, de qua nos cap. de Guanabano egimus. Samacæ tamen folia rotundiora.

ARBOR CUCURBITIFERA.

FICUS NIGRITARVM.

CAP. XLV.

In insula quadam inhabitata, prope *Caput viride* dictum, arbor quædam crescit, folia habens no-



stratis. Ficus similia, fructum longum, bipedaneum, aut circiter, crassum ad proportionem, ut ad magnas longatque Cypri Cucurbitas accedere videatur. Quidam hunc eliant, haud secus ac nos Melones nostros. Intus semen est, reni leporino figura simile, magnitudine fabæ: Theuetus de Francia Antartica. Hist. Lugd.

Descriptio Folia.

Fructus.

Semen.

Synonyma


Ficus Nigritarum Theueto in Americæ singularibus, & Colmograpia: cui arbori similis ferē, sed folia valdē diuersa Ouedi Higuero. Eadem cap. de Guanabano Ouedi, hanc Guanabano Scaligeri similitudinem dicit, foliis tamen diuersam: eademque & Clusius dicit, ante ipsam.

Quidam authore Theueto simias hoc fructu nutriunt: alii ex eo probē maturo ritēque siccato monilia collo appendenda faciunt, præcipue elegantiz.

Ficus Nigritarum. Higuero. Guanab. Scalig. simil. Vfus.

HIGVERO OVEDI.

CAP. XLVI.



Higuero Ouedo arbor est prægradis, veluti Morus nigra fructu ferens Cucurbitæ rotundæ, interdum verō oblongæ similem. Ex eo pateras & alterius generis vasa cōficiunt. Materie est robusta, atque apta sedibus, subtellis, ephippiis aliisque openibus fabricandis: Malit enim Medicæ aut Punice

Descriptio

Fructus.

Vfus.

Materia.

K 2

HISTORIAE PLANTARVM

Palencom.
Medusa

matariam esse diceret : cortice facile deliberatur. Folio est longo, angusto, per extremum latiore. à quo ad pediculum usque paulatim angustius fit. Indi nonnunquam prae aliorum fructuum penuria hoc vescuntur, hoc est, eius carne, quæ cucurbitæ carni, cum adhuc vixet, similis est. Corticis color & forma cucurbitæ. Maximus eius fructus libram aquæ continere potest. Minimus verò pugnus non excedit magnitudine. Vulgaris est hæc arbor in Hispaniola, reliquisque insulis, & Indiarum Americanarum continente.

In hac tabella exhibetur vna Mamei arbor, de qua dicemus H.n.g.lib. seq.

excaustum Mayzo alijsve seminibus aut lapillis
replent: *Maraka* & *Tameraka* nuncupant. *Ar-* Nonius
borem Hist. Lugd. Chrys.

Frequens est in regione Americanorum, quam
Morpionem vocant.

Fructus Choyne, auctore Theueto, non est edulis, quantumvis aspectu elegans. Americani, præterquam quòd ex eo pocula conficiunt, ad præstigias mirificas vtuntur. Excavatam enim fructum repletum semine Mili, aut alius, bacillo affigunt in terram adacto, circumquaque plumis ornatum. Quo modo singulæ familiæ duos aut tres referuant, idque magna cum veneratione, rati miseri idololatæ, vbi fructum hunc pulsauerint, *Toupan* [id est sui Dei : Sic à suis Paygi, seu diuinatoribus persuasi] colloquio sese frui, qui arcana reuelet. Potissimum verò etiam in eodem errore versantur eorum dicti Prophetæ. Vnde & diuinitatem quandam fructui attribuerunt, nec quicquam quod in sensus incurrat, adorant, quàm tinnulum hoc instrumentum.

Profigio
America
novum,

CHIEF THEVETL.

Cap. XLVII

Descript. **N**igitarum ficui similiorem, [vt scribit Hist. Lugd.] non tamen eandem, memorat Theuetus. Fructus. a hic in Insula Zipangu prouenit, magno Meloni par, cui nomen *Chinof*, quod Syria-
Super.
Semina. cē Ficum significat. Suauissimus est, cum manditur Mannæ modo in ore liquefens. Semina intus continet, qualia in cucumere nostro reperiuntur, corrice cum maturuit croceo, folio arboris eximie viridi, exquilitē rotundo, aureo numero Gallico pari.

ANON OVIEDI.

CAP. XLVIII.

Descript. **A** Non Oniedi arbore est, cuius fructus magnam cum *Guanabano* similitudinem habet, cum forma, tum carne & semine. Sed & ipsa *Anonis* arbor *Guanabani* arbori simillima est, cum magnitudine tum forma & folio. Duabus vero in rebus differunt: primum quod huius fructus minor sit *Guanabano*, cornicque color luteus, qui in *Guanabano* viridis est, deinde, quod meo quidem iudicio gravior sit palato *Anon*, quam *Guanabanus*, utpote firmiore carne. Vtrumque magno in pretio habent *Indici Americi*, & diligenter in suis prae diis colunt: Ex *Oniedo*.

Locus. Clusio Mangas plus similitudinis habet cum Anon Ouiedi Ialama eiusdem.

CHOYNE AMERICANA.

CAP. XLIX

Descrip.
Fructus. **E**st Americanis Morpionem regionem incolentibus arbor, ipsorum lingua *Chaine* ducta, fructum ferens magnitudine mediocri citrulli, formâ oui struthiocameli: folia Lauriis similia: Theuctus.

Lenius eadem de hac arbore & fructu tradit, & addit fructum esse magnitudine capius infantis, non edulem, cortice duro, quom perforant, & ex eo faciunt instrumentum, cui dictum Maraca, & poteras ad potandum, aliaque vascula.

Clusius fructus huius apud Canibales à The-
neto & aliis traditam historiam, non malè *Gua-*
naban quadrare videri tradit, præsertim si inter-
iora, quæ à nemine [inquit] describantur, de-
mas: idcirco enim semina, continet Phaeolacea
incertum; ipsa arbor folio Lauri est: fructum

BRYSTHAER CHINÆ.

C. A. P. L.

AD Chinaram sinum marinz arbores stupenda sunt vastitate: tanta, inquam, vt in eis immensz magnitudinis aubus stabulari liceat. Etenim tam grandes sunt, vt eis etiam grauiora animalia integra sustollantur, atque auferantur. Has arbores vocant incolz Brusathaer. Fructus serunt Augustiis non minores: author Scaliger: cademque etiam scripsit M. Ant. Pigafetta, in itineralio suo, teste Hist. Lugd.

YHEBE HASOV THEVETI.

CAP. LI.

V Hebeha-
lou mirz
altitudinis est
arbor, cuius ra-
mi alii alios
subeunt, folia
habet Brasticæ:
singulos ramos
onerant fru-
ctus, pedem
longi, sicc &
eadem gummi
rubrum.

Hist. Lugd. Synonymi
quoque Vhe- Mellifera
behasou vocat, arbor,
ex Theueto.

An Higuero
in navigation-
um historiis
Arbores circa
Peru, quæ mel-
le aded referte,



ut perusto cortice aut trunco quinque aut sex
exsillent mensuræ mellis limpidissimi & optimi.
Dum in America esset Thevetus, sex milliaribus
ab eo loco quo subsistebat, obseruatam sibi hanc
arborem tradit, quam eminus artificio potius
quàm natum arbitraretur quispiam effecit.


Ad

Ad huius fructum (refert idem) quem ego quidem viridem vidi, innumeræ apes conuolant, ex eo alimentum petentes: receperat se in foramen eiusdem arboris, ubi mellificio & ceræ incumbant. Harum generatim duo: alie nostris magnitudine sunt pares, quæ non nisi ex suauolentibus floribus victum quærent, & mel quidem optimæ notæ conficiunt. Ceram verò non usque adeò flauam ac nostram. Aliud genus dimidio minus, quarum mel bonitate superat: iam dictum, quod syluestres illi *Hira* vocant. Et dissimili ab aliis videtur utuntur, quæ meo quidem iudicio causa est, quod ceram carbonis instar nigram faciunt, & quidem copiosè, præsertim ad flumen Vales & Plate: ubi animal quoddam inuenitur, *Heyrat* nomine, hoc est bestia mellis, quod vndique has arbores quærit, ut mel quod apes dicte conficiunt depopuletur. Est autem coloris ferruginei, magnitudine Aeluri, & quod vnguibus mel norit extrahere, ita quidem ne ipsum apes, nec ipse has contingat.

Magno istius in pretio est hoc mel, ut quod soleant syluestres egrotantibus exhibere, multum farinæ recenti, quam è radicibus conueuerunt facere. Ceræ verò apud illos nullus alius est usus, nisi ad conglutinandas pennas, quibus capita coronant: aut ad obstruendas arundines magnas, quibus plumas suas inserunt, qui maximus est Syluestrium illorum thesaurus. Fructus verò *Vheebafu*, quantumvis ab apibus frequenteretur, non tamen est edulis propterea quod non facile maturescat, sed apibus solis, quantum quidem ego animaduertere potui, in alimentum cedit.

ARBOR FOFIO LAVRI, FRVCTV CUCURBITÆ EX GVINIA.

CAP. LII



Arborem (inquit Clus. Exot.) cuius iconem damus ab honestissimo viro Petro Gareto acceptam cum eiusdem fructu anno 1602. Inglandis arboris celsitudine equare nec dissimili cortice testam esse se rebant, Folia Laurinis habere similia, ad quorum exortum fructus in ramis nascetur, inuod quidem


dem viridis, deinde ubi maturitatem adeptus, eius coloris quem in eius historia dicam. Erat porro fructus Magni mali instar, & orbicularis penè formæ: nam ducta à pediculo per longitudinem fructus mēsurā ad alteram partē pediculo proximam, decem vnciarum fuisse reperta est, quam ea qua fructum transuersim per medium ambibat, vix superabat: levis erat pro sua magnitudine, & crasso latiusque firmo cortice præditus, foris

læui & splendente, ex flauo spadicei coloris, interdum etiam nigris maculis consperso, interna autem parte fuliginosi, & nihil continens præter nigrum quemdam pollinem. Certè quum illum inuod conspicebam (mittebatur enim primum solus nulla addita icone) Cucurbitæ genus quoddam peregrinum esse censebam, præsertim ob corticem Cucurbitæ cortici non valde dissimilem, tum etiam propter leuitatem: sed conspecta icone suis coloribus expressa, in qua arboris ramus, cum fructu & foliis, opinionem mutare non piguit. Hæc sunt quæ de ista arbore & eius fructu intelligere potui post longam disquisitionem: quæ beneuolum lectorem boni consultorum arbitror.

LAGENVLAE AMERICAE.

CAP. LIII.

Cuius arboris esset hic fructus Exoticus, quod nomine diceretur Clusium latet. Erat autem orbicularis penè formæ, binas vncias longus, tantūdem se è crassus, duro, læui, spadicei coloris cortice præditus: an nucleum aut semina contineret ignorat, si autem habuissent, exempta fuisse oportet: Quia binos accipiebat à Iacobo Gareto extrema parte funiculo tractos & quodammodo con-




modo connexos, foraminibus per quæ funiculus, qui eos connectebat, tractus erat, nigra cerâ obturatis, & infima similiter parte, quæ videlicet pulvis quidam ex albidis ad cineraceum cōdens (quo pleni erant) iniectus fuerat: falsus eius sapor & linguam vellens, quo venisimile est incolas vsos ad

sua edulia condienda, propterea secum circumtulisse, Gareto significabat. è mari Australi, quod pacificum appellant Hispani vulgò *Mar del sur*, allatos esse. Et ipse aliquot annis antè, cum adhuc Clus. Viennæ viueret, similem miserat, sed singularem, & longè maiorem, eumque inanem, summa parte apertum & funiculo tractum. Sibi porro persuadet, has lanegulas iis cucurbitulis, esse persimiles, quarum Americus Vespulius Nauigatione secunda meminisse agens de moribus eius gentis ad quam appulerat. Ait enim singulos viros ex collo pēdentes pusillas siccatasque binas cucurbitas gestasse vnam plenā herbā quam mandebant, alteram farinā quadam candicante gypso cōminuto simili, è bacillo quodam in ore niadesacto, atque in cucurbitam farinā plenā immisso, farinam exemisse, quā herbam quam manducabant aspergebant, subinde id repentes: illudque facere existimasse, ut sitim sedarent, quia aqua recenti quam bibere possent, penitus erant destituti.

FRUCTVS INDICVS PYRIFORMIS
MIS GRANIS INTVS NIGRIS,
Cucurbitani generis.

CAP. LIV.

Descriptio.



Redimebat [inquit Clusius Exot.] Franciscus Peninus, cuius & Pharmacopæus Amstelredamensis, fructum quendam exoticum anno reparatæ salutis humanæ 1601. ex India, ut aiebant, relatum, cuius nec nomē nec in quo arboris genere natus esset, intelligere potuerat: quia tamen eius formæ erat, qualem antè

vidisse non memineram, pro ea quæ mihi cum illo est vetere amicitia, commodatò impetrabam, ut breuem illius historiam concinnare possem, quam in Exoticorum librum inferrem, & eius iconem, in tabella exprimi curarem. Erat hic fructus penè quinque vnciarum longitudinis à pediculo ad summum mucronem, ambitus qua parte crassior fructus nouem vncias cum semisse explebat, à pediculo satis crasso sensim tumescens, deinde à medio corpore paulatim in obtusum mucronem desinens [ut ex icone faciliùs obseruari potest] fisco duròque corice constans, & nucleum aut pulpam, cum seminibus in globum congestam continens, strepitum enim agitatus edebat: qualis autem inesset nucleus aut pulpa, ignorabam cum hæc scriberem, quandoquidem illum aperire verebar, quid meus non esset, propterea integrum illi restituebam. Post aliquot tamen dies fructum ad me remittebat in binas partes tractu suum scdum, ut internam partem etiam describere possem, quam valdè leuem & exigui esse ponderis comperiebam, cineraceique ex fusco coloris, continentem pulpam spongiosam, nigram, mollem, acidiusculi saporis, in globum compactam, in qua latebant aliquot grana, nigra, penè orbiculata, compressa tamen, & magis lata quàm longa, in binas partes scdalia, quemadmodum Cucurbitarum & similium semina, sic ut Cucurbitacei generis alicuius plantæ fructum esse mihi persuadeam.

Fructus.

Cortex.
Pulpa.

Grana.

Cucurbita
genus.

GVANABANVS OVIEDI FRVCTV
SQVAMMATO.


CAP. LV.

Descriptio
Folia.
Fructus.

Gvanabanus Ouiedi proceræ arbor est, & fornosa, folio ferè Meli Medicæ, quam Limoniam vocant, virgente: fructu pulcherrimo, mediocris Melonis magnitudine, qui tamen interdum in capitis pueri magnitudinem excreseat. Cortex huic fructui viridis, & qui certis quibusdam squa-

mis distinctus videatur, ut Strobilus, leuioribus tamen, neque ita tumentibus, quandoquidem totus cortex tenuis sit, neque crassior, quàm in Piri. Caro candidissima saporisque delicatissimi, quæ faciliè pinguedinis lactis initar in ore resoluitur. Per eius carnem sparsa sunt semina magna. Frigidus est hic fructus, & per æstus utilis. Nam tamen quis integrum Guanabanum deuoret, nihil inde sentiet nocumentum. Infirma est ligni materies.

Clusius ait, cum Dorionibus planè conuenire



Guanabanum Ouiedi, quem per vniuersam ferè Americam, siue Nouum Orbem nasci tradunt. Diuersus est ab eo cuius Scaliger meminit, de quo paulò antè.

Generalis Histor. Indic. author tradit Guanabani fructus corticem viridem & tenuem esse, ut Piri, superficiè squamulis distinctà.

Hic Guanabanus, inquit Hist. Synonyma

Lugd. planè conuenire videtur cum Ouiedi Guanabano & uterque diuersus esse à Scaligeri.

M. Furez, Guanabanos & Guanabano, pulchra arbor, fructus crassus ut humanum paruit, cutis squammata &c. Guanabanus Ouiedi Clusio.


An Benzoni's Guanabanus arbor modica & gracilis fructum ferens cordis effigie, corio viridi & subtili, squammatum in morem vestitum, interioribus candidum.

Extant etiam paulò diuersi ab his formæ orbiculares eius arboris fructus, cruce coloris & prioribus illis longè meliores, omnes verò incus acinos exiles spadicei coloris gerunt. Videntur quidem nobis hæc præsertim prioris varietatis descriptio, huic Guanabano Ouiedi satis bene conuenire.

DVRIONES ACOSTÆ

CAP. LIV.

Descriptio



[Inter celeberrimos, inquit Garcias] Indiarum fructus recensentur à plerisque Doriones in Malacca vocitatus fructus Melopeponis magnitudine, denso cortice rostratisque tuberculis plurimis obductus, veluti is quem Iacca Goa vocant, [de quo suo loco] fors virescens, intus verò concameratus: seminæque exigui qui gal-


Iacca Goa
vocal.

Semina
lana.

LIBER PRIMVS

115

Alia hanc Bry fratrum.



*Parietem
Opuntia*

Tela

*Tempera-
mentum.
& Vires
Capacitas
odor.*

Præsum.

*Antipathia
cum Betule*

*Durionum
mixta re-
media.*

Durionum.

*Locus.
Nomina
& Syno-
nyma.*

linacei magni-
tudo in singulis
cameris conti-
nens, coloris &
saporis eius con-
dimenti, quod
ex Amygdalis
contusis, lacte,
farina, aqua ro-
sacea, & saccharo
fit, *Manger blanc*
vocat Galli, non
tamen ita molle-
scientia aut gluti-
nosa; in nonnul-
lis verò non can-
dida sunt, sed pa-
lidi coloris. Offi-
culum hanc in se
continent, Mali
Persici ossiculis
persimile, sed ro-
tundum. Folia
huius arboris

medium palmum oblonga, acuta, salso gu-
stu, colore viridi dilutiore parte aucta, interna
verò parte admodum virefcentia. Flos è candido
flauescens. Arborem iuglandis modo prægran-
dem esse aiunt, foliis Laurinis.

Calidus, inquit Acoſta, & humidus est hic fru-
ctus, & qui edere volunt, pede leuiter compri-
mere & frangere solent, propter spinas quibus
oblitus est. Qui nunquam hos fructus ederunt
cùm primùm illos olfaciunt, videntur putridas
Cæpas odorari: sed postquàm degustauit, præ-
reliquis cibis benè olere & sapere censent. Est ve-
rò in tanta existimatione apud eos, qui gulæ dedi-
ti sunt, hic fructus, ut putent neminem eo posse
saturari, propterea varia dant illi epitheta. Tanta
tamen est huius fructus in Malaca abundanti-
a, ut singuli nò pluris quàm quatuor maravedis ve-
neat præsertim mensibus Iunio, Iulio & Augusto:
nam reliquis præsum intenditur pro hominum
arbitrio. Admiratione porro digna est Betule cò
hoc fructu antipathia, quæ profectò tanta est, ut
si quis in naue in Durionibus plenam, ædesse aut
concamerationem, ubi obseruentur, aliquot Be-
tele folia reponat, corrumpantur & putrescant
omnes. Et si cui ex Durionum immolico esu ven-
triculus inflammatur & grauatur, folio Betule su-
pra ventriculum imposito, subitò mitigatur in-
flammatiò, tumorque tollitur. Et, si à Durionum
esui ingerantur aliquot Betule folia, nullam no-
xam sentiet, quantumuis multos ederit. Inde fit,
tùm etiam ob eius gustum suauem, ut vulgò di-
catur, neminem eorum elu posse satiari.

Eiusdem fructus & Linschottanus meminit.
Duriacon vocitans, in laua crescere, magnis ar-
boribus, quales apud nos Pomi arbores. Gustu
quidem suauissimo, sed inassuetis primùm aduer-
so, ob odoris cepacei, adusti aut putridi vhe-
mentiam. Estimam faciem Castaneæ cortici assi-
milat, sed aculeis hunc esse paulò maioribus &
quadrangulis, Alueos communiter intus habere
tres, parietibus intergerinis disseptos, in quorum
singulo tria grana cepacea facie, & horum vnum-
quodque rursus alios tres nucleos continet. Ha-
beri inter meliores, salubriores, suauioresque to-
tius Indiæ, sed non diu durare. Reperiri etiam co-
piosè in Baly & Malacca.


Vocantur Duriones in Malaca, Garciz: cum
quibus Clusait, Guanabanum Ouiedi planè con-

uenire. At ex vtriusque historia facile patet rectè
intuenti, res esse diuersas. Cast. Dur. *latta mag-
giore*, ut vult C. Bauh. Durio Còste: In Malayo (quæ
est prouincia ubi gignitur) Duriacon: ipsius flos
Buaa: ipsa arbor *Butan*. *Duriones* Linschottano.
Hist. Lugd. *Durionis* Acoſte, & fortè Darian Sca-
ligeri eidem, An Scal. Durian? Meloni & Corco-
pali similis, Taprobanz fructus, qui Durian di-
citur. An *Durionis* Bry fratrum in Icon. Ind. Oriët.
qui addunt hos fructus totius orbis existimari op-
timos, & in sola Malacca reperiri.

Durionis.

ERINACEVS FRUCTVS INDICVS

CAP. LVII.




FRuctus qui-
dam nascitur
in Insula Baly, Descript:
magna, copia,
magnitudine
Pomi nostratis,
vel potius Piri,
siquidem infer-
nè rotundus su-
perne turbina-
tus, cortice mu-
nitus aspero &
echinato, vnde
ab Holandis
Schweinigel id
est, Echinus por-
cinus vel suillus
vocatur. Cordi-
tus hic fructus
lucis est, lapi-
dus, & nauiga-
tionum Indica-
ru commodum subsidium. Diu durat. Crescit
in celsis arboribus, racemum coherens, ut bac-
ca in racenis vitium. Ex huiusmodi Indicis.

*Echinus
Porcinus
Vulgaris.*

IACA INDICA.

CAP. LVIII.



Iaca arbor est Descriptio
in India præ-
grandis, fructu
in summo cau-
dice non in ra-
mis ferens, præ-
grandem, magni
Melonis effigie
interdum maio-
rem, virentem
foris, intus verò
flauescentem,
multis spinulis
instar erinacei,
sed mollibus,
oblectum. Con-
tinet autem hic
fructus in se ma-
gnas quasdam
nucis, duro pu-
tamine tactas.
Cortex fructus

gustu Melonis, sed difficillimè concoctionis, nem-
pe qui plerumquæ soleat, ita ut assumitur, excor-

h t

ni. Noces verò intus nate torrentur aut elixantur, abiectioneque putamine [qui nullius est usus] Castanearum modo, quibus sunt per similes eduntur. Nascitur duntaxat in maritimis. *Garcias.*

Locum.
Alia de-
scriptio.

Fructus.

Cucurbit.
magnum.

Locum.

Differen-
tia.

Barca.
Papa.
Girafal.
Praetium.

Castanea.
Sapor.

Vitis.
ad v. curi.

Durionis
pulpa.

Descriptio
longior.

Melopepo-
ni forma.
ananas fo-
rmis.

Girafal.
Chamba-
sal.

Cachi Sc-
lig.
Cicaria.

Sine a muc-
forma.

Acosta verò paulò aliter sic: Vasta est arbor, foliis palmaris amplitudinis prædita, dilute virentibus, neruo crasso & duro per longitudinem excurrente. Malum fert non è germinibus, aut foliorum sede, quemadmodum alix arbores, sed ex ipso trunco maioribusq; ramis nascens. longum, crassum, obscurius virens, crasso duroque cortice testum, omni ex parte cupidibus septo, quæ in spinam breuem, viridem, nigroque aculeo præditam desinunt, admodum similem Durionis spinæ, sed minime acutam aut pungentem, tamen si minitari videatur. Horum fructuum minimus est maximæ cucurbitæ amplitudine atque etiam maior, præsertim in Malabar, ubi præstantiores nascuntur. Nam qui in Goa proueniunt, minores & peiores sunt, atque magis insipidi. Cum maturus est hic fructus, bonum odorem spirat. Eiusque duas differentias constituunt. Vnum *Barca* appellatum, & præstantiorem: alterum *Papa* aut *Girafal* dictum, minusque bonum: deprehenditur postremus ex mollitie: quoniam si manu apprehendas, digitis cedit. Præstantissimi verò fructus pretium quadraginta maravedis non excedit, hoc est, paulò plus regali Castellano. Per longitudinem secti hi fructus, intus candidi, & densa carne præditi apparent, ac veluti in capsulas aut receptacula diuisi, plena Castaneis longioribus & crassioribus quàm sint Dactyli siue Palmulæ, cinerea tunica testis, & intus albis Castanearum vulgarij modo, gustu terrestri & aspero, si virides edantur, multosque flatus generantibus. At si vti Hispanicæ Castaneæ assentur, gustu lapido & Venerem excitantibus, ob quam solam rem plebs frequentius vti solet. Sunt autem singulæ hæ Castaneæ pulpa flavescente, & aliquantulum lenta inuolutæ, & pulpam Durionis nonnihil referente, tamen si ab eo differat. Grati saporis est, præsertim quæ in *Laca Barca* cognominata continetur, optimi Melonis pulpæ admodum similis.

Describitur etiam paulò aliter à Linchottano apud figuras zneas, his verbis: *Laca* mirabilis naturæ ex trunco altissimæ arboris nascuntur fructus ad litus maris: Vbi arbor in folia & ramos se fardit, nulli sunt fructus. Magnitudine autem & forma Melopeponis serè sunt, ad *Ananas* accedunt, colore tamen subviridi. Tunicis autem distinctus est interior nucleus, colore inter albedinem & flauedinem, sapore mellis. Tales serè tunicæ centum numero in vno pomo reperiuntur. Est autem duplex genus: optimum vocatur *Girafal*, illud quod est simplicius est *Chambasal*. Arboribus & fructibus eadem forma est, sed ex gustu suauitate discernuntur. *Hac ille.* Veramque figuram ponimus ut non parùm variantes iudicent qui arborem ipsam cominus inspexerunt.

Scaliger videtur de eadem planta & fructu scribere, his verbis: Spinosa est arbor in Malabar, cuius folium non pingunt. Ipsa *Cachi*, eius fructus *Cicaria* dicitur, longitudine pedali, humanæ coræ crassitudine. Pondus fidem superat. Cortici color primum viridis: maturefcens in luteo fuscescit: corpus firmiusculum, compressioni tamen ita cedit, ut frangatur. Temporis quoque suapte natura impatiens. Haud enim ita multò post, quàm detractus sit, fit rugosum. Totius forma, ut Pinæ nucis. Intus enim Camerulæ membranis distinguuntur, ut in Punica. Pulpæ odor suauissi-

mus. Sapor mistus ex Melone Moschato, Persico, *Sapor.* Arancio dulci, & melle. Intus poma ducenta quinquaginta ad tercentena vsque, Ficorum tum specie, cum dulcedine, sine cortice, ut aiunt. Membranulis tamen distingui necesse est, quibus segregentur: ut duorum vitella: In his pomis fructulus est alius, figura castaneæ. Qui ad eundem, quo castanea, modum inter coquendum crepitat: esculentusque est. Etiam bobus in pastum datur. Exit è trunco fructus, sicut & *Iumeiz*, id est, Sycomoro, inter spinas, & frondes. Interdum, quod magis mirum est, è radice, subtus terra, vnde prodit. Hic longè præstantior, regibus dono datur. Legitur mense Decembri.

In Calicut, inquit Ludouicus Romanus, reperiuntur nonnulli fructus quos cultores *Iaceras* appellant. Idem vult eundem fructum idem esse cum *Iaca*, atque eo nullum præstantiorem dignioremque scribit, eiusque descriptionem fusè tradit.

Vocatur hic fructus in Malauar *Iaca*: in Canara & Guzarate *Panax*: intus nuces velut castaneæ: *Synon.* *Garcias.* *Iacera* Lud. Romani, eademque *Iaca* *Panam.* Clusio. *Iaca* Malabarenlibus. Guzaratenlibus *Panax*, Canarinis, *Panasu*. Arabibus, *Panax*, & *Iaca*. Persis *Funax*: Eius duæ species, vna dicta *Barca*, altera *Papa* vel *Girafal*, Acosta *Laca minor*, in Canara *Panax*, Durant.

An Scalarbor *Cachi*, fructus *Cicaria*. Historia sanè Lugd. huius sententiæ est, & addit, eadem prorsus scripsisse Lud. Bonon. in Itiner. suo, quæ Scaliger. ac nasci in Calicut.

Eadem Nic. Costin. in Itine. nisi quod non fructus ait bubus pro cibo præberi, sed eorum cortices. Præterea arborem grandi Fico similem esse, foliis diuisis Palmæ modo, ligno buxo, ad multa vili. Eadem Hist. Lugd. & alibi de hac arbore tractat, sub titulo, *Laca* Acosta, utique hanc diuersam putans, à *Cachi* Scaligeri.

Iam suprà dictum, quæ ratione Castaneæ intus latitantes, grauiter comedentes excitent ad Venerem. Scribit tamen Costa, nullum usum medicum præbere: duræ esse concoctionis, & admodum grauare ventriculum: atque ut illarum Indiæ Prouinciæ Medici dicunt, si in ventriculo corumpatur, noxios & venenosos humores generare: quique frequentius hoc fructu vescantur, facile in pestilentem illum morbum, atque funestum *Morbi* incolis vocatum incidere.

IAMBOS. CAP. LIX.

Iambos Acosta.




Magna, ut scribit *Descriptio* *Garcias*, apud Indos in estimatione est is fructus, cuius nunc mentione facuri sumus, primum è Malacca [ubi plurimus nascitur] paucos ante annos illuc translatus. Est autem is fructus oui anserini magnitudine, aut paulò maior, colore ex candido purpurascens, pulcherrimo odore rosaceo. *Præstant.* Vel.

LIBER

PRIMVS

117

Lambos Linschottian.



Vel, ut verius dicam, similis est hic fructus magnis Gallis recentib. [quas poma de Cuquo nuncupamus] eum in odore, tum in colore: gustu suauissimo, sed humido. Nisi verò (annotat Clus.) Garcias gallas istas maiores, quæ in Robore passim per Hispaniâ & Lusitaniâ, nascuntur, intelligat per Bugalhas grandes quid sibi velit, ignorare me fateor.

Ceterum eas

exigua pila palmaria maiores nunquam vidi, colore pulcherrimo rubicantes, dum recentes sunt, & odoratas. Velfortè prægrandes illas Iuglandes vult, quæ vulgaribus duplo maiores sunt: quemadmodum vulgares suo operimento nudatas Bugalho appellare videtur.

Porro ipsa *Lambos* Arbustula, ex eodem Garcia, in Pruni magnitudinem assurgit, folia ferens magnam similitudinem habentia cum cuspidate ferrea maioris alicuius lanceæ, viridia, aspectu pulcherrima. Flos ruber, odoratissimus, gustu acido. Fumis nititur radicibus hæc arbor, quoniam admodum fertilis est. Post quartum enim annum fructifera, nec semel duntaxat fert in anno ut pleræque omnes ferè arbores, sed pluries singulis annis novos edit fructus.

Arbor, inquit Acosta, quæ *Lambos* fructum præbet, vasta est, maximam Malum auream quæ in Hispaniis nascitur æquans, multis ramis in latum exparsis multamque umbram præbentibus brachiata, aspectuque pulcherrima: caudex maiorisq; rami cinereo cortice integuntur: folia pulcherrima sunt, lævia, palmum aut amplius longa, crassiora verò per longitudinem, multis autem obliquis venis in latera excurrentibus, parte superna saturatius, inferna dilutius virentia: flores ex rubro purpurascens, viuidi admodum coloris, multis staminibus in medio præditi, aspectu pulcherrimi, gustu capreolorum vitis simili. Fructus magnitudinem est Piri, quod à Rege cognomen accepit, eiusque duo sunt genera: vnus enim aded obscure rubet, ut niger videatur, magna ex parte officulo caret, & sui bonitate præstat: alter ex candido rubescit, & officulum continet album, durum, non admodum rotundum, officuli quod in Persico malo est, magnitudine, læue, & candida hirsutaque membrana tectum: qui licet superiori bonitate cedat, dignus tamen est hominum etiam delicatissimorum palato: vtriusque odor suauissimam rosam, refert, frigidus & humidus est, & admodum tener, cortice aded tenui & molli tectus, ut cultello auferri non queat. Altè suas radices terræ infigit hæc arbor, & post quartum annum sic fructifera. Fructum sæpius eodem anno perficit, & nonnunquam sine flore & fructu conspicitur, cum iidem rami floribus, fructu viridi & immato semper ferè

onusti sint, decidentibusque quotidie floribus [sic ut solum rubro colore tinctum quandoque videatur] noui subnascantur, fructusque alii primùm enascantur, alii maturecant, alii iam maturi colligantur, succosa arbore maturi faciliè decidunt, comprehensi verò rami ad fructus colligendos facillimè ab arbore reuelluntur.

Linschottamus ad figuram ære exsculptam annotat *Lambos* officulum habere, ut fructus *Cyparissi*: sed quid sibi velit fateor nos ignorare. *Cyparissi* fructus nullum habet officulum, nisi fortè ipsam intelligat nucem: præterea quia eius figura non parum differt ab *Acostæ*, vtramque Synonyma proponimus.

Lambos in Malaca dicitur etiamque Hispanis, Garcias. *Lambos* fructum Malabares & Canarini *Lamboli* vocant. Lusitani istic habitantes *Lambos*: Arabes *Tupha*: Indi Persæ *Tuphat*: Turci *Alma*: Lusitani arborem *Lambeiro*, Acosta. Hist. Lugd. quoque & Linschott. *Lambos* vocant.

Fructus ante reliquos cibos initio mensæ edi solent, atque interdum. Condiuntur etiam tum fructus tum flores, atque ita afferuntur.

CARAMBOLAS ACOSTAE.

CAP. LX.



Carambolas, autote *Garcia*, fructus est in Goia magnitudine minoris cuius galinacei, in quatuor ut videtur, partes distinctus, flauescens.

Plerumque describit Acosta. Arbor *Cotonæ* magnitudine folus Mali, paulò longioribus, coloris viridis saturationis, & gustus amantissimis, floribus parvis quinque foliolis constatibus, ex albo rubescentibus, nullo quidem odore gratis, sed aspectu elegantibus, & gustu oxalidis acetoso. Ipse verò fructus maiusculi oui gallinacei magnitudinem æquat oblongus, flauescens, atque veluti in quatuor partes diuisus, sulcis illis paulò altius impressis, magnam gratiam addentibus. In medullis continet semina tenera saporis aciditate palato grata.

In Malauar *Carambolas* vocatur, in Canara & Decan *Camari*: in Maluo *Balimba*. Garcias. Acosta verò *Carambola* Lusitanis: Decaminis & Canarinis *Camari*: Persianis, *Chamaroch*: in Malayo, *Balimba*: *Caramboles* Acosta & H. Lugdunens.

Nullus eius in medicina vsus, præterquam quod in febribus quotidianis exhibetur, & ex eius succo, cum aliis idoneis, fiunt Collyria ad oculorum lippitudines utilia: plerisque benè sapit hic fructus, præsertim qui vinosus est saccharo conditur, gratissimisque est Palato. Ed verò utor syrupi acetosi loco. Garcias: Costa verò scribit multa usum esse in medicina & cibis: namque maturum exhibere in biliosis febribus & saccharo

officulum Cyparissi.

Lambos. Lamboli. Tupha. Tuphat. Alma. Lambiro. 1/101

Descriptio fructus.

Descriptio arboris. Cotonæ magn.

Mali foliis.

Flora.

Fructus.

Synonyma Carambolas.

Camari. Balimba. Carambola. Chamaroch. Balimba. Vires.

Febres ad multas.

Bugalha. Descriptio arboris.

Flu.

Bugalha.

Tempus.

Alba. Descriptio. Malum aureum. Magnitudo.

Folia.

Fructus Piri.

Differencia.

Officulum Persici.

*Febris li-
loja.*

*Ad secun-
dum et
secundum mor-
tum
Cibum.*

conditum syrupi acetosi loco praeberet: Canari-
nos eius succo cum aliis medicamentis isthuc na-
scentibus, collyria parare, ad oculorum nubecu-
las tollendas: Obstetricem (quae illis *Daya* dici-
tur) vidit fructu sicco & in pulverem contrito,
& foliis *Betele* virentem, ad secundinas à parvi ex-
pellendas, sicutumque mortuum educendum. E-
ius etiam muria conditi frequentem esse usum,
cum grauiissimi sit saporis & appetentiam ex-
citet.


AMBARE INDICA

CAP. LXI.

Descriptio

Folia.

Flores.



Ambare Indis
dicta, crassa
magnaue est
arbor, folia ha-
bet luglandis so-
lus magnitudine
respondentia, sed
non eius forme,
dilutius virentia
& multis venis
elaborata, quae
illis magnam gra-
tiam addunt. Flo-
res exiguos can-
dilos, Fructus
nucis luglandis
magnitudine, di-
lutius virentes,
& cortice quam
illa leuiore: o-
doris grauis &
gustus acerbi,

dum adhuc virent: coloris vero flauo immaturo,
gratioris odoris & gustus grata aciditate com-
mendabilis, medullam continentes cartilagi-
nosam & duram, è duris nervis oblique inter-
textis constantem: *haec Acofta. Brevius Garcias:*
Fructus in India nucis magnitudine, maturus o-
doratus, fulvus: immaturus cartilagineo quo-
dam integritur cortice virente.

Synonyma

*Ambare,
Amba,
Clul mor,
Ambare,
Amberech,
Harb,
Ambre.*

Ambare Indis, Garciz. Clusius annotat Lud.
Romanum hunc fructum *Amba* nominare,
& caudicem *Manga*. At *Acofta* distinguit *Amba*
ab *Ambare*, ideo nos *Ludouici Romani*
Ambam non huc reducimus, sed ad *mangam* siue
Ambam de qua sequenti libro. *Acofta*, *Amba*
re arbor Canariis: & fructus Ambares, Per-
sis Ambereth: Turcis Harb. Lusitanis Amba-
res. Cast. dur. In Canaria Ambre, & fructus
Ambares. Indis Ambare, H. Lugdunens. Ambare A-
cofta.

*Vires & r-
for.*

Propter fructus gratam aciditatem cum Om-
phaci seu agrestis modo cibis admiscunt: matu-
rum ex sale & aceto edunt: excitat enim edendi
appetitum Indi aduersus biliosos humores uul-
lem esse perhibent, Sale & aceto conditus diu
conseruari potest.

CACHOS.

CAP. LXII.

*Descriptio
Malo insa-
no.*

Cachos nascitur arbusculi modo: insigni viro-
re praedita est, folio rotundo & tenui: fru-
tum fert Malo insano similem, altera parte sessi-

lem, altera turbinatum, cinerei coloris, tamen sapo-
ris, & acrimoniae expertus, minutum admodum
semen continens. Inuenitur duntaxat in Pe-
ruuanis montibus: *Monardes*: qui sibi huius
plantae semen apud Indos *Cachos* vocare nullum
testatur.

Locus.

H. Lugd. Cachos: Magna est apud Indos as-
timationis, ob insignes eius facultates. Nam
vrias ciet, calculum è renibus pellit, quodque
praestantius est, illius usu calculum in vesica com-
minui ferunt, si mollis adhuc sit, vltisque medica-
mentis comminui queat, eiusque rei tam multa
proferunt exempla, ut admirationem pariunt.
Nam ea est mea opinio (inquit *Monardes*) vesicae
calculum haudquaquam expelli posse, solamque exem-
prionem illius remedium esse, nullum autem medica-
mentum adeo efficax esse, ut eum confringere valeat.
Aiunt tamen illius semen tritum, ex aqua aliqua
ad eam rem vili sumptum, calculum in lutum
dissolvere, quod excretum denud concretum, &
in lapideam duritiem conuertatur. Adolescentem
vidi, cui hoc obtigisse scio. Is cum vesicae,
calculo torqueretur, idque à lithotomis, qui cal-
culum deprehenderant, intellexisset, & ex sym-
ptomatis quae patiebatur agnoscerem, hominem
veris initio ad fontem, qui de petra cognomina-
tur, ablegauit: ubi cum duos menses haesisset, à
calculo liber rediit, & omne lutum, quod paula-
tim eiecerat, denud in lapidea fragmenta con-
cretum secum in charta detulit.

Nomina.

Vires.

Vrias.

Calculus.

*Opinio Mo-
nardes de
Vesicae cal-
culo.*


Historia.

DE MORO.

CAP. LXIII.

His indicis Pomis inferenda fuit *Morus*, & ip-
sa *Pomifera*, sed quae ut vulgatio, alijs *Po-*
miferis sequentibus, ob affinitatem nominis fuit
permittenda.

MORUS NIGRA.



Morus dici-
tur cau-
dex satis crassus,
contortus ac
nodosus: alti-
tudo iuxta ar-
boris, rami pa-
tuli, cortex ru-
gosus, crassus,
lentus. Mate-
ries robusta, &
medullitudo
flaua. Radices
numerosae, ma-
gra ac robustae,
non tamen altè
descendentes,
sed sese diffun-
dentes, si *Marth.*
credimus. Folia
ex rotunditate
in acumen desin-
nentia, inter-
dum vitiginea, sinuata, per ambitum serrata, ta-
men nonnihil aspera, hirsuta, sapore subdulci &
viscido. Pro floribus *Dod.* autore Iuli sunt, vi-
rentes, lanuginosi. Fructum fert breuissimo pe-
diculo haerentem, maiorem & longiorem quam
Rubus, glomeratum similiter, sed acinis minus
rotundis, primum quidem virentem & auerum,

*Descriptio
Morus
nigra.*

Materia.

Radix.

Folia.

Floris.

Fructus.

pot.

pōt rubentem, acidum & adstringentem, per maturitatem nigrum, sanguineo dulci succo madidum, manus & os inficientem. Matth. ait, modicam vbi maturuerit remanere austeritatem.

Descriptio *Morus alba* tota delicatior est, vt à nobis quidem obseruatum, quàm nigra, eaque propter bombycibus alendis magis expetita: folia teneriora, angustiora, firmaque, oblonga magis, non minùs Nigra folijs serrata: aliquando vitiginea, sed tam concinnà diuisurà, vt Gallici sceptri lilia artificii pictoris manu ficta ad certamen pronocent. Iulos longiusculis pediculis hærentes, plures sæpè simul profert, vt in ramo spontaneæ Mori ex Italia delato obseruauimus. Fructus, non, vt præcedentis, niger, sed per maturitatem albus, sapore (Matth. teste) melleæ dulcedinis, quo fit vt minimè cum nigro facultate conueniat, minor etiam: antè maturitatem viridis & subviridis, austeriusculo sapore. Radix in ingentem sese diffundit longitudinem magis quàm nigra, fortasse quoniam amplior, altior, proceriorque semper quàm nigra habeatur.

Sycamina *Sycamina* Theophr. vocat, nomine à Ficu derivato, quam similem dicit Egyptiæ, folio, magnitudine, totaque facie: materie spillam & lentam, validam, ad opera facilem, quæ vetustate nigrescat, vt lotus: medullam eius nigram & duram: tardè geminare, citòque amittere folia: fructu esse paruo pro magnitudine arboris, leui, diluto, ex humore & cuticula constante, succo vinoso: flore lanugineo, fructibus insidente. Fructum, quia nudus, humidus, tenuique testus sit cuticula, promptè vel leuiter à sole tepesactum perfici, quippe qui ad sui perfectionem minimo egeat calore. Valida namque vis quadam confertim & celeriter prorumpere solita, fructum percoquit, sicut & in germinando fit. Longi enim prorogatio ac velut cunctatio germinis collectum maximum facit. Hinc fit, vt germina congesta magno cum impetu prorumpant, etiam cum strepitu quodam, vt quidam perturbent. Ita cunctis cum celeriter perfici solet. Eodem namque humore euenit, sicut frumens, quæ hyems diu retinet. Quæ ubi semel laxata fuerint, celeriter argeant. Adde, quod Morus fructum non vniuersum, sed particulatim percoquere soleat. Idèd & longo tempore in arbore manet, [alijs nimirum transcurrentibus aut cadentibus, alijs maturefcentibus] & maximè cum ijs humiditas illa tenuis & aquea. Hisigitur de causis præcox Mori fructus. Cæterùm vt Mæstor tradit, serò germinat hæc arbor, ob frigidiorem loci: Cito maturat, propter tenuitatem: diu tibi deditur. Placuit ita reddere, non propter summi becillitatem, sicut Gaza, quamvis eundem secutus sit Scaliger. Nam quid hoc est dicere, debilitatem esse causam citæ maturationis: quam rectius causam dixerimus serotinæ germinationis. Et res ipsa respondet. Succus tenuitas præpioris maturationis causa, quemadmodum crassitudo tardioris, vt in Cidonijs, Pitis hyemlibus, Prunis siluestribus, Mespilis & alijs id genus videmus. Neque repugnat vocabuli significatio, quam, si lubet Grammaticis, huc vsque extendent vt & tenuitatem denotet.

Gaza & al. mor. Diofcor. posita à Sycamina, arbor nota: alijs tamen legunt *moris* à Sycamina, Morus Sycaminea, vel Morus simpliciter. Sicut Hipp. vt explicat Gal. in eius vocibus: Cui & Sycamina id est *moris*. Fructus ipse à Sycamina Theophr. quod & *moris*, Morum.

Morus. *Morus* Palladio & Plin. ipsa arbor, qui fructum

inter carnosa Poma refert: Moris, inquit hîc, succus in carne vinosus: trini colores, candidus primò, mox rubens, maturis niger. In nouissimis florent, inter prima maturefcent. Tingunt manus succo matura, eluunt acerba. Minimum in hac arbore ingentia profecerunt, nec omnibus, nec infitu: (alijs insitis.) Nec alio modo, quàm Pomi magnitudine. Differunt Ostensia & Tusculana Roma. Nascuntur & in Rubis, multum differente callo. At nos parum differente callo, ad rem accommodatius legi censemus, licet nec Hermol. nasutissimus alioqui Plinij lector, nec ipse adeo Dalech. eius commentator alijue veterem corrigant lectionem. Idem Plin. Moro vinosum succum tribuit. Et alibi: Pro cute in animalibus, cortex in arboribus est. Mirum, his in Moro medicis succum quærentibus, serè hora diei secunda, lapide incussus [incisus, alijs] manat, alijs fractus siccus videtur (nempe cortex) quæquam hoc Plin. non de Moro, sed de Sycomoro tradere debuisse, vt sentit Corn. de qua re plura suo loco. Ad Rubi Mororum differentiam Officina hodie serè Mori arboris seu Dus Mora Celi vocant.

Morum arborem, vt scribit Curtius, non nulli à Græco nomine deriuant, propter fructus nigritiem: *moris* enim nigrum est. Græcis præter prædicta nomina, & *Soria* & *Soria*, Moros, ab Hippocrate, nisi mendum sit, Pomi in Sycaminon: Aëtio fructus Sycamina & Sycomora. Aeschylus tamen, autore Iulio Polluce, Sycamina ea vocauit, quæ tantum ex Rubo colligerentur.

Primas fructus germinationes, seu futuros poma, Ricinos, vel vt alijs malunt Cygnos, Græci vocant. Alij Mora oblonga, vel iulos teretes arbitrantur. Nigram celebrat Virg. Eclog. 6.

Sanguineis fructum Moris & temp. va pingit. Fabulantur Poetæ, Mori fructus vt is albos tantum fuisse: postea verò Pyrami & Thibes amatium sanguine tinctos, ac rubrum colorem mutatos, dum vterque sibi ipsi sub Moro apud fontem & Nini sepulchrum, propè Babylonem manus consciuissent. Sic enarra Quid. Metamorph. 4. Canit:

Arbor ibi nuda & berbosa poma
Ardua Morus erat, gelido contermina fonte.
Et post:
Arboris fati aspergine cadu in atram
Versantur faciem, in dispartitos sanguine radix
Purpurea tingit pendens à Mora calore.

Post Thibæ ad Morum:

Signa tene cadu, pulvisque & l. d. lib. aptos
Semper hæc feru. gemini in n. ment a cruorin
Dixit: & ap. pectus nunc nel ab imum,
Incubuit ferro, quod adhuc à cade expebat.
Vota tamen tetigere Deos, tetigere parentes.
Nam calor in poma est, vbi permaturnit, ater.

Athen. Sycamina, inquit, cum simpliciter omnes appellent Mori fructum, Alexandrini soli Mora nominant. Sycamina quidem, non intelligo fructum Egyptiæ fructus, quem nonnulli Sycomorum vocant. Apud Aeschylum in Phrygius Hector. Sycamina mora vocat:

Fuit vir ille Moris maturior.

Idem in Cressis sic nominat: & in Camiciis:

Candida enim Moris, ac nigrum succum fundentibus,
Venusque rubrica colore tinctu amula sunt
eius regionis arbores.

Sophocles:

Primam quidem cernes candidam qua floret spica
Deinde teres atque puniceum Morum.

Differentia

Plin. cor. red.

Mora Celi

Mori Egyptiæ

Sycamina
Morus
Pomum Sycaminum

Ricini
Cygni

Pyrami & Thibes amatium
de Metamorph.
phasi Mori

Mora nuda

Sycamina, a Mora

Candida Mora

Spica. Spicam autem vocat fructus arboris Mori rudimentum spicae simile.
Nicander in Georgicis tum arborem ipsam vocat semper *Morem*, ut & Alexandrini, tum etiam declarat, eius fructum priusquam reliquarum omnium conspici.

Mora. *At Morea quereb. blestemena tenellis,
Qua primum fructum fruct. in miralibus offert.*
Parthenius Sycamina, quae Mora vocant nonnulli, Abryna (*αβρυνα*) nominat. Demetrius Ixion (vel in *ετρουσκα*, vel *εσθια*) Sycamina & Mora eadem esse voluit his verbis: Veluti Mora, quae sanguine manant, & Ficis meliora sunt.

An Mora alba antiquis incognita fuerit, ut quidam suspicantur ex iam citatis aliquot locis, maxime Ovidii, & ex Athen. facile diiudicari potest, quamvis apud reliquos Veteres, maxime Theophrast. Dioscor. Gal. & Plin. & Geoponicos nihil de ea haecenus observauerimus.

Syce. Herimol. Syce apud Hipp. Morum arborem denotare aperte testatur.

Sycaminum. Media Comedia Sycaminon vocat & pomum & arborem: sed pomum neutro, arborem masculino genere, ut apud Iul. Pollucem notatum legitur.

Modon. Inuenias & *Modon* scriptum in Hipp. pro Moro, sed id culpa librorum, ut idem Herimol. autumat. De Syce autem Hippocratis infra inter vires. Amatus non miri aut Morum albam antiquis (excepto Ovidio) incognitam, quum postero seculo ex nigra Moro Populo inserta alba effecta sit, cui & subsistere videtur Lacuna: qui & Morum hominum amicum dicit, ac locis delectari quos homines frequentant. Idem Mora alba vulgo Mora Celti dicit scribit, quae aliis (ut Isidoro) Mora excelsa. Melsues vero pro Moris Celti, habet *Mora de seni*.

Hominiu
auitca.
Mora Cel-
si. Mora
excelsa
Mora de
seni.
Differen-
tiz.
Plinio e-
dem nigra
& candi-
da.
Differentias duas tantum plerique faciunt, Nigram & Albam: utramque descripsimus. Celsapinus putat, Plinium candidam & nigram eandem accepisse: quasi candida quae hodie frequentissima est, & optima ad Sericum praestandum, peregrina quoniam fuerit in Italia, ut eum bestiola, quae eius frondis pastu sericum reddit. Idem annotat Moro lighum flavum, aliquando & Buxen n esse: folia Fico minora, rotundioraque, minusque sinuata. In tenellis quoque germinibus laetum inesse succum quamvis parciorem, quam in Fico. Non florere euidenter, sed fructum nascentem binis squamis tegi, quibus deciditibus, veluti flosculorum apices totis fructibus insidere: quae sane observationem merentur.

Morus ni-
gra Moris
alba Cha-
mamora.
Prinque
vulgata
discreta.
Pumila
Morus.
Pena
et
lob.
Camer. quemadmodum & Pena & Lob. tres differentias agnovere, Nigram, Albam, & Chamamoram, quam Camer. scribit in duodecimum annum in horto cultam, nec unquam tamen fructum protulisse. Sed non placent Pen. & Lob. in suis descriptionibus, quando sic tradunt: Vulgatio Morus, Serotinos flores edit catulos, hirsutos & folia Alni, maiora, rotundiora, nigriora. In alba, minora, imbecilliora, ambitu sinuata, alba Populi, aut Sambuci montanae, albidia, flaccida, graviora, sed Mora multo insipidiora, candida nitent, ad nascentiam potius quam ad alendum nata, caduca, satius dulcia, tota arbore minore, quam tamen pluri faciunt coloni ad velleris opus. Idem in margine: Pumila, quam vocant Chamamorum, non nisi modo, magnitudine, pro totius rata parte distat. Sed valde claudicant eorum similitudines, quas Populum albam & Sambucum montanum cum Moro alba habere tradunt, cum

longissime petita videantur, maxime Sambuci mont. ex qua vix ullam animaduertimus similitudinem. Deinde Albam minorem dicunt vulgata. Matth. contra, altiore, procerioreque semper albam dicit: Et sane fateri non est vidisse nos nigras eius proceritatis, quales magno agnuncerie quadam positas vidimus extra nobis Ne-mausum.

Morus arbor, **morum** fructus, utrumque à Græco deductum apparet: nam *μωρον* Aeschilo & Eustath. Iliad. 5. fructus dicitur, *μωρον* arbor: apud Pollucem etiam pro *μωρον* scriptum *μωρον*, ut annotat Const. Dictum igitur *μωρον*, *μωρον* id est, exitio, infortunio, vel supplicio, quod exitii quondam causa fuerit illis qui exstendebant. Non defuere tamen Grammatici, quibus [literam pro litera ponendo] *μωρον*, vel Attice *μωρον* ut *μωρον* dicta putabatur Morus, quasi minimè fatua, quod diu morari consueverit, antequam germina protrudat, metu frigoris rediuiui: quapropter & *sapiens arbor* dicta. *Bacha* Hebraeis Samuelis 5. [licet Pirum transtulerit vulgatus Bibliorum interpret, sed reclamant omnes Hebraei] aut *Schukmah*, ut alii sentiunt, teste Trago. Setap. & Arab. *Tur*, qui & *Thut* utrumque nominant tam arborem, quam fructum. Germ. *Maulbeerbäum*: *Maulbeer* forte quia *μωρον* *μωρον*, oris affectibus commodus sit fructus ex cuius sanè succo convenientissima parantur *μωρον*. Scimus tamen alicubi & *Morbeere* dici, à quo forte & ab utendi modo illud *Maulbeere* detortum. Belg. *Noerbesyeboom*: *Noerbesie*. Gal. *Meurier*, *meurier*. Ital. *moro gelsa*, & *gelsa moro*. Hisp. *Catal. moral* & fructus *mora*. Catal. *moreria* & *mora*. Portug. *moreira* & *mora*. Angl. *Mulberry tree*. Bohem. *Moruffe*. Hung. *Zedery fa*.

Amat Morus calida loca, sabulosa, & plerumque maritima. Iuvat Morum temperies coeli moderata, & locus planior, qualis est ager Narbonensis, Italia Lombardica: nec temere in Montibus visam Morum Plin. scribit. Annotat Tragus utrumque genus in Rhætiis Alpibus inueniri, quorum alterum atros, alterum candidos ferat fructus. In regionibus vero quae Rheno adiacent, vnum duntaxat reperiri, nimirum nigrum. Alba ubique scatur in Italia ac etiam Hispania ad alendos bombyces tantum lata. Nigra etiam ubique aut in hortis aut vitidariis, ac in genere amoenos amat tractus. Humor assiduus Moris prodesse non creditur. Frigida etiam valde abhorret. Basileæ & in Alsacia oppidis nigras colunt in ædium areis, proceras, parulas & elegantes: sed albae multo rariores in tractu Germanico, nuper tamen Illustriss. Ducis VVirtemb. &c. mandato in Ducatum VVirttembergicam magna copia ex Italia inserti & propagari, bombycum nutriendorum causa, coepit. Aded flagrat sapientissimi huius Principis indefessum studium, in ornando suo Ducatu, ut ne desit suis quod adest aliis, eoque eius magnificentia serè restituta, ut ad sit illis, quod abest multis, & vix paucis aliis nationibus concessum, uti passim in huius historiae serie patet. Nos quoque utramque colimus iam à multis annis in E. Horto Montbelg.

Serotino germinatu florere maturaque celeriter fructum Morus, quae nouissima urbanarum germinat, nec nisi exacto frigore, ob id dicta sapientissima arborum. Magna & in hanc vis Soli, nam cum coepit, in tantum vniuersa germinatio erumpit, ut vna nocte peragat, etiam cum strepitu, ut post Theoph. Plinius quoque scriptum reliquit, Sed cum primis folia dimitit. Trago non

Synonyma
ling.
Erym. Lat

Sapiens ar-
bor.
Bacha.

Tur.
Erym.
Germ.

Locus

Ducis
VVirt. Ery.
Studium di-
tando Ger-
mania.

Tempus

tardam ob tardum illud ortum, sed quod folia sua tenella ab ortu statim rugosa producat, sapientia simbolo notatam putat hanc arborem, seque obseruasse scribit, non protrudere folia, nisi exacto iam frigore & pruinis, his maxime quæ perniciem adferre possent. Quod sanè vel *de h. m. m.* intelligendum, vel in locis temperatis. Alioqui apud nos & contrarium euenisse obseruatum, & pruinæ superuentu folia iam emersa contabuisse. Sed hoc rariùs. Ergo vtpurimam mense demum Maio, germina emittunt: Fructum maturant Augusto, vt Dod. obseruauit. At nos citius, nempe Iulio Basileæ, immò medio etiam Iunii matura legimus Montpellii, nec tardius in Austria Italique locis plerisque. Auenionensi & Veronensi agro plurimum gaudent. Cæterum hanc arborem tardissime senescere Veteres prodiderunt.

Tarda semina. Morus, inquit Plin. talea tantum feritur, quoniam ramo eam (in Vltimo feri: alii: vet. inferi) religio fulgurum prohibet. Seruandum in eo ante omnia, vt talex ex feracibus fiant arboribus: ne eurus, neue scabre, aut bifurcæ: neue tenuiores, (quod & Theophrast. & Colum. de arboribus talea ferendis in genere præcipiunt) quam vt manû impleant: neue minores pedibus: vt illibato cortice: atque vt lectura inferior ponatur semper, & quod erit ab radice: accumuleturue germinatio terræ, donec robur planta capiat: quæ conditiones & leges vniuersaliter arborum talea ferendarum sunt. Mororum sationis tempus ab Idibus Feb. vsque ad æquinoctium vernum Columella designat. Vt Berytus auctor est, feritur autumnis ramulis ficulnorum modo terræ defixis, etiamque vere. Habitiora sunt terra ipsi circumfusa assidue fuculata, non in profundum, sed vsque ad superficiem radicum. Mora etiam semine plantari possunt, si quis ipsum Morum prius dissoluerit, & grana eius electa in terram demiserit ac rigauerit. Præstat tamen plantari à claua & talea nam ex semine nata degenerant. Quidam taleis & cacuminibus sesquipedalibus, vtraque parte læuigatis, melius prouenire tradunt, si fimo oblinantur. Locum in quem palum demiserunt, cinere tectis admixto tegunt, sed non amplius quatuor digitis operiunt.

Cultura. Fossione gaudet & stercore. Putris in iis & arida post triennium sunt putanda.

Transplantatio. Plantam si robusta, transferes mense Octob. si tenera, Feb. & Martio. Scrobes desiderant altiores interualla maiora, ne altera umbris prematur alterius. Circa Cal. Octob. Morus ablaqueanda est, & radicibus vini veteris recentissimæ feces in spargenda. Amica est Morus & Vitis.

Vitificatio. Feraciorum præcocioremque fieri arborem tradiderunt, si perforato hinc inde trunco, singuli cunei Terebinthi vel Lentisci adigantur.

Inserio. Inferitur, si prisca Geoponica credendum, Castaneæ & Fago. Item Fico sub Cortice. Inficit Vltimo comprehendit, sed parit magnæ infelicitatis argumenta vt iisdem persuasum. Berytus apud Const. Cæsarem scribit, si Populus alba inferatur aut inoculetur in Morum nigram, alba Mora nascitur. Sed Quinquernus de laudibus Prouinciæ ait, si quis Morum nigram Populo albæ inferat, in Morum albam facescere. Quin & Io. Agric. vulgò Mora alba fieri tradit per insitionem supra populum albam, nouumque esse inuentum, cuius antiquiores non meminerint, in quo fallitur. Sed quicquid sit, tam Veterum, quam Recentiorum fabulam putamus, neque est, qui se expertum tradat. Et Geoponicorum Clariss. scriptor Palladius, quædam Morum insitionibus sequentes versus, com-

posuit, huius rei & Populi albæ ne verbulo quidem meminisse: refert verò & alias quædam arbores, quarum coniugium admittat.

Morus qui etiam Moru commercia Ficus Præstat, & oblatam Robore germen alit.
Fraxinum huic arida confert sua membra foror,
Et meruit sacris sparsa cruore nouos.
Præter Fagus, & poma hirsuta virentis
Castanea, dum aspera mala comit
Insiciens monstrat picea nigrescere partem,
Et succopas, se surgida poma nouo.
Obsequitur Moru blandi Terebinthus odore,
Et gemma veniunt munda missa b. ris.

Res est experiri: experiatur qui volet.

Morus si tardius folia producat pro bombycum alimento, nouilunio funum radicibus eius adhibeatur.

Mori foliis deficientibus Vlmi folia & Vrticæ germina substituenda suadet Car. Steph. Quidam & Lactuæ folia præbent & Endiuæ, sed iunioribus tantum, nam egregie depascuntur: sed si nimium des, aut paulò maioribus, alio fluida facillè dissoluuntur ac pereunt, vt ipsimet experti sumus. Quidam & Rubi folia tenella dare suadent, sed his nequiquam delectantur. Mori albæ foliis nos nigra substituimus, nec sinq. successu. Hæc eadem quoque, vtpote magis pulposa conueniunt adulis: sic etiam serico pondus maius acquiritur & crassities, vt annotat Cæsalp.

Colligenda potius vetera folia, quam noua, manè ubi ros deciderit: aut si madida fuerint diligenter prius abstergenda aut ad ignem siccanda: Nam nimia humiditas obest bombycibus.

Cæterum Mori culturam, ad ministrandi modum, quemadmodum & bombycum serici architectum curiosè & diligenter descriperunt Car. Steph. & Hieron. Vnde Cremonensis elegantissimo carmine. Sed his adhuc specialius & curiolius Aug. Gallus, in opere suo Geoponico Italice conscripto.

Morain vitro vase diligenter condita plurimo tempore durant, proprio suo vino demersa diligenterque operta, autore Constantino. Morus semper maximus fit, in iis regionibus ubi sericum paratur, vt Lucæ, Genuæ, Granatæ, in tota penè Lombardia, Auenioni, nuper Turoni Gallorum, & hodiè Stuckardiz quoque.

Qui muscas vitare volunt, non plantent iuxta domos.

Hipp. auctore, sanientruentam ex vtero educit *ovis* (Mori, gal. & Cornar.) radix cum melle subdita, & postea rosaceo illinita. Sanè nisi interuenisset autoritas Galeni, (quem meritò tanquam fidu Hip. interpretem suspicere debemus) *ovis* voce mallems Ficum intelligere, quam Morum. Ficus enim à Dioscor. & aliis *ovis* dicitur. Et si rem & rationem ipsam inspicias non temerè nostram reiicere coniecturam. Ficus quippe nostro iudicio, melius fortè id præstabit lactis sui acrimonia, quam Morus. Videtur & ipse Hipp. propter radicis acrimoniam illitum postea præscribere ex oleo rosaceo. Et Galenus asserit, in radice Mori restringendi partes vincere. Quod si ita est, vt reuera esse consensimus, quæ quæsi ratione proliciat veteri sordes purulencas? Sed hanc nostram sententiam libenter doctiorum subiicimus censuræ. Hoc saltem præstitisse putamus, si Hipp. non Ficum intellexisse videatur, id tamen, quod intendit, eius radice vel ramo haud inefficacius præstati posse, quam Mori. Is præterea si prægnantes bilis vexet, pusane succum dat Rheo rubro insperso, aut eo qui ex Moris paratur

Succedanea.

Delectus.

Repositio.

Vires & vires.

Sanæ & sanæ.

Coniectura.

Adiantum
platyneuron.

Žignti Gyms.

Franklin G.
Co.

Alum. Ro-
m. fact.
Stomachus
Liquor.
Nona.
Fensil. in-
flam.

Cadence

[illegible]

Morsum
phalang.
Dolor de
pau
taccu è
dole
Concreta

Tubercle

Paraglossa.

Dysentery

Quemada
1110 105-
Camp 105
f. a. m. 105
mendicant

Температура
- 1000

Siccitas.
Dysenteria.
Diarrhea.

Cur alim
-abricam

dromacho recenset. Ceterum Plinio neutiquam consentit Horatius, iniquenti, intumescere Mora comesta, nisi alius superueniat cibus, ut his de-
clarat versibus:

— ille salubrem

Aestates peraget, mœni qui prandia Moris

Pinet, ante grauem qua legerit arbore Solem.

Nec Dioscoridi consentit Diphilus Siphnius Me-
dicus apud Athen. sic scribens: Sycamina, quæ &
Mora nuncupant, succum mediocriter bonum
generant, parum alunt, celeriter excernuntur,
Lentius, hoc est, ventriculo grata sunt. Peculiari
verò facultate ante maturitatem lumbricos ex-
pellunt [hoc Dioscorides de cortice radice scri-
bit.]

Palagra.

Pythermus, ut inquit Hegesander, memoriz
tradidit, æuo suo Moros annis viginti fructum
non edidisse, & popularem morbum podagram
ita fuisse grassatam, ut non solum viros, sed etiam
pueros, virgines, eunuchos, mulieres is morbus
corripuerit: quin & eam egritudinem adeo ve-
hementer exuisset in greges, ut ouium partes duas
ille morbus affligeret.

Mira sunt præterea, inquit Plin. quæ produn-
tur. Mori germinatione, prius quam in folia ex-
eant, sinistra decerp. iubentur futura poma: rici-
nos Græci vocant [Cytinos Hermol.] Hi terram
si non attingere, sanguinem sistunt adalligati, siue
ex vulnere fluat, siue ore, siue naribus, siue hæ-
morrhoidibus: ad hoc seruantur repositi. Idem
præstare & ramus dicitur, Lunâ plenâ defractus,
incipiens fructum habere. Si terram non attinge-
rit, priuatim mulieribus adalligatus lacerto contra
abundantiam mensium. Sed veremur ne supersticio
eius, di. remedi. generibus sit pro facultate.

*Sanguis
fluens*

*Menses.
Plin. not.*

*Serpentum
id. m.*

*Contra
Scorpiones.*

*Diamor-
aliud.*

*Stomatice.
Vulnera.*

Aliud.

*Noma. Pe-
stus.*

*Viscera.
Dentes.*

*Ambusta.
Dentium
dolor.*

*Apostoma.
Purgans.*

Ptilorhœus.

*Diamor-
Retentus.*

*Diamor-
Corda.*

Vuliora sunt quæ sequuntur. Folia Mori trita,
aut arida decocta, serpentium ictibus imponun-
tur. Ad idemque potu proficitur. Scorpionibus
aduersatur è radice corticis succus ex vino aut po-
tula potus. Succum expressum maturi pomi im-
maturi que mistum coquebant Antiqui in vase æ-
reo ad mellis crassitudinem. Aliqui myrrha ad-
iecta & cupresso: vel, ut alii malunt, passo, prædu-
rantes, vas Sole torrebant permiscuentes spatha
ter die. Hæc erat stomatice, qua & vulnera ad ci-
catricem perducebant.

2. Alia ratio: immaturi succum exprimebant,
siccato Pomo multum saporis obsoniorum confe-
rente. In medicina verò contra nomas, & pecto-
ris pituitas, & ubicunque opus esset adstringi
viscera. Dentes quoque colluebant eo. 3. Tertium
genus succi, foliis & radice decoctis, ad ambusta
ex oleo illibenda: imponuntur & per se folia. Ra-
dix per messes incisa, succum dat optissimum den-
tium dolori, collectionibusque & suppurationibus.
Aluum purgat. Folia Mori in vrina madefa-
cta, pilum conis detrahant. Placuit hæc ex Plinio
ad verbum transcribere, quamuis pleraque & à
Diosc. tradita videantur, sicut & ipse Veteres citat
Plinius: sunt tamen & quædam à Plinio superad-
dita, quæ excindere ex Plinii verborum serie no-
luimus. Et quoniam iam aliquot Diamori descri-
ptiones ex Diosc. Gal. & Plinio proposuimus, me-
rito & eam adscribendam censuimus, quæ hodie
in Pharmacopœorum Officiis patari solet ex
descriptione Nic. Florentini.

Succi Moror. Celsi lib. sem. Succi Moror. Rub.
lib. j. Mell. opt. despum. Sapa. vnc. iii. Cordus loco
sapa. succos Mori Rubi Idæi & Fragorum, pari
singulorum cum succo Mororum pondere addit.
Vnus ad depascentia oris vlcera, ad dentium affectus
& gingivarum noxas, atque ad omnia oris vitia

Tom. 4.

cum aq. conuenienti succo vel decocto gargariza-
tus non sine magno profectu Potest etiam omni-
bus serè supra scriptis morbis diuersimodè ac-
commodari.

Aegineta autor est, Mora impensè humectate
& mediocriter refrigerare: Neque tamen hæc fa-
cultates acerbitati & aciditati, ut Curtius putat,
eorum tribuenda, cum utroque illa facultas ter-
restis alicuius naturæ potius sit sociata, quam hu-
miditatis. At immaturis utramque inesse non ne-
gamus. Succus illorum. Cya. hi pondere contra
phalangium mortis auxilio est, Sed diu verò
in viro decoctus & bibitus, ventris defluuia
compescit, vel Særeno hoc testante his versibus.

Arbore pyramica cortex direpta liquetur

Axe sub æthere, si nigra mixta lino,

Immensum poterit potu retinere fluxum.

Bayrus ad defluuium capillorum radices Celsi ex-
corticatas atque combustas coquit cum oleo rosæ
& vngit.

Constat (inquit Matth.) alba Mororum astrin-
gentem facultatem longè minorem, quam nigra
esse adepta (etsi Diosc. & Gal. alborum non me-
minerint) & multa & perspicua, sed paululàm in-
sipida dulcedine: in maturis nulla adstringendi
vis planè percipi potest. Quare nec ita ut nigra in
medicos usus assumuntur, quanquam magis nigris
alvum subducant.

Schuenckfeld. annotat folia x aceto ambustis
mederi Camer. Anno 1559. tantam annonæ penu-
riam Italiæ loca quædam pressisse, ut pauperiori-
bus rationes Mororum in alimentum cesserint.

Ex Mori etiam materia, autore Marcello, para-
tur Itali signarium, si, (ut serè in matutino tempo-
re fit) extinctis ignis hesterni reliquijs omnibus,
instaurandus iterum focus sit. In quem vsu mu-
tuo eius ligni attritu flammam excitari dixerunt.
Eandem vim Mnestor apud Theophrastum Mo-
ro tribuit, quod ad excipiendum ignem apussina
videtur ob materiz lentorem.

Tradunt & pastorum religione olim consecra-
tam, nunquam nisi sanguineo eius Pomi succo
unctis corporibus, Pana nomen suum precibus
& votis ad suam sui que gregis opem inuocan-
tium. Sæperest insignis ille foliorum vsus, quibus
quadraginta serè diebus à vergiliarum exortu vs-
que ad solstitiū pasti vermes serici plastæ, vellers
nunc omnibus notissimi quo principes quondam
& magistratus ornabantur, ut esset potestatis &
honoris insigne: nunc autem promiscuo vsu ad
plebem, & vti nam non ad meretricium luxum
pellucens translatus, vel in agtis etiam sorde-
re cæperit.

Plinius id vestimenti genus scæminis olim tan-
tùm in delicijs habitum haud obscurè insinuat:
nec puduit tamen has vestes usurpare etiam viros,
leuitatem propter æstiuam. In tantum à lorica
gerenda distessere mores, ut oneri sint etiam ve-
stes, ut merito cum Seneca rogemus: nonne vi-
dentur tibi contra naturam viuere, qui commu-
tant cum scæminis vestem? Nec sine ratione Ti-
berius olim, ut refert Tacitus, promiscuas vi-
rorum & scæminarum vestes accusabat.

Porro siue nendi, siue texendi varium serici
artificium, immodè si ipsam animalculorum admi-
randam inspicias naturam & varietatem tam vi-
cæ, quam operis, nullibi sagaciorum naturam, in-
dustriam magis deprehendas artem: at si vsu
& redditus, qui inde manant spectes, haud vanè
tantoperè Italiæ atque Hispaniæ hodiè etiam
Galliæ atq; Germaniæ optabilem haberi ceptam,
ut sint, qui in re rustica Morum etiam vitibus &

Temperat.

*Curtius
not.*

Phalang.

marj.

Peris. p.

fluat.

*Defluui-
capillorum.*

Alba. m.

Italiæ.

Parfart.

Observat.

Ignis m.

In ficiis

ad illud

papillat.

Oleis aded præferendam censuerint, quoniam in Italia vestigal præcipuum iamdudum esse cepit, annonamque nihilò hercle minus, quam vitis & Olea augeant.

Præfertur tamen ab omnibus, copia & teneritudine foliorum magis [vt inquit Marcellius] quam bonitate Morus candida, priscis naturæ cultoribus atque historiographis, vti videtur, ignota, & in Italiam non nisi serò translata, quando, [vt iam prius monuimus] nec Theophrastus Plin. nec in disciplina ruris tot Latini auctores aliquid de ea tradiderint: non relictum in augenda domini re tam facilem simul & honestam questus rationem, si quod tam latè nunc patet tractare, & exercere, eà quàm nunc exercetur ratione, & ipsi quoque didicissent. Fuisse tamen serici, & quidem bombycum opera facti, apud ipsos vsum maximum, vel ex Plinij historijs abundè patet, sed longè differente

ab hodierno conficiendi modo, de quo ipsemet consuli potest. De bombycum historia, & foliorum administrandi ratione specialiori hic tractare superfedemus, cum breuitatis causa, tunc verò quid illud negotij iamdudum mihi [Cherleto] datum nouerim in historia mea Insectorum.

Non omittendum quod Porta in noua sua Philosophandi ratione, à signaturis petita, annotat, ^{Mora in somnijs visa vulnera portendere ob co-} Mora in somnijs visa vulnera portendere ob co- ^{quæ deno-} borem. Immatutum, hoc est, nondum perfectè maturum, quia rubeus sit, tunc præcipuè altringere ac sanguinem reprimere: maturum verò, quia nigrescat, soluere aluum: quos effectus vt concedimus, ab ijs coloribus tanquam causis produci: immò nec ^{Porta not.} quidem censemus vel signa infallibilia. Dicemus & hoc ne ^{quæ deno-} quidem verè ac propriè censeri posse, quibus temerè fides in arte sit habenda. Sed hæc alteri sunt tractationis.




DE SYCOMORO ET FICV CYPRIA

CAP. LXIIII

Sycomorus Matth.

Cypria Alp.

Cypria



Descriptio

Folium.

IN sicco nostro Herbario folium habemus Sycomori, paulò palmā latius, longitudine aliquatò maiore, in obtusum mucronem desinens, nonnihil sinuatum, quod secundum longitudinem percurrit neruis, vnde oblique in latera venarum, propaginibus suis quoque donatæ, porriguntur, quale ad figuram Ficus Cypriæ adpingi curauimus. Sycomorū siccam præterea vidimus apud Celeberrimum Virum D. Vlysem Aldroandum, Professore doctiss. & rerum naturalium peritissimum, Medicum Bononiensem, cuius figuram exhibent Bry Fratres in æneis tabellis effigiatam.

Rauwolfij descriptio.

Fructus.

Extotius arboris inspectione descriptionem dedit Rauuolf. vt sequitur. Tam Cypria quam Aegyptia Ficus syluestris, seu Sycomorus, proceritate crassitieque Morum albam adæquat folijs quoque consimilibus donata, paulò tamen magis rotundatis, in ambitu nullis incisuris crenata, serrataue: Fructus ferunt nostris ficubus non abimiles, dulciores tamen, cenchramidum expertes, bonitateque inferiores: quò sit vt minoris estimentur, magnaque ex parte in pauperum vsum cedant diuenditi. Vtraque species caudice, folijs, fructu admodum est simili: abique eo quod

vt huic fructus inferius potius est in ramis maioribus ipsoque etiam caudice, ita illi, iidem nascuntur non in ipsis ramis, sed in priuatis surculis, foliorum expertibus, spithamam longis, plerumque admodum conferti. Fructus ferunt hæc arbores ter quaterue quotannis, paruos, ad cinereum colorem vergentes, ex oblongo rotundos, Prunorum instar, toto serè anno in arbore sua inueniendes.

Alpinus sic describit. Maxima arbor ramos latissime spargens, folijs Mori crassioribus, candidioribus atque asperioribus. Insitionem Fici supra Morum plures Aegyptii asserunt. Truncus, ramus, cortexque, fructus, lac, foliorum asperitas colorque Fici apparet: foliorum figura & magnitudo Moro respondet. Fructus tardè, neque perfectè maturefcit, atque saporem aqueum & iucundum habet: nunquam multis fructibus caret, qui caudici adnascuntur, minimèque ramis: neque fructum producit hæc arbor, nisi prius multis verberibus sapè laceretur, sic vt caudicis cortex vulneretur, vnde exiguis surculus Ficus fert modò ternos, modò quinos, modò septenos & plures etiam. Ex seminibus non nascitur, sed ramus propagatur.

Alpinus des-
cripsit
insitionem
ex Fico &
Moro com-
parata.

Ad hæc

Ad hęc Eto Aphoc. lib. 9. Ficus Aegyptia, incolis dicta *amir*, arbor & folia si nulia ceteris ficibus: Verū n arbor est insignis altitudinis & crassitudinis: fructus non fere supra ramis nec in extremitate eorum, sed tantū ad radicem arboris, vbi nulla folia: sapor idem, qui ficibus vulgaribus, crassi & violacci odoris. Considerandum an benē describatur Ficus Aegyptia à Leone foliis similibus Ficibus, quandoquidem alii aliter tradunt.

Sycamori Aegypti propriam, & Ficum Cypriam describit Theophrast. & ex eo ad verbum penē Plinius in hunc modum. Et in Aegypto multa genera, quæ non alibi. Ante omnia Ficus, ob id Aegyptia cognoscitur. Arbor Moro similis folio, magnitudine, aspectu. Pomum fere non ramis, sed caudice ipso. Idque ipsum Ficus est prædulcis, sine granis interioribus, perquam forando prouentu, scalpando tantū ferreis vnguib: aliter non maturefcit. Sed cum factum est, quarto die demittitur, alio subnascente &c: In Theophrast. autem quedam emendanda: nam pro *hæc leg. ista dicitur* ex Plin. & ad *τὸ φῆναι*, addendum *quum*, ex ipso sensu.

Quod verò Theophrast. ait Ficum Aegyptiam fructum ferre non furculis, non ramis, sed caudice ipso: quāque sententiam & Dioscor. sequitur: Athen. aliter habet, sic: *ἐκ τῆς κορυφῆς καὶ τῶν ῥαμνῶν*. vbi, *ἐκ τῆς κορυφῆς* teneros ramos vocauit. Gal. verò in 2. de ali. n. fac. cap. 33. omnia hæc aliter, & fortè corruptus codex est.

Testatur Galenus se arborem vnā cum fructu in Alexandria vidisse, fructum quidem consimilem Ficui paruz albæ. eūque in medio Mororū eacicum locū posse ait. Vnde etiam nomen sit indeptus, à similitudine videlicet, quā ad vtrumque fructum habet, vnde Sycomorus dicitur. Insuper etiam ridiculos eos esse ait, qui Sycomora dicta putant, quod fatuis Ficibus, hoc est, *τῶν μικρῶν ῥαμνῶν* similia existant. Quibus verbis palmam est Dioscor. ab eo notari, quem & ipsum de Sycomoro tradentem audiuisse patet.

Sycomorum, inquit ille, aliqui etiam Sycamunum vocant: cuius fructus Sycomoron quoque propter ignauum infirmūque saporem appellatur. Est autem arbor magna, Fico similis, largo succo abundans: (*παχύσαρκος καὶ πολυχυμὸς* ex Theophrast. vulgata quædam *παύχυμος* habent, & Sarrac. testatur, in vetustis codicibus *παύχυμος* legi, sicque & Serap. & Ruell. legisse videntur: & idipsum etiam Plin. innuit, quando aliās multo lacte, aliās largo succo abundare Ficum Aegyptiā dixit) foliis Mori. Fructum & ter quaterue anno proferit, non è summis ramis, vt Ficus, sed è caudice ipso, caprifico similem, grossis dulciorem, sine granis interioribus: quique non maturefcit, nisi vngue ferroque scalpatur.

Athen. Sycomori seu Ficus Aegyptiæ fructum indigenæ, vbi ferro leuiter scalpserint, in ipsa planta relinquunt: tandem verò vento iactatus, excutitur intra triduum maturefcit, odorūque fit ac esui iucundus, præsertimque si Fautoni spirauerint. Erante Dioscor. Athen. & Plin. dixit Theophrast. maturefcere nequit, quin scalpui fuerit, id quod ferreis præstant vnguib.

Cut verò citra scalpaturam eius fructus maturefcere vix queat idem Theophrast. declarat alibi, sed oleo quoque perungi debere ait post scalpaturam, idque nisi fiat maturitatem adipisci non posse, propter affluētiā pabuli: siquidem scalpui ali- quid humoris prolicetur.

Quod id scalpendi modum, Theophrast. Plin. Tom. I.

& Athen. ferri tantū meminērunt, vel vnguis ferrei: at Dioscor. & vnguis simpliciter, & ferri. (*ῥαχὴν ἢ σιδῆρα*) sed parum referre videtur, siue humano, siue ferreo scalpatur vngue, modò scalpatur, quod & alio instrumenti genere fieri queat. Sed sola scalpura non sufficit, sed & oleo inungi oportere aliquoties inculcat Theophrast. quod Plin. non obseruauit, ita parū consideratē scribens: scalpando tantū ferreis vnguib: &c: quamuis nec ipse etiam Dioscor. vel verbulo solo meminērunt olei, nec Athen. qui tamen pletaque ex Theophrast. mutuū videntur, aut certè omnes hi ex aliquo vetustiore.

Ceterū Dioscor. eam Ficum quæ in Cyprio nascitur, (quam Cypriam vocauimus) ab Aegyptia specie disterre ait: quippe, inquit, quæ Vlmus (*ῥαχὴν*) eū sit, folia Sycamini [Sycamori Cornu vertit] refert: fructum verò Prunorum magnitudine (*πῆλιν ὡς Προυνῶν*) & quādam ipsa dulciorem. Cetera omnia antedictis similia sunt. At Theophrast. hanc Cypriam Ficum paulo aliter describit. Nam arboris caudicem, cui tractus adnascitur, Populo albæ (*τὴν λευκὴν*) similem facit: folium (*τὴν ῥάχιν*) Vlmis. At Plin. hoc tantū à Theophrast. discrepat, quod non Pruni sed Sorbi fructum dicat esse magnitudine. Sed à magnitudine exigua differentia, modò paruum, aut mediocriter tantū Prunum cum Sorbo conferas maiusculo.

Vides itaque Dioscor. cum Theophrast. Cypriam Ficum à Sycomoro diuersam facere, hancque inter Vlmorum genera referre. Plinius disiungere videtur, quando ait: Moro in Aegypto & Cyprio sui generis, vt diximus, largo succo abundans summo cortice desquamato, altiore plaga sicantur, mirabili natura. Athen. quoque separatim de Cypria Fico agit, lib. 3. qui iam de Aegypia lib. 2. tradiderat. Nihil verò aliud, quā Theophrast. citat verba, quæ cum iis, quæ supra ex Plinio adduximus penē coincidunt. Verū Athen. cum Theophrast. in hoc tantū differt à Dioscor. quod hic arborem Vlmis similem esse tradat, ille folium tantū. Sunt tamen qui apud Theophrast. pro *ῥαχὴν* legendum censeant *παύχιν*, eo sensu aduicam Populo similem esse. Lectionem tamen vulgatam Dioscor. confirmare ait Dalech. quod non simpliciter verum, quippe qui arborem ipsam, non folium, vt illi, similem Vlmis dicat esse, sicut dictum.

Ceterū haud supinè hoc loco prætereundum, quod & cap. superiori de Moro obiter monuimus, Plin. lib. 16. c. 38. Moro tribuere, quæ Sycomoro competunt, quando sic in sit: Mirum, hic in Moro Medicis succum quærentibus, serè [verò M.] hora diei secunda lapide incussus [incisus M. incusso vet.] manat, alius fractus cortex siccus videtur. Quod sanè Dioscor. manifestè de Sycomoro refert, his verbis: Liqueorem verò fundit arbor [Sycomorus] primo Vere, priusquā fructum proferat, lapidis ictu summo cortice desquamato: si enim frangatur aliud, nihil quicquam emittit. Spongia aut vellere lachryma colligitur, quæ siccata & in pastillos coacta, sicili vase reponitur, ex quibus Dioscor. verbis facillè Plin. restitui potest. Sed diuersimodè hic locus apud ipsum quoque Dioscor. legitur. *ἐκ τῆς κορυφῆς καὶ τῶν ῥαμνῶν* Dalech. nempe lacteum succum ex arbore teneila colligitur priusquā fructum ferat. Plin. pro *ῥαχὴν* aut *ἐκ τῆς κορυφῆς* seu *ἐκ τῶν ῥαμνῶν*, aut tale quid legisse videtur, quando diei horæ secundæ mentionem facit, quæ in matutinum tempus inciderat, vt clarissimi Scriptores anno-

Ficus Cypria ex Diosc.

Theophr. Ficus Cypria.

Vlmis generis Moro Aegypti Plin. Moro Cypria.

Succum & melle Sycomori.

Modus colligendi Diosc.

HISTORIAE PLANTARVM

tant. Ruell, primo Vere arbore tenera, suorum
eximi verit apud Diosc. tanquam pro nage
legisset. Vulgata extirpi habent. Sune qui
facilem lapsum animaduertentes, aut re
simpliciter reposuerint. Sed vetusti
codicis lectio plausibilior, quam & Sarrac. secut
tus.

Porro vero similibus esse putat idem ex adulta,
quam ex tenella adhuc nouellaque arbore tan
tum succi emanare, ut facile spongia aut vellere
excipi possit: quippe eam nouella necdum adul
ta arbores vix amplius succi habeant, quam quod
ad ipsarum incrementum satis esse possit. Sed mi
rum, Virum alioquidissimum modestissimum
que eo securitatis delapsum, ut de arbore sibi in
cognita, siue nouella siue adulta iudicium in re
propria ac ei specialiori ferre sit ausus: mirum et
iam eo obliuionis eum lapsum, ut non recorda
tus sit, & a se annotatum, hanc arborem
Theophrastus, vel ut ille apud Diosc. legit
ex vet. cod. dici, ut iam non amplius du
bitandum sit, incisione vel in tenellas [quales, a
liker quam ipse censet, succulentiores ferè in v
niuerso arborum genere ad proportionem esse
solent] vel in adultas facta, tantum effluere succi,
ut spongia excipi queat, nec tamen deficiat ipsi
pro incremento. Quippe si multum reddet, mul
tum etiam trahet, ut patet in frequenti eius fru
ctificatione.

Corn. Celsus de Phrenitide tractans, in qua
quidam somnum moluntur, alii addit, vel Amo
nium vel Sycamini lachrymam fronti inducunt.
Hoc nomen apud Medicos reperio. Sed cum Græ
ci Morum Sycaminum appellant, Mori nulla la
chryma est: sic verò significatur lachryma arbo
ris in Ægypto nascentis, quam ibi *Morijeb* ap
pellant: quæ postrema verba Histor. Lugd. apud
Celsum supposititia esse censet, ex cuiusdam glos
semate, qui Celsum vellet liberare ab ea dubita
tione, quæ hæsitabat inserta textui.

Porro Theoph. seu *Synonyma* Diosc. &
Gal. apud Eusebium Evangelistam etiam *Synonyma*
dicitur: Super quam ascendit Zachæus, cum vel
let Christum videre. Eadem, quod fructu care
ntem vidisset Christus, maledixit, ut ne posthac
ferret fructum, & mox exaruit, ut historię nos
docent Euangelicæ. Idem de hac arbore statuunt
Bellon. Ravvolff. & alii qui illas regiones perlu
strarunt. Item Matth.

Quin & D. Hieron. Sycaminum arborem Sy
riæ peculiarem dicit: eius etiam meminit Esai. c.
9. & Amos 7. *Sycaminus*, Mortis Ægyptiæ,
quod nomen etiam Ce
ronix arbori improprie attribuitur, autore Theo
phrast. Appellatur vulgò Synis Ficus Pharaonis,
testibus Geln. Bellon. & Rob. Const. qui & *Gien*
mez iisdem in Syria dici testatur.

Accris speciem, [inquit Bellon.] Obliu. i. c. a.
quibus Sycomorum existimant, licet Sycomor
us rara sit planta, quæ nunquam visa fuit, nec
sylvestris nec culta, nec in Græcia, nec in Italia.
Quales verò in Palæstina conspiciuntur, ramos in
trunci summo gerunt in serui speciem: patulæ sunt
admodum, foliis agminatim iuxta se innicem po
sitæ, trunco crasso.

Idem tradit, iuxta Cairum, in horto quodam
Matereo dicto Sycomoros quoque haberi, quos
Ficus Pharaonis vocitent. Fructus eorum, inquit,
similes essent nostris Ficibus, nisi exterius essent
rubri, magnitudine oui, & perpetuò ferè fissi &
aperti. Sicci nihil valent, sunt enim duri, exsucc
granosi, gustu ingraro & saturo, iis præsertim qui

his non sunt affecti. Recentes magis per barba
qui tamen nec ipsi, si quod res est facere velimus,
maximè commendandi videantur, quoniam in
Ægypto magni fiant ex iis redditus.

Dod. gloriatur Sycomori ramum cum fructu
ac foliis ad se misisse Cortusum, quod nobis sar
e non sit verisimile. Nam quomodo iam in fructi
bus ac foliis onustum accipere potuerit, fatemur
nos neutiquam intelligere, cum iam prius ex
Theophr. Plin. & aliis atque ab ipso adeo Alpino
teste oculo didicerimus, fructus caudici ad na
sci, minimèque ramis. Propius igitur consideran
dum fuit ac inspiciendum Dodonæo, quid à Cor
tuso acceperit. Botanici sumus, non planstra vel
cursus, ut truncos feramus pro ramis aut furcu
lis.

Præterea mirari subit eundem in post. sua Hist. *Alter Dod.*
retinere ficticiam illam suam iconem, quam iam *error.*
olim foliis serratis, & ramis fructibus stipatis, et
iamque minoribus iuxta folia, exhibuerat.

Arborem Ægyptiam esse fateatur quidem A
matus, sed in India quoque procerè crescere tra
dit, & sicut ab iis, qui ex Alexandria & India ad
nos sunt reuerfi, acceperit, similem esse Moro.
Multi [addit idem] *Ficum Adams* appellant, quia *Ficum Adams*
in ea Adamum peccasse credunt. At Indiæ Histo
riographi *Ficum Indicum* à Sycomoro diuersam
tradunt, de qua nos paulò post.

Quod de Adamo dictum, etiam Lonicerus re
fert: de quo nihil certi asserere possumus.

Sed Lonic. sicut & Lacuna figuram ficticiam *Lonic. Cy*
Matthioli commentum habent, qui ait, imagi
nem Sycomori sibi à D. Aldroando missam. Ar in
primis comment. pinxerat ex descriptione vel suo
potius cerebello, folio omninò Mori, quam se
cundò in Diosc. editis comm. tanquam ficticiam
reiecit, aliamque substituit, quamque & nos ex
hibemus primo loco: sed valde veremur ne & i
psa aliquid fictici præ se ferat, præsertim cum Al
pini eiconi qui arborem ipsam vidit non respon
deat. Nobis sanè olim Patavii à Pharmacopœo
ad Aquilam pro Sycomoro exhibitum, quale Fi
cui Cypriæ ex Ravvolffii Hist. desumptæ adpingi
seorsim curauimus.

Camer. ad Histor. Matth. Germ. pingit portio
nem ex fig. Matth. decerptam, & alteram Sycomor
i Cypriæ Ravvolffii, quibus addit figuram folii
similis ei quod Gesnero à nobis communica
tum fuit.

Pena & Lob. sibi amicos & studiosiores quos
dam ambulones Monachos qui hanc arbo
rem in Syriam profecti viderint, ita oratione re
præsentasse testantur, similiorem multò Moro,
quàm Ficui: fronde Apocyni aut Mori, & cogni
tu facillimam de fructu, qui caudici, aut imis ra
mis propè alas hæreat, media inter Ficum & Mo
rum constitutione & figura, pusillam Ficum æ
quante, granulorum tamen intus experte. Granu
la etiam carere tradiderunt Veteres: & Alpinus
atque Ravvolffius ipsi qui *admodum idem*
testantur.

At Bellon. contrà, Sycomori fructus plenos
granis, Cechramides, *αρχαίος* Græcis dictis, esse
conceptis verbis testatur, ut ex eius descriptione
paulò antè allata liquet, propter quæ & ingra
tum & odiosum vetustiore exiccaturve fru
ctum esse ait: in quam rem studiosi peregrinan
tes diligentius obseruabunt.

Alpinus tradit fabulosum esse, quod dicit Mat
thiol. truncos ramosque huius arboris nunquam
siccati, ni prius in aquam proiciantur, & moren
tur aliquantulum. Verum istud Matthioli inuen
tum

Synonyma
in *Serra*
serpentia
clara
Sycam.
Ægypt.
Morus
Ægypt.
Ficus Ægypt.
Ficus Pha
raonis.
Gienmez.
Aceris spe
cies.

Bellon. def.
origina.

Ficus Pha
raonis.

Alter Dod.
error.

Ficum Adams

Lonic. Cy
Lacuna
Matth. mor.

Proposita
icones decia
ramur.

Pena & Lob.

Similior
Moro quam
Ficum.

Contrary
fit ad fru
ctus sit gra
nulosus.

Bellon.

Matth. o
reprehensi
on Alpin
condemnat

tum non est, sed ante eum Theoph. & Plin. scripserunt matrem eius stagnis mergi, quod eius licet sit, quæ tamen verba aliter accipiunt & interpretantur, Plinium igitur potius vel Theophrast. reprehendere debuit Alpin. quam Matthiolum, nisi forte Matth. nimium dixerit in eo, quod absque iniectione in aquam nunquam sicari tradiderit: de qua re nihil adhuc nobis ceruconitat.

Illud notandum in Alpini figura à Matth. diuersa Ficus non adherere trunco sine petiolis. Vtra nunc verior sit figura Matth. an Alpini, iudicabunt, qui utramque cum fructibus vident.

Ceterum considerandum an aliquid, cum Sycomoro commune habeat Theueti arbor, quam is in regione Catay nasci refert, quæ Phœtel dicatur, fructum edere magnum, Muxæ Aegyptiæ fructui parem, sed paulò breuiorem: quam ob causam nonnullis Ficum Pharaonis dictam: folium habere Plantaginis, sed paulò spissius: fructus ligno inhaerentes. Arborem octo cubitorum altitudinem vix superare. In qua tamen descriptione quædam à Veterum & Recentiorum descriptione diuersa sunt. Vtramque speciem ab Antiquis traditam agnoscit, additque eam, quæ in Cypro prouenit Ficum syluestrem aut Sycomorum posse vocari Cyprioticam, vt prima species Aegyptiaca aut Pharaonica.

Curtius de Ficu Cypria diuersa tradit. Theophrast. & Plinium eius interpretem solii Tiliæ sed laticioribus atque mollioribus dixisse, ait: radices agere, vt Ficus urbana, crassas & lentas: molli medulla carere: cor autem solidum, minimè putrescens esse: quare materiem præualidam, ac sine lacte: Mespilo similem habere florem: fructum tiliæ magnitudine secundum Theoph. rotundioris tantum, secundum Diosc. Pruni: Guai esse Mespilaceo, dulciore tamen, & Aegyptiæ Fici aut cæterorum omnium generum suauiori. Hac sane eius sunt verba, mutatis tantum modo & casu. Quæ omnia demonstrant Curtium non distinguere Ficum Idæam, de qua Theophrastus, l. 3. c. 17. de ficu Cypria.

Sycamore, Sycamora, Sycamorus, Sycamora, Moroscyon, vel vt Celsus diceret Meroscyon, Ficus Aegyptia. Marcellus putat posse etiam vocari *Sycamora*. vt sit, quali *stula Ficus*, propter saporis ignauiam, quæ sententia iam supra explosa est: nec quenuquam hactenus inter probatos auctores Græcos vidimus qui per o scribat. Sycomorus Hebraicè dici posset *Theena bacha*: & iuxta Marcelli scripturam, *Theena cefluth*: sed Ficus Aegyptia iisdem *Theena mizraim*: Sycomorus Cypria *Theena bacha copher*, vt annotat Lonice. Arab. *Mumeiz, lumeiz, Alumeiz, Gumeiz, Gumeiz, lumeiz, Gumeiz*, vt diuersi diuersimodè scribunt. Alpin. etiam *Gumeiz* habet. Rauuolf. testatur Moris & Arabibus hodierno adhuc retineri nomen *Mumeiz*, vt circa Tripolim, qui & *Wildefeygenbaum*, Germ. vocat. Alii *Aegyptische feygenbaum* aut *Munbeensfeygen*, *Adamo feygen*. It. *Fico d'Egitto, Fico de Adam, Sicomora*. Gal. *des Sicomores, Fiques d'Adam ou d'Egypte*. Hisp. *Fuigera de Adam, Figo de Adam*. Boh. *Moruffe*.

Acquisoca Morus. *Sycamore* siue *Morea* Dioscor. ea creditur, quæ Latinis *Morus* dicitur: auctore Gesnero in *Ital. G. topio*, in *Vortumno*, & *Rob. Const. in Lex. Syriaca*. Hipp. vt vult. Bened. Curt. nisi mendam sit Pomum Sycaminon, Aëtio seuctus Sycamina & Sycomora. Est & Sycaminos, siue Sy-

comorus, Diosc. *συκαμινος*, aliquibus etiam *συκαμινος*. Theoph. Sycaminus Aegyptia. Sycaminifolio Ficus Cypria Dioscoridi: quibusdam Sycomori genus: Rauuolfius eius iconem proposuit, quam exhibemus. Dalechampi existimat Ficum Cypriam Diosc. & Theoph. esse arborem Sebesten quæ Myxa fert. Sycamina & Sycomora dicuntur de Rubi Moris, vt videre est ex Curtio & D. Hieronymo, vt suo dicitur loco. Scribit Amicus eos toto errare cælo, qui Sycomorum existimant esse Ficum agrestem in parietibus frequentem. Sycomorus non est eadem cum Fico Aegyptia, vt malè verit Gaza, Plinio suffragando. In Italia malè olim dicebatur arbor Azidaracht. Lotum inquit Anatus, Cerasum hyemale appellare solent quam non desint eorum aliqui, qui Sycomorum vocent: sed falsè. Nobis videntur loco citato multa conuenire, cum Lauto-ceraso, vt ibidem à nobis demonstratur. Acerem nunquam & maiorem à quibusdam malè vocari Sycomorum dicitur alibi. Gesn. scribit Arborem Iudæ quibusdam dici Sycomorum.

Nascitur plurima in Caria, Rhodo, locisque non multi Triticis feracibus, vbi prouentu fecundo restibilibus iuuamentum adfert cum annonæ caritas premit. Diosc. Circa Tripolim copiosè prouenire ambas species Rauuolf. refert. Item ad Turcarum monumenta in lustratione montis Libani. Prouenit & Alpino teste in arenosis sterilibusque Aegypti locis, citò crescit, diuissimèque, quod mirum videtur, viuit. Quædam Sycomorus in Materea visitur in cuius trunci cauitate credunt virginem beatissimam iram Herodis Hierosolymam fugientem, Christum seruatore nostrum adhuc puerulum occultasse. Abundat ea Syria, nec reperitur in Italia, si Anguil. credimus. Authore Bellon. locus vbi Christus maledixit Sycomoro, est in Bethania: is dixit sibi visas in Palestina non longè à Carbascara vbi erant diuersaturi, in planitie ordine dispositas quo disponuntur iuglandes nostrates. Item alibi scribit: Incolæ Cari quia vexantur ardore Solis coguntur umbras quærere arborum virentium, ac idè colunt Sycomoros multis in locis & plateis.

Quidam, vt annotant Aduers. frustra sunt conati Italiz Hispanizque tum Europæ, tum Indicæ in quibusnam facere: nam ne germinauit quidem: tamen in syluis Syriacis per familiarem esse, vel Propheta testatur Amos, qui se opihonem dicebat, & legere solitum Sycomora illic aut locis vicinis: nec pauci sunt hodiè, qui eandem inibi illuc peregrinati viderunt. Cypria solum natale & ipsa specialiùs insinuat. In Iudæa nasci abundè sacre testantur literæ. Cautum est, auctore Vlpiano I. C. cum de extraord. criminibus differit. Ne quis Sycomorum per Aegyptum excidat. Hæc autem maximè in Nili aggeribus plantata hos suis radicibus colligit, per quos Nili incrementa dispensantur & coarctantur.

Pomum Sycomori tradente Diosc. alio vtile est, sed perquam exiguum præbet alimentum, stomachoque aduersatur. Lachryma eius vim habet emolliendi, vulnera conglutinandi, & ea discutendi, quæ ægrè maturantur. Bibitur etiam, nec non & illinitur contra serpentium morsus, in scirrhum induratos lienes stomachi dolores atque perfrictiones, (scilicet.) Celenter verò teredinem sentit.

Fructus Sycomori, inquit Gal. nullam habet acrimoniam: exigua tamen dulcedinis est parti-

Ficus Syriaca.

Sequeffen. Rubi Moris.

Ficus agrestis. Ficus Aegyptia.

Azidaracht.

Lauracera. Acer minus. Arbor Iuda. Locus.

Cautum. Cypria solum natale. In Iudæa nasci abundè.

Vires & v. lachryma.

Serpentium morsus. Lienis scirrhosus. Stomachi dolores.

Tempo-
ram.

ceps, estque facultate, ut Mora, humidior, quodammodo ac frigidior. Quin potius in medio Mororum ac Ficuum iure quis ipsum collocant, indeque nomen ipsi arbitror esse positum. Et in 14. meth. K. T. in curatione tumoris ex crasso vaporosoque spiritu, mirum in modum commendat Emplastrum *Syl. Sycomori*, cuius descriptio est apud Paulum Aeginetam.

Ardor Ro-
machi cum
febre.

Athen. Sycomori fructum probè maturum, odoratum, ac esu iucundum dicit. Eundem ob lenem refrigerandi vim, eorum quos febris vrit stomacho inpositum cum rosaceo, non parum aridorem agrotantium mitigare.

Paulus de fructu & lachryma eadem tradit quæ Diosc.

Adversus
serpentes
Dysenteria
Pani &
tumores
Fulvora.
Caput do-
lor & au-
ditum.

Succus Mori Aegyptiæ & Cypriæ, ut tradit Plin. aduersator venenis serpentium, prodest dysentericis, discutit panos, omnesque collectiones: vulnera conglutinat, capitis dolores sedat, item aurium: splenis bibitur. Illinitur & contra perfrictiones. Idem Plin. fructum prædulcem dicit: Et Cyprio suauitatem Fici tribuit.

Scamma
in Syllam.

At Bellon. vti iam prius monuimus ingratum potius dicit, nec maxime expectandum, fortè quoddam illa dulcidine sensum non excites, eademque fastidio magis quam nouæ voluptatis titillatione edentes impleat, adeoque inertis saporis esse videatur. Vt in hunc sensum trahendum videatur quod Plutarchus de Sylla & ab eo obsessis Atheniensibus ait: qui intra vibem clausi, & muris hominis signa maledicentes ac irridentes, nunc metellam quasi mulierem appellabant, nunc, hoc scommate impetebant *συκωμωχία* id est, Sylla Sycomorus est potentia maceratus: ignauiore adiuncto alio, hominis ignauiam ingeminatam insinuate volentes.

Sylla Syco-
morus.

Theuetus scribit Fructus Photol siue Ficus Pharaonis præter ceteras dotes ad sedandam sitim & febrium ardentium estus refrigerandos peritiles esse: ac folia arthritidi misce conficere.

Febres.
Sitis
Arthritis.
Nec a
dura.

Vfus ficuum, teste Alpino, in cibo stomacho est noxius, ipsumque laxat, labefactat atque subvertit. Verò Ficus vtiliter comedunt, qui vel innere, vel Sole incaluerint, refrigerationeque opus habent, & humectatione: fructus siquidem hi frigidi temperatè existunt, multumque humidi: alium faciliè lubricant, atque relaxant: tumores omnes calidos atque duros emplastri modo inpositi sanant.

Tempo-
ram.
Aluum la-
nant.
Tumores.

Idem Alp. ait Dioscoridem tradere, succum Sycomori non ignobilem ad pestem usum habere. Necessè est igitur alio loco hoc scribere Dioscor. quàm capite de Sycomoro vel Ficu Cypria, nam hæc verba, huncue verborum sensum apud eum hæcenus non legimus, qui Sycomori fructum aduersus pestem deprædicet.

Pium Sy-
comoris.

Fic & vinum è Sycomoris (*συκωμωχία* dictum) eodem modo quo Catorchites, de quo cap. de Ficu: sed in acetum acre degenerat, quoniam non ita præualeat vis eorum, ut manantis liquoris dulcedo retineri possit. Dioscor. Eiusdem aceti meminit & Plin. qui postquam de Sycite vino locutus fuisset, subdit: E Cypria Fico & acetum fit præcellens, atque Alexandrinum quoque melius. Per Alexandrinum autem acetum non aliud intelligit, quàm id quod ex Sycomoro paratur, quæ Alexandria plurima est, vel ex Diosc. lectione patet.

Plin. illust.

Idem, inquit Rhazes, calidi sunt, ventriculo mali, nauseam excitant, subtilioris naturæ quàm Ficus, cuiusque descendunt. Per Iamien Sycomorum intelligimus apud Rhazem.

Dignum certè notatu, quod D. Augustinus de

diuinitate Dei ad Marcellum libro. 21. capite 4. perscribit. Lignum cuiusdam Ficus Aegyptiæ tradunt, non ut ligna cetera in aquis natæ, sed mergi, & quod est mirabilius eam in imo aliquandiu fuerit, inde ad aquæ superficiem rursus emergere, quando madefactum debuit humoris pondere grauari.

SYCOMORO SIMILIS.

In insula Mayo, (quæ vna est Viridium, graduum quindecim eleuationis poli versus Septentrionem) multæ arbores patulæ & longiusculæ à se inuicem distantes conspiciuntur. Similitudinem quandam habent cum Sycomoro, foliis vestiuntur paulò minoribus quàm Ficus: fructus feruntur Ficibus adsimiles, paruos, luteos, sine granulis aut semine. Trunco, ramis, cortice, fructu, succo lacteo & foliorum acrimonia planè similes sunt Ficibus. Fructus earum nunquam ad perfectam maturitatem peruenit. Arbor est admodum fructifera, ut haud faciliè inueniatur absque fructu. Non prouenit ex semine seu fructu, sed ex surculis aut taleis in terram depectis, ut Mori nostrates. Lin-schottanus.

Locus.

Descriptio
Folia.
Fructus.

FICVS. CAP. LVI.



Chamaeficus.



Descriptio
Morus Syco-
mori, hæc
Ficum familiæ
nexu post se
trahit. Huius
caudex licet sit
vbi grandescat
& contortus vi-
deatur, parum
tamen est fir-
mus, ut qui tum
virgineo, lxiui
tamen cortice,
inferne cinera-
ceo, in ramulis
viridi sit vesti-
tus, cum ligni
parum, medullæ
verdè fungosæ
plurimum obit-
neat. Materie
namque constat
molli, rara, am-
pla intus cauita-
te, cuius inana
crassa fungosæ-
que medulla, si-
cut in Sambuco
ferè, repletum
est. Ipsa alioqui
arbor mediocri
Sambuci magni-
tudinem nonnū-
quam superat,
pluresq; ab vna
eademque radi-
ce immitit stolo-
nes crassitudine
variantes & pro-
ceritate. Radi-
cibus intitur
multis, longis,
firmis, lætis, e-
uulsu contuma-
cibus, multis ca-
pillamentis &
bratis, coloro fla-

nis atque Rutæ radicibus similibus, maioribus tamen multò, ut Cordus annotat: Abundant cortices sicut & folia adeoque fructus ipsi nondum maturi lacteo copiosoque satis succo, glutinoso, odore ad Rutam accedente, quemadmodum & reliquæ eius partes, sapore subacri, qui tamen in fructu paulatim in dulcem excoquitur succum. Folia conspicua sunt latitudinis, crassa, in lacinias plerumque quinas profundas diuisa, minus acutata, quam Platani, aspera, pediculo mediocriter longo, qui abruptis lac fundit. Flores, ut omnes hæcenus tradiderunt, non fert, sed statim parua fructuum rudimenta, quos *grossulos* aut *grossos* Latini vocant, Piso aut Fabæ æqualia, ea paulatim increseunt, donec Piri mediocris figuræ & magnitudinem consequantur. Cum ad mediam magnitudinem peruenerint, intra se flores [quod fortasse miretis] concipit figura confertis staminibus similes, colore in candido purpurascens, vndique è carne exeuntes, atque ad mediam fructus cauitatem se dirigentes: quam florum observationem atque descriptionem primò Cordo diligentissimo naturæ botanicæ vestigatori acceptam referimus, ac nos ipsi aliquando rem ita se habere, obseruauimus. Ut in hac planta, duo spectanda veluti miracula euenire naturæ studiofis obseruandum sit: vnum, florem intra fructum recondi: alterum, maturitatis causam ipsum fructum meditari, interuentu caprificationis, de qua infra.

Fructus ex surculis, Piniformes nascuntur, basi latiore cælum spectante, pulposi & molles, virides, sed viroris quodammodo obsoleti, aut ex viridi rubentes, fusciue, quidam etiam per maturitatem ad flauum inclinantes, melleæ dulcedinis, carne pallida aut subrubea, innumeris granis lacteolis quæ *κρυχταίδια* vocant respersa, ex quibus seminibus nihil producit, autore Camerario odorem etiam spargit haud inuicundum, sibiq; peculiarem.

Est & humilis, sesquicubitalis altitudinis in ceteris priori similis: *Chamaeficus* vocant.

Videntur sanè auctores, cum Philosophi & Geoponici, & in vniuersum naturæ plantarum consulti Scriptores, humanitatis item cultores, quos vocant, ac ipsi aded Poetæ de hac planta veluti certatim ingenii sui dotes posteritati reliquisse, ut vnde ritè ordiaris, vel non ordiaris eorum placita proposituro dubitare facilius sit, quàm decernere. Conandum tamen, ne hæc Autorum multitudo materiarque ceu messis & *ἀντρία*, in ipso narrationis procinctu hæitationem atque ipsam adeò *ἀντρία* peperisse videatur. *Sint igitur veluti περὶ ἀντρίας quædam Poetarum signenta.*

Figunt hi Syceam aliquem è Titanibus fuisse, quem quum Iupiter infectaretur, Terra mater suæ prolis miserta, intra se occultit: ac in eius gratiam in Syceam arborem, hoc est Ficum commutauit. In cuius rei memoriam, vbi in Sicilia Syceæ nomen inditum volunt. Sic ipsa antiquitas non potuit alio magis munere ipsam plantam commendare, quàm ipsius à suis Diis origine.

Lacedæmonios Sosibius tradit, Dionysium colere Syriten cognomento, Milichius etiam dicitur quandoque: nam Milicha pro Ficus usurpari animaduertimus, & Melichen pro ipsa planta.

Apud Naxios certè simulachrorum facies nunc vitigineæ conformatur, nunc Ficulnea, prout vel Bacchus dicitur, vel Milichius, ut testantur Athen. & Cæli Rhod. Alii de eius inuentione aliter arbitrantur, ut tamen semper ad Deos suos refe-

Locum vbi primò inuenta vi sique fuit, Greci *Σύκων* vocant, & Athenienses *ἱερὴ ἰσὴν σύκων*, Ficum sacrum vocant (& hinc fructus Hegetoria dictus, quæ Eleusinem ducit, in qua Phycalum, angusti agelli, iuxta Marathonem, dominum, Ceterem apud Cephisum hospitio benignissimè recepisse ferunt. In cuius gratiam, & accepti beneficii non immemor, illum surculo ficulneo donauit, qui primò in Attica coaluerit. In cuius rei memoriam, ad eius tumulum præclarum stat eelogium, omnia referente Pausania, quod ex Græco ita conuertit Calderinus:

*Hic situs est Heras, Ceterem qui in recta recepit
Phycalæ: hinc quondam primò ea dulcia poma
Monstrant, Ficus nomen dixere priores,
Phycalum æternos inde sortitus honores.*

Sed utiliora sectemur, ipsam naturam eius propriis contemplantes.

Theoph. sparsim Ficus meminit, quæ tamen vox apud eundem anceps & multiplex est, & non antè diuersas Ficos differentias, loco, facie, aut quauis alia nota differentes complectitur. Sed tales etiam, quæ nihil minus ferè, quàm Ficum representant, ut ex ipsiusmet verbis ac descriptionibus colligere est.

De Ficu autem simpliciter dicta, eiusque fructificatione, implicata sanè, præsertim rem ipsam non cognitam habenti, recessione agit, quam tamen facilius intelliget qui totum eiusdem variationis decursum perlegerit causasque diligenter perpenderit ex cap. i. lib. 5. caus. & diuersis eiusdem operis locis. Nos rem paucis ex nostra & summi Scaligeri obseruatione sic explicabimus.

Tria Ficum genera fert Ficus. Vnum valde præcox quod idcirco vocant Greci *πρόκοκκον*, quasi præcox, præcurforem, præcoquum Gaza. Atque is quidem edendo est: *Bala* vocant Veneti: *Vascones El rones*: Colum. communi voce, *priorem fructum*: Plin. *præcozes*. Aliud genus postea prodit, cuius duæ sunt species: vna quæ maturatur, Ficum dicimus, Greci *σύν*: altera quæ semper cruda est, & prius cadit, quàm absoluitur: vocaturque Plinio *aborsum*. Alio nomine & Grossus dicitur. Greci, quia referunt indomita natura sua Caprifici fructum, eadem qua illum donantur appellatione: *ἐλαυδης* dicunt, cum quibus apud Theoph. *ἱερὴ ἰσὴν* sunt, ex sententia Scaligeri. *Ὀλυνθος* verò propriè est *σύνων ἰσὴν* & *ἰσὴν* in *πρώτῳ* in siue *πρώτῳ*, Ficus immatura, Latinis hic vel hæc Grossus: efferturque propriè de Fico domestica vox vtrique tam Græca quàm Latina simpliciter: alioqui cum adiectione, ut grossi Caprifici, *πρὸς ἀγέλας συνῆς ἐλαυδης*. Tamen plerumque confundunt Authores differentiam, indifferenterque ab ipsis usurpantur *ἱερὴ ἰσὴν* & *σύν* qui & *ἱερὴ ἰσὴν* dicuntur, ut multis testimoniis confirmat Constantin. Lex. Alioqui *ἐλαυδης*, etiam ficum syluestrem, *ἀγέλας ὀλυνθός*, Lat. Caprificum apud Authores significat: quæ nominum & vocum confusio magnam huic historię peperit obscuritatem, quam nos partim iam dictis, partim licendis pro virili discussisse speramus. Ipse verò etiam Theophr. inter Ficum syluestrem & Caprificum manifestè distinguit in Histor. 2. quando ait: *ἡ ἀγέλας ἡ ἀγρία συνῆ &c.* Ceterum tidem grossi, si scalpantur, aliquando matureseunt, admissio Sole: quemadmodum è legitimis non pauci manent crudi, neque perficiuntur præuenti frigoribus. Rursus ex Ficubus, quædam Ficos propriè dictos *σύν* tantum ferunt: quædam grossos seu *Ὀλυνθος* tantum: *ἐλαυδης*, qui nihil aliud sunt, quàm Fici immaturi, grossuli dicti, qui ad matu-

*Ficus sacra
Hegetoria.*

Theoph.

*Tria Fi-
cum genera
Prodramas
Bala.*

*Ficus
aborsum
Grossi.*

*Ὀλυνθί
Grossi ac-
prio.
Ficus im-
matura.*

*Erime.
Erimeas.
Ficus syl-
uestre.*

*Differet Fi-
cum syl-
uestre & Caprifici.*

tatem non pertingunt: Gaza Caprificos pend
 semper vertit, Olynthos nimirum cum ieuvis,
 quos caprificos propriè vocat Theophr. confun-
 dens, non sine plurimorum tamen autoritate
 ut dictum priùs: } quædam vtrumque: quædam
 etiam Prodromos: { præcoquos vocant } quæ-
 dam non. Deinde variant fructum: ut quorundam
 grossi etiam sunt esculenti. Variant item in officio
 seu ferendi modo. Nam nonnullæ constanter
 tales sunt: aliquæ non, sed mutant. Mutant au-
 tem vel quia nunc ferunt esculentum, aliàs non.
 Notat etiam à calore fructuum differentias, & à
 loco natalium, vel situ. Quosdam supra solum,
 quosdam post, quosdam subtus nasci. *Hæc est sum-
 ma* implicatæ Theophrasticæ recensitionis. Quæ
 grossos ferunt [*ἐκ αὐτοῦ γένου*] tres faciunt differen-
 tias: non ferunt nisi grossos: ferunt albos: fe-
 runt esculentos. Aliæ verò quatuor: ferunt Fi-
 cus: ferunt grossos: ferunt nigros: ferunt gros-
 sos tum esculentos tum non esculentos. Ac sanè
 sua naturâ esculenti non sunt grossi, sed sunt vi-
 les per accidens, quoniam nascuntur in ipsis
 culices, de qua re suo loco. Notabis præterea dif-
 ferentiam variationis in ferendo duplicem: vel
 enim non ferunt aliquando, vel non bonos fe-
 runt. Item triplicem differentiam sitis: secun-
 dum frondes, & infra, & ex ramis valdè crassis:
ἐκ τῆς ῥαχίδος καὶ ἐκ τῆς ῥαχίδος. Ergo ex ficibus priùs gignun-
 tur Prodromi, deinde grossi, tum Ficus, vbi &
 temporis differentia consideratur.

Ficorum itaque differentias ex ipsa natura, nascendi modo atque tempore desumpisse Theophrastum apertum est. Ceteri vero Auctores tam Græci, quàm Latini generum Ficorum ingentem recensuerunt numerum, quantum in alia arbore reperire vix sit. Respexerunt autem præter prædicta etiam vel ad diuersitatem figuræ, coloris & magnitudinis: vel ad regionum, in quibus nascuntur, varietatem, vel denique ad Auctores ipsos. M. Cato habet *Africanas, Herculanæ, Saguntinas, hybernas, Telanæ, Telsanæ atque* Plin.] *pediculo longo*: quibus omnibus præmittit *Ficos mariscæ*. His adiecit Varro *Chias, Cæcidicæ & Lydiæ*: Item alibi & *Sabinas* memorat. Columella Ficorum generâ sapore atque habitu distare ait, & præter dicta habet *Linianas, Sulcas, Callistrutias, Topias, Rhodias, Libycas, Hibernas*: omnes etiam biferas & triferas flosculos. Quid autem sibi velit Columella cum hac voce [flosculos] nondum omnino percipimus.

Idem tradit Fici corticem seu librum (ut ille vocat) humidum, succosum & validum esse, & lactis plurimum fundere.

Ficuum differentias varias tradit Plinius libri. 15. c. 18. Inibi enim meminit Ægyptiæ : Cypriæ : Lydiæ : Callistruhiæ : Africanæ : Alexandrinæ , Nigræ : Rhodiæ : Tiburtinæ : Liuiæ : Pompeiæ : Herculanæ : Albiceratæ : Aratiæ albæ : Porphyritidis : Popularis , Chelidonis quam Athenienses Erythromelænam vocant : Serotinæ : Omæ , &c. super quibus Plinium ipsum consulere , haud graue erit.

Meminit Cato Africanarum, Herculæarum, Saguntinarum, Hybernarum & Telhanarum. Sed à Catone, inquit Plinius, appellatam tum Africana, admonet & Aphricæ, ad ingens documentum vſo eo pſo. Namque pernicali odio Carthaginiſ flagnans, nepotúmque ſecuritatis anxius, cùm clamaret omni Senatu Carthaginem delendam, attulit quodam die in Curiam præco- cem ex ea provincia Ficum oſtendéntque Patri- bus. Interrogò vos, inquit, quando hoc po-

mum deſumptum putetis ex arbore? Cùm inter
 omnes recentem eſſe conſilior. Atqui tertium,
 inquit, ante diem ſcītote deceptum Carthagine:
 tam propè à muris habemus hoſtem: itaūque
 ſumptum eſt Punicum tertium bellum, quo Car-
 thago deleta eſt: quanquam Catone anno ſe-
 quente raptō. Quid primum in eo miremur?
 Curam ingenii, an occaſionem fortuitam, cele-
 ritatēque curſus, an vehemenciam viri? Su-
 pra omnia quiddam eſt, quo nihil equidem dūco
 mirabilius, tantam illam urbem, & de terrarum
 orbe per cxx. annos æmulam (urbis æmulam.
 vet.) vnius pomi argumento euerſam: quod
 non Trebia aut Trafymenus, non Cannæ buſto ſa-
 iuſignes Romani nominis perficere potuerunt:
 non caſtra Punica ad tertium lapidem vallata, *Carthago*
 portæque collinæ adequitans ipſe Annibal. *Fici æque-
 mētiſ euerſa.*
 Tò propiùs Carthaginem pomo Cato admo-
 nit: (adiit D. adiri monuit. Vet.)

Prolixus Idem, nec non parum perturbatus in
Historica relatione Ficum duarum Romanis
crarum: Quarum alteram *Rominalem* appellatam
dicit, eò quòd sub ea arbore Lupa Romam, id est
inamnam Romulo & Romo dederit: Alteram ve-
rò *Naniam*, quæ ab augure Atio Navio Romæ
in comitio quidem nata: sed ibi spontè nata, vel
illuc spontè transisse credebatur.

Quidam existimant Ruminalem Ficum dictam *Ruminalem*
quod sub ea pecudes æstatis tempore, frigora cap- *Gude.*
tantes: herbas ruminare consueverunt: An Ta-
citus per ruminalem arborem intellexerit, consi-
derandum: quando quidem longæua fuit arbor. Fi-
cus autem breuissimæ vitæ, Theophrasto autore.
De Ruminali Ficu hæc Ouidius.

Arbor erat, remanent vestigia: quaeque vocatur
Romula nunc Ficus, Rumina Ficus erat.

Cæterum Ficus (Plinio) succos dulcis: odor nul-
lus: [quem reprehendens Scal. malè cum ait ne-
gare Fici odorem: est sanè etiam siccis odor,
quamvis tenuis atque exiguus] folia latissima,
maxima & umbrosissima, & idè supra id po-
mum, eidèque seriùs folium nascitur quàm po-
mum. Insigne proditur in quodam genere Cili-
ciæ, Cypri Hellædis, ficos sub folio, grossos verò
post folium nasci. In Laconico genere maxima
sunt. Inferiore sui parte fertiliores sunt Fici, ma-
risca, Onescitrus tradit in Hircania fertiles admo-
dum esse Ficus, ut sint quæ modios cclxx. singula
ferant prægrandes. Nullo flore exultantur, na-
talèsque pomorum recursus annuos versicolori
nuncio neque Fici neque Caprifici promittunt.
Dixit tamen Plin. loco iam suprà citato præcoces
ficus cum venientium flore maturefcere. Nos
florem, vel flori respondens aut analogum, ex
Cordo prædimus.

Difficile autem fuerit, simul & inutile, vt Cæ-
ſalp. æſtimat Plinianas Ficorum appellationes,
noſtris, hoc eſt, huius ſæculi Italicis accommo-
dare, vt Aphricanas iis, quos vulgò Hetruria, Bru-
ſciottoſ vocat, inter nigraſ: Aratiaſ, ſeu potius
Auratiaſ à colore aureo, inter albaſ iis, quaſ qui-
dam Curceaſ cognominant, inter præcoceſ: nam
poſt groſſoſ primæ maturantur.

Diosc. prædictarum differentiarum nullas nomine tenus tradit, sed αἰξον, hoc est, Ficorum in genere, αἰξας αὐτῶν, Ficus sylvestris, & ὄκυνος Ficus fyl-
 λειρα, Grofforum, inquam, quæ à nonnullis Erinci nominantur, vires tradit.

De Ficu inter alia habet Athenæus lib.iii. Di-
pnoſoph.cap.3. Nulli quicquam concederem in
ſermonibus ad Ficum pertinentibus, etiamſi ſu-
ſpendi oporteret, quoniam Ficubus nūrum in mo-
dum

*Crafts fine
Dyestuffs.*

Cake!

Ficini dif-
ferentia
romani Va-
romani CXC
LXXX.

Differential Flows.

No. 10.

Historia de
Cacome y
Fico Car-
thaginensi.

Carthago
Fici argenteo-
rubrae cultus.

Fire Ramen
culs.

Ficus Rho-
smunda.

Ficus N...

**Ruminant
Food:**

Plin. nat:
Scaliger 1
repr.

Car supra
sonne fides
magistrat

Electronic
of

Answer:

Caspases

Brusciola
ficus.
Auratis.
Cucur.
Dischor.
Ficus.

12 *Ficus glauca*
Ardisia cuneata
Grass: *Echinochloa*

dum sum amicus, quare diuine de his quæ mihi
inciderint edisseram. Ficus, o viri amici, simplici
vitæ principium extitit, quod attestari videtur
locus qui ab Atheniensibus sacra ficus nomina-
tur, in quo primùm Ficus inuenta fuit, atque fru-
ctus hinc dictus Hegesia, quia primus ad victum
mansuetum inuentus fuit. Ficuum multa sunt
genera, de quo Antiphanes in Homonymis, Lau-
dans enim agrum Atticum inquit:

*Qualia fert, o Ipponice, ista regio,
Excellens tota quam vniuersum orbem, mel,
Panem, Ficus, Ficus enim, ita me amet Iuppiter,
Abunde gignit.*

Carica. Iltus in Atticis prodidit, vetustum fuisse Caricas
exportare in Attica nascentes, his indigenæ ut
soli fuerent. Cum vero multi furtim adhibere
deprehenderentur, delatores qui apud iudices il-
los accusarent, vocatos principio fuisse Syco-
phantas. Alexis in poetâ:

*Sycophanta nomen proprium viri
Decent, haud inoponitur:
Nam qui foret bonus, & Urbanus, debuit
Indicis Ficus mores approbare suos.
Nam autem flagitiosus cum sic nominent,
Dubitare id cogit, sur id factum sit.*

Alexis illi. Indicis ficibus, inquit, nempe quæ contra le-
gum auctoritatem clanculim asportabantur: mo-
res suos probabant, id est, fidem suam, probita-
tem, integritatem. Philonnestus lib. de Sinin-
thius Rhodus scribit, Sycophantam inde nuncu-
patum fuisse, quod illis temporibus, ficuum mer-
catum, vini, olei, tributa colligerentur, ac porto-
ria, & militarentur qui ea non soluissent, & qui-
bus in administratione Reipub. sumptus fieret,
itaque coactores qui exigent, & eorum pro-
uentum suis rationibus ostenderent, ut credibile
est, appellatos fuisse Sycophantas, ad idque mu-
nus delectos fuisse ciues spectatissimos ac optime
fidei. Laconice ficus meminit Aristophanes in A-
gacolis his verbis:

*Ficus omnes ego seram præter Laconicas.
Insepe namque sunt illa, ac tyrannica:
Nec enim pusilla forent, si animi se pœchem odio non
prosequerentur.*

Ficus quid. Vt nisi plebi odiosa foret ea Ficus, id est, domi-
nandi ratio: Sic Dal explicat. Ficuum scilicet eam
pusillam vocat poeta, quod exigua & humilis
planta sit. Significat & Lacedæmoniorum hos-
tilem animum erga Athenienses, ac eorum domi-
natus crudelitatem, & summum abolendæ popu-
læ potestatis studium. Alexis in Olynthio, cum
Phrygiæ ficus mentionem facit, ait:

*Et diuini cibis, à matre data mihi delicia,
Carica ficus,
Phrygia munus.*

Phibalea f. Phibaleatum Ficuum meminere Comici multi:
quin & Pherecrates in Crapallis:

*Febriçia, o miser, nulla de re felicitas:
Et nam per astatem Phibaleam ficus comede:
Illisque sat læ meridiator.*

Teleclides in Amphistyonibus?

*Quam pulchra Ficus, Phibalea quidem sunt.
Est autem Phibaleos, Atticæ locus.*

Chelidonia Chelidoniæ meminit Epigonus in Branchia:
[Ragcedisone.]

*Deinde panis post aduenis Chelidoniis
Ficibus omnia conferam quadra.*

Chelidonia Andronion, sine Philippus, sine Hegemon in
Georgico, hæc Ficuum genera sic recenset: In pla-
nis & campistris ferere Chelidoniæ Ficus ex-
pedit, Caprificos, Leucercineas, Phibaleas: at quo-

uis loco Oporobasilidas [Monspelhodie vocant
Ficus regias D.] Horum enim generum cuique
sua est utilitas, maxima verò Colōris, & Phory-
niis. Fructuosæ sunt & imprimis viles, bisera, La-
conicæ, Megaricæ, si rigentur. Rhodiorum me-
minit Lynceus in Epistolis, ea comparans quæ
proueniunt Athenis præstantissimæ cum Rho-
diacis. Eius hæc est oratio: Atheniensium [scilicet,
sylvestres ficus] certare de bonitate sic videntur
cum Laconicis Rhodiacis, ut Mora cum Ficibus.
Id ego, non cœnatus, ut Athenis sit operueto
iam gustu ob satietatem, sed ante cœnam, cum
appetentia intacta & nondum occupata est, com-
paratione facta perspexi. At quas in pulchra Ro-
ma Callistruchias vocant, si quemadmodum ego,
Lynceus gustasset, bestia eiusdem nominis longè
fuit perspicacior in huius contentione iudi-
cio, adeo Ficus illa antecellunt omnem quæ in v-
niuerso terrarum orbe generantur. In pretio sunt
& alia Ficuum genera Romæ nascentium, nempe
Chiz, Lintanæ, [scilicet Lintæ vel Lydiæ: amba-
rum meminit Plin.] ex quas Chalcidicas vocant
[Plinio Duracinx à duro Corin D.] & Aphrica-
næ, ut testatur Herodotus Lycius in opere de
Ficibus. Parmeno Byzantius in Iambis, è Cauno,
quod oppidum Æolicum est, laudans, ut excel-
lentes, ait,

*Per longa mari spacia ego accessi, nec tamen ficuum
Cauniarum fascem [scilicet bauli unum] adieci.*

Caunias è Caria ficus celebrari peruiulgatum est.
Toxaliarum ficuum meminerunt Heracleon E-
phesius, & Nicander Thyatirenus, citatis versibus
ex fabula Apollodori Carystii, cuius est titu-
lus, Mendica vetitana.

*Ceterum vill. in adu. dum fuit
Et adu. m. & improb. m. adu. ut me puderet:*

Alia quidem regiones Toxalias ferunt

Ficus mea verò etiam viles.

In Insula Paro eximia gignuntur Ficus, Hæmo-
nias [scilicet æmone, tanquam infectas sanguine: san-
guineas] incolæ nominant: congeneres Lydiis,
quas ob rubrum colorem [Plinio, Lydiæ purpu-
ræ sunt] eodem quoque nomine vocant. Earum
sic meminit Alchylus:

*Paron missam facit, & Ficus illas, & marinam
Vitam. [assiduæ nauigationes.]*

Hæc certè Ficus tantum à reliquis vulgaribus dis-
crepant, quantum apri caro ab alulis porci & vil-
lati pulpa. Leucercineas Ficus species est, illa
fortassis cuius albus est fructus. Eius sic meminit
Hennippus in Iambis:

Sorsim verò è Leucercineas Caricas.

Hæmonax in Glossis Cretensibus genera Fi-
cium enumerat, Amadea, & Nicylea. Philemon

in Atticis vocabulis quædam Ficus Regias voca-
ri tradit, & ab illis regias caricas nominatas fuisse.

Huic idem narrationi addidit maturas Ficus voca-
ri Colytra [fortassis quasi κολυτρά, id est, leues:
sunt enim maturæ Ficus, immaturis seipsis leuior-
es D.] Seleucus in Glossis refert, Glycisiden

quandam vocari, figura perquam similem Fico,
[Præonia Glyciside est fico similis, vel siliquis,
quæ semen continent, vel appendicibus glandi
similibus in radice feminæ. Emendatus locus ex
Plin. & Diosc. D.] à Medicis quoque obseruatum fuisse,
in cibo sumptam, rubra foeminarum profusio

sistere, ac valere contra malum mentis, & insa-
tiationes: id quod Plato Comicus ait in Cleo-
phonte. Pamphilus hybernas Ficus vocari tradit
ab Achivis Cydonia, idque scriptum ab Aristophane
in Glossis Laconicis. Hermippus in Militu-
bus Coraceas Ficus: [tanquam Coruinas: ob ni-

Oporobasil-
das.
Colura.
Phoronia.
Megarica.
Rhodia
Athenienses
Eritæa.

Callistruchias.

Ficuum præstantissimum.

Chiz.
Lintana.
Chalcidica.
Duracina.

Carica.
Toxalia.

Hæmonia.

Lydia.

Amadea.
Nicylea.
Regia.
Colytra.

Glycisida.

Hyberna.

Coracea.

predinero puto D.] eorum quandam speciem vocat his verbis:

Phibaleum potissimum, aut Cōuacearum.

*Charitua
Malia.*

Theop. lib. 1. hist. plant. scribit, Ficus arboristale quoddam genus esse, quale id est, quod Charitiam siue Araceam nuncupant. Hae Athen. Nusquam verò apud Theop. hæc leguntur, (& mutila esse videtur hæc oratio D.) Quam verò ident

Ficus Idæa.

Athen. ex lib. 3. eiusdem auctoris Ficus Idæa adfert descriptionem, & inter Ficus recenset, non huc pertinet, sed aliò, de qua vide cap. de Diospiro.

Præcoces.

De præcocibus Ficus idem Theop. lib. 5. caus. ad hunc modum scribit: Fieni humidus aer & clemens, cum elicitur germinatio, & ea de causa præcoces Ficus: Idem progressus inquit, quasdam Ficus, præcoces fructus gignere, vt Lacopicanæ, & Leucomphalianæ; quasdam minimè. Seleucus in Glossis, Ficus speciem quandam vocari ait, id est, Primariam, quia præcocem fructum pariat antè ceteras.

Primæca.

Bisera.

Ficus bisera meminit Aristophanes in cōticiōnaticibus.

*Pærentium
velut egre.*

Ves, quasi sumperitis Ficum bisera solia.

Aristophanes in Scelerijs:

Iuxta bisera an Erium, infernè est.

Theopompus lib. 50. hist. scribit, Philippi regis principatu, circa Bisalvan, Amphipollin, & Grestoniam Macedoniæ, medio vèrè ficus poma, vitem, vuas, Oleam, quando ipsam florere par est. Olias edidisse, omniaque tunc ex voto succelsisse Philippo. Nōn me fugit, (inquit Athen.) aliis quoque nomenclaturis Ficorum species appellari. Regios, Regios ficos, Cirioceladios, Hyladios, Sarcelaphenos, Lapyrios, Pieridios, Draconias, Leucophias, Melanophias, Creneos, Mylacos, Flauos & tanquam excavatos: syluestres: carne cuti cepidrum simili: amariusculos: obtortos, draconum more: natura nigros, & albos, fontanos: mole instar rotundos: Ascaloniis similes: ob suauitatem detegrandos. D.) Tryphon, lib. 2. hist. plant. de Ficuum appellatione differens, inquit, Dorionem in Georgico narrare, Syceam vnum ex Titanibus, terræ filiam insequente Ionè acceptam à matre fuisse, illamque gnato arborem emisisse, cuius fructu oblectaretur, & aleretur: præterea nominatam ab illo Titane Syceam fuisse Ciliæ ciuitatem: at Pherechens epicus poeta, Heracleotes genere, appellatam fuisse tradit à Syce Oxyli filia. Oxylium enim Orix filium concubitu Hamadryadis sororis genuisse Nucem, Euglandem, Cornum, Oxyam, Aegiton, Vlmum, Vitem, Ficum, quas Hamadryadas omnes vocarunt, illarumque nomine multas arbores nuncupatas fuisse, acideo Hipponactem dixisse:

Regios.

Regios ficos.

Cirioceladios.

Hyladios.

Sarcelaphenos.

Lapyrios.

Pieridios.

Draconias.

Leucophias.

Melanophias.

Creneos.

Mylacos.

Flauos.

Tanquam excavatos.

Syluestres.

Carne cuti cepidrum simili.

Amariusculos.

Obtortos.

Draconum more.

Natura nigros.

& albos.

Fontanos.

Mole instar rotundos.

Ascaloniis similes.

Ob suauitatem detegrandos.

D.)

Tryphon.

lib. 2. hist. plant.

de Ficuum appellatione differens.

inquit.

Dorionem in Georgico narrare.

Syceam vnum ex Titanibus.

terre filiam insequente Ionè acceptam à matre fuisse.

illamque gnato arborem emisisse.

cuius fructu oblectaretur.

& aleretur: præterea nominatam ab illo Titane Syceam fuisse Ciliæ ciuitatem: at Pherechens epicus poeta.

Heracleotes genere.

appellatam fuisse tradit à Syce Oxyli filia.

Oxylium enim Orix filium concubitu Hamadryadis sororis genuisse Nucem.

Euglandem.

Cornum.

Oxyam.

Aegiton.

Vlmum.

Vitem.

Ficum.

quas Hamadryadas omnes vocarunt.

illarumque nomine multas arbores nuncupatas fuisse.

acideo Hipponactem dixisse:

Nigram suam vitis sororem.

Porrò is color nonnullis sanguineus putatur.

Horatius pullam dixit:

Suauique pulla suis ornat arborem.

Coroneas Strabo habet.

quæ eadem videntur cum Coriatis vel Coriaceis Aristoph. antè dictis.

Duricorias & Plautus celebrant:

Ficus nobis attulit, duricorias, præcoces.

Chiam Martialis ob salis viniq; sapore pungentè.

Infanti melimela dato. satiasque mariscas.

Nam mihi qua nonis pungere Chia sapit.

Ex alibi clariùs.

Chia sentis simili Baccho, quam Seria m'fit.

Ipsa merum secum portat. & ipsa sale.

Marisca, teste Curcio, Græcè Glouca. Festo & Macrobio dicitur. Nam Græci magnis & amplis rebus, syllabam Bu, affucti sunt præponere, vt Bu-

pedo, Bulimz. Sunt etenim magnæ, quamobrem inter omnia Ficorum genera, has tantum Senecio commendabat. Nempe is solum grandia appetebat, vt propterea Grandionis nomen sibi assumpserit, autore Seneca. Præ pinguedine verò rumpitur, semperque ostendit. Quod patet eadem poeta.

Danasti, Lupe, rns sub urbe nobis.

Nōn Buleus hanc, nōn marisca.

Ridere.

Marisca etiam morbus est, sic dictus à Fici similitudine, qui idem & Ficus dicitur, de quo Iuuenalis:

— Et podicè seu

Caduntur iunuda medico ridente marisca.

Eadem ratione Græcè etiam *marisca* dicitur. Coctanas, siue, vt alii vocant, Coctana, quæ inter minores numerantur Iuuenalis habet:

— Quo Prunæ & Coctana vento.

Missabantur olim inter Saturnalia Sexenicia, vt se turbinato. Quod declarant Statius hendecasyllabo.

Nusquam turbino conditus ruens

Prunorum globis atque Coctanorum.

In vasculis etiam muti solebant, quorum forma metæ instar erat. Quod disticho comprobatur Martialis:

Hac tibi qua torti venerunt condita meta,

Stimulata ferunt Coctana, Ficum erat.

Fico auctore Hermol. circa Elephantium agrum folia non desinunt. Similiter & in Tylo caduca non sunt. Callistrias & Ficus, & Passarias vocantur. Capitolinus auctor est in Clodio albino. Infinitio Pysctalia vocari quoddam earum genus ab algore, nisi quis male ab Atticæ regionis insula Pysctalia. Sed an Callistrias sint, quæ Plinio frigidissimæ dicuntur, parum constat. Sunt quæ Pysctalia intelligant, quæ recentes non sunt quidem, non tamen siccatæ. Phibalex dictæ quoque Hippocrati. Julius Pollux Chelidonias dicendo, Atticas inquit, intelligimus, quas Lacedæmones Chelidonias appellabant. In Ficorum genere, caricæ peculiari arbore fert Syria, & minores eius generis, quas Coctana appellant. Habentur & Cauniz, omniales M. Crasso in Parthos bellum mouente.

Ficus porphyria.

Callistria.

Passaria.

Pysctalia.

Phibalex.

Attica.

Caricæ.

Coctana.

Cauniz.

In auctione vitarum Luciani, de Epicuro quærit licitator, quibus edulis deleteretur: respondet Mercurius, dulcibus vescitur & mellis, & quædam addit. *τὴν ἰοχάδα.* Subiicit licitator *χάμας ἰοχάδα.*

Sic & Paulus *Carica* pro Ficu anda videtur, superasse, quando scribit, aut *Carica* drach. octo, sameluchi drachma, tritis cum oleo, donec cerati huius spissitudo vitæ: quo loco *Carica* nihil aliud esse videtur, quam quæ *Carica* quoque Græcis dicitur, vel ex doctiss. Dalech. sententia.

Carica.

Apud Cic. 2. de diuin. legimus: Quum M. Crassus exercitum Brundisii imponeret, quemdam in portu Caricæ Cauno aduectas vendentem *Carica* clamitasse, quæ res inferius specialius declarabitur.

Carica in Cauno.

Cauniz ponit sunt ex Caricæ oppidulo, unde nomen Caricæ apud nos, vt aperte conicit Hermol. siue itaque à loco, siue aliunde nomen habeat carica, Græcis & Latinis usurpari constat. Antiochenæ verò Caricæ, quæ & Trophyllos vocant, vt inquit Strabo, ab Antiochia Phrygiæ nomen habent. Omnia hæc [& multa ex superioribus dictis] L. Vitellius in Italiam Tiberi principatu transtulit.

Carica.

Carica.

Antiochia.

Trophyllos.

Plato in legibus & Ficus & Vites quasdam commemorat, quasi nobiles: cuiusmodi nobiles

si

Indole à generoso, vt inquit Aristoteles, differt: fortis illa genera intelligens, quæ dicuntur Aquilides inter Ficos: & racem vt Nicotracos inter riuas: quæ dap Athenis maximè commendabantur, vt racemas Hipponius in Rhodo insula: Thracelinas ad licentiam probari apud Aetiam legitur.

Hactenus Ficorum differentias Veterum, quæ potissimum diligentia persecuti sumus, & notis cum ipsis autoribus illustrauimus. Mirum verò alicui haud immerito videtur, & tot generibus, ne quidem solam appellationem (quod nobis quidem copiosè) remansisse, nisi forte lux originis: neque enim nunc aliter vocamus quam Hispanicis, Maliliensibus, Campanis, & ita de aliis, quæ patrio suo nomine designantur, vt idem iudicium cum Plinio faciendum sit, quamuis euentu contrario, inquit: subiere tot Ficorum nomina: æque genera, vt vel hoc solus æstimantibus appareat, mutatam esse vitam. Annotat tamen Marthiol. plura esse genera in candidantiam & nigrescentium discrimine, sed differentiarum nomina nulla tradit. Quidam etiam, inquit, Fici faciem representant, alii sessiles sunt, alii verò inter hos necti.

Differunt etiam colore Ficus, quippe quiddam aliæ albe, alie nigrae, alie purpureæ, alie vides, alie subrose, alie pallidæ, & alie variegatæ colore spectantur. Celebrantur in Hetruria Pisani, Brigiotti, Grascelli, Balignanesi & Perugini. Anguil. ait multas esse Ficuum species, sed omnes notas esse in Italia: Nos etiam aliquot differentias tam in Prouincia & Gallia Narbonensi, quam in Italia obseruamus: vt magnas illas quales Geneuæ nascuntur, & in horto Scutgardiano, suntque multo Maliliensibus & Prouincialibus maiores, hæc tamen nobis sapidiore videntur. Vulgatæ ubique fore notæ sunt. At parua illæ luteæ, quas & in Italia & in Prouincia celebrant, sine dubio reliquis omnibus excellunt.

Caricæ seu Ficæ hodie tres species ad nos in Germaniam communiter importantur, vt annotat Cordus: si modò specie differant. Plantæ in sparteis corbibus, quas Germ. Boerfseigen vocant. Aliæ etiam in cistis Laurinis foliis commixtæ, quas à foliis Laubseigen appellant. Tertium genus ex Prouincia adfertur, quas Malilienses dicunt, in infantis & turbinatis sparteis corbibus: hæc parua quidem sunt, sed suavitate præstantes: Marfilische feigen dictæ. Sed hodie etiam, quia nostris succibus nihil ingustatum volumus, etiam magnæ illæ purpureæ. Genuenses dictæ à leuioribus institutoribus in Germaniam importantur.

Porro succus maturefcentibus lactis: percoctis, mellis: tactus omnibus mollis, sed maturis. Lac, inquit Macrobius, propriè ficorum dicitur. Ficus itaque non Pomum facit: à Pomis apud idoneos autores Afranium Ciceronemque repetas. Senescunt, ficus in arbore, antequam destillant gummi modo lachrymam [vt Plin. scribit] siccatæque: tales *ixadæ* dicuntur Græcis non minus quam *Ficus passa*. Athenienses *γάρ* vocant eam folliculos, vt Varro glumas.

Perierunt ex Veteribus, qui Ficum nunquam ullum perire asserere non dubitauerunt, quod Marcellus non nisi amaritudine, & malo materis eius habitu, fieri posse autumat. Quæ enim humorem sunt, inquit ille, iniurias cæcillitas non sentit, quales phocæarum & hyemum pelles, & in arboribus aliquæ etiam alie traduntur. Debebat ob has causas nocentibus sibi repugnare Tom. I.

Ficus, nec minus, quam in natura, in scriptore hoc integra & incolumis seruari, & quæ voluptate sinicatem & mentis nostras, quotannis auget, æqua felicitate medicinam etiam instruat. Securus nimirum perdoctus ille Marcellus de quæstione *ixadæ*, sollicitè *ixadæ* perquirat, cum illud [vt] si nostro iudicio aliquid tribuendum, æquum sit ratum & indubitatum. Quod si verò maxime res ita se haberet, quem in lumen materis habitum quæso tribuet Luro tantoperè omni suo aduersus ictus fulmineos celebratæ, eoque etiam ipsis aded Imperatoribus orbis sacre? In qua tamen re si quid ariolandum, rationabilis forte dicemus proceras arbores fulminibus esse opportuniore, manifestiusque in his noxam impressam apparere, quam in minoribus, quales Ficus, ut rationem illam Physicis celebratam & doctis notam nuntiauerimus.

Hæc tamen verum in sacris paginis & à celebratis Ecclesiæ doctoribus imprimis commendatum Ficum. Apud Hieremiam cap. 4. ostendit mihi dominus &c: Duo Calathi pleni ficis &c: Calathus vnus Ficus bonas habebat nimis, (inquit Hieron.) vt solent Ficus esse prima temporis (videtur intelligere præcoces) & Calathus vnus ficus habebat malas nimis, quæ comedi non poterant, ed quiddam male sint. &c: Quidam interpretantur in lege & Euangelio; Synagoga & Ecclesia &c:

Talia multa habent D. Hieron. & D. Augustinus aliique Ecclesiæ Patres, quod mouisse tantum hoc loco sit satis, aliquando publicanda.

Est & Ficus tessera abundantis lactis, vt Gorgopius annotat in Vertumno. Lac enim propriè, inquit Macrobius, ficorum dicitur: quod etiam sentit Quidius Pastor. 2.

An tibi dum Lactens hærebit in arbore ficus.

Ficum autem à fecunditate dictam volunt, autoribus Varro & Quintil. ne Græcis omnia concedere videamur.

His *Σύν*, & *Σύν* ipse (Mæuius & Sycon fructum Latine dicit) fructus & *οὐκ ἔστι*, quoniam per hanc vocem nouellam serè Ficum intelligant, autore Iul. Polluce: nam *ixadæ* aridæ Fici sunt, aut Caricæ interdum. Inuenias apud Græcos *ixadæ* recentes & veteres quoque dici. Ipsa arbor *Σύν* & *Σύν*, prima longa. Attici Ficum ipsam *ixadæ* quoque nominant, vt dictum. Arbor Hebræis *Theenab* Hieron. 1. Fici aridæ Lat. *Carica*, Hebræis *Deselab*, *Deselab*, *Theenab*, *Deselim*, teste Trag. vid. 1. Samuel. 30. & 2. Reg. 10. Cordus reprehendit Marcellum quod Caricæ vocem male in Diosc. contextum posuerit: habere enim Caricas ficus suum peculiare genus, vt ex Plin. & Hermol. colligere est. Germ. *Feig*, *Feigenbaum*. Belg. *Dyghen*, *Dyghenboom*. Gal. *Figuier*. It. *Fichi*. Hisp. *Higuera*, *Higuera*. Angl. *Figtree*. Boh. *Füßte*, *pei*, Arab. *Sin*, *Sin*, *Sin*. Caricæ vulgè *ficæ*, *Ficus passa*: *ixadæ*, *ixadæ* dum Epag. *ixadæ* *ixadæ* Eustath. Ger. *Dürre feigen*. Belg. *Dode*, *schade*. Gal. *Figues seches*, *Figues de Carisme*. It. *Fico di Quadragesima*. Ouid. Pastor.

Quid vult. Palma sibi, rugosaque Carica dicit.

Habetur quoque apud Hip. Caricum medicamentum duplex, aridum & liquidum, sed neutrum Caricas recipit, neque à Caricis nomen habet, sed à Carum gente, quibus erat in multo usu, dictum fuisse tradunt Grollius, quem & immaturum fructum vocari diximus *ixadæ*, *ixadæ*, *ixadæ*, Ameriz. Germ. *Grüne feigen*, *Dünzeige feigen*, *Groene Dyghen* / die noch niet ripe zijn. Gal. *Figue qui n'est pas en terre meure*. It. *il rono*, *bolo*.

Veneris. Hisp. *Higo* arbo maduro.

Chamaeficus.
Humilis
ficus.

Eius Na-
ma.

Folium
Trium.

Adagium.

Frondes.

Ramus

Crade.

Frondes.

Folliculus

Grana.

Frumentum

Proverbia
de ficu.

Ficus atra.

Eiusdem arboris nominibus insignitur *Chamaeficus* dicta cum eius fructibus, quæ & humilis ficus, quam in ollis & hortulis pensilibus alunt. An vero à vulgata differat aliter, quam magnitudine, nondum asserimus. Doctiss. Medicus Chiffletius, apud quem in horto Vesuntii vidimus (& apud D. Abbatem de pulchro fonte) *Ficum nanum* vocat. Denique tanta fuit apud Antiquos commendatione Ficus, ut & secundum locum habuerit à vite: Et eius partes omnes peculiaribus sint nominibus designatæ. Ipsum folium *Trium* præci Græci vocarunt propter eius asperitatem quo convulso anguilla piscis facile detineri queat: unde adagium, *τὸ βίβω τὴν ἑχιδνάν*, id est, Folio ficulno anguillam, nempe tenes, dirigendum in versutum aut versatilem hominem, quem alius archore nudo retinet atque constringit. Sunt qui existiment frondes etiam ficosum ea voce insigniri. Ficulnus ramus, *καδὺς*, & *καδὺς* *Θ.* Ponni fundū umbilicum. *ἡ δὲ ἑστὶν ἡ τῶν πυλῶν τὰ ἀμφὶ αὐτῶν*. Folliculus Fici, sicuti frumenti Varroni *Grana* dicitur. Granum Ficarum, Frumentum Plinio, *καρπὸς* Theoph. & Gal. Germanis quibdam *Lysen* dicuntur, quasi pediculi, à sonitu, quem eundem cum pediculis pressi efficiunt.

Produntur & proverbia de Ficu. *Ficum post piscem: Legumina post carnem*: alii tamen pro Ficu, Nocem dicunt, *Gallinaceos amantibus ficum ne ferito, Assentari nescio, Ficum, Ficum: panem, panem dico.*

Ficum atram infelicem pontifices putabant, felicem, albam: teste Hermolao.

Sed antequam reliquam historiam pertexamus de *Caprifico* prius specialius quadam tradenda.

DE CAPRIFICO.

Quomodo
differant
Caprifico
et
Sylvestris.

Caprificum, sylvestrem Ficum tradunt, quamvis [inquit Cam.] non immerito docti quidam discrimen faciant inter Ficum sylv. & Caprificum. Nos ita censemus. Sylvestrem esse incultam, & vel natura, vel neglectu sterilem, aut eatenus solum, quatenus fructum non perficiat: Caprificum vero eam, quæ Caprificatur, quæ tamen & ipsa sylvestris sit, ita ut reipsa quidem conveniant, sed ratione tantum fructus & cultus differant. Quid? quod ne à satius quoque specie differat Caprificus vel ficus, sylv. quodd ex grano satius nascatur Caprificus: ut dicetur in progressu. Hæc verò sententia distinctionis Caprifici, à ficu sylvestri ipsius etiam Theophr. est, qui in 2. de caus. c. 1. de Caprificatione & Caprifico [quam *ἰσχυρὴ* vocat, & Gaza semper Caprificum reddit] locutus ait: esse verò quadam loca quæ Caprificatione non egeant, absurdum non est, quippe quæ temperiem idoneam (*σωφροσύνη*) habeant tam alimenti quam ætis. At humorem totum hoc genus (sub eorum quæ caprificatione egeant) nimirum esse, vel ex ipsis sylvestribus, (*ἡ γὰρ αὐτὴ τὴν ἀγρίαν*: ex ipsis erraticis vertit Gaza) constat. Cruditas (*ἀσβλία*) enim illa non nisi ea de causa sit, [nempe ob alimentum copiam] & eas ergo solent caprificare, ut possint permanere. Vides ut *ἡ γὰρ αὐτὴ τὴν ἀγρίαν* intelligat incultas ficos non autem Caprificos: Idem dicit *ἡ γὰρ αὐτὴ τὴν ἀγρίαν*. Quæ sententia & doctissimi Scaligeri est & verò Theophrastum quoque ita sentire statuit, quamvis eandem *ἡ γὰρ αὐτὴ τὴν ἀγρίαν* in legentibus *ἡ γὰρ αὐτὴ τὴν ἀγρίαν* quæque

videatur appellare: ut non temerè Scaliger, quoniam igitur modo *ἡ γὰρ αὐτὴ τὴν ἀγρίαν*.

Porro Caprificum longè validiorem tradunt, quam ficum: nullis ferè vitis obnoxiam, ut etiam fico insita grossos suas tueri credatur: materie flexibili: nunquam ut in ea maturefcere pomum.

Cordus Caprificum urbane per omnia similem dicit: incultiorem tamen, duriorémque: grossos ferè, quales urbana, sed nunquam maturefcetes: hquore manare, quam situa aciore, cum gustu, quàm odore: De ea Theophrast. passim multa: ex quibus præcipua hæc sunt: *ἡ γὰρ αὐτὴ τὴν ἀγρίαν*, Caprificus seu ficus sylvestris incunte vere germinat, montibus propria est, fructus suos non maturat nec perficit, sed ex putredine in iis parvi gignuntur culices, qui alimenta gratiã aduolantes alios ficos appetunt, & crebra morfu aperunt: hinc sit ut superfluo humore absumpto, ad aperitque fructu facilius Solis admittatur vis, unde melius & à Sole, & à propria natura vegetante percoquantur: quod nūc fiat, grossi eorum decidunt, nec ad maturitatem perveniunt. Atque hæc ipsa quoque ratio cur culices gignantur: nempe quia fructus maturari nequeunt: Ergo interuentu putredinis culices in iis gigni, ut & in ceteris putrescentibus solent. In hunc finem caprifici rami cum ipsis Olynthis ficos appenduntur, ut culicum opera ficus tueantur, ne decidunt, sed maturentur, eo quo diximus modo. Aut etiam iuxta ficos caprificos conferunt, ut culices inde prognati promptè & facile aduolare & ingredi queant. In summo autem ficeti limite conferendæ, unde culices ad ficos secundo vêtō deferri queant. In Italia autem non egent ea Caprificatione, quia spontè ficos maturantur.

Laudantur potissimum Caprifici nigri, & locis ortis saxosis, quod tales per multa contineant grana. Culicibus gignendis aptiores habentur rubri, versicolores & robusti: quæ minus aptæ, albæ sunt & imbecilles. Vbi plurimus est pulvis, ibi & plurimæ validissimæque Caprifici ex-cunt.

Hæc ferè summa est historiz Theophrasti de Caprifico & Caprificatione (quamvis multus sit & copiosus, in causarum eius pernestigatione, eamque passim inculcet.) quam & Plin. potestegantè tradidit his verbis: Caprificus vocatur & sylvestri genere ficus, nunquam maturefcens, sed quod ipsa non habet, aliis tribuens: quoniam est naturalis transitus, atque, ex putrescentibus identidem generatur aliquid. Ergo culices patit: hi fraudati alimento in matre, putri eius tæbe, ad coactam volant: moriūque ficum crebro, hoc est, avidiore pastu aperientes ora eorum, atque ita penetrantes, intus Solem primò secum inducunt, cerealesque (secundas) auras immittunt foribus apertis. Mox lacteum humorem, hoc est, ipsam pomum, absumunt: quod sit & spontè, (naturæ vi, sed longiore temporis spatio) Ideoque Ficus caprificus permittitur (permiscetur D.) ad rationem venti, ut flatus euolantes in ficos ferat. Inde repertum, ut illarum quoque aliunde, & inter se colligatæ iungerentur Fico: quod in macro solo & aquilonio non desideratur: quoniam spontè arebant loci situ, rimisque eadem, quæ culicum opera, causa per hinc: nec non ubi multus pulvis, quod euenit maximè frequentia via appolita. Namque & pulvis vis siccandi, succumque lactis absorbendi: quæ ratio pulvis & caprificatione hoc quoque præstat, ne decidunt, absumpto humore tæbeo, & cum quadam fragilitate ponderoso.

Et

Ex dictis itaque patet caprificationem nihil aliud esse quam medicationem quandam (sic libeat ex Plin. cit. verbis dicere) quā putrescente caprifici fructu culices geniti in vrbana fructus euolant , fructūque morſu aperientes, eiufdem maturitatem promouent & accelerant. Ad aperta namque media Ficu ſuperfluam depaſcunt culices humiditatem , vbi ſubtraſto quod exuberabat, à calore natiuo reliquum poſſit excoqui : deinde vt iuuari queat hic calor ab externo , cui patere queat aditus per apertionem illam, ad expeditio- rem, perfectiorēque concoctionem & matura- tionem. Caprificari (inquit Sipontinus) eſt adhi- bere caprifico , ne fructus propinquæ Ficus ante maturitatem decidant, prouidere.

Non potuit, imò nec debuit tantus Philoſo- phus Scaliger, quin ſuum acumen in hoc tam in- ligni naturæ opere (propemodum dixerimus mi- raculo) exerceret, quod vt paſſim præſtitit in ſuis in Theoph. eduiſ doctiſſimis & quouis æmulo ſuperioribus commentariis, ita his poſſiſſimum verbis ſuccinctis rem ſanè quā ſubtiliſſimè con- cludit. Propoſuit natura Caprifici fructum per- ſciendum, rem vilem admodum: non poteſt: ver- tit operam illam plebeiam ad operoſiorem fun- ctionem, quippe culicem: quemadmodum con- tingit hominibus nequam, quibus pœnitentia eſt ſædior peccato. Dicendum, naturam omnem v- bi naſta fuerit materiam, adiungere formam ido- neam. Neque eſt culex æque, aut accellorium o- peræ quæ parabatur ad caprificum: ſed æquale propoſitum naturæ, vt ex materia caprifici culicem generet, opus caprifici fructu nihilo mi- nus. Nec miretur quiſpiam quomodo in capri- fici cruditæ fieri queat putrefactio: contraria namque ſunt. Eſt quidem cruditæ ceſſatio eius caloris qui intendebat fructus murationem. In hac huiusce operæ ſuſpenſione ſubit externus calor, qui ſit author putrefactionis. Calore enim extraneo, quando prohibetur ſua, neceſſe eſt fieri putrefactionem: atque hinc generationem culicis, qui poſtea murationis fiat promotor, ſic eſt dictum: de qua re (ego Cherl.) ſuſius in Hi- ſtoria de infectis.

In Cea (Chis) inſula auctore Plin. caprifici tri- ſetæ ſunt. Primo ſætu ſequens euocatur, ſequen- tertio: hoc Fici caprificantur. Hodie etiam in- colas eius inſulæ dictam caprificandi modum re- tinere Dal. ad Plin. annotat. Caprificorum (inquit idem Plin.) laudantur maximè pigræ, & in pe- troſis, quoniam ſtrumenta plurima habeant. Ca- prificatio ipſa poſt imbrem. In primis autem ca- uendum, ne ex remediis vitia fiant: quod euenit nimia aut intempeſtiua medicina.

Theophrastus auctor eſt meliores quodam lo- co naſci ficus, ſine vlla caprifico ope, quas aucti- ſima prædicari commendabili venundantiā in- dicatura ac ſymbolo, quippe non paſſas capriſi- cationem. Eam ob cauſam nonnullos abicere conſilium caprificandi: eāſque plus probare, quæ culicum pertuſione fuerint expertes, ſuo ſucco latiores, quæ commendatio excellentiæ verſetur in opinione hominum. Eſſe etiam quædam loca, quæ non egeant opera culicum, cauſamque ſua- uitate ſtatuit ætis ad alimentum. Vt neque ex- cedat in humido, quod eſt in Græcia: neque in ca- lore, quod ſit in Ægypto: ſed æquabili vtrique temperatura. Maxime verò deteſtatur humoris copiam. At in macro ſolo non quæri caprificatio- nem: neque in Boreali: quia ſiccus ventus.

Quædam ſunt in ſtirpium genere, inquit Ariſtoteles lib. 1. de gener. animal. c. primo, quæ

res, quæ fructum ferunt, & quædam quidem quæ non ferunt, ſed ferentes adiuuant illas ad ma- randum: vt inter Ficum [Ficus] & caprificum [ier- rir].

Mirum verò (ſi noſtri in hoc negotio iudiciū valet ratio) caprificationi quā vocant, non poſ- ſe ſubſtitui aliam quādam apertionem quæ vel cultello fiat vel vngue, vel quouis alio inſtru- mento commodo: vel ſcarificationem. Nam his artibus & ſucci abundantis pars abſumetur. & ex- terni caloris beneficium admittetur: niſi laboris moleſtia ſicutumque multitudo tædium cauſare ſolita, fortè abſterreant. Malimus ſanè quoad nos, ſi ſuo ſucco lætas eſſe non detur, cuiusmodi apertione maturatas, quā tot culicellorum ro- ſtellis perforatas, & ſuis fortè etiam excrementis inquinatas, deguſtare. Sed de caprificatione plu- ſaris.

Cæterum caprificum multi quoque claſſici Scriptores memoriæ commendate dignati ſunt. Nam, vt annotat Athen. Fici, id eſt, agreſtis, ſeu caprifici, meminit Euripides in Scirone, vel adſigere Fici, id eſt, caprifici ramos. Epicharmus in Sphinge: hinc hæc nullo pacto ſiquilia ſunt. Sophocles in Nuptiis Helenes fructum arboris nomine, figuratè ſic dixit:

Immaturus erinus, id eſt, immatura Caprificus.

Cum ſi, nec idonea

Cibo, alioſ oratione tua caprificas, [Ficus].

Conuenit hoc adagium in temerarios adoleſcen- tes qui ſenes peritiores docere conantur. in mitor- ieo, id eſt, immatura caprificus nimirum ille dixit, pro immaturus caprifici fructus. Lepidè proteſto Alexis in Lebeco:

Quid præterea nos dicere opus eſt? frequentior Ficos

Qui vendunt in Caniſtris, inferne quidem

Duros & vitioſos ſemper

Occultant, bonas autem & maturas ſuperne oſtendunt:

Deinde qui mercatur, quaſi tales erant,

Pretium numerat, eāque fraude, pecuniam in buccam abſtriſa

Caprificum (Ficus) ille dat, iuravit ſe cum ſi- cos vendere.

Agreſtis Ficus arbor maſc. gen. Ficus appellatur, fructus neutro, Ficus. vnde Homer. Odyll. 11.

Hinc adeſt Erinus præteris, ſolus parui.

Amerias ſcribit groſſos vocari ipſos. Plin. quo- que Caprificum dixit pro Caprifici fructu. Te- rent. in Adelph. Illic vbi etiam caprificus magna eſt.

Caprificum à carpendo dictam volunt, quod muros, ſaxa que ac parietes carpat, quod Martia- lis inſinuaſſe putatur, Epigr. lib. 10.

Marmora Meſſala ſindit Caprificus.

Qui tamen Sycomorum, Ficum agreſtem, parie- tibus frequentem eſſe autumat, toto errant cælo.

Erinus Plutarcho & Pauſania, quod in Erino Theſſalix, vel vt alii volunt, Achaiz municipio primum apparuerit, vt Phocioni placuit. Alii, vt Phanorinus, Fici ſpeciem, ab Erino vrbe Dorica. Meſſinorum lingua Ficus, teſtante Pauſania, & Herodoto: quod & Apollo Ariſtomeni & Theo- cli vati, de ſalute conſultantibus ſi- cos, & Ficos vocant. [Ficus].

Erinus etiam Græcis dicitur: Alii in mitor- ieztes Lycophronis interpretes, Ficum ſatyram di- xit. Fructus Polluci Ficus vocantur. Lat. Capriſi- cus, Ficus ſylu. Ficus agreſtis, inculta: errata Ga- za. Germ. Wilder ſeygenbaum, Belg. Wilt.

de Dygeboom. Gal. Fiquen *saunage*. It. Ficala *sel-*
natica, Fubi *saluaticchi*. Hisp. *Cabrahiga*.

Obst.

caprificatio dicitur etiam dixit Theo-
phrast. propterea quod inde fructus sit capri-
fici. Caprificatio *iconquis*.

Ipsos etiam grossos siue grossulos *indude* & *re-*
me vocant, de quibus in precedentibus abunde
dictum: nimirum grossos proprie Olynthos esse,
hoc est, primitiuas Ficus.

Cra.

Phae.

Exem.

fol.

Apud Macrobi. Grossos legas, Ficos esse quae
nunquam maturescunt. Alii sic distinguunt, ut
Ficus primò sit *indude*, deinde *phaeix*, postea Sy-
con, postremò *lchas*, ut annotat Hermol.

Locus.

Nicol. Nicolai lib. 2. c. 8. nauig. narrat in Chio
Ficus diuersae & contrariae esse naturae, quas ta-
men oporteat habere, & Ficus inutiles reddere,
alias viles, mirabili modo qui ibi narratur.

Ficus in toto Europaeo tractu temperationi ca-
lidioris obuia, ne Germaniae quidem usque adeo
insolens habetur, quippe quae & in laetioribus
magnatum hortis colatur, & non raro fructum ad
maturitatem perducit locis etiam plusculum ad
Septentrionem vergentibus. In Hispania, Italia
& Gallia Narbonensi copiose nec sine subsidio
vitae prouenit, ubi syluulas vernae & autumnali so-
tura biserae Ficus perelegantes videas. In Brasilia
quoque, illata ex nostro orbe, autore Masseeo. Le-
uin. Flulsius scribit se in insula S. Helenae Indig., vi-
disse in Ficuum arboribus nomina inscripta An-
no 1510. & 1515. Ficus autem ibi satas per Lusita-
nos.

Quod Ficus omen fecisse ait Plinius. M. Crasso
in Parthos exercitum mouenti, id ita se habet. Cras-
so nauem expeditione illa conscendenti, cum
Caueas Ficus venales quidam vociferaretur, di-
xisse visus est, *Caue ne eas*. Romani enim olim, ut
auruncare pro auerruncare, dorum pro diuor-
tium dixerunt, sic & Caueas, pro caue ne eas.
Cic. 2. de diuin. ut supra monuimus: Cum M. Cras-
sus, inquit, exercitum Brundisij imposteret,
quidam in portu caricas cauno aduectas vendes,
Caueas clamitabat. Dicamus, si placet, moni-
tum ab eo Crassum caneret ne res. &c. Vid. Scal. in
Festum, voce Aurum: & Ioach. Camer. in Plau-
tum.

Ceterum Stuckardiz in horto principis ma-
gnae coluntur arbores ficus magnas purpureas ad
maturitatem gustumque suaves perducentes,
quemadmodum & Heidelbergae in horto Electro-
ris: Item Basileae in priuatorum quibusdam prae-
sertim D. Plateri horti, sed utrobique hyeme co-
duntur. Apud Mompelgardenses rariùs perfici-
unt fructum. Fructus in his partibus, maiores
Monspelienfibus, sed suauitate inferiores. Exitus
in horto Montheigardensi inter alias etiam vetu-
lula iam ante multos annos lata ab Ill. Georgio
& E. C. V. Virtemb. Patre f. m. quae iam saepius
frigore perempta, à radice tamen stolones emit-
tens semper reuiuiscit. Caprificus Germaniae
incognita, inquit Cordus, Romae frequens pro-
uenit in uetustorum aedificiorum ruinis & muris.
Monspeluli & in agro Narbonensi passim proue-
nit Caprificus totoque ferè anno abundat grossis:
in Italia item multis locis crescit. Horat. iubet
sepulchris Caprificos erigere, flammis adun. Col-
chicis.

Tempus
& nra.

Est porro breuissimae vitae Ficus, longioris ca-
prificus, authore Theoph. causam tribuit fecun-
ditati eius: unde & Plin. citò occidunt, quia ve-
loces, & tamen abundant diuitiis: omnia autem
celerius senescunt praesecunda. Quin & proui-
nus moriuntur aliqua, cælo omnem fecundita-

tem eblandito, quod & maximè vitibus euenit.
In trimatu ferre incipiunt, ostendentes & ante.
Serius solum nascitur, quam fructus. Serotinae
Fici ante quàm fructum percoquant, folia deperi-
dunt. Germinat sub arcturum post Ver, quod
tempus commune omnibus est, praesertim edo-
miis, ac praecipue Fico & Viti. Eo melior futu-
rus intelligitur fructus, quod latius germinem ante-
cesserit, contra quàm ceteris arboribus. Fructus
omnis ferè urbanae Ficus, ut & Cordus testatur,
bis producit: æstatis initio vnum: autumnò ve-
rò alterum, utrosque simul fouens, sed diuerso
tempore perficiens. Monspeluli Iunio & Iulio
maturas comedimus, Iulio etiam Basileae. Romae
Maio. Qua ratione florent, supra dictum.

Ficos maritimas M. Cato in loco cretoso & apri-
co feri praecipit: Africanas & Herculanias, Sagon-
tinas, Hybernas, Telanas, atras pediculo longo,
in loco crasso & stercoreato. Loca calida amant,
quia densa eius materia non est: hincque fit, ut
in locis frigidis [intellige valde frigidis] sicca fi-
ri non possint, teste Varrone. Ficum, inquit Co-
lum, frigoribus ne serito: loca aplica, calculosa,
glareosa interdum & saxosa amat. Ficus nodi a-
gro citò conualescit, si serobes amplas & ido-
neos feceris. Ficorum genera etiam si sapore &
habitu differunt, tamen vno modo, sed dispari
differentia agri seruntur. Locis frigidis & Au-
tumni temporibus aquosis, praeterea serito, ut
ante pluiam fructum deligas. Locis calidis hy-
bernas serotinas serito. At si voles Ficum quam-
uis non natura seram facere, cum grossuli minui-
erunt, fructum decutito. Iterum alterum edet
fructum, & ea hyemem seram differet maturita-
tem. Nonnunquam etiam, cum frondere coepe-
rint arbores, cacumina Fici acutissimo ferramen-
to summa amputare prodest. Sic hemiores arbo-
res & feraciores fiunt: ac semper conueniet si-
mul ac folia agere coeperit Ficus, rubricam amur-
ca diluere, & cum stercore humano ad radicem
infundere: res efficit uberiores fructum, &
sacrum Fici pleniora melioraque. De Fici sa-
tione controversia orta est. Theoph. ex *Chal-*
mine interiore, id est, minutis eius granis [sic
xapida ac vocari diximus] caprificum nasci.

Satia.

Cur locis
valde fro-
gida non
nascantur.

Vi ferit fa-
ra fiat.

Vi feracio-
res fiunt.

Vi ferit fa-
ra fiat.

Ex semina
vin nasci.

Quomodo
ferit in Ita-
liam perla-
ta.

plerique Geoponici Scriptores tradunt, ex semi-
ne satam omnino degenerare. Cicero fatetur ex
semine nasci, in Catone maiore. Ex Fici, inquit,
tantulo grano tantos truncos procreat. Et Const.
Cesar. Plantatur, inquit, Ficus commodè à fructus
ipsius granis. Alii ut Plin & Ruell. Ficum omni-
bus emergere modis, praeterquam ex calca seu
ramo & sarculo. M. Varro ex semine vix nasci pos-
se scribit, his verbis: Fici semen naturale intus in
ea Fico, quam edimus, quae sunt minuta grana, è
quibus paruis, enasci coliculi vix queunt. Omnia
enim minuta & arida, ad crescendo tarda. Qua-
re sarculis potius utendum, quàm semine ad hie-
ta facienda terraque obruenda, praeter si aliter
nequeas, ut si quando quis trans mare semina
mittere, aut inde petere vult, tum enim resticu-
las per Ficos, quas edimus maturas perferunt, &
eas cum inaruerint, complicant, ac quò volunt
mittant, ubi obrepit in seminatione periant. Sic ge-
nera ficorum Chiae, Chalcidiae & Lydiae & A-
fricæ. Item cetera transmarina in Italiam per-
lata. Hæc Varro. Colum. Ficulnea cacumina iam
tumentia locis frigidis & humidis. A Calendis
Martii usque in decimum Calend. April. vtilissi-
mè poni tradit.

Specialius de Ficorum satum & cultura differet
Palladius hunc modum. Calidis locis Fici plan-
ta

ta radicata Novebris mense, temperatis Februario, frigidis melius Martio vel Aprili ponenda est. Si taleam vel cacumen ponas, ultimo Aprili, cum ei se viridior succus infuderit: Plantæ in scrobe depositæ lapides substituendi sunt, ad radicem firmo terra miscenda est. Si loca frigida sunt, plantarum cacumina diuisis, canna internodiis defendantur a frigore. Si cacumen velis ponere, trifolium rami in bimum vel trimum ab australi parte decidas, & sic obrues, vt diuisa cacumina terra interficente velox tres furculos reddant.

Taleam sic ponemus vt cætera, cui leuiter ab infima parte diuisæ lapidem mergemus in fisco. Ego, inquit Pallad. mense Feb. ultimo, vel Martio in Italia plantas grandæpicorum per pastinatum solum disposui, & eo anno poma peperere supra comprehendendi felicitatem, velut tributa reddentes.

Plantarum delictus. Quæ feriles. Legendæ sunt plantæ, in quibus frequens nodus extuberat. Steriles creduntur, quæ nitidæ sunt, & oculos suos per longa internodia distulerunt.

Fe poma generosiora producant. Si plantam rici prius nutrias in seminario, & maturam transferas in scrobem, poma generosiora producent. Aliqui multum prodesse confirmant, si plantam rici diuiso Squillæ bulbo interlitam, stricamque vinculis collocemus. Scrobes amat altas, intervalla maiora, terræ genus durum & gracile & siccum pro vili sapore pomorum. Prouenit & petrosis & asperis, tamen potest locus propis omnibus feri.

Ficum delictus. Quæ in montanis & frigidis locis nascuntur, quia minus lactis habent, ad siccitatem durare non possunt. Vfus illis in viridi est, melioris magnitudinis & saporis arguti. Quæ nascuntur in campis, & locis calidis, & pinguioribus sunt, & in siccitate durabiles.

Quæ Carica melius feruntur. Si genera numerare velimus, immensum est: sufficit, quod omnibus æqua cultura est. Illa distantia est, quod in caricis melius alba seruat. In locis nimie frigidis præcoquas ficus seramus, quæ cito veniant, vt ante imbres genus hoc possit currere, calidis verd, & æstuosis eas, quæ seculo maturant.

Calura. Si æstiva assidua fossione. Per Autumnum prodeat, si sterus admoucas, præcipue de auriis. Recidenda sunt in ea, quæ aut putria aut male parata repentes, & mutatione putanda est, vt indurata per terra possit expandi.

Fe ficus sapiores ferunt. In his humidis ficus saporis obtusi est, cui circumdatis contra hoc radicibus aliquantus cinis debet affundi. Aliqui inter ficarias caprifici arborem ferunt, vt non sit necesse per singulas arbores pro remedio eadem poma suspendi.

Caprifici rami compati. Mense Iunio, circa solstitium caprificandæ sunt arbores rici, id est, suspendendi grossi ex caprifico, lino, velut terra, pertusi. Si hoc desit Abrotadi virga suspendatur, aut callum, quod in Ulmeis foliis inuenitur, aut arietina cornua cimaradices arboris obtinuntur, vel truncus arboris. quo loco turgit, scarificandus est, vt possit humor effluere. Cum folia incipiunt producere rici, vt fructum multum & pinguem ferant, in principio geminis cacumina summa decutimus, vel illud tantum cacumen, quod ex arboris medietate prodit.

Fe ficus sapiores ferunt. Vt Ficorum mater succo æpe longioris cum oleo, & Phlegmate mixto, in poma, quando proficiunt, subrubore.

Fe ficus sapiores ferunt. Ficus ex Didymi traditione referunt. Constatino Casare, duobus anni temporibus, Vere & autumno comitio diffinè scribit: Verham ta-

Torp. 1.

men sationem magis desiderat, quippe cum arbor omnium ferè tenerissima & delicatissima sit, gelcidia & glacies horret, ventosque mirum in modum formidat, quod cum ruunt aut trunant flatus rûpatur. Ego tamen, inquit, Iulio mense toto plantas disposui rigans, & transferens, & poma in arborem magnam adolentes peperere. Calidioribus tamen locis solo pastinato neque admodum irrigato pangi debent: liquidem aquarum copia genitiam earum pulchritudinem nauumq; decorem tollit, & corruptioni reddit opportuniores.

Plantatur & alio modo. Si quis maceratas ficos resti obducatur, siquentique riget rore, complures emergent arbutula, quas oportet transferre in scrobes, vbi in hoc seminario nutrueris. Si verd viridices quis deponat, eas scilicet immixtas plantare oportet.

Quidam muria macerantes plantam pangunt. Præstat autem, si ramos plantaturus es, vt ipsos in bubulo stercore riges.

Alii cum planta calcem viuam iniiciunt, & non fallit neque frustratur ipsos plantatum.

Alii rubricam oblaqueatis radicibus iniiciunt. Si in altitudinem luxuriari nolis, clauam in caput ferito. Scire expedit senescentem Ficum fertilio-

rem euadere.

Ficum Plin. omnia insitionis genera admittere scribit. Inferitur in Morum & in Plantanum, teste Leontio. Inferitur autem non solum vere, quemadmodum aliæ arbores, sed etiam æstate vsque ad solstitium hyemale, velut etiam Florentinus prodixit. Aprili mense, tradente Palladio. Ficum inferere debemus inter corticem, vel si nouellæ arbores sunt, fisco ligno, quod statim operiendum est & ligandum ne ventus introeat. Melius comprehendunt, si circa terram recisam inserantur arbutula. Aliqui & Iunio mense inferunt. Varro circa solstitium.

Surtulus legendus est anniculus, inutilis enim creditur maioris vel minoris ætatis. Inoculari ficus solet locis siccis Aprili, sed humidis melius Iunio mediante, Octobri mense, locis tepidis. Propagari & ramis potest. Inferitur autem in Caprifico, in Moro, in Platano, & oculis & surculis. Idem Pallad. de insitionibus.

Persuadet Morsæ rectum mutare colorem

Ficus, & inuasis dat sua iura Comis.

Se quoque mutatur pingui grandescere secco,

Et solum gaudet viuere poma modum.

Insignes foliis Platani felicia mensis

Brachia gaudentes viti bonore Comas.

Ingressus pingui se cortice maxima Ficus

Servat, & operatus implet adeptus sinus.

Nunt ficulnea cacumina obruuntur vtiliter, cum tumescunt, vt plantas faciant, si earum copia non abundat.

Vt etiam varios fructus vna Ficus exhibeat, ramos duos nigra, & albæ arborum inter se ita vinculo stringes atque torquebis, vt germina miscere cogantur, sic vt obruti & stercoreati, & humoris rigati, ubi prodire cœperint, germinantes oculi aliquo inter se annexu conglutinentur, & compactum germen in vnum caudicem coalescat, qui bicolores fructus pariet; sed binam transferre plantulam melius, autore Leontino quicquidem modum præscribit. Quidam tuius iustmodi coitum moluntur. Ficaria grana ex diuersi coloris ficibus dinteolo illigata legunt, & deinde suo tempore transplantant.

Si in oculo Fici quid scribatur, Ficus scriptæ germinaturas dicit Democritus.

M. 3.

*Vi fructum
non alig-
uatur.*

Vi fructus non abiciant idem cauere spondet, si cadex eorum Mororum succo sit illitus: nec amittere, velut apam pomum, si radix eius sale & algis marinis obducta sit, aut si grossi ex ipsa amuleti vice suspendantur: aut si quadrantibus Lunæ rubrica caudix oblinantur, vel intorta ex caprificis feta suspendantur. Quapropter aliqui in singulos ramos ipsos inserunt, ne illud singulis angustis facere cogantur. Continet etiam fructum rucus, si circa Pleiadas scrobes circumfoderis, & amurca cum aqua æqualiter mixta truncum perfuderis.

*Vi fructus
filu. man-
fuerit.
Vi Grossi
non deci-
dunt.*

Ficum sylvestrem mansuetas affirmando id Africano, si putatos ramos vino & oleo madescens, & rigaueris per septem dies. Grossi seu immaturæ rucus non decidunt, si arboris radice incisa, quaternos salis sextarios inieceris, & terram insuper aggesseris.

*Vi fructus
purgantes
fructus fo-
rat.*

Democritus tradit si quis Fici esu, aluo deiectionem moliri cupiat, Elleborum nigrum cum Tithymalo tritum, radicibus arboris, quæ deponitur inferi debere, sic enim inde enatas Ficus purgatrices futuras.

*Vi fructus
fuit.*

Præcoces Ficos, hoc est, ante tempus maturescences idem fieri promittit, si columbarum sterco & Piper & oleum iuxta adieceris.

Florentinus in Georgicis suis, præcoccem & Theriacam Ficum fieri ait, fructu ex antidoto Theriacâ illito. Pollere idem affirmat aduersum ferarum morsus pomum, quod antidoto Theriace pubescens fuerit delibutum. Si verò ante tempus Ficus edere velis, columbinum stercus & Piper oleo mixta olynthis & grossis idem circumlinenda suadet.

*Vi fructus
videt con-
seruando.*

Ficus post maturitatem in arboribus manere non possunt, quemadmodum alij pomorum fructus, sed spontè cadunt: possunt tamen, si Africano credimus recentes seruari, quales in arbore erant, hac arte. Quin opercula vini doliis obduurus es, ollam nouam accipito, aut aliud vas non rotundum & oblongum, sed potius, ex arbitrio quadratum, fundoque fultum. Huic immitte recentes ficus minis maturas, cum suis pediculis umbilicis hoc est, particula qua arboribus suis dependent lectas, sed leui manu, atque ita ut distent inter se, ollamque diligenter obtura, & in dolum vino plenum ut innatet immitte, tum dolum tege & occlude. Hæ Ficus permanent quales fuerint iniectæ, nisi vinum acescat. Conseruantur recentes Ficus etiam hoc modo. Ex recentibus cucurbitis eximere oportet ex lateribus, eas partes quæ splenis similes existunt, easque excavare velut thecas aut vaginas. Deinde in singulas, singulas ficus impones, Cucurbitamque exemptis splenis obturabis, & in loco vmbroso suspendes, vbi nec ignis inspiraret nec fumus. Sed, ut ante dictum, legendæ cum petiolis, quippe quæ diutius durent integre. Alii sic in melle disponunt ficus, ut neque se inuicem: neque vas tangerent, dein indito operculo sinunt. Atque vitreum poculum, aut aliud quoduis pellucens, sicubus leniter immersum super imponunt, & obducto cera spiramento ita relinquunt, sicque immarcescibiles manere promittunt.

*Vi carica
conser-
uandæ.*

Si in tegete, qualo vel cratibus indita Fici calfacto furno post exemptum panem propendant, & in fictilem & bene picatam fideliā condantur, diu seruantur illæ. Sed eas cum pediculo ex quo dependent deerpere conuenit, & muriam cum oleo seruandam in Sole irrorare, & in vas mittere, idque luto oblinere, noctem tamen

vinam antea rori exponere, ac postea vali committere. Alii cratibus expandunt, toto Sole siccandas, & recipiunt nocte sub terra. Alii pinguißimam quàmque viridem Ficosum eligunt, & arundine vel digitis diuisam dilatant, atque ita in Sole arescere patiuntur, quas deinde bene siccatas meridianis teporibus, cum calore Solis emolliatæ sunt, colligunt: & ut est mos Afris atque Hispanis, inter se compositas comprimunt in formam panis redigentes: tum rursus in Sole assiccant, & ita in valis recondunt.

Modum Campaniæ consuetum tradit Palladius: ac varios etiam habet Columella, quos breuitati consulentes hic prætermittimus. Ex dictis autem patet, Ficus olim iniunctis caplis, arcis & cadis reſeruatas fuisse: hodie [ut ad nos importantur ex Galloprovincia & Italia] iniunctis sportis reponuntur.

Sed & de Ficus morbis quædam dixisse conuenit, ut & huic rei culturae modus præſcribat. Est itaque ei, authoribus Theoph. Plin. & Geoponicis tam Græcis quàm Latinis, petularis Vermicalaria. Bestiolas istas vocant Cerasas, stridulum animalculum, de quo fusiùs alio opere. Præterea & Scabies, cochleæ. Crados est, cum marcescunt rami, quos priuatim Cradas in ficu vocari, supra diximus. Item parcella, sed aliter quàm in Olea, quoties videlicet radices imbrum superuentu quasi deglabrantur. Eandem & vredo afficit xanthus: & tabes in rami Theoph. dicta, estque quasi quidam stupor rigorque. Frigore & gelu aliosis annis contrahitur. Illi etiam ut & plerisque aliis arboribus infestæ sunt formicæ & Sideratio.

Dicamus & remedia quædam. Ergo ne vermes patiantur, suadente Palladio ramum Terebinthi vel Lentisci taleam cum plantis Fici cacumine ponemus inuerso. Vncinis æreis tollendi vermes ex Fico. Alii amurcam, alii veterem vinam ablaqueatis radicibus miscent. Alii bitumen & oleum, aut solam calcem viam latebris vermium linunt. Si formicæ molestæ sunt, rubrica, butyro, & pice liquida mista circa truncum debet induci. Alii Coracinum piscem contra formicas in arbore suspendendum suadent. Si fructus suos vorant, gra proiciet, alii rubrica aut amurca insulsa mista aqua arborem liniunt, vel cancrum fluuialem cum ramo Ruta suspendunt, vel algam marinam, vel fascem Lupinorum, vel radici terebræ cuneum figunt vel securi arboris corium sepius proſcindunt. Quædam etiam ad idem diximus supra. Scabiosam ficum curabis scilla iuxta radices eius plantata, aut rubrica aqua diluta circum truncum ipsius oblita.

Ficus arbores ut perquam pumilæ habeantur, & in vasculis super fenestris spectentur à viatoribus ita docuere mangones referent Matth. Abscindito Fici surculum verno tempore, paulo ante germinationem, prominente iam corculo, & subinde contorto manibus cacumine, in quo vis vase terra referto surculum ipsum serito cacumine inuerso, circa quem hordei milique nonnihil inspergito, & terra deinde obruito, demissa extra tellurem reſecta parte: rit enim hoc mangonio, ut inde ramuli enascantur parui, qui cum vas sese fundentes, brevi admodum tempore ficus optimos edant, pumila perpetuo manente arbore.

Sed eandem ad vires. Sunt qui huic fructui præcipuum honorem, inter eos, quos hortator dicimus, debere assenerent, utpote, cuius succus minus vitiosus sit, & qui magis alit, etiam quàm

*Alus. mo-
dus.*

Alus.

Fiti morbi.

*Vermic-
alaria.*

*Crados.
Scabies.
Cochleæ.
Parcella.*

Vredo.

Remedia.

*Ad fructus
causam.*

*Ficus pumila
manet.*

*Vitis
vitis.*

vitis.

vua, succo etiam præstantior. Vique adeo apud
pneicos existimatur, ut Ananias, *anania* *anania* *anania*
id est, ricas auro vtiliores melioresque di-
cent: Et Homero Ingeniorum fonti, *ingeniorum*
Sic & Tryphon ricum
magnopere laudant. Atque adeo ricum in maxi-
ma admiratione fuisse apud Græcos argumento
est, quod & *ricum*, & maximi quique viri eandem &
scripserunt, & appetitus famulatio profecti sint.
Hercules virides ficus ac recentes cum bubula e-
stle ferunt. Plato Philosophorum ille trimegi-
stus & Philosophus, sed ne mireris, & quædam ex
que ac *ricum*, haud minus, inquam, ricum,
quam vinarum amator, cognominatus fuit.

Sed, ut specialius eius vires inspiciamus, Hipp.
contingit, ut menses diu retenti de repente
assum prorumpant, tunc huic ita se habenti
Grossum siccam [*Grossum siccam*] contusam & cri-
bratam, in linteo ligatam in subditiōe apponit, &
imo veneti refrigerantia admouet, ea cautione,
ne inhorrescat. A medicamento etiam potione v-
teros Grossorum decocto, postea etiam acerbis
colluit. Grossos quoque hybernas in aquam in-
iectas lentotigne coquit, deinde percolat, & af-
fuso oleo, vteros colluit. Idem pro subditiōe
purgante & emolliente caricam coquit, donec
grana interiora [*grana interiora*] deponat, id ex-
pressum linteum tritum in vellere [*lintheum tritum*] cum
unguento rosaceo subdit. Si tandem ex partu,
aut inflammatione exulcerati fuerint vteri, Gros-
sos hybernas [*hybernas*] affusa aqua deco-
ctas excolat & deponit, deinde oleum tepi-
dum affundit & permiscet. Durbus ad summum
heminis colluit, & purgat. Vlcerebus autem pur-
gatis eisdem ita corroborat. Grossos hybernas
tenet & affusa aqua per diem totam macerat, & o-
leo affuso colluit. Sed hæc illegisse hic sufficiat, qui
plura vult, apud Hipp. legat.

Fici maturæ, autore Diosc. recentes ventricu-
lum lædunt, aluumque solvunt: ut etsi hic fructus
in maxima sententiarum autoritate sit, nihilominus
peculiare ac commune serè pomorum omnium
probrum hoc effugere minime potuerit. Sed
contracta ab his alvi fluxio facile cohibetur: pa-
pulas emolliunt, sudoresque mouent: sitim se-
dant, caloremque restringunt: Sicæ verò sunt
alibiles & excoctæ: sitim magis afferunt, al-
uumque non viles: at alui ventriculi fluxio-
nibus [*fluxionibus*] contrariæ: gutturi autem arte-
tiz, velicæ ac renibus peritiles: nec non & iis
qui ex longa valetudine decolorati sunt, Anhe-
læticis, Comitialibus atque Hydropicis. Fer-
tilis est cum hyssopo & potæ, quæ pectore con-
tinentur expurgant: veteris tussis ac diuturnis pul-
monum vitis conueniens, aluumque molliunt
cum nitro & cinere tusc, deinde manducatur. Ipla-
rum decoctum arteriz ac tonsillarum inflamma-
tionibus gargaritatu prodest. Quin & Cataplas-
tatis ex hordeacea farina miscetur, sitimque in
mulieribus solas cum Foenugræco aut ptisana.
Ceterum cum Ruta coctæ, ad torsiones colicas
infunduntur. Costæ, deinde tritz ac impositæ,
dumtaxat discutiant, parotidas & furunculos e-
molliunt, panos maturant, efficaciusque addita
lacte, nitro aut calce vna. Cruda quoque si cum
melle tundantur eadem efficiunt. Cum mali-
corio: pterygia repligant. Cum atramento iu-
torio, medentur ægri sanabilibus malignisque iu-
biatum fluxionibus, (vltimis Pl.) Quin & in vi-
no deferuntur, addito absinthio & hordeacea
farina, vltimis hydropicis illinuntur. Crematæ &
cerato amulæ peritiones sanant. Quod si cruda

terantur, & liquido sinapi exceptæ auribus indan-
tur, sonitus tinnitibusque sanant. Porro tam syl-
uestris, quam sativæ Fici lacteus succus coaguli
modo lac contrahit, coagulatumque aceti modo
dissoluit. Idem corpora exulcerat, ota vasorum
reserat, aluum soluit & vterum relaxat cum trito
amylo potus: [*amylo potus*] ita & Plin. legisse vide-
tur. Melids *melids*, rationabilisque. Menses
quoque ciet appositus cum oui luteo auxera Tyr-
thenica: Podagricorum cataplasmatibus cum farina
Foenugræci & aceto vtilis: Lepras verò, Lichenas,
maculas à Solis ardore contractas, vitilignes, plo-
ras, vlceraque capitis manantia cum polenta ex-
purgat. Instillatur plagæ, percussis à scorpione,
venenatorum ictibus & canis moribus auxilia-
tur: dentium dolori prodest lana exceptus, & in
eorum cauis additus: denique formicolas verru-
cam tollit, carne quæ in ambitu est adipe circum-
lita.

Hæc eadem præstat succus à teneris sylvestris
Fici cauliculis, quandid lacteo liquore prægnans
est, nec dum oculi egerminant. Tum enim hi tusi
exprimuntur, & succus siccatus in umbra reponi-
tur. Porro & liquor & succus ad exulceratoria
medicamenta usurpantur. Decocti verò cum bu-
bulis carnibus ficulnei furculi efficiunt, ut hæc fa-
cilius percoquantur. Lac quoque si dum coqui-
tur, spathæ vice ficulneo eiusmodi furculo monea-
tur, maiore illud vi præditum efficiunt.

Grossi, quæ & Eninei quibusdam dicuntur, co-
cta & illita, collectionem omnem, strumasque
emolliunt. Cruda verò cum nitro & farina impo-
sita, fornicationes thymosque tollunt. Quin &
hæc eadem ipsa folia possunt. Cum aceto autem &
sale illita, vlcera in capite manantia, furuncles &
epinyctidas sanant. His quoque ficosæ scabæque
genæ perscrantur. At nigra Ficus foliis ramulis-
que vitilignes albæ perunguntur. Faciunt quo-
que aduersus canum morsus cum melle, & ad vl-
cera quæ favi, Græcis *avicia* vocantur. Grossi cum
napaueris sylvestris foliis ossa extrahunt: furuncu-
losque cum cera discutunt. Ceterum cum eruo ac
vino impositæ, contra muris aranzi morsus &
scolopendræ venena possunt. Fit & è cremato-
rum tam sylvestris quam sativæ Ficus caliculis
rinere lixiuum. Sed cinerem plurimum diuissi-
meque macerari oportet. Vtile porro est ad me-
dicamenta caustica, & partibus prodest gangrena
tentatis. Nam expurgat & consumit quæ excre-
scunt: Vtus est, ut eo imbuta subinde spongia su-
perponatur. Interdum & infunditur, quemad.
Dysentericis, & in vetustis fluxionibus, nec non
& sinibus cuniculatis depascentibus, itq; magnis
Etenim purgat, conglutinat, carne replet & oras
committit, æquæ ac emplastra quæ cruentis vul-
neribus imponuntur. Propinatur & ad san-
guinem in grumos concretum itemque contra
præcipitationes, rupta atque conuulsa cum aqua
cyatho recens excolatum, admisto olei exiguo.
Colicis, ac dysentericis per se Cyathi mensura da-
tum auxiliatur. Nervorum vitis & conuulsis ex
oleo conuenienter illinitur: quippe quod sudo-
res moueat. Bibitur & aduersus gyphi potum,
phalanginorumque morsus. Eisdem porro effe-
ctus exhibent lixiua reliqua, præsertimque quea-
rum: omnia verò astringendi vi pollent. Hæc
Diosc. De qua postrema eius sententia infra,
post vires ex Galeno specialius tradimus. Plin.
quoque testatur, Fici succum lacteum coaguli
vsum præbere aceti que naturam habere, & plera-
que alia Diosc. de Ficu placita confirmat diuersis
locis, additque lac eius pilos detrahente, palpe-

Tinnitus.

Lactis.

Alui.

Vteros.

Menses.

Podagra.

Lepra.

Lichenas.

Vitiligo.

Piora.

Vlcera capi.

Idus Genes.

Dentium.

dolor.

Verruca.

Fici filia.

res.

Exulcerat.

Grossorum.

vis.

Struma.

Fornicatio.

Folia.

Vlcera capi.

Scabæque.

facies.

Vitis.

Canum mor-

sus.

Vlcera co-

Fici.

Vitis.

Linimentum.

Gangrena.

Gangrena.

Dysenteria.

Fluxiones.

Vetus.

Vlcera co-

na.

Facultates.

Sanguis co-

crens.

Causa co-

alio.

Cathaca.

Dysenteria.

Nervi cum

nulli.

Sudorificum.

Causa co-

plum.

Morsus pho-

long.

Vitis co-

Plum.

Pflasterum.

nifesta ad suum effectum. Actimonia nimirum la-
tis ficulnei, quale in ficu immatura deprehendi-
tur, eam vorandi cupiditatem inducit. Mala ve-
rò id duplici ratione efficiunt, vel propter frigi-
ditatem & adstrictionem, si immatura sint: (vtra-
que enim harum facultatum famem & appetitum
ciere potius est) vel quia citò descendunt, & ven-
triculum vacuum relinquunt, si sapida sint, tene-
rasque dulcia. At non est aperta illa vis Ficus
ad appensam tantummodò carnem? Quod si
paulò diuùs ex ea penderet, temporis pondus
spatio causam acceptam ferremus, quippe quo
vel abique Ficu carnes, & potissimum gallina-
ceas, tam nostratum quàm Indicorum Gallorum
tenerescere atque adeò friabiles reddi, tam certò
scimus, quàm huius cogitationis optatam inter-
dam ferimus appetitus conuiualis gratiam. Quo-
modo enim id à spiritu vel habitu arboris simplici
euenire queat, (nisi quis fortè & hic occultam a-
liquam vim caulari velit) fatemur ingenua illa,
sed fragilitatis interim suæ confessionis formula:
nos nescire.

*Cur fulmi-
bus non
percellatur*
Idem Plutarchus & alii plures, Ficum fulmine
non icipi existimant: causam tribuit idem amarori
& trunci vitio, ut talia fulgure non percellantur.
Quod si verum sit, multiplex profectò, còtra rem
tam horridam, tamque pertimescendâ, & tantum
naturæ periculum remedium iam nobis innotuit,
cùm tot res amaras inuenire sit obuium. Aliud
de hac iudicium in superioribus exposuimus.
Hec philosophia fuit.

*Cur fici
succus a-
marus, fru-
ctus dulcis.*
Magis etiam ad artem accedit, quod ille ipse
autor quærit in Symplosiacis: cur Ficus *ἡ δὲ γὰρ
ἀμαρὴ τῆς ῥίζης, nascitur ἐκ τοῦ πυκνότητος*. Cur,
inquam, cùm in Fici arbor amarissima sit, fructum
tamen ferat dulcissimum. Et lanè haud parum
torset hæc quæstio Plutarchum, vtrò eniòque in-
geni pendente vela pro consequendo cuius ra-
tionis & veritatis. At non vidit ille disputator
idem euenire in aliis plerisque arboribus. Ama-
rus succus Pruni potissimum sylvestris: at fructus
maturatione tandem ad gratiam redigit atq. dul-
cissimus. In Cerasis nihil dulce. At fructus pleri-
que dulces nascuntur. Amaranthus, austerus vel
insuauis. Piri non succus modò, sed partes eius
omnes, pluraq. videas Pira dulcia, quàm non dul-
cia, præsertim probè matura. Concludamus cum
summo disputatore Aristotele, omnia coctione
dulcescere. Quantò magis geminâ? internâ, in-
quam, à forma & calore animæ Fici, Cerasi, Piri
&c. & externâ à colore Solis. Eisdem rationes, cur
Fici arbor amarissima Plutarcho fructus ferat dul-
cissimos quod nobis fuit demonstrandum. Et de-
cui fortassis lectorem in tam longa Ficuum tra-
ctatione, aliquot quæstioncularum ventilatione
recreare.

Nunc & cæterorum autorum placita, de Fici vi-
ribus persequamur, vbi priùs quædam de Sycite
vino adiecerimus.

Obscurè de eo Plinius: Id verò tentium esse
partium, flatus gignere, stomacho aduersari, fasti-
dium creare, bonam tamen facere aluum, urinam
ciere, menses trahere, lactis vbertatem præstare, at
vitium sanguinem creare. Elephantiamque &
zythum infetre tradit Dioscorides, modum pa-
randi addens.

*Accord
Sycitis Co-
lum.*
Aceti Sycitis seu ficulnei parandi modum hunc
docet Columella. Sunt quædam regiones, in qui-
bus vini, neòque etiam aceti penuria est. Itaque
Ficus viridis quàm maturissima legenda est, vique
etià si iam pluuia inceserunt, & propter im-
bres in terram decidit: quæ cùm subiecta est, in

dolum vel in amphoras conditur, & ibi finitur
fermentari: deinde cùm exaruit, & remisit liquo-
rem, quicquid est aceti, diligenter colatur, & in
vasa picata benè olida diffunditur: hoc primè notè
acerrimi aceti usum præbet, nec vnquam situm
vel mucorem contrahit, si non humido loco
positum est. Sunt qui multitudini studentes a-
quam Fici permisceant, & subinde mactant. *Alia ratio.*
Ficus recentes adiciant, & patiantur in coiture
tabescere donec satis acris aceti sapor fiat. Postea
in iuncis fuscillis, vel sparteis saccis percolent, li-
quatùmque acetum seruefaciant, dum spumam,
& omnem spurciam eximant, aut torridi lassis
aliquid adiciant, quæ res prohibet vermiculos a-
liæ innasci animalia.

Cæterùm ficus arida, ex traditione Galeni, vim
habent exalfaciendi ordine primo completo aut
secundo incipiente: habent verò etiam partium
tenuitatem quandam. Ex istis duabus idoneæ
sunt, quæ duos tumores concoquant: statim ve-
rò etiam eos digerant: atque ipsæ per se illis eius-
modi vim obinent. Sed & decoctum earum eius-
dem vtique naturæ est. Verùm vbi magis conco-
quere consilium est, miscenda est farina triticea:
vbi verò plus digerere, hordeacea: panis horum in
medio. Porro scire oportet, quòd quæ pingui-
res sunt, magis possunt concoquere: quæ verò
gustu aciores, magis tum extergere, tum digere-
re. Cæterùm quod ex his plurimum in aqua co-
ctis efficitur, simile est meli non solum consili-
tia, sed & facultate. At Ficus virides comestæ, pro-
pter admixtam humiditatem facultatis sunt imbe-
cillioris: subducunt tamen alium vtræque tum
humidæ, tum sicæ. Ficus verò Caprifici acris &
digerentis facultatis sunt. Sic etiam domesticarum
grossi, quas *ῥαβδὸν* vocari diximus: inest enim il-
lis non nihil etiam succi ex ficu arbore. Ipsa Ficus
arbor calidæ tenuiùmque partium temperaturæ
est, vt indicant & liquor eius & foliorum succus.
Valenter vterque calidus est: quare non mordi-
cat tantùm aut vehementer abstergit, sed & vlcera-
rat & ora valorem reserat, & verrucas quas myr-
mecias vocant eicit. Sed & purgare potest. Ficus
agrestis, tum liquor tum succus ad omnia quàm
satine valentior est. Sed & cradæ earum adeò sunt
calidæ tenuiùmque partium, vt carnes bubulas
duras, si coquendis adiciantur, friabiles ac tene-
ras efficiant. *Hæc Gal. in 8. simpl.*

Idem lib. de alim. Ficus, inquit, tametsi minùs
prauis succi gignant, quàm cæteri omnes non mo-
dò fugaces sed & autumnales fructus, non tamen
proflus id vitium effugere potuerunt. Cæterùm
hæc ipsis insunt bona, nempe quòd commeabi-
les sint, & faciliè in totum corpus peruant. pe-
netrentque. Nam & abstergendi vi pollent haud
obscurâ: cuius gratia post ipsarum esum nephritidis
multas arendas excernunt. Cum porò omnes
autumnales fructus exiguum corpori alimentum
præbeant, minimè omnium Ficibus id usu venit:
carnem tamen non compactam neque firmam
generant, ceu panis & suilla caro, sed turgidulam
& subinane, veluti Fabæ. Quin ventrem fla-
tibus implent & ipsæ, nec mediocrem profectò
hinc molestiam intulissent, ni etiam celerem def-
cesum essent adeptæ, cuius beneficio cùm cele-
riter peruant, flatus quem excitant non diu
manet, atque ob id minùs cæteris autumnis fructi-
bus lædere consueverunt. Maturæ Ficus imma-
turas non mediocriter antecellunt, quod & in a-
liis omnibus cernitur fructibus, quanquam non
tantum in illis discrimen existat. Siquidem ad
plenum maturæ Ficus paulò minùs omni prorsus

*Alia ratio.**Caricatum
tempera-
mentum
ex Gal.**Decoctum.**Ficus Sici-
licæ.**Laxant
alium.
Ficus Ca-
prifici.
Arboris
temperam.**Succi tem-
peram.**Ad Sycitis**Tempo-
ram cradæ**Nephritis.*

noxavacant. Ficus & Vux, quemadmodum inter fructus autumnales principatum obtinent, ita fugacibus omnibus magis nutriunt, minimumque pravi succi habent, praesertim cum exactam maturitatem fuerint adepti. Quodque nutriant, maximo argumento sunt ii, qui vinearum fructum custodiunt: siquidem cum duos menses solis vultu & Ficubus, quarum custodiz praesunt, veltantur (nisi forte panis quippiam cum illis addant) obesi tamen ac pingues fiunt. At caro quae ex ipsis gignitur, haudquaquam est firma ac densa, quemadmodum ea quae ex carnibus fit, sed laxa ac praeumida: ob id celeriter etiam cum vesci ipsis desierint, contrahitur ac coarctatur.

Caricæ usus. Caricæ quidem multiplicem habent utilitatem, si quis tamen largitus esitauerit, ab eis offendetur: non admodum enim probum sanguinem gignit: quapropter pediculorum quoque agmen eas comitatur. Incidendi extenuandique vim habent, qua & ventrem ad excretionem irritant & renes expurgant. Pecori autem Lienisque inflammatione obsessis sunt noxiae quemadmodum & ficus, non peculiari quadam eximia facultate, sed communi ratione dulcium omnium ciborum ac potuum. Obstructis illis aut scirrhus tentatis ex sese nihil profunt aut obsunt, sed medicamentis incidentibus ac extenuantibus & extergentibus mixta non mediocriter auxiliantur. Ideoque nonnulli medicorum in dictis Lienis ac hepatis effectibus exhibent ipsas longè antè cibum cum Thymo aut Pipere, aut Zingibere aut Pulegio, aut satureia, aut Calamintha aut Origano, aut hyssopo: ad eundem etiam modum si caricæ cum alio quopiam illorum quæ facultatem habent acrem aut omnino incidendi assumantur, non solum sic affectis, sed sanis quoque utiles erunt: siquidem iccoris meatus, per quos fertur alimentum, apertos esse non egrotantibus modò, sed bene valentibus etiam tutissimum est. Proinde hoc pacto Ficus cum sale extenuante aceto & garo preparatas vulgò comedunt, quòd id utile esse experientia didicerint. Verisimile est, ipsorum nonnullos Medici cuiusdam consilio adductos, Ficus hoc modo primum comeditse, deinde eam notitiam ad vulgus dimanasse. Qui verò cum cibo aliquo incrassante Ficus & Caricæ edunt, non mediocriter offenduntur. *Halstonus Gal.* qui ut salubrem vitam degeret, ab omni fugaci pomo abstinuisse se tradit ab xxviii. anno ætat. ad senectam usque exceptis exactè maturis Ficubus, atque vuis, quæ minus inutilia esse existimavit, ut ex modò dictis abundè patet. Idem ait quòd quicumque amicorum suæ parvè admonitioni, ut ab iis quæ fructibus abstineret, sine morbis fuisse.

Experientia. Martialis Epigram. 13. traditum Distychon non malè & huc quadrare videtur: quamvis ille ad Ficedulam referat, aut allusisse videatur.

*Cum me Ficus alar, cum pascat dulcibus vni,
Cur potius nomen non dedit una mihi?*

Ficedula. Est autem Ficedula M. Varroni dicta auicula, quòd ficubus vescatur, ob quam rem etiam *auicula*, aliis *auicula* dicitur, & *auicula*, id est, vuedula, ab vuis quas etiam pascitur, quibus mirum in modum pinguescere creditur. Hanc Recentiores falsò putant esse quamcumque Autumnalem auiculam ob pinguetudinem expectam: certa enim species est, corpore grandiusculo quam Luscinia, oblongo, colore misto ex rano, cinereo, pallido, Pellagiam Vascones vocant: quod ex Scalig. observationibus hic annotare placuit, sed ea lege ac omine, uti nobis non sit fraudi materias commisisse.

Porro Gal. lib. 8. simpl. cap. de Cinere. Dioscoridem haud iniuria reprehendisse videtur, quòd lixivium omnia adstringendi vim habere prodiderit, inter quæ & ficulneum connumeravit. Nam cum Lixivium ut Gal. verbis utamur, sit tantummodò *de l'huisme des cendres*, id est, cineris lotura: id certè cineris, è quo fit, naturam rescipere consentaneum fuerit. Porro cum cinerum natura non vana sit & eadem, sed pro materiz combustæ diversitate diversa, aliorum quidem adstrictoria, aliorum verò acris & absterforia, & ipsa quoque lixivium pro cineris, è quo facta fuerint, varietate varia esse necesse fuerit. Quapropter doctiss. Sarac. ut ne Galeni reprehensionem locus esset vllus, suprà adducto loco apud Dioscor. mendum subesse haud malè suspicatur, & *auti te vna l'huisme*, namque legendum esse iudicat.

Non abs re fuisset Simeonis Sethi paucis verbis & veluti compendio, tradita de Ficuum vitiis adscribere, nisi pleraque ex Gal. essent desumpta. Dicamus quædam ex eo. Fici, inquit, primo ordine calefaciunt intenso: deficcant verò medio primo, nutriuntque abundè, sed ventri ventriculum complent nisi probè concoquantur. A Nephriticis comesta, multas arenulas educunt. Pectus & pulmones iuvant: aiunt insuper contra venena medicamentum siccos esse, eos singulis diebus ieiunus si quis sumat.

Sed ut de Ficorum erga venena vi magis constet, nota est Mithridatis compositio, tantopere à multis celebrata, de qua etiam Iuvenalis. Saty. 14.

--- Atque eme quod Mithridates

Composuit, si vni aliam decerpere Ficum.

Quippe caricæ cum Iuglandium nucibus comest manducata, egregiè venenorum maleficia hebetare creduntur. De Mithridatis antidoto plura habes in historia Nucis Iuglandis. Denique omnium fructuum quos *epithymus*, id est, Ligneos, [quoniam è materia stipium lignea oriuntur, à quibus diversi cereales, *arborum*] appellant, vtilissimos esse ficos etiam Herodotus Lycius in opere suo de ficubus [ut scribit Athen.] planum facit multis verbis, ac Ficuum succo recens natos puellos optimè alii, vegetosque fieri, si illis nutrantur, affirmat. Pherecrates, qui Persas edidit, *tertiū cibum*, inquit:

Aspexit nostrum si quispiam aliquando Ficum ferentem,

cum compellina est,

Puellis, ut nutrant, obtritum in cibum dat, tantumquam

medicamentum non vulgare Ficum fit.

Herodotus in primis admirandus & mellissimus lib. 1. hist. ingens bonum mortalitati fici esse, ad hunc modum scribit: Aduersus illos homines, o rex, exercitum comparas, qui anaxyride [femorali seu subligaculo] & reliquo vestitu coriaceo vtuntur: cibantur verò non iis quæ cupiunt, sed iis quæ suppetunt, regionem asperam incolunt: vinum, per Iouem, non bibunt, nec fici nec aliis lautis cibis vescuntur.

Polybius Megalopolites lib. 11. narrat, Philip. pum Persei patrem, cum incursionibus Asiam vastaret, commeatus inopia, quia frumentum deesset, cibaria militum à Magnesiis Ficus accepisse, idèque potitum Myunte, ac pro danificis eum locum tribuisse Magnesiis. Ananias Iambicus:

In adibus auti multum si quis conluserit,

Et paucas Ficus, &c.

Quandò Ficum auro sint praestantiores intelligit.

Tam prolixè Magnus de Ficubus cum tractasset, ad

Dioscor. lib. 8. simpl. cap. de Cinere. Dioscoridem haud iniuria reprehendisse videtur, quòd lixivium omnia adstringendi vim habere prodiderit, inter quæ & ficulneum connumeravit.

Diosc. locum subesse haud malè suspicatur, & auti te vna l'huisme, namque legendum esse iudicat.

Temper. ex Sam. Sath.

Ad Venena

Infantibus utantur, affirmit. Pherecrates, qui Persas edidit, tertium cibum, inquit:

ad hunc modum locutus est Daphnus medicus Philomus lib. 3. de alimentis, recentum Ficum aut plures esse inuicem differentias, nempe generis, temporis quo proueniunt, & facultatis: ceterum in vniuersum, humiditas & maturas ocyllinè dissolui ex omnibus, & quouis alio fructu celerius coqui, nec aliis impedire cibi coctionem: humidarum facultatem glutinosam esse ac dulcem, subnitrosam tamen; (ob lactis exiguum acrimoniam) deiectiones moliri largiores, liquidiores, promptiores, minimeque molestas: succum salum & subacré corpori suppedicare cum sale deuoratas: at quod præbent alimentum cito dissipari. Itaque multis Ficuum esu valde auctam molem corporis, breui post tempore gracilescere ac extenuari supra modum: quod profecto non accideret, si perstaret alimentum & Ficu perceptum, & statim discuteretur.

Reliquis porro fugacibus fructibus à ventriculo facilius superari hoc arguit, quod non solum citra noxam copiosis aliis fructibus iugerimus, sed etiam quod illis præsumptis si consuecum & parem cibi modum addamus id nihil incommodet: unde manifestum est, utrumque cibum à ventriculo confici, & minore negotio Ficus vinci quàm alios fructus, nec obstaré quominus alius cibus coquatur. Facultas quidem ea Ficus est, quam proposuimus. Glutinosa & salua, ex eo deprehendimus, quod ob lentorem manibus inhaerescit, & illas tamen absterget: dulcem linguæ & oris iudicio cognoscimus. Quod autem sine torminibus & perturbatione alui deiectionem moueat celeriore, copiosiore, molliore, ut probemus, verbis haud multis fuerit opus. At verò in ventriculo Ficus parum immutatur seu alteratur, non quia difficilis sit exitum coctio, sed quia confectum deglutimus dentibus nondum extritas & cominutas: quæ de causa promptior est eorum excretio.

Salum quidem succum à Ficis procreari, & in corpus deduci indicauimus, quoniam, ut est demonstratum, nitrosi sunt: augetur salugo addito sale, quo cum serè recentes comedi solent etiam hodie in Italia & Galloprovincia. Ita augebatur olim acrimonia etiam adiecto vel Thymo, vel reliquis supradictis herbis, vel aceto. Ac veteres citasse Ficum cum sale, Thymo atque aceto, abunde colligere licet ex Athenæo.

Heracleides Tarentinus in Conuuiuo (ut idem refert) dubitat & percontatur, post esum Ficum an aqua gelida bibenda sit, an calida. Qui calidam maluit, illos inquit hoc suadere, quod animaduertant sordidas manus aqua calida lotas cōfestim purgari, & hoc exemplo credibile putent in ventriculo Ficus è vestigio dissolui, præsertim cum extra corpus nostrum aqua calida ficum continentes partes distrahat, & in ternes portuunculas liquatas diuidat, frigida verò illas contrahat, & cogat. E diuerso, qui frigidam bibendam sentiunt, sic ratiocinantur: frigida portione ob eius gravitatem, quæ insident ventriculo deorsum protrudunt: non admodum bellè ventriculum habere post esum Ficum, quia estuofus & imbecillus reddatur: quomobrem quidam exemplo merum bibunt: aquam porro frigidam in ventriculum acceptam illas depellere.

Est autem post sumptas Ficus largis & affatim bibendum, ne in ventriculo subsistant, sed ad inferiorem intestinorum partem delibantur.

Quidam Ficus aient edendas meridie non esse, quia tum morbose sint, id quod etiam in Crapula Phædrates dixit. Auspophanes in Proagone.

Agratantem verò aliquando ipsam astate cum vidisset.

Ut agraret etiam ipse, meridia Ficus comedebat.

Eubulus in Sphingocartione:

Per lucem ita est. Etenim rectè non valebam, o vir optime,

Ut quæ nuper Ficus edissem meridio.

Nicophon in Sirembus:

Vestrum si quis Ficus meridio

Recentes, postquam epuratis, ch. mis. at, sebr. Cautio à febre.

Chrsi aduenit.

Diphilus Siphonius inquit, recentes ficus & prauum & pauum alimentum præbere, egeri facili, innatare ventriculo, & citius in habitum corporis distribui, quàm siccas.

Demetrius Scepsius lib. 19. Troiani apparatus scribit, eos qui ficis abstinent, esse vocaliores, ideoque Hegesimacha ciuem Alexandrinum, qui historias composuit, cum ihrid pauper esset, eximium Tragediarum actorem & histriorem euasisse, potèque mirum in modum sonora, quia per annos octodecim ficum non esitasset: ideo studiis vocis abstinere sic Græci iubent.

Notum est quod de ficis iactatur prouerbium. Post pisces Ficus, post carnem legumina.

De quo, quia extat apud Eras. in adagiis, plura non dicemus.

Baptista rictus vites qualdam ficum breui nec ineleganti carmine complexus est:

De illis etiam Eob. Hessus:

Ergo tot inter spes regnantis fructibus anni,

Prima locum merito Ficus & una tenent.

Vtraque nam succu implet melioribus, & nil

Quæ nocent vitii damna ferentis habent.

Detestum, inquit Paulus, ficorum, plerique Sireon appellauere: quod & desinit quoque nomen est. Hippocrates Sycion.

Posteritatis obseruationi tribuendum, ficos cū fermento tritas, admixto sale, pestem atque vlcera vel tumores emollire adeò ut intra paucos dies abscessus rumpatur. Eodem tamen medicamento Regem Ezechiam vltum fuisse (2. Reg. 2. 20.) existimat Tragus.

Matthioli sibi experimento compettum esse tradit caricas duas aut tres nocte vna in aqua vitæ maceratas Astmaticos inuare, qui manè eas deuorauerint. Ad nephritidem & dolorem colicum experimentum excellens & præsentaneum eiusdem, vtille ait: Caricarum albi, Græci ana M. l. coquantur in lib. 1. C. vini ad consumptionem tertie partis, cum sale pauco iniiciatur per clysterem, sordes multas ad flauas educit. Ficum decoctum calidum infantibus propinatum, cæthymata & exanthemata protrudit.

Ficulneo lacte vermiculoso, sanantur aures: & ficulneis foliis faciliè afflicti citantur hemorrhoides, qui hodie vulgò facillimus & tutissimus habetur hemorrhoides excitandi modus. Practici quoque & ad promptè maturandos panos caricis decoctis (quibus tamen vel solis magnam in coactu tribuunt vim) addunt radices Lili, Altheæ, cæparum &c.

Si quis ictus, vel demorsus ab animali venenoso, is insillat tres, vel quatuor guttas lactis ficulnei supra vulnus, & mirum, teste M. zaldo, inueniet præsidium.

Rondeletus in sua praxide calculo renum non vult in Enemate addi ficus, quia inquit vesica nocent: quæ verò possit esse ratio nec addit ille, nec nouimus ipsi. Arenulis expellendis opportunas

Impugnatur.

Experimentum.

Glutinosa.

Disiectum moueat celerior.

Cur promptè excreantur? Cur salum succum generant.

An frigida vel calida. post ficum quam bibenda.

Post sumptam ficum. largius bibendum Meridie non edendum.

Cautio à febre.

Recentes.

Abstinentia à ficum.

Prouerbiū de ficum.

Sycionum.

Ad pestem.

Experimentum ad Asthma.

Aliud ad Nephritidem ex coactu.

Exanthemata. Haemorrhoides.

Ad ictum animalium venenatorum.

Pediculi. Suprà diximus ex Galeno. Ficum frequentem v-
sum pedunculos generare prater Galenum, &
Paulus Aegineta, & Orisbalus, & posteriorum
quampulurimi, ipsèque aded vulgus, persuasum
habere, causamq; referunt, quod malum generent
sanguinem. Quod si certum sit eas pediculos
causare, (nondum enim hoc omnino nobis com-
pertum) malum equidem causam referre ad id
quod nimis impingunt, vti dictum, & quod vi
sua Diaphoretica, quā & exanthemata protru-
lunt, carnez molis & cutis excrementa in cor-
poris superficiem expellunt, sicque occasionem
præbeant generationi pediculorum.

Superfluitas Cardanum. Hactenus abunde de seriis, nunc ex alijs enu-
meranda naturæ aliquot miracula, si non potius
figmenta. Referunt nonnulli apud Cardanum
expertumque esse dicunt, folio Ficulneo conta-
ctas verrucas aboleri, si solum ipsum sepiatur.
Sed quid sepultura hæc foliorum? forsitan etiam
insepulta idem efficiunt. Ficus albas in somniis
boni quid denotare, nigras verò inopportuno
tempore, calumnias & detestationes. Porta scri-
bit. Hæc somniorum prudentem! At idem: fi-
cus quia habent frondes nervis conspicuas, idem
earum cinis nervorum vitis & contusionibus
illinitur ex oleo. O diuinatorem egregium! Co-
chlearia ex ficulno ligno facta, hoc habent pecu-
liare, [inquit Keckerman. ex Mizaldo] quod car-
nes ad celerem concoctionem adigant, si elixatio-
ni earum lapidis admoueat. Cur tantus Philo-
sophus vocabulum Quia non adiunxit?

Philemon. Lepidum, quamvis sinistri euentus est, quod
Cicero alicubi de Philemone poeta refert: is
conspicatus ficubus vescentem asinum, quæ in
prandium paratæ erant, tanta vehementia cœpit
ridere, vt statim emoreretur.


Fabula de Coruo Apollinis. Non insubide nunc fabulam Corui Apollinis
& alias quasdam Coronidis loco subiiciemus.
Tradunt, aut potius fabulantur Poëtæ, sacrifi-
cantem Apolline, coruum, qui in eius tutela esse
dicitur, ad fontis puram aquam asportandam mis-
sum. Vidit hic ficorum plures arbores, & in his
fructus nondum maturos: ac in earum aliqua
confedit, expectaturus nimirum, dum eius fru-
ctus maturefcerent: quod ubi euenit, plures à
Coruo ad saturitatem vsque comestæ sunt. Cuius
moram, tam eius quam maturitatis, vtpote non
parvam, pertæsus Apollo, quum etiam re alia
ad sacrificandum vti necessarium fuisset, Coruum
hac pœna atque ignominia vitus, vt quoad Fici
maturefcerent, bibere posset nequaquam. Per
illud enim tempus guttur pertusum habet, vt
propterea aquam minimè haurire possit. Aliter
alii: vt Quid in secundo Fastorum. Dum Iupiter
festum solempne appararet, coruum, vt aquam
ferret, misit: qui, vt iam dictum, dum Ficus ma-
turandas expectasset, quas prius rostro immatu-
ras deprehendisset, diu immoratus, & Ioui mo-
ræ causam mentitus, [Nam illi aquarum obfesso-
rem hydram affirmarat] Ob quod mendacium in
sydus cœleste commutatus, si credere fas est.

**Forma et im-
pugnatio.** Eadem aut simili incude & hæc fabricata fabu-
la. Ficus arbor fuit in qua Aæcus Iouis & Agi-
næ filius formicas vidit, quas in sociorum ob pe-
sultentiam amissorum, solatium, in homines con-
uertere desideravit. Quod si ita euenit: qui deinde
Myrmidones dicti. Iuxta Elenfinem Atticæ ciui-
tatem, & propè Cephissum fluvium fons est, quem
Capitium appellant, quo Plutonium, rapta
Proserpina, ad inferos descendit: fama est. Pau-
sanias in Atticis. Nondum innotuit nobis ex quo
fonte habeat hoc Curus, quod tam categorice

nullaque hesitatione scribat Adamum & Enam
post in Deum prauaricationem factam, cum se-
nudos cognouissent, fici [ac huius quidem fici de
qua ibi tractat] folia consuisse, & subipsis perizo-
mata confecisse.

ARBOR PEREGRINA, FRUCTVM FICVI SIMILEM GERENS.

CAP. LXVI.



Descriptio
Cris sit hic
ramulus & Clu-
sium & Paluda-
num, qui ramu-
lum describen-
dam Clusio de-
dit, later. Erat
autem cum suo
fructu in vuz
modum quasi
congesto, refic-
catus, durus,
crasso cortice
tectus, gracilis,
& digitalis lon-
gitudinis, colo-
ris ex fusco ei-
neracei, octo
fructus exiguor-
um Ficum in-
star, crasso bre-

uique pediculo subnixos summo fastigio susti-
nens, fuliginosi coloris, cineraceis maculis con-
spersos, duos, & satis solidos: vt quandam affi-
nitatem habere viderentur cum Sycomori circa
Tripolim Syriz nascentis fructu, descripto à
Rauvvolfo, nisi ipse Paludanus, qui Sycomoros
in Egypto & Syria viderat, Clusium ab ea sen-
tentia submoueret. Caterum, similem fructum à
Iac. Gareto missum Londino, Francosurti ad Mo-
num accipiebat Exoticorum author, non tamen
tam copiose ramo inhaerentem, sed singularem
duntaxat, vel interdum geminum, suis pediculis
simul connexum.

Quum porrò hic fructus ficui vulgari valde
sit similis figurâ, & nonnunquam etiam aded pu-
sillus, vt Cicero magnitudinem non multum ex-
cedat: an ad ficus Indicas circa Acesinem amnem
nascentes referri non possit, cuius Theoph. Hist.
plant. lib. 1. cap. 12. & lib. 4. cap. 5. mentionem facit
Verum is negat copiosum fructum ferre, & ex
Fabriciana relatione, singulares inter folia, vulga-
rium ficum instar, nasci deberent. An verò fru-
ctus arboris Gagey, quam describit Ferd. Quiet.
cap. 13. lib. 8. 1. part. general. & nat. Historiz.

FICVI SIMILIS FRUCTVS.

CAP. LXVII.

Descriptio
Fructus exoticus, quem Clusio misit Iac. Pla-
teau, non valde absimilis erat fructui, qui im-
maturæ ficui similis esse scribitur, cum forma,
tum magnitudine, & colore: etenim durus erat
& solidus, levis tamen: eius color ex fusco cine-
raceus, albis maculis aspersus, nec alia ratione
ab illo differre videtur Clusio, nisi quod hic gra-
culore pediculo esset præditus: an verò plures in
vno

LIBER PRIMVS

Vno ramulo braserint, vtili, ignoratidem, quia
singularem accipiebat.

PIMPINICHI ARBOR

LACTESCENS.

CAP. LXVIII.


Descriptio In omnibus continentis Indiae oris, inquit Mo-
nardes, lacteus quidam succus eliditur ex arbu-
sculis Malorum similitudine: Indi Pimpinichi
vocat: de cuius ramis recisus lacteus humor illico
emanat, aliquantulum densus & viscosus.

Vires. Huius succi tres aut quatuor guttae sumptae,
Purgant. validissime per alium purgant bilem & aquas.
Pulvis. Bibitur ex vino, aut desiccati pulvis deglutitur
paucis quantitate propter nimiam vehementiam.
Illud autem peculiare habet, quod si quis illo
Peculiaris sumpto iusculum, vinum, aut aliud quid iniciat,
Ca. subito eius operatio infringitur & cessat. Sed eo
Temperamentum. sumpto, à somno abstinendum. Calidus est &
siccus hic liquor in tertio gradu: ideoque vali-
dum nimis & perniciosum medicamentum. quo
etiam sicut & alius eiusdem generis, uti desitum
est, adueto Mechoacam, de quo suo loco.

FICUS INDICA.

CAP. LXIX.

Descriptio
Ca.



Ficus Indica autem Clu-
lio in magnam
altitudine vni-
co trunco co-
que admodum
crasso assurge-
re solet: ramos
deinde in om-
nia circum late-
ra expandit, qui
tenues quas-
dam fibras siue
filamenta [qua-
lia in Cuscuta
vulgo nuncu-
pata conspici-
mus] colons
dum recentia
sunt, arci siue
aurei demittit.

His ubi terram
attigerint hemantur, novamque quasi soboli ge-
nerant: etenim magnam crassitudinem paulatim
acquirunt, & veluti in nouos arborum caudices
transcunt, qui novos rursus summa sui parte in
latera ramos spargentes, nouis denuo fibris deor-
sum missis sese propagant. Sic alii deinceps rami
in infinitum, ut interdum vnica arbor suis pro-
paginibus integrum ferè militare Italicum in am-
bitu occupet, siueque difficile, quæ primaria sit ar-
bor, siue omnium ultimum prolium parens diu-
dicare, præterquam ex trunci amplitudine, quæ
nonnunquam in matre tanta est, ut trium tro-
pum vltis præ apprehendi queat. Verum non
modò inferiores rami similes fibras spargunt, sed

Toti. I.

etiam in arbore summi: ideoque vnica arbor
densissimam syluam efficit. Sub eas autem ar-
bores aditum sibi paratur incolæ fibras tam in
truncos, conuersas, tenuiores scilicet, excindere
solent, atque ea ratione veluti concamerationes
& umbracula facere, arcendi caloris gratia: adeo
enim densis ramulis reliqui maiores rami luxu-
riant, ut Solis radij nulla ratione penetrare queat:
immo concavit istarum fornicum multiplicesque
sinus scindunt inæqualiter inde resultantem aëra,
quæ causa est, ut Echo multis in locis ter atque
etiam sepius humanas voces reddat. Vidit verò
qui hæc retulit D. Fabricius Sclenitanus, qui ali-
quot annis in Indis vixit: interdum octingentos
aut mille viros, quo in numero & ipse fuit, vnus
huiusmodi arboris umbrâ tegi: atque affirmabas
etiam hominû millia sub tali arbore latere
posse. Folia fert in nouellis ramis Mali cotonei fo-
lia similia, superius viridia, inferius candicantia,
& lacugine, uti illa, pubescentia, quæ mirum in
modum ab Elephantis expetuntur, ideoque in eo-
rum pabulum cedere solent. Fructus extremi pol-
licis articuli magnitudine, ricibus exiguis similis,
colore foris & intus sanguineo, granisque, uti
vulgares Ficus, plenus, dulcis quidem & edulis,
verum saporis minus grati quàm illæ. Nascitur
autem inter folia, quemadmodum vulgares Ficus,
hoc est, in nouellis ramis, qua parte folia illis in-
herent.

Ioan. Hugo Linschot. qui ante paucos Annos
Goa rediit, eius iconem exprimit, sed longè ab hac
nostra diuersam: etenim non singulares radices
è ramis dependentes, verum innumeras, illasque
adeo multifidas, ut vix arborem aut fruticem tam
varie multipliciterque locatas radices habere pu-
tem: hanc ob causam valde suspecta ea est.

Guardam huius arboris nullam mentionem fa-
cere, satis mirari nequeo.

Indica regio inquit Theophrastus arbore Ficum
appellatâ gignit, quæ è ramis radices demittit sin-
gulis annis. Demittit autem non ex nouellis, sed
ex anniculis, atque etiam vetustioribus. Illæ se-
terre inferentes veluti sepem circum arborem ef-
ficiunt, ut fiat veluti tabernaculum quoddam,
sub quo & homines degere solent. Radices autem
enascens manifestè à ramis discernuntur: sunt
enim candidiores, hirtæ, [sæpius] ac tortuosæ, bi-
naque fronde foliatæ. [disquali.] Ipsa arbor co-
mam supernè lasciuam gerit, [Ipsi si tu] amplexu
[mollis] totaque fornicato ambitu pulchrè orbi-
culatur, & magnitudine vehemèter excellit, quip-
pe umbram bino stadio facere fertur: & crassitu-
dine caudicis plerasque ultra quàm sexaginta gra-
dium [Bipedum, pedis vestigiorum. Plin. passuum]
orbem colligere, magna verò ex parte quadra-
ginta. Folium pelta non minus habet: [potius ad
similitudinem quàm ad amplitudinem referenda
hæc comparatio. Clus.] fructum admodum per-
uum magnitudine Ciceris, Ficui similem: quam-
obrem Græci Ficum eam arborem appellabant.
Pancos verò admodum fructus fert: non tantum
pro arboris magnitudine, sed etiam omnibus re-
bus. Cur autem adeo exiguum & paucum ferat
fructum, idem Theophrast. causam reddit hæc,
nempe quod ad germinum efformationem to-
tum penè absumat alimentum: nam cum folio
amplissimo sit, etiam radicum ab eius foliis demis-
sarum generatio, nutrimenti causa videtur acce-
dere. Sed fortè è diuerso, ut quoniam in ea quo-
que pabulum dispensatur, ideo fructus exiliore
atque parcids proferat.

Nec à Strabone omilla fuit hæc arbor, quam si

*Arbor ad-
mir.* non nomine expresse at lemmate manifesto des-
cribit, tali. India multas quidem admirabiles ar-
bores fert, & quibus vna ramos ad terram pro-
nos habet, frondes [alia folia vertunt] non mi-
nores clypeo.

*Taberna-
culum mul-
ti columnis* Onesicritus, qui curiosius ea persequitur, quæ
sunt in Musicana terra, Indix australissima, refert
arbores quasdam ingentes esse, quarum rami,
cum ad duodenos cubitos creuerint, reliquum
incrementum prouinciant, de flexi, quousque
terram contingant. Deinde terram ingressi radi-
ces agunt velut propagines: mox rursus in trun-
cum exeunt, à quo postquam aucti fuerint, inde
flectuntur, & aliam propaginem efficiunt & dein-
de aliam, & sic deinceps, ut ab vna arbore um-
braculum fiat, tabernaculo multicolunio simi-
le. Narrat præterea miras arborum quarundam
magnitudines, quarum stipitem vix quinque ho-
mines complecti queant.

*Ficus Indi-
ca.* Aristobolus ubi Acesines Hyarotidi permisce-
tur, de arboribus dicit, quæ ramos deflexos ha-
bent, & de earum magnitudine, ut sub vna arbo-
re quinquaginta equites meridiani possint. Neat-
cus verò quadringentos ait.

Curium. Ficum Indicam mirata est & Alexandri victo-
ria, eo orbe patefacto, digna quidem, quam non
solum ipse Alexander, ingenii sui nobilitate & sa-
gacitate, atque omnis eius ingens exercitus de-
miraretur, sed ceteri quoque quotquot mortales
sunt, de qua Q. Curium in Hist. ærum ab Alexan-
dro gestarum tradit [licet Fici nomenclaturæ non
meminerit.] Alexandrum Poro regē, & Hydaspē
amne superato, ad interiora Indix processisse. Syl-
uas autem propè in immensum spatium fuisse dis-
fusas, procerisque & in eximiam altitudinem e-
ditis arboribus: plerosque ramos instar ingen-
tium stipitem flexos in humum, rursus quæ se
curauerant erigi, adeo ut species esset non rami
resurgentis, sed arboris ex sua radice generatæ.

Plin. Plinius verò hanc arborem ex Theophrasti
placitis [qui Alexandri coætaneus fuit, & quæ
adiutorum hominum narrationes haud dubiè
magna diligentia excepit] descripsisse videtur.
sed tam eleganter, ut, quod Scal. ait, sub ea æsti-
uare potius, quam eius historiam legere videaris.
*Enthia po-
ma.* Ficus, inquit, ibi [in India] exilia poma habet. I-
psa se semper ferens, vallis diffunditur ramis:
quorum imi aded in terram curuantur, ut annuo
spatio infigantur, nouamque sibi propaginem fa-
ciant circa parentem in orbem, quodam opere
copiatio. Intra septem eam æstuant pastores, o-
pacam pariter & munitam vallo arboris, decoris
specie subter intuenti, proculve fornicato ambi-
tu. Superiores eius rami in excelsum emicant,
siluosa multitudine, vasto matris corpore, ut
LX. P. pleræque orbe colligant, vmbra verò bina
radia operiant. Foliorum latitudo peltæ effigiem
Amazonicæ habet: quæ fuit, auctore Xenopho-
ne, Hederæ folio consimilis, ut sub ea equitum
turmæ condantur] ea causa fructum integens,
crescere prohibet. Rariorque est, nec Fabæ [Cice-
tis Theophr.] magnitudinem excedens: sed per
folia solibus coctus, prædulci sapore, dignus mi-
raculo arboris. Dixerat autem iam prius, arbores
in Indix præteritatis gigni, ut sagittis super-
cari nequeant. Hæc [addit] facit vbertas Soli,
temperies cæli, aquarum abundantia [si libeat
credere] ut sub vna ficu turmæ condantur equi-
tum. Ut deinceps nemini amplius dispiciendum
dubitandumque videatur, num arbor hæc Vete-
ribus cognita fuerit, quorum iam tot descriptio-
nes, & vix in pauculis dissentientes produximus.

Eiusdem meminit Athen. sed paucis duntaxat
verbis ex Theophr. mutuatis.

Cæterum propositarum descriptionum vnus
eiusdemque arboris collatio, perspicuum reddit,
qualis & quanta sit Ficus Indica. Vnum relictum
nobis est à Theophr. dubium, qui arboris trunco
LX. Cytææ adscripsit, quæ gradus Gaza vertit, quæ
vox & fellam, suggestum, pulpitem & subsellium
denotat, ut annotat Scal. Sed & passus mensu-
ram denotat apud Plutarch. in Demetr. Vulgata si-
gnificatio gradus est, quem Boëtius gradum inter
mensuras numerauit duobus pedibus & dimidia-
to definiens, quò videtur Cytæa Euclidis interpre-
tari. Georgius nullum scriptorem inuenit qui
gradus vel *βήματα* mensuram usus sit, & ea loca
quæ obici posse videt, aliter exponit, qui tamen
Goropio minimè probatur hac parte. Si de Plinio
Theophrastus intelligi posset, *βήματα* non gradus
sed pedes essent vertendi.

Est & alia difficultas, nam Theophr. folia, & qui
horum meminerunt amplissima dicunt, atque a-
deò pelta seu clypeo non minora esse. Clusius
verò ex supra dicta Fabricii relatione, Mali Cido-
niz vel Cotonei foliis similia dicit, peltæ verò si-
militudinis potius quam amplitudinis gratia con-
ferri.

*Linsehotte-
nus.* Linsehotanus qui ex postremis Ficum Indi-
cam describere videtur, nomine Arboris radicem,
foliorum ne verbum quidem meminit, videtur-
que descriptionis suæ membra quedam, aut qui
eius observata Latio reddidit, ex Plinio suble-
gisse: sic enim habet. India arborem fert multi-
plici radice, mirabili aspectu. Crescit enim è terra
ut extera arbores, ac spargendo ramos radices his
aducit, quibus denud sua sponte terræ infixis, in-
gentem ferè numerosa sobolem trahit, cum ra-
mus vnus arbori recenti, secundo euentu, Laby-
rinthoque similis, vagis vsque itineribus sufficiat.
Ita triginta aliquando passus vna arbor implet, in
summam crassitatem productis ramis, ut mater ea-
demque genitrix omnium arbor vix agnoscat,
ex omni parte copia radicum funium more pri-
mo aspectu dependente. Fructum vsibus huma-
nis aptum non fert. Nam is qui Oliuarum formam
excreuit, volucres tantum delectat. Hæc ille.

An verò vnicum Clusium vel eius recitatorem
Fabricium tam spectatæ antiquitatis, Theophr.
inquam, Straboni & Plinio. opponere debeamus,
sola vnus testis relatio id haud ita temerè per-
suadebit. Goropius verò tantum abest, ut cre-
dat, folia eius exigentia esse, ut planè sit in ea opi-
nionem, Ficum Indicam eam esse arborem, cuius
fructum veterum primi parentes comederunt, &
sub qua se absconderunt, cuiusque ingentibus
foliis (sic ille ait) perzomata sibi conuerunt, at-
que fecerunt. Viles (inquit) quam omnia in-
ter se consentiant: Nomen ipsum Ficus cum Mo-
se consentit. Impia est illorum cogitatio, qui arbo-
rem hanc symbolice duntaxat intelligunt, in
quorum numero præcipuus Philo Iudæus Col-
mopira. Lex quæ de ea re scripsit Corn. Agrip-
pa, & opinionis nouitatem prauitatemque mira-
beris, fortè & ridebis.

Idem Goropius in Vertumno. Primi nostri, in-
quit, parentes, cum serpentis fraude seducti veti-
tum pomum comedisent & nomen ei dederunt,
quo eius abominatio indicaretur. Fygenim dici-
tur per Apocopen Fygy, (Cimbris) id est, tu abo-
minande. Hinc Latini Ficum serè, & Græci cor-
ruptè *κῆρος* nominarunt. Hi Goropii conceptus
sunt & opiniones, quæ si vera esset Clusii de
foliorum magnitudine sententia, per se ipsa fa-
cile in nihilum abirent.

Dicta

4

**Mangle
Cards!**

Ceterum quamvis et ipse Quedi non exigua cognitionem habere videatur cum Ficus Indica, quod multi eius rami deorsum quoque vergere videantur, & postea radices figere, illosque rursus ramos sursum vergentes producere: verum quia arbor filiquata est, magnas & speciosas profrens si quis, nostri memores ordinis institui, commodius de ea trademus post Cassiani solotinnam, in libro filiquosarum, quamvis Hist. Lugd. eodemque capite huius & Ficus Indicæ hystoriâ coniunxerat quemadmodum. Clesius: Ferdinandus Lopez Mangin nos relegendum ad caput de Mangle quod est in libro. nostr. hister.

С. П. LXX.

Impress-
ion press.

Cong. partem perluentis sita, nascitur arbor, *Exzanda* ab incolis nuncupata, celsa & semper virescens &c.

Tom: I

Cap. LXXI.

Description

CA P. LXXII.

Description

Cornu fi-
molas fran-
cisi.

Cap. XLV.

The upbr.
corr. & it
instr.

Plinius tamen nomina habet prima: nam postquam Scipio de Ficu Indica tradidisset, ita subdit: Maior alta, pomo & suavitare præcellentior, quo Sapientes Indorū viuunt. Folium alas auidū imitatur, (videtur Plinius primā & secundam Theoph. confundere.) longitudine trium cubitorum, latitudine duūm. Fructum cortice emittit, admirabi-

Plus vite.

N 2

*Pala ar-
bor. Ariana
fructu.*

Item succi dulcedine, ut vno quaternos satiet. Arbori nomen *Pala*, pomo *Ariana*. Plurima est in Sydracis, expeditionum Alexandri termino. Est & alia similis huic, dulcior pomo, sed interaneorum valetudini infesta. Edixerat Alexander, ne quis agminis sui id pomum attingeret. Vbi vides Plinium sapientem quidem, sed non Nudorum, quod Gaza fecit, meminisse.

Xala.

Pala, inquit Curtius, siue ut alii volunt, *Tala*, licet Theophrastus nominis non meminerit, Arbor Indica est, Fico Indica maior, pomi suauitate precellentior. Indos *Pala* foliis velci Arrianus refert, in quorum fastigio quoddam pingue, Palmarum instar, gignant.

*Quorum
dantur.*

Dalech. arborem *Palam* Plinii ait esse, qui Tamarindos nostros putent. Qui verò ij sint, qui istud putent, nondum occurrit: neque sanè videmus quomodo conuenire possit. Dicit Plin. dulci pomo: Theophr. cibo dulci: [*id est* *δουλο-
δουλο*] quod neutiquam videtur conuenire cum Tamarindis, qui ob summam aciditatem commodè edè nequeunt. Quidam Musam esse putant. Ouedus Platanos vocat. Theuetus arborem vocari ait *Pagunere*: fructum *Patona*. Vtrumque nomen ad *Palam* quodam modo accedit. Alium huic similem & vltus frequentissimè Theuetus scribit vocari *Hoyrin*. Ouedus *Isama*. Sed de Hoyrin inter carduos, de Musam qua propriè ad prædictas arbores accedere videtur, nunc trademus.

*Pacouere
pacoua.*

M V S A.

CAP. LXXIV.

*Descriptio
sily fici.*

EX folii Musæ fragmento, quod adseruamus, apparet esse amplissimum: nam & latitudo cubitum facillè æquat, cuius medium costâ crassiusculâ striatâ fungosâ fuletur, à qua utrinque exporrigitur folii tenuis lauisque inoffensam æquor, fibris teneris transversis contextum: colore rano altera facie, altera ferè fusco, quod fibrarum ductus secutus, facillè diuidat.


*Descriptio
Ouedus ar-
boris.*

Musam Ouedus in hist. Indica sic describit. Inuenitur, inquit, hic fructus Platanus nomine, tametsi neque arbor dici possit, neque vera sit Platanus: sed planta quædam huic Indica haudquaquam peculiaris, & aliunde translata sub Platanus nomine.

*Platanus
Indica.*

Musa arbor.

*Arboris
crassitudo.*



Interdum autem hæc impropiè dicta Platanus in arboris celsitudine excreuit, & ad hominis crassitiem intumescit: aliàs verò coxæ humanæ crassitiæ conspicitur, pro soli natura & vbertate angustens. Ab infimo ad summum folia fert amplissima, interdum duodecim palmos longa, ternos aut quaternos lata, plerumque minora. Hæc ventorum flatibus facillè mulsa

Musa cum fructu.



dissecantur, & ex costâ illa per folii longitudinem excurrente pendere spectantur eū in modum dissecta. Tota planta veluti germinans est, aut surculus, è cuius summo enascitur pediculus aut malloclus brachiali crassitudine, qui vñ producit, vicinos, tricenos, interdum centenos & plures fructus palmari longitudine, brachiali crassitudine, sustinentem, nonnunquam minores, quandoque etiam ampliores,

Cortex.

pro plantæ ipsius & soli fertilitate. Cortex huic satis crassus, sed qui facillè eximatur, continens pulpam siue carnem bubulæ medullæ persimilem. Caudex qui vñ profert, annuus est, & semel duntaxat in vitâ fructus gignit: verum ad radices consurgunt quinque, sex, aut plures surculi, qui parentem renouant, & subsequente anno fructum perficiunt. Adcò verò secunda est hæc planta, ut nunquam intercidat, sed subinde nouas proles gignat, ut fructus toto anno vberimè legere liceat.

Surculi & folia.

Arbor, quæ poma fert Paradisi inquit Cardan.] breuissimæ est vitæ: anno enim secundo truncus arefcit, fructus fert in botris, ut sunt acini vñ, sed mali magnitudine, ac in botro vno quandoque centenos, vnde cistæ magnitudinem refert botrus: croceo verò velatur amictu, quo detracto fructus prædulcis, ac suavis subest. Folium tam longum fert, ut hominem stantem æquet: latum non parum.

*Poma Pa-
radisi Cardan.*

Theuetus in Cosmographia arborem Mauze in Egypto vocatam describit non maiorem ficu mediocri, cuius folia quinque aut sex pedes longa sunt, duos lata: fructus in caule coaceruatus non secus ac dactyli in Palma, crassius & longus, mediocri cucumeris instar, delicatissimus atque suauissimus, quem domi suspendunt, ut nos vñ pensiles, eoque sæpè solo tanquam optimo vtuntur alimento. Arbor tenella est & fragilis, adcò ut nisi maximè truncum haberet coxæ hominis crassitudine parem, nimia tibi, in creniorum, non in arborum numero, recensenda foret. Truncus, auctore Garcia, ex squamoso foliorum cortice constat: nullis constat ramis, sed è germine flores quosdam coniunctim profert, subrosos, oui effigie, & palmi longitudine: circummeminent pediculi, centum, interdum ducentos aut plures ficus sustinentes.

*Theuetus
Mauze.*

Flores.

Describit & Acosta in hunc modum, Musam seu Ficum Indicam vocans: decem & octo aut viginti (inquit) palmorum magnitudine attollitur hæc pulchra & elegans arbor, cuius truncus ex multorum corticum sibi mutuo incumbentium coniunctione constat, & humani cruris crassitiem adipiscitur, radice rotunda & crassa, Elephantorum grato pabulo: foliis nouem palmorum longitudine, duorum eam sensu latitudine

*Musa Aco-
sta. Ficus
Indica.*

Radix.

dine, neruo satis crasso per longitudinem excurrente, & transversis fibris in latera sparsis, parte superiore laticius, inferiore dilutionibus. Ex huius arboris fastigio nascitur veluti thyrsus quidam florum simul congehorumque modum Pinei floribili, coloris rufi: deinde vineam ramum fert humani brachii crassitie in multos nodos diuisum, e quorum singulis decem aut quatuordecim dependent ficus, ita ut nonnunquam ramus centenis aut ducentenis ficibus onustus conspicitur. Hos in diuersas species distinguunt Lusitani. Illi enim primo *Cenotus* appellant qui admodum flauent, laues, longiusculi, gratique saporis sunt, & odoratiore: 2. *Chimapanes*, verò, qui virescunt nonnihil, longioresque sunt, tique etiam grati saporis. 3. Laudantur præterea qui in Cosala nascuntur, *Ethiopiis Indica* dicti. Legitimum nomen apud Arabes & Persas (ut è præstante Medico Persa in Ormuz nato intellexisse se testatur idem Costa) est *Mus*, non autem *Musa* aut *Amusa*: arboris verò *Daracht Mus*. Rhafis *Musam* vocat: Serap. *Mamm*, id est, *Musam*. Sic & Auic. apud quem in margine *Manzi* vel *Manzi* annotauit Bellunensis. Verum neuter horum describit. Sed nostro iudicio, recentiorumque consensu, hanc ipsam intelligunt, de qua hic agimus.

Ex prædictis, si Clus. iudicio aliquid tribuimus, nemò accuratius hanc stirpem descripsit, quàm Quiedus sub Platani nomine. Acolia peculiarem habet iconem, quæ variat à Matthioli (quam & nos proponimus, cui nostrum folium egregie respondet) & Linfchottancone, & à Paquiere figura Theueti.

Hist. Lugdun. tres icones proponit: primam, eamque geminam, ex Matth. nomine *Musa* arboris & fructus: secundam, titulo *Musa Paruera* Theueti: tertiam pro *Musa* seu *Ficus Indica* Acolia, qui ait *Musa* fructus memorasse Ruell. ex auctoritate Theoph. & Strabonis.

Nondum tamen pro certo asserere ausimus, an Veteres Græci *Musa* meminissent: consideranda quæ Theoph. lib. 2. hist. pl. narrat. & inter *de Palma* Palmas, his verbis: Est & aliud *Palmarum* genus in Cipro, quod & folium laticius habet seu arboris, & fructum multò maiorem peculiarique forma, magnitudine Mali Punici, figura oblonga, lucco minis grato [ἐξ ὧν] quàm in cæteris, sed radicibus similem [καὶ ὡς] Dal. vult legendum *καὶ ὡς*, id est, Punice simili. Sed ferri potest antiqua lectio, si modò de hac arbore, de qua hic agimus, intelligendus sit Theophrast. Nam & antè dictum eius radicem rotundam esse & crassam. Itaque non deuoratur, sed comansus expuitur. Consideret etiam lector quæ paulò antè scripsimus ex Theophrast. de *Arboribus Indiciis*, & ex Plin. de *Palma*. Quæ verò ex modò citato Theophrast. loco verba transcripsit Plinius, eacapite *de Palma* [quod & ipse fecit] retulimus.

Matthiol. in Diolcor. Sunt, inquit, qui palmarum generi adscribant plantam in Aegypto Ciproque nascentem, quam Veneti inde redeuntes *Musam* appellant, & *Musa* similiter fructus. Inclinat animus eam esse quæ Theophrasto in Palmarum genere recensetur folio cæteris ampliore & c: ut iam modò citatum. Idem tradit ex quorundam relatione folia arundinea esse, correscere æstate sui natura, vel etiam fortasse Solis ardore, adèd ut mense Septembri eorum cortice prorsus nudæ cernantur, decedente foliorum materia, quod admodum sit tenuis. Caudex [addit idem] squamoso foliorum cortice vestitur, *Palmarum* aut *Arundinis* ferè

modo. Ramos habet nullos, sed caudice tantum constat. E vertice germen emergit materie molli, longitudine serè cubitali, à quo alia ab origine ad summum prodeunt germina terribilia, quaternumque digitorum inuicem distantia: e quibus circumninent fructus parui, cucumeris magnitudine, qui per maturitatem qualescunt flauescunt, cortice Fici, qui eodem modo digitis detrahitur. Substantia pulpa consistit Melopeponum modo, nullo intus osse neque semine: sapore cum quadam insipiditate dulci. Primùm gustibus fructus insipiditatem quandam præ se ferre videntur, adèd ut primo statim gustu non placeat: verum qui esui assuescunt, inde magis delectantur: quippe qui quadam occulto saporis suauitate allecti, quæ nisi tractu temporis cum palato in gratiam, nunquam satiri videantur.

Ita sibi *Musa* descripsisse tradit Matthiol. qui ex Aegypto & Cipro ad nos reuertuntur. Sed quænam antiquis *Musa* fuerit planta qui referat non habere: sibi tamen videri eam esse Theoph. Plantam, quam paulò antè diximus, addidit eisdem verbis.

Matthiol. in præf. suo contradicens Guiland. in la. *Guiland.* *Musa*, inquit, certio à Theophrasto inter *Cyprius Palmas* loco describi, malè coniecit, quod fructus huius saporis non sit, sed radicibus similis, ut non deuoretur, sed sicut tantum expressio, expuitur. *Musa* verò, vel ipsomet [Matthiol.] teste, longe omnium suauissimus est saporissimisque.

Idem Guiland. plantæ huius tribus tantum in locis vniuersis Bibliis, sub nomine *Budaim*, mentionem haberi annuaduerit: & ab Aeschilo, antiquissimo Tragico, *Phrygiæ* nomen à cæteris ferè Græcis iuxta atque Latinis *Margaritæ* à Mauritanis *Muz* & *Gemez*. Qui Cyprium incolunt, *Musa* & *Musa* vocant, argumento à vulgari Asiaticorum opinione ducto, qui *Musa* esse contendunt eam plantam, quæ hominum omnium protoplasto, diuino olim mandato in cibis interdicta fuit: quod imitati nostrorum temporum scriptores, *Pomum Paradisi* nominant. Rhafis Ficus Pharaonis dici memorat, ut idem Guil. censet. Indi, qui in orientem protendantur, *Melapolanum* nuncupant: qui in occasum, *Platanum*. Deique in quilibet insula D. Thomæ, *Abellanum*.

Camer. annotat, Aegyptiis, apud quos copiosè inuenitur, hodiè *Musa* vocari. Antonii *Musa* coniectura est, Elatem Plinii esse fructum illum dulcissimum, quem vocant *Musam*, vel ut Mauritanii loquuntur *Muzam*, hoc est, mitem, qui habet *Punorum* crassiorum similitudinem.

Curtius annotat Syriæ accolis [apud quos gignuntur] *Poma Paradisiaca* vocitari, satis admirandaque esse.

Non abs re fuerit & Bonzonem Indicarum rerum historiographum non contemnendum, de hac arbore sub *Platani* nomine tradita referre. *Platani*, ait, longiores quàm crassiores sunt: minores multum maioribus præstant. Arbor ipsa folia sesquipalmi latitudine, quatuor palmorum longitudine porrigit, inter quæ rarius enascitur, qui centum ac plures *Platanos* minores fundit: si verò maiores, vigintiquinque aut paulò amplius. Tenera est hæc arbor, nec nisi semel fructum fert, qui annuo spatio perficitur, & ex ipsis radicibus alii stolones fruticant. Vbi maturus fructus, le-

Germes

Fructus
Specularis
descriptio.

Guiland.

Matthiol.

Palma Cy-

prus Theo-

phrast. non

est.

Budaim

Bibl

Phrygiæ

Margaritæ

Muz.

Gemez.

Musa Pa-

radisi.

Pomum Pa-

radisi

Ficus Pha-

raonis.

Melapo-

lanum.

Platanus.

Abellana.

Elate.

Muzam.

Poma Pa-

radisiaca.

Fructus

matura-

tio

arist.

tiosa.

Differen-

tia.

Cenotus.

Chimapanes.

Indica.

Mus.

Amusa.

Daracht Mus.

Rhafis Musam.

Serap. Mamm.

Manzi.

Manzi.

de Palma

Cypria spe-

cies Theoph.

Theoph. il.

loqr.

de Palma

Plin.

Palma for-

te genus

Matthiol.

Musa.

Folia qua-

lia.

licésque tres aut quatuor latæ, Cucumeris crassitiem nanciscuntur. Ramus hic serè semper C. ficus habet, plus minusc, quæ ut vix in nodum coguntur. Racemi inde quidam ita magni, ut duorum virorum baculo baiulantium onus impleant. Nondum planè maturi scinduntur, cum inter viriditatem & flauedinem etiamnum hæret, tum alibi à trabe suspensi, intra 4. aut 5. dies commodè maturefcunt. Arbor siue planta vnicum duntaxat racemum fert, quæ mox tota detruncatur, ac mensis spatio iustis denud incrementis adolescit, & fructum toto anno ita perpetuum fert, tantq; abundantia, ut communiter Indis in cibi vltus feruat, gustu sanè bono. Decorticantur autem, folliculis instar Fabarum existentibus, licet aliqui tenuiore sint tegmine: interius albescent, ac morso farinam & butyrum dulci mixtione representant, ideo panis ac lacticiui loco seruiunt, simplici victu, quo corpus hominis abiq; alio cibo facillè possit sustentari, ut in India multi sunt, quibus toto vitæ tempore particularis cibus ex ficu est.

Plurimas ac communiores Lusitani *Figos d'ora* vocant, quasi hortenses dicentes, suntque aliquantulum crassiores. Aliæ quas *Seronas* dicunt minores ac extrinsecus leuiorcs, velut optimæ notæ, suauit odore pollent, ac gustu percommodo. *Cadolina* ficus etiam in pretio sunt.

Ceterum maximalis *Chincapulu* est, regionis Malabar. Flauescunt illæ pardi, viriditate exteriori maximâ, largæ ac proceræ, odore suauit, ac aquæ rosæ æmulo. Sunt & aliæ genera. Quæ in Cananor reperiuntur palmæ longitudine, ac crassitudine præsertim, non magnam ibi copiam siccantur, ac demptis folliculis per Indiam, inercaturæ quondam genere distrahuntur. Quando maturefcunt, affiantur plurimum, quod terudè ob acrimoniam, quam in deglutiendo adferunt, non perinde grata sint. Colore introscum rubescunt. Ceterum assatè decorticantur, ac in orbes scinduntur, adiecto vino cassiæque contusâ, præstantia cibi suauissima, etiam supra Cidonii mali assati excellentiam. Ut ceteræ oblongâ scissione finduntur, saccharoque iniecto costæ, condimento probo, ab Indis summo perè expetuntur. Ex ficibus quippe præcipua plebi sustentatio.

Ex omnibus Indis ac Orientis locis inueniuntur, ut & Mosambicæ, Ormuzi, ad oram Arabæ, Malabar, Malaccæ, Bengalæ, &c. Gufarattæ, Decanini, Canarini, Bengaleses eas *Quelli* nominant, Malabares *Palan*: Malacitani *Pyfan*. Etiam in Arabia reperiuntur, quas *Musa* vocant: Hierosolymis, Damasci, Cayri item habentur, ut ab iis accepisse se testatur Linchottanus, qui istis in locis negotiantur: persuasum inde quibusdam, primum patrem Adamum ex hoc genere fructum cum peccato gustasse.

Verùm cum in Testamenti Veteris historia legimus, exploratores Terræ sanctæ racemum vuarum retulisse, cui gestando vix duo homines sufficerent, mihi, inquit idem, huius fructus recordatio sæpè incidit: num talis ille racemus extitisset, qui eodem more ab Indis ad domum Archiepiscopi Domini mei translatus, haud falsi illius historiae imagine apparebat. *Hactenus Linchottanus.*

Annotat Paludanus Ficus Indicas apud Arabes, non *Musam* aut *Amusam*, sed *moru* vocari, arborem verò *Darache* illam. A Brasilianis *Pacana* & arborem *Pagouner*: in Guinea *Bananas*, in Malabar *Palan*, in Malacca *Pican*, in Canara, *Decan*, Gufaratta & Bengala *Quelli*: quæ nomina plera-

que & Musæ tribui præcedenti capite dictum. Quin & idem Paludanus addit à Brocardo in Terræ sanctæ descriptione, Paradisi Melum à O. uiedo *Plaranum* vocari, atque vites supra Musæ dicatas ex Arabibus etiam huic tribuit, quasi eadem hæc cum illa sit, aut certè aliqua eius species suprà dicta.

Paradisi autem *Mala* idem vocati putat, quod amaro & suauit sint gustu, odore item ac colore probentur, gustum quippe acidum dulcedinem habere adiunctum: odorem velut rosarum nates afficere: colorem flauum, pulchrè item videri oculos pascere. Accedere ad prædictas rationes figuras Crucis, quæ obliqua fructus scissione apparent, de quibus Syria Christiani varia referunt, eadem peregrinus ostendentes.

PACOVERA AMERICANA, MVSA, VT VIDETUR, SPECIES.



Arborem *Descriptio*
Hanc, auctore Theueto, syluestres Americani *Pagounero* suo idiomate vocant, quæ nec in Europa, nec in Asia vel Africa proueniat, quæque fortè non temerè præ aliis omnibus mirabilissimâ dicas. Caudicem emittit homine non altiore, crassitudine ea, quam ambæ hominis adulti manus ex æquo capiant & amplectantur, substantia aded tenera, ut cultri acies facillimè penetret. Folia latitudine bipedanea, homine sesquidodrante longiora aut amplius. Eiusdem speciei vidisse se, ait idem, in Aegypto & Damasco, Hierosolymâ redeuntem, sed folia ad ista vix mediæ esse longitudinis. Magna quoque differentia est in fructu: nam huius arboris, de qua hic loquimur, fructus maximus pedalis est, crassitudine cucumeris, ad quem etiam figurâ satis bene accedit. Hunc fructum incolæ suo idiomate *Pacana* vocant, qui probè maturus præcipue est suauitatis facilisque digestionis. Colligunt ante perfectam maturitatem, & in suis cassis recondunt, uti nos fructus nostrates. Crescit in arbore in glomerem seu racemum congestus, triginta aut quadraginta simul proximè sibi inuicem iuncti ex surculis è stipite emerfis, ut in figura apposita videre est. Et quod in hac arbore mirabilius, semel tantum fructum fert, qui magnæ parti incolarum cedit in nutrimentum. *Hæc Theuetus.*

Letius *Paco-aire* tradit esse foliis Lapathi aquatici, longitudine sepédali, latitudine bipédali aut latiori, nec putat tantæ magnitudinis folia vspiam extare in Europa, Asia vel Africa: tenuia esse, ventisque agitata ita discindi in partes ut primo obtutu quis Struthiorum pennas existimet, *Mathioli* addit idem, meminisse Musæ, quæ bene

Racemum
magnitud.

Maturatio
artificiosa
fructum.

Sapor.

Cibus.

Ex ficu dâ-
ranat qui-
dam Gists.
tant.

Ficus hor-
tensis.
Seronina
Cadolina
Chincapulu-
na.

Cananori-
na.

Caudica.

Typha:

Locus.

Synonyma

Quelli.
Palan. sy-
sam. Musa.

Fructus
peccati.

Racemus
Terra san-
ta.

Moru.
Darache.
Pacana.
Pagouner.
Bananas.
Palan pi-
can. Decan.
Quelli.

Paradisi
Mala.
Plaranum.

Cur para-
di. Mala
di. Ta.
Sayer. O-
dor. Color.

Figura
Crucis in
fructu.

Folium

Pacana.

Colligunt

Paco-aire

Musa
mala.

benè picta est, & aliquatenus similis *Paca-ore* Brasilianorum.

*Musa Pa-
coca.*

Hist. Lugd. Musam Patoueram Theueti vocat. Patet verò tam ex Theueti quàm Læti verbis nò eandem hanc esse cum Musa ex Matthioli. depicta. Quin & ipsa quoque icon nòn parum differt tam à Musa quàm à Linchottani Ficu Indica proximè precedentibus capitibus propositis. Peritis tamè diligendū relinquo, an diuersarum plantarū sint icones, vel vnius plantæ figuræ diuersæ.

MALVS AVREA, FOLIIS

PRÆGRANDIBVS.

CAP. LXXVII.

Descriptio

Foliorum amplitudo, & quod Dodon. qui scilicet (quod quidem sciamus) exoticæ huius arboris historiam tradit, *Palam* Plinii [de qua paulò antè] huius quoque historiam hic poni postulabant. Ergo *Mali aurea* Dod. dicitur, velle scribit, ad *Mali Punice* sumum accedit, Pomum & ipsum cognomento aureum: sed magna & proceræ hæc arbor est, longis tamis valdè parula: folia etiam prægrandia, tres subinde cubitos longa & duos lata, in quibus crassiores, venæ secundū longitudinē productæ, veluti in *Cinara* foliis. fructus permagis est, ad instar humani capiti, forma & colore *Mali Punice* similis: habet verò & intus recondita complurima succi plena grana, sed oblongiora & maiora, quàm *Punice mali*, & colore non rubentia, sed auri luteo splendentia, sapore subacidulo, ori grata. A quo huius descriptionem habuimus (inquit idem) sibi hæc *Panormi* in *Sicilia* visum reuoluit in horto excellentissimi cuiusdam Medici: hæc dubium autem, quin peregrina sit, & ex India vel aliunde illuc olim aduecta. Nomen autem hic vel ab his vel fructus huius nullum sibi aliud cognatum asseruit, quàm *Mali aurei*: atque hoc nomine fructum appellari. Potest autem hoc nomen accepisse, quòd grana auri luteum colorem referant. Plinius huius, ut idem Dod. putat, ut nunt lib. 12. cap. 6. ubi arborem hanc *Palam* fructum verò *Ariensem* dici refert. Plinii verba inueniet lector paulò ante capite de arboribus Indici Theophrasti. Habet verò huius arboris descriptionem Dod. proposita quædam quæcum Musa conueniunt, sed plura quæ discrepant, ut conferenti patebit. De scilicet foliis verò (addit Dod.) nihil quoque aliud accipimus, quàm quòd ipsa auri colore succulenta grana valdè acutè sebricitantibus admodum essent & grata & utilia: ut pote quæ calorem magnum contemperarent, ac humi vehementer sedarent.

Folia.

*Grana lu-
tea.*

Sapor.

Locus.

*Mali aureum
Pala.*

*Vires.
Fibres.
Aqua.*

PALMITES.

CAP. LXXVIII.

Descriptio

Palmitis nomine arborem depictam, & tabulis æneis Iconum parte 4. sculptam exhibent Bry fratres in historia Indiarum Orientalis, de qua scribunt. *Palmites* arbor est trunco crasso, è quo folia longissima nullo pediculo hærent. Idem in itinere Holandico anni 1599. aiunt. In insula Don Galopes, vel D. Mauntii prope Madagascaram inuenimus multas *Palmites* arbores, ex quibus vinum



huic, quemadmodum ex *Cocco* arbore.


ARBORES ALTISSIMÆ PALMITIS SIMILIS.

CAP. LXXIX.

In insula parua *S. Marix* altissimæ arbores crescunt absque ramis, arboribus similes, quas *Palmitas* vocant. Hæc fructum ferunt, qui externa facie fructui *Ananas* quodammodo similis est, auri colore conspicuum. Intus grana parua latent qualia *Mali Granati*, quæ parte dulcissimi sunt saporis: reliquæ duri atque inutiles. *Linchottanus*.

BENIOINO OBVOLVTVM FOLIVM MAXIMUM.

CAP. LXXX.



Benioino ali-
quando so-
lum Lugduni
detraximus, quo
obvoluta erat
maxima gleba.
Illud quidem ar-
boris ne sit an
herbæ nihil cer-
ti habemus: ap-
paret tamen ex
eo fragmento,
quod penes nos
habemus, & hic
depictum da-
mus, maximum
fuisse, adeoque
& Musæ fortè
folio maius. Est
autem colore
rufescente, costa

elata posteriorem folii partem secundum longitudinem percurrente, à qua nervi elati & ipsi, sæpius oppositi, aliquando inæquali ortu, omnes obliqui prodeunt, inter quos spatium intercedens, vnciam vnum latum est, interdum tres, subinde palmare: aque nervis obliquis vltro citroque discurrunt uenulæ transversæ, semuncia aut paulò

Descriptio noxa vacante. Ficus & Vix, quemadmodum inter fructus autumnales principatum obtinent, ita fugacibus omnibus magis nutriunt, nihil minusque pravi succi habent, praesertim cum exactam maturitatem fuerint adepti. Quodque nutriant, maximo argumento sunt ii, qui vinearum fructum custodiunt: siquidem cum duos menses solis vixit. Ficus, quorum custodiz praesunt, veltantur (nisi forte panis quippiam cum illis addant) oboes tamen ac pingues sunt. At caro quae ex ipsis gignitur, haudquaquam est firma ac densa, quemadmodum ea quae ex carnibus fit, sed laxa ac praeumida: ob id celeriter etiam cum velti ipsis desierint, contrahitur ac coarctatur.

Caricium vix. Cariciz quidem multiplicem habent utilitatem, si quis tamen largius elatauerit, ab eis offendetur: non admodum enim probum sanguinem gignit: quapropter pediculorum quoque agmen eas comitatur. Incidendi extenuandique vim habent, qua & ventrem ad excretionem irritant & renes expurgant. Pecori autem Lienique inflammacione obsessis sunt noxiae quemadmodum & ficus, non peculiari quadam eximia facultate, sed communi ratione dulcium omnium ciborum ac potuum. Obstructis illis aut scirrhis tentatis ex sese nihil profunt aut obsunt, sed medicamentis incidentibus ac extenuantibus & extergentibus mixta non mediocriter auxiliantur. Ideoque nonnulli medicorum in dictis Lienis ac hepatis affectibus exhibent ipsas longe ante cibum cum Thymo aut Pipere, aut Zingibere aut Pulegio, aut satyria, aut Calamintha aut Origano, aut hyssopo: ad eundem etiam modum si cariciz cum alio quopiam illorum quae facultatem habent acriorem aut omnino incidendi assumantur, non solum sic affectis, sed sanis quoque utiles erunt: siquidem iecoris meatus, per quos fertur alimentum, apertos esse non agrotantibus modò, sed bene valentibus etiam tenuissimum est. Proinde hoc pacto Ficus cum sale extenuante aceto & garo praeparatas vulgò comedunt, quòd id utile esse experientia didicerint. Verisimile est, ipsorum nonnullos Medici cuiusdam consilio adductos, Ficus hoc modo primum comedisse, deinde eam notitiam ad vulgus dimanasse. Qui verò cum cibo aliquo incrassante Ficus & Caricas edunt, non mediocriter offendentur. *Hactenus Gal.* qui ut salubrem vitam degeret, ab omni fugaci pomo abstinuisset se tradit ab xxviii. anno etat. ad senectam usque exceptis exactè maturis Ficibus, atque vix, quae minus inutilia esse existimauit, ut ex modò dictis abundè patet. Idem ait quòd quicumque amicorum suarum parvè admonitioni, ut ab istiusmodi fructibus abstineret, sine morbis fuisse.

Descriptio Martialis Epigram. 13. traditum Distychon non malè & huc quadrare videtur: quamvis ille ad Ficedulam referat, aut allusisse videatur.

*Cum me Ficus alat, cum pascor dulcibus vix,
Cur potius nomen non dedit una mihi?*

Ficedula. Est autem Ficedula M. Varroni dicta auicula, quòd ficibus veltatur, ob quam rem etiam *auicula*, aliis *auicula* dicitur, & *auicula*, id est, vuedula, ab vix quas etiam pascitur, quibus mirum in modum pinguescere creditur. Hanc Recentiorum falsè putant esse quamcumque Autumnalem auiculam ob pinguetudinem expertam: certa enim species est, corpore grandiusculo quam Luscini, oblongo, colore misto ex rauo, cinereo, pallido, Pellafigam Vascones vocant: quod ex Scalig. observationibus hic annotare placuit, sed ea lege ac omine, uti nobis non sit fraudi materias commi-

Picorum condimentum.

Expressum. Longa vita

Expressum.

Expressum.

Expressum.

Expressum.

Expressum.

Expressum.

Expressum.

Expressum.

Expressum.

Expressum.

Expressum.

Expressum.

Expressum.

Expressum.

Expressum.

Porro Gal. lib. 8. simpl. cap. de Cinere. Dioscoridem haud iniuria reprehendisse videtur, quòd lixiuia omnia adstringendi vim habere prodiderit, inter quae & ficulneum connumeravit. Nam cum Lixivium ut Gal. verbis utamur, sit tantummodò *de aqua raris*, id est, cineris lotura: id certe cineris, è quo fit, naturam resipere consentaneum fuerit. Porro cum cinerum natura non vna sit & eadem, sed pro materiae combustae diversitate diversa, aliorum quidem adstrictoria, aliorum vero acris & absterforia, & ipsa quoque lixiuia pro cineris, è quo facta fuerint, varietate varia esse necesse fuerit. Quapropter doctiss. Sarrac. ut ne Galeni reprehensionem locus esset ullus, supra adducto loco apud Dioscor. mendum subesse haud malè suspicatur, & *am raris*, non *de aqua raris* legendum esse iudicat.

Non abs re fuisset Simeonis Sethi paucis verbis & veluti compendio, tradita de Ficuum vitiis adscribere, nisi pleraque ex Gal. essent desumpta. Dicamus quaedam ex eo. Fici, inquit, primo ordine calefaciunt intenso: desiccant verò medio primo, nutriuntque abundè, sed vento ventriculum complent nisi probè concoquantur. A Nephriticis comestae, multas arenulas educunt. Pectus & pulmones iuvant: aiunt insuper contra venena medicamentum ficos esse, eos singulis diebus ieiunus si quis sumat.

Sed ut de Ficuum erga venena vi magis constet, nota est Mithridatis compositio, tantopere à multis celebrata, de qua etiam Iuvenalis. Saty. 14.

*Atque eme quod Mithridates
Composuit si vi aliam decerpere Ficum.*

Quippe cariciz cum Inglandium nucibus comamanducatae, egregiè venenorum maleficia hebetare creduntur. De Mithridatis antidoto plura habes in historia Nucis Inglandis. Denique omnium fructuum quos *gignit*, id est, Ligneos, [quoniam è materia stirpium lignea oriuntur, à quibus diversi cereales, *arborum*] appellant, utilissimos esse ficos etiam Herodotus Lycius in opere suo de ficibus [ut scribit Athen.] planum facit multis verbis, ac Ficuum succo recens natos puellulos optimè ali, vegetosque fieri, si illis nutrantur, affirmat. Pherecrates, qui Perlas admittit, *tarò cibum*, inquit:

*Aspexit nostrum si quispiam aliquando Ficum ferentem,
Cum tempestiva est,
Puellula, ut nutrant, obstitam in cibum dat, tantumquam
Medicamentum non vulgare Ficum sit.*

Herodotus in primis admirandus & mellifluus lib. 1. hist. ingens bonum mortalitati fici esse, ad hunc modum scribit: Aduersus illos homines, rex, exercitum comparas, qui anaxyride [seniori seu subligaculo] & reliquo vestitu coriaceo utuntur: cibantur verò non iis quae cupiunt, sed iis quae suppetunt, regionem asperam incolunt: vinum, per Iovem, non bibunt, nec fici nec alia lautis cibis vescuntur.

Polybius Megalopolites lib. 12. narrat, Philip-pum Persei patrem, cum incursionibus Asiam vastaret, commeatus inopia, quia frumentum deesse cibaria militum à Magnesiis Ficus accepisse, ideoque potitum Myunte, ac pro dantis fici eum locum tribuisse Magnesiis. Ananias Iambicus:

*In adibus auri multum si quis concluderit,
Et paucas Ficus, etc.*

Quandò Ficus auro sint praefata intelliget.

Tam prolixè Magnus de Ficibus cum tractauisset, ad

Descriptio

Descriptio

Temper. ex

Ad Genera

Infantibus

ad hunc modum locutus est Daphnus medicus Philotimus lib. 3. de alimentis, recentum Ficum ait plures esse inuicem differentias, nempe generis, temporis quo proueniunt, & facultatis: ceterum in vniuersum, humidus & maturus ocyllimè dissolui ex omnibus, & quouis alio fructu celerius coqui, nec alius impedire cibi coctionem: humidarum facultatem glutinosam esse ac dulcem, subnitrosam tamen; (ob lactis exiguam acrimoniam) detractiones moliri largiores, liquidiores, promptiores, minimèquè molestas: succum salum & subacè corpori suppeditare cum sale deuoratas: at quod præbent alimentum citò dissipari. Itaque multis Ficuum esu valdè auctam molem corporis, breui post tempore gracilescere ac extenuari supra modum: quod profectò non accideret, si perstaret alimentum è Ficu perceptum, & statim discuteretur.

Impinguit.

Experimentum.

Glutinosus.

Deiectionem mouet.

Cuius propter humiditatem, & salum succum generant.

An frigida vel calida, post ficum quam bibenda.

Post sumptum, si ficum largius bibendum, Meridie non edendum.

Reliquis porro fugacibus fructibus à ventriculo facilius superari hoc arguit, quod non solum citra noxam copiosius alis fructibus ingerimus, sed etiam quod illis præsumptis si consuetum & parem cibi modum addamus id nihil incommodet: unde manifestum est, utrumque cibum à ventriculo confici, & minore negotio Ficus vinci quàm alios fructus, nec obstat quominus alius cibus coquatur. Facultas quidem ea Ficus est, quam proposuimus. Glutinosam & salum, ex eo deprehendimus, quod ob lentorem manibus inhærescit, & illas tamen absterget: dulcem linguæ & oris iudicio cognoscimus: Quod autem sine torminibus & perturbatione alui deiectionem moueat celeritatem, copiositatem, molliorem, ut probemus, verbis haud multis fuerit opus. At verò in ventriculo Ficus parum immutatur seu alteratur, non quia difficilis sit eorum coctio, sed quia confectum deglutimus dentibus nondum extritas & comminutas: qua de causa promptior est eorum excretio.

Salum quidem succum à Fici procreari, & in corpus deduci indicauimus, quoniam, ut est demonstratum, nitrosi sunt: augetur salugo addito sale, quo cum serè recentes comedi solent etiam hodie in Italia & Galloprovincia. Ita augebatur olim acrimonia etiam adiecto vel Thymo, vel reliquis supradictis herbis, vel aceto. Ac veteres esitasse Ficum cum sale, Thymo atque aceto, abunde colligere licet ex Athenæo.

Heraclides Tarentinus in Copuio (ut idem refert) dubitat & percontatur, post esum Ficuum an aqua gelida bibenda sit, an calida. Qui calidam maluit, illos inquit hoc suadere, quod animaduertant sordidas manus aqua calida lotas confectum purgari, & hoc exemplo credibile putent in ventriculo Ficus è vestigio dissolui, præsertim cum extra corpus nostrum aqua calida ficum continentes partes distrahat, & in tenues portuunculas liquatas diuidat, frigida verò illas contrahat, & cogat. E diuerso, qui frigidam bibendam sentiunt, licetatiocinantur: frigida portione ob eius gratitatem, quæ insident ventriculo deorsum protrudi: non admodum bellè ventriculum habere post esum Ficuum, quia cæstuosus & imbecillus reddatur: quamobrem quidam exemplo merum bibent: aquam porro frigidam in ventriculum acceptas illas depellege.

Est autem post sumptas Ficus largius & assatim bibendum, ne in ventriculo substant, sed ad inferiorum intestinorum partem delibantur.

Quidam Ficus aiunt edendas meridie non esse, quia tunc morbose sunt, id quod etiam in Crapula Phlegmatibus dixit Aristophanes in Proagone.

Agratantem verò aliquando ipsum esse cum vidisset.

Ut agratantem etiam ipse, meridie Ficus comedebat.

Eubulus in Sphingocratione:

Per Iouem ita exstititum rectè non valebam, o vir optime,

Ut quæ nuper Ficus edissem me ridere.

Nicophori in Sirenibus:

Vestrum si quæ Ficus meridie

Recentes, posteaquam esit aruit, obdormis, at, febri

protrinus.

Cursu aduenit.

Diphilus Siphonius inquit, recentes ficus & prauum & paucum alimentum præbere, ceteri faciliè, innatare ventriculo, & citius in habitum corporis distribui, quàm siccas.

Demetrius Scepsus lib. 15. Troiani apparatus scribit, eos qui ficis abstinent, esse vocaliores, idèque Hegesimacha ciuem Alexandrinum, qui historias composuit, cum ihid pauper esset, eximium Tragediarum actorem & histrionem euasisse, vocèque mirum in modum sonora, quia per annos octodecim ficum non esitasset: idè studiosis vocis abstinere ficu Græci iubent.

Notum est quod de ficis actatur proverbium.

Post pisces Ficus, post carnem legumina.

De quo, quia extat apud Eras. in adagiis, plura non dicemus.

Baptista fierus vires quasdam ficum breui nec ineleganti carmine complexus est:

De illis etiam Eob. Hellus:

Ergo tunc inter opes regnantis fructibus annis,

Prima locum meritis Ficus & una tenent.

Vtraque nam succu implet melioribus, & nil

Quæ nocent vitii damna ferentis habent.

Detocum, inquit Paulus, ficorum, plerique Sycii appellauere: quod & defrato quoque nomen est. Hippocrates Sycion.

Posteritatis obseruationi tribuendum, ficos cum fermento citas, admixto sale, pestem atque vlcera vel tumores emollire adeò ut intra paucos dies abscessus rumpatur. Eodem tamen medicamento Regem Ezechiam vltim fuisse (2. Reg. c. 20.) existimat Tragus.

Mithriol. sibi experimento compertum esse tradit caricas quas aut tres nocte vna in aqua vltra maceratas Asthmaticos inuare, qui manè eas deuorauerint. Ad nephritidem & dolorem colicum experimentum excellens & presentaneum eiusdem, vt ille ait: Caricarum albi, Græci ana M. l. coquantur in lib. 1. C. vini ad consumptionem tertie partis, cum sale paucò inficiatur per clysterem, fordes multas ad fluxus educit. Ficum decoctum calidum infantibus propinatum, cæthymata & exanthemata protrudit.

Ficulneolacte vermiculosè, sanantur aures: & ficulneis foliis faciliè afflicti citantur hæmorrhoides, qui hodie vulgò facillimus & tutissimus habetur hæmorrhoides excitandi modus. Prædicti quoque & ad promptè maturandos panos caricis decoctis (quibus tamen vel solis magnam in eo casu tribuunt vim) addunt radices Lili, Altheæ, caparum &c.

Si quis ictus, vel demorsus ab animali venenosus, is instillet tres, vel quatuor guttas lactis ficulnei supra vulnus, & mirum, teste M. zaldo, inueniet prædium.

Rondeletius in prætaxe calculo renum non vult in Enemate addi ficus, quia inquit vesicæ nocent: quæ verò possit esse ratio nec addit ille, nec nouimus ipsi. Arenulis expellendis opportunas

Recentes.

Qui ficos abstinent, vocaliores.

Abstinentia a fisco.

Proverbium de fisco.

Sycion.

Ad pestem.

Experimentum ad Asthma.

Aliud ad Nephritidem, & colicam.

Exanthemata.

Ad ictum, & demorsum venenosum.

Pediculi.

luprâ diximus ex Galeno. Ficum frequentem vsum pedunculatos generare prater Galenum, & Paulus Aegineta, & Oribasius, & posteriorum quum plurimi, ipseque adeo vulgus, persuasum habet, causamque referunt, quid malum generent sanguinem. Quod si certum sit eas pediculos causare, (nondum enim hoc omnino nobis compertum) malum equidem causam referre ad id quod nimis impingunt, ut dictum, & quod vi sua Diaphoretica, quâ & exanthemata protrudunt, carnes molis & cutis excrementa in corporis superficiem expellunt, sicque occasionem præbeant generationi pediculorum.

Superfluitas Cardanum.

Hæc tunc abunde de seris, nunc ex aliis enumeranda naturæ aliquot miracula, si non potius figmenta. Referunt nonnulli apud Cardanum expertumque esse dicunt, folio Ficulneo contactas verrucas aboleri, si folium ipsum sepiatur. Sed quid sepultura hæc foliorum? forsitan etiam inscripta idem efficiunt. Ficus albas in somniis boni quid denotare, nigras verò inopportuno tempore, calumnias & detractiones Porta scribit. Hæc somniorum prudentem! At idem: ficus quia habent frondes nervis conspicuas, idem earum cinis nervorum vitii & consulsionibus illinatur ex oleo. O divinatorum egregium! Comblearia ex ficulno ligno facta, hoc habent peculiare, inquit Keckerman, ex Mizaldo] quod carnes ad celerem concoctionem adigant, si elixationi earum sepius admoveantur. Cur tantum Philosophus vocabulum Quia non adiunxit?

*Porta fabulosa.**Comblearia ex ficulno ligno arborum collationem carminum.**Philemon conspicuum asinum ficibus vescentem, mortuum.*

Lepidum, quamvis sinistri euentus est, quod Cicero alicubi de Philemone poeta refert: is conspicuus ficibus vescentem asinum, quæ in prandium paratæ erant, tanta vehementia cepit ridere, ut statim emoreretur.

Fabula de Coruo Apollinis.

Non insubide nunc fabulam Corui Apollinis & alias quasdam Coronidis loco subiiciemus. Tradunt, aut potius fabulantur Poetæ, sacrificante Apolline, coruum, qui in eius tutela esse dicitur, ad fontis puram aquam asportandam missum. Vidit hic ficorum plures arbores, & in his fructus nondum maturos: ac in earum aliqua confedit, expectaturus nimirum, dum eius fructus maturefcerent: quod ubi euenit, plures à Coruo ad saturitatem usque comestæ sunt. Cuius moram, tam eius quam maturitatis, utpote non parnam, pertæsus Apollo, quum etiam re alia ad sacrificandum vi necessarium fuisset, Coruum hac pœna atque ignominia vitæ, ut quoad Fici maturefcerent, bibere posset nequaquam. Per illud enim tempus guttur pertusum habet, ut propterea aquam minime haurire possit. Aliiter alii: ut Ovid. in secundo Fastorum. Dum Iupiter festum solemne appararet, coruum, ut aquam ferret, misit: qui, ut iam dictum, dum Ficus maturandas expectasset, quas prius rostro immaturas depræhendisset, diu immoratus, & Ioui moræ causam mentitus, [Nam illi aquarum obsessorem hydram affirmarat] Ob quod mendacium in sydus cœleste commutatus, si credere fas est.


*Corui ficibus edax.**Corui forma.**Formica in ficu in omnes menses.*

Eadem aut simili incude & hæc fabricata fabula. Ficus arbor fuit in qua Æacus Iouis & Aeginæ filius formicas vidit, quas sociorum ob silentiam amissorum, solatium in homines converti desideravit. Quod statim euenit: qui deinde Myrmidones dicti. Iuxta Eusebium Atticæ civitatem, & propè Cephisum fluvium fons est, quem Capithicum appellant, quæ Plutogem, rapta Proserpina, ad inferos descendit: fama est. Pausanias in Atticis. Nondum innotuit nobis ex quo fonte habeat hoc Curtius, quod tam categorice

nullique hesitatione scribat Adamum & Evam post in Deum prauaricationem factam, cum se nudos cognovissent, fici [ac huius quidem fici de qua ibi tractat] folia consuisse, & subaptis perizomata confecisse.

ARBOR PEREGRINA, FRUCTVM FICVI SIMILEM GERENS.

CAP. LXVI.



Cuius arboris sic hic ramulus & Clusium & Paludanum, qui ramulum describendum Clusio dedit, latet. Erat autem cum suo fructu in vix modum quasi congesto, refectus, durus, crasso cortice rectus, gracilis, & digitalis longitudinis, coloris ex fusco cineracei, octo fructus exiguorum Ficum instar, crasso bre-

uique pediculo subnixos summo fastigio sustinens, fuliginosi coloris, cineraceis maculis conspersos, duos, & satis solidos: ut quandam affinitatem habere viderentur cum Sycomori circa Tripolim Syriæ nascentis fructu, descripto à Rauvolfio, nisi ipse Paludanum, qui Sycomoros in Ægypto & Syria viderat, Clusium ab ea sententia submoueret. Ceterum similem fructum à Iac. Careto missum Londino, Francofurti ad Mœnum accipiebat Exoticorum author, non tamen tam copiose ramo inhaerentem, sed singularem duntaxat, vel interdum geminum, suis pediculis simul connexum.

Quum porro hic fructus ficui vulgari valde sit similis figurâ, & nonnunquam etiam adeo pusillus, ut Ciceris magnitudinem non multum excedat: an ad ficus Indicas circa Acesinem amnem nascentes referri non possit, cuius Theoph. Hist. plant. lib. 1. cap. 12. & lib. 4. cap. 5. mentionem facit. Verum is negat copiosum fructum ferre, & ex Fabriciana relatione, singulares inter folia, vulgatum ficum instar, nasci deberent. An verò fructus arboris Gagey, quam describit Ferd. Oued. cap. 13. lib. 8. 1. part. general. & nat. Historiz.

FICVI SIMILIS FRUCTVS.

CAP. LXVII.

Fructus exotici, quem Clusio misit Iac. Planteau, non valde ab similibus erat fructui, qui immaturæ ficui similis esse scribitur, cum formâ, tum magnitudine, & colore: etenim durus erat & solidus, levis tamen: eius color ex fusco cineraceus, albis maculis aspersus, nec ab ratione ab illo differre videtur Clusio, nisi quod hic graciliore pediculo esset præditus: an verò plures in

vno

LIBER PRIMVS

146

uno ramulo haxerint, vtili, ignoratidem, quia
singularem accipiebat.

PIMPINICHI ARBOR

LACTESCENS.

CAP. LXVIII.

Descriptio IN omnibus continentis Indix oris, inquit Mo-
nardes, lacteus quidam succus elicitur ex arbu-
sculis Malorum similitudine: Indi Pimpinichi
vncant: de cuius ramis recis lacteus humor illico
emanat, aliquantulum densus & viscosus.

Vires. Huius succi tres aut quatuor guttae sumptæ,
Purgant. validissime per aluum purgant bilem & aquas.
Pulvis. Bibitur ex vino, aut delicati pulvis deglutitur
pauci quantitate propter nimiam vehementiam.
Illud autem peculiare habet, quod si quis illo
sumpto iusculum, vinum, aut aliud quid iniciat,
subito eius operatio infringitur & cessat. Sed eo
sumpto, à somno abstinendum. Calidus est &
siccus hie liquor in tertio gradu: ideoque vali-
dum nimis & perniciosum medicamentum. quo
etiam sicut & alius eiusdem generis, vti delitum
est, asucto Mechoacæ, de quo suo loco.

FICUS INDICA.

CAP. LXIX.



Ficus Indica
autore Cla-
sio in magnam
altitudine vni-
co trunco co-
que admodum
crasso assinge-
re solet: ramos
deinde in om-
nia circum late-
ra expandit, qui
tenues qual-
dam fibras siue
filamenta [qua-
lia in Cuscuta
vulgò nuncu-
pata conspici-
unt] coloris
dum recentia
sunt, aurei siue
aurei demittit.
his ubi terram

attigerint firmantur, novamque quasi sobolē ge-
nerant: etenim magnam crassitudinem paulatim
acquirunt, & veluti in quos arborum caudices
transiunt, qui novos rursus summa sui parte in
latera ramos spargentes, novis denum fibris deor-
sum missis sese propagant. Sic alii deinceps rami
in infinitum, ut interdum unica arbor suis pro-
paginibus integrum serē miliare Italicum in am-
bitu occupet, sicque difficile, quæ primaria sit ar-
bor, siue omnium ultatum prolium parens diui-
dicare, præterquam ex trunci amplitudine, quæ
nonnunquam in matre tanta est, ut trium viro-
rum vltis in apprehendi queat. Verum non
modò inferiores rami similes fibras spargunt, sed

Tom. I.

etiam in arbore summi: ideoque unica arbor
densissimam sylvam efficit. Sub eas autem ar-
bores aditum sibi paratur incolæ fibras tam in-
tuncos, conuersas, tenuiores scilicet, exscindere
solent, atque ea ratione veluti concamerationes
& umbracula facere, arcendi caloris gratia: adeo
enim densis ramulis reliqui maiores rami luxu-
riant, ut Solis radij nulla ratione penetrare queat:
immò concavi istarum fornicum multiplicesque
sinus sciunt inæqualiter inde resultantem aerem,
quæ causa est, ut Echo multis in locis ter atque
etiam sepius humanas voces reddat. Vidit verò
qui hæc retulit D. Fabricius Salernitanus, qui ali-
quot annis in Indiis vixit: Interdum octingentos
aut mille viros, quo in numero & ipse fuit, vnius
huiusmodi arboris umbrâ tegi: atque affirmabat
terna etiam hominū millia sub tali arbore latere
posse. Folia fert in nouellis ramis Mali cotonei fo-
lia similia, supernè viridia, infernè candicantia,
& larugine, ut illa, pubescentia, quæ mirum in
modum ab Elephantis expetuntur, ideoque in ed-
ium pabulum cedere solent. Fructus extremi pol-
licis articuli magnitudine, sicibus exiguis similis,
colore fors & intus sanguineo, granisque, ut
vulgares Ficus, plenus, dulcis quidem & edulis,
verum saporis minùs grati quàm illa. Nascitur
autem inter folia, quemadmodum vulgares Ficus,
hoc est, in nouellis ramis, qua parte folia illis in-
herent.

Ioan. Hugo Linschot. qui ante paucos Annos
Goâ rediit, eius iconem exprimit, sed longè ab hac
nostra diuersam: etenim non singulares radices
è ramis dependentes, verum innumeras, illasque
adeo multifidas, ut vix arborem aut fruticem tam
variè multipliciterque totas radices habere pu-
tem: hanc ob causam valdè suspecta ea est.

Gardiam huius arboris nullam mentionem fa-
cere, sitis mirari nequeo.

Indica regio inquit Theophrastus arborē Ficum
appellatā gignit, quæ è ramis radices demittit si-
ngulis annis. Demittit autem non ex nouellis, sed
ex anniculis, atque etiam vetustioribus. Illæ se
terre inferentes veluti sepe circum arborem ef-
ficiunt, ut fiat veluti tabernaculum quoddam,
sub quo & homines degere solent. Radices autem
enascens manifestè à ramis discernuntur: sunt
enim candidiores, hirtæ, [scissæ] & tortuosæ, bi-
naque fronde foliatæ. [Siquæ.] Ipsa arbor co-
mam supernè lasciuam gerit, [scissæ] totaque fornicato ambitu pulchrè orbi-
culatur, & magnitudine vehemèter excellit, quip-
pe umbram bino stadio facere fertur: & crassitu-
dine candidis plerisque ultra quàm sexaginta gra-
duum [scissæ] pedis vestigiorum. Plin. passuum
orbem colligere, magna verò ex parte quadra-
ginta. Folium pelta non minus habet: [potius ad
similitudinem quàm ad amplitudinem referenda
hæc comparatio. Clus.] fructum admodum par-
uum magnitudine Cicenis, Ficui similem: quam-
obrem Græci ficum eam arborem appellabant.
Paucos verò admodum fructus fert: non tantum
pro arboris magnitudine, sed etiam omnibus re-
bus. Cur autem adeo exiguum & paucum ferat
fructum, idem Theophrast. causam reddit hæc,
nempe quod ad germinum efformationem to-
tum penè absumat alimentum: nam vni folio
amplissimò sit, etiam radicem ab eius foliis demis-
sarum generatio, nutrimenti causa videtur acce-
dere. Sed sortè è diuerso, ut quoniam in ea quo-
que pabulum dispensatur, ideo fructus exiliore
atque paucius proferat.

Nec à Strabone omiſſa fuit hæc arbor. quam si

N

non nomine expresse at lemmate manifesto describit, tali. India multas quidem admirabiles arbores fert, & quibus vna ramos ad terram pronos habet, frondes [alii folia vertunt] non minores clypeo.

Onesicritus, qui curiosius ea persequitur, quae sunt in Musicana terra, India australissima, refert arbores quasdam ingentes esse, quarum rami, cum ad duodenos cubitos creuerint, reliquum incrementum prouum faciunt, deflexi, quousque terram contingant. Deinde terram ingressi radices agunt velut propagines: mox rursus in truncum exeunt, à quo postquam aucti fuerint, inde flectuntur, & aliam propaginem efficiunt, & deinde aliam, & sic deinceps, ut ab vna arbore vmbra culum fiat, tabernaculo multocolumnio simile. Narrat praeterea miras arborum quarundam magnitudines, quarum stipitem vix quinque homines complecti queant.

Aristobolus ubi Aescines Hyarotidi permiscetur, de arboribus dicit, quae ramos deflexos habent, & de earum magnitudine, ut sub vna arbore quinquaginta equites meridiari possint. Nearchus verò quadringentos ait.

Ficum Indicam mirata est & Alexandri victoria, eo orbe patefacto, digna quidem, quam non solum ipse Alexander, ingenii sui nobilitate & sagacitate, atque omnis eius ingens exercitus demiraretur, sed ceteri quoque quotquot mortales sunt, de qua Q. Curtius in Historiis ab Alexandro gestarum tradit [licet Fici nomenclaturae non meminerit.] Alexandrum Poro regē, & Hydaspem superato, ad interiora India processisse. Sylvas autem propè in immensum spatium fuisse diffusas, procerisque & in eximiam altitudinem editis arboribus: plerosque ramos instar ingentium stipitem flexos in humum, rursus quae se curuauerant erigi, adeò ut species esset non rami resurgentis, sed arboris ex sua radice generatae.

Plinius verò hanc arborem ex Theophrasti placitis [qui Alexandri coetaneus fuit, eique adiutorum hominum narrationes haud dubie magna diligentia excepit] descripsisse videtur, sed tam eleganter, ut, quod Scal. ait, sub ea astituate potius, quam eius historiam legere videaris. Ficus, inquit, ibi [in India] exilia poma habet. Ipsa se semper ferens, vallis diffunditur ramis: quorum imi adeò in terram curuantur, ut annuo spatio infigantur, novamque sibi propaginem faciant circa parentem in orbem, quodam opere topiario. Intra septem eam astituant pastores, opacam pariter & munitam vallo arboris, decoris specie subterintruendi, proculve fornicato ambitu. Superiores eius rami in excelsum emicant, filuosa multitudine, vasto matris corpore, ut LX. P. plerumque orbe colligant, vmbra verò bina radia operiant. Foliorum latitudo peltae effigiem Amazonicam habet: quae fuit, auctore Xenophonte, Hederæ folio consimilis, ut sub ea equitum turmae condantur] ea causa fructum integens, crescere prohibet. Rarusque est, nec Fabae [Cicetis Theophr.] magnitudinem excedens: sed per folia Solibus coctus, prae dulci sapore, dignus miraculo arboris. Dixerat autem iam prius, arbores in India tantae proceritatis gigni, ut sagittis superari nequeant. Hæc [addit] facit vbertas Solis, temperies ætheris, aquarum abundantia [si libeat credere] ut sub vna ficu turmae condantur equitum. Ut deinceps nemini amplius dispiciendum dubitandumque videatur, num arbor hæc Veteribus cognita fuerit, quorum iam tot descriptiones, & vix in pauculis dissentientes produximus.

Eiusdem meminit Athen. sed paucis duntaxat verbis ex Theophr. mutuatis.

Ceterum propositarum descriptionum vnius eiusdemque arboris collatio, perspicuum reddit, qualis & quanta sit Ficus Indica. Vnum reliquum nobis est & Theophr. dubium, qui arboris truncum LX. Cuius adscripsit, quæ gradus Gaza vertit, quæ vox & tellam, suggestum, pulpitem & subsellium denotat, ut annotat Scal. Sed & passus mensuram denotat apud Plutarch. in Demetr. Vulgata significatio gradus est, quem Boëtius gradum inter mensuras numeravit duobus pedibus & dimidiatum definiens, quo videtur Cuius Euclidis interpretari. Georgius nullum scriptorem inuenit qui gradus vel passus mensuram usus sit, & ea loca quæ obuii posse videt, aliter exponit, qui tamen Goropio minimè probatur hac parte. Si de Plinio Theophrastus intelligi posset, Cuius non gradus sed pedes essent vertendi.

Est & alia difficultas, nam Theophr. folia, & quorum meminerunt amplissima dicunt, atque adeò pelta seu clypeo non minora esse. Clusius verò ex supra dicta Fabricii relatione, Mali Cidoniz vel Cotonei foliis similia dicit, peltæ verò similitudinis potius quam amplitudinis gratia conseru.

Linschottanus qui ex postremis Ficum Indicam describere videtur nomine Arboris radicem, foliorum ne verbulo quidem meminit, videturque descriptionis suæ membra quædam, aut qui eius observata Latio reddidit, ex Plinio sublegisse: sic enim habet. India arborem fert multiplici radice, mirabili aspectu. Crescit enim è terra ut ceteræ arbores, ac spargendo ramos radices iis adiicit, quibus denuò sua sponte terræ infixis, ingentem serie numerosa sobolem trahit, cum ramus vnus arbori recenti, secundo euentu, Labyrinthoque si uilis, vagis usque itineribus sufficiat, ita triginta aliquando passus vna arbor implet, in summam crassitiem productis ramis, ut mater eademque genitrix omnium arbor vix agnoscat, ex omni parte copia radicum funium more primo aspectu dependente. Fructum vñibus humanis aptum non fert. Nam is qui Oliuarum formam excrescit, volucres tantum delectat. Hæc ille.

An verò vnicum Clusium vel eius recitorem Fabricium tam spectatae antiquitati, Theophr. inquam, Straboni & Plinio opponere debeamus, sola vnius testis relatio id haud ita temerè persuadebit. Goropius verò tantum abest, ut credat, folia eius exigua esse, ut planè sit in ea opinione, Ficum Indicam eam esse arborem, cuius fructum vetitum primi parentes comederunt, & sub qua se absconderunt, cuiusque ingentibus foliis (sic ille ait) perizomata sibi consueverunt, atque fecerunt. Viles (inquit) quam omnia inter se consentiant? Nomen ipsum Ficus cum Mose consentit. Impia est illorum cogitatio, qui arborem hanc symbolicè duntaxat intelligunt, in quorum numero præcipuus Philo Iudæus Cosmopæa. Lege quæ de ea re scripsit Corn. Agrippa, & opinionis nouitatem prauitatemque miraberis, fortè & ridabis.

Idem Gorop. in Vertumno. Primi nostri, inquit, parentes, cum serpentis fraude seducti vetitum pomum comeditissent & nomen ei dederunt, quo eius abominatio indicaretur. Fyge enim dicitur per Apocopen Fygy, (Cimbris) id est, tu abominande. Hinc Latini Ficum ferè, & Græci corruptè *κίττα* nominarunt. Hi Goropi conceptus sunt & opiniones, quæ si vera esset Clusii de foliorum magnitudine sententia, per se ipsæ facile in aëtherem abirent.

Arbor ad-
mir.

Taberna-
culum multo-
columnium

Ficus Indi-
ca.

Curtius.

Plin.

Exilia po-
ma.

Folia
Pelta A-
mazonica

Cosmo-
pæa

Dubium in
Theophr.

Pulchra de
gradu.

Difficultas
alia de fo-
lia.

Linschotta-
nus.

Descriptio
Linschotte.
Arboris ra-
dicum.

Arbor 30.
passuum.

Fructum
liuoris.
dumum m-
ba.

Arbor Geri-
ca in Pa-
radiso.

Philosod.
not.

Corn. 4.
8777. not.

Fyge.

Dicta

Firm Ind-
cat.

After the
discussion,

Locus

Vices

**Magic
Cards!**

N A S C E N S.

CAP. LXX.

LINEAR-
AND FCBF.

Tom: L

CAP. LXXI

Description

VENENATA.

СЛР. LXXII

Description

Cornish fi-
nished from
1700.

PHRASES. TREES.

CAP. XLV.

Theophyl.
over of the
1000.

21

3

Plus vite!

N. 2

*Pala ar-
bor. Ariens
fructus.*

Item succi dulcedine, ut vno quaternos satiet. Arbori nomen *Pala*, pomo *Ariens*. Plurima est in Sydracis, expeditionum Alexandri termino. Est & alia similis huic, dulcior pomo, sed interaneorum valetudini infesta. Edixerat Alexander, ne quis agminis sui id pomum attingeret. Vbi vides Plinium sapientum quidem, sed non Nudorum, quod Gaza fecit, meminisse.

Pala.

Pala, inquit Curtius, siue ut alii volunt, *Tala*, licet Theophrastus nominis non meminerit, Arbor Indica est, Fico Indica maior, pomi suauitate precellentior. Indos *Pala* foliis veluti Arrianus refert, in quorum fastigio quoddam pingue, Palmarum instar, gignant.

*Quorum.
tam erret.*

Dalech. arborem *Palam* Plinii ait esse, qui Tamarindos nostros putent. Qui vero ij sint, qui istud putent, nondum occurrat: neque sanè videmus quomodo conuenire possit. Dicit Plin. dulci pomo: Theophr. cibo dulci: [id est] quod nentiquam videtur conuenire cum Tamarindis, qui ob summam aciditatem commode edi nequeunt. Quidam Musam esse putant. Quiedus Platanos vocat. Theuetus arborem vocari ait *Paguere*: fructum *Pacina*. Vtrumque nomen ad *Palam* quodam modo accedit. Alium huic similem & vsus frequentissimi Theuetus scribit vocari *Hoyri*. Quiedus *Iaiama*. Sed de Hoyri inter carduos, de Musa qua propius ad praedictas arbores accedere videtur, nunc trademus.

*Paguere.
Pacina.*

pro plantis ipsius & soli fertilitate. Cortex huic satis crassus, sed qui facile eximatur, continens pulpam siue carnem bubule medullae persimilem. Caudex qui vnam profert, annuus est, & semel duntaxat in vita fructus gignit: verum ad radices consurgunt quinque, sex, aut plures surculi, qui parentem renouant, & subsequente anno fructum perficiunt. Adeo verò secunda est hae planta, ut nunquam intercidat, sed subinde nouas proles gignat, ut fructus toto anno vberime legere liceat.

M V S A.

C A P. LXXIV.

*Descriptio
folij.*


EX folij Musae fragmento, quod adseruamus, apparet esse amplissimum: nam & latitudo cubitum facile aequat, cuius medium costae crassiusculae striatae fungosa sulcitur, à qua utrinque expositur foli tenuis laevisque inoffensam aequor, fibris teneris transversis contextum: colore rano altera facie, altera ferè sulco, quod fibrarum ductus secutus, facile diuidas.

*Descriptio
Quiedus ar-
bor.*

Malam Quiedus in hist. Indica sic describit. Inuenitur, inquit, hic fructus Platanus nomine, tamen neque arbor dici possit, neque vera sit Platanus: sed planta quaedam huic Indica haudquaquam peculiaris, & aliunde translata sub Platanus nomine. Interdum autem hae improprie dicta Platanus in arboris celsitudine exerceat, & ad hominis crassitie intumescit: aliàs verò coxae humanae crassitie conspicitur, pro foli natura & vbertate augescens. Ab infimo ad summum folia fert amplissima, interdum duodecim palmos longa, ternos aut quaternos lata, plerumque minora. Hae ventorum statibus facile mulsum

Musa arbor.

*Arboris
crassitudo.*



facile mulsum

Musa cum fructu.



dissecantur, & ex costa illa per folij longitudinem excurrente pendere spectantur eum in modum dissecta. Tota planta veluti germen est, aut surculus, è cuius summo enascitur pediculus aut malleolus brachiali crassitudine, qui vnam producit, vicinos, tricenos, interdum centenos & plures fructus palmari longitudine, brachiali crassitudine, sustententem, nonnunquam minores, quandoque etiam ampliores,

Cortex.

pro plantis ipsius & soli fertilitate. Cortex huic satis crassus, sed qui facile eximatur, continens pulpam siue carnem bubule medullae persimilem. Caudex qui vnam profert, annuus est, & semel duntaxat in vita fructus gignit: verum ad radices consurgunt quinque, sex, aut plures surculi, qui parentem renouant, & subsequente anno fructum perficiunt. Adeo verò secunda est hae planta, ut nunquam intercidat, sed subinde nouas proles gignat, ut fructus toto anno vberime legere liceat.

*Surculi vel
falones.*

Arbor, quae poma fert Paradisi inquit Cardan.] breuissimae est vita: anno enim secundo truncus arescit, fructus fert in botris, ut sunt acini vuae, sed mali magnitudine, ac in botro vno quandoque centenos, unde cistae magnitudinem refert botrus: croceo verò velatur amictu, quo detracto fructus prae dulcis, ac suavis subest. Folium tam longum fert, ut hominem stantem aequet: latum non parum.

*Rama Pa-
radisi Car-
dan.*

Theuetus in Cosmographia arborem Mauze in Aegypto vocatam describit non maiorem sicu mediocri, cuius folia quinque aut sex pedes longa sunt, duos lata: fructus in caule coarctatus non secus ac dactyli in Palma, crassus & longus, mediocri cucumeris instar, delicatissimus atque suauissimus, quem domi suspendunt, ut nos vitis pensiles, eoque saepe solo tanquam optimo vuntur alimento. Arbor tenella est & fragilis, adeo ut nisi maxima truncum haberet coxae hominis crassitudine parem, minima tibi, in creniorum, non in arborum numero, recensenda foret. Truncus, auctore Garcia, ex squamoso foliorum cortice constat: nullis constat ramis, sed è germine flores quosdam coniunctim profert, subrufo, oui effigie, & palmi longitudine: circummeminent pediculi, centum, interdum ducentos aut plures sicut sustententes.

*Thouart
Mauze.*

Flores.

Describit & Acofta in hunc modum, Musam seu Ficum Indicam vocans: decem & octo aut viginti (inquit) palmorum magnitudine attollitur haec pulchra & elegans arbor, cuius truncus ex multorum corticum sibi mutuo incumbentium coniunctione constat, & humani cruris crassitatem adipiscitur, radice rotunda & crassa, Elephantorum grato pabulo: foliis nouem palmorum longitudine, duorum cum senisse latitudine

*Musa Aco-
fta. Ficus
Indica.*

Radix.

dine, neruo satis crasso per longitudinem excurrente, & transuersis fibris in latera sparsis, parte superiore satutis, inferiore dilutionibus. Ex huius arboris saltigio nascitur veluti thyrsus quidam florum simul congestorum in modum Pinei Arobili, coloris rufi: deinde vnicui ramum fert humani brachii crassitie in multos nodos diuisum, e quorum singulis decem aut quatuordecim dependent ficus, ita vt nonnunquam ramus centenis aut ducentenis ficibus onustus conspiciatur. Hos in diuersas species distinguunt Lusitani. Illi enim primo *Cenurus* appellant qui admodum flauent, laues, longiusculi, gratique saporis sunt, & odoratiore: 2. *Chinopanees*, vero, qui vireseunt nonnihil, longioresque sunt, itque etiam grati saporis. 3. Laudantur praeterea qui in Cosala nascuntur, Aethiopibus *Innaga* dicti. Legitimum nomen apud Arabes & Persas (vt e praestante Medico Persa in Ormuz nato intellexisse se testatur idem Costa) est *Mus*, non autem *Musa* aut *Amusa*: arboris vero *Daracht Mus*. Rhafis *Musam* vocat: Serap. *Maum*, id est, *Musam*. Sic & Auic. apud quem in margine *Mauzi* vel *Muzi* annotauit Bellunenensis. Verum neuter horum describit. Sed nostro iudicio, recentiorumque consensu, hanc ipsam intelligunt, de qua hic agimus.

Ex praedictis, si Clus. iudicio aliquid tribuimus, nemo accuratius hanc serpem descripsit, quam Quietus sub Platani nomine. Acosta peculiarem habet iconem, quae variat à Matthioli (quam & nos proponimus, cui nostrum solum egregie respondet) & Linschottani iconem, & à Piquouere figura Theueti.

Hist. Lugdun. tres icones proponit: primam, eamque geminam, ex Matth. nomine *Musa* arboris & fructus: secundam, titulo *Muse Pacouera* Theueti: tertiam pro *Musa* seu *Ficu Indica* Acostae, qui ait *Musa* fructus memisse Ruell. ex auctoritate Theoph. & Strabonis.

Nondum tamen pro certo asserere ausimus, an Veteres Graeci *Mus* meminissent: consideranda quae Theoph. lib. 2. hist. plant. c. 9. t. 1. inter Palmas, his verbis: Est & aliud Palmae genus in Cipro, quod & folium latius habet seu amplus, & fructum multo maiorem, peculiarisque forme, magnitudine Mali Punici, figura oblongum, succo minus grato [i. e. exuato] quam in ceteris, sed radicibus similem [i. e. Punici] Dul. vlt. legendum *rae paus*, id est, Punico simili. Sed ferri potest antiqua lectio, si modò de hac arbore, de qua hic agimus, intelligendus sit Theophrast. Nam & ante dictum eius radicem rotundam esse & crassam. Itaque non deuoratur, sed cominus expuitur. Consideret etiam lector quae paulò ante scripsimus ex Theophrast. de *Arb. ribus Indiciis*, & ex Plin. de *Palis*. Quae verò ex modò citato Theophrast. loco verba transcripsit Plinius, ea capite de *Palma* [quod & ipse fecit] retulimus.

Matthioli in Dioscor. Sunt, inquit, qui palmarum generi adscribant plantam in Aegypto Ciproque nascentem, quam Veneti inde redeuntes *Musam* appellant, & *Musa* similiter fructus. Inclinat animus eam esse quae Theophrasto in Palmarum genere recensetur folio ceteris ampliore & c. vt iam modò citatum. Idem tradit ex quorundam relatione folia arundinea esse, torrescere & state sui natura, vel etiam fortasse Solis ardore, aded vt mense Septembri eorum costae prorsus nudae cernantur, decedente foliorum materia, quod admodum sit tenuis. Caudex [addit idem] squamoso foliorum cortice vestitur, *Palmae* aut *Arundinis* ferè

modo. Ramos habet nullos, sed caudice tantum constat. E vertice germen emergit materie molli, longitudine ferè cubitali, à quo alia ab origine ad summum prodeunt germina terna, quaternumue digitorum inuicem distantia: e quibus circumeminent fructus parui, cucumeris magnitudine, qui per maturitatem quadantenus flauescunt, cortice Fici, qui eodem modo digitis detrahitur. Substantia pulpa consistit Melopeponum modo, nullo intus osse neque semine: sapore cum quadam insipiditate dulci. Primùm igitur fructus insipiditatem quandam pra se ferre videntur, aded vt primo statim gustu non placeat: verum qui esur assuescunt, ij indies magis delectantur: quippe qui quidam occultis saporis suauitate allekti, quae nisi tractu temporis cum palato integrantur, nunquam saturi videantur.

Ita sibi *Musam* descripsisse tradit Matthioli. qui ex Aegypto & Cipro ad nos reuertuntur. Sed quænam antiquis *Musa* fuerit planta quid referat non habere: sibi tamen videri eam esse Theoph. Plantam, quam paulò ante diximus, adductis eundem verbis.

Matthioli more suo contradicens Guiland. in suo Theone: *Musam*, inquit, tertio à Theophrasto inter Cyprias Palmas loco describi, male coniecit, quod fructus huius saporis non sit, sed, radicibus similis, vt non deuoretur, sed sacro tantum expresso, expuitur. *Musæ* verò, veliptomet [Matthioli] teste, longè omnium suauissimus est saporissimisque.

Idem Guiland. plantae huius tribus tantum in locis vniuersis Bibliis, sub nomine *Budam*, mentione haberi animaduertit: & ab Aeschilo, antiquissimo Tragico, *Phryni* in diti: à ceteris ferè Graecis iuxta atque Latinis *Margaritam*: à Mauritaniis *Muz* & *Gemez*. Qui Cyprium incolunt, *ma* & *ma* vocant, argumento à vulgari Asiaticorum opinione ducto, qui *Musam* esse contendunt eam plantam, quae hominum omnium protoplasto, diuino olim mandato in cibis interdicta fuit: quod imitati nostrorum temporum scriptores, Pomum Paradisi nominant. Rhafis Ficum Pharaonis dici memorat, vt idem Guil. censet. Indi, qui in orientem protenduntur, *Melapolan* nuncupant: qui in occasum, *Platanum*. Deique in quili in insula D. Thomae, *Abellanam*.

Camer. annotat, Aegyptiis, apud quos copiosè inuenitur, hodiè *Mus* vocari. Antonii Musae coniectura est, Elatem Plin. esse fructum illum dulcissimum, quem vocant *Musam*, vel vt Mauritiani loquuntur *Muzam*, hoc est, mitem, qui habet Prunorum crassorum similitudinem.

Curtius annotat Syriae accolis [apud quos gignuntur] Poma Paradisiaca vocitari, satis admirandaque esse.

Non abs re fuerit & Bonzonem Indicarum rerum historiographum non contemnendum, de hac arbore sub Platani nomine tradita referre. Platani, ait, longiores quam crassiores sunt: minores multum maioribus praestant. Arbor ipsa folia sesquipalmi latitudine, quatuor palmorum longitudine porrigit, inter quae ramus enascitur, qui centum ac plures Platanos minores fundit: sin verò maiores, viginti quinque aut paulò amplius. Tenera est haec arbor, nec nisi semel fructum fert, qui annuo spatio perficitur, & ex ipsis radicibus alii stolones fruticant. Vbi maturus fructus, leuunt: immaturum adhuc & acerbum non decerpunt, sed excissam arborem loco calido reponunt: ibi Platani celeriter maturescunt flauescuntque. Corio vestiuntur obtusa cultelli partis crassitudi-

Germani

Fructus
specialior
descriptio.

Guiland.

Matthioli.

Palma Cypria Theophrasti.

Budam.

Bibl.

Phryni.

Margarita.

Muz.

Gemez.

Mala Pa-

radisi.

Pomum Pa-

radisi.

Ficus Pha-

raonis.

Melapolan-

Platanum.

Abellanam.

Platanus.

Abellanam.

Elatem.

Muzam.

Fructus

maturus

non ar-

tistic.

110

110

110

110

110

ne : quod superest, pulpa est, sapore in dulcedinem vergens.

De eadem peculiaria quædam Rauvolfius & ipse illarum regionum oculatus scriptor refert, his verbis : Intra Tripolim inter alias, arbores peregrinæ, Musa dictæ, crescunt, trunco vnius & semis, aut duorum virorum altitudine, extrinsecus glabro, nisi quoddam multiplici foliorum incubitu, arundinum serè in morem, inuolutus sit. Pulchre virent. In caudicis cacumine latè expansa folia veluti pennaceum sertum aut cristam præmagnam referunt. Eius enim longitudinis sunt atque latitudinis, ut hominem in longum procumbentem in plenum comprehendant. Fructus Citrulli formam referunt, nisi quoddam paulò sint maiores, extrinsecus lzues, cortice crasso recti, primò flauescens, mox paucis diebus post repositi nigricante, qui faciliè, ut in recentibus Ficibus, detrahitur. Interior substantia candida, referta, absque granis aut semine dulcis & sapida : sed faciliè & citò satietatem inducant, moxque & nauseam pariunt magnam, & vehementes cruciatus colicos : ob id ab Alexandro exercitui suo ab eorum esu interdictum. Hæc Rauvolfius. Ex quibus patet eum hanc, quam hoc loco describit, eandem putare cum ea quam præcedenti capite arboris Indicæ nomine ex Theophrasto tertio loco posuimus, cuiusque verba adduximus : Nobis verò Musa de qua hic agimus, potius conuenire videtur cum secunda, cuius folium prælongum dicit, simile pennis Struthiorum, ut dictum. De Musæ enim fructu, nemo, præter Rauvolfium, ait villam prædictarum nozarum parere, ut ab eius esu sit vel fuerit interdicendum.

Fructum
lia descriptio.

Nona.

Rauvolfius.

Dodon.
Mose.

Lob. & Pena.
Arbor d.
danno pro
hibita.
Folia Cam
ma.

Vala. pa
gonere. Pa
gonia.

Musa vulg.
Cassalp.
palma spec
ies.

Discremen
inter Algæ
latifolia.
Aculei.

Musa d.
rabum
Clusio.

Pala:

Figuera
Banana.

Dodon. scribit Musam nunc in Syria Mose vocari, additque Græcis & incolis Christianis ac Iudeis arborem censeri, de qua à Deo sibi prohibita comedit Adam.

Lob. & Pena in Aduers. testantur folia Musæ portentosæ magnitudinis se habuisse: cuiusque effigiem, fructum, floresque affabre delineata esse apud Matth. Idem in Obseru. tradunt foliis esse Cannæ Indicæ maioribus, quibus Gummi Elemi inuoluitur sesquipedalibus, duos pedes longis, infernè compressis. Iam supra annotatum: Palam quosdam Musam existimare, quam Theuetus Pagonere vocari dixit: fructum Pacina: Ouid. Plantarum: quæ omnia nomina ad Palam vtcunque accedunt.

Musa vulgè dicta, ut scribit Cassalp. inter Palmas videtur recenseri posse: oritur in Aegypto & Cypro, cuius folia in Italia visuntur sacchari panes conuestientia: distinguuntur ab Algæ latifolia, quæ similiter saccharum condunt in Occidente, quoddam Algæ folia nulla media costa donentur. Musæ autem folia costam perpetuam & crassam habent, per medium folium discurrentem, aliquando aculeis quibusdam à tergo armatam.

Clusius aliquot annis in ea se fuisse opinione tradit, ut existimaret Musam Arabum eam esse plantam cuius Plinius meminit his verbis: Maior alia pomo, & suauitate præcellentior, quo Sapientes Indorum viuunt &c. Nam serè omnia pulcherrimè ad Musæ descriptionem quadrant. Huc accedit, quod in Prouincia Malauar, quæ supra Indum flumen est, intra Gangem, Palam nomen adhuc retinet, à quo Latini suum Pala mutuati videntur. Vlyssipone, vbi aliquot plantas vidi [addit idem] minimè tamen fructiferas, nomen hoc retinet, vocant enim etiamnum Figuera Banana, id est, sicut Bananas ferentem.

Meminit huius fructus Lud. Rom. lib. nauig. ac tria eius genera [Malapolanda, Canchapalon, & Cadelapalon] constituit, de quibus paulò antè.

Meminit item F. Brocardus qui Terram sanctam descripsit, sub nomine pomorum Paradisi, quem per omnia secutus est Cardan. lib. de subtilit. & Theuet. lib. singularium Americæ.

Lenius verò in hist. sua fructum Pala, & arborem Pato aere nominat.

Quid si Palmæ genus illud sit, ait Clus. quod Theophr. in Cypro nasci prodidit. An verò eadem arbor, quam idem folium prælongum habere ait, simile pennis Struthiorum?

Ridiculum autem, inquit Garcias, est quod scripserit quidam Franciscanus. Appellatur, inquit, hic laudabilis fructus Musa, quoddam dignus sit Musis, aut quoddam earum sit cibus. Addit præterea eum esse fructum quem degustauerit Adam in Paradiso terrestri.

Alpino autore, Mauz seu Muza dicta Aegyptiis. Vocatur nunc Ficus Martabanis. In Malauar Chincapalones: Meliores Cenarius. Aethiopicis Iminga: sed hæc differentie eius sunt, quas mox in viribus specialius designabimus.

Et si ex prædictis satis pateat de locis, vbi nascuntur, tamen & hæc specialius addenda, propter nomina. Nascitur in Canara, Decan, Guzarate, & Bengala: vocaturque illis Quelli. Nascitur etiam in Malauar, vbi Palan: & in Malayo, vbi Pican dicitur. Provenit etiam plerisque aliis locis, & in ea Africæ parte quam Guineam appellant, vbi Bananas nuncupatur, teste Garcias. Pauci crescunt Topoli, sed ex vicinis locis satis copiosè inuehuntur, ut scribit Rauvolfius. Itaque ex Orientali in Occiduas Indicas insulas, adeoque in Portugalliam translata Musa iamdiu multis innotuit. Eandem vidimus Patau in ædibus Priuli, sed emortuam ob præcedentis hyemis scuritiam.

Hæc planta non nisi semel feritur. Nam semel Tempus & sata, ex trunci pede multos stolones emittit, qui satio. in arbusculas euadunt. His itaque stolonibus propagatur. In America semel aut summum bis fructus fert. In Aethiopia & Arabia vicinisque insulis etiam trisera est. Ex Garcias & Theueto.

Integrâ vult ante maturitatem colligendam Collectio: præcipit Ouidius, cum videlicet aliquis fructus flauescere incipit, deinde in ædibus suspendendam, illic enim plenam maturitatem consequitur. Formicæ huic plantæ admodum infestæ sunt, indeoque plurimæ initio perierunt, antequam aduersus eas inuenta essent remedia.

Musa, ut scribit Rhases, calida est, stomacho noxia, fastidium & nauseam inducens, & promptè in bilem fluam conuertitur: sed aluum subducit, & gutturis asperationes lenit. At Serapio ex aliorum autoritate Musam in medio primi caliditatem, & in fine humedantium ordinis ponit, parum nutrire, & vtilem esse aduersus pectoris, pulmonis & vesicæ ardores: lenire aluum, sed grauitatem stomacho parere iis, qui eius fructu multum vtantur, hepatisque obstructions parere. Ideo si complexio sit frigida, eius qui fruitur, superbibendum melicratum, aut oximel, aut Zingiber conditum. Augere tamen sertum in vtero, renibus conferre, vrinas ciere, & ad Venerem incitare. At ex Auic. sententia, paucum præbet alimentum, bilem generat & pituitam: prodest tamen aduersus pectoris & pulmonum incendia, stomachum verò offendit. Ideoque biliosis ab eius esu, oxymel cum seminibus propinan.

Poma Pa
radisi.

Pato:

Palmæ!

Musa cry
mon redi
culum.

Adami po
mum.

Mauz.
Muza.
Ficus.

Locus.

Quelli.
Palan.
Pican.

Bananas.

Collectio:

vires & vi
sus.
Temperat.

Purgat.
Guttur.

Ardores
pectoris &
vesicæ
stomachum.

Viendū
madus.
Fertus.
Renis.
Venus.

Parum nut
rit.

nandum: pituitosis mel. Idem & renibus opitulari tradit: vrinæque prouocare.

Garcia tette commendatur si fructus, qui in Martaban proueniunt: primùm enim è Bengala edelati sunt, deinde sati vt grandiores euaderent. Sed quos *Cenyrins* appellant, laues, flauis, & pleni, odorati, & palato gratiores. *Chincapalanes* Malauaris dicti suaves quoque sunt & palato grati, pleni, colore virentes. Laudantur etiam in Sophala nati, quos *Æthiopibus* *Iminga* vocari diximus. Inuenitur etiam in Bagum alifque prouinciis, genus quoddam amplum, plenum, palni longitudine. Id assatum & vino deinde inaceratum insperfo Cinnamomo, multò melius sapit, quàm malum Cidonium assatum. Idem fructus per medium sectus, & in sartagine cum saccharo probè suctus, insperfo cinnamomo, gratissimus est cibus. Idem in duas partes per longitudinem apertus, & vtrique incisus, deinde insolatus, gratissimus est saporis, & carcas succi bonitate superat. Tegulæ item impositus & in clibano coctus, cor rehit, & suauissimus est. Sunt qui cum carnibus elixent, cortice exempto ollæ imponentes cum carnes ferè coctæ sunt, diutinam enim coctionem non fert: neque inaturus nimium, neque omnino acerbus deligendus est. Sunt qui crudum edunt, at maturum, sine pane alioue aliquo condimento, gratissimum enim est saporis, nec minus salubris & facili concoctionis, vt testatur *Ouedus*. Plantam ipsam collecto fructu, spontè exiccare sinunt, tanquam in posterum inualem: aut amputant, in domesticorum Elephantorum pabulum. Nonnulli interiora tenerioraque, antequam explicentur folia, florumque thyrsum *P. pere*: *Zingibere* recenti, allio, sale, & aceto condiunt, & Capparium modo edunt. Folia verò quoniam amplissima, mollia, frigidaque sunt, substernere ad accumbendum in æstu solent: & ambustis non nunquam imponunt, autor *C. sta*.

Alpinus refert huius fructus substantiam mollem esse, pinguem, lentam, dulcem, atque apprime suauem, eam comedere assueus, sed stomachum grauare, difficulter concoqui, multum nutrire, succum generare crassum ac lètum, quo viscera obstruuntur, præsertim hepar. Opitulari tamen tussientibus, & suspitiosis ex calore factis: eius decocto vtiliter vti incolas ad tussim ex calidiorum humorum destillatione genitam, atque ad pleuræ & pulmonum inflammationem, ad inflammatos renes, & ad vrinæ difficultatem. Aiunt etiam iidem fructum commendatum, vel decoctum assumptum Venerem incendere. Fructuum cortices exiccatos multam vim habere ad roboranda omnia viscera iidem affirmant, eodem Alpino referente, cordique opem ferre ex ipsis paratum decoctum in aqua *Calaf*. Vnusque huius decocti ad febres pestilentes apud eosdem dicitur valde vtilis. Puluerem quoque ipsorum corticum in cordis passionibus cum aqua *Calaf* dissolutam hauriunt.

ARBOR POMIFERA.

AN MVSA?


CAP. LXXV.

Descriptio IN Aegypto abundant, inquit *Gabriel Giraudet* in *Iun. Hierosolym.* boni fructus. Sunt ibi arbores pomiferæ, magnæ altitudinis, foliis cubitum longis, & pedem latis, ferunt poma longa, similia cucumeribus. Pomum secatur per me-

dium, vel quocunque modo, reperitur in medio sectionis figura nucis, esui sunt optima: alibi non possunt ferre bonum fructum, intra verò 7. dies putrescunt. Sunt & aliz pomiferæ arbores quæ ab vna parte morsuram habent vocanturq; *Poma Adami*, parua sunt & similia nostratibus & esui commoda.

FICVS INDICA LINSCHOTTANI.

CAP. LXXVI



Facile concessimus hanc *Ficum Indicam* *Linschottano* dictam, vel ad *Musam* antè dictam quoque referendam, vel certè eius aliquam speciem esse aut varietatem: quia tamen icon hæc, vt videre est, euariar, & ipse quoq; *Linschottanus* peculiaris quædam de hac tradit, placet ex eius observationibus historiam paucis continere.

Ad figuram itaque ære exsculptam hæc tradit. *Descriptio*. *Ficus Indiæ* præstantissima ad hominis magnitudinè crescit, foliis longis ad stuporem, & in varios vsus commodissimis. Fructus vuarum specie in magnitudinem *Cucumeris* multiplices caulibus adherent. Racemum duntaxat vnum quæque arbor fert, & detruncatur tum arbor, quæ continuo breui spatio excreuit, & nouos fert fructus: communis *Indorum* cibus, & sunt præstantissimi ex *Cononor*. Racemus aliquando duorum virorum vires implet, vt & *S. Scriptura* testatur. *Indiarum* *nische* *Vygbe*: *Ficus Indiæ*.

Idem in historiis nauig. specialiùs de ea scribit, in hunc modum *Ficus Indiæ* multiplex est, modò crassiore, modò tenuiore forma, diuersis præstantiæ notis. Verùm eadem omnibus imago ac color idem, arborque ipsa eodem modo viri staturam æquat. Folia habet vlnæ magnitudine tres dodrantes lata, iis *Turcæ* vtuntur chartæ bibulæ vice ad cucullos. Lignum arbor non habet, sed similitudine arundinis truncum. Quod senescente arbore exteriorem corticis partem tegit, in modum cribri ex pilo facti figuratur, aspectu tamen crassius aliquantum: intorsum eadem folia cucullata ac clausa apparent, in mediū hominis altitudinem tum explicant sese ac per vices excreunt: ita vt vetera à recentioribus successione quadam expellantur, donec arbor iusto incremento steterit, fructumque maturum protulerit. Folia in medio crassiore quo diuiduntur, nervum habent. Interfolia ex arbore surgentia flos nascitur, magnitudine oui *Struthionis*, colore purpureo, ex eo longiore incremento ramus prodit, non ligni quidem materiæ, sed caulis brassicæ, *Ficus* coaceruatos abundè proferens. Primò quidem *Fabarum* formam habent, cum adhuc voluulis includuntur, magnitudine mediū palmi, pol-

licetque tres aut quatuor latz, Cucumeris crassitatem nanciscuntur. Ramus hic serè semper C. ficus habet, plus minusve, quæ ut vix in nodum coguntur. Racemi inde quidam ita magni, ut duorum virorum baculo baiulandum onus impleant. Nondum planè maturi scinduntur, cum inter viriditatem & flauedinem etiamnum hæret, tum alibi à trabe suspensi, intra 4. aut 5. dies commodè maturefcunt. Arbor siue planta vnicum duntaxat racemum fert, quæ mox tota detrunctur, ac mensis spatio iustus denud incrementis adolescit, & fructum toto anno ita perpetuum fert, tantq; abundantia, ut communiter Indis in cibi vltus seruiat, gustu linè bono. Decorticantur autem, follicul s instar Fabarum existentibus, licet aliqui tenuiore sint tegmine: interius albescent, ac morsu farinam & butyrum duci mixtione representant, ideo panis ac lacticiui loco secuiunt, simplici victu, quo corpus hominis atq; alio cibo facillè possit sustentari, ut in India multi sunt, quibus toto vitæ tempore particularis cibus ex ficu est.

Plurimas ac communiores Lusitani *Figos d'orta* vocant, quasi hortenses diceret, suntque aliquantulum crassiores. Aliæ quas *Serouina* dicunt minores ac extrinsecus læuiorcs, velut optima notæ, suauit odore pollent, ac gustu percommendo. *Cadolina* ficus etiam in pretio sunt.

Ceterùm maxima laus *Chincapina* est, regionis Malabar. Flauescunt illæ parùm, viriditate exteriorc maximâ, largæ ac proceræ, odore suauit, ac aquæ rosæ æmulo. Sunt & aliæ genera. Quæ in Cananor reperiuntur palmæ longitudine, ac crassitudine pro rata, ob magnam ibi copiam siccantur, ac demptis folliculis per Indiam, mercaturæ quodam genere distrahuntur. Quando maturefcunt, attantur plurimùm, quod i crude ob acrimoniam, quam in deglutiendo adferunt, non perinde græ sint. Colore introscum rubescunt.

Ceterùm allatæ decorticantur, ac in orbes scinduntur, adiecto vino cassiæque contusâ, præstantia cibi suauissimâ, etiam supra Cidonii mali assati excellentiam. Ut ceteræ oblongâ scissione scinduntur, saccharoque iniecto costæ, condimento probo, ab Indis summopere expetuntur. Ex ficubus quippe præcipue plebi sustentatio.

Ex omnibus Indiæ ac Orientis locis inueniuntur, ut & Mosambicæ, Ormuzii, ad oram Arabæ, Malabar, Malaccæ, Bengalæ, &c. Gufarattæ, Decanini, Canarini, Bengaleses eas *Quelli* nominant, Malabares *Palan*: Malacitani *Pysan*. Etiam in Arabia reperiuntur, quas *Musa* vocant: Hierosolymis, Damasci, Cayri item habentur, ut ab his accepisse se testatur Linchottanus, qui illis in locis negotiantur: persuasum inde quibusdam, primum patrem Adamum ex hoc genere fructum cum peccato gustasse.

Verùm cum in Testamenti Veteris historia legimus, exploratores Terræ sanctæ racemum vuarum retulisse, cui gestando vix duo homines sufficerent, mihi, inquit idem, huius fructus recordatio sæpè incidit: num talis ille racemus extitisset, qui eodem more ab Indis ad domum Archiepiscopi Domini mei translatus, haud falsa illius historię imagine apparebat. *Hactenus Linchottanus.*

Annotat Paludanus Ficus Indicas apud Arabes, non *Musam* aut *Amusam*, sed *Acro* vocari, arborem verò *Daracht* iisdem. A Brasilianis *Pacora* & arborem *Pagouer*: in Guinea *Bananas*, in Malabar *Palan*, in Malacca *Piran*, in Canara, Decan, Gularatta & Bengala *Quelli*: quæ nomina plera-

que & Musæ tribui præcedenti capite dictum. Quin & idem Paludanus addit à Brocardo in Terræ sanctæ descriptione, Paradisi Malum ab Ouedo *Platanum* vocari, atque vires super Musæ dicatas ex Arabibus etiam huic tribuit, quasi eadem hæc cum illa sit, aut certe aliqua eius species supra dicta.

Paradisi autem *Malaided* vocari putat, quod a meo no & suauit gustu, odore item ac colore probentur, gustum quippe acidum dulcedinem habere adiunctum: odorem velut rosarum nates afficere: colorem flauum, pulchrè item viridem oculos pascere. Accedere ad prædictas rationes figuras Crucis, quæ obliqua fructus scissione apparent, de quibus Syria Christiani varia referunt, eandem peregrinis ostendentes.

PACOVERA AMERICANA, MUSEA, UT VIDETUR, SPECIES.



Arborem Descriptionem hanc, auctore Theueto, syluestres Americani *Pagouera* suo idiomate vocant, quæ nec in Europa, nec in Asia vel Africa proueniat, quæq; fortè non temerè præ aliis omnibus mirabilissimâ dicas. Caudicem emittit homine non altiore, crassitudine ea, quam ambæ hominis adulti manus ex æquo capiant & amplectantur, substantia adeò tenera, ut cultri acies facillimè penetret. Folia latitudine bipedanea, homine sesquidodrante longiora aut amplius. Eiusdem speciei vidisse se, ait idem, in Aegypto & Damasco, Hierosolymâ redeuntem, sed folia ad ista vix mediæ esse longitudinis. Magna quoque differentia est in fructu: nam huius arboris, de qua hic loquimur, fructus maximus pedalis est, crassitudine cucumeris, ad quem etiam figurâ satis bene accedit. Hunc fructum incolæ suo idiomate *Pacora* vocant, qui probè maturus præcipue est suauitatis facilisque digestionis. Colligunt ante perfectam maturitatem, & in suis castis recondunt, ut nos fructus nostrates. Crescit in arbore in glomerem seu racemum congestus, triginta aut quadraginta simul proximè sibi inuicem nati ex surculis è stipite emeris, ut in figura appositâ videre est. Et quod in hac arbore mirabilius, semel tantum fructum fert, qui magnæ parti incolarum cedit in nutrimentum. *Hæc Theueto.*

Lenius *Paco-are* tradit esse foliis Lapathi aquatici, longitudine sepedali, latitudine bipedali aut latiori, nec putat tantæ magnitudinis folia vspiam extare in Europa, Asia vel Africa: tenuia esse, ventisque agitata ita discindi in partes ut primo obtutu quis Struthiorum pennas existimet, Matthioli addit idem, meminisse Musæ, quæ bene

Racemum magnitud.

Maturatio artificiosa fructu.

Sapor.

Cibus.

Ex ficu duntaxat quidam vltus tant.

Ficus hortensis

Serouina Cadolina Chincapina.

Cananorina.

Condita.

Quæli.

Locus.

Synonyma.

Quæli. Palan. Pysan. Musa.

Fructum peccati.

Racemum Terra sanctæ.

Morin.

Daracht.

Pacora.

Pagouer.

Bananas.

Palan. Piran.

Decan.

Quæli.

Paradisi Malum.

Cur Paradisi Mala adest? Sapor. Odor. Color.

Figura Crucis in fructu.

Folium.

Pacora.

Colligunt.

Paco-are.

Musa mala.

benè picta est, & aliquatenus similis *Paco-aire* Brasilianorum.

Musa Pacouera.

i lult. Lugd. Musam Pacoueram Theueti vocat. Patet verò tam ex Theueti quam Leri verbis nò eandem hanc esse cum Musa ex Matthioli. depicta. Quis & ipsa quoque icon non parum differt tam à Musa quàm à Linschottani Ficu Indica proximè precedentibus capitibus propositis. Peritus tamè diu hanc relictam relinquimus, an diuersarum plantarum sint icones, vel vnius plantæ figuræ diuersæ.

MALVS AVREA, FOLIIS

PRÆGRANDIBVS.

CAP. LXXVII.

Descriptio

Foliorum amplitudo, & quod Dodon. qui filius (quod quidem sciamus) exoticæ huius arboris historiam tradit, *Palam* Plinii [de qua paulò antè] huius quoque historiam hic poni postulabant. Ergo *Mali aureæ* Dod. dicitur, velle scribit, ad Mali Punici firmum accedit, Pomum & ipsum cognomento aureum: sed magna & proceræ hæc arbor est, longis ramis valdè patula: folia etiam prægrandia, tres subinde cubitos longa & diuoluta, in quibus crassiores venæ secundum longitudinem productæ, veluti in Cinnam. foliis, fructus pennæque est, ad instar humani capiti, forma & colore Mali Punici similis: habet verò & intus recondita complurima succi plena grana, sed oblongiora & maiora, quàm Punici mali, & colore non rubentia, sed aut luteo splendens, sapore subacidulo, ori grata. A quo huius descriptionem habuimus (inquit idem) sibi hanc Panorum in Sicilia visum reuocavit in hortum excellentissimi cuiusdam Medici: haud dubium autem, quin pergrina sit, & ex India vel aliunde illuc olim aduicta. Nomen autem hic vel ab his vel fructus huius nullum sibi aliud cognatum affirmabat, quàm Mali autem: atque hoc nomine fructum appellari. Potest autem hoc nomen accensisse, quòd grana aut luteum colorem referant. Plinius huius, ut idem Dod. putat, meminit lib. 12. cap. 6. ubi arborem hanc *Palam* fructum verò *Atienam* dicit refert. Plinii verba inueniet lector paulò ante capite de arboribus Indicis Theophrasti. Habet verò huius arboris descriptionem Dod. proposita quædam quæcum Musa conueniunt, sed plura quæ discrepant, ut conferenti patebit. De facultatibus verò (addit Dod.) nihil quoque aliud accepimus, quàm quòd ipsa aut colore succulenta grana valdè acutè febrientibus admodum essent & grata & vtilia: ut pote quæ calorem magnum contemperarent, ac litem vehementer sedarent.

Tabula.


Grana lutea.

Sapor.

Locus.

Malum aureum
Pala

Ficus
Febres
litem



finit, quemadmodum ex Cocco arbore.


ARBORES ALTISSIMÆ PALMITIS SIMILIS.

CAP. LXXIX.

In insula parua S. Maris altissimæ arbores crescunt absque ramis, arboribus similis, quas *Palmitas* vocant. Hæ fructum ferunt, qui externâ facie fructui *Ananas* quodammodo similis est, aureo nitore conspicuum. Intus grana parua latent qualia Mali Granati, quæ parte dulcissimi sunt saporis: reliquæ duri atque inuiles. Linschottanus.

BENIOINO OBVOLVTVM FOLIVM MAXIMUM.

CAP. LXXX.



Benioino ali. Quando solum Lugduni detraximus, quo obvoluta erat maxima gleba. Illud quidem arboris ne sit an herbae nihil certum habemus: apparet tamen ex eo fragmento, quod penes nos habemus, & hic depictum damus, maximum fuisse, adeoque & Musæ sortis folio maius. Est autem colore suffescente, costa

elata posteriorem folii partem secundum longitudinem percurrente, a qua nervi elati & ipsi, sepius oppositi, aliquando inæquali ortu, omnes obliqui prodeunt, inter quos spatium intercedens, vnam vnum latum est, interdum tres, subinde palmare: a qua nervi obliqui vltro citroque discurrunt uenulæ transversæ, semper aut paulò

PALMITES.

CAP. LXXVIII.

Descriptio


Palmitis nomine arborem depictam, & tabulis æneis Iconum parte 4. sculptam exhibent Brystrates in historia Indiarum Orientalis, de qua scribunt. Palmitis arbor est trunco crasso, quo folia longissima nullo pediculo hærent. Idem in itinere Holandico anni 1599. aiunt. In insula Don Galopes, vel D. Mauntii prope Madagascari inuenimus multas Palmitis arbores, ex quibus vinum

plus inter se distantes, aliquando breuioribus interuallis distat: quo nomine à Mulx quoque foliis distat, quæ à costa quidem longitudinem percurrente, obliquis illis nervis caret, transuersitque, de quibus diximus, venulis destituuntur.

OPUNTIA VULGO HERBARIORVM.

CAP. LXXXI.

Descriptio



Folia.

Succum.

Floris.

Fructus.

Prima folia.

Inter naturæ miracula hæc planta merito accensenda, quibuldam Ficus Indica appellata, ob quædam fructus similitudinem, licet planta non solum à Ficus, sed à ceteris quoque arboribus mirabili modo differat. Ipsa verò quoque in magnam euadit arborem, cui folia magna longitudine interdum plusquam pedali, latitudine sesquipalmari, ex

oblongo rotundata, pollicem crassa, infima etiam crassiora, duriusque supremis, foris membrana tecta, plurimis tuberculis asperata, è quibus spinulae albae acutæ faciliè consecretanti adherentes, infixæque aculeationem nauiam deferentes, [Matth. etiam sine spinulis visa testatur] succo intus turgente colore herbaeco, tactu vituloso, saluoso, qui exsiccat, granulosis arenæ tenuissimæ instar attritu digitorum dissoluitur: per quem discernunt nervorum plurimorum mediocriter crassorum reticulatus plus, atque hæc quidem folia ex alijs folijs iucundo connexu succrescunt, quibus etiam plurimum pro caudice vititur, & in brachia deducitur, ut in appolita figura aperitè demonstratur. Folia hæc cum tempore incrassantur magis, & sunt rotundiora, imò ligneam tandem substantiam acquirunt, præsertim inferiora, tumque & spinas magna ex parte amittunt. Femoris crassitudine obseruatum fuisse Gesnerus monet. Foliorum pinnis insident fructuum rudimenta multa, similiter spinosa, è quorum umbilico flores emicant Calathi Balastii quadantenus effigie, succulentiore magnitudine, multi, lutei, multis folijs vngue lationibus, totarum folijs similibus constantes, quibus marcescentibus fructus maturatur Ficum magnam adæquans, superne umbilicatus, pulpa sanguineo rubore maris tingente infecta, gustu subduli, sed quàm ficum insuauiore, [serinum quiddam præ se ferenti Cæsalpin.] granulis farsæ lentis ferè magnitudine, sed sinuatis & inæquali ambitu donatis, iisdemque concoloribus in sinu, ut cur ficulneis granis quidam conulerint, non videamus, sapore quodam peculiari, non tamen ingrato. Gesneri fructu grauem quendam odorem esse annotat. Cùm primum exit hæc planta [nam creuit nobis Montbelgardi, ex femi-

ne Romæ in diligentissimi Pharmacopœi hortu lecto] foliola duo emittit crassa, succulenta [ali-quod Sedi genus emergere diceret] inactonata, è quorum sinu coniugali ceu pili quidam candicantes & purpurantes, sinuatum spirularum primordia, simul exeruntur, quos non multò post solum sequitur iisdem vattum, & hirsutum totum, nec latum, sed teres ferè, quod tamen temporis progressu paulatim in latitudinem comprimitur, hincque aculei cum tempore etiam firmiusculi. Radicula nouellæ plantulæ simplex & albicans est. Eandem cum primis folijs iconi nostræ adiungi curauimus.

Tradit Matth. parere hanc plantam in Indicis regionibus foliorum summitatibus fructus Ficus nostratibus similes, sed crassiores, & qui anteriore parte in coronæ speciem desinant, colore ex viridi purpurascente. Interiorem pulsam perinde esse ac in nostratibus: verum adeo succosam secundamque, ut sanguineo succo Mororum modo manus inficiat. Exillat & gummi hæc arbor, succino flauo colore & substantia, si duritiem eximas lapidosam, admodum simile, & glebulis concretum & Tragacanthæ ferè in modum vermiculatum, adeo durum ut dentibus comminueret vix sit. Candela admodum flammam non concipit sed comburitur, nec tamen vliam odoris spiritus fragrantiam matremque quæque nullum saporis: statu dignum exhibet. Tale à Jo. Heriz nanno, indultio Pharmacopœo Basiliensi accepimus.

Esti verò faciliè in eorum eamus sententiam, qui negant plantam modò à nobis descriptam, veram esse Veterem Opuntiam, nihilominus tamen hic proponemus, quæ à Veteribus de Opuntia tradita, quæ nondum planè constat nobis, si ad aliam, ad quam tamen plantam sint referenda.

De ea Theophrastus tradit Fico Indicæ [cuius ramus in terram curuantur, eique se insidentes rursus radicanter, de qua supra] simile quiddam est, vel potius quodammodo mirabilius, si quæ ex folijs radicem mittat, qualem aiunt circa Opuntiam esse herbulam, quæ & cibo grata sit, & suavis gustu. Malè verò habet Scaligerum, quod tam claram tamque singularem herbam quæ & vsui & miraculo sit, non nominant Theophrastum mittendumque potius fuisse cursorum quod à se non semel factum testatur.

Plinius eadem pauis repetit, sic: circa Opuntiam Opuntia est herba, eam homini dulcis. Mirumque, è folio eius radicem fieri, ac sic eam nacti.

Ficus hæc est in India, inquit Cardanus, quoniam fructu & foliorum magnitudine Ficum refert: Eam Mexicanis, apud quos frequens est, vocant *Nu belti*, arborem Nepali: Indi autem insulæ Hispanæ arborem vocant & fructum *Tuna*: alii verò *Pitharam* etiam hanc generi adnumerant. Minus autem diligenter describit *Tunam*, non semel fallens nos, aut superficiali inspectione falsus ipse, nec eam exactè distinguit à *Pithaya*, de qua inter Cardanos.

Plinius Opuntiam plerisque Ficum Indicam nominari Matthioli testatur, & Indis suo idiomate *Tunc* vocari, censetque eandem esse cum Opuntia Plinii & planta illa Theophrasti circa Opuntiam crescente. Hispani *Higuera de la India* vocant.

Quidam, inquit Læpna, *Palam* Plinii existimant, quod affirmare non auiam. Nobis tanè descriptio *Pala* Plinii, Opuntia dicta, minimè conuenire videtur. Benzo notat Peruanis aliisque

Matth.

Sanguis succum Gummi.

Opuntia.

Theophr.

Scaliger.

Opuntia.

Nachli, Nepal, Tuna, Pithara.

Aliquot Cardani errores de- sequuntur. Opuntia ex Ficus Indica multum i- dem. Tunc. Opuntia. Pala.

Anc.

LIBER PRIMVS.

Tunz. Americæ provincie incolis *Tunna* appellari. At Guland. in epistol. ad Langium, Opuntia non Carduus est, ut, cui Tunz nomen, sed herba elui apta.

Tunz Card. Er in Theone: magnus, inquit, error Matth. apparet in Opuntia, quod Theophrasti testimonio non videtur, non autem arbor, ut ipse falsò adstruit, cui vulgus perperam Fici Indicæ nomen imposuit. Ea Theophrasto *ἀνώνυμος* est: Plinio alioquin *Palz*, & Ariano hist. Alex. lib. 8. Talz nominibus celebrata, ut alterutrum ferè locum mēdo sum esse necesse sit.

Gesner. liberè dicit Ficum hanc Indicam aliquibus indiculè Opuntiam nominari: ineptè verò ab alijs *Carduus Indicum* propter spinularum in folijs cœu pemissos.

Idem. fructum dodrantalem ferè, verrucosum, ut Cucumis & Pannum mirabile, cui etiam ferè colore similis sit in maturitate ex Clusio annotat: qui conjicit hoc esse Euphorbium quod Io. Leo in descriptione Africæ describit, id quod Gesner. diligentius considerandum monet. Verùm Clusij opinio nobis non probatur: non enim est Euphorbium Leonis Africani, nec est Ficus Indica Vēterum hæc planta de qua agimus, licet Clusius Cardanus & alij Ficum Indicam & Cardum Indicum vocitent, quod nomen prius etiam Pena & Lob. ei tribuunt in observationibus: relictis in Aduersariis Fici feram Tunem Indorum appellant, ad eundam homonymiam huius nominis, *Ficus Indica*, quod alijs arboribus tam à Vēteribus quàm à Neotericis tribuunt in superioribus patet.

Cæterum peculiaris est observatio Dodon. vel potius error de huius plantæ flore: sic ait. In extremis folijs primum flores erumpunt oblongi, deinde fructus sub quantum quorum fastigia foliosa quadam instar coronæ ambiunt, veluti ostendit icon quam Iac. Ant. Cortusio acceptam ferimus. Hæc ille. Vides quid sit plantæ vel partis aliquam eius descriptionem ex icona conderat: melius Annum estingeres ex eius umbra, si locari liceret. valletur Dod. qui iuxta iconem suam appropinquat florē separatim calyculo longo, qui videtur esse flos Mexicanus, seu Iasmini Indici vocati, cui nihil ferè simile cum flore huius plantæ. Si hunc ei misit Cortusius pro eius flore, sanè impositi ipsi. Non sunt oblongi flores Fici feræ huius arboris, sed tales quales supra diximus: quales & ipse Dod. in sua icona à Cortusio nulla adpictos foliorum pinxis ostendit, quamvis non florem, sed foliosa quadam instar Coronæ vocitet ne sciens eum esse florem, & coniectura sua umbratili uti malens quàm de re sibi ignota scripsisse videri.

Cæsalp. hanc à Ficu Indica Theophrasti non valde abimilem dicit, & ab ea nequaquam genere differre: Nos planè contrarium dicimus: vter veriora tradat patebit viriusque historiam diligenter consideranti.

Fast. Lugd. ait: Opuntiam esse non sine ratione quis suspiceretur. Camer. Opuntiam vulgò habitam ducit à Theophrasto. Opuntia, Anapallum dicit à Bellonio. Legimus quidem apud Bellon. lib. 1. cap. 44. Arborem dictam, Anapala, semper virere in Cæta: an verò intelligat plantam à nobis descriptam, in tanta breuitate dubitare ration. bilius quàm asserere. Lob. & Pena. in Aduers. dicitque Muha seu Opuntia. Tabern. Ficum Indicam spinosam: Germ. *Stachelbeere Indianisch* Feigen appellat. Schvvenckel. licentiosè simpliciter Anapallum Bellonii, & Indianisch Feigen vocat, ab incerto nomine Latino.

In Americæ insulis Peruvianis, Hispaniola, Nicaragua, Guattimala, & toto Nouæ Hispaniæ regno, tunc ac spontè abundè arborefcit, teste Benzoni. Peregrina in Europa est arbor, sed in Italia, Hispania Galliis atque etiam Germania iam ante multos annos in magnatum hortis & atrijs potissimum in pensilibus Adonis coli cœpta. In Monachorum Galliæ Narbonensis Paradisus multis & suburbanis ad Montpelium, non modò elegantes culte, sed etiam neglectæ plantæ multos annos viruerunt, ut annotant Aduersaria. Et Camer. testatur Neapoli in Monasterio pone Castellum nouū vidisse altero tantò maiorem quàm hominem, caudice duro ac lignoso. Tales & nos vidimus Romæ in Belvedere dicto Paradiso, Pontificio Vaticano, alibique passim Italiæ & Galliæ lauioribus hortis. Sed quid calidiora illa loca dicimus: Coluit iam dudum & etiamnum colit in instauratissimo suo horto plures arbores Basileæ Cl. D. Platerus, quouis homine altiores, cui etiam floruit vti vidimus. Colimus & nos Montbelgardiz elegantes, tam ex semine quàm ex folijs defixis natas. Basileæ gummi profudit planta supradicti pharmacopœi, quod antea descriptissimis. Rarius etiam fructum ferunt in Gallia, qui ad maturitatem perueniat. Maturum vidimus & legimus Romæ in horto Cornuti perussini pharmacopœi, vbi florēt aliquid oblectauimus Maii fine: Montpelii, Iunio.

Apud nos in hypocausta & conclauia reponebant tempore hyemis, & à frigore magna cura præseruanda: alioqui facili putrescunt, & frigoris sunt impatientissimæ: attamen & loca nimis occlusa odit.

Tam vana est hæc planta, ut tum seminulo facta, tum folio lumen medio tepus de folio crescat fuillimè. Vtroque enim nobis prouenit modo & abis prouenit seminis. Semine paucis interiectis diebus creuit: quamvis Camer. 16. deinde à fatu die alteram, alteram verò etiam tertio deum mense sibi produisse tradat, causatus sicut sine hyemis reliquias, alioqui maturius fortè proditura.

In Italia & calidioribus Galliæ locis feliciter crescit, & hyeme etiam in hortis sub dio relinquitur: sed vndique stupis involutam induunt, & rigatione abstinere. In Gallia Cisalpina non fructificat, ut narrant, ne Patavii quidem aut Ferrariæ. Facili tamen crediderimus vel ibi diligenti cultu ad frugem peruenire posse. Locis namque calidioribus, ut Romæ (ut diximus) alibique & in Græcia, fructum perficit, quem aiunt longum esse digitos ferè octo, graui quodam odore. Superiōribus annis, cum diuersis in locis Germaniæ hæc plantam seruare aliqui conarentur, in cellis vinariis nimirum (vbi solent) omnibus periit. Septimo aut octavo anno fructu profert, qui maturascit autumno.

Sapor plantæ, quem Sedi maioris similem exhibet, satis apertè, vel Lacuna indice, ostendit frigidam & humidam esse. Experientia constare idem tradit, vulnera recentia mirabiliter glutinare. Aliquot Ficus comestæ tingunt urinā rubro sanguineo colore. Urina sanguinea ignotibus causam insignem terrorem attulit non sine consociorum & medicorum risu. Cautio itaque sit non edendum alioqui urinam cruentam ex plurimorum Autorum observatione causaturum. Etenim hoc & Matth. & Pena cum Lobel. Cardanus, Gesnerus, Camer. alique plures qui fortè non magis hoc ipsis retulerunt, hoc testantur. Referunt hoc idem qui Orientales insulas sunt

Tempus Vires & fructus. Tempus. Vulnera vrinæ cruenta.

peragat. Folio dissecto multus & tenacissimus humor emanat, instar albuminis oue coagulatus, et in viceribus antiquis vtiliter adhiberi tradunt. Ipsi fructus refrigerant: haec quoque foliorum pro aqua vtuntur Indi. Granorum quae fructibus illis continentur ad sericum tingendum vtilis est autore Gesnero & Cardano.


Tindura.

Sed mox lib. de var. rer. subdit idem Cardanus: Ceterum an omnino ex granis illis sericum tingatur, haec multum refert quandoquidem aeternae res, non quae mutantur edocemus: singula enim cursu temporum & multa cum regione mutantur: at ratio perpetua manet, velut si quid colorem hunc rubeum splendorem recipiat: substantia vero & tenui & densi mediocriter praeditum fuerit, tunc cum vires habeat effitaces, tincturae serici vel lanarum erit idoneum. Quod si hic (Mediolani) planta haec posset propagari, melior esset haec Chymica quam metallorum: nam non solum sericum, verum & lanam hoc medicamento inficiunt, purpuramque seu Chermesinum vocant. Haec ille. Sanè vero, Oedipo vel Delio aliquo natatore opus esset, qui edoceret, quid prius illis suis verbis vellet: vel potius Scaligero aliquo magistro, qui vel male sentientem exploderet, vel ineptè loquentem castigaret. Quid enim hoc ad rem, querere an granis sericum tingatur: tum dicere, parum referre, quoniam res aeternae docere propositum habeat, non mutabiles: subsequenter verbis quid sibi velit, subolfacimus tantum. Granis inest quidam adstrictio, quibus color à succo in rem tingendam manans firmatur & quasi ne euanescat aut alienetur, coercetur. Perinde ac alumen, galla aliae eiusmodi, diuersis coloribus saturandis & figendis (vtiliter hac voce Chymicis consueta) accommoda. Nobis ita visum: succum fructus, colorem, granarum administrata, coloris firmationem, fixationemque subministrare. In succulenta namque fructus substantia cruentum illum colorem in semine nullum, atque verò nullum, praeter leuem quandam adstrictionem, haecenus deprehendimus. Meliora certioraque docenti libenter herbam porrigemus. De tingendi enim modo ex hac planta haecenus nihil certi & definiti nobis compertum.

Purpura.
Chermesinum.
Cardanus.

OPUNTIA VULGO DICTA

COGNATA FERRUMINATRIX Indorum.





A Rhusculi in Descriptio India sponte natam, & (Ficus Indica vulgo dicta) admodum cognatam, vocant incolae Ferruminatricem, actionem fracturis & luxationibus peramicam. Perpetua viret, & foliorum sobole successiva arborem magnitudinem adipiscitur: indeque plane foliis [cum Opuntia dicta] sed fructu minore & spinosiore, purpureum viscidum

succum remittente, adque imbuendos pannos infectura tenacissima. De eadem & Histor. Lugd. tradit: Indis Ferruminatricis nobis Opuntia Ostocellos dici potest. Ramos profert foliis refertos aspectu deformibus, admodum spissis & spinosis, Tunc foliis similibus, vt describit autor generalis Indiarum historiae. Rami isti folia primum fuere, ex singulis singula oriuntur, atque ex his alia, quae demum indurantur, & mutuo sibi succedente foliorum sobole in ramos abeunt, ac tandem arboris magnitudinem adipiscuntur, quae perpetuo viret caudice in imo & ramis cinericis, asperis.

Succus fructus ad inficiendos pannos infectura tenacissima: vt dictum folia spinis exemptis trita & cataplasmatibus modo imposita fracta ossa mirè glutinant, sed illa prius locis suis aptissime reponi oportet. Nam admotum Cataplasma eadem agere in partem coepit? ita haeret, vt auulsu perdifficile sit. Ea verò sanata sponte excidit.

FINIS LIBRI PRIMI.





HISTORIAE

GENERALIS

STIRPIVM

LIBER SECVNDVS.

EARVM EST ARBORVM ET FRVCTVVM

QVI POMI QVOQVE VOCE GENERALIORI COMPRA-

HENDVNTVR: SED FORVM POTISSIMVM, QVI OSSEAM NV-

cem carne obiectam habent, esculentam, vel non esculentam:

& quorum aliqua cum his affinitas.


6699

MALORVM natura, qua vel carne constant pulposa & eduli, vel tali aliqua substantia, quam heterogeneam, qua tamen, aut certe magis ex parte sit edenda, habemus dicta: ceteri externarum quadam mixta conditione irrepisse videantur. Eorum enim omnia ita exacte velut in cancellis quosdam cogas, quod hinc n. d. d. m. n. a. n. a. t. a. e. Partem nunc diligentius persequamur, quorum ista visceribus comprehensa, nobilibus & vegetis propagandis principium dandunt: seu, ut Plin. ait, virtutumque cunctum fructus, cum fructus alibi mutatur vitio: nempe per ramum esse. Quorum natura trigemina est, corpus, deinde lignum, rursusque semen in ligno, ut Persici, & quae maxime tractantur.

MALVS PERSICA.

CAPVT I.

Descriptio



IUSTA magnitudinis arbor est Persica, caudice satis crasso, ramis brachiata, cortice rubente & fuscescente. Flores profert pulchros dilute rubescences, odoris exigui, e quinque foliis liris compositos. Medium occupant stamina multa, longiuscula, purpurantia, aut alba, cum parvis magnitudinis stylo. Infident autem flores sine pediculis, ramorum tuberculis adnati, calycibus rubentibus in quinque foliola acuta sese explicantibus. Poma non nihil rotunda, densa villosa tomentosa, ex luteo herbacea, alias pulchre flava, alias punicea arete decorata, carne alba vel pallida, interdum flava, rarius ru-

bente penitus, aut sanguineis guttis cruentata, sapore dulciusculo, pertinaci aethere osclentum vix deferente, in quibusdam tamen speciebus facile solubili (quae bonitatis nota habetur) cuius profundis sulcis & scrobiculis passim se insinuat. Est autem osclulo crassities insignis, durities fere inuicta, sed interna facie laevis politus, externa multis sulcis profundiusculis nullo ordine canaliculata, binis valvis constans: in quo nucleus callosus, oblongus, exacutus, albus, flavescente cuticula vestitus, qua detracta geminus conspicitur, amarus, non tamen guttu insuavis. Folia oblonga, Salicis, acuminata, crenata, Amygdalidis, quibus persimilia, maiora, sapore amaro, qualis in Persicorum nucleis, ingratiore tamen. Materies munda, & circa media fere punicea, satis firma, ob id ad torni artificium praeter alios expetita.

Osclulo

Nucleus

Materies

Hae arbor non multam aetatem acquirit, ut e. Acta. nimis cito & prompte adolescit, & ad frugem peruenit, ita non multis annis post senescens tendit ad interitum.

Porro an de hac arbore aliquid Theophr. prodiderit, haud ita facile iudicari. Persica [venit] Gaza apud Theophr. lib. 3. c. 5. in Aegypto & locis proximis fructificat, quanquam in Rhodo usque ad florem duntaxat devenit. Quae verba Dalech. citans de Persico hac nostra vult esse in-

An Theophr. de Persico et germ.

berculis adnati, calycibus rubentibus in quinque foliola acuta sese explicantibus. Poma non nihil rotunda, densa villosa tomentosa, ex luteo herbacea, alias pulchre flava, alias punicea arete decorata, carne alba vel pallida, interdum flava, rarius ru-

To. n. 1.

telligenda, addens: aliquos perperam pro Persica legere Persicam. Nostra exemplaria *persica* habent. Ita & Scaliger legit, & malè ait verè à Gaza Persicum. Vult enim duas esse *persicas*. Videretur itaque nò agnouisse aliud esse *persicum* aliud *persicam*: *persica* sanè apud Athen. legitur pro Persica alicubi. Monendus est autem Lector, tres esse arbores, vnam Nuccem Persicam quæ nostra est iuglãs: alteram Malum Persicam, de qua hic agimus, quam fortè non malè *malum* nomine exprimas: & tertiam veram *persicam* Theophrasti, de qua suo loco. Diosc. sanè manifestè distinguit Persicam, à Malo Persica, diuersis locis de ijs tractans. Et Corna. suprâ citato loco Theophrasti, *persica* legi vult: Et rectè, ita enim quoque habetur lib. 2. caus. c. 4. vbi Theophr. eadem repetit: vt Theophrast' nihil de hac nostra Persico egisse videatur, quantum quidem nobis hæcenus constat: Et locus citatus de Persica intelligendus videtur: neque quicquam exprimit, quod nostræ Persici speciem aut naturam declararet, vt mirum sit Dalechampiū ex Plinii sola versione [deprauata tamen] iudicasse ex Plinio apud Theophr. *persica* vel *persicum* legendum, Theophrastumq; de nostra Persico locutum. Nam quod Plinius, lib. 15. c. 13. scribit: In totum quidem Persica peregrina etiam Asia Græciæque esse, ex nomine ipso apparet, atque ex Perside aduecta. Persicæ arbores serò, & cum difficultate transire, vt quæ in Rhodo nihil ferant, quod primum ab Ægypto earum fuerat hospitium. Iustum est, venenata cum cruciatu in Persis gigni, & pernarum causa à regibus translata in Ægyptum, terra mitigata. Id enim de Persica diligentiores tradunt, quæ in totum alia est &c. Hæc inquam verba tota, non postrema tantum, vt Plinius ait, sed priora quoq; de Persica intelligenda, ex Theophrasto. Teste etiam Euricio Corao Persica & Persica, diuersa sunt diuersarum arborum mala.

Synonyma Diosc. *persica* *persica*: Serap. *shanch*, id est, Persicum. Auic. Persica. Bellunensis ponit in margine *Chanch*. Matth. *Sanch* habet.

Harpocrati taciturnitatis Deo Persicam sacram esse tradit Plutarchus lib. de Iude & Osiride, quoniam huius arboris folium lingue simile sit, fructus cordi.

Rhodacina. Persica mala, è Græcis nonnulli *persica* quasi Duracina appellant: nonnulli, vt Aristophanes Grammaticus, in Glossis Laconicis vocari dicunt, (vt Athenæus tradit) Coccymala, & oxymala Persica, & Adria.

Idem Athen. tradit Theophrastum de Persica agere, quando sic ait: Theophr. libro secundo historiz plant. de ijs tractans, quorum fructus non est conspicuus, ita scribit. Manifestum quidem est maiorum omnium plantarum principium, vt Amygdali, Nucis, & aliarum huiusmodi, itemque Punice mali, Piri, Mali, excepto Persico, cuius obscurum est, ac minimè tale. Atqui hunc locum nec Dalecham. neque nos hæcenus quamuis diu & diligenter questum inuenimus. Placet itaque Dalecham. sententia, locum hunc corruptum esse, & ex aliis locis eiusdem auctoris ita restituendum. Manifestum quidem est maiorum omnium plantarum principium modis pluribus, veluti Nucis, Amygdali, & aliarum huiusmodi: item Punice Mali, Piri, excepta Malo Persica (vbi *malum persicum*). Hæc enim pluribus modis minimè gignitur. Persicam malum scil. intelligit Citriam, quam is & Persicam & Medicam vocat, vt in superiori libro patet, quæ semine tantum nascitur, non autem Persicam nostram, vt Athenæus videtur existimasse.

Quidam Nuccem Molluscam putant, sed malè, vt postea docebitur *malum persicum* Galeno, qui iam suo tempore vulgò ab omnibus Persice tantum appellari tradit, videlicet omiſſa voce *malum*. Ideo etiam nunc eius fructum plerique *persicum* & Persicum simpliciter vocant. Paulus & Aetius *persicum*, vel, vt alij volunt, *duracina*. Sed vix autorum placita atque synonyma ritè exequemur nisi prius eorundem differentias assignemus, ne diuerſam nomenclaturæ lectori pariant confusionem, ijs non præmissis, & quomodocunque explicatis.

Palladius itaque Persicorum genera hæc posuit: duracina, præcoqua, persica armeniaca, vel vt alij volunt Armenia. Galenus tamen vnum tantum præcoquum, & Armeniacum genus esse voluit. Nam Armeniaca vocitari, iam desitum est, de quibus Martialis:

Vilia materis suorum præcoqua tantum:
Epigr. lib. 13.

Nunc in adoptionis, Persica cara sumus, Actius hoc genus etiam Bericocum vocat: quod Pomo cæteris minimum est: sunt tamen è Neotericis plures, qui hoc genus ad Pruna Armeniaca referant, quibus Curtius neutiquam ad stipulatur. Neque sanè putandum Dioscoridem ita confusè hoc genus Prunorum cum Persica Malis miscuisse, cum alibi Prunorum meminerit.

Plinius autem regionum habere cognomina prodidit: Gallica, Asiatica, & Supernatia. Sed Persicorum (inquit) palma duracinis. [Rhodacenis Cornat.] Nationum habent cognomen, Gallica & Asiatica. Post autem matureſcunt: ætate præcoqua, intra xxx. annos reperta, & primo denariis singulis venundata. Supernatia è sabinis, veniunt, popularia vndique. Pomum innocuum experitur ægris: pretiumque iam singulis triceni nummi fuere, [alii, tricenis, nummi fuere.] nullius maiore: quod miremur, quia non aliud fugacius. Longissima namque decerpto bidui mora est: cogitque se venundari.

Softratus in *τῷ δὲ βαρτοῦ ἡ δούρα*, Persicam Rhodacineam vocari ait, translataque ex Æthiopia in Ægyptum: Nicander in Alexiph. Persicum Mycenis scuisse, à Cepheo Andromedæ patre dono acceptam: eiusque nucleos ceruissæ veneno auxiliari. Vterque scilicet, quamuis classicus & vetustus scriptor Persicam cum Persica confundit, vt doctissimus annotat Dalech. Neque verò etiam placet eiusdem Nicandri interpretis in hunc modum scribens: sciendum est Socratem in comment. de reptilibus testari, Persicam quam Rhodacineam dicunt: hac voce autem Græci Persica nunc etiam appellant: ex Æthiopia in Ægyptum translata fuisse. Et Rhodus Democriteus in Comment. de his quæ vitæ *καὶ ἐν αἰσθησὶ* dicuntur: Persas (ait) lethalem arborem habentes in Ægyptum misisse credentes perituros multos ab ea, sed utilem cōtrario euentu illis profuisse, protulisseque suauissima poma, qualia nunc videntur: Non placet inquam interpretatio Scholiastis Nicandri, existimantis Persicam & Persicæ nuces idem esse cum Rhodacinis siue Persicis Nicandri, de qua re specialius cap. de Persica.

Paulus in *περί τῆς* his verbis distinguit: *τὰ δὲ πρὸς τὴν καὶ ἀσκήν* [alij legunt *ἀσκήν*] καὶ ἀσκήν *καὶ τὴν τῶν πρὸς τὴν* &c. Corn. vertit: præcoqua & Rhodacina & Armenia meliora sunt Persicis, neque enim accescunt, neque similiter corrumpuntur: sunt autem & secunda. Verum non probatur nobis Cornarius, reponens vocem Rhodacina

Duracina.
Persicum.
Malum persicum.

Duracina.
Præcoqua.
Persica.
Armeniaca.

Bericocum.

Gallica.
Asiatica.
Supernatia.
Sabina.
Præcoqua.
Popularia.

Persica.
Rhodacina.
Malum.

Persicum.

Persica.

Rhodacina.
Persica.

Interpres.
Nicander.
repreh.

Cor. repreh.
cena

cena pro Duracena: quandoquidem ipse etiam Palladius, probatus Latinus & Geoponicus, eodem modo nominavit, differentiasque similes posuit ante Paulum in Nouembri cap. 6: quas paullo ante adduximus. Merito igitur reprehensus fuit à Marthiolo, ut particulatim dicitur cap. de Armeniae.

Pin. 107.

Mirum quod Plin. lib. xv. cap. xxix scribit, nullum succum Persicis, cum praesertim duracina succo abundent. Quis verò dicat nullum succum esse Persicis, quorum omnia genera, quae hodie quidem habentur, nemo est qui non fateatur succulentia, licet alia magis, alia minus qualia sorte sua duracina intelligit Plinius: quomodo fortassis Duracina latini dicta quis putare possit, quod solidior sit carnis deditur ceteris quorum substantia tenera & mollis, ut quid de eo Plinij loco statuamus vix occurrat.

Duracina unde?

Addit idem alia quaedam ad persicorum explanationem facientia his verbis: sua & in odore miracula: Malis acutus, Persicis dilutus, dulcibus nullus. Sed quid: dulcibus nullus? Intellegat licet vel Poma vel Persica, non stabunt eius verba. Non meminerat Plin. (inquit Scal.) cum haec diceret, rerum naturalium, quae vel quotidiano in usu sunt. Vel enim & valde dulce, & valde odoratum est: & probum mel quod dulcis, odoratus Diotior. Malè igitur dulcia ab odoratis excludit.

2lin. reproh.

Pergit Plin. Alijs foris corpus, intus lignum, ut Persicis & Prunis. Quaedam statim à ligno recedunt, ut Noces & Palmae: quaedam adherent, ut Oliux, Laurique. Quorundam generi utraque est natura, ut Persicis. Etenim Duracinae adheret corpus, lignoque auelli nequit, cum in ceteris facile separetur. Quorundam natura trigemina est, Corpus, deinde lignum, cursusque semen in ligno, ut Persicis.

Rhodacena Pauli qualis? Vnde duracina? Vnde de dicta. Praecocia Plin. quomodo? Noces ocellatae.

Porrò Rhodacena Pauli, Dalech. dicit quae Galli *Auberges*, *Miracotens* & *Presses* vocant, sic dicta quod vel rosam oleant, vel rosea & rubro colore picturata ferè conspiciantur. Duracina verò, quorum caro sit durior. Per Praecocia item intelligit magna & ampla: sic dicta, quod è montanis & lupernis locis aducherentur: Vulgò *Abric. r.* Alex. ab Alexandro Gen. Dicitur Noces ocellatas, quibus authore Tranquillo Augustus cum pueris luit, probabilius nucleos putat quos in Persicis Poinis lutos inspicimus, quibus persici ludere, nostros pueros hodie videmus. Et Celsus in Catal. Idem comprobatur, dum ait: Nux persica, hanc aliqui Ocellatam apud Suetonium accipiunt *Ein Persischstein*. Dalechampi probat eam opinionem, quae vult noces Ocellatas esse Auellanas, ut licet videre l. 3. H. n. g. Aliam verò longè differentem opinionem habet Rob. Const. qui Ossillatis, vel ossiculis nucibusque existimat legendum, ut demonstratur c. denuce juglande.

Persicorum ocellati.

Nux Persica.

Vnde dicitur? Vnde?

Rhodacina Praecocia Rhodacina Gude. Duracina.

Duracina. Molluscum nucis. Persica sine ossibus & inscripta. Molluscum nucis.

Sincon sethi. *pod. p. l. u. & m. a. d. e. r. a. n. a. b. e. t.* Persica, inquit Hermol. ex Perside aduecta in Rhodo ad florem usque perueniens. Inde Rhodacina fortasse vernaculo Graecorum sermone dicta, nisi quis inuersum nomen putet, quasi Duracina: sic enim Persica ipsa nominantur a Graecis recentioribus Paulo & Aetio, quasi Duracina.

Molluscum nucem sunt qui Persicum interpretati falsò fuerint.

Persica sine ossibus & inscripta quemadmodum nascantur, docebit Palladius.

Mirati verò sibi cur Hermol. scribat, Palladium tria tantum genera Persicorum enumerare, cum manifestè quatuor habeat, ut supra ostendimus, quorum Hermol. praecocia omittit. Sint haec Armenia, quae Prunorum generis quidam volunt, an

diuicia, studiosi salgamorum dijudicent. Heron-lao eadem videri placet.

Macrobius qui Persicum vulgò dictam Molluscum Nucem esse putat, aperte iudicat ipse esse, inquit idem. Molluscum autem Nucem dictam putabat Macrobius, quod ceteris generibus mollior esset, cuius potamen facile rumpatur, de qua Plautus in Calceolo:

Molluscum Nucem super eius dixit impendere regulas.

Suenij testimonio fretus, in Idillio, quod inscribitur Moretum, ita putauit Macrobius. Erronilque causa fuit quod ipse existimauerit idem esse Malum Persicum & Nucem Persicam. Sic enim hic Idyllio seu Edulio, quod Moretum inscribi dicitur:

Admiste tu Acca Basilicae haec, Nux partem, Pa. cum Persica, quod n. men denique fortis: Propter ea quod qui quondam cum rege P. n. i. Nomine Alexandro Magno fera praena bello In Persas retulere suos, inde retentum Hoc genus arboris in praetatis finibus Graijs Disseruere, nonis statim m. r. alibus dantes, M. Basca haec Nux est, ne quis forte insani erret.

Non enim hic, ut hic arbitratur de Persico teniori Pomo agit, sed de Nuce Persica. In Moreto enim poma tenera poni non solebant, sed Persicae noces. Haec fuit Perotti sententia, qui Macrobiū reprehendere voluit, in quam item, inquit Curtius, si eiusdem classici auctoris monumentis me doceret, in Moreto non poma tenera, sed persicas tantum Noces, id est, Iuglandes, poni solere, quod ex Vergiliano Moreto non probatur. Ad Hermolai auctoritatem accedit quoque Ruellij, idem dicentis, nimirum Macrobiū Mali persici & Nucis persicae confusione lapsū.

Marcellus notum quidem Persicorum genus omne & formam tradit, nondum tamen in Antiquioribus satis patere, an huius pomi arbor sit, quam Diosc. pluresque alij Persicam dicunt, in Aethiopia lethalem, in Aegypto autem salutem, qua in hortulo occidit Colum. an quae in alius Persica ubique nascitur? Ex Nicandri (adit ille) interprete in Theriacis credi potest eandem esse. Poeta ubi de Cerussa agit, praecipit duras Persicae noces: Nocesque appellat Persicorum ossi soliditate sua nucibus similia: Quas hic ipse in remediis cerussam *m. r. a. l. i. b. u. s. d. a. n. t. e. s.* appellauit. Ex quibus manifestè patere putat Marcellus, quam alij *tr. p. l. a. r. a. r. b. o. r. e. m.* dicunt, Poetice à Nicandro interpretèque eius *m. r. a. l. i. b. u. s. d. a. n. t. e. s.* vocari. In hanc enim ait inclinare animum eius, cū id Plinius negauerit, & aliorum multorum auctoritati obstat. Et alibi: In Persica Theoph. plura sunt quae nostrati Persicae eadem sunt: aliqua nihil nostris idem aut simile habent: inclinatur animus genere eandem, specie diuersam nostratam ab Aegyptia esse, de qua tantum Veteres egerunt. Huius rei testis Columella est.

Considerandum an idem senserit Nicander quod eius interpretes scholiasticus, & ex eo Marcellus. Fortè Nicander de Persica tantum scribit & nō de Persicis. Columellam de persicis scribere existimamus: Marcellus assentiri non possumus: persicam diuersam a persica statuimus.

Ruellius putat Theophrasto non indicta Persica, quod colligimus ex his verbis, quando ait: Persica Theophrasti temporibus in Aegypto & vicinis locis ferebat &c. Sed an de Persica intelligendus sit ex precedentibus patet.

De differentiis idem sic ait: Tria Pomorum obseruant genera: (Verū ex Palladio & Plinio satis patuit quatuor ipsis obseruata) posteritas inu-

Molluscum nucem non esse Persicam.

Persica.

Noces Persicae.

Persica.

Marcellus putat Persicam & Persicam idem esse.

Persicorum ossi.

Persicae.

Marcellus not.

Duracinum
Sanguin. &
Præcox Am-
erisicum.

Trecacin.

Delictus.

De G. &

Perfida de-
fensa Per-
seu.

Orn.

Myroco-
tonum.

Cornar. var.

Differentia
Trag. &
Marth. pe-
pulare
Duracina.
Supernat.
Sabinum.
Rubra.
Aurea.
V. renita.
Candida.

Differentia
de sapore at-
que de la-
ore.
Duracina.
Cotonea.

Sanguinea.

Nuciperse-
ca.

Perfida de-
mygdala
Marth. var.

meta penè fecit. Populare vulgò notum est, *Perfida* vocabulo, Duracinum ex re dictum, quòd corpus pertinacius hæreat ossi, Galli *Pressum*: In quo etiam genere reperitur Poma quæ sanguineo succo manus inficiunt. Præcox, Antepersicum officinus, vulgò Trecacinum, quòd inde ad nos adferatur, æstate maturificens: Hoc ut reliquis est minus, ita iucundissimo, cætera præueniens, placet sapore, atque innocenti gustu, ut quod impune manditur agris. Nec figura, nec succo, nec gustu, nec colore, sed sola celeritate proueniendi distinet à vulgari. Armeniaca peregrina sunt, de quibus agitur postea. Verùm quæ ex ossi (ex Malis, ut ait Curtius) prouenerint, Græcis Agricultura peritis *De G. &* appellantur.

Cordus Categoricè affirmat Persica nostra differre à Perseis. In differentiis quædam parua dicit, quædam grãdia, & croceâ carne, quæ omnibus saporis bonitate præferantur. Nos ex candidis genus degustauimus, quòd sapore vix ulli cedat croceo.

Vulgaris Persici, ut annotat. Scaliger species à colore tres. Vna sublutea valde diluta, si corticè spectes: alba pulpa. Altera tota lutea, duum generum: Alterum narium, minus nobile, alterum longè commendabilius, an arte sit factum, nescire se ait. Myrocotoneum Galli vocant. Tertia species tota sanguinea est. Primam speciem dux partiuntur differentiæ. Marem ac foemellam dicunt. Maris caro ab ossè non abscedit: foemellæ abscedit. Hæc generilia sunt differentiarum fundamenta. Sed specialiores quoque differentias secernunt, ex recentiorum Herbariorum observationibus, atque etiam nostris.

Cornarius Persica omnibus nota Rhodacena dici & à se alibi ostensum ait. At apud Paulum, vulgaria Armeniaca, quæ Germ. *Marstschpen* dicit esse Simeonis Sethi Rhodacena.

Tragus sic distinguit: Vulgari Persicum dicitur populare aliud, quòd non facile à nucleo separatur, Duracinum & doracinum: Tercium Supernarium: Sabinum Persicum totum rubrum. Persica autem mala primum ex Perside allata.

Persicorum, inquit Marth. plurimæ reperiuntur species: Nam quædam rubent, alia aureo colore fulgent, alia virescunt, alia candida sunt, alia sanguineo succo madent, alia Duracina, alia Cotonea vocantur. Adhuc quædam habentur dulcia, quædam acida, quædam vinosa, quædam amariulecula, & quædam etiam austera. Prima laus in cibis Duracinis, quòd durior sit pulpa, & raro pertinaciter hæreat ossi. Præcipua autem in hoc genere illis laus, quæ ab aurei coloris nitore odoreque perquam incundo Cotonea cognominant. Secundas sibi vendicant partes, quæ cortice detracto, sanguineum succum fundunt, non propterea quòd sint gustu reliquis suauiora, sed etiam quia magnitudine & colore sunt speciosa. Proxima sunt, nec prædicto generi fortasse cedunt, quæ à Nucis similitudine Nucipersica cognominantur, quòd Nucum Iuglandium faciem repræsentent. Hæc enim cum colore & sapore non refragentur Persicis Cotoneis, tùm etiam non ingrata dentibus duritie, gustum mira afficiunt voluptate. Est & genus aliud Persicorum in Hetruria, ac in alijs Italiae locis agricolarum mangonio factum, quæ idèd Persica Amygdala vocant, quoniam Persicorum ossium vice dulces Amygdalarum nucleos includunt. Hæc itaque Marth. differentia sunt. At si, ut ille ait, Nucipersica colore & sapore non refragitur Persicis Cotoneis, quomodo Nucum Iuglandium faciem repræsentant, quæ scimus per-

petuè esse vitides? Videtur quoque Matthioli Persico Amygdala diueria à nostra Amygdalo Persica, de qua cap. de Amygdalo.

Cornar. Contendit ubique corruptum esse Plinij Codicem ijs in locis, in quibus de Duracinis Persicis tractat: quin & Pauli, & Palladij & Constantini Cæsaris libros corruptos esse: Matthiolus potius Cornarium hallucinatum credit, quàm libros deprauatos esse quòd non intellexerit, quid Plinio & Palladio Duracina, quid Paulo *De præcox*, quidue Actio & Constantino & alijs quibuscumque Græcis *De præcox* extiterint. In Paulo *De præcox*, ut vulgata habet lectio, non *De præcox*, Cornarij modo, legendum: ut Corn. ipse faceret, Rhodacena, non est alia, quàm Malus Persica, quemad. Rhodacena nihil aliud sunt, quàm Mala ipsa Latinis Persica vocata. Sed Paulo *De præcox* genus est præcoxis siue Armeniaci mali, ut ipse declarat. Non ut Corn. nostra aras vocat quædam Persica mala Duracina, quòd ossè cæteris durior sit, sed Antiquos secuta, quòd pulpa consistentia gustu gratiori sese offerant, & longiori tempore perdurent.

Actius, Const. Cæsar & Simeon Sethi, inter recentiores Græcos pluribus in locis manifestè demonstrant, nihil aliud per Rhodacenam se intellexisse, quàm veram Persici plantam.

Marcellus Flor. & Symphorianus Campegius in historialibus Galeni campis existimant, eandem Plantam esse Persicam & Perseam, sed qui perlegerit quæ Theoph. Diosc. & Gal. scribunt, has plantas inter se differre comperiet.

Porro non nobis propositum hoc loco tueri opinionem Cornarij, verùm illud obseruandum existimamus apud Paulum non nobis videri *De præcox* genus esse Præcoxis siue Armeniaci Mali, ut vult Marth: sed Persicorum, quòd apparebit, nostro iudicio, ijs, qui considerabunt verba Pauli.

Lacuna Mancanas Persicas (Persica mala) multas habere differentias scribit, ut *Duracina*, *Priscæ*, *Melocotona*, *Alia & coque*, aliaque species, quarum nomina ipse ignoret. Antiquis Duracinas, priusquam innotuissent Melocotonea, pluris hæbât, (inquit) & propter duritiem vocabantur mala Duracina: verùm cum industria humana produxit Melocotonea, famam amiserunt Duracina. Melocotum reuera est Duracinum spurium, ex insitione Duracini & Cotoneæ, maius & pulchrius est legitimo: Duracino autem simile figura & sapore ac pulpa adhærente ossi: Cotoneo magnitudine, colore luteo ac nomine. Priscorum vox de omni genere usurpatur Hispanis, videturque, ex Persica corrupta & deprauata. Vocamus tamen Priscos omnia Duracina cui pulpa adhæret firmiter ossibus, nec facile ab eis separari potest, huius Hispanis celebrantur differentiæ, quas vernacula lingua *blancas*, *arvillos*, *bermeios*, *pardillos* & *azules* vocant. Item alia sunt extrinsecus villosa, alia glabra: aliis caro firmiuscula & dura, aliis eiusmodi, quæ velleui manuum contractu in succum diffuat.

Sic & *Amatus* quauis Persicorum varia agnoscat genera, vniuersa tamen ad duo præcipua reducit, ad Duracina & Præmolliæ. Duracinum ei quoque dictum quia difficulter ab ossibus auellitur, non verò à Rodacino, ut quidam fabulantur. Hoc in Vniuersa Hispania in maximo habetur pretio & meritò, quia stomacho sua suauis & vix perceptibili stypticitate conueniat, imò ea de causa inter cordialia medicamenta à nonnullis reponatur. Præmolle verò ut vile infimæ plebis hominibus relinquatur, sic dictum, quia facile ab ossè

Corn. repr.

Duracina.

Rhodacena
idem quod
Persica.
Duracina ge-
nus Præ-
cox siue Ar-
meniaca.
Corn. var.

Marth. var.
Symphor.

Marth. var.

Duracina
non esse ge-
nus præcox
aut Arme-
niaci, sed
Persici
Mancana
persica.

Melocotum
quid.

Differentia
Amati.
Duracinum

Rhodacina.

Præmolle.

d'anant peach. 4. Persica lutea. The yellow peach. Belg. Peerfich / Peerse. Gal. l'n Pefchier, pefche. It. Persu. & Persiche. Hisp. Pexego, Durafu. Castil. Prisca. Catal. Preschs. Portug. Pessigo. Hung. Baraksa.

Restat ut nobis obferuatarum differentiarum lemmata subnectamus.

Autribus
obferuata
Persicorum
differentia.
Persica mi-
nima pra-
co. alb. 1.

Persica minima, magnitudinis paruorum Malorum Armeniacorum, alba, hirsuta, pulpâ albâ, adhærente ossi: matura Augusto in Alsatia, potissimum hortu Nobilissimi Reguli Waldner à Freudenstein. Eadem nobis obferuata Lugduni matura fine Iulij, gustu sapida. Ossa sunt valde parua, oculata tamē. De his scripsisse videtur Cordus his verbis. Persica minima ab Armeniacis differunt, nostratibus per omnia respondent, multo tamen minora sunt, ut ex nucibus æstinare facile quis potest: quæ cum à vulgariis nucibus lignota substantia, & scabro cauernosoque habitu nihil discrepent, duplo tamen aut triplo minores sunt paruis, & ex Asia venientibus Amygdalis. Saporem & qualitates vulgaribus easdem habent. Considerandum an sit id quod Ruell. vocat Præcox, Antepersicum, quod dicit gustu non discedere à vulgari: vulgò Treacinum, & Gelin. in Catal. Præcocia seu præcoqua Persica, *albus, præcocia, die früzeitigsten pferfich: anant-peschies, pefches de Troye.* Malum præcoquum ex Persicorum genere, *maximam*: ab urbe Trevis, Treacinum. An item Camerario Persica pumila, fructu præcoci, dulci admodum & paruo, apud Norimbergenses Johannes Pfersich / admodum suauis. Casp. Bauh. apud March. ait: Præcocia dici Persica S. Iohannis parua, instar Armeniacorum, eiusque ferè saporis. Nostra Persica non habent eum saporem, nec etiam qui de paruis Persicis scribunt, talem tradunt, quod adhuc obferuauerimus.

Præcox.
Antepersicum.
Treacinum.

Præcoquum
Persica S.
Iohannis.

C. Bamb.
1.

Persica parua
alba.

Aliud genus est carne facile separabili à nucē parua, sapore commendabili. In ipsis ossibus quoque conspicua differentia, quæ non ita profunde, nec tam frequenter sulcata, sed frequentibus punctis & foraminulis referta. Ex pago Valentini, Comitatus Montbelg. matura Septembri.

Persica mediocria
alba.

Persica alba
maxima

Persica mediocria, tunica vestiuntur ex luteo pallescente, carne alba, facile ab ossibus separabili, prædictis magnitudine superiora. Ex Epamanduro.

Est & alborum maximum genus, carne sapida, nucleis non multum adhærente. Habent in hortu Principis Iohannitarum in Heisterfchen Briscoit.

Persica lutea
mediocria.

Montbelgardi habentur Persica mediocria externe lutea, quibus pulpa firmisscula facile abscedit ab ossē, saporis grati. Figurâ etiam nonnihil differunt à cæteris; nec ita rotunda sunt ut illa, præsertim mediocria alba. Profundius adhæc sinu sulcata. Abundat hoc genus Epamanduri. Habetur etiam in hortu E. C. Montbelg.

Persica lutea
maxima.

Ex flauis maximum genus habent Basilienses & Burgundi, sapida & duriuscula pulpa, quæ facile recedit ab ossē. Ipsa saturâ flauedine & propemodum crocea, & magnitudine insigni, quæ cotonea ferè æquant, à cæteris flauis mediocribus facile discernuntur.

Persica alba
maxima
& succulentissima.

Est & Persicorum genus quoddam aqueum & succulentum, & quod ad apertum & leuiter pressum facile in liquorem diuidat, & acido ac vinoso aliquid amaricatis habens, præsertim circa externâ pulpa mordicus ossibus adhæret, vincta notâ

non probata bonitatis. Horum alia mediocria sunt, alia paulò minora: Basilienses *Wasserpersich*, *Varium aqua Persica* vocant. Meminimus nobis alicubi *Eautopersich* / *Persica porcina* vocata, quod plerumque sibus prolici soleant. Non probantur hæc in cibis, & infimæ sortis hominibus, (ut fieri solet) relinquuntur. Prædicta omnia cute sunt tomentosa, quamvis alia minus.

PERSICA HISPANICA: MELOCOTONIA QUORUNDAM.

Melocotoneam vocant quidam arbore, cuius flores & folia Persicæ, à qua tamen nonnihil differre videtur. Fructus autē maiores, tardius maturescentes, sed diuturniores, puluinato calyce foris rubente, atque ex vna parte maculis nigris notato: pulpâ intus Pomi, difficile os delectante, quomodo nobis Vesuntione missa descripio. Idem fructus nobis prouenit, pugno maior, sublongus, albidus, ossiculo in ipso Pomo sæpius deliscente, in quibusdā etiam ita in frustula diffracto, ac si id mallico esset factum, quod aspectu mirabile, quomodo id euenerit, fructu nondum aperto: carne ipsa testaceo nucamento adhærescente, & purpurea atque sanguinea, eâ ipsa parte, quâ adhæret. Os ipsum compressius, quàm cæterorum Persicorum, altera præsertim parte, adedque figurâ ipsa enarians, fragilius quoque, si integrum sit, nucleum continens qualem cæteri, iuxta quem viscosus quidam lentor interdum deprehenditur. Et hoc notabile quod aliquando obferuatur carnem circa pediculum ita abscedere, ut cum ipsi ossis substantiæ insertum, fructu etiam nondum aperto, contueri sit facile, ipsaque etiam animalcula infecta, per eam apertionem subeuntia, intus stabulentur. Caro firma & quæ dentibus trita, strepiter, sicut Pomorum, alba, & circa extrema subviridis interdum, gustu suauis, sapida, vinosâ: Cute dura villosa viridante, & altera parte purpurascēte, & punctis suffusis maculata.

Totius pomi figurâ sublonga, & quàm reliquorum angulolior. Primum hæc nobis visa Montbelgardi, ex Burgundia missa ab amicis, nomine Melocoton: quæ in hortum E. C. plantata in arborem excreuit, quæ iam sæpius pulcherrima poma protulit ipsi etiam Principi peculiariter expetita. Diutius incorrupta seruantur cæteris. Matura sunt Septembri.

An Gelnero Cydonipersica mala ex insitione nata: persicis incognita. Montbelgardi habentur quædam glabra parua, carne quoque nucleo adhærente quæ non admodum sapida. Fortè ad idem genus pertinent, quod antea succulentum appellauimus, nisi cutis leuor impediatur.

Colmaria tandem obferuauimus Persica magna & speciosa, carne usque aded rubra, ut Carotarum instar tingant, vnde arbutulas & nucleos importatos transplantauimus in hortum II. E. C. Helicuria etiam habentur in hortu præfecti. Item Massovij: sed minora Colmariensibus, adhærescente pulpâ ossibus. Huius iconem ex Camerario, quam & ipse pro Persica rubra exhibet, desumpsimus, eamque quod pluribus si arboris & florum speciem spectes, accommodari possit persicorum generibus, in principio huius capituli posuimus. In qua iconē partes oēs affabre expressæ sunt. Non sunt silentio prætereunda quæ faciem parentis succumque adoptionis exhibent, appellata ab utroque Nucipersica, quæ & Martialis (ut vult Ruellius) distycho superius adducto commemorant.

Namque

Defcriptio nuciperficæ. Namque ut idem Ruell. tradit, Nuciperfica arbor est humilis, præcociſ Perſici proceritate, folio Amygdalæ, ſed maiori: flore puniceo.

Pomum emicat viride, Carnosum, succulentum, nulla exterius lanugine pubescens, medio inter luglandem & Persicum malum sapore, dura intus & scabra nuce, in qua nucleus, qualis Amygdali, aut Persici Pomi. Maturescit autumnii exitu, diutiusque Persicis ætatem prorogat, non tam celeriter marcescens, sed multo Nuce fugacius est. *Sapor.* Lucundo placet sapore, leuiter amaro atque innocentii gustu. *Tempus.*

Locus. Scatent hac arbore Galliarum plerique tractus, tura nostra Persiconucem, aut potius curtato nomine Persiconucem vocant. Ea soboles median inter utrumque progenitorum naturam exhibeo.

nam utriusque progeniem exornatissimam, ut ipso
contraxit: attulitque infictionis, ut arbitror, dili-
gentia, aut satorum mistio nouum adulterij genus,
ita ut ex Amygdalo seu Nuce Græca & Persico
progenies inuisa prioribus seculis exoriretur,
utriusque parentis ingenium referens, & effigiem
simul adoptans: hoc est Malum quod foris amu-
la facie Persicum pomum mentitur, intus dulcem
Amygdalam & facie & gustu repræsentat, ipsum
rectè uterque parens Amygdalopersicum nomina-
bit.

Recordamur nos aliquando hos fructus Auen-
nioni in Gallia degustasse, videnturque iidem
esse fructus, quorum mentionem fecimus inter
Perlicorum differentias, nempe Matthiolo Nuci-
perlica & Perlica Amygdala, Anguil. *Perfube*
noti, quæ vocantur ab Auerrhoc *Auripersica*: Ce-
salp. *Nucopersica*: Dod. *Nucipersicum*, *Personaux*
& *persenoix*.

Nos & aliam novimus mediam inter Persicum & Amygdalum, fructu hirsuto, ab hac non parū differentem, de qua post Amygdalum nomine Amygdalopersici.

Taberes Sericum. Porro quia prius illi scriptores Columella, maximèque Palladius Taberes multoties periculis committunt. hincque multos scribimus et significamus.

*Priscorum
dixerunt
in descri-
bendis
designandis
plurique.*

sim subleuantur, vt patebit, & res ipsa satis aperte declarabit: quamuis interim non nesciamus, quosdam aliter de ijs statuere, vt suis quibusque patebit locis. Ad eò verò sciunt & breuiter de his agunt, cum iam citati Autores tum etiam Plinius (vt in alijs multis, quorum negligentia in describendis stirpibus posteritatem in eas turbas & controuersias coniecit) vt nec quid velint ipsi clare doceant, nec quid intelligere debeamus instruant nos. Videamus tamen paucis quid de ijs tractent, ne vel in hoc lectori curioso, porissimum herbaria studiosis, quantum quidem in nobis est, defuisse videamur.

Tuber Ar- Ergo Tuber priore correpta arboris genus est
bor. & fructus. Arboris utique quoniam Colum. scri-
bit: possunt etiam his diebus Cerasi, & Tuberes,
& Armeniaca, atque Amygdala, ceteraque arbo-
res, quæ primæ florent, inferi commodè. Nota:
quæ primæ florent dicit.

Palladius quoque Tuberes feri præcipit & inferi, & (mox immediatè) addit, olla dufacinarum (quod pericorum genus esse ex præced. patet) vel

plantas eiusdem generis poni &c. Et alibi: Mense
Septembri circa Cal. Oct. vel Februario Tuberes *Tuberū sui*
feremus sobole, vel nucleis. Rursus alibi: Ianuario ^{19.}
Tuberes inferuntur Cydoneo: nunc locis tempera-
tis perlica oīa ponuntur. Vbi rursus notandum,
inferi Cydoneo.

Inter differentias habuimus Melocotonca (quæ fortassis non incognita fuerunt Antiquis, ut Lacuna existimauit) ex infusione duracina & Cotonæ comparata. De iisdem sic Plin. Acquæ peregrina (ac Medica) sunt zizipha & Tuberes, quæ & ipsæ non pridem uenere in Italiam, hæc ex Africa, illa ex Syria. Sext. Papinius, quem Consulem uidimus, primus utraq; attulit, Diui Aug. nouissimis temporibus, in castrorum aggeribus læta, baccis similiora (de ziziphis, non Tuberibus, hoc audiendum Dal.) quam Malis, sed aggeribus præcipuè decora, quoniam & in tecta iam syluæ scandunt.

Tuberum duo genera eide micanthidum, & à colore Sericum dictum. Penè peregrina sunt in vno Italię agro Veronensi nascentia, quę Lanata appellantur. Lanugo ea obducit, Struthis Perlicis-que plurima: his tamen peculiare nomen dedit, nulla alia commendatione insignibus. Ab Amygdala proximè florent Armeniaca dein Tuberes, & Pręcoces: illę Pręcogę, hę coactę, hoc est, (ut Dal. annotat) hominis industria & cultura effectę. Tuberes melius inferuntur in Pruno sylvestri, & Malo coronco, & in Calabrice: ea est spina sylvestris.

H. Lugd. Plinius inter Malorum genera , & Tuberes, vulgò peschenoix [Nuciperfica] in agro Veronensi nascencia lanata [Mala] à lanugine obducente nuncupata numerat. Ait Nuciperfica sunt glabra , quomodo igitur possunt dici lanata Mala ? Et alibi , Tuberum, inquit, quos Nuciperfica vulgus appellat, duo genera cunctis ferè nota sunt: alterum etiam cum maturuit, ex albo subiretlescens, eodem in toto pomo colore: alterum, fructu rubro, vel qua parte Solem spectat, rubescente, altera subflavo, quem esse credunt suavioris & delicatioris gustus. Hoc videlicet esse putatur Sericum Plinij, vel ut Dal. apud eundem legere videtur Syricum, quamvis ipse Plin. suam lectionem abundè confirmet, quando ait à colore sic dictum, hoc nempe candido opponens. Tuberis huius meminit Petronius his lepidissimis vericulis:

*Infelix modò criminibus mœbas,
Phœbo pulchrior & sorore Phœbi.
At nunc lausior arc. vel rotundo
Horri Tubere, quem rigavit unda,
Ridentes fugis & rimes puellas.*

Tuber itaque in male. genere à Petronio pro fructu
huius arboris ponitur. Martial. lib. 13.

*Letta suburbanis, miscuit Aprina ramis
Et Verna Tuberes, quid tibi cum Libycis?*

Vernæ, id est domi nostrę natę. Et rursus idem, de arbore:

*Non tibi de Libycis Taberes, & Apyrina ramis,
De Nomentanis, sed damus arb.ribus.*

Suet. in Domitiano cap. 16. Oblatos Tuberes seruari iussit in crastinum. *Nuciperica*, id est Nuciperica Martiali atque Palladio, Constantino apud Theophrastum: nosque inquit, vocamus *Nix pefches*, quas arbores Tuberes a Plinio dici nonnulli arbitrantur. Dalech. sanè non semel Tuberes apud Plin. *Pefchensis* interpretatur, sicut dictum.

Gesnerius arborem peregrinam dicit, fortasse quia ipsi non erat cognita. At nimis protectè securitate MATTH. cap. de Ziziphis negat Columellam scripsisse de Tuberibus, cuius locum paulò antè citavimus: fortè Plinij imitatione i-

Taberni fci
117.

Zizipha.
Tuberos.

Tabernaemontana diffusa
Scribn.
Locus.

Tempus:
Tuberc. in-
ficione effi-
cta.

N. acipenser
ca.

Differen-
tium descri-
ptiones.
Synonyma.
Series
Flor.
Exsiccat.
Dalecham.

Notonotus
Laber.

Vernatubig
741.

Caryocista
macropoda

Arbutus parviflora
Marsh. var.

Aud facere voluit, qui miratur, Persici Pomi mentionem à Catone non habere.

Tuberis dif-
ferentia
700.

Potro à Tuberibus diuersum Ziziphum esse, vel ipsa cultura vtrarumque diuerso loco & tempore à Palladio tradita videtur demonstrare. Ziziphi autem culturam, quæ est in Aprili c. 4. referemus in eius historia l. 6. sub titulo de Iuubis. Tuberum autem, quæ est in Septembri, eius nodi est. Circa Cal. Octob. vel Febuario Tuberis feremus sobole, vel nucleis, cuius tenera diligenter nutriti debet infantia. Sumatur cum radicibus planta diuulsa, bubulo fimo linatur ac luto, statuatur pingui terra & subacta, subditis conchis & marina Alga, terris magna sui parte condatur. Alij pomis statim grana decussa, & Sole siccata, pingui & propè cribata terra autumnno tria simul ponunt, quæ feruntur in vnum coire virgultum, quod assidua rigatione iuuandum est, atque fossura quæ solum leuiter scalpens teneritudini robur inducat. Post annum deinde, vel aliquantò tardius, quæ fuerit de semine planta transfertur, & hoc genere fructus efficit dulciores. Mense Ian. vitimo vel Feb. Tuberum surculus mirabiliter proficit Cydonio insitus. Inferitur autem Malis omnibus, & Piris, & Prunis: & Calabreici, melius trunco fisco, quàm cortice: desuper squalo, vel fictili vase munitur, repletis propè summitatem surculis terra subacta cum stercore. Profunt Tuberibus, quæ Malis prodesse memorauimus. Tuberis feruabuntur, si obruantur in Milio vel vireolis picatis & oblitis. Sed ad Persica reuertamur.

Inferitur
herum.

Repasit.

persicorum
locus in
genere.

Persica qualibuscunque locis proueniunt, ut tradit Palladius: sed & Pomis & frondibus & durabilitate præcipua sunt, si calum calidum, solum arenosum & humidum sortiuntur. Frigidis verò & maxime ventosis, nisi obiectu aliquo defendantur, intereunt. Plus Romanâ grauitate: quid attinet, inquit, in Pontum abire? Iuxta Romam ipsam Persica ægrè proueniunt in Tusculano. Item, Peregrinæ & Cerasi, Persicæque, & omnes, quarum Græca nomina aut aliena. Scitent sanè Persicis tam Germaniæ quàm Galliæ, etiamque loci paullo magis frigidiusculi. In Anglia verò in magnas arbores non excresecunt, teste Turnero. In Italia vbiq; copiosæ, sed in Apulia (regione calidissima) copiosissimæ proueniunt, teste Matth. Et Porta Neapolitanus, Persica, inquit, tam apud nos fecunda sunt, & læta prosiliunt, ut potius Persæ à nobis petiisse, quàm ad nos misisse videantur. Ex quo patet, calidis regionibus hanc arborem non minus lætam, quàm paullo frigidioribus spectari. In Germaniæ & Galliæ sanè, etiam paullo frigidioribus locis, ut hortis ac vinetis, vel planis, vel in collem elatis, passim videas, diuersi generis, ut ferè nulla hodie apud nos vinca conspicitur, quæ ea careat. In monte Pannoniæ Eysenberg diuersi generis quoque, præstantissimæ, maximæque arbores, autore Clusio. Nos quoque aliquot differentias colimus in E. C. horto Montb. sed faciliè apud nos gelu conficiuntur, & difficulter in magnas arbores adolefcunt, ob frigiditatem loci.

Tempus.

Florent paulo post erumpentibus folijs, Martio, Aprili, tardius aut citius pro natura loci. Fructus magna ex parte Septembri perficitur: Basileæ tamen vbi magnus diuersorum generum prouentus, etiam Augusto matura habentur. Præcocia passim Augusto maturantur, & in calidis regionibus etiam citius, ut Montpelij.

Ratio.

Persica ante brumam per autumnum feri iubet Columella. Nouembri mense, autore Palladio, locis calidis, cæteris verò Ianuario Persici ossa in

passinatis arcis sunt ponenda. Sed ossa ponantur acumine deorsum verso, & non amplius, quàm duobus aut tribus digitis obruantur. Ossa verò, quæ ponenda sunt, aliqui siccata prius paucis diebus cineris mistione terra soluta reteruant, alij sine vlla cura.

Dum tenera sunt germina, sæpè herbis circumfossa liberentur. Bimam plantam rectè transferemus scrobe breui. Nec à se longè statuendæ sunt, ut inuicem se à calore Solis exculent. Ablaqueandæ sunt per autumnum, & suis stercorendis folijs. Putanda Persicus in autumnno est, ut arida & putrida tantum virgulta tollantur. Nam si quid viride resecemus, arescit. Languenti arbori veteris vini faeces aquæ mistas oportet infundas. Si arbor ardore Solis siccata contabescat, frequentia aggestione cumuletur. Vespertino iuuetur humore: obiectis defendatur umbraculis. Iuuat in ea & spoliū serpentis appendi. Contra pruinas sterco ingeratur Persico, vel faeces vini, cum aqua permixtæ, vel, quod magis prodest, aqua in qua faba decocta est. Si vermes arborem infestent, eos cinis amuræ mistus extinguit, vel bouis vrina, cum aceti tertia parte confusa. Si poma caduca sunt, nudata radici eius, vel trunco Lentisci, aut Terebinthi cuneus affigitur, vel terebratæ in medio, palus Salicis imprimetur.

Cultura.

Circa pru-
nas.
Aduersus
vermes.

Ne caduca
fiant poma.

Si Poma rugosa creabit aut putrida, circa imum truncum cortex recidatur, & cum inde modicus humor effluerit, argilla, vel paleato luto plaga retegatur.

Ne persica
rugosa fiant
aut putrida.

Magna Poma Persicus affert, si florenti, per triiduum ternos sextarios caprini lactis ingesseris.

Ut persica
nascantur
magna.

Contra vitia persici proficit Spartum ligatum, vel sparrea suspensa de ramis.

Contra vitia.
Inferit.

Mense Ianuario vel Febuario, locis frigidis, Nouembri calidis persicus inferatur, maxime circa terram surculis plenioribus, & propè arborem natis: nam cacumina vel non tenebunt, vel diu durare non poterunt. Inferitur in se, in Amygdalo, in pruno: sed Armenia vel præcoqua, prunis, Duracina Amygdalis, melius adhærescunt, & tempus ætatis acquirunt.

Mense Aprili vel Maio locis calidis; in Italia verò utroque exeunte, vel Iunio persicus inoculari potest (quod Emplastrari dicitur) præciso superius trunco, & emplastratis pluribus gemmis.

Inferit.

Persicus rubescit, si platano inserta ligatur. Arbor etiam in herbam inferitur, teste Costo, ut persicus in Brassicam, quam rationem inferendæ (inquit) ætas nostra inuenit. Nostra sanè ætate incognita videtur, aut saltem non in vso. Nam de ea nihil Herbarij nostri. Et difficilis videtur apprehensio arboris in herbam. Experiantur cæciosi.

Ut Persicus
rubescat.

Adfirmantibus Græcis persicus scripta nascitur, si ossa eius obruas, & post dies septem, vbi patet fieri cæperint, apertis his nucleos tollas, & his cinnabari quod libebit inscribas. Mox ligatos simul cum suis ossibus obruas diligentius adhærentes. Inscripta persica nasci putat Democritus, si exeso corpore internum os tridui madescat in aqua, dein aperto sensum ligno, nucleus intus inuentus cortice tenui æneo stylo non altè, quibus placebit literis, exaretur: dein papyro vel charta inuolutus, commissis carinis feratur: quod enim in eo Amygdalo depinxeris, hoc enatum inde pomum representabit.

Ut inscri-
pta nasca-
tur.

Rubra nascuntur persica, eodem tradente, si Rosas sub arbore conseras. Altera ratione rubra creari promittit, si post septem dies, quam patet fieri cæperint, (nam spontè toridem terè diebus

Ut persica
nascantur
rubra
Alia mo-
do.

bus

Perforata fatiscunt) in osium internos ventris sinus cinnabarinum infundas, mox ut cohaereant, stricam obligata simul cum suis nucibus adobruas: Sic rubra daturus arbores perlica. Si alium quemvis instilles colorem, in talem enatam progeniem degeneraturam. perlica sine ossibus nasci tradit Africanus, si in perforatum truncum extrusa medulla, Salicis vel Corni palum adegeris. perlici poma & hac arte sine suis ossibus nasci volunt, qui sese afferunt expertos. Brachij crassitudine ramum Salicis solidum, longum cubitis duobus iubent perforari in medio: plantam perlici ramis omnibus spoliata solo capite relicto, per impressum foramen induci loco in quo consistit. Tunc eundem salicis ramum Capite utroque demerso in arcus similitudinem incuruari, foramen luto, musco, vinculisque astringi: anno deinde exacto, ubi infra medullam, Salicis caput plantula sic cohaerit, ut vnitas ex duobus mista corporibus contrahatur, plantam subter incidi atque transferri, terramque aggerari, quae Salicis arcum cum perlici cacumine possit operire: sed hoc locis humidis vel riguis conuenire. Salices aquarionibus iuuandas, ut tigni naturam vigeat, quae humore delectatur, & copiam succi germinibus ministrat alienis. Sed satis de Mangonio. Quomodo Duracina & Tuberes inferantur, supra dictum. De perlicorum insitione sic canit Palladius:

*Ipsa suas oneras meliori germine ramos
Perficis, & Pruno sit sociare genus.
Imponiturque leues in stipite phyllidis umbram,
Et tali discit fortior esse gradu.*

Repositio & adseruatio. Difficiliter adseruantur perlica, quia non aliud Pomum fugacius, ut Plinius ait: Duracina tamen Palladio seruantur, condita muria & oximelle, vel detractis ossibus ficorum more in Sole siccantur, ac pendent. Idem saepe se vidisse testatur, detractis ossibus Duracina melle condiri, & saporis esse iucundi. Item bene seruantur, si umbilicum pomi gutta picis calentis oppleueris, ut sic saporem innatare cogantur, vase concluso. Tuberes seruabuntur, si obruantur in milio, vel vireolis picatis & oblitis, quemadmodum & in superioribus docuimus.

Viros & vici. perlica mala secundo excessu refrigerant & humectant, nonnullis tertio, alijs etiam quarto: ut Curtius scribit, quamuis autores non citet. Verum in secundo Galenus & sequaces sentiunt. Dioscor. perlica Mala ventriculo vtilia sunt, & alium quoque bonam praestant, si matura fuerint. Imatura vero eandem cohibent, sed siccata vehementius. Sumptum eorumdem siccorum decoctum, in stomachum ventremque decumbentes fluxiones sistit. Galenus vero tradit arborem ipsam in germinibus & folijs vincentem habere amarum qualitatem, ideoque folia eius trita, & umbilico imposita lumbricos necare, & alioqui sanè etiam discutienti medicamen esse. Fructum eius esculentum, ipsum videlicet perlicum, humidius esse & frigidius temperie. Idem alibi scribit, pomorum perlicorum succum, & veluti carnem facile corrumpi, omninoque noxam inferre. Quamobrem non post alios cibos, vltimamque, ut nonnulli solent, illa offerri oportere, quod in summo nantia corrumpantur. Hoc verò quod omnibus commune est, memoria tenendum, quaecunque vitiosi succi, humidique & lubrica sunt, facileque descendunt ac secedunt, ante alios cibos assumenda esse. Ita enim fit ut & ipsa citius subducantur, & alijs praecundo ipsis quali viam inueniant.

Ante alios cibos comedenda. Quod si verò postremo sumantur, vna secum alia quoque corruptioni reddunt obnoxia.

Valerianus de iisdem perlicis sic scribit. perlicum in cibo est quidam stomacho inutile, eo quod succos eius citò marcescit, & cito aque per concoctionem vitatur, verum minime graue, dum modo non diu in intestinis moretur, & ad hanc semper exitu celeri festinet. perlica in cibo negant medici membra nutrire. Folia perlicorum sicca & in puluerem trita, recentes plagas vulnorum crucientorum claudunt. Gummi seu gutta, quam perlicorum truncus illacrymat, fluenti alio medetur: eadem mixta cum vino, etiam in vetrica lapillos frangit; (ut ille ait) Trita cum aceto impetigines reprimunt: decocta cum croco tumores faucium mitigat. Asperum arteriae canalem laxiorem facit. Excreantibus sanguinem mirum modo subuenit. Thoracis obstructos sinus refert, vitia pulmonis expurgat.

Plin. praeclearius sentire videtur de perlicis, quam Gal. & Valerianus. Is enim postquam dixerat: pruna alium mollire, stomacho verò vtilissima esse, sed breui momento: mox subdit: Vtiliora perlica, succusque eorum etiamnum in vino aut in aceto expressus. Nec est alius eis pomis innocentioribus. Nulquam minus odoris, succi plus, qui tamen sitim stimulet. Folia eius trita illita, haemorrhagiam sistunt. Nuclei in aceto & oleo capitis doloribus illinuntur.

Plinio verò refragari Galenum ex supra citatis eius verbis liquet: nimirum perlicorum omne genus damnauit ut prauum succi, & quae facile corrumpantur, ac noxam ventriculo inferant. Quare mirari subit, ex quorum scriptis deprompserit Plinius, quod innocua expectantur agris. Nisi fortasse & ipse pro perlico perlicam deceptus acceperit, ut suspicatur Matth. quemad. & recentiorum nonnulli fecere. Quamquam, quod apud Dioscor. dicitur de perlica, fructum cibo idoneum & stomacho vtilem, ab eodem etiam Dioscor. dicitur de perlicis. Nos tamen plus tribuimus sententiae Galeni ac Pauli ei subscribenti, quam Dioscor. & Plinij, hac quidem in re.

Porro tam Dioscor. quam Paulus pro remedio aduersus Cerussam praescribunt ossa perlicorum, si rectè legatur in codicibus Dioscoridis, qui habent *περίκων τὰ ὀστά*: fortasse melius *τὰ ὀστά* legas. Paulus & Nicander habent *περίκων ὀστά*.

Diphilus Siphnius (ut refert Athen.) libro de iis quae vefcenda bene valentibus & agris dantur, ita scribit: Quae perlica mala vulgò nuncupantur, & à quibusdam perlica pruna, succi sunt mediocriter boni, & plus nutriunt quam mala.

Philotimus libro de alimentis scribit, perlici mali nucleum pinguiorem esse, laxiorem, tufum olei multum reddere, raucedinem, stertoremque excitare: Deuocata nimirum pituita è Cerebro, exasperatisque amore suo faucibus, ut Daliannotat. Oleum nucleorum perlicorum confert dolori aurium frigido, & morbillis si illinatur. Folia trita etiam cum floribus, & expressorum succus haustus ascarides expellit purgando. Eodem succo si linatur peccen fastorem emendat. Succus foliorum instillatus in aurem vermes necat: ex Serapione.

Auicenna. Perlica sunt frigida in fine secundi gradus, humida in primo. Lemunt, sed cum aliqua adstrictione. Siccata magis adstringunt, & alium cohibent, quemad. & imatura. Oleum nucleorum aut conferre hemieranem, & doloribus aurium tam calidis, quam frigidis. Matura bona esse stomacho, & excitare appetitum, modò non post alium cibum comedantur. Siccata tardius concoqui, minusque boni esse nutrimenti, quam-

Folia.

Vulnora.

Tumores.

Alui fluxus.

Xanth.

Calculus.

Impetigo.

Tumor faucium.

Cuius.

Asperitas.

Faucium.

Spiritus.

Sanguis.

Vicia Pulmonum.

Mentem.

Capitis dolor.

Dioscor.

Plinio. Gal.

contrarietatem.

Imo.

Aduersus.

Cerussam.

Perlica mala.

Mala quae.

Mala.

Oleum nucleorum.

Perlicorum.

Dolor aurium.

Ascarides.

Temperamentum.

Hemieranea.

Dolor aurium.

Alui fluxus.

HISTORIA PLANTARVM.

uis plurimi. Ve matura leniunt alium, ita immatura restringere. Addit, ex quorundam sententia, excitare libidinem, sibi autem videri illud verum tantum in corporibus siccis & calidis. An potius obstat, quo ingenerant.

Simeon Sethi testatur, Persica quosdam in tertio ordine refrigerantium humet inuicemque posuisse: alios in primo, alios in secundo, quod exactius factum dicit. In ceteris eadem penè quæ Gal. dicit, & addit: cor qui crebrius ips. ad satietatem ventur, febre corripitur, nempe quod celeriter in ventriculo concoquantur. Ledere & nervos proprietate quadam. Suadet itaque ut & ante cibum sumantur, & insuper meracum superbibatur. Rhodacina cibi appetentiam excitare, prodesse ventriculo inflammato, & genitali semini adiacere: sanguini ramen seroso quid putredini obnoxium preparare, sepiusque post vnum vel alterum mentem ob putredinem febres gignere, non quales sunt ex ips, quæ Armeniaca dicuntur: illa etenim breuiore, & quæ facile solvuntur, febres facere: hæc verò longiores, & quæ difficulter solvantur. Illud etiam obiter præcipit, ne super hæc aqua bibatur, vel cibaria acida superingerantur.

Paulus Duraena & Armeniaca, quemadmodum & præcocia meliora dicit, persicis. Neque enim acescere, neque similiter corrumpi: sunt autem & iucunda. E Contra Eluchastes, Persica inquit, (Persic) meliora sunt Armeniacis (Naleslin) quia non ita facile corrumpuntur: crassiorum etiam sunt partium, tardius febrem generant, forte intra mensem aut duos: odoratiore sunt & ventriculo gratiora quam Armeniaca, eis aliequi similia: meliora quæ facile ab ossiculis separantur, facilius concoquantur: conferunt iuuenibus, calidis, & subtilem naturam habentibus, & in febribus ardentibus.

Arnoldus scribit, quemdam diu liberasse dolore frontis vehemente quotidie ad vespem, frustra varijs usum remedijs, tandem illum & alios multos curatos cataplasmate ex nucleis persicorum optimè tritorum.

Viremburgicus quoque Cento Medicus eodem varijs modis adhibitos commendat in doloribus capitis, ut confusos cum telis arancarum & oleo rosaceo.

Auicenna in quartana permittit persica: melius fuerit, ex sententia Holsij, uti conditis. Coquantur si recentia sint, nec condita, & saccharum inspergitur: ita prodesse possunt nec nocent. Vino quoque contra errorem multorum persica infundi possunt.

Persici flores recentes autore Matthiolo esu alium deiciunt, itemque vomitiones cient. Hydropicorum aquas pellunt, si recentes in acetarijs edantur, sed non absque ægrotantium labore. Arboris lachryma datur ex aqua plantaginis, aut portulacæ succo vtiliter ad cruentas deiectiones: tussientibus verò & anhelosis, ex mulla, aut tussilaginis decocto, addito croci momento.

Datur calculosis cum succo raphani, aut Limonium, ex vino duarum drach. pondere. Nuclej tormina ventris tollunt, si deuorentur: quinetiam potantes inebriari prohibent, si septem diebus præsumantur. Fendantur item & decoquantur in aceto, quousque liqueant, pulicula modo, ad alopeciam: namque illi crinum in modum capillos replicant. Oleum contraforum somnam conciliat cum aqua Verbenacæ, & fricti atque temporibus illiti: dolores capitis ipsamque adeo hemicraniam sedat, id quod & cremor facit. Idem oleum tam potum, quam Clysteribus

infusum Coli dolores à statu genitos, & alio modo facibus exicatis, peribellæ mulcet: datur pariter potandum Iliacis & Calculosis quatuor vnciarum pondere. Atque maxime calculosis auxiliatur hoc modo: sumito nucleos ossium persicorum L. nucleum ceraforum C. florum sambuci manipulum, vini Cretici lib. tres: excipiantur hæc omnia fictili nouo, & sepeliantur in fumo, diebus decem, deinde destillatur vitreis organis. Aqua quæ inde fluxerit, pota ante cibum, quatuor vnciarum pondere, mirum in modum renum calculos pellit. Con-tusa folia recentia illinantur vtiliter ventri: & aceto, ad interaneorum vermes. Vleeri vomit-noso canum injiciat quidam succu foliorum Persici.

Nuclei persicorum autore Dodon. calidi sunt ac siccis, aperiunt & extergunt, aduersus lienis & hepatis obstructions conducunt: breuiter Amygdalis amaris facultate & viribus similes.

A prædij initio memineris (inquit Gesn.) ut plurimum nucleos persicor. sex aut septem deuorare, nam & lumbricos eliminant, & alijs viles sunt valetudini. Ebrietatem accendit præ sumpti persicorum nucleis, sicut & foliorum expressus succus jeiunio assu nptus cyathi mensura. Extrahitur verò ex his cum aqua pulegij succus lacti similis, quem in ore frequenter contineri Apoplecti-cis prodest, saluam elicit, & linguam expedit: folia persicæ amara excalfaciunt quoque ac rescant: viscerum obstructions aperiunt, ac purgandi potentiam obrinent, quæ biliosos ac putrillos humores per aluum detrahunt. Decoquantur in aqua, sero lactis aut vino diluto. Feruntur & flores saccharo potissimum conditi ad alui expurgationem quoque facere. Guammi temperamento mediocre est: sed substantia lentum & glutinosum, cuius beneficio tenuium humorum acrimoniam obrundit: phthitice ac tussientibus in Eclegmate conducit, & ad omnes sanguinis excretiones, aliosque fluores accommodatur.

porro quæcunque supra ex Gal. & Simeone Sethi de noua persicorum dicta sunt, ea Amatus de præmolibus intelligenda esse credit: secus enim ait esse de Duracinis, ex quibus optimus spirat odor, suavis, gratus, & spiritum recreans: nam eorum sapor delicatissimus est, cum quadam austeritate perceptibilis, qua mediante stomacho conducit, & ipsum roborat: quibus de causis post victum accipi possunt. Imò omnes principes Hispaniarum, & viri delicatissimi ea post victum comedunt, non nisi pridè vino infusa, & nullam inde noxiam euenire persentiunt.

Brasavola sub cineribus coctum vnum vel alterum persicum ægrotantibus suis, quum eorum instat tempus, offert, maxime saccharo aspersa, quod à nullo alio nec Hispano, nec Gallo, nec Germano medico, cum quibus abundè versatus est, vquam id animaduertisse idem Amatus testatur. Cibum verò delicatissimum esse & ægris perquam gratum & iam ab alijs quoque medicis Hispanis, viris insignibus in usum trahi cepisse.

Siccata Persica vbiq; ferè adseruantur. Condita ut idem testatur nupiam clariùs aut lapidiùs, quam Genue parantur, quanquam & apud Ferrarienses non postremè notè concinnantur, quod conditum Abunzoar libro sui Theisr maxime laudat videtur.

Persica ad condituram laudatissima putantur præcociæ & duracina. Ritè lecta manu, decorticatæ tenuiter cum aqua & saccharo vel melle ad consistentiam decoquantur syrupo debitam, ut supra in romis & Cotoneis docuimus. Mirificè placent ægrotantibus, præsertim siti & lingue arida-

Cabra.

Staca.
Calculus.

Aqua de
Persica.

Ad venter
Calculus.

Nucleorum
temper.

Obstru.
Lecus ex

Hepati.

Apoplecti-

Fecurum
temperant

Purgans.

Flores
diti

Guammi tem-

perant.

Phthitice.

Tussis.

Duracinis
rum quali-

temperant.

Persica co-
cta.

Siccata
Persica ob-

dit.

Condiendi
modos.

In quibus
morbis con-

ducant.

Causa.

Profectum
n. 48

Appetit.

Entericuli
in flammam.

Causa.
Delectum.

Febris.
Obstru-

tion

Lili Cap.

Quartana.

Persici flo-

res purgat.

Vomito-

rium.

Hydrops.

Dysente-

ria.

Tussis.

Calculus.

Tormina.

Alopecia.

Hemicran-

ia.


ditate veratis, refrigerando corroborant, & in omnibus calidis morbis apprimè conducunt. Sed antequam coquas dissecanda & nux eximenda optimeque purganda.

DE ARMENIACIS, SEV MALIS PRÆCOCI BUS PRISCORVM.

CAP. II.

ARMENIACA Mala minora.

Descriptio



MAGNA est Arbor, quæ Armeniaca dicta Mala fert, persicæ aliquatenus a linis, cortice nigriore, caudice crassiore, firmo, ramis magis patulis brachiata. Folia: folia habet persicæ folijs latiora, breuiora, ad Populnea aut Betulacea quodammodo accedentia, rubedine subinde secundum nervos respersa, acuminata, denticulata, & pinnulis subinde ad pediculum articolata, sapore acidulo. Flores: Flores ex roseo rubore pallent, Persicæ floribus persimiles: Fructus: Fructus vero præcior: citius maturatur, pruno æqualis, intus forisque luteus, carne solidiore succioremque quam persica, nec non magis sapida, (quamvis aliqui diuersum statuere videantur) gustu vinoso, quæ ab officulo facile abscedit, non ita rugoso ut persicorum, compresso modicè, ut nihilominus verrinque protuberet, nucleum claudente ad officuli proportionem, sed minus longum, quam persici, & pro proportionem crassiore, sapore minus amaro, quam illius, & nonnihil ad Amygdala accedente non sine impressione aromatica. Est nobis inter naturalia nostra geminum officulum indissolubili coalitu monstruosum.


Flores.

Fructus.

Officulum

Officulum geminum.

ARMENIACA Mala maiora.



AR M E N I A - Descriptio CA maiora maiorum. cognominantur, quæ paulo minor Persicis, saltem ut plurimum, impressa lacuna sulcata, altera parte nonnihil interdum rubentia & maculosa, altera ex luteo pallida, carne tenera, sed callosiore quam Armeniacis minoribus, dulciore, grata, odorata, quæ officulum facile relinquit, Amygdalino æquale, latius, lauius, compressum, ab vno latere cristatum, fractu haudquaquam facile.

compressum, ab vno latere cristatum, fractu haudquaquam facile.

Alui mor.

Conditum Meris.

Ventriculi ardor.

Oris fater.

Florum conditura.

Oleum & fater.

Aqua florum.

Syrupus & fater.

Syrup. ex fater.

Vfus officini.

Vfus ligni.

Condit & sic, præsertim rubra. Decorticata, ut prius, & concisa in ollam vitreata pone & depuratum & sufficienter coctum mel affunde, ut supereminet, & adserua. Eadem ratione ex saccharo affuso syrupo parare possis. Si cui mellis sapor molestus, prius lauentur aqua fontana, antequam agro exhibeantur. Persica quæ conduntur firmitudine esse oportet, & paullo infra perfectam maturitatem.

Mel succus conditum ex persicis præscribit tale. persicorum maturorum intus & foris purgatorum, & succi persicorum aliorum sume singul: lib. tres sacch. alb. lib. duas: tere persica in medullæ consistentiam coque cum syrupo, secundum artem. possunt aspergi aromata, ut lignum aloës, santalum, cinnam. cubebe, macis &c. sed sine aromatibus admodum salubre est, & expertum, nam ventriculi ardorem mitigando ipsum roborat, sitim extinguit, tetrum oris halitum emendat: odore præterea cor ipsum spiritumque vitalem recreat, persica aliqui in vino macerant, in frusta dissecta, atque decorticata, existimantes ita citius in venas deduci, minus asferre noxæ, ac sanguinem nihilominus refrigerare: simili ratione vtimur in cibis.

Flores quoque persicorum quemad. Rosarum flores, saccharo conduntur, pueris res vtilissima aduersus verines & omnes putredines, quominus illi generentur. Hac conferva manè potissimum ieiunio exhibenda. Ex iisdem acetarium cum sale, aceto, & oleo parabitur, quod erit palato gratissimum, aluum leuiter leniens, bis tertie purgans.

Oleum ex nucleis expressione conficitur, ut oleum Amygdalarum. Ex quo Tabern. tale remedium parat non contemnendum ad tumores hemorrhoidum quos ficos & Mariscas appellant. Acc. Ol. nucleor. persicor. & Amygdal. amar. sing. vnc. j. styracis liquidæ, Bdellij, sing. drach. j. Mice & locum illine.

Quæ ex floribus persicorum destillatur aqua, si eâ manè & vespere abluatur facies, maculas delet, eamque splendidam reddit. autor Rôls. in secretis.

Sed & syrupus è floribus persicorum à posteris inuentus hodie in benè institutis pharmacopolijs paratur, ad plures prædictorum effectuum aptissimus. purgat n. trium vnciarum dosi, putredines arceet, offensus liberat diuturnus eius vsus, & inprimis vermes enecat ac exterminat. paratur infusione multiplici, ut syrupus infusionis Rosarum.

Fontanonus ex ipsis persicis expressis ingeniosè satis parauit hunc syrupum. Acc. succi persicorum non absolutè maturorum, lib. duas, coque ad dimidias, sine ut fæces subsideant. Colato adde succi Malorum Granatorum vnc. iij. sacch. q. s. coque in syrupum & clarificetur suff. quantitate santali citrini. Hunc industrius medicus probè accommodare nouerit in rem præsentem.

Nec sua quoque vtilitate carent ipsa nucamenta ossia. Nam, ut nobis pro certo asseruit industrius & ingeniosus Ill. ducis Wirtemberg. Architectus Hen. Schickart, ex ijs in carbonem redactis lautissimum & præstantissimum paratur atramentum pro impressione figurarum ere insculptarum.

Iam supra diximus, ligni materiem præ alijs ad tornum ab artificibus probarj.

Ipsa quoque arbor à prædicta nonnihil euariat: Nam præterquam quod initione hæc comparata credatur, raro in proceram excreuit arborem, Matth. & Dalech. Folia, populi nigra æmula, quam prædicta rotundiora, quaternis, quinave simul emittunt. Flos albus Cerasi florum figura, cui succedunt fructus Persicorum quadantenus specie atque colore cum purpura mixto, unde Chrysomela Romanis nuncupata.

G.A. qui *armeniac* dicitur, Melcan Armenicem vocat, scribit nomen verum delictum: vocare enim omnes tum fructum tum arborem *armeniacum*, Præcocion.

Diosc. *Μηλα ἀρμενιάκη* & *ῥοδάκη*, quæziti dicitur: Armeniaca, Latine præcoqua, vel præcocia ut alij volunt, minora sunt Persicis. Galeno tamen Armeniaca & Præcoqua diuersa fuisse videntur, qui 2. de alim. fac. Præcoqua facit Armeniacis præstantiora, licet eodem capite de ambobus agat: addit tamen, qui Præcocion nomen fugitant, utraque Mala Armeniaca vocitant, alij verò Armeniaca *ῥοδάκη* Eginetæ. Dicuntur & *Βερίκοκα*, Bericocca, vel, ut quidam scribunt Bericoca, alij Bericoccia.

Palladio quoque Præcoqua differunt ab Armeniis, ut vult Hermolus, cui Armeniaca siue Armenia Prunorum generis sunt, peregrina. Sola è Prunis odor: conueniuntur, eadem: (nos tamen multa Pruna odorata nouimus) Armeniaca vocari delicta, & præcocia siue præcoqua tantum dici iam dictam de Gal. Græci non præcocia, sed Bericoccia ferè pronuntiant. Quæ Veteres de Armeniis præcoquis scripserunt præcedenti capite sunt annotata, quia plerique simul de ijs cum persicis scribunt, ut commodè a nobis separari haud potuerint, nisi inani repetitione Lectorem obtundere voluissent.

Porro Plinius præcocium duo genera indicat: alterum Superas, amplum & magnam, quod è Sabinorum locis adhibebatur, vulgò *gras Abricots*: alterum vulgare, paruum & strigolum, etiam Armenium dictum, vulgò *dos Armegnes*, ut notat Dalech. Ruellius putat de voce Bericoca tractum nomen vulgè *abrica*, utrinque (air) potius pruni quam persici & naturam & faciem referre, quamquam diuersi generis esse multis placeat.

Comar, *ῥοδάκη* seu Rhodacena (sic enim legi vult apud Paulum, quam lectionem tamen supra improbuimus) exillinat esse quæ Germanis pro locorum varietate alibi *Melcten* alibi *Artonzen*, alibi *Marischten* appellantur. Idem præcocia Sethi ac etiam Armeniaca ad Cerasa refert, veluti capite de Cerasis dicitur. Cordus Armeniaca Persicorum generis facit. Persicum quartum Treacinum Trago: & Lonic. quidam (addit ille) volunt reducere sub caput Diosc. Persæ: verum descriptio apud Theoph. & Plutarch. facit ut aliam existinem.

Turn. *ῥοδάκη ἀρμενιάκη*, quam Gal. Paul. & Arius mox Persicis subiungit, nec non Dioscorid. Plinius latinus Scriptor vocat Præcocia mala, & inter Persica recenset. Differunt tamen Præcocibus folia latiora, quam Persicis, citiusque multo maturascunt: Persicorum ossa rugosa, cæternosa. Præcocium plana, lauia atque horum fructus totus minor Persicis.

Armeniæ arborum, ut tradit Matth. plura videntur genera, magnitudine potius, quam genere differentia, quod euenit non modo cæli clementia & terræ admodum frigifera donibus, sed & cultorum quoque. Omnia ubi maturitatem sentiant albo colore splendunt: ideo Romanis

vulgò *Grifomele*, quasi Chysomela dicuntur, eaque præcipue quæ in contractu cum Persicis magnitudine certant. Maturascunt incunite æstate, mensis Iunio ante alios fugaces fructus: unde merito Præcocia dicta. Os in quibusdam amarum reperitur, ut in Persicis, in aliis verò dulce, ut in Amygdala. Est & alia differentia prædicta minor, Armeniaca *ῥοδάκη* dicta.

Amatus, Armeniaca dicit à Præcocibus differre, quamquam nullam inter illa differentiam, ob nimiam quam habent similitudinem, faciat.

Generis quatuor differentias ponit. 1. Malum Armeniacum vel præcoquum (Duracinum) commune, *Amarellen* / *Barilleli*. 2. Mala Armeniaca ex Hungaria magna & optima, VVoyssello. 3. Mala Armen. candicantia, gustu suauissima, nucleo oblongo, dulci, ut Amygdala videantur esse. 4. Mala Armeniaca alia longè maxima, quæ ille existimat esse vera Veterum Armeniaca, ex annotatione VVoysselli.

Dod. Mala Armeniaca quædam parua, nec minus vulgaribus maiora: alia ad mediocrium persicorum magnitudinem accedunt, vel etiam æquant. Ex hac arbore gummi effluit.

Recentiorum nonnulli hanc differentiam faciunt, ut quædam maiora ac insita Armeniaca sint, Gallis *anapeschis*: minora verò præcocia, Gallis *abricots*.

Lob. & penz: Armeniaca malus maior & minor: Mala Armeniaca, præcocia dicta, quæ figura & foliis referunt prunum, pomo autem ipso Malum persicum.

Denique plerique Herbariorum duas has differentias agnoscunt, non tantum magnitudine, sed & saporis suauitate differentia, palmam tribuentes maioribus, quod non solum cælo soloue tribuendum, sed insitioni & cultorum industria. Maiora seu præcocia, ut Hist. Lugd. vocat, Gallis dicuntur *gras Abricots*, quod insita fuerint: minora Armeniaca, quæ in Gallia Narbon. *Armegnes* vocantur: Gallis cæteris *Petits Abricots*, quod sponte gignantur.

Solerius ait in Plinij Armeniacorum & præcociorum historia dubia esse multa, sed quæ sibi dubia videantur, non addit.

Mauritani *Mermex* vocant, seu *Mirmix*, Mex, *Mesmes*, *Misnu*. Germ. *Amarellen* / *Sommerperschen* / *Malatzen* / *Goldperschen* / *Amarellen* / *Malatzen* / *Möllelin* / *Mollerzen* / *Amarelbbaum* / *Marillen* / *S. Johanspersich* / *Barilleli* / *Sommerpersich* / *S. Johanspersich* / *Goldpersich* / *Morellen* / variantibus nominibus & idiotismis, pro varietate prouinciarum: In Coloniensi agro, ipsa arbor mirabili voce, *Bardumelkenbaum*. Gal. *Abricotier*: ipse fructus, *Abricots*, *Armegnes*, *Anapeschis*, *Peschis de Troyes*, *Carmagnole*: Maiora *Anberges* etiam dicuntur prouincialibus. Ital. *Armellini*, *Baccabe* Herulesis, *Moniache*, *Armeniache*, *Grifomele*. præcocia Roma *Albricchi* dicuntur. In Syria *Amazza* Franchi. Barb. *Chrysomela*. Hisp. *Albricques*. Castil. *Aluarques*, *Aluarcoques*, & *Aluerchigas*. Catal. *Aiberces*. quibusdam etiam *Albarchigas*. Castiliensium *Aluarques* respondent Diosc. Armeniacis, & Latindrum præcoquis, autore Lacuna. Belg. *Koodepeersche* / *Droeghe Peersche* / *Abricoque* / *Anapeschis* / *see* / *Droeghe perschens*. Angl. *Abrecood tree* / fructus *Abrecood* / rectius *Bastie peches* / id est, præcocia persica dicerentur, autore Turnero.

Recentiores quidam sic distinguunt: ut Taber. Armeniaca minora, *klein Marillen* / *Malleyten* / Dioscor. præcocia: *Salbe Sommerpersich* / *Schvencf*.

Chrysomela maxima

Præcocia
Sic?
Os amarum
& dulce.

Differentia
Generis.

Præcoquum
commune.

Armeniaca
Hungarica
Armen. candicantia.
Armeniaca
maxima.
Parua.
Medicinal.
Gummi.

Maiora insita

Minora
præcocia.

Maiora
præcocia

Nomina
Linguarum
Armeniacæ

Minora

Schvvenck. scribit in Silesia dici: Klein Morels
len. Hort. Lusar. The lesser. Xpresso de tree / alijs
vniacum aut Armeniacum Gerardo. Armeniaca ma-
iora: Groß Marillen/ Groß Malleyten / persi-
ca præcoccia, Sommerpferosens/ Goldpferfing/
Malilen/de genere sunt persicorum Schvvenck.
The gwater Xpresso de tree Gerardo. Hungar.
Tongori beyack / h. c. Marium persicum. Sed
differentiæ sitis explicatæ in superioribus. Li-
guarum dialecti, istam nominum multitudinem
inuerunt, quas placuit in Nationum gratiam
hic assignare.

Coluntur in viridarijs & hortis Italiae & Gal-
liz. Minora etiam in Germania haud infrequen-
tia sunt, sed maiora multò rariora. Scribit tamen
Turn. semultas huius generis arbores in Germa-
nia vidisse: aliquas etiam in Anglia. Maiora in
Herruria cum ipsis etiam persicis magnitudi-
ne certant teste Matth. Eadem Lutetia abundant,
ubi magnæ arbores: item Argentinae. Minora
frequentia sunt Basileæ. Apud nos Montbelgardi
vtrumque genus vix immune, quin singulis fere
annis aliquid patitur, præsertim maius cuius
summitates vix plurimum gelu marcescunt, & in-
fructiferae redduntur. Tam minora, quam maio-
ra habentur in Alsacia, sed hæc in hortis pauco-
rum nobilium.

Montpelij Martio florescentes vidimus cum fru-
ctu satis iam magno, Basileæ fructus maturare
Iunij principio aliquando etiam Iulio, præser-
tim maiorum, vt Genevæ & Lugduni. In Hispania
matura Maio: auctore Lacuna. Vidimus et-
iam Romæ Maio, optima & sapidissima.

Inferuntur optime in prunum. Albercocci Ita-
lis dicta, quorum fructus Armeniacis fere similis,
& partim Persicis, non autem foliis. Autore
Aug. Gallo, inferuntur prunis & Malis Ar-
meniacis. Fructus qui inde emergunt admodum
delicati sunt dicti Albergesi: qui licet possint in-
ferri persicis & prunis, melius proueniunt ex oli-
bus autumno plantatis potius quam vere.

Transferri etiam gaudent. Nam vt Gesner.
scribit, Persicus præcox vel Armenia cum semotis
crassitudine truncum haberet, effossa & tranilata
pulchre creuit, & Vere floruit. De cultura plu-
m habes capite precedenti.

Armeniaca autore Dioscor. stomacho vtiliora
sunt quam Persica. Galeno verò, fructus humi-
dus est, & frigidus, vtrumque in secundo excessu.
Sunt enim hæc quoque ex genere Persicorum,
bonitate tamen nonnihil illa superantia. Neque
enim in ventriculo, vt illa, corrumpuntur, neque
accrescunt, vulgè autem suauiora apparent, vnde
etiam stomacho sunt gratiora: cætera enim illis
sunt similia. Præcoccia tamen quæ vocant Ar-
meniacis sunt præstantiora. Quidam recentiores
medici Dioscoridis & Galeni dictæ sententiæ re-
fragantur, & ea magis quam persica in stomacho
corrumpi putant, vt tradunt Matth. & Dalech.
quod nos vniuersumque experientia diiudican-
dum relinquimus.

Oleum è nucleis Armeniacorum expressum,
mirifice valere tradunt inunctum ad inflamma-
tas hemorroidas, & ad vlcera tumores, ac lin-
guæ impedimenta, & pariter ad aurium dolores.
Item potum vinctarum quinque pondere, cum vi-
ni Cretici vincta, calculos pellic, & colicos iu-
uat. Reliqua vide in viribus Persi-
corum.

Tom. I.

MVNIACVS ARBOR.

Mvniacus arbor quædam (inquit Petr.
Cresc. l. 5. agricultura) similis fere pru-
no, verum magis nodosa, cuiusque fructus est
magnitudinis communium prunorum, similis
fructuum Persicorum in forma, valde tamen odo-
riferum, & in colore aureum eius potius: aërem
& terram desiderat, vt prunus, solum tamen so-
lum desiderat, non argillam, vel cretam. Seri-
tur semine, mense Februario, & Martio: trans-
plantatur in se verò, pruno & persico, & forsitan
Amygdalo potest inferri. Circumfodi debet as-
siduè, & siccis temporibus irrigari, atque putrida
& arida in ea recidi, atque vt prunus formari.
Minus sunt humida poma eius quam persica, aut
pruna, magis tamen stomacho & cerebro confor-
tatiua, cum optime matura extiterint, quod eorum
color, sapor & odor aperte demonstrat.

Nos solertissimis naturalium indagatoribus
considerandum relinquimus: An Armeniaca
Malus?

PERSEA.

CAP. III.



Persea arbor
est Piro simi-
lis, in latum di-
ructa, perpetua-
que Coma virens,
ramulis ex viridi
pallenscibus. Fo-
lia Lauri latifolia
habet, parte su-
perna uirentia,
inferiore verò ci-
neri coloris, fir-
ma, nervis ali-
quot per obliqua
discurrentibus, o-
dore & sapore co-
mendata, cum
adstrictione lin-
guam mordican-
tia. Flos Lauri
fere copiosus, ra-
cematum conipa-

ctus, pallidus, sex foliolis constans. Fructus per-
initia pruno similis: deinde successu temporis pi-
ri in modum oblongus, nigro colore, iucundo-
que sapore: nucleum cordis effigie continet, gustu
Castaneæ aut dulci Amygdalæ haud ablimili.
Clus.

De Persia Theoph. in quarto hist. sic scribit. Ar-
bor est in Aegypto Persea dicta, aspectu procera
pulchraque: foliis floribus & ramis totaque adeo
figura Piro similis, nisi quod altera perpetua, (nè-
pe Persia) altera decidua sit solid. Fructus co-
piosos profert, omnique tempore maturum edit,
nouo semper veteri subsistente. Maturat per-
fectè sub Etesiarum flatum: reliquum crudiorem
collunt & reponunt. Est magnitudine Piri, figu-
ra oblongus, Amygdali specie, colore herbidus,
nucem intus quemadmodum Pruni continens,
sed multo minore mollioremq. Caro ei dulcis ad-
modum & iucunda, & concocta facilis. Nihil e-
nim molestiarum affert iis, qui multum comede-
runt. Arbor ipsa radicem tum longitudine, tum

Armeniaca
arbor
Pruno si-
milis.

Persica.

Sativa.

Asiatica.

Descripta.

Folia.

Spica.

Flora.

Fructus
Pruni &
Piri, acie.

Nucleum
cordis effi-
gie.

Synonyma
autem quæ
placuerunt.

Pruno simi-
lis.
Fructus.

Amygdali
specie.
Nux Pruni.

Radix.

Lignum.

P



Les quatre
différents
verses et
Persique.

Abstract

Myxodora
Perfora can-
genae.
Hed. linn.
1847.

1. **Forma**

March

Fig.

H. Light
1995,

~~Cucurbita~~
ran,
mygdala.

Abstract

Salem, N.J.

• Login:

de Iesù, primo ab vrbe Valentia lapide, ex Armenia, vt ferebatur, sed delatam.

Tempus. Vere florentem conspexit idem. Autumno maturum fructum ferre intellexit à D. Ios. Placa Medico & professore Valentino, qui ei loco dicto monstrabat. Simon de Touaro Med. Hispal. similem arborem in suo horto alit. Persion, inquit Athen. gignit Arabia.

Vires & Vitis. Persicæ fructus, autore Diosc. cibo idoneus est, & stomacho utilis. Arida folia trita & inspersa sanguinis eruptionem sistendi vim habent. Persicæ folia, vt scribit Gal. adstringentem vim modicè participant, aded vt queant etiam nonnunquam vtiliter sanguinis eruptione affectis partibus imponi. Paulus persicæ radicem inter menses ducentia recenset. Apud neotericos, Europæos saltem, quantum nobis constar, nullo adhuc experimento celebratur.

PERSICÆ NYCI SIMILIS FRUCTVS NUCLEO
venenato.

CAP. IV.

Vires & Vitis. Cathartica, vel, vt verius loquamur, septica est huius fructus facultas, quo Indus quidam Æthiopisiam (vt refert Monardes) cuius crura malignis & inueteratis vlceribus scatebant, in puluerem redacto atque insperso curabat, exesa carne putrida. Eundem puluerem cum elychnio iisdem inposuit vlceribus, ad generandam carnem, & vlcus ad cicatricem perducendum. Est is fructus in insula Margarita dicta admodum vulgaris, quo etiam in cibo frequenter vtuntur, magnitudine Mali Assyrij vel Arantij, nucem Persici mali ossiculo similem continens, cuius concremati pulvis (nam ob duritiem cremandum, alioqui difficile attritu) ad ea quæ modò dicta utilis est. Nucleus qui intrus continetur aded noxius est & deleteria facultate præditus, vt siue homo, siue bestia eo vescatur, præsentaneam mortem sibi molitur, cui nullo remedio occurrì potest, tanquam sublimatum aut corrodens aliud medicamentum sumpsisset.

Hæc pauca à Monarde prodita reuocant nobis in memoriam, quæ Diosc. Plin. & Gal. scribunt de Persicæ venenata vel lathali, quæ adhuc pauciora & dubij plena.

Huc fortè etiam referenda quæ Ramoullf. scribit: Persianum quendam mercatorem indicasse sibi de venenato fructu Persicæ, eis noto nomine Sepha: propterea ab ijs negligi. Confer etiam quæ dicuntur de Manga venenata.

MAMAY ARBOR.

CAP. V

Descript. Mamay ab Hispanicis historicis descripta (cuius iconem lib. præcedenti cap. 45. sub titulo, Guanabano forte similis Higuero, damus) arbor est formosa, simili modo virens vti Iuglans, alta lataque coma, sed quæ aliquantulum in pyramidem deinat, Cupressi modo, folium longius quam latum: materies ligni fungosa: fructus rotundus & magnus, carne Malum cotoneum referens, sed sapore Persici duracini: hanc insunt terna quaternaque ossa, interdum plura simul iuncta, valde amara: Gomara.

Vt Scaliger verò tradit, Mamæi Castaneæ cum facies tota, tum magnitudo. Idem folium, sed maximum. Fructus non solum ingentis Persici, sed etiam maximi Cidonij superat globum. Nucleus duas habemus, quas intus fert: quarum altera penè æquat Persicum, altera longè maior. Ex qua potes, addita, aut circumiecta pulpæ corpulentia, totum ambitum animo metiri. Pulpa rubro colore est: Corium fructui fuluum. Sapor Persici, non, vt Cardanus scribit, Piri. Quod & testatur Cardanus ait: Nuculam esse triangularem: verum quidem est, sed minùs accurate pictum. Vnum enim è lateribus aded est obtusum, vt dorsum potius, quam anguli acies esse videatur. Vna planities illa, non duæ: Latissima, splendidissimaque pars hæc, colore ferrugineo. Tertium latus planius, & ad utrumque caput cuneatum. Rostellum quoque alteri prominere geminum: sed inferne producit magis. Eius figuram quod refert, nauigium præcurre sculptum vidimus. Quod verò idem Card. scribit, in nucula nucleum ferruginei coloris, verum non est. Potius ruber est. Eius nempe coloris, cuius vel China, vel Air, vel Ben rubrum. Odor, qualem diximus, Persici nucleo proximus: item sapor, verum longè dilutior. Vbi gustaris: tandem, licet lentè, ac serò, palatum acuit, ac pungit parum. Intra medullam hanc, quam alteram medullam amarissimam Card. profitetur, nullam inueni, nec verò simile est. Si verum est, non deest est. Hæc Scal.

Ouedus tam arborem quam fructum paulò aliter describit, sic: Mamæi arbor est speciosissima, magnæ Nucis iuglandis proceritate, folijs paribus aut maioribus crassioribus, altera parte viridioribus, palmum longis & ad proportionem latis. Huius fructus est omnium qui in insula Hispaniola dicta proueniunt gustui suauissimus, quandoque perfectè, quandoque imperfectè rotundus, pugnos duos magnitudine æquans, aliquando minor, cortice contegitur fuluo, modicè aspero, Pirorum syluestrium ritu, nisi durior crassiorque esset. Sunt qui unum, alij duos trèue concludunt nucleos, in pomi medio, interstitiis distinctos, acinorum ritu membranula tenui opertos, delibratæ castaneæ colore, quorum pulpam, si seueris, iudicabis castaneæ, præterquam sapore similem, sed interior acinus fellis est amaritudine, delicata tunicula contextus, quam inter & priorem illam membranulam caro siue pulpa intercedit ferè fulua, Persici Duracini gustu, aut meliori, non tamen tam succulenta est, neque tam odora. pulpæ isti digitalis est crassitudo in maioribus, minor in minoribus pomis.

Benzo huius fructus lemma & varietatem paucissimis verbis comprehendit. Mamæi arbor mediocris Nucis magnitudine, longiore quam latiore folio. Fructus eius in Hispaniola insula rotundi, in continenti verò longi & crassiores, & gustu iucundiores sunt, tres quatuor acinos seu interiora ligna habent pulpa in spadiceum colorem vergente, tenui tunica, sapore aliquantulum dulci.

Mamay, Gomara in histor. gen. Indiar. Item Clusio. Mamæi Scalig. Oued. Hist. Lugd. Figuram quam exhibemus ex Hist. Lugd. desumpta est, nec videmus magnam similitudinem cum Castaneæ folio, quale ei Scaliger tribuit: Gomara autem & Ouedus tribuunt Iuglandis. Haud multò felicius, si figuram speciei, qualem tamen illi circumscribunt. Quod si etiam vera dicit Ouedus interiorem acinum esse fellis amaritudine, etiam-

Cardanus
not.

Non Card.
error.

Sapor.

Arboris a-
na descrip-
tio.

Fructus de
scriptio alia

Uno nucleo,
aut plura-
bus.
Castanea
simil. ex sa-
pora.
Interior a-
cinus ama-
rissimus.
Pulpa sapor

Varietas.

Synonyma



Herbarij omnes Amygdali vulgato nomine tam ad designandam arborem, quam fructum ipsum utuntur.

Linguarum nomina. Germ. Mandelbaum: Mandlen & Mandelfern. Belg. Amandelboom, Amandel. Gal. Amandrier, Amandres, & Amende. Ital. Mandioia. Mandole. Hisp. Castil. Almendra, Almenbras: Catal. Amellos: Portug. Amendoas. Anglic. The Almond tree. Bohem. Mandlij. Vngaricè, ut refert Clus. Mondola / amygdalus dicitur.

Differentia. Quoad differentias: autores penè omnes supra citati, tam Græci quàm Latini, alijque dulces agnoscunt & amaras, tanquam præcipuas differentias. Aliquorum tamen diligentia etiam aliæ observatae sunt, qualis est illa de qua Athen. scribit, præstantes nasci in insula Cypro, diuersa ab ijs quæ alibi proueniunt figura: sunt enim (inquit) & oblongæ, & in summo reflexæ.

Tenues. Seleucus in Linguis scribit dulces Amygdalas à Lacedæmonijs vocari *Tenues*: ampliores verò nuces, *Myccero*: At *Amerias*, *Myccero* Amygdalas dicit tradit. Gesnerus tradit, esse etiam Amygdalum, nuces rotundas ferentem: & aliam Perlico insitam, (de qua nos postea) in hortu Matthiæ Curtij.

Dura. Tragus tria facit genera: putamine duro: alia molliore: tertia amara.

Mollis. Matth. dulcium plures facit differentias: magnas, paruas, mediocres, compressas, rotundiores: quarum nonnullæ durissimo integuntur operimento: aliæ fragili: sunt item quæ duplici consistunt nucleo. Nos & omnes has differentias obseruamus, & in naturalem nostrum thesaurum etiamnum adseruamus: His adde Amygdala lanugine carentia, de quibus postea. Amygdalæ minores vulgaribus per omnia similes sunt, quibus etiam sapore & facultatibus respondent: multò tamen, hoc est, triplo aut quadruplo minores & ad proportionem gracilem continent nucleum. Hæ, ex obseruatione Cordi, quoque duum sunt generum: vna enim amaras, altera dulces producit. Adferuntur adhuc putaminibus suis incluse cum Gallicis Asiaticis alijsque medicamentis ex Asia aduehi solitis.

Amygdala lanugine carentia. Amygdalæ fragili & flexili putamine multiplici ratione à vulgaris differunt. Primò putamen nullis foraminulis habent punctatum aut scarificatum, sed quodammodo sulcatum potius, cui extrinsecus venulæ albæ ex carne separatae residuæ adherent. Latitudo vncialis ferè, longitudo vncialis maior, cortex quauis iuglande aut Amygdala fragilior, cæteris tenuior, nihilominus pulchros & benè succulentos intus continet nucleos, nescio quid in ipso etiam gustu, si rectè iudicamus, à vulgaris discriminis, habentes. Leuissimo digitorum pressu vel quamuis huius generis puer decennis facile frangat, quod in cæteris vix mallei vi præstet. An hæc fortè sit Nux Græca Tarentina Columellæ? Nux tenera Amygdali Palladio. Amygdala putamine molliore dentibusq; fragili, Trago.

Amygdala lanugine carentia. Lanugine carentium Amygdalorum meminit Cæsalpinus, his verbis: Amygdalorum fructus renellus, antequam & induruerit, cibus gratus est, subacidus: laudantur in hunc usum, qui lanugine carent & grandiores sunt: huius gratia inserere solent super Prunum.

Amygdala maxima. At maximi generis nuces quas habemus, duas vncias longæ, vncia latiores, sed ad proportionem compressæ conspiciuntur, tales quoque nucleos, nempe longos & compressos continentes. Extri-

secus alicubi striata testa apparet, crista per ambitum eminenti & acuta.

Mediocria vncia longiora, latitudine inferiora, leuiori prædictis putamine, crista minori, obtusiorique, minùs frequentibus punctis notata, interim ventriosiora, eius generis putamus, cuius nucleï passim in officinis prostant. Huius generis geminam habemus, tam fabre vinctam, ut naves puemli pulchrè representent.

Minimi generis Amygdala, minùs reliquis omnibus compressa, sed terè ad Cylindri rotunditatem accedentia, triplo longiora quàm lata, mediocribus quàm maximis putaminis leuore similia, pulchellum sui generis nucleum continent.

Post differentias locum teneat delectus. Amygdalæ tam dulces quàm amarae probantur flauissimæ, plenæ, integre, non contractæ nec erosæ, tamen leues, duræ & siccæ, quantum illis datum est, ob id fragiles, intus albidissimæ. Ex his dulces, sapore delicatæ, propè indicibili in Castaneam rostratam & panis purissimi benè cocti qualitatem inclinantes, odore ante esum nullo, aut perquam exiguo, inter edendum autem iucundo, quales Venetijs omni penè tempore, potissimum circa Autumnum habentur: quo tempore nos ibi comedisse meminimus. Tales aut his fortè meliores adhuc, Monachi celebrant apud Meluen, quando aiunt, ex dulcibus meliores esse Apulientes, quæ Ambrosinæ cognominantur, fortassis à saporis suauitate. Ex amaris, magna, succulentæ, integre atque recentes præferuntur.

Amygdalis, ut scribit Theoph. locus gracilis, ferè nus atque apricus longè commodior est, (seu, ut ait Palladius, durum, siccum, calculosumque solum, coelumque calidissimum) quàm humidus, ad alendum & augendum comparatus: nam si altus sit atque pinguis, nimia pabuli vbertate lasciuientes sterilescent: sunt tamen qui inter vites ferendas censeant, tanquam innoxiam & alimento mediocri contentam, & simul quod maturè fructificet, nec late inumbrer, minime grauem. Sed hi non rectè existimant. Vmbra enim, & serus fructuum prouentus, non tam infestant, quàm radicem vires: rapiunt enim alimentum suo amplo discursu, implexuque enecant.

Porro in Creta horti abundant Amygdalis: In Italia familiaris est: In Galloprovincia Delphinatique consistunt planities patentissimæ: Ex quibus dulce illud oleum, quod & nobis interdum, in mensa butyri vice crudum expetitur, Lugdunum, & inde in diuersas prouincias importatur. In genere dicendo, Loca amat Amygdalus regionique calidiores, atque iccirco vberior adolescit in insulis: præsertim quæ pluuijs intempestiuis non infestantur: & ob hanc & frigidam coeli temperiem, difficulter nascitur aut fructum facit in Belgio, teste Dod. In Anglia maturant interdum nuces, autore Lob. Circa Argentinam complures sunt. Reperiuntur in tractu Rheni non paucis locis: sed primas in Germania nascentibus tribuunt in Spirensi agro natis. Camerario teste, in Germania hodie copiosè proueniunt, Laudatissimæque Landauenses. Turnerus scribit in Anglia quidem esse, sed nullo fructuum memorabili prouentu. In Alsatia haud infeliciter benè cultam prouenire nouimus. Quicquid sit præstantiores semper Germanicis Prouincijs & Narbonensibus, quæ Lugduno ad nos aduehuntur, solidiores & minis rugosæ. Sic videas Geneuæ prouenientes Prouincialibus multò esse rugosiores. Basileæ paucis hortis colitur, sed tamen ad frugem interdum peruenit.

Amygdala maxima.

Delectus.

Ambrosinæ.

Locus.

Amygdalis non inter vites ferenda.

Delectus à regione.

Modus. antequam germinant, viles sunt, qui de summitate lumuntur. Inferuntur & sub cortice, & in trunco. Inferuntur in se, & in Persico: quidam & Pruno inferunt. Palladius.

De Amygdala inscripta. *Phyllis odoratos primis floribus arbor.*
Discessit Pruni cortice fixa regis.
Pomaque permixta velamine Persica misto.
Duritiemque docet regumnis esse loco.
Id modicum tornat filiqua tendente figuram
Et frondes pulchro ditat odore feras.
Castaneamque truncem depulsi cogit echinis
Mirari fructum, laeta poma sui.

Si ferax sit. Amygdalus si parum ferax erit, forata arbore lapidem adiciat, & ita librum arboris inolescere finito Columella. Copiosiores fructum dari adfirmat Theoph. si ferreus palus adigatur arbori, impressoque foramini quercus inseratur paxillus quo modo in eam animaduerti volunt, perinde quasi arbor iniuria lasciuiat. Palladius tede cuneum terebratæ radici immergere suadet, in eundem finem.

Adversus yela. Locis frigidis ubi metus est de pruina, Martialis dicit hoc remedio subueniri. Antequam floreat radices nudatur, & albi lapides minutissimi mistis arenis congeruntur, & ubi iam tempus videbitur, ut debeant germinare, effossi iterum lapides submouentur.

Si sunt comæ. Teneras nucas Amygdalus creabit si ante florem radicibus ablaqueatis per dies aliquot calida aqua ingeratur. Ex amaris dulces fiunt, si circumfollo stipite tribus digitis à radice fiat caueria, per quam noxium defudet humorem: vel medius truncus terebretur, & cuneus ligni melle oblitus imprimatur: vel si circa radices suillum stercus, vel urinam affundas. Idem tradit Africanus. Theophrastus verò palo denso humorem nimium & abundantem educi iubet, sed ea lege ac omine ex amaris dulces euasuras, si id biennio aut triennio facias. Plinius circumfodi tantum iubet, & ab ima parte circumforari, ut defluens pituita abstergeatur.

Si amari fiant. Amarescunt si à pecore rodantur, idem ab ijs seruandæ, qui istud nolit.
De seminario Amygdala. Cum in seminario Amygdala disponimus, si siccitas intercesserit, ter in mense rigemus, & herbis nascentibus circumfodiendo sæpe purgemus. Terra seminario latamen debet habere admissum.

Quando putanda. Putandæ sunt Nouembri mense, ut superflua & scrida, & densa tollamus.

Si ferax sit. Democritus alium modum præcipit, si ferax non sit Amygdalus, nempe tedæ præpinguis adactum terebratæ radici cuneum, inuulo prius humano lotio mergere.

Si Amygdala inscripta per nascentur. Græci asserunt, & inter eos idem Democritus nasci Amygdala inscripta, si aperta testa nucleum sanum eximas, & in eo quodlibet scribas, & inuolutum luto & stillo stercore charta reponas. Sed satis de Cultura & Mangonio.

Repositio. Amygdala, ut Florentinus & Palladius tradunt ad legendum maturitatem fatentur, cum fuerint spoliata corticibus. Hæc sine cura hominis seruantur in longum: si difficulter corium dimittet, paleis obruta continuo relaxabunt. Item decorticata, si aqua marina lauemus, aut salsa, & candida fient, & plurimum durabunt.

Si diu durent. Amygdalæ autem Hippoc. æstuosæ sunt, verum probe nutriunt. Aestuosæ quidem sunt propter pinguedinem: nutriunt autem propter carnositatem.

Manus facta. Dioscorides: Amygdalæ amaræ radix, si trita

decoquatur maculas in facie à Solis ardore contritas tollit. Ipsa quoque Amygdala illa eadem præstant: apposita verò mentes cient, & capitis doloribus auxiliantur, fronti temporibusque inducta cum aceto & rosaceo. Valent & ad epinyctidas (seu pustulas nocturnas) ex vino, itenique ad putrescentia vlcera, herpes canumque morsus cum melle. Porro comesta dolores adimunt, aluum emolliunt, somnum faciunt, urinamque cient. Profunt etiam ad sanguinis reiectionem, si cum Amylo & mentha sumantur. Ex renibus verò & pulmonum inflammatione laborantibus, conferunt cum aqua pota, aut in eclegmate cum resina therebinthina. Urinæ difficultate affectis atque calculosis in passo opitulantur: itemque eclegmate cum melle & lacte hepaticis, tussi, & coli irritationibus, Nucis auellane magnitudine. Quinque sentæ si præsumantur, ebrietatem arcent. Enecant & vulpes cum quapiam esca deuorant.

At gummi ipsius arboris adstringit, calcificat, & contra sanguinis reiectionem potum auxilio est: cum aceto verò illitum, impetigines in summa cute tollit. Tussi diuturnæ cum vino diluto potum medetur: calculosis verò cum passo bibicam prodest. Ceterum dulcis & cibo idonea Amygdala, quantum ad efficaciam spectat, multo quam amara est inferior: attamen & ipsa extenuandi, urinæque ciendi vi poller. Amygdalæ verò quæ virides cum suo putamine deglutuntur, humida stomachi vitia emendant.

Olei Amygdalini parandi ratione idem Diosc. hanc tradit, quod aliqui Metopion vocant: Amygdalarum amararum repurgatarum & arefactarum choenices quatuor in pila ligneo pistillo leuiter in osam contundito, affusæque aquæ feruentis heminis duabus finito semihore spatio humorem imbibere, tumque postea maiore vi terito, ac deinde tabellis comprimens exprimito, quodque digitis hæserit concha excipito. Tandem magnari iterum aspersa aquæ hemina, quam combibere siueris, idem facito. Singulas porro heminas reddunt quaterni choenices. Est autem efficax contra vuluarum dolores & strangularum, ac eorumdem locorum tum conuersiones tum etiam inflammationes: itemque ad capitis dolores, auriumque ægitudines, sonos incertos atque tinnitus. Iuuat & virijs, renem laborantes, ægrè meientes atque calculosos, suspensios item lienosisque prodest. Quin & maculas tollit à facie, à Sole vitis medetur, & cutem erugat, admixtum melli, Lilij radici, ac Cyprino rosaceæ cerato. Hebetem etiam oculorum aciem emendat: denique vlcera quoque manantia & furfures cum vino expurgat. Plinius ferè eadem tradit quæ Diosc. addit tamen quardam vel de suo, vel ex alijs exscripta. Amygdalæ (inquit) amaræ radicem decoctum colorem hilariorum facit. Noces ipsæ somnum faciunt & auiditatem. Urinam & mentes cient. Capitis dolori illinuntur, maximeque, in febris: Si ab ebrietate ex aceto & rosaceo & aquæ sextario. Et sanguinem sistunt cum Amylo & Mentha. Lethargicis comitialibusque profunt capite peruncto. Epinyctidas sanant: è vino veteri vlcera putrescentia. Canum morsus cum melle. Et furfures ex facie, ante fotu præparata. Item iocinoris & reni dolores ex aqua potæ, & sæpe ex eclegmate cum resina therebinthina. Calculosis & difficili urinæ in passo, & ad purgandam cutem in aqua multa trita, sunt efficaces. Profunt eclegmate iocinori, tussi, & colo cum Elelisphaco modicè addito. In melle sumitur Nucis auellane magnitudo. Alique,

Menses
Cap. dolor.

Epinyctidas

Ulcera.

Herpes.

Canum

morsus.

Dolor.

Aluus.

Somnus.

Prima.

Sanguinis

Reiectio.

Pulmonum

inflammatio.

Urina diffi-

cultas.

Calculus.

Hepatica.

Tussis.

Cutis.

Adversus y-

ela.

Ulcus.

Neurama

tionis tē-

peram

Langui-

reductio.

Impetigo.

Tussis.

Calculus.

Dulcis vi-

tes.

Prima.

Amygdala

Græci.

putamine.

Amygdalini

olei amari.

parandi ra-

tio.

Olei Amyg-

dali Græci.

Dolor sub-

maxillæ.

Dolor capi-

ta.

Aurium.

bi.

Urina diffi-

cultas.

Calculus.

Asthma.

Licet ab-

struere.

Macula fac-

iei.

Uisus.

Ulcera.

Furfures.

Radices ad

faciem.

Somnus.

Capiti do-

lor.

Lethargus.

Epilepsia.

Ulcera.

Canum mor-

sus.

Cutis.

*Vulpiam
Sennam.
Dulcium
Syrus
purgant.
Nucis Gra-
ca.
Atorine ve-
gum.
Vitis fida.
Olea Sura.
Purgat.
Pars
Farmaculus
autum.*

*Dolor cap.
Oculorum
Vitis.
Condylomata.
Ad semina
An Amygd.
amara jam
guinum f.
plant.
Cura Plin.
Diof.*

*Vitis pa-
denda.*

*Tussis ex
præf. Senn.*

Ephelis.

*Obstruc-
tio
gutturis.
Lacrima
dolor.*

*Et dulcia au-
liqua habet
se amara.
dorem.*

*Nulla ad-
fructu.*

*Vitis non
soluunt.
Non multum
nutrunt.
Spirum.*

quinis ferè præsumptis, ebrietatem non sentire potiores: vulpesque, si ederint eas, nec contingat è vicino aquam lambere, mori. Minus valent in remedijs dulces, & hæc tamen purgant, & urinam cient. Recentes stomachum implent. Nucibus Græcis cum Absinthij semine ex aceto sumptis, morbus regius sanari dicitur: item illitis per se vitia sedis & priuatim condylomata. Idem tussis & sanguinis reiectionis profunt.

Idem Plin. de Oleo Amygdalino has tradit vires. Oleum Amygd. purgat, molit corpora, cutem erugat, nitorem commendat, varos cum melle tollit è facie. Prodest & auribus, cum rosaceo & melle, & Mali Punici germine decoctum. Vermiculæque in his necat, & grauitatem audientis diffundit, sonos incertos & rinitus, obiter capitis dolores & oculorum. Medetur furunculis, & a Sole vitiis cum cera. Huleera manantia & furfures cum vino expurgat. Condylomata cum meliloto. Per se verò capiti illitum, somnum allicit.

Vt verum fateamur, non placet, quod scribit Plin. Amygdalas amaras sanguinem sistere: quod multo minus exultimamus heri addita Mentha, ut illo vult, quamuis idem quoque sentiat Diof. In vtriusque enim nulla acrietas aut frigiditas, sed calor & facultas aperiendi. Quod si sanguinem sisterent, reprobanda essent in canum moribus: nec utiles essent in obstruccionibus.

Hippoc. l. 1. de morb. mul. Si prægnanti pudenda superficiali ac fetido vlcere affecta sint, Amygdalas tritas & medullam bubulam cum aqua coquere præcipit, & modica farina addita pudenda illinit, & aqua coctis Myrti baccis perluere. Idem l. 2. ad tussim ex præfoctione vteri præscribit Amygdalas amaras depurgatas.

Amygdala inquit Gal. que palam amara sunt, omnino extenuandi vim possident, Ephelin expurgant & excretionibus ex pectore pulmoneque crassorum lentorumque humorum impendio conferunt. In iecore crassorum viscosorumque humorum in extremis vasu impactorum obstruccionibus abundè expurgant expediuntque. Quin & laterum dolores ab huiusmodi causa natos, & Lienis, & Coli & Renum. Porro & ipsa arbor vniuersa similem sortita vim est. Nam huius radices coctæ atque illitæ ephelides purgant. Quorquor verò sunt Amygdala dulcia, & ipsa leuiculam amaritudinem possident, quæ tantum dulcedine superante occultatur: ceterum id temporis spatio clarum fit. Qualitas autem dulcis moderatè calida est.

Idem alibi, Amygdale, inquit nihil prorsus habent facultatis adstringentis: sola enim tenuandi facultas ac detergendi in eis præpollet, quæ cum viscera purgant, non humores e pulmonibus ac thorace spatis expectorant. Quædam autem ipsarum facultatem habent succos crassos ac lentos incidenti adeo exuperantem, ut usandi præ amore nequeant: oleosæ tamen ac pinguis qualitatis, ut Noces, participes: cuius causa, & ipsæ procedente tempore sunt, ut illæ, oleosæ. Minor tamen eis inest hæc qualitas, quam in Nucibus: quo fit ut tardius, quam Noces, oleosæ fieri cernantur. Ex ijs sane intelligi potest, quod neque ventri subducendo conferunt, neque corpus multum nutriunt. Quæ verò qualitatem amarâ habent præpollentem, ea ad pus & succos crassos ac lentos ex thorace & pulmonibus expuendos plurimum conferunt.

Rursum alibi Amygdala amara Mundificant & tenuant, & aperiunt oppilationes hepatis, & adiuvant ad spumendam humiditatem ex pectore & pulmone.

Et de simpl. med. Galeno attributo opusculo hæc leguntur: Amygdala est & suavis & amara, & vtraque viribus stipica: magis tamen sunt in usu medicinarum, & aptiores amara, eo quod subtiles magis. At paulo antè ex eodem Galeno traditum nihil plene adstringentis habere amygdala: ex quo patet librum hunc esse spurium, non genuinum Galeni. Hunc posteriorem locum sequuntur Germani plerique falso sibi persuadent Amygdala ventrem stringere. Eoque res venit ut mulierculæ medicastæ, quæ hoc à non multo se doctioribus hauserunt annulatis togisq; pecoribus, ignorantia autem insinuare ipsis contrariis persuadere conantes: sed mundus vult decipi, decipiat ergo.

Porro quod de facultate Amygdalarum aduersus ebrietatem supra ex Plinio & Diof. adduximus, quia id non parum momenti apud quosdam potatores habere videtur, sciunt, si in sua arte confirmari velint, eiusmodi effectus causam esse amaritudinis vim exiccantem, & humiditatem discutientem, ut vult Plutarchus in sympo. lib. 1. quest. 6. quo loco refert apud Drusum Tiberij Cæsaris filium Medicum quendam, (nimirum voluit ex arte bibere) qui alios omnes subinde bibendo vincere solitus erat, antequam potaret, quinque sextæ Amygdalas edentem fuisse deprehensum: ac deinceps id facere prohibitum, à vino facillimè superatum fuisse, immò ne tantillum quidem ad compositionem perferendam valuisse. Bellum verò mehercule Medicum, qui quod naturæ contrarium deprehendit, ne arte destitutus videretur, arte comparandum, vel sanitatis morumque adeo iactura, non debitaui. Vtinam non essent hodie, qui ne Amygdalis quidem ad eam rem egerent. Eandem historiam ex Plutarcho citat quoque Athen. qui tradit præsumptas Amygdalas bibendi appetentiam summo opere excitare. Eupolis:

Da quæ manditem Naxiam Amygdala:

Da vinum quod bibem è vite Naxia.

Ipsæ quoque Diof. in Eupor. multum Amygdal. amararum Cyathi vnius mensura ebrietatem accere tradit. Nouimus tamen, qui amulectum illud aduersus ebrietatem in usu habentes, nihilo secius à Baccho obruuntur, ac nimia sui remedij fiducia decepti, ita prosternuntur, ut nec manus nec pedes suo amplius fungi possint officio: ut cogitare necesse sit:

Viciisti tandem Bacche, Viciisti.

Diof. apud eundem Athen. scribit nutrimenti multum Amygdalas suppeditare (hoc sup. Galenus negauit) incundas esse ventriculo, calfacere, quia oleosum quippiam habeant: ut i. a. a. Sic legit Ruellius. Quidem legunt *συχώδης*: alij *αχρώδης*: alij *εμυώδης*. Ruellium sequitur Dalech. quamuis certum sit, ut idem quoque annotat, illos qui plurimum nucibus utantur, rauocessere, humectata illarum pingui liquore tunica interiore gutturis. Amygdalarum tamen minus operosa coctio est. Quamobrem citra noxam sautas edimus.

Diphilus scribit Amygdalas attenuare, prouocare lotium, purgare, parum nutrire: recentes ac virides prapum succum gignere, & cum paucioribus: siccas autem inflare & innatare magis: teneras, plenas, albas, lacteas meliorem succum gignere: ex siccis Thasias & Cyprias, quia sunt teneriores promptius excreui.

Mnesticus Atheniensis libro de edultis, scribit: Amygdalas & Noces Persicas castaneis esse deteriores, ex his tamen & ceteris cunctis nucum generibus in vniuersum edendum nihil esse quod

Scriptura.

*Lib. de
simpl. med.
non est Gal.
leni.*

*Vulp. Ger.
manorum
error.*

*Ratio cur
Amygdala
ebrietati
resistant.*

*Medicus
potator ar-
tisticus et
natur.*

Naxiam

*Experimentum
concordans.*

*Ratio apud
Athen. Ga.
len.*

*Purgant.
Parum
nutrunt.*

*Præpo-
nent
Tensa
Cypria*

quod non sit igne coctum, præter virides Amygdalas. Siccas enim pingues esse, quantum nocentissimam pinguedinem absumat ignis. Cæterum Diocles scribens nutrimenti multum Amygdalas suppeditare, cum Galeno, dicente, non multum curare, sic conciliari potest. ~~Pisum~~ Nutriunt, si comedantur cruda cum cute nucleum immature integre, & non optime masticata: vique adeo compacta & densa eorum substantia est, ut observaverimus in multis portiones Amygdalarum denotatarum, ac dentibus non bene attritarum, integras reiectas. Optime verò tritas, ut usantur pro lacte Amygdalino & aliis cibis ac ~~spediuntur~~, facile crediderimus cum Diocle posse multum alimenti suppeditare.

Mnefirheus quoque fortassis considerans incoctas reiici Amygdalas, dixit eas, & Nuccas Perficas Castaneis esse deteriores. In Castaneis sanè pulpa non ita solida & cōpacta: nec obseruauimus unquā incoctas frustulationi reiectas vt Amygdala.

Simeon Sethi eadem ferè de viribus quæ Dio-
scor. & Plin. habet: Is tradit modicè calidas esse
saris nutrire, attenuare & incidere. Amaras dul-
cibus esse calidiores: ebrietatem eius dici auer-
tere. Oleum Amygdalarum dulcium, quod ead-
em ratione ut amararum exprimi potest: (modum
familiarem docebimus postea:) modicè & tempe-
rate calidum esse: iccoris obstructions aperire &
aperire: Pulmoni etiam & pectori vtile esse,
quod postremum nostra experientia multorum
commodo sèpissime exploratum.

Scrapio ex Aben Meluai, foliorum & florum Amygdalæ expressorum succum epotum ascarides cum purgatione deturbare scribit. Eodem colluta inguina factorem amittere, injectum auribus necare vermes. Oleum nucleorum (subaudi amararum) confert dolori aurium frigido, & morbillis conferre illitu.

Mefues Oleum Amygdalarum dulcium magnis
collit laudibus, asperitatem gutturis, pulmonis,
& partium cæterarum etiam externarum lenire,
arritiam omnem ac siccitatem iuncturarum &
partium aliarum emendare: impinguare, conferre
hecticks, semen augere, ardoriquæ vulvæ & va-
riarum iniectionum commodare. Et est sanè medi-
camentum, verè *εὐπρόσιτον*, & ad multa efficax, blan-
dum, gratum, & velut quidam typus aliorum o-
leorum generis eiusdem: scimus quid possit in coli-
co dolere, ab induratis fecibus, ab humore acris:
in quibus tuto & maximo successit multoties
exhibuimus. Sed recentior oportet esse expres-
sum: datur ab vnciis tribus ad libram semis plus
minus, vel per se, vel cum iurè carniū. In con-
stipata alio, mite, tutum & probatum experimen-
tum, etiam renum dolor diuexatis. Est etiam
insigne anodynum, & vnicum propemodum in-
fantum medicamen.

Idem Meluei oleum Amygdalarum amararum
trahit obstrueta aperire, flatus resolvere & dissipare,
etiam in aurium tinnitu, & eiusmodi aurium
morbis, asperitates lenire, neruorum mulcere do-
lores, durities mollire, panum faciei delere. Auicenna
scribit pilulas fieri ex Amygdalis &
oleo Amygdalino ad famem diu tolerandam. Il-
lud consideratione dignum, quod apud Auic. le-
gitur gummi Amygdalæ adstringere & caleface-
re, quod nobis quidem vero minus consentaneum
videtur, quamuis in eo ipsum adeo Diosco-
tidem secutus videatur. Facile concesserimus
adstringere per accidens, nempe glutinando, vi-
scido liquamine in humore aliquo dissolutum.

Tom. 1.

qua ratione dysentericis quoque prodesse putamus. Sed de hac re doctiorum est iudicium, aut quibus est in hac re aliqua experientia.

Non omitendum quod Trallianus tradit Amygdala & Pistacia in hepaticis dysenteris caueri debere, eò quòd facile corrumpantur, & oleosa sint, promptèque in bilem mutantur, & excrementum asperius reddant, ut hinc venter magis, crebriùsque irriteretur. Idem alibi præcipit de purulenti: si alius non sit citata succum Amygdalarum, sin autem sic citata nihil prorsus de his exhibendû. Quo sanè loco, (quamvis & alios facci supra ex Diosc. & Plinio citauerimus hac facientes) facile refutare possis nostrorum Germanorû, opinionè qui existimant adstringi alump vsu lactis Amygdalini. At nos vix existimamus concedendum Tralliano in hepaticis Dysenteris caueri debere Amygdalas, eò quòd facile corrumpantur & oleosæ sint, proruptèque in bilem mutantur. Nobis enim videtur ea quæ difficulter concoquantur, non facile corrumpi & in bilem mutari. Nec oleositas tanta est in Amygdalis non rancidis, quæ id præstare possit. Cremor qui-

dem eorum facile accescit, si loco reponatur calido: non propterea in bilem vertitur. Sunt etiam qui moti auctoritate Auic. didicentis Amygdalas ob suam vinctuositatem commouere choletam, sibi persuadent non tutum cremoris Amygdalini usum febricitantibus, & iis qui stomachum biliosum habent, facile inflammari, mittere ad caput vapores, vulnerato capite his non vitendum, excitare dolorem capitis. Nos in cremore vinctuositatem illam non obseruauimus, nec quicquam nocuentorum iam dictorum, licet in febribus & calidis morbis sæpè vti simus, & vtamur ipsi in dies, etiam in nostro corpore. Quod si etiam vel tantillum eiusmodi vitiorum iis inesset, aqua vel simplex, vel hordei decoctum, quo cum parari iubemus, id facile emendat. Sed diligentibus medicis ista deinceps curiosius examinada relinquimus: quæ ipsi obseruauimus, annotamus & in publicum conferimus: Aliorum obseruationes non spernentes, si ratione & experientia confirmentur. Ridenda profectò & eorum sententia, qui lacteum cremorem à dulcibus Amygdalis parari solitum dari minima debere anhelolis ceterisque pectoris & pulmonum vitiis laborantibus contendunt, quòd falsò sibi persuadeant cremorem hunc omnino adstrictoriæ facultatis non obscure esse participem. Amygdalarum in cibis usum genitale augere semen volunt, quod profectò vix alia fieri queant ratione, quàm quòd multum nutriendum eà quæ suprà dictum ratione est. Etenim semen excrementum benignum vltimi alimenti. Nam nec magno acrisse calore, nec flatulenta qualitate (quæ duæ etiam causæ semen excitare & stimulare solent) illud præstari certum est.

Tragus Amygdalis adstrictionem non tribuit quidem, sed tamen addit. Amygdalæ in cibo v. surpatæ præsertim si pultes ex iis, conficiantur, adhibita aqua, in qua candens Chalybs extinctus fuerit, aluum lubricam adstringunt: At id nos Chalybi tribuimus non Amygdalis. Succus Amygdalæ amaræ expressus coxendicium dolores lenit, teste Sereno.

Amigdalis, inquit Matth. plerique videntur & ad roborandam venientiam, & ad reficiendas vires, quamvis Galenus non multum alimenti suppeditare scribat. Egrotantibus nutriticibus, Amygdalino lacte, cum aqua cardui benedicti, extracto dies aliquot infantes sustentari possunt. Amyg-

Cooking Alia Cane

**Germanos
runt error
denub' re-
fusator.**

Caro Diego
dalla signora
angela.

Qua ratione
ne adfirin-
gunt Amyg-
dala.

del General
del General,

dala dulces masticataz gingiuarum dolores tollunt.

Virides Amygdala. Eorumque virtus.

Causa.

Virides Amygdala, suo integro operimento, comestæ, vt tradit Amarus, bonum faciunt stomachu, & illu ab humiditate emendant. Quia verò Hippocrasius dicit ob pinguedinem, ideo Auic. dixit *sanis* earum commouere Cholera ob suam vntuositatem: ad quod aduertant (infit Amarus) qui indifferetē febricitantibus Amygdalatum porrigant, aut saltem ijs qui stomachum biliosum habent, ne magnum adferant ægris nocumentum. Sed de hac re paulo ante iudicium nostrum diximus.

Dulces Amygdala. Officium.

Dulces Amygdala, teste Turnero, cerebri substantiam augere creduntur, inacilentis viles. Earum oleum ad Conuulsionem à siccitate laudatur: amararum verò oleum, vno gradu, eo quod ex dulcibus exprimitur, calidius est, accommodum auribus obstructis; flatu distentis crassiusculo, tinnientibus, sordaltris, verminantibus. Experientia compertum est, hoc oleum præ cæteris omnibus oleis, auribus esse conuenientissimum. Amygdala amara, sumpta cum vino dulci, et muscatellino, aut arte facto, quod *Balthard* Galli vocant, vrinam prouocat, ac vrinæ difficultatem tollant, profunt laborantibus calculo, & arenulis, teste Dod.

Prima difficultas Calculi.

Lacuna refert Amygdala dulcia difficulter eoqui à ventriculis debilibus, mittere ad caput vapores, ideoque reprehensione dignos esse medicos, qui in omnibus naturis & morbis ægris præscribunt Amygdalatum, quod facile inflammantur, nisi admisceantur semina Melonum aut Cucurbitarum & papaueris. Nos verò Lacte seu emulsionem Amygdalarum dulcium ex decocto Hordei deglubiti, in calidioribus affectibus pro potu vtimur: Addimus etiam interdum semina Cucurbitæ ac Melonum, etiamque papaueris albi & lactuæ, si vigilare urgeant.

Quorundam error.

Brucrinus de re cibaria: Mirum, ait, cur obesos fieri videntes Amygdalis nonnullis sit traditum, cum leuiter alant. Sed mirari delinet, si cogitauerit tales vel esse fatelicos & proinde firmiter Romacho, vel sanè in quaestione adhuc esse vtrumque ab eo positum: vel denique Amygdalas non primariam esse impinguationis causam, neque simpliciter verum esse, leuiter alere, quamuis Galid scribat. Sunt enim & multi alij, qui contrarium statuunt.

Causa.

Paræus in sua Chirurgia, in fractura capitis non vult læsos vti Amygdalato, dicens Amygdala excitare dolorem capitis. De hoc quoque ante dictum. Nec videmus, qua id ratione fieri queat. Sæpe accidenti alicui hæc vel illa assignatur causa, quæ nihil minus quam eius causæ est. Ratio inspicienda, non negligenda experientia, si cum aliqua ratione coniuncta sit. Alioquin ne experientia quidem fuerit.

Harchius in suo Enchiridio Amygdalarum vires quasdam paucis versiculis complectitur:

Decoctum faciem decorat capitisque dolores

Sanat, at infest; menstrua pigra citat:

Conciliant somnia fructus.

Quoniam verò compositionum aliquot in his Amygdalarum viribus meminimus, placet præcipuas aliquot hic in gratiam studiosorum adijcere.

Eclypsa ex Amygdalis, cuiusque virtus.

Prima sit Eclypsa illud Mesuei, phthisicis saluberrimum: sed etiam hæcticis & aliter consumptis, quod, & tussim lenit, ac intemperiem multum siccam pulmonis & thoracis, & tussim inde siccam. Recipit autem Amygd. dulcium & amar. seminis lini torrefacti, nucleorum pineo-

rum, anisi, triggacanthi, gummi Arab. sicci & rad. glycyrrhizæ ana drach. vnam & dimid. sacchari, penidior. ana drach. tres: excipiantur mellis & succi feniculi simul coctorum quantitate sufficienti.

Ex Amygdalis & Amylo Sepalsarij hodie delicatis, & deliciarum mancipijs placentas, *Mariipanis* vulgò vocant, conficiunt, quas consultius erat ægris exhiberi, quam nocturnis compotationibus, quod ferè fieri solet, inferuire. Meliores his deliciarioribus sunt ex Amygdalis cum saccharo & aqua rosata. Tabidis conuenientissimum est sequens.

Amygd. dulcium exortic. vnc. ij. pinearum vnc. ij. passul. enucleat. & decorticat. pulpæ dactyl. ana vnc. j. & s. gummi arab. & trag. ana drach. j. Amyli vnc. ij. pulpæ capi elixi vnc. iij: fructus macerari cum aqua cum reliquis tundantur, & saccharo paulatim asperso fiat massa: indeque cuiusque figuræ panes sensum siccandi. Addere potes & semina cucurb. & melonum cum semine papaueris si magis refrigerare voles. Præstans quoque est Pasta regia Mesuei ex iisdem parata: Nec tamen dicenda, ne potius ad pompam, quam ad studiosorum compendium & historiarum huius gratiam id præstitisse videamur. Videat apud ipsum, qui volet. Lubet tamen Lactis Amygdalini modum docere, propter exoticos, ad quos fortè hæc nostræ lucubrationes, si Deo ita visum fuerit, vt mereantur, peruenient, apud quosque fortè non est in usu.

Amygdal. dulcium à cuticula purgatarum, (quod ut aqua tepida, non feruente, ne oleola substantia prouocetur in actum, sicque hæc non bene album fieret) quantum voles, vnc. iij. vel iij: addi possunt semina melonum & cucurbitarum, itidem decorticata ad vnc. j. sem. lactuc. & j. papu. albi præsertim si refrigerare magis voles, totumque placidum, non violentum, quod sic optime, accersere, singul. drach. j. vel ij. contendantur in mortario marmoreo, quod omnino optimum ad hanc rem, seminum assula aqua cotra, ac decoctionis hordej, vel etiam sero lactis, pro ratione scopi, traice per lineum, & in frigidiusculo reserua: nam citò accescit. Potis & cum solo hordeato & Amygdalis parare. Hæc quæ sequuntur desumpta ex Gesn. libello de lacte & operibus lactariis obliuioni tradenda non sunt. Naturæ lac imitatur Amygdalatur, quod rum ad delicias, tum ad sanitatis beneficium ætas nostra frequentissime parat. Amygdalæ cæcitè libræ pondere calida resoluuntur, vt facilius cortice spoliarentur, deinde cum pane excauato tunduntur. Tusa ac dissoluta recenti aqua lacacabum per seraceum funditur, & procul flammâ in carbonibus agitata cochleari, propter fumum, coquuntur. Sacchari adijcitur selibra. Parum cocturæ amant, liquidum enim hoc ferculum magis quam spissum placet. Sunt qui & aquam rosaceam addant. Idem ibid. Cateus ex Amygdalino lacte. Amygdalinum lac omnis temperato, salitum decoquito, & si libet, crocum adice, aut alia quælibet aromata: tum densatum igne cochleari diligenter per nitebis, & impones testaceo, vt quod liquidius est desuat, tandem saccharatum conuiuis appones.

Si etiam lac caruleum facere volueris, Amygdalium cum cyani floris succo para loco aquæ. Hunc deinde oryzam aut far incoquere licebit. Aliud cibarium ex Amygdalis, lac coagulatum referens. Amygdala tusa per seraceum transeres cum aqua, deinde calfacies ad ignem semper agitando

Mariipanis.

Alina.

Alina ad Tabem.

Lactis Amygdalini præparatio.

Amygdalarum.

Cateus ex Amygdalino lacte.



Coccymelea
Myrobal.
Emblia.
Chryloba-
nus.

Ita transcripsisse indubiè adfirmare ausimus. In hoc tamen euariat Plinius à Theophrasto. Hic Mespilo comparat: ille spinæ Egyptiæ: hic nucleum rotundum, ille lignum grande dicit: reliqua reipsa eadem, verbis tantum discrepantia. An verò Coccymelea Plinij seu Theoph. sit Myrobalanus emblica officinarum, ut & Chrylobalanus Galeni flaua, ut ex quorundam sententia annotat Dalech. suo loco patebit. Prunis, inquit Plin. succus aquosus: foris corpus, intus lignum.

Differentia
Prunorum
Plum.
Hordearia.
Asina.
Nigra.
Cereia.
Purpurea.
Armeniaca
Nucipruna

Alibi verò diligenter persequitur differentias his verbis. Ingens turba Prunorum, versicolor, nigra, candicans. Hordearia appellata, à comitatu frugis eius, (quod eam Hordeum meretur ea maturefcant.) Alia eodem colore seriora maioraque, Asinina cognominata à vilitate. Sunt & nigra, ac laudatiora cerina atque Purpurea. Nec non ab externa gente Armeniaca, quæ sola & odore commendantur. Peculiaris impudentia est Nucibus insitorum, quæ faciem parentis succumque adoptionis exhibent, appellata ab utroque Nucipruna. Et hæc autem, & Persica, & Cerina, ac sylvestria, ut Vux, autumnno cadis condita, usque ad alia nascentia ætatem sibi prorogant. Reliquorum velocitas citò mitescentium (maturefcientium Dal.) transuolat. Nuper in Burtica Malina appellari ceperunt Malis insita, & alia Amygdalina, Amygdalis. His intus in ligno nucleus Amygdalæ est: nec aliud Pomum ingeniosius geminatum est. In peregrinis arboribus dicta sunt Damascena, à Syriæ Damasco cognominata, iampridem in Italia nascentia, grandiore quamquam ligno, & exiliore carne, nec vquam in rugas siccata, quoniam Soles sui desunt: (quamquam Soles sui non desint:) sed Pruna omnia post Catonem corpille manifestum est. Cereæ quoque Virgil. celebrat vnic.

Malina.
Amygdali-
na.
Damascena.
Pruna post
Catonem.

Cereæ Vir-
gil.

Sunt autumnali Cereæ Pruna dic.

Et in Ecloga 1.

Addam Cereæ Pruna, & bonas erit haic quæque
P. mo.

Cercidila

Columella:

Armenisque & Cereolis Prunisque Damasci.

Nigra.
Generosa.
Cereæ.
Damascena.

Et Ouid. in sua Metamorphosi,

Prunaque non solum nigro lucentia succo,
Verum etiam generosa, nonasque imitantia
ceras.

Galenus Iberia & Damascena celebrat, uti patet in viribus. Palladius ea Damascena dicit, quæ suo seculo siccabantur in sole per crates loco siccioris disposita. Talia etiamnum hodiè in officinis Damascena dicta sunt: *Δαμασκηνὸν ποτὶ μῆλον* Athenæo tamquam ab alijs diuersum (alijs tamquam ceteris præstantiorem) quæ gignuntur in alijs regionibus. Pruna igitur hæc sunt & alijs & Hipponacti memorata, ut refert idem Athen.

Coronam habui è Prunis atque Meniba.

Alexis;

A. Quin & in somnis videre visus si mibi
Prunum victoria. B. Quæ id erat dicito.

A. Adverte iam animum.

In stadio concerratorum me quispiam
Nudus accedens coronare visus est corona roscili
Prunatum. B. Dii boni. A. Macturorum.

Idem rursus

Vidisti vquam omasum paratum, aut splenem
inquinarum condimento, maturorumque Pru-
norum sportam?

Tom. I.

Prunorum
Coronam
conceratorum
et prunum
victoria.

Tallsest præsus eius faciem.

Nicander:

μῆλον ὁ κόκκινος καὶ λευκός

Malum quod, Cucullus vocantur.

Ita vertitur. Annotat Dal. *κοκκινός*: quod grandescens cucullus è suis latebris prodeat & conspiciatur: sed quid commune aut si nile Pruno cum cucullo? Clearchus Peripateticus scribit, Rhodijs & siculis Pruna vocari *καύκον*, ut apud Theophrastum Syracusium?

R. mos Brabylis græci & in eadem curus.

Et alibi:

Quand Malum Brabylis seu nigris.

Est autem Brabylon fructus, Pruno vulgari ambitu minor, eodem sapore, sed paulò acris. Hæc quidam referunt ad Prunum Damascenum. Dalechamp. reprehendit Athen. quod *τὸ δαμασκηνόν* inceptè vsurpet, pro *συρρακτικόν*, vel *ῥοδίον*. Acerbior est Prunum syriacius Damasc. Seleucus in linguis, ut idem tradit Athen. eadem esse ait *μαδρνα* & *διδυλα*, *καὶ τὸν λευκὸν καὶ τὸν ῥοδινόν*. Dicta porro sunt *μαδρνα* velut *μαλόν* *διδυλα* *καὶ τὸν λευκόν* verò quia ducunt aluum, quasi *βρωτὸν δίδυλον*, id est, cibos depellentia: & *ῥοδία* quasi *ῥοδία*, id est, Mala, ut Demetrius Ixion prodidit in Etymologia. Theophrastus, Prunus inquit, & spodias, quæ veluti Prunus sylvestris est. Araros Coccymelean vocat ipsam arborem: Coccymalum verò eius fructum. Aristophanes Grammaticus in Glossis Laconicis scribit à Laconibus Pruna vocari *ῥοδία* *καὶ τὸν λευκόν*, id est, acida Poma Persica, & à quibusdam Adria. Nec solum *καὶ τὸν λευκόν* arbor dicitur, sed & *καὶ τὸν λευκόν*, autore Polluce. Suidas *τὸν λευκόν* tradit vocari *ῥοδία*, quæ tamen sectius dicas Armeniaca, de quibus suo loco.

Pruna multi, ut testatur Curtius *ὅτι καὶ ῥοδία* Græcè vocari arbitrantur. Nos verò eam vocem in hac significatione apud nullum probatum autorem inuenimus. Onychina autem ab vnguis colore vocantur eidem. *ὄνυχος* enim vnguis est. Sunt & versicoloria, & inter has differentias quædam præcocia, alia serotina: quædam item lignum statim dimittunt, & hæc inter pretiosiora habentur, & huius dotis in multis generibus nomine est: Ceteris verò carne lignum adhaeret.

Goropius è Penu suo Cymbrico nobis aliquid noui importat. Pruna nos (inquit) *Prunnen* vocamus, quasi *Pur-ruinnen* id est, Mora euacuans. Latini itaque Prunorum nomen nostrati linguæ acceptum ferre debent. Herimolao teste: *καὶ τὸν λευκόν* & *καὶ τὸν ῥοδινόν*, seu ut ille scribit, Coccymelea & Cocomelos Græcè dicta: Pomum ipsum neutro genere, arborem masculino media comædia pronunciat. Folio Arburi describitur, si Theodorus Gaza audiatur: sed hoc Plinius Theophrastum secutus, non Pruno sed Coggigryæ vocare tribuit. Deceperit hominem, vel corrupta lectio, vel nominum affinitas. sunt Pruna onychina Columellæ, nigris laudatiora.

Et quia Pruni Erymi mentio incidit non infusè nobis Lonicerus in *καὶ τὸν λευκόν* derivationem originem inquirere videtur. Equidem, inquit, haud satis indagare huius vocis, *καὶ τὸν λευκόν*, etymon possum, ut res respondeat. Ex compositione certè, *καὶ τὸν λευκόν* granum est, *μῆλον* Malus, aut *μαλόν*, Malum, unde Pomum potius Granatum erit. Verum historia & natura eius non responderet. Aliud enim est *μαλόν* id est, Malum Punicum, aliud Prunum. Propemodum eo inclinatur animus, ut per barbaralexin putem *καὶ τὸν λευκόν* factum esse ex latine coquendi vocabulo, ut supra contigit in Armeniacis

C. 290.

Brabyla

Brabylon.
Atben not
Sylvestre
Damascen
Aladija.
Brabyla.
Prunus
Spodias.
Coccymelea
Coccymala.
Onychina
Persica

Adria.
Coccyma-
lus

Bericea
Sylvestris not.
Onychina.
Onychina.

Versicoloria
carum
que differ-
rentia

Prunus typ-
mon.

Cocomelos
Cocomelos
Gaza.

Onychina.
Kornikun
dic.
Erymon.

Q. 3

figura, plurimo succo, si quod aliud genus abundantiā, quare *Mithra* vulgus vocat, ac si succum meiere videantur. Alia quædam vsque adeo parua sunt, ut magnitudine Pruni sylvestris fractum parum excedant, nigra, rotunda & seriora. Sunt & Acidula, nigro colore, succo etiam abundantia verum non identidem. In extremum Autumnum durant, ut hyemem attingant.

Clearchus Rhodius & Siculus, Theocritum Syracusanum *Bratyla* pruna appellasse scribunt, quæ & *Madrya* & *Badria* Athenæo dicantur, ut dictum supra. Fructus quidem hic minor, gustus verò idem, ni aliquantulo esset asperior.

Iouberus *Pruna Perigonis*, *Prunidabila*, *Damascena* & *Imperialia* vocata præ cæteris cõmendat.

Solerius *Asinina* seu *Pedicularia* Plin. Gallis Delphinatibus *Prunes Bonantz* dici scribit, esseque fortè Hiberica. Idem *Perigonis* Ruellij, suspicatur esse magna Galeni.

Nicol. Abr. à Framboisiere de sanitate tuenda: In Francia excellentiora Pruna sunt *Damascena* trium generum. Nigra, rubra, & violacea. Secundum locum obtinent *Dactyla* ob suauitatem. Magni sunt in Prouincia pruna ex Brignoles: multi etiam sunt Pruna *Pardygoinia* ob magnitudinem & gratum saporē. Pruna *Reimensia* æstimantur ob pulchritudinem potius, quàm bonitatem: color enim cæruleus visu delectabilior, quàm sapor gustui gratus: eis inest minimum aciditatis & astringentis, incolis dicuntur *N. beres*.

Sunt etiam apud Reimenses alia Pruna, dicta *des Pignons*, quæ comeduntur plerumque priusquam maturecant. Propter insignem astringentiam & acritatem illi instantopere delectantur, ut soleant ponere in iusculis, loco vuarum acerbarum.

Hispaniæ celebrata pruna, ut tradit Amatus, hodie Pruna *Damascena* præcipua habentur, Syracusana ab Hispanis nominata, nigra, rubentia, vel in totum alba, ad citrum tendentia, oblonga, boni saporis: Citerum multi Cerea appellare non dubitant. Multi quoque ex omnibus Pruni speciebus præcipuè laudant, quàm *Salmaticenses Andrinæ* ob colorem nigrum vocant: rotunda sunt, sapore acido, ori gratissima, quæ matura febricitantibus apud *Salmaticenses* D. Alteretus non sine optimo successu concedebat. Lacuna verò scribit inter Pruna Hispanica præcipuè cõmendari dicta *De Monie*. Secundum locum obtinere quæ deferuntur ex S. Michaele. Inter ista sequi rotunda, quas vocant *Andrinæ*. Ab omnibus laudari *Damascena*.

Perlisferens nunc Italica.

Prunorum, inquit Cæsalp. rotundorum quædam mali amplitudine, flaua, dulcia, odorata, quæ primo maturantur: cognominantur autem à Malis. Iis minora, & austeriora, quæ Augusto maturantur, Pruna *Agostana* vocata: & *Albana* inter pretiosa. Alia nigra, durior carne, sed gratissimo sapore, vulgò *Perdiciana* cognominant. Grandiora iis sunt *Messimiana*, ac succi bonitate præcellunt. Simili specie constant acria quædam, ut etiam fallant, sed in suauitate saporis quamprimum discernantur, ut quæ *Isinaria*, & quæ *Gubia* alicubi vocantur ingustabilia.

Paulo minora iis & oblongiora *Viridacea*, sic appellata, quia dulcia sunt antè perfectam maturitatem, dum adhuc viridia sunt. Hæc maturitate perfecta ad ruffam tendunt, sed dulcedine minùs grata. Alia in longitudinem extenuantur iuxta

pediculum, ut *Damascena* colore flauo: *Cæciliana* colore subuiridi, alia colore nigro. Multæ aliz sunt inexplicabiles differentiz, vario cultu, & studio inferendi inuentæ. Est & sylvestris *Prunus*, &c.

Peculiare (addit idem Cæsalp.) in fructu Pruni, quod deflorescens, si multi imbres contigerint, conuertitur in longum quoddam corpus inane quod *Turca* vocant. Idem ex Theoph. dicit Pruno foliū esse *Arbuti*: ac peculiare ei tractū in *pappum* perire: quæ Pruni nostris conueniunt, si *pappus* hic non Lanuginem, sed inane corpus significet, *Turcam* dictum. Quod ad primū, vel non rectè nouit Cæsalp. *Arbuti* folium, vel cersè non bene contulit, atque adeo hac collatione aliquem in suspicionem conijcere possit, ipsi neutrum probè cognitum. Quoad posterius: bellam sanè verò interpretationem vocis *pappi*, quam Theoph. per τὸ ὑπερβαίνον τὸν ἄνθος expressit. Si Cæsalpinus annotasset obseruationem doctissimi Hermolaj, comperisset id à Theophrasto de Pruno non dici sed de alia arbore. *Turcam* sæpius obseruauimus, sed quo iure is vel alius quouis *pappum* vocet, nondum agnoscimus. Vitium est fructus *Turca*, non illi par nec ordinariè omni fructui enenit, ut de fructu eius arboris, de qua Theoph. scribit eum in *pappum* abire, tradit. Quod si verum esset de Prunis, ille sua *Perdiciana* non tantopere commendasset.

Sed persequamur reliqua Pruna Italica ab Aug. Gallo obseruata. Pruna, *Brigne* vel *Brigne* dicta Lombardis optima sunt, & bonitate *Damascenis* succedunt, quæ quamuis cæteris minora, pulchra tamen sunt, sapida & sana, tam cruda quam cocta, potissimum si cum pullis & auculis decoquantur. Alium soluunt cocta parum in aqua, & ita mollia comesta, cum multo saccharo. Sunt & alia magna, & dulcia admodum, quæ probè matura alium magis lubricant. omnia cruda vel cocta in aqua tepida macerata sitim restingunt. His succedunt dicta *Brigne Agostana*, quæ non pulchra, longa tamen & crassa: sana sunt cruda, & cocta, & sicca. Pruna dicta *Brigne gr. st.*, rotunda non postremas tenent, si præsertim benè matura & decocta sub cineribus folijs inuoluta, decorticataque & saccharo aspersa comedantur: vel etiam & melius, cruda decorticata, & in patella cum saccharo lentè cocta. Inter Pruna, quæ dicuntur *Brigne Myrabolani*, alba, nigra & lutea salubria esse sunt, non cocta. *Brigne Cæciliana* dicta, benè matura præferuntur cruda, cæteris omnibus, albis, nigris, viridibus aut rubellis, dulcedine & succi gratia præstant: corroborant magis, & præ alijs sitim extinguunt, decorticata à febricitantibus in ore recenta singulari sunt solatio, mitigant summum ardorem, & restitunt non nihil appetitum. Sunt etiam alia Pruna Italica vulgò dicta *Agostana bianche*, *Settembrine*, *Messimiana*, *pernicione*, *Gierusalem*, & alia multa suauitatis & salubritatis non contemnenda.

His addamus quorum meminit Alpinus, (nisi iam supra scriptorum aliquo nomine dicta sint) & cum dactylo oblongo, magno & crasso confert, Pruna alba, quæ Iulio mense in agro Bassanensi maturantur.

Matthiolum quem, velut Italum, decebat pulchras istas merces Italicas nobis Germanis præ alijs celebrare, ne id quidem de ijs habet: sed postquam palnam tribuisset *Damascenis*, quæ uicè ex Syria Venetias importantur: secundus tenent (addit) in Germania quæ ex Pannonia & Transilvania conuehantur in quorum genere

Cæciliana
Nigra

Turca pro
in uinum

Cæsalp. re-
prehens.

Alia m
re

Lombardis
pruna
Sajana

Magna
dulcia

Pruna pro
gr. st.

Pruna
crassa

Pruna pro
brigne

Cæciliana

Alba Boffa
nanfa
Damascena
na Gude
ad uell
Pannonia

que minuscule sunt, maiorem cum palato inest gratiam in vino decocta, & saccharo aspersa: hoc enim modo parata prunis mensis sumpta, & ori grata sunt & alium commodissime citant, nam dulcia sunt & sine adstrictione. Verum si nō gustarit aut nouerit alia, quæ ex Germania prædicaret, deinceps Germani ipsi audiendi sunt, ut quàm Germani hoc fructu dilescent, intelligant etiam exteri: Matthiolumque interim excusent, qui Prunorum differentias inexplicabiles ferè dixit, quod non ægrè confitemur si intellexerit omnes.

Pruna
Germania

Damascena

Damascena
Hungarica

Perigona
Cerea

Prunida
Ayla

Pruna An
tumida
Nigra
Rotunda

Differentia

Had.

Had.

Had.

Had.

Had.

Had.

Had.

Had.

Had.

Had.

Had.

Had.

Had.

Had.

Had.

Had.

Had.

Had.

Had.

Had.

Had.

Had.

Had.

Had.

Had.

Had.

Had.

Had.

Had.

Had.

Had.

Had.

Had.

Had.

Had.

Had.

Had.

Had.

Had.

Had.

Had.

Had.

Had.

Had.

Trago itaque multa sunt Prunorum genera, inter quæ primum apud Germanos quoque locum obtinent Damascena vocata, Theocrito Brabyla, Athenæo Badrya & Madria cognominata. Germani Damascenem pflaumen/ Vnde Querschen vocant. Hæc in Pharracopolis exiccata habentur, quemadmodum etiam magna illa Hungarica, ab ipsis Hungaris Damascena, & à Germanis Grosse Zwetschen vel Querschen/ & Vngersche Pflaumen vocata. Quidam his pro Damascenis videntur, autore Cordo. Deinde ponuntur, à Trago, purpureæ, quæ ex Hispania veniunt. Iberica & Perigona vocata. Germani Spanische Pflaumen. Iunc Cerea seu Cereola. Germ. Gelfrieden/ Vnde Spilling dicta. Cordus annotat Brabyla quosdam prunum interpretari Frieden. Quanto ordine collocanda sunt oblonga illa & Cereola, aliis Prunida Ayla, Germ. Blaw lang Pflaumen/ blaw Spilling/ vnde Bilsen Pflaumen nominant. Quinto loco exigua illa (nec enim nec auellana maiora sunt) & Autumno proueniencia Pruna, German. Klein herbst pflaumen dicta. Hæc Basilienfes Ziparten vocant. Postremo sunt & alia genera, utpote nigra illa quæ vocant, groß Rofs pflaumen: & rotunda illa, magna & dura Pruna, quæ Autumno appetente maturantur, German. Schaappflaumen/ Latini Asinina & Pedicularia nuncupant. Hæc Trago.

Eadem ferè & Lonicerus habet, additque fructus Prunorum Theocrito dici Brabyla.

Dodon. verò & alia vult dici magna illa Pruna dulcia cærulea, Lat. Pruna Damascena: Had. Jun. Had. Theocrito scribit, ἡ γὰρ δαμάσκηνη: German. Blet Spilling/ Querschen. Belg. Pflaum pruyme/ ost pruyme van Damasc. Gal. Prunes de Damas. Secundum Dodon. genus sunt Pruna vulgaris ruffa, quæ Hispanica vocatur. Lutetia, Latine Cerea & Cereola Pruna: Hæc Had. Jun. Rospflaum, German. & Belg. Deit rospflaum vocat. Dod. verò quartum tuum genus ita nominat, Pruna rubra & rotunda quibusdam Latine Asinina Pruna, Gal. Prunes de chenal. At Pruna asinaria vel asinina vilia dicit Innis, & maiora. Belg. Dispruyme. Omnium minima Pruna rotunda Dod. Nana H. Junio. Ger. Blet herbst pflaum. Belg. Croeffen/ Pallofen. Gal. Creches & d'anoim. Sic vnusquisque patria sua præcis accommodare studens, non tamen aduertit sibi non conuenire cum eo qui est ante fores.

Alia quædam adhuc habet H. Jun. æquæ Plinij & præcorum nomenclaturis accommodata, & iam prius quoque dicta. Sic Prunum Hordearium Plinij candens dicit, Belg. Vite Pruyme. Prunum decanum: Belg. Eterpruyme. Damascenem verò, Prunum passum vocat, & rugosum. ardrum ardrum, Belg. Pruyme Van Damasc. Ital. Pruna fissa Hispan. Pruna fisa.

Decanum

Damascena

Dodonæus quoque addit: Theophr. & Plinij Egyptiam Prunum incognitam esse: nostram ætatem in Germania, circa Damascum Syriæ vibem naris Prunis carere. Pannonica siue Hungarica laudat oblonga & dulcia, sed magis tamen Morauica, ad alium leniendam commendat, præsertim Branx nata, quæ Morauia olim Marcomannorum Prouinciæ, vrbis est primaria: hæc etenim ubi resiccata fuerint, ori suaui palatoque gratissima, alium citra molestiam ita faciunt, ut delectoria vi Cassiam & Mannam post se relinquunt, ut Thomas Iordanus affirmat. Nostra ætas quædam Gallica à patria appellat.

Persequamur cæterorum Germanorum differentias. Gesnerus itaque has habet. Prunum quæ fructus magnos, purpureos & acidos sapore fert, Lindauia Bengst vocant, Tigurini Bodschoden (quasi capri testiculos dicas) vel Pflaumen. His similia etiam cerei coloris minus frequentia apud Tigurinos reperiuntur. Pruna Cerea vel Cereola magna subdulia. Pruna parua, scrotina, cereola, quæ Tigurini & Heluetij nescio vnde Ziparten appellant: Inter urbana minima, tardissime cerea ferè maturefcunt Septembri. Pruna præcociora parua, versicoloria, à tempore quò Auena metitur apud Tigurinos dicta Gersberfrieden/ passim illis abundant. Pruna Neapolitana, oblonga, dulcia (ni fallor) alba & Punicea, Lindauia. Pruna Hungarica, quæ vulgò Tuschia vocant, Zwetschen, duorum generum: maiora & oblongiora: & alia minora, rotundiora, dulciora Lindauia: Basileæ probè perficit fructum. (Fandelfrieden vocant) Pruna Hungarica præstantissima, Damascena fortè Vvoistello. Eiusmodi Venetiis mittuntur aliquando Augustam magno pretio, crassa & carnosa, subacida. Hæc vel oblonga Neapolitana, aliqui Imperatoria siue Augusta cognominant, quod iis Imperator Augustus oblectetur. (Itali suæ ab Augusto mente, quo maturefcunt, Augusta dicunt, de quibus supra.) Augusta Pruna alia Hungarica, aurei vel cerei coloris: magnitudine oui gallinæ: aut etiam Anatini, carnosa, gratissimi saporis. Aliud pruni genus, maturefcit circa finem Iulij, cui fructus parui cærulei, dulces: Bletfrieden. Pruna minima, subcærulea, acida, parum humida, Vinfrieden, maturefcunt Augusto. Veisfrieden, Pruna alba, tardius aliquando matura: omnia alba. Rofs biddle, partim candida, partim rubella, alium puto magis soluunt: & hæc aliqui alba vocant, sed minus propriè. Hæc Gesnerus.

Tabernamontanus quatuor summa Prunorum facit genera: 1. Vulgata, quorum quatuor differentias constituit, nigra, rubella, alba, viridia, quædam etiam flaua & rubra. 2. Pruna Myrobalana, quæ antequam maturefcunt sunt viridia, postea rubescunt, tandem perfectè matura atropurpurea fiunt: succulenta, odorata, nucleo paruo. 3. Auenaria Galsbleben vulgò dicta: primo generi similia, sed fructu paruo acidulo, substringente sapore, grato tamen. 4. Flaua, oblonga, nucleo exacuto, vulgò cerea, wachsgelbe Pflaumen oder Spilling dicta. His addit quædam alia sed iam dicta: quamvis & hæc forte iam magna ex parte memorata sunt, nec vili sit iam dictorum, dicendorumque autorum, qui non alterius quædam habeat, etiamque diuersarum regionum. Scopus tamen noster est, uti supra quoque in Pomis diximus, non tam nationum quam ipsorummet autorum, quæ tamen fieri

Aegyptia
Pruna
Pannonica
Morauica
Pruna

Gallica
Gesneri
differentia
Magna
Cerea magna
Cereola
Parua

Prunia
parua
Neapolitana
Hungarica
matura
Almona

Hungarica
Almona
Damascena

Imperatoria
Augusta

Augusta
Pruna

Pruna parua
cærulea
Pruna minima
Pruna alba
Viridula

Taberna
Differentia
Vulgata
Myrobalana

Auenaria

Flaua
Cerea

Antonom
instituta
et scopus in
recensenda
antonom
prunorum
differentia



dam fluvedinem inclinant, sapore præ cæteris suavi ac dulci, cute obiecta dura & membranosa, ut melius patet in conditis, pulpa recentibus firmituscula, & à nuce contenta libera. Nux hæc seu ossiculum aliquid peculiare præ cæteris habens, vicia longius, gracile, compressum, leuiter incurvum, utrinque acuminatum, nucleum gracilem, nec valde amariorum continet.

Hæc arbore nihil fructuosius: fructuum numero ipsa vincente folia, ingenti nihilominus cæterum humi iacentia: nec extremis tantum furculis, sed crassioribus etiam ramis immediate hærentes quamplurimos observauimus. Magna his gratia in cibis, siue crudis siue decorticatis ex saccharo & vini modico aquæ rosacea coctis. Sed modicum addi melius, quod ipsa per se calefacta satis succi fundant, & ut naturæ peculiaritatem suam suauitatem non amittant.

Conditæ. Præcipua gratia conditis. Condiuntur autem saccharo integræ, etiam cum ossiculis: sed non perfectè matura esse oportet, maturitati tamen proxima. Sic firmituscula caro etiam conditis, mirum quantâ gratiâ atque dulcedine. Habet quidem Dactylia alba Curtius, quæ ita fortè vocat ad Purpureorum differentiam: Sed hæc eiusmodi viriditatis speciem ac colorem habent, ut alba dici non mereantur: ex viridi tamen albescent, præsertim probè matura, sed de Curtij nobis ignotis nostrum statuere non est præsertim cum illa non describat.

Pruna alba Lugd. Pruna dicta Lugdunensibus, *Prunes blanches*, longa sunt satis magna, lutea, cum quadam rubedine, carne satis molli, acido dulci. Ossicula longa, compressa, ab una parte ad sphaericam formam tendentia, sicut & ipsa Pruna.

Pruna rotunda Lugd. *Prunes de R.*, magna quoque sunt, rubra vel potius punicea, rotunda ferè, valde odorata, carne dulci, tunica satis dura & acida. Caro facile abscedit ab ossibus, quæ magna & aspera. Matura Iulio.

Pruna rotunda Lugd. Monthebergardi habent Pruna Augusto matura, rotunda, satis magna, rubelli coloris, carne ossiculis hærente non ingrata. Plantari curauimus in horto Ill. E. C.

Pruna purpurea Lugd. In horto iam dicto abundat Prunus, fructu purpureo, satis magno, serotino, sublongo, acido, carne ossiculis adhærente, quæ nostra cura plantata. Hæc sunt ea quæ Lugd. *Prunes D'August* dicta ex postremis maturescunt, similia Damascenis, minora, quæ etiam viridia planè concoloria sunt, ut videantur matura.

Pruna purpurea Lugd. Pruna purpurea vel coerulea magna, nonnihil sublonga, ossiculo nudo manente, maturescunt Augusti fine. Damascenorum genus quoddam esse videtur, ossiculo incuruato. Montb. in horto E. C. satis copiosè provenit. Talia observauimus Gœppingæ in Ducatu Wirt. ubi copiosè coluntur & exiccantur ad vsus medicos & culinarios. Hungaricis non cedere videntur, vocant *Zwetschen*. Eadem nobis visa in *Wisensteig* horto Ill. Comitit.

Aliud prunigenus præcox in horto Montb. habetur, quod citò maturescit, colore purpureo.

Pruna sublonga, parua, alba, vicia, digitivæ latitudine, interdum non maiora, facile nucleum liquentia, acidodulcia, optima & delicatissima, etiam & exiccata. Hæc ex diversis Burgundicæ locis conquisita in horto h. Montb. plantata sunt. Maturantur ferè Aug. principio.

Pruncolorum cæterorum vulgè *Lippen* dictorum arbor plerumque vulgaribus Prunorum arboribus minor est, siue caudicè spectes, siue ramos & folia.

Præcipuè verò est fructuum discriminem, qui autumnò primùm maturescunt, colore cereo, cui glaucedo aliqua aspersa, non multò maiores Prunis siluestribus, pediculo fœcundali hærentes, sapore dulci, ossiculo facilè à pulpa separabili, cui ab altero latere crista secundum commissuram nonnihil elata. Hæc Basileâ accersita, ubi in lautioribus hortis coluntur, in hortum E. C. Montb. plantari curauimus. In pago Raupach Bessfordiæ vicinè copiosè coluntur, & in magnas arbores exerecunt. Maturescunt Sept. In Ducatu quoque Wirtemb. potissimùm circa fontem adu. habentur prædicto nomine.

Anno 1507. principio Septembris ostendente Char. fratre C. Bauhino vidi pruna valde speciosa, magnitudine ferè paruorum Persicorum, cum sulco in medio, qualem habent Persica, colore sunt rubra, carne firmituscula, saporis grati, lucundi, subaciduli: pro proportionem fructus paruum, à carne separabilis, aiunt plures in hortis haberi, ac inter alios honorandum nostrum alihem Dn. Feschium Consulem meritissimum. Hoc genus Prunæ existimo esse Prunidactyla Clusij. *Hæcenus de generibus & differentiis Prunorum.*

Prunus in genere, solo lato gaudet, & humido: Coelo tepidiore melius adulescere putatur, quamvis & frigidius possit sustinere. Non temerè in montibus vita Prunus, inquit Plin. Locis glaucis & arenosis, nisi iuuetur latamine, caduca.

Poma & vermiculosa non grandescunt: autor Palladius. Gignuntur hodiè in omnibus cogniti orbis regionibus, sed potissimùm ubi terra sit soluta & hortensis. Quapropter paucos videas in Europæo tractu hortos paullo cautiore, in quibus non Prunæ aliquod genus reperiatur: quoniam Tragus scribat, Prunæ varia genera tardè ad Gallos & Germanos commigrasse: sunt tamen hodie apud eosdem ubique ferè locorum notissima.

Pruna omnia, post Catonem cepisse manifestum esse, ait Plinius: specialia loca in differentiis dicta sunt: Damascena tamen sicca terra & coelo calido gaudent, ut Pamphilus scriptum reliquit.

Florent plerumque cum Ceraso, Aprili, aut etiam citius. Nos Prudum etiam vidimus florentem Septembri in pago *Admurt*, comitatus Montbelgardici, Anno 1530, & denud non vno in loco An. 1599: quemad. & hoc quo hæc cōmentamur, 1601. quo & fructus vidimus magnitudine auelant: Ex quo patet promptitudo germinandi florentique huius arboris, si ultra consuetum tempus ætium extendatur. Fructum diversimodè maturant, Iul. Aug. & Sept. mensibus, ut particularius dictum in præcedentibus. Montpelij observauimus Prunum habentem magnum fructum & florem si nui mense Aprili: estque contumacis vitæ Prunus.

Pruna Columella post mediam mensem, usque ad Idus Feb. feri præcipit. Plinius verò Italix ferendi tempus Prunis post mediam hiemem & Idus Feb. indixit: oportet autem Prunos distantiores ferere Piris, autore Theoph. si ossibus serantur, ut tradit Pallad. autumnò, mense Novembri solo putri & subacti, duobus palmis obtruantur. eadè pontantur mense Feb. sed tunc prius lixiuio sunt maceranda per triduum, ut citò germinare cogantur. Bonuntur & plantis, quas ex caudicè mense Ian. exeunte, vel Feb. circa Idus sumemus radicibus fimo oblitis.

Extirpandæ sunt soboles à radice, exceptis rectoribus, quæ seruabuntur ad plantas. Si lan-

Pruna parua per se similia.

Locus & tempus prunorum in genere. Ne vermiculosa fiant.

Montb. tempus.

guida Pruni arbor est, amurca cum aqua equaliter temperata radicibus debet infundj, vel bubulum lotum solum, vel humanum verus cum duabus aquae partibus mixtum, vel cineres ex furno, maxime stumentorum. Iuuantur frequenti humore, & assidua fotione.

Si poma decidant, Oleastri cuneum terebrata infige radici. Vermes eius atque formicas rubrica cum pice liquida si adlinatur, extinguet, sed modestius propter arboris noxam, ne idem faciat remedium, quod venenum.

Si Pruni fusculli in mosco intingantur, & deinde inferantur, fructus inde fieri odoratos, Cofteus tradit. Mense Martio extremo Prunus inferitur, melius trunco fuso quam cortice: vel mense Ian. ante quam incipiat germen lachrymare. Inferitur in se, & Persicum recipit uel Amygdalum vel Malum, sed eam degenerem reddit & paruum. Pruni, inquit Celsus, inferuntur Nuci, Malo, Amygdalo. Castanea etiam inferi Talad. tradit his versibus:

Pruna suis addunt salicia germina membris.

Donque cognata corpore laeta ferant.

Exarmat fetus: sed brachia r. baris armat

Castanea Prunus: ista tenere laetam.

Nucibus iam olim inserta fuisse, ex Plinio patet: inde Nucipersica enata. Damascena inferitur iisdem horis ut reliqua Prunus, ut Pampylus scriptum reliquit.

Prunorum fusculli sambuco infiri, Cathartica Pruna ferunt. At nisi curam diligentem adhibueris facile pereunt.

Pruna seruantur cadis vino dulci vel novo fluitantia, operto diligenter vase. Siccantur etiam in Sole per crates loco siccioris disposita. Haec sunt quae Damascena dicuntur. Alij in aqua marina vel in muria feruente recenter lecta pruna demergunt, & inde sublata, aut in furno tepido faciunt, aut in Sole siccat.

Pruni fructus, ut tradit Diosc. esculentus est, sed ventriculum male afficit, aluumque molliat. At Syriacarum, & eorum maxime, quae Damasci nascuntur fructus exiccatus ventriculo utilis est, aluumque adstringit. Decoctum foliorum, ex vino paratum, vuam, gingiuas, tonsillaeque fluxione laborantes ore subinde colluto reprimit. Ceterum gummi Prunorum agglutinandi vim habet, & in vino potum calculos comminuit. Ex aceto vero illitum lichenas infantium sanat.

Verum Galenus & simp. cum Diosc. non omni ex parte conuenit: ita enim scribit ille: Pruni fructus ventrem subducit, recens quidem plus aridus minus. Ceterum haud scio cur Diosc. Pruna Damascena siccata ventrem sistere dicat, cum & ipsa palam etiam subducant, minus tamen quam quae importantur ex Iberia. Siquidem Damascena magis adstringuntur quae Iberia fert, dulciora sunt. Quin & ipsae arbores fructibus proportionem respondent. Minus enim adstringunt, quae in Iberia nascuntur: magis vero quae Damasci. Ut autem in summa dicam, quorum in foliis aut germinibus adstrictio quaedam inesse apparet manifesta, iis decoctis phlegmonae in Columella aut tonsillis existentes idonee colluuntur. Gummi autem arboris sunt qui dicant cum vino potum lapides confringere, cum aceto, puerorum sanare lichenas. Ac si id praestat, (videtur dubitare Galenum, quod & nos facimus: nam si manifestam glutinandi facultatem habeat, ut Diosc. facit, quomodo calculum comminuat)

clarum est incidendi tenuandique illi facultatem inesse. Idem de Alim. fac. l. 1. Raro fructum hunc auterum, aut acidum, aut omnino inuicundum inuenias, ubi exactam fuerit consecutus maturitatem. Priusquam enim eo perueniat, nullus est ferine qui non acorem aut acerbitatem praeseferat: est & qui amaritudinem. Proinde ex hoc fructu minimum alimenti corpus accipit. Verum quum humectare & refrigerare mediocriter ventrem statuimus, utilis erit, quem subducit humiditatis & lentoris sui gratia. Prunis porro & quae ac Ficus concessum est, ut vel exiccata utilia permaneant.

Damascenis prima eius bonitatis magna hominum opinione defertur. Proxima ipsae quae in Iberia & Hispania proueniunt. Probatissima in Damascenis sunt, quae cum mediocri adstrictione magna laxaque sunt. At parua, dura, acerbique & in cibo permolesta, & ventri subducendo minus idonea, cui officio Iberica maxime conueniunt. In melicrato plus mellis habente, abunde ventrem molliunt, etiam si sola comedantur, inultum magis si melicratum ipsum suborbeatur. Hanc vim Prunorum laxantem multi poetae suis carminibus commendauerunt: quale est hoc quo Martialis ludit:

Pruna peregrina carie rugosa senecta

Sume: solent duri, solvere ventris onus.

Sape cibi specie, vitio vel corporis ipso:

Poribus aut duris, restricta morabitur alvus.

Vinciturque mora talis cum gramine Mercurialis:

Prunaeque conueniunt, quae mittis clara Damascus,

Pruni folia, inquit Plin. decocta, tonsillis, gingiuas, vuas, profunt in vino decocta, & subinde ore colluto. Ipsa Pruna aluum molliunt, stomacho vero utilissima, sed breui momento. Sic Apollonius apud Gal. foliorum Pruni contusorum, decoctum lacte permixto ad aphras colluere praecipit, pueris nimirum lactis vitium cum folijs contusis praescribens, sicut Diosc. & Plin. vini cum foliorum decocto, adultis & in grauioribus affectionibus.

Diphilus Siphnius, ut testatur Athen. Pruna succi mediocriter boni scripsit, facile corrumpi & egeri, parumque alere.

Audiamus Mesuen, distincte admodum ac Medicis de Prunorum viribus tradentem. Pruna, inquit, aluum subducunt, & alterant: sed alba, flaua, rubra, minus sunt medicamentosa, quam nigra: quorum quae alba, id est dulciora sunt, alterant magis. Dulcia vero soluant largius: tamen utraque alterant, & soluant, magis scilicet & minus. Damascena vero, & Armena, utrumque praeter cetera praestant, humida tamen potius, quam sicca corrumpuntur.

Dulcia calido frigido temperata, aut paulo frigidiore, humida ordine secundo: alba, id est, dulciora frigida, principio secundi: omnia tamen lauant, leniunt, refrigerant: bilem educunt: ob haec duo biliosis cum febribus, tum morbis alijs sunt salubria: stomacho nocent, pauci sunt alimenti. Quia imbecilliter soluant, eis adduntur praesertim infusione, Tamar Indi, Cassia fistula, Manna, violae conditae. Ex horum succo fit Syrupus & ex carnibus Electarium in eadem salubre.

Armeni truncum Pruni arboris locis duobus vel tribus palmae vnius intervallo tenuiter perforant: immissoque scammonio lutant, Pruna ob id purgatoria euadunt. Dantur succo seu decocto cum saccharo ad libram vnam.

Porro Plinius tradit, tam in sylvestribus quam satiuis Prunis esse Linum arborum, quem Graeci Lichena

Ne pruna decidant. Adversus Vermes & formicas. Vt odoratus nascantur Pruna. Inscriptio.

Vi purgantia Pruna nascantur.

Repositio.

Damascena

Vires & v. suc. Stomachum alius fluxus

Defluxio.

Gummi. Calculus.

Lichenas.

Diosc. repreh.

Damascena

Iberia.

Phlegmonae.

Gummi.

Prunum. Prunum. Prunum.

Deliciae.

Purgatio.

Folia.

Aphra.

Vires et Mesua.

Damascena

Armena

Tepetum.

Syrupus ex succo prunorum. Electarium. Vt pruna purgatoria nascantur.

nam ex his tribus duo intellexisse eum necesse est) Ribes fig. apposita.

Ambr. Corn. error. Prunus sylvestris non est Brachy. Corn. Brachy.
Quod autem Schleben seu Prunum silvestrem quam ille Poterion patat Brabyla esse vult Corn. in Dioscoridis & Plinij auctoritatem recipit, opinionem suam minime veracem fateatur necesse est. Scribit enim Diosc. fructum Poterij inutilem esse, & Plinius Brabyla (in quibusdam codicibus legitur Brabilla) vim habere spissandi, Coronici nam modo: tum fructus Poterij non poterunt esse Brabyla.

Contra Cornarium facit & hoc, quod de Brabyliis scribit Plinius in hunc modum. Vim habent spissandi, nec amplius de ea tradunt auctores. Dubius siquidem locis amplius de Poterio scribit Plinius, Veteres secutus. Ex Plinij igitur auctoritate non idem sunt Brabyla & Poteria. Ideoque nec frutex Schleben Germ. poterit esse Poterion, nec fructus eius Brabyla.

Corn. Brachy.
Cronenburgius tamē scribit Cornarium probabilibus coniecturis velle spinam Schleben esse Poterion Diosc. sed Tragum contradicere. Verum siue contradicat Tragus, siue non contradicat, non videntur nobis probabiles coniectura Cornarij, quicquid scribat Cronenburgius.

Idem scribit Matthiolum (forte legendum Cornarium, nam hæc apud Matth. non inuenimus) aduersus Fuchium constanter affirmare Schleben neminem unquam Latinorum scriptorum *Prunum* ac *Prunellam*, siue *silvestre Prunum* appellasse, immodò ne Prunorum quidem generis existimasse, cum Pruna ferens planta, iusta arbor sit, non humilis spina ex Gal. & Diosc. testimonio: sed quisquis ille sit, qui hoc scripsit, parum circumspexit, quæ Plinius de Prunis tradit, perquisiuit, qui loco supra à nobis adducto, aperte Pruni silvestris mentionem fecit.

Spinus sylvestris.
Cautius Turnerus: Latini (inquit) spinum potius, quam Prunum nominant quantum memini: Pruni enim nomen apud solum Plinium legitur. Palladius Pomum spino, id est Pruno inferi scribit. sed cum Spinus a spinis sit, Prunus spinosa, siue silu. siue sativa spinus rectè nuncupabitur. Ut autem Cornarij sententiam refutet acurè tanè spinæ seu Pruni silvestris differentias proponit, & alia quædam sua, hoc est Anglica lingua tradit, quæ translata huc referri merentur. Quemadmodum enim (inquit ille) Prunorum hortensium varia sunt genera, ita quoque silvestrium, quorum duas saltem noui differentias. 1. Angl. *Bulles tree* et *Bulles tree*. 2. Angl. *Slo tree* et *plackthorn tree*. Prior illa duum est genetum: vnum in hortos transfertur, & in iustam Pruni magnitudinem excrescit: alterum in sepibus nascitur, nunquam arborescit, sed inter arborem & fruticem magnitudinis consistit. Minus autem genus spinosius est maiori, ideoque spini nomine dignius. Illud autem genus, quod *Slo tree* vocant Angli, longè adhuc instans spini nomen eandem causam meretur.

Corn. error.
At Corn. contra omnium doctorum sententiam negat *Slo tree* esse Spinum aut Prunum silu. quod non sit arbor magna, in quam possit fieri initio (ex Palladio.) Male coheret eius ratio. Erit enim Palladius Spinum vnum aptum infusionibus censere, non tamen quolibet idoneum facit. Nam nec ille nec Virg. negat spinam quemdam minorem infusionibus ineptum. Imò videtur Virg. fruticem *Slo* intelligere per Spinum sylvestrem: Virg. inquit, occultant spinera lacertos. Quo loco spinetum à spina, id est, Carduo non deducitur. Tom. I.

citur, propterea quod sub Carduis non soleant sese occultare lacertæ. Neque spina apud probatos auctores significat *Salzbörn* (id est, *Ger. Hagendorn*) nisi cum adiectione alba, idque in Columella solo, quod meminimus. Neque spinetum ab hortensi Spino neque à magno silvestri spino deductum est: non enim solent vltimam tam dense tantoque numero crescere, ut spinetum dici possint, ideoque nec lacertos à Sole occultare possunt. Relinquitur ergo verisimile esse, spinetum à spinis silu. minoribus, seu Ger. *Schleben* derivatum. Idem patet ex Theophrasto. *Λυγισια* enim, id est, sepes habet, seu consepita aut sepimentata, quæ ex spinis silu. minoribus fiunt.

Porro quod pertinaciter defēdit Corn. *Schleben*, (Prunum silvestrem) vel Anglorum *Plackdorn* esse Poterion Diosc. inferens inde non esse Prunum silu. ne Dioscorides dicatur duobus locis de eadem re agere præter consuetudinem suam, facile probauero non esse Poterion. Non enim habet *Schleben* ramos longos, lentos, molles, flexiles. Erit enim *Blackthorn* in cacumine ramos multos habeat, non sunt tamen ij longi, sed breues, duri, fragiles: fructus aut nullum aut exiguum habent odorem, tantum abest, ut suauem habeat, quæ omnia in Poterio requirit Diosc.

Ceterum quod scribit Corn. Prunum Theophrasto memoratum lib. 4. c. 3. esse *Bulles tree* (quæ est Prunus silu. prima nostra) tam in eo erat, quam in Pruno silu. *Brabyliis* & Poterio. Arbor siquidem, cuius meminit Theoph. insignis est magnitudinis, cui folia nunquam decidunt. Sed arbori quam nos *Bulles tree*, Germani *Heiß Bilsen* vocant, folia delabantur, neque insignis est magnitudinis. Nequit igitur esse Prunus Theophrasti. Quare nec idem hic merentur Cornarij coniectura. Sed illa Plinii verba, quibus ait, siluestrium Prunorum bæccæ & errorum Cornarij patefaciunt, negantis *Schleben* Germ. esse fructum Pruni silu. Nam si in Pruno silu. nascerentur solummodo Pruna magna, nunquam eius fructum nominasset Plinius bæccas, quæ vox minoribus tantum fructibus conuenit.

Nihil igitur est quod Harchius tam securè pronunciet in suo Enchir. *Schleben* Germ. *Poteria* vulgò. Mirum verò talia pronunciare aliquem audere, non considerata prius descriptione, quæ nihil minus, quam respondet. Verum, ut sit, ut vnus error, plures post se trahat errores, ita Cornario euenit, existimanti, ne succum quidem ex Prunis silvestribus expressum ac inspissatum Acaciæ loco esse substituendum: quàm benè docti viderint. Sic autem inquit. Officinæ Acaciam vocant, quam ex Prunoli fructu ab ipsis appellato, nostrum autem *Schleben* dicto, parauerunt, succo illius fructus vnà cum carne in massas coacto. Nos autem fructum illum Poterij esse in Comment. medicis, & apud Diosc. clarè docuimus. [Sed quàm clarè ex precedentibus patet.] Proinde ex ipsorum Acaciæ illis sperandum relinquentis eum effectum, qui verè adscribitur. Nos autem, si sapiemus, illorum Acaciæ non utemur.

Sed propter suam falsam Poterij opinionem, reiecit Cornarius *Acaciam Prunellæ*, contra plurimorum doctorum sententiam eam legitimam *Acaciæ* substituentium, ut patebit in vitibus.

Nec tamen idem ferendus eorum error, qui existimant Prunum silvestrem esse Acaciam. Ita videmus quosdam Neotericos Practicos, qui tamen egregie se sapere putant, in suis receptis scribere solitos: Rec. aquæ florum Acaciæ: siue enim sciunt non esse Acaciam, siue nesciant, utroque tamen

Spinetum vnde.

Rationem Schleben non sit Poterion.

Prunum Theoph. non esse Prunum sylvestrem.

Harchius not.

Corn. not.

Acaciam esse Prunellæ requirit.

Prunum silvestre non esse Acaciæ.

modo peccant. Si sciunt non esse, vsu tamen ob-
stinato efficere volunt, vt secus credat posteris,
esse, quod non est. Est sane hic morbus successio-
nis, vt qua semel insulerint, nefas putetur immu-
rare. Sic multa absurda in officinas irreperunt. Sin-
nesciunt, ne ea quidem sciunt, quæ suis etis præ-
scribunt. Sic Dod. luteum expressum, inquit, Aca-
ciam appellant, vnde & Acaciæ Germanicæ stirpi
nomen factum.

Rectè Lonicerus: quidam qui non benè con-
siderant descriptionem Acaciæ, Agtiococciniala &
Prumna Græcè dicta [id est, Prunum silu.] volunt
esse Acaciam.

Potè Prunum siluestrem perique Herbarii vo-
cant, & Spinum Virgili dicunt, vt Hermol. Ruell.
Dod. & alii recentiores, atque de his propriè in-
telligendum quod Theoph. ait, contumacis esse
vitæ Prunum.

In siluestri Pruno hoc peculiare quod deflores-
cens si nulatque imbres contigerint, conuertatur
fructus in oblongum quoddam & inane corpus,
quod in Italia *Turcas* vocant, quales se anno 1587.
circa Norimbergam obseruasse Camer. scribit.
Eiusdem rei & mentio facta supra in Prunis.

*Pruna siluestria, Prunella. G. Schleben/ Dorns-
schleben/ Spinling/ Bilsen. Ipsa arbor, Schles-
henbaum/ Schlehendorn. Belg. fleen: flecten Flä-
dris. Gal. Prunelles, Pelouses, Prunes sauvages, Fourdes
mes, etiamque Penelles nonnullis, vt Montbelg. quæ
vox etiam apud eosdem in opprobrium abiit a-
dagio vulgato: Ce sont des Penelles: de re nihili, aut
nullius momenti. Ital. Pruno saluatico, & in quibus-
dam locis Italiæ, vt in Apulia, Trique, siue Attri-
neæ, vt Pandectarius scribit, vocantur. Hisp. Pru-
na. Angl. Slo tree. Bohem. Truk. Vngar. Bofeny fa.*

Prunorum silu. duas species faciunt. Maiora
German. *Heberschleben* / quali dicas Auenaria:
reliqua *Schleben* simpliciter: hæc pusilla & parua
sunt. Ipse quoque frutex infra arboris conditio-
nem constitutus videtur, quod fruticibus similior,
quàm arbori videatur, licet reuera arbor sit: horri-
dior verò priore, spinis rigidior: ex harum fructu
fit *Prunellorum Acaia* dicta officinis. Lærior sylue-
stris transplantatione, insertione & cultu in gran-
dem proceram & domesticam abit, [si Penæ &
Lob. credendum] mitiore pomo, succulentiore,
maiore, suauiore. Quod verò Turn. vt Prunorum
hortensium, ita & siluestrium varia genera dicit,
id nondum innotuit nobis. Plura enim duobus
dictis, non vidimus, nisi quæ fortè cultu respiciat:
nam alterutrum sine dubio cultu speciosius euadet &
mitius vnde tamen non specierum numerus, sed va-
rietas tantum oritur: At insitione multiplicari
posse non negamus. Inter siluestria Pruna, inquit
Cain. sunt quæ fructu duplo maiore, quàm communis
est, & admodum dulci. Huius fortè duas differen-
tias constituit Turner. Vnum quod in hortos
transfertur, & in arboris proceritatem excrecit:
alterum quod in sepibus maneat, nec vaquam in
iustam arborem assurgat. Idem ait certum esse ex
Columella dari Prunum syluestrem.

De loco non est, quod multa dicamus: quod pas-
sim ferè proueniant, in sepibus, siluestribus, siluis,
dumetis, collibus & planis. Germani ipsos agros su-
os sepiunt, & hortos. Montbelgardensis ager etiam
abundat: incommoda valde in sepibus propter
nimium repletum: comodior multò Spinus alba,
verum lente crescit. Turnerus nusquam & copio-
sius vidisse testatur, quàm in agro Sommerfetenii
Angliæ. In Belgio quoque frequens.

Florent Martio & Aprili. Septembri & Octobri
fructum maturant, quæ colligi possunt, & expres-

sus succus resiccare, vel ipsamet siccata recondi.

Spino seu Pruno silu. inseritur Pomus, vel poti-
us Pirus, si rectè inspiciamus textum Palladij. Pli-
nius scribit Tuberos melius inseri in Pruno silue-
stri. Pruna verò eidem omnis generis inseri hodiè
translatitium est.

Prunorum siluestrium fructus, auctore Diosc.
post maturitatem exiccatus, eadem præstat, quæ
latiuorum. Cum sapa verò decoctus utilior & ad
cohibendam aluum aptior euadit. Siluestrium,
Prunorum bacce, inquit Plin. vel è radice cortex,
in vino austero si decoquantur, ita vt triens ex he-
mina super sit, aluum & tormina sistunt. Satis est
singulos Cyathos decocti sumi. Sic & Galeno,
agrestium Prunorum fructus euidenter astrictori-
us est, ventremque sistit.

Præstantissima inter siluestria Pruna, auctore
Trago, ea sunt quæ & satis magna apparent, & Au-
gusto mense maturantur, quod in Pruno silu. vul-
gari non contingit, illius namque fructus sicut &
hos frigoribus occupatur, antequam maturetur.
Nisi verò illa Pruna mollescant, non sunt edendo,
propter imensum ipsorum acerbicatem. Paupe-
res Pruna silu. igne quandoque vstulare solent, vt
commodius illis vesci queant.

Refrigerantem & adstringentem vim habent.
Melle condita non tantum commestrationibus no-
cturnis proponenda sunt, sed dysentericis etiam
& alui profluuijs laborantibus exhibenda. Ad eam-
dem facit vinum ex his fructibus confectum, quod
ad Iulium & Augustum vsque menses diligenter
adseruare conuenit. Earumdem facultatum est &
decoctum. Aqua è floribus illorum destillata &
data ad laterum dolorem singulari facit experi-
mento. Ea verò efficacior fuerit, si flores Pruni silu.
recentes per noctem vino forti & optimo ma-
cerati in balneo [vt vocant] Mariæ distillantur.
Hac aqua multis se profuisse, Tragus scribit ea-
que lateris, cordis & stomachi quousvis dolores
seu compressiones & puncturas dissolui.

Aduersus vini penduli vitia nihil efficacius Pru-
nis siluestribus reperitur. Pruna antequam blauo
tingantur colore leguntur, & in mortario tula,
pro magnitudine & exiguitate vasis multa aut
pauca vino iniiciuntur cumque probè vina agita-
tione crebra commixta fuerint, obturatur vas per
dies 8 vel 10: cum intra paucos dies vinum resti-
tuitur. Ceterum possunt Pruna silu. tusa & in aere
siccata ad eos vsus per totum annum conservari.
Wirsungus scribit quosdam præscribere aquam
florum Pruni silu. ad pleuritidem, se tamen non
animaduertere posse, quomodo prosit, cum ob-
struat & adstringat hæc planta. Nolumus tamen
dicere aquam florum Prunorum silu. adstringere:
sunt enim valde amari, in quibus nullam adstri-
ctionem animaduertimus. præterea Cordus in li-
bello de destillatione purgantem facultatem huic
aque tribuit. Quod verò Tragus scribit, prædesse
puncturis cordis, de Ventriculo intelligimus, &
per dolorem lateris, cum, qui sit à flatibus: alio-
qui non videret conuenire cum vino in Pleuriti-
de cum inflammatione. Florum viridium vnc. j.
per noctem in vino albo maceratorum parum mo-
uit aluum. Exhibuimus diuersis maiori etiam
quantitate in vino maceratos pluribus illicibus, sed
leuem euacuationem hætenus in impuris nostror-
um hominum corporibus præstiterunt: fortè in
delicatis plùs efficiant, in quem finem & le-
uiter bulliri post aliquam macerationem possunt.

Suadent tamen Medici Matpurgenses in consilio
suo de præcauenda Dysenteria, si quis diuiniore ste-
tiorene sit aluo, capiat florum Prunellorum vnc.
semis

Aburdita-
tu quaru-
dam causa
& occasio.

Agricocci-
mala Pru-
na.

Turca Pru-
na silu.

Linguaru
nomina.

Adagium

Trique.
Attrinea.

Differentiæ.
Auenaria
maior.
Pruna.
Hortensium.
Læior.

Pruna sil-
uestria dul-
cia.
Siluestria
maior.

Locus &
tempus.

Repositio.

Inseritio

Vires &
sus.

Alui fluxus

Tormina

Prunella
quomodo
edantur.

Temperæ
mentum.
Dysenteria.

Vinum d
Prunella.

Operitum.
Aqua silu-
la &
laterum
dolor.

Ad punctu-
ras & com-
pressiones.
Vini pendu-
li correctio.

Aqua ad
pleuritidē.
Wirsung-
us.

Aqua p
gar.

Infusio fl
Pruni.

Ad præca-
uendā Dy-
senteria.

di nidia mensura vini aut cereuiliæ maceret, sepius exprimendo, atque inde per biduum in pasta bibat.

Syrupus
infus. flor.
Prunell.

Wittichius ad febrem epid. cum mania pro purgatione præscribit syr. ex multiplici infusione florum Prunellorum silu. & alibi ait: bene reputari infantis, si per aliquot dies detur serum lactis in quo per noctem infusus fuerit manipulus florum Prunellorum.

Ad purgan-
dum, oris
ulceres.
Dysenteria.

Matthiolo tota Prunorum silu. planta adstringenti facultate præstat, quemad. & baccæ. Her-
Cibetis & Dysentericis vtiliter deuorantur. Ex-
dem cum arbutulæ radicibus ex aqua vel vino austero decoctæ, sanant oris linguæ & gingiuarum ulcera & fluxiones, quinetiam columellæ & fissuram ulcera, gargarisato earum decocto. Quamobrem recreantur non parum hoc medicamento, qui hydrargyro peruncti, oris ulceribus & fluxione laborant, addito Lycio, alumine & rhodomelle: idem decoctum in descissionibus auxiliatur foris vteri fluxionibus obnoxiijs. Aqua de floribus destillata, hausta intestinorum vermes interficit. Succus baccarum ad impetigines vtilis est & inflammationes. Idem inflammationibus oculorum illitus optime refrigerat. pilos illitus prohibet nasci: & vel per se vel cum aqua Plantaginis fronti impolitus & in nares, tractus, hæmorrhagias sistit. Ad procidentiam ani facit illitus succus ad spissitudinem coctus.

Pleura fura-
tum.
Præparatio
de hydrar-
gio.
Pteri fura-
tum.
Lumbri-
cis.

Impetigo-
tum.
Pili ne nascantur.
Sanguis fluxus.
Anus proci-
dens. mor.

Duo verò in Matth. obseruanda: Primum, an flores adstringendi facultate sint præditi, quod nobis non sit verisimile, vti pauld antè dictum, & aliquorum experimento confirmatum contrarium potius præstare. Secundum: an Lycium noverit Matth. quod tam confidenter præscribit quod nec ipsum quidem nobis videtur.

Baccæ Prunellorum silu. purgare.

Goropius in suo Vertumno hoc loco Paradoxus putatur, quando ait: Non absurdum si Prunis agrestibus quoque ventis deijciendi vis tribuatur eo tempore quo pleno autumno ad tardam deueniant maturitatem, nihil fortè Tamar-Indis seu Dactylis acerbis Indorum vel sapore vel facultate cessura: Atqui scire debuit Goropius purgandi facultatem non ex sapore iudicandam, & hanc rem experimento potius, quam coniecturâ decernendam. Si experientia nouit purgare, cur non dixit? sin minus, cur adstruit. sed res est expertu facilis, & pauperiores, quibus frequens eorum usus, hoc scire possunt, ad quos lectorem relegamus.

Goropius
mor.

Schwenckfeld. Prunum siluestrè totam exiccantis & adstringentis esse facultatis ait, quod posterius non verum esse, in Matth. iam redarguimus. Idem ait: flores tantillum amaricare, abstergere, siccare, cohibere: resiccatos in Dysenteria alijsque alui fluxionibus magni esse usus. Nobis quidem satis amari visi sunt: an verò cohibeant, ex præcedentibus patet. Considerent etiam docti, an flores sicci in Dysenteria conueniant, ut ille vult: si intelligat abstergendo, ferri potest: si cohibendo, ipse viderit. Placet quod addit ex sua obseruatione, Fructus immaturos pueris Dysenteriam conciliare sapissimè à se visum: quod profectò vix alia ratione euenire potuit, quam cohibendo noxios & impuros humores quibus impenitèr scatent pueri, adstrictoria sua vi, qui alioqui fortè egererentur: nisi quis malit in eorum acerbitate qua intestina torquent & irritant culpam referre. Per maturitatem verò resiccati costis & saccharo conditi, aluum adstringunt, & ventriculo vtiliores fiunt. Dentium dolores mulcet cortex radicis niger accro-

Dysenteria
Schwenckf.
mor.

Quando
Prunus silu.
fructus Dy-
senteriam
conuenit
causare pos-
se.

Dentium
dolor.

Tom. I.

decoctus, fluxionesque inhibet. Eadem fortè vis folijs & baccis contulis, & ex eodem decoctis: si frigida sit, fluxio ex vino coqui possunt.

Caues. tradit incanum muscum in vetustis Prunis siluestribus ex vino rubro decoctum, Hernia incrementum prohibere impositum.

Alusius
Hernia.

Potius Prunellorum succus inspissatus, Acaciæ succedaneum hodie habetur in plerisque Europæ officinis. Acaciæ loco, inquit Sylius, ex bacculis Prunorum agrestium coctis succum expressum tessellatum, confectum insolarumque vlturpamus minimo errore, quia refrigerat, siccant, adstringit, vt Veterum Acacia, quæ in partibus nostris ignoratur. Idem & Monachi tradunt apud Mesuæ, & præferunt eam, quæ sit ex non perfectè maturis, vt adstringentior fiat: Veruntamen, hos fructus non credunt habere tantam virtutis bonitatem, quantam vera Acacia habet. In eius tamen defectu possumus vti. Et Cordus Acaciæ loco succum Prunellorum silu. substituit. Idem in fine de ptzpar. simpl. componit succedaneum. Quam tamen rem Matth. pauld morosius interpretari videtur, satius esse ducens, Dioscoridis præceptis inhære, qui in defectu Acaciæ, Rhos arbutulæ folia, vel Lentisci foliorum succum, vel hypocistidem medicamentis immiscere præcipit, quibus potius seplasiarios vti debere putat, quam supposititio siluestrum Prunorum succo. Eadem ferè & Apollo & Bacchanellus de succedaneo Acaciæ tradunt: sed vici hodie consuetudo, prædicantium consensus, & non improbata vtendi felicitas.

Succus in-
spissatus &
Acacia succedaneum.
Mesuæ pro-
randa.

Aliud succedaneum.

Cæterum Germani nostri in delicijs quoque habent, præsertim nobiles & ditiores Alsatiæ, vinum quod vocant Schlehenwein, ex Prunellis paratum, quale sæpè gustauimus, & dulcedine aromaticoque sapore, quem à granis contulis acquirit, haud ingratum. Pruna siluestris matura vel gelu fraccida coquant in fornace, & contusa in mustum seu vinum conijciunt. Probatum in fluxionibus, & alij profluuijs, vbi non admodum suspectus sit calor vel febris.

Vitæ præparatio
mellum.

Pauperes quoque ex Prunellis contulis & vindemix expressæ residuo, additis etiam alijs quibusdam, vt Pomis & baccis berberis secundarium vinum, quod Loran vocant, vulgè Leure, parare norunt, adfusa multa aqua, vt simul feruescant ac bulliant. Gratum ipsis est, quod vini quodammodo saporem æmuletur, sed delicatis & ad colicum dolorem procliuius, noxium. Parant etià ex folijs Prunellis, (vbi ea abundant) contulis & affusa aqua: tandem vt melius fiat, & cocta adijciunt, vt antea dictum, quale potionis genus per hiemem seruatum non iniuaue reddi scimus.

Loran
Prunellæ.

DE MYXIS, SIVE SEBESTEN.


CAP. XII.

IN vsu Medico *Sebestena* dicta, fructus sunt paruis serotinis Prunis pates, nigricantes, turbati, in acumen desinentes, (in rugis contracti quæ in offic. habentur) calyci insidentes facillè cedenti, qualem in Dactylis videmus, sed longè maiori, & acetabuli instar concauo, cinerei ferè coloris. Horum pulpa atra est, viscida, dulci sapore prædita, pertinaciter officulo adherescens, quod aliàs tribus costis donatur, aliàs compressum Pruni nostratis officulum imitatur: in cuius vtrolibet hinc foraminulum apparet, atque ex inferiore quoque, qui vel in geminos, vel ternos


Descriptio
fructus.

Myxa domestica.

Nucis



Delicta

*Myxa siluestris.*Arboris de-
scriptum et
differentia.

Flor.

maiores, melioresque.

Serapio Sebesten arbutum dicit alium cortice albicante, ramorum extremorum verd viridante, folijs rotundis, magnis: fructum racematum magnitudine Nucis, sapore dulci, qui glaucescat cum maturatur, intus continentem pulpam viscosam, granum oliuz.

Myxa.

Hæc etiam profert Cardan. de variet. Myxa, nec auditu olim cognita Antiquis, iam nunc in Italia, vicinisque regionibus colliguntur, ut recentia degustare liceat. Arbor est, ut Marthiolus refert, pruno similis, aliquando minor, cortice trunci subalbido, ramorum autem subviridi, folio rotundo firmoque, fructus minor pruno, viridis, fuscusque cum maturuerit, ossa triangula: gustus dulcis, sed adeo lentus, ut viscum gustasse videret, nec ab re forsan: referunt enim, in Oriente ex his fructibus optimum viscum confici.

Piscus à
myxa.

Synonyma
autorum
placita.
Myxa Prunorum Syria
popularis.

Syria Prunorum inquit Plin. dici possunt populares eorum Myxæ, quæ & ipsæ nunc coepere Romæ nasci insitæ sorbis, Aegypti persicæ simili colore.

De his Græci antiqui nihil prodidisse putantur sed posteriores tantum, veluti Paulus, Actius,

imperones acutos linditur, geminis veluti rudimentum exili: Nuclei tribus loculis forsim tres continentur, oblongi, triangulares, albi, Melonum vulgari magnitudine & sapore, quique eodem modo vetustate rancescunt, qui non immixtus in recentibus: alias vnicus nucleus ossiculo clauditur. Eligenda plena, maiora, pingua, carnosula, quæque situm non redolent, calyci adhaerentia, teredine non arrosa.

Arboris ipsius duo (inquit Alpinus) sunt genera: alterum siluestre, Pruno simile: alterum Domesticum, folijs latioribus, ac crassioribus, à siluestri differens. Vtraque arbor flores fert albos, paruos, Germanij proximis. Siluestris fructus fert minores, tardè maturescens, imperfectiores ijs, quos domestica sebesten profert, qui sunt

Pfellus, Actuarius: μύξα quidem Paulo, μύξα Actio & Actuarius. Δίδου γὰρ τοὺς ἐν αὐτῇ, μύξας τοὺς μικροτέρους: δίδου δὲ τὰς ἐν αὐτῇ: fructus minor pruno, sed facultate similis. Dicta volunt ἀπὸ τῆς μύξης, id est, à maco lento, è naribus stillante: nam & hunc fructum simili lentore referunt esse.

Sebesten vulgò officinis, Arabicam appellationem magis quam Græcam retinere malentibus, quod nonnulli in Cæsaris honorem factum arbitrantur, qui οὐβασίς, id est honorabilis dictus. Abrahamia vel Mabeica, fructus ferens dulces, quos gentes Pharas nominant sebesten, Serapionj. Mabeica Isaac apud eundem, & est Reib in Arabia. Mabeica, sebesten, Avic. Myxa Græci vocant, non Myxas, quibus similis est persicus Aegyptia, nisi quod poma Aegyptiæ rubescunt, Herimolao. quæ posteriora verba ex Plinio sumptisse videtur, quamuis in eo non ita legatur, sed rubedine similia esse, seu, ut ille ait, Myxis rubentibus. Myxæ vel Sebestæ Cordo.

Quidam Serica Galeni putant, norante Trago qui Arabes hunc fructum nobilitauisse, Veteribus minimè descriptum, tradit.

In nominibus habet Matth. μύξας & sebestina Pruno proxima sebesten, id est si Lat. interpreto- ris, Augusta, Amaro.

Sebastos Lacunæ, qui ait, posterioribus Barbaris corruptè sebesten dici.

Sebastos in Augusti honorem dictos putant Ruell. & Ryff. Sebastos ex quibus in Syria fit Viscum, Damascenum dictum, Lonic. Sebesta quibusdam: Hanc verò eam esse quam ἀμαμύξην Matron Parodus in coena Aëtica apud Athen. appellat, suspicari quidem licet, sed adfirmare non est promptum, præsertim cum & exemplaria quædam ἀμαμύξην habeant: μύξας de fructu Dod. οὐβασίς & Myxus Gesn. Prunum Aegyptiæ Theoph. & Plinij arborem quidam putant quæ Myxa gignit.

Hist. Lugd. duas habet icones: priori titulus, Prunus sebestena Matth. alteri Myxos arbor, sine sebestena nostra. At nobis non videtur differentes esse arbores: altera icon est ex Trago.

Pruni Aegyptiæ Theoph. & Plin. descriptiones dedimus cap. præcedenti, cui Myxa non per omnia conuenire videntur.

Sebesten Persicam vocem, Syluaticus Mammillam canis dicit, et si οὐβασίς Græca sit, ideo Portus sebesten similitudinem tribuit mammillarum canum. Germ. Schwarze brustberlin. Arbor sebestenbaum. Ioan. Lang. Epist. med. l. i. Epist. 66. circa finem, Myxa à Sebastia Samariæ metropoli, vbi olim crescebant, patrium nomen sebestæ retinere tradit.

Pruna in Damasco nata & Myxa vtraque familiaria suo tempore Italiæ ait Plinius. Alpinus auctor est, nasci in Aëgypto, toto autem anno in arbore fructus cerni: Vere florere, autumnno fructum maturari. Hodie raris admodum hortis & viridarijs Italiæ vident: apud Syros quoque proueniunt, æquæ ac Aegyptios, ex quibus locis ad nos conferri Matth. testatur. Aegæ verò solo Italico vel Narbonico assuescit. Nostra ætate in Monspelienis agri vrbecula, vernaculè Massilarges nominata, quidam aluit sed neglecta, & non diu illis supersuit, & tantum arbuscula fuit, teste Lob. Ex Alexandria Venetias defertur Viscum: Lacuna.

Calabrice, inquit Plin. l. 17. c. 10. spina est siluestris, quæ nunc optime & Myxas recipit. Inferitur & sorbis. Vnde Idem Plinius l. 15. c. ij. Myxæ & ipsæ nunc coepere Romæ nasci, insitæ Sorbis.

Myxa.

Myxa.

Myxa.

Myxa.

Myxa.

Myxa.

Myxa.

Myxa.

Myxa.

Myxa.

Myxa.

Myxa.

Myxa.

Myxa.

Myxa.

Myxa.

Myxa.

Myxa.

Myxa.

Myxa.

Myxa.

Myxa.

Myxa.

Myxa.

Myxa.

Myxa.

Myxa.

Myxa.

Myxa.

Myxa.

Myxa.

Myxa.

Myxa.

Myxa.

Myxa.

Myxa.

Myxa.

Myxa.

Myxa.

Vires & vicia.

Prunus.

Purgant.

Tassa.

Catarrhus Stranguria.

Aperit.

Lent.

Lent.

Lent.

Viscum.

Viscum.

Viscum.

Tumores.

Temper.

Tassa.

Dyspnoea.

Orthopnoea.

Pleuritis.

Peripneumonia.

Rauco.

Febris.

Ferb. var.

Sebasten.

Sebasten.

Mirabile.

experimen.

tum.

Hermol.

Ex Myxis in Aegypto & vicia sunt, autore Plinio. Paulus tradit Myxas Prunis facultate esse similes, quod doctioribus considerandum relinquimus, cum pleraque Pruna sint acida nec ea visciditate praedita quae Myxa. Existimaremus Pruna frigidiora. In Pulmonum affectibus pluris facimus Myxa, quam Pruna. Myxa, enim calore & frigore medio modo se habent. Febricitantibus ventrem laxant. Conferunt tussi cum calore & siccitate iuncta: Pectus leniunt: catarrhos calidos sistunt, contra stranguriam quam acrior urina concitauit, efficaces. Vermes expellunt, ex Serap.

Ut verò Auic. vult, Sebestena, parum abest, quin temperata sint: gurguris asperitates & pectoris leniunt: sitim sedant, potissimum verò eorum semen: alium leniendo soluant.

Ex pulpa eorum, teste Alpino, optimum viscum conficiunt Aegyptij: quippe sebesten maturos contundentes, atque lauantes. Sunt aliqui, qui masticando, pulpam ab osse lingua expuentes, viscum parant: quantitatem huius fructuum in vase collectam, parum, quoad aquea humiditas assumatur, bullientes. Vnde Ioub. Viscum Myxarum [sebesten] siue collam ex pulpa pro visco querno sumi posse autumat.

Visco vtiuntur omnes emplastri modo, ad scirrhusos tumores. Ipsum quidem calidum est, in primo gradu, atque humidum in secundo, vimque habet attractoriam & resoluentem. Resoluit omnes tumores, & emollic omni duritiem. Aliqui ad tussim ex eo paratos bolos cum saccharo candido & radicis glycyrrhizae puluere multis diebus sumunt.

Fructuum usus familiarissimus est ad tussim, dyspnoeam, Orthopnoeam, Pleuritidem, Peripneumoniā, & ad vocis raucedinem, parato ex ipsis decocto, quo etiam ad multas febres vti consuecunt, praesertim pectore noxam aliquam patiente.

Porro Viscum illud, quod ex Myxis Syri & Aegyptij conficiunt, (inquit Matth.) Venetij Alexandrinum vocatur, aucupij commodissimum.

Pollent autem fructus teste eodem deiectionaria facultate, non secus atque Pruna, tam Graecorum quam Arabum testimonio, id quod etiam comprobatur quotidiana experientia, tamen contrarium censuerit Fuchsius in paradoxis, qui nullam sebestinis deiectionariam esse facultatem contendit, quin potius ea adstrictoria vi polleat. Actuarius pluribus commiscet medicamentis quae bilem eiciunt, ut videre est in suo de comp. med. compendio. Ut milles se expertum ait idem Matth. eorum pulpa drach. 10. pondere deuorata, aut ad summum 12. eosdem ferè praebet effectus, quos Cassia vocata. Vtiliter dantur ex huius febricitantibus. Amatus quoque reprehendit Fuchsiū quod restringentem vim Myxis tribuerit: deuorata 30. aut 40. ex iure carniū macerata, prima statim mensa, alium commodissime citare. Electarium quod ex his conficitur ad ciendam alium facile mucorem contrahit, proinde non nisi recenter parato videntur. Mirabile est illud Porri verbum, quod faretur Myxa vel Sebesten destillationibus quidem auxiliari, sed ipsam praestare causam, cum cuilibet digito circumdatam, res est experimenti. Amariora Prunis Myxa dicit Hermolaus, quem miramur, num aliquando gustauit: neque enim vllam, vllam in ijs amaritudinem deprehendimus, ut taceamus, & ipsa Pruna amara esse debere si Myxa sint amariora, amariū quippe, non nisi respectu amari verè dicitur. Non

malè consulunt, quibus fructus pueris dandos suadent coctos ex aqua, [poilis postulae aut aliam aliquam conuenientem sumere] aduersus vermes. Decocta cum Glycyrrhiza, mala & rad. Altheae ex vino dulci, & epota, dolores veteri mitigant, & gonorrhoeam. Eorum etiam varius est usus ad varios affectus, & multas compositiones, praesertim thoracem & pectus respicientes, ingrediuntur.

Prunus.

Doler. vesp.

Gonorrhoea.

HOBVS SEV HOVVS INDICA, PRV.

HI FACIL.

CAP. IIII

Indi Occidentales abunde habent fructus Houus Idichos, Prunorum Damascenorum crassitudine, pauca carne, grandiore ligno: vbi maturuere flauescunt, subacidi saporis. Arbor eum fructum ferens, magna est, folia verò modica: Benzo.

Descriptio

fructus.

Prunorum

crassitudi-

ne.

Arbor.

Caluetus apud eundem, Hobus seu Houus, inquit, procera & pulchra arbor: vmbrae quidem salubritate adeo commendata, ut quoties Indi in militiam aut peregrinantes, aut greges in pecuariis pascentes, cubare sub dio necesse habent. Hobum temper, vmbrae tantum gratia expectant & querant: quippe sub ea dormientibus caput nunquam grauari, ut aliarum arborum vmbrae, ferunt.

Experita

arbor pro

vmbrae.

Mitum praeterea de hac arbore proditur. Si forte in squalidis siccitate campis, aquarum penuria peregrinantes sitim accenderit, atque illi casu in Hobum inciderint, ablaqueato arboris pede & radicibus eius taleam excindunt. Mox alterum taleae caput ori inferentes, velut gutti aut ampullae epistomium, altero manu elato, tantam inde humoris vim exsugunt, ut facillime sitim restinguant. Guttationem videlicet primò inde stillante aqua, mox tractim & continuo veluti filo defluente, ut quamvis sitibundos expleat. Id se expertum scribit Ouiedus in hist. Ind.

Aqua red-

dit ad sitim

Eiusdem meminit P. Martir, de rebus Oceani & nouo orbe: l. 9. dec. 2. Houus arbor Prunis persimilem generat fructum, & forma & sapore, sed aliquid grandiore: hanc Myrobalanum esse pro certo habent. Est Hispaniolae adeo peculiaris, ut eius fructibus porci saginentur.

Prunis si-

milis fru-

ctus.

Myrobalan-

um.

M. Fumec. Hobus fructus cum nucleo, cuius arbor alta Houus dicta, vmbraque grata.

Hobus.

Houus.

Refert Fragoius in noua Hispania fructum Dactylorum modo nasci Houos nomine, Myrobalanis flauis adeo similem, ut plerique eundem esse contendunt. Praeterea nascitur arbore, ut vix colligi possit, nisi praematurus sponte decidat. Hanc igitur Fragoii sententia iam cadit P. Martiris aut eorum sententia, qui existimant esse Myrobalanum.

Myrobal-

anis flauis

similem.

P. Martir

aut.

De eadem etiam tradit Gomara, in gen. sua Ind. historia. Houus, inquit, arbor est praeterea & patula, sanam vmbrae praebens, ex cuius cacuminibus & cortice odorata sit aqua ad crura roboranda, & facundam faciem, vtilis: etenim cutem constringit & densat: in quem usum balnea fiunt ex ea etiam itinere defessis salutaria. Eius radice vulnerata, multa aqua manat porui apta, fructu flauo, paruo, & pulpe parum habente, sed officulum in se continente satis magnum. Salubris est is fructus, & facilis digestionis, sed dentibus molestus & noxius, ob librarum copiam.

Houus.



此後，
我將
繼續
努力
工作
，
為
人
民
服
務
。

我
將
繼
續
努
力
工
作
，
為
人
民
服
務
。

我
將
繼
續
努
力
工
作
，
為
人
民
服
務
。







Synony-
mia
Quebula.
Quebulge.
Arctea.
Condita.

Chepula.

Quebulge; Chepula nostra, quæ pituitam purgant, incolis *Arctea* appellantur. *Arctea* magna sunt, & rotunda, oblongiora tamen dum ad perfectam maturitatem peruenerunt & angulosa: folia eius Persicis similia. Chebulorum conditorum maior est gloria: condiuntur hæc in Bisnager, Bengala, & Cambaya: quæ tamen rarius ad nos adferuntur, & non nisi dura & malè condita, teste Clus. Chepula quæ *Arctea* folijs Persicæ, *Acosta*: qui tamen fateatur se arborem non uidisse. Myrob. Vel Myrab. Chepula, vel Chebula Herbarijs & offic. Germ. *Groß oder schwarz brann Myrobalan*.

MYROBALANI EMBLICA, IN SEGMENTIS NUCLEUM HABENTES, ANGULOSA.

Descriptio.

Emblicæ sessiles sunt, puluinato calyce omnium copiosissimo, nigro, sed non nitido, more carnis Indarum striato, etiam in penitioribus substantia pro costarum ossis commissuris spontè dehiscente, quæ plurimum carnis fragmenta adferri solent: sapore, Indarum acido parum acerbior: os læue, turgidum, hexagonum, substantiâ læui, solida, non foraminulenta, ut putamina Citrinarum & Chebularum, senis loculis distinctis totidem semina disclusa continet Piracea, vel Pomacea, spadicea, triangularia: spontèque in partes fatiscit. Hanc crebrè integrâ cum nucleis pediculo donatis conditam obtinuimus, quemadmodum figura repræsentat, ut & reliqua satis eleganter.

Super.

Semina Py-
rææ vel
Pomaceæ

De ea autem sic scribit Cordus. Myrobalanus appellata Emblica suum peculiare & proprium genus habet, etiam à Bellirico diuersum: magnitudine Bellirico cedit, eadem nunquam integra adfertur, sed in fragmina diuisa & dilapsa: habet enim eius caro sex in longitudine commissuras, quibus, cum maturat, dehiscens, in totidem partes dilabitur, quæ singulæ adhuc in binas partes digitis findi queunt, crassitudine mediocri, habitu contracto, & aliquantulum rugoso, colore cinereo aut fusco. Totus fructus sub commissuris singulas cavitates habet, quarum vestigia in fragmentis apparent. Semen in medio est lignosum, durum, ad rotunditatem accedens, colore subrufum, æquale, minimè rugosum, parum rotundèque Auellane æquale: sex angulis & commissuris compactile, & in totidem partes secundum longitudinem fissile, quibus singuli insunt nuclej figura oblongi & triquetri, ligneo, tenui, & tamen duro cortice, intus autem medulla constantes. Sapore caro eius inde Myrobalano, aut Chebulo similem habet. Eligito fragmenta eius maiora, solidiora, ponderosiora, & minimè rugis contracta.

Nuclei.

Delectus

Bellirici

Gabr. Fallop. notat, quod Emblici sunt crassiores, & consistunt ex pluribus partibus, ita ut videantur constare ex pluribus sessilibus, & semper deferuntur ad nos in frusta; raro autem poteritis uidere unum ex his myrobalanis integrum: nucleus ipsorum est veluti ossis, constatque ex quatuor vel quinque partibus in quibus sunt semina.

Synonyma.

Primus &
Egyp-
tius
Embalica
Ampelitis
Emberi
Embelgi
rab.

Scaliger in Theophr. de Præco, siue *emmalis* Aegyptiæ aliquid, (inquit) contemplare super Myrobalanis Emblicis aut eiusmodi: multa enim conueniunt. Corrige *emmalis*: non *emmalis*. Hæc est illa quæ Empelitis Syllio dicta, eandem putat esse cum ea quæ Aduario *emmalis* & *emmalis* quoque dicitur. Myrobalana Emblica, inquit Garcia, Arab. *Embelgi* vocant, sed sub nomine

Seni, ut patet ex Serapione, qui *Seni* tenuissimum corticem prædita esse scribit: quæ nota Emblicis conuenit. Quamvis autem Serapio scribat *Seni* cognominata Myrob. genus esse olivarum, tamen errat, atque erroris causam præbuisse credo, quod Emblica sale aut aceto condita edantur. Quinque genere Myrob. Amuale incolis nuncupato, nobis verò Emblica, dicto, non vtuntur, nisi desiccatis corijs & atramento conficiendo: sunt tamen etiam nonnulli, qui ijs viridibus, vescuntur excitandæ appetentiæ causa. Amuale folijs est minutim incisus, Palmum longis. Emblica copiose recentissima & optime condita inuehuntur Antuerpiam, teste Clus. Emblica autore Acosta, incolis Amuale dicta, folia minutim incisa habent, Effici ferè similia, sed paulò crassiora. Eschens farò Myrobalanen Germ. Emblica Herbarijs & Offic.

MIROBALANI BELLERICA ROTVNDIORES.

Bellericis, quæ altera parte sessiles ferè, altera *Descriptio.* turbinatæ, & in apophysen seu pediculi crassi desinentes, magnitudine quæ Citrinis, nili magna ex parte essent rotundiores: superficies quoque leuior, minus rugosa, obiter duntaxat costarum putaminis vestigia ostendat, quæ nonnunquam terreo, aliàs ferrugineo colore, licet penitior pulpe substantia etiam flavescat, sapore Citrinarum. Putamen angulosum, breuius & rotundius, cauernulas non habet gummi receptices, veluti Citrinæ & Chebulæ: cavitatem autem possidet longè capaciorem, triplo puta quadruploque: in qua nucleus plerumque marcidus.

De hac Cordus: Myrobalanus quæ Bellericus appellatur, à prioribus tribus differt, in alterius generis, quàm illæ, arbore nascens, figuram habet rotundam, aut modicè oblongam, superficiem fuscam, æqualem in longitudine quinque vel plurimum angulis distinctam, magnitudinem verò maioris gallæ, possidere quatuor aut quinque scrupulos superans aut æquans, tenui carne, & magno, lignoso, duroque semine constans, Chebuli semine multò maiori, drachmæ pondus leuante, & intus oblongo, acuminatum & Auellane propemodum æqualem nucleum claudente. Sapore caro eius habet proximè ad prædictarum Myrobalanorum qualitatem accedentem: substantiam verò illis rariorem. Eligito maiores, ponderosiores, solidiorique carne constantes.

Fallop. Bellirici rotundi sunt, & quasi pilosi in extrema facie: habent pediculum aliqua ex parte adactum, & corticem, ac nucleum crassum. Hi sunt Myrobalani qui in officinis habentur, quorum historia est penitus ignota omnibus, an scilicet omnes iste species sint ex vna eademque arbore, an ex pluribus inter se differentibus, & quales sint arbores: Lodouicus tamen Barthelemy in libro navigationum inquit, quod aliqui asserunt arborem, quæ producit Myrobalanos esse figurâ Pyrorum, tamen sciatis quod est omnino ignota Mæne & omnibus. Vnde omnia plantæ accipiamus fructus, & agamus infinitas gratias Deo quod ipsos habemus: & non curamus nunc amplius de historia. Hæc illi.

Myrobalana Bellerica, Arab. *Belirigi*: Myrobal. genus tertium, *Germ.* incolis nuncupatum, rotundum. Guri folijs Lanri, sed pallidioribus & subcinericis: Garcia. Bellerica rotunda incolis *Germ.* folijs Lanri. Myrobalani bellericæ recentes

Synonyma.
Belleriga.
Guri.
Germ.

decem. Ne fume flante Borea & his sumptis, pifib. abfint. Verumtamen harum decoctum promptius & valentius obftruit, quam maceratorum exprefsum. Affe item ipfe minus purgant, potentius conftipant, & adstringunt, & his magis vifa. Harum quoque tritarum pulvis quò tenuior, eò vehementius adstringit: maceratorum verò exprefsum, minus adstringit, omniumq; maximè purgat. Ob id eas infundimus, quando folam vacuatione expetimus. Cepula verò conditæ purgant quidem minus, partes nutritorias roborant magis: non conditæ contrà. Condiuntur autem vel recentes, fi harum eft facultas: vel ficcæ, fed industria humectatæ. Recentes quidem, denfæ, stylo confixæ, poftea igni lento coctæ, quantum fufficit: aqua deinde expreflæ, vno die fuper tabulam ficcantur, poft mulla biduo macerantur, igni lento percoquantur, vafe vitreo reconduntur, poft fex menses utendæ. Si verò ficcæ sint, aqua fub Sole dies octo macerentur: deinde in dolio, vel alio vafe magno vel foffa in arenis humidis tertio quoque die mutandis fecretas, identidem aqua irrigabis, donec tumefcant: reliqua vt prius perfequere. Emblica parum frigent, ficcant ordine primo, pituita etiam petri ventriculum purgant, eumque & cerebrum, nervos, cor, hepar, & partes laxas constringendo roborant: ob id tremori cordis conferunt, appetentiam inuitant, vomitum fiftunt, furorē & larratus eius cohibent, vim animæ rationalem augent, calorem uifcerum infigniore, & inde natam fitim, extinguunt. Præftantiores funt magnæ, carnis multæ, denfæ, graues, offium paruorum. Tardius purgant, & rugis uentriculo minus incommodant, fi aqua in Sole macerentur, donec humectatæ tumefiant. Poftea expreflæ mulla biduo macerantur, igni lento coquantur: ubi coctæ refrigerint, mellis albiffimi parte quarta exceptæ reconduntur. Aromatibus quoque, cinnamomo, xilaloë, cardamomo, croco, gallia, & fimilimus nonnulli condiunt. Eæ etiam lacte manè & vespere mutato, macerantur triduo, ficcantur uento, & in umbra, & reconduntur. Bellerica etiam funt benignæ, & roborant: frigida primo gradu, ficcæ fecundo, cæterà Emblicis viribus proximæ. Optimæ funt magnæ, multa & denfa carne, graues. Conditarum vires Mefues alibi persequitur, his verbis. Cepula Myrobalani Conditæ Stomachum & ventriculum firmant, appetentiam inuitant, coctionem promouent, rationalem animæ partem vegetam reddunt, & fenfificam: quapropter vifum quoque clariorem, & ufu crebro iuuentutem tuentur. Accipientes verò funt ex ficcis recentiffimæ, & iam præfcripto modo præparandæ ad condituram, fi recentium non fit potestas. Hac etiam arte, quæ prius Myrobalanos condiendi tradita eft, poffis quoque alios fructus ficciores condire & recentibus fimiles reddere. Vna manè ieiuno dati potest fingulis aliquot diebus. Placent enim fapore aultero, & per condituram dulci, & nonnihil aromatico. Quæ autem recentes funt conditæ, funt præftantiores: ac diutius feruantur, quam poft humectationem conditæ, vt cenfet Sylius. His fubstitui poffe idem putat, ex noftris fructibus non paucos, vt Oliuas Colimbades, Noces conditæ, Perfica Corboliana, Cydonia condita, Pruna damascena & Iorrana, & dactylia dicta, quæ fi condiantur, inquit, eadem præftare poffunt: de qua re iudicent periti. Emblica Myrobalani, eodem Mefue tradente, conditæ uentriculum roborant, eius substantiam & facultatem contrahendo, & intemperiem humidam corrigendo. Darur

vna femel tota diebus aliquot, ut fuperior. Non tamen his adeo fidendum cenfet Sylius, vt opinione magis quam veritate adducti eas tam faciamus, vt ægros, quantumuis opulentos, fumptu parum necellario oneremus magis, quam proficiamus aliquid. Quam fim uerus, inquit, iudicare poffunt qui ufu harum admodum profecerunt. His autem fi utendum fit, mallem confulas accurate probare, quam dentibus parum probè commanfas deuorare, ne fua dura substantia uentriculum lædant, & coctioni fux diutius refiftant adeo, ut ne horis quidem quatuor (quantum tempus harum coctioni tribuere folenne eft) percoqui poffint, & forfan vix femicoqui.

Porro in iunioribus medicis quemadmodum & Aëtuario illud quoque fortè reprehensione non careat, quoddam Chebulas tantum phlegmagogas, Citrinas cholagogas duntaxat dicunt: ex Serapionis etiam & Auicennæ fuprà citatis verbis facile refelluntur, qui promiscuæ facultatis catharticæ ditertis verbis meminerunt.

Sed Aëtuarium quoque ipfum & vnum inter Recentiores de earum viribus tradentem confuli patet. Perquam mediocriter, inquit, aluum ciunt Myrobalana: trita duabus aut tribus drachmis repurgant: peculiariter fuperuacuum capitis humorem exhauriunt: Flaua bilem flauam: atra nigram detrahunt: quemadmodum pituitam Cepula. Stomachum autem & Interanea, fua infidente adftrictione firmant, fed vifa multò magis & elura: quæ de caufa magnam purgantis facultatis iacturam faciunt, quoddam tenuioribus & ficcioribus conftent particulis. In quibus itaque decumbens fluxio partem aliquam fatigat, aut inteftina exulcerat, hæc tofta & elura repræfentamus, & mediocriter inteftina fubducunt. Eandem vim Emblica fortiuntur, vnde hæc omnia mifcentes genera, Sapienter barbarorum medici paruam triphalon adpellatam ex ipsis componunt.

Gabr. Tholloprius tractatu de medicamentis purgantibus fimpl. in genere de his hæc habet. Myrobalani in officinis funt in vfu vel quales funt, vel conditi. Verum Auicenna non condit omnes, fed Emblicos & chebulos tantum, qui etiam nunc conditi folent: Condiuntur & alij. fed precipue illæ duæ fpecies, & ratio eft: quia bene condiuntur, cum habeant multam carnem: alij verò habent parum carnis: ideo non bene. Condiuntur autem vel virides, vel ficcati: virides conditi non deferuntur ad nos: ficci verò poffunt conditi eo modo, quem docet Mefues. Illi qui redeunt ex Alexandria, dicunt, quod antequam condiantur, macerantur aqua faponis, & hinc moti aliqui nolunt vnquam vti Myrobalanis conditis, quoniam, dicunt, ratione illius aquæ faponis, amittere totam fuam vim. Sed fiue macerentur aqua illa, fiue non, quod nescio, nec volo inquirere: video quod habet fuam vim, nam obferuo quod fi quis vtatur frequenter ipsis, ficcatur optime caput, & reperio in ipsis aftrictionem, qualem in ijs, qui non funt conditi. Ac ideo confulo vobis, vt quando volueritis roborare, & ficcare caput, exhibeatis pluribus diebus à cibo vnâ Myrobalanum conditam: cum verò volueritis magis euacuare quam roborare, exhibeatis vel infufionem, vel decoctum, vel substantiam Myrobalanorum: verum tamen eft quod nunc non eft in vfu ex hibito ipforum in substantia: & nifi mifceant cum aliquo pharmaco, in cuius compositione ingrediatur, vt in Electuario Indo, & fimilibus, nunquam medici vtuntur ipsis in substantia: & rectè faciunt quia nimis aftringunt, & ideo vtuntur vt pluri-

Cautio.

Affe.
Pulvis.Cepula con-
dita.
Condiendi
modus.Sicca Græ-
dicenda.

Emblica.

Delectus.

Emblica cō-
dita.Bellerica.
Téperam.
Delectus.Cepularū
condita-
rum vires.
Ratio.
Sensu.Pecendi mō-
dus.Succeda-
na Myro-
balanodes.Emblicarū
conditarum
vires.

Cautio.

Taurum
gaurum
medicam
error.ad elura
aftrictionem
runt.Perna tri-
phalon.Myrobalani
conditi.Condiendi
modus.Roborans
caput.

Vfus inf.

plurimum eorum, decocto, vel infusione utuntur, inquam, ad euacuandos varios humores, nam Emblici euacuant bilem, Chebuli pituitam. Sunt etiam in usu apud recentiores ad conficiendos siropos quosdam pro morbo Gallico, quia refrigerant, roborant & euacuant: & reuera optimi sunt si morbus Gallicus sit in principio, & nondum fixerit radices.

Er, subdit, Myrobalanorum omnium vires sunt, quod omnes sunt frigidi in primo gradu, & sicci in secundo: & si dicere in quod in siccitate excedunt secundum, non errarem: quia dum ipsis utor in affectibus oculorum & in malignis viceribus video maiorem siccitatem quam possit provenire ex secundo gradu. Vnde dicere, quod omnes Myrobalani frigidi sunt in primo gradu intenso, & sicci in secundo intenso, vel in tertio incipiente: exceptis tamen emblicis, quos Mesues dicit refrigerare, & siccare in primo tantum gradu: sed intelligatis in primo admodum intenso. Myrobalani omnes astringunt validissime: & ob id ego soleo ipsis uti foelici cum successu in defluvio capillorum, quando opus est astringere & roborare cutem, quod est post euacuationem humorum illorum acriorum, atque illarum fuliginum. Incommodum primum, quod est in usu Myrobalanorum est, quod obstruunt vias, & meatus etiam illos, qui bilem deferunt: & idcirco non sunt exhibendi illis, qui sunt obnoxij obstructionibus: corrigitur autem hoc incommodum admixtis aperientibus, acris, & diureticis, ut ait Mesues, ut sunt semina odorata. Corrigitur quoque & auferitur hoc incommodum, si nos non exhibeamus substantiam Myrobalanorum, sed eorum decoctum, vel infusionem. Alterum incommodum, quod habent, est quod harent ventriculo, ita ut non possint descendere. Tertium est, quod corrugant substantiam ventriculi; quae duo incommoda corrigetis per pingua, inungendo sc. Myrobalanos ipsos oleo amygdalarum dulcium, vel butyro, dum atteruntur & comminuuntur; vel miscendo cum ipsis passulas aut Cassiam fistulam, ut dicit Mesues.

Alit Porta Neapol. nouo suo Philosophandi aucupio, Myrobalanorum diuersam purgandi vim ex ipsis coloribus depromit: Myrobalanorum inquam fructus quosdam luteos vel herbaceo colore flauescetes accensam bilem e corpore deiecit: sic qui atrii sint, ad atram bilem dururbanam efficacissimos: Genus Empeliticum albicans pituitam trahere: Chebulas vero ex fusco rufescentes sanguinem ex melancholia repurgare. Similiter, inquit, Myrobalani quia cor referunt, & eidem conferunt. An vero color & figura sint illarum virium causa, & an suos effectus praestent quatenus vel alba, vel hoc aut illo modo figurata iudicent Philosophi.

Amarus scribit, ossa chebulorum valere vice Spodij.

Maranth. Meth. cognosc. simpl. l. 3. c. 7. paucula haec habet. Omne Myrobalanorum genus post longam macerationem pharmaceutici quamplurimi diutius coquunt, ita ut non solum purgatricem vim in terreis eorum partibus fundatam in decoctum deducant: sed eam rursus nimia ad ignem mota deperdant, dumque laugate corpus credunt, illud potius adstringant.

Porro Myrobalanorum preparationis modus, ut scribit Garcias, apud Indos non inualuit, utpote qui ita non utantur purgationis duntaxat gratia. Nam si purgare velint, eorum decocto utuntur, & maiore dosi, quam nos in Europa. Solent au-


tem iis saccharo conditis uti magno cum successu, nec quisquam medicorum vni istorum famam unquam est periclitatus. Idem stillaticium liquorem ex immaturis elici iubet, quem post sumptam aliquam conferuam adstringentem propinat, & syrupis admiscet, si quando opus est. Flava & Bellerica praescribere solet initio mensis, iis qui aut alui profluvio, aut stomachi relaxatione laborant. Talibus enim conuenit huiusmodi cibis propter adstrictionem cum pauca aciditate coniunctam. Praeterea immaturorum Myrobalanorum succum, in alui profluvio apprimè efficacem esse, experiri se testatur.

Aqua stillat. Myrob.

Alui profluvium.

MYROBALANI SPECIES RAVWOLFIO:

CAP. XIX



Hic fructus Descriptio
qui Myrobalani speciem quandam prae se ferre videtur, aequat magnitudine & forma Oligani Hispanica, aut gladem quernam magnam, coloris buxci, verrucis raris asperatus, alioqui laevis, nonnihil canulatus, spiritus circularibus praecinctus; quae arbori suae harsit, calyculi vestigium, ut in Dactylis ostendit. Fragili huic cortici sub-

est caro fungosa (vetustatis, uti videtur, ratione) sapore amariante, ossi aspero & canulato adherens. Nucleus osse continetur magnus, ut in Myrobalanis Bellericis, utrinque turbinatus, canaliculatus, amygdalini nuclei consistentia, pinguis, coloris melini obscuri, pellicula intectus albicante. Hunc fructum dono acceptum a D. Ravwolfio, inter alia nostra naturalia custodimus, de quo ad nos scripsit: Arborem videre sibi non licuisse, reperiri in in Palestina, quosdam censere Myrobalani speciem esse. In hac eadem tabella habes & Fagaras iconem, de qua agimus lib. sequenti.

Sapora.

Nucleus.

MYROBALANI FACIE FRV-

CTVS INDICVS.

CAP. XX

Ex tunc facie ad Myrobalanum quodammodo accedere videbatur. Magnitudo est penè Nucleis iuglandis, figura, quali Myrobalanus Bellerica, aut Ficus, aut Pirum, sed paulo ventriosior, angulosus, colore ex pullo rufescente, ea parte qua adhaeret in turbinatam apophysen extensus. Pondus leue satis, substantia carnosa fere, colore cinereo, nullo sapore manifesto praedita. Quid in eius visceribus latitet, nescimus, cum sationi destinaverit Ill. Ducissa Wirtembergica, cum alijs quibusdam exoticis, quae hunc fructum alioque

Locum.

etiam pro descriptione & pictura gratiose nobis commodauit.

MYROBALANI VRENTES.

CAP. XXI.

Descriptio. *Aretca.* In Insula S. Marię proueniunt etiam pulcherrimi Myrobalani, quos Aretca vocant. Obscurè rubent, & lapideam continent insignem. Gustati linguam & fauces adurunt, in modum vt Piper. Linichott. Bry fratres in tabulis æneis Hist. Indię Orient. magnam Myrabolani, Aretca dictam vocant, quæ in dicta proueniat insula. Proponunt eadem pagina plures Palmas, sed paruis iconibus, similes maiori iconi quam exhibuerunt pag. xi. nomine Arequeira & Aretca; unde nobis suspicio oborta, an fortè aliqua species Palmæ Myrabolani feræ, cuius Plin. meminit, esse possit. Vtinam essent qui eadem cura vegetabiles hos Indiæ thesauros perscrutarentur & obseruarent quàm mineralibus vita carentibus inhiant, magno vitæ suæ (& vtinam non melioris) dispendio.

*As Palma
Myrabolani
feræ Plin.*

MYROBALANO CITRINO ALIQUOMODO SIMILIS FRV- CTVS CAVVS.

CAP. XXII

Descriptio. Apud Chariff. fratrem C. Bauhinum vidimus Anno 1650. fructum cui aliqua similitudo cum Myrobalano citrino, vnciam tantum longum: parui Pyri modò formatus, parte vna latiore, altera angustiore: in eo costæ notabiles sex, interpositis quibusdam aliis minoribus inæqualibus, acicul: perforauimus, cauus compertus est. Color sordidus cum vitore.

FRVCTVS PENTAGONVS VEL OSSICVLVM.

CAP. XXIII.

Descriptio. *Nucleus.* Fructus Pentagonus à Paludano datus (Clus. Exot. Lib. 1. cap. 10.) veriùs Fructus ossiculum dicendus, vncialis longitudinis, quod ex quinque veluti oblongis tessellis compactum, quibus subleuatis, longus nucleus in singulis apparebat, sed inanis & membranaceus duntaxat: totum ossiculum tuberculis inanibus erat oblitum. Illud vnicum habebat, & quidem vetustate quasi attritum.

MYROBALANI NIGRI OSSICVLO, NON VALDE DISSIMILIS FRV- CTVS EXOTICVS.

CAP. XXIV.

Descriptio. Myrobalani nigri ossiculo non valde dissimilis fructus (per Batavos relatus in prima nauigatione in Iauam) maior tamen, inæqualis, suo externo cortice (si quem habuit) aut pulpâ nudatus, & duntaxat, vt mihi persuadeo, fructus alicuius ossiculum, quod contractum satis crasso putamine præditum esse obseruabam, & nucleum continere subsuscum, atque in binas partes diuisum. Clus. Exot. lib. 1. cap. 5. Quale sit ossiculum Myrobalani nigri nondum nobis constat.

MYROBALANI OSSICVLO SIMILIS ANGVLOSVS.

Ossiculo Myrobalani, inquit Clusius Exot. lib. 1. communicatus fructus neque magnitudine, neque etiam forma dispar cum suo ossiculo, ab vna parte hexagono, vel heptagono, neruis oblique per vniuersum dispersis: is autem nigra cute veriùs quàm pulpâ rectus erat, acidi saporis: Ossiculum autem duro putamine constabat, in quo nucleus ex rubro fuluiscens, non insipidi gustus, sed Amygdalam dulcem vetustam referentis.

*Amygdala
saporis.*

NICARAGVÆ POMVM, NVCE ROTVNDA.

CAP. XXV

In Nicaragua, inquit Benzo, noui orbis prouincia, Pomi quoddam genus peculiare est, neque Hispaniolæ neque vlli alteri Indiæ parti concessum. Piri nostri specie ferè est, ligno interiore rotundo, Nucis crassitudine, & dimidio amplius, optimi & iucundissimi saporis. Arbor procerâ, exiguis foliis vestita. Pomum Nicaragua vocant: alij Nicaragua.

*Descriptio
fructus.*

Arbor.

COLA FRVCTVS AD SITIM.

CAP. XXVI

Anonymus quidam ad tabulam Cosmographicam scribit: Fructus qui Cola dicitur, si manius in ore detineatur, sitim restinguit, & impositus aquæ, gratum ei saporem indit, & sanos valde confortat, atque stomachum corroborat. Imò literis proditur, quod si puluis ex hoc fructu confectus, putri ventriculo gallinæ aut alterius cuiuspiam volatilis inspergatur, putredinem discutit, & pristinam ei qualitatem restituit.

Oleum inde destillatum & Santalis mixtum, febricitanti, si eo inungatur, intra horas duas vel tres sanitatem confert.

Legimus præterea in descriptione Guineæ, in regno Congi esse arbores, quæ fructum producant Cola dictum, Nucis Pinæ magnitudine, continentem alios fructus Castaneis similes: quibus quatuor rubri siue incarnati nuclei continentur, quos dentibus terunt, ac in ore versant, extinguendæ sitis gratia. Fructus hi in aquam coniecti eandem aciescere faciunt, ac amarescere palato: stomachum roborant, iecurque corruptum probè emendant.

Sitit.

Stomachus.

Mirum.

*Oleum ad
febrem.*

Sitit.

*Iecur cor-
ruptum.*

DE CORNO.

CAP. XXVII.


Cornus sativa, seu domestica.

APrunis & Myrobalanis haud insubidè natisimus ad Cornos & Cerasos, quæ & ipse carni inclusa putamina, & in iis nucleos edules magna ex parte habent.

Arbor procerâ satis est Cornus, & multistramis brachiata, cortice subrubro vel cinereo, materie alba, firma, solida & dura. (corticem scæpru. n. & adstrin-

Descriptio.

Materia.



adstringentem valde dicit Marth.) Flores primum omnium profert, in ramorum surculis extremis insidentes, numerosos, brevissimo pediculo appensos, e quatuor foliolis extrorsum purpurantibus vel in ora, alias subluteis, intus conuexis, luteolis: intra quae alia concoloria foliola, incerto numero, teneriora & minora ex quorum

concursum apices attolluntur octoni, noveni, deni, hirsuti, qui in quaterna crocea foliola explicantur, staminula exigua lutea continentia. Subsequuntur fructus oblongi, ad Olium accedentes, graciliores, primum virides, postea rubri, sanguinei, maiores, manus purpuram rutilam inficientes contriti, forma sua ad liliubas accedentes: gustu primum acerbo, at ubi maturatione remollita fuerint, acido dulci & suavi cum quadam tamen adstrictione, ossa continentia oblonga, teretia, qualia ferè in oliis, durissima: in quorum angustis cavitatibus nuclei latitant exigui, subdulces, graciles, quique vix integri eximi queant. Folia, qualia uirga sanguinea, [Coronae Trago.] Videntur in icone paulillo angustius picta esse. Reliqua pulchre expressa.

Theophrasto Cornus [καρνία] quaedam mas: quaedam femina, quam & *Δαυαρηνία*, id est, Cornifemina [Gaza feminicornum vertit.] vocant. Folium habet Amygdalo [Ἰχθυόειον] simile, quod dicitur *ἀμυγδαλέοις*, habet textus, quem & Gaza sequitur; Dal. vertit utriusque folium Malo, aut vulgaris aut Cydoniae ex Marthiolo] simile; nisi pinguius crassiusque esset, corticem nervosum, teretem: caudicem haud admodum crassum. Stolonem [ἰστίον] profert femina sicut Vitex, [de utriusque hoc dicit Dal.] quae fruticosior est. [Dal. femina quamvis fruticosior, maiores.] Vtraque habet, sicut Vitex, geminos, & ex aduerso collocatos. Materies maris exore, totaque solida, cornibus spissitate firmitateque similis. At feminae materies medullam habet, & mollior est, atque canatur, ideoque ad iacula [ἰστίον] inutilis. Maris altitudo duodecim ad summum cubitorum, quanta nimirum sarissarum [σαρίσσος], quamvis *καρνία* in vulgaris legatur] Macedoniae [quam vocem de suo addit Gaza] longissimarum. Nunquam enim totus caudex altius assurgit, [ἡ δὲ καρνία ἐλάσσοις, ὅτι ἐν ἰστίον, habet textus: legendum, ut uult Dal. ἡ δὲ καρνία ἐλάσσοις &c. ὅτι καρνία corruptum est in ἰστίον.] Quae Idam Troianam incolunt, Matrem sterilem dicunt, feminam verò fructiferam. Nucleum fructus Olium similem continet, gustu dulcem & odore: Florem Oleum similem habet, & Floret (pro *ἀνθή*, *ἰστίον*) fructumque fert eodem modo, ex uno pediculo plura Corna proferens, atque eodem ferè tempore, quo Oleum. At Macedones ambas fructiferas affirmant, sed feminae fructum haud esse esculentum. Radices Viticis modo, validae & incorruptae.

Idem Theoph. feminae fructum insuauissimum, (*ἀσπέρ*) lignum insitum fungosumque dicit: tanta est inter ambas differentia, cum mari firmissimum sit: quae tamen postrema verba vel de suo addit Gaza, vel ex Plinio, nec in Graeco extant: nostrae tamen bene conueniunt, ut ex natura ipsa de promptu illa verba videatur, & nostram matrem exstimescere. Sed & in praecocem ac serotinam distinguit Theoph. hancque quibusdam feminam dici ait, & post autumnum deum fructum perficere, quem modò ex eodem insuauissimum &c. diximus. Addit Theop. eodemmet cap. Corni feminam fructum inguitabilem cunctis animantibus gignere, de qua re in viribus. Quae verò ratione Cornus omnem respuat cultum, & vel negligi desideret; cum siluestris lapidiore inuitioreque proferat fructum, ex eiusdem Theoph. sententia, inferius tradetur.

Cornus ex sententia Diosc. [καρνία] arbor est fortis. [ἀσπέρ] fructum ferens Olium modo, oblongum, primum quidem viridem, deinde per maturitatem flauum aut cerinum. [καρνία ἢ καρνία: alii καρνία ἢ καρνία, croceum: Lacuna legit in vetusto codice *ἰστίον*: & rectius, atque ad rem accommodatius.] esculentum, adstringentem &c. Plinius sane Corno feminae sanguineum tribuit. Homer. *Ἰλιάδ.* *καρνία* *καρνία*, corticem Cornum vocat, quae inter se quatit extensos ramos sono, nec sine fragore frangi Euro Notòque in montium conuallibus inter se concertantibus ipsamque concurrentibus.

Ferre Pirum & Prunus lapidosa rubescere Corna. Et Aneid. 3.

Fortis fuit iuxta simul, quo Corna summo Virgulta, & densis hastilibus horrida Myrtus: Accessi, viridemque ab humo conuelleret siluam Cernus, ramis tegerem ut frondibus aras.

Quid autumnalia Corna. Horat. Rubicunda Corna: & alibi siluestria Corna. Eiusdem meminit Colum. traditque Arbutum gallicum desiderare arborem humilem nec frondosam, cuiusmodi sit Oplus, arbor Corno similis: quinetiam Cornus. Et Plin. Cornus circa solstitia reddit primo candidum, postea sanguineum fructum. Ex eo genere femina post autumnum baccas fert acerbis, & inguitabiles cunctis animantibus: (quod de sequentis capitis corno femina, si modò ea Plinij sit, intelligi debet) ligno quoque fungosa & inutillis, cum mas è fortissimis quoque sit, tanta differentia ab eodem genere sit. Item: ab his, quibus spissa est firmitas, proxima est Cornus: quanquam non potest videri materies propter exilitatem.

Corna & Cornus Gal. *ἰστίον*, Cerasa Italica, Cornus Indica Trago. Corni, addit idem, in Germania nostra vnum duntaxat genus habemus, nempe id quod fert rubras baccas: quae Cereos ferat fructus haudum vidi.

Vera autem Cornus, autore Cordo, duplex est: Siluestris & sativa. Vtraque in Germania nascitur. Nascitur siluestris Cornus pinguibus montanis locis. Distinguitur etiam alio modo, siquidem altera mas, altera femina existit. Mas apud nos (in Germania) montibus familiaris: quinetiam in hortis seritur. Statim Veris initio flores lutei coloris producit. Femina etiam in plana descendit: florem in pallido candicantem serius emittit, & serius fructum percoquit. Inuenitur femina Cornus, quam Graeci *καρνία* vocant, plurima inter Danubij Vuerdam oppidum, & Augustam Vindelicorum. Cornus femina, masculae Corno per omnia similis est: distat tamen ab hac, caudice minus procero, minusque recto flore racemo-

Præcep.
Serotina.

Fructus inguitabilis.
Corna.

Diosc. emend.

Synonyma.
Lapidosa
Corna.

Autumnalia
Corna.
Corna rubicunda.
Corna siluestria.
Corna sanguinea.
Fructus.

Thibi crania.
Corna indica.

Discretio.
Locus.
Siluestris.
Sativa.
Corna mas.
Corna femina.

Locus.
In quo differat mas & femina.



Gallis, vt refert Ruell. Corna cum ematurue-
sunt in lagena patentissimi oris facis leuiter &
laxe componuntur, ne collidi possint: deinde ad
fauces vsque commissa vinctis surculis sic trans-
uersis arctantur, ut modice Corna comprimant,
nec patiuntur ea, cum acceperint liquorem, sub-
leuari: quamoprimo & liquidissimo melle, vel vi-
cario eius saccharo, vas vsque ad summum ita re-
pleatur, vt Corna submersa sint. Hæc ratio non
solum ea custodit, sed etiam liquorem mulsei sa-
poris præbet, qui sine noxa possit interdum da-
ri febricitantibus, præsertim si ventris profluui-
o simul corripiantur: suoque subacido gustu, & pala-
tum inuitante morosam abigit malaciam. Possunt
etiam torreri, vel sale Conditi sicut oliuæ, qua
de re vide Columellam. Quidam saccharo &
melle condiunt Sicut Cefara & Pruna siluestria:
quo pacto parata & esitata dysentericis magno-
pere prosunt. Et iam officinis quibusdam in usu,
ea saccharo condire. Diligentiores etiam pul-
pam ex iis conficiunt & in Electaria concinnant
dysentericis expetitiuissima. Cornar. tradit mutia
condita ad assatas carnes in mensa poni, velut oli-
uæ colymbades. Fit & sapa ex iis quemad. ex Ce-
ralis ad prædictos usus & ad opsonia. Item ad fe-
bres, ad fluxiones biliolas, ad sitim, ad excitan-
dam appetentiam. Quis & ex eorum decocto &
saccharo ut tradit March. liquor, ignis opere & co-
ctura concreuit, coagulaturque, qui præterquam-
quod gratissimo placeat gustu, datur vtiliter dy-
sentericis, ac fixumis mentium profluuiio labo-
rantibus.

Alui pro-
fluui.Malacia.
Cornar.
sapa.Flect. ex
pulpa.

Sapa.

Dysentria.

Vinum red
Cornar.Elect. parat.
de modis.

Cornelina.

Emplastrum
ad vomitum
& menses
alui fluxus.
Cautio de
morsu à ca-
nibus.Observatio-
nes.Sunt Ci-
bor
Ligni vsus.

Ex Corni fructu fit & vinum, hoc pacto. Acci-
pe vini rubri adstringentis lib. C. cornorum ma-
turatorum lib. x, aquæ chalybeata lib. xii. Commi-
scentur omnia in vase ligneo mundo, stent dies
quindecim: postea in aliud vas defundatur vinum
cuius nobilis efficacia in omni fluxu.

Electarium verò ex iisdem sic fit à pharmaco-
polis. Cocta corna per cribrum cernunt, pulpam
cum saccharo recoquunt, quo modo cydoniarum
fit, vocantque *cornelinam*, cuius usus in alui flu-
ore.

Corna sicca contrita, & cum oleo Myrtino
aut omphacis mista in Emplastri formam, præ-
senti auxilio sunt ad vomitiones, ventriculo im-
posita contra fluxum autem alui, abdomini in-
ducta: contra menses immodicos, pectini &
coccygi applicata.

In Hæturia abstinent demorsi à cane rabido
per integrum annum à quorundam lignorum con-
tactu, præsertim corni arboris & sanguineæ virgæ
vocatæ: siquidem (vt testantur ij qui rem experi-
mento compertam habent) si harum virgæ ram-
dia manibus teneantur, quosque concalescant,
illico demorsi rabie exagitantur. Memini, inquit
March. me vidisse in ciuitate nostra Ilcinensi, a-
micum quendam meum rabie correptum, quod
corni arboris virgis, lanam diu excussisset, qui
eorum oblitus, quibus sibi à medicis interdictum
erat, rabidus interiit.

Fructibus etiâ corni, qui ad Mosellam & alia in
quibus hæc arbor luxuriat loca incolunt, suæ sa-
ginare consueverunt, teste Trago.

Materies validissima Theoph. censetur vt ante
citatum ex l. 3. c. 12. vbi dicitur, id est iaculorum
meminit. Gaza vertit venabula, vsus voce Plini-
ana, qui l. 16. c. 39 sambuco attribuit quæ The-
oph. de corno dixit, vt, fusiùs dicetur l. 5. in
historia sambuci. Cornus igitur propter validita-
tem iaculis expetita Scaligero: & pistrinarijs fa-
bris ad parandos rotarum dentes. Virgis Lanis-

ces ad contundendas lanas vtuntur. Bizantii mul-
tæ officinæ eorum, qui tornant manubria pro se-
curibus & alijs instrumentis corni ligno præ alijs
scatent, quod durius omnibus alijs lignis perhibea-
tur: Hocque ligno quemad. & Asphendani onustæ
naues aduchuntur Bizantium in prædictos & alios
vsus, ex regione Mengrelia, vt refert Bellon. vin-
de patet etiam in ijs locis hanc arborem plurimâ
abundare. Corni lignum, autore Plinio, non aliò
pene, quàm ad radios rotarum, vtile: aut si quid
cuncandum sit in ligno, clausis figendum ceu
ferreis. Inter Adagia celeberris est Gordij nodus,
quem & Gordonium nodum vocant, Hic autem,
autoribus Arriano & Plutarcho, ab Alexandro
magno solutus è corni arboris libro, quamuis alijs
enle dissectum scribant. Vt verò vult lo: Baptiste.
Porta quæ corni bacce per maturitatem rubescunt,
dysentericis valent, & muliebrium mensium excres-
centiis, & albæ bacce ad rubra profluuiâ.

Gordianus
nodus corni
cuius solus
est.

CORNVS FOEMINA, PVTATA VIRGA SANGVINEA.

C A P. XXVIII.

EX Fruticum familia est, quam Cornum femi-
nam vulgò appellant, multis stolonibus luxuri-
ans, ramis plurimum oppositis, cortice spadiceo,
sed ramorum sanguineo, odore vinoso prædito,
materie alba & dura. Folia ad corni fasciâ quan-
proximè accedunt, attrouientia, nonnunquam
rubore asperso, bina ex opposito nascentia. Flo-
res in umbella gerit odoratos, candidos, quatuor
foliis radiatis constantes: in medio oblique sur-
gunt totidem eiusdem coloris stamina, stilo recto,
subuiriidi. Bacce Hederaceis vel iuniperinis præ-
res, sanguineis petiolis appensæ, primùm vitiles,
per maturitatem nigricant, latuna in umbilico
parua perforata, in quibus osliculum pulpa turren-
te, acerba, insuauis, nec sine amarore immersum,
striatum, nucleum continens album, amarum. Li-
gni materies, autore March. dura ossæque, corno
ininimè cedens, virgis corno tenuioribus, robustis,
nodosis, cortice sanguinis modo rufescente.

Descriptio.

Folia.

Flores.

Fructus.

Osliculum.

Materies.

Cassalp. fructus niger, ut in ligustro rotundus,
osse binas cavitates habente in quibus singula se-
mina continentur.

An fructus
niger rotundus
velutum.

Si hæc *luxuriaria* Theoph. seu cornus femina e-
ius & Plinii, huc pertinent quæcunque superiori
capite de ea tradidimus. Sed an reuera ea sit, ad-
huc sub iudice lis est: uti patebit ex autorum co-
trouersia. Satis accedere videtur his notis. So-
rò fructificat: fructus insuauissimus & inguitabilis:
caudex non admodum extat: stiones graciles ha-
bet sicut vitex & potius frutex est, quàm arbor.
Quas omnes notas Theoph. suæ Corno femine tri-
buit: Sed & nodos hæc habet, quos vtrisque cornis
còmunes esse ait idem autor. Repugnat verò quod
corniferæ Theoph. lignum infirmum, fungosum,
& medullam habens tribuit. Huius verò lignum
æquè durum ac firmum sit, ex multorum autori-
tate, quàm corni maris. Sed hanc difficultatem
diligentiores aliquando noua quadam obseruati-
one conciliabunt.

Nihilò certius constat, an sit Virga sanguinea
Plinii. Tam pauca enim de sua Virga sanguinea tra-
dit, vt Oedipo ferè opus sit ad explicandum quæ
describat. Imò si verum fateari velintus eam nec
describit quidem. Hæc enim de ea tradit, Nec vir-
ga sanguinea felicior habetur. Cortex eius interi-
or.

An Virga
sanguinea
Plin.

Sanguinea fruticosa. rior, quæ præstare, [celerius quam opus esset] aperit. Ideo sanguineum fruticem alibi vocat, & de eius usu ac viribus diversis locis agit, quæ infra trademus in viribus, ne ordo noster interrumpatur.

Terragonia Dalech. Dalech. annotat, sanguineos frutices Plinij Terragonias esse Theoph. quas Gaza Quadrato-
Dalech. nas vocat: & addit, sanguineam virgam Plinium appellare. Quæ verò ratione Dalech. dicat, fruticem sanguineum esse Terragoniam Theophrasti, nondum agnoscimus, cum docti aliam iudicent Terragoniam ab ea de qua dicitur cap. de Eponymis.

Opulus Colum. An sit columella Opulus, ut olim existimavit Dod. considerandum sanè quæ de opulo pauca tradit Columella, & præcedenti cap. à nobis citata sunt, non malè videntur Virgæ sanguineæ competere. In historia Aceris & alia de opulo opinio trade-

Synonyma autem. Bellonius eandem plantam Cornum feminam, Virgam sanguineam & sanguineos frutices videtur indicasse, quando ita scribit: Arbor quam Mædones olim cornum feminam nominarunt, quam Galli nunc Latinos imitantes Des Sanguinis vocant, in monte Castagna inter urbem Philippi & Bucephalum nunc *Cavallam* dictam, sita, non multo minores proveniunt, quam magnæ nostræ corni mares.

Cornus. An Corn. apud Diosc. hanc intelligit, cum ait: Cornum feminam esse puto, quam Germ. Faulberbaum & Faulholtz vocant, quidam etiâ Spindelholz. Sed forte Cornar. contendit duas diversas plantas, aut saltem distinctarum nomina. Spindelholz enim Germani de Eponymis dicunt: Faulberbaum verò de Alno nigra.

Apud Cordum in Diosc. quidam hæc annotavit: cornum silu. aliqui interpretantur Faulholtz / Faulbaum: sed in aliis locis alios frutices alii.

Cornus femina. Cornus femina, inquit Ruell. dumetis & nemoribus familiaris: sed quod neglectas & inopinatiles ferat bacca, indignam quæ Corni nomine vocaretur, rura putaverunt.

Sanguinea. Matth. vero, Cornus, ait, haud absimilis est planta, quam in Hæturia à sanguineo virgarum colore vulgari idiomate vocamus sanguineæ & sanguineæ. Sunt qui velint Cornum esse feminam, sed non video [inquit] quibus argumentis hoc probare nitantur: Virgam sanguineam esse Plinii non aulim affirmare.

Non esse Cornum feminam. Et alibi scribit: sanguine in Tuscano, multis Cornu (Cornus femina) quorundam falsa opinio. Et in Germ. Hartriegel quidam vocant Pseudocraniam, alii offram: Plinius est Virga sanguinea, Corniola.

Celestium. Nonnulli Germanici rationem reddunt Tragæ, quia (inquit) fruticis hinc liquor, maxime cum apud fuerit, securi & cæteris, misce in modum sanguinis, idcirco apud Germanos id nomen sortitus est, ut Hartriegel vocaretur, licet ea appellare lignum quoque à nonnullis tribuatur, sed perperam. Quod si hic frutex arborescens hinc folia non amitteret, vocarem illum Celestem Germanicam.

Cornus. Galenus rursus & Cornum feminam, & Virgam sanguineam Plinij diversis locis dicit, caprilique gratam, unde nomen sit apud Gallos. Sanguinea Italæ. Post Hartriegel. Pseudocrania Cordi, id est, falsa Cornus. Querendum monemus hæc sit arborescens seu frutex, quem à ligni districta Germ. Hartriegel appellat, addens Plinio virgam sanguineam esse & ex aliis Cornum feminam cornum, sed cum mox cap. 30. aliam Cor-

num feminatam describere, cuius ipse Iconem apponat. At verò ea icon quæ ex Trago apposta est Cordi nobis neutiquam videtur respondere descriptioni Cordi.

Lonicero, Cornus silu. Spindelbaum Faulbeer / Cornus femina: Item alibi Hartriegel, potest dici offea. Sed malè idem duas ponit figuras & duobus locis diversis de eodem frutice agit.

Euchar. Rossin in suo Herbar. scribit Phillyreæam Diosc. existimari à nonnullis Hartriegel. Intelligit autem Cornum feminam: quo nomine vno loco depingit, & altero sub titulo Spindelholz / Faulbeer / cornus silvestris.

Dod: hist. Gal. Cornetier sauvage Gallis: Theoph: *Opulus*: Lat. cornus fem. Colum. Opulus: quibusdam Brabantis, Wilden Uier / id est, sambucus silu. ita dicta, quia nuper natos ramulos plenos medullæ habet, ut sambucus. Item: Virga sanguinea, ab Ital. dicta sanguinea, Sanguinella. Petro crescentio *Sanguinea*: Bel. Wilde cornetier, id est Cornus silu. Videtur Theophr. Cornus fem.

Valerius Cordus *Pseudocrania* facit, inquit idem Dod. id est falsam seu spuriam cornum. Nobis verò non videtur Pseudocrania Cordi, licet eum Dod. idem sentiant Lob. C. Bauh. & Schuuenckf. Apud Cordum enim sunt duæ diversæ plantæ eodem nomine, quarum neutri nobis videtur convenire, quicquid dicat Lobel, qui sic ait: cornus fem. *Opulus* cordi, Germ. Spindelholz & Faulbeer, id est, Fufaria. Coriarij expetit frutex Cordo.

Aduersaria cornum fem. Pseudocraniam Cordi, & Virgam sanguineam vnam & idem faciunt: quam rectè, ipsi viderint.

Turner. Cornus fem. Angl. quibusdam, Dogberry tree: alijs corne tree small: alijs, quod lanionibus ad verucula conficienda in usu sit, Prick tree.

Cautè Cæsalp. *Sanguinea* inquit, vulgè, folia subhirsuta: hanc Plin. videtur intellexisse Virgam sanguineam vocans. Hanc autem Theoph. cornu fem. videtur intelligere.

Securè Schuuenckel. corniolus *Sanguinea* Theoph. Pseudocrania Cordi, Schreberen Silchys, Faulbaum, Hartriegel Silch. Spindelholz. E-nimvero qui ista nomina in vnius plantæ designationem concordant, is nobis egregius & subtilis Botanicus fuerit: difficultates iam in præcedentibus ex parte declaratæ, & suis quæque locis declarabuntur.

Camer. circumspiciens eadem ferè dicit, quæ Cæsalp. Causam reddit, Virgam sanguineam Plinij asseri non posse, quod brevis sit in ea.

Opulus & corn. fem. H. Lugd. Tabern. & Thahio. Cornus silu. fem. Rythio. Bohem. Sanguinea Hung. gyronsa. Reliquarum linguarum synonyma dicta sunt fuscè, suis quæque autoribus tributa.

Virgam sanguineam hunc dictum putamus fruticem [si coniecturæ locus est] propterea quod vitæ eius magna ex parte rubent, sanguinis instar: quamvis Veteribus & aliis de causa sic dicta videatur, quod ex verberatione Parricidarum, antequam morti traderentur, sanguine maderant, unde fortè, eius lignum apud Friscos infelicitissimum habitum, ut specialius dicetur in viribus.

Suberunt in montosa sanguinei frutices: Plinius. Verum non in montibus tantum. Nam in sepibus, fruticetis, siluestribus & saxosis locis passim Germania, fruticat. Vidimus etiam circa Montepelium & Patavium. Provenit in Anglia quoque, Turn.

Phillyrea

Lonicera.
Thelera-
na.
Opulus.
Sambucus
silu.

Sanguinea

Dodonæa
prick.

Lob. aut.

Fufaria.

Lonicera
in usu.

Corniola

Schuuenckel
not.

Locus.



que Theoph. de qua supra mentio facta in descriptione Cerasi. Nec enim aliud tradit vel Theoph. vel Gal. de Diospyro vel Diosphyro (si modò sint vnum) quam quod ille quidem nucleum habere iam aperte insinuat, quando cerasa officulum diuinas habere tradit, hic vero sua Diosphyras quemad. & corna inter constructas recenset; qui exiguum quidem habeant alimentum, sed pluri succi sint omnes. Vt suspicio aliqua sit Diospyra Veterum ad cerasorum aliquod genus accedere posse: difficile tamen, quid sint, definitè pronuntiare in tanta Autorum breuitate.

Rob. tamen Const. in Lex. libere dicit *Sideroxylon* vel *Alemyon* genus est Cerasi de quo Theoph.

Hermolaus non separat Cerasum Theoph. à *Liniano* atque adeò nostrate: Gazam verò redarguit, quod apud Theoph. *Sideroxylon* lous flammam interpretatus sit, cum lous triticum interpretari debuisset, si vocis vim exprimere voluisset. Sed nec Ruell. distinguit inter Theoph. Plin. & nostram Cerasum, quemad. nec Tragus.

At Anguil. in epist. Dubitas, inquit, an nostra Cerasa sint ea de quibus meminit Theoph. mihi etiam res suspecta est, quia nescio quid velint hæc verba: *σύναν δὲ ὅταν τὸ τῆς αὐτῆς ἴσως*: qui describendo Mespilum, dicit habere folia Apii: Postea loquens de flore ait: *ἀπὸ δὲ τῶν ἀνθῶν ἡ μὲν ἴσως* *ἴσως τὴν μὲν αὐτῆς ἴσως ἔχειν, ὡς δὲ &c.* Has notas nostris Cerasis non respondere, nec in foliis nec in floribus apparet: Aliorum tamen esto iudicium.

Hæc ille. De mespilo suo dictu in loco; & quid de illa foliorum comparatione sentiendum: nempe Seraniam intelligendam, ut & supra dictum. Quam verò de floribus adducit difficultatem Anguil. est certè aliqua, non dum enim planè apertum est, quomodo flos Cerasi nostratis ex multis flosculis congestus sit. Quid si racemosam intellexisset Theoph. Aut, quid si pro *ἴσως*, legendum sit *εὐκρίως* ita ut foliola horum, intelligantur. Iudicent docti.

Fuerunt, inquit Goropius qui putarunt *cratægus* à Theoph. descriptum Cerasum nostram esse: quam verè non iudico: id interim displicet, quod fluxilem Mespilum videri dicant.

Cerasus arbor *κνῆστις* Græcis; & *κνῆστις* fructus ut Const. interpretatur: & in Geopon. *κνῆστις* pro eadem arbore, ut idem explicat. Diosc. verò *κνῆστις* Cerasa, pro fructu; & Cerasia, ut interpretes vertunt, pro eodem. *κνῆστις* nomen vertunt gummi Cerasorum. Had. Iunio Cerasus *κνῆστις* Græcè est. Iudris, teste Trago, *Gudgannioth*, ex nomenclatura *Abiz* Lewitz. Arab. *Serasie* & *Sarasie*. Germ. *Birsen* vel *Birschenbaum*: de me arboris nomen *baum*, & habes fructum. Belg. *Kersboom* & *Eriekboom* / *Brieken* / *Bersen* / *Erieken*. Ital. *Siregie*, *ceraso* Gal. *Crisier*, *Cerise*. Hisp. Castil. *Cerezas* aut *Guindas*: Catal. *Ciceres*: Port. *Cereias*, aut *Gineas*. Bohem. *Wissne*. Hung. *Etherosnyosa*.

Cerasorum multiplex differentia, à sapore, colore, figura, magnitudine, loco, autoribusque seu inventoribus ipsi.

Cerasorum, inquit Plin. Aproniana maxime rubent: nigerrima sunt Actia: Cæciliana verò & rotunda. Iulianis gratus sapor, sed penè tantum sub arbore sua, adeò teneris, ut gestatum non tollerent. Principatus Duracinis, quæ Pliniana Campania appellat: in Belgica verò Lusitanis. In ripa etiam Rhæni. Terrius ijs colos è nigro ac rubenti viridiq; similis maturefcitibus temper. Minus quinquennio est, quod prodire que vocant Laureæ, non ingratis amaritudinis, insita in Lauro.

Sunt & Macedonica parua arboris, raroque tria cubita excedentis: & minores etiamnum frutice chamæcerasi. Inter prima hæc à pomis colono gratiam annuam refert.

Hermol. etiam quædam ad differentias præsentia tradit, his verbis: sunt & Laureæ Cerasa. *Amarasia* dicuntur vulgò, quasi amara Cerasa. Etenim Pomum ipsum non Cerasum vocari Seruius præcipit: Cuius & illa quoque verba sunt, Cerasum, inquit, & antequam Ceraso urbe Lucullus adueheret, erat in Italia, sed durum, & Cornus appellabatur, quod postea mixto nomine Cornocerasum est vocatum. Sint autem Cornocerasia idem cum Duracinis genus, in verò Seruio credendum, qui Cornum in Italia Cerasum fuisse prodat, cum alia res sit Cornus, alia cerasus omnino, satis ambigimus. Cerasiorum porro discrimen alterum quod Romæ Visulumpellant, frequentissimum in Germania & Gallia.

Sed in Scythia ferè supra modum, ubi & Viscina Barbari cognominatur, ut Pomponius Letus, qui ea loca modò inuist, constanter affirmat. Hæc ille. Videntur autem Viscina Barbaris dicta, eadem quæ Germ. *weichslen* vocantur.

Ruellius de Cerasorum differentiis sic scribit: Gallis horum Malorum varia notantur discrimina: quædam mediocri arbore, interdum pumila, quasi frutice (quam chamæcerasum dici puto) pendent: pediculo breui, pomo rotundo, rubente, carne multa, molli, succola, osse intus duro, nucleo dulci. Hoc maxime grato placet acore, morotoque laborantium morbo palata recreat, prægnantium etiam malaciis, antequam maturefcit expetitur. Hoc Francis tantum cerasi nomen meruit. Reliqua varias sortiuntur appellationes. Quædam Pomo prodeunt proximo ex arbore grandiuscula, longiore petiolo, fructu multo acidior & subacervo cetera simile: vulgus Merasia nominat. Ea nimio sui acremento respuuntur, ut alia, nimia sui dulcedine fastidium pariunt. Alia proceris arboribus exeunt, ruginatiore pomi figura, longioreque, pediculis longis, pluribus una coeuntibus: baccis partim candicantibus, nonnunquam in totum rubris: prædulci carne, ori iucunda, fragili intus osse, nucleo non insauu. Sed hoc Malum longè acidis fugacius, primumque in Cerasiorum genere maturitatem sensit; vulgus nunc Guindæ, nunc Guindolæ vocat. Sed inter ea habentur crassiora, alba carne, prædura, magna ex parte albicantia, prædulci gustu, callo corporis nucleo perennius hærente: ob hoc putarim Veteribus Duracina, Cerasia nuncupari. Quæ in totum rubent, mollitie cedunt. Quæ partim albicant, partim rubescunt, cum utriusque societatem ineunt. Celerius inarescunt, quæ molliori constant carne. Inueniuntur & alia in siluis & nemoribus, nonnunquam in dumeris & cultis, baccis paruis, multum infra dictorum magnitudinem: callo carnis rotundior, ossibus appressis, parte Soli obuersa rubescente, auersa candicante, sapore dulci quidem, sed dilutiore: ruri familiaria, spontè nullo humano cultu nascuntia. Alia nigerrima, quibus succus inest sanguineus, ea uelcentiū manus & labra sanguine suo & Mororum modo, insciant vtrique Scythiana rura vocant. Sed posterius hoc Veteribus Actianum dici putauerim, ut prius illud forsitan Cæcilianum, curtato [ut in Gallia plerumque fieri solet] vetere vocabulo, ac Cæssianum pro Cæciliani concisum proferentibus.

Germaniæ vñtata Cerasa Tragus describit: Inter varia, nomen, genera vel appellationes præcipuum

Sunt & Macedonica parua arboris, raroque tria cubita excedentis: & minores etiamnum frutice chamæcerasi. Inter prima hæc à pomis colono gratiam annuam refert.

Hermol. etiam quædam ad differentias præsentia tradit, his verbis: sunt & Laureæ Cerasa. *Amarasia* dicuntur vulgò, quasi amara Cerasa. Etenim Pomum ipsum non Cerasum vocari Seruius præcipit: Cuius & illa quoque verba sunt, Cerasum, inquit, & antequam Ceraso urbe Lucullus adueheret, erat in Italia, sed durum, & Cornus appellabatur, quod postea mixto nomine Cornocerasum est vocatum. Sint autem Cornocerasia idem cum Duracinis genus, in verò Seruio credendum, qui Cornum in Italia Cerasum fuisse prodat, cum alia res sit Cornus, alia cerasus omnino, satis ambigimus. Cerasiorum porro discrimen alterum quod Romæ Visulumpellant, frequentissimum in Germania & Gallia.

Sed in Scythia ferè supra modum, ubi & Viscina Barbari cognominatur, ut Pomponius Letus, qui ea loca modò inuist, constanter affirmat. Hæc ille. Videntur autem Viscina Barbaris dicta, eadem quæ Germ. *weichslen* vocantur.

Ruellius de Cerasorum differentiis sic scribit: Gallis horum Malorum varia notantur discrimina: quædam mediocri arbore, interdum pumila, quasi frutice (quam chamæcerasum dici puto) pendent: pediculo breui, pomo rotundo, rubente, carne multa, molli, succola, osse intus duro, nucleo dulci. Hoc maxime grato placet acore, morotoque laborantium morbo palata recreat, prægnantium etiam malaciis, antequam maturefcit expetitur. Hoc Francis tantum cerasi nomen meruit. Reliqua varias sortiuntur appellationes. Quædam Pomo prodeunt proximo ex arbore grandiuscula, longiore petiolo, fructu multo acidior & subacervo cetera simile: vulgus Merasia nominat. Ea nimio sui acremento respuuntur, ut alia, nimia sui dulcedine fastidium pariunt. Alia proceris arboribus exeunt, ruginatiore pomi figura, longioreque, pediculis longis, pluribus una coeuntibus: baccis partim candicantibus, nonnunquam in totum rubris: prædulci carne, ori iucunda, fragili intus osse, nucleo non insauu. Sed hoc Malum longè acidis fugacius, primumque in Cerasiorum genere maturitatem sensit; vulgus nunc Guindæ, nunc Guindolæ vocat. Sed inter ea habentur crassiora, alba carne, prædura, magna ex parte albicantia, prædulci gustu, callo corporis nucleo perennius hærente: ob hoc putarim Veteribus Duracina, Cerasia nuncupari. Quæ in totum rubent, mollitie cedunt. Quæ partim albicant, partim rubescunt, cum utriusque societatem ineunt. Celerius inarescunt, quæ molliori constant carne. Inueniuntur & alia in siluis & nemoribus, nonnunquam in dumeris & cultis, baccis paruis, multum infra dictorum magnitudinem: callo carnis rotundior, ossibus appressis, parte Soli obuersa rubescente, auersa candicante, sapore dulci quidem, sed dilutiore: ruri familiaria, spontè nullo humano cultu nascuntia. Alia nigerrima, quibus succus inest sanguineus, ea uelcentiū manus & labra sanguine suo & Mororum modo, insciant vtrique Scythiana rura vocant. Sed posterius hoc Veteribus Actianum dici putauerim, ut prius illud forsitan Cæcilianum, curtato [ut in Gallia plerumque fieri solet] vetere vocabulo, ac Cæssianum pro Cæciliani concisum proferentibus.

Germaniæ vñtata Cerasa Tragus describit: Inter varia, nomen, genera vel appellationes præcipuum

Gallis horum Malorum varia notantur discrimina: quædam mediocri arbore, interdum pumila, quasi frutice (quam chamæcerasum dici puto) pendent: pediculo breui, pomo rotundo, rubente, carne multa, molli, succola, osse intus duro, nucleo dulci. Hoc maxime grato placet acore, morotoque laborantium morbo palata recreat, prægnantium etiam malaciis, antequam maturefcit expetitur. Hoc Francis tantum cerasi nomen meruit. Reliqua varias sortiuntur appellationes. Quædam Pomo prodeunt proximo ex arbore grandiuscula, longiore petiolo, fructu multo acidior & subacervo cetera simile: vulgus Merasia nominat. Ea nimio sui acremento respuuntur, ut alia, nimia sui dulcedine fastidium pariunt. Alia proceris arboribus exeunt, ruginatiore pomi figura, longioreque, pediculis longis, pluribus una coeuntibus: baccis partim candicantibus, nonnunquam in totum rubris: prædulci carne, ori iucunda, fragili intus osse, nucleo non insauu. Sed hoc Malum longè acidis fugacius, primumque in Cerasiorum genere maturitatem sensit; vulgus nunc Guindæ, nunc Guindolæ vocat. Sed inter ea habentur crassiora, alba carne, prædura, magna ex parte albicantia, prædulci gustu, callo corporis nucleo perennius hærente: ob hoc putarim Veteribus Duracina, Cerasia nuncupari. Quæ in totum rubent, mollitie cedunt. Quæ partim albicant, partim rubescunt, cum utriusque societatem ineunt. Celerius inarescunt, quæ molliori constant carne. Inueniuntur & alia in siluis & nemoribus, nonnunquam in dumeris & cultis, baccis paruis, multum infra dictorum magnitudinem: callo carnis rotundior, ossibus appressis, parte Soli obuersa rubescente, auersa candicante, sapore dulci quidem, sed dilutiore: ruri familiaria, spontè nullo humano cultu nascuntia. Alia nigerrima, quibus succus inest sanguineus, ea uelcentiū manus & labra sanguine suo & Mororum modo, insciant vtrique Scythiana rura vocant. Sed posterius hoc Veteribus Actianum dici putauerim, ut prius illud forsitan Cæcilianum, curtato [ut in Gallia plerumque fieri solet] vetere vocabulo, ac Cæssianum pro Cæciliani concisum proferentibus.

Germaniæ vñtata Cerasa Tragus describit: Inter varia, nomen, genera vel appellationes præcipuum

Gallis horum Malorum varia notantur discrimina: quædam mediocri arbore, interdum pumila, quasi frutice (quam chamæcerasum dici puto) pendent: pediculo breui, pomo rotundo, rubente, carne multa, molli, succola, osse intus duro, nucleo dulci. Hoc maxime grato placet acore, morotoque laborantium morbo palata recreat, prægnantium etiam malaciis, antequam maturefcit expetitur. Hoc Francis tantum cerasi nomen meruit. Reliqua varias sortiuntur appellationes. Quædam Pomo prodeunt proximo ex arbore grandiuscula, longiore petiolo, fructu multo acidior & subacervo cetera simile: vulgus Merasia nominat. Ea nimio sui acremento respuuntur, ut alia, nimia sui dulcedine fastidium pariunt. Alia proceris arboribus exeunt, ruginatiore pomi figura, longioreque, pediculis longis, pluribus una coeuntibus: baccis partim candicantibus, nonnunquam in totum rubris: prædulci carne, ori iucunda, fragili intus osse, nucleo non insauu. Sed hoc Malum longè acidis fugacius, primumque in Cerasiorum genere maturitatem sensit; vulgus nunc Guindæ, nunc Guindolæ vocat. Sed inter ea habentur crassiora, alba carne, prædura, magna ex parte albicantia, prædulci gustu, callo corporis nucleo perennius hærente: ob hoc putarim Veteribus Duracina, Cerasia nuncupari. Quæ in totum rubent, mollitie cedunt. Quæ partim albicant, partim rubescunt, cum utriusque societatem ineunt. Celerius inarescunt, quæ molliori constant carne. Inueniuntur & alia in siluis & nemoribus, nonnunquam in dumeris & cultis, baccis paruis, multum infra dictorum magnitudinem: callo carnis rotundior, ossibus appressis, parte Soli obuersa rubescente, auersa candicante, sapore dulci quidem, sed dilutiore: ruri familiaria, spontè nullo humano cultu nascuntia. Alia nigerrima, quibus succus inest sanguineus, ea uelcentiū manus & labra sanguine suo & Mororum modo, insciant vtrique Scythiana rura vocant. Sed posterius hoc Veteribus Actianum dici putauerim, ut prius illud forsitan Cæcilianum, curtato [ut in Gallia plerumque fieri solet] vetere vocabulo, ac Cæssianum pro Cæciliani concisum proferentibus.

Germaniæ vñtata Cerasa Tragus describit: Inter varia, nomen, genera vel appellationes præcipuum

Gallis horum Malorum varia notantur discrimina: quædam mediocri arbore, interdum pumila, quasi frutice (quam chamæcerasum dici puto) pendent: pediculo breui, pomo rotundo, rubente, carne multa, molli, succola, osse intus duro, nucleo dulci. Hoc maxime grato placet acore, morotoque laborantium morbo palata recreat, prægnantium etiam malaciis, antequam maturefcit expetitur. Hoc Francis tantum cerasi nomen meruit. Reliqua varias sortiuntur appellationes. Quædam Pomo prodeunt proximo ex arbore grandiuscula, longiore petiolo, fructu multo acidior & subacervo cetera simile: vulgus Merasia nominat. Ea nimio sui acremento respuuntur, ut alia, nimia sui dulcedine fastidium pariunt. Alia proceris arboribus exeunt, ruginatiore pomi figura, longioreque, pediculis longis, pluribus una coeuntibus: baccis partim candicantibus, nonnunquam in totum rubris: prædulci carne, ori iucunda, fragili intus osse, nucleo non insauu. Sed hoc Malum longè acidis fugacius, primumque in Cerasiorum genere maturitatem sensit; vulgus nunc Guindæ, nunc Guindolæ vocat. Sed inter ea habentur crassiora, alba carne, prædura, magna ex parte albicantia, prædulci gustu, callo corporis nucleo perennius hærente: ob hoc putarim Veteribus Duracina, Cerasia nuncupari. Quæ in totum rubent, mollitie cedunt. Quæ partim albicant, partim rubescunt, cum utriusque societatem ineunt. Celerius inarescunt, quæ molliori constant carne. Inueniuntur & alia in siluis & nemoribus, nonnunquam in dumeris & cultis, baccis paruis, multum infra dictorum magnitudinem: callo carnis rotundior, ossibus appressis, parte Soli obuersa rubescente, auersa candicante, sapore dulci quidem, sed dilutiore: ruri familiaria, spontè nullo humano cultu nascuntia. Alia nigerrima, quibus succus inest sanguineus, ea uelcentiū manus & labra sanguine suo & Mororum modo, insciant vtrique Scythiana rura vocant. Sed posterius hoc Veteribus Actianum dici putauerim, ut prius illud forsitan Cæcilianum, curtato [ut in Gallia plerumque fieri solet] vetere vocabulo, ac Cæssianum pro Cæciliani concisum proferentibus.

Germaniæ vñtata Cerasa Tragus describit: Inter varia, nomen, genera vel appellationes præcipuum

Gallis horum Malorum varia notantur discrimina: quædam mediocri arbore, interdum pumila, quasi frutice (quam chamæcerasum dici puto) pendent: pediculo breui, pomo rotundo, rubente, carne multa, molli, succola, osse intus duro, nucleo dulci. Hoc maxime grato placet acore, morotoque laborantium morbo palata recreat, prægnantium etiam malaciis, antequam maturefcit expetitur. Hoc Francis tantum cerasi nomen meruit. Reliqua varias sortiuntur appellationes. Quædam Pomo prodeunt proximo ex arbore grandiuscula, longiore petiolo, fructu multo acidior & subacervo cetera simile: vulgus Merasia nominat. Ea nimio sui acremento respuuntur, ut alia, nimia sui dulcedine fastidium pariunt. Alia proceris arboribus exeunt, ruginatiore pomi figura, longioreque, pediculis longis, pluribus una coeuntibus: baccis partim candicantibus, nonnunquam in totum rubris: prædulci carne, ori iucunda, fragili intus osse, nucleo non insauu. Sed hoc Malum longè acidis fugacius, primumque in Cerasiorum genere maturitatem sensit; vulgus nunc Guindæ, nunc Guindolæ vocat. Sed inter ea habentur crassiora, alba carne, prædura, magna ex parte albicantia, prædulci gustu, callo corporis nucleo perennius hærente: ob hoc putarim Veteribus Duracina, Cerasia nuncupari. Quæ in totum rubent, mollitie cedunt. Quæ partim albicant, partim rubescunt, cum utriusque societatem ineunt. Celerius inarescunt, quæ molliori constant carne. Inueniuntur & alia in siluis & nemoribus, nonnunquam in dumeris & cultis, baccis paruis, multum infra dictorum magnitudinem: callo carnis rotundior, ossibus appressis, parte Soli obuersa rubescente, auersa candicante, sapore dulci quidem, sed dilutiore: ruri familiaria, spontè nullo humano cultu nascuntia. Alia nigerrima, quibus succus inest sanguineus, ea uelcentiū manus & labra sanguine suo & Mororum modo, insciant vtrique Scythiana rura vocant. Sed posterius hoc Veteribus Actianum dici putauerim, ut prius illud forsitan Cæcilianum, curtato [ut in Gallia plerumque fieri solet] vetere vocabulo, ac Cæssianum pro Cæciliani concisum proferentibus.

Germaniæ vñtata Cerasa Tragus describit: Inter varia, nomen, genera vel appellationes præcipuum

Gallis horum Malorum varia notantur discrimina: quædam mediocri arbore, interdum pumila, quasi frutice (quam chamæcerasum dici puto) pendent: pediculo breui, pomo rotundo, rubente, carne multa, molli, succola, osse intus duro, nucleo dulci. Hoc maxime grato placet acore, morotoque laborantium morbo palata recreat, prægnantium etiam malaciis, antequam maturefcit expetitur. Hoc Francis tantum cerasi nomen meruit. Reliqua varias sortiuntur appellationes. Quædam Pomo prodeunt proximo ex arbore grandiuscula, longiore petiolo, fructu multo acidior & subacervo cetera simile: vulgus Merasia nominat. Ea nimio sui acremento respuuntur, ut alia, nimia sui dulcedine fastidium pariunt. Alia proceris arboribus exeunt, ruginatiore pomi figura, longioreque, pediculis longis, pluribus una coeuntibus: baccis partim candicantibus, nonnunquam in totum rubris: prædulci carne, ori iucunda, fragili intus osse, nucleo non insauu. Sed hoc Malum longè acidis fugacius, primumque in Cerasiorum genere maturitatem sensit; vulgus nunc Guindæ, nunc Guindolæ vocat. Sed inter ea habentur crassiora, alba carne, prædura, magna ex parte albicantia, prædulci gustu, callo corporis nucleo perennius hærente: ob hoc putarim Veteribus Duracina, Cerasia nuncupari. Quæ in totum rubent, mollitie cedunt. Quæ partim albicant, partim rubescunt, cum utriusque societatem ineunt. Celerius inarescunt, quæ molliori constant carne. Inueniuntur & alia in siluis & nemoribus, nonnunquam in dumeris & cultis, baccis paruis, multum infra dictorum magnitudinem: callo carnis rotundior, ossibus appressis, parte Soli obuersa rubescente, auersa candicante, sapore dulci quidem, sed dilutiore: ruri familiaria, spontè nullo humano cultu nascuntia. Alia nigerrima, quibus succus inest sanguineus, ea uelcentiū manus & labra sanguine suo & Mororum modo, insciant vtrique Scythiana rura vocant. Sed posterius hoc Veteribus Actianum dici putauerim, ut prius illud forsitan Cæcilianum, curtato [ut in Gallia plerumque fieri solet] vetere vocabulo, ac Cæssianum pro Cæciliani concisum proferentibus.

Germaniæ vñtata Cerasa Tragus describit: Inter varia, nomen, genera vel appellationes præcipuum

in locis non obtinent apud Germanos, quæ puniceæ sunt, seu spadiceæ coloris, acidi saporis, Amarellen / Wiechsen / Weinstell isdem appellata. Hæc fortè sunt, quæ nonnulli Macedonica, Metasia & Gindola vocant. Acida verò & vulgaria cerasia *Emmerling* vnd *Bloderfirschen* Germ. dicta, fortè Aproniana appellari poterunt. Nigra, Germ. *Wildvogelfirschen* / Cerasia Actiana Latinis nominantur. 4. Quæ iucundissimi sunt saporis, & Germ. *Großbundefirschen* nominantur, Iuliana Lat. dicuntur. Rotunda cerasa, Cæciliana & Cæciliana: Dulcia planè, cuiusmodi sunt alba, Ger. *Wißfirschen*. Duracina & Pliniana, quæ Lauro insita fuere & amara proflus sunt Laureæ, & Amarasia nuncupantur.

Fuchsius aliter distinguit, dicens: Multa cerasiorum sunt genera: in Germania tamentria, quod sciam, duntaxat proueniunt. Primi enim generis sunt rotunda, ac maximè rubent, suaque voce illis dicuntur Amarellen. Alterius generis, quod ad figuram attinet, prioribus similia sunt, differunt autem colore qui illis ad nigredinem accedit. Vocantur autem illorum lingua *Wiechsen*. Tertij generis prædictis minora sunt ac longiora, partimque rubent, partim nigricant, à nonnullis priuatim *Birschen* / vel *Briefsen* appellantur. Quæ in utroque genere nigra sunt, ea vespertium manus & labra succo suo, qui sanguineus est Motorum instar inficiunt.

Cordus tradit, austera & maiora, quæ non in magnis arboribus nascuntur, esse ea, quæ à Pontio primùm in Italiam Lucullus attulit. Quæ verò dulcia sunt & in proceris arboribus nascuntur, sponte sua ubique in Germania prouenire. Duracina Plinij autort Cornar. etiam hodie durant, suntque ea, quæ ad Rhenum Rincasiana, aut etiam Maguntina appellantur. Hæc oblonga sunt, & cum albore rubent in perfecta maturitate quæ ipsis circa mediū ferè Maium contingit, & omnino præcocium generis sunt. Chamacerasa vt scribit Alex. Bened. vulgus Mariscas ob morbi similitudinem fortè vocauit, aut morbum pomi nomine: alij Laurocerasa vocare maluerunt.

Dod. hæc sunt cerasorum differentie. Prima: magna & proceras arbor siluestris, cui fructus quidam rubent, alij nigricant, sapore dulces. Præcoces olim vocabat, in hist Gal. Cerasum Theoph. & Gallicè *Guignier* & *Guigne*. Altera: Cerasus magnis folijs, humilior, hortensis, ceraso maiore, carnositate, dulci, & colore vel rubente, vna tantum parte albidiorè: vel nigro: vulgò Hispanicum cognominatum, fortè Lusitanicum Plin. quibus principatum Belgica illius ætate tribuit. Olim Dod. vocabat chamacerasum, Gal. *Gr. firs Guignes*, *Cerises d'Espagne*. Brab. *Spaensche Bersen*.

Tertia: Cerasus, prioribus humilior ac tenerior: audices tenuiores: cerasum rotundius, carnosius, sapore vinoso, acidulum, quod rarius est. Est autem & in hoc & nonnulla varietas alia: quæ etenim citra insitionem nascuntur aut in alias eiusdem generis insitæ, magna admodum cerasa frequentè ex breuibus pediculis dependentia gignunt, quæ subinde adeo magna sunt, vt xvi. vel etiam plura suorum ossiculorum pendeant. Earum verò quæ in siluestre siue priorem cerasum (quod sæpè fit) insuntur, Cerasa minora sunt, & longioribus habent pediculis. Citiùs autem maturitatem hæc assequuntur: ossicula verò istorum minora sunt, quam superiorum. Amarenas posterior ætas huius tertie cerasi fructus nuncupat, vel etiam Merendas: Italicorum plerique *Marasche* & *Amerine*: alij *Marchiane* vel *Duracine*. Germ. *A-*

marellen: & quæ nigra sunt, *Wiechsen* / *Weinstell* Brab. *Crieschen* alibi, in Belgio etiam *Bersen*. Ad Duracina Plinij videntur referenda Cæciliana: Item Actia nuncupata. Olim Dod. hæc dicebatur *Diospyros* siue *Iouis flamma* Theoph. interp. *Gaza*, Gall. *Grotier* & *Grottes*. Hæc illi, qui nobis obscure ac intricatè satis de cerasis scribere videtur.

Tabern. quinque icones cerasorum n. proponit, cum his titulis. 1. *Bundefirschen*, Cerasia Pliniana. 2. *Spanisch Birschen*: Cerasia Hesp. 3. *Amarellen Birschen*: Cerasia acida. 4. *Wassers Birschen*: Cerasia aquatica. 5. *Schwartzfirschen*, Cerasia nigra.

Schuueneck. in Silesia prouenientia cerasa hæc proponit. 1. cerasus silu. cerasa Cæciliana Plin. Amaratia & Laureæ rubra & nigra, duriuscula, nonnihil amaricantia. 2. Cerasia hort. dulcia, rubra seu cæciliana. 3. cerasia nigra, Actiana: 4. Cerasia Hungarica, Hispanica, Iuliana Plin. *Grosse Ungersche Birschen* / *Spanische Birschen*. 5. Cerasia Italica, acidula, acidodulcia, Pliniana, *Welsche Birschen*: *Weisse Birschen* / *Weinseurlechte Birschen*. Hæc omnium sunt suauissima, quæ in culinas veniunt: rubent. 6. Cerasia austera, Amarena, Aproniana, fructu acido Amarellen: *Wiechsen* vulgò. Oportet autem Schuueneck. egregie cognita habuisse cerasa Plinij, quod tam categoricè de ijs pronuntiare audeat. Et, quod magis, differentes species ad eiusdem cæciliana refert, siluestria & hortensia, & tam rubra quam nigra, amaricantiaque: item dulcia. An hæc omnia ex pauculis illis Plin. verbis extorquere potuerit, vt tam certo ipsi constare possit, docti videant.

Sed Matth. consulamus, qui & Italia Cerasia & alia quedam celebrat. Inter cerasa, inquit principem sibi locum vendicant, quæ Hierusalem vulgò *Marchiane* & *Duracine* vocantur: tamen horum alia maiora, alia saturato colore rubent, alia verò potius albicant. Quæ autem Plinio Iuliana, nobis verò vulgò *Marasche*, hoc est, quæ dicuntur, in nullo tamen habentur pretio: quandoquidem adeo sunt tenera & fragilia, vt nisi sub arbore sua comedantur, facile gestatu collidantur, & marcescant: quin & ob aquæ parum redundantiam insipida sunt, omneque ingrata. Quæ autem, quod admodum nigricant, *Corbine* nos vulgò vocamus, Plinius verò Actia & Cæciliana, cum sint duriuscula & dulcia, gustatu habentur non iniucunda: veruntamen quoddam manus, dentes ac labra atro colore inficiant, discumbentesque derisunt, mensis raro apponuntur. Sunt & cerasa, quæ vno tantum petiolo ternas, quaternas, quinasue baccas sustinent: quinetiam quæ racematim vix modo proueniunt, quorum imagines misit ad me Calzol. ac quæ peculiariter in hortis, vineis & viridarijs habentur, viribus & qualitatibus ab alijs cerasorum generibus non differunt. In cerasorum genere numerantur & illa, quæ Romæ *l'isole*, Senis *Amarine*, & in alijs compluribus Italiae locis *Marasche* vulgò nuncupantur, à sapore (vt puto) dicta, quod non iniucundi amaris tantillum respiciant. Horum porro varia notantur genera, quæ etsi omnia sibi acidum assequant saporis, hæc tamen citius plus. illa verò minus habent. Rura Tridentina ea *Marasche* vulgò nominant, quæ minus acida gustu deprehenduntur, quorum genus quoddam admodum gratum habetur, quippe quod in ijs acidodulce sit admixtum, ob idque illa palato maxime placeant. Quedam præterea inibi *Marine* & *Marinella* co-

marcellen: & quæ nigra sunt, *Wiechsen* / *Weinstell* Brab. *Crieschen* alibi, in Belgio etiam *Bersen*. Ad Duracina Plinij videntur referenda Cæciliana: Item Actia nuncupata. Olim Dod. hæc dicebatur *Diospyros* siue *Iouis flamma* Theoph. interp. *Gaza*, Gall. *Grotier* & *Grottes*. Hæc illi, qui nobis obscure ac intricatè satis de cerasis scribere videtur.

Tabern. quinque icones cerasorum n. proponit, cum his titulis. 1. *Bundefirschen*, Cerasia Pliniana. 2. *Spanisch Birschen*: Cerasia Hesp. 3. *Amarellen Birschen*: Cerasia acida. 4. *Wassers Birschen*: Cerasia aquatica. 5. *Schwartzfirschen*, Cerasia nigra.

Schuueneck. in Silesia prouenientia cerasa hæc proponit. 1. cerasus silu. cerasa Cæciliana Plin. Amaratia & Laureæ rubra & nigra, duriuscula, nonnihil amaricantia. 2. Cerasia hort. dulcia, rubra seu cæciliana. 3. cerasia nigra, Actiana: 4. Cerasia Hungarica, Hispanica, Iuliana Plin. *Grosse Ungersche Birschen* / *Spanische Birschen*. 5. Cerasia Italica, acidula, acidodulcia, Pliniana, *Welsche Birschen*: *Weisse Birschen* / *Weinseurlechte Birschen*. Hæc omnium sunt suauissima, quæ in culinas veniunt: rubent. 6. Cerasia austera, Amarena, Aproniana, fructu acido Amarellen: *Wiechsen* vulgò. Oportet autem Schuueneck. egregie cognita habuisse cerasa Plinij, quod tam categoricè de ijs pronuntiare audeat. Et, quod magis, differentes species ad eiusdem cæciliana refert, siluestria & hortensia, & tam rubra quam nigra, amaricantiaque: item dulcia. An hæc omnia ex pauculis illis Plin. verbis extorquere potuerit, vt tam certo ipsi constare possit, docti videant.

Sed Matth. consulamus, qui & Italia Cerasia & alia quedam celebrat. Inter cerasa, inquit principem sibi locum vendicant, quæ Hierusalem vulgò *Marchiane* & *Duracine* vocantur: tamen horum alia maiora, alia saturato colore rubent, alia verò potius albicant. Quæ autem Plinio Iuliana, nobis verò vulgò *Marasche*, hoc est, quæ dicuntur, in nullo tamen habentur pretio: quandoquidem adeo sunt tenera & fragilia, vt nisi sub arbore sua comedantur, facile gestatu collidantur, & marcescant: quin & ob aquæ parum redundantiam insipida sunt, omneque ingrata. Quæ autem, quod admodum nigricant, *Corbine* nos vulgò vocamus, Plinius verò Actia & Cæciliana, cum sint duriuscula & dulcia, gustatu habentur non iniucunda: veruntamen quoddam manus, dentes ac labra atro colore inficiant, discumbentesque derisunt, mensis raro apponuntur. Sunt & cerasa, quæ vno tantum petiolo ternas, quaternas, quinasue baccas sustinent: quinetiam quæ racematim vix modo proueniunt, quorum imagines misit ad me Calzol. ac quæ peculiariter in hortis, vineis & viridarijs habentur, viribus & qualitatibus ab alijs cerasorum generibus non differunt. In cerasorum genere numerantur & illa, quæ Romæ *l'isole*, Senis *Amarine*, & in alijs compluribus Italiae locis *Marasche* vulgò nuncupantur, à sapore (vt puto) dicta, quod non iniucundi amaris tantillum respiciant. Horum porro varia notantur genera, quæ etsi omnia sibi acidum assequant saporis, hæc tamen citius plus. illa verò minus habent. Rura Tridentina ea *Marasche* vulgò nominant, quæ minus acida gustu deprehenduntur, quorum genus quoddam admodum gratum habetur, quippe quod in ijs acidodulce sit admixtum, ob idque illa palato maxime placeant. Quedam præterea inibi *Marine* & *Marinella* co-

Duracina
Cæciliana

Tabern. diff.
serena

Piffer
Schuueneck
Cæciliana
amarantia
Laurea
Cæcil
Actiana
Hun. ar.
Hispan.
Iuliana

Amarena
Aproniana

Schuueneck
f. l. m.

Differentia
Matth.
Italia cerasa

Marchiane
Duracine
Marchiane
Marchiane
Marchiane
Marchiane

Corbine
Actia
Cæciliana

Cerasa
pedicula
plura

Cerasa
comosa

Viscula
Amerine
Marasche

Marina
Marinella







plurimam eorum, decocto, vel infusione, utuntur, inquam, ad euacuandos varios humores, nam Emblici euacuant bilem, Chebuli pituitam. Sunt etiam in usu apud recentiores ad conficiendos sirupos quosdam pro morbo Gallico, quia refrigerant, roborant & euacuant: & reuera optimi sunt si morbus Gallicus sit in principio, & nondum fixerit radices.

Et, subdit, Myrobalanorum omnium vires sunt, quod omnes sunt frigidi in primo gradu, & sicci in secundo: & si dicerem quod in siccitate excedunt secundum, non errarem: quia dum ipsis vtor in affectibus oculorum & in malignis viceribus video maiorem siccitatem quam possit provenire ex secundo gradu. Vnde dicerem, quod omnes Myrobalani frigidi sunt in primo gradu intenso, & sicci in secundo intenso, vel in tertio incipiente: exceptis tamen emblicis, quos Mesues dicit refrigerare, & siccare in primo tantum gradu: sed intelligatis in primo admodum intenso. Myrobalani omnes astringunt validissime: & ob id ego soleo ipsis uti foelici cum successu in defluvio capillorum, quando opus est astringere & roborare cutem, quod est post euacuationem humorum illorum acriorum, atque illarum fuliginum. *Incommodum primum*, quod est in usu Myrobalanorum est, quod obstruunt vias, & meatus etiam illos, qui bilem deferunt: & idcirco non sunt exhibendi illis, qui sunt obnoxij obstructionibus: corrigitur autem hoc incommodum admixtis aperientibus, acribus, & diureticis, ut ait Mesues, ut sunt semina odorata. Corrigitur quoque & auferitur hoc incommodum, si nos non exhibeamus substantiam Myrobalanorum, sed eorum decoctum, vel infusionem. Alterum incommodum, quod habent, est quod habent ventriculo, ita ut non possint descendere. Tertium est, quod corrugant substantiam ventriculi; quae duo incommoda corrigetis per pingua, inungendo sc. Myrobalanos ipsos oleo amygdalarum dulcium, vel butyro, dum atteruntur & comminuuntur; vel miscendo cum ipsis passulas aut Cassiam fistulam, ut dicit Mesues.

At Porta Neapol. nouo suo Philosophandi aucupio, Myrobalanorum diuersam purgandi vim ex ipsis coloribus depromit: Myrobalanorum iniquiens fructus quosdam luteos vel herbaceo colore flauescens accensam bilem e corpore deijcere: sic qui atrii sunt, ad atram bilem deturbandam efficacissimos: Genus Empeliticum albicans pituitam trahere: Chebula vero ex fusco rufescentes sanguinem ex melancholia repurgare. Similiter, inquit, Myrobalani quia cor referunt, & eidem continent. An vero color & figura sint illarum virium cause, & an suos effectus praestent quatenus vel alba, vel hoc aut illo modo figuratae iudicent Philosophi.

Amarus scribit, ossa chebulorum valere vice Spodij.


Maranth. Meth. cognosc. simpl. l. 3. c. 7. paucula haec habet. Omne Myrobalanorum genus post longam macerationem pharinae porci quamplurimi diutius coquunt, ita ut non solum purgatricem vim in terreis eorum partibus fundatam in decoctum deducant: sed eam rursus nimia ad ignem mora deperdant, dumque laugate corpus credunt, illud potius adstringant.

Porro Myrobalanorum praeparationis modus, ut scribit Garcias, apud Indos non inualuit, utpote qui eis non vtantur purgationis duntaxat gratia. Nam si purgare velint, eorum decocto vtuntur, & maiore dosi, quam nos in Europa. Solent au-

tem iis succato conditis uti magno cum successu, nec quinquam medicorum usu istorum fana vnquam est periclitatus. Idem stillatitium liquorem ex immaturo elici iubet, quem post sumptam aliquam conseruam adstringentem propinat, & syrups admiscet, si quando opus est. Flaua & Bellerica praescribere solet initio mensis, iis qui aut alui profluuiis, aut stomachi relaxatione laborant. Talibus enim conuenit huiusmodi cibis propter adstrictionem cum pauca aciditate coniunctam. Praeterea immaturo Myrobalanorum succum, in alui profluuiis apprimè efficacem esse, experitum se testatur.

MYROBALANI SPECIES RAVWOLFIO:

CAP. XIX



Hic fructus Descriptio
qui Myrobalani speciem quandam prae se ferre videtur, aequat magnitudine & forma Oligam Hispanicam, aut gladem quernam magnam, coloris baxeae, verrucis raris asperatus, alioqui leuis, nonnihil canulatus, spiris circularibus praecinctus; quae arbori suae haeret, calyculi vestigium, ut in Dactylis ostendit. Fragili huic cortici sub-

est caro fungosa (vetustatis, uti videtur, ratione) sapore amariante, ossi aspero & canulato adherens. Nucleus osse continetur magnus, ut in Myrobalanis Bellericis, utrinque turbinatus, canaliculatus, amygdalini nuclei consistentia, pinguis, coloris melini obscuri, pellicula intectus albicante. Hunc fructum dono acceptum a D. Rauwolfio, inter alia nostra naturalia custodimus, de quo ad nos scripsit: Arborem videre sibi non licuisse, reperiri in in Palestina, quosdam censere Myrobalani speciem esse. *In hac eadem tabella habet & Fagaras iconem, de qua agimus lib. sequenti.*

MYROBALANI FACIE FRV-

GTVS INDICVS.

CAP. XX

Extrima facie ad Myrobalanum quodammodo Excedere videbatur. Magnitudo est penè Nucis iuglandis, figura, quali Myrobalanus Bellerica, aut Ficus, aut Pirum, sed paulo ventriosior, angulosus, colore ex pullo rufescente, ea parte qua adhaeret in turbinatam apophysen extenuatus. Pondus leue satis, substantia carnosa serè, colore cinereo, nullo sapore manifesto praedita. Quid in eius visceribus latitet, nescimus, cum sacioni destinauerit Ill. Ducissa Wirtembergica, cum alijs quibusdam exoticis, quae hunc fructum alioque

etiam pro descriptione & pictura gratiose nobis commodauit.

MYROBALANI VRENTES.

CAP. XXI.

Descriptio. **In** Insula S. Marię proueniunt etiam pulcherrimi Myrobalani, quos Aretca vocant. Obscurę rubent, & lapidem continent insignem. Gustati linguam & fauces adurunt, in modum vt Piper. Linichott. Bry fratres in tabulis æneis Hist. Indię Orient. magnam Myrobalanum, Aretca dictam vocant, quę in dicta proueniat insula. Proponunt eadem pagina plures Palmas, sed paruis iconibus, similes maiori iconi quam exhibuerunt pag. xi. nomine Arequeira & Aretca: unde nobis suspicio oborta, an fortę aliqua species Palmę Myrobalaniferę, cuius Plin. meminit, esse possit. Vtinam essent qui eadem cura vegetabiles hos Indię thesauros perscrutarentur & obseruarent quā mineralibus vita carentibus inhiant, magno vitę suę (& vtinam non melioris) dispendio.

*An Palma
Myrobalanifera Plm.*

MYROBALANO CITRINO
ALIQVOMODO SIMILIS FRV-
CTVS CAVVS.

CAP. XXII

Descriptio. **A** pud Chariff. fratrem C. Bauhinum vidimus Anno 1650. fructum cui aliqua similitudo cum Myrobalano citrino, vnciam tantum longum: parui Pyri modò formatus, parte vna latiore, altera angustiore: in eo costę notabiles sex, interpositis quibusdam aliis minoribus inæqualibus, aciculis perforauimus, cauus compertus est. Color sordidus cum virore.

FRVCTVS PENTAGONVS VEL
OSSICVLVM.

CAP. XXIII.

Descriptio. **F**ructus Pentagonus à Paludano datus (Clus. Exot. Lib. 1. c. 10.) veriùs Fructus ossiculum dicendus, vncialis longitudinis, quod ex quinque veluti oblongis tessellis compactum, quibus subleuatis, longus nucleus in singulis apparebat, sed inanis & membranaceus duntaxat: totum ossiculum tuberibus inanibus erat oblitum. Illud vnicum habebat, & quidem vetustate quasi attritum.

Nucleus.

MYROBALANI NIGRI OSSICVLO,
NON VALDE DISSIMILIS FRV-
CTVS EXOTICVS.

CAP. XXIV.

Descriptio. **M**yrobalani nigri ossiculo non valde dissimilis fructus (per Batauos relatus in prima nauigatione in Iauam) maior tamen, inæqualis, suo externo cortice (si quẽm habuit) aut pulpā nudatus, & duntaxat, vt mihi persuadeo, fructus alicuius ossiculum, quod contractum satis crasso putamine præditum esse obseruabam, & nucleum continere subsuscum, atque in binas partes diuisum. Clus. Exot. lib. 1. cap. 5. Quale sit ossiculum Myrobalani nigri nondum nobis constat.

MYROBALANI OSSICVLO SIMILIS
ANGVLOSVS.

Ossiculo Myrobalani, inquit Cluius Exot. lib. 2. communicatus fructus neque magnitudine, neque etiam forma dispar cum suo ossiculo, ab vna parte hexagono, vel heptagono, neruis oblique per vniuersum dispersis: is autem nigra cute veriùs quàm pulpā tectus erat, acidi saporis: Ossiculum autem duro putamine constabat, in quo nucleus ex rubro fuluescens, non insipidi gustus, sed Amygdalam dulcem vetustam referentis.

*Amygdala
sapore.*

NICARAGVÆ POMVM, NVCE
ROTVNDA.

CAP. XXV

In Nicaragua, inquit Benzo, noui orbis prouincia, Pomi quoddam genus peculiare est, neque Hispaniolę neque vlli alteri Indię parti concessum. Piri nostri specie fermę est, ligno interiore rotundo, Nucis crassitudine, & dimidio amplius, optimi & iucundissimi saporis. Arbor procera, exiguis foliis vestita. Pomum Nicaragua vocant: alij Nicaragua.

*Descriptio
fructus.*

Arbor.

COLA FRVCTVS AD SITIM.

CAP. XXVI

Anonymus quidam ad tabulam Cosmographicam scribit: Fructus qui Cola dicitur, si manius in ore detineatur, sitim restinguit, & impositus aquę, gratum ei saporem indit, & sanos valde confortat, atque stomachum corroborat. Imò literis proditur, quod si puluis ex hoc fructu confectus, putri ventriculo gallinę aut alterius cuiuspiam volatilis inspergatur, putredinem discutit, & pristinam ei qualitatem restituit.

Oleum inde destillatum & Santalis mixtum, febricitanti, si eo inungatur, intra horę duas vel tres sanitatem confert.

Legimus præterea in descriptione Guineę, in regno Congi esse arbores, quę fructum producant Cola dictum, Nucis Pineę magnitudine, continentem alios fructus Castaneis similes: quibus quatuor rubri siue incarnati nuclei continentur, quos dentibus terunt, ac in ore versant, extinguendę sitis gratia. Fructus hi in aquam coniecti eandem aciescere faciunt, ac amarescere palato: stomachum roborant, iecurque corruptum probè emendant.

Sine.

Stomachus.

Mirum.

*Oleum ad
febrim.*

Sine.

*Iecur con-
ruptum.*

DE CORNO.

CAP. XXVII

Cornus satina, seu domestica.

APrunis & Myrobalanis haud insubidè transimus ad Cornos & Cerasos, quę & ipsę carni inclusa putamina, & in iis nucleos edules magna ex parte habent.

Arbor procera satis est Cornus, & multistramis brachiata, cortice subrubro vel cinereo, materie alba, firma, solida & dura. (corticem scabrum, & adstri-

Descriptio.

Ad aseruis



Gallis, ut refert Ruell. Corna cum ematurae-
runt in lagena patentissimi oris satis leuiter &
laxe componuntur, ne collidi possint: deinde ad
fauces usque commilla vinctis surculis sic trans-
uerlis arctantur, ut modicè Corna comprimant,
nec patiuntur ea, cum acciperint liquorem, sub-
leuari: quàmòprimò & liquidissimo melle, vel vi-
cario eius saccharo, vas usque ad summum ita re-
pleatur, ut Corna submersa sint. Hæc ratio non
solum ea custodit, sed etiam liquorem mulsei sa-
porem præbet, qui sine noxa possit interdum da-
ri febricantibus, præsertim si ventris profluuiò si-
mul corripiantur: suoque subacido gustu, & pala-
tum inuitante morosam abigit malaciam. Possunt
etiam torrerì, vel sale Conditi sicut oliuæ, qua-
de re vide Columellam. Quidam saccharum &
melle condiunt Sicut Cefara & Pruna siluestria:
quo pacto parata & esicata dysentericis magno-
pere prosunt. Et iam officinis quibusdam in usu,
ea saccharo condire. Diligentiores etiam pul-
pam ex iis conficiunt & in Electaria concinnant
dysentericis expetissima. Cornar. tradit muria
condita ad assatas carnes in mensa poni, velut oli-
uæ colymbades. Fit & sap. ex iis quemad. ex Ce-
ralis ad prædictos usus & ad optunia. Item ad fe-
bres, ad fluxiones biliosas, ad sitim, ad excitan-
dam appetentiam. Quip & ex eorum decocto &
saccharo ut tradit Matth. liquor, ignis opere & co-
ctura concreuit, coagulaturque, qui præterquam-
quod gratissimo placeat gustu, datur utiliter dy-
sentericis, ac fauimus mentium profluuiò labo-
rantibus.

Ex Corni fructu fit & vinum, hoc pacto. Acci-
pe vini rubri adstringentis lib. C. cornorum ma-
turosum lib. x, aquæ chalybeatæ lib. xii. Commi-
sceantur omnia in vase ligneo mundo, stent dies
quindecim: postea in aliud vas defundatur vinum
cuius nobilis efficacia in omni fluxu.

Electarium verò ex iisdem sic fit à pharmaco-
polis. Cocta corna per cribrum cernunt, pulpam
cum saccharo recoquunt, quo modo cydoniatum
fit, vocantque *caractinam*, cuius usus in alui flu-
ore.

Corna sicca contrita, & cum oleo Myrrino
aut omphacio mista in Emplastri formam, præ-
senti auxilio sunt ad vomitiones, ventriculo im-
posita: contra fluxum autem alui, abdomini in-
ducta: contra menses immodicos, pectini &
coccygi applicata.

In Hæturia abstinent demorsi à cane rabido
per integrum annum à quorundam lignorum con-
tactu, præsertim corni arboris & sanguineæ virgæ
vocatæ: siquidem (ut testantur ij qui rem experi-
mento compertam habent) si harum virgæ tam-
diu manibus teneantur, quosque concalescant,
illic demorsi rabie exagitantur. Memini, inquit
Matth. me vidisse in ciuitate nostra Illicinensi, a-
micum quendam meum rabie correptum, quod
corni arboris virgis, lanam diu excussisset, qui
eorum oblitus, quibus sibi à medicis interdictum
erat, rabidus interijt.

Fructibus etiã corni, qui ad Mosellam & alia in
quibus hæc arbor luxuriat loca incolunt, suis sa-
ginare consueverunt, teste Trago.

Materies validissima Theoph. censetur ut ante
citatum ex l. 3. c. 12. vbi dicitur, id est iaculorum
meminit. Gaza vertit venabula, vsus voce Plini-
ana, qui l. 16. c. 39 sambuco attribuit quæ The-
oph. de corno dixit, ut, fusiùs dicetur l. 5. in
historia sambuci. Cornus igitur propter validita-
tem iaculis expetita Scaligero: & pistrinarijs fa-
bris ad parandos rotarum dentes. Virgis Lanifi-

ces ad contundendas lanas vtuntur. Bizantii mul-
tæ officinæ eorum, qui tornant manubria pro se-
curibus & alijs instrumentis corni ligno præ alijs
scatent, quod durius omnibus alijs lignis perhibea-
tur: Hocque ligno quemad. & Asphendani onustæ
naues aduchuntur Bizantium in prædictos & alios
vsus, ex regione Mengrelia, ut refert Bellon. vi-
de pater etiam in ijs locis hanc arborem plurimã
abundare. Corni lignum, autore Plinio, non aliò
pene, quàm ad radios rotarum, vtile: aut si quid
cuneandum sit in ligno, clauis que figendum ceu
ferreis. Inter Adagia celebris est Gordij nodus,
quem & Gordonium nodum vocant, Hic autem,
autoribus Arriano & Plutarcho, ab Alexandro
magno solutus è corni arboris libro, quamuis alijs
ense dissectum scribant. Vt verò vult lo: Bopst. f.
Porta quæ corni bacce per maturitatem rubescunt,
dysentericis valent, & muliebrium mensium excre-
scentiis, & alba bacca ad rabra profluuiã.



CORNVS FOEMINA, PUTATA VIRGA SANGVINEA.

C A P. XXVIII.

EX Fruticum familia est, quam Cornum fœmi-
nam vulgò appellant, multis itolonibus luxuri-
ans, ramis plurimùm oppositis, cortice spadicco,
sed ramorum sanguineo, odore vinoso prædito,
materie alba & dura. Folia ad corni satia quam-
proximè accedunt, atrorencia, nonnunquam
rubore asperso, bina ex opposito nascentia. Flo-
res in umbella gerit odoratos, candidos, quatuor
foliis radiatis constantes: in medio oblique sur-
gunt totidem eiusdem coloris stamina, itilo recto,
subuiridi. Bacce Hederaceis vel iuniperinis pe-
res, sanguineis periculis appendæ, primum virides,
per maturitatem nigricant, lacuna in umbello
parua perfolia: in quibus ossiculum pulpe aiten-
te, acerba, insuauis, nec sine amare amersum,
striatum, nucleum continens album, amarum. Li-
gni materies, autore Matth. dura osseaque, corna
minimè cedens, virgis corno tenioribus, robustis,
nodosis, cortice sanguinis modo rufescente.

Casalp. fructus niger, ut in ligustro rotundas,
osse binas cavitates habente in quibus singula se-
mina continentur.

Si hæc *Malvastrum* Theoph. seu cornus femina e-
ius & Plinii, hæc pertinent quæcunque superiori
capite de ea tradidimus. Sed an reuera ea sit, ad-
huc sub iudice lis est: uri patebit ex autorum cõ-
trouersia. Satis accedere videtur his notis. Se-
rò fructificat: fructus insuauissimus & inguitabilis:
caudex non admodum extat: stolones graciles ha-
bet sicut vitex: & potius frutex est, quàm arbor.
Quas omnes notas Theoph. suæ Corni fœminæ tri-
buit: Sed & nodos hæc habet, quos vtrisque cornis
cõmunes esse ait idem autor. Repugnat verò quod
corniferæ Theoph. lignum infirmum, fungosum,
& medullam habens tribuit. Huius verò lignum
æquè durum ac firmum sit, ex multorum autori-
tate, quàm corni maris. Sed hanc difficultatem
diligentiores aliquando noua quadam obseruati-
one conciliabunt.

Nihilo certius constar, an sit Virga sanguinea
Plinii. Tam pauca enim de sua Virga sanguinea tra-
dit, ut Oedipo serè opus sit ad explicandum quã
describat: Imò si verum fateari velimus eam nec
describit quidem. Hæc enim de ea tradit, Nec vir-
ga sanguinea felicior habetur. Cortex eius interi-

Gordonia
nodum corni
cortice folio-
rum.

Descriptio.

Folia.

Flora.

Fructus.

Ossiculum.

Materies.

An sit
cornus
fœmina.

An sit
sanguinea
Plin.

rior, quæ præstare, [celerius quam opus esset sanguis] aperit. Idem sanguineum fruticem alibi vocat, & de eius usu ac viribus diversis locis agit, quæ infra trademus in viribus, ne ordo noster interrumpatur.

Dalech. annotat, sanguineos frutices Plinij Tetragonias esse. Theoph. quas Gaza Quadrato-
rias vocat: & addit, sanguineam virgam Plinium appellare. Quæ verò ratione Dalech. dicat, fruticem sanguineum esse Tetragoniam Theophrasti, nondum agnoscimus, cum docti aliam iudicent Tetragoniam ab ea de qua dicitur cap. de Euonymo.

An sit columellæ Opolus, ut olim existimavit Dod. considerandum sanè quæ de opulo pauca tradit Columella, & præcedenti cap. à nobis citata sunt, non malè videntur Virgæ sanguineæ competere. In historia Aceris & alia de opulo opinio trade-

Bellonius eandem plantam Cornum feminam, Virgam sanguineam & sanguineos frutices videtur indicasse, quando ita scribit: Arbor quam Macedones olim cornum feminam nominarunt, quam Galli nunc Latinos imitantes Des Sanguinis vocant, in monte Callagna inter urbem Philippi & Bucephalum nunc *Callam* dictam, sita, non multo minores proveniunt, quam magnæ nostræ corni mares.

An Corn. apud Diosc. hanc intelligit, cum ait: Cornum feminam esse puto, quam Gerin. Faulberbaum & Faulholtz vocant, quidam etiâ Spindelholz. Sed fortè Cornar. contendit duas diversas plantas, aut saltem ductarum nomina. Spindelholz enim Germani de Euonymo dicunt: Faulberbaum verò de Alno nigra.

Apud Cordum in Diosc. quidam hæc annotavit: cornum silu. aliqui interpretantur Faulholtz / Faulbaum: sed in alijs locis alios frutices alii.

Cornus femina, inquit Ruell. dumetis & nemoribus familiaris: sed quod neglectas & ingratas ferat baccas, indignam quæ Corni nomine vocaretur, rura putaverunt.

Math. verò, Corgo, ait, haud absimilis est planta, quæ in Hetruria à sanguineo virgarum colore vulgari idiomate vocatur *Sanguin* & *Sanguinell*. Sunt qui velint Cornum esse feminam, sed non video [inquit] quibus argumentis hoc probare nitantur: Virgam sanguineam esse Plinii non aulam affirmare.

Et alibi scribit: *Sanguis* in Tuscano, multis *Cornis* (Cornus femina) quorundam falsa opinio. Et in Germ. *Barriegel* quidam vocant Pseudocraniam, alii *offam*: Plinio est Virga sanguinea, Corniolus.

Nomina Germanici rationem reddidit Teigen, quia [inquit] fruticis huius lignum, maxime cum apudum fuerit, securi & cætreo, melle in modum impingit, idcirco apud Germanos id nominis sortitus est, ut *Barriegel* vocaretur, licet ea appellatio lignum quoque à nonnullis tribuatur, sed perperam. Quod si hic frutex arborescens hucus in Italia sua non amitteret, vocem illam Celatam Germanicam.

Galenus tamen & Cornum feminam, & Virgam sanguineam Plinij diversis locis dicit, cap. 1. quæ gratum. unde nomen sit apud Gallos, *Sanguis* Ital. *Bos pergeren*. Pseudocrania Cordi, id est, falsa Cornus. Querendum monent hæc sit arborescens frutex, quem à ligno distincta Germ. *Barriegel* appellat, addens Plinio virgam sanguineam esse & emittit Cornum feminam conici, sed cum mox cap. 30. aliam Cor-

num feminam describere, cuius ipse Iconem apponat.

At verò ea icon quæ ex Trago apposta est Cordi nobis neutiquam videtur respondere descriptioni Cordi.

Lonicero, Cornus silu. *Spindelbaum* *Faulbeer* / Cornus femina: Item alibi *Barriegel*, potest dici offa. Sed malè idem duas ponit figuras & duobus locis diversis de eodem frutice agit.

Euchar. Rossin in suo Herbar. scribit Phillyreæ Diosc. existimari à nonnullis *Barriegel*. Intelligit autem Cornum feminam: quo nomine vno loco depingit, & altero sub titulo *Spindelholz* / *Faulbeer* / cornus siluestris.

Dod: hist. Gal. *Cornetier sauvage* Gallis: Theoph: *Sanguis*: Lat. cornus fem. Colum. Opolus: quibusdam Brabantis, *Wilden Ulier* / id est, sambucus silu. ita dicta, quia naper natos ramulos plenos medullæ habet, ut sambucus. Item: Virga sanguinea, ab Ital. dicta *sanguis*, *Sanguinello*. Petro crescentio *Sanguis*: Bel. *Wilde cornellee*, id est Cornus silu. Videtur Theoph. Cornus fem.

Valerius Cordus *Pseudocrania* facit, inquit idem Dod. id est falsam seu spuriam cornum. Nobis verò non videtur Pseudocrania Cordi, licet cum Dod. idem sentiant Lob. C. Bauh. & Schuuenckf. Apud Cordum enim sunt duæ diversæ plantæ eo nomine, quarum neutri nobis videtur convenire, quicquid dicat Lobel. qui sic ait: cornus fem. *Spindelholz* / *Faulbeer*, id est, Fularia. Coriarij expetitur frutex Cordo.

Aduersaria cornum. Pseudocraniam Cordi, & Virgam sanguineam vnum & idem faciunt: quam rectè, ipsi viderint.

Turner. Cornus fem. Angl. quibusdam, *Dogberry tree*: alijs *corne tree* small: alijs, quod latronibus ad verucula conficienda in usu sit, *Prick tree*.

Cautè Cæsalp. *Sanguis* inquit, vulgò, folia subhirsuta: hanc Plin. videtur intellexisse Virgam sanguineam vocans. Hanc autem Theoph. cornu fem. videtur intelligere.

Secure Schuuenckf. corniolus *Sanguis* Theoph. Pseudocrania Cordi, *Scheisbeeren* Sileijs, *Faulbaum* / *Barriegel* Silef. *Spindelholz*. Erimus qui ista nomina in vnius plantæ designationem concordant, is nobis egregius & subtilis Botanicus fuerit: difficultates iam in præcedentibus ex parte declarata, & suis quæque locis declarabatur.

Camer. circumspiciat eadem ferè dicit, quæ Cæsalp. Causam reddit, Virgam sanguineam Plinij asseri non posse, quod brevis sit in ea.

Sanguis & corn. fem. H. Lugd. Tabern. & Thahio. Cornus silu. fem. Rythio. Bohem. *Sanguis* / *Hung. gyronsa*. Reliquarum linguarum synonyma dicta sunt fusc, suis quæque autoribus tributa.

Virgam sanguineam hunc dictum putamus fruticem [si coniecturæ locus est] propterea quod vitæ eius magna ex parte rubent, sanguinis instat, quamvis Veteribus & alijs de causa sic dicta videatur, quod ex verberatione Parricidarum, antequam morti traderentur, sanguine madebant, unde fortè, eius lignum apud Priscos infelicissimum habitum, ut specialius dicitur in viribus.

Suberunt in montosa sanguinei frutices: Plinius. Verum non in montibus tantum. Nam in sepibus, frutetis, siluestribus & saxosis locis passim Germania fruticat. Vidimus etiam circa Montepelium & Paranium. Provenit in Anglia quoque, Turn.

Sanguineum frutex.

Tetragonias.

Dalech.

An Opulus Colum.

Synonyma: zosterium: quæ puto: Idem Cornus feminæ: Virg. Sanguis: & Sanguinell.

Cornar. m.

Cornus femina: in indicat.

Sanguis: lo.

Non est Cornus feminæ: Virga sanguinea: Sanguis: Pseudocrania: offa: Corniolus.

Celatam.

Germ. Cornus fem. Pseudocrania: Pseudocrania.

Phillyrea.

Lonicera: Theophrastus: Opolus: Sambucus silu.

Sanguis.

Dod. m. p. 11.

Lob. m.

Pasaria.

Lonicera: in v. 11.

Corniolus.

Sanguis: m.

Loca.

Tempus

Floret April. & Maio, Dod. Iunio, Trago. Iulij initio in Silcf. Schuuenckfeldio: Nos Montbelg. etiam Septembri, Geneuz octob. & Nouemb. Lugduni Maio, Basil. Aug. sept. ac etiam octobri, praesertim circa Mutetum, (celebrem ob herbarum frequentiam) montem vicinū florentem obseruauimus. Baccæ imminente autumno magna ex parte nigrescunt, Sebemb. maturae.

Vires & vlt.
Baccarum
sapor.
Oleum à
baccis.

Virgæ sanguineæ baccæ, gustu sunt amaro, acerbæ, adstringente, vnde necesse est consimili facultate prædictum esse earum oleum, quod Ananien sia rura in Tridentino agro conficiunt ad lucernarum vsum, expressis torculari, decoctis prius in aqua baccis, vt tradit, Matth. Eodem teste, iam supra dictum in Hetruria demorsos à cane rabido abstinere à contactu sanguineæ virgæ: siquidem si Virgæ tamdiu manibus teneantur, quousque concalescant, illico demorsos rabie aragitant.

Cane ra
bido dicitur
A

An de hac frutice sequentia scribat Fraecast. de contag. morbis. l. 2. in line capitis. 1. considerandum, ait: cur verò & qui sub Orbo arbore iacent, verrus in rabiem vertantur, si alias rabidi fuere, consimilem habet latentem causam si modo verum est, quod fama quadam circumfertur, nihil autem prohibet vapores, qui ex ea arbore continenter exhalant, stupri q. n. de a. & h. licet dicere melancholicis, ad hominem delatos, & intus tales factos idem facere posse, quod & seminaria rabiei, magis autem in eo, qui rursus rabidus, propter derelictam dispositionem.

Orbus ar
bor.

Fructus à turdis multum expetitur, autore Celsalp. Cui non consentit Dod. qui scribit: Baccas sapore ingratas & voluerum nulli desideratas esse. Partium dissimilium sunt, quasdam enim habent calidas, amaras, & extensorias: plurimas verò frigidas, siccas, acerbæ & adstringentes. Et sanè huic Dod. sententiæ optimè quadrat quod de corno sua femina tradit Theoph. fructum eius & Buxi cunctis animantibus ingustabilem esse. An verò re ipsa expetitur sit Celsalp. contrarium, nos latet.

Turdorum
abus
Celsalp. re
preh.
Baccarum
varia sunt.

De Virgæ sanguineæ viribus sic Plin. Nec Virgæ sanguinea felicior habetur. Cortex eius interior cicatrices, quæ præsanauere aperit. Item: sunt qui sanguineis virgis tangunt ea, quæ nolunt his obnoxia esse: nimirum, formicis, erucis &c: Eiusdem frutices viribus vincula suppeditant. At cortice in ea præstare nec compertum, nec verisimile Dod. putat. Nobis vero haud similis putatur quod de eorum contactu infecta fugari scribit. Sed cur infelicem dicit? Modestinus in l. penult. ff. ad leg. Pomp. de Particid. antequam facco parricide inderentur, ostendit in more fuisse positum, vt virgis sanguineis caderentur: nempe ex hac arbore sumptis, non, vt quidam legunt, sanguineis, aut, vt alij interpretantur, sanguine rubentibus, ac torantibus, quoniam hoc lignum infelicissimum haberetur, ac maxime intame. Magius, & ex eo Dal. Perro quæ ex hoc frutice utensilia & rustica instrumenta, potissimum verò ad carros pertinentia conficiuntur, ea diu durant, nec facile corrumpuntur, teste Trago: qui quid in medicina possit, sibi, in expertum fatetur. Camer. verò tradit Italos ex huius ligno aquam stillatitiam elicere, qua sola strumas (si qua fieri id possit ratione) penitus discutiat: sin minus, maturare partem & diminuer. Ryff. Coriarijs expeti hunc fruticem ait: sed indagandum id à coriarijs, an hic ipse sit, quem expetunt. Nobis enim de hac re nihil constat.

Cur infelix
putatur vir
ga sanguin

Parricide
Olim virgis
sanguineis
cadebantur.

Lex de Par
ticid. cap.
fina.

Magius

qua ad
strumas.

Coriarijs

CORVUS ADULTERINA SEV PSEUDOCRANIA CORDO.

CAP. XXIX.

Pseudocrania, arbor est, quatuor, quinque aut sex cubitorum altitudine, caudice distorto vltimum, crassiore quam vt manu complecti queat, cortice vestita sp. idiceo, ramisque pluribus brachiata. Folia habet subrotunda, ac interim in breuem mucronem desinentia, leuissimè per ambitum serrata, raro sesquiunciam latiora, figurâ inter Tiliam, Betulam ac Pirastrum media. Flores post veris initium secus folia è succulis ramulisque profert paruos, colore præpomerum in herbaceo pallecentes, staminibus paucis breuibusque stipatos. In medio flore exiguum & oblongum eminet secururi fructus rudimentum, quod paulatim relicto post se flore, in oblongam excreuit baccam, vtrinque modicè turbinatam, & Corni fructus modo ouatam. Radice nititur multifida, quodquo versus distracta. Nascitur in saxosis collibus inter petras, quales sunt supra Regensburgum urbem (quam Ratibonam vocant) in vtraque Danubij ripa, & circa Selhemium. Cordus.

Descriptio

Folia.

Flores.

Fructus.

Radix.

Locum.

Scimus esse qui velint plantam hanc à Cordo descriptam eandem esse cum Cornu femina quondam, seu Virga sanguinea, vt Dod. Lobel. C. Bauh. Schuuencht. Verum descriptio non videtur nobis conuenire, vt iam monuimus cap. præced.

Considerandum an affinitatem habeat cum Alno nostra baccifera altera.

DE CERASIS IN GLNERE.

CAP. XXX.

In tanta Cerasorum varietate, primum Autotypus Idoginata de ijs prælibanda.

Descriptio.

Ceraso, auctore Theoph. natura peculiaris, magnitudo excelsa, quippe quæ ad xxi v cubitorum altitudinem excreuit, admodum recta, & ab una radice crassitudinis bicubitalis. Foliū habet Mespili (sed Seranæ non Anthedonis. Const. sed prædurum & latius. Vt vel è longinquo hæc arbor colore (& altitudine) cerni queat. Corticis leuore, colore, & crassitudinē Tiliæ (quæ) similis est: idque citius ex ipso conficiunt, sicut etiam è Tiliæ corticibus. Hic cortex neque recto ductu ascendit, neque in ambitu æqualiter (vt Theoph. vulg. habet. quidam iam legendum censent.) ambit, ab inferius sursum se adducens, quemad. & foliorum descriptio. *Idoginata*: intelligimus figuram quando conuoluntur, vtrinque adductis) canque desquamatur, hoc eodem modo decorticatur: alioqui scissilis est, nec pars aliqua eodem filo detrahi potest. Crassitudine verò soliatim attenuatur, corticis reliqua parte æque arborem conseruante, ac integro, quo antea vestiebatur. Cum verò & reliquus cortex auferatur, exit humor quidam. Sin verò externa tantum tunica, reliqua piquitosa (vt Theoph. quodam humore nigrescit. Rursus, quæ anno secundo, tunica, vice illius subnascitur, veram tenuior. Materies neruis cortici similis, tortili ac conuoluta. Virgæ eodem omnes modo illico enascuntur. Ramis crescentibus cuenit, vt inferiores assidue vergant & nucunt, alij sursum versus in-

Radix.

Folia.

Folia.

Cortex.

Theoph. auct.

erescant. Omnino arbor hæc minus nodosa, multo tamen nodosior quam nigra Populus: radice alioqui multiplici, perquam sublimi sed non admodum crassa innititur, & conuolutio eadem radice, & corticis radicem regentis. Flos candidus, Piro & Mespilo proximus, ex parvis floribus constans, forma fauaceus. Fructus ruber, figura Diospyro similis, magnitudine Fabæ, Verum Diospyri nucleus durus, Cerasi autem mollis. Nascitur ubi Tiliæ: omnino autem ubi amies, & rigua. Huic arbori humor in lachrymæ modum densatur. Hæc Theophrastus Cerasi verba, aptè videntur quadrare cum nostra Ceraso, quamvis operosus admodum videretur in descriptione corticis: si quis tamen diligenter attendat, & nostræ quoque aptari posse, intelligent periti.

Flores fauaceos (κενέωδες Gaza legit, non κενοειδές ut vulg. habent) dicit, vel ob concavitates scilicet frequentes, ut Scal. censet, vel quia, ut ipsemet alibi Theoph. loquitur de re simili, est quædam οξύς παλάμη μορφή ἀπὸ τοῦ κενέω, ex qua flores Cerasorum dependent. Istud forte alicui difficultatem iniciat, quod Cerasi nucleus non mollem dicat. Sed sciat, ipsum relativè hoc dicere: præmittit enim Diospyri durum esse. Alioqui per se & simpliciter osiculum Cerasi durum quidem est, quominus dentibus frangi conteriue possit, id quod in suis animadvertitur, qui ea veluti glandes, agminatim, nulloque negotio fracta comminuntur.

Clara sunt, quæ de Ceraso Plin. habet. Medio genere, inquit, l. 15. c. 24. inter baccas acinosque (fructus sunt) Cerasis. Pomum his primò candidum, ut serè omnibus baccis. Mox aliis virefcit, ut Olivis, Lauris: ruber verò Moris, Cerasis, Cornis. deinde nigrescit Moris, Cerasis, Olivis. Notandum tamen hoc loco non omnibus Cerasis nigrescere, sed quibusdam inter eas (speciebus tantum. Idem Cerasum inter peregrinas (Italix) arbores recenset. Quando autem esse experint, dicet in loco. Eidem, sanguineus succus cerasi, quorum intus lignum, extra caro: cute & succo teguntur. Ramulatum Cerasus etiam in x i cubitorum cræbes, æquali per totum quàm cubitotum crassitudine reperitur.

Athenæus Cerasi historiam potius implicat, quam explicat, quado in hunc modum ex Theoph. tradit. De Cerasi hoc Theoph. in opere de plantis scriptum reliquit. Peculiarem quoque naturam formæ est cerasus, vastæ magnitudinis, ut quæ ad cubitum x i v assurgat: folijs Mespilo (Setaniz ne Aronie Dal.) similibus, duris, crassioribus, cortice Tiliæ simili, flore candido, qualis est Piri & Mespili, ex parvulis floribus composito, qui ceram olet. κενοειδής. Apud Athen. κενοειδής: Ruell. suo similis, sicut & nos antè, quam vers. & Scal. & Const. doctissimi viri admittunt. At negat Dal. hoc in flore participi, & odoris Cerei reddit, & omnino regum esse dicit. Et admittimus, tanquam ingeniosam interpretationem, nec relictimus. Sed an ad mentem hoc sit Theophrasti, valde ambigimus: cui consuetum, non vno loco flores aut fructus fauaceos seu κενοειδής dicere, qui in densum agmen & velut in glomerem aut umbellam fauaceo stipatu aggesti sunt. Pergit Athen. Fructu rubro figura, Melampyro [Theoph. Diospyro] simili, fabæ magnitudine: At Melampyri [Theoph. Diospyri] nucleus durus est, Cerasi mollis: [Theoph. Diospyri] nucleus mollis est, Cerasi durus, Diospyros autem est Guaiacana, Dal.] Rursum idem Theoph. crategus: aliis crategum dicitur: (Crægon pædoscè, legend. crataigona Tom. I.

Const.) Folium, inquit, rigidum habet, Mespilo (Aroniz non Setaniz. Arbor hæc Sorbus est terminalis offic. & herbario. Dal.) simile, sed maius, latius, oblongius, & in eo scissuras. Mespilo dissimiles. Arbor ipsa nec crassa est admodum, nec procera: lignum varium, flavum, ærum: cortex lævis, qualis Mespili, radix quæ varca est non altè descendit: fructus rotundus, Olivæ similitis [οἷον ἰσότητος] magnitudine: maturus è flavo nigrescit, succo & sapore Mespili. Quamobrem aggestis Mespilus esse potius arbor videtur. His scilicet verbis Philosophum [Theoph.] arbitror, inquit Athenæus, quod nunc appellant Cerasion indicare. (Egregium sane verò iudiciū in discernendis plantis: sed danda ei venia, ut parum in re herbaria exercitatio. Asclepiades (pergit Athen.) Myricæ arborē quandam chamæcerasum nominans, ita scribit. In agro Bithyniæ chamæcerasus gignitur cuius radix non est admodum magna, nec ipsa arbor: sed par rosarum arbori &c.

Mox cerasi originem traditurus idem Athen. in Græcos invehitur sub nomine Laurentij cuiusdam Rhetoris, his verbis: Vos quidem Græci, vobis multa vendicatis, quod ea primū vel à vobis inventa sint, vel nominata, hoc tamen nescitis, Lucullum, Romanum Imperatorem, qui Mithridatem & Tigranem debellavit, è Cerasiurte oppido Ponti, hanc plantam in Italiam primū aduxisse, eundemque nomine civitatis illius, fructum hunc Cerasum nuncupasse, quod proditum est à nostris Scriptis: (Latinis existimamus) Hæc Athenæus. Ex quibus apparet dubitasse illum quid esset cerasus apud Theoph. & an eadem quæ crategus, de qua egimus cap. de Sorbo terminali, lib. histor. nostræ primo. Nec placet nobis à quibusdam in Græco Athen. textu antiquo & versione Lat. irutata quæ dicuntur de nucleo Diospyri & cerasi in contrarium sensum; quandoquidem ipsemet Theoph. ita habeat: aut monendum erat Athenæum habuisse Theoph. codicem corruptum, quod tamen diligenter considerandum, priusquam certò affirmetur, nec classici Autoris textus tam facile immutandus. Non displicet quidem mutatio lectionis Melampyri in Diospyron, quia ex Theoph. desumpta, resque ipsa se ita habere videtur. Indignum profecto Athenæo iudicemus, post cerasum & crategon tradere de comaro & Menecylo, & postea iterū de ceraso, quasi congeneres essent plantæ, nisi & alibi apud eundem oblectumsemus, eiusdem plantæ historiam, interuentu alterius, & fortè nihil minus quam congeneris, diuulsam, quod in viro docto & ordinis saltem, si non methodi studioso, neutiquam ferendum. Nos ea quæ de comaro scribit, in medio serè illorum quæ citauimus, & in viribus citabuntur, relegauimus ad caput de Arbuto. An verò Guaiacana sit Diospyros, ut censet Dal. suo loco videndum: Sic itaque de tribus distinctis arboribus vno quasi tractu agit Athen. quatum prima est cerasus Theoph. altera Arbuti: Tertia (dicenda in viribus) est cerasi vulgaris, quam nec distinguit à ceraso Theoph. nec an eadem sit docet. Quod autem de Lucullo tradit, eadem & à Plinio de ceraso vulgari tribuntur.

Cerasi porrò & Diosc. meminit, præter vires nihil habens: & Varro, & Palladius, & Galen: qui & Diosphyra habet. Verum quid sint Diosphyra apud Gal. considerandum, & diligentius perquirendum. Const. Diosphyra Galeni eadem patat

Fol.

Fructus.
Faba.
Diospyri.
Locus.Theoph. l.
c. 24.Theoph. c.
24.Plinius c.
24.Cerasi m.
p. 15.Mespili f.
l. 15.
Tiliæ c.
24.Theoph.
Athen.
fract.Melampyri
fructus.

Diospyri.

Crategus.

Arbor pa.
rum in re
herb. citat.Crati ph.
risc.Cerasi cy.
lus, su ne
mini orig.

Athen m.

Dal m.

Athen m.

Diosphyra

nam locum obtinent apud Germanos, quæ puniceæ sunt, seu spadiceæ coloris, acidi saporis, Amarellen / Wichslen / Weinstell ipsæ appellata. Hæc fortè sunt, quæ nonnulli Macedonica, Metasia & Gindola vocant. Acida verò & vulgaria cerasia *Emmerling* vnd *Blodstirsen* Germ. dicta, fortè Aproniana appellari poterunt. Nigra, Germ. *Wildvogelstirsen* / Cerasia Aetiana Latini nominantur. 4. Quæ iucundissimi sunt saporis, & Germ. *Großbundstirsen* nominantur, Iuliana Lat. dicuntur. Rotunda cerasa, Cessiana & Cæcilianæ: Dulcia planè, cuiusmodi sunt alba, Ger. *Wistirsen*. Duracina & Pliniana, quæ Lauro insita fuere & amara prorsus sunt Laurea, & Amarasia nuncupantur.

*Rubra, d-
marcellana.* Fuchsius aliter distinguit, dicens: Multa cera-
storum sunt genera: in Germania tamen tria,
quod sciam, duntaxat proueniunt. Primi enim ge-
neris sunt rotunda, ac maxime rubent, suaque
voce illis dicuntur Amarellen. Alterius generis,
quod ad figuram attinet, prioribus similia sunt,
differtunt autem colore qui illis ad nigredinem ac-
cedit. Vocantur autem illorum lingua Wiedschel.
*Nigra
Wiedschel 3.* Tertij generis predictis minora sunt ac longiora,
partimque rubent, partim nigrescant, à nonnul-
*Dulcia, Kir-
sch.* lis priuatim Birsen / vel Briefsen appellantur.
Quæ in utroque genere nigra sunt, ea vescentium
manus & labra succo suo, qui sanguineus est Mo-
rorum instar inficiunt.

Córdus tradit, austera & maiora, quæ non in magnis arboribus nascuntur, esse ea, quæ è Ponto primum in Italiam Lucullus attulit. Quæ verò dulciora sunt & in proceris arboribus nascuntur, sponte sua ubique in Germania provenire. Dufacina Plinij autort Cornar. etiam hodie durant, suntque ea, quæ ad Rhenum Rincayiana, aut etiam Maguntina appellantur. Hæc oblonga sunt, & cum albore rubent in perfecta maturitate quæ ipsis circa mediû ferè Maium contingit, & omnino præcocium generis sunt. Chamaçrasa ut scribit Alex. Bened. vulgus Marifcas ob morbi similitudinem fortè vocavit, aut morbum pomi nomine alij Laurocêrasa vocare maluerunt.

*Leuco-
rafa.
Differentia
Dod.
Cerasus
Theoph.*

Dod. hæc sunt cerasorum differentie. Prima magna & proceræ arbor siluestris, cui fructus quidam rubent, alij nigricant, sapore dulces. Præcoce olim vocabatur, in hist Gal. Cerasum Theoph. & Gallicè *Guignier* & *Guigne*. Altera: Cerasus magnis folijs, humilior, hortensis, ceraso maiore, carnosiore, dulci, & colore vel rubente, vna tantum parte. albidior: vel nigro: vulgò Hispanicum cognominatum, sortè Lusitanicum Plin. quibus principatum Belgica illius ætate tribuit. Olim Dod. vocabatur ehamæcerasum, Gal. *Gryffes Guignes*, *Cerises d'Espagne*. Brab. *Spaensche Bessen*. Tertia: Cerasus, prioribus humilior ac tenerior: iudices tenuiores: cerasum rotundius, carno-

marellen : & quæ nigra sunt , *Wachsten / Winstel* Brab. *Cruichen* alibi; in Belgio etiam *Reesen*. Ad *Duracina* *Plinij* videntur referenda *Cæciliana* : Item *Actia* nuncupata. Olim *Dod.* hæc dicebatur *Diospyros* siue *Iouis flamma* *Theopl.* interp. *Gaza* , *Gall. Grotier & Grottes. Heerde* , qui nobis obscure ac intricatè satis de *ceratis* scribere videtur .

Tabern. quinque icones cerasorum proponit, cum his titulis. 1. *Bundtsirſchen*, *Cerasia Pliniana*. 2. *Spaniſch Birſchen*: *Cerasia Hiſp.* 3. *Amarellen Birſchen*: *Cerasia acida*. 4. *Wäſſerſirſchen*: *Cerasia aquatica*. 5. *Schwarzſirſchen*, *Cerasia nigra*.

Schuuenecks. in Silesia prouenientia cerasa hæc proponit. 1. cerasus silu. cerasa Cæciliana Plin. Amara & Laurea rubra & nigra, duriuscula, nonnihil amaricantia. 2. Cerasa hort. dulcia, rubra seu cæciliana. 3. cerasa nigra, Actiana: 4. Cerasa Hungarica, Hispanica, Iuliana Plin. Grosse Ungersche Birschen / Spanische Birschen. 5. Cerasa Italica, acidula, acidodulcia, Pliniana, Welsche Birschen: Weisse Birschen / Weinscheurlechte Birschen. Hæc omnium sunt suauissima, quæ in culinas veniunt: rubent. 6. Cerasa austera, Amarena, Aproniana, fructu acido Amarellen: Weichsel vulgò. Oportet autem Schuuenecksel. egregiè cognita habuisse cerasa Plinij, quod tam categoricè de ijs pronuntiare audeat. Et, quod magis, differentes species ad eundem cæciliana refert, siluestria & hortensia, & tam rubra quàm nigra, amaricantiaque: item dulcia. An hæc omnia ex pauculis illis Plin. verbis extorquere potuerit; ut tam certò ipsi constare possit, docti videant.

Sed Matth. consulamur, qui & Italix Cerasia & alia quædam celebrat. Inter cerasi, inquit principem sibi locum vendicant, quæ Hetruscis vulgò *Marchiane* & *Duracine* vocantur: tametli horum alia maiora, alia saturato colore rubcant, alia verò potius albicent. Quæ autem Plinio Iuliana, nobis verò vulgò *Aquamole*, hoc est, aquæ dicuntur, in nullo tantè habentur pretio; quandoquidem adèò sunt tenera & fragilia, vt nullo labore sua concedantur, facile gestata collidantur, & marcescant: quin & ob aquæ partis redundantiam insipida sunt, omique ingrata. Quæ autem, quòd admodum nigrescent, *Corbine* nos vulgò vocamus, Plinius verò *Actia* & *Cæcilianæ*, cum sint dariuscula & dulcia, gustatu habentur non iniucunda: veruntamen quòd manus, dentes ac labra atro colore inficiant, discumbentesque deturpent, mensis raro apponuntur. Sunt & cerasi, quæ vno tantum petiolo ternas, quaternas, quinasue baccas sustinent: quinetiam quæ racematiq; vix modo proueniunt, quorum imago misit ad me Calzol. ac quæ peculiariter in hortis, vineis & viridarijs habetur, viribus & qualitatibus ab alijs cerasorum generibus non differunt. In cerasiorum genere numerantur & illa, quæ Romæ *Pisciole*, Denis *Amarine*, & in alijs compluribus Italix locis *Marasche* vulgò nuncupantur, à sapore (vt puto) dicta, quòd non iniucundi amarois tantillum resipiant. Horum porrò varia notantur genera, quæ etsi omnia sibi acidam afficiant saporem, hæc tamen eius plus, illa verò minùs habent. Rura Tridèntina cæ *Marasche* vulgò nominant, quæ minùs acida gustu deprehenduntur, quorum genus quoddam admodum gratum habetur, quippe quòd in ijs acidodulce sit admistum, ob idque illa palato maxime placeant. Quædam præterea inibi *Marine* & *Marinella* co-

**Devarana,
Cachiana.**

*Tuberc. dis-
ferentia.*

Differ.
 sch. wench.
 Castanea.
 amaraia.
 Laurea.
 Cast.
 A. B. am.
 Hun. ar.
 Hippom.
 Julana.

Asiatica
Asiatica

Swanwick
field. nr.

Differenzial
Nacht.
Italia vera
Ja.

Arabia-
na, terram
que vocatur
sine.

Continued.

Caribana.

Cerasa v.
pedicula

plura.

cerca de
cena.

1000

America.

Adm. 174/100.

•

10

10

Marine, 9

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26







*Præcedat
proinde
Vireo
grandescat.
Et cerasa
sua offibus
nascantur.*

ramina falce concisa, circum radices sepeliantur, ibique marcescant. Cerasos præcoces facit, cogitque maturefcere calx adnota: vel sæpius astusa aqua calida aut lixiuio, sed poma interuelli minus est, ut quæ relicta sunt, grandescant: autor Palladius.

Cerasa sine ossibus nasci Martialis rei rusticæ prudens promittit, si teneram arborem ad binos pedes relictam, usque ad radicem findas, abraque ferro partis vtriusque medullâ, statim subiunctas partes vinculo perstringas, & summâ partem & diuisuras laterum oblinas fimo. Post annum ducta cicatrice diuortia coalescunt. Hanc arborem surculis qui fructum adhuc non tulerunt, inseris, & sine ossibus poma (ut asserit) nascuntur.

Cardanus in opere suo de rerum varietate cerasa sine nucleis nasci generali ratione posse, statuit: postea, postquam priorē Martialis modum proposuisset, addit: cum nunquam hunc fructum viderim existimo aut vix viuere posse, tot vulneribus acceptis, aut non in Italia.

Si cerasus concepto humore putrescit, in truncato foramen excavetur, quo possit sanies educi.

*De Ceraso
patet
Ne formica
nocent.
Ne asinus
obstruat.*

Si formicas patitur, succum Portulacæ debetis infundere, cum aceti mediâ parte penitus, vel vini facibus truncum arboris florentis adlinere.

Si æstu canicularum fatigatur, trium fontium singulos sextarios post solis occasum radicibus arboris iubeamus infundere, sic, ne remedium Luna deprehendat: vel Herbam symphoniacam circa arboris truncum torquebimus in coronam, vel ex ea iuxta unum codicem cubile faciemus: ex Palladio.

*Repositæ
affertur.*

Cerasa dulcia toto anno seruate vix possis: Genesius tamen seruari testatur Cardanus.

Plinii tempore condiebantur, ut Olius, cadis. Ratio hæc à Florentino rei rusticæ autore sic docetur. Cerasia ante Solis exortum arbore sua decerpta, in vas substratâ in fundo saturciâ conijciuntur: dein cerasia superponuntur, iterumque alternis satureia: adicitur nonnihil acidi mellis aliquantum dulcescentis. Seruantur itidem interiectis Arundinum folijs, & in eundem modum alternatim dispositis in cado. Nostri hanc operam impendere nolunt, sed in feruenti Sole ad rugas siccata, diutissime seruant: item molliuscule turri calore passa. Alioqui & in sapam mensam excoquant in annuos vsus.

*Vires &
vires.
Alque.
Quoniam.
Tuffi.
Color carni.
Vires.
Apparet.
Calculus.*

Cerasia in genere frigida & humida purantur. Ea tradente Dioscorido bonam quidem aluum præstât, si recentia sumantur: ac siccata, aluum sistunt. Gummi verò cerasorum cum vino diluto sumptu diuturnæ tussis ineditur: colorem quoque commendat: visum exacuat & appetentiam inuitat. Ex vino etiam potum calculosis prodest. Plinio quoque autore, cerasa aluum molliuat, sed stomacho inutilia. Eadem siccata aluum sistunt, urinam eiciunt. Inuenio (inquit ille) apud autores, si quis matutino rosida cum suis nucleis deponet, in tantum leuari aluum, ut pedes morbo liberentur. Porro Galen. Paulus, ceterique Græci Medicinæ principes rectius & distinctius à saporum differentijs de cerasorum facultatibus videntur tradidisse. Quoniam enim triplici ferè quoad saporum differentia spectantur, nempe dulci, acerbis, & acido: dulcia statuunt magis aluum soluere, & stomacho minus esse grata: acerbis è contra sistere aluum, stomachoque vtiliora esse: acida denique ob eam quam habent incidendi vim, pituitoso excrementis que repleto ventriculo appropinque congerire.

Sed interest, Galenum ipsam audiri, quem

scimus accuratè rerum medicinalium vires æstimasse. Cerasus, scribit ille, arbor fructum fert non paræ adstrictionis in omnibus particulatim plantis participem. Nam & harum, sicut etiam Malorum Granatorum, & Malorum, quibusdam austera qualitas, in quibusdam verò dulcis, non nullis autem acida exuperat. Quinetiam ipsorum dulcium, ea quæ nondum cocta sunt ac matura, quædam admodum sunt acerbis, quædam similiter Moris acida: sed in Moris immaturis acida qualitas acerbam exuperat, in cerasijs non semper. Ergo quæ dulcia sunt, magis quæ in intestinis sunt subducunt, sed minus grata stomacho sunt. Contrà austera & quæcunque acida pituitosis excrementis que stomachis sunt apta: liquidem austera magis deliccant, & nonnihil etiam incidunt. Porro ipsius arboris gummi communem omnibus viscosis & mordacitatis expertibus medicaminibus facultatem obtinet, quæ & ad arterias exasperatas accommodata est. Propriè autem, si quidem, quod quidam subscribunt, verum est, calculo vexatos adiuvat. (add. cum vino bibiturum.) Nam sic illi tenuium partium inest facultas quædam. Item alibi: Ex cerasijs quædam sunt, quæ Moris sunt similia, cuius modi sunt ea quæ minimam habent adstrictionem: alia Ruborum fructus, ut ea quæ euidentius astringunt: quædam autem sunt, quæ vel valentius ijs astringant. Proinde memoratæ cuiusque speciei facultatem, ex ijs, quæ de Moris & Rubi fructibus diximus, potes colligere.

*Dulcia
austera
acida.*

*Gummi.
Arteria
perit.*

Calculus.

Galeno subscribit Paulus. At Simeon Seth. paucissimis rem complexus: Cerasia, inquit, frigida sunt & humida, malique succi, ventrem subducunt, stomacho parum idonea, humidum ventriculum ledunt, præsertim cum matura non sunt: sed calidis & siccis ventriculis & temperaturis profunt. Gummi autem arboris cum vino sumptu calculosos sanat.

Temper.

*Calidius
sumi.*

Celso quoque refrigerant cerasa, aluum mouent, stomachoque idonea sunt.

Athen. refert, virum quendam illustrem Diphilum Siphinium nomine, qui sub Lysimacho rege (vno ex Alexandri successoribus) vixit, multis apud Lucullo antiquotem, (quem supra ex Plin. diximus cerasa primum in Italiam importasse) Cerasorum meminisse his verbis: Cerasa stomacho grata sunt (ἐνὶ στήθεσσι) parum nutriunt, bonum succum gignunt. Cum frigida sumuntur, placeat ventriculo: præferuntur cæteris Milesijs, & quæ magis rubent, quoniam mouent lotium.

*Parum
nutriunt.
Milesijs
Cerasa.
Mouent
lotium.
An Cerasa
stomacho
grata.*

Ita vides non inter se conuenire autores de cerasorum vi stomachica, alijs eadem ἐνὶ στήθεσσι, alijs ἐνὶ στήθεσσι facientibus. Sed facile litem compones si, ut supra fecimus, ex sapore distinguas. Quid si & sic controuersiam tollamus? Cerasa quæ verè talia minus conuenire stomacho: eò quod dulcia sint. At acida & austera, (ut supra alicubi monitum) ne cerasa quidem verè dici. Quidam verbis haud inconcinne eorum vires comprehendunt, ut noster ille Virgilius Germanus.

Eob. Hællus:

Noxia sunt stomacho Cerasi prædulcia poma.

Ingerat hac eadem si quis acerbis, iuuant.

Illæ mouent, hæc astringunt communiter aluum.

Vires eas eadem rubraque Mora tenet.

Ficra:

Ille dedit o Ponto nobis tria Poma Lucullis

Vix tepida & cursus, dulcia, sunt subiti.

Dulcacida, ignito, siccant, apertissimi ventri,

Condis adusta vorax Actra Sole Coquunt.

Dulcacida.

Appetitus *His alius fluida arcerur, sanis improbus ardet*
Crescit Gr.

Calculus *Schola Salernitana.*
Si Cerasum comedas, tibi confert grandia dona
Expurgat stomachum; nucleus lapidem tibi tollit.
Hinc melior toto corpore sanguis inest.
Nec reiicienda interpretatio Arnol'di. Triainquit, his verbis enarrantur comoda ex esu Cerasorum. Primum, expurgare stomachum: quod quibusdam vetum videtur, si nuclei vna contrantur, hoc enim modo abstergunt & emundant. Secundum est, nucleum cerasorum peculiarj proprietate frangere lapidem seu calculum in Vesica, si succus eius sumatur, vel lac inde fiat. Tertium est, carnem cerasorum optimum generate sanguinem, confortare & impinguare: Et hoc experientia comprobatur. Videmus enim passeris qui plurimum cerasis delectantur, eo tempore quo cerasa matura sunt, longè maiora habere hepar, quam alias. Vnde colligitur cerasa hepar augere & confortare.

Cerasorum *discrimen*
tribus accommodat.
Dulcia generat / or-
mes
Pontica.
Cina.
Cina nigra.
Hic notandum duplicia esse cerasa, crassa scilicet & parua. Cerasa rursum duplicia, dulcia & Pontica. Dulcia omnia & parua, insalubria sunt; facile corrumpuntur in corporibus, Vermes generantia. Crassa Pontica, Cina vocata, & ipsa dulcia inueniuntur. Quaedam enim rubra sunt & molles carnis, quæ recentia sunt edenda in principio mensæ: Vim habent adstringendi stomachum, & eiendi appetitus. Alia Cina nigra sunt & crassa, dura carnis, & maxime omnium Pontica, quæ summo loco in prandio siue carna comedenda, quia styptica sua vi in fine mensæ claudunt orificium stomachi, quo clauso digestio melius & citius peragitur.

Obstru.
hepat.
Flava bilis.
Lichenes.
Ruellius acidis cerasis etiam plus tribuit, obstructiones nempe iocinoris infarctu leuare, flauam bilem extinguere: Gummi lichenes infantium ex aceto sanare.

Condita.
Aqua destil.
Lac.
Ad aphor.
nam.
Et Tragus, Cerasa, infit, acida pituitam incidunt, crassosque humores pellunt. Solent illa saccharo quandoque conditi, ægris inflammationibus & calore vehementissimo laborantibus gratissimo cibo.

Feb biliosa.
fiat.
Oris infla-
murat.
Appetitus.
Quidam è nigris siluestribus aquam destillant, quæ amissam loquelam restituere dicitur. Omnia verò cerasorum genera, inquit Matth. quæ Amarina dicuntur, aptissima sunt, vt insolentur, saccharoque condiantur. Quin & sapore commendantur ad intinctus conficiendos, quibus non modò sanis edulia iucundissime condiuntur, sed etiam ægrotantibus, præsertimque biliosis febribus vexatis. Siquidem illis non modò sitim extinguunt, sed oris insuauitatem emendant, & cibi appetentiam conciliant, nec ita facile, deuorata, vt dulcia corrumpuntur in ventriculo, ideoque ad prædictas febres facile conceduntur à Medicis Germanis. A pediculis repurgata vis matura admiscetur, & deinde vinum ex his paratur, gustu gratissimum, quod in alui fluxionibus vtiliter vsurpatur.

Vinum Cera-
for.
Siluestria.
Alium vini cerasorum modum supra docuimus, cuius vsus & in hoc casu esse possit, si vino rubro, nec forti paretur. Siluestria quibus plerumque vescuntur aues, raro in cibis admittuntur, præterquam à rusticis, tum quòd plus offis quam carnis habeant, tum etiam quòd cum quadam acerbitate amara sentiantur. Oleum è nucleis Cerasorum, faciem abstergit, maculas & lentigines aufert, vtile etiam arthritidi, & calculo renum & Vesicæ. Paratur sicut ex Amygdalis, expressione. Cerasorum quorumvis aqua bibitur contra nimios calores & fortis imponitur: priuatim verò dulciami nigro-

tum, quæ & contra Paralytin à multis commendatur si ori infundatur, & os inde benè colluatur, vt amissum linguæ vsus restituat. Destillatur autem vel caro sola, vel vna nuclei quoque contriti, vt calculosam renum & Vesicæ materiam educat destillatus inde liquor.

Nigra & acida, *isula* dicta, aquam reddunt salubrem in febribus, tum alijs, tum pestilentibus, refrigerantem, & confirmantem vires: vtilem quoque aduersus sitim & Dysenteriam, autore Euonymo. Rittius scribit Dulcium nigrosum recentium destillatam aquam quibusdam mirifice commendari ad Epilepsiam, ita vt cumprimùm in os Epileptici paroxismo correpti intusa fuerit, dosi drach. quatuor aut amplius, illico remoueat recreatus, nec villo amplius spasmo conuellatur, donec statuto tempore, vt fieri solet, post aliquot dies, alius paroxysmus oboritur, tumque iterum, vt prius infundendam impetire enim, auferre, atque sanare Paroxysmum. Sunt qui eandem aquam ad hydropem commendent.

Quoniam verò aquæ cerasorum iam aliquoties mentio facta, præscribamus formulam perbreuem parandi Optimam. Exempli loco sit Aq. Cerasorum acidorum. His contritis & Alembico vitreo immixtis affundas bonum vinum, ac destilles in B.M. His destillatis affundas aliquid succi recentem expressi ex prædictis cerasis, vt sapore iucundior fiat efficaciorque. Cor hæc atque Ventriculum mirifice corroborat. Siccis etiam cerasis affunditur mustum: hocque vinum appetitum excitat ac calculum pellit, autore Matth. Existimauerimus, siquidem sicca cerasa, præsertim acida, adstringunt, & vinum hoc modo cum ijs paratum adstrictionem induere, ideoque fluxionibus alui varijs accommodum. Aqua ex rubris acidis destillata, ad fluotes menstruos expetissima putatur, itemque ad dysenterias aliasque fluxiones duarum vel trium vnciarum dosi hausta. Hepar refrigerat, & stomachi ardores compescit. Præstans hæc habetur à quibusdam aduersus pætorum conuulsiones. Aquæ ceras. nigr. & florum Tiliæ aquas partes misce. dosi vnc. j aut ij proxtate.

Egregia est & illa compositio Camer. ad ardorem vrinæ. Nucleorum Cerasorum siluat. vnc. ij. interioris pulpæ optimæ Melonum lib. f. addito pauco sacch. confusa destillentur. Huius aquæ stillariæ cochlearia aliquot ardorem vrinæ mitigant.

Nucleos Cerasorum Taber. commendat ad spleneticos, & ad difficultates vrinæ. Labiorum fissuras emendabis mucagine parata ex gummi cerasorum & aqua rosata, eaque spicula illita.

Nicol. Abr. à Frambois. noui aliquid adferre videtur his verbis. Cerasa [Cerise] recentia aluum laxant, sicca restringunt. Quæ ad perfectam maturitatem perueniunt, dulcia sunt, quæ nondum matura, austera aut acida. Dulcia alunt, solunt: sed ventriculo minùs commoda. Austera contrà. Acida vtilia ventriculo pituitoso & superfluitatibus pleno. Hæc ille, quem non intelligimus in distinctione cerasorum, aciditas, austeritas & dulcedo cerasorum non pendet à maturitate: sed diuersa sunt genera, dulcia, acida & austera.

CERA-

















Appetium *His alius fluida arceatur, famis improbus ardu*
inuenit. *Crescit &c.*

Calculus *Schola Salernitana.*
Si Cerasum comedas, tibi confert grandia dona
Expurgat stomachum; nucleis lapidem tibi tollit.
Hinc melior toto corpore sanguis inest.

Succus Nuc-
cleorum
Cerasi.
Lac ceraso-
rum.

Cerasi pin-
guiscent
passeri.

Cerasorum
describen-
tibus ac-
commodati.
Dulcia ge-
nerat & ar-
mes
Pontica.
Cina.
Cina nigra

Obstru-
tionem
hepar.
Flava bilis.
Lichenes.

Conditi.
Aqua destil-
lata.
Ad apho-
roisiam.

Feb biliosa.
febris.
Oris infla-
mentis.
Appetitus.

Vinum Ce-
rasorum.
Siluestria.

Oleum nu-
clei
Macula
Arthritis.
Calculus.
Aqua Ce-
rasorum.

His alius fluida arceatur, famis improbus ardu
Crescit &c.
Schola Salernitana.
Si Cerasum comedas, tibi confert grandia dona
Expurgat stomachum; nucleis lapidem tibi tollit.
Hinc melior toto corpore sanguis inest.
Nec rejicienda interpretatio Arnoldi. Triain-
quit, his verbis enarrantur comoda ex usu Ce-
rasorum. Primum, expurgare stomachum: quod
quibusdam verum videtur, si nuclei vna conte-
rantur, hoc enim modo abstergunt & emundant.
Secundum est, nucleum cerasorum peculiarj pro-
prietate frangere lapidem seu calculum in Vetrica,
si succus eius sumatur, vel lac inde fiat. Tertium
est, carnem cerasorum optimum generate sangui-
nem, confortare & impinguare: Et hoc experi-
entia comprobatur. Videntur enim passeres qui
plurimum cerasi delectantur, eo tempore quo
cerasa matura sunt, longè maiora habere hepata,
quàm alias. Unde colligitur cerasa hepar augere
& confortare.
Hic notandum duplicia esse cerasa, crassa scilicet
& parua. Cerasa rursus duplicia, dulcia &
Pontica. Dulcia omnia & parua, insalubria sunt;
facile corrumpuntur in corporibus, Vermes gene-
rantia. Crassa Pontica, Cina vocata, & ipsa dul-
cia inueniuntur. Quædam enim rubra sunt & mol-
lis carnis, quæ recentia sunt edenda in principio
mensæ: Vim habent adstringendi stomachum, &
ciendi appetitus. Alia Cina nigra sunt & crassa,
dura carnis, & maxime omnium Pontica, quæ
summo loco in prandio siue cæna comedenda,
quia styptica sua vi in fine mensæ claudunt orifi-
cium stomachi, quo clauso digestio melius & ci-
tiùs peragitur.
Ruellius acidis cerasis etiam plus tribuit, ob-
structiones nempe iocinoris infarctu leuare, fla-
uam bilem extinguere: Gummi lichenes infantium
ex aceto sanare.
Et Tragus, Cerasa, insit, acida pituitam inci-
dunt, crassosque humores pellunt. Solent illa sic-
charo quandoque condiri, agris inflammationi-
bus & calore vehementissimo laborantibus gra-
tissimo cibo.
Quidam è nigris siluestribus aquam destillant,
quæ amissam loquelam restituere dicitur. Omnia
verò cerasorum genera, inquit Matth. quæ Amari-
na dicuntur, aptissima sunt, ut insolentur, saccha-
roque condiantur. Quin & sapore commendan-
tur ad intinctus conficiendos, quibus non modò
sanis edulia iucundissimè condiuntur, sed etiam
agrotantibus, præsertimque biliosis febribus ve-
xatis. Siquidem illis non modò sitim extinguunt,
sed oris insuauitatem emendant, & cibi appeten-
tiam conciliant, nec ita facile, deuorata, ut dulcia
corrumpuntur in ventriculo, ideoque ad prædi-
ctas febres facile conceduntur à Medicis Germa-
nis. A pediculis repurgata visis maturis admiscen-
tur, & deinde vinum ex his paratur, gustu gratif-
issimum, quod in alui fluxionibus vtiliter vsurpatur.
Alium vini cerasorum modum supra docuimus,
cuius vsus & in hoc casu esse possit, si vino rubro,
nec forti pareretur. Siluestria quibus plerumque
vescuntur aues, raro in cibis admittuntur, præter-
quam à rusticis, cum quod plus offis quàm carnis
habeant, cum etiam quod cum quadam acerbitate
amara sentiantur. Oleum è nucleis Cerasorum, fa-
ciem abstergit, maculas & lentigines aufert, vtile
etiam arthritidi, & calculo renium & Vetricæ. Para-
tur sicut ex Amygdalis, expressione. Cerasorum
quorumvis aqua bibitur contra nimios calores &
foris imponitur: priuatim verò dulcium nigro-

tum, quæ & contra Paralyin à multis commen-

datur si ori infundatur, & os inde benè colluatur,

ut amissum lingue usum restituat. Destillatur au-

tem vel caro sola, vel vna nuclei quoque contriti,

ut calculosam renium & Vetricæ materiam educat

destillatus inde liquor.

Nigra & acida, *isula* dicta, aquam reddunt sa-

lubrem in febribus, tum alijs, tum pestilentibus,

refrigerantem, & confirmantem vires: vtilem quo-

que aduersus sitim & Dysenteriam, autore Euony-

mo. Rittius scribit Dulcium nigrosum recentium

destillatam aquam quibusdam mirificè commen-

dari ad Epilepsiam, ita ut cum primò in os Epi-

leptici paroxismo correpti infusa fuerit, dosi

drach. quatuor aut amplius, illico remoueat re-

creatus, nec villo amplius spasmo conuellatur, do-

nec statuto tempore, ut fieri solet, post aliquot dies,

alius paroxismus oboritur, tamque iterum, ut pri-

us infundendam impetire enim, auferre, atque sa-

nare Paroxysmum. Sunt qui eandem aquam ad

hydropem commendent.

Quoniam verò aquæ cerasorum iam aliquoties

mentio facta, præscribamus formulam perbreuem

parandi Optimam. Exempli loco sit Aq. Ceraso-

acidorum. His contritis & Alembico vitreo im-

missis affundas bonum vinum, ac destilles in B.M.

His destillatis affundas aliquid succi recentis ex-

pressi ex prædictis cerasis, ut sapore iucundior fiat

efficaciorque. Cor hæc atque Ventericulum mirifi-

cè corroborat. Siccis etiam cerasis affunditur

mustum: hocque vinum appetitum excitat ac cal-

culum pellit, autore Matth. Existimauerimus, si-

quidem sicca cerasa, præterea acida, adstringunt,

& vinum hoc modo cum ijs paratum adstriccionem

inducere, ideoque fluxionibus alui varijs ac-

commodum. Aqua ex rubris acidis destillata, ad

fluotes menstruos exquisitissima putatur, itemque

ad dysenterias aliasque fluxiones duarum vel tri-

um unciarum dosi hausta. Hepar refrigerat, & sto-

machi ardores compescit. Præstans hæc habetur à

quibusdam aduersus prætorum conuulsionem. Aquæ

ceras. nigræ & florum Filix æquas partes misce. do-

sis vnc. j aut ij pro ætate.

Egregia est & illa compositio Camer. ad ardo-

rem vrinx. Nucleorum Cerasorum siluat. vnc. ij.

interioris pulpæ optimæ Melonum lib. f. addito

pauco sacchi. contusa destillentur. Huius aquæ stil-

laticis cochlearia aliquot ardorem vrinx miti-

gant.

Nucleos Cerasorum Taber. commendat ad

spleneticos, & ad difficultates vrinx. Labiorum fis-

suras emendabis mucagine parata ex gummi cera-

forum & aqua rosata, eaque spicula illita.

Nicol. Abr. à Frambois. noui aliquid adferre vi-

detur his verbis. Cerasa [Cerasis] recentia aluum la-

xant, sicca restringunt. Quæ ad perfectam matu-

ritatem perueniunt, dulcia sunt, quæ nondum

matura, austera aut acida. Dulcia alunt, solunt: sed

ventriculo minùs comoda. Austera contrà. Acida

utilia ventriculo pituitoso & superfluitatibus

pleno. Hæc ille, quem non intelligimus in distin-

ctione cerasorum, aciditas, austeritas & dul-

cedo cerasorum non pendet à matu-

ritate: sed diuersa sunt ge-

nera, dulcia, acida

& austera.


CERA-

CERASVS SILV. AMARA

MAHALEB PYLAEA.

CAP. XXXI.

Descriptio.



Cortex.

Flores.

Fructus.

Matth.

Lacaria.

Lacaria.

Lacaria.

Vaccinia.

Plinius.

Infra.

Vaccinia.

Cerasi sil.

Infra.

Mahalebum vocant quidam arborem Cerasi satis similem ramulosam & furculosam, caudice, teste Dal. plerumque intorto, cortice rimoso, squabro, subcinereo: ramorum vero cortice ex coeruleo nigricante, laui, colore oculis non ingrato, radicibus crassis, multis, brachiatis. Folia Betulaceis similia, aut Popu-

li nigra, minora, paullo minus lata, quam longa, concinne in ambitu crenata, Pruni silulati & pallidius virentia, venosa. Flores odoris grati, ex quatuor foliolis, [vt idem Dal. ait,] nobis, ex quinque congesti, crebrisque staminibus medium occupantibus, filis intus candidis, apice rubro coronatis; cetera Cerasorum floribus similes, albi, minores, pediculis breuibus, vix vncialibus, pluribus ab vno pediculo longiore & ramoso propagatis; quibus succedit parvus fructus, effigie Cerasi, rotundus, niger, amarus, tinctura sua manus insciens, olliculo Cerasi, & nucleo amaricante, eiusdemque saporis cum Cerasi nucleis. Baccæ, inquit idem, succo plene purpureo, qui expressus linthea, coriaque munda & candida, horridissima purpura tingit, colore nec fugaci, nec caduco, sed durissime permanente.

An Lacaria Theophrasti? de qua sic ait: Descendit in plana Lacaria; sic enim in Græco legitur, non Lacaria, vti vertit Gaza. Item auctu facili Lacaria, vbi Gaza rursus Lacaria vertit, quasi Lacaria, sive in vulgatis posteriori loco, Lacaria, prius, Lacaria legitur: nullibi Lacaria. Sed difficile est iudicare ex tam paucis verbis quid per Lacariam vel Lacariam intellexerit Theophrastus, tamen aliqui suspicari suat Mahaleb quorundam esse Lacariam, hic eius meminisse decuit.

An Plin. Vaccinia? Non nisi in aquis (inquit) proueniunt salices, &c: Item Vaccinia Italica aucupis lata, Gallia vero etiam purpura tingendi causa ad seruitiorum vestes. Constantinus è Turnebo legit, Italica mancipis lata: quia mangonio Vaccinii tardatur corporis pubertas, quod erat venalitiis utile. Ego vero (addit Dal.) si eam lectionem probarem, rationem potius ex sequentibus verbis afferrem, quia Vaccinii succo tingantur seruitiorum vestes in purpureo colore. Præterea tardior pubertas his utilis non erat, sed domus, & mangonibus, quod plaris eos nondum barbato venderent.

An Vaccinia nigra Virgilii.

De presenti vero arbore sic scribunt Machi apud Mosycen. Reperuntur etiam & cerasi siluestres, sed non sic passim, vt urbana nascuntur. In

partibus Apuliz plures arbores vidimus, quæ ab incolis loci Nera vocantur, quarum fructus non est Almahaleb, vt mox patebit. Est enim fructus Nera minor, neque nigrior Cerasio domestico, & folio rotundius, minus ac solidius. In caudice autem & ceteris partibus non differt Nera à Cerasio, & tam Cerasius quam Amareus inseritur in Nera, & optime fit.

Producit & gummi Nera affluenter vt Cerasus.

An Trago siluestre cerasi genus, quam Pumiā cerasum aut Chamæcerasum dici posse ait, Lestorem tamen ad Ruellium remittit. At ille loco ab ipso citato meminit Chamæcerasi, quæ nihil commune habet cum Tragi siluestri Ceraso, de qua alibi.

Suam autem sic describit Tragus. In Rheno trago siluestre quoddam & humile cerasi genus reperitur, raris fructuum potissimum gaudens, ligno & fronde satino per omnia simile. At penia eius longe sunt minora satinis, nec etiam vulgare hortense Pisum magnitudine excedunt, colore ferè nigricante tincta, singula singulis suffulta pediculis, dulci, sed ingrato, & qui nauseam vomitionesque excitet, gustu prædita.

C. Bauh. qui apud Matth. Chamæcerasum pergam vocat, satis secure Cerasum siluestrem Tragi pronunciat.

Nos dubitanter proponimus, quia folia & locus non conueniunt cum nostra ceraso amara: folia diuersa à satina: Gaudet etiam locis siccis & petrosis. Non videtur etiam dicenda Chamæcerasus: quandoquidem loco comodo non excelsa in arborem non paruum excreseat. Quid fieret si multa cura etiam coleretur?

An Anguil. in Epist. Arbor Mahaleb propiciens in Italia, Veronensi agro, itinere ad montem Baldum & in Sclanonia: de qua plura apud Serap. Putauit itaque Anguil. hanc arborem de qua hic agimus (si modò eam intelligit) esse Mahaleb Serap. de qua nos lib. 5.

Matth. quoque sic scribit. Mahaleb dicta quibusdam Neotericis planta cuius semen in usu, quævis non sit Phyllyrea. Non desunt argumenta quæ inducunt, vt credam, verum & legitimum Mahaleb Arabum; quia video apud Serap. facultates ex Arabib. desumptas vt Mesue & Rasi, diuersas à Phyllyrea facultatibus: concedo errasse Serap. existimando Phyllyream & Mahaleb Arabum idem esse. Auic. Mahaleb abstergit &c: Marthiolo tamen assentiri non possumus, nec concedere Serapionem errasse. Lib. 5. ostendemus argumenta Marthioli nullius momenti nobis videri.

Dalech. doct. s. Medicus, Chamæcerasum (vt scribit Gesn. in epist. quadam) nominat arbutulam quæ Arabicè Mahaleb dicatur. Aduchi ex Syria, quamuis vbique per sepes istic (circa Lugdunum) nascatur, sed arbore humiliore, fructu minus habito, nucleo & semine tenuiore ac graciliore, folio rotundiore, flore albo &c. Bellonium sibi retulisse seminibus eius quæ odorata sunt, vti Lugduni, illos, qui Chirothecæ odoribus imbuunt.

Dalechampi autem annotat apud Plin. Constantinum putare Vaccinium fuisse Hyacinthum: Se vero arbutulam in sepibus frequentem, quam Mahaleb quidam vocant. Plinius ceterè Vaccinium arbutulam perperam Hyacinthum reddit, tamque cum Hyacinthi bulbosa herba confundit.

Videamus & Rob. Const. verba Lacaria (inquit) apud Theoph. retineo, quamuis alicubi Lacaria habeatur, & Gaza Lacaria legerit: & nisi fallor est Lacaria Serapionis, quæ in agro Veronensi pro-

Nera
Alma
Gummi

Tragus
Siluestre
cerasus
humilis

Serap.
Chamæ-
cerasus
pergam

Mahaleb

Mahaleb
non est
Phyllyrea

Serap. etc.

vsq.

Plin. etc.
















HISTORIÆ UNIVERSALIS PLANTARVM

LIBER TERTIVS.

QVI NVCVM EST , ET EARVM QVÆ VEL FACIE AR-
BORIS , AVT FRVCTVS , AVT NOMINE SOLO CVM HIS ADPINITATEM
indeptz , siue indigenz , siue peregrinz.




DE Pomorum censu & Nucis sunt. Sed harum quoque acceptio ampla & multiplex. *Kajus* sane (Nucis) & *Assici*, & alij Scriptores communi vocabulo fructus omnes, operimento duro tectos appellant. Harum intus corpus, foris lignum, ut *Plinius* limitat. Sed sunt, quibus & extra lignum caro vel pulpa, edque vel edulis, vel cassa & magna ex parte neglecta. Priorum generis pleraque persequitur liber precedens, nimirum nucs plerasque pulpa eduli obiectas, quemadmodum prius Poma, qua magna ex parte sunt edendo: Ergo ea deinceps persequemur, qua *semper* haec it vel ex toto vel ex parte. Neque enim operimenti modus unus. Aliter *Nux Inglands* obtegitur, aliter *Auellana* nostrates, aliter *Indica*, aliter *Pistachia*, aliter *Staphylodendros*. Sunt forte inter peregrinas quibus & nullum tegumentum esse abditum: quadam & tota lignum, aut corpus ferè uniforme. Operimentum, vel coriaceum, vel pulpaceum: & hoc rursus vel edule, vel non. Edule dicimus ad cibum suave, non medicatum, quale *Inglands*, aut *Auellanis* plerisque: non alicui animantium, nec homini. In *Exoticis* tamen nondum de istis plenè innovis, quod ea magna ex parte pulpa vel tegumento exuta ad nos importentur. Sed rem ipsam aggrediemur à *Inglande*, *Nucum* vulgarissima.

NUX IVGLANS.

CAPVT I.

Descriptio



Procera arbor est *Inglands*, multis prælongisque nixa radicibus, trunco ad binum ternumque cubitorum complexu sæpius crassescente, materie ampla, ruffa, vel subfusca, multis exiguis segmentis scarificata, quibusdam partibus undulatum crispa, robusta: firmis, vastisque ramis brachiata, cortice cinereo, crasso, lzui, per senium hiul-

disponuntur, coniugationes claudente folio impari, quorum singularia ampla, sesquipalmum longa, palmum ferè lata, principio & mucrone angustiora, venis obliquis à medio nervo deductis, pulchrè viridantia, odore iucundo, ferè Laureo, sed graviore & vehementi, sapore adstringente. Iulum profert longum, multiplici callo compactilem, cuius flaccescentes paniculæ breui decidunt: tum flos emergit herbaceus, totidemque caliculacea tegumenta, quot flores petiolo contrahuntur, quibus singulis singulæ includuntur Nucis. Nucem siue fructum [quales simul multi confertim ex eodem pendent pediculo] iam perfectiorem tegit pulvinatus calyx, acerbi & amari saporis, nec sine acrimonia, nigro colore manus inficiens, cui subiectus cortex lignosus, rugosus, in duas carinas apertilis, nucleum continens in binas partes ad medium ferè fissum, & penè quadripartitum, revolutionibus cerebri similiter inæqualem, primò mucosum, ac insipidum ferè, deinde per maturitatem callosum, candidum, dulcem, cuticula pallida tectum, exortum trahens ex candida & ex acido amari-

Iulum

Flor.

Fructus

Nucleus

244

co, & in nimas altas dehiscence.

Tom. 4.

cante quadam substantia pulposa, cuius terrestrior portio in lignea vel ex ligneo membranacea quadam nucleorum dissepimenta abit, qualibus tenuioribus interior ossis cavitata magna ex parte obducta est. Integri & maturi magnitudine minoris aut mediocritatis Persici & pulpa vindi, seu integumento externo puluinato, [quem Festus vocat *Culeolum*, quod exiguum *Culeum*] atque carnoso dempto, vicia ferè latiores, & hac ipsa latitudine longiores, ex rotundo in oblongum sub- tumelcentes, sed delumbata virisque quā valua- rum commissura est circinacione rotundi. Sunt & vicia non ampliora: in figura naturali, alia ro- tundiores, longiores alia.

Fructus

Varietas

Huius porro fructus variis & magna ex parte monstrosa est varietas. Nux enim iuglans sua naturali & consueta constitutione bivalvis est, ex duabus carinis aequalibus commissis constituta. Nobis verò multae sunt ad manus, plures obser- uatae, vniuales, binales, sed non medio tenus, ut communes triuales: idque diuersa propor- tione, valua maiore reliquis, vel geminae vel tri- partitae maiori aliis aequaliter tripartita, aliis in- quaher, vna integra, altera gemina, & hoc etiam variè.

Nux nana

Gemma

Est & quae nulla nec valua nec commissura in- signis, sed ouis ferè in modum, ex integra testa constituta. Sunt & nanae, Auellanae mediocrem non excedentes. Geminas habemus, tam firmi- ter & pressim coalitas, ut integras separare non sit: & integra potius duplex, si figuram spectes, quam ex duabus constituta videatur, si in signis ille sulcus per medium ambitum speciosè diuide- ret.

Breui mirandā figurā luxuriā vel in hoc fructu naturam lusibile certum. Reliquas diffi- ciles spe- ciales postea dicemus, hic enim fructus tantum varietatem, magna ex parte monstrosam, paucis insinuasit sit satis.

Anteriorum
placita at
que Sym-
onyma.

Ceterum difficile est pronunciaré & pro certo adfirmare, quid sit iuglans aut quomodo vocetur apud Theophrast. expressam enim & specialem eius descriptionem non inuenimus.

Fortè lib. 3. cap. 7. meminit, nomine *πυρρα* *κρύβας*, de qua ait, earum geminae in vnum foliū finiri. Et Gaza quoque Nucem iuglandem con- uertit. Scaliger tamen annotat, haud satis esse ver- tere, sed vertendum esse in Persica Nuce: quae species sit in Nuce, sicut Pontica & Graeca. Non repugnat tamen Scal. esse iuglandem, alioqui re- futasset: non enim mos eius praeterire quicquam, quod reprehensionē mereatur: sed verbis Theo- phrasti naturam suam significationem relinquen- dam cenet: & rectè. Theophrast. cap. 18. lib. 1.

Persica
Carya.
Persica
Nux

ait: Quorundam semen statim post inuoluerum ambiens subest, ut Palmæ, nucis: *κρύβας* Graecè ha- betur, & Scal. vult interpretandum iuglandis: non tamen existimamus, hunc locum posse conueni- re Auellanis, ideo lectores conferent quae paulò post de nuce Euboica Theophrast. scribemus, quae fortè non alia, quàm iuglans. Scimus Gazam di- uersis in locis *κρύβας* interpretari iuglandem: ve- rum ea loca, & quae *κρύβας* *ή αλληλοπικνής* habet: Auellanas retulimus: *ή αλληλοπικνής*, quae quibus- dam iuglans existimatur, dicemus capite de Ca- stanea. Nux iuglans, *κρύβας* *ή αλληλοπικνής* Dialector. c. de Centauro magno: & cap. proprio: *κρύβας* *ή αλληλοπικνής*, *ή αλληλοπικνής* *κρύβας*: Et cap. de Paeonia, *ή αλληλοπικνής* *κρύβας*: quando ait *κρύβας* *ή αλληλοπικνής* *κρύβας* *ή αλληλοπικνής* Gal. Nux regia (sic in- terpres reddit) eidem lib. de pond. & mens. pen- det drach. quatuor.

Nux iu-
glans.

Cato Nuces caluas, Auellanas Praenestinas & Graecas habet: An vna harum possit esse iuglans, incertum. Varro apertè Nuces iuglandes appel- lat, quando inquit: lib. 4. de ling. Lat. Nux iu- glans, quod hanc Nux antequam purgetur, similis glandi. Hanc glans optima & maxima ab Ioue & glande iuglans est appellata. Eadem, Nux, quod ut nox aërem, ita huius succus facit corpus atrum. *Hac ille*. Ad quae postrema Scalig. Alii, inquit, à nocendo Nucem dictam volunt, quomodo & Graecè quoque *κρύβας* *ή αλληλοπικνής*. Est autem vox Syriaca *Luz*, sed Lin. Nabit, ut *Lympha*, *Nym- pha*. Idem Varro in Geop. ait: Si iuglandes ma- gnae, crebrae, finitimae fundi oram faciunt sterilem. Item: Nucem iuglandem, quantum citius promas, iucundiorē utare, quod vetustate fiat aridior. Ea- dem in arenā seruandam praecipit. iuglandem & Colum. dicit & Palladius, uti suis patebit locis.

Nux cal-
ua.Nux iu-
glans unde

Apud hunc speciatim obseruauimus vocem Tarentinam manifestè competere iuglandi: quia nulla facta mentione vilius Nucis praeterquam iuglandis, dicit: Si Tarentinam facere volueris &c: Clarum quoque eandem vocem non tantum de iuglande dici, verum etiam de aliis nucibus, ut sit epitheton diuersarum specierum, ut patet ex le- xicone Columellae, & dicitur quoque cap. de Auellana. Nuces Virgilius suo quoque celebravit carmine: Ecl. 8.

Nux Taren-
tina

Musse nugas incide faces, tibi ducitur uxor:

Spargite marite Noces, tibi deferre Hesperum

arian.

Noces
spargere.

Spargebantur autem olim in Nuptiis boni omnis ergo, quod hae essent in tutela Iouis, cuius felix erat cum Iunone in matrimonium: Indèque & iuglandem quasi *Iouis glandem* dictam volunt. Alio- qui etiam Noces spargere adagialiter dicitur, pro relictis nugis & puerilibus exercitiis, ad grauiora se conferre, quod Perlius insinuasit videtur: quan- do ait.

Iuglans
unde

— Et Nucibus facimus quacunque relictis

Cum sapimus paternos.

Et Catullus lepidè:

Da nutes pueris iners

Concubine: satis diu

Lusui nucibus: lubet

Iam ferre Talasio.

Virgilius verò etiam praedictiones ex Nuce iuglande desumptas videtur: sic canens: Georg. 1.

Contemplator item, cum se Nux plurima syluis

Induet in florem, & ramos curuabit olentes:

Si superant sacris, pariter frumenta sequentur,

Magna que cum magno veniet tritura calore.

At si luxuria florum exuberat umbra,

Nequaquam pingui palea teret arca culmos.

Curtius Nucem interpretatur hoc loco Nucem Amygdalum: sed quā id ratione, vel quā saltem apparenti, nondum videmus. Considerent le- ctiores, an per florem Virg. non intellexerit Iulos iuglandis, & an Amygdalus propriè habeat ra- nos olentes. Aut quis unquam Amygdalum sim- pliciter vocauit Nucem? quis eam in syluis cresce- re dicat. Crescit sanè Nux, si rariùs in syluis, in sylvarum marginibus frequenter.

Curtius
notat.

Sed attendamus quid Plinius de hac tradat. Ab his (Sorbis) inquit locum amplitudine vindicaue- runt, quae cessere auctoritati Noces iuglandes: quanquam & ipse nuptialium Fescenniorum co- mites, multum Pincis minores Vniuersitate, ex- demque portione ampliores nucleo. Nec non & honor his naturae peculiaris, gemino protectis o- perimento, puluinati primum calycis, mox lignei putaminis. Quae causa eas nuptiis fecit religiosas

tot

tot modis fecit munito: quod est verisimilius, quam quia cadendo tripudium sonitue faciant. Et has e Perside à regibus translatis, iudicio sunt Græca nomina. Optimum quippe genus earum Persicon atque Basilicon vocant. Et hæc suere prima nomina. Caryon à capitis grauedine, propter odoris grauitatem conuenit dictum. Tinguuntur cortice earum lanæ, & rufatur capillus, primum prodeuntibus nucibus. Id compertum infectis tractatu manibus. Pinguescunt vetustate. Sola differentia generum in putamine duro fragilive, & tenui ac crasso, loculoso & simplici. Solum hoc pomum natura compactili operimento clausit. Namque sunt bifidæ putaminum carinæ, nucleorumque illis quadripartita distinctio, lignea intercurrente membrana. Cæteris quicquid est, solidum est, ut in Auellanis, & ipso Nucum genere. Cato Græcas nominat, quas quidam & in Iuglandium genere seruant. Adiecit præterea Auellanas, & Galbas [Caluas ex Vet. gloss. Turn.] Prænestinas, quas maximè laudat, & conditas ollis, in terra seruari virescunt. Nunc Thasiz & Albopse celebrantur. Et Tarentinorum duo genera, fragili putamine, ac duro: quæ sunt & amplissimæ, & minimè rotundæ. Præterea Molluscæ putamen rumpentes. Sunt qui honoris nomen interpretentur, & Iouis glandem esse dicant. Nuper Consularem virum audui, biferas & Iuglandes nuces habere se profectum. Hæc Plin. qui & diuersis locis de Nuce Iuglande hæc habet. Succus pinguis Nuci Iuglandi: putamine clauduntur: his intus corpus, foris lignum: iidem putamen statim recedit à ligno, extra gemina geminantur vicia: gravis & noxia etiam capiti humano, omnibusque iuxta satis Iuglandium umbra, quæcunque attingit, non dubie venenum est.

Porro quod de tripudio ait Plin. id ita habet. Patresfamilis sponi cum domesticos pueros meritorios ab officio turpi dimitterent, nuces dabant, quas spargerent *negotia fessum macerantes*.

Apud Græcos, eodem instituto nouis sponsus in *εὐχὰς*, Iuglandes, Amygdala, & Noces id genus alias spargebat, ut putant Grammatici, nuptæ clamor ne audiretur. Scalig. in Catulum.

Duras apud Festum Titinnius *μαράσια* vocat, unde diminutivum *μαράσιον*.

In veteri glossario Calua Nux, *καὶ οὗτος βασιλικός*. Turnebo Calua Nux alia est. Plautus in Calceolo Molluscam Nucem super eius dixit impendere regulas, quam Iuglandem quidam interpretantur, & Plinius citato loco ad eorum genus refertur videtur.

Scaliger reprehendit Plin. quod solius Iuglandis nucleum binis legi valuis scripserit. Nam & in Pistaciis (inquit) vestigia quæ per seipsa hiant, aliquando vetustate. Mollusculæ sanè Iuglandis (addit idem) omnino genus, aut cum Tarentino idem.

Illud animaduertentes e Iuglandem observatione, *αὐτὸν* apud Theoph. lib. 1. c. 13. hist. distingui *αὐτὸν*, tanquam diuersum à Iuglande, ut intelligas errorem Gazzæ, qui lib. 5. nec semel *αὐτὸν* Nucem pro Iuglande est interpretatus, dum Plinii auctoritatem nimis securus famæ sequitur.

Nec temerè quis dubitauerit, an quæ Plin. de Tarentinis dixit, intelligenda de Iuglande, ut sanè intellexisse videntur Ruell. & Curtius, quorum hic ait: Est aliud nucis Iuglandis genus, quod Tarentinum dicitur, quod ita molle est, ut vix ac-

treclatum frangatur: Tarento, quod est Sabino- rum lingua molle. Ad quod alludit Horatius:

—Et molle Tarentinum.

De qua in libro Faudini, auctore Macrobio, sic reperitur. Itemque quidam Tarentinas onces, vel Nuces dicunt, quæ sunt Tarentinæ. Tarentinorum tamen Plin. duo genera posuit, ut prius dictum.

Esse præterea quoddam genus Iuglandium Nuces sine putamine edentium Africanus auctor est, quamquam arte id fiat & cultura.

Rarum & propemodum ostento proximum, quod Tragus refert Vasoniz, qui locus ad Rhenum situs est, Iuglandem repperit, quæ ante diem D. Ioan. sacrum (qui non multò ante solstitium æstiuum incidere solet) neque folia, neque Nuces ostenderet. Cum verò id tempus adesset, parem reliquis nucibus fuisse, quod ad fructum & fossa atinebat, id quod singulari naturæ miraculo factum credit.

Apud eundem Tragum in margine scriptum inuenimus, eiusmodi arbores Gengenbachii binas extare. Tales sanè aliquando etiam circa Tigurum vidimus. An quia impedimentum aliquod habeant, vel à radice, vel à solo, quo tardius germinant? An verò species quædam peculiaris naturæ, vel arte aliqua ad hæc comparata?

Cæterum quod Plin. de biferis Iuglande obiter tetigit, haud vatum videtur. Nam & Hermol. doctus & facile dignus Scriptor, biferas Iuglandes Siluanion Patavinæ agri viculo prouenire, satis constare tradit.

Eiusdem observationis est, germinare hanc arborem, non cacumine, ut maxime pars arborum, sed lateribus, impulsio priore pullulo, quæ forma & caudex totus & prægrandes rami crescunt.

Mutari in Quercum serio nonnulli produnt: quod nobis sanè fabulæ aut Græcæ mendaciæ speciem propius esse videtur, quam vel rationi, vel experientia, quibus non potest non perpetuo credere stipata veritas in naturalibus. Nam de ut quæ prodigiosè transformantur eos sollicitos esse sinamus, qui se Magos, aut Magis professores gloriose buccina proclamant.

Tarentinas duriores & amplissimas, à frangendis mori & *μαράσια* à quibusdam vocari, idem Hermol. tradit. Præterea Molluscæ putamen rumpentes. Idem Macrobius qui Persicum vulgò dictum, Molluscam esse putat, apertè hallucinatum, cum is non de Persico, sed de Nuce Regia & Iuglande, quæ sit e Perside conuecta primum ad nos *μολλυσκὰ* intelligat: nam à quibusdam Nucem Persicam vocari tradit, Sueui hominis doctissimi testimonio fretus.

Thasiam quoque Nucem atque Græcam Amygdalarum esse generis Cloatius existimat.

Prænestinam Macrobius eandem esse cum Auellana Varonis & Neui auctoritate meminit.

Iuglandem Diosbalanon Theoph. vocasse auctor est Cloatius. Sed certè Diosbalanos Castaneam Diosc. significat. Proinde non parcius errauerit Non. Marcellus, qui Iuglandem pro sylvestri nuce interpretatus est.

Persicas & Regias Græci, uti tradit Marcellus: Romani verò Iuglandes in genere Nucum eas dixerunt, quas nunc priuatim Hetruria gentisque aliæ multæ Nuces nominant. Nuces Ponticæ, siue ut Theoph. ab Heraclea Ponti ciuitate semper appellat, Heracleoticæ.

Iuglans, (tradente Ruell.) Græcis Caryon Basilicon, id est, Regia Nux, interdum Persica, Euboi-

cante quadam substantia pulposa, cuius terrestrior portio in lignea vel ex ligneo membranacea quiddam nucleorum dissipatione abit, qualibus tenuioribus interior ossis cavitatis magna ex parte obducta est. Integri & maturi magnitudine minoris aut mediocritatis Persici & pulpa viridi, seu integumento externo puluinato, [quem Festus vocat *Culeolum*, quod exiguum *Culeum*] atque catenoso dempto, vncia ferè latiores, & hac ipsa latitudine longiores, ex rotundo in oblongum sub- tumefcentes, sed delumbata vtrinque quā valua- rum commissurae & circinatione rotundi. Sunt & vncia non amphiores: in figura naturali, aliæ ro- tundiores, longiores aliæ.

Fructus

Varietas

Huius porro fructus varia & magna ex parte monstruosa est varietas. Nux enim iuglans sua naturali & consueta constitutione bivaluis est, ex duabus carinis aequalibus commissis constituta. Nobis verò multæ sunt ad manus, plures obseruatæ, vniualues, bivalues, sed non medio tenus, vti communes triualues: idque diuersa propor- tione, valua maiore reliquis, vel gemina vel tri- partita maiori talis aequaliter tripartita, aliis in- qualiter, vna integra, altera gemina, & hoc etiam variè.

Nux nana

Gemma

Est & quæ nulla nec valua nec commissura in- signis, sed cui ferè in modum, ex integra testa constituta. Sunt & nanæ, Auellanæ mediocrem non excedentes. Geminas habemus, tam firmiter & pressim coalitas, vt integras separare non sit: & integra potius duplex, si figuram spectes, quàm ex duabus constituta videatur, ni in signis ille sulcus per medium ambitum speciosè diuide- ret.

Brevi mirandâ figuræ luxuriâ vel in hoc fructu naturam insisse certum. Reliquas diffusi- uas spe- ciales postea dicemus, hic enim fructus tantum varietatem, magna ex parte monstruosam, paucis insinuasce sit laus.

Auctorum placita atque Synonyma.

Ceterum difficile est pronunciare & pro certo adfirmare, quid sit iuglans aut quomodo vocetur apud Theophrast. expressam enim & specialem eius descriptionem non inuenimus.

Fortè lib. 3. cap. 7. meminit, nomine *πρωκινός* *πρωκινός*, de qua ait, earum germina in vnum foliū hinc. Et Gaza quoque Nucem iuglandem con- uertit. Scaliger tamen annotat, haud laus esse ver- tere, sed vertendum esse in Persica Nuce: quæ species sit in Nuce, sicut Pontica & Græca. Non repugnat tamen Scal. esse iuglandem, alioqui re- futasset: non enim mos eius præterire quicquam, quod reprehensionē mereatur: sed verbis Theo- phrasti nativam suam significationem relinquen- dam cenet: & rectè. Theophrast. cap. 11. lib. 1. ait: Quorundam semen statim post inuoluerum ambiens subest, vt Palmæ, nucis: *καὶ τὸν* Græcè ha- betur, & Scal. vult interpretandum iuglandis: non tamen existimamus, hunc locum posse conuer- re Auellanis, ideo lectores conferent quæ paulò post de nuce Euboica Theophrast. scribemus, quæ fortè non alia, quàm iuglans. Scimus Gazam di- uersis in locis *καὶ τὸν* interpretari iuglandem: ve- rum ea loca, & quæ *καὶ τὸν* *καὶ τὸν* habet: Auellanas retulimus: *διὲς* *καὶ τὸν*, quæ quibul- dam iuglans existimatur, dicemus capite de Ca- stanca. Nux iuglans, *καὶ τὸν* *καὶ τὸν* Dilibcor. c. de Centauro magno: & cap. proprio: *καὶ τὸν* *καὶ τὸν*, *καὶ τὸν* *καὶ τὸν* Et cap. de Pæonia, *καὶ τὸν* *καὶ τὸν* *καὶ τὸν* quando ait *καὶ τὸν* *καὶ τὸν* *καὶ τὸν* *καὶ τὸν* Gal. Nux regia (sic in- terpres reddidit) eidem lib. de pond. & mens. pen- det drach. quatuor.

Nux iuglans

Cato Nuce caluas, Auellanas Prænestinas & Græcas habet: An vna harum possit esse iuglans, incertum. Varro apertè Nuces iuglandes appel- lat, quando inquit: lib. 4. de ling. Lat. Nux iuglans, quod hæc Nux antequàm purgetur, similis glandi. Hæc glans optima & maxima ab loue & glande iuglans est appellata. Eadem, Nux, quod vt nox autem, ita huius succus facit corpus atrum. Hæc ille. Ad quæ postrema Scalig. Alii, inquit, à nocendo Nucem dictam volunt, quomodo & Græcè quoque *καὶ τὸν* *καὶ τὸν*. Est autem vox Syriaca *Luz* sed Lin. Nabit, vt *Lympha*, *Nym- pha*. Idem Varro in Geop. ait: Si iuglandes ma- gnæ crebræ, finitimæ fundi oram faciunt sterilem. Item: Nucem iuglandem, quantò citius promas, iucundior vtare, quod vetustate fiat aridior. Eod- dem in arenâ seruandam præcipit. iuglandem & Colum. dicit & Palladius, vti suis patebit locis.

Apud hunc speciatim obseruauimus vocem Tarentinam manifestè competere iuglandi: quia nulla facta mentione vllius Nucis præterquam iuglandis, dicit: Si Tarentinam facere volueris &c: Clarum quoque eandem vocem non tantum de iuglande dici, verum etiam de aliis nucibus, vt sit epitheton diuersarum specierum, vt patet ex le- ctione Columellæ, & dicitur quoque cap. de Auellana. Nuces Virgilius suo quoque celebrauit carmine: Ecl. 8.

Mopse nugas incide faces, tibi ducitur uxor:

Sparge marite Nuces, tibi deserit Hesperus *Nuces*
atan. *spargere.*

Spargebantur autem olim in Nuptiis boni ominis ergo, quod hæc essent in tutela Iouis, cuius felix erat cum Iunone in trimonium: Indèque & iuglandem quasi *Iouis* glandem dictam volunt. Alio- qui etiam Nuces spargere ad agaliter dicitur, pro relictis nugis & puerilibus exercitiis, ad grauiora se conferre, quod Persius insinuasce videtur: quan- do ait.

—Et Nucibus facimus quacunque relictis

Cum sapimus paternos.

Et Catullus lepidè:

Da nudes pueris iners

Concubine: satis diu

Lusuri nucibus: lubet

Iam seruire Talasi.

Virgilius verò etiam prædictiones ex Nuce iuglande desumpsisse videtur: sic canens: Georg. 1.
Contemplator item, cum se Nux plurima syluis
Induet in florem, & ramos curuabit olentes:
Si superant sacus, pariter frumenta sequentur,
Magnaque cum magnis veniet trientra calore.
At si luxuriâ florum exuberat umbra,
Nequicquam pinguem palea teret arca culmos.

Curtius Nucem interpretatur hoc loco Nucem Amygdalum: sed quâ id ratione, vel quâ saltem apparenti nondum videntur. Considerent le- ctiores, an per florem Virg. non intellexerit lulos iuglandis, & an Amygdalus propriè habeat ra- nos olentes. Aut quis vnquam Amygdalum sim- pliciter vocauit Nucem? quis eam in syluis cresce- re dicat. Crescit sanè Nux, si rariùs in syluis, in sylvarum marginibus frequenter.

Sed attendamus quid Plinius de hac tradat. Ab his (Sorbis) inquit locum amplitudine vindicaue- runt, quæ cessere auctoritati Nuces iuglandes: quanquam & ipsæ nuptialium Fescenniorum co- mites, multum Pineis minores Vniuersitate, ex- demque portione ampliores nucleo. Nec non & honor his naturæ peculiaris, gemino prætectis or- perimento, puluinati primùm calycis, mox lignei putaminis. Quæ causa eas nuptiis fecit religiosas

tot

tot modis forte munito: quod est verisimilius, quam quia cadendo tripudum sonitumve faciant. Et has e Perside à regibus translatae, iudicio sunt Graeci nomina. Optimum quippe genus earum

Nux Persica. Persicon atque Basilicon vocant. Et hæc suere prima nomina. Caryon à capitis grauedine, propter odoris grauitatem conuenit dictum. Tinguuntur cortice earum lanæ, & rufatur capillus, primum prodeuntibus nucibus. Id compertum insectis tractatu manibus. Pinguescunt veritate. Sola differentiæ generum in putamine duro fragilive, & tenui ac crasso, loculoso & simplici. Solum hoc pomum natura compacti operimento clausit. Namque sunt bifida putaminum carina, nucleorumque illis quadripartita distinctio, lignea intercurrente membrana. Cæteris quicquid est, solidum est, ut in Auellanis, & ipso Nucum genere. Cato Græcas nominat, quas quidam & in Iuglandium genere seruant. Adiecit præterea Auellanas, & Galbas [Caluas ex Vet. gloss. Turn.] Prænestinas, quas maximè laudat, & conditas ollis, in terra seruari virescens tradit. Nunc Thasica & Albanæ celebrantur. Et Tarentinorum duo genera, fragili putamine, ac duro: quæ sunt & amplissimæ, & minimè rotundæ. Præterea Molluscæ putamen rumpentes. Sunt qui honoris nomen interpretentur, & Iouis glandem esse dicant. Nuper Consularem virum audiui, biferas & Iuglandes nuces habere se profitebatur. Hæc Plin. qui & diuersis locis de Nuce Iuglande hæc habet. Succus pinguis Nuci Iuglandis: putamine clauduntur: his intus corpus, foris lignum: indem putamen statim recedit à ligno, extra gemina geminantur vicia: gravis & noxia etiam capiti humano, omnibusque iuxta satis Iuglandium vmbra, quæcunque attingit, non dubiè venenum est.

Nuxes. *Urtica.* *Galba.* *Prænestina.* *Thasica.* *Albanæ.* *Tarentina.* *Molluscæ.* *Iuglandis.* *Basilicon.*

Porro quod de tripudio ait Plin. id ita habet. Patresfamilias sponi cum domesticos pueros incitatorios ab officio turpi dimitterent, nuces dabant, quas spargerent nuptialia seseuina cantantes. Apud Græcos, eodem instituto nouis sponsus in ætæque Iuglandes, Amygdala, & Noces id genus alias spargebat, ut putant Grammatici, nuptæ clamor ne audiretur. Scalig. in Catul. lum.

Moracia. *Calua.* *Nux.* *Molluscæ.* *Plin. apud.*

Duras apud Festum Titinnius *Moracia* vocat, unde diminutium *Moracillum*. In veteri glossario Calua Nux, καρυω βασκινον. Turnebo Calua Nux alia est. Plutus in Calceolo Molluscæ Nucem super eius dixit impendere regulas, quam Iuglandem quidam interpretantur, & Plinius citato loco ad eorum genus referre videtur.

Molluscæ. *Iuglandis.* *genus.* *Caryon.* *Hubucum.* *diuersum.* *Gazæ.*

Scaliger reprehendit Plin. quod solius Iuglandis nucleum binis legi valuis scripserit. Nam & in Pistaciis (inquit) vestigia quæ per seipsa hiant, aliquando veritate. Molluscæ sanè Iuglandis (addit idem) omnino genus, aut cum Tarentino idem.

Tarentina. *hub.*

Illud animaduertentes ex eiusdem observatione, & sicut apud Theoph. lib. i. c. 18. hist. distingui debet, tanquam diuersum à Iuglande, ut intelligas errorem Gazæ, qui lib. 5. nec semel & Basilicon Nucem pro Iuglande est interpretatus, dum Plinii auctoritatem nimis securus famæ sequitur. Nectemerè quis dubitauerit, an quæ Plin. de Tarentinis dixit, intelligenda de Iuglande, ut sanè intellexisse videntur Ruell. & Curtius, quorum hic ait: Est aliud nucis Iuglandis genus, quod Tarentinum dicitur, quod ita molle est, ut vix at-

Tom. I.

treclatum frangatur: à Tarento, quod est Sabino- rum lingua molle. Ad quod alludit Horatius:

—Et molle Tarentum.

De qua in libro Faudini, Authore Macrobio, sic reperitur. Itemque quidam Tarentinas onces, vel Nuces dicunt, quæ sunt Tarentinæ. Tarentinorum tamen Plin. duo genera posuit, ut prius dictum.

Esse præterea quoddam genus Iuglandium Nuces sine putamine edentium Africanus author est, quamquam arte id fiat & cultura.

Rarum & propemodum ostento proximum, quod Tragus refert Vaspone, qui locus ad Rhe-num situs est, Iuglandem repertam, quæ ante diem D. Ioan. sacrum (qui non multo ante solstitium æstiuum incidere solet) neque folia, neque Nuces ostenderet. Cum verò id tempus adesset, parem reliquis nucebus fuisse, quod ad fructum & folia attinebat, id quod singulari naturæ miraculo factum credit.

Apud eundem Tragum in margine scriptum inuenimus, eiusmodi arbores Gengenbachii binas extare. Tales sanè aliquando etiam circa Tigillum vidimus. An quia impedimentum aliquod habeant, vel à radice, vel à solo, quo tardius germinant? An verò species quædam peculiaris naturæ, vel arte aliqua ad hæc comparata?

Cæterum quod Plin. de biferis Iuglande obiter tetigit, haud vatum videtur. Nam & Hermol. doctus & facile dignus Scriptor, biferas Iuglandes Situatiensibus Patavini agri viculo prouenire, satis conitare tradit.

Eiusdem observationis est, germinare hanc arbo- rem, non cacumine, ut maxima pars arborum, sed lateribus, impulso priore pullulo, quæ forma & caudex totus & prægrandes rami crescant.

Mutari in Quercum serio nonnulli produnt: quod nobis sanè fabula aut Græcæ mendacii speciem propius esse videtur, quam vel rationi, vel experientia, quibus non potest non perpetuè incedere stipata veritas in naturalibus. Nam deus quæ prodigiosè transformantur eos sollicitos esse sinamus, qui se Magos, aut Magis professores gloriofa buccina proclamant.

Tarentinas duriores & amplissimas à frangendi morâ & *Moracia* à quibusdam vocari, idem Hermol. tradit. Præterea Molluscæ putamen rumpentes. Idem Macrobius qui Persicum vulgò dictum, Molluscæ esse putat, aperte hallucinat, cum is non de Persico, sed de Nuce Regia & Iuglande, quæ sit e Perside conuecta primum ad nos *Molluscæ* intelligat: nam à quibusdam Nucem Persicam vocari tradit, Sueui hominis doctissimi testimonio fretus.

Thasiam quoque Nucem atque Græcam Amygdalarum esse generis Cloatius existimat.

Prænestinam Macrobius eandem esse cum Auellana Varonis & Neui auctoritate meminit.

Iuglandem Diosbalanon Theoph. vocasse author est Cloatius. Sed certè Diosbalanos Castaneam Diosc. significat. Proinde non parcius errauerit Non. Marcellus, qui Iuglandem pro syluestri nuce interpretatus est.

Persicas & Regias Græci, uti tradit Marcellus: Romani verò Iuglandes in genere Nucum eas dixerunt, quas nunc priuatim Hetruria gentisque aliæ multæ Nuces nominant. Noces Ponticæ, siue ut Theoph. ab Heraclea Ponti ciuitate semper appellat, Heracleoticæ.

Iuglans, (tradente Ruell.) Græcis Caryon Basilicon, id est, Regia Nux, interdum Persica, Euboi-

X 3

eaque, Gallis *Nuierum* dictam. Nucis callosum her-
baceumque corticem *Guliscam* dicunt: Tenuis tu-
nica, *Nauis*, ut quidam volunt, nominatur. In-
feriori sui parte fertiliores sunt Iuglandes. Sed mi-
rum est, quod proditur, Quercum & Iuglandem
tam pertinaci odio dissidere, ut iuxta Nucem Iu-
glandem depacta moriatur, quā mutari in Quer-
cum senio nonnulli tradant. Eandem esse Nucem
Persicam, Regiam, Iuglandem, fatebitur, qui bo-
nos autores euoluerit. Optimum earum genus
Persicum atque Basilicon, in eo gerere, quā mol-
lior sit, & putamen frangat, *M. Musca* dicitur, ut
Tarentina quā nuda coruge, vel molli & fragili
prodeat putamine.

Nos quod de odio inter Iuglandem & Quer-
cum scribit Ruellius, facile credimus. Iuglans
enim citò crescit, & magna sua umbra Quercui of-
ficat, amplissimiisque radicibus vicinā cunctā abū-
dit, tardiusue crescenti alimentum subripit. Sed al-
terius in alteram mutationem, tanquam fabulo-
sam respicimus. Erroris autem Macrobiū causa
fuit, quod ipse putauerit idē esse Malum Persi-
cam & Nucem Persicam.

Brueyus Nuces à nocendo ideo dictas putat,
quod frangendo dentibus noceant: quali verò
huius noxæ causa primariò ab ipsa depēdeat Nu-
ce, & non ab homine, qui suū in morem denti-
bus conterere velit, quod possit alia ratione: Ma-
gis aridet illa medicorum, quod edendo aut ni-
mio vlti noceat, uti patebit in viribus: Maxime
verò, quod satis nocere credatur, quod certè sen-
sisse videtur Ouid. in Eleg. de Nuce, cum ait.

Quoniam sacra ledere credor
Cultus in extremo margine fœdus habet.

Non. Maucellus ut annotat Curtius, Iuglandes
Nuces agrestes interpretatur: Sed hoc quidem
minis bene, si vocis etym. non consideretur. Ma-
tem Varroni dicitur, quod hæc antequam purge-
tur, glandi similis sit: Macrobio autem à Iuuando
& glarde. C. enim Bassus, ut h. c. scribit in lib. qui
de verb. signif. inscriptus, Iuglans perinde ac Iou-
is glans. Græcè autem Cloatio Vernoni in lib. à
Græcis tractat. dicit. *βάλανος*, ut etiam Theophr. ait.
Gerætorum enim nonnulli imitatione *χάριτος* dicit
χάρις, id est, capitis grauedine. Plutarch. in Sym-
pos. quod spiritu graui & capiti nocuo sit. Ab hac
voce Caryatides (de quibus Vitruuius lib. 3.) di-
xit, Lactatius, ut aliis placet Lactantius, apud
Statium in Thebaide à Nuce arbore nominatas
scribit. Philostratus in iconibus Iuglandes Casta-
neas appellasse videtur. Pontica Nux etiam &
Heracleotica dicitur. Plin. verò earum opti-
mum genus Basilicum & Persicum esse dicit. Hoc
autem vltimum Mollusca Nux dicitur, quod cæ-
teris generibus mollior sit, ut voluit Macrobius.
cuius putamen facile rumpatur, de qua Plautus in
Calceolo: Molluscā nucem &c: Hanc verò ille
errore, ut Nicolao Perotto episcopo Syponino
placet, putat dici ex Sueui autoritate, quæ Malum
Persicum est. Sic enim hic in edulio quod More-
tum inscribitur.

Mollusca hæc Nux est, ne quis fortè inscius erret.

Non enim his, ut hic arbitrat, de Persico tene-
riori Pomo agit, sed de Nuce Persica. In Moreto
enim Poma tenera poni non solebant, sed Persi-
cæ Nuces. In Perotti sententiam item, si cuius-
dam classici autoris monumentis doceret, in Mo-
reto non Poma tenera, sed Persicas solū Nu-
ces, id est, Iuglandes, poni solitas, quod ex Vir-
giliano Moreto non probatur. Aufonio Nux sim-
pliciter dicitur:

Et duplici defensa putamine quinq. genus
Nux.

Culeola Fæsto cortices Nucum viridium sunt,
dicta à grauedine Culeorum, quibus vitum si-
ue oleum continetur, cuius diminutuum vide-
tur culeocæ. Eidem verò autori Iuglandium Nu-
cum summa & viridantia putamina sunt.

Nace Fæsto, vel *Nauis* Pompeio, nucis putamē
est, aut oliuæ nucleus, vel medium Nucum dis-
sepimentum, id est, membranula illa, quæ in me-
dio Nucis interstita visitur: denique cuiusvis pu-
tamen *del. Inua*, nauci vocatum existimant. Qui-
dam à voce Græca *νάρις*, quod pellem caprinam
deciat. Sosipatro fabæ granum est, cum se ape-
rit. Naucem facere & nauci esse deriuantur,
quod est nihil esse, & nihil facere. Plautus etiam
protulit: *Vitam tuam vitiosa Nuce non emam*, quod
proverbialiter dicitur, nec minimo quidem. Apud
Aristoph. unica Nuce emere dicitur.

Regia Nux Caryon, ed quod, [ut scribit Go-
ropius] *Caryon* ad vnguem Cimbris designet ip-
sius quod carum est, custodiam, ideo testera
matrimonii. Nucleum *Carn* vocamus.

Iniurius est Plinius Iouis glandi, dum à capitis
grauedine, quam inducat, nomen accepisse dicit,
quod tantūmahæst, ut verum sit, ut ne hoc qui-
dem ipsi demus, hoc nomen esse peculiare: imò
communē non cæteris modò Nucibus: sed etiam
Amygdalis esse asseramus. Neque verò Iuglan-
des magis capiti nocent, quā Amygdala. Quid
dico nocent? Cum vtrunque genus robur capi-
ti addat, ut in medicorum scholis nemini dubium
esse credo.

Latinis (ait idem) ratio nominis Nucum igno-
ta, tametsi & ab horum quibusdam ed ventum sit,
ut à nocendo Nucem deriuent, quoniam satis
noxiam esse dicant. Absit omen, ut fructus dul-
cissimus tam inauspicio nomine à vetustissimis
lucit vocatus. Noces tenebre non parum Myro-
balanis omnibus præstantiores. Nux Cimbris *Nut*
vel *Nut*, à quo non mirum est Latinos Nux fecisse,
cum Alemanni quoque *Nuß* inde forment: dicitur
à *Nott*, quod necessitatem significare scimus. Hæc
Goropius, cui facile concedimus fructum Iuglan-
dis, siue nucis nucleum esse innocuum, non tamē
idē concluderimus, ut malè Goropius, Plin-
ium scilicet Iouis glandi fore iniunium: is enim,
nostro iudicio, non intelligit per Caryon fructum;
siue nucem à suis putaminibus separatam (quæ
non habet odoris grauitatem) sed Caryon cum
suis putaminibus, vel ipsam potius Iuglandem
arborem cum suis frondibus, quibus vtriusque
gravis odor inest.

Monachis in Mes. Nux Alexandrina est Nux Ie-
glans.

Corn. Noces regias, inquit, nostri [Germani]
Noces Italicas nominant. Placotomus annotat,
absolutè, pro Iuglande sumi, ut ab Ouid. de Nu-
ce. Baptista Fiera in Cæna:

Mille Noces poteras dixisse, sed unica Iuglans
Nux dicta est, lingua tam uetera tua.

Et Rob. Const. Latini cum Nucem simpliciter
hæc, Iuglandem intelligunt, *ut vix, ræcia* arbor
pla, id est, Iuglans. Macrobius ementia Theo-
phrast. autoritate, Iuglans inquit, quasi *Diuglās*,
id est, *δύο βάλανος*, sicut Theophrast. ait. Trago
Nux Persica, Nux regia, Græca, Euboica, Ca-
yon, Iuglans, Iouis glans, aut *Diuglans*: Nux,
& Nux Iuglans plerisque herbariis. Hebr. Aeggos,
Cantia. 6. In Hierem. principio [ut Diu. Hieron.
in Eccles. caput. 12. scribit] Baculus Nucis
sacra & varietur accensura & Nucem, significat
& Vi-

In glandem non infusa
aut cum aliis pignore iungi posse, ita ut Iuglans alteram non admittat arborem, suum etiam surculum respiciens si pangatur, nec villo fœderis nexu coalescens.

Hinc fortè Tragus communis, (nisi peculiati vel sua vel aliorum id tradiderit experientia) Nucibus, inquit, seritur Iuglans, nec inferi vult, ut alie arbores. At Palladius contra in Ian. cap. 16. scribit: Inferitur, ut plerique asserunt, mens. Feb. in Arbuto, sed melius in trunco, ut alii, & in Pruno, & in se: Deque eius insertione hos fecit versus.

*Arbutum frondes vestre Nux occupat umbra,
Pomusque sub d. pluri cortice tuta refert.*

Et si planè, ut Damogeront placet, à veritate defecerunt, qui nullam infitionem admittere Iuglandem crediderunt, experientiaque docuit Iuglandis resinosa Terebintho aut Pistacio insitum comprehendisse, & in grandiore sua sorte arborem euasisse.

Terebinthus & Iuglans surculum Pistacii recipiunt, qui conceptus persæpè coaluit. Et licet forsitan non facile coeat, non deò tamen id habendum neglectui, si res non semper suum sortitur effectum.

In glandem non infusa
Sunt qui hoc infitionis utantur genere. Nuncem obruunt, & ubi adoleuerit, bimam aut trimam radicem eruant, radicique surculum iuxta carnem infigunt, & iterum terræ religant. Alii ramulum anniculum legunt & inuertunt, infitionemque diligenter viminibus obligant. Ut res sit, nos sanè infitionis multa cura non opus esse iudicamus, siquidem, nucum sattu facilè ac feliciter proueniat, & iterata [nostri sanè iterata semel atque iterum conterti ferè sunt] transplantatione breui adulescant: nisi quis fortè infitionem Mangonii ergò tentare velit. Huic nostræ sententiæ subscribit Ouidius, quando ita canit:

*Sed per magna mei est operoso cura colono:
Inueniam, dederit quid mihi præter humum?
Sp. n. mea facili contemptor maior in agro,
Parquet hoc, quaesto, publica penè via est.*

Ne dura vel modica sit Nux.
Si dura Nux erit, vel nodosa, cortex [præci. Pallad.] circumcidendus erit, ut vitium mali deducat humoris. Alii radicem summa præciunt. Alii terebratæ radici palum de Buxo imprimunt, vel Cuprinum clauum, vel ferreum, ad medullam usque ut quidam volunt. Sic etiam latiore futuram? Si quis terebro (ut Damogeron autor est) per medullam arborem traiciat, atque foramini parem Vimentis adigat cuneum, nodosam duriciem Nux exuet.

Vi fructus non amittit.
Ea fructum non amittet, si Verbasci radicem vel coccinum è sterquilinio pânium amuleti vice suspendat. Cuius amuleti ratio naturalis cum nulla sit, eius dignitatem inter vanitates Græculas reponimus.

Vi fructus amittit.
Canis iugiter, vel candici, vel radicibus offusus, & tenetudinem adfert, & fragiliorem nuclei carnem efficit, autore eodem.

Tarentina fiat.
Si Tarentinam, inquit Pallad. facere volueris, solam Nucis carnem lana propter formicas obuolutam in seminario debebis obruere. Si ferentem iam in hoc genus velis mutare, lixiuio per annum continuè terrigabis in mense.

Vi Nux nuda nascitur.
Nuces nudas & sine putaminibus edent Iuglandes, ut pollicetur Africanus, si fractis utrinque carinis integer nucleus ille præorsus carne, lana vel vitigineis foliis recentibus, aut Platani frondibus obuoluitur, quominus à formicis erucleatus erodatur fructus: Nein terræ manderetur. Hoc idem Florentinus asserit. Ut Tarentina fiat,

sive, quod idem esse putat Ruell. suis operimentis spoliata, solam Nucis carnem vellere propter formicas, inuolutam in seminario obrui iubent, quod in Amygdalis quoque venturum promittunt: sed cinerem scrobibus aspergendum: qui modus ferè idem cum prædicto Palladii. Ut Noces in proximum annum copiosius proueniant, nos est hodie apud rusticos quidam, ut Noces perticis decurtantur. Hinc non inconcinnè quidam alludendo cecinit:

Nux, affinis mulier, simili sunt lege ligata:

Hæc tria nil fructus faciunt, s. verb. r. cessant.

Credunt enim, si Nuncem glumeis vinculis obuolutam, fustibus tundant, reddi fecundiorum.

Democritus scriptum reliquit, si quispiam ieiunus seorsum lentis grana mandat, atque dum adhuc mansum in ore versat, quum flore pubet Iuglans, ramum demordeat, arbor Persica distabescet. Item si flagrans igni Lentis granum radicibus imprimatur: aut si in traiectam terebra arborem, puerile lotium indatur: aut si quis iuxta ablaqueatam radicem dictamnum, fabas, vel panum menstruo sanguine mulieris imbutum deponat, arborem ariditate tabida conficiet. Hæc Constantinus refert, & ex eo Ruellius, sed ut liberè dicamus quod sentiamus, eiusmodi vel superstitiosa, nec vlla ratione fundata putamus, quæ ex Democrito adducta sunt: vel sanè illicito quodam aut Diabolico condimento non vacua: vel deniq; ab impostoribus & mendaciorum mancipiis veteratione efficta & enenuta. Nostrum est, non solum non tradere talia, sed nec tradita credere, nec si opinio quædam sinistra nos trahat, vi credamus, temerè vanæque experiri: interim tamè de vanis & nulla bona ratione fundatis aut stabilitis liberè, nullaque vfi circumsione, sententiam nostram pronuntiare. Sed de his satis.

Cortex Iuglandis hians, & abscedens maturitatis argumentum est, quales & reponi debent. Seruantur, ut tradit Pallad. vel paleis obrutæ, vel arena, vel tolina suis aridis, vel arca ex ligno suo facta inclusæ, vel Cepis mixtæ, quibus hanc vicissitudinem reddunt, ut eis accedinem tollant. Marialis asserit, & expertum se ait, virides Noces tantum liberis putaminibus suis melle demergi, & post annum virides esse, & ipsum mel ita medicabile fieri, ut ex eo facto potio arterias curet & fauces.

Hippocrati Amygdalæ æstuolæ (æstuolæ sunt, Vires & verum probè alunt [æstuolæ].) Acituolæ quidem rursus sunt propter pinguedinem, nutriunt autem propter carnositatem, & Noces (æstuolæ) calidæ similes his sunt. Noces regæ, aliquibus Persicæ dictæ autore Dioscor. in cibo sumptæ coctu sunt difficiles, stomacho nocent, bilem gignunt, capitis dolorem inferunt, suntque tussientibus inimicæ: viles verd in cibo ieiunis ad vomitiones concitandas. Venenis quoque resistunt cum fimbis, & ruta præsumptæ, ac etiam post ipsa venena haurita comestæ. Largius autem estitæ, lateros lubricos pellunt. Imponuntur & mammatum inflammationibus, adfessibus, luxatibusque, cum mellis exiguo & ruta. Cum Cepa autem melle & sale, contra canis hominisque morsus proficiunt. Exdem cum calyce suo perustæ, & umbilico admotæ, tormina sedant. Putamen verd combustum, tritumque in vino & oleo, puerorum capite peruncto capillos condecorat, Alopecurum replet. At qui intra ipsum est, nucleus vstus, tritus, & cum vino appositus, menses sistit, Perueterum autem Nucum nuclei commanducati & impositi, gangrenæ, carbunculi, ægilopibus

& Alo-

oleum i
maribus.
Sagittaria.
Alopecias presentis sunt remedio. Fit & ex ill.
dem oleum tuis, expressisque. Porro recentes,
vtpote dulciores, stomacho sunt innocentiores:
quapropter & Allia miscentur ad acrimoniam
ipsorum emendam. Ex ipsa quoque imposita
luentia seu sagittata emendant.

Nux.
Nuces Iuglandes, vt scribit Plin. Graeci à capi-
tis grauedine appellauere. Etenim arborum
ipsarum foliorumq; vites in cerebrum penetrant:
hocque minore momento; sed in cibis, nuclei fa-
ciunt. Sunt autem recentes iucundiores, sicce
vnguinosiores, & stomacho inutiles, difficiles
concoctis, dolorem capitis inferentes, tussienti-
bus inimicae, (quoniam impleto vaporoso halitu
capite, fluxionem coeitant, vti putat Dal.) & vo-
mitus ieiunis: (laxatum enim & emollium o-
leoso suo vngue ventriculi os, ad vomitionem
imbecillum reddunt) aptae in Tenesmo solo: tra-
hant enim pituitam. (Conueniunt in Tenesmo,
non quia trahunt pituitam, sed quia flatus crassos
recti intestini extremam oram distendentes dis-
ticiunt, & viscidam pituitam ibi tenaciùs inha-
rentem abstergunt, Dal.) Eadem praesumptae ve-
nena hebetant: item anginam cum ruta & oleo.
Item aduersantur Crispis (Allia Diosc.) leniunt-
que earum saporem. Aurium inflammationi im-
ponuntur cum mellis exiguo. Item cum Ruta
mammis & luxatis. Cum capra autem & sale &
melle, canis hominisque morsui. Putamine nu-
cis Iuglandis denscauis inuitur. Putamen com-
bustum tritumque in oleo aut vino, infantium
capite peruncto, nutrit capillum: & ad alopecias
eo sic vtuntur. Quò plures nukes quis ederit,
hoc facilius tineas (Teneas Vet.) pellit. Quae per-
veteres sunt Nukes, gangranis & carbunculis
medentur: item suppuratis. Cortex Iuglandium,
lichenum vitio, & dysentericis prodest. Folia trita
cum aceto, aurium doli. In Sanctuaniis Mi-
chridatis maximi regis deudis, Cn. Pompeius in-
uenit in peculiari commentario ipsius manu
compositionem antidoti, è duabus nucibus sic-
cis, item ficis totidem, & Ruta foliis viginti si-
milis tritis, addito salis grano: & qui hoc ieiunus
sumat, nullum venenum nociturum illo die. Con-
tra rabiosi quoque canis morsus, nuclei è ieiuno
homine coramanducati illitique praesenti reme-
dio esse dicuntur.

Antidoti
flammarum
Mammis
inflamm.
Luxatis
Morsui
Dens ca-
uis.
Alopecia.
Tinea.
Gangrana
Carbuncu-
lis
Sagittata
Lichenis
Dysenter.
Sanctuaniis
Michridatis
regis
Antidoti
doli.
Pompeius
inuenit
compositionem
antidoti,
è duabus
nucibus sic-
cis, item
ficis totidem,
& Ruta
foliis vigin-
tis simili-
bus tritis,
addito salis
grano: &
qui hoc iei-
unus sumat,
nullum ve-
num nocitu-
rum illo die.
Contra
rabiosi quo-
que canis
morsus, nu-
clei è ieiuno
homine cora-
manducati
illitique pra-
esenti reme-
dio esse di-
cuntur.

Antidoti à Plin. memoratae, eleganti quoque
carumine meminit Sereus cap. 8. de venenis pro-
hibenda:
Antidoti vero multis Michridatica fertur
Consecrata modo, sed & agnus ferinus a Regis
Cum caperet videtur, visum deprehendit in illis
Syn. hesis, ut vulgata satis medicamina risit.
Bis sumit Ruta folium, salis & breue gramini,
Iuglandisque dam. totidem enim corpore Ficem.
Hec oriente die parso conspersa Lyao
Quaebat mernens dederat qua pocula tutor.

Accedamus ad Galenum. Is diuersis locis de
Nucis Iuglandis viribus haec habet. Nucis regis
arborum capitis parit dolorem. Nukes tenerae,
rancidae, vltz, cinere digerunt & adstringunt.
Quidam Nukes regias appellant eas, quae nunc
Nukes ab omnibus nominantur. Sunt & aliae
quaedam, quae & & & appellantur, praedictis
multò minores, quas nonnulli Ponticae, id est, Pon-
ticas seu Anellanas vocitant. Multus autem am-
barum est usus: alimentum corpori praebent exi-
guum, copiosius tamen Ponticae occupata,
quam Nux regia: quòd ipsius substantia sit co-
ctior, ac minus oleosa. Regis autem laxior est,
contineturque in se ipsa plus pinguitudinis. Habet
Tom. I.

Antidoti à Plin. memoratae, eleganti quoque
carumine meminit Sereus cap. 8. de venenis pro-
hibenda:
Antidoti vero multis Michridatica fertur
Consecrata modo, sed & agnus ferinus a Regis
Cum caperet videtur, visum deprehendit in illis
Syn. hesis, ut vulgata satis medicamina risit.
Bis sumit Ruta folium, salis & breue gramini,
Iuglandisque dam. totidem enim corpore Ficem.
Hec oriente die parso conspersa Lyao
Quaebat mernens dederat qua pocula tutor.

Accedamus ad Galenum. Is diuersis locis de
Nucis Iuglandis viribus haec habet. Nucis regis
arborum capitis parit dolorem. Nukes tenerae,
rancidae, vltz, cinere digerunt & adstringunt.
Quidam Nukes regias appellant eas, quae nunc
Nukes ab omnibus nominantur. Sunt & aliae
quaedam, quae & & & appellantur, praedictis
multò minores, quas nonnulli Ponticae, id est, Pon-
ticas seu Anellanas vocitant. Multus autem am-
barum est usus: alimentum corpori praebent exi-
guum, copiosius tamen Ponticae occupata,
quam Nux regia: quòd ipsius substantia sit co-
ctior, ac minus oleosa. Regis autem laxior est,
contineturque in se ipsa plus pinguitudinis. Habet
Tom. I.

tamen & adstringentis qualitatibus non exiguum,
quae tandem procedente tempore marcescit, tota
ipsius substantia in succum pinguem transmuta-
ta, adeò, vt cibo prorsus sit inepta, quòd sua pin-
guedine, oleo veteri affimilis appareat. Ceterum
quae viridis adhuc est ac humida, neque adstring-
gentis qualitatibus, neque oleosa conspicue est par-
ticeps, sed magis quodammodo est & &, id est,
Qualitatis expers, quod saporis genus aequum
vocare consueuimus. Coquitur tamen haec Nux
facilius, quam Pontica, stomachoque est gravior,
& multò magis, quando cum Caricis manditur.
Traditum autem à plerisque Medicis est, homi-
nem à Pharmacis lethalibus nihil magnoperè la-
sumiri, si vtriusque has ante alios cibos cum Ruta
sumpsent. Liqueat praeterea, quòd humida qui-
dem apta ad deiectionem est: sicca verò minus.
Plerique autem ventris subducendi gratia cum
garo etiam ipsam praesumunt: in quem usum vi-
ridis est accommodatior, vt quae adstringentis
qualitatis minus sit particeps. Quin & siccarum
quoque, si prius (quod nonnulli faciunt) in a-
qua fuerint maceratae, facultas viridibus est affi-
milis. Ipsa verò Carya arbor tum in foliis, tum in
germinibus adstrictionem quandam habet. Ceterum
evidentem plurimamque in nucis putamine
recenti pariter & sicco, proinde èo fullones
quoque vt solent. At nos eius expressi succo, si-
militer vt Mororum & Ruborum, in melle deco-
cto, vice stomachi medicaminis vtmur, & ad o-
mnia reliqua adhibemus, ad quae modò dicti succi
conuenire censentur. Porro ipsius id, quod e-
dendo est, oleosum est, & tenue: itaque etiam
facile exprimitur: & quo diutius reconditum fue-
rit, magis tale efficitur. Quamobrem oleum ex
eo inueterato exprimere liceat. Tunc sanè ad-
modum fit per halitum euaporatorium. Itaque
quidam eo gangranas, & carbunculos, & xgilo-
pas sanant, ac nonnulli ad nervorum vulnera v-
tuntur. Ceterum si recens sit, adstringentis non-
nihil qualitatis etiam obtinet. At quod imperfec-
tum est etiam dum, ac nondum siccum, veluti
reliqui fructus omnes, qui virides sunt, plenum
est semicocto humiditatis. Nucleus tamen eius
(alii putamen malunt) vbi inaruit, (aridum &
vstum) tenuium partium & exiccationum est me-
dicamentum, morsus expers.

Est & aliud eiusdem Gal. memorabile experi-
mentum à nucibus, quod his tradit verbis. Ego
quando primum in patriam redii, agrum perturan-
tum, & inueni quemdam hortulanum, ab vna &
tonillis ac glandibus ferè suffocatum. Vtebatur
autem collutione aquae nullae Rosae in ipsa inco-
ctis. Cùm igitur vidissem fructum nucum in vi-
gore esse, iussi detractum ab eis extremum corti-
cem, quo etiam tinctorum videram vtentes, sta-
tim in mortatio contundi, & succum eius per lin-
teum excolari, nondum sciens, quomodo iuxta
crassitiam aut tenuitatem haberet: Cùm verò re-
perissem aquosum, & compage tenuem, garga-
risare eum iussi ipsum hortulanum. Postquam
verò valde tenuis apparebat, praecoxi: & mel-
commenturata, veluti in eo quod ex Moris fit,
fieri sciebam, admisceti: atque vbi iam ad com-
pagem mellis redactum esset, hortulano vtendum
reliqui. Porro cùm viderem celeritatem vtili-
tatem ipsi inde oboriri, praestabile ratus sum ita
multis experiri: atque ex hoc sufficiente experi-
mento accepto de facultate eius Pharmaci, sem-
per ipso vtor. Merito itaque mirandum, nullum
ex prioribus Medicis aliquid de hoc Pharmaco
mente concepisce, vt tum parabili, tum generoso

Viridis

Adversus
Venena.Aluum foli-
um.

Carya

Putamen.

Ad stom-
achum.

Oleum.

Gangrana?
Nervorum
vulnera.

Tomilla

Cortice

hoc succo vterentur, maxime cum viderint, quomodo etiam manus inficiantur eorum qui virides Nuces decorticant. Ex his enim apparet, qualis sit earum succus, & quod aegre elui possit ipsarum adstringendi vis, adeo ut neq. per fortissima exterioria elui queat. Amplius autem adhuc miratus sum de medicis, quod non cogitarint surtem esse ipsarum vim, cum etiam tinctores videant eiusmodi Nucum corticibus uti. Nisi enim in profundum manuum descenderet, & nisi per omnem substantiam lanarum penetraret, non certe aegre eluibilis esset. Cum vero descendat, indicat planè substantiam succi tenuium partium esse: rationi autem confectaneum est, adstringendi vim maxime proficere, ubi in eiusmodi substantia contineatur. Etenim quæ ex adstringentibus crassas partes habent, per adstrictionem cogunt & condensant superficiem corporum quibus adhibentur, & à progressu in altum ipsorum corporum sese impediunt. Quibus enim etiam aliàs ob substantiæ crassitudinem impossibile erat progredi in altum, his adhuc amplius impossibile fuerit, densato corpore iuare, & quod totum est inflammatum. Optimum itaque esse Nucum succum persuasus, ut qui etiam coctum cum melle gustatum, nihil iniuare habentem.

In libello de Dynamid. Galeno attributo, in formula ad hæmorrhoides recipitur cortex virginis nucis. Persicæ nuces, ex sententia Athen. capiti non minus graues sunt quam Heracleoticæ, magis nutriunt, os & fauces exasperant: assæ vero minus lœdunt, & ex omnibus nucibus, si edantur cum melle, egeruntur promptissime.

Diphilus Siphnius regias nuces scribit dolorem capitis excitare, innatareque stomacho, & ex iis teneras, quæ adhuc candicant, esse meliores, ac succilaudabilioris: patetis nutrire, quæ in furnis fringuntur. Persicæ nuces Castaneis esse deteriores, nec edendas, nisi igne sint coctæ ac siccæ: harum quippe virginosam nocentissimamque pinguedinem, ignem assumere.

Nux viridis, ut pote adhuc aquationis humoris, ut refert Plinius Valerianus, stiptica & frigida virtute censetur. Potest eadem & stomacho aliquid vigoris acquirere, & ventrem cum garo sumpta mollire.

Nuces virides, autore Simeone Sethi, atque recentes, calidæ prima distantia reponuntur: quæ vero siccæ sunt, secunda distantia calidæ censetur. Virides etiam ventrem ciunt. Et ideo quidam antè cibum cum sapa vel defruto comedunt: concoquuntur etiam melius, quam Amygdalarum: autem si edantur inflammationes & vlcera efficiunt. Stomacho quidem meliores sunt, si cum catiis edantur. Concoquuntur insuper Nuces probe in ventriculis frigidis, in calidis vero potius alterantur, ac in biliosum humorem vertuntur: succium præterea & capitis dolorem adserunt, & tussis augent. Antè alios cibos sumptæ, vomitus sunt efficitrices. Si ad saturitatem edantur, ventris lumbricos educunt, & ad dentium mordicationes laniationesque utiles sunt. Eob. Hællus:

*Iuglandes prodest feruere, nec pascere multum:
Pascere Auellanas plus, valuisse minus.*

Marcellus Virg. ex antiquorum decretis significat, habere arboris Iuglandis coliculos aliquid quod adstringat: summum verò Nucis operimentum, quod ea maturecente decidit multa hac potestate esse. Interius deinde carinatum & bisidum putamen crematum extenuandi vim acquirere, & sine erosione siccare. Quodque in eo clauditur

edendo aptum, oleosum quod est, facillimè hilem augere: confectumque ex eo oleum extenuandi vim habere: & tumores præterea discutere.

Idem Hermol. reprehendit, quod *Sisyrinchium* apud Dioscor. resides in corpore & difficile transire dixerit, longiore quàm decuit verborum ductu: nec satis apto rei intellectu, quoniam aliud sit aegre concoqui aliquid, aliud residere aliquid in corpore, nec facile transire. At vocibus iis usus aliquando in libris de re rustica Varro est: scimus id quidem: nec Varro nem in iis quæ docuit damnari: sed quod aptius & certius in Dioscor. ad medicinam dicti debuerat, desideramus. Melius Plin. difficiles concoctu dixit.

Fuchsio Virides Nuces primo ordine siccæ, secundo verò calidæ censentur. Dodonæo Nux viridis adhuc & recens frigida est & desiccatur, partesque tenues habet. Cortex nucum multum desiccatur, adstringitque. Folia eiusdem ferè sunt temperamenti. At Curtio recentes siue virides Nuces primo ordine exsiccant, tenuiumque partium sunt & exsiccantium.

Tragus scribit, quosdam guliocam [sic enim callosum illum herbaceumque corticem exteriori vocant] arefacere, inque puluerem redactum, peris loco in condiendis cibis usurpare. Quod si huic pulueri folia Saluæ siccatæ ac tusa admisceantur, non contemnendi saporis condimentum futurum. Pari ratione prima ac tenera rubrique foliola siccatæ ac tusa usurpari posse.

Nuces Iuglandes exigua immatura circa Festum D. Ioan. lectæ ac siccharo aut melle conditæ ægris exhibentur à mulierculis, quarum confectioem ipsis relinquimus. Componitur & medicamentum ex putamine viridi Nucis, quod ore agitaturn prodest omnibus inflammationibus & vlceribus incipientibus in gutture, amygdalis & ore. Ad idem etiam facit idem cortex decoctus. Earundem ferè Virium sunt folia.

Dod. Theophrast. Parac. vult testam Nucis Iuglandis (quoniam cranium nostrum reserat) summum à natura, vulnera, omniæque mala cranii factum esse remedium, existimat enim eorū influxu notas quasdam in singulis medicamentis simplicibus impressas reperiri, ex quibus de præcipuis singularum facultatibus iudicandum sit.

Et Gesn. in enumeratione simplicium purgantium ponit Catulos Nucis Iuglandis. Fernel. quoque Iuglandis in los sursum purgare scribit. Motuus ad immoderatam menstruum purgationem hoc præscribit. Acc. flor. cucurbitæ & nucamentorum Iuglandis an. vnc. j. fiat puluis. Concregis dat drach. j. cum ouo sorbili. Verum cum putamina seu nucamenta Nucum calida videantur Gesnero atque Fernelio atque purgant & ipsæ nuces, autore Matthiol. menses ciunt, vix nobis probari potest in eo casu prædictum medicamentum.

Cortices Nucum recentium sæpè infusi in oleo, cum modico alumine, benè tingunt capillos, teste Bayro. Idem tradit, frictos dentes cum radice Nucis singulo quintiduo semel, intellectum vegetare, sensus aciere.

Matthiolo tradente, Iuglandes virides decerpit Maio vel Iunio appetente, antequam earum putamina obduruerint, siccharo vel melle adseruatæ stomacho viiles euadunt, & ori non ingrati.

Iuglandum Iuli, qui mense Martio prima germinatione erumpunt sicci, & in puluerem contriti, & æ vino albo poti, drach. pondere seminis Iuglandis vuluæ affectis misceat profunt.

Inest quoque Iuglandibus Nucibus propria quædam, & peculiaris facultas ad remoratos menses

*Partim
causam
dura*

*Hamor-
rhoides,
Capiti
grauis.*

*Nux per-
sica.*

*Nux viri-
dis.*

Stomacho

*Alumne sol-
uit.
Tempera-
mentum.*

*Quibus co-
medenda:
quibus non*

*Vomitus
Lumbrici,
Dentium
dolor.*

*Tempera-
mentum
Nucis.*

Hermol.

*Diutius
sententia
circa tem-
peramen-
tum Nucis*

*Callosa
pulvis pro
condimento*

*Candida
Nucis.*

*Inflamma-
tio.*

*Testa ad
Iuglandis*

*Caroli
purgant
Gesn.*

*Ad mensis
purgationem*

*Capilli
siccata.*

*Ad mensis
purgationem*

Candida

Drasacanth

Ad claudu
menjes.

menfes diendos, adeo vefecto periculo, fe non parum demiratum teftetur Matth. & præferim vbi cetera medicamenta, quæ ad hoc munus ob- eundum præfiantiora cenfentur, nihil mouerant. Macerantur itaque ad id in aqua Iuglandis nu- ces cum fuis putaminibus, quouſque remollitz, atque humefactæ eorum nuclei à contegente membrana, perinde ac virides, expolari poſſint: ſumuntur deinde expolati nuclei, & conduntur macerandi in aqua vitæ præſtanti, & poſt duos dies præpurgatis prius feminis, nuclei duo vel tres integre Nu. is, quotidie dantur manè ieiun- nis deuorandi, decem continuis diebus, ante tempus menſtrux fluxionis.

Pefte.

Ad Peſtem hoc præſtat. Nucleorum Iuglan- dium, bacc. lunip. Ruta an. vnc. ſem. maceren- tur in aceto, de hac miſcella ieiuno ventriculo, ſi ſumatur, quanta eſt nux Myſtica, hominem eo die à peſte tutum præſtat.

Aliud ad peſtis præcautionem. Acc. corticum Iuglandium virid. vnc. ſem. Zedoar. drach. ii. affun- de aceti boni lib. ii. ſtent benè cooperta. Huius omni manè cochlearia bibantur tria quatuorve. Cum prodis in publicum, Zedoariam ore teneas licet. Aqua ſtillaria è virentibus corticibus po- ta, ſanguinem concretum diſſoluit. Cortex arbo- ris medius, adhuc ſucculentus, ſi excecetur, pro vomitorio eſt. Catuli ſeu iuli ex iuſculo aut vino ad calculum & colicam propinantur. Emulſio ex Iuglan- diſus recentibus, cum momento ſem. Papau. ſomnum conciliat. Aſparagorum Maio decoctio ex aqua ventrem emolli pota. Succus autem radicis violenter purgat, validis ruſticis exhibendus.

Sanguis
concretus.
Cortex Go-
morium.
Catuli ad
calc.
Semen.
Purgan.

Gummi.

Scaliger alicubi tradit, ſerre gummi Iuglan- dem, renibus imbecillis vtile.

Heremeli.

Et H. ſt. Lugdun. Eſtate, inquit, ſeruidiſſima, quod aërom. li. ruſſum è cælo ſtulat, folijs & fron- dibus Nucis Iuglandis magis inſidere quàm in vici- narum arborum, obſeruauit Dalech. (e. quem melle irrorata Iuglandis folia, oriundita, ſuum fedire,) folijs propinquarum arborum exſuccis & aridis, quali maior ſit huius arboris cum cælo concor- dia & cognatio.

Iuglandis
aqua.

Iuglandis aquam ex immaturis Nucibus com- mendat Parzuſ ad diſſoluendos thrombos con- creti ſanguinis. Quidam vtuntur in malis vlceri- bus tubiarum, vbi caro putrida apparet, & contra Meliceria Celſi: quamuis de hoc vocabulo dubi- tetur inter doctos, ita tamen rem deſcribit, in- quit Camer. vtrum eo affectu, quem vulgò das Gliedraſſer vocant, conuenire videatur.

Refrigerat.

Sed de aqua Iuglandium viribus Euonymi theſauruſ paulò ſpecialiùs tradit, his verbis. Nu- cum Iuglandium immaturarum aqua circa feſtum D. Ioan. parata, ſoris impoſita prodeſt vulneribus & vlcenibus calidis, & anſtraci peſtilenti: pota etiam ad dunt aut tres vncias refrigerat, & peſti- lentiz reſiſt. Ex putaminibus etiam exteriori- bus Iuglandium (ſiue maturis, ita vt iam à Nuce ſoluantur, ſiue nondum omnino) menſe Sept. aqua deſtillatur: nec reſert, nigra fuerint, modò reputredinem ſenſerint, imò nigra præferantur. Huius aquæ mediocris potio (cum tertia parte aceti, ſi cum calore morbus ingruat) vena priùs ſectâ, aduerſus peſtem, tanquam certum experi- mentum propinatur. Laudatur & ad aurium tin- nitus, & audiendi difficultatem, & ad anginas gargarizata.

Pefte.
Antrum
tinnitui.
Angina.
Foliorum
aqua.

Ad mouendum vomitum recipit Fel. Plat. aquæ Nucum viridium, cum aceto deſtillatæ vnc. iii. Sed monendū nos ab aceto deſtillato grauiā ali-

quando ſymptomata vidiffe. Foliorum, ſi placeat, vltimū percipe.

Foliorum verò Iuglandis aqua circa finem Maij deſtillata, mirè commendatur, ad ſiccanda & adſtringenda vlcera, & inducendam eis cicatricem, ſi manè & velperi inde lauentur, & ma- didum inde lindeolum imponatur: Bruniſcenis. An verò aqua Iuglandium refrigeret, vt Euo- nymus tradit, vix adduci poſſumus, vt credamus. Iudicent docti atque experti. Porro multus mo- dis cibos hominum & medicinas adiuuant nuceſ. Nam & immaturæ, vt Bruyer. annotat, & nato nu- per nucleogulæ delicias præbent: quantò verò propiùs ad maturitatem accedunt, tantò cibus in- gratiores: quippe iis tantum pro medicamento in eſu piſcium vtimur. Medicorum etiam recen- tiorum ſchola prædicat, aduerſus piſcium aquo- ſos & pituitoſos ſuccos, aduerſari namque pu- gnante quadam vi, & quadam antipathia piſcium iniquitati ac malignitati perſuaſiſſimum habet. Vnde illud tritum:

Post piſces nuceſ: poſt carnes caſem adſic.

Nonnulli hanc virtutem eis tribuunt ob calefa- ciendi & ſiccandi carum facultatem. Certum eſt etiam eaſdem venenis repugnare præſumptas in cibis, ſi quicquam aliud, vt iam diuerſimodè o- ſtenſum, quod & Serenus hoc verſu inſinuaſſe vi- detur.

Ante cibos igitur Iuglandis ſeruetur.

Ceparam item & alliorum ſaporem lenire ac mi- tigare, inuenerunt gulæ procetes, vnde alliatum vocant vulgò quoddam condimentum, ex Allio & nucibus concinnatu n, quod ad epiſcopatuſ & peſſu. inunctus piſcium adhibent. Scruiente peſtilentia procetes pariter ac plebs inſima, quin etiam rura coſtas ieiuni mandunt.

Condiendi
modus offi.

Officinæ nuper natas, & virentes iam manu- culas cum puluinato calyce, & ligneo putamine nondum duritiā adepto, Garyophyllis ac Cin- namomo conſixas, ſaccharo condiunt ſeruāt- que in multos annos. Sed noſtri in pluſculos dies priùs obiter decorticatas in aqua frigida ſon- tis maderant, quotidie affuſa nouâ, vt hac mace- ratione ad condituram quaſi aptiores ſapidior- tique reddantur. Ergo teneræ Nucis cortex, putamenque antequam ligneſcant, deglubuntur cultro cucula virente & teneriuſcula tenus, & veſtigioque ne nigreſcant in aquam puram proſi- ciuntur, vti dictum, tum vſque dum molleſcant coquuntur, tum fruſtulis Cinnamomi, Garyo- phyllis aut etiam corticum Arantiorum ſegmen- tis traiectæ, ſaccharo aut melle in ſyrupum per- ſectè cocto bulliunt tribus quatuorve ebullitio- nibus: tuncque quò ſaccharum ebibant, triduo aut quatrinduo inibi ſinuntur. Et quia ſaccharum recrudet, propter humorem quem imbiberat, illud idem ſaccharum per ſe denud coquitur, & ſic biſ tertè repetitur, ex præſcripto Lob. & Pe- ruz. Noſtri vnica coctura eleganter condituram abſoluunt, ſed poſt macerationem & coctionem lindeis abſterſas, non diu in ſyrupo coqui ſinunt, ne nimium molleſcant, ſic minùs ſapide palato fu- turæ, ſed ſyrupum ad perfectam conſiſtentiam decoquant, condituræ complementum vltiori in ſyrupo macerationi committentes. Poſterita- tis hoc inuentum putamus, vt cuiſmodi alia mul- ta ad medicinam excogitata, ſed quæ à ſalutari orta principio, hodie paſſim ad ventris ganeam rapiantur. Sic conditas ventriculo refrigerato & imbecillo, viſceribusque alijs frigidiſſimis utiliſ- ſimas promittunt Senibus item & pituitoſis, ma-

Condituræ
vires,
Ventricu-
lus.
Caſſia,
Kerm.

ritisque in Venarum pigris: calidioribus naturis ac biliosis minus tutas esse.

Schwenck
29.

Schwenck. annotat, ligneam illam membranam, nucleis intercurrentem, Nauci vocatam, vulgo das böglin in der Nüss, aduersus calculum vulgi experimento laudatam esse. Sed veremur ne ille cum ipso vulgo decipiatur. Multum est, alicui rei experimentum tribuere, cuius nec ratione scias, nec effectum euidentem videris vnquam. Ecquis enim est probatarum medicorum, qui eundem vnquam sibi visum, & aperte agnitiū vllō experimento testetur? Non recipimus hic vaniloquos Empiricos, quibus nil aliud in hacca quam secreta & experimenta, tam vera, quam ipsi vires eorum, quæ tractant, medicaminum nesciunt ac intelligunt. Ecquid obsecro operari queat, insipida, terrestris, exucca atque aded tam Nauci illud membranaceum corpusculum, quod fortè adstrictione quadam non destituitur? Obesse potius atque aded nocere calculosis existimauerimus, & quantum quidem in his sit, exitum calculi vel arenularum potius impedire, quam promouere. Sed mundum velle decipi, iam aliquoties dictum, totiesque dicetur, quoties eiusmodi frivolas opiniones in sacratissimæ Medicinæ Rempublicam irrepsisse deprehenderimus.

Aduersus
Empiricos.

Inglans
rancida
Senarium
Olani pro
pueris.

Raimundus a Vinario, in opusculo suo de peste scribit, luglandem rancidam planè venenatam, & Rhabis testimonio confirmat. Idem ex luglandis Nucis medio glandem parat pro pueris. Rhabis scribit enim ad Alm. Si quis male habuerit ab usu Nucum corruptarum, vomitus excitetur, deinde exhibeatur syrupus omphacinus, malorum macianorum, & similia in potu, vti concoctu facilia & appetitum excitantia. Haud incelebris est hodie apud Medicos compositio, *diacynthi* Græci dicta, cuius inuentionem Galeno tribuunt, nosq; supra inuentionis occasionem & modum iam superius abundè docuimus, Lubet tamen & ex Melue eiusdem usum & conficiendi rationem subicere. Medicamen est efficax ad catharrum acris, & tenuè à capite in asperam arteriam, pulmones, thoracem, à quo phlegmone, suffocatio, mors, impendent. Libræ quatuor succi ex corticibus Nucum viridium, diebus canicularibus extracti semel ferueant: tunc mellis lib. ii. ad litis, coquantur ad mellis crassitiem: idque medicamentum pueris, mulieribus & naturæ humidis salubre est. Quod si phlegmones initum, adstringendum aliquid admiscendum est, vt Rosa, Balaustrum: si in statu, crocus & Myrrha: si in declinatione, nitrum & sal ammoniacus, & similia Alioqui vires habet eisdem cum diamoro ad omnes oris phlegmonas, & cynanchas, sed efficaciores, vt ex Galeno discimus.

Ligni vsus

Inglans materies mensis & vtersilibus laudatis dicatur, & operi testorio. In Galliæ multis locis, præsertim Lugduni pluri fit hoc lignum pro mensis, scammis, lectis, thronis, & aliis eiusmodi, quæ tela cerea fricant sæpè: sic egregiè poliantur, & nitidum splendorem acquirunt. Talia multa singularis elegantiz opera videas Lugduni in tota Burgundia, eumque Montbelgardi Ad fursures VVurf. comburit lignum luglandis, vel putamina Nucum, facitque ex cineribus lixiuū, quo abluit caput. Ad paroxysmum febrium medicamen ex cortice interiore Nucis tantorum parat Felix Plat. quod nigram maculam nonnihil erodit. Recipit autem corticem q. l. macerat in aceto, & applicat ubi pulsus arteriarum senatur, quo remedio feliciter vuitur. Idem probat decoctum hoc, Zing vnc. ꝑ. piper. drach. i. membranarum

Nucum interiorum seu Nauci drach. ij. &c. Non membranam Nucum insulam & insipidam verè nauci facurus in hoc affectu, cætera autem non. Ex viridibus putaminibus Nucum decoctis colorem parant fabri lignarii ad menticandum lignum quoduis eo tinctum.

Sed de olei Nucum viribus speciatim quoque Olei N. tradendum, etiam si iam supra quædam attigerimus. Eodem autè modo, [vt Dioscor. Aetius & alii scribunt] oleum Nucum [q. v. v. v.] luglandium paratur, quo Amygdalinum, Nucibus aut tuis & expressis, aut post contusionem in aquam feruentem coniectis. Dioscor. eandem ei vim tribuit quam Balanino: Aetius, quam Amygdalino. Insuperque hoc priuatim habere tradit, quod inaurantibus, aut inurentibus conducit. Siccat enim, & ad multum tempus inaurationes & inuentiones continet & adseruat. Discutit hoc, (vt Curtius ex quorundam sententia prodit) & nonnulli ad gægrenas, carbunculos, zgyloas, & neruorum vlcera vtuntur. Vim habet etiam tumores extenuandi, ac putredines. Infusum verò aurum fortitati prodest, & idem vtile calidis doloribus illitum. Cætera miners & graue corpori, sapore. Enimvero si quid in nucleo putredinis fuerit, totus modus deperit, fietque oleum mox rancidum. Recens verò nonnihil adstringentis qualitate habet. Oleum, quod de luglandibus Nucibus elicetur, nullius in Medicina vsus esse reperit Matthiol. & si lucernis & lampidibus, qui parsimoniz student, id maximopere expectant, quippe ignis funiculo non tam citò consumitur, quam id, quod ex oliuis paratur. Præsertim etiam pictoribus eo quod è lini semine exprimitur: siquidem hoc cerussæ admixtum tractu temporis colorem immutat, illud verò incorruptum perpetuè asseruat. Sed quid dicit Matthiolus? Suine est oblitus? aut sibi ipsi inconstans pro arbitrio contraria tradit: non recordatur verborum suorum eiusdem libri primi. Fit quoque è luglandibus nucibus oleum, quo ad lucernas vtuntur Infubres, & ad opera sua pictores & fabri lignarii, vbi splendorem suis operibus addere volunt. Haustum hoc quinque aut sex vnciarum pondere, status potenter dissipat, quo fit, vt in coli affectibus à statu gentis, plurimam adferat auxiliū. Illitum tumores discutit, & contractos nervos emollit, addita præsertim calce lota: antiquam verò scabiem sanat. Non animaduertit ulum in Medicina apud Dioscor. quæ commentatur? Nonne dicit Dioscor. id eandem vim haberet, quam Balaninum? Notanda quoque autem animaduersione, vtò licere vti oleo Nucum luglandium pro Balanino: Non item Balanino pro luglandium oleo. Vis maligna nulla in nucibus, qualis in Balano Myrsifica.

Memorable experimentum est, quod à Regulo quodam Ducatus VVirtembergici, optimo ac nobilissimo viro acceptum, perlibenter publicamus. Is pro certo nobis affirmavit le oleo è Iulis luglandium parato, rusticum sorditate vnus auris egregiè atque perfectè sanasse. Oleum sic parabat. Per annum cucurbitam vitream Iulis plenam sub sino condiebat, quæ transacta, ex iis ynguinosi, oleum exprimebat. Hoc mixtum tum alio Nucum oleo expressione parato aliquot guttas in aurum murebat. Oportere autem dicebat agrum in sublimi positum aut excipere olei guttulas, quæ recepto cum impetu desilire, vt melius intret ac penetraret.

Nec tacendum Plinii Valeriani Oleum ad Alopecurā. Inter Calendas & Idus Iulii centum numere

Parandi
modus

Ad inaurantibus
et inuentiones
Tumores
Sorditas
cap. dolor

Cantus

At Matthiol.
reorgan.
tar.

Colicæ doli
lar.

Tumores
Scabies

Oleum tui
lorum nu
cum ad
surditatem

ad deflu-
entem & de-
pulsivum.

De isca in
glande e-
nig que ves-
lase.

Ifc arum
on the border
of the road.

Personal
use.

Engr. no.
ca. 1900.
p. 11.

Где-то на
самом сто-
ящем в
дальности.

Rec'd.

Cap. II.

**Enbixid
cayul.**

Lignum soc-
cul.

Gasworks

Scalig r²
prob.

Drain!

Carbamates

Lucas:

Flow:

pe cum singula (vti retulimus) diuersa secundum materiam habeant: non solum, quod eandem meliorem: deterioremue possideant, verum etiam quod ferant, vt Tmolus, Olympusque Mysius Nucem, & Castaneam [*ἐκ τῆς δὲ δασὸς βάλανος*, puto legendum *ἐκ τῆς*] plurimam ferunt. In Eubora verò, & circa Magnesium Euboicæ, (*ἡ δὲ δασὸς πολλὰ*) Peculiaris arbor, vnde & cognomen, Scal.) multæ quidem habentur, è reliquis autem nulla.

Fossio Gra-
m.

Cæterum fossionem huic quoque vtilem esse, ostendit Theophrast. lib. 3. caus. cap. 14. his verbis: Fossio omnibus prodest: tollit enim quæ impediunt, vel auferant pabulum, ipsamque solum humectius atque suspensius reddit: Adhæc aer humo permiscetur (permisceatur enim necesse est, cum terra agitur) præbet vaporatum quendam humorem, atque alimonium efficit. Quocirca solum squalidum atque siticulosum, fodere, agitareque sæpe oportet. Palustribus quoque, vliginosisque, fossio prodest: quanquam mirum appareat, solis inter se aduersis curam eandem posse conducere. Verum nihil mirandum id est: alterum enim siccatur, alterum humefacit, scilicet cum vtrumque contrariis adiuuari desideret. Alimento autem meliori, vbeniorique, cum ipsæ arbores vigent, fructus meliores creantur. Nam & nuclei miores, & eorum quæ ligno crustæ teguntur, vt Nucis Euboicæ, tegmina tenuiora, inestina verò ampliora vtiq; sunt: quippe omnino alimenti copia humefacit pulpamque auget fructus. Quas ob res ratione sic euenit, quod si reliqua quoque adsit cultura, magis magisque ampliores, iuuioresque fructus perficiuntur, quoniam & plus alimenti, & amplior excoctio foret. Nunc semen (quod autore eodem, hist. lib. 1. c. 18.) postremum in omnibus est, humoremque atque calorem insitum in se habet: qui cum defierint, infecundam relinquitur) quorundam protinus post tegmen ambiens subest, vt Palmæ, Nucis Amygdalæ: quibus ambientia plura vtiq; sunt, ceu Palmæ: quibusdam caro, & nucleus interiacent, vt Oleæ, Pruni, aliorumque.

Nux Eu-
boica.

Semen.

Polcherrima hæc de semine contemplatio, quæque mereatur esse pars nostrorum (inquit Scal. g.) librorum, quos ad hanc materiam, multis laboribus digessimus numero septem. Ait Theophrastus, in omni semine & humorem, & calorem esse: diuina vox. Altera materia est: altera aut forma, aut formæ affecta, atque instrumentum. Alterum est principium actionis, cum proportionem ad materiam: alterum passionis ad semellam.

ἡ δὲ ἐκλειπὴν τὸν. Deficientibus calore, & humore, semina steriles cere, sicut & oua intelligemus: etiā verò alterutro tantum deficiente. Theodorus defierint. At defuit, quod fuit. Philosophus autem hic profundius sentiat, vt non solum calor, qui fuerit, abeat: verum etiam, qui esse debeat non adsit, sed desit, vt in ouis hypenemiis: cum abiat calor & corrumpitur, *ἐκλειπὴν* dicitur alibi à Theophrasto: tunc definit: in principiis constitutionis, si non insit: deest, non definit. *δὲ τὸν* vniuersalius, quam *ἐκλειπὴν τὸν*. Sed & hæc verba [*ἡ δὲ ἐκλειπὴν τὸν σπέρμα ἢ τὸ πείσχω*] excitabant contemplationem iudicii non vulgaris. Sic enim dicit *ἡ δὲ*. Statim, inquit, sub tegmine est semen in quibusdam. In aliis autem *μετὰ τὸν*, scilicet tegminis & seminis, est caro, & testa. Igitur opponit *τὸ μετὰ τὸν ἡ δὲ*. At videamus exempla *τὸ μετὰ τὸν*. Oliuam ponit, & Prunum, rectissime. Inter nucleum enim & cutem interest caro, & testa. Videamus exempla *τὸ ἡ δὲ*. Palmulam ponit & Iuglandem, & Amygdalum: quasi verò non habeat

cutem Iuglans: deinde carnem, tum autem testā. *ἡ δὲ* Theophr. Nam quid est *πυρὴν* in Pruno, quod non sit in Amygdalo? Neque enim semen est ipsa testa, sed quod intus. Quid quod etiam aliquid aliud præterea habet Palmula? quippe membranam inter os & carnem. Quid quod ipse, cum dicit, *ἡ δὲ*, sibi contradicit, atque ait: *σπέρμα δὲ τὸ πρὸς τὸ ἐμπείσχω*, *ὡς τὸ ἐκλειπὴν*. Postremo in vtrâque diuisione est, & Palmula, & Oliua. Vtrâque cum carne esculenta, vtrâque cum cute, vtrâque cum testa nucleum operiente. Theodorus *ἐκλειπὴν*, *ἀμυγδαλὴν*. Nucis Amygdalæ: verum minus cautè. *ἡ δὲ* Gaz. Nam Amygdalum quoque nux est: melius Iuglandis. *πυρὴν* Plinius item nucleum vocat, qui nucis vicem gerat. Nuculam nos excogitauerimus: vt nucleus, quod intus esset esculentum tantum significaret. Est autem valde æquiuocum nomen *τὸ πυρὴν*, si & Oliuæ nucleum significet, & ligneum Panici acini, intra quod nihil aut est, aut non apparet.

Gaz. m.
Iuglans.

Sed quid hæc moramur, ad negotium propius accedamus institutum, Arborum (pergit Theophrast.) nulla semine nudo, sed aut carne obducto, aut cute, aut crusta *τὸ δὲ σπέρμα τῶν δασῶν, δασῶν τῶν δὲ ἐκλειπὴν*) ceu Glans, & Euboicum: aut ligno, ceu Amygdala & Nux: nullum in vasculo semen arboris est, nisi conum vasculum dixeris, quod absolui de fructibus potest. Semina ipsa quibusdam protinus carnosæ, seu illa, quæ nucum, & glandium genere comprehenduntur. Quibusdam caro in nucleo est, ceu Oliuæ, Lauro, & aliis. Sed quid ad hæc Scaliger. *ἡ δὲ*, *ἡ δὲ* aut carne semen obducitur, aut cute, ne intellige carnem solā, etenim ipsa quoque cute ambitur, nec intellige cutem aliter, quàm solam. Cutis naturam diuidit in duo, sic: *τὸ δὲ σπέρμα τῶν δασῶν, τὸ δὲ ἐκλειπὴν*. Quid sit *σπέρμα τῶν δασῶν*: haud satis percipio. Theodorus vertit crusta, vt sit *ἐκλειπὴν*. sanè placet: verum contextus non placet. Sic enim scribit, aut cute, aut crusta. Igitur non videtur diuidere *τὸ δὲ* in crustaceum, & *ἐκλειπὴν*, at Theophrastus diuidit. Sic ego diuiderem, extimum operimentum, in cutem, membranam, corium, lignum, testam, os. Cutis est, in frumento: membrana in acino Punici: corium, in Castanea: lignum, in Iuglande: testa in glande: os, in Pistacio. Notabis diligentius, si pro *σπέρμα τῶν δασῶν* legas, *ἐκλειπὴν*, non conuenire exempla de glande. Etiam illud animaduertes *ἡ δὲ* hic distinguere *ἡ δὲ* *τὸ δὲ* tanquam diuersum ab Iuglande. Itaque in 4. hist. Euboicas arbores etiam in Magnesia oriri, pro narratione minimè vulgari posuit: vt intelligas errorem Theodori, qui in 5. nec semel, *ἡ δὲ*, nucem pro Iuglande est interpretatus, dum Plinii auctoritatem nimis securus famæ sequitur. *ἡ δὲ* *τὸ δὲ* Theodorus, quod absolui de fructibus potest. Non intelligo quid velint sibi verba hæc: at Græca ita interpreto: *ἡ δὲ* *τὸ δὲ* à natura fructuum segregari. *ἡ δὲ* *τὸ δὲ* *σπέρμα*. Semina, inquit, protinus quædam carnea, exempla ponit. Quæ in nucum: aut glandium genere censentur: alia, inquit, *ἡ δὲ* *τὸ δὲ* *σπέρμα*: intra nucleum carnem habet, vt Oliua. Quæ diligentius quidem sunt notanda. Apertâ namque glandis crustâ, protinus caro inuenitur: & non absimili modo, Oliua nucleo aperto statim carnem habet seminalem. Videtur differentia: quia Oliuæ nucleus esculentâ obducitur carne: idcirco dixit *ἡ δὲ*, hoc sic apparetur, vt potest. Nam sanè alterum exemplum videtur laborare: ait enim Iuglandem habere statim carnem seminalem. At enim verò eadem sede & Iuglans ha-

Theophr.
lib. 1.

Euboicum
distingui-
tur à Co-
ry.

Gaz. m.

Glans.
Oliua
claus.

Iuglans

bet.

bet & Oliua. In vtraque primo æquale loco est caro, quanquam diuerso usu. Verum id nunc non disputatur: sed de sede, atque ordine inter se, & medullæ feminæ, & integumentorum: deinde est nucleus, tum pulpa. Præterea nulla ratione conuenit exemplum bacæ Lauri, cum Oliua. I habet enim cuticulam Oliua, quæ à carne non abscedit: habet carnem: habet os: postremò intus medullam feminalem pusillam: at Lauri bacca os nullum, medulla nullum. Sed primum, atque extimum, corium, deinde membranam, intra quam caro firma ac solida: qualis Castaneæ. Ea est bipartita nihil intra se continens, tantum ad verticem ligulam habet Castaneæ modo, quam ligulam vulgus germen vocat. Huc usque Scalig.

Cæterò apud Theoph. nos per *καρύον* intelligimus Auellanam, quamvis Scal. Iuglandem interpretetur, magna liquidem similitudo Auellana-rum & Glandium. Per Euboicam autem Iuglandem potius aliter, quam Scalig. nec videmus, quod repugnet, lignosum est eius putamen: cur potius lignum sit in glande, quam in Castanea, ut scribit Scaliger, aut cur Glandis putamen non sit etiam corium, aut dici possit, non intelligimus: Nec etiam illud cur in Iuglande testa, & non etiam in Pistacio: Si de Pistacio os dici potest, poterit etiam de Iuglande, vtriusque est aliud tegumentum aut putamen carneum. Quidam potius *καρύον* & *βέραν* interpretantur Castaneam, ut Athenæus, quod idem faciunt, qui cum sequuntur, inter quos Rob. Carib. qui ait Athenæum cælum miscere mari, Plinium & Gazam erroris accusat, qui Iuglandem interpretati sunt, eorum tamen opinio melius nobis placet. Constantini verba recitabimus cap. de Castanea lib. 7.

NUX INDICA NON BIFORIS IUGLANDI SIMILIS.

CAP. III.

Descriptio

A Duchitur quidam fructus ex Occidentis, aded Nuci Iuglandi similis, ut nondum introspectum, sæpius putauerimus Nucem Iuglandem esse: sed effracto, caro fuit velva, intus albida, Castaneæ sapore, nullis distincta nucleis: putamine & testa vtraque crassi ore, quam Nuci Iuglandis. Hunc Rocellæ sibi dono datum à D. Launo Medico, Lob. & Penr. obseruationi debet posteris, donec quid certius de ea resciscamus.

GENIPAT AMERICAE FRUCTVS TINCTORIVS: ET ALIVS EDVLIS.

CAP. IV.

Descriptio

Genipat dictum fructum incolis Americanis, Caithore Theueto magni faciunt, non quia edulis, sed propter usum eius ad tincturam corporis. Hi magnitudine & colore nostris Persicis similes, in ramorum extremis nascuntur, sibi mutuo incumbentes, miranda quadam ratione. Folia Iuglandis similia sunt. Fructus huius arboris succo Americani v. iuersum corpus insciunt, hoc modo. Miseri illi & bruti homines cum succum ex hoc fructu aliter exprimere nesciant, illum mandunt, ac si voraturi essent, deinde ore reuertunt, & manibus velut spumam exprimunt, ut lacum emittat, qui admodum limpidus est. Profecturi igitur illi ad stragem aliquam edent.


Tom. I.

dam, aut ad inuicendos amicos, aut ad solemnè aliquod, totum corpus hoc liquore madefaciunt. Corpora is quò magis in corpore exsiccat, eò magis natuum colorem acquirit, qui vix verbis exprimi potest: est enim quodammodo inter nigrum & cæruleum, siue eum colorem, qui vulgò azurus dicitur, medius. Hoc insecti Barbari incedunt, non minus ornatos sese existimantes, quam nos nostris cocineis, aut holofericeis vestimentis. In America reperitur & alia arbor Genipat dicta, fructu multò maiore, eoque eduli.

IVNIPAPPEEYWA BRASILIA.

NORVM NVCVM FOLIIS SIMILIS
ut Genipat.

CAP. V.



ARhoris ramulum (inquæ Clus. Exot.) foliis Nucum cum fructu. Frando-furei ad Maxum accipiebant, anno restauratæ salutis humanæ 1591. Londino missum à Richardo Gauth, quem illud in tabella exprimendum curabam, ut eius iconem cum historia lectoris oculis proponerem. Attendatur autem Iuniperi Brasiliensi appellatione, quæ vox

statim mihi suspicionem iniecit, illius arboris esse posse, quam, Brasiliensi Iunipappeeewa nominant, teste Iano Stadio Hæsto, qui apud Tappin. Inbatus nouem & amplius mensibus captiuus fuerat, demumque non sine Dei benignitate anno 1545 liberatus est. Theuetus & eum sequutus Lerus, corruptè Genipat nomen indiderunt. Huius porro praxiansi deinde expressi succo, Brasiliensi corpus atro colore insciunt. Is autem quem accipiebam, mediocritatis magnitudine erat, orbicularis penè formæ, superna parte, paulò platinior, & velut exigua coronâ insignitus, denso cortice, & [quia resiccatus] duro, exterius rugoso, & fusco colore, internè læui & spadiceo: tota pulpa quasi in massulam contracta erat ob siccitatem, plurimæque grana continebat simul iuncta, quemadmodum in stramonio conspiciuntur, plana, nigra, rugosa. Ipsam autem pulpa, licet vetustam & proprius exsiccatione paululum tamen praxiansiam, nigro colore insicere, & valde acidi saporis esse deprehendebam. Summo porro ramulo terni aut quaterni fructus inhaerere videbatur. Sed & ipse Theuetus suo Genipat plures fructus extremis ramis coniunctim nascentes tribuit, & Iuglandis folia, quorum Stadius non meminit, ut apparebit ex vtriusque descriptione, reponenda in Peregrinarum Plantarum Historia ex variis Neotericis Authoribus, qui suas peregrinationes descripserunt, à me, Deo concedente, concinnanda & in lucem producenda.


Cæterum, an etiam Iugna, cuius Oniedus c. 4.

Y

lib. 8. Primæ partæ Generalis & Naturalis Historiæ meminit? Certè eadem facultates hæc Xagux tribuit.

MACOCQVER VIRGINENSIVM.

Descriptio



Londino ad me, inquit Clusius exot. mittebat, anno 1591. lac. Guatetus fructum ex VVingandæcaou Prouincia, quam Angli [à quibus primùm obseruata] Virginiam nuncuparunt, relatum. Erat autem prorsus orbiculari formâ, quatuor vnciarum diametro, cortice duro præditus, foris laui & subfusco, intere nigra membranâ inducto, perquam sparsæ quædam fibræ à

pediculo ad summum: continebat verò pulpam nigram [quia non recens sed siccus & vetustus] acidique & quodammodo salis saporis, in qua plurima grana inuoluta, subfusi coloris, plana, & cordis: ut vulgò pingitur formam referentia, medullâ albicante prædita. Quum porro hic fructus ex Virginia relatus esse dicatur, facile mihi persuaderi inam illum esse, quem eius regionis incolæ *Macocquer* appellant, & [magno aliquo periculo liberati, vel bello defuncti, in lætius signum stracto igni affidentes] pulpâ seminibusque exemptis, implent lapillis aut crassioribus quibusdam granis, ut maiorem strepitum agitatus & commotus edat, bacilloque aptantes manu tenet, perinde ac Brasiliæ suum *Tamaraca*, sed nullis pennis ornant.

Tamaraca

Similem deinde anno 1602. à Christi natiuitate, conspiciebam apud eruditissimum Iuuenem Ioannem de Laet Ioan. F. qui illo anno Amstelredamum redierat ab his qui in varis prouincias nauigant. Orbicularis verò foris non erat, ut meus, sed paulò oblongior, fusco colore præditus, qui mihi præsentē, apertus, nigram pulpam superiorem pulpâ prorsus similem, quâ grana, alterius granis non dissimilia, erant inuoluta, continere deprehendebatur. Ceterum hic fructus non valdè dissimilis videtur *Higuero* tetrasyllabo Ferdinandi Oriedi.

Higuero

Conferant lectores historiam huius *Macocquer* cum Arboris *Iunipappeyuna* Brasiliæ norum Clusii paulò antè dictæ, comperient inuicem & descriptionibus præterque conuenire.

IUNIPAPPEEYVVE SIMILIS PENNE FRUCTVS ORBICULARIS IN quo semina Staphisagrie similia.

Descriptio

Orbicularis penè fructus è Brasilia ut referebat Paludanus, allatus: forma non valdè dissimilis *Iunipappeyuna* Brasiliæ norum, teneiore tamen cortice, præditus, & superna parte planus,

atq; quodam modo in tenerum umbilicum delinens: continebat autem interna parte multa semina rugosa, Staphisagrie seminibus non dissimilia, nucleum continentia in duas partes diuisum: pediculus cui inhærebat, triuncialis longitudinis. Clus. Exot. lib. 2. c. 7.

IUNIPAPPEEYVVE ALIIS SIMILIS FRUCTVS.

Refert Clus. Exot. lib. 2. cap. 17. à Richardo Garth. Londino missus fructus receptus è Brasilia, prorsus contractus, ut eius forma dignoscere nequiret: nullum nomen additum: putaminis fragmenta satis fragilia erant, foris & cineracei ex fusco coloris, interne nigri, pulpa rugosa & in vnum coacta, nigra, quæ gustata, acidi saporis deprehendebatur, & nigro colore inficiens, non secus quàm *Iunipappeyuna* Brasiliæ norum: huius tamen cortex *Iunipappeyuna* cortice fragilior, & in huius pulpa nulla semina obseruabam, quemadmodum in illius fructu.

Descriptio

Aridus pulpa gustu.

ARBOR VINIFERA, COVTON, IUGLANDI SIMILIS.

CAP. VI.

Mirabilis est arbor, quam Theophrastus Americæ suæ cap. 30. sic describit. In Canada prouenit arbor crassitudine & figura similis Iuglandi, cuius vsus diu incognitus mansit, donec quidam excindendo arborem obseruauit fluere succum boni & lapidi saporis, qualis optimi vini Aureliensis, aut Beaunienfis: ita indicauit noster capitaneus & alii nobiles, qui cum comitabantur: Eius succi subito collegerunt quatuor aut quinque magnas amphoras: suo idiomate hanc arborem vocant *Covton*.

Iuglandi simile. Vinus succus. Covton arbor.

LIGNVM COPA-V SIMILE IUGLANDIS LIGNO.

CAP. VII.

Scribit Leri in Brasilia prouenire lignum, quod nominant *Copa-v*: cuius arbor similis quodammodo Iuglandi, non tamen nuces ferens. Afferes, uti vidi pro utensilibus, adaptati, easdem cum Iuglande venas siue fibras habent.

ARBOR TINCTORIA

CAP. VIII.

Autor est, Theophrastus inter arbores in Regno Senegæ, ubi Aethiopes degunt, arborem esse glandiferam nostrarum crassitudine, fructu ferentem *Dasylys* parem, ex cuius nucleo oleum exprimitur miris virtutibus præditum. Aquæ permixtum, croceo colore planè inficit, quo magunt pocula, ac pileos quosdam ex lunci, vel orizæ paleis contextos. Præterea id oleum odore est Viçæ Martis, olei nostri sapore. Quamobrem multi pisces, onzam, aliosque cibos eo coniungunt.

PENOS

PENOABSON ARBOR AMERICANA.

CAP. IX.

Descriptio Est & in America, eodem teste, arbor Penob-
son dicta, cortice odoris planè admirandi, foliis
Portulacæ, valdè spissis, perpetuò virentibus.
Pomifera Fructus edit magnos, grandioris Pomæ magnitu-
dine, orbiculatos, pilæ luforiæ modo, minime e-
dules, imò venenatos. Singuli tenas Nuces intus
habent, Amygdalis nostris similes, nisi quod la-
tiusculæ sunt, & magis compressæ, in singulis
singuli nucleï conduntur. Hi ad sananda vulnera
minuscè profunt, quibus etiam vtuntur Barbari
sagittis, aut quouis alio modo in præliis vul-
nerati, ex his confusis oleum exprimentes ru-
sum, eoque vulnera illinentes.

NVX COULCOVL.


CAP. X.

Descriptio Constantinopoli, authore Bellonio, vendun-
tur Nuces duos pugnones crassæ, quibus care-
mus, quæ plenæ sunt parvis granis esui bonis, A-
uellanarum modo dulces, Couleoul vocant, id est,
Nuces Couleoul. Qualebenus lib. 4. epist. Matth.
de plantis peregrinis Constantinopoli nussis. De
Couleoul & Hebulden, inquit, nihil dum certi
intelligere potui, nisi quod Couleoul quibuldam
in delictis sint, præsertim quando recenties ex Æ-
gypto aduehuntur. Matth. respondens Quale-
beno scribit. Nucleus quem Couleoul & Hebulden
appellat, est arboris quæ Staphylodendron ap-
pellatur. Ex quibus patet Matth. sententiam mul-
tùm dissidere à Bellonio: notandum quoque Bel-
lonium scribere Constantinopoli vendi semina
Hebulden, quibus nos non vtimur: separat au-
tem ea à Couleoul. Nec etiam Qualebenus vi-
detur idem dicere Couleoul & Hebulden: de his
plura nunc non occurrunt nobis scribenda.

NVX AROMATICA, VVLGO MOSCHATA.

CAP. XI.

Descriptio.



Tom. I.

Post Iuglan-
dem Arma-
ticam dici conue-
niat. Nam & ge-
neris nomen, &
triplex cum illa
involuerum cõ-
mune habet: &
folia huius à nõ-
nullis dicuntur
esse Iuglandis si-
milia, vt tacea-
mus has conditas
cum istis ab in-
fistoribus fre-
quenter adulte-
rari. Adde quod
exterius eius pu-
tamen viridi Iu-
glandis simile di-
catur.

Dudum porro

maximè generum sunt Nuces moschata: vnum fi-
gura Oliuari, alterum longius minùsque rotun-
dum. Vtrumlibet verò genus, prout conditum
adfertur, Persicam malum mediocrem æquat:
primùmque puluinato integitur, Iuglandis vel
Persici in morem, calyce: huic subest mediocris
crassitudinis putamen seu cortex lignosus, nullo
nec sapore nec odore, intus cinereus, foris ex ni-
gro spadiceus, valleculis hinc inde depressis inæ-
qualis, quas extimo & huic iam dicto cortici in-
teriecta Macis dicta explet, reticulato plexu cer-
tis locis durum illum corucem obuoluens, perti-
naciùs circa pediculum adhærens, alioqui ab
& incubitu duntaxat leui appressus facili negotio
auellendus, coloris ex rubro flauescens, saporis
iucundissimi aromatici, acriusculi cum amarore
quodam, velut oleaginei quandam punctura
remittens, quem & acu punctus reddit nucleus,
quem vulgò omnes Nucem moschatam, eruditi ve-
rò etiam totius nomine nucem myristicam voca-
mus, oliuæ magnitudine, vel paullo lon-
gior, Dactylum tam figura quàm magnitudine
referens. [longas appellant maces: liuores, scimi-
nas,] coloris terè cinerei extrinsecus & rugosus, fæmina.
spadiceis & ex flauo albicantibus venis vdatam,
vel sine vilo ordine hinc inde discursantibus, sub-
stantiâ solida. Sed in pila fragili, nec difficulter
in scutula dissiliente, sapore & odore aromati-
co & subadstringente.

Author est Garcias, arborem quæ Myristicam
Nucem & Macis profert, Pici esse magnitudine,
foliis eiusdem, sed brevioribus & subrotundis,
seu veris Persicæ malo haud abstimilem, breui-
oribus tamen foliis. Fructum ferre, duro cortice
munitum, quo per maturitatem deliscente, ca-
lycem echinatorum, qui Castaneas amplectun-
tur modo, macis appareat. Verùm in us, quæ
nostro orbi conditæ importantur, non obliuimur
echinum Castaneæ, sed Persici puluinatum
calycem, vt iam dicebamus. Repentur, sed ra-
ridis, gemellus quoque nucleus, facie interiore,
quæ se ambo nucleï tangunt, compressim, exter-
nè gibbosus, qualem & nos inter Exotica nostra
naturalia reconditum habemus.

Potro videtur nux moschata καριόκκινον esse apud
Theoph. Scimus alios existimare, Comacum esse
Gariophyllos, de quibus suo loco. Nobis plausibi-
lius videtur, esse nucem aromaticam, quia fru-
ctum dicit. Verba Theoph. sunt: τὰ ὅ αὐτὰ πάλαι
τὰ ἑσπερία, ἢ καὶ τὰ ἀνατολικά καλεῖται, τὰ ὅ αὐτὰ
καλεῖται, καὶ ἡντινὶ ἐπὶ δὴ καλεῖται κατεστρωμένη, τὰ ὅ αὐτὰ
ἀρβύλας, δὴν περὶ τὸ κινάμαρον, καὶ τὰ κασιὰ, καὶ κινάμαρον.
ἢ περὶ ὅ αὐτὰ τὰ κινάμαρον, καὶ τὰ ὅ αὐτὰ ὁμοιωμένη
ἢ τὰ αὐτὰ αὐτὰ τὰ κινάμαρον. Sed ὅ αὐτὰ superfluum
censemus, & legendum post κατεστρωμένη, τὰ ὅ αὐτὰ
ἐν: in quem modum etiam Gaza legit atque con-
uertit, hoc sensu: Ceteri autem odorata, quibus
ad vnguentorum confectiones odoras vtuntur,
quædam ex India aduehuntur, ac inde transmi-
tuntur ad mare: quædam ex Arabia, vt Cinamo-
mum, Cassia, Comacum, atque hunc diuersum
fructum esse, quem vnguentis sumptuosissimis
permiscere solent. Vides ipsum Comacum aper-
tè appellare fructum: Gariophylli propriè sunt
flores. Vnguentis etiam commodior nux mos-
chata, immò expressus eius liquor per se ipse vn-
guentum est, vt his notis Theophrasti Comaco
apprimè competat.

Eundem Cinnamum & Caryopon esse cense-
mus apud Plinium, nisi forte Comacum quoque
legendum sit. Chiffletius sanè vir doctissimus &
& amicus noster singularis iamdudum Comacum

legit apud Plin. pro Caryopon, ut Dal. quoque
 obleruauit. Sic autem ait Plin. In Syria gignitur
 & Cinnamum, quod Caryopon appellant. Hic
 est succus nuci expressus, multum à succulo veri
 cinnami differens, vicinatamen gratia. Pretium
 in libris asses quadraginta. Vt etiam Theophras-
 to clarus nucem nostram moschatam Plinius in-
 nuasse videatur. Nucem manifestè dicit, Caryo-
 pon succum ei expressum: quod oleum dicere
 possis, etiamnum hodiè lautioribus Pharmacop-
 ois, pro delicatiorib' exprimi soliti, quod mox
 in vnguenti consistentiâ congerit. Reliqua quo-
 q. non repugnantiam & vicinam Cinnamo gra-
 tiam habet, & ab eo tamen plurimum differt.
 Massius autor in hist. Ind. Ad Bandam ditionis
 Molucarum vicinas aliquot insulas totius orbis
 terrarum solas [quod constat] spontè, lautiores
 in epulas & medicamenta mortuum, ex vna ca-
 demque arbore Nucem myristicam & Macim pro-
 gignere. Arbor [addit] Plinius ad Pyn similitu-
 dinem accedit: fructus Mala Persica quadante-
 nus imitatur: floret quo tempore ibidem aliz
 quoque plantæ & herbæ variis generis: in quibus
 vniuersis mixtus odor, incomparabilis cuius-
 dam suauitatis existit. Vbi desinunt maturescens
 potum, paulatim è viridi, tum cœruleas luteas-
 que, tum purpureas & igneus transit in maculas,
 quales in arcu cœlesti: atque eo ipso tempore
 pistraci & aliz aut sexum pulchritudinis ad gra-
 tiffimum sibi palmam aduolant: augent oblecta-
 tionem, cum folia & fructus & alites ipsæ variis
 colorum picturis in certamen vique luxuriant.
 Lud. Rom. Nucis Mosch. historiam sequentibus
 tradit: Minus nucis caudex Persico caudice simi-
 lis, ramos foliaque consimilia producit, verum
 nonnihil angustiora: priusquam nucs huiusmo-
 di percoquant, sicut arborem mastix florentis
 Rosæ instat: & ubi nux percoxit, mastix eam
 complectitur. Ex quibus sanè verbis apparet
 Ludouico Romano non bene cognitum fuisse
 Macis crescendi modum, quem malè vocat Ma-
 sicen: non floret Rosæ instar, licet enim sub
 pulpa: fortè olim Maubiolus ex Lud. Rom. de-
 scriptione curaret concinnandam suâ iconem. M.
 Fume in hist. gen. Ind. Gallicè concripta Moscha-
 ram arborem similem Quercu facit, ferentem
 Nuces ut Glandes, aut more Dactylorum, quæ ha-
 beant Macim. Sed bonus ille vir de arbore sibi
 incognita, neque visâ scribens, adiecit quæ omni-
 bus qui de ea tradunt, ignota sunt atque inaudi-
 ta, ne dum visa, nempe Quercui similem esse.
 E contra, & rectius Maxim. I. Transylu. de Mo-
 luc. insulis. Nucis Myristicæ arborem proceram,
 amplamque esse dicit, eique, quæ Nucem Iuglan-
 dem ferat, admodum similem. Neque hanc Nu-
 cem aliter, quam Iuglandem produci,
 gemino protectam operimento, puluati
 primum calycis, sub hoc tenuem membranam,
 quæ reticulatim nucem amplexatur. Hanc nos
 Muscatæ florem, (inquit is,) Hispani Macim vo-
 cant. Alterum operimentum, ligneum esse pu-
 tamen, ut Auellana, cuius nux insit Muscata.
 id est, quædam, quædam, quædam quidam
 Græcè vocant: alii etiam & vniuersim. Sed nun-
 quid Dioscor. incognita fuit Nux moschatæ fuit:
 nihil enim de ea scripsit: scribit quidem de Mace-
 re non de palliolo huius, seu cuticula foliaceâ,
 Macis dicto, à quo Macer haud parum diuersus.
 Auic. Grauziban, Nux muschata. Serap. leuzba-
 ue vel luthique, id est Nux muschata. Item Bis-
 hese, id est, Macis. Isaac Eben amram: Est cortex
 Nucis Muscatæ, qui est supra corticem crassum in-

utilem: fructus qui utilis, nominatur in Orien-
 te Adaches. Hermod. Nux odorata, quam Græci
 modò Caryon myristicon appellant, hoc est, Nu-
 cem vnguentariam, quæ sanè diuersa à Glan-
 de vnguentaria. Moschocaron, teste Ruell. à Græ-
 cis recentioribus dictum, Latinis occasionem de-
 dit, ut eius imitatione Nucem moschatam nomi-
 narent: ea membranoso primum velut calyce,
 foliato, fissili, mox lignoso. Mauritaniæ factio-
 nis principes Macis nomine extimam intelligunt
 membranam. Ex quibus Ruell. verbis facilè
 patet ei crassiorem & exteriorem corticem carnei
 non fuisse cognitum. Nec intelligimus quid sibi
 velit his verbis, quando ait: Hippocrates Aegy-
 ptiz Balani meminit. Sed multum à veritate mihi
 deficere videntur, qui Nucem odoratam, quam
 vulgò dicunt Moschatam, hac glande vnguenta-
 ria comprehendere putent, longè profectò differen-
 tem, & Veteribus, ut existimo, prorsus incogni-
 tam. Aegyptia reliquarum modo ossa non habet
 in balanis. Alium & mensis sinit in vino aulte-
 ro, & vulnera agglutinat. *adiposum & durum* Actio,
 Veteribus ignotum, Syluius qui ait, historiam eius
 graphicè depingi à Ruellio. In margine: Nux
 moschata vulgo, etiam si moschum non oleat. At
 nobis non videtur graphicè descriptam à Ruel-
 lio, cui non cognitum fuit exterius corpus callo-
 sum, ut patet ex eius descriptione. Tagaultius
 quoque à veritate multum deficere tradit eos, qui
 Nucem odoratam, seu Muscatam vulgò sub Glan-
 de vnguentaria comprehendere putent. Nux Mos-
 cata, id est, ut scribit Cordus, fructus qui totus cum
 ad iustum peruenit incrementum, Iuglandis, vi-
 de carnosumque putamen habentis, magnitu-
 dine cernitur, triplici cortice nucleoque compo-
 situs: exterior cortex carnosus consistens, cui sub-
 est tenuior, non continuus, Macis appellatur: eo
 detracto apparet tertius in fusco, purpureus, li-
 quolus, intra se nucleum continens subrofun-
 dum, oblongum, longitudine vicialem. Sapo-
 rem habet & odorem tenuem, suauiter acrem, iu-
 cundum valde aromaticum & adstringentem, qui
 Nux muschata vocatur: decorticatus ex India ad-
 fertur. Adferantur etiam integri fructus, melle
 conditi quos nuper ex petiit adulterare, eius sin-
 gulis nucleis, viridi Iuglandis putamini diuiso
 impositis, & rursus composito: qui delus facilè
 deprehenditur mollitia, sapore, & quia diuise
 erant commissure. Carnosus enim Moschata nu-
 cis cortex iucundum habet saporem, solidiorem-
 que consistentiam: Iuglandis verò austriorem
 & molliorem. Similiter quoque excipiuntur Li-
 monum & Chebulorum: quos sic vocant] con-
 ditorum carne, sed hic delus commissus depre-
 hendendus est, quoniam condita earum caro gustu serè
 nihil à Nucis moschatæ carnosio putamine differt.
 Est & Moschata mascula, precedenti similis, ma-
 ior tamen oblongiorque, figura atque magnitu-
 dine serè ad vulgares Palmulas accedit, cuius pe-
 ricarpium quale sit, nondum nobis constat. Sa-
 porem habet subacrem, aliquantulum tenuem
 & aromaticum. An Galeno Chrysobalanos, cuius
 meminit lib. de comp. med. loc. 3. cap. 3. in duobus
 pharmacis Asclepiadis Stomachicis: ubi ait Chryso-
 balanos esse ex discutientibus & corroboranti-
 bus. Item lib. 9. cap. 2. in medicam. Asclepiadis ad
 Coli affectus præscribitur Chrysobalanos. Glans
 muscata, Bapt. Pieri in carnibus caræ. Nux
 quam pignensarii Moschatam appellant, Plin. de
 honesta volupt. Myristica Nux Scalig. Corar.
 in Gal. lib. 5. de comp. med. cap. 1. Quæ hodie
 Nux muscata seu Muschata vocatur, non alterius
 (inquit)

Nux odo-
 rata.
 Caryon
 myristicon
 Moschocaron

Ruell.

Balanus
 Aegyptia.

Nux mos-
 chata.

Glans de-
 gypcia.

Caryon
 Aromat.
 Actio
 Sylu. ex
 Ruell.

Nux mos-
 chata
 Cordus
 descriptus.

Nux mos-
 chata con-
 dita.

Adulterium

ut depre-
 hendatur
 facit.

Aliud a-
 dulterium.

Moschata
 mascula.

Chrysoba-
 lanos.

Glans mos-
 chata.

Nux mos-
 chata.

Chryso-
balani.
Cornu putat
Veteribus
ignotum
Nucem
moschat.

[inquit] generis quàm Myrobalanorum Græcorum censendam putat, & fortassis ea est, quæ Chrysobalanos eidem Gal. lib. 8. citati operis appellatur. Neque enim credere sustineo Veteribus ignotam fuisse, in tanta hodie frequentia. Nam quæ ab Arabibus Medicis ei adscribuntur vires, magna ex parte Dioscor. hæc autem præcipue tribuit: verum est hæc in suo genere magis aromatica, & stomacho commoda, tum corroborans ac concoctionem iuuans, quod Dioscor. de Balano Myreplica negasse videtur: *αρωματική & διεραιτική*, inquit. Ad olei certè ex ea expressionem reliquis generibus etiam accommodatior videtur. Succum autem ex Balano Myreplica expressum, olei vicem in vnguentis præstare præbuisse Dioscor. lib. 4. testatur, & cum in ahis, tum in Amaratino ac Cinnamonino vnguento lib. 1. meminit, idem, velut Plin. quoque facit oleum Balaninum sæpè appellans. Nolo tamen hac parte in hac reum obscuritate quicquam adleuerantius adstruere. *Hæc Cornu.*

Chryso-
balani.

At Matthiol. Hodie, inquit, ignorata videtur quæ *χρυσοβάλανος* Græcis vocatur, digerens & roborans Indicæ Nardi modo, ad Colicos affectus, ventriculi ardores & singultus à Gal. Asclepiadis autoritate commendata. Non desunt à Recentioribus, qui sibi persuaſeant Chrysobalanum esse Nucem myristicam: cum tamen plura sint, quæ eorum destruunt sententiam, nempe cinereus color, acutus ori sapor, & quod Myristicæ nucis nusquam meminerint Veteres Græci. Nullam huiusce, quod legerim, mentionem fecit Gal. in libris simplicium medicamentorum: id quod argumento esse potest, Gal. ipsum non habuisse compertum, quid esset Chrysobalanus. Verum Matth. rationes nobis non satisfaciunt. Primum quidem certum est, nostram Nucem aromaticam esse cineritio colore: interea tamen nullus (quod equidem sciamus) meminit coloris Chrysobalani, nisi ab etymologia nominis sumitur. Verum quid si non à colore, sed à præstantia aurea Balanus dicatur? Vel quid si propter Macin aurea dicatur, quo fortè obducta visa fuerit ab Asclepiades? Secundò, quid impedit acutus ori sapor, cum dicat Gal. esse ex discutientibus. Tertiò, quod Veteres nusquam Myristicæ nucis meminerint, nihil ad rem, nam et si hoc nomine non meminerunt, non sequitur tamen non potuisse meminisse sub nomine Chrysobalani. Quartò, cuius quæso momenti hoc argumentum. Galenum de simpl. non meminisse Chrysobalani, propterea Galenum non habuisse compertum quid esset. Quin potius Galenum existimamus scivisse quid esset, cum dicat esse ex discutientibus & corroborantibus, quæ sanè in nuce nostra aromatica reperiuntur, & ad eadem nos nostra utamur, ad quæ Asclepiades sua Chrysobalano utebatur, ut videre est ex facultatibus Nucis moschatæ attributis. Ita nolimus adhuc Cornarii opinionem reiicere, existimantis Asclepiadi, Galeno, & Prisco aded illi ævo cognitam fuisse Nucem nostram aromaticam, donec firmiter argumenta audiamus. Nectamen eius sumus opinionis, Nucem moschatam eandem cum Balano Myreplica Dioscoridis. Matthiolum quoque lapsam in Myristica nuce Guilandinus ait: quodque Antiquis incompetam dicit non probat. Quid enim? [inquit] An eam Theophr. Comacum & Plinio Cannam Caryopon appellari euerteret?

Matth. error.

Comacum.
Cinnamon.
Caryopon.

Sed audiamus ipsum Matth. de Myristica nucis scribentem. Sic autem tradit apud Diosc. Myristicæ nucis, quæ vulgò offic. ob odoris præstantiam

Muscatæ quæ Moschatæ dicuntur: Hæ post soliorum germinationem florem statim emittunt, quem Macin Arabes vocant: panditur is sylvestrium Rosarum modo: & ubi maturitatem senserit, expansus eam circumplectitur. Suo Maci tanquam rete comprehensæ Venetiis in Officinis visuntur, duro putamine conclusæ.

Idein in post. com. Lat. & Ital. cum magnis figuris, mutata icona scribit: ut referunt ii, qui Indica littora perlustrarunt, has proferunt arbores quædam nostratibus Persicis haud absimiles, angustioribus tamen foliis ac brevioribus. Fructus nostratibus Nucibus adhuc in arbore existentibus persimiles sunt. Siquidem primo crasso ac viridi cortice conteguntur, cui deinde subest Nux ipsa, duro satis putamine oclusa, nostrate tamen tenuiore, quo fracto Macis apparet, rubicundus, reticulæ instar nucleum circumueſtiens: id quod palam faciunt Myristicæ nuges, quæ saccharo, aut siliquarum melle adseruatæ, integræ ex India ad nos conuehantur.

Ceterum mira tur quid cogitarit Matth. quod scripserit olim, atque aded vnquam scribere ausus sit, Macin esse florem Nucis moschatæ, ut etiam ex sua phantasia pinxit, & postea dicere, comprehendere tanquam rete, quod pictura etiam exprimit. Miraculosa profectò metamorphosis, nuper floris arboris, iam in fructus corticem transfigurati, atque aded maior, quàm si Rosa Hierichontæ macerata se aperiat: atque pandat die natalitio, Saluatori Christo dicato, vel parientibus mulieribus. Sed quid opus die verbis ludere. Macin arboris florem esse, eius cerebelli figmentum est vnum ex innumeris aliis, atque aded veteratorum ab eo factum, quod figuram ex sua descriptione imaginaria, [quod quidem attinet ad florem] pingendum curare fuerit ausus. Si Nuges moschatas, quales in India integræ conueniuntur & in Europam importantur vidisset aut diligenter considerasset, animaduertisset præter durum putamen & Macin reticulatam, aliud esse externum, crassum & carneum nucamentum seu putamen, seu callosum carnosumve corpus liceat appellare, quale ferè in Iuglande, Amygdalis, Persicis immaturis & similibus.

Dum verò in post. com. Lat. & Ital. priorem errorem emendare satagit, alio nouo & crassiore ingemnat. Nouam quippe figuram atque descriptionem excogitans, corticem appingit crassorem, quem fatetur adesse, ut in Iuglandibus: verum Macin esse tradit sub cortice duriore, immediatè supra ipsam Nucem moschatam vulgò dictam, idque apparere ait in Nucibus conditis ex India allatis, quod falsum: perinde sanè, ac si nos luscis existimasset. Proinde ex eo quoque constat, posteriorem figuram ab eo fuisse effictam: nec probè sibi visam aut cognitam æconomiam partium Nucis moschatæ.

In Hist. Germ. alium situm Macis meritò tradit: verum quid sibi volunt in descriptione hæc verba Iude Holgrinde / id est, cortex lignosus mollis. In epitome quoque bene ab eo factum, quod situm Macis aliter, & ex ipsa aded natura, non suo ingenio declararit, nihilominus tamen in postrema, & reformata eius editione Macis dicitur flos: ut ipso aded Matth. reduit, sed melius edocto opus esse videatur, qui repetitam suam Cramben recoquat, atque aded digerat, quàm hæcenus factum, melius.

Camer. apud Matthiol. in hist. Germ. & Epitome reiecit iconem Matthiol. subrogata alia.

Nec impunè nobis abest Tabern. qui pro nu-

Vnde Matth.
chata dicitur.

Fructus
nucis in
gl. sumitur.

Matthiol.

Matth. error.

Tabern. not.

ce moschata deterids etiam figmentum exhibet, quod una icone duas falsas Matthioli complectitur: qua postea icone de nouo nouissimam Matthioli editionem maculauit eius patronus: digno melicucle patellâ operculo.

Hist. Lugd. mor.

Hist. quoque Lugd. Consecrator censura dignus qui assumpta Matthioli descriptione ac figura falsa, secunde & oscitanter praterit, non animaduerso utriusque natio: quod tamen ei facile fuisset, quippe qui ad manus habuerit libros Atom. Garcia, quem citat in margine.

Alter hist. error. Munsteri mor.

Eadem Hist. aliam praterca nouam, sed falsam quoque iconem ex Acoſta ostendat.

Facilius excusabimus Munsterum, qui vitiosam descriptionem atque figuram in sua Cosmogra. exhibet quem scimus in alieno foro hac in parte versatum: hoc tamen docet, in Insula Sumatra nasci eas.

Euch. Roslin. in. mor. Curtius mor.

Falsam quoque iconem in suo Herbar. habet Euch. Roslin.

Curtius vno eodemque loco Macim his describit, nec videtur eius extimum putamen carnosum cognouisse.

Lacuna mor.

Lacuna ex iis quoque est, qui tum Nucem moschatam tum Macim antiquis Græcis incognitam putant. Is quoque iconem falsam habet, diuersam à Matthioli icone: in eo tamen cum eius prior consentientem quoddam externum crassum putamen non habeat, licet ipse scribat, deferri in Lusitaniam siue Portugalliam conditam magnitudine Persici siue Melocotonis, in eius medio tenuem esse corticem, vulgò Macis dictum, restis modo inuoluentem testam duram: mox tamen sui oblitus, contrarium dicit. Macim esse florem Nucis moschatæ.

Lonicer. reproh.

Lonicerus eandem cum Lacunæ fictitiam iconem habet, & praterca perperam scribit Macim & Macerem corticem ambire Nucem Muscatam, quasi esset flos eius. Neque idem Macis & Macer, uti patebit postea.

Dolendum Cronemb. ita vanum & fabulosum ut cum aliis de peregrinis scribat à se nos visis: Cudit enim hic suam descriptionem ex falsa icone Matthioli, vel alius alicuius. Si is vidisset Noces in arbore prouenientes, vel eas, quæ ex India cõditæ adferuntur, aliter descripsisset. Est enim supra Macim crassus cortex vel potius caro, & in Iuglandibus & Persicis, nec floret Rosæ instar, ut dictum.

Nuc. Myristica.

Nec sapit Amato Nucem Moschatam Myristicam appellari, cuiusque nomine Hermolaum & Marardum, aliòsque doctores taxat, quasi minùs bene ita ab ipsis vocaretur, quoddam nomen Glandi Vnguentariæ ex directo respondeat, quæ Græci *Βανδαρι* *μυριστίνης* sua voce appellant. Et sanè si rem suo pede metiri velimus, minùs propriè ita vocari comperiemus, quoddam ea vox sit æquiuoca, & utrique vnguenti significatu atque respectu competat.

Corticis sapor.

Sed quid Costa de ea, Indiarum ille explorator: nimirum Piro similem facit hanc Nucem, paulò rotundiorem, externum operimentum carnosum & durum aliquantulum, à Bandæ incolis sepe neglectum, nisi viridi cum sale & aceto velcerentur, quoniam grati & adstringentis gustus sit. Verùm eius iconem falsam esse, vel ad libitum factam, vel ex eo apparet, quoddam ramum pingit cum Nuce aromatica Maci tantum obducta, sine extimo putamine, quæ formâ utique ramo non adhzret.

2

Cronembur. lib. 1. de Comp. med. Cornarium falli scribit, existimantem Chrysobalanon esse Ga-

leni, ut ex colore & sapore vulgaris Nucis moschatæ demonstrari queat. Sed cur non refutat eundem.

Garcias quoque vult Nucem moschatam cum suo Maci veteribus Græcis incognitam. Eos qui nostram Myristicam nucem Myristicam nucem Chrysobalanum Galeni esse volunt satis conuincit eam formam, tum colore & temperamento. Sed si formam Chrysobalani tam bene nouit, cur eam non docet: cæteris rationibus responsum prius, dum nobis res esset cum Matthioli.

Dod. Nucis moschatæ descriptionem paucissimis comprehendit. Primum, inquit, habet corticem viridem crassum: deinde pelliculam quæ Macis supra putamen lignosum, in quo Nux.

Nucis mosch. partes.

Affinem fronde & fructu Persico, esse arborem Nucis Myristicæ, quam frequentem habent insulæ orientis à Moluccis, vna referebant, (ut tradunt Pen. & Lob.) qui attulerunt easdem Noces decerptas suis manibus amari, & triplici cortice protectas, quales conditæ prostant in offic. & posse nostro cælo assuescere negabant.

Iam Cæsalpinus, qui diuersas descriptiones opinionisque nouas habet, audiatur: Nux muscata ex Iusulis ultra Gangem aduehitur, maior Auellana, minor Iuglande, rotunda: adfertur autem purgata à suis putaminibus: aliquæ tamen visæ cum suis corticibus, utpote immaturæ, quarum exterior tunica dissecta magis quam Auellandarum calyx, colore ruffo, aromatica, totam Nucem circumplectens: sub ea cortex ossis continetur. Tradunt eius arborem Persico Malo similem: foliis paulò angustioribus: in incultis nasci, fructum ante maturitatem circumdare instar florentis Rosæ, quæ postea perfectam Nucem complectatur vndique. Incolas verò eius loci, quamprimum huiusmodi complexum viderint, certatum colligere. Alii distinctius referunt, arborem specie & folio Nuci Iuglandis similem: fructum completum magnitudine Mali Cotonei, externo cortice viridi & crasso, ut in Iuglande, qui Saccharo conditus gratus est gustui, & aromaticus. Sub hoc membranam tenuem contineri, quæ Macim [fortè leg. Nucem] circumdat, rubicundum & implicatum circumdorem corticem: intra hunc postremum Nucem muscatam contineri. Eius mentio reperitur apud quosdam ex Græcis recentioribus, *Muscocaryon*, & Myristicam vocantes. Fortè Actius eandem intellexit sub nomine Nucis Indicæ, quod recipit in sustinamento muscato. Arabes optimè nouerunt, in medicinis expectantes & medullam internam & externum corticem tenuem, quem Macim vocant: nam medius qui ossis est, inutilis iudicatur. Si diuinare liceat in re aded ipsi Autoribus incomperita, quid obstabit si dicamus extimum Nucis muscatæ corticem apud Dioscor. vocatum fuisse *Narcaphibum* inter sustineta odorata quod ex India corticosum aduehitur. Alterum autem eiusdem corticem crassiorem esse Macerem, qui ob substantiæ crassitiem acerbus sit, & minimum quid redolens: ideo inutilis iudicatur, Serapioni. Quasi putamine tantum iis temporibus afferrentur, Nuce in patriâ remanente: ea tamen ut præiosa & valde peregrina oxosculabatur antiquitas. *Hæstius Cæsalp.*

Prior descriptio.

Iuglandis folio.

Nux Indica Act. Cæsalp. cõscriptura.

Narcaphibum.

Macer.

Multi Cæsalpini erroris deteguntur.

Cæterum fabulosam esse historiam priorem Cæsalp. de tunicis & flore satis superque demonstratum. Nam quando dicit, exteriorem tunicam totam Nucem circumplecti: circumnasci florentis Rosæ instar: postea cõplecti vndique, falsasunt hæc omnia. Ut mirum sit tam magnū Botanicum atque Philosophum, etiam post alios Scriptores incon-

incon-

Antonius sicut commentatum de re, quæ diligenter considerationem optime merebatur. Sed, inquit, ex aliorum relatione ista magna ex parte tradidit. Sed, inquam, eius fuerat, in tanto loco, & tam famosa Italia regione constitutum aliorum errores taxare, eos præsertim, qui iam ante ipsum fuerant detecti. Censuram & considerationem etiam merentur ista, quando dicit, visas cum suis corticibus immaturas esse: folia Iuglandi similia, nec addens Authorem, qui viderit: medium verò corticem osseum esse. Qualia sint folia, Persicine, an Iuglandis, fateatur nobis nondum planè constare. Corticem extimum non esse *Narcaphthum*, satis demonstrant ea, quæ de eo dicit Acoſta, nempe serè neglectum corticem Nucis moschatæ: neque Garcias neque Acoſta aromaticam vim ei tribuit, ut fecit Cæſalp. Cortex ille alter siue putamen nihil habet, quod respondeat illis quæ Diosc. & Gal. de Macere scripsere. De Maci & Macere subſequentibus agemus capitibus: De Narcaphtho, suo loco.

Corticem
extimum
non esse
Narcaph-
thum Diosc.
Alterum
corticem non
esse Macer.
Diosc.

Nux mos-
chata mas.

De Nuce moschata mascula dicta, vel maiore, quædam peculiaritas habet C. Bauh. eam esse gustu adstringente, odore serè nullo, cariosam magis, minùs oleosam, affectibus ventriculi & capitis commodiorem. Verùm Nucem masculam hæcenus non obseruauimus differre à vulgari adstringente, odore, carie & oleositate: nec etiam viribus: ex vetustate aliqua possit oriri varietas à vulgari, præter magnitudinem & figuram quam habet: nam quia rariore, diutius adseruari solet, unde fit ut exoleſcant. Deinde si odore serè nullo sint, & cariosæ magis, non videmus quomodo ad prædictos affectus possint esse commo- diores. Verum quidem est, Rondeletium olim pro roborando ventriculo prætulisse eas Noces, in quibus minùs sit oleositatis, sicciores & magis exuccas. Mihi sanè Bauhino, quæ multo oleo refert, ructus mouent.

Synonyma
linguar.

Nux moschata, *زهر الجوز* Conſtan. Lex. quo authore, ipse viderit: nisi quia fortè eandem vocis vim existimaret quæ *juzeim*, Arab. *Insiband*, ut quidam scribunt, id est, nux Bauſenſis, & *Drigar*: Germ. *Muscat nuß*. Belg. *Mote moscaer*. Gal. *Nux muscade*, ou *mugette*. Ital. *Nux muscade*. H. sp. *Nuez de especia*, *nuez muscade*. Bohem. *Ruſſi Muſſfatorwe*. Persis arbor *Drach*. Turcis *Agache*. Vngar. *Zerechön dic*.

Locus.

Nascitur Myristicæ nuci arbor in insula Banda. Inueniri etiam tradunt in Moluccis, sed non est fructifera, quemadmodum nec ea quæ in Zeilan prouenit. Garcias. Acoſta tradit in Moluccis humiles esse, & fructu pusillo nasci. In insula maris Indici, Banda dicta, abundant in syluis spontaneæ, ut scribit Lud. Romanus. Nux moschata mas ex India quoque ad nos importatur, non tamen copiosè, ut reliquæ, sed rarè, inter reliqua aromata, præsertim inter moschatas vulgatas.

Vfus.
& vires.
Tempera-
mentum.
Lentigo.
Virus.

Nux moschata, ut scribit Auic. calida & sicca est in fine secundi vsque ad tertium: striptica est: confert lentiginibus & odorem oris bonum facit: confert panniculæ & visum acuit: corroborat hep- par, splenem ventriculūque, maximè verò eius orificium constringit, prouocat, & confert difficultati vrinæ, & cum in oleis ponitur, confert doloribus, & similiter in pellariis, & prohibet vomitum.

Difficultas
vrinæ.
Dolor.
Vomitum.

Serapio scribit: nucem moschatam Aben Mes- uaio esse naturæ Geryophyllorum, calidam & sic- cam in tertio gradu.

Stomachus.
Hepar.

Ventrem & stomachum & iecur firmare tradit Auius, cibi coctionem iuuare: longis iocinoris

Tom. I.

valetudinibus opitulati, sed pulmonibus officere. Singulorum tollunt toſtæ, aut ad ignem desic- cata: fluxum ventris sanant, maximè si in vino rubro sumantur. Matrici viles sunt, renibus & vesicæ: ad difficultatem vrinæ, quæ à frigida cau- sa prouenit, & aliis multis morbis, tam virorum quàm mulierum.

Singulorum.
Fluxus ve-
tris.

Calculum frangunt & pellunt, maximè si ma- cerata fuerint in oleo Amygd. dulcium, authore Dod. Verùm tam calculum frangere credimus, quàm cætera quæ dicuntur id præstare sine vlla certatione aut firma experientia. Cordus an- notat, Venetas mulierculas Nucem moschatam masculam contra difficiles partus assumere. Ple- risque existimatur nux moschata caput confortare præ aliis medicinis, id quod & Placot. testatur in lib. de tuenda bona valetudine. Immaturam, at- que adè integræ nucem saccharo condiunt Lusitani: nam præter odoris suauitatem, & sapo- ris gratiam, propter quæ expetitur, Indici Me- dici & Brachmanes multum illa vtuntur, in om- nibus frigidis cerebri morbis, Paralyſi, & aliis neruorum atque vteri affectibus. Maioris verò æstimationis sunt apud illos grandiores Noces, quàm apud nostros, teste Acoſta.

Difficultas
vrinæ.

Dod. non.

Ad diffi-
cultatem
partum.

Conditio
saccharo.

Paralyſis.

Conditio de
saccharo.

De iisdem conditis sic Amatus: Est Pomum quod non diu ex India ad nos saccharo confe- ctum deferri cœpit, magnitudine quæ Pomum Persicum, rotundum, obscuris quibusdam lineis intersectum, nam color illi Persici quoque inesse videtur. Huius autem Pomi caro suauissima ac gustui gratissima est, & cordialis: & ea de causa eius libra quatuor venditur autem ducatis.

Æstimatione

Nucis myristicæ dimidium, teste Cam. ex vino huiusmodi, facit ad citam respirationem. Longè re- ctius ad diuturnitatem conduntur vina, vna aut altera nuce myristica in dolio huiusmodi iniecta, quàm impuro sulphure.

Cura respi-
ratio.
Dolorum
correctio.

Ex recentibus prius contusis & in cacabo cale- factis prælo exprimitur oleum seu liquor oleagi- neus, qui refrigeratus Cera nonæ instar concre- ſcit, saturè flauum, fragrantissimum spirans odo- rem, frigidis morbis, potissimum neruorum ar- ticulorumque diuturnis doloribus à frigore exci- tatis vtilissimum, quin & Venereis inunctionibus maximè expetitur, ut tradit Matth. Datur ex ca- lido iusculo aduersus dolores Colicos, tormina, & cruciatus nephriticos.

Oleum ex-
pressum.

Dolor.

Calica.
Nephritis.

Ex iisdem quoque, sicut ex aliis aromatibus, destillatur oleum, Gummi arboris, quæ nucem myristicam fert, ut refert Camer. nonnunquam inter alia aromata à Lusitanis in Italiam impor- tata, reperitur, eximie fragranti odore præditum, si accendatur: pulchrè autem rubet, cuiusmodi se portiuunculam habere testatur.

Oleum de-
stillatum.
Gummi.

Cl. Medicus Bapt. Montanus scribit sapienter se huius præclaras, expertum esse vires in imbecil- litate membrorum corrigenda, potissimum verò articulorum, & podagra. Myristicum oleum vnguinofum, [ex sententia Lob. lib. de Balsamo] laxando & inquinando nec quicquam vulneri- bus glutinandis Balsamo simile habet, nec stoma- chi vires colligendo idoneum est. Quamobrem Rondeletius in cordis & ventriculi corroboran- tibus medicamentis immaturas, siccas, leues, au- steras, aliquantulum cariosas, adstringentes nu- ces moschatas ponderosis, maturis, vnguinosis præferebat, coquis, culinariis blandimentis com- mittens pingues aut præpingues. In Anglia vo- catus ad generosam matronam prænantem, quæ cum summo desiderio auidè duodecim nuces moschatas tanquam panem manducaſſet, in-

Imbecilli-
tas membrorum.
Podagra.

Ventriculi
lax.

Dolorem
ab ipso nu-
cem mosch.

Y 4

incidit in delirium, vel potius ebrietatem, sed post imperatam quietem & somnum copiosum, repellentibus capiti admotis conualuit.

Idē Lob. Masculas ad affectus vetriculi & capitis commodiores & aptiores ait: de qua re paulo ante vires iudicium nostrum diximus. Praefert tamen posset, ut rationibus, quas modò ex Rondel. attulimus: quia mares seie vetustiores esse consueverunt in nostris officinis; si modò habeantur.

*Experimen-
tum ad-
miris Co-
licum à
flatus en-
aqua fru-
para.*

In mea iuuentute, quum ego L. Bauhin. pedes Florentia redirem, & in Apenninis montibus frigidam audiùs bibillem, subito incidi in insignes ventris dolores, flatibus in teroto vexantibus, accedente tumore, sine tamen vlla hernia praecedente aut subsequente. Cum existimarem me in monte pro doloribus periturum, itineris locus, insignis nunc medicus Ill. mei Principis, Duci Wirt. &c. Oluaidus Gabelkauer amicè obtulit Nuces moschatas, quas secum habebat. Deuoratis 4. subito per D. G. & hoc remedio liberatus fui à doloribus, atque iter perfecti sospes & incolumis: quod perpetuè gratitudinis ergò, & in grauiam aliorum qui in idem periculum incidere possent, hic à nobis referri par fuit.

*Adulteri-
um*

Sciendum denique Antuerpià, & ex aliis locis adferri ab intitoribus oleum Nucis moschatæ, quod interdum adulteratum. Adulteran potest adultera cera. Fucus deprehenditur à peritis masticatione, qua cera se dentibus prodit, & gustu languidiore minùsque acri. Odor enim etiam adulterati, vix remittit, ut dignoscatur eo solo queat. Praestatque vis recenter expresso, quale nos parari curamus in vltus quotidianos.

*Vis depre-
hendat fa-
cum.*

DE MACI ARABVM, SEV CORTICE AROMATICO NVCS moschatæ.

Placet de Maci seorsim agere, tum ob nobilitatem vtilitatemque eius priuatam: tum ne mixta tractatio Lectori pariat confusionem: quamuis in praecedentibus iam satis constet, quid sit Macis. De eo autem sic scribit Serapio. *Bisbese*, id est Macis. Haec Eben, *Amran* est cortex Nucis moschatæ, qui est supra crassum corticem alium. Praefertur qui sit coloris fusci: deterior est niger. Crassioris corticis nulla vtilitas, sed fructus, qui in Oriente vocatur Adaches. Macim dicunt aliqui esse corticem, qui non ex Graecorū regionibus apportatur. Color eius est flauus, estque naturæ crassa & admodum stiptica. Galen: Talisfar est cortex qui defertur ex India. Haec Serap. qui saltem in eo laudandus quod nihil tradat temerè ex se, nec confundat Macim cum Macere. Quod scribit. Dicunt aliqui quod Macis &c: (sic enim in impressis legitur) & quæ subiungit de Talisfar Gal. & de Machir Dioscor. ad Macim non pertinent, sed ad Macer. Recitat enim quæ Dioscor. & Gal. scripserunt de Macere.

Bisbese.

Delictus.

Talisfar.

*Serapio il-
lustratur.*

Macis, inquit Auic. est simile quiddam foliis geminis, duplicatis seu inuolutis siccis, vergens ad rubedinem & citrinum colorem, sicut cortex, & lignum & folia, mordicans linguam, sicut Cubebe. Filius Mesur testatur esse corticem Nucis moschatæ. Auicennam verò confundere Maceris vires cum viribus Macis, patebit postea ex viribus Maci attributis.

*Auic. nat.
Macer
Xyloma-
tis*

Hermolaus scribit: Macis Graecè *μακίς* & *μακίς*, cortex est rubens radice magnæ: Recentio-

res Macis non radice, sed Nucis odoratæ corticè, ac folliculum esse affirmant, idque verò propius est, & planè ita modò cernitur. Fallitur in eo Hermol. quod dicit Macis, Graecis *μακίς* &c: non enim idem sunt Macis Arabum, & *μακίς* Graecorum, quæ tamen errorem non animaduertisse Marcellum, (acris alioqui censor Hermolai) ex eius verbis apud Dioscor. lib. 1. cap. 100. patet. Ruell. Cornar. Cordus, Bacchanel. Had. lun. Manar. Brunfels. Brassauola, alique viri alioqui doctissimi, secuti sunt. Sic enim Ruell. De primo cortice quasi nucamento Nucem moschatam inuolvente, non conuenit inter autores antiquos & recentiores. Namque Mauritanæ factionis principes Macis nomine intelligunt. Macer cortex est rubens arboris magnæ. Recentiores non arboris, sed odoratæ Nucis corticem esse contendunt: nobis verò litè hanc dirimere non licet. Item alibi: *Macis*, ut alii *macer*, offic. *Macis*, Plin. Dioscor. Galeno cortex est arboris. Recentioribus odoratæ Nucis, idque verò propius. Iniuriam facit Ruell. citatis autoribus, quibus non Macis, sed *Macer*, cortex est arboris.

Nihil melius Cornar. Macis inquit, Dioscotidis profectò etiam hodie tum culinis tum Offic. notissima res est: sed non arboris corticem ipsi vidimus, sed Nucis odoratæ. Vulgus tamen nostrum, *Muscatenbluet* velut Nucis moschatæ florem appellat. Quare non ambigendum esse putat Corn. Macis appellatum officinis & barbaris idem esse cum Macere Graecorum & Plinii. Sed fallitur: sunt enim diuersa.

Miramur verò Cordum diligentissimum & naturæ peritissimum in hanc sententiam descendere ausum ut scriberet, conuenire inter omnes promodum doctos, *Macer*, corticosum illud aroma esse, à pharmacopolis Macis appellatum, ipsis Arabibus etiam id testantibus: qui in descriptione sui Macis Dioscor. caput de Macere allegant.

Nemo autem miretur cur Dioscor. suum *Macer* arboribus misceat, cum potius inter aromata de eo agere debuerit. Venia dignus est in hac Dioscor. cuius ætate res noua, nec penitus cognita fuit, Credebant tamen arboris corticem esse quæ propter ab eo inter arbores recensetur. Nostra verò ætate quid reuera sit cognoscere incepimus. Nam Arabes clarè scribunt corticem esse Nucis moschatæ. Item alibi: *Macis* seu ut Veteres vocat, *Macer*, nequaquam exterior ut hactenus nobis traditum est, sed medius Nucis moschatæ cortex. Vides ab eo manifestè confundi, cum tamen quid reuera sit, se scire sibi planè persuadeat. Sciuit nimirum quid esset Macis: non quid *Macer*. Ipse verò potius venia dignus, [non Dioscor.] qui Arabum scriptis, maxime Auic. deceptus, vnum & idem esse putauit, eaque propter de Dioscor. & Graecorum *Macer* non diligentius perquisiuit.

Ita Bacchanellus quoque idem peccatum committit in suis consiliis.

At audaciùs etiam Amatus: non approbo, inquit, illorum iudicium, qui *Macerem* à *Maci* Offic. diuersum esse statuunt, quum reuera Antiquorum *Macer*, *Macis* nostra sit. (Si diis placet.)

Monachi quoque in Meluen lata incedentes via: *Macis*, inquit, cortex Nucis Myristice: apud Diosc. autè, Gal. Paul. & Plin. *Macer*, seu *Macis*, seu *Macher* vocatur, ut patet ex Serap. & Auic. Arabicè etiam *Talisfar*, ut in Auic. & in Synonymis Rhafis, legimus *Macin* vocari.

Auic. 2. can. duo capitula habet de *Mace*: vnum nomine *Macis*, in quo Andreas Bellun. multa correxit: [sortè etiam corruptit] & alterum sub uulo

Ruell. nat.

*Cornar.
nat.*

*Cordus
nat.*

*Erroris
Cordi aliq.
runquo
canse.*

Talisfar.

Modelle
200.

**Herzogen
exhibition**

Gal. exen-
satur.

Cordas 1988.

At this time
the

Macis nom.
et. *Macis*.

Abstract

Synonyma
linguar.
Annusculi.
Bestabe.
Buckles.

Location:

Tempos de decisão

Delectus;

Vires &
Virus
Temperā
Temores.

*emera-
ma.
Alui flu-
xus.
Dysente-
ria.*

Hemicraneam. Confortat hepatis & stomachum: fluxum ventris cohibet, & Dysenteriae confert: prodest matri. *Hacille.* Sed quidam harum facultatum, praesertim posteriores sunt Maceris: ita ut appareat, vel ex hoc, quod etiam ante plus satis inculcatum, Auic. hoc cap. miscuisse vires Macis & Maceris.

*Tempera-
mentum.*

Macis membrana tenuis, rufa aut flava, interdum nigricans, aromatica, odore suavi, sapore subacri, & nimium amaro, tenuum partium, calida sicca tertio gradu, ventriculum roborat, coctionem iuvat. Succus expressus Gummi Hederae figura, quam ipsum Macis est valentius, autore Sylvio.

*Macis pra-
parat.
Nuce mos-
chata*

Macis verò ex sententia Scalig. ipsa Nuce moschata nobilior est. Si degustetur, linguam & fauces admodum vellicat: odorem iucundum profundit & leuissimum amarorem quadam cum siccitate relinquit. Quod facile ostendit Macis tantum calidi quantum sicca temperamenti concepisse, & fortasse plus calidis, quod pleraque eius essentia sit tenuium partium, quicquid dicat ex Paulo Auic. xqualem esse.

Auic. not.

Rectè itaque Matth. vol. neutiquam errare eos existimat, qui dicunt Macis odoratum exalface- re, & pariter siccate in fine secundi vel in principio tertii ordinis. Quamobrem Macer esse non potest, cum dicit Gal. constare Macerem essentia pleraque frigida, terrestris: paucula verò calida.

*Cordia
gale.
Ventricu-
lus
Nausea.*

Dod. Macis ad Cordis palpitationem facit, utilior ad omnes morbos frigidos quam ipsa Nux myrtica. Oleum è Macis expressum regioni ventriculi inductum, ei robur addit, nauseam & fluctuationes tollit, appetentiam excitat, & concoctionem adiuuat. Quod verò Dod. Macis sistere ait fluores muliebres, & facere ad Dysenteriam confultò omisit: nam in hac quidem non ausimus praescribere, veluti nec in illis si sanguine sint. Hic error pendet ex eo, quod vires maceris confunduntur cum viribus macis, calore, n. suo & acrimonia augetur fluorem muliebrem. In dysenteria etiam non conuenit, ea enim à bile & acrimonia sanguinis exoritur: in fluore albo pituitoso mulierum & diarrhaea & henteria pituitosa non improbanus.

*Vrina sup-
pressio.
Calculus.
Flatus.
Oleum
Macis.*

Lacuna quoque testatur, mirè roborare ventriculum, urinam prouocare, pellere calculum, & qualescunque flatus resolvere.

Podagra.

Fit in insula Banda ex Macis oleum admodum comendatum in nernorum affectibus & aliis frigidis morbis: Acofta. Hoc Welferit mercatores Augustani aduehant, quod fragrantissimum est, & podagram, mirabile dictu, pedi oblitum sanare Cronemburgius refert. Clus. quoque testatur vidisse se aliquando Vlyssipone oleum d: Macis ex India magnis fictilibus delatum, quod magno aestimabant, atque in ventriculi frigidis morbis plurimum commendabant. Id verò erat inspissatum, & saponis Gallici fere modo in tabellas vnciam propemodum densas, tres verò latas, totidemque aut amplius longas efformatum, pingues, subflauas, odoratas. Paludanus apud Linschoten notat, quod macis optimo remedio in-

*Ad Ventri-
culi fleg-
mas morbos*

firmitates stomachi sanat, digestionem promoueat, omnesque prauos humores consumat, ventositatibus expullis.



MACER DIOSCOR. ET GRÆCORVM.

CAP. XII.



EX praedictis liquet, quanta sit inter doctos dissensio de Macere & Maci, multis existimantibus esse vnum & idem. Quamobrem, quia contraria seu diuersa, iuxta se inuicem posita magis elucescunt, hoc loco de Macere agendum duximus.

Cùm ego Io. Raubini Lugduni medicinam facere, Antuerpiam misit insignis Pharmacopœus

Richardus Sermoise Insulanus corticem sibi ignotum ut dicebat, ex India aduectum, cuius nomen rescire exoptabat: id a. primus detexit singulari diligentia & in materiae medicae cognitione versatissimus, Valerandus Dourez Lugd. Pharmacopœus. Est autem cortex crassus admodum, crassior multò quam Guaiaci, lignosus, durus, dentibus tamen atteri potis, cuius proportio magnæ arboris esse corticem ostendit, exteriùs rubet: fractus interiùs ltrias ostendit pulchras, alias rubras, alias albas, alternantibus pectinibus sulcis siue rebenibus & cinereis, perinde ac si laminis aliquibus constaret: gustu primum dulci, dein manifestè adstringente. Hunc corticem, ante annos triginta, qualem scripsi Macerem Græcorum, collatis eorum descriptionibus, esse iudicavi, nec haudenus inuenimus, quod melius respondeat.

Reliquam historiam pertexet Cristoph. Acofta in hunc modum. Maceris arbor vasta est & multis ramis prædita, Vlmò multò maior, cuius folia in longitudinem sex aut septem vncias longa sunt, duas lata, exteriore parte dilutius virentia, interiore saturata. Ea non alium florem, non alium fructum habere creditur, præter semen quoddam, denarii magnitudine, tenue, cordis effigie, colore flauo, sapore verò Amygdalæ aut nuclei Persicorū malorum, tenui & candida membrana testu: quod vesica quadam ex tenuissimis duabus simul iunctis & transparentibus membranis constante includitur. Ea autem vesica in medio folio nascitur, aliis magnitudine non dissimili, sed cuspidè obtusiore, & circa pediculum angustiore, colore medio inter rubrum & fulvum, inæquali & multis fibris à pediculo ad extremitatem recta linea ductis, crispo & rugoso, haud absimilis illi, quem Vlmò nascitur, paulò tamen est planior. Succo lacteo prædita est hæc arbor uti Morus, radicisque habet llici persimiles, magnas, crassas, in latum & profundum diffusas, & cortice testas crasso, aspero, scabro, duròque, cinereo foris colore, interiùs albo & lacteo, succo pregnante dum recens est, flavescente autem dum sicca est, & admodum adstringente. Et licet succus ille cum ad-

*Descriptio
corticis.*

*Arboris
scripta.*

Folia.

*Semen su-
ma cordis.*

*Succus lac-
teus
Radix.*

- chin, ne dubitaret, quin hic cortex Auic. Macer esset. Macis & Maceris differentiam Auic. probè fuisse cognitam: quippe qui Macem odoratæ Nucis inuoluerum cap. 456. & Macerem radicis corticem cap. 695. sub titulo Talisfar descripserit. Neque ignotam etiam Serapioni, qui ex auctoritate Isaac, Macem esse Nucis odoratæ operimentum dixit: Macerem esse ligni corticem.
- Talisfar.** Hinc patet Monachos suam oscitantiam satis prodere, quando aiunt Macim & Macerem non differre.
- Monach. error.** Hist. Lugd. de ea binis locis tractat: Primo sub titulo, *Monach. Arbor foliis cordis effigie*. Secundo sub tit. *Macer Acostræ*.
- Hist. Lugd. mor.** De Xylomacere nihil habemus, quod dicamus, solum nomen apud Neotericos nostros, ut Hermod. Ruell. Curtum &c. inuenimus. Apud Antiquos nihil hætenus. Crediderimus ab eis fictum occasione verborum Plinii superius citatorum. Meliora tamen docentes perlibenter audiemus.
- Xyloma. acc.** Macer, teste Cronenburgio ex India conuehitur ut Plin. & Gal. dixerunt, non ex Barbaria ut Diosc. quare rationali coniectura in eo Scriptore suppositum hoc cap. Marcellus denunciavit sed Matthiol. hanc difficultatem explicare conatus: hoc modo scribens haud ignorandum est, nec Galeno nec Plinio, quod dixerunt ex India aduehi Macerem Dioscoridem repugnare, qui ex Barbaria adferri dicit: quoniam [ut Ptolomæus est auctor] quedam in Indo fluuio insula, vel vrbs sit, est, quæ Barbaria dicitur, ex qua faciliè comportabatur Macer: vel quod afferretur ex Arabia eo manus sinu, qui à Barbaria insula Barbaricus appellatur: Quandoquidem, [ut inquit Strabo] omnia quæ in India proueniunt, ea scilicet parte, quæ ad Austrum vergit, similiter in Arabia nascuntur. Acostræ perhibet, Maceris arborem nasci quibusdam Orientalibus insulis, præsertim verò in Provincia Malabar, in insulis S. Crucis regni Cochinchinæ, tum in ripis fluminis Mangate & apud Granganor.
- Locus.** Macer, autore Dioscor. bibitur ad sputum sanguinis & Dysenterias & alui fluxus. Gal. videtur ex multa constare essentia: pleraque terrena frigida, paucula verò calida, & tenuium partium. Quamobrem desiccat valenter & proinde Celiacis, & Dysentericis miscetur facultatibus, in tertio exiccantium consistens ordine, in caloris frigorisque differentia neutrum insigniter efficiens. Hæc. 7. simpl. At in lib. qui ei tribuitur de opt. secta Empir. sic ait: Finge à me Macerem nunquā expertum esse, qui arboris cortex est ab Arabia delatus. Hunc omnes quicumque de medica materia scripserunt alium constipare affirmant: nunquid illis credendum erit, vel non credendum? ego quidem credendum assero, cum omnes ita esse conueniant. Talisfar apud Auic. Indicus est cortex, adstringens cum acrimonia, nonnihil odoratus, in quo est substantia terrea plurima & subtilis. Nulla in eo nec caliditas nec frigiditas est: fatu digna & Gal. memorata. Sunt tamen qui calidum & siccum faciunt in secundo gradu. Adstringit & potenter siccatur, & resolut, nam ex mixtis constat substantiis, sed terrea præualeat. Consent. Diatribæ, Dysentericæ, mensibus immodicis hæmorrhoidum nimio fluxui atque tenesmo. Hæc Auic. Verum quod ante non uimus, ex viribus Talisfar ab Auic. hic traditis, apparet de Macere hic propriè agi, quomodo & separat à Maci, licet male huic quoque illius tribuat vires, ut patet ex cap. præcedenti.
- Diatribe.** Paulus catapotia ex Macere ad Dysenteriam
- Quæstio.**

admiranda prædicat. Videtur autem ex eo solo parata intelligere, cum aliquo liquore conuenienti, nam nihil præterea addit. Reinerus Comitissæ præscribit ad compescendum fluxum sanguinis uterinum, ac dicit Lusitanos in acido lacte ad Dysenterias uti. Radicis cortice recente, ut tradit Acostræ, trito, & cum oxygala seu lacte acido mixto, omnis generis Dysenterias & alui profluvia mirabili successu curant omnes medici cum Brachmanes tum Canarini & Malabarici. Aliqui huius corticis sicci & in puluerem redacti semunciam per noctem macerant in quatuor vnciis feri lactis, cumque bis in die propinant manè & vespere, deinde medicamento sumpto, oryzam sine sale & butyro coctam, atque pullos gallinæos coctos, inaceratos & tritos in Oryzæ decoctione statim agro exhibent: interdum si necessitas urgeat, Opium admiscunt, roborandi medicamenti causa.

Solent verò etiam Arabes cuiusque generis alui profluvia Opio, Nuce moschata admixta curare. Huius item radicis usus salutaris creditur, ad vomitus compescendos & ventriculum roborandum cum aqua Menthe & Mastiches puluere.

Brachmanes quidam Medicus rogatus de huius corticis, quem Macre vocant, facultatibus in hæc verba respondit. Si vos Lusitani hunc corticem probè nossetis, multò pluris ipsum faceretis, quàm Piper: sed quoniam isthic in Lusitania eius facultates ignoratis, idcirco contemnitis. Puluis quem in omnis generis alui profluvia ex oxygala propinare soleo, ex hoc cortice de quo percunctaris, conflatus est. Rhizotomus quidam isthic mihi allerebat, istius corticis apud ipsos usum esse in compescendis vomitibus, aluique profluiis sistendis, plûsq; pallere huius radicis portionculam, quàm magnam quantitatem Myrobalanorum aut Arceæ, eamque præstantiorem esse Coru Malabarico.

Referebant præterea Macre fructum omnis generis lumbricos in humano corpore natos necare & expellere, & calculum in renibus frangere: tum etiam eos qui singulis diebus manè eo uterentur, liberos fore à calculo & à coli doloribus neque, inebriari posse.

Monardes quoque scribit suum corticem magnè esse apud Indos æstimatione, ut qui eo utantur aduersus omnis generis alui profluvia, huius pulueris drachmæ pondere, aut paulò ampliùs manè propinantes ex aqua conueniente, aut crasso vinotubro. Ter aut quater id remedium repetitur, obseruatũque in reliquis victus ratio, quæ huiusmodi morbo necessaria est. Eiusdem corticis fragmento donatus sum auctor paucos dies, cuius periculum iam bis feci in alui profluvio inueteratus magno successu.

NXX AROMATICA FEMINA

CAP. XIII.

Ubet hic Nucum Aromaticorum. descriptiones ex Clusii exoticis subicere Nucis Myristicæ inquit, vulgò appellatæ, quam feminam consent, & quæ apud nos frequenter in usu, historiam satis persundiorè tradidisse mihi videtur Garcias ab Orta cap. de Maci: nec qui hunc per omnia imitatus, Christophorus à Costa de Nuce moschata, multò plura attulit. Horum commentaria ante multos annos in Epitomen contrahendam & Latina faciebam, addiis etiam in ea scholiis, & interdum

interdum nonnullis figuris, certe in scholio ad caput de Maci Garciz, Nucis integre per mediū sectæ iconem, eiusdem insuper suo illo crasso operimento liberata, ut Macis facilius conspicere posset, dabam. Quia verò anno 1600. ex insula Banda, in qua sola nasci perhibet, à Batavis recenter allatas conspicebam muria conditas cum suis tenebris ramulis



In Banda insula sola nascitur. Nucis condita.

et foliis, illius descriptionem paulò accuratorem dare conabor, quæ in hunc primum Exoticorum librum inferatur, & ipsius Nucis integre cum suo ramulo & foliis expressam figuram aduciendam existimabam. Referentibus porro diis qui in Banda insula fuerant, arbor quæ Nucem myristicam fert, magnâ copia istuc spontè nascitur, & excelsa est, Pyro haud minor, perpetuè virens, & frequentibus ramis prædita, quos teneriores videlicet & virentes, alternatim, non ex aduerso, sed inæquali serie ambiunt folia, Laurinis prorsus similia, minustamen duras, & paulò interdum latiora, siue, ut verius comparem, Mali Arantii foliis propiora, ademptis appendicibus, breuique pediculo tentia, in ambitu non serrata, sed vixit quibusdam à medio nervo in latera excurrentibus insignita: fructus satis crassus est, mali Perfici magnitudine, orbicularis, nisi supernâ parte pediculo proximâ aliquantulum turbatus esset: breui autem pediculo inter folia ramo non inhaeret, ut Matthioli & plerique alii exhibent, sed ex tenuioribus extremis ramulis oblongiusculo crassiusculoque pediculo subnixus, pendet, singularis ut plurimum, quemadmodum ab ipsis Indis, quos Hollandi ex Iava Amstelredamum anno nonagesimo septimo supra millesimum & quingentesimum aduxerant, deinde ab ipsis Hollandis triennio post ex Iava, ut dixi, reduci bus intelligebam, tum ex ipsis nucibus, suis ramulis qui folia adhuc retinebant inhaerentibus, muria conditis, ab Hollandis eo anno relatis, deprehendebam: interdum tamen binas etiam nucas coniunctim nasci, se observasse mihi asserbat Cheturgus, qui Hollandis in ea profectione comes fuerat. Constat autem is fructus denso operimento, quod veluti sulci cuiusdam, illum in binas æquales partes diidentis, formâ præditum est, eaque etiam parte maturum dehiscit, Macis sub ipso latentem & nucis corticem retis instar ambientem ostendens, adeo ut rubentem & elegantem initio, ut admirationem pariat, sed aëri expositus, paulatim illam elegantiam amittit, & flavescentem colorem tandem contrahit. Ex recenti autem oleum extraxerat D. Lambertus Hortensius Medicus dum in Banda erat, rubens admodum, liquidum, & magni ad pleraque vires, præsertim verò ad roborandum ventriculum.

Audio in eius Insula montanis illam etiam arborem nasci, sed fructum vix maturitatem conse-

Tom. I.

qui: eam ob causam illius nucem negligi, cum adseruari nequeat, sed breui teredinem sentiat & duntaxat legi, ut Macis adimatur: quæ verò ad nos advehuntur nucas, earum esse arborum, quæ in planis & cultioribus locis nascuntur.

Macis.

NUX AROMATICA.

CAP. XIV.



Quia nemo hæcenus (quod equidem sciam) dicit Clusii myristicæ nucis oblongioris, quam marem cent. ut. historiâ tradidit (nisi eam designare videtur Christ. à Costa, quum scribit grandiores nucas maioris esse præti apud incolas, & pluris æstimari quàm apud nos) non inutilem operam me sumpturum arbitratus sum, si eius brevem historiâ,

qualem videlicet ex ramo sicco sua folia & fructum retinente, donato Cl. V. Petro Pauvuo, concinnare potui, hic subicerem, atque ipsius etiam effigiem Lectoris oculis proponerem. Erat porro is ramus sesquipedalis longitudinis, crassitudinem autem habens tubi pennæ anserinæ, quo ad scribendum uti solemus, retinens adhuc aliquam ligni præcedente anno nati partem, cineracei coloris cortice testam, superna autem quæ illo anno quo ramus abruptus nara erat pars, tenerior erat, & multâ medullâ inter anâ parte prædita, coloremque habebat ex fusco rufescentem, huic ramo inæquali serie adnata erant septena aut octona folia, longè sanè maiora & crassiore pediculo prædita, quàm illius quæ nucem mofcatam vulgò notam refert: etenim illi folia sunt Mali Aurantiz foliis non absimilia, exceptâ illâ appendice, qua Nucis folia carent, & tenuiora pediculo nituntur, gracilioribusque etiam ramulis adnascuntur: hæc verò folia, licet non multò densiora, interdum pedis Romani longitudinem æquabant, trium aut amplius unciarum latitudinem, magnâ autem ex parte, eorum longitudo septem aut octo unciarum erat, latitudo duarum cum semisse, color parte prona canescens, supina viridis & splendens: à medio illo crassoque nervo folium per longitudinem medium secante, exoriebantur alii minores tenuioresque nervi, ad folii latera expansi, utrinque quatuordecim aut quindecim, nonnunquam etiam plures, iique non pro folii amplitudine, sed indifferenter: nam in pedalis longitudinis foliis interdum tredecim aut quatuordecim duntaxat observabam, in iis verò quæ septem uncias solummodò erant longa, quindecim, sexdecim, aut plures: tenues præterea, & vix conspicuæ ob folii spissitudinem, oblique venulæ per nervorum lateralium interstitia grant sparsæ, & licet ante multos menses abruptus fuisset ille ramus, atque inter chartas adser-

Rami descriptio.

Cortex.

Folia.

Mali Aurantiz.

Color foliorum.

Sapor & odor.

Z

Nucis.

natis, non mediocrem tamen acrimoniam, sed suauem & non valde vrentem retinebant folia: Summo autem rami fastigio inhaerebant binae Nuclei crasso breuique pediculo innixae, in quo tamē binae aut tertiae aliae coniunctim creuissile videbantur, quā adhuc apparebant vestigia vbi adhuc essent, atque etiam in ipso rami fastigio binae aliae similia pediculorum loca: ut non sine causa Abdala Guzaratenfis, qui prima illa Batauorum in laua navigatione Amstelredamum aduectus fuerat, deinde secunda reuectus, mihi affirmaret Nucleum Myristicam ab illo enim percontabar an singulae nukes in fastigiorum alis nascerentur quemadmodum pinguis Matthioli [Ingländis] modo prouenire, vide licet singulares interdum, binas, ternas, aut plures nonnunquam, & coniunctim in eodem crasso pediculo natas, de hac nimirum nucleum mare ipsum voluisse dicere arbitror, quoniam illam quae nobis in usu, aliter prouenire certum est. Ceterum haec nukes binas vncias longe erant, summoque suo operimento teste valde rugoso, nec illo quidem valde crasso (quia ante earum maturitatem ramus abruptus) & villum suum Amygdalarum instar repente, ferruginei hoc est ex rufo fulci coloris, in binas aequales partes fissa & hians, nucleumque ostendente suo maci eam reuolutam amplectente septari, cui similem e suo operimento exemptam, suo tamen Maci operam, ab eodem C. L. V. Paauio acceptam, in seniore tabellae parte, in qua huius nucis ramus cum suo fructu immaturo expressus, adnecurabam: Macis autem illud, etiam reliccatum, elegantioris coloris quidem est eo quod aliam nucleum ambit, sed multo infirmitatibus viribus praeditum esse creditur.

Adrich.

Nucis.

Villum A. mygd.

Macis.

ADMIRABILIS FRUCTVS INDVS.

CAP. XV.

Descriptio



Officulum.

tudine continebatur, foris fusca, & fungosa quadam materia oblitus, durus, ut qui reliccat, interne albus & corneus duritiei: membranacea illa folia, multis venis erant distincta, & rhomboidis formae, atque vnicalem longitudinem & latitudinem habebant. Nullum eius nomen indicare poterant Indi ab Hollandis aduerti, quemadmodum multarum aliarum rerum: sed quaecumque ignorabant (ignorabant autem plurima, ut qui omnes vilia mancipia fuissent, praeter Abdalam, quem in laua mercede conducebant, inter-

rogati qui vocarentur Madagascari responderebant, tanquam inuere volentes, apud ipsos non nata, sed à Magascar, siue D. Laurentii insula, esse delata, quia naucleros Hollandos in ea aliquot dies haesisse non ignorabant, imò illorum natum nimum inde aduectus fuerat.

DE CORYLO ET AVELLANIS.

CAP. XVI.

Corylus sativa.

Variis operimenti modus ut ante indicatum, aliter enim nux luglans, nux Myristica ali-

Descriptio



ter, & aliter Auellana ex Corylo producta, folio Alni, sed *Polium*; acutiore, nec eū in modum viscido, hirsuto, modicè serrato, rugoso, suauiter odorato. Flos *Flor.* ē gēmula erumpit coccineis filamentis compositus: simulque Iuli longi, tenuiores quam Nucis luglandis qui priusquam decidunt, flauifunt. Fructus simul aliquot iun. *Fructus* & i, inuolucris callosis, succosis,

herbaceis, barbatis, hirsutus, adstringentibus & acidis oblectu, magnitudine dimidio minores v. plurimum luglande, oblongi vel globosi, putamine vmbilicato per maturitatem flauesc. aut rufi, leui, lignosi ac duro latius: cui subest pellicula in domesticis quibusdam coccinea, in aliis subrufa, nucleum obuestiens albidum, firmiusculum sicut Amygdali nucleus, eiusdemque sapore dulci, lacteum remittentem succum. In auellanis nucleis, antequam nucleus formetur aut perficiatur, ambiens pulpa est candicans, fungosa, saporis acidi. Ipsi vero nuclei plurimum obnoxii sunt vermiculis, qui deficiente intus ac omni consumpto aut in nigrum puluisculum redacto nutrimento, ipsum etiam putamen percutiunt & prorepunt. Ipsa Corylus arbor est, ex radice crassa late se diffundente nodosa atque crispā, caudices magna ex parte aliquot emittens, in multos ac robustos subdiuisos stolonos virgalesque lentas & obsequiosas, quales quotannis emittit nouas, nec ramosas: materie candida, molli. Caudex vbi annosus fuerit, cortice obducitur incano, & Viscum nonnunquam producit, teste Trago.

Nucleo

Arbor ipsa

Theophrastus in Coryli seu Nucis Auellanae historia haud brevis nec sterilis esse videtur, qui eius in quamplurimis locis & *Europae*, & *Asiae* nomine menisse videtur, quamvis circa interpretationes non consentiant auctores. Ergo eius de ea dogmata collecta, considerataeque in lectoris Botanici grauiam hic referemus: sic igitur ait.

Corylus seu ut Graecum habet *κorymbos* (inconsideratē hic quis Nucem auellanam vertat, Const.)

Theophr.
Coryli loci
emend. illi
loft.

Const.) (nam & huius quoque natura sylvestris est) quoniam sylvestris, nihilominus, aut certe non modo deterius quam urbana fructificat, hyemes quascunque ferre potest, moribusque magna ex parte prouenit, & quidem fecundissima temporaria uertutis promotione. Præterea non caudicosa, sed fruticosa potius, virgis siue alis enodibus, sed paruis, etiamque crassis nonnullis assurgit. Cæterum & mansuescere potest. Differt tamen hæc ab illa, quod fructum meliorem, foliumque maius habeat. Circumferratam solum ambabus, simillimum Alno, sed latius, & arbor ipsa maior est. Fecundior & assidue reddetur, si virga præcidantur. Vtriusque duplex genus: quædam enim rotundam, quædam oblongam ferunt nucem. Candidiores verò fructus satius, & pulchrior, & circa aquatica maximè fructifera est.

Sylvestres translatæ mansuescunt, corticem exterimum habent tenuem, pinguem, maculis albidis peculiariter variatum. Materies admodum lenta, ut prægraciles virga, decorticatæ, crassæ, deorsum renouentur. Habent medullam tenuem, flauam, quæ concuantur. In Corylo [αμυγδαλίνη] postquam deciderit fructus, bryodes quiddam [vulg. habent βαρυώδεις, sicque & Gaza & Dal. legit: nobis melius placet βαρυώδεις cum Const. & rei accommodatius] vermes maioris magnitudine, ex vno petiglo plura (αμυγδαλίνη δὲ: vulgata πύδης, pingue.) nascitur id est, lulos nonnulli vocant. (perperam lulum apud Gazam) constant hi ex minutissimis particulis squammatim digestis eodem ordine, quo in Nucibus Pineis (οὐρεὶς καὶ τῆς πίνης) conspiciuntur, ut non ab similibus sit Nuci Pineæ nouellæ ac viridi, nisi esset oblongior, & ubique æqualiter crassus. Hyeme augetur: ineunte Vere dehiscit. Squammatæ illæ flauæ fiunt, & ad trium digitorum longitudinem inuolant. Vere autem erumpentibus foliis decidunt, ac tum totidem calyculacea tegumenta gignuntur, compactim iuncta, in vno pediculo, quæ & flores, horumque singulis singule nuce [αμύγδαλα] nascuntur.

Idem quod modo lulum dixit, pauld antè, & eodem quidem cap. αμύγδαλον, Cochryn appellauit (Gaza Argentum reddit) quam & Abietum, & Pino, & Ribori, Tiliæ, καύκη (Nuci Iuglandi Gaz) Diosbalano, (Castanea, Gaza) & Picæ tribuit.

A latere (pergit Theophr.) germinant & Nux Persica, & Corylus, (αμυγδαλίνη καὶ ἡ ἑλὴς ἡρακλειώτατη) & quædam alia, quarum omnium germina in vnum solum sinuntur. Idæi Prunum & Nucem Auellanam (ἡρακλειώτατη) altissimam radicem habere dicunt, sed Corylum (αμυγδαλίνη) tenuem atque robustam, Prunum numerosam. Quæ ratio & quasi necessitas cogat, ut ambæ diutius viuunt, aut diutius moriantur. (αμυγδαλίνη δὲ.) Quidam αμυγδαλίνη καύκη (Nucem Auellanam Gaza) & αμυγδαλίνη καύκη existimant: alii nullam earum, sed αμύγδαλον (villum vertit Gaza, relictus è Græco lulum retinuisse) καύκη Nucis. Apud Quercus &c. grossis præciduis (αμυγδαλίνης γένους papillis præuiis fortè rectius dicat) proportionem respondere existimant. Mature germinat καύκη, (Nux Iuglandi Gaz.) eademque fructum reddit autumno. Scalig. in annot. ad Theophr. Considerabis, inquit, quo consilio Nucem Iuglandem inter feras connumeret Theophr. Quid si intelligat Theophr. Corylum? Coniungit enim Alnum, ei simile: & egregie respondet locus. Nam in syluestribus utraque & montanis. Ut hac coniectura Scaligeri difficultati & suspitioni satisfactum iri non temere fortè quis iudicabit. Item αμυγδαλίνη, Betula, ὄλο Canis dictæ, præter

Tom. I.

quam pauld angustiore. Et Gaza quoque Caryæ teponit. Hinc Scal. Theodorus, inquit, refugit Iuglandis interpretationem: & est ratio. Non enim notis rebus addimus τὸ καύκη, τὴν αμυγδαλίνην. Nostro quidem iudicio malè vertisset Gaza, Iuglandis. Quid enim similitudinis Iuglandis folio cum Betula? Match. liberè faterur, sibi non compositum, quid apud Theophr. sit καύκη. Item καύκη (Nux Iuglandi Gaza.) & αμυγδαλίνη (Castanea, id.) frigoris cupida montanæque. Atqui Iuglandis non est frigoris cupida: nescimus etiam an verè ac propriè montana dici possit, quapropter hoc loco potius intelligimus Corylum. Item: Thimolus, Olympusque Mysius, καύκη (Nucem Gaza, legend. existimamus, καύκη) & αμυγδαλίνη (Castaneam Gaz.) plurimam ferunt: In Eubœa & circa Magnesium Euboicæ &c. καύκη rursus pro Corylo intelligimus, quam Alpinam dixit alibi ἡρακλειώτατη καύκη gignit solum. τὰ καύκη τὰ ἡρακλειώτατη (id est, Noces Auellana) maximè feruntur, quia Ligno putamine obiecta, eoque densa, sed amara tandem fiunt.

Adhuc ait. Fomites tametsi ex multis fieri possint, tamen optimi ex nucem: (ut Gaza vertit) celerimè namque & latissimè concipit. Quantum ex circumstantiis iudicare possumus, per αμύγδαλον hic intelligenda Corylus, cui lignum n. raru n. & quod facilius ignem sumpsit, quam lignum Iuglandis, quod durum & solidum. Hæcenus fere q. a Theophr. de Corylo & Nucem Auellana.

De eadem Plin. in hunc scribit modum. Cæteris (Caryis, dixerat enim de Iuglande) quicquid est, solidum est, ut in Auellanis ex ipso nucum genere, quas antea Abellinas patrio nomine vocabant. In Asiam Græciamque è Ponto venere, & idè Ponicæ nuce vocantur. Has quoque mollis protegit barba. Sed putamini nucleisque solida rotunditas inest. Ex & torrentur. Umbilicus illis intus in ventre medio. Idem tradit: Catonem Nucibus aduere Auellanas & Galbas Prænestinas, &c. Verùm apud Catonem legimus, Noces caluas, Auellanas, Prænestinas &c. In veteri glossario Calua nux, καύκη ἡρακλειώτατη. In eodem Albi: n. Noces, Prænestina. In Priapeis, Longæ nuce, Auellana: Nucemque longam, quam vocant Abellinam: Turneb. Calua nux, quæ fructum caluum fert, id est, summo apice nudum; nec vniueque putamine corticis obductum, qualis est Auellana. Turnebus è veteri codice legendum putat Abellanas. Idem & caluas Prænestinas ex dicto glossario, ut annotat Dalech. Idem Plin. Ferunt & Auellana lulos, inquit, compacti callo, ad nihil utiles. Et alibi Xylon barbata Nucleis similem deferre fructum tradit. Quia verò loco pauld antè adducto Abellinas seu Ponticas nuce, molli protegi barba scripsit, idè per barbaram nucem Auellanam quidam intelligunt vti postea patebit.

Coryli meminit & Colum. inter ea quibus nemora vestiuntur. Pallad. Auellana. Varg. Georg. Duras Corylos dicit:

Et Egl. 7.

Phyllis amat Corylos: illas dum Phyllis amat
Nec Myrtus vincet Corylos, nec Laureæ Phylli.
Arbor fragilis canente Ouid.

Et Coryli fragiles, &c.

Dioscor. καύκη ποντική, ἡ ἐν τῇ ἀμυγδαλίνη καύκη: Noces Ponticæ, quas aliqui Leptocarya vocant, id est minores nuce, ποντικὴ καύκη, ut & ἡρακλειώτατη, atque etiam αμυγδαλίνη. de hac nucem tandè meminit Athenæus: sed nucum Iuglandi Ponicæ

Scal.

Abellana.

Abellina.

Pontica nux.

Plin. locus
refert
Nux cal.
na.

Barbara
nux.

Coryli.
Arbor fragilis.
Noces Ponticæ.
Leptocarya.
Lepima.
Athen. Garg. capla.
en. Garg.
Ponicæ.

legit apud Plin. pro Caryopon, ut Dal. quoque obiter uisum. Sic autem ut Plin. In Syria gignitur & Cinnamum, quod Caryopon appellant. Hic est succus nuci expressus, multum à furculo veri cinnamini differens, vicinam tamen gratia. Pretium in libras asses quadraginta. Ut etiam Theophrasto clarius nucem nostram moschatam Plinius innuasse videatur. Nucem manifestè dicit Caryopon succum ei expressum: quod oleum dicere possis, etiamnum hodie lauioribus Pharmacopoeis, pro delicatioribus exprimi solent, quod mox in vnguentis obliuiscens congruit. Reliquæ quoque non repugnantiam & vicinam Cinnamo gratiam habet, & ab eo tamen plurimum differt. Massæus autor in hist. Ind. Ad Bandam ditionis Molucarum vicinas aliquot insulas totius orbis terrarum solas [quod constat] spontè, lauiiores in epulas & medicamenta mortalium, ex vna eademque arbore Nucem myristicam & Macis progignere. Arbor [addit] Plinius ad Pyn similitudinem accedit: fructus Mala Persica quadantenus imitatur: floret quo tempore ibidem alia quoque plantæ & herbæ variæ generis: è quibus vniuersis mirificus odor; incomparabilis cuiusdam suauitatis existit. Vbi defloruit maturefcens primum, paulatim è viridi, tum cæruleas luteasque, tum purpureas & igneas transit in maculas, quales in aru coacti: atque eo ipso tempore plures & aliaque eximie pulchritudinis ad gratissimum sibi palmum aduolantes augment oblectationem, cum folia & fructus & alites ipsæ variis colorum picturis in ceramen utque luxuriunt. Lud. Rom. Nucis Mosch. historiam sequentibus tradit: Muslicæ nucis caudex Persico caudici similis, ramos foliaque consimilia producit, verum nonnulla angustiora: priusquam nucs huiusmodi percoquant, sepius arborem malix florentis Rosæ instat: & ubi nux percoxerit, malix eam complectitur. Ex quibus sacè verbis apparet Ludouico Romano non bene cognitum fuisse Macis descendendi modum, quem malè vocat Macicen: non floret Rosæ instat, later enim sub pulpa: fortè olim Mathiolus ex Lud. Rom. descriptione curat concinnandam suam iconem. M. Fume in hist. gen. Ind. Gallicè conscripta Moschatam arborem similem Quercui facit, ferentem Nuces ut Glandes, aut more Dactylorum, quæ habeant Macis. Sed bonus ille vir de arbore sibi incognita, neque visa scribens adiecit quæ omnibus qui de ea tradunt, ignota sunt atque inaudita, ne dum visa, nempe Quercui similem esse. E contra, & rebus Maxim. I. Transylu. de Mollic. insulis. Nucis Myristicæ arborem proceram, amplamque esse dicit, eique, quæ Nucem luglandem ferat, admodum similem. Neque hanc Nucem aliter, quam luglandem produci, gemino protectam operimento, puluinati primum calycis, tunc hoc tenuem membranam, quæ reticulatim nucem amplectatur. Hanc nos Muscatæ florem, (inquit is,) Hispani Macis vocant. Alterum operimentum, ligneum esse putamen, ut Apellanæ, cui ipsa nux insit Muscata. *advers. aduocatur, ut in vna, ut in vna* quidam Græcè vocant: alii etiam *ut in vna, ut in vna*. Sed nunquid Dioscor. incognita fuit Nux moschata? Fuit: nihil enim de ea scripsit. Scribit quidem de Macere non de palliolo huius, seu cuticula foliacea, Macis dicto, à quo Macer haud parum diuersus. Auic. Ciauziban, Nux moschata. Serap. Iuzhane vel Inth que, id est Nux moschata. Item Bishefe, id est, Macis. Isaac Eben amram: Est cortex Nucis Muscatæ, qui est supra corticem crassum in-

utilem: fructus qui utilis, dominatur in Ojete Adaches. Hermol. Nux odorata, quam Græci modò Caryon myristicon appellant, hoc est, Nucem vnguentariam, quæ sanè diuersa à Glande vnguentaria. Moschocation, teste Ruell. à Græcis recentioribus dictum, Latinis occasionem dedit, ut eius imitatione Nucem moschatam narent: ea membranoso primum voluente calyce, foliato, fissili, mox lignoso. Mauritiz factio- nis principes Macis nomine extimam intelligunt membranam. Ex quibus Ruell. verbis facile patet ei crassiorem & exteriorem corticem carnei non fuisse cognitum. Nec intelligimus quid sibi velit his verbis, quando ait: Hippocrates Aegyptiæ Balani meminit. Sed multum à veritate mihi deficere videntur, qui Nucem odoratam, quam vulgò dicunt Moschatam, hac glande vnguentaria comprehendere putent, longè profecto differen- tem, Veteribus, ut existimo, prorsus incognitam. Aegyptia reliquarum modo ossa non habet in balanis. Alum & mentes sinit in vino aucto- ro, & vulnera agglutinat. *aduers. aduocatur, ut in vna, ut in vna* Actio, Veteribus ignotum, Syluio qui ait, historiam eius graphicè depingi à Ruellio. In margine: Nux moschata vulgò, etiam si moschum non oleat. At nobis non videtur graphicè descriptam à Ruellio, cui non cognitum fuit exterius corpus callosum, ut patet ex eius descriptione. Tagaultius quoque à veritate multum deficere tradit eos, qui Nucem odoratam, seu Muscatam vulgò sub Glande vnguentaria comprehendere putent. Nux Muscata, id est, ut scribit Cordus, fructus qui totus cum ad iustum peruenit incrementum, luglandis, viride carnosumque putamen habentis, magnitudine cernitur, triplici cortice nucleoque composi- tus: exterior cortex carnosus consistentia, cui sub- est tenuior, non continuus, Macis appellatur: eo detracto apparet tertius in fulco, purpureus, li- gnosus, intra se nucleum continens sabrosun- dum, oblongum, longitudine vnicalem. Sapo- rem habet & odorem tenuem, sicut acrem, in- cundum valde aromaticum & astringentem, qui Nux moschata vocatur: decorticatus ex India ad- fertur. Adferuntur etiam integri fructus, melle conditi, quos nuper experiri adulterare, eius sin- gulis nucleis, viridi luglandis putamine diuiso impositis, & rursus composito: qui delus facile deprehenditur mollitia, sapore, & quia diuisi erant commissuræ. Carnosus enim Moschata nu- cis cortex incundum habet saporem, solidioremque consistentiam: luglandis verò austeriorem & molliorem. Similiter quoque excipiuntur Li- monum & Chebulorum: [quos sic vocant] con- ditorum carne, sed hic delus commissuris depre- hendendus est, quoniam condita earum caro gustu fore nihil à Nuxis moschata carnosio putamine differt. Est & Moschata mascula, præcedenti similis, ma- ior tamen oblongiorque, figura atque magnitu- dine ferè ad vulgares Palmulas accedit, cuius pe- ricarpium quale sit, nondum nobis constat. Sa- porem habet subacrem, aliquantulum tendem & aromaticum. An Saleno Chrysobalanos, cuius meminit lib. de comp. med. loc. 8. cap. 3. in duobus pharmacis Asclepiadis stomachicis: ubi ait Chryso- balanos esse ex dissonantibus & corroboranti- bus. Item lib. 9. cap. 4. in medicam. Asclepiadis ad Coli affectus præscribitur Chrysobalanos. *aduers. aduocatur, ut in vna, ut in vna* Glans muscata, Bapt. Fierè in carnibus cænz. *aduers. aduocatur, ut in vna, ut in vna* quam pigmentari Moscatam appellant, Plinio de honesta volupt. Myristica Nux Scalig. Cornu. in Gal. lib. 5. de comp. med. cap. 1. Quæ hanc Nux muscata seu Muschata vocatur, non alterius

Nux odorata.
Caryon
myristicon
Moschata

Ruell.

Balani
Aegyptia.

Nux moschata.

Glans
Aegyptia.
Caryon
Aegyptia.
Sylu. ex
Ruell.

Nux moschata
Glandem
Pernici
Cordus de
serap.

Nux moschata
condita.

Adulterium

ut depre-
hendatur
fuerit.

Aliud a
dulcissimi.

Moschata
mascula.

Chrysoba-
lanos.

Glans
muscata.

inquit

Chryso-
balanus.
Cornu-
pustul.
Veteribus
ignotum
Nucem
moschat.

[inquit] generis quàm Myrobalanorum Græcorum censendam puto, & fortassis ea est, quæ Chrysobalanos eidem Gal. lib. 8. citati operis appellatur. Neque enim credere sustineo Veteribus ignotam fuisse, in tanta hodie frequentia. Nam quæ ab Arabibus Medicis ei adscribuntur vires, magna ex parte Dioscoridis auctoritate tribuit: verum est hæc in suo genere magis aromatica, & stomacho commodi, tum corroborans ac concoctionem iuvans, quod Dioscor. de Balano Myreplica negasse videtur: *ναυσταγος & ενιερως*, inquit. Ad olei certe ex ea expressionem reliquis generibus etiam accommodatior videtur. Succum autem ex Balano Myreplica expressum, olei vitæ in vnguentis prætiolis præbuisse Dioscor. lib. 4. testatur, & eum in aliis, tum in Amaratino ac Cinnamonino vnguento lib. 1. meminit, idem, velut Plin. quoque facit oleum Balaninum sæpè appellans. Nolo tamen hac parte in hac rerum obscuritate quicquam adseverantius adstruere. *Hæc Cinnam.*

Chryso-
balanus.

Idem Chry-
sobalanus
fuit Nucis
Myrs.

Matth. re-
f.

Aurea Ba-
lanus.

Matth. re-
f.

Comacum.
Cinnamom.
Caryopon.

At Matthiol. Hodie, inquit, ignorata videtur quæ *χρυσοβαλανος* Græcis vocatur, digerens & roborans Indicæ Nardi modo, ad Colicos aff. usus, ventriculi ardores & singultus à Gal. Asclepiadis autoritate commendata. Non desunt à Recentionibus, qui sibi persuadeant Chrysobalanum esse Nucem myristicam: eum tamen plura sint, quæ eorum destruunt sententiam, nempe cinereus color, acutus ori sapor, & quod Myristicæ nucis nusquam meminerint Veteres Græci. Nullam huiusce, quod legerim, mentionem fecit Gal. in libris simplicium medicamentorum: id quod argumento esse potest, Gal. ipsum non habuisse compertum, quid esset Chrysobalanus. Verum Matth. rationes nobis non satisfaciunt. Primum quidem certum est, nostram Nucem aromaticam esse cineritio colore: interea tamen nullus (quod equidem sciamus) meminit coloris Chrysobalani, nisi ab etymologia nominis sumatur. Verum quid si non à colore, sed à præstantia aurea Balanus dicatur? Vel quid si propter Macin aurea dicatur, quo fortè obducta visa fuerit ab Asclepiade? Secundò, quid impedit acutus ori sapor, cum dicat Gal. esse ex discutientibus. Tertio, quod Veteres nusquam Myristicæ nucis meminerint, nihil ad rem, nam etsi hoc nomine non meminerunt, non sequitur tamen non potuisse meminisse sub nomine Chrysobalani. Quarto, cuius quæso momenti hoc argumentum. Galenum de simpl. non meminisse Chrysobalani, propterea Galenum non habuisse compertum quid esset. Quin potius Galenum existimamus scivisse quid esset, cum dicat esse ex discutientibus & corroborantibus, quæ sanè in nuce nostra aromatica reperiuntur, & ad eadem nos nostra utamur, ad quæ Asclepiades sua Chrysobalano utebatur, ut videre est ex facultatibus Nucis moschatæ attributis. Ita nolimus adhuc Cornarii opinionem reliccere, existimantis Asclepiadi, Galeno, & Prisco aded illi ævo cognitam fuisse Nucem nostram aromaticam, donec firmiora argumenta audiamus. Nectamen eius sumus opinionis, Nucem moschatam eandem cum Balano Myreplica Dioscoridis. Matthiolum quoque lapsum in Myristica nuce Guilandinus ait: quodque Antiquis incompertam dicit non probat. Quid enim? [inquit] An eam Theophr. Comacum & Plinio Cinnamon Caryopon appellari evertet?

Sed audiamus ipsum Matth. de Myristica nucem scribentem. Sic autem tradit apud Diosc. Myristicæ nuce, quæ vulgò offic. ob odoris præstantiam

Tom. I.

Moschatæ quæ Moschatæ dicuntur: Hæc post foliorum germinationem florem statim emittunt, quem Macin Arabes vocant: panditur is sylvestrium Rosarum modo: & ubi maturitatem senserit, expansus eam circumplectitur. Suo Maci tanquam rete comprehensæ Venetiis in Officinis visuntur, duro putamine conclusæ.

Idem in post. com. Lat. & Ital. cum magnis figuris, mutata icone scribit: ut referant ii, qui Indica littora perlustrarunt, has proferunt arbores quædam nostratibus Persicis haud absimiles, angustioribus tamen foliis ac brevioribus. Fructus nostratibus Nucibus adhuc in arbore existentibus persimiles sunt. Siquidem primo crasso ac viridi cortice conteguntur, cui deinde subest Nux ipsa, duro satis putamine oclusa, nostrate tamen tenuiore, quo fracto Macis apparet, rubicundus, reticulæ instar nucleum circumvestiens: id quod palam faciunt Myristicæ nuce, quæ saccharo, aut siliquarum melle adseruatæ, integræ ex India ad nos convehuntur.

Ceterum miratur quid cogitarit Matth. quod scripserit olim, atque aded vnum scribere ausus sit, Macin esse florem Nucis moschatæ, ut etiam ex sua phantasia pinxit, & postea dicere, comprehendere tanquam rete, quod pictura etiam exprimit. Miraculosa profectò metamorphosis, nuper floris arboris, iam in fructus cortice: certè transfigurati, atque aded maior, quàm si Rosa Hierichontæ macerata se aperiat atque pandat die natalitio, Salvatori Christo dicato, vel parientibus mulieribus. Sed quid opus diu verbis ludere. Macin arboris florem esse, eius cerebelli figmentum est vnum ex innumeris aliis, atque aded veteratione ab eo factum, quod figuram ex sua descriptione imaginaria, [quod quidem attinet ad florem] pingendam curare fuerit ausus. Si Nuce moschatæ, quales in India integræ condiuntur & in Europam importantur vidisset aut diligenter considerasset, animadvertisset præter durum putamen & Macin reticulatam, aliud esse externum, crassum & carneum nucamentum seu putamen, seu callosum carnosumve corpus liccat appellare, quale ferè in Iuglande, Amygdalis, Persicis immaturis & similibus.

Dum verò in post. com. Lat. & Ital. priorem errorem emendare satagit, alio nouo & crassiore ingeminat. Nouam quippe figuram atque descriptionem excogitans, corticem appingit crassiorum, quem fatetur adesse, ut in Iuglandibus: verum Macin esse tradit sub cortice duriore, immediate supra ipsam Nucem moschatam vulgò dictam, idque apparere ait in Nucibus conditis ex India allatis, quod falsum: perinde sanè, ac si nos luscis existimasset. Proinde ex eo quoque constat, posteriorem figuram ab eo fuisse effictam: nec probè sibi visam aut cognitam æconomiam partium Nucis moschatæ.

In Hist. Germ. alium situm Macis meritò tradit: verum quid sibi voluit in descriptione hæc verba linde Holstgrunde: id est, cortex lignosus molli. In epitome quoque bene ab eo factum, quod situm Macis aliter, & ex ipsa aded natura, non suo ingenio declararit, nihilominus tamen in postrema, & reformata eius editione Macis dicitur flos: ut ipso aded Matth. reduiuv. sed melius edocto opus esse videatur, qui repetitam suam Cramben recoquat, atque aded digerat, quàm hætenus factum, melius.

Camer. apud Matthiolan hist. Germ. & Epitome reiecit iconem Matthiol. subrogata alia.

Nec impune nobis abeat Tabern. qui pro nu-

Vnde Matth.
chata &
da.

Fructus
nucis in
gl. similes.

Matthiol.

Matthiol.
ib. error.

Tabern. ed.

ce moschata deteridis etiam figmentum exhibet, quod una icone duas falsas Matthioli complectitur: qua postea icone de nouo nouissimam Matthioli editionem maculauit eius patronus: digno mehercule patella operculo.

Hist. Lugd.
not.

Hist. quoque Lugd. Confarcinator censura dignus qui assumpta Matthioli descriptione ac figura falsa, securè & oscitanter præterit, non animaduertens utriusque nomen: quod tamen ei facile fuisset, quippe qui ad manus habuerit libros Arom. Garcia, quem citat in margine.

Alter hist.
error.
Assumptum
not.

Eadem Hist. aliam præterea nouam, sed falsam quoque iconem ex Acoſta ostendat.

Faciliùs excusabimus Munsterum, qui vitiosam descriptionem atque figuram in sua Cosinogra. exhibet quem scimus in alieno foro hac in parte versatum: hoc tamen docet, in Insula Sumatra nasci eas.

Ench. Ros.
in not.
Curtius
not.

Falsam quoque iconem in suo Herbar. habet Euch. Roslin.

Curtius uno eodemque loco Macim bis describit, nec videtur eius extremum putamen carnosum cognouisse.

Lacuna
not.

Lacuna ex iis quoque est, qui tum Nucem moschatam tum Macim antiquis Græcis incognitam putant. Is quoque iconem falsam habet, diuersam à Matthioli icone: in eo tamen cum eius prior consentientem quòd externum crassum putamen non habeat, licet ipse scribat, deferri in Lusitaniam siue Portugalliam conditam magnitudine Persici siue Melocotonis, in eius medio tenuem esse corticem, vulgò Macis dictum, restis modo inuoluentem testam duram: mox tamen sui oblitus, contrarium dicit. Macim esse florem Nucis moschatæ.

Lonicer.
repreh.

Lonicerus eandem cum Lacunæ fictitiā iconem habet, & præterea perpetuam scribit Macim & Macerem corticem ambire Nucem Muscatam, quasi esset flos eius. Neque idem Macis & Macer, ut patebit postea.

Dolendum Cronemb. ita vanum & fabulosum ut cum aliis de peregrinis scribat à se nos visis: Cudit enim hic suam descriptionem ex falsa icone Matthioli, vel alius aluius. Si is vidisset Noces in arbore prouenientes, vel eas, quæ ex India cõditæ adferuntur, aliter descripsisset. Est enim supra Macim crassus cortex vel potius caro, & in Iuglandibus & Persicis, nec floret Rosæ instar, ut dictum.

Nuc My.
repreh.

Nec sapit Amato Nucem Moschatam Myristicam appellari, cuiusque nomine Hermolaum & Manardum, aliòsque doctores taxat, quasi minùs benè ita ab ipsis vocaretur, quòd istud nomen Glandi Vnguentariæ ex directo respondeat, quæ Græci βάλανον myristicæ sua voce appellant. Et sanè si rem suo pede metiri velimus, minùs propriè ita vocari comperiemus, quòd ea vox sit æquiuoca, & utrique vnguenti significatu atque respectu competat.

Corticis
sapor.

Sed quid Costa de ea, Indiarum ille explorator: nimirum Piro similem facit hanc Nucem, paulò rotundiorem, externum operimentum carnosum & durum aliquantulum, à Bandæ incolis ferè neglectum, nisi viridi cum sale & aceto velcerentur, quoniam grati & adstringentis gustus sit. Verùm eius iconem falsam esse, vel ad libitum factam, vel ex eo apparet, quòd ramum pingit cum Nuce aromatica Maci tantum obducta, sine extremo putamine, quæ formâ utique ramo non adhzret.

Cronembur. lib. 1. de Comp. med. Cornarium falli scribit, existimantem Chrysobalanon esse Ga-

leni, ut ex colore & sapore vulgaris Nucis moschatæ demonstrari queat. Sed cur non refutat eundem?

Garcias quoque vult Nucem moschatam cum suo Maci veteribus Græcis incognitam. Eos qui nostram Myristicam nucem Myristicam nucem Chrysobalanum Galeni esse volunt satis coniungi cum forma, tum colore & temperamento. Sed si formam Chrysobalani tam benè nouit, cur eam non docet: cæteris rationibus responsum prius, dum nobis res esset cum Matthioli.

Dod. Nucis moschatæ descriptionem paucissimis comprehendit. Primum, inquit, habet corticem viridem crassum: deinde pelliculam quæ Macis supra putamen lignosum, in quo Nux.

Nucis
mosch.
part.
181.

Assinem Ironde & fructu Persico, esse arborem Nucis Myristicæ, quam frequentem habent insula orientis è Moluccis, unà referrebat, (ut tradit Pen. & Lob.) qui attulerunt easdem Noces decerpas suis manibus amici, & triplici cortice protectas, quales conditæ prostant in offic. & posse nostro cælo assuescere negabant.

Iam Cæsalpinus, qui diuersas descriptiones opinionèque nouas habet, audiatur: Nux muscata ex Iululis ultra Gangem aduehitur, maior Auellana, minor Iuglande, rotunda: adfertur autem purgata à suis putaminibus: aliquæ tamen visæ cum suis corticibus, utpote immaturæ, quarum exterior tunica dissecta magis quàm Auellandarum calyx, colore rufio, aromatica, totam Nucem circumplectens: sub ea cortex ossæus continetur. Tradunt eius arborem Persico Malo similem: foliis paulò angustioribus: in incultis nasci, fructum ante maturitatem circumdare instar florentis Rosæ, quæ postea perfectam Nucem complectatur vndique.

Prior de
scriptis.

Incolas verò eius loci, quamprimum huiusmodi complexum viderint, certatum colligere. Alii distinctius referunt, arborem specie & folio Nuci Iuglandis similem: fructum completum magnitudine Mali Cotonei, externo cortice viridi & crasso, ut in Iuglande, qui Saccharo conditus gratus est gustui, & aromaticus. Sub hoc membranam tenuem contineri, quæ Macim [fortè leg. Nucem] circumdat, rubicundum & implicatum circumdorem corticem: intra hunc postremum Nucem muscatam contineri. Eius mentio repetitur apud quosdam ex Græcis recentioribus, Moschatarion, & Myristicam vocantes. Fortè Aetius eandem intellexit sub nomine Nucis Indicæ, quod recipit in suffimento muscato.

Iuglandis
folia.

Arabes optimè nouerunt, in medicinis expetentes & med ulla internam & externum corticem tenuem, quem Macim vocant: nam medius qui ossæus est, inutilis iudicatur. Si diuinare liceat in re ad eò ipsi Autoribus incomperata, quid obstabit si dicamus extremum Nucis muscatæ corticem apud Dioscor. vocatum fuisse *Narcaphurum* inter suffimèta odorata quod ex India corticosum aduehitur. Alterum autem eiusdem corticem crassius esse Macerem, qui ob substantiæ crassitiem acerbus sit, & minimum quid redolens: ideo inutilis iudicatur, Serapioni. Quasi putamine tantum iis temporibus afferrentur, Nuce in patria remanente: ea tamen ut pretiosa & valde peregrina oxosculabatur antiquitas. *Mastennus Cæsalp.*

Nuc Ind.
ca det.
Cæsalp. co.
iellura.

Cæterum fabulosam esse historiam priorem Cæsalp. de tunicis & flore satis superque demonstratum. Nam quando dicit, exteriorem tunicam totam Nucem circumplecti: circumnasci florentis Rosæ instar: postea cõplecti vndiq, falsasunt hæc omnia. Ut mirum sit tam magnū Botanicum atque Philosophum, etiam post alios Scriptores incon-

Narcaphu-
rum.

Macer.

Mali Co-
salpini or-
rures detu-
guntur.

Inconfutis commentatum de re, quæ diligenter considerationem optime merebatur. Sed, iniquies, ex aliorum relatione ista magna ex parte tradidit. Sed, inquam, eius fuerat, in tanto loco, & tam famosa Italia regione constitutum aliorum errores taxare, eos præsertim, qui iam ante ipsam fuerant detecti. Censuram & considerationem etiam merentur ista, quando dicit, viles cum suis corticibus immaturas esse: folia Iuglandi similia, nec addens Authorem, qui viderit: medium verò corticem ossium esse. Qualia sint folia, Persicæ, an Iuglandis, scemur nobis non. dum planè constare. Corticem exterium non esse *Narcaphthum*, satis demonstrant ea, quæ de eo dicit Acoſta, nempe serè neglectum corticem Nucis moscatæ: neque Garcias neque Acoſta aromaticam vim ei tribuit, ut fecit Casalp. Cortex ille alter siue putamen nihil habet, quod respondeat iis quæ Diosc. & Gal. de Macere scripsere. De Maci & Macere sublequentibus agemus capitibus: De Narcaphtho, suo loco.

Corticem
exterium
non esse
Narcaph-
thum Diosc.
Alicum
corticem non
esse. Macer.
Diosc.

Nux mos-
cata mas.

C. Bauh.
In quibus
Suis. diffi-
cat mas.

De Nuce moscata mascula dicta, vel maiore, quædam peculiaria habet C. Bauh. eam esse gustu adstringente, odore serè nullo, cariosam magis, minùs oleosam, affectibus ventriculi & capitis commodiorem. Verùm Nucem masculam hactenus non observauimus differre à vulgari adstringente, odore, carie & oleositate: nec etiam viribus: ex vetustate aliqua possit oriri varietas a vulgatis, præter magnitudinem & figuram quam habet: nam quia rariores, diutius adseruari solent, unde fit ut exoleſcant. Deinde si odore serè nullo sint, & cariosæ magis, non videmus quomodo ad prædictos affectus possint esse commo- diores. Verum quidem est, Rondeletium olim pro roborando ventriculo prætulisse eas Noces, in quibus minùs sit oleositas, sicciores & magis exuccas. M. hi sanè Bauhino, quæ multo oleo refertæ, ructus mouent.

Synonyma
linguar.

Nux moscata, *nux moscata*. Conſt. in Lex. quo authore, ipse viderit: nisi quia fortè eandem vocis vim existimaret quæ *moscata*, Arab. *mus- band*, ut quidam scribunt, id est, nux Baufensis, & *Brigar*: Germ. *Muscat nuß*. Belg. *Noot moscaer*. Gal. *Nux moscade*, ou *mugette*. Ital. *Nux moscade*. II sp. *Nuez de especia*, *nuez moscade*. Bohem. *Kulfa Muskatowe*. Persis arbor *Drach*. Turcis *Agache*. Vngar. *Zerechón dic*.

Locum.

Nascitur Myristicæ nux arbor in insula Banda. Inueniri etiam tradunt in Moluccis, sed non est fructifera, quemadmodum nec ea quæ in Zeilan prouenit. Garcias. Acoſta tradit in Moluccis humiles esse, & fructu pusillo nasci. In insula maris Indici, Banda dicta, abundant in syluis spontaneæ, ut scribit Lud. Romanus. Nux moscata mas ex India quoque ad nos importatur, non tamen copiosè, ut reliquæ, sed rarè, inter reliqua aromata, præsertim inter moscatas vulgatas.

Vfus.
& vires.
Tempera-
mentual.
Lentia.
Vfus.

Nux moscata, ut scribit Auic. calida & sicca est in fine secundi vsque ad tertium: stiptica est: confert lentiginibus & odorem oris bonum facit: confert panniculæ & visum acuit: corroborat hep- par, splenem ventriculūque, maximè verò eius officium constringit, prouocat, & confert difficultati vrinæ, & cum in oleis ponitur, confert doloribus, & similiter in peſſariis, & prohibet vomitum.

Difficultas
vrinæ.
Dolor.
Vomitum.

Serapio scribit: nucem moscatam Aben Mes- uaiio esse naturæ Caryophyllorum, calidam & sic- cam in tertio gradu.

Stomachus.
Hepar.

Ventrem & stomachum & iecur firmare tradit Acoſtus, cibi coctionem iuuare: longis iocinoris

Tom. I.

valetudinibus opitulari, sed pulmonibus officere. Singulæ collunt costæ, aut ad ignem defic- cata: fluxum ventris sanant, maximè si in vino rubro sumantur. Matrici viles sunt, renibus & vesicæ: ad difficultatem vrinæ, quæ à frigida cau- sa prouenit, & aliis multis morbis, tam virorum quam mulierum.

Singulæ.
Fluxus &
vrinæ.

Difficultas
vrinæ.

Calculum frangunt & pellunt, maximè si ma- cerata fuerint in oleo Amygd. dulcium, authore Dod. Verùm tam calculum frangere credimus, quàm cetera quæ dicuntur id præstare sine vlla certa ratione aut firma experientia. Cordus an- notat, Venetas mulierculas Nucem moscatam masculam contra difficiles partus assumere. Ple- risque existimatur nux moscata caput confortare præ aliis medicinis, id quod & Placot. testatur in lib. de euenda bona valetudine. Immaturam, at- que adeò integram nucem saccharo condunt Lusitani: nam præter odoris suauitatem, & sapo- ris gratiam, propter quæ expetitur, Indici Me- dici & Brachmanes multum illa vtuntur, in om- nibus frigidis cerebri morbis, Paralyſi, & aliis neruorum atque vteri affectibus. Maioris verò æstimationis sunt apud illos grandiores Noces, quàm apud nostros, teste Acoſta.

Dod. me.

Ad diffi-
partum.

Condita
saccharo.

Paralyſis.

Condita de
saccharo.

De iisdem conditis sic Amaris: Est Pomum quod non diu ex India ad nos saccharo confe- ctum deferri cœpit, magnitudine qua Pomum Persicum, rotundum, obscuris quibusdam lineis intersectum, nam color illi Persici quoque inesse videtur. Huius autem Pomi caro suauissima ac gustui gratissima est, & cordalis: & ea de causa eius libra quatuor venditur aureis ducatis.

Æstimatione

Nucis myristicæ dimidium, teste Cam. ex vino hauritum, facit ad citam respirationem. Longè re- ctius ad diuturnitatem conduntur vinæ, vna aut altera nucis myristicæ in dololum iniecta, quàm impuro sulphure.

Cura respi-
ratio.
Dolorum
correctio.

Ex recentibus prius confusis & in cacabo cale- factis prælo exprimitur oleum seu liquor oleagi- neus, qui refrigeratus Cera nouæ instar concre- ſcit, saturè flauum, fragrantissimum spirans odo- rem, frigidis morbis, potissimum neruorum ar- ticulorumque diuturnis doloribus à frigore exci- tatis vtilissimum, quin & Venereis inunctionibus maximè expetitur, ut tradit Matth. Datur ex ca- lido iusculo aduersus dolores Colicos, tormina, & cruciatus nephriticos.

Oleum ex-
pressum.

Datur.

Colica
Nephritis.

Ex iisdem quoque, sicut ex aliis aromatibus, destillatur oleum, Gummi arboris, quæ nucem myristicam fert, ut refert Camer. nonnunquam inter alia aromata à Lusitanis in Italiam impor- tata, reperitur, eximie fragranti odore præditum, si accendatur: pulchrè autem rubet, cuiusmodi se portiunculam habere testatur.

Oleum de
stillatum
Gummi.

Cl. Medicus Bapt. Montanus scribit sæpius se huius præclaras, expertum esse vires in imbecil- litate membrorum corrigenda, potissimum verò articulorum, & podagra. Myristicum oleum vnguinosum, [ex sententia Lob. lib. de Balsamo] laxando & inquinando nec quicquam vulneri- bus glutinandis Balsamo simile habet, nec stoma- chi vires colligendo idoneum est. Quamobrem Rondeletius in cordis & ventriculi corroboran- tibus medicamentis immaturas, siccas, leues, au- steras, aliquantulum cariosas, adstringentes nu- ces moschatas ponderosis, maturis, vnguinosi- præferebat, coquis, culinariis blandimentis com- mittens pingues aut præpingues. In Anglia vo- catus ad generosam matronam prægnantem, quæ cum summo desiderio auide duodecim nuces moschatas tanquam panem manducaſſet, in-

Imbecilli-
tas membrorum
Podagra.

Ventricu-
lus.

Delirium
ab esu nu-
cum mosch.

Y 4

incidit in delirium, vel potius ebrietatem, sed post imperatam quietem & somnum copiosum, repellentibus capiti ad motus conualuit.

Idē Lob. Masculas ad affectus vetriculi & capitis commodiores & aptiores ait: de qua re paulo ante vires iudicium nostrum diximus. Praefert tamen posset, iis rationibus, quas modò ex Rondel. attulimus: quia mares seie vetustiores esse consueverunt in nostris officinis, si modò habeantur.

*Experimen-
tum ad
verius Ca-
licam &
floribus en-
aque fru-
gum.*

In mea iuuentute, quum ego L. Bauhin. pedes Florentia rediret, & in Apenninis montibus frigidam audiuis bibissem, subito incidi in insignes ventris dolores, flatibus in scroto vexantibus, accedente tumore, sine tamen vlla hernia precedēte aut subsequente. Cum existimarem me in monte pro doloribus periturum, itineris socius, insignis nunc medicus Ill. mci Principis, Ducis Wirt. &c. Oualdus Gabelkauer amicè obtulit Nuces moschatas, quas secum habebat. Deuoratis 4. sub. tō per D. G. & hoc remedio liberatus fui à doloribus, atque iter perfeci sospes & incolumis: quod perpetuè gratitudinis ergò, & in gratiam altiorum qui in idem periculum incidere possent, hic à nobis referri par fuit.

*Adulteriu-
m*

Sciendum denique Antuerpiā, & ex aliis locis adferri ab intitoribus oleum Nucis moschatæ, quod interdum adulteratum. Adulterari potest adlita cera. Fucus deprehenditur à peritis masticatione, qua cera se dentibus prodit, & gustu languidiore minùsque acri. Odor enim etiam adulterari, vix semittit, ut dignosci eo solo queat. Praestat itaque vti recenter expresso, quale nos paramus in vltis quotidianos.

*Ve depre-
hensus fu-
erit.*

DE MACI ARABVM, SEV CORTICE AROMATICO NVCS moschatæ.

Placet de Maci seorsum agere, tum ob nobilitatem vtilitatemque eius priuatam: tum ne mixta tractatio Lectori pariat confusionem: quamvis in praecedentibus iam satis constet, quid sit Macis. De eo autem sic scribit Serapio. *Bisbese*, id est Macis. Isaac Eben, *Amram* est cortex Nucis moschatæ, qui est supra crassum corticem alium. Praefertur qui sit coloris fusci: deterior est niger. Crassioris corticis nulla utilitas, sed fructus, qui in Oriente vocatur Adaches. Macim dicunt aliqui esse corticem, qui non ex Græcorū regionibus apportatur. Color eius est flauus, estque naturæ crassa & admodum stipticæ. Galen: Talisfar est cortex qui defertur ex India. Hæc Serap. qui saltem in eo laudandus quod nihil tradat temerè ex se, nec confundat Macim cum Macere. Quod scribit. Dicunt aliqui quod Macis &c: (sic enim in impressis legitur) & quæ subiungit de Talisfar Gal. & de Machis Dioscor. ad Macim non pertinent, sed ad Macer. Recitat enim quæ Dioscor. & Gal. scripserunt de Macere.

Bisbese.

Delellus.

Talisfar.

*Serapio il-
lustratur.*

Macis, inquit Auic. est simile quiddam foliis geminis, duplicatis seu inuolutis siccis, vergens ad rubedinem & citrinum colorem, sicut cortex, & lignum & folia, mordicans linguam, sicut Cubebe. Filius Mesuz testatur esse corticem Nucis moschatæ. Auicennam verò confundere Maceris vires cum viribus Macis, patebit postea ex viribus Maci attributis.

*Auic. nov.
Macer
Xyloma-
tis*

Hermolaus scribit: Macis Græcè *μακίς* & *μακίς*, cortex est rubens radicis magnæ: Recentio-

res Macis non radicis, sed Nucis odoratæ corticē, ac folliculum esse affirmant, idque verò propius est, & planè ita modò cernitur. Fallitur in eo Hermol. quod dicit Macis, Græcis *μακίς* &c: non enim idem sunt Macis Arabum, & *μακίς* Græcorum, quæ tamen errorem non animaduertisse Marcellum, (actis alioqui censor Hermolai) ex eius verbis apud Dioscor. lib. 1. cap. 100. patet. Ruell. Cornar. Cordus, Bacchanel. Had. lun. Manar. Brunfels. Brailauola, alique viri alioqui doctissimi, secuti sunt. Sic enim Ruell. De primo cortice quā nucamento Nucem moschatam inuolvente, non conuenit inter autores antiquos & recentiores. Namque Mauritanæ factionis principes Macis nomine intelligunt. Macer cortex est rubens arboris magnæ. Recentiores non arboris, sed odoratæ Nucis corticem esse contendunt: nobis verò liæ hanc dirimere non licet. Item alibi: *Macis*, ut alii *macer*, offic. *Macis*, Plin. Dioscor. Galeno cortex est arboris. Recentioribus odoratæ Nucis, idque verò propius. Iniuriam facit Ruell. citatis autoribus, quibus non Macis, sed Macer, cortex est arboris.

Ruell. not.

Nihil melius Cornar. Macis inquit, Dioscoridis profectò etiam hodie tum culinis tum Offic. notissima res est: sed non arboris corticem ipsi vidimus, sed Nucis odoratæ. Vulgus tamen nostrum, *Muscarenbluet* velut Nucis moschatæ florem appellat. Quare non ambigendum esse putat Corn. Macis appellatum officinis & barbaris idem esse cum Macere Græcorum & Plinii. Sed fallitur: sunt enim diuersa.

*Cornar.
not.*

Miramur verò Cordum diligentissimum & naturæ peritissimum in hanc sententiam descendere ausum ut scriberet, conuenire inter omnes promodum ductos, Macer, corticosum illud aroma esse, à pharmacopolis Macis appellatum, ipsis Arabibus etiam id testantibus: qui in descriptione sui Macis Dioscor. caput de Macere allegant.

*Cordus
not.*

Nemo autem miretur cur Dioscor. suum Macer arboribus misceat, cum potius inter aromata de eo agere debuerit. Venia dignus est in hac Dioscor. cuius ætate res noua, nec penitus cognita fuit, Credebant tamen arboris corticem esse quod propter ab eo inter arbores recensetur. Nostra verò ætate quid reuera sit cognoscere incepimus. Nam Arabes clarè scribunt corticem esse Nucis moschatæ. Item alibi: Macis seu ut Veteres vocat, Macer, nequaquam exterior ut hactenus nobis traditum est, sed medius Nucis moschatæ cortex. Vides ab eo manifestè confundi, cum tamen quid reuera sit, se scire sibi planè persuadeat. Sciuit nimirum quid esset Macis: non quid Macer. Ipse verò potius venia dignus, [non Dioscor.] qui Arabum scriptis, maxime Auic. deceptus, vnum & idem esse putauit, eaque propter de Dioscor. & Græcorum Macere non diligentius perquisiuit.

*Erroris
Cordi alibi
rumque
causa.*

Ita Bacchanelius quoque idem peccatum committit in suis consiliis.

At audaciùs etiam Amatus: non approbo, infie, illorum iudicium, qui Macerem à Maci Offic. diuersum esse statuunt, quum reuera Antiquorum Macer, Macis nostra sit. (Si dis placet.)

Monachi quoque in Mesuen lata incedentes via: Macis, inquit, cortex Nucis Myristice: apud Dioscor. autè, Gal. Paul. & Plin. Macer, seu Macis, seu Macher vocatur, ut patet ex Serap. & Auic. *Talisfar*. Arabicè etiam Talisfar, ut in Auic. & in Synonymis Rhasis, legimus Macin vocari.

Auic. can. duo capitula habet de Mace: vnum nomine Macis, in quo Andreas Bellun. multa corticis: [sortè etiam corruptis] & alterum sub titulo

toto Talisfar sine Talisfar, unde probatur quod ipse Auic. sub vario nomine varia intellexerit simplicia, cum idem sit Macis & Talisfar.

Aloisius Mundella, in annot. in examen Brasiliolæ præ alius sapere sibi videtur, quando inquit: Macer non est radice cortex, quemadmodum hactenus videre potui, sed cortex tantum simpliciter, non radice, aut alterius rei ut Hermol. voluisse videtur: verba enim illa Galeni, quæ citat, Galeni non sunt, sed Plinii esse omnibus manifestum est. Sed sapiendo facit Mundella, ut nihil sapiat: nam quid sibi vult, non est cortex radice aut alterius rei, sed cortex tantum simpliciter. Cortex sane (si sit) esse non potest, quin sit, vel fuerit alicuius rei cortex, *φλοιός, κελύφος*, est enim nostris quidem iudicio de genere *αέριον*: haud secus ac indumentum, integumentum, vel consimilis aliqua vox, quæ respectu habeat.

Quando verò Hermol. dicit, [ut Gal. inquit] intelligit de his verbis [gustui acerbo, & cum quadam acrimonia, &c.] quæ ex Galeno sunt.

Ausimus & addere, non solum Plin. dixisse esse corticem arboris, verum etiam Galenum, quamvis fortè in Gal. excusari possit (si concedamus nostrum Macis esse Macerem Veterum, quod tamen non concedimus) quod dixerit arboris, non radice arboris, ut Plin. quandoquidem Macis supra Nacein moscatam prouenit, quæ fructus arboris est, potest dici quodammodo cortex arboris. Nam siquidem fructus sit arboris, & cortex fructus: cortex utique arboris quoque fuerit: vel iuxta illud Mathem. quæ vni tertio &c. Hac igitur in parte non errant Hermol. sed potius Cordus, qui putauit Macerem Diosc. esse Macis, & idè Diosc. redarguit, quod Macerem inter arbores reposuerit. Consulamus acutissimum Scalig. sic tradentem. Si noster Macis non sit Antiquorum Machir, facit suspitionem, Machir interisse: si non interit, nominis alinitatem multum valere ad persuadendum hoc illud esse, & illud hoc. Argumenta verò si verum statuunt, Myrsiticæ nucis corium Veteribus ignoratum, fateri necesse est: quod tamen ipsa nucis longè est nobilior, ac fortasse omnium aromaticum obtinet facile principatum. Ex Arabum lectione, Macis aliud, aliud Machir. Macis ab Auic. pingitur lacerentè. Machir verò est, quod vocat idem Talisfar. Vides quanta cautela sua prodia Scaliger: ut si vel peccare videatur, vix tamen inuenias in eo quod reprehendas.

Apertius doctiss. Sylvius *Macis & Macer* res plapé diuersa, quod ex Plin. apertè patet. Macer hodie incognitum: tamen pro Nicol. Macis Actuar. *μακρ* reponit. Macis Arabum membrana est extima, nucem moscatam propè totam vestiens. Propè totam ait, non enim omnino extima est, sed intra eam latet, & conuexo interioris incumbit.

Sic Mach. quoque Offic. inquit Macis, quo Myrsiticæ nucis prætextus instar conteguntur, à Diosc. Macere multum differt. Differentiam non ignorauit Serapio. (idem & Hist. Lugdun. dicit) Quod cum compertum haberet Auic. de utroque sensum tractauit, & Macis ad c. 456. relegauit: Macerem cap. 694. sub titulo Talisfar descripsit. Monachi nullam inter Macis & Macerem ponendam differentiam affirmant: nullà tamen auctoritate (quod equidem sciam) aut ratione nituntur.

Item in postrema editione reformata: Hic asserere non dubitauerim Macerem Diosc. & Gal. Myrsiticæ nucis florem esse nequaquam. Nam si

ad eos floris cognitio pertinisset, veri quidem simillimum est, quod etiam fructus notitiam habuissent. In hac eadem reformata editione, quod vocat florem, paulò antè dicit sub crasso potamine subelle nucem duro satis putamine occlusam, nostra tenuiori Maci circumuestito &c. egregius sane florem in Pomo latitantem.

Curtio quoque Macis aliud à Macere. Et Cronemburgio: qui omnes, qui contrarium dicunt, præter Galeni doctrinam, etiam Arabum testimonio conuincantur.

Et Rob. Cont. *μακρ* Recentioribus Græcis est Macis Arabibus, res planè diuersa à Macere. Est aromaticus cortex ambiens inuolutum nucis myrsiticæ.

Eidem dicunt atque statunt apertè Dod. Lacuna, Garcias, Acoila, Hist. Lugd. Musa, & Recentiorum plurimi.

Crisalp. denique de hac ipsa re sic scribit. Arabes auctores optimè nouerunt in medicinis expetentes nucis moscatæ externum corticem tenuem quem Macis vocant: Macis nomen assumptum ex Macere, cuius Diosc. & Gal. & Plin. meminere. Nam Serap. ex Diosc. transfert, in corticem nucis moscatæ, quæ de Macere scribitur. Scribit Diosc. de Macere ex Barbaria aduehi, &c. Ex ieiuna Diosc. Plin. & Gal. descriptione significatur incertam illis fuisse historiam, & non esse extimam nucis moscatæ tunicam: repugnat enim eius tenuitas & acredo maior quàm adstrictio. Hactenus de auctorum consensu & dissensu circa Macis.

Macis, *μακρ*, quibusdam *μακρ*, non tamen Anonymum, Offic. Macis, ab incolis *Bunipalla*, *Beisaba*, qui ait, vocis *Beisaba* Auic. derivatione non se nunquam scire potuisse. Arab. hodie *habele & Beisaba*. Macis oleum Arab. *Gensifami*: Persis *Gens erugam*: Turcis *Gensiar* dicit, testatur Acoila. Germ. *Muscabluhe / Muscablüh*: Belg. *Macis / foelic / bloem van moscaer*. Gal. & It. *macis*, *hisp. macas*, *macias*, *Gingibre mequi*. In lingua hodie *maca* vocari, & *Beisaba* lingua Malayar itaque *macis* nomen esse Indicum.

De loco in præcedentibus quædam attigimus: Et cum pars nucis moscatæ integrans sit atque essentialis, ibidem prouenire certum, ubi & ipsa. Ex India autem vehitur per Syriam in Asiam superiorem, & inde in Græciam. Item ab eadem India per Assyriam in Aegyptum, atque porro in Italiam, ad hæc per Oceanum Meridionalem: de iisdem Indiæ partibus in Hispanias, Scaligero teste, & hoc seculo copiosè longa & pertinaci navigatione ex Indiis, ac ipso aded interdum solo natali, à nuperis Belgicis nauigatoribus in Germaniam copiosè cum Nucibus moscatæ aliisque aromaticis aduehitur.

Sunt qui annos decem efficacem seruari posse in nostris regionibus credant, quod Syluo nequitiam placet, qui vires eius citius euanescere magna ex parte existimat.

Diligendus autem Macis integer, crassissimus, fuluus seu rubentior, copiosorem liquorem ex impressa plaga fundens, pinguisimum & ponderosissimum.

De viribus Macis sic tradit Auic. Macis Mescha dicit facultate similem Natemesch, subtilioris tamen. Paulus ait esse æqualis temperamenti, non calidum valdè, & esse siccum in secundo gradu. Resoluit tumores in cerato, quamvis habeat adstrictionem quandam. Halitum oris commendat. Ex eo cum oleo Violato fit caputpurgium ad so-

Macis, habet

Synonyma
linguar.
Bunipalla,
Beisaba,
Beisaba,
Biskele.

Locus

Tempus
durationis

Vires &
Vires
Temperamentum
Tumores.

Oris halitus
Soda

est tunc non nihil mordet, breui tamen euas-
cescit hac velut insensibilis mordicatio.

Quia dubitamus an Lobel. eundem corticem
nobiscum pro Macere intelligat, exhibentur eius
iconem nostrae eadem tabella iunctam.

Autorum
placita.
Macer.

Macer Diosc. cortex est à Barbaria aduehi soli-
tus, subflauus, [coriandor] crassus, satis [ingratis
Ruell. & Sarr. perquam] adstringens. Videtur
autem Dioscor. Barbariam Gangetis Indis flumini
insulam inuere, ut annotat Sar.

Cortex a-
romaticus.

Gal. Macer cortex est, qui ex India conuehitur,
gustui satis [ingratis, non multum, ut quidam ver-
tunt: Cornar. verò qui malè Macim intelligit,
multum calfaciens,] acerbis cum leuicula qua-
dam acrimonia, odorata, iucundum sanè redolen-
s, ut pleraque aromata sine odorata, quae ex
India conuehantur. Item: *τὸ καλὸν καὶ τὸ αἰσθη-
τὸν ἔχει τὸν ὀσφύριον, ἐν τῇ ἰνδία ποιεῖ-
ται ἀπὸ τοῦ ξύλου τοῦ ἐν τῇ ἰνδία ποιεῖται.*

Paulus & Aetius de hoc ipso verba facientes,
in *τῇ ἰνδία* seu *Ἰνδία* asportari solitum comme-
morant.

Macer.

Sic Plinius & Macer ex India aduehitur, cortex
rubens radicis magnae, nomine arboris suae. Qua-
lis sit ea, incompertum habeo.

Talisfar.
Macer.

Serap. Dicunt aliqui Macim esse corticem qui
adfertur altitudinè quam ex Graecia, flauum, crassum
& stypticum valdè: Galeno Talisfar: Diosc. ali-
ter nominat, nempe Machir &c. Idem Serap. eo
ipso capite statim à principio tradit Macim diuer-
sum admodum esse à Macere.

Talisfar.

Talisfar, cortex Indicus adstringens, Auicenn.
Ex infra scriptis autem viribus satis apparere vi-
detur Auicennae nomine Talisfar intellexisse Macer-
is corticem, quamuis cap. de Maci, vires Macer-
is cum eo confuderit, ut prius dictum est cap. de
Maci.

Auicenn.

Porrò Sole clarius est iam Macerem & Macem
inter se differre, & res planè diuersas esse. Macer
enim cortex crassus est: contra Macis tenuis. Ma-
cer perquam adstringit: Macis sapore subacris
est. Macer temperatus: Macis calida: reliqua ex
vtriusque descriptione facillè innotescunt, quam dis-
sertam non ignorauit Serapio, ut Matth. cen-
set. Nam postquam tradidisset ex autoritate
Isach, Macim esse Nucis odoratae operimentum,
dixit secus esse, de quo loquebatur Diosc. quippe
quod scriptum reliquit Macerem esse ligni cor-
ticem siue Corium. Quod cum compertum habe-
ret Auicennae de utroque seorsim tractauit.

Præterea maximo est argumento, inquit Mat-
thiol. quod Macis & Macer vtrique inter se diffe-
rant, quod Diosc. Gal. & Paul. de odoratis nuci-
bus, quorum Macis est tegumentum, nihil scri-
ptis memoris reliquerunt: quippe si Macer, qui
eis conuehitur, Macis noster vulgaris extitisset,
credendum sanè, quod cum illo quoque ad-
mixta essent Myristicæ nuges: quarum illi histo-
riam, & facultatem, cum sint & in viribus & in
odore admirabiles, nequaquam describere præ-
termisissent.

Quod Macer longè differat à Maci haud ob-
scure ex verbis Gal. colligi potest. Namque ipse
gustui non reperio hoc esse aded acerbum, nec
tam leuiculae acrimoniae, quin potius si degu-
stetur, linguam & fauces admodum vellicat: odo-
rem iucundum perfundit, & leuisculum amaro-
rem quadam cum siccitate relinquit, reliquasque
supra scriptas qualitates possidet, quas nemo di-
xerit Maceri conuenire, cui Gal. essentiam frigi-
dam atque terrefactam magna ex parte, paucam

verò solidam tribuit. Matth. sententiam sequitur
Curtius.

Sed quid multis hic opus verbis? præcedenti
capite authores dicti sunt, qui Macerem à Macere
differentem faciunt: nunc hoc agendum ut con-
stet potissimum de natura & essentia Maceris.

An Lob. & Pen. cortex Xylocassiae facit, idem-
que ut ipsi coniectantur Dioscor. & Plin. Macer?
Cortex [inquiunt] cuiusdam arboris stipitis imo
exemptus, interiori sui parte valdè similis &
concolor xyllocassiae, sed minus crassus, serè ino-
dorus, aut quiddam luglandis & Lauri redolens
gustui: perparum coloris glutinisque mixti ad-
strictioni habens: cum autem Dioscor. & Gal. ad-
stringens sit & calefaciat, arboris cortex hic vi-
detur. Item Hist. Belg. Cortex Xylocassiae facit:
an Diosc. & Plin. Macer? Belg. Baselaer.

Cortex
Xylocassiae
facit.

Monard. *Arbore contra il flussu*, id est, cortex ad
alui profluuium: (ut Clus. verit.) Proferit (inquit)
nouus orbis prægrandem arborem, foliis cordis
effigie, nullo fructu. Eius cortex digiti crassitu-
dine aut amplior, foliis, durus, & ponderosus,
tenui candicante pellicula integitur. Similis est
admodum cortici Gayacani, uti Gentiana amarus,
manifestè adstringens, grati tamen seu aromatici
cuiusdam odoris participans.

Arbor con-
tra fluxum.
Folia cor-
data.
Cortex
crassus.
Similis
Gayacani.
Amarus.

Ceterum ne quis fallatur, considerent Lecto-
res Monardem tribuere suo cortici amaritudi-
nem, cuius alii non meminerunt quantum nobis
quidem constat. An fortè ab aliis audita ille scri-
bat, vel de cortice dixerit?

Considerandum venit, an Clus. Exot. l. 4. c. 4. no-
strum Macer intelligat, cum scribit: corticis cuius-
dam pedalis aut sexdecim vnciarum longitudinis
fragmentum Amstelredami vidit, ango à nato
Chr. 1602. apud D. Stephanum Backerum il-
lius vrbis Medicum, binas vncias aut paulò am-
plius latum, satis crassum, subrubentis exterioris
coloris & veluti nodosum, internè subfusi, &
& multis rimis hiantem, adstringentis saporis. Si
meam opinionem de hoc cortice liberè proferre
licet, plurimum ad Veterum Macer accedere vi-
detur, tametsi paucas eius notas nobis illi reli-
querint, è quibus exactam coniecturam facere
possimus. Eisdem tamen facultates, Maceri tri-
buunt, quibus hunc corticem præditum ferebant
ii, à quibus Backeros se accipere aiebat. Et qui in-
colas ad alui profluuium sedanda frequenter eo uti
asserent. Idem apud Acoftam cap. 12. de Macere,
procul dubio noster cortex magnam affinita-
tem habet cum Macere Acoftæ.

Descriptio

Macer Ve-
terum.

Solenand. Mater Græcorum, cortex ille cras-
sus est, qui hoc tempore à Lusit. iterum cognitus
cepit importari. Scribit autem hoc in Confirmed
edit anno 1588. eodemque opere alibi his verbis.
Macer quod ex Lusitania ad nos ante aliquot an-
nos adferri cepit.

Macer
Græcorum.

Sic Acofta nomen vulgare huius arboris apud
Lusitanos tradit, *Arb. de las Camaras*, & *Arbore
Santæ*: hoc est, Arbor Dysenteriae, & Arbor San-
cta: ab indigenis Christianis *Arbore de S. m. s. senteria*
Thome, id est, Arbor D. Thomæ, & *Macnyre*: à
Medicis Brachmanis *Macre*, apud quos summo
in pretio est arboris cortex. Quidam rhizotomos
(addit) cui arborem ostendi, aiebat sua lingua
dici, *Cara sancta macre nifusa garul*, hoc est, Macre
ab Angelis ostentum hominibus ad ipsorum sa-
lutem. Certissimum esse ait Græcis probè notum
fuisse Macer, de quo dubitamus, & quod pleri-
que adhuc ignorant: nesciuisse autem Macem &
nucem moscatam nobis apprimè nota. Admo-
nuisse præterea se Medicum quendam Regis Co-

Arbor Dy-
senteria
Arbor San-
ctæ
Arbor D.
Thomæ
Macnyre.
Macre.

- chin, ne dubitaret, quin hic cortex Auic. Macer esset. Macis & Maceris differentiam Auic. probè fuisse cognitam: quippe qui Macem odoratæ Nucis inuolucrum cap. 456. & Macerem radice corticem cap. 695. sub titulo Talisfar descripserit. Neque ignotam etiam Serapioni, qui ex auctoritate Isaac, Macem esse Nucis odoratæ operimentum dixit: Macerem esse ligni corticem.
- Talisfar.** Hinc patet Monachos suam oscitantiam satis prodere, quando aiunt Macem & Macerem non differre.
- Monach. error.** Hist. Lugd. de ea binis locis tractat: Primo sub titulo, Monardæ Arbor foliis cordis effigie. Secundo sub ut. Macer Acostræ.
- Xylomacer.** De Xylomacere nihil habemus, quod dicamus, solum nomen apud Neotericos nostros, ut Hermod. Ruell. Curtium &c. inuenimus. Apud Antiquos nihil haftenus. Crediderimus ab eis fictum occasione verborum Plinii superius citatorum. Meliora tamen docentes perlibenter audiemus.
- Locus.** Macer, teste Cronenburgio ex India conuehitur ut Plin. & Gal. dixerunt, non ex Barbaria ut Diosc. quare rationali coniectura in eo Scriptore suppositum hoc cap. Marcellus denunciauit sed Matthiol. hanc difficultatem explicare conatus: hoc modo scribens haud ignorandum est, nec Galeno nec Plinio, quod dixerunt ex India aduehi Macerem Dioscoridem repugnare, qui ex Barbaria adferri dicit: quoniam [ut Ptolomæus est auctor] quedam in Indo fluuio insula, vel vrbs sita est, quæ Barbaria dicitur, ex qua facillè comportabatur Macer: vel quod afferretur ex Arabia eo maris sinu, qui à Barbaria insula Barbaricus appellatur: Quandoquidem, [ut inquit Strabo] omnia quæ in India proueniunt, ea scilicet parte, quæ ad Austrum vergit, similiter in Arabia nascuntur. Acostræ perhibet, Maceris arborem nasci quibusdam Orientalibus insulis, præsertim vero in Provincia Malabar, in insulis S. Crucis regni Cochinchinæ, tum in ripis fluminis Mangate & apud Granganor.
- Vires & vici.** Macer, autore Dioscor. bibitur ad sputum sanguinis & Dysenterias & alui fluxus. Gal. videtur ex multa constare essentia: pleraque terrena frigida, paucula verò calida, & tenuium partium. Quamobrem desiccatur valenter & proinde Caliacis, & Dysentericis miscetur facultatibus, in tertio exiccantium consistens ordine, in caloris frigorisque differentia neutrum insigniter efficiens. Hæc l. 7. simpl. At in lib. qui ei tribuitur de opt. secta Empir. sic ait: Finge à me Macerem nunquàm expertum esse, qui arboris cortex est ab Arabia delatus. Hunc omnes quicumque de medica materia scripserunt aluum constipare affirmant: nunquid illis credendum erit, vel non credendum: ego quidem credendum assero, cum omnes ita esse conueniant. Talisfar apud Auic. Indicus est cortex, adstringens cum acrimonia, nonnihil odoratus, in quo est substantia terrea plurima & subtilis. Nulla in eo nec caliditas nec frigiditas est: fatu digna & Gal. memorata. Sunt tamen qui calidum & siccum faciunt in secundo gradu. Adstringit & potenter siccatur, & resoluunt, nam ex mixtis constat substantiis, sed terrea præualeat. Constat Diatribæ, Dysentericæ, mensibus immodicis hæmorrhoidum nimio fluxui atque tenesmo. Hæc Auic. Verum quod antè non uimus, ex viribus Talisfar ab Auic. hic traditis, apparet de Macere hic propriè agi, quom & separat à Maci, licet male huic quoque illius tribuat vires, ut patet ex cap. præcedenti.
- Diatribea.** Paulus catapotia ex Macere ad Dysenteriam

admiranda prædicat. Videtur autem ex eo solo parata intelligere, cum aliquo liquore conuenienti, nam nihil præterea addit. Reinerus Comitissæ præscribit ad compescendum fluxum sanguinis uterinum, ac dicit Lusitanos in acido lacte ad Dysenterias uti. Radix cortice recente, ut tradit Acostræ, trito, & cum oxygala seu lacte acido mixto, omnis generis Dysenterias & alui profluvia mirabili successu curant omnes medici cum Brachmanes cum Canarini & Malabarici. Aliqui huius corticis siccæ & in puluerem redacti semunciam per noctem macerant in quatuor vncis sen lactis, cumque bis in die propinant manè & vespere, deinde medicamento sumpto, oryzam sine sale & butyro coctam, atque pullos gallinaceos coctos, maceratos & tritos in Oryzæ decoctione statim agro exhibent: interdum si necessitas urgeat, Opium admiscunt, roborandi medicamenti causa.

Solent verò etiam Arabes cuiuscunque generis alui profluvia Opio, Nuce moschata admixta curare. Huius item radice usus salutaris creditur, ad vomitus compescendos & ventriculum roborandum cum aqua Menthe, & Mastiches puluere.

Brachmanes quidam Medicus rogatus de huius corticis, quem Macre vocant, facultatibus, in hæc verba respondit. Si vos Lusitani hunc corticem probè nossetis, multò pluris ipsum faceretis, quàm Piper: sed quoniam isthic in Lusitania eius facultates ignoratis, idcirco contemnitis. Puluis quem in omnis generis alui profluvia ex oxygala propinare soleo, ex hoc cortice de quo percutatis, confectus est. Rhizotomus quidam isthic mihi allerebat, istius corticis apud ipsos usum esse in compescendis vomitibus, aluique profluiis sistendis, plùsque pollere huius radice portionculam, quàm magnam quantitatem Myrobalanorum aut Arceæ, eamque præstantiorem esse Coru Malabarico.

Referebant præterea Macre fructum omnis generis lumbricos in humano corpore natos necare & expellere, & calculum in renibus frangere: tum etiam eos qui singulis diebus manè eo uterentur, liberos fore à calculo & à coli doloribus nec, inebriari posse.

Monardes quoque scribit suum corticem magnè esse apud Indos estimatione, ut qui eo utantur aduersus omnis generis alui profluvia, huius pulueris drachmæ pondere, aut paulò amplius manè propinantes ex aqua conueniente, aut crasso vino rubro. Ter aut quater id remedium repetitur, obseruaturque in reliquis victus ratio, quæ huiusmodi morbo necessaria est. Eiusdem corticis fragmento donatus sum antè paucos dies, cuius periculum iam bis feci in alui profluvia inueteratis magno successu.

NVX AROMATICA FEMINA

CAP. XIII.

Ubet hic Nucum Aromaticorum descriptiones ex Clusii exoticis subicere Nucis Myristicæ inquit, vulgò appellata, quam seminam centenis, & quæ apud nos frequenter in usu, historiam satis persunditè tradidisse mihi videtur Garcias ab Orta cap. de Maci: nec qui hunc per omnia imitatus, Christophorus à Costa e. de Nuce moschata, multò plura attulit. Horum commentaria ante multos annos in Epitomen contraheram & Launa faciebam, addiis etiam in ea scholiis, & interdum

interdum nonnullis figuris, certe in scholio ad caput de Maci Garcia, Nucis integre per mediū sectæ iconem, eiusdem insuper suo illo crasso operimento liberatæ, ut Macis facilius conspicere posset, dabam. Quia verò anno 1600. ex insula Banda, in qua sola nasci perhibet, à Batavis repperit allatas conspiciebam munita conditas cum suis tenellis ramulis



In Banda insula sola nascitur. Nucis condita.

& foliis, illius descriptionem paulò accuratorem dare conabar, quæ in hunc primum Exoticorum librum inferatur, & ipsius Nucis integre cum suo ramulo & foliis expressam figuram adiciendam existimabam. Referentibus porro iis qui in Banda insula fuerant, arbor quæ Nucem myrtilicam fert, magnâ copia istuc spontè nascitur, & excelsa est, Pyro haud minor, perpetuò virens, & frequentibus ramis prædita, quos teneriores videlicet & virentes, alternatim, non ex aduerso, sed inæquali serie ambiunt folia, Laurinis prorsus similia, minus tamen dura, & paulò interdum latiora, siue, ut verius comparem, Mali Aurantii foliis propiora, ademptis appendicibus, breuique pediculo contenta, in ambitu non serrata, sed venis quibusdam à medio nervo in latera excurrentibus insignita: fructus satis crassus est, mali Perici magnitudine, orbicularis, nisi supernâ parte pediculo proximâ aliquantulum turbatus esset: breui autem pediculo inter folia rano non inhaeret, ut Matthioli & plerique alii exhibent, sed ex tenuioribus extremis ramulis oblongi pediculo crassiusculoque pediculo subnexus, pendet, singularis ut plurimum, quemadmodum ab ipsis Indis, quos Hollandi ex Iava Amstelredamum anno nonagesimo septimo supra millesimum & quingentesimum aduexerant, deinde ab ipsis Hollandis triennio post ex Iava, ut dixi, reduci bus intelligebam, tum ex ipsis nucibus, suis ramulis qui folia adhuc retinebant inhaerentibus, munita conditis, ab Hollandis eo anno relatis, deprehendebam: interdum tamen binas etiam nucas coniunctum nasci, se observasse mihi asserbat Chirurgus, qui Hollandiis in ea professione comes fuerat. Constat autem istius fructus denso operimento, quod veluti sulci cuiusdam, illum in binas æquales partes diidentis, formâ præditum est, eaque etiam parte maturum desilire, Matrem sub ipso latentem & nucis corticem retis instar ambientem ostendens, adeò ut rubentem & elegantem initio, ut admirationem pariat, sed aëri expositus, paulatim illam elegantiam amittit, & flavescentem colorem tandem contrahit. Ex recenti autem oleum extraxerat D. Lambertus Hortensius Medicus dum in Banda erat, rubens admodum, liquidum, & magni ad pleraque usus, præsertim verò ad roborandum ventriculum.

Audio in eius Insula montanis illam etiam arborem nasci, sed fructum vix maturitatem conse-

Tom. I.

qui: eam ob causam illius nucem negligi, cum adseruari nequeat, sed breui teredine sentiat & duntaxat legi, ut Macis adimatur: quæ verò ad nos advehuntur nucas, earum esse arborum, quæ in planis & cultioribus locis nascuntur.

Macis.

NVX AROMATICA.

CAP. XIV.



Quia nemo hæcenus (quod equidem sciam) dicit Clusii myrtilicæ nucis oblongioris, quam matrem centent, historiâ tradidit (nisi eam designare videtur Christ. à Costa, quum scribit grandiores nucas maioris esse pretii apud incolas, & pluris æstimari quàm apud nos) non inutilem operam me sumptuum arbitratus sum, si eius brevem historiâ

qualem videlicet ex ramo secò sua folia & fructum retinente, donato Cl. V. Petro Pasuvio, concinnare potui, hic subicerem, atque ipsius etiam effigiem Lectoris oculis proponerem. Erat porro is ramus sesquipèdalis longitudinis, crassitudinem autem habens tubi pennæ anserinæ, quo ad scribendum uti solemus, retinens adhuc aliquantulum ligni præcedente anno nati partem, cineræ coloris cortice testam, superna autem quæ illo anno quo ramus abruptus nata erat pars, tenerior erat, & multâ medullâ interianâ parte prædita, coloremque habebat ex fusco rufescentem, huic ramo inæquali serie adnata erant septena aut octona folia, longè sanè maiora & crassiore pediculo prædita, quàm illius quæ nucem mofcatam vulgò notam refert: etenim illi folia sunt Mali Aurantiæ foliis non absimilia, exceptâ illâ appendice, qua Nucis folia carent, & tenuiora pediculo nituntur, gracilioribusque etiam ramulis adnascuntur: hæc verò folia, licet non multò densiora, interdum pedis Romani longitudinem æquabant, trium aut amplius unciarum latitudinem, magnâ autem ex parte, eorum longitudo septem aut octo unciarum erat, latitudo duarum cum semisse, color parte prona canescens, supina viridis & splendens: à medio illo crassoque nervo folium per longitudinem medium secante, exoriebantur alii minores tenuioresque nervi, ad folii latera expansi, utrinque quatuordecim aut quindecim, nonnunquam etiam plures, sique non pro folii amplitudine, sed indifferenter: nam in pedalis longitudinis foliis interdum tredecim aut quatuordecim duntaxat observabam, in iis verò quæ septem uncias solummodò erant longa, quindecim, sexdecim, aut plures: tenues præterea, & vix conspicuæ ob folii crassitudinem, oblique venulæ per nervorum intersticia erant sparsæ, & licet ante multos menses abruptus fuisset ille ramus, atque inter chartas adser-

Rami descriptio.

Corticem

Folia

Mali Aurantiæ ramus.

Color foliorum.

Sapor & odor.

Sarum & sylvestris. Confit. 7 (nam & huius quoque natura sylvestris est) quoniam sylvestris, nihilominus, aut certe non multo deterius quam urbana fructificat, hyemes quascunque ferre potest, montibusque magna ex parte prouenit, & quidem fecundissima temporaria vbertatis promotione. Præterea non caudicosa, sed fruticosa potius, virgis siue alis enodibus, sed paruis, etiamque crassis nonnullis assurgit. Cæterum & mansuescere potest. Differt tamen hæc ab illa, quod fructum meliorem, foliumque maius habeat. Circumserratum folium ambabus, simillimum Alno, sed latius, & arbor ipsa maior est. Fecundior & assidue reddetur, si virgæ præcidantur. Vtriusque duplex genus: quædam enim rotundam, quædam oblongam ferunt nucem. Candidiores verò fructus latius, & pulchrior, & circæ aquatica maximè fructifera est.

Vi fecundior reddetur.

Theophrastus.

Iulorum descriptio.

Sylvestres translatæ mansuescunt, corticem extimum habent tenuem, pinguem, maculis albidis peculiariter variatum. Materies admodum lenta, ut prægraciles virgæ, decorticatæ, crassæ, deorsum renouentur. Habent medullam tenuem, suauem, quæ concuuantur. In Corylo [ἀραλίστην] postquam deciderit fructus, bryodes quiddam [vulg. habent βρυόνες], sicque & Gaza & Dal. legit: nobis melius placet βρυόνες cum Conit. & rei accommodatis) vermibus maioris magnitudine, ex vno petiglo plura (τὰς δὲ: vulgata πύδν, pingue.) id est, iulos nonnulli vocant. (perperam lutum apud Gazam) constant hi ex minutissimis particulis squammatis digestis eodem ordine, quo in Nucibus Pineis (οὐρεῖς καὶ τὰς πίνες) conspiciuntur, ut non ab similibus sit Nuci Pineæ nouellæ ac viridi, nisi esset oblongior, & vbiq; æqualiter crassus. Hyeme augetur: incunte Vere dehiscit. Squammata illa flaua fiunt, & ad trium digitorum longitudinem crescunt. Vere autem et impetibus folijs decidunt, ac tum totidem calyculacea tegumenta gignuntur, compactim iuncta, in vno pediculo, quot & flores, horumq; singulis singula nuce [πύδν] insunt.

Cathart.

Idem quod modo lulum dixit, paulò antè, & eodem quidem cap. καὶ χερύ, Cachryn appellauit (Gaza Argentum reddit) quam & Abiet, & Pino, & Robori, Tiliæ, & (Nuci Iuglandi Gaz.) Diosbalano, (Castaneæ, Gaza) & Picæ tribuit.

A latere (pergit Theophr.) germinant & Nux Perfica, & Corylus, (ἀραλὴ καὶ πύδν, ἢ τὰς ἀραλίστην) & quædam aliz, quarum omnium germina in vnum folium finiuntur. Idæi Prunum & Nucem Auellanam (ἀυελλανίστην) altissimam radicem habere dicunt, sed Corylum (ἀραλίστην) tenuem atque robustam, Prunum numerosam. Quæ ratio & quasi necessitas cogat, ut ambæ diutius vivant, aut difficulter moriantur. (ἐμμένειν δὲν.) Quidam ἀυελλανίστην καὶ πύδν (Nucem Auellanam Gaza) & δὲς βάλανος fructe existimant: alii nullam earum, sed iulæ, (villum vertit Gaza, reddens è Græco lulum renouisset) καὶ πύδν Nucis, ἢ Quercus &c. grossis præciduis (ἀραλίστην ἢ πύδν papillis præcuis fortè rectius ditas) proportionem respondere existimant. Maturè germinat ἢ πύδν, (Nux Iuglans Gaz.) eademque fructum reddit autumnno. Scalig. in annot. ad Theophr. Considerabis, inquit, quo consilio Nucem Iuglandem inter seras connumeret Theophr. Quid si intelligat Theophr. Corylum? Coniungit enim Alnum, ei similem: & egregie respondet locus. Namin syluestribus utraque & montanis. Ut hac coniectura saligeni difficultati & suspitioni satisfactum in non temerè fortè quis indicarit. Item Sæcula, Betula, folio Canis dictæ, præter-

Tom. I.

quam paulò angustiore. Et Gaza quoque Carya reponit. Hinc Scal. Theodorus, inquit, refugit Iuglandis interpretationem: & est ratio. Non enim notis rebus addimus τὰς ἀραλίστην, τὴν καὶ πύδν. Nostro quidem iudicio malè vertisset Gaza, Iuglandis. Quid enim similitudinis Iuglandis folio cum Betula? Matth. liberè fatetur, sibi non compertum, quid apud Theophr. sit καὶ πύδν. Item καὶ πύδν (Nux Iuglans Gaza.) & δὲς βάλανος (Castanea, id.) frigoris cupida montanæque. Atqui Iuglans non est frigoris cupida: nescimus etiam an verè ac propriè montana dici possit, quapropter hoc loco potius intelligimus Corylum. Item: Thmolus, Olympusque Mylius, καὶ πύδν (Nucem Gaza, legend. existimamus, καὶ πύδν) & δὲς βάλανος (Castaneam Gaz.) plurimam ferunt: In Eubœa & circa Magnesiæ Euboicæ &c. καὶ πύδν rursus pro Corylo intelligimus, quam Alpinam dixit alibi ἀυελλανίστην καὶ πύδν gignit lulum. τὰ καὶ πύδν τὴν ἀυελλανίστην, (id est, Nucem Auellanæ) minime seruantur, quia Ligenon putamine oblecta, eoque densa, sed amara tandem fiunt.

Adhæc ait. Fomites tametsi ex multis fieri possint, tamen optimi ex nucis: (ut Gaza vertit) celerimè namque & laxissimè concipit. Quantum ex circumstantiis iudicare possumus, per ἢ πύδν hic intelligenda Corylus, cui lignum rarum, & quod facilius ignem sumpsit, quàm lignum Iuglandis, quod durum & solidum. Hæc enim ferè quæ Theophr. de Corylo & Nucem Auellanæ.

De eadem Plin. in hunc scribit modum. Cæteris (Caryis, dixerat enim de Iuglande) quicquid est, solidum est, ut in Auellanis ex ipso nucum genere, quas antea Abellinas patrio nomine vocabant. In Asiam Græciamque è Ponto venere, & idè Ponicæ nuce vocantur. Has quoque mollis protegit barba. Sed putamini nucleisque solida rotunditas inest. Ex & torrentur. Umbilicus illis intus in ventre medio. Idem tradit: Catonem Nucibus adicere Auellanas & Galbas Prænestinas, &c. Verum apud Catonem legimus, Nuces caluas, Auellanas, Prænestinas &c. In veteri glossario Calua nux, καὶ πύδν καὶ πύδν. In eodem Alb. nux Nucis, Prænestinæ. In Priapeis, Longæ nuce, Auellanæ: Nucemque longam, quam vocant Abellinam: Turneb. Calua nux, quæ fructum caluum fert, id est, summo apice nudum, nec vndique putamine corticis obductum, qualis est Auellana. Turnebus è veteri codice legendum putat Abellanas. Idem & caluas Prænestinas ex dicto glossario, ut annotat Dalech. Idem Plin. Ferunt & Auellanæ Iulos, inquit, compacti callo, ad nihil utiles. Et alibi Xylon barbatæ Nucis similem deferre fructum tradit. Quia verò loco paulò antè adducto Abellinas seu Ponicas nuce, molli protegi barba scripsit, idè per barbatam nucem Auellanam quidam intelligunt vti postea patebit.

Coryli meminit & Colum. inter ea quibus nemora vestiuntur. Pallad. Auellanæ. Varg. Georg. a

Duras Corylos dicit:

Et Egl. 7.

Phyllis amat Corylorillas dum Phyllis amabit
Nec Myrtus vincet Corylos, nec Laureæ l'habbi.
Arbor fragilis canente Quid.

Et Coryli fragiles, &c.

Dioscor. καὶ πύδν καὶ πύδν, ἢ τὴν ἀυελλανίστην καὶ πύδν: Nuces Ponticæ, quas aliqui Leptocarya vocant, id est minores nuce, καὶ πύδν καὶ πύδν, ut & ἀυελλανίστην, atque etiam δὲς βάλανος. De hac nucis tandè meminit Athenæus: sed nucum Iuglandi Ponicæ

Scal.

Abellana.

Abellina.

Ponicæ nuce.

*Plin. locus
vestit
Nux cal-
ua.*

*Barbata
nux.*

*Coryli.
Arbor fra-
gilis.
Nucis Pon-
ticæ.
Leptoca-
rya.
Lopima.
Athen. Ca-
pi capite
m. et illa
fragilis.*

maque subindit: latius rubras & oblongas ferr.
Robe baselnus oder Bohnschuß: sylvestris alia
 magnas, alia exiguas: quædam oblongas, non-
 nulla rotundas largitur Noces. Turnerus potius
 differentias quam species esse putat: Hortensis,
 Angl. Sylberd-tree: sylvestris, Woodnut-tree.
 Duas habet figuras: quarum una Coryli: altera
 Pruni, errore typographico sortē.

Dod. Urbanas, Gal. *noisettes rouges*, & Germ.
Robe baselnus antè dictas veras Noces Ponticas
 ab antiquis descriptas censet. Lacuna in longas
 & rotundas distinguit: longas sapidiore, maiores
 tardius maturari.

Noces Ponticæ, autore Cordo duplicis sunt
 differentie: quædam spontè ubique in Corylo
 vulgari nascuntur, quæ à Germ. *Baselnus* nomi-
 nantur: quædam verò, in hortis seruntur arbore
 Coryli simili, sed fructu oblongiore, & toto ceu
 barbato putamine vestito: nucleus rufus utpluri-
 mum membrana cogitur. Plinius has barbata in
 Xyli descriptione appellat. Est & tertium Aucl-
 lanæ genus in hortis satum sylvestri simile, sed
 minus nucleo, & gustu suavius. Quartum genus
 est, quod in Macedonia nascitur, arbore non que-
 madmodum apud nos multiplici, caudice frutico-
 so, sed singulari, procero, & iustam arborem æ-
 quante: foliis latis, Nucibus in grandem racemū
 pingui magnitudine congestis.

An autem Veteres hanc cognouerint, neque
 negare neque affirmare aulim. Certè apud eos,
 qui nūc extant auctores, nulla extat descriptio, quæ
 eam referat. Inuenerunt autem hanc Corylum in
 Macedonia & Hemo Thraciæ monte Legati quidā
 à Buda Constantinopolim missi, inter quos fuit
 & Paulus Rubigallus, qui hæc nobis reulit.

Brayerius & satuas duplices facit: quippe quæ-
 dam insignes rotunditate & amplitudine, mem-
 branam, quæ ambit, candidam habentes. Aliæ
 oblongæ magnæq; rubescentem tunicam nascæ,
 has Gesn. ait Lombardicas al. quos cognominat:
 additque urbanas & rotundas, satiusque magnas
 se vidisse in S. haudia.

In Italia, si Mattheol. credimus, & in urbanatum
 & in sylvestrium genere numerosæ reperiuntur.
 Ex domesticis aliæ oblongæ, aliæ rotundæ sunt.
 Oblongæ præstantiores putamine, vehementer
 rubent, & fractu minimè sunt contumaces, qua-
 les sunt Vicentinas, quæ tam suavi sunt sapore, ut
 Pistacis serè comparari possint. Siquidem non
 omnibus Auellanis idem sapor reperitur, neque
 eadem pulpæ gratia: aliæ namque prædulces ac
 mansuæ faciles, aliæ verò asperiusculæ & ingrati-
 ores, & manso duriusculæ habentur. Oblongæ se-
 tius maturitatem sentiunt: celerius verò rotundæ:
 quapropter illæ vegetiori sunt nucleo, diuque
 perdurant. Sylvestres in Tideninis montibus
 oblongæ & rotundæ. Vestitur Auellane nuci pu-
 tamen viridi callosaque membrana, in extremi-
 tatibus tamen mollior & simbriosa in barbæ mo-
 dum protrahitur: quo fit ut quibusdam hæc Bar-
 batæ Noces appellentur, etsi genus reperiatur
 haud barbatur, sed aded breui amictu, ut puta-
 men anteriori parte nudum videatur. Nuci nu-
 cleus quandoque albus, quandoque purpureus
 vestitur membrana. Putamen aliis rubrum, aliis
 fuluo colore aureum, rursus aliæ dulces, omnis
 acrimoniæ expertes: aliæ contra, eodem teste.
 Cæsalpin. urbanarum fructum candidiorem di-
 cit, quod admitti potest, si putamine libe-
 rum, & cute ruffa exutum intelligat nucleum.

Camer. apud Norimbergenses, Cellenes, à quodam
 monasterio prope VVurzburgum denominatas
 Tom. I.

aliis præferri ait: sed quales sint non docet. Cre-
 scetiam apud se addit maiores istas, quæ ipsæ
 à loco, unde adferuntur, Lugdunenses vocentur.
 Colligamus paucis iam dictas differentias. Aucl-
 lanæ aliæ sylvestres, aliæ hortenses. Sylvestres
 vel longæ vel rotundæ, hortensibus minùs sapi-
 dæ. Hortenses oblongæ & rubræ, putaminè &
 cute interna, ceteris nobilissimæ habitæ, & Germ.
 rothe vel zame baselnus / aliis Rothe Bohnschuß /
 ut iam monuimus, sunt & hortenses illæ magnæ
 amplissimæ, Franciæ, Lugdunenses, Lombardiæ,
 aliis Italicæ dictæ. Hæ nostris regionibus cogni-
 tæ: nam quas Cordus Macedonicas vocat, nostris
 hortis pondum innotuerunt. Habemus racemi
 serè specie duodecim auellanas sibi mutuo cohz-
 rentes, verum ex de sylvestrium genere sunt: item
 geminas, & trigeminas sylvestres & satuas non
 iniucundas visu, naturæ peccantis potius aut lu-
 xuriantis opera, quàm distinctæ alicuius speciei.
 Non inelegantius est, quod serè quadrangulum
 quatuor costis torosis ac eminentioribus con-
 stans adferuimus. Sed placet, more nostro, no-
 bis obseruatarum Auellanarum descriptiones,
 breuiter subicere, quàmuis ex pleraque iam di-
 ctæ sint.

1. Quæ passim in nostris proueniunt monti-
 bus, sylvestres dictæ, parue sunt, albæ, subro-
 tundæ, vel sublongæ, umbilico gibbato putami-
 ne dentibus fragili flauescente, nucleo v. conti-
 nent, fungosa atque ruffa quadam cuticula obte-
 ctum.

2. Specie distinctæ sunt, an varietas tantum,
 quas paruas admodum, rotundas, magis ruffas,
 umbilico magis ex parte fissili habemus, adfir-
 mare pro certo non aulimus. Hæ quidem sylue-
 stres sunt.

3. In sylvestrium quoque censu habentur, vul-
 gatæ illæ, quas passim in hortis & viridaria trans-
 latas colunt, arboris & fructus facie primis simi-
 les, sed duplò serè maiores speciosiorèque, sed
 verinque serè obtusiores, nucleo habitiori sua-
 uiorique pellicula albicante tectos. Longitudine
 tamen vnciam non æquæ, latitudine semun-
 ciali.

4. Eleganti varietate conspicuæ, & ipsæ in hor-
 tis cultæ sunt graciles admodum, & quædam ca-
 lamum scriptorium crassiorè crassitudine sua,
 præsertim circa umbilicum, non superantes. Lon-
 gitudine vnciali. Cylindrica atque torosa serè fi-
 gura: nisi parte inferna modicè dilatarentur, quò
 fit, ut à notabili illa rotunditate umbilico tenuis
 prædita, desciscant.

Prædictæ omnes & sequentes putamine suo
 herbaceo media serè parte detectæ & nudæ, ob
 quam fortè causam à Piscis calux nuncupatæ, ut
 quidam volunt.

5. Satius rubræ prædictis omnibus maiores,
 vnciæ tamen serè breuiore, umbilico magno, e-
 lato, opposita parte exarata: hæc putamini suo
 herbaceo atque barbato penitus immerse, vix a-
 cuminis partem exerunt. Estque exterius puta-
 men magis barbatur ceteris, sed principio mi-
 nus serè calloso carnosove. Cortex lignosus du-
 rus, rubens, quem excindendo cuspidem cultro
 facilius adaperias, præsertim non planè recen-
 tem, quàm dentibus. Nucleus rubra vel potius
 purpurante tunica contextus, præsertim in re-
 centi & haud ita pridem decerpta, gustu gratio-
 re præcedentibus: idè & præ illis lautiorum men-
 sis adhiberi solitæ. Vulgò persualum scimus, præ-
 dictis omnibus faciliè causari, Dysenteriam. Vnde
 Rothe Bohnschuß à quibusdam, quasi dysentericæ

*Aucllanæ
 obseruata
 Auclli dif-
 ferentia
 Alia fo-
 mul cohz-
 rentes.*

*Monstruosa
 auellana.*

*Sylvestres
 auellana.*

*Sylvestres
 minores
 rotunda.*

*Sylvestres
 calæ.*

*Graciles de-
 longa.*

*Nut cal-
 na.*

*Satius vici-
 bre.*

*Dysentericæ
 auclli.*

Nucis Bar-
bata.
Auellana
magna
Lugdun.

Auellana seu Noces dictæ. Has Noces barbatas, Bartnuß / lo. Wittichius vocat.

Restant magnæ illæ, quas alii Lugdunenses, alii Italicas vocant, vnciali amplitudine, rotundæ: Et hæ rubro putamine ligneo contextæ, sed duriores cæteris omnibus. Latiores tamen serè sunt quàm altæ, umbilico sessili, leuiter impresso: nucleo duriore cæteris, gustus suauitate faciliè cum rubris dictis certantes, ideòque delicatioribus expetitur. Lugduni saccharo incrustantur.

Delectus.

Porro ex omni specie Nucum auellanarum præferuntur & modò dictæ magnæ: rubræ: sed & inter has & reliquas, quæ integræ sunt, ponderosæ, ligno non portulæ, corpulento nucleo, sapore grato, & inter Castaneam ac Amygdalum quodammodo medio. Duratione præferuntur maximæ, vel ipsis rubris durabiliores, ut putatur: nec tamen sapore inferiores. Infimæ sunt sylvestres, ligno ex nucleo candicante. Improbantur leues, perforatæ, quia vermiculose, vetustate oleagineæ, rugoso nucleo & exuoco. Delectus signum haud postremum quis capiat à Petronio Arbitro qui in suo Satyrico sic ait. Auellanas Noces cum precatione misit in vinum: & siue in summum redierant, siue subfederant, ex hac coniectura dicebat, nec me falleret, inanes scilicet, ac sine medulla ventosas Noces in summo humore consistere: graues autem & plenas integro fructu ad ima deferri. Sed par est & Byzantinam dictam Auellanam inter differentias accenseri.

AVELLANA BYZANTINA.

Descriptio.



Calyx.

Fructus.

Nucleus.

Saturnus
modus.

Auellanæ Byzantinæ fructum supra cupit. Iam altitudinem raro excresecit, sed pumilum semper persistere referunt. Crassos vero admodum, magnosque fert testibus pediculis calycibus, extrema parte in multas crassas longasque lacinias diuisos, sed etiam multis lacinias appendicibus obsita. Sunt autem calyces foris valde

dura asperaque lanugine hirsuti, interiore parte laues, continentque fructum Auellanæ sylvestris & spontè nacenti serè similem, breuiorem tamen, duròque putamine, ut illæ, constantem. Qualis verò sit, qui in eo continetur nucleis, indicare nequeo, cum vnicum duntaxat fructum mihi dederit. Manifeste Daniel Vognad (de paucis quod ad ferendum retinuit) eamque ob causam consingere noluerim. Postea tamen cum plures nactus esset, & aliquot ab ipso accepissem suis calycibus inclusos & exemptos, non modò degustare volui, sed etiam telluri commisi insectilibus, non cum suo calyce, ut antè mihi fuerat significatum, sed nudos: atque illi quidem altero duntaxat à saturno anno nati sunt, & in singularem vngulam excreuerunt pedalem, quam sine ordine oblon-

giora paulò quàm in vulgari ambiabant folia, perinde tamen rugosa. Eius vnicum fructum humanam altitudinem superantem adhuc alebam, cum Francofurto discessi M. D. XCIII. sed qui vilius fructus speciem nondum dederat, imò neque etiam anno M. D. XCV. licet in magnâ altitudinem excreuisset, ut ad me scribebat, cui arborem descendens reliqueram. *Chf.*

Idem Auellanæ rarum admodum genus, hoc atque peregrinum dicit, quod Turcarum Imperatori eiusque Proceribus in deliciis sit, Constantinopoli allatum. Constantinopolitanis & Baselnus Taber.

Montes (autore Constant.) amat Corylus, descenditque etiam in plana. Gaudet humidis & argillosis. Sic Montes in Gallia & Germania passim sylvestribus atque vulgatis Corylis vestiuntur, & nemora scatent, maxime vlginosa, aliqua sunt partibus Rheno finium, ut annotat Tragus. Ut Matthioli in Italia urbanarum pariter & sylvestrium numerus prouentus. Sylvestribus Coryletis, propemodum innumeris, scatent Tridentini montes, quæ oblongas pariter, & rotundas largiuntur Noces, tanta vbertate, ut eas rura sacis legant, ubi maturitatem senserint. Domesticis horti ornantur in Gallia & quibusdam Germaniæ locis, quorum pergula vmbra superbiunt multa, densa, per caniculares ardores recubantibus expetissimæ. In Heluetia, ut tradit Gesn. rotundæ minores in sepibus & syluis, præsertim humidioribus locis copiosæ: Urbana rotundæ in Sabaudia, Lausannæ, præsertim vero Lugduni abundant. Has aliquoties Montb. in horto E. C. Lugduno acceritas plantandas curauimus, sed frustra. Rubras tamen habemus, ex Alsatia & Basilea acceritas, in quibus locis non infrequentes sunt, & optimæ. Sylvestres vero hic passim in vicinis montibus proueniunt: itemque in Silesiacis tam montibus & collibus quàm syluis, teste Schvvenck. In Scotia tum longæ, tum rotundæ spontaneæ in syluis ubique, autore Cargillo, medico doctissimo. Quales proueniant Monspelii diligenter non obseruauimus. Aduchuntur quidem eò magna copia ex Hispania (ut perhibent) maximæ illæ, quæ & Lugduni copiosè venduntur, & a nostratibus interdum emptæ mercato-ribus ad nos importantur. Tho. Harriot in hist. Virginæ insule scribit in ea prouenire Auellanam Nucem [Coudrier] & ex ea incolæ arcus parare.

Iuli primo quoque tempore erumpunt, nondum soluta hyeme. Imò & Octobri & Nouembri Iulios nonos exertos sæpè numero conspeximus, quidēde Martio aut Aprilis succrescentibus folijs flu-uescentes abscedunt: mox verò strobili emicant, & post eos folia. Fructus sylvestrium Augusto mense: satiuarum Autumno maturus legitur, teste Dod. Nos tamen etiam rubras illas satiuas Augusto in mensis sæpissimè vidimus. Locis calidis Iulio circa Nonas matura est, teste Pallad.

Auellanæ, eodem præcipiente, ponendæ sunt Nucibus suis. Nec amplius supra terra ducenda est, quàm crassitudine duorum digitorum. Plantis tamen & sobole expertum se testatur melius prouenire. Mense Februarii, seu planta seu semen exponitur. Gaudet loco macro, humido, frigido & sabuloso.

Translatu mitescunt sylvestres, prægraciles virgæ desquamantur, crassioresque deorsum interpolantur. Nux Pontica, ut tradit Didymus apud Const. sentur eo quo Amygdalus modo, aut Nux, & tempore eodem deponitur: Ex eo gene-

Folia.

Loca.

Tempus.

Satio.

Calyx.

*Rotunda
celerius
crefcit.
Vt fructus
melior co-
pofiorque
nafcatur.*

re est rotunda & oblonga. Rotunda si eodem quo longior tempore pangatur, celerius comprehendet, & lztior adolefcet. Arborem si quis frequenter collocet, fructum meliorem copiofiorēque ferre traditur, neglectaque migrat in fruticem. Quare tonderi resecarique præcipiunt, sic fecundiorē reddi: alioqui si arborefcere patiatur aliquis, in corpulentiam alimentum omne transferet.

*Vites &
vitis.
Stomacho
melior.
Tuffi
Catarrho*

Nuces Ponticz, quas nonnulli Leptocarya vocant, ex sententia Dioscor. stomacho infestæ sunt: ipsæ tamen tritzæ, & in aqua mulla potæ, veteri tuffi medentur. Tostæ verò si cum Piperis exiguo comedantur, destillationem concoquunt. Sin autem totæ crematæ fuerint, & cum axungia aut adipe vrsi tritzæ, illitu alopecis capillum reddunt. Aiant nonnulli vsta putamina, & cum oleo ad lzuorem contrita, cæcias infantibus oculorum pupillas perfuso sine ipse denigrare. Nucis Auellanz, vt tradit Plin. capitis dolorem faciunt, inflationem stomachi, & pinguedini corporis conferunt, plus quàm sit verisimile. Et Gal. Est & aliud genus nucum minorum, quæ nimirum Ponticz nuncupantur, plus habens essentiz terrestri ac frigida. Itaque etiam gustanti austerior tum cortex tum planta, tum fructus apparet. Cæterà magnæ Nuci Iuglandi similes sunt.

*Ad deni-
grandes o-
culis
Nuxa.
Cap. dolor.
Stomachum.
I pingui-
Temp. ra-
mentum.*

Simeoni Sethi Auellanz calidæ sunt & humidæ, magis nutriunt quàm Iuglandes Nuces, difficultusque concoquuntur: & vt quidam aiunt, comestæ ieiunum intestinum lzdunt. Facilius autem concoquuntur, minùsque ventrem sistunt, si interior earum cortex abiciatur. Dicitur quoque, si quis ante reliqua cibaria sumperit, cum ruta, huic venena nec morsus venenatorum efficere die illa, scorpionis que ab eo sugere. Sumptæ verò cum caticis, morsum scorpionis venenati sanant. Ad acidam quantitatem, quæ à nigro humore in ventriculo excitatur, valdè proficiunt.

Nuxa.

*Adstrin-
gens.
Contra
scorpiones.
Ad melan-
cholia.*

Plutarchus scriptum reliquit, Quoties Coryli nucula laquearius appensa coharebit scorpini in domicilia non irrepet. Negat enim Auellanam à scorpione adiri. Nec est omittendum, quòd simplex rusticitas obseruauit & Ruell. annotat, serpentem obtorpescere, quæ Coryli caudice vel virgâ fuerit icta, & tandem emori. An quia ob earum firmitatem, (propter quam & ad equos castigandos expectantur) icta spina, quæ per eius longitudinem extenditur, vertebis sibi mutud per apophysin haud secus ac in cæteris animantibus, infernis, luxetur, sicque ad motum ineptior reddita tandem contabescat? Peculiarem quæ esse hanc antipathiam asserere non ausimur.

*Contra ser-
pentes.*

Athen. scribit, Heracleoticas nuces non tantum alere, quantum Amygdala, ac præterea aliquid habere quod innatet, & stertorem ac raucedinem (ἡχιδνός, ἄλλοι κροχιδνός) vocis efficere: largitis sumptas caput grauari. & minùs nocere recentes quàm siccas. Et mox: Ponticam nucem pinguem dicit, concoctique difficilem, & iterum. Heracleoticas nuces Castaneis esse deteriores, idèoque frigendas, vt nocentior pinguedo absumatur.

Auellana, teste Aetio, præterquam quòd frigidior, austerior, terrestriorque est, in reliquis Iuglandi assimilatur.

*Cur Ger-
minum el-
noxia.*

Sed quare Auellanz tantoperè obnoxia sunt vermibus? Sanè quia Aristoteli humor putredinis mater est, causa vel nimix earum humiditati tribuenda, qualis præsertim recentibus necdum maturis inesse solet: vel quia parum olei habent.

Tom. I.

Ac vtrique ratio egregiè consentit. Nam adultiores & iam oleaginosiores, vix amplius vermibus infestari videmus, sed potius contrà, & exiccati. Eandem ob causam Iuglandibus nulli solent innasci vermes, nempe quòd oleo magis abundent omni tempore, vel recentes vel antiquæ.

*Cur Iuglan-
dibus non
innascan-
tur vermes?*

Nucibus Iuglandibus quoque comparat auellanas Auicen. easque tradit decliues esse ad caliditatem & siccitatem paruum: & nonnulli recentes illas in secundo ordine calidas faciunt & siccas. Gal. tamen illas potius frigidas censet. Maturum fructum primum ordinem non excedere arbitratu Brassauola: imò antequam sit maturus, humiditatem habet, & crassam.

Temperat.

Porro nuces Auellanas stomacho tenuioribusque intestinis infestas esse, maxime si non satis maturæ fuerint, non solum ex verficulo Macri:

Nuxa.

Ex minimis Nucibus, nulli datur esca salubris.

Sed etiam experientia ipsa docere conatur Tragus. Pueri namque (infæ) si Augusto mense Auellanas nuces auidè deuorant, facilè in Dysentericum morbum incidunt. Idem Ruellum ridens, quòd Coryli bacculo vel caudice serpentem ictum ex rusticorum obseruatione, morti tradit. Ego verò, addit, non dubitarem fuisse, quos ex Coryli radicibus rusticis desumptos hunc inde secum gestant, id nullo negotio effecere posse, quibus vel canem rabiosum interficere difficultè non sit. Nos verò an aliqua id ratione fieri possit, etiam cum tenuioribus virgæ, (quæ tamen ligatam serè habeant crassitudinem) paulò antè quædam atuginus.

Dysenteria

Oleum Nucum Auellanz efficacissimum ad cussin veterem, & destillationem, eidem Trago.

*Oleum au-
ell.*

Matth. author, bilem augere Auellanas: ad menses cohibendos valere subrassam cuticulam sub putamine nucleum ambientem. Oleum earum destillationes efficacissimè concoquere, & articulorum dolores inunctum leuare. Sed quòd Dioscor. d. putaminibus vllis, ac cum oleo tritis, glaucas in pueris oculorum pupillas denigrare prodidit, hoc illustri experimento facto aliquoties se cognouisse, & verissimum esse compenisse gloriatur Cornarius.

*Ad menses.
Ad destill.
et articu-
lor. dolores.*

*Experimen-
tum.*

I. V. Vitiich. in præf. sanit. Nuces, ait, Auellanas seu Ponticas laudat Hippocr. quòd cerebrum angeant, verum sunt calidæ & siccæ naturæ, facilè grauant caput & ventriculum. In eo laudantur, quòd hepar corroborent.

Téperam.

In Thuringia Mures agrotum coadceruant nuces, quas quidam petquunt, tollunt, suspendunt per aliquot dies ad fumum, & vocant Nivesennusse. Hæ nuces non solum sunt lapidæ, verum parum nocent, vt sapè se expertum dicit.

*Hepar cor-
roborant.*

Lacuna scribit istud quòd dicitur stomachum & caput grauari, & experientie, & communi reclamare opinioni: bonæ quippe matronæ Hispanicæ rostit vulgariter vtuntur ad placendum suo stomacho, cerebrumque confortandum, non sine felici successu.

Succus ex Auellanis veluti ex Amygdalis lacteus extractus, valenter aluum adstringit Dodo-næo, atque Cæliacis & Dysentericis hac ratione prodessè potest. Iuli frigidi ac sicci, & similiter adstringentes, ventris quoque fluxiones sistunt, Auellanz Cellensium cremor in calculo renum & ardore vrinz vtiliter exhibetur.

*Succus la-
cteus
Alui flu-
xus.
Cæliaca.
Dysenteria.
Iuli.
Calculus.
Ardor vrinæ
na Lac gen-
erant.*

Camer. Auellanz lac generant, quia commundata lactis plenæ sunt: ad restituendas vires, & ad Venerem roborandam præstant. Porta ex Galeno.

Z 4

*Hort. Luf.
aut. met.*

Horti Lusatiz autons, quicquid ille siq. vana nobis videtur illa coniectura, qua dicit, Auellanas similes Calculis renum & Vesicæ, eorum affectibus conferre. Similior silex aut lapis alius topiaceus, num igitur conferat? Nec magnopere videmus quid in Auellanis esse possit, quod ad calculum conferre queat, nisi forte exhibitum oleum ex eis expressum, quomodo Amygdalinum, ad dilationem, ad lubricandas vias, ad dolorem.

*Pinguis-
sima.*

Bruyerius refert, Auellanas rubras, matronis in cibis gratissimas, præsertim recentes & maturitatem exactam non adeptas. In Plinii sententiam, pinguedini corporis conferre, posteror medicina manibus pedibusq; descendit. Tostas autem insalubriores dicunt, quicquid dicat Athenæus.

*Sacchara
succulenta.*

Seplatiarii saccharo incrustant, quæ bellariotum vices implent, præcipue quæ sunt ampliores & rotundæ.

*An nebula
oculorum.*

Notabile est hoc Arnoldi. Ad Albulam & nebulam valens. Accipe virgam Auellanz, incipite perfora, imple foramen granis Piperis, & tere supra eotem cum vino albo, quod distillat, collige, & in oculo pone.

*Mandatu
ad Auellana.*

Horstius tradit, ad Dysenteriam pestilentialem Auellanas nocuas, idemque & vulgo persuasum nouimus passim ferre. Hinc Illustriss. Princeps Guille. Palatinus Dux Bavar. in quodam mandato de Politia obseruanda tempore pestis, cauet ne venales proponantur Auellanz (Baselnus) & vinum sublimatum [Brantwein] sine permissu, quia sanitati resistere & pesti occasionem præbere per doctos existimentur.

*Caudicum
Coryli.*

Caudex Coryli quotannis multis stolonibus, seu virgis fructuat, quæ si non lædantur, intra paucos annos ita crassescunt, vt ex his circulos dolares elegantissimos conficere queas.

Ex ligno etiam carbonem parant pictores, sculptores, & aurifabri ad delineationes & figurarum præludia ducenda commodos. Ex huius etiam ligni carbonibus pyrius puluis conficitur. Sed & ligno assulatum secto ad cribra vtuntur.

*Radix
Coryli.*

Ex radice nodosa ac undulatum crispa vasa & suppellectilia varia fabricantur, quæ ad longos annos durant, nec facile corrumpuntur. *Tragus.*

*Pili Coryli
Coryli.*

Nic. Metri in libro medico, per Heremiam Martium in lucem edito mirabiliter commendat Viscum, Coryli (Baselnus) quem librum, quia non amplius nobis ad manus, lector ipse, si lubet, consulat. Coryli vrbana atque & scenis opere topiario texendis, & in altum etiam eleuandis conueniunt. Tales in Gallia multis locis, in magnatum & nobilium hortis: præcipue Biturigibus, vt Gesnerus annotat, constructæ vtuntur. Vidimus in splendissimo quodam horto (putamus fuisse Reguli cui de Fleury cognomen, quondam ad Heluetios Legati) sub topiaria Corylo comestantes, vel potius ex gentis more, pomeridiana collatione sub umbra sitim fallentes pro libitu hinc isthinc ceu in Muscolo sedentes pulchras & sapidissimas diuersi generis Auellanas decerpisse. Ipsæ alioqui Coryli dentæ frondes pullis Gallinaceis optatam præbent umbram & quoddam velut asylum, aduersus impetum & rapacium auium insidias.

*Ufus
Coryli.*

Restat, vt Coronidis loco, de insigni illa Coryli virgarum utilitate aliquid dicamus, quia nobilis & eximia à nonnullis, spes vanas pretio vendentibus, ad inueniendas aut aliorumque metallorum mineras atque (si Diis placet) gazas subterraneas, præstare creditur. Modum & rationem doctè & eleganter descripsit Agricola, rei Metallicz, & quicquid alius sui seculi consultissimus, in hunc

modum. De virgula sarcata inter metallicos multæ & magnæ contentiones sunt: nam eam alii aiunt, in venis inueniendis, sibi maximo vsui esse, alii negant. Qui tractationem & vsum virgule probant, eorum alii prius sarcam cultro rescant columnam: quam præ ceteris ad venas querendas idoneam esse censent: præsertim si Corylus supra venam aliquam creuerit. Alii pro varietate metalli diuersis virgulis ad venas inquirendas vtuntur: etenim Coryli virgulas adhibent ad venas argenti: fraxini, ad æris: Piceastris, ad plumbi, maxime candidi: ex ferro vel acie ferri factas, ad auri: dein se utriq; virgule cornua manibus prehendentes pugnos faciunt: necesse autem est vt digiti compressi ad cælum spectent, vtque virgula erigatur ea parte, qua cornua coeunt tum hic & illuc passim cum per locos montolos vagantur: itaque dicunt simul atque supra venam pedem posuerint. Statim virgulam versari & volvi, sibi prode venam: ubi pedem retulerint: & ab ea discesserint, rursus virgulam immobilem manere. Verum, vt ipsi asserunt, causa motionis virgule est vis venarum: eaque interdum tanta est, vt arborum, prope venas crescentium, ramos ad se flectat. Contra qui virgulam nulli viro bono grauique vsui esse posse dicunt, hi vim venarum iccirco motionis eius causam esse negant, quod omnibus non solet moueri, sed istis tantummodo, qui cautionibus aut astutiis vtuntur: vim præterea venarum negat ad se trahere ramos arborum, sed exhalationem calidam & siccam eos efficere contortos. Ad quæ isti respondent: quod vis venarum virgulam, cum quidam à metallicis aut ceteris hominibus eam tenet in manibus, non vertat, in causa est hominis proprietates quadam singularis, quæ vim venarum impedit atque alligat: quia enim vis venarum versat & voluit virgulam, non aliter ac magnes ferrum ad se allicit & trahit, eam occulta hominis proprietates debilitat & frangit, non secus atque alium Magnetis vires infirmat & excludit. Etenim alii succo Magnes oblitus ferrum ad se non trahit: nec idem trahit rubiginosum. Quin etiam de tractatione virgule nos admonent, vt digitos leniter non stringamus, neque comprimamus acriter: nam si leniter tangerimus virgulam, decider, inquit, antequam vis venarum eam verset: sin acriter constringemus, vis manuum vi venarum resistet, & eam superabit. Itaque, vt ipsi censent: quinque res sunt necessariæ ad hoc, vt virgula suum faciat officium: quarum prima est, virgule quantitas: vis enim venarum baculum nimis magnū volvere nequit: altera virgule figura, nam nisi sarcata fuerit, eadem vis eam uertere non potest: tertia vis venarum, quæ naturam voluendi habet: quarta virgule tractatio: quinta priuatio proprietates occultæ. Ex iam dictis autem solent concludere hoc modo. Si quoddam virgula omnibus non moueatur, in causa est ineptia eius tractatio, aut occulta hominis proprietates, quæ vi venarum repugnat & obstitit, vt supra diximus, qui venas ipsas querunt non necesse habent id cautionibus facere, sed satis est eos virgulam aptè tractare posse, & occulta proprietates carere. Virgula igitur in inueniendis venis viro bono grauique vsui esse potest. Verum de ramis arborum contortis plura non dicunt isti, sed manent in sententia.

Cum autem hæc res controuersa sit inter metallicos, ea suis ponderibus, examinanda. Virgula diuina, qua incantatores scrutantur venas, vt annulis etiam, speculis, crystallis quamuis forma sarcæ figurari possit, nihil tamen

*Furca
luna.*

*Modus
re-
nendi
vir-
gam*

*Tractatio
causa*

*Asserunt
parum
re-
spon-
dere*

*Impossi-
bile
subter-
fugum*

*Causa
fa-
cta in
re-
nendi
vir-
gula*

*Quinque
re-
cessaria
ad usum
virgule*

*Res trian-
mam cer-
tamen-
ta*

*inter me-
tallum*

ad

Nihil con-
ferre figu-
ram
Virgula &
huius apud
Veteres
multiplex
exempla de-
scriptur
Virgula &
fig.
Virgula &
fig.

ad rem interest, recta sit, an in aliam figuram formata: non enim valet virgule figura, sed incantamenta carminum, quæ mihi commemorata non habet neque libet. Veteres autem, non ea modo quæ ad victum & cultum attinent, virgula diuina conquisiuerunt, sed rerum etiam formas venterunt: etenim incantatores Ægyptiorum virgas, ut Hæbreorum litteræ narrant, in serpentes mutarunt: & apud Homerum Minerva senem Vlysses virgula diuina repente in iunonem conuertit, ac rursus restituit in senem. Circe quoque socios Vlyssis mutat in bestias, eisque reddit hominis effigiem: quinetiam Mercurius virga, quæ caduceus appellatur, vigilantibus somnium dat, ac à somno excitat dormientes. Itaque virgula diuina primò ex incantatorum impuris fontibus defluxisse videtur in metalla: deinde cum viri boni abhorrent ab incantamentis carminum eaque teneant, virgula à simplici metallicorum vulgo est retenta, & in querendis venis vestigia antiqui usus remanserunt.

Quomodo
ad metalla
translata
Motionis
Virgula
causa
Nam trahit.
Venas non
trahere
perferendo

Quoniam verò metallicorum virgulæ mouentur, etiam si eas incantare non solent, alii dicunt, motionis earum causam esse vim venarum, alii iactationem, alii utramque. Verùm quæ vi ad se attrahendi prædita sunt, ea omnia in orbem non torquent res, sed eas ad se alliciunt, verbi gratia: magnes ferum non voluit, sed id ad se trahit: & succinum attritu concaléfactum non vertit paleas, sed simpliciter eas ad se allicit. Similiter vis venarum, si eandem cum Magnete aut succino naturam haberet. virgulam toties non versaret, sed semel tantummodo ad spatium semicirculi versatum recta ad se traheret, & nisi compressio hominis qui virgulam teneret in manibus ipsi venarum vi resisteret & repugnaret, virgulam ferret ad terram: quod cum non fiat, necesse est sequitur tractionem esse causam motionis virgulæ. Id verò hinc etiam perspicuum est quòd callidi isti tractatores rectam virgulam non capiunt, sed fureatam, atque eam celerem, aut aliquam aliam ita flexibilem, ut si sic teneretur in manibus, ut eam tenere solent, omni homini, quocunque in loco steterit, in orbem vertatur: nec mirum si virgula non versatur cum inertes eam tenent. Etenim eius cornua acriter comprimunt, aut leniter strungunt: hoc autem ipsum vulgo metallicorum fidei facit, virgulam venas inueniri, quod ea videntes casu aliquas inueniunt, sed inde multo sapientius perdunt operam, & ut venas inuenire possint, nihilo minus in fossis agendis defutigantur, quam aduersæ partis metallici. Metallicus igitur, quia cum virum bonum & grauem esse volumus, virgula incantata non vitur, quia rerum naturæ peritus & prudens, fureatam intelligit sibi vlti non esse, sed habet naturalia venarum signa, quæ obseruat. Itaque ea si natura

Tractatio-
nem esse
causam
motionis
Virgula
Causa furea-
tam sumit
columnam
Proba qua-
rendi mi-
neram ratio

vel casus, aliquo in loco, ad fodiendum apto, patet fecit, ibi Metallicus agit fossas, si non ostendit, crebris fossionibus usque eo scrutatur locum, quoad venam crudatam reperit.

Vir bonus
et non
vir.

Schuyvenckfeldius nem paucis comprehendit: Vulgus, inquiens, Metallicorum ad virgulam Diuinam, ut vocant, qua venas Metallorum inquit, præceteris fuream eligit columnam, verùm cum ex impuris fontibus incantatorum primò in Metalla defluxerit, Metallicus, utpote vir bonus, & gradis ac naturæ peritus, ea non vitur, sed alia naturalia signa venarum obseruat. Verè ac rectè & per omnia Agricola iudicio consentiens. Enimverò tam plerisque vii virgulam, nulla quidem Magica arte, vel bonæ (cuius ne nomen

quidem nouerint) vel mala imbutos existimamus. Sed ex mera quadam impostura, ac spe lucrandi, hoc est, decipiendi Magnates ac Principes, quibus persuadeant hoc furo ut nummos suppedient ad perquirenda metalla. Sunt enim & hi, nocturnæ ad aucupia crumenarum, è quibus autem, quod pollicentur ipsis, sibi effodiant prius. Talem aliquando vidimus & deprehendimus in insigni quodam & extra pudorem impostore, qui Ill. Exc. C. V. Viri. Principi nostro ac Patrono clementissimo multa vanitatis plena persuadere conatus fuerat, ut suppedicaret argentum & aurum, ad vestiganda effodiendaque illa. Vidimus, didicimus & probè scimus: Solent isti manu utraque in pugnum contracta, furcam hanc Columnam præhendere, angulo farsum spectante, & utroque radio ex apprehensione reflexo. (eam autem præferunt quidam, cuius alter ramus cum capite & angulo eiusdem anni, bimulus, alter vero statim post angulum nouit us & proximi anni, solus, & integer sit situs.) Ita vagantes per loca, metallis (si credere sis est) vel opportuna vel prægnantia, velut in æquilibrio, sito prædicto, virgulam continent ubi voluit, nullo manifesto motu premunt vel laxant, utraque enim ferè modo declinare solet si vatrè tractetur, tum à metallis tractum insigni impudenter tamen timentur. Tenemus & ipsi modo nunc: (nam ut imposturam detegas, imposturam dallas licet, quod nemo temerè fraudem detegat, nisi qui eandem prius nouerit) sed inter nostras manus nullus motus aut tractio inuoluntaria, vel subiecto auro & argento, consecuta. Ita dextrè possimus tenere, vel poplitis regere virgulam, ut in æquilibrio maneat, nec tamen vi teneatur vlla, si adit vis aliqua, vel leuissima, quominus attrahit. Possimus etiam, nemine id deprehendente, facere, quod illi faciunt, ut allici aut trahi à quodam subiecto metallo videatur. Sed malè fortè nobiscum actum existimabunt, quod vel Magica arte, (qui eam ad hanc rem postulant) vel sympathia illa metallifica destituamur. Quibus confutandis, & ad turpitudinem, si verecundiam nesciant, redigendis, vel hæc sufficiant rationes. Aut vis trahendi primaria est in metallis, aut in virgula accedendi. Vbiunque sit, ibi certum est, primum esse motionis principium: mouens seu agens, in mouento: patiens in moto. Rursus eadem vel sufficiens, vel non. Si sufficiens, quid opus hominis sympathia, aut Magica arte? Quamuis, ut ingenuè fateamur, consensum adesse oporteat, tam ad laxandam virgulam, quam ad aucupandum sumptus non necessarios, quod paucis melius dixeris, ad decipiendum. Si non sufficiens: Ergo iam inter hominem & metallum cognatio quædam. Est, est, pro dolor, & maximus inter utrumque consensus, quo nisi fascinata essent maximorum & ingeniosissimorum alioqui Principum ingenia, eiusmodi nebulorum, patibulo dignorum, arte aut experimento ferè vel nunquam deciperentur: docerentque tandem istos lucrpetas nequitias suas exuere, quibus sine opprobrio furti, interim etiam sine virtute, honores atque diuitias licet indagare atque consequi.

Virgula
conditio
melioris

Impostura
in visis
et clare
deceatur.

Ludovicus


STAPHYLODENDRON.

CAP. XVII.

Descriptio

Folia

Flores



Staphylo-dendron dense fruticat, nonnūquam in arborem adolefcens, cortice virente aut ruffo, materie virenti, medulla ampla, alba, molli. Folia Sambucinis proxima, vel Fraxini, acuminata, argutè crenata, quina aut septena ad costam annexa, impari alà claudente. Flores longo & pedulo pediculi ex intervallis verticillatim oriuntur, ita vt

eminus intuenti racemulum mentiantur, odore Sambuci, quinis folus radiatim expansis, albis, mucrone nonnihil interdum foris rubente, totidemque candidis, item surrectis, coeuntibus leuiter mucronibus, vt concavam viceoli figuram exprimere poffe videantur, quæ intercedunt totidem stamina alba, apicibus luteis donata, mediū occupante stylo albidio, bifido. Superueniunt veficæ magnæ virentes, in duos loculos ceu ferotum difperitæ, in quibus duæ nucleæ coherentes, putamine fragili & tenui, colore flauo aut rubuffo, in quibus nucleæ corio virefcente obtectæ, sapore nonnihil naufeofo. Ex nucleis caluariæ commodè exprimi poffunt, fculptura leni.

Staphylo-dendron.

De eadem fic fcribit Plin. Est & trans Alpes arbor, fimillima Aceri albo materie, quæ vocatur Staphylo-dendron. Fert fiquas, & in iis nucleos, faporis Nucis Auellane.

Ruell. n.

Ruell. de Colutea altera Theophrast. tradens, hanc Plinio ait, Staphylo-dendron dici exiffimant. Quæ interim fit Staphylo-dendros aut qualis non docet Ruellius. Curtius quoque nihil aliud habet, præter ea quæ dicta à Ruellio.

Pistacia.

Staphylo-dendron.

Quidam, vt fcribit Tragus, fub Pistaciis Dioscor. comprehenfæ volunt nuculas, arboremque ipfū Staphylo-dendron Plinii vocant. Verū cum Plin. Staphylo-dendron fiquas ferre dicat, hæc verò Veficæ gerat, non video (inquit) quo iure ex Nuce Veficaria Staphylo-dendron hi faciant, nifi fortè per fiquas, veficæ intelligere velint, quod per nos quidem illis licebit. Nos tamen in præfentia Nuccæ Veficariæ & folliculæ res nuncupabimus, quoad emergat aliquis qui certiore nos doceat nomenclaturam. Ex quibus verbis patet Tragum quodammodo hæfiffie an Staphylo-dendron Plinii fit hæc de qua agimus. Difficultas quam obicit, levis eft, fiquæ vocè ampliore fignificatu, pro folliculo vel veficula Plinio vfurpante.

At Scal. Apud Iefuates nostros, inquit, arbor eft, è qua virga pæta, & adoleuit celerrimè, & effufis ftolonibus frequentiffimam circa fe confecti fyluam. Enodis, fi quæ alia, oliuz folio fim-

plia, aut Salicis frondi proximo. Eramis folliculū, qualem Halicacabus, durum tamen. In eo fructus conduntur bini, terniue, efculenti, natura, colore, fapore Pistaciorum, fed orbiculati facie. Quare qui Pistacii arborem ignotam habet: ex hac Pistaciorum medullam elatam: an fit iam ad Pistaciorum fpecies referenda, non ambigam. Idem paulò antè [extat autem locus lib. i. de Plac. falfo Arist. tributus] Pistaciis vefigia effe fcribit, quæ per feipfa hient aliquando vetuftate: Ne hac in parte Plinii fequatur errorem, qui folius Iuglandis nucleum binis tegi valuis fcripfit, additque Pistacii arborem fibi nunquam vilam.

Scaligerum equidem vt virum doctum atque adeo fummi acuminis admiramur, & ab eius lectione non raro doctiores redire nos profitemur: quando verò tam leui de caufa Plinium, grauem antiquum ac venerandum autorem, virum, in qua n. ob fummos labores & diligentiam, præfertim feculo quo fcripfit, omnibus admirandum, taxat atque adeo erroris accusat, vt folet aliàs, hoc loco id impudè non feret, maximè cum ipfe met talpa cecior loco citato grauiffimos committat errores. Primū enodis an fit iudicabunt quibus primò occurret vilenda planta. Iam verò, quæ obfecro Staphylo-dendri folio fimilitudo cum oliuz aut falicis. Quin nec harum fanè ea fimilitudo, vt vtræque vni eidemque rei, conferri mereantur, aut à fubtilitatis adeo profeffore debeant. Melius videntur Tragus & Matthiol. Fraxini foliis comparaffe. Natura, color & fapor, Staphylo-dendri fructui diuerfus à Pistaciis quibus putamè fragile tenui membrana [virenti fortè in vilente] immediatè obductum atque adhærefcens. Staphylo-dendri fructus in amplo & rotundo refidet folliculo, umbilicotenus tantū adhærens, hoc eft, bafi, vt columna quædam in theatro aliquo conftituta. Staphylo-dendri fructus fufci Trago, & recentes rufi, Pistacia candidiffima Cordo, vel fanè pallidula ex albo. At nucleæ plurimū differunt: Pistaciis quidem nucleus colore in flauo virefcens, valdè fuaui, tenuis [tefte Cordo] oris halitum commendās: Staphyl. albus, qui Matthiol. fapore dulci naufeam commouens dicitur. Sed fortè pro Scaligero quis obicit nobis, cum non fcribere de Staphylo-dendro, fed de alia planta: quod nobis non fit vefiffimè, neque perluaderi nobis patiemur vnquam donec prodeat aliquis, qui doceat, quam aliam intelligat. Cætera quæ fcribit de fua Pistacia arbore omnia noftre conueniunt Staphylo-dendro. Gefn. Nux Veficaria, Staphylo-dendron Plin. Itali quidam, vt Roma, vocant Sambucum validam.

Staphylo-dendron, Arbor viris, Anguil. Rob. & Pen. Aduerf. an Staphylo-dendron Plin. vt quidā volunt, qui tamen Aceris folium dicunt. In Oblitamen, apertè Staphyl. Plin. vocant. Lectori verò confiderandum relinquimus vbinam locorum fuo Staphylo-dendro Plinius tribuit Aceris folium. In loco fanè citato de ligno locutum intelligimus. Quæcebono fcribenti, de Coulcoul & Hebulben nil dum certi, fe intelligere potuiffe, refpondet Matthiol. Nucleum quem Coulcoul & Hebulben appellat, Arbor Plin. Staphylo-dendron. Nobis verò non conftat an Quæcebonus idem putarit quod Matthiol. nimirum Coulcoul & Hebulben idem effe, nec etiam quo nōmine miferit nucleos Matthiolo. Ex Bellonio fanè manifefturn eft Hebulben rem effe diuerfam à Coulcoul. Descriptio Nucis Coulcoul apud Bellon. nullo modo potest conuenire cum noftro Staphylo-dendro. Hebulben non defcribit.

Idem

Pistacia agrestia. Pistachium.
Idem Match. apud Diosc. scribit, quibusdam in locis Pistaciorum sylvest. nomine appellatur. Quam arboris fructum, quam Plin. Staphylodendron, nominat. Et in Epitom. Staphylodendron, sive Pistacia agrestia. Nux vesicaria, Neoterici quibusdam Pistachium, Dodon. Staphylodendron Plin. eidem.

Vesicaria follicularia.
Loniceri iudicio posset vocari Vesicaria aut F. follicularia. Pistachia vulgaris Cast. Dur. Staphyl. Plin. Pistacea silvestris quibusdam dicta; atque videtur Aceri & Fraxino. Casalp. Ex Plinii verbis falsum esse perspicitur, quod multi contendunt, Staphylodendron istud Plin. Colyteam esse Theophr. quæ folio est Salicis &c. Hist. Lugdun. Staphylodendron vocat sicut & Camerar. & Tab. & reliquum sicut Herbariorum vulgus. æquæ ædificæ quibusdam.

Germ. Pimpernussbaum/pimpernussile, wilde pimpernussle. Belg. Amucnis noctens, pimpernote. Gal. Nez coupé, Baguandes à patenôtes. It. in Abruzzo, Lagrime di Ioppe, teste Anguil. aliis in locis Pistachis saluatis. Boh. Hlocha Hung. Haliagfa.

Locus.
Nux vesicaria videtur vdis & humidis gaudere locis. Nam Basilæ extra portam Albanam & Rhenaniam ad aquas nascitur. Ibidem pulchra arbor in horto Cœnobii Cathusianorum. Scaliger quoque ait apud suos lesuates arborem provenisse. Gesn. testatur provenire in agro Tigurino in sepibus: quamvis rara locis humidioribus: frequentior circa Arouiâ Helvetiarum oppidum. Anguil. dicit haberi Patavii in horto, ac in multis Italici locis. Dodon. Germania infer. interdum in sepibus inveniri. Genevæ & Lugdun. hortis colitur. Ferratæ in Monasterio S. Dominici à l'Angels. Bononiæ in horto S. Salvatoris. Inter Solodurum & VVallenburgum quoque sponte provenientem observavimus. Matth. tradit crescere in sylvis & frutibus. Habetur in horto Montb. E. C. à nobis lata.

Tempus.
Floret Maio. Nuculas maturat Autumno, mensē Septembri.

Satio.
Facillimè seritur & propagatur. Tragus annotat, quocunque in loco plantetur, facillè provenire. Seritur autem nuculis, nec non surculis, seu stolonibus qui quotannis à radice profiliunt circa radicem, sicut in Cotonea. Hi surculi Autumno aut Vere instante transplantari possunt, quæ ratione à nobis lata egregiè adolevit.


Vires Vitis.
Sunt qui sibi persuadent, in hortis satam arce te venenata animalia. II nuculis multis in locis orbiculos precarios conficiunt, præsertim pimperes, aut qui nummis parere volunt. Fructus dulcis nauseam commouet, ut si copiosè edatur, ex Matth. sententia, indubiè vomitionem commovere possit.

PISTACIA.

CAP. XVIII.

Pistaciorum arbor.

Descriptio.
VT Auellanz alio tegumento obducuntur à nucibus, sic Pistacia ab Auellanis diverso, quorum arbor in longa costa è ramis propagata, folia coniugata disposita habet, quanquam non videntur adeo exactè semper respondeant singulorum foliorum ortis. Sunt ea verò nunc subrotunda, nunc in mucronem acuminata, nervosa, Terebinthi foliis, nisi iis maiora essent, similia. Fructus Officinis notissimi, Auellanz magnitu-



dine, oblongi, acuminati, una parte in gibbum cristatum eminentiorem protuberantes, altera depressiori, in acutum fastigiatum, opposita parte, qua pediculi, quo adhererent, vestigium, obtusum, lignosum, lento, fractu contumaci ac propemodum inter-ossu & crustaceum medio cortice, sed tenui, levi, candido, cui rugosus alius, ac ferè aridus, coriaceus, tenuis, & fragilis, super sternitur, colore supermo Amygdalæ putamini similis, in exoletis niger. Lignosus cortex nucum modo in duas partes separari solet, interdum sua sponte hians. Nucleum continent rufâ pellicula conuestitum, in flano virentem, dulcedinis suavisimæ, pinguem, huiusmodi masticatu commendantes, præsertim recentiores. Flores, ut perhibent Adversaria racemosi, purpurantes, Terebinthi.

Rauvolf. tradit Pistachiarum arbores circa Alepum truncos esse crasso, ramis expansis, cortice obductis cinereo, specie his rotundis foliis, (qualia & pingit in sua icona,) saturè virentibus, illorum Charnubi (id est Siliquis) similibus, iuxta quæ dependent multæ nucleæ racematim dispositæ.

Plin. & Græcis, ut apud Nicander. in Theriac. apud Diosc. Galenum, & alios καπνὸς τῆς πικρίας, Alciphroni. Dioscor. Pistacia similia Pineis nucibus (τρεβιάνθης) dicit. Nicander eidem germina Amygdali tribuit, locumque natalem ducet.

ἰσχυρὸν ὡς ἰσχυρὸν χυμὸς πικρὸς οὗτος ὁ δένδρον πικρὰ ἀπὸ τῆς οὐσίας αὐτοῦ δαλνύει πικρῶτα. Sunt tamen qui ἰσχυρὸν apud eundem Nicander legant, ut Dodon. & alii. Sensus est: quæcunque sub Induæ murmurantis Choaspi fluxum Pistacia cum geminibus suis Amygdalis similia videntur. Vnde Marcellus suspicatur, quoniam apud Diosc. πικρία τῆς οὐσίας αὐτοῦ δένδρον ὡς οὗτος ὁ δένδρον πικρὰ ἀπὸ τῆς οὐσίας αὐτοῦ δαλνύει πικρῶτα: quæ verò in India apud Choaspi proueniunt, Amygdalis sunt similia. Marcellus pro τῆς οὐσίας, ἰσχυρὸν legendum censet, id est, nouimus: quam veram & antiquam huius loci lectionem putat, facillimèque fuisse in vna tantum syllaba ad vitium lapsam. Sed huic difficultati iam consultum ex vet. codice, in quo, teste Sarac. legitur: πικρία τῆς οὐσίας αὐτοῦ δένδρον ὡς οὗτος ὁ δένδρον πικρὰ ἀπὸ τῆς οὐσίας αὐτοῦ δαλνύει πικρῶτα. Sic sensus integer est, si vera sit lectio: quæ si alicui fortè non sapiat, suspicari etiamnum possit, speciem aliquam apud Diosc. omittam, quod & Pallad. duas faciat, ut dicetur, aut recurrere ad priorem lectionem.

In Nucum genere Pistacia nota, inquit Plinius. Hermol. scribit Venetiis hanc Iudaico vico satum feminis enatam vidisse, folio maiore, quàm Lentisci. Nicander Colophonius Pistacia (πικρία) vocauit, & alius Nicander, ut idem Hermol. testatur, Phistacia, sunt qui Pistacia (πικρία) ut Posidonius. Inuenitur & Pistacia scriptum in Poëtis.

Cortex.

Nucleus.

Flos.

Autotum placita & Synonyma.

Pistacia.

Diosc. illud.

Diosc. loci, emend. ex Nicand.

Pistacia. Phistacia. Pistacia. Pistacia.

Fistulas. Bohem. Pistacia. Angl. Pistaces & Pistiles.

differentia

M. & F. Pistacia.

Locus.

Præter foliorum varietatem, qua vel natura ludat, vel autores decipiuntur, si non sit speciei quædam varietas atque distinctio, vnicus, quod nobis quidem constat, Palladius cum Damogero te Maris & Fœminæ differentiam agnoscit. Maris, inquit, dicunt, cui sub Corio velut osei videntur latere testiculi: quibus verbis quid sibi velit fatemur nos nescire. Omnes enim fructus Pistaciorum, qui ad nos importantur, inter se sunt similes. Staphylo dendro quidem fructus geminus intra corium latitat velut testiculi, non tamen Pistaciam, marem dicimus.

Pistacia ex sententia Palladii, amat locum calidum, sed humectum, & rigatione gaudet & Sole. Hæc autem tradente Diosc. in Syria nascitur, vbi & Galen. vberius nasci testatur, præsertim versus Alexandriam earum esse feracem, sed in primis Berthæam oppidum Syriæ. Hanc L. Vitellius, qui censor fuit, in Italiam primus intulit in Syria, cum Legatus in ea Prouincia fuisset, nouissimis Tiberi Cæs. temporibus: simulque in Hispaniam Flaccus Pompeius, eques Romanus, qui cum eo militabat, auctore Plin. qui & Syriam peculiare habere scribit arbores. Nicander in India apud Choasphum annem Pistacia nasci. supra citatis verbis testatur. Ruell. in Parisiensi agro, in ædibus sacris D. Maris fati seminis enatam vidit. Bruyer. in quædam Gallia quibusdam satis vidit arbores, sed haud temere peruenire dicit ad maturitatem: ita nec in Gallia Narb. obuiam eam arborem quamquam cælem solumque habeat huiusmodi arboribus aptum.

Rauvolf. narrat, cum tenderet ex Tripoli ad urbem Damasci & Halepum, vidisse circa urbem Sermin sylvas arborum Pistachiorum, quæ ibi coaduerantur, & Tripolim deportantur, vbi nostris mercatoribus venduntur. Secus vias quoque obseruasse, potissimum in vico Basilo. Circa Halepum quoque vulgatam admodum esse. Arborem qualem in hortis italicis vidisse Lobel. scribit, etiamque in horto Pharmacopœi ad Londini in Angliam mœnia, prorsum [inquit] dicas Terebinthum. Colunt in Italia & Galloprovinciæ locis quibusdam, sed maturitatem non assequuntur. Angull. in Italia pronenire tradit, sed fructum non ita bonum, ut in Aegypto & Syria. Proueniunt & in Sicilia in Agrigentino, ut refert Cæsalp. Vt Matth. Pistacia quorum est communis in Olfus. ex Persia, Arabia & Syria Venetias importari solent. Horum arbores [addit] Venetis, Caletæ, Neapoli, & in aliis italicis locis videmus. Quidam doctus vir perhibuit, sibi demonstratam in hortis Cathusianorum Parisiensium. Lugdun. vidimus arborem per aliquot annos durantem, vbi etiam fructus tulisse, testatur Hist. Logd. Item Genevæ quondam visa nobis in quodam horto. Fructum qualis copiose Lugdunum importari solet, aliquoties terræ commisimus in horto Montb. sed frustra. Ramos bimos habemus, alterum Lutetia collectum in horto Robini insignis Botanici regii: alterum cum fructibus satis magnis: vnde acceperimus, non amplius recordamur.

Satio.

Serendi modus.

Pistacia ex sententia Pallad. feruntur Autumno & mense Octobris sobole, & nucibus suis. Sed melius ipsa Pistacia iuncta ponuntur mas & fœmina. Qui diligentiùs facere voluerit, pertusos calyculos, & stercoreata terra repletos parabit, & in his Pistacia terna constituet, ut ex omnibus germen quodcunque procedat: quod vbi conualuerit.

Tom. I.

ut planta, hinc faciliùs transferatur, mense Februario.

Diophranes nucem integram, suisque putaminibus illasam, ac ne deliquammatam quidem plantandam præcipit. Damageron circa Cal. April. serebat, maris & fœminæ coniuncto matrimonio, sed ita ut maris dorsum ad Fauonium spectaret. Sic enim naturis coniunctis largiorem fructum, ut ille promittit, producent.

Inferitur & eodem tempore, & in sui generis arbores, & in Terebintho, & viderem existimat, Amygdalo.

Paxamus iubet scrobes priùs faciendos esse locis apricis, & optimè insolatis, probè sobactos, & accipiendos arborum stolones aut viuitadices nouellas, vegetas, easque vnà colligatas in scrobem demergendas, Luna secunda, terræque in ambitum accumulata scrobiculos adimplendos, & sufficienti stercoreatione pastinandos. Sed operam dandam, ut octonis diebus rigentur, & de nouo rursus constringantur. Postquam verò triennales facti fuerint caudices, ablaqueatione facta, effossisque scrobibus finum adiciendum, & impulsio altius trunco, aggeve vndique probè muniendos, ut cum arbor in vastam exiret proceritatem firmius stet, aduersus ventorum impetus.

Didymus in Georgicis suis quoque ait Pistacion in Amygdalum inferi. Et Pallad. inferi Terebintho tradit mense Febr. vel Martio: at secundum alios & Amygdalo inferi posse, de qua re hos fecit verius.

Quin & Amygdaleas subuenit Pistacia ramos.

Et debentur maius de breuitate petunt.

Hæc & cognatocingens Terebinthus amittit.

Nutrit adaptat & v. bilis anda c. mis.

De repositione insitiores eorum locorum, vbi prout nunt, aut qui aduehant curiosi sunt. Nobis sufficit hoc loco de delectu aliquid dixisse. Ergo deligantur maiora, ponderosiora, & candidissima, quæque aded sua sponte modicè dehiscent, nucleum recentem, non rugosum neque rancidum continentia. Nam quæ ab his notis recedunt, aut inutilia, aut certè parum grata minusque proficua sunt. Possunt tamen & ista conditionibus sugillata curantibus immisceri, ex iudicio Cordi. Syluius recentia eligi suadet, nucleo intus herbaceo, sapore iuteudo. In crustantur à seplasiariis saccharo, sed perit vetustate gratia: rancida enim ut cætera nuges fiunt.

Pistacia Dioscor. stomacho grata sunt. Eadem siue edantur, siue trita in vino bibantur, aduersus reptilium bestiarum morsus opem ferunt, quod posterius & Plin. confirmat: alioqui eisdem vsus & effectus habere quos Pinei nuclei. Fructus Pistaciæ, ut scribit Gal. quodammodo tenuioris essentia est, subamarum quid & odoratum habens. Obstructiones itaque liberat, sed maxime iecoris, veruntamen etiam thoracis pulmonis. Et alibi: parum quidem nutriunt, verum ad hepar roborandum, & succos in ipsius viis infarctos purgandos viles sunt: qualitatem enim habent aromaticam, subamaram & subadstringentem. Porro non ausim affirmare vllam ex ipsis stomacho accedere vtilitatem aut læsionem insignem: quemadmodum neque quodd alium deiciant, aut sistant. Et in lib. de med. expertis Galeno falsò attributo. Decoctio Fisticæ confortat stomachum, & mundificat canales pulmonis & hepatis. At nos nullas eiusmodi vires in cortice deprehendimus, nisi fortè sint in extimo recentium, antequam ad nos aduehantur, aut in cortice arboris iudem recenti. Sic de Dynamis.

AA

diis eidem attributi opusculo Fisticorum sit mentio in Antidoto ad Lumborum dolorem, & frangendos lapides, & ut lumbi pinguecant.

Gal. in Antidoto. Ceterum consideret hoc loco Lector insignem Gal. modestiā & in tradendis suis scriptis posteritati prudentiam integritatemque, qui ne nobis imponeret, nihil in expertum literis mandare voluit. Non audeat uti vides affirmare, an stomacho profint vel obfint: aluūmne moueant, an cohibeant, ut vel hinc conici, immo quasi sciri possit, non nisi assidua experientia cum fide explorata, ne vitam salutaribus fraudaret, prodidisse.

Tantò magis ridendi neotericorum multi, qui vix cognita pro certis experimentis produunt, sacū potius simplicibus, quàm commodum Republicæ medicæ præstantes: de quorum perfidia vel vanitate aliquando ridebit posteritas. Paulus Aegineta Galeno posterior, moderatè grata stomacho censuit, easdemque vires obtinere Amygdalis, in expurgandis visceribus atque thorace: præstantiora verò in leuandis iecinoris anfractibus.

*Aluūm Pi-
staciorum.* Actius tenuioris esse substantiæ, & cætera Galeno confimiliter scripsit. Simeon Sethi ait parum nutrire: reliqua quæ habet iam dicta sunt, nisi quidd addat, oleum quod ex Pistaciis confectum est, conferre pectori, renibus & pulmōni.

*Temperamentum.
Hepar.* Anic. scribit: Fistici calidiores sunt quàm Nux & Amygdala, suntque calidi in fine secundi, cū aliqua humiditate. Quidam perperam existimant frigidos esse. Hepatis obstructions & partium nutritioni dicatarum liberant, propter suam amaritudinem & vim aromaticam, conferuntque stomacho.

*Stomachus.
Nausea.
Vomitum.* Oleum eorum prodest in dolore hepatis ab ossarctu succi crassi & pituosi: arceat nauseam & vomitum, & confortat os stomachi.

Cordiale. Alium nec soluit, nec retinet: habent tamen viscidum quandam & aromaticam adstrictionem, propter quam tradunt exhilarare cor idque corroborare: eaque propter inter theriacales medicinas connumerantur.

*Venerem
excitant.* Amato teste, Venerem stimulant, & apprimè nutriunt, quibus de causis hodiè bellariis instaurantibus & reficientibus *αἰσθητικαί* Græcis dictis commiscuntur, tam ab Hispanis quàm ab Italis & Gallis medicis.

*Præstantif-
sime fru-
ctuum.
Cor Vene-
rem stimu-
lent in quæ-
situm.* Rabbinus Moses de Aegypto ex omnibus fructibus Fisticos præstantissimos æstimat. Non abs re miratur Alois. Mundella, cur Trallianus lib. 3. cap. de Dysenteria ex frigida hepatis intemperie facta ita illa damnet, ut certissimè putredini obnoxia, & in bilem conueri, ideoque summè in morbo vitanda, maximè cū Gal. exprobet ad Iecur refocillandum & tum ipse tum plerique alii Stomachica dicant. Illud quoque dubio non caret, quæ ratione Venerem stimulare credantur, cū modici alimentum perhibeantur à Gal. neque flatum gesserare constet, neque humida esse, cuiusmodi solent esse ea, quæ Venerem prouocant & incendunt. Generant siquidem semen, quæ vel probè nutriunt, vel tota substantia familiaria sūt, vel acrimonia aliquā incitant, vel denique flatu generant. At horum neutrum manifestè in Pistaciis deprehenditur, nisi quis fortè velit substantiæ proprietatem id præstare, credere, eandemque uti tanquam portitore aromatica illa qualitate, & fortè etiam plus nutrire, quàm vulgò credatur. Nam siquidem restaurantibus accenseantur, talia autem optimè nutrant, & quæ optimè nutriunt, semen prolificum quoque gignant, certum est & hac vi, & insuper suo calore & vegeto, nec nimio tamen, & fortè etiam substantiæ similitudine Venerem ciere posse. Hæc propter medicinæ con-

ditatos: alioqui in historia potius *αἰσθητικαί*, quàm *πρὸς τὸν τραχυνδὸν* scimus, & ab omni disputationis ambitu non necessario sibi temperandum esse.

Venerem. Matth. quoque à medicis ad conciliandam Venerem, & ad pinguedinem inducendam macie & Marasmo affectis, commendari tradit. Perperam facere Pharmacopæos qui odoratam cuticulam nucleis detractam abiciunt: inesse enim huic cuticulæ vim quandam sensim constringendi, & viscera corroborandi. Pistaceorum oleum potum dolores internos sedare, quibus origo sit à pituita viscida & flatibus. Idem prodesse contra spasmū & Paralytin, & interno vlu facere ad generationem.

*Putaminis
Succus.
Arteria
secta.
Albacasis
et Dactylus.
Tartarum
eius.* Dalechamp. in 6. lib. Paul. Aegin. cap. 40. Si fortè [inquit] in sectione venæ basilicæ vulnere-
retur subiecta arteria, Albucasis putaminis Pistacii fissi partem mediam [ut cui vis sit adstrictoria] superponi iubet cum plagellis & ligatura, itaque dimittendum in diem insequentem. At nobis profectò non placet Albucasis medicamentum hoc: non enim tanta adstrictio cortici, ut multum præstare possit ea ratione impositus: præterea cautitas eius exitum præbere videtur sanguini arterioso, non benè comprimendo arteriam, quod Dalech. annotare debuisset.

Rauuolff. refert in Halepi ultimis locis Aethiopes verno tempore recentes colligere turiones, priusquam se explicent folia, eisdemque in acetariis præparare, sicut nos asparagos. Finiamus Pistaciorum vices hoc Fieræ Distycho.

Ignis Nuxes superat, renes iuuat, & Iecur humens

Pistaceum hoc stomachi Cæna senilis amat.

TEREBINTHVS INDICA MAIOR

FRUCTV ROTVNDV.

CAP. XIX.



Terebinthū Indicam cū Theophrast. plerique existimant esse Pistaciam arborem ut patuit cap. præcedenti. Huius porro Terebinthi Indicæ nucleæ Pistaciis bonitate non cedunt, in quibus præter saporem salum, inest mediocris quædam siccitas. Pistacis etiam satis similes, sed breuiores & rotundiores, extracem pendunt ut illa, vel potius ut baccæ Terebinthi,

pro qua etiam nonnullis habentur, potissimum quia arbores suis maximè foliis longiusculis Terebinthi foliis satis similes, quæ notè faciliè quoque à Pistacia arbore distinguuntur cui folia rotundiora specioraque, ut testatur Rauuolff.

Pistaciæ Indicæ Nicandri præcedenti quidem capite meminimus, adscriptis eius verbis, quæ for-

ad hanc haud temerè quis referat, quòd hæc ipsa
adèd Nicandri Pistacia Indica videt̃ possit.

De sua verò Terebintho Indica sic scribit
Theoph. l. 4. c. 5. Ferunt & Terebinthum in India
haberi, alii similem arborem Terebintho: cui fo-
lia & rami & reliqua omnia Terebintho similia,
fructus autem diuersus, quippe qui similis sit A-
mygdalis. Sed & in Bactris Terebinthum esse, fer-
rèque nuces Amygdalarum magnitudine, ve-
rùm non magnas, sed aspectu similes, & suauitate
Amygdalis etiam præstantiores, & idèd loci illius
homines his potius uti.

Iam antea monuimus hanc Terebinthi Indicæ
descriptionem Theoph. suis bene conuenire Pi-
stacis antè dictis. Verùm eùm in ipsa quoque In-
dia reperitur arbor correspondens, & quæ no-
mine quoque conueniat, malumus hoc loco po-
tius recitare quæ Theoph. de ea scribit, quam e. d. e
Pistacis.

Synonyma Peregrinæ hæc Terebinthi nuxula, auctore
Rauvolfian lunc. Arab. *Batin*, Persis *Terbank*,
Botin quib.


Idem censet maiores has nucas esse *Fael* Se-
rap. Auct. & *Rhalis*, quæ potissimùm in India pro-
ueniunt: & Theoph. Indicam Terebinthum. I-
tem parte quarta, ubi figuram proponit, Indica
Terebinthus Theoph. Arab. *Batin* & *Albatin*.
Germ. *Groß Terebinthen nusslin*. Serap. tract. 4.
Melarugie Albazani & Rhalis auctoribus *Phel*. Pi-
stachiorum aliud genus Rauvolf. Cap. Terebin-
thus Indica 1. Theoph. l. 1. l. 1. l. 1. l. 1.

Locus. Magni *cham* Officinæ & loca vicina abun-
dant Terebinthis Indicis. Copiosè proueniunt in
Agemia aut Persia, Mesopotamia & Armenia.
Rau.

Vires. Melarugie, ut scribit Serap. *Phel* est med. et
calida & sicca: Albazani & Rhalis censet ventosi-
tati hæmorrhoidum.

TEREBINTHVS INDICA FRV- CTV PARVO, AD CORCVIVM accedente.

Descriptio



Locus.

Synonyma

Bel

**Eum sen-
gen**

Vires.
Defluxio.
Fidagria.
Hæmor-
rhoides.


Terebinthin nusslin.

Serap. tract. 2. Eben Amran. Bel est Medicina
Indicæ. Calidum & siccum est in tertio gradu. Con-
fert defluxioni in nervos & articulos, & poda-
græ, semen prolificum augeat Melchar: Prodest et-
iam ventositati hæmorrhoidum.

Tom. I.

TEREBINTHVS.

CAP. XX.



A Rbor est **Descriptio**
Terebin-
thus, sed quæ
Clus. teste, ma-
xima ex parte
fruticat, rami
longis, rami, e-
mreco cortice
tectis, nec et
quidem quan-
tùm animad-
uertimus, flo-
d. s. sup. per hye-
mem tenax. Pri-
mus ferè est flo-
rum verno tẽ-
pore apparuit,
quos è ramu-
lorum tubercu-
lis copiosus in
longo racemo
prodit, interis

Fab.

Folia

ramineis fibris purpurascenibus contextos,
line se explicant in alam filia, quamquam non
semper æquali situ, Laurinis similia, sed magis ob-
tusa, [Pistachis & eiusdem odoris Cl. l.] coniu-
gati in Sorbo nascentia, subrubentia, quæ
crebris obliquis nervulis percurruntur. Fructus
delapsos flores excipiunt, parui, ex rotundo ob-
longi, rubentes, Carpobalsamo Offic. penè simi-
les, resinoso lentore vitædi, nucleum continen-
tes. Pro Carpobalsamo, ab impostoribus inter-
dum diuendi putamus.

Fructus

Observauimus sæpè in Terebintho copiosum
excrementum, visis instar, ut in Vluo: in extre-
mis etiam ramulorum cartilagineæ substantiæ
cornicula rubentia, quatuor, quinque aut
sex digitos longa, aut etiam longiora, quibus
peris lenta salua in conspectum se dat, quæ
manifestè hærent colices parui, alati. Abundat hæc
arbor resinâ.

*Folliculi
Terebinthi*

Cornicula

Beiloonius annotat etiam *Galla* ferè, de quibus
in viribus. Videntur autem Corniculorum tan-
tò primordia esse.

Galla

Terebinthum Theoph. inter *arbores sylvestres*, quæ semper folia habent,
ponit. Eodem auctore, alia mascula est, alia fe-
mina. Masculæ non ferè fructum, idèd [inquit]
matrem nominant. Fæminarum autem alia fru-
ctum protindis rubrum fert, magnitudine Lentis,
qui coqui nequit. alia viridem [χλωρὴ: alii χλω-
ρὴ legunt ut Plin. qui pallidum verit] primò edi-
tum, postea rubentem, & cum vna maturescen-
tem: postremo nigrum, magnitudine Fabæ,
[χλωρὴ χλωρὴ] resinolum. [Dioscorides: Dal. legen-
dum censet *Thyris* fructui simi-
liorem: *Goza* legit *Thyris*, sulphureum: Plin.
verit odore iucundior, quali legisset *Thyris*
quam le. Const. veram putat: sed & vulgata il-
la bona est, & fortasse hæc melior, & inter omnes
optima.] Arbor autem est circa Idam & Macedo-
niam, brevis, fruticosa, contorta. Circa Dama-
scum Syriæ, magna, frequens & pulchra. Mon-
tem enim aiunt inibi admodum magnum Tere-
binthis refertum. Sed in quo nulla alia arbor gi-
gnatur. Materies ei lenta, [χλωρὴ] radices vali-
dæ & profundæ, & tota arbor incorrupta

*Semper
rens.*

differt.

*Theoph. ib.
infr.*

Aa 2

ca vindemias, dum maturuit virentem.

*Padu.
Ryff. me.*

Terebinthus arbor, inquit Ryff. cuius picturam damus, iuxta Monspellulum nascitur, *Padu* appellata. Ast non satis mirari possumus quorundam temeritatem [ut ne quid dicamus grauius] de stirpibus historias compilare audentium, qui nihil minus sunt, quam Botanici, ut ex eorum scriptis facile quibus, & passim deprehendat, vel semestris Herbarius: atque adeo planè incognita sibi prodere non erubescunt, ut eo abierit etiam fingendi licentia, ut falsas pro veris introducere audeant figuras: qualis est Ryffii, nullo modo Terebinthum exprimens, imò, ut existimamus, nullam plantam naturalem. Et tales sunt, qui vulgi manibus trici, exotica, si Dñs placeat descripsisse putantur.

Anguill. ex Theoph. annotat: Terebinthum aliam magnam, aliam esse parvam.

Terebinthus unde dicta

Lob. & Pena de Terebintho sic tradunt. Coccineæ racemorum baculæ aut acini rubelli similes & concolores quadantenus Ciceri nomen Terebintho potuerunt fecisse: nam *ῥιζίνος* Græcè Cicer est. Huius autem semper virentis & perpetuifoliae, nullus collis aut deexus paulò aptior Narbonæ aut Galloprovinciæ non feracissimus, ubi duas folio tenuis discernendas meminimus.

*Differentia
ex foliis
angustifolia
latifolia*

Frequentior quippe est angustiore Lentisci positu (non Fraxini, ut Senensis) colore & habitu, folio duplo maiore. Alteri autem folia multò latiora, rotundiora, vicina Lauro & Pistachia, adeo virentius intuentem fallat. Vix varique eadem, acinulis, quæ in Lentisci, maioribus, coccineis, purpurantibus: demùm ex viridi in cæruleum maturefcentibus, non per inia, (ut putauit radiatus Apollo) si ut Lentisci aut Samachi racemosi, folliculi cartilaginei, teretes, aut conici, angulosi, vel sphaerici: unde cubæ & fuliginoso excremento euolant, succo saluati ad Balsama laudatè effluente. Volatiliores, & aduoltores sunt, a boream proceritatem affectant: & ferro vultu sculis factis, in Valena Sylua Monspellensium, sepius nobis non paucam Terebinthinam exstilarunt lucidam.

Apollo repreh.

Ceterum si reprehendatur Apollo, cur non potius Theophrastus ex quo transcripserit? Hoc sane arguit, Pen. & Lob. non consuluisse Theophrastum, aut eius verba non non recordatos. Quamuis Matth. supra vulgus neququam fuerit in cognitione stirpium versatus, ut ex diuersis eius commentariis, potissimum prioribus, vel leuiter peritis apertum est, veritati tamen studentes, hoc loco à vero neququam deflexisse, ut Pen. & Lob. sibi persuadent, statim. Posuit Lentisci, Terebinthi similis, addamus & Fraxini, quatenus posuit: ut ne quis nodum quærat in scirpo. Coniugata folia ubique magna ex parte, eademque sita & ordine, si impar supremum existimamus (in Lentisco, cui plerumque decit) disposita, ut patet diatarum arborum ramos diligenter conferenti. Notandum verò, eos Terebinthum perpetuifoliam facere: num rectè, ipsi viderint. Cælip. profectò in Italia deciduis esse foliis testatur, quamuis Theoph. inter perpetuè virentes recenseat.

*Diosc. in
curcul.*

Ceterum Diosc. [ut annotat Lob.] dicit: Adulteratur Carpopallamum semine Hyperico simili, quod è Petra oppido deserti: sed minimè ita legendum videtur, quamuis & Plin. ita habeat, sed petra Terebintho. Terebinthi resina ex Arabia Petra deserti assueuerat Dioscor. Apparet Carpopallamum Terebinthi fructu adulterari posse, quemadmodum euenit hodie. Sed in hoc

*Petra Terebinthum
adulteratur
Carpoballamum*

Tom. I.

solum differunt, quod Terebinthi fructus immaturus inanis sit, minùque rotundus, & utraque parte magis acutus.

ῥιζίνος Theoph. Diosc. Polluci & Græcis: Apud Theoph. etiam *ῥιζίνος*, Et Pollux, *ῥιζίνος* autè τὸ *ῥιζίνος* ἐκ τῆς *ῥιζίνος* ἐστὶν ἐκ τῆς *ῥιζίνος*: eius resina *ῥιζίνος* *ῥιζίνος*. Plin. & Latinis atque Herbariis vulgò Terebinthus. Et resina, Terebinthina. Monachi apud Mel. etiam Terminthum, & ab ea Terminthinam resinam dicunt. Arab. *Helcalimbar*, *Albotin*, siue *Barin*, vel *Borin*, aut *Barin* à Rhasi *Haelebalimbar* scribitur. Gluten *Alimbash*, siue *Alimbash*, siue *Alimbach*, seu *Olimbarch*, seu *Alborin*, *Albotin*, idem quod Terebinthiga. Nonnullis Hebræis *Barnen*. Gen. 41. nominatur: Resina iisdem *Zari* Ieremix 51. Gen. 43. teste Lonic. Germ. *Terebinthbaum*. Gal. *Terebinthe*. Ital. *Terebintha*. In Abruzzo comitatu de Roca Scaligna vocatur *Truente*. Romæ Cornucapra: In Patavina ditione Lentisco, teste Anguill. Cornucapram Italici dici propter folliculos cornu similes, annotat Camer. Hisp. Castil. *Cornicabra*: Catal. *Lo abre del pi*. Belg. *Terpentin* est *termenthinboom*.

*Synon.
linguar.*

Lob. duas icones habet, vnam, titulo, Terebinthuseum flore: alteram, Terebinthus maior. Totidem & Tabern. 1. Terebinthus. 2. Terebinthus latifolia.

Cornucapra

Locus

Resina Terebinthi ex Arabia Petra conuehitur. Prouenit tamen etiam in Iudæa, Syria, Cypro, Africa & Cycladibus insulis, auctore Diosc. Plinio verò montes amat Terebinthus. Theoph. tanquam rem miraculo proximam narrat, Terebinthum visam in Olea, & Polypodium vocatum in quibusdam arboribus. Nobis verò non videtur mirabile granum Terebinthi in aliquam causam Oleam incidisse, & ibi germinasse etiamque excreuisse, ut sepius vidimus in Quercubus Salicibus & eiusmodi, alias prouenisse arbores. Mirabilis est in præaltis montibus, ut catrorum vetustissimorum fastigiis, summis montium ac præruptis iugis atque saxis nasci arbores, quales non raro conspiciuntur. Quasi verò non eò delata faciat olim semina, vel per ventum, vel ab avibus, vel ab animalibus etiam quadrupedibus, ut sunt Mures, Sciuri, &c.

*Olea in
Terebintho*

Ceterum lubenter prouenit locis siccis, lapidosis & soli expositis, ut testatur Matth. qui primam se vidisse gloriatur in colle vulgò cognomine *Castel Trento*, non procul à ciuitate Tridenti prope Athesim, à Theoph. historia haudquaquam dissimilem: ipsamque deinde reperisse in aliis compluribus Hetruriae locis, videlicet in collapsis Romanorum ædificiis ac rudibus: sed frequentem admodum in lapidæ collibus, prope Pucinum castrum, Adriatico sinu non longè à Tergesto. Et Bellon. In Creta [inquit] proueniunt. Inter Siderocapsam & urbem de la Cuaile, olim nominatam Bucephalam, sunt monticuli, in quibus Terebinthi non crescunt in magnas arbores, ut sit in Insula Corfu. Sed cum regio rupibus aspera sit, non altiores Corylis proueniunt. Gignuntur & in montibus circa Hierosolymam, circa Libanum: in Cilicia & Syria. Inuenisse se scribit rusticum Arabem ducentem Camelum oneratum seminibus Terebinthi: proximos enim montes referens esse eiusmodi arboribus, ex quibus Gummi colligunt, quod vendendum ferunt Damascum, quod autem in Cairo venditur: adferri ex regione Turcis dicta Asamia, Latini vocant Chalceam, cuius caput Babylon. Turcæ comprehendunt sub Asamia Melopotamiam & Assyriam. Constantinopoli in Officiis

Gummi

vendunt omnes semen viride Terebinthi, & eius resinam, quæ dura est.

Veram Terebinthum, si Thurnisio credamus, hodie etiamnum alit Aegyptus & Tmolus Lydiæ perhibetur & in monte Horeb Libanique syluosis iugis crescere. In agro Romano circa Virgouarum Castellum Vrsinorum sunt Terebinthi altissimi & crassissimi, sicut etiam in Sclauonia supra Zaratium in insula Sala. Sed qui nascuntur in Tuscanæ & Lombardia & in Abruzzo, parui sunt, atque contorti, Angul. Venetiis in Franciscano cœnobio reperitur, & in montibus, prope Veronam & prope Tridentum iuxta Episcopiarceam. In Germania nusquam vel sponte nascitur, vel in vlllo quod Cordus & Gesnerus quidem se (sic aiunt) horto reperitur. Sponte quoque, teste Clus. prouenit plurimis Hisp. & Lusitaniz locis, quemadmodum & Galliz Narbonensis, vbi interdum in arboris formam assurgit, sed maxima ex parte solummodò fruticat. Nusquam, quod ille sciat, commemoratis locis resinam & Terebinthinam elici. Circa Monspelium in syluis Aegremont & Valeua sponte nascentem læpissimè vidimus, & flores folliculos, fructus atque cornicula legimus. Sata in horto Montb. etiamnum durat, sed parua, & singulis annis folia decidunt. Diligenter hyeme custodienda à frigore hyemis.

Tempus. Floret Monspelii mense Aprilis: Septembri cum fructibus legimus, sicut & folliculos atque cornicula. Theophrasto ineunte Vere germinat Terebinthus: circa Tritici messem, aut paulò seridis semen reddit, eademque serè & Plin. tradit. Montbelgardiprouenit nobis etiam ex semine Terebinthi. Contraria videtur scribere Hipp. de vfu fructus Terebinthi. Nuncenim si fluor muliebris copiosior sit, Terebinthi (πικρὸς) fructum tritum ex vino & aqua propinat. Nunc si mentes non eant eodem modo ieiunæ bibendum dat, & calida lauat.

Vires & v. sus. Terebinthi folia, fructus & cortex (tradente Dioscor.) qua possent astringendi vi ad eadem ad quæ etiam Lentiscus conueniunt, simili parata modo sumptaque. Eius fructus esculentus est, ac stomacho noxius: vrinam verò ciet & excalescit. Est & ad excitandam Venerem apuissimus: ex vino verò potus contra phalangiorum morsus prodest. Et Gal. Terebinthi (inquit) tum cortex tum fructus astringorium quiddam obinent. Sed & secundo ordine excalesciunt. Itaque quod etiam deficcant manifestum est: recentes quidem etiam humidique modicè: sicci verò ordine secundo. Cæterum aridus propinquus est etiam tertio ordini: deficcantium. Est enim aded calidus, ut mandentibus protinuseius caliditas percipiatur. Itaque etiam Vrinam prouocat, lienibus prodest.

Lien. Tumor. **Stomachum.** Plin. Terebinthi folia & radix collectionibus imponuntur. Decoctum eorum stomachum firmat. Semen in capitis dolore bibitur in vino, & contra difficultatem vrinæ. Ventrem leuiter emollit: Venerem excitat. Celebratur & Thericles nomine, calyces ex Terebintho solitus facere torno, per quem probatur materies. Omnium hæc sola vngi vult, meliorque oleo fit. Colorem aduiteratur luglande ac Piro syluestri tinctis, atque in medicamine decoctis. Eiusmodi calyces ex Terebintho à Thericle factos à figlinis discernere facile non erat. Quidam δὲ πικρὰ dicta volunt Terebinthi ligna, quod in iis seræ insculperentur: Rhodig. Figulum Corinthium Thericulum fuisse, non autem vsum torno scribit Athen. Idem tamen ex Apollodoro Geloo citat πικρὰ πικρὰ: Dalech. quod ante Plin. & alios Theophrast. prodidit his

verbia. Nigrum admodum ac densum est Terebinthi lignum: Traduntque circa Syriam nigrius esse Ebena: ex hoc quoque capulos pugionum, fieri & pocula Thericlea tornari, quæ à figilibus secerni non possint: Verum cor tantum accipi, & oportere lignum perungi, sic fieri & melius [ἀλλὰ] & nigrius. Hæc Theophrast. qui tamen postea alio loco, vbi recenset vsum diuersarum arborum, tum ad ædificia, tum ad utensilia diuersa, addit: Terebinthus non nisi, fructu resinaque utilis, quod profectò prædictis contrarium videtur, nisi inueniamus aliquam Theophr. excusandi rationem. An igitur ibi de Terebintho arbore, hic de fruticante tantum locutus? Sed leuis excusatio hæc: & textus ipse Græcus per se sat euident. Existimandum, Theophrastum fuisse hominem, & tam ab aliis falli potuisse, quàm fallere alios. Mirum tamen Scaligerum, virum supra Simonidem memorem, in suis annotationibus huius contradictionis ne verbulo quidem meminisse, quam tamen de Phylitico ipso loco circa eandem rem detexit. Impostores pro Ebena phalas ad pedestres lanceas venditant è Terebintho. Scal. Bellonius testatur, veterum morem in comedendis seminibus Terebinthi nunc adhuc durare in Cilicia & Syria, sibiq; aliquando rusticum Arabem occurrisse (viam supra quoque monuimus) ducentè Camelum Terebinthi seminibus onustum. Testati sunt auctores fidè digni, ante duo millia annorum hominibus, esum seminum Terebinthi in vfu fuisse, ac Persas is viditasse antè vsum panis. Rustici Thraciæ & Macedoniæ scientes magnè esse vsum Gallarum Terebinthorum, qui per colles crescunt & abundant, [videm Bellon scribit] lucri quod inde sperant occasionem non prætermittunt. Nam circa Iunii finem parua poma sub foliis colligunt, aut ad rami radicem, ferentis semina ad formam racemi, vbi inueniunt paruiam Gallam vacuum & inanem, magnitudinis Auellanz, quæ si crescere sineretur, longa euaderet ad formam parui cornu: sed adhuc paruam colligunt, ac carè vendunt, ad tingenda serica subulia diuersis coloribus in vrbe Boursæ: vbi in communi vfu est simplex hoc veteribus incognitum. Quotannis consumunt plusquam sex millia librarum.

Et alibi. Species sunt Gallæ, magnitudine paruarum Gallarum, Romanarum, intus cauz, prouenientes ex excrecentiis foliorum Terebinthorum Masculorum, colliguntur vere, quo tempore nisi colligerentur in longitudinem semipedalem excreverent ad formam cornu.

DE RESINA TEREBINTHINA, EIVSQVE VIRIBVS.

NON inconueniens diximus de Resina Terebinthi, quam Terebinthinam hodiè passim vocant, specialiis disserere. Nomina, Locus, modusque eliciendi è planta sua superius declarata.

Legitur tamen nonnunquam minis rectè, & quasi barbarè per varios libros Ferbentina, seu Terebentina, vel Trebentina, Trementina aut Fermentina, ut annotant Monachi apud Mesuena: Gluten Alimbath, alimbar, alimbath: ut serè omnes iuniore, declarant, idem significat quod Terebinthina. Est verò Terebinthina vocata, ut describit Cordus Terebinthi arboris resina, colore candida, sub flaua, vitrea, aut candida, cæruleum colorem affectans, interdum pellucida, quæ friata, primum in plurimas micæ teritur, mox lentè

Theophr.
sibi contr.
dicit

Galla

Tindus

scit & glutinosa sit, odorem habet acrem, suauem, aliquantulum grauem, & Lariceæ resina non dissimilem, præsertim manibus tractata, & prunis imposita. Gustu modico amanscit, & inter dentes lentescit, iis dum masticatur adherens. Destillat hæc prima liquida, deinde paulatim arefcit. Eandem hæc hactenus sacrificuli vnâ cum Thure accensam, in templis adoleuerunt, ob id incensum appellant: quo factum est, ut hodie adhuc cum Thure ex Syria & Aegypto allata, pro Thuris quadam specie vendatur ab imperitis & impostoribus mercatoribus, qui differentiam inter vtrumque facturi, hanc, Incensum siue Thus appellant: (sed magno errore) Thus autem verum, Olibanum, non intelligentes hæc duo vocabula, alterum Græcum, alterum Latinum, eiusdem rei nomen esse. Porro ex præmissa descriptione facile patet, eam quæ hodie vulgò Officinis Terebinthinæ nomine habetur, genuinam Terebinthinam non esse, quippe quæ tenax, liquida, interim lenta, stauescat, & odore sit graui, Abiecinio vel Lariceo, de qua re specialius suo loco.

Præfertur autem à Dioscoride magis pellucida, candida, vitreo colore, & in cæruleum vergente, odorata ac Terebinthum olens.

Resinas porro omnes eodem autore præcedit Terebinthina: proxima huic Lentiscina deinde Pineæ [*pinum*] & Abiegnæ. Post has numeratur ea quæ ferunt Piceæ [*taxum*] & Strobilina.

Vis autem resinæ cuiusvis molliendi, calefaciendi, discutiendi, dissipandi & expurgandi. Tussi ac tabi conueniunt in elegendate, per se aut ex melle, quæque ex pectore educi oportet expurgant. Vrinam quoque mouent, cruda concoquant & ventrem molliunt: ad agglutinandos palpebrarum pilos conferunt: itemque ad lepras cum arugine, furorio atramento ac nigro. Ad aures denique sanie manantes cum melle & oleo, nec non ad genitalium pruritum sunt viles: Emplastris quoque, malagmatis & acopis admiscuntur: quin & per se illitz aut impositæ laterum doloribus auxilio sunt. hæc Diosc. Ex cuius verbis patet eam resinam Terebinthinam omnium optimam, strobilinam verò infimam statuere. Cui quasi è diametro contrariari videtur Galen. Is enim de comp. med. 27. 28. principem calore facit strobilinam, proximam huic Abiegnam, postremam Terebinthinam esse scribit. Scilicet de bonitate resinarum absolute locutus est Diosc. Galenus verò de earum qualitate, seu caliditate agit: in aqua primas haud dubiè obtinet strobilina, veluti & eo ipso loco disertè admonuit Gal. ne à Dioscor. dissentire videretur.

In eandem porro sententiam & simpl. Terebinthinam & huic viribus proximam Lentiscinam, ob eam quam præ cæteris maiorem habent partium tenuitatem, magis digerere, magisque attrahere prodidit. Sed ipsummet dicentem audiamus. Inter resinas (inquit) primas meruit omnium Lentiscina: inter alias præfertur Terebinthina, manifestam quidem non tamen similiter atque mastiche adstrictionem possidentis. Ceterum adiunctam habet amaritudinem quandam, per quam magis etiam quam mastiche digerit. Ob eam qualitatem inest & absterfio, tanta quidem, ut & pforas sanet. Quinetiam quæ in profundo resident, cæteris resinis magis attrahit, nimirum, cum illis maiorem habeat partium tenuitatem. Attamen Piceæ, & hæc etiam magis Strobilina, ætiores quidem ea sunt, sed non magis tamen di-

gerunt neque attrahunt. Mediæ inter has sunt Pineæ & Abietina: aciores quidem quam Terebinthina, minus tamen quam aut Picea, aut Strobilina. Habet porro etiam emolliens quiddam Terebinthina. Secundum locum habet in emolliendo Lentiscina, sicut & Cyparissina acrimonia. Quo loco rursus patet Lentiscinam à Gal. reliquis omnibus præferri, sicut à Dioscor. Terebinthina. Sed ad diuersa respexit vterque, ut patebit Galeni integrum illum locum legenti. Non enim hic omnes controuersias specialius declarari consultum.

Persequamur vires ex Gal. Terebinthina resinæ, cum detergendi discutiendiq; facultatem habeat, etiam affectus tales quod concoquat, quidpiam obtinet. In lib. de sanitate tuenda, ubi docet, quibus senes uti debeant ad aluum ciendam, eam nucis Ponticæ magnitudine, aliquando duarum triumve sumi præcipit. Quippe non modò aluum soluere citra noxam posse, sed & viscera omnia, iecur, lienem, renes, pulmonemque abstergere. Idem & Paulus confirmat, & ventri vel oliuæ magnitudine deglutitam apprimè conferte testatur. Andromachus Terebinthinam in sua Theriacæ addit, & quidem Libycam: de quo miratur Galenus, cur hanc potius Chiz præferat: hanc enim pendè omnes meliorem iudicare, quanquam & Libycam laudandam censeat, si bona sit, sed proculdubio bonam semper non esse, quemadmodum quæ è Chio venit. Nasci quoque & in Ponto, & in aliis aliquot locis optimam. Verùm Chiam reliquas & odore & sapore vincere.

Sic Plin. in Oriente optimam tenuissimamque Terebinthos fundere Terebinthinam, odoratissimamque tradit.

Porro non diu est, inquit Marth. quod Venetias deferretur ex Cypro. Antea costam afferebant, vel quòd esset aduectu aptior, vel quòd impostoribus, ad adulterationem aditus hoc modo facilius fieret. Verùm liquida, ut per se ex arbore manat, nimis frequens facta est. Ceterum quia Terebinthina iamdiu in Italiam non aduehebatur, Larigna non modò Terebinthinæ locum sibi vendicauerat, sed etiam cognomentum: Larignam enim falsè Terebinthinam Officinæ vocant, quanquam in hoc magnum errorem haud committi Amatus existimet, quum vtraque eadem serè vires ac facultates obtineat, ut testatur Gal. cui postea & Paul. & Æt. subscripserunt. Satis tamen uisè vera vi Terebinthina. At dum ea caremus, illa eius vice uti possumus. At Monachi, satius esse ducunt, in defectu veræ Terebinthinæ uti Mastiche, quippe quam ipse Diosc. in omnibus Terebinthinæ correspondere tradat. Ideòque tutius quoque esse in eius carentia ponere Mastice, quam aliud. Sibi autem certè cognitum esse, eam, qua hodie sub Terebinthinæ nomine utimur, ex Laricis arbore excipi, tamen Actii auctoritate, ad omnia quæ Terebinthina valet.

Auic. in cap. de Terebinthina nihil dicit: sed mittit lectorem ad cap. de grano viridi. Verumtamen Bellunenſis in capite illo pro Terebinthina, rescripsit *alchalimbar*.

Inuenitur etiam apud filium Serap. *Helcalimbar*, quod idem est, quòd *Alchalimbar*, id est, gluten *alimbar*. Hæc enim, siue *Hole* Arabicè, gluten interpretatur Latine.

Quæ pro resina Terebinthina venditur, ex Syluii testimonio, aut Laricea est, aut Abietina. Terebinthinam veram è Cypro allatam, Venetiis, ad eum misit, Io. Bapt. Opizo Medicus, nostræ Laricæ & Abietinæ affinem, sed infinitis

Laricea. partibus præstantiorem. Terebinthina proxima est Laricea. Larici bonitate & tota natura est affinis Abietina, quæ hodie propè sola pro Terebinthina ab omnibus officinis supponitur, magno errore, cum sit multò inferior Terebinthina.

Quod si Gal. non modò Terebinthinam exigebat, sed Chiam tanquam omnium præstantissimam requirebat, quæ, non dico, ignominia, sed pœna mulcandi sunt illi, qui, scientes, Abietinam pro Terebinthina vendunt, vsurpantque non sine Medicorum id permittentium infamia & culpa.

Sylvio ad stipulatur Apollo de adulterio, sed de vitium diversitate nūquam. Sic enim insit. Terebinthina, multis iam præteritis lustris Medicos omnes luit, nec dudum Venetias ferri cœpit cocta, & in massas velut placentas congesta, fortè quòd ita commodius vehitur, aut sic facilius adulteria admittit. Nec deest liquidæ copia, qualis ex Terebinthino manat. Huius loco ætas nostra, resinam Larignam vsurpauerat, ei Terebinthinæ locum, & cognomentum falsò vendicans: nec graui admodum errore, quum ex Galen. lib. 4. de comp. med. per gen. cap. vlt. omnibus his Pharmacis, quæ Chironis conuenire palam est, Larix resina, loco Terebinthinæ, nullo errore misceatur, sibi inuicem affini similitudine. de comp. med. per gen. c. 15. atque Lentiscinæ Terebinthinæ respondeat, ex Diosc. altera alterius defectui satisfacere poterit, quanquam Terebinthina passim vendita, flauo coloris, & mellis Attici, ex Larice resina sit. *Hæcenus Apollo*, qui inter cætera Terebinthinam leuissimam dicit, sed qua vel ratione, vel quo autore, nūquam apparet. Ex Theoph. id desumpsisse videtur, sed malè intellecto, qui inquit, quod sit *la resina* & *la resina* id est, id est, odoris suauissimi & leuissimi, siue qui leuissimè feratur, quique grauis odore non sit: quod bonus ille Apollo ad pondus retulit.

Quoad veram Terebinthinam, de qua hic agimus, Valer. Dourez annotauit se collegisse ex ipsamet arbore factò sacrificatu. Eiusmodi rara est admodum, vidimus tamen in cucurbitis quæ ex Creta Venetias delatæ dicebantur, quæ etiam vsusamus Lugdunæ & Geneuæ ad Theriacem quam preparabat Valer. Dourez me Bath. præside & intendente. Pulchra erat, lucida, ac multò densior resina illa liquida, quæ ex Abiete colligitur. Veram Terebinthinam Dod. calidam facit ad secundum gradum, non tamen vsque ad eòdè siccam.

Porrò ut & de Recentiorum viribus vtendi, modo aliquid addamus, dosis eius serè hodie à drach. j. ad drach. 4. quinque etiam exhibemus, vel in bolo cum puluere Glycyrrhizæ, vel cum drachm. j. puluere Rhabar. ut Sylvius qui drach. ij. tarò excedebat, vel potius dabat ex decocto Cicerum, vel eius loco aquæ illius aut Olei destillando separati vnciam dimidiam cum vino albo propinabat nephriticis: purgatis prius venis primis & ventre reliquo.

Purgat thoracem ab omni immunditie: Item iecur, splenem, renes & Vesicam. Conseruet veteri ruffi, spirandi difficultati, spurco sanguinis purulento, vertiginosis, calculosis, & peculiariter etiam ischiadicis, Podagricis, Chiragncis: aperit, mundat, calfacit & roborat neruos. Vnde Cermilon *sanctissimam appellauit medicinam*. Quidam eius potum vtilem prædicant in affectibus vteri cum decocto artemisiz, & infusione Chamæmelii. Mulieres Persæ vruntur ad masticandum gummi Terebinthinæ, quod prodest ita masticari, vt

denubus non adhæreat, nec in ore consumatur, teste Bellon. Lob. in libello de Balsamo scribit, Li-
quoris Balsami loco nullum præstantius esse succedant
Opobalsamum veri Terebinthi latice.

Verno namque tempore ramulorum pullulantia tenella Terebinthi extracta flagella ipsoque etiam Narbonensi, Nitiobrigum siue Linguagotico aut Monspehensi agro, instar Ficulnæ arboris, lac stillant, quod conchis exceptum & adseruatum in limpidissimum, tenacem, resinofum laticem abit, qui dum recens est, id est, in musto, vt Plin. verbis vtat, in laneam vestem fusus, neque maculam faciens, neque si eluatur vestigium aut notam relinquens: senescens tempore crassescit: nec abluitur nisi oui vitello addito. Qui Garyophyllorum, Nucis Myristicæ aut Cinnamomi oleum huic liquor præferunt, suauitati & saporis plùs quàm optatis facultatibus differunt. Sic Clemens Clementinus, Terebinthinam destillatam proximam esse Oleo Balsami prædidit, vel parum calidiorem & conseruet omnibus ægitudinibus frigidis, & maximè neruorum. Immo ipse Dioscor. Terebinthino oleo Balsamum adulterari dixit.

Quod verò frigesfacere vertunt in *laxo* interpretes Dioscor. ostendunt quàm parum ad rem ipsam attendant, cum manifestè calfaciat oleum Terebinthinum, tantum abest vt refrigeret. Melius Sarrac. iuxta alteru *laxo* significatum siccare conuertit: quandoquidem & fructus Terebinthi è quo illud exprimitur (nam eodem modo, quæ Lentiscium & Lurinum ex fructu parari docet Dioscor.) euidenter exicare proditum est à Gal. 3. simpl. cap. de Terebintho. Quod si quis *quorundam* vitandæ gratia *laxo* legere maluerit apud Dioscor. pro *laxo*, possit. Hoc autem oleum hodie apud nos, vt & in Italia, neque paratur neque habetur, quod & Matthioli restatur. Hoc tamen, vt Melues tradit, vulnera consolidat: medetur item conuulsis, Opisthotonicis, neruorumque duritiis, & creberrimè Cataplasmatibus admiscetur.

Aliud est Oleum quod arte destillatoria ex ipsamet Terebinthina in retortam posita destillatur in arena, vel per se, vel cum aqua simplici, vel rosarum, aut etiam vino, vel hoc cum illa admixto: quale ego Cherl. haud ante multos annos scriptis Lutetiz parauit pro Generosis ac Nobilissimis coniugibus D. de Sancy Cõsil. Regii à latere, & D. de Fabry Thesaurarii & Cõsil. Regii, quarum prior illa miserè interdum Nephritide conflictabatur, & ex hoc oleo singulare solatium sentiebat. Terebinthinam probè lotam sacco lineo immittebam, huncque in retortam vino albo & aq. ros. semiplenam. Sic arena imposita adhibito excipulo, primò aqua limpidissima exibat, qua finita, oleum splendore sine dubio margaritas reforens exibat, prædictæ aquæ innatans. Dixisses perlas dissolutas. Magna opus cautione, in regimine ignis, quippe si vel paululum incandescat supra modum, *laxo* dicitur oleum. Vbi sufficiens album existillasse putauit, mutauit excipulum: non enim expectandum, donec flarescat. Tum & flauum secutum, & tandem rutilum. Primi, quod à sua aqua separatur, vsus est intra corpus, ad omnia supra scripta longè præstantissimus. Secundi & tertii quæ igneam propemodum naturam habent & topica, præsertim fridos partium morbos, & summam extersionem, Quod remanet in retorta [quodque tamen non expectandum] Colophonia vulgò habetur,

*Nisi impro-
bat Apollo
Sylvio La-
ruca*

Apollo not.

*Tempera-
mentum.
Diosc.*

*vtendi
modo.*

*Sanctissi-
ma medici-
na.*

*Communi
Tereb.*

Balsami

succedant

Liquor

Terebinth.

Oleum Tereb.

repreh.

Diosc. ill.

Diosc. in-

terpretis

repreh.

Diosc.

mend.

Oleum fil.

laxum

Terebinth.

gingivae.
Capillum.
& gingivas colluit. Folia dentibus in dolore attruntur mobiles decocto colluuntur. Capillum ungunt. Lachryma sedis vitis prodest, cum quid ficiari excaleherint opus sit. Folia tenera oculis in flammis illinuntur. Medetur & attritis partibus, siue oleo de semine eius facto [de quo postea] ceræque misto, siue foliis ex oleo decoctis, siue cum aqua virilia foueantur. Quo loco non displicet nobis Dalechamp. lectio, pro viridia, naturalia legentis, nempe vulvæ, quamvis de utrisque intelligi possit.

Idem Plin. testatur Democratem medicum in valetudine Confidiz M. Seruili Consularis filiz, omnem curationem recusantis, diu efficaciter vsum lacte caprarum, quas Lemisco palcebat. Mortuum cum fuisse Vlcus pulmonis renimue credibile est, aut immodicas sanguinis profusiones, ex coniectura Dalech.

Vitæ
Pulmonis.
Vlcus re-
nim.
Sanguinis
profusio
Temperat.

Lentiscus, ex traditione Galeni ex aqua essentia leuiter calida facultate, & terrena frigida non pauca composita est. Desiccatur igitur secundo ordine completo, aut tertio incipiente: in caliditate & frigiditatis differentia quodammodo est medius & symmetrus. Similem omnibus sui partibus adstrictionem obtinet in radicibus, ramis extremis tenuioribus, gemminibus ac foliis: præterea fructu, & cortice: ac si succum ex foliis eius viridibus exprimas, similis hic ordinis est, moderate adstringens. Itaque bibitur & per se, & cum aliis medicamentis, quæ Dysenterias & alii affectus sanant: quin & ad sanguinis exuptiones: sanguinisque ex utero eruptiones, tum sedis vulvæque proidentias idoneus est, ut pote ad hypocythida non nihil propè accedens. Idem in Euphoristis: ad gingivas sanguinolentas extremitates Lentisci & Balaustræ in posca coqui & collui præcipit. Porro dentiscalpia ex Lentisco parata tum prisca, tum hoc seculo magnatibus & delicatioribus præsertim in usu quotidiano pro optimis & præstantissimis habentur, quod Valer. Mart. quoque insinuat.

Sanguinis
exuptionem.

Gingivæ.

Dentiscal-
piæ.

Ediditque censis ora laxa Lentiscis.

Et in Apophoretis,

Lentiscum melius: sed si tibi frondea cuspis
Desuerit, dentes penna leuare potest.

Dentifricia eiusmodi per Hispanias, Italiam & Galliam, ubi passim ferè venalia habentur, & ad Germanos quoque à Mercatoribus importantur, in quotidiano sunt usu. Fabrè effectum & exsculptum mihi Cherlero aliquando obtulit mulier Africana, ut arbitror, cum Venetis Anconam versus solueremus vnâ. Sed nec id inter nostra naturalia lignorum ordine positum, nec alia multa exoticæ raritatis nobis chara, rapaces cuiusdam, cui nimium fidebamus, manus deuolare potuit.

Adag.

Cæterum eiusmodi assidui dentium exsculptores adagialiter vocantur *χρηστωρ*, id est, Lentisci arbores dicuntur, quod in eos potissimum quadrat qui nitiduli esse gestientes nimia satagentia corpus expoliunt. Linguagothi Lentisci virgulis ad calcacienda clibana & ad coquendum pro quouis alio ligno promiscuè vtuntur.

Vinum
Lentisci-
num
Mastiche-
tes.

Exsiccant.

E Lentisco etiam vinum fit, quod Schinium siue Lentiscinum dicitur. Si verò Mastichen accipiat, Mastichites. Hac ratione. Bacciferi rami cum foliis tunduntur decem minarum pondo, & in tres musti congios merguntur, coquunturque donec duo supersint, aut certè dimidium, tādēque colatum id vinum ad vsus reponitur. Astrogit hoc, stomacho accommodatum. Eo etiam in testinorum, vesicæ & stomachi destillationes fi-

stuntur, ac etiam eruptiones sanguinis. Vlcera & fouentur & ad cicatricem perducuntur. Sedis vulvæque fluxiones tum iniectione tum potum cohibet.

Vt vini præscripti, ita & Olei Lentiscini prærandi rationem & vsum docet Dioscor. Lentiscinum oleum similiter atque Laurinum ex maturo fructu confectum ac prius inspissatum, scabiem iumentorum canumque sanat. Pellis, acopis & ad Lepras tollendas accommodatis medicamentis aptè & vtiliter immiscetur: ac sudores etiam cohibet. Idem & Plin. tradit, additque idem effectum quod rosaceum, ni durius paulò intelligeretur: vsum eius esse ad papulas à nimio sudore excitatas. Gal. in defluuio capillorum Lentiscinum oleum valde commendat, habere namque adstrictionem atque maiorem oleo in Iberia aut Hispania nato, sponteque naturæ tale existere, quale est ipsum Ladanium. Quare neque expertum se, neque mente concipere posse vllum præstantius Pharmacum ad defluos capillos, quàm quod ex Ladano & Lentiscino oleo permixtum constet.

Oleum L.
iscinum.

Scabie.
Lepra.
Sudores.

Papula.
Defluuio
capill.

De eodem sic Aëtius. tradit. Quod si gingivæ ob inflammationem doluerint, oleum Lentiscinum, si moderate calidum ore contineatur, præstantissimum est remedium. Sit autem recens: nam quod vetustum est, deterius est. Porro id in duplici vasi calefieri debet. Est igitur hoc gingivarum inflammationi quàm maximè accommodatum. Nec verò minus, si quis in alia quapiam parte membranæ, tum linguam vestientis, tum succingentis totum os, dolor ob inflammationem oritur, Lentiscinum sedare potest. Repellit enim placidè, & citra asperitatem quam austerorum plurima obtinent. Adhuc, absque morbo discutit, quo inflammata omnia in primis opus habent.

Lingua
inflam.

Apud Germanos tamen, teste Cordo, nullus est olei Lentisci vsus, quoniam nec abunde affertur ipsum oleum neque in Germ nascitur, ex cuius baccis confici possit: quoniam tamen præstas eius vsus est, ut patet, possent perfacile ex Gallia Narbonensi vel Italia accersiri, cum & ea quæ gulæ & ventri deseruiunt abundè ista loca institorum cura nobis suppetant. Ab Hispanis sanè Oleum fructuum Lentisci in maximo habetur usu, præsertim etiam pro inficiendis chirothecis, quod sua voce *Azeite de Mata* appellant, teste Amato. Et Clus. quoque scribit, cum in Narbonensi degeret Gallia, oleum ex baccis exprimi solitum magni ad vana vsus quod in peregrinas regiones asportabatur.

Adulteratur eiusmodi oleo opobalsamum, si Lob. credimus. Appellatur Gallis *Huile de Mastic.*

Opobalsa-
ms adulter-
atum.

LENTISCINA RESINA, MASTICHE.

Mastichen & dictum, Lentiscus Lachrymatur, (modumque superius declarauimus, & specialius adhuc dicitur postea) cuius grana, quales ad nos importati in Officiis habentur, orizæ granum æquant, longè etiam interdum maiores, candidi, pellucidi, fragiles, qui statim sub dente dissiliunt, mox tamen siatura omnis denudat continuata masticatione, lentescitque mollis ceræ, [sine adhesionis ad dentes metu] quam rursum exiit simul atque aërem sentit: prunis iniecta flammam concipit, promptius tamen format, quàm flammescat, contra ac Thus, guttasque as-

Descriptio

factum

vi d. Th.
red. de
am. Ma
ch.
facile destillat, id quod Thuri negatum, odorem-
que non ingratum spirat. Sapor leuiter adstringens cum calore modico.

ad. de
Cordus annotat aliquos hodie Mastichen Santaracha adulterare. At Diosc. seculo, ut ipsemet testatur, Thuris & resinæ Strobilinz admixtione.

Synon.
lingos.
Resina Lentiscina, Mastiche, *μαστιχη* *αντισηνικη*
Offic. Mastix. Germ. *Mastich* / & *Mastix* vulgò.
Belg. *Mastich*. Gal. *Mastice*. It. *Mastice*. Hisp. *Almali-*
go, & *Almaliaga*. Arab. *Gluten Romanum*.

Quoniam
Thurib.
Huius & Theophr. meminit lib. 9. quando ait: ex Lentisco (*γιν*) & spina Ixine dicta lachryma effluit, quæ *μαστιχη* vocatur. Et Diosc. E. Lentisco, inquit, gignitur quoque resina, Lentiscina cognominata, & à nonnullis *μαστιχη* dicta. Præstantissima porro & copiosissima in insula Chio provenit. Præsertur pellucida, quæ Tyrrhenicæ candore sumis, densior vel pleni, arida, striabilis & odorata. Viridi autem minus probatur. Myrrham verò Lentisci glebis adulterari, quemadmodum & gummi, apud Plin. legimus. Scimus inter Mastiches glebas, haud raro reperiri glebularum gummi Tragacanthi & Arabici, qui fucus tamen à peritis facile discernitur, ab aliis etiam matricatu aut igne. Reliqua vitia deprehenduntur sapore gummi dente lentescens.

De Lentis-
co
scis
simis
quæ
similes
Ruell.
Lama
Lama
Mastiche, auctor Plin. & ex alia spina fit in India (an hæc illa spina quam supra Ruell. Lentiscum dixit similem Iuniperi?) itaque in Arabia: Lamam vocant. Sed mastiche quoque gemina est: quoniam & in Asia Græciæque reperitur herba, radice sola emittens, & caudam similem Malo, seminis plenum lacrymæque erumpit incisa parte summa, (ima Dal.) vix ut dignosci possit à Mastiche vera. Nec non & tertia in Ponto est, Bituminis similior. Laudatissima autem Chia candida cuius pretium in libras xx. nigra verò xii. Chia è Lentisco traditur gigni gummi modo. Adulteratur ut Thura, resina. Hæc Plin.

Quoniam
Quod verò de herba illa tradit, Ixinem apud Theophr. insinuare videtur, ex quo verisimile est eum partem transcripsisse. Dal. annotat eum Chamaeleonem album intelligere, qui Ixinem Mastiche similem gignit. Porro in Medicis Græcis Mastiche etiam solum Chia vocata reperitur, ut falli possint qui legunt, & ad proximè antecedens medicamentum hanc vocem refert.

Mastiche
personata
Mastichen personatam Marcellus Medicus empiricus vocat alibi, fortè ex eo quòd faciei illiutionibus admixtam, claritatem ac nitorem inducere Diosc. dixit, ut sit velut *μαστιχη*, ut coniecit Cornar. Quamvis autem Gal. ad Glanc. laudet Masticem Aegyptiam, scimus tamen (inquit Bellon.) in sola insula Chio nunc provenire, ubi Lentisci arborescunt ea diligentia, & non minoribus sumptibus quam apud nos vites istius insulae diuini consistunt potissimum in Mastiche.

Chio de
Mastiche
At nisi colerent diligenter, Oleæ modo, Lentisci parum Mastiches proferrent. Turcæ tributis vice incolæ annuatim quatuor vel quinque millium ducatorum Mastichen solvunt, singulo pondocentum & quinque ducatos æstimato. Reliquum sibi referunt. Mercatores Galli, quia vident perpetuò eo fruendi pretio, aiunt ac sibi persuadent, Chientes collecta certa quantitate Mastiches, reliquam abicere. Sed hoc falsum. Nam, ut dictum, multum impendunt, in excolendis Lentiscis. Sed Mastiches pretium nec minuit, nec augent propter quantitatem pretii 4000. ducatorum, quam tenentur Turcæ persolvere: ita tum detrimento summo imminerent vel amplarent pretium.

Tom. I.

Ergo quæ ad nos importatur & in vniuersam ferè Europam vel Ma. quoque teste, in Chio provenit ex domesticis solum Lentisci plantis, vulnerato quotannis arboris trunco. Fluit enim inde Mastiche, & in terra circumpanita concrevit. Mastiches idemne quod in tota insula provenit, Reipublicæ debetur, quòd fit, ut qui vindemiat tempore propriis in agris Mastichen colligunt, id totum absque dolo in commune ferant. Multantur secta manu, qui Lentiscum Mastichen fundentem, in proprio vel alieno agro exciderint, tanta est Mastiches cura & reuerentia apud Chios. Nec abs te quidem, cum illis tantum Mundus ferè vniuersus tam necessarium & salubre medicamentum acceptum ferat. Tradunt etiam in Creta Lentiscum Mastichen fundere, sed flavam, amaram, & Chià longè deteriore.

Idem Matb. certò se scire ait, Caphuram, Mastiche, ardenti aqua, Zedoariaque ab impostoribus adulterari. Plinium verò tum ipse tum Amatus reprehendit, quòd liquidarum generi Lentiscinam adscribat, quæ est nostra Mastiche. ceteris profectò durior. Sic & Dalech Plinium falsò Mastichen resinis liquidis annumer. Ille scribit. Et alibi: E Lentisco inquit resinam liquidam fluere tradit Plinius, quod tamen vltus falsum esse monstrat.

Hæc isti boni viri aduersus Plinium, non aduertentes quàm facile ab eorum reprehensione vindicari possit. Liquidis utque accenseri potest, quatenus effluit. Non enim nisi hac specie promanare quit. Ex quo & posterior reprehensio exploditur, nam si quidem liquida effluit, & in terram decidens, vel ipso Matb. teste, concrevit, non videtur salutatis in eo accusandus Plinius. Immo nihil concrevit, nisi quod liquidum est. At rem concretam ne Dalech. quidem negauerit. Stragitur immota Plinii sententia. Si verò contrarium vsum scivit Dalech. cur non docuit? quamvis hercle nondum rectè percipiamus, quid per suum vsum intelligat.

Idem Amatus in Hispania & Italia provenire quidem fatetur Mastichen, aded tamen in parva quantitate reperiri, ut de ea colligendi homines nullam habeant curam, Sed officio suo satisfecisset, si docuisset, eademne cum Chia, an diuersa, & in quibus differat, aut conveniat. Annotat Apollonius Dioscor. scripsisse Mastichen propolis more ductilem esse. Nostram autem vix talem esse compertum existimamus, & locum illum in Dioscor. nondum reperimus.

Masticho pota sanguinis reiectioni & veteri rufi vtiliter adhibetur. Stomacho quoque est vtilis, ructumque mouet. Additur etiam in dentifricia & faciei illitus: quippe quæ nitorem cui conciliet. Quin & pilos oculorum fluentes glutinat & cohibet: commenducata oris halitum commendat. gingivæque contrahit, Diosc. Quod & Plin. confirmat ex parte, his verbis: Masticho Lentisci replicandis palpebris, (oculorum pilis superne agglutinandis) & ad extendendam cutem in facie, & smegmata adhibetur, & sanguinem reicientibus, rufi veteri, & ad omnia quæ Hammoniaci vis. (Acaciæ vel hypocistidis Dioscor.)

Galeno Mastiche candida & Chia consueto more cognominata quodammodo ex contrariis composita facultatibus est, adstringente videlicet & emolliente. Proinde stomachi, ventris, intestinorum, iecorisque inflammationibus competit, ut puta secundo ordine exalfaciens & desiccans. Nigra verò quæ Aegyptia cognominatur, tum

Modo
colligendi

Mastiche
Cretensis

Caphura
adulterata

Plin. not.

Matth. A-
mat. &
Dal. not.

Plin. de
fero
durior

Amat.

Vires &
luc.
Rufum
Dentes
Facies
Pili Hæ-
luc
Gingiva

Sanguis
spu-
tum. Tufia

Tempera-
mentum.
inflammat.
Viscera
Nigra seu
Aegyptia
cum quo
Vires.

Farnaculi.

Oleum Ma-
stiches.Vulua
Stomachi
Scirrhus.
Colica.
DysenteriaParanda
medic.

Dures

Corn

Ad dolores
Ventriculi
topicum.Alui pro-
fluvium.

magis hac deficiat, tum minus astringit: quam ob-
rem aptior est ad ea, quae validiorem digestionem
per balneum exposcunt. Hac ratione surmunculis
bonum est remedium. Porro oleum vnguentum-
que ex Chia conficitur, non admodum sanè ex Ae-
gyptia. Ceterum similis est & ipsum Mastiches
fuculatis. Paratur autem docente Diosco. è trita
Mastiche. Contra omnia vuluæ mala efficax est,
leniter calefaciens, astringens simul & emolliens.
Est & vtile ad prominentes circa stomatum scir-
rhos, ut & ad Cæliacorum Dysentericorumque
cruciatu. Vitia quæ sunt in facie emendat, colo-
remque meliorem præstat. Optimè verò in Chio
insula componitur. Preparandi modus etiam ap-
ud Paulū, Aetium & Mesuen habetur, alter sim-
plex, alter compositus. Prior: Mastiches vnc. iij.
ol. sesamini sextario coquantur in vase duplici.
Alter. Mastiches vnc. iij. Vini albi boni vnc. iij.
ali octo, ol. ros. lib. j. in vase duplici coquantur
ad vini consumptionem. Cerebrum nervos, iun-
cturas, ventriculum, hepar corroborat, tumores
dures lenit, dolores sedat. Posterius hodie se-
dè tantum est in usu, quia præstantius habetur prio-
re, quicquid clamat Matthiol. Sepalsarios prio-
rem obliuiscens conficiendi modum. Sciant tamen
Pharmacopœi in duplici vase, hoc est, balneo ca-
lentis aquæ confici debere, non æreo vase carbo-
num igni admoto, ut solent. Matthiol. oleum sim-
plex, Sylvius cum Paulo oleū omphacinum sume-
dum potius existimat, quàm sesaminum: sed di-
uersa olea pro diuersis scopis sumi possunt: ac par-
est scopum Vniuersalem ei relinqui, ne iudicium
iuniorum medicorum turbetur.

Matthiol. gloriatur se vitreis organis è purissi-
mo tantum Mastiche illud sæpius confecisse. In of-
ficinis cum oleo rosaceo fieri solet, ad consumptio-
nem vini, ex præscripto Cordi, quem se-
dè hodie sequuntur. Fernel. loco vini, aq. ros. sumit, & ol.
vel omphac. vel ros. Sic lienteriz & vomitionu
magis fuerit accommodatum, quoniam magis ad-
stringendo roborat. At ex ol. ros. & vino anti-
quo ad partium lassitudinem & imbecillitatem sic
Mesue in fine Canonum. Dioscor. suum, quod
simplicissimum est, ad duritias imponi præcipit,
imbuto videlicet linteolo in ipso, atque ita im-
posito, verum duritiem prius calidè oleo fricari par-
sit. Sed vox *ἐπιπρόσθετα* ad *ἐπιπρόσθετα* (quamvis
Matthiol. *ἐπιπρόσθετα* legat) abigam lectionem fecit: ut
putat Corn. Verum, inquit, si *ἐπιπρόσθετα* legitur,
& ad oleum refertur, integram & rectam senten-
tiam exhibet. Quasi verò *ἐπιπρόσθετα* non æquè
apertè ad *ἐπιπρόσθετα* reduci possit, sensu integro
& congruo, ut nobis quidem videtur, & ex loco
superius ex Dioscor. adducto, satis patere potest.


Ad omnem ventriculi dolorem, ut refert Mat-
thiol. vomitum & nauseam magni faciunt hoc re-
medium Alfarabius & Mathæus de gradi, & Vi-
tellum oui n°. j. melis despumati cochl. ij. Masti-
ches gr. xv. Contrita & commista, indantur teste
magnæ oui anterini, si haberi possit, & in calidis
cineribus assentur. Ex hoc magmate si comedat
eger, certò inuabitur. Solent & Mastiches grana
aliquot in aqua hordei decoqui, iis quibus interd-
ctum est vinum. Ad dolores ventriculi topicum:
in puluerem redigitur Mastiche inspergendum lin-
teo aut alucæ, post calfacta imposita ventriculo
dolorem & vomitum compescit. Vel & panem
tostum, tere subtilissimè, cui admisce Mastiches
drach. ij. Sacculo imposita, & calfacta, ventricu-
lo imponantur. Contra omne alui profluvium,
præsertim verò hypercatarrhum. Cingitor ar-
busimè, mox prunis injecto puluere ex æquali-

bus partibus Mastiches & Thoris suffragam ano ex-
cipiro: extemplo sistit. Egregium & probatum ad
inueteratum coxendicis dolorem, & Myrrhæ &
Mastiches ana part. æqual. contrita coquantur in
oleo Chamæmelino, eo calido inungatur locus
dolens. Emplastrum ad arthritidem à frigida cau-
sa. & Mastich. Cymum. Puleg. Salu. Bacc. Lauri.
Sabina ana part. æqual. Subacta cum melle ca-
lida applicentur.

Addendum Coronidis vice & Mastiche, quod
ut annotat Camer. ex liquida adhuc & lenta sunt
vascula magnatibus ad debiliorem ventriculum
expetita, quæ infuso potui gratum saporem con-
ciliant.

NVCVLA EXOTICA PISTACII SPECIE

CAP. XXII.



Rara pro-
fus & exo-
tica nunc sequi-
tur: nam ab in-
itio huius libri
dictum fuit de
nuce vulgatissi-
ma Iuglandis sc.
& de peregrina
nuce aromatica,
Auellanis, Sta-
phylo dendro,
Pistacis, Tere-
bintho & Lenti-
sco. Fructus igitur
exouci in
maxima copia
max tradendi se-
quuntur, nucibus
Auellanis, Pista-
chisque similes.

Sunt nobis peregrini fructus seu nuculæ, quæ, si benè recor-
damur reperiuntur interdum cum Anacardis &
Aromaticis aliis, ad Pistacia suo clausa ossiculo ac-
cedentes, magnitudine & forma oblonga, non-
nihil angulosa & conuexo inæquali: putamen fra-
gile, sulcum, rugosum, nucleum comprehendit
solidum, coloris obsoleti, pingui, rancido (in no-
stris saltem vetustissimis) sapore præditum, quem
obuoluit tenerior quædam pellicula, coloris æ-
nerici.

NVCVLA PEREGRINA ALIA.

CAP. XXIII.

Clus. in peregrinis lib. 2. c. 30. describat octa-
do loco, fructumque hunc peregrinum de-
pingit, quem dicit Pinei alicuius se existimare,
adè nostratus Pineæ nucleos refert, licet ple-
rumque sint & longiores & crassiores: duto scilicet
putamine eodè inque colore. Huc refert li-
buit, quia de Nucum familia sunt, sed qua-
rum planta, nondum innotuit. Ha-
im icon est cum superiore.

SBL SERAPIONIS, ET AVIC.

CAP. XXIV.

Descriptio


Sapar.

Sel
Cucurbitum
IndumVires
Scl.

Fruetus *Scl*, quales Rauvolf. vidisse scribit, carent duris putaminibus, planéque nudi sunt, magnitudine Pistaciorum, colore Iuglandibus nostris non dissimiles, sapore satis amaro cum manifesta acrimonia. Dedit sibi Minoritam quendam Hierosolymis, qui dicebat in vicinis locis provenire. Esse autem *Scl* Serapionis & Avic. De quo sic Serap. tradit. *Scl* Isaac Eben Amram, est Citonium Indum, fructus rotundus sicut Auellana, absque cortice. Virtutem habet Zingiberis, calefacit tertio, humectat primo ordine. Attenuat humores crassos, & induratis nervis confert. Melihaho idem tradit. Rauvolf. verò etiam *Scl* vocari citat.

CACAO AMERICA, SEV
AVELLANA MEXICANA.

CAP. XXV.

Descriptio
CacaoCacao
MexicanaFructus
Cucurbitae.Amygd.
IndicaSynonyma
Scl.

Cacao Scaligeri arbor est Castaneae folio, fructu Amygdali, specie rubicundo tum cortice tum nucleo. Benzo sic describit: *Cacauate* vulgò Indi vocant, monete illis usum præbet. Est arbor modicæ magnitudinis, nec nisi calido loco & opaco vivit. Simul ac Sole tacta est, contabescit: itaque ferè in sylvis umbrato & humido loco feritur, neque id satis, sed iuxta eius generis arborem aliam editiorem plantant, quæ simul ac adolescere coepit, eius cacumen ita concinnant aptantque ut adulta ea arbor *Cacavatem* in umbra defendatque ita ab æstu, ut Solis radiis laedi non possit. Fructus Amygdalarum specimen referens, siliquis quibusdam, velut Cucurbitis includitur, crassitudine & latitudine Cucumeris: annuo spatio maturefcit. Maturas eas ubi legere volunt, excussis folliculis fructum super stercis expansum ad Solem exponunt, donec sudorem exsudaverit.

Clusio verò Amygdalo planè similis est hic fructus suo putamine exemptus, membrana tenui, nigra, nucleo qui in binas aut ternas partes dividitur subfusco & cinereis venis distincto, adstringentis & ingrati gustus, quare non mirum est, si qui primum degustant à potione ex eo confecta abhorreant. Eam tamen claris hominibus propinant, ut nos aromates vinum solemus, referentibus iis qui pauculos fructus retulerunt.

Cacuate Benzoni. *Cacao* Scalig. Clus. Hist. Lugdun. Taber. de quo Guiland. *Palmarum*, inquit, Tom. I.

naturam obtinet Auellana Mexicana; cuius fructum indigenæ *Cacao* appellant, quæ citra sociam sui generis arborem non fructicat.

Provenit in India Scal. Celebrem per universam Americam multique usus fructum Peruanæ Prouinciæ littorales gentes secum detulerunt *Cacao*. Clus.

Ex nucleo *Cacao* sunt Sorbitiunculae refrigerantes: eam ob causam aded expectat, ut cum eis quidvis vel pretio vel usu carum facile commutent. Hunc potum confectum (inquit Benzo) in testa fictili ad focum exsiccant: mox lapidibus, quibus pinsitur panis, contusam & commolutam, fusumque in pateras (quæ cucurbitæ specie est tertia arboribus per omnem Indiam nascuntur) paulatim aqua temperant, atque interdum paululo Pipere quali vulgò vtuntur, condiunt, eoque in potu vtuntur. Porcorum ea verius colluies, quàm hominum potio. Quum eam Prouinciæ peragrem, pluiquam integrum annum à tali lora abhorui: & cum pagum aliquem prætereuntem Indus fortè aliquis ad bibendum inuitaret, ego verò aspernarer, multum mirans idemque abibat. Sed cum mihi vini copia non esset, ne semper aqua bibere cogerer, alios imitari didici. Ea *Calia* sapore a-

CACAO SIMILIS FRUCTVS.

Fructum, inquit Clusius in Exot. à Jac. Gareto accipiebam adiunctum Oregioellæ: *Cacao* fructum magnitudine penè æquabat, membrana fusca tectus, per medium secundum longitudinem divisibilis, ut Amygdalæ, Auellanae, Glandes & similes non oblique, ut *Cacao*, cuiusdem tamen cum illo saporis, & forsitan eius genus: gemellum similem etiam cum illo accipiebam.

FRUCTVS BRASILIANORVM
PERNITOSVS.

CAP. XXVI.



Iacobus Gareto Clus. vt in-
tuenti apparebit
in Exoticis hb. 2.
cap. 16. mittebat
fructum, qui vn-
cialis erat longi-
tudinis, non tam
denso quàm len-
to cortice te-
ctus, spadicis ex
flauo colons, nu-
cleum cortinis
cineraceo colore
præditum, & te-
nui, nigerrimæq;
& splendens
membrana ob-
uolutum, præ-
terquam infima
parte, quæ aut
Bb 1

candicans, aut (deterfa membrana) nuda, quantum quidem mihi obferuare licebat, dimidiatum enim fructum cum integro nucleo duntaxat accipiebam, ita vt hic expreffus: gustare tamen nolebam, quia, qui mittebat adfcripferat, Brasilianos monuiffe illos, qui hunc fructum legabant, ne manducarent, quoniam perniciosus effet.

CYRCAS AVELLANAE MAGNITUDINE.

CAP. XXVII.

Descriptio **N**ascitur in Malauar, autore Garcia, fructus quidam magnitudine Auellanz, cum suo putamine, non tamen adeo rotundus est, candidus, gustu quali sunt Tubera cocta, dependet ex ramis cuiusdam plantae quae feritur: nullius, quod sciam, in medicis a vltis. Dicitur in Malauar *Chiquilenga*, id est, exiguum Inham. In Cairo vbi frequens est *Circas*. (licet enim in quibusdam Malauar locis) in Cambaya Carpata. Quantum coniectura allequi possum videtur Serap. huius meminisse, vocasseque *Habelculcul* corrupto vocabulo, cum *Habalculcul* dixisse deberet, quod *Circas* significat. (nisi nos ipsi forte *Circas* corrupte vocemus) *Hab* enim magnum semen sonat: *al* articulus est genitiui. Scribit autem Serapio eius frequentem vltum, seminis quidem copiam facere, sed cholericam, quam vocant, passionem excitare: quae omnia Malauares huic fructui tribuunt. Eius meminit Rhases de re med. lib. 3. cap. 10. vocatque *Kikil*, sed forsitan corrupte. Clus. tamen annotat, videri Serapionem eo loco non *Circas* intelligere, sed suum potius *Secacul*: Se praeterea ingenuè profiteri, quod ignoret, quid sit exiguum *Inham*, nisi sit *Trasi*, quod Hispani *Incia* *Auchunada* appellant. Sed nobis Clusi suspicio non placet, vt dicemus cap. de *Trasi*, lib. 3.

Synonyma
Chiquilenga
Inham

Habelculcul
al Serap.

Vltus
Sperma
auger.
Cholera.

Kikil

Secacul

PETITA PERVANVS: ALIVSQUE SIMILIS FRUCTVS.

CAP. XXVIII.

Descriptio **I**n fructu hoc quaedam est varietas: nam alter altero maior & amplior est, licet color & forma propemodum eadem. Planus est & oblongiusculus, altera parte latior, altera angustior, glaber & laevis, totus fusci aut interdum spadicei coloris, nisi linea quaedam candicans, qua parte suo fructui adhæsit (nam alteri inclusus fuisse videtur) varium faceret, pregnans est, & sonitum edit. Clus.

Alter similis

Amygdaloides nitidus

Huic similem si non eundem habemus ex liberalitate Illustrissimæ Ducissæ Wirtembergicæ: qui magnitudine Amygdali, lubrica lauitate splendet, colore ex pullo flauescente obsoleto: cortice mediocriter duro. Supernè latior, infernè angustior, alteram faciem compressam habet, veluti vestigium ex appressu alterius: parte opposita tumidior. Laterosum hilo insignitur longo, profundo, candicante. Non pictum damus, quod Clus. ad pictæ figuræ satus benè exprimat. Habet praeterea hic fructus affinitatem cum fructu Amygdaloyde nitido peregrino sequenti. Color & magnitudo serè eadem, sicut & laeior. Figura tantum euariat. Tres à D. Paludano acce-

pimus, forma & colore huic similes, nisi quod vnus ex his vtrique puluinatus: hylus quoque non albus vt in praedicto. Nucleus qui intus est Pineo nucleo minor, obsoletus & rancidus.

FRUCTVS AMYGDALOIDES NITIDVS PEREGRINVS,

CAP. XXIX.

Laevis & lubricus est superficie, nuclei Amygdalini magnitudine & forma, nisi quod vna parte paulò est acutior, obtusà Amygdali parte, infraque mucronem alterum lacuna orbicularis insculpta, non tamen effatu dignæ altitudinis: fortè hinc prodibat germen. Color est ex flauo ferè cinereus: & altera quidem parte magis in arcum curuatur Damasceui Pruni nuclei modo: corticèque tegitur tenui, fragili nucleum in se continens. Vnde acceperimus non occurrit.

FRUCTVS PERVANVS AMYGDALOIDES, SVB TERRA NASCENS.

CAP. XXX.

Missus est (inquit Monar.) ex Peru fructus sub terra natus, pulcher admodum aspectu, & grati saporis, qui & radice caret, neque aliquā plantam profert, aut ab vlla planta producit, sed solummodo sub terra enascitur, quemadmodum tubera: Dinudii digiti magnitudinem æquat, rotundus est & contortus, & affabrè elaboratus, coloris spadicei, nucleum intus continens, resonantem dum siccus est, Amygdalæ similem, cortice fusco, intus album, & in duas partes diuisum; vt Amygdala, grati saporis, & Auellanam gustu referentem. Multæ nos rationes mouerunt, vt ad Noces referremus.

Inuenitur apud flumen Maramnon, nec vlti alibi per vniuersam Indiam. Editur recens & excitatus, sed torteri præstat. Adponitur secundis mensis bellatorum loco, quoniam ventriculum admodum exsiccatur & roboratur. Sed si liberalius edatur capitis grauedinem generat. Eum admodum estimant cum Inditum Hispani, nec immeritò, quoniam eos, quos ad se missos tradit idem Monardes grati saporis esse deprehendit, cui & temperatus esse videtur.

Locus:
Virces & vltis.

Perniciosa
luc.
Noxa.

MANOBI LERII.

CAP. XXXI.

Fructum quendam Syluestribus *Manobi* appellatum, ait, Lerus Amer. Hist. sub terra Tuborum modò nasci, tenuibus filamentis simul coherere, nucleum non esse maiorem domestica Auellana, eiusdemque saporis, cinerei coloris, cortice non duriore, quàm Pisorum filiquæ: an verò folia, semenue proferat ignorare se fatetur, licet frequenter fructum ederet. Clus. Lerium interpretatus, vertit aliter quàm nos: Fructum nucleum continere, ac Manobi sibi videti idem cum fructu Amygdaloyde. Nos dubitamus an Monardes bene descripserit suum fructum, qui nobis videtur potius arboreus: fortè Manobi sit *Trasi* genus aliquod. *Trasi* autem sunt veluti fructus & nuclei Auellanarum.

Manobi
Lerus.

An Trasi

AMYG-

AMYGDALA PERUVIANA COR-
TICE TRIANGULARI, RUGOSO.

CAP. XXX.

Clusio, vt habetur in Exot. lib. 2. c. 18. Hispani Simon de Touar mittebat fructum anno 1596. cui nomen erat inditum, *Almendras del Peru*, id est, Amygdalæ Peruanæ, quia fortè operimentum quo hæc Nux tecta fuit, illi simile quod Amygdalam tegit, aut quia nucleus quem continet amygdalæ nucleo non est dissimilis: certè huius quam aperiebam, nucleus, & substantia & sapore, amygdalæ nucleum valdè referebat, sed ossis siue lignei corticis qui nucleum continebat, forma dissimilis: nam triangularis erat, dorso lato, in bina letera angulosa desinente, valdè rugoso, quemadmodum & utrumque latus: supina pars etiam rugosa, sed angusta & cuneiformis. In aquam iniecta hæc nux, non mergebatur, licet nucleum aded integrum haberet, vt totum ligneum corticem expleret. Iconem huius exhibemus sub Numero I.

FRUCTVS EXOT. PRONA PAR-
TE IN ARCVM ELATVS, SUPINÀ
planus, sulcus.

Delatus per Baranos ex Lata, inquit Clusius L. 2. c. 15. Fructus, qui binas penè uncias latus, paulò autem longior, pronà parte in arcum elatus, supinà planus, denso, crasso, duròque cortice præditus, fusci coloris, & quando immaturus, quodammodo spadicci, materia spongiosa, firma tamen, constans: nucleum verò continebat uncialem, planum, durum, fusci coloris externa parte, subrubentem interna, in binas partes diuisum, quadam adstrictione initid præditum, deinde salinam cientem, tenui spadicea membrana inuolutum, nullum nomen erat additum. Huius iconem demonstrat Numerus II. sicut & sequentis tertius.

NUCI CYPOTE ACCEDENS FRV-
CTVS, ORBICULARIS, LEVIS,
spadicci coloris.

Testatur Clusius lib. 2. quem de Exot. scripsit c. 19. sibi dono datum, anno 1600. per Ornatissimum Virum Henticum ab Os Amstelredamum, fructum exoticum, qui orbicularis penè erat formæ, quatuor verò uncias erat eius ambitus, cortice, siue verius putamine quidem duro, sed non valdè crasso tectus, qui superna parte lævis & spadicci coloris, infernà rugosus & fuscus, nucis Cypote ferè instar, nucleum continens durum, foris fuscum, intus album, non ingratæ saporis, eà parte quâ lævi putamine tectus fuerat, striatum, altera procius rugosum.

FRUCTVS BIVALVIS INDI-
CVS NIGER.


CAP. XXXI.

Licitatis præcipue fructus Anonymos bivalui tegitur cortice, non duro, & vt vide-
Tom I,

tur, fragili, hiantibus iam medio tenuis valvis, nigris, subscabris, figura oblonga utrinque exacta, modicè compressa, alioqui ouatam relatura. Latitat intus nescio quid nuclei, quodd unicuique esset inter Exotica Plateriana, aperite non licuit. Sapor cortici nullus.

APELLANÆ INDICÆ MAIORES
CORTVSI NIGRICANTES.

CAP. XXXII.



Fructus quæ Descrip-
tione hac tabella ex Matth. postremis comment. Lat. & Ital. cum magnis figuris exhibemus ab eodem sic describitur. Auellana Indica, quam multo dono I. d. r. la. Anton. Cortulus, continebat putamine exteriori Cardui maioris maioris putamini simili, sed duriore compactiore, & colore magis olivaceo in longitudine longioris, vix adhuc putamine

circumtectus. In eo Auellana concluditur oblonga, utraque parte acuminata, dorso arcuato, & inferiori parte lata, ac sessili, osse contexta duro, lævi, Castaneatum colore, in quo nucleus concluditur solidus, eiusdem ferè figuræ, albæque membrana circumuestitus, dulci que intus medulla & ipsa quidem albicans. De eius autem facultate hætenus nihil compertum habeo. *Hæc ille.*


Sed quousquisque intelligat de quo loquatur fructu, cum in vna eademque figura ad minus tres vel quatuor differentes fructus depingat, tredecim distinctis iconibus. In epito. solam iconem proponit sine descriptione: tertium genus (vt existimamus) faciens: hic propositas, quas, inquit, ex earum imagine faciliè quisque am intelligere poterit. Ita suos Lectores figuris Solis atque Ideis satiare vult. In comment. duorum tantum meminit. Porro Matthiolum iconibus à nobis hoc loco propositis, vnum tantum genus intellexisse affirmare non possumus, licet vnius eiusdemque omnes existimemus, diuersas tantum facies, tum nucis tum putaminis exhibere, adiecta aperta testa cum nucleo. Camer. ad Hist. Germ. Matth. easdem adiungit, addita descriptione, & descriptionem Auellanae 1. Matth. quam videtur comprehendere sub iconibus à nobis propositis, de quibus sic Clus. apud Garciam. Auellanae nostra ferè simile genus minus nigricante colore, quod à Matth. inter Indicas Auellanas exhibetur Tabern. & C. Bauh. apud Matth. omiserunt iconem hanc maioris Auellanae Matth. quam Tabern. tradit sub Nucula Indica, & reponunt sub iconem *Mebenberene*, quæ Matth. est Auell. 2. Indica, ni fallimur: quasi Auellana illa maior Matth. comprehendatur sub iconibus *Mebenberene*. Res eò redit
Bb 3

Nucula Indica Mebenberene

Matthiol. & praedictos sibi non constare, nec iis cum eo conuenire, qui eius opera illustrarunt.

AVELLANA INDICA MAIOR
SVERVA CLVS.

Descriptio



Avellana vera Indica hic proposita ex Clus. annot. in Garc. lib. 1. c. 26. pollicari longitudine, duorum vero digitorum crassitie, inferiore parte sessili, rugosa scabrae & cinerea: superna autem, & eminentiore parte laevi, subrufoque coloris, ita ut animalculum duro corio contextum videatur: praegnans est, & aliam continet.

Huic ferè simile genus invenitur minus, nigricantèque colore quod à Matthiol. exhibetur inter Indicas Auellanas. Hanc etiam pro Auellana Indica Clus. altera exhibet H. st. Lugd.

Anno 1606. Gener rediens ex Anglia & Belgio detulit, fortè munere Jac. Garci fructum planè eà magnitudine & figura, qui est icon nostra ex Clusio, ei tamen optimè respondet descriptio, cui hoc addimus, corucem esse fragilem, instar ferè testæ ovorum, minus tamen cum sit spissior, continet nucleum magnum, tectum tenui membrana, cinerea, in qua sporem pinguem non animaduertimus: Nucleus autem magnus, rugosus, firmus, Amygd. modo, sapore non ingrato. Cum hac Auellana Ledorum oculis inspicendâ quoque proponimus iconem Fructus peregrini ovalis, Iudaico lapidi magnitudinis paris, itémque alterius nucem ponticam non excedentis.



NUX SIVE OSSICVLVM GYPOTHE SIMILE NVCI BALSAMI
Peruviani.

Descriptio

Scilicet Clus. Exot. lib. 2. cap. 18. Accipiebam Hispali anno 1596. à Doct. viro Simone de Touar, fructum, cui nomen adscriptum erat, Nux siue Ossiculum Gypote. Non autem erat valdè ab- similis illi, qui mihi aliquando missus pro fructu eius arboris, quæ liquorem illum Balsami appellatione donatum, in insula Hayti siue Hispaniola profert: sed minor, nec spadiceus, ut ille, coloris, verum fusci prorsus, & præ luore splendens: ventre siue inferna parte: cineracei coloris, non laevi, ut superna, sed scabrâ: quem pictor valde negligenter expressit. Alio fructu haud dubiè inclusus fuerat, nam ossiculum duntaxat erat alterius fructus: qualis autem fuerit arbor quæ fructum protulit, aut quâ in provinciâ nata, nihil erat adscriptum: tamen si autem nucleum continere hanc nucem certum esset, agitata tamen nullum strepitum edebat, nec aqua merula subsidebat.

BALSAMI PERUVIANI FRUCTVS CLVS.

Descriptio






At quos hic exhibemus Clus. lib. 2. de peregr. & Exot. c. 29. similes ait suæ Auellanz Indicæ maiori (de qua modò antè) tetras autem uncias longitudine superant, crassitie vnam, altitudine duas ferè equat, alioqui forma & colore illi auellanz planè similes: nèpe crasso corice seu putamine constantes, inferiore parte &c: ut in precedenti. Praegnans & hic est, & nucleum intus continet duas uncias longum, vnam latum, geminum, extrema parte simul cohaerentem, tenui cinereaque membrana tectum, materie firma ut Amygdala aut Castanex recentis, subfusca, pingui, & oleaginosa, odore sat iucundo prædita, & gustu non ingrato. Eum ac.

Locum cepit Lusitanus quidam mercator Petrus de Frias nuncupatus à provinciâ Peru Prorege, pro fructu illius arboris in nouo orbe nascens, ex qua balsamum elicetur, cum ipso Balsami oleo. Verum si D. Monardes descriptioni credendum, longè minor est Balsami fructus. Contule finem cap. 8. ipsius histor. simpl. ex nouo orbe, quem Latinum fecimus. Hanc Clus. Hist. Lugd. eandem iconem habet nomine fructus Balsami.

AVELLANA INDICA PRO BALSAMI
FRUCTV MISSA, EIVSQUE SPECIES ALIA MINOR.

Hanc primò depictam à superioribus, si non specie, at figura diuersam, Hercules Saxonia ad nos cum aliis aliquot munificæ naturæ Indicae monumentis, adiectisque etiam iconibus ad viuum, nobis dono misit sub hoc titulo: Fructus Balsami Petri de Frias minor. Magnitudinè eicon ostendit, digitum ferè æquat, & si competentè haberet crassitudinem atque rotunditatem, galeam quodammodo repræsentaret. Testa constat laevi, splendida, ex rubro ad spadiceum vergente, crassa satis



fatis, substantia
oilca. Nucleus
intus later A-
mygdalini facie
sed latior, in ca-
teris propor-
tioni nucamen-
ti respondens:
sapore rancido,
quippe exole-
to, quem Num.
ii exprimit. Nu-
m. iii. Prædicto
multo minor
concolor, figu-
ra nonnihil va-
riat: potissimū
hyli illud vesti-
gium, quā in
fabis nostris
vulgatis non la-
tus, nec ut in

prædicto eminet. Testa tenuior multò, nucleum
quoq; paruum, sibi que proportionatū continet.

Descriptio

BALSAMI PERUVIANI FRUCTVS METÆ FORMA.

FRUCTUS Exoticus concessus à Paludano, in-
quit Clus. Exot. lib. 2. c. 20. in aquam coniectus,
non mergebatur, licet satis grauis, & nucleum
contineret, ut ex itrepiru quem agitatus edebat,
coniecturam faciebam, vnciale superabat ma-
gnitudinem, metæ formam quodammodo refe-
rens, hoc est ab ampla basi sensim gracilior assur-
gens, cineracei fortè coloris. Paludanus ad se-
missum scribebat pro fructu Balsami Peruijani: al-
terius tamen erat formæ, & valde ab eo diffe-
rens quem eo nomine ante multos annos acci-
piebam, (Lector eius iconem inueniet in prima
tabella cap. xxviii. huius libri) ut ex vtriusque
collatione cuiuslibet manifestum esse poterit. Si
porro vterque conferatur cum fructu à Nicolao
Monardes Balsamo Peruijano attributo neuter
conueniet.

BALSAMVM EX PERV. CAP. XXXIII.

Descriptio

Balsamum Peruvianum quod antè aliquot an-
nos ab Illustriss. Principissa D. Dorothea Du-
cissa Lotharingæ, vidua Illustriss. Ducis Brunsuic.
&c. (cū ei in graui morbo à consiliis ellemus)
Nucula Indica Ovi vix maiori reconditum, gra-
tioso & liberali dono accepimus, liquor est pon-
derosus, mellæ consistentiæ, densus, lentoris
resinacei: color ex ruffo ad nigrum vergens odor
fragrantissimus, Styracis, ad Benzoini suauitatem
nonnihil accedens, & qui sua fragrantia totum a-
død conclaue perfundat, diūque perseueret. Sa-
por subacris, linguam mordicans. Dentibus attri-
tus lentus, nec illicò separabilis adhærescit. Flam-
mam facillimè concipit igni admotus, suauiterq;
olentem similiter fumum spargit. Aquæ iniectus
mox fundum petit, in qua existens, si vel statim
digitis atteratur, albescit: nec idèd lentorem de-
ponit, sed instar resinæ digitis etiā magis, quā
dentibus adhæret.

Lectores considerent idèdne sit cum nostro
hoc quod describit Monardes his verbis: Balsa-
mum nouæ Indiæ, Xilo, liquor est, qui ex nouæ
Hispaniæ littoribus præstantissimus ad nos impor-
tatur, & Balsami nomen obtinuit ob insignes &

Tom. I.

admirabiles eius virtutes huic cum Aegypti vero
Balsamo communes. Prouenit ex arbore Granato
maiore, foliis donata vriticæ, dissectis tenuibus.

Fit autem duobus modis. Primus: Fisso incisus
cortice liquor exstillat tenax subalbidus. Al-
ter, Indis vsitatus. Dissectum truncum & ramos
in minutissima frustula, in capacissimum Lebe-
tem aqua plenum coniungunt & bullire sinunt,
quod satis sit. Quā refrigeratū oleum superna-
tans conchis colligunt; quod pro Balsamo ad
nos inuehitur, & quo illic communiter vuntur.
Colore est pullo, ex ruffo scilicet ad fuscum ver-
gente, odoris suauissimi. Neque verò aliter as-
seruatur, quā in vase argenteo, stanneo, vitreo
aut vitreato, propter insignem penetrandi vim.

Idem parte secunda ait: Qui per incisionem
exstillat, ad nos non adfertur. Multo enim labore
colligitur: iam verò nauibus quibusdam à con-
tinenti Americæ & noui orbis solvenubus ma-
gna copia Balsami incisura extracti ad nos inferti
cepit. Illud autem ex arboribus quibusdam eli-
citur, arboribus eius Balsami, quod per deco-
ctionem paratur, similibus. Hæ sunt magnitu-
dinis processæ, à quibus ad radices rami plerumq;
extenduntur, duplici cortice tecti, exteriori cras-
so, Quercuum cortici simili, tenui altero, qui in-
teriori ligno proximus adhæret. Ac intra hos duos
cortices Balsami liquor collectus per vulnus ex-
stillat, albus, pellucidus, odoratissimus. Huius
Balsami, vel sola guttula toti amphitæ præceden-
tis præfertur, quod vsus eius cuius manifestum
faciet. Et certò mihi persuadeo, huncce Balsa-
mum Aegyptio illo vero, quo iam à tot seculis
caremus, præstantia & viribus neuiquam esse in-
feriorem, ita ut illum etiam isto multò pretiosio-
rem existimem. Est verò mihi illius fructus, exi-
guus quidem pro arboris magnitudine, ciceris-
que grano vix maior, gustu amaricante, in siliquæ
summo latitans, quæ digitum lata, compressa, al-
ba atque tenuis est. Eo fructu vuntur Indi in
suffumigiis ad capitis dolores atque fluxiones tol-
lendas. Idem Monardes proponit iconem pro
Balsami fructu. An verò respondeat eius descri-
ptioni, iudicent qui viderunt aut videbunt. Clu-
sius sanè eam omisit. Consideret Lector, quan-
tū differat ea icon à Balsami fructu Clusii, de
quo nos antè.

Amatus, Opobalsamum (inquit) quod è Pe-
ru regione noua adfertur, purum & sincerum es-
se crediderim, cū tantæ sit fragrantia & odo-
ris, ut omnes alios præstantissimos odores an-
tecellat: quod, ut tradunt qui arborem illuc vi-
derunt ex arbore Pinu persimili non adèd ta-
men procera colligitur, gustu pingue, acutum,
diu in ore saporem retinens, odoris ad Belzini-
um tendentis, colore & substantia aquæ mel-
lis inspissatæ. Manifestum non esse eiudem spe-
ciei cum Iudaico aut Aegyptio: quanquam Tro-
gus Pompeius arbores Opobalsami, quæ in Iu-
dæa nascebantur, Pincis similes fecit, ita ut hæc
arborescunt Peru delineasse visus sit.

Math. liquorem, qui ex Occidentalibus In-
diis odoratissimus adfertur, liquido Styraci ad-
modum similem dicit, quem qui deferunt, in-
quit, Balsamum vocant. Verumtamen cū, te-
ste Serabone, Balsami lachryma lacteo colore sit,
crediderim potius nouum liquorem hunc, ve-
ram Stactem vel Styracis liquorem, quā Bal-
sami: ob id quæ non esse penitus ab re si quispiam
eo Balsami loco vteretur.

At Lacina audentiùs, Balsamum scribit, ex no-
ua Hispania non verum est Balsamum, sed oleum

Arbor Bal-
sami vriticæ
foliis
Quomodo
fiat

Affermandi
ratio

Arbores
Balsami
quales

Fructus
exiguus
Siliquæ
Vix gran-
dus

Amatus

Odoris fra-
grantia

Arbor Pi-
na similis

Differat à
Iudaico
Balsamo
Trogus Pom-
peij Balsamum
Math.

Stactem

Lacina
Styracis li-
quorem

Styracis purissimum. Et alibi: Balsamum odoriferum quod adfertur ex noua Hispania est Dioscor. Styracium oleum.

Scaliger. Consultamus scientissimum Scaligerum. Is ad Cardanum sic scribit. Quæ de Goacomax pingis arbore, unde oleum fiat Indicum, Balsamum ab Hispanis appellatum: cuius facies non persuasit tibi, ut Iudaicæ Balsamo congenerem iudicares: Siquidem ut Balsamum Theophrast. ita tu hanc Punicæ similem agnoscebas. Est apud nos liquor is inter alia Indiæ monumenta. Balsami vires multas æmulatur. Non omnes expertus sum. Tandem in aquam stillatim non diffunditur, sed neque lac cogit, neque fundum petit.

Coll. Flor. Collegium Florentinum quoque & Borgaricus testantur pro Balsami liquore Balsamum ex India aduehi.

Alpinus. Prosper Alpinus in suo Dialogo de Balsamo, Balsami Occidentalis Indiæ, Amati & Monardis meminit. Idem, Balsamum, inquit, nunquam ab aliquo nostrorum vel Arabum visum est neque auditum: nisi forte produceretur nouissime ab Occidentalibus Indiis delatum, à quibusdam pro legitimo Opobalsamo receptum, quod falsum esse plane constat.

Opobalsamum falsum. M. Fume in hist. gen. Indiæ scribit: In Insula S. Donnici Balsamum adulterinum provenire ex arbore Geaconax, nec esse eiudem bonitatis cum Aegypto vel Iudaico. Ad flumen Maragnon inculas coquere panem cum Balsamo, aut saltem cum liquore ei simili.

Geaconax. Goropius: quid dicam, ait, de arbore ex Atlantico orbe, quæ liquorem illum suppeditat nobilissimum, quem ob odorem, suauitatem, & maximas recentium vulnerum curandorum vires, Balsamum vocamus? Eius duo genera sunt, alter cortice inciso limpidissimus distillat, haud secus atque oleum Abiegnum: alter excoquitur & iccirco spiritior est.

Duo genera. Cæsalp. nouum genus Balsami ex India Occid. ex russo ad nigredinem vergens: arbori folia Verticæ: Indi appellant Xylon: decoquunt ramos & colligunt oleum: Lachrymam etiam excipiunt: fructus Ciceris modo inclusus &c.

Opobalsamum. Balsamum Peruvianum compactum, quod immixtum in aqua subsidet, Lob. qui & alibi Peruvianum illud officin. Opobalsamum vocans, minime sincerum ut plurimum esse putat.

Monard. Balsamum Indicum seu Occid. Hist. Lugd. Monard. fructum Balsami dicit: *Linocier, Fruit de Baume.*

Vires & Vitis. Eius usus, auctore Monar. in Medicina tantum celebris, & ab eo ipso serè tempore, quo innotuit India, Hispani quoque Indorum exemplo eo vulnera persanant. Tum primum tanto erat in pretio, ut vicia vna decem aut etiam viginti ducatis venderetur. Hodie verò libra vna non pluris tribus aut quatuor emitur. Romam primum delati vicia centum ducatis fuit diuendita. Nunc tam copiose eo delata, haud ita magni æstimatur, ut etiam amici hoc se mutuo dicent dono: Ad eorum abundantia homines in sui rapit despectum. Nam quod rarum in principio frequenissimo fuit in usu, illud vulgatum nunc, meliorique emptum pretio serè contemnitur, iuxta illud:

Prorium. Omne rarum carum, vilescit quotidianum. Porro triplex eius usus medicus. Aut enim per os introrsum assumitur, aut foris applicatur, aut Chirurgicis remediis permiscetur. Sumptum manducatio Asthmaticis utile est, & vesicæ labe & vlcera abstergit. Menses ciet sumptum, & pelli modo subditum. Dolores Ventriculi inueteratos le-

nit linctu matutino repetito, eumque soborat. Hepatis vitia corrigit: pectus alleviat infarctum: uentrem conseruat. Illustis mihi notus heros, qui ex huius usu frequenti ætatis vigorem iuuenilem cunctis representabat, absque vlla corporis molestia. Pthilicis plurimis profuit. Fæmine steriles, pelli vice feliciter admiserunt. Omnes frigidus & flatulentos dolores apprimè demulcet linctu calido aut imposito linteo eo imbuto. Resoluit enim, discutit, & apostemata antiqua & frigida absomit. Membra roborat impositum. Cerebrum confortat mirabiliter, doloremque lotit à quacunque causa obortum. Paraly sin tollit, si caput, ceruix & spina parique ipsa resoluta eo illinatur. Omnibus pariter nervorum indecilitatibus & Spasmodis medetur. Ventriculo illitum, aut panno calido inductum concoctionem adiuvat, & robur ei addit: status dissipat: oppilationis eius Lienisque remouit atque aperit: Intestidorum cruciatus abigit, calidè insusum: Vrinam prouocat illitum: doloribus iuncturarum mirè confert, in quibus atque adeo Ischiaticis primas tenet. Durities & apostemata resoluit. In nervorum passionibus nulli secundum. Destillationes quasuis abstulit ac sistit.

Sit & in Chirurgia varios habet usus, tum per se, tum aliis medicinis admixtum, quæ omnia particulam exponere longum foret. Cuique peripatetici debitus miscendi utendiq; modus relictus esto. Vulnera quævis, etiam capitis, ubi cranium non fractum fuerit, contusiones item & suppurata persanant. Sed vulnera etiam recentia sine supuratione glutinat.

Eius usus apud Venetos ad plagas celeberrimus est, & vel intra triduum vulnera restituit: omnia præstat quæ ad vulneris glutinationem requiruntur, ut non temerè egenorum thesaurum quis dixerit. Nervorum iuncturarumque, omnia denique tam recentia quam antiqua vulnera vel per se, vel aliis permixtum, mirum quantà felicitate persanant. In febribus chronicis spina eo calente inuncta paulo ante paroxysmum, superhaussisque statim vini aliquot guttis horrores abigit & antevertit discutiendo. Sed repetito usus opus est.

Cæsalpinustradit, Balsamo ex India Occid. delato magnas vires tribui, præcipuè vulneribus glutinandis, & cæteris ad quæ Opobalsamum Aegyptium laudatur. Idem ad suprà scriptos affectus omnes deprædicat, si quatuor aut quinque guttæ vino vel aqua modica vel intra fauces intromittantur sensim deglutendo, ita tamen ne linguam attingat, ut vel gustum deprauet vel eadem pertinacius adhaereat.

BALSAMVM DE TOLV.

ARbores è quibus colligitur Balsamum de Tolu, inquit Monardes, pumilis Pinis sunt similes, multos ramos, quaquauersum spargentes, foliaque Ceratiz similia obunientes, perpetuè virentia.

Præferuntur domesticæ & in cultis natæ. Colligunt verò hunc liquorem Indi vulnerato & inciso arborum cortice, qui tenuis & tenellus est, suppositisque & arbori adnexis veluti quibusdam cochlearibus è Cera nigra, in illis regionibus nata confectis, quæ emanantem è vulneribus liquorem excipiant, quem deinde in alia vascula ad eam rem parata effundunt. Id verò sententissimum bene sole necesse est, ut liquor facilius emanet:

Hepatis
Pectus

Inuenerunt
conferuatio
Pthilicis
Dolor

Temperamentum
Apostemata
Cerebrum
Paraly sin

Nervi
Spasmodi
Ventriculo

Lien
Intestidorum
Vrinam

Ischiaticis

Chirurgicis
usus

Vulnera
Varia

F. breuè

Horrores

Descriptio
arboris.
Ceratiz
folia
Delectum

Colligendi
modus

nam

nam noctu ob frigiditatem nihil efficit. Erumpit etiam interdum ex ipsis arboris nodis & aliis nonnihil liquoris, qui cum exiguus sit, & in solam decidat, perit.

*Balsami
descriptio
Color*

Sapor

Odor

Locus.

*Balsami
Toletani*

Balsamum verò hoc colore est rubro ad aureum tendente, mediè inter liquidum & densum consistentiæ, glutinosus admodum, & ubicunque reponatur firmiter inhaerens: sapore dulci & grato, nec si sumatur nauseam mouente, quemadmodum reliqua Balsama, odore excellentissimo & limonum fragrantiam quodammodo referente, sic ut ubicunque reponatur, abscondi non possit, sed suo odore locum gratiorem reddat, ac etiam paucillum in vola manus attritum, suauissimum spirat odorem, ut Iasmini ferè.

(Lusi. quoque tradit nunc recens aduehi ex continentis quadam Prouincia inter Carthaginem & Nomen Dei sita, Tolu ab Indis appellata: ideòque Hist. Lugdun. Balsamum Toletanum vocat.

Monardes paucillo simili Balsamo à Morgano sub suum è Londino discessum donatum se testatur.

*Vires &
Vius*

Balsamum hic liquor, ut idem refert apud Indos maximè celebris est, ob insignes eius facultates, à quibus edocti deinde Hispani, cum in eos eius effectus animaduertissent, pro re maximi pretii inde in Hispaniam detulerunt, magno illum istic redimentes, nec abs re, quandoquidem præstantius esse maioribusque facultatibus pollere videtur, eo quod noua Hispania aduehitur. Eius facultates insignes sunt, quoniam incisione elicitur, quemadmodum olim Balsamum in Aegypto: ad eadem omnia, ad quæ illud celebratur efficax. Omnia recentia vulnera curat, consolidat, glutinatque labra, nec materiam purulentam in eis exoriri sinit: quòdque maius est, nullum cicatricis vestigium curatis vulneribus relinquit, si eorum labra probè iuncta fuerint.

Vulnera

*Faciei
vulnera*

*Vulnera
in facie*

Quapropter in faciei vulneribus singularis est. Primum autem emundandum est vulnus, ab omni spurcitie, & vino eluendum: deinde eius labra probè vnienda, Balsamumque sub tepidum illinendum, & lineus pannus duplicatus eodem Balsamo intinctus superimponendus, atque ita colligendus, ut labra hiare nequeant. Postmodum victus ratio sit tenuis, seorsumque vena si necesse sit, quarto demùm die solvatur ligatura (nisi symptoma aliquod antè solvere cogat,) & vulnus consolidatum inuenietur. Quod si singulis diebus vulnus curare necesse sit, lineum pannum Balsami intinctum liquori subinde adponendo glutinabitur. Etenim eius facultas est prohibere, ne materia in vulnere generetur. Præsertim verò vtile est in vulneribus in quibus confracta sint ossa, exemplis prius iis, quæ separata sint fragmentis, & reliquis intactis, quoniam Balsami facultas ea expellet, vulnusque sensim consolidabit.

*Vulnera
articularia*

Mirz etiam virtutis est in articularum vulneribus & neruorum sectionibus, omnibusque puncturis: etenim ea curat & à contractione liberat, ne partes inutiles fiant, & motu priuentur.


Punctura

Quævis

Atque penetrantia & cuniculosa vulnera curantur huius Balsami albo vino mixti per Syringam iniectione, & post ternas deinde horas eius educatione. Idem fit in vulneribus punctim inflatis, semel in die mediocriter calidum iniiciendo. Vtile præterea est in contusionibus, reliquisque Chirurgi operam requirentibus, modò nulla insignis inflammatio addit: Ea verò conuenienti-

bus medicamentis sublata, Balsami est usus. In morbis in quibus Chirurgi opera non est necessaria, plurimum profunt huius aliquot ex albo vino guttæ, veluti in asthmate. Capitis dolorem à frigida causa prognatum lenit lineus pannus eius liquore tinctus capiti circumligatus. Temporibus adpositum, omnem defluxionem, in oculos præsertim, cohibet, eorumque dolores leuat: præcalidum cerebro impositum dolorem tollit, roborat, & Paralyti remedio est. Vtilis sunt & nonnulli Phthysici, manè aliquot guttæ è manu lambendo, magnamque senserunt commodum, quoniam peritus egregiè expurgat. Aliquot eius guttæ ex aqua vitæ calida initio rigoris in quartanis aut tertianis diuturnis & importunis sumptæ, vtilis sunt: sed etiam ante frigus eodem Balsamo seruenti oleo rutaceo permixto ceruices inungendæ. Si quis ab officio ventriculi ad umbilicum usque inungatur, ventriculus roboratur, & dolore liberatur, languens ubi appetentia excitatur, concoctio iuratur, flatus discutuntur. At longè maiore efficacia illud molitur, si æquales Balsami & olei Nardini compositi vel simplicis partes misceantur: facilius etiam illinitur. Longa experientia apud Indos probaturum est, eos qui Hydropicorum in morem tument, si hoc Balsamo æquis partibus cum vnguento aperitiuo mixto ventrem illinant, Licet: regionem præsertim, magnum leuamen sentire: quoslibet tumores & œdemata cuiusunque partis corporis resoluit: omnes dolores à frigida causa promanantes, etiam diuturnos, tollit, emplastri modo applicatum, & continuè delatum donec spontè decidat. Eisdem effectus præbet calidè adpositum, lineòque panno, qui aqua vitæ selectissima & calefacta madeat, superimposito, ubi sunt flatus, siue in vent. e, siue in alia corporis parte. Magnæ est etiam efficaciz in Nephritico dolore, si seruens cum aliis oleis ad eum morbum vtilibus mixtum illinatur: contractum nervorum dolorem lenit, & si per summos æstus illo illinantur & fricentur, eos relaxat. Parotides seu Scrophulas cæcæ & apertæ curat. Alias præterea multas facultates obtinet hic mirabilis liquor, quæ me latent: sed quas intelligere potui, vniuerso orbi notas facio, ut ad eod præclaro medicamentum, & tam insignibus viribus prædito (quibusque longè plures & maiores tempus detegat) quilibet uti queat.

BALSAMVM NOVVM FRVCTV RACEMOSO.



Utor generalis historiz Indiarum narrat in India & Hispaniola insula plantam quædam spontè nasci, arboris magnitudine, utpote quæ ad duorum hominum proceritatem interdum assurgat; caulibus cinereis, foliis viridibus, superiore parte magis quam inferiore, grandibus & amplis, costa crassioribus & elatioribus per

Asthma

Defluxio

*Paralyti
Phthysici*

*Quartana
Tertiana*

*Ventriculi
lms.*

*Ventriculi
mor*

*Tumores
diuersarum
partium
Dolores*

Flatus

Nephritici

Descriptio

Fructus. per medium diuisis foliorum pediculis non virē-
tibus, sed rubescentibus. Fructus est racemosus,
longus, instar manus digitate, acini eius rari, viren-
tes, quandoque rubescentes, & qui maturescen-
do magis ac magis rubescunt. Succum ex eo hoc
modo extrahunt. Cymas & asparagos teneros hu-
ius plantæ colligunt, alii racemos addunt, & ex
his succum exprimunt, quem in aqua coquunt ad
dimidias: deinde magis ac magis ad saporem aut mel-
lis crassitudinem. Residere sinunt, & ad vsum re-
ponunt. Eius folium hic ad vium est expressum,
veroque extremo acuminatum, sex digitos longū,
latum quatuor cum dimidio.

**Folia de-
scriptio.**

Locus

Vires

Sanguis

zuz

Aqua de-

stilla

Vulnera

Morbi fro-

gidi.

Ventricu-

lus.

Reperitur in multis locis Insulæ Hispaniæ.
Vlceribus & Vulneribus admovent: sanguinem
etiam reprimunt: terget & mirificè eis medetur,
etiam vero Balsamo efficacius. Ex eius summitati-
bus destillatur aqua, præstantior aqua vitæ, vul-
neribus utilissima, & morbis omnibus qui à fri-
gore ortum habent, uti dolori ventriculi aut par-
tis alterius, si diebus aliquot bibatur. Refert Hist.
Lugd.


De hoc Balsamo Posthius Electoris Pal. Medi-
cus doctissimus sic cecinit.

*Hæc fertur ex Hispania
Nova nouum, ecce Balsamum,
Aegypto haud minus potens.
Odore nam suauissimo.
Nares caputque recreat,
Morbiisque prædest frigidis
Infirma firmans viscera.
Idem dolores corporis
Totius illitum lenat:
Vnguento & omni fortius
Cruentæ sanat vulnera.
Miram è Dei potentiam!*

**BALSAMVM VERVM, XYLOBALSAMVM,
CARPOMBALSAMVM, OPO-
balsamum.**

CAP. XXXVI.

**Ordinis de-
scriptio.**



vel adulterari, vel eidem substitui, aliæque quæ
suadere poterant, hoc pouissimum loco de eo
tradendum.

**Xylobalf.
descriptio.**

Porrò ut à nobis notis exordiamur, exoleti illi
ramuli, qui Xylobalsami nomine in Offic. vendi-
turi, nec saporem nec odorem ullum evidentem

lenibus ingerere solent, contorti, digitali cras-
sie, duplici cortice instructi, exteriori tenuiori, ru-
goso, cinereo, aut ex cinereo rufescente, interio-
re crassiore, fusco, textura satis compacta: nodosi
sunt admodum & multis tenuibus ramulis bra-
chiati.

Carpobalsami nomine in Offic. habentur semi-
na Terebinthi acinorum oblonga forma & ma-
gnitudine, pediculo breui donata, cortice ru-
goso, fusco, quatuor costis in totidem quadrantes
distincta, cui subest tenerum putamen album, sæ-
pè callum, interdum nucleo pingui dulci, nisi ve-
rustate nimia rancescat, grauidum: alioqui sapor
effæcis, cuiusmodi in officinis asservari solent gra-
næ, nullus: nullus odor.

In ipsius verò arbutulæ descriptione, mirum
quàm inter se variant autores, ut patebit in pro-
gressu. De namque tam pretiosa, tam rara, sed tam
principibus atque magnatibus omni tempore ex-
petita aliquid solidi medicum & Bontanicum scis-
se par est. Operæ pretium igitur facturi si autorū
tam priscorum quàm recentiorum, & inter hos il-
lorum potissimum qui Aegyptum peragant,
eiusque solum natale viderunt obseruata in me-
dium producamus, exorsū à Theophrast. Bota-
nicorum vetustissimo.

Balsamum, inquit ille, in valle Syriæ gignitur,
in duobus tantum, uti ferunt, hortis, quorum alter
viginti iugerum est, alter multo minor. Ar-
boris magnitudo, quæ magnæ malo Punice, ra-
mis valde multis, folio Ruta simili, sed subcandi-
diore, perpetuè virente. Fructus similis est Tere-
bintho, magnitudine, figura & colore, valde odo-
ratus, ipsa que aded lachryma odoratio. Hanc ex
incisura colligi tradunt in caudicem facta vngu-
ibus ferreis circa supremam, sub sydere, æstu seruen-
te. Colligi æstate tota perhibent nonnulli, verum
haud multum esse quod effluit, nec magis vna
conchâ plenâ in diem colligi. Sed odoris suavi-
tate eximia & diffusa præstare, aded ut vel tantilli
odor longum spatium permeet: sed sincerum ad
nos nullum aduehi, sed eum collectum est atque
permixtum: multarum namque rerum permixtio-
ne vitari, & quod in Græcia venditur
sæpè adulteratum esse: Sed & valde odo-
ratos esse huius arboris ramulos, hosque quotan-
tis putari, non tam ut reliqua valentiora seruen-
tur, quàm ut emolumenti plus comparatur: ven-
di namque vel illos magno posse pretio. Atque
huius arborum cultus causam ad imbres referunt,
quos crebriùs decidere perhibent: Sic & virgarum
amputationem causam quandam esse dicunt, ne
procera fiant arbores. Etenim frequenter puta-
re vel attonse, virgas tantum emittunt, nec in
vnum caudicem vites intenduntur. Sylvestre Bal-
samum nullibi extare accepimus. Ex maiori hor-
to vasa duodecim plena colligi, quæ congruè dimi-
dium capiant: Et ex altero duo tantum. Sincerum
vendi duplo ad argentum pretio: pro ratione mi-
xtionis. Balsami præstantiam præcipuè in odore
consistere uideri.

Solius in Polyhist. similes vitibus stirpes esse
tradidit.

Strabo Cosmog. 16. Balsami historiam paucis
complexus est, his verbis: Hænicus est campus à
montana quadâ valle circumdatus, quæ in theatri
speciè ad ipsum declinat. Hoc in loco est Palmetū,
cui immixta est etiam alia materies domestica, &
ferax, Palmis abundans, spatio stadiorum C. &
totum irriguum & habitationibus plenum. Vbi
& regia est, & Balsami viridarium, quæ arbor a-
romatica est & fructuosa, Cytisq; & Terebintho per-
similis.

Arbori
descriptio
Cyso
Terebinthi
similis
Balsamum
Levi simile
omnis
in hoc loco

Simile: etiam totidem scindentes succum in vasis suscipiunt, tenaci lacti perficientem, susceptus autem in conchis coagulatur. Dixerat autem eodē lib. in Arabia apud Sabaeos tractu maritimo thurs & myrrham & Cinamonum nasci: in ora etiam Balsamum & quandam aliam plantam valde odoratam. Et rursus: à Iordane lacum esse: qui aromaticam Iuncam & Calamum ferat: habere etiam paludes. Lacum Genesareticum vocari. Gignere etiam Balsamum. Videtur autem Strabo Sylvestre balsamum aliquod denotare, eo quod sponte in maritimis Sabaeorum nascitur, et si istud incognitum fuerit Theophrasto.

Balsamum
fructu

Et Dalaperte scribit si huiusmodi illud esse. Pausanias in Bœotia balsami arbores in Arabia describit, Myrtorum magnitudine, foliis Amaraci. Videat Lector reliquam historiam viperarum sub eius fronde latitantium, quam longum esset hic referre.

Plinius

Sed consulamus potius Plinium, qui non parum balsami historiam ex Veterum monumentis, suisque annotatis illustrasse videtur. Postquam igitur de pluribus Arabiæ & Aegypti odoratis tradidisset, omnibus odoribus præferri (inquit) balsamum, quoniam terrarum Iudææ concessum, quondam in duobus tantum hortis, utroque regio, altero iugerum xx. non amplius, altero pauciorum. Servit nunc hæc, & tributa pendit cum sua gente, in totum alia natura, quam nostri externique prodiderant. Quippe Viti similior, quam Myrto. Mallois sibi dicitur, nuper vineta, ut vitis: & implet (at nunc implet Dalec.) colles vinearum modo, quæ sine adminiculis se ipsæ sustinent. Tondetur similiter fruticans, ac rastro nitescit, properatque nasci, intra tertium annum fructu ferre. Folium proximum Rutæ, perpetua coma. Saxiæ in eandem Iudææ, sicut in vitam quoque suam. Contra defendere Romani, & dimicatum pro frutice est. Seritque nunc eum Fiscus: nec unquam fuit numerosior aut præcior. Proceritas intra bina cubita subsistit.

Arbori
descriptio
Balsamum
Levi simile
omnis
in hoc loco

Arbori (Xylobalsamo) tria genera. Tenui & capillacea coma, quod vocant Eutheristum. Alterum scabro aspectu, incurvum, fruticosum, odoratis: hoc Trachy appellant. Tertium Eumeces, quia est reliquis procerius, lævi cortice. Huic secunda bonitas, novissima Eutheristo. Semen eius (Carpobalsamum) vino proximum gustu, colore rufum, nec sine pingui: perus in grano, quod levius atque viridius. Ramus crassior, quam Myrto. Inciditur vitro, lapide, ossisve cultellis. Ferro lædi vitia odit. Emortitur protinus, eadem amputari superuacua patiens. Incidentis manus libratur artifici temperamento, ne quid ultra corticem violet. Succus (alibi oleum vocat) è plaga manat, quem Opobalsamum vocant, suavitatis eximie, sed tenui gutta: ploratu lanis parva colligitur in cornua. Ex iis nouo fictili conditur crassiori simili oleo, & in musto candida. Rubescit deinde, simulque durescit & translucido.

Opobalsamum

Alexandro Magno res ibi gerente, toto die æstivo unam concham impleri iustum erat. Omni verò fecunditate è maiore horto congios sex, minore singulos, cum duplo rependebatur argento (Quem locum ex Dioscor. & sic restituit doctiss. Budæus lib. 4. de assē: Anni verò fecunditate è maiore horto congios senos singulis annis, cum & duplo rependebatur argento.) Nunc etiam singularem arborum largior fena, per omnibus percutitur æstibus, postea deputatur. Et sarmenta quoque in merce sunt DCCC. (denariis trecentis.) Amputatio ipsa

furculisque vendit intra quatuordecim annum. Xylobalsamum vocatur, & coquitur in virgulis. Pro succo ipsum substituere Officinarum: corticis etiam ad medicamenta pretium est. Præcipua autem gratia lachrymæ, secunda semini, tertia cortici, minima ligno. Ex hoc buxosum est optimum, (inquit Dioscor. Plin. videtur legisse in hoc loco) quod est odoratissimum: è semine autem maximum & ponderosissimum, mordens gustu, feruensque in ore. Adulteratur Potius Hyperico, (semine Hyperico simili, quod à Petra oppido defertur Dioscor.) quod coarguitur magnitudine, inanitate, latitudine seu longitudine, odoris ignavia, sapore Piperis. Lachrymæ probatio, ut sit pinguis, tenuis, & modice ruffa, & in fuscando odorata. Secundus candido color, peior viridis crassaque (crassaque Dalec.) pessimus niger. Quippe, ut oleum senescit. Ex omni incisura maximè probatur, quod ante seminem fluxit. Et aliàs adulteratur semine suo (seminis succo. c. h.) vixque maleficio deprehenditur gustu amariore. Esse enim debet lanis, (lævis Dioscor.) non subacidus, odore tantum austerus. Vitiatur & oleo rosæ, Cypri, (Cypri m. & ch.) Lentisci, Balani, Terebinthi, Myrti, Resina, Galbano, cera Cypria, (cerato Cyprino aut Myrtino Dioscor.) prout quæque res fuit. Nequissimè autem gummi, quoniam ipsum quoque in hærescit manu inuersa, & in aqua fidit: quæ probatio eius gemina est. Debet sincerum & in hærescere: sed hoc & gummi addita fragili crusta euenit. Et gustu deprehenditur. Carbone vero, quod cera resinaque adulteratum est, nigrescit flamma. Nam melle matatum statim contrahit muscas. Præterea sinceri densatur in tepida aqua gutta sidens ad ima vasis, adulterata olei modo innatat: & si in metopio vitata est, circulo candido cingitur. Summa probatio est, ut lac coagulet, in veste maculas non faciat: nec manifestior alibi fraus. Quippe millibus denarium sextarii empti: tendente fisco tricenis denariis vzvenit. In tantum expedit augere liquorem. Xylobalsamo pretium in libras vi. (xv. m. & ch.)

Tacitus medicam arborem ait, ut non tam ex aliorum erga cæteras arbores comparatione, quam definitè ex hoc parvam arborem esse oporteat.

Iustinus historicus è Trogo Pompeio tradit, Opes genti ex vethgalibus Opobalsami creuisse, quod in iis tantum regionibus (Iudææ gignitur. Est namque vallis, quæ continuis montibus velut muro quodam cincta instar hortorum clauditur, spatium loci ducenta millia iugerum, nomine Iericho dicitur. In ea valle sylva est, & vberitate & amœnitate insignis, siquidem Palmeto & Opobalsamo distinguitur. Et arbores Opobalsami formam similem Piceis arboribus habent, nisi quod sint humiles magis, & in vinearum morem excoluntur. Hæc certo tempore anni Balsamum sudant.

Iosephus quoque magnus ille Hebræorum Historicus in Iudæa nasci confirmat. Et Egesippus de excidio Hieros. Locum ait propè Hiericho esse, in quo Balsamum gignitur, virgulisque innascitur, quæ acutis lapidibus incidunt pueri agricolarum, perque eas incisiones destillare humorem lachrymis pulchrè rostantibus.

Diosc. non solum in consille Iudææ quadam, sed Aegypto quoque nasci testatur, cuius verba quoque de Balsamo referre lubet, quod à prædictis, maximè Plinio, non parum euariet. Sic igitur

Xylobalsamum

succeda

neum Balsamum

Cortex

Lignum delens

Seminis delens

Adulterio

Seminis delens

Lachryma

probatio

Aliud adulterium

et id est

rimum

Probatio

Summa

probatio

Pretium

Parua ager

Loci descriptio

Piceis formae

modi esse

Indie haberi Balsamum sincerum apud nos Balsamum
 gypto Turcarum & Barbarorum rabie & incur-
 sionibus. Itaque nemo speret temerè se sinceram
 Balsami lachrymam consecuturum. Quid dicemus
 sinceram? ne adulterati quidem copia nobis con-
 tingit, & si importetur ea, in Principum tantum
 versatur manibus, qui potissimum speciosis eius-
 modi imposturis illiciuntur. Vidisse scetamen ve-
 rum Balsamum gloriatur idem, quod hominum
 memoria aliqui ex Aegypto attulerint, Hieroso-
 lymis huc reuersi, colore fuluum, lentum, spis-
 sum & inueteratum: interim tamen suauissimi
 adhuc odoris, cuius tantillum totum palatium
 penetraret. Antiquitus, ut tradunt superscripti
 authores, Plin. & Theoph. Balsamum vni terra-
 rum Iudæa concessum erat. Sed postea, si Matth.
 credimus, propagata admodum fuit species, cum
 Iudæa ipsa simul cum Balsamo Romani positi
 sunt, qui eam malleolis ferendo, atque iterando,
 non secus ac vites in collibus propagantur, la-
 tidius auxerunt. In Arabia nasci ex Pausania di-
 ctum, sed quomodo sit factum [ut in Syriam pe-
 regnantes vno ore fatentur] quod hoc tempo-
 re omnibus sanè balsami plantis Iudæa sit peni-
 tibus destituta, cum olim sola eiusdem ferax à com-
 plundus crederetur, declaratu haud ita obuium.

Indie haberi Balsamum sincerum apud nos Balsamum
 Verum, inquit Matth. cum certò sciam proba-
 tissimorum virorum testimonio, qui ex Italia sol-
 uentes plures in Aegyptum nauigarunt, Mem-
 phi balsami viridarium extare. Illud fortasse eue-
 nisse putandum est, quod è Iudæa ab Aegypti re-
 gibus, quibus vniuersa subiiciebatur Syria omne
 in vniuersum balsamum ed fuerit translatum,
 quod decoris inde plurimum Regiæ accederet. Si
 vnquam hodie Opobalsamum venale inuenia-
 tur [tamen in Italia per longas ætates non am-
 pliùs venturum putem] non ematur, nisi priùs
 de eo omne fiat periculum. A Veterum balsami
 fructu, quod hodie Carpobalsamum vocatum,
 & ex Alexandria importatur longè differt. Suspi-
 candum hoc idem esse semen simile hyperico,
 quod [ut suprà ex Dioscor. diximus] olim à Petra
 Palestinæ oppido deferabatur.

Xylobalsamum vulg. Myrrus
 Quod Xylobalsamum hodie vocant potius
 Myrrum quam balsamum referre censet Matth.
 Mirum Dioscoridem corticis non meminisse, &
 Plinio tamen dictum, eiusque medendi vsum.

Amara
 Amarus certum se ait balsamum in Aegypto
 nasci, indeque nunc Xylobalsamum verum ad-
 duci, primo aspectu vitis ramusculos figura & co-
 lore referens. Ceterum hodie alibi balsamum,
 quam in supradictis regionibus nasci sibi cogni-
 tum. Sed aliud balsamum non intelligit, quam id
 quod priùs Peruvianum vocatum, quod verum
 balsamum Antiquorum non est.

Cautio
 Fuchsius in ea suspitione est, quemadmodum
 & Lacuna, neque Carpobalsamum, neque Opo-
 balsamum, neque Xylobalsamum Sepalsiarum
 esse legimum & verum: ideòque non temerè
 illis ad conficienda medicamenta vtendum, sed
 potius ex officinis Medicorum eicienda, & suc-
 cedaneo illorum vtendum esse, de quo nos pos-
 teà specialius quodam trademus.

Cardam.
 Scaliger suo more censoria stipatus virgula in-
 cedit. Sic enim Card. alloquitur: balsamum de-
 fuisse ais: ac paruo esse in pretio: quorum vtrumq;
 vanum est. Nam & apud Maximil. Cæl. multum,
 & nonnihil apud patrem meum vidimus, ex ipsis
 allatum locis purissimum: Nec parum apud Ca-
 rolem Sabaudiz Ducem. Miror te Iesemino bal-
 samum comparasse. Aboali non corrigebas? qui
 de balsamo cum scriberet, idem & in aqua con-
 stare, & cum aqua misceri scripserat in eodè loco.

Tom. I.

Lonicerus lignum quod Xylobalsami nomine
 adfertur excoctum putat, quemadmodum & fru-
 ctum adulteratum. Is balsam figuram habet, ad
 descriptionem effictam, non ad visam plantam.

Castor Durantes quoque figmentum ponere
 videtur pro balsamo. Munsterus herbam vocat in
 sua Cosmogr. & picturam stirpis nec visæ nec co-
 gnitæ exhibet.

Scriptit Lob. ex professo libellum de balsamo,
 ex quo sequentia potissimum ex eius observatio-
 nibus annotanda. Dioscor. vires balsami melius
 quam stirpem notam habuisse, eòque ab Aegy-
 ptis potius & Arabibus quam à Græcis peten-
 dam. Apud Dioscorid. minimè legendum
 [quamvis omnino ita legendum censeat Mar-
 cell.] sed eam vocem expungendam, aut legen-
 dum *Lythrum*, cui & Strabo comparat. Pro Pyracan-
 tha apud Diosc. leg. Pyracantha, cuius nulla men-
 tio apud Antiquos.

Apud Trogum Pompeium, quem & Iustinus Trogi mem-
 historicus citat meritò mendum multi docti in
 codice suspicantur, quando balsamum Piceæ ar-
 bori comparat. Pausaniæ collatio cum foliis Sam-
 puchinis balsamo minimè repugnat.

Matthiolo mastix Guilandinus, Bellonius, &
 Prosp. Alpin. qui arbusculam foliis Rutæ aut Len-
 tisci, aut lasmini proficuntur, quod Theoph. Dio-
 scor. & Plin. minimè repugnat.

De balsami liquore varia est lectio. Alii *de Balsam.*
 ne cum Ruell. & Marcell legunt, qui citissimè pe-
 netrat, facillè diluitur: quæ lectio rei ipsæ mini-
 mè quadrare videtur. Alii, ut rei meliusculè con-
 ueniat *de Balsam.*, quod facillè scissilis, penetrabi-
 lis & facillè diuiditur, vertunt. Vetus interpret
 Serenun interpretatur, qui *de Balsam.* legisse videtur,
 Serap. secutus, quem *de Balsam.*, id est, facillè solu-
 bilem legisse autumant: nam ipse interpretatur
 velocis resolutionis. Marcelli verò versio reci-
 pienda videtur, quia maximè cum balsamo par-
 tium tenuitate convenit. Quod etiam à Plin. te-
 nue dictum est: multoque magis etiam ab ipso
 Gal. lib. 7. simpl. qui Diosc. tacitè reprehendit. V-
 bi autem Diosc. dicit adulterari Cypria cera liqui-
 da, videtur legendum Cypreo aut Cyprio, cum
 nulla sit cera Myrtea aut Cyprea.

Opobalsamum trassum [inquit Lob.] legitimæ
 Terebinthinæ Cypriæ veteris siue victæ aut resi-
 naceorum liquorum instar densatum seruamus,
 glebæ Benzoini ferè concretionem, sapore acri, &
 colore fuluo, masticanti ut Mastiche, lentescente.
 Recens præfertur Antiquis, quare in hoc maximè
 vulgus hallucinatur, qui quod antiquius est, eò
 melius opinatur. Viperæ illæ, quæ in balsameticis
 vitam degunt, innocuæ sunt.

Carpobalsami arborem Aduersaria ex amici cu-
 iusdam relatione sic referunt. Humilis est frutex,
 aspectu deformis, cineracei coloris, flore lasmini
 lutei simili, minore, perpetuis virgis. Liquor au-
 reus, sapore Moschi. Mirum verò quod Pen. &
 Lob. in suis Aduers. referant, [ex cuiuscunque id
 tandem testimonio tradant] & contra omnium
 scriptorum authorum sententiam, saporem esse
 Moschi. Si odorem intelligunt, neque sic verè
 narrare videntur: quis enim vnquam balsamo
 Moschi propriè tribuit odorem? Si saporem, quæ
 quæso possit esse saporis gratia Moschi, partis ex-
 crementitiæ, siue iam sanguis sit, siue ludor, siue
 peculiaris alia collectio excrementitia, de quo
 nondum constare certò apud plerosque videtur.
 De genuini verò balsami odore & sapore, plus sa-
 tis suprà.

C. Bauh. apud Matth. balsami arbusculam de-
 C. Bauh.

Gc

*Flor Viola
alba.*

scribens, ait esse floribus albz violæ similibus, vt figura Alpini adposita exprimat. Mox subdit in India & Aegypto prouenire. At apud nullum hactenus autorem legimus flores esse Violæ albz, nec illud Alpini icon declarat vlla ratione, nec ipsius Alpini historia, qui expressè ait Acaciæ floribus proximos, id quod dicta icon haud inconcinne exprimere videtur, quæ flosculos ex meris apicibus constantes exprimit, quales nemo stirpium gnarus facillè dixerit, vllam habere similitudinem cum Leucoio. Præterea negant Alpinus & Bellonius, quibus præ aliis huius fruticis vera & exacta debetur historia, prouenire in India ac Aegypto spontaneam.

Sed par est tandem & eos audiri qui ipsam arbusculam in loco suo natali viderunt & eius historiam literis prodiderunt, quales inter alios præcipui sunt Theuetus, Bellonius & Prosp. Alpinus, qui posterior de eo tractatum integrum conscripsit. Huic Italia, sed potissimum Serenissima Respub. Venetorum debet, quod Aegyptii Balsameti monumentum viuum in Augusta sua viderint vrbis. Binas, inquam, plantas, ex Arabia cum aliis (nisi fallor secum allatas, aut accersitas, sed duas tantum habuisse & coluisse, ex ipsomet [ego Cherlerus, cum anno 1596 & 1597 Patavii agerè] intellexi, & alteram quonque bis vidi, quæ Leucoii magnitudinem non excedebat, foliis lasmini quodam modo: de cæteris certò statuere, quoddè longinquo tantum & per fenestram viderim, non possum. Altera autem famuli eius uti putabatur, vel cuiusvis alterius maleferati furto nequissimè ei erepta, aded morosum ipsum effecit, vt nemini aditus ad residuum pateret. Vidi tamen, & semel vidit mecum Henricus Ellenberger, tum Consil. Illust. Germ. nat. Patavii, qui nunc, vt audio, professorum Celeberrimum agit Marpurgi, qui idem mecum, si recordatur, testari potest. Sed quid magno opus testimonio, cum hoc notum sit omnibus, & ipsemet iam superioribus annis aluerit, vt ex ipsiusmet testimonio aliorumque infra patebit: & ipse Alpinus adhuc sit in viuis, nunc magno suo merito Celeberrimi illius horti Patavini præfectus, idemque Professor Botanicus Patavinus.

*Theuetus.
in Alp.*

Sed placet prius audire Theuetum. Hic testatur se vidisse hortum non procul à Cairo Aegypti liquore illo raro & preuoloso ex Balsamo arbore profuente celeberrimum, quam Prouinciæ præfectus adhibitis custodibus diligentissimè cõseruat, vt eius liquorem colligat, quem quotannis ad Turcarum Imperatorem mittat. Itè à Græcorum Patriarcha & vrbis senioribus audiuisse, eum qui hodiè colligitur, neque tam oleosum, neque vulneribus vlcenibusque curandis tam utilem, quàm qui postremi Regis Aegyptii tempore colligebatur. Plures quidem clam Opobalsamum vendere, sed adulteratum. Narrasse Arabes ex historiis Cleopatram Aegypti Reginam ex Iudæa Balsamum primum in Aegyptum transtulisse. Sed huic historiæ vix assentitur Theuetus, quod in alia vulgari Græca lingua conscripta, in Palæstina legent, Traiani tempore Balsami seracia fuisse montana Engadi, & quædam alia Asiæ minoris loca: quanquam re vera cum hæc lustraret, nullam reperire potuerit Balsami stirpem. Præterea Balsamimontis Libani incolæ ex historiis suis referebant, in quadam montis parte, quæ Solis ortum spectabat, Alexi Græcis imperante, tantum Balsami colligi solitum, quantum in Aegypto. Sed regione à Turcarum tyrannide oppressa, & exacta inde Christianis, eius liquoris memoriam vnâ

cum planta ipsa exoleuisse. Aegypti Reges nihil pretiosius habebant, quod Regibus & Imperatoribus Persidis, Catax, Aethiopia, Græciæ, cæterisque dono darent, siue ad ineundam, siue ad confirmandam cum eis amicitiam.

Autor descriptionis Africæ, in octaua eius parte tradit extra urbem Aegypti *Milfrubersch* primam in Aegypto à Mahumentanis conditam ad Nilum, excellentes esse & magnificas sepulturas Regum Aegypti: nec procul ab illis esse hortum vnicam alentem, arborem, quæ Balsamum producit, nec in toto orbe vllam aliam esse præter hæc solam. Plantata est in medio fontis instar putei: nam est procera arbor. Folia eius similia sunt foliis Viis & parua. Audiuisse se refert, qui dicerent, si aqua fontis diminuatur, plantam ipsam siccatam iri. Hortus cinctus est validissimis muris, in quem ingredi nemo potest nisi maximo fauore, aut dono custodibus dato. Multa quidem hæc illi de Balsamo: nullus tamen notis omnibus delineauit eius imaginem, vt verisimile sit eam præsertim Veteribus illis incognitam fuisse.

Bellonius denique & Alpinus Balsami historiam perspicuè, vt putamus, sic tradunt. Arbuscula est (inquit Alp.) viticosa, quæ excreuit ad altitudinem *Elbanne*, seu Ligustri, vel Cytisi, folia paucissima gerens, Rutæ proxima, non tamen, vt dicebat Dioscor. iis candidiora, sed potius Lentisci foliis similia cernuntur, scilicet colore viridi, subalbido, perpetuòque virentia. Eius lignum gummosum lenèque apparet, colore exteriori subrubro, cuius ramuli eodem colore conspicui sunt, longi, recti, graciles, paucis foliolis ordinatim referti, foliaque simul terna, aut quina, aut septena alæ adnata, aliquo pacto Lentisci foliorum æmula. Sunt ramuli odorati, gummosi digitisque contrectati eis tenaciter adherentes. Flores fert paruos, albos, Acaciæ floribus proximos, ternos singulis appensos, quasi in umbellæ forma, summè odoratos (odor paululo temporis resoluitur) à quibus semina promanant flaua, folliculis nigris subrubescens contenta, valdè odorata, intusque humorem flauum melli per similem habentia, sapore subamaro, parumque acri linguam ferientia, Opobalsamumque, redolentia, Terebinthi fructuum figuræ & magnitudinis æmula, extrema aculeata & medium crassum obtinentia. Opobalsamum, cum primum eductum, colore, vt audio, est albo, qui paulò post in viridem, tertid in aureum, & demum in melleum mutatur. Eius succi etiam substantia in primis turbi la crassaque, vt oleum statim ab Oliuis expressum cernitur, postea tenuissima atque clarissima, demum Terebinthi modo crassescit, odore eximio in primis atque acutissimo Terebinthi redolens, cum suauiore odoris fragrantia cernitur, saporeque amaro, acri & adstringente. Lenissimè est in primis diebus, atque vsque aded validi & acuti odoris, vt aliquibus inter odorandum sanguis è naribus eruperit, & præ multà eius leuitate in aquam stillatum non desidet, sed ex alto in eam proiectum parumper in ipsa mergitur, ferèque continuò assurgens supra totam aquæ superficiem totum expanditur, eique miscetur, & citissimè in ea dissoluitur, vt ab aqua maximà cum difficultate separatur: in qua paulò post concreuit atque coagulatur, coagulatumque stylo totum ab aqua eximitur, quodd tunc colore lactescit, siue album quale lac visitur. Quantò hic succus annosior, edè sit inodoriator, atque ad motum segnior. In primis itaque stirim albo colore cõspicitur, qui color paucissimis diebus in viridem mutatur, oleique crassitie cernitur, qui postea longo tempo-

Folia Viis.

*Balsam.
Alp. hist.
Balsam.
Ligustri
vel Cytisi
facie.
Rutæ folia.
Diosc. nar.
Lentisci fo-
lia.*

*Acacia fo-
res.*

Semina.

Sapor.

*Terebinthi
fructu.*

*Odore quod
homines.*

*Anno ei
molestus.
Mutatio
per etatem.*

*De iore
quodam.*

ris intervallo depuratur, nonnullique annis tenuissimus euadit atque clarissimus, ex viridique colore in aureum splendidissimum transiit. Senio vero confectus, crassus qualis Terebinthina fit, qui si in aqua vel lacte stilletur, statim confidet, multaque cum difficultate, & non nisi longo tempore, denud supra aquam fertur, tardissimèque in ea dissoluitur. Vnde Plinium ex variis coloribus ac substantiis in Opobalsamo inspectis, varias eiusce facies differentias vel species facientem errasse clarissimè patet. Improprie & falsè Opobalsamum quoque appellatur nigrum illud, quod ex India Occid. importatur, cum sit diuersæ arboris, magnitudine, figura, ramis, foliis, fructibus, à vera balsami arbore longissimè differentis.

Plin. error.

Opobalsamum utrum Indicum

Bellon. de scriptis.

Putatio necessaria.

Lyci Terebinthi & Pyracanthæ magnitudinem

Iustin. error.

Cueris folia.

Foliorum numerum

et proportionem.

Lignum quale.

Foliorum varietates

prodeunt.

Folia Amari.

Ruta folia.

Ramorum & foliorum qualitates.

Geminis cortex.

Corticis sapor.

Locus.

Bellonio teste, quotquot eius frutices in horto Matereæ apud Cayrum aderant, stipitem solum habebant pedis longitudine & pollicari crassitie, tenuibus alis præditum, raris foliis obsitum. Vbiunque autem nascantur, duorum aut trium cubitorum altitudinem non superant: & pedali altitudine cum sint, in multos graciles ramulos anserinæ pennæ caule haud crassiores finduntur. Balsami frutices Matereæ iam recens putati fuerant, sic ut soli stipites supereissent, qui ramulorum rudimenta producebant. Eiusdem etenim est balsamum cum vite naturæ, quam singulis annis putare necesse est, alioqui d. generat. *Alpin.* Audio in Arabia solo ad Lyci, Terebinthi & Pyracanthæ magnitudinem [ut scripserunt Diosc. atque alii] & maiorem etiam excrecere. Iustinum verò quod Piceæ arbori plantam balsami similem asserat, deceptum omnino fuisse credendum est. *Bell.* Folia utrinque in nervo nata, ut in Rosarum, vel Frazini, vel Iuglandis foliis videre est: ciceris tamen foliorum magnitudinem non excedebant, sicque constructa eratiporum series, ut postremum foliolum extimam alam occupans, imparem numerum efficeret: nam totius alæ foliolis numeratis, terna, quina aut septena inveniuntur: septenarium certè numerum superare vix agnoscuntur: extremum autem foliolum reliquis maius. Facto etenim ab illo progressu reliqua sensim minutiora fiunt, ut in Rutæ foliis. Ipsum lignum candeat, odorisque & saporis expers est, non secus atque aliud inutile lignum. *Alp.* Balsamum quod ex seminibus nascitur, bina folia in primis habet, bifoliis nascentis vitis maximè similia, & quæ post hæc, quæ sunt tria quatuor vel quinque, prodeunt, Amaraci foliis sunt proxima: quæ verò tertio nascuntur singula trina existunt, Rutæque proxima cernuntur. Hæcque sunt Balsami folia, aliter quàm Scriptores antiqui descripserint, ex quibus atque aliis Dioscoridem fortasse atque alios multos antiquos Scriptores viuentem Balsami plantam non inspicisse iure suspicamus. Rimum & folia (addit Bellon.) degustauimus, quæ facultatis nonnihil adstrictioris esse comperimus, pinguisque aliquantulum saporis, atque aromatici: ramulorum autem cortex his odorator. Geminis cortice præditi sunt ramuli, extimo foris subrubente, qui ut membrana intimum opent. Is gustatus, inter Thus & Terebinthi solum sapit. Satureiæ sylvestris sapore simili admodum grato, atque digitis tritus Cardamomum olet.

Ex dictis hætenus patet quanta sit autorum varietas, non tantum circa arboris formam & magnitudinem, sed & partium eius descriptionem, cui tamen controuersæ & obscuritatis, ex posteriorum, maximè Bellonii atque Alpini [qui ipsi per arbusculas diligentissimè considerant] pla-

citis & annotatis magnam huic balsami historię lucem accessisse indubiè quis asserere audeat. Restant & de loco & tempore quædam specialius excutienda.

Ergo quoad locum, ut tam patet ex præced. Dioscor. in sola Iudæa in quadam valle & in Aegypto nasci tradit, differens ipsum à seipso asperitate, longitudine & gracilitate. Ante ipsum Theoph. in duobus tantum vallis Syriæ viridiaribus: Strabo & in Syria, valle illa fertili quæ Libanum & Antilibanum interiacet, iuxta locum Genesareticum, & in Arabia quoque Sabæorum tractu maritimo. Hieronym. in Epitaphio Paulæ matris cap. 5. Contemplata est [inquit] balsami vineas in Engaddi. Ita plerique autorum balsamum in Aegypto nasci perhibent, regione quæ nunc Solis oculus siue fons dicatur, quondam Heliopolis, ut annotat Hermol. ex Auic. balsamum, ut scribit Lob. vñ terrarum Iudææ & Aegypti Memphi ciuitate, quæ Cayrum vocant, oriundam Theophrast. Dioscor. Plin. & nonnulli antiqui asserunt: hodiè tamen constat, neque Iudæam, neque Aegyptum, eius esse spontaneum solum. Eius olim multæ plantæ à Mecha Arabiæ felici oppido in Aegyptum translata. Sed Monardes balsamum antiquorum perisse scribit in Aegypto, & in hoc mundo non amplius repetiri. Idem & Petrus Martyr confirmat, nempe balsamum circa Caium Aegypti perisse: interius varias recenset causas, & inter alias menstrui sanguinis venenum, quæ nobis non videntur verisimiles. Sed quid ad hæc Bellonius? Sunt, ait, qui existimēt Mateream balsamum à Iudæa fuisse translatum, nos verò nunquam in valle Hiericuntina cultum arbitramur. Non longè Cayro Aegypti hortense duntaxat ex sit. Quanquam autem putarit Theophrast. nusquam sylvestre reperiri, constanter tamen asserere audent, & olim & etiamnum in Arabia felice existere, vnde lignum & fructus ab omni antiquitate cum aliis mercibus Arabicis deferri solita: quod ex Mithridatica antidoto, ex Dioscor. Diod. Siculo Pausan. Strab. Cor. Tacito facillè est probare, adeoque insitiores Cayrini de balsamo interrogari, respondunt, quicquid Xylobalsami & Carpobalsami vnam vendiderint, cum aliis medicamentis Mechæ Arabiæ delatum: meminisse autem balsami arbusculas, quæ hodiè Matereæ visuntur, magnis Sultani sumptibus ex Arabia felice adportatas fuisse. Ceterum arbusculæ, quas ego Matereæ vidi iuxta Cayrum, pauca admodum habebant folia mense Septembri. Et Alpinus: Habentur, inquit, arbusculæ in horto Mattharia propè Cayrum, cura Eunuchi Messer dicti, Aegypti Præfecti. Mechæ & Medinæ, ex Monte quodam arenoso in quo multas balsami plantas viuere asserunt, quas insigni Mahemetis miraculo in sterili illo monte natas asserunt, per Haly æci peregrinorum ducem, Anno à partu Virginis 1575 transfueta. Balsami plantam apud me viuentem verissimam, Iacobus Contarenius Senator clariss. Johan. Voethus nobilis Anglus, Franc. Ferretus Gallus, Ioach. Iungermanus Germanus, Marcus Fennarius Venetus Pharmacopola & plures alii viderunt, verumque etiam Opobalsamum ab eius foliorum alis dist. dist. exstillauisse quod multis maximè mirum fuit, cum aliàs Italiam hanc plantam habuisse, nusquam appareat. Arabia autem felix balsami locus patrius semper fuit, nunquam Aegyptus ac Iudæa.

Legitimum Opobalsamum notis omnibus comprobatum vidisse gloriatur Matthiol. apud Imper.

P. Martyr not.

Sylvestre Balsamum contra Theoph.

Insitiores Cayrini respondunt.

Opob.

Perdini. à S. Ilimmo Imp. Turcarum missum : cui simile omnino sibi visum ait illud, quod Franciscus Calceolarius Veronensis referebat Reuerendissimo D. Barbaro, Electro Aquilensi Patriarchæ, ad suam parandam theriacem.

Porro, ut Campestius in suo speculo pharmaceutico testatur, Balsamum incognitum (quod non simpliciter, sed magna ex parte intelligendum censemus) in Gallia, Italia, Hispania, & magis in Germania verum non habemus, sed tantum adulteratum. Aliquando se vidisse iactat idem apud D. Annam Franciæ, x. aut x. i. ampullas vitreas, quantum quædam erant missæ per Sultanum Aegypti Regi Ludouici x. eius patris alix Duci Burgundiæ Caroli alix Regi Carolo viii. Sed vnum non fuisse simile alteri, existimaturque maiorem partem fuisse veram Terebinthinam ex Grano viridi. Balsamum ramulorum vegetum adhuc nactus Bellon. eodem exiccatum cum Xylobalsamo Offic. collatione facta, per omnia conuenire deprehendit, idemque de Carobalsamo dicit.

Tempus.

Incidi tradunt autumnino ad liquorem eliciendum, teste Herimol. Alpinus tamen refert mensibus Iunio, Iulio, Augusto, partim sponte, partim stipite ferro scarificato destillare & in vitrea vâcula recipi album, quod postea teporis successione mutatur, ut prius dictum. Lob. & Pen. ex amici curusdam relatione perhibent Decembri mense ramulos præscindi, quibus cera oblitæ appendantur amphoræ excipiendo aureo liquori. Folia, ut idem tradunt exiit Decembri, quibus non nisi mense Maio noua sufficiantur. Quod si verum, iam corrui omnium tam præcorum quam neotericorum recepta opinio esse perpetua folia, Et sanè inter notas à Veteribus proditas, quibus Balsamum dignosci possit, vna est, ut perpetuo viuat illud tamen in Materea, apud Cayrum, teste Bellonio, pauca admodum folia Septembri mense habebat : quod sibi insolens vitum est. Nam reliquæ arbores, quæ hyeme virere solent, folia, inquit ille, solum nouo vere abiciunt, cum videlicet noua germina produxerunt : solentque autumnino magis virere, quam nouo vere. At reliquæ, quæ folia abiciunt, id sub hyemem facere solent, ut astate noua acquirant. Ideoque nobis præter naturam videbatur Balsamum folia abicere, ut hyeme noua germina produceret : nobis enim id obiectuantibus, quæcunque habuit folia, recens nata erant. Has fortè difficultates vel ex relatu scientes, vel subolsacientes Pen. & Lob. perpetuis virgis Balsamum dixerunt, non perpetuis foliis : at perpetuis virgis eodemmet merito, ut nobis quidem videtur, dicas saluè, vitam, abasque arbores vel fruces plurimos.

Pen. & Lob.

Nomina
Linguarum.
Balsamum

Balsamum Paulanias in Bæotiis *Palsamum* proferri vult : Cæsarque Græcis à quo reliquarum ferè Linguarum nomenclaturæ detorta videntur. Serap. *Belesen* vel *Belesma*, qui ex Dioscor. dicit arborem esse magnitudinis Grani viridis & sicuti arboris *Bocarea*. *Balsam* Anic. Inuenimus & *Balsam* Arab. dici. Alp. tradit antiquis Arabiæ medicis *Balsam* dictum.

Arab.

Græc. *Balsam*. Ital. *Balsamo*. Gal. *Barme*. Herimol. liquorem *Oleum Balsaminum* vocat, quam etiam ipse videt.

Balsami
succedanea
Receptum

Dicta sunt supra Balsami, *alibastida* ex Dioscor. Plin. & aliis : nunc & recentiorum quorundam de ea re sententiam audiamus, antequam transierimus ad vires. Etsi enim ex supra scriptis satisque inculcatis notis Balsamum nosse, fortè haud videtur difficile attamen cognitum habere longè difficilissimum esse certum est. Operataque dan-

da accuratissima, quod eius vires quàm exploratissimas habeamus, ut quando non licet illo frui, saltem bonitate proxinis & simili facultate præditis utamur.

Tribus huius plantæ partibus, etia succedanea est meditata posteritas. Liqueoris namque loco sua Balsama (quæ vocant) vnguinæque vulneraria nostri Barban in Thesauris habuere, quorum mirificæ vires literis & experimentis proditæ sunt. Quidam Ol. Terebinth. vel Laurinum, vel Gummi hederæ substituant, ut legitur in quodam incerti auctoris libello, quem Sephasarii Quid pro quo nuncupant. Syluius Placoto. Borgaricus, Lacuna, Monachi, Lobel. Myrrham statim substituant, id est, Myrrhæ pinguis sinz expressæ liquamētum, quod quidem nobis, si ad Myrrhæ facultates quis respiciat non displicet. Alii substituendum malunt Styracis electæ liquorem. Verum & ea ipsa rara habetur hodie electa, pura, nec commixta : alioqui non improbaremus. Antidotarium Romanum Oleum è seminibus Cici substituit, quod improbare non possumus, præsertim ad venena in theriaca : alioqui si de vulneribus iudicium fiat, aliter statuendum. Matthiol. mauult supponere Ol. Myristicæ nucis, vel Styracinum, quàm Terebinthinum vel laurinum. Colleg. Florent. Cordus, Placotomus, Borgar. Antid. Rom. Ol. Garryophyllorum : Medici præsertim Romani expressè dicunt Ol. ex Garioph. non multum distare à Balsamo : quorum sententiam tamen improbant Pen. & Lob. ob nimium eius feruorem. Cordus vult Ol. Cinnam. similes virtutes esse Balsamo : quod ob suam acrimoniam oculis neutiquam conuenire videtur. Placot. speciatim Ol. Iuniper. candidum, quod & ipsum in quibusdam nostro calculo admitti possit. At Terebinthi è pululanibus botris atque flagellis tempore verno laticem limpidissimum, odoratissimum, non parum tenacem emixisse se profitentur Pen. & Lob. qui digerendo, glutinando, dolore &que mulcendo, ut illi tradit, omnia quæ Opobalsamo insunt, conferre videatur. Quod non modò doctiorum, sed & Chirurgorum consensus secutus est. Nullus enim videre est ex illis vnguinibus, quod vnum præstantia nomen Balsami mernerit, cui non sit admixta Terebinthina vulgata : Quid putas futurum, si genuinum Terebinthi liquorem admiscuissent? Ea de causa nullum præstantius succedaneum iidem arbitrantur, cuius omnes partes omnibus respondeant partibus, liquori, semini, quàm Terebinthum genuinum. Matthiol. & qui suum Garryophyllorum, Nucis Myristicæ, aut Cinnanomileum, huic liquori præferunt, suauitati & saporis plus quàm optatis facultatibus deferunt. Hæc namque tametsi eximios fundant liquores : tamen nec Dioscor. nota, nec venenis aut Theriacis comparata fuere. Et præterquam quod plerumque vel sætent vel seruent ignis empyreumate, præsertim ab ignatis parata : tamen si vel probè sint confecta, actiora sunt, quàm ad tale institutum par sit, ideoque intemperiem feruidam imprimere nata. Oculorum verò hebeti aciei [quod à Balsamo genuino postulat] si quis admouere auit, ne ille hominem ex luscioso circum faciet. Myristicæ verò oleum, laxando & inquinando, nec foris vulneribus glutinandis, nec stomachi viribus colligendis idoneum est, nec quidquam Balsamo simile habet. Alii, teste Lob. Coppam-Iuam Indorum Balsami loco obtrudunt : qualem & nos aliquando vidimus magnis laudibus celebratam pro Balsami genere Ill. Duc. Wir. quod nominant *Anida di Capo vna*.

Liqueoris
succedanea.

Ol. Tereb.
Laur. Gumm.
Hederæ.

Myrrhæ
Balsæ.

Styrac.

S. Cici

Ol. nucis
der.

Ol. Garryoph.

Ol. cinnam.

Matthiol.

Carpo

Carpobalsami substituta
Cubeba.

Pachy. ex tract. Quod pro quo aut. Leucos radic.

Garyophyll. Cordamomum Grana Paradisi Galanga. Nux. moschata. Fructus Hederae. Grana lupini. Colleg. V. ad nos. Semen Terebinth. Semen Lentisci.

In quo differt pseudocarpobalsamum a vero Carpopalsami.

Xylobalsami substituta.

Nerium Alo. Fuch. not. Radix Leonurij. Acorum verum. Macis. Macer. Cyperum. Agallochum. Cubeba. Cyperum nigrum.

Carpobalsamo cubebas substituit Cordus, & Matthiol. qui plerisque rei medica studiosos secum sentire confirmat: addit præterea rationis loco, quod si ex mandanur, dentibus conficiantur, mordent gustum, seruentes in ore percipiuntur, & aromatis non modicum resipiunt, quas nimirum qualitates Balsami fructui inesse Diosc. testatur. Eiusdem sententia sunt Borgarucus, Placotomus & Adolphus in multis locis, & quidam alii. Fuchsius Galeno utique illo tributo tractato, Quid pro quo, dicto, deceptus nimium tribuēs. Carpopalsami loco Leucos radicem substituendam censet. Sed ad rem ipsi respiciendum fuit, non ad putati auctoris testimonium, & deprehendisset nullis qualitatibus præditam eam radicem, quæ vel minimo ad Carpopalsamum legitimum accedere possit, suamque illam opinionem nec Gal. genuinis libris, nec ullius probati auctoris calculo comprobati. Garyophyllos recipiunt, Adolphus, Cord. Placot. Borg. & Colleg. Flor. Cardamomum Cord. Borg. Placot. Grana Paradisi, Colleg. Flor. Fructum Hederae, Tract. quid pro quo. Xylobalsamum equali pondere, idem. Grana lupini, Medici Veneti, ut testatur Alpinus, quos taxat & reprehensione dignos censet. Pena & Lob. qui in ea sunt opinione, Carpopalsamum quod in Offic. prostat, neutiquam esse fructus Balsami, imò cumsum plantæ, incertum esse, rancidum, viciatum, exoletum, inodorum, minime Capobalsami loco usurpari debere: quin potius huius penaria semen Terebinthi vel Lentisci immaturi eximias vires, omnes Carpopalsami facultates, & dotes, ut si quod aliud, explere ipsis videtur. Prosper Alp. tamen vulgaria semina pro vulgari falso Carpopalsamo à multis recepta, quorum ad nos singulis annis magna copia aduehitur, verum esse Antiquorum Carpopalsamum se iudice affirmandum suadet. Idem tradit Pseudocarpobalsamum, Carpopalsamo admodum magnitudine, colore, figuraque simile esse: differre tamen à vero, quia eo sit oblongius & ex medietate tantum folliculo contextum sit: Illudque esse suspicatur quod olim Dioscor. tempore ex Petra oppido Arabiæ pro Carpopalsamo asportabatur, & quo verum Carpopalsamum adulterabatur, si Piperis laporem præ se ferret.

Campesius in suo speculo pharmaceutico aperte dicit nec Carpopalsamum nec Xylobalsamum inueniri Lugduni, Antuerpiæ, Medinæ campi, aut Francofurti. Quod si ita est, & quis eo uti velit, utique de antiballomeno sollicitus esse debet bono, & viciis quàm proximè accedente. Testatur tamen Alpinus virgas apud se adseruatas, cum iis quæ apud Venetos Pharmacopolas sunt, easdem esse, modico tamen tempore omni odore & sapore exui, ut & hac de causa succedaneo opus sit. Perperam autem quidam Nerio Alpino pro eo utuntur, ut tradit Gesn. Et Fuchsius nihilo prudentiâ radicem Leucos ex tractatu Quid pro quo, qui & eidem lignum Hederae supponit. Acorum verum Colleg. Colon. Macis Colleg. Florent. Macerem Fernel. quia Xylobalsamum, ut apud eundem annotat Plantius, Gallis minimè suppetit. Maceris & Cypriana part. zq. Adol. Occo: qui & alibi Cyperum solam sufficit, sicut & Colleg. Flor. Agallochum Matth. Cubebas Adol. Occo & Bapt. Montanus, ut testatur Cronemb. Cyperum rotundum maiorem & maiorem in Italiâ ferunt ad Theriacæ compositionem. Aptissimum enim Xylobalsami succedaneum tam diu Patavina & Veneta Collegia sanxerunt & usurparunt, tametsi ex Pen. & Lob. sententia commodiora bo-

diè suffici possent. Cumque ex illorum sententia, Lignum quod Xylobalsamum dicunt officinæ, Lentisci sint surculi, plerumque carioli, tamen neutiquam contemnendi, modò recentes sint, nec odorem amiserint: gratissimus namque pulvis intus & foris, stomacho, propter naturæ amicam temperamentum: cuius argumentum faciunt dentis calpia, quæ aromatica & moderata astringente & calefactione dentes, gingivæque persurgant, roborant & mulcent. Idcircoque eorum multæ myriades parantur à miseris mancipiis, qui in tririmibus Ligurum sub neruo vitam degunt. Pseudoxylbalsami huius magna copia paucis præparari potest ex Italia & Gallia Narbonensi.

Efficacissima liquoris visine est, ut qui maximè calescit. Quæ pupillis tenebras offundunt extergit: itemque vulvæ perfrictionibus medetur, cum cerato rosaceo adpōitus. Menses quoque, secundis, & scetus extrahit: rigores illitu soluit, sordidaque vlcera expurgat. Quin & potius, concoctionem iuuat, urinasque ciet: ægrè spirantibus conuenit, nec non & his qui aconitum hauserunt, si cū lacte exhibentur, itemque à vipera demorsis. Mulcet & acopis, malag-natis & antidotis. Ac in Vniuersum efficacissimam vim habet Balsami liquor: proximam hinc fructus: minimam verò Lignum. Fructus potius datus conuenit Pleuriticis, peripneumoniacis, tussientibus, ichthiosis, conuulsiuis, vertiginosis, Orthopnoicis, tormenosis, difficulter meientibus, & à vipera, venenatisque aliis animalibus demorsis. Porro & ad muliebres suffusus accommodatur: itemque decoctus in sellu vuluam aperit, humiditatemque exhaurit. Lignum easdem cum fructu vires habet, attamen minores: ex aqua decoctum & potum cruditatibus, torminibus, virulentorum morsibus, conuulsisque opitulatur. Urinas quoque ciet, & capitis vulneribus cum lide sicca conuenit: squamas etiam passim extrahit. Denique ad vnguentorum etiam spissamenta editur. Ad capitis dolores, & suffusiones oculorum incipientes, & habitudine mirifice conferre tradit Strabo, eoque pretiosius esse, quod in Hieroconio solum tractu nascatur.

Plin. Balsami vires tradens inter olea Balsaminum oleum vocat obliuiosè, quod apertissimè prius in eius historia succum esse scripserat, ut reuera est, vel Dalechamp. quoque teste. Sic autem Plin. tradit de viribus. Balsaminum longè pretiosissimum omnium, (oleorum) ut in vnguentis diximus contra omnes serpentes efficac. Oculorum claritati plurimum confert, caliginem discutit. Item dispnoas, collectiones omnes, duritiasque lenit. Sanguinem densari prohibet, ulcera purgat: auribus, capitis doloribus, tremulis, spasticis ruptis perquam utile. Aduerlat Aconito ex lacte potum. Febres cum horrore venientes perunctis leuior facit. Utendum tamen modicè, quoniam adurit, augèturque vitia non seruatō temperamento.

Balsamum, autore Gal. desiccatur & excalescit secundo excessu: est autem & tenuium partium, adeò ut odoratum sit. Sed liquor eius subtiliorum etiam partium est quàm ipsa planta, non tamen adeò calidus veluti quidam existimant, tenuitate partium falsi. Porro fructus eius persimilis facultatis est, ceterum longè in subtilitate partium inferior. Videtur autem his verbis Galenus Dioscor. tacitè reprehendere, qui credidit Balsamum præsentissimas & primarias facultates ad calfaciendum habere, deceptus partium tenuitate, ut euidenter Gal. testatur. Diosc. tamen Plin. quoque secutus est, ut liquet ex vtriusque verbis adductis.

Lentisci surculi.

Balsami vires & d. sus ex Dioscor. Oculi. Vulua. Alenfer. Rigor. Vlcer. Frima. Asthma. Aduerfus Aconitum. En. n. or. Superarum. Fructus vires. Pleuritis etc.

Ligni vires

Plin. not.

Adu. Serpentes. Caligo oculi. Dyspnea. Tumores. Sang. resoluens. Pleuritis. Adu. Aconitum. Horrores. Cautio. Temperamentum.

Scaliger.
Vulnera.
Balsami felicissimum successum vidisse testatur Scal. ad ingens vulnus cuiusdam equitis in inguine: periculosissimūque vulnus & maximū, cuius cicatrix quam sub oculo laevo habebat, vix ostendebat vestigia, non alio, quā Balsami sibi ab Heroina misso, auxilio sanatum scribit. Lob. quoque experimentum siue mirandum periculum factum esse tradit Opobalsami in quodam nobili, ore sonipedis vngula fauciato: momento & breui tempore restituto, his tantū peruncto auximpolito.

Balsami
quos apud
Aegyptios
Ceterū nullum est medicamentum, vt refert Alpinus, quo magis ac frequentius Aegyptii medendo vtantur, quā Opobalsamum, quod illi ad omnes serē morbos ac symptomata adhibent, ad eoque maximē qui vel ex simplici intemperie frigida & humida, vel frigidis humidisque succis, vel à venenis concitantur. Summa cum laude eo vtuntur ad omnia vulnera, quo mirificē curantur, quod experientia in Petro Mariano Veneto mercatore, in capite à Turcis nocte quāpiam vsque ad os pessimē lignis vulnerato, comprobatur: Balsamo siquidem inuncta ea vulnera, per diem tantū, si rē omnino coaluerunt, & eo quā paucissimis diebus, vt is testis esse potest perfectē sanatus est. Vtuntur etiam ipso ad vlcera sordida,

Vlcera.
Morsus
etiam à
serpente
na.
Pess.
quae eo mundantur atque sanantur. In venenatis & demorsis à serpentibus, atque ictis à scorpionibus, tum epotum, tum illitum maximē iuuat. In peste, vt ab eius contagio defendantur, nihil maius habent, quo vitulus & turtula vtantur, singulis diebus eius semidrachmam deglutientes.

Febres.
Multatque etiam putridas febres eo epoto illi sanant, largiore ab ipso erumpente sudore. In chronicis febribus à crudis frigidisque humoribus, ob-

Obstructiones.
structionibusque viscerum, nihil vtilius ac prestantius experitur, quā Opobalsami binos scrupulos vel drachmam per os quotidie exhibere, liberat enim valenter viscera ab obstructionibus,

Dofis.
caloremque naturalem fouendo, crudos humores concoquit ac digerit: hincque eius vsus ad omnes frigidus morbos ac symptomata apud eos est frequentissimus. Oculis visum deperditum, atque auribus auditum instillatum restituit, auriumque dolores sanat. Praeterea ad convulsos ex humiditate ac frigiditate, ad vertiginosos, epilepticos: resolutos, trementes, ad cuiusque ex frigido humore, orthopnoeam & omnem spirandi difficultatem, pulmonum fluxiones, humiditates & dolores, ad stomachi frigiditatem, cruditates, atque ad omnes flatuum molestias, ad uteri frigidam humidamque intemperiem, ad praefocationes, dolores, sterilitatem, albos fluores, ad interceptam vrinam ex frigiditate, flatu, vel lapidibus, ad calculosque in renibus valenter frangendos ac abstergendos, vsus Opobalsami est apud omnes illos populos nouissimus, & ad haec omnia mala praestantissimum illi auxilium experitur.

Parat.
Mulieres verò Aegyptiae steriles eo tum supposito, tum epoto, tum suffito, feliciore successu saepe ad remouendam sterilitatem vtuntur.

Non minori in vsu etiam habent ad pulchram faciem afficiendam, quando eo ipsa illita à rugis defendatur. Ferunt etiam aliquas ad conseruandam faciei pulchritudinem ac iuuentutem non inutiliter vsas fuisse. Balsamanda enim mulier (vt sic loqui liceat) in balneum caldum inprimis moratur, quousque multum incaluerit, quo tempore cutim Opobalsamo multoties copiose illinit, à quali inuione per horam & amplius in balneo valde calido, quosque cutis rectē Opobalsamo imbibatur & arescat, morata, balneum

egreditur, solitaque munia exercet, permanetque sic facie atque pectore Opobalsamo inunctis, per tres ad minus dies, in quibus nunquam peruncta cutim abluat vel mundat, ac tertia die ab inunctione rursus in balneum eodem iam dicto modo se confert, faciemque ac pectus valde calefactum copioso Opobalsamo multoties perungit: aliquae sunt, quae vel decies vno die cutim inungunt, obseruantes commodum interuallum, quo rectē cutis peruncta totum Opobalsamum imbibat, atque paululum arescat, vt promptius succum inumidis haurire queat: quā Opobalsami inunctione hoc modo praestitam, multoties morantur, saltem diebus triginta, in quibus cutem nunquam lauant vel mundant, à quibus quindecim & etiam amplius sic cute Opobalsamo inuncta quiescunt, quosque nihil liquoris ostendat, probēque ab eo siccata fuerit, quo tempore aqua fabarum stillatitia, prius ad eas partes praemissa modica olei Amygdalarum amararum inunctione se lauant, cutemque multis diebus abstergunt.

Seminum atque virgarum quoque recentium vsus apud illos est familiaris. Eis siquidem ad omnia serē, ad quae Opobalsamo vtuntur: praesertimque ad robur stomacho conciliandum, eius enim puluerem cum decocto Spicae Nardi ad binas drachmas exhibent, idem praestat decoctum, quo maximē calorem naturalem fouent, augent & roborant. Vtuntur & ipso in spirandi difficultate, tussi frigida atque aliis morbis à frigiditate nascentibus. Vsum frequentissimum habet puluis & decoctum ad humiditates vteri exsiccandas, eiusque calorem viuificandum. Suturae ex his frequentant ad morbos omnes vteri à causa frigida concitatos. Eodem modo & ligni vsus est. Succus enim, semina, ac lignum, iisdem facultatibus donata sunt, ad eademque vsu habent. Veruntamen Opobalsamum efficacius potest, eoque minus Carpobalsamum, omniumque minimē Xylobalsamum.

OPOBALSAMVM SOLIDVM

CAP. XXXVII.

Descriptio
Illustrissimae Celsi Wirtemb. misit D. Paludanus Opobalsami solidi nomine, quod ita est solida substantia, vt flexioni interim non resistat, pellucida, & digitis ductili, non friabili vt Colophonia, quā colore rutilo egregiē refert, vni formi, odore suauis Benioini, quem fragrantiorē, cum adoleatur, adspirat naribus, nec tegniter flammam concipit: sub dentibus lentescit, & is inhaerefcit. Fortē hoc idem est cum Lobelii Opobalsamo concreto de quo capite praecedenti.

BALSAMVM CERTARVM QVA- RVNDAM PLANTARVM, QVAS Copaibas vocant.


CAP. XXXVIII.

Descriptio
Copaibas.
IN Brasilia [vt refert Mass. Indic. nauig.] certis ē plantis, quas vulgō *Copaibas* vocant, inciso per rstatem cortice, in modum Balsami liquor suauissimi odoris emanat: cui, cum ad alios mortalium vsus, tum ad curanda vulnera & cicatrices tollendas mirificam esse perhibent vim. Ex plantis cernuntur affricu animalium attritae, quae à serpentibus venenatis, aut à fetis icta, ad remedia illud ipso naturae instinctu se conferunt.

A V E L

AVELLANA INDICA MEHEMBETHENE CORTVS.
CAP. XXXIX.

Descript.



Aquat magnitudine parvam luglandem, formā ferē ovali, in cuius basi triquetrum patet foramen, producens ex singulis angulis costam, ita ut præter ternas illas costas totidem alix alterno situ per longum concēdant, putamen durum, crassum, nonnihil inæquale ex cinereo flavesceit: quo effracto, tres cellule sese o-

stentant nucleum continentes oblongum, album ac dulcem, si Clusio credimus.

Hunc verò eundem fructum fortè Matthioli in Comment. ad Diosc. Gal. Lat. & Ital. cum magnis figuris sic describit: Auellana superiori [de qua antè egimus] longè minor à Cl. Cortuso mihi Patanio missa, quæ suo tegumento exempta, quod læue molleque est, colore subpallido, nec folio Palmæ crassius, glandis acuminatæ aut Myrobalani flavi ferè figura, duro putamine, colore vulgaris Auellanz, oblongo intus nucleo, pumilam Amygdalam referens, ut ex eius hic imagine omnibus palàm fiet. Sed non apertè agit nobiscum Matthiol. quando nos ad icones remittit. Nam cum tres vel quatuor diuersos fructus in eadem proponat tabula, duos verò tantum describat, reliquorumque ne verbo quidem meminerit: coniectura potius licet assequi, quàm certò scire quàm intelligat.

In Epitome ait, secundum & tertium genus eorum imaginibus facillè intelligi posse. Nimirum sic botanicæ studiosis, præsertim in Exoticis non versatis, egregiè prospectum. Quicquid sit, per Auellanam eius alteram hanc ipsam intelligimus, quamvis minds acuratè ab eo describatur.

C. Bauh. apud Matthioli adponit iconem qualem habet Clus. & Lob. pro Mehembethene: & Nucis Ind. nomine eandem tabellā, quæ villosum habet inuolucrum, cuius tamen Matthiol. ne verbulo quidem meminit: ipse verò (Casp. Bauh.) eandē faciens cum Mehembethene, (à qua Clus. diuersam fecit nec describit tamen. Ita tenebræ obducuntur nebulis.

Clus. in edit. 4. Garziz de arom. Auellana Ind. à D. Cortuso missa nomine Mehembethene, quāvis non admodum eius descriptioni conveniat, & potius eorum sententiam amplectendam censet, qui inter Vnguentarias referunt: pollicem transversum longam dicit, forma triangulari, duram & ligneo putamine, fractam tres habere cellulas, in quibus nucleus oblongus, albus dulcisque inueniatur. Et placent quidem icones à Clus. propositæ: at non placet eius vel eorum opinio, qui ad Nucem Vnguent. referendam censent. Sanè in paucis cōuenit cum ea: durus admodū hic fructus, & tres habet canitates, quas in illo non habes.

Tom. I.

Meheembethene siue Auell. Ind. varietas Lob. qui se inter Nuces Moschatas Antuerpiæ aliquando reperisse testatur eandem, quam pro Meheembethene Cortusus misit. Colore, [addit] figura & magnitudine Nucem Myristicam refert, sed triangularis forma, osseo & prædure cortice, Nuculæ Indicæ nostræ: ac effracta tres cellulas habet, vnā conspicuā dulcem nucleum claudente. Ceterum Lob. eandem habet iconem cum Clus. à quo tamen in eo dissidet quòd Auellanam priorem exigam villosa inuolucro non distinguit aut separat à Meheembethene.

Tabern. in icon. & Hist. Meheembethene vocat Indianisch haselnuß. Hist. Lugd. Matth. Auellana Ind. 2. Item Clus. Auell. Ind. 3. Quomodo autem inquit, Meheembethene nomen illi tribui possit, non video, cum Auic. de Meheembethene tractans nihil aliud, quàm Græcorum Lathyrum describat. At eadem Hist. Lugd. ne 4. meiz figurarum destituta videretur, duas posuit, vnā ex Matth. alteram ex Clus.

Anno 1608. Illustr. nostra Princeps dedit octo fructus Auellanz Meheembethene Cortuso dictæ, magnitudine, longitudinēque differentes, omnibus triquetrum foramen, vnus à nobis per medium sectus planè respondet iconi Clusii, tres insunt cauitates, duæ minores vacuæ, in maiori nucleus inuolutus, tenui, rufa tunica, albus, grato sapore cum quadam aromatitate.

AVELLANAE INDIAE MEHEMBETHENE VALDE SIMILIS FRUCTVS.

Descript.

VT videre est apud Clus. Exot. lib. 2. cap. 25. Inter aromatum Tripoli allatorum purgamenta inuentus septimus fructus cum plurimis quilibet, nucis vnguentariæ genus, à nonnullis Meheembethene nuncupatum. Erat enim figura orbiculata, cortice spadicei coloris, eoque lēu constans, atque veluti in binas partes secto. An verò alio cortice, siue inuolucro testā fuerit hæc nux (ut verisimile est, me latet: alia tamen addita erat minis crassa, sed paulò oblongior, neque adeò spadicei coloris, quæ mediā ex parte testā erat suo inuolucro nigro & rugoso, cui petiolus adhuc inhærebat, quo in ramo firmata fuerat.

AVELLANA IND. PECULIARIS CAMER.

Descript.



DE hac Auellana hoc tantum habemus apud Matth. in Hist. Germ. & in Epitome per Camer. renouatis, quod hic pro Auellanz Indicæ peculiari specie pingit, quam tamen non describit, quamvis à Matth. Auell. 2. diuersam facere videatur, cuius iconem omisit. Si quid tamen ex icone sola coniectari

fit integrū, suspicamur differentiam quandā Auell. Indicæ Meheembethene dictæ esse, iam modò descriptæ.

Cc 4

AVELL. IND. VILLOSA, FORAMINATA.

Descriptio

Avellana Indica, tribus lateribus elatioribus, utque itidem tribus foraminum vestigiis, uti Nux Indica seu Cocculus conspicua, villosa quodā involucre, veluti *Fausel*, ferè tecta, nucleum continens dulcem, tenui candicante membrana inclusum Clus. Cui apud Garciam de arom. Auellana prior exigua: & de peregr. stirp. Prima Nux annot. hist. Arom. dicitur.





Mehembethene siue Auell. Indicae varietas Lob. qui eandem cum Clus. iconem habet, verum non separat à *Mehembethene* ut Clus. Sed videtur eandem specie facere. varietate tantum distinctam.

C. Bauh.

C. sp. Bauh. iconem ponit nomine Nuculae Indicae, nulla addita descriptione, cuius tamen non meminit Mattheol. praeterea eandem facit cum *Mehembethene* contra mentem Clus. & Tabern. qui Nuculae Indicam quoque & *Indianisch Nüsse* in vocans, non citat Clusio addit, tria habere foramina. tectam esse cortice villosa, *Fauseli* ferè modo. Nec tamen negamus & ipsi hanc Nuculae seu Auell. Indicae, for. è speciem aut differe. tiam praecedentis *Mehembethene* Cortusi esse posse.

AVELL. MEHEMBETHENE CORTUSI SPECIES ALIA: NYDA, ET VESTITA VILLO.

Descriptio



Avidè à nobis descripto fructu speciosiorum, & altero ferè tantò crassiorum, minusque longum dono ad nos misit, vir sapientia, maximisque doctrinis clarus Hero. Saxonia Med. Patavinus Primarius, sub nomine, *Fausel* Arabum, & nucis Indicæ parum. Qui praeter eas notas, quas superius descriptus habet, pulchre etiam tripertitus est, medianthus tribus costis quæ in imo & summo coeunt, communem triangulum superne comprehendentes, cui area albescent, triquetrumque foramen in medio est: reliqua facie corporis rugosa, eo ferè modo, quo Nux moschata. Dignum pictura censuimus hunc fructum, quod cum prioribus non esset pictus, ab iis tamen non parum eu-

ciaret, & à tanto viro nomine diuerso missus esset,

quale sine dubio haud temerè ei imposuit:

Hunc eundem suspicamus fructum quem apud Cl. D. Platerum observauimus, cuius figuram quoque depictam damus. Magnitudine & figura praedicto respondet, superius quoque foramen triangulare habet sed villis ex parte tectum. Nam totus corticosis ac lentis segmentis parvis, putamini tenaciter adherentibus obductus est, in modum ferè Auell. Ind. Clus. de qua c. praeced. Eadem segmenta à trianguli foraminati veluti centro facto exortu, & in ambitu fructum vniuersum complectentes, parte opposita in scopam & veluti caudam coeunt.

Hic fructus pro magnitudine admodum ponderosus, ac si osseus esset, aut lapideus, color fuscus, aut ex Cinereo nigricans, concussus strepitat, argumento intus contenti nuclei. At quia noster non fuit, aperire non decuit. Lectori considerandum relinquimus, in quibus & quantum ab Auell. Mehembethene superius descripta discrepet. In secunda tabella pinguntur etiam Globuli Saponarii.

NVX, SIVE OSSICVLVM, FRVCTVS EX PALMARVM GENERE.

NVx aliqua Clus. Exot. l. 2 cap. 14. siue Ossiculum fructus ex Palmarum genere, à Petro Gareto, cui villi, qui illam vestiebant, adempti fuerant, nam daldè terla & polita erat, multisque venis nigris, à summo ad imum distincta, praesertim, quæ à tribus veluti umbilicis aequali prope modum spatio ab inuicem discretis originem ducebant, & magnam venustatem nuci



adferbant: alioqui nux binas uncias longa erat, eius ambitus tres cum semisse continebat, umbilici autem penè unciam ab inuicem distabant: duro cortice nux illa erat praedita: & nucleum continere, ex motu stupitum ciente, manifestum erat.

FRVCTVS IVGLANDIS FERÈ MAGNITVDINE, DVRISSIMVS, INDIS CARIN, sapore nucis moschatæ.

CAP. XXXX.

ANno 1608. cum essemus Stutgar. Mercator quidam, cui nomen Claudius Cintre, dedit nobis fructum, magnitudinis parvæ iuglandis, non ponderosum, inaequalem valdè, unica tectum cinerea, sub qua alter duriss. crassitudinis dorsus cultri, niger ubi effractus: non facile frangitur, plenus est, nucleo aut medulla siue pulpa flavescente, oleosa, per medium fissa, saporis grati & nucis moschatæ, mitioris tamen.

Idem fructus, ni fallimur, nobis datus ab Ill. nostra Principe, qui speciosior, maior, qui bene exprimitur icone nostra desumpta ex Clusio, is etiam inæqualis, vna parte tamen magis gibberosa, altera depressa. Cor penè exprimit hic fructus, prout vulgò pingitur, cortice exteriori minùs cinereo, quo abrato, subest niger, durus: Eum non aperimus. De prædictis fructibus Clusio libello de peregrinis, vbi icon sub numero II. scribit. Fructus alter peregrinus, Nucis Iuglandis ferè magnitudine est, extrema parte latiusculus, totus rugosus, atque vt Nucis Iuglandis putamen



inæqualis, niger, sed magna ex parte veluti crusta quadam durissima & cinerea tectus. Lewis est & minimè ponderosus, tamen admodum solidus sit, & saxea duritie præditus, nec minùs in aqua sublidat, quàm lapis. Contractus crasso durissimoque cortice constare, deprehenditur, & nucleum candidum succulentum, grati saporis, iucundique

Macis alba

odoris, oleum ferè Macis referentis, continere, in binas partes sectum & tenui candidaque membrana diuisum, alia insuper paulò crassiore firmiorèque inclutum. Eiusmodi ante plurimos annos Antuerpiæ inter aromata inuentos, cum repurgarentur, memini.

Camiri

Addit præterea: Anno 1597. inter aromata, quæ Batavi ex Iana referebant, similes multò recentiores conspicebam, quos Abdala Camiri, adpellari dicebat.

Etc. 15. Inter nuces Myristicas repertus fuerat Sextus, quem ab Indis Camiri appellari intelligebam, vncialis magnitudinis, nuci Iuglandi, suo illo externo viridi cortice exempto, non dissimilis, inæqualis, summâ parte lauior, infima in obtusum mucronem propemodum desinens, putamine satis crasso saxæ duritie præditus, nucleum continente album, amygdalæ penè sapore. Alio fructu, sine externo cortice opertus fuisse videbatur, quia depressioribus putaminis locis cineream quandam materiam adhuc inhaerentem retinebat. Sed & alios similes inter aromata non semel repertos habui. Atque anno M.D.C. Vnum inter plures à Parduino accipiebam, tenui, fragilique, & in binas partes sectili putamine inclutum, cuius suprema pars mucronata in vnum non coibat, aut claudebatur, sed aperta erat, atque supinâ parte plana fidem faciebat, binos fructus coniunctum nasci, vel etiam ternos, è pediculo aliquo dependentes, quemadmodum apud nos Staphilodendri fructus. Eundem hunc fructum ex Clusio proponit Hist. Lugd. Tabernæ dicitur fructus peregrinus.


NUX INDICA PVLCHRA, CUI VNGUIS ALBUS.

CAP. XLI.

Cum fructibus Exot. III. C. Wirt. piz memoriz Descriptio Stutg. 1608. pulcher fructus, vnciam & semis longus, vnciam latus, compressus, niger, splendens, in suprema parte veluti vnguis albus, sonorus est. Cortex niger, mediocriter crassus, subest medulla alba, in iis, saporem manifestum non animaduertimus, medullæ autem albæ subest fortè ossiculum, est enim sonorus, fructum aperire non sum ausus, quia reueruat Illust. Principilla.

FRUCTVS PEREGRINVS OVA-TVS, SIMILIS LAPIDI IYDAICO.




CAP. XLII.



Fructus peregrinus alter Clusio libello de peregr. & Exot. l. 2. c. 3. ovals, Iudaico lapidi magnitudine par, & eius formam exceptis striis pulcherrimè exprimens, ex rufo nigricantis coloris est, vt maiores nonnullæ gallæ, leuis, & aqua impositus supernatans, ducto putamine contentans, ac nucleum continens. Nactum se ait Clus.

Londini eo delatum ex ea Nigritarum in Aphrica regione quæ vulgò Guinea appellatur, & circiter quinque gradus ab æquatore distat.

FRUCTVS FVSCVS, DVRSVS, STRIATVS, STREPITVM EDENS.



Mihi, inquit Descriptio Clusius Exot. l. 2. c. 24. fructum exoticum concedebat, vt describere possem Cl. V. Petrus Pauvius, primarius in Academia Lugduno Batava ar. Med. & idemque Anatomes & simplicium medicamentorum Professor atque Academici horti Præfectus: Is paulò erat longior vnciâ, vñ verò vnciarum

Camiri & simi simili

ambitum (quā parte crassior) continebat, colore fusco præditus, durus, striatus in obtusum mucronem desinens, in quo ossiculum vel nucleus inclusus, quia agitated strepitū edebat. Icon. n. I.

**PYRIFORMIS FRUCTVS, RUGOSVS,
NIGER, DVRO CORIO TECTVS.**

Descriptio.

Exoticus fructus anno 1601. ex Orientali India aduectus auctore Clusio Exot. lib. 2. cap. 24. turbinatus, eratque pyri forma, binas uncias cum semisse longus, quatuor cum semisse eius ambitus, lævis tamen, rugosus, prorsus niger, aded duro & tenaci corio tectus, licet non valde denso, ut difficulter cultro, nisi malleoli vi adacto, aperire possem: apertum binas cellulas habere deprehendebam membrana quadam fusca & splendente distinctas, in quarum singulis nucleus bifariam diuisus, mediā etiam intercurrente membranā, quemadmodum ferè in nuce Iuglandæ: totus nucleus situm vetustate contraxerat, & initio quidē nullo manifesto sapore præditus videbatur, diutiusculè tamen in ore retentum quandam acrimoniam habere, & tandem fauces quodammodo vire, comperiebam. Icon. n. II.

**PYRIFORMIS FRUCTVS, LÆVIS,
SPADICEI COLORIS, FRAGILI
cortice tectus.**

Descriptio.

Exoticus fructus visus Amstelredami 1601. ex Orientali India aduectus, binas etiam uncias cum semisse longus, cuius ambitus trium unciarū, lævis totus, & spadicei cum cineraceo mixti coloris, in longum mucronem desinens, fragili cortice constans, qui in alio experimento tectus fuerit, me latet, inquit Clus. Exot. lib. 2. cap. 24. pulpam autem continebat nigram, in qua ossiculum latebat uncia magis longum, durum, cineracei ex fusco coloris, obtuso mucrone præditum, & summā parte in vno latere veluti exsculptū, in quo haud dubiè nucleus, licet agitated nullum sonitum ederet. Vtrumque hunc Amstelredami nanciscer. Icon. n. III. in præcedenti tabella.

FICVI SIMILIS FRUCTVS EXOTICVS.

CAP. XLIII.

Descriptio.

Fructus, quem dono accepimus ab Illustriss. Duc. S. Wirtemb. Ficum communè magnitud. & figurā quodammodo repræsentaret, si non angulosus esset & superne cordatus. Cortex exterior subflauus, fragilis quo decorticato alius subest crassus, durus, niger. Concussus non crepitat. Iniectus aquæ suo pondere sedit. Similem accepimus à D. Paludano, sed crusta cinerea obtectum.

NVCVLA IND. LOB. ET PENÆ.

CAP. XLIV.

Descriptio.

Nuculam Indicam hanc, admodum fructu variam fortèque & sylvestrem esse suadent Nuculæ quas ex sinibus Trogloditicæ Guineæ habemus: hæc vix magnam æquat Olivam, cortice solo nucleo, oleagineo, ac lapido, illi prorsus nuci

Indicæ similis, sed huic Nuculæ testa ossea. Adu. & ic. & hist. Belg. Icon integra magnam habet similitudinem cum Chamæriphe fructu.



NVCVLA INDICA PECVLIARIS CAMER.

Descriptio.

De hac Nucula Indica peculiari Camerarii nihil habemus in præsentia quod scribamus præter nomenis enim iconē posuit in hist. Germ. Matt. in tabella Nucis Indicæ, ascribens esse Nuculam Indicam particularem: Ein besunder India nisch Nüsslin. In epit. Matt. solam exhibet iconem sub Nuce Indica: quam verò intelligat nescimus. Si non scripsisset Nuculam, suspicio esset, eum intelligere Nucem Ind. parvam cuius mentionem fecimus c. de Balamo Peruviano. Conferatur etiā cum nostra Nuce Ind. larvata. Est autem cum Avellana Indica peculiari Camerarii.

NVCVLA INDICA AB HERCVL. SA.

XONIA MISSA.



CAP. XLV.

Magnificus vir Herc. Saxonia, Medicus nostri seculi nulli secundus hanc misit Nuculam, hoc titulo: Cechiglis de Guigne. Uncia beuor est, semunciam vix lata, nigra, dura, modicè exterius arcuata, internis sinuata, phasoli modo, multis fissuris, seu lineis excavatis variè sparsis sulcata, quæ tamen omnes in tuberculum, paruum, umbilici speciem præferens, coeunt.

FRUCTVS PEREG. SVLCATVS.

CAP. XLVI.

Descriptio.




Avellanæ domesticæ magnitudine est, oblongus, turgidus, niger, cætera lævis & politus, præterquam ad latera profundus sulcus, rectus, (quem à summo ad imū habet exaratum, lineola in medio nullam emittente) vbi non nihil rugosus: parte opposita sulco respondet leuia quædam alterius cuiusdā sulci vestigia impressa.

Is verd quoniam inter monimenta nostra Exotica seruiamus, foramine per longum peruius est, ad cuius margines in altero finium apophysis parua est, in medio fissa: inanis est, & pulsatus resonat, proculdubio aliquando pulpa plenus, unde nacti sumus, non commeminiimus.

FRUCTVS OMNINO ROTUNDVS,
LYTEVS, NON SPLENDENS,
cum suo frutice.

CAP. XLVII.



Hic frutex est ex globulo ipsi appi-
cto, hoc anno
sato, cuius colo-
ris verd ille fue-
rit, me latet.
Frutex quidem,
qualis primo
anno erat, sua
magnitudine est
depictus. Huic
ex opposito la-
tere idem folio-
rum numerus,
duobus scilicet
inferioribus ra-
mulis folia sunt
duodecim, supe-
rioribus autem
tantum unum.

Idem folio-
rum nume-
rus

Spina

In hoc frutice, anno 1603. Iunio nullam spinam
obseruo in trunco, in foliis incipiunt apparere a-
liquae, sicuti etiam in principio caulis superante
duos priores ramos. Sapor foliorum ingratus,
cum aliqua amaritudine. Vidimus & alium simi-
lem fruticem hoc anno natum, cui caulis glaber
& folia priora penè eadem, cui tamen non tot foli-
ola. In vno enim nouem, in altero decem. Sa-
por idem, in supremitate nondum apparent fo-
lia illa quatuor sibi inuicem oppo- sita color virens
& lucidus est. Huius Ill. Princ. pilla apposuit fru-
ctum planè luteum non splendens, sed aspe-
rum, modicè circinatæ rotunditatis, cum rubente
umbilico, qui minor reliquis. Anno 1603. obser-
uauit globulorum luteorum plantas spinosas in
horto Ill. nostræ Prin. Stuttgardia.

Sapor.

Frutex a-
lium
Caule
Folia
Sapor
Color
Fructus


FRUCTVS PEREG. TANQVAM
TORNO ELABORATVS ARGENTEVS.

CAP. XLVIII.

Descript.

Trigidus ex rotundo aliquantum oblongus
est, politus & lubrici laueris; coloris ar-
gentei, circulaibus lineis saturationibus densè
cinctus, durus, altero sine nonnihil turbinato,
umbilico luideo, & in eo veluti pediculi vesti-
gium ostentans, à quo vna aut altera linea de-
mittitur, ad oppositam ferè basin pertingens,
pregnans est, & concussu resonat. Hunc vidi-
mus apud Illustrissimam Ducissam VVirtemb.
germinasse satum, produxisseque bina folia pin-
nata, spem futuræ arboris facientia, vel ipso la-
nuar. principio. Plantarat autem Exc. Celsit. fru-
ctum ad apertum & prius in arena madida mace-
ratum, in olla in hypocaufto posita, & quotidie

Folia.



rigari inbebat
Eundem dono
accepimus à D.
D. Schuartz Ex.
Cels. VVirtemb.
Medico & col-
lega nostro ho-
norando.

Varietas

Videtur au-
tem hic fructus
nonnihil varia-
re. Nam minùs
tumidum & non-
nihil angulosum
accepimus ab
eadem Excell.
Celsitud. lineis
prædictis caren-
tem, nihilo mi-
nùs tamen,
quàm ille, den-
sè cinctum zo-
nulis,

quo secta ferrà per medium, depræhen-
dimus corticem crassum satis, ac duritiei osseæ,
eiusdè nque externam tantum faciem argenteam
esse, internam substantiam lubrum. Nucleus
qui intus latet pallidus est, duriusculus, gustu a-
maro. Aquæ niectus fundum petit.

C. Bauh. Milium Indicum vocat. Scimus & à
quibusdam Italis Auellanam Indicam aliquam
putari.

Milium
Indicum.
Auell. Indi-
ca

FRUCTVS PEREG. TANQVAM
TORNO ELABORATVS, FLAVVS.

Descriptio

AD figuram orbiculatam quamproximè ac-
cedit, & vel tantillum ad oblongam vergit.
Cortex laevis, colore flauescens, ac ferè melino,
zonulis saturationibus quidem, sed vix ac ne vix
quidem conspicuis densè cinctus, perinde ac si
arte torni ita factus esset. Parte extrema aut su-
prema area quædam luida aut subfusca conspicit-
ur, in cuius medium punctum, adhesionis vesti-
gium. Ponderosus est, & aquæ immisus, mergit-
ur. Quia vnicum tantum habemus Ill. Ducissæ
VVirtemb. munere aperire non libuit.

Eundem Clus. fructum peregr. 6. vocans in suo
Libello, & Exot. lib. 2. cap. 19. describit, orbiculati
ferè rotunditate, tanquam torno elaboratum,
cum passerino minorem, flauum omni ex parte,
nisi in altera extremitate subfusca macula insigni-
tus esset, solidum, lapideæque duritie, & in aqua
subsistere.

Doctrinà insignis vir & consultissimus Adsef-
sor Cameræ Spirensis, Dominus Tengnagell. hæc
de hoc fructu ad nos scribit: Nucleum hanc ali-
quando confregi, intus habebat nucleum, colore
& carne nucleum Pistachiam referentem, sed durio-
rem & solidiorem & magis ad flauum colorem
inclinantem, nulla albedine, totam nucleum sine
ullo tomento implet, sapore est adeò amaro, ut A-
loës quoque amaritudinem vincat. Purgandi vim
habere creditur.

Nucleum
Maior
Minor

Anno 1606. Genes noster Cherlerus ex Angliâ
& Belgio rediens, pulcherrimam hanc Nucleum
maiores attulit, quàm nostra argentea vicia lon-
giorem, non rotundam, ut est icone nostra ex
Clusio, sed longam & oualem. Attulit etiam om-
nino sphericam, minorem multò & icone Clu-
siana non maiorem, coloris penè Aurantiorum
non maturorum splendens umbone & macu-

la perum appatente, striis etiam circularibus, minis eidentibus, in aquam iniecta, fidit.

FRUCTVS IND. TANQVAM TOR-
NO ELABORATVS VIRIDIS.

Descriptio. Eiusdem generis cum argenteo iam descripto videtur. Sed color viridis est, & multis angulis & impressionibus inæqualis, ac si ab aliis vicinis fructibus compressus fuisset. Zonulis item saturationibus frequentibusque in orbem cinctus, ut nisi æqualitas id cauere, toro & hunc elaboratum diceret. Concussu sonat: aqua iniectus non mergitur, fortè quia non perfectè maturus (vnde fortasse adhuc viridis) nisi quis coniectari malit nimis esse exoletum.

Dubitatur an idem sit cum eo quem Clus. depingit ac describit in sequenti lemma: quia color diuersus tantum, cetera conuenire videntur. Eiconem non damus, quia Clus. figura satis bene exprimit, si Zonulas addas.

FRUCTVS PEREG. CLVS. DVRS-
SIMVS: ALIVSQUE SIMILIS.

CAP. XLIX.


Descriptio. Alteri iam memorato non admodum dissimilis est Clus. libelli de peregr. Sed minor & Ponticam Nucem non excedens, [tamen si Iuglandi ferè æquales videre meminerim] levis, splendens, cinerei coloris, & saxeæ duriæ præditus, licet in aquam demersus supernatet, inæqualis aliquantulum, & compressus uti Pisa quæ in eadem siliqua nata sese mutuo contigerunt.

Alia descriptio si non eadem. Considerandum an ille fructus Cordi in Obleru. sylua huc possit referri, de quo sic ait: Fructus quidam globosus modicè, acuminatus, osseus foris soliditatis, colore cineraceus, linea quadam à basi usque ad apicem spicè modo circumuoluens. Norimbergæ vidi.

FRUCTVS PEREG. ORBICVLA-
TVS CUSPIDATVS.

CAP. L.

Descriptio



Fructus hic, teste Clus. l. de peregr. & Exot. lib. 2. cap. 30. mediocrem Nucem auellanam non excedit, orbiculari ferè, nisi infirma parte paulò angustior in triangularem veluti cuspidem desinere, colore ex rusto nigricante, tamen si levis, in aqua subsidens & inum petens, duro crassoque putamine constat, & nucleum candidum tenui

fusca membrana tectum continet, Londini datus fuit, qui ex Guineæ delatus erat. Terra communis non est natus. In hac imagine habetur etiam fructus peregrinus sphaericus penè, &c. itemque Fr. Ind. sphaericus granulatus, ac etiam Fr. Ind. Beruba dictus.

LAVRI BACCÆ SIMILIS
FRUCTVS.

CAP. LI.



Descriptio. Est nobis fructus peregrinus, magnitudine & forma, quæ Baccæ Lauri nauticæ, coloris nigricantis, leui & nitida superficie, ex altero turbinato sine stylo retusum, quemadmodum in glandibus videre est, proferens: altero autem, tanquam ab acicula impressum vestigium habens, durus, & lapidi allusus cum sonitu resiliens. Eorum vni circa medium insculptus apparet

scrobiculus, naturæ an arte nescio.

SAPONARIÆ SPHÆRVLÆ AR-
BORIS VILICIFOLIÆ.

CAP. LII.



Descriptio. Fructus quos Saponarias sphaerulas vocant, dono accepimus à Cl. D. D. Fel. Platero Archiatro & Profess. Basil. sine nomine, cui ex Anglia aliquot erant missi. Gallæ sunt magnitudine, orbiculati, nigro cortico atque rugoso quodam putamine contexti: sub quo alius cortex testaceus ac penè osseus, verum non crassus, colore fusco splendente. Horum aliàs duo, aliàs, ut ex vestigiis patet, tres. Intus fructus latet exquisitè sphaericus, osseo & crassiusculo cortice contextus, nigro, leui, & Ebeni politi in modum splendicante. Hic mediante flavescente quodam tomento ab extimo putamine distinctus videtur. Nucleus qui in globulis est, pallidus, Auellanae instar, osseus, & per

& per vetustatem rancidus, quem etiamnum alia cum spadicea atque fungosa cingit, perinde atque Auchanarum nucleos. Eicon utrumque ostendit, cum putamine cui parvus & abortivus adheret, & nucleum exemptum, integrum atque dissectum.

*Inglan-
dis magnitud.*

Parata & iam sculpta mone, alium predictis maiorem, nempe Inglan-
dis magnitudinis, acce-
pitum missum ab insigni Botanico Regio D. Ro-
bino. Huius cortex spadiceus, pulposus, quo-
dammodo, laevis & splendens, atque adeo per
omnia, quam iam descripti, elegantior, minime
rugosus, pediculo crassiore, quippe qui perfectio-
rem maturitatem consecutus videatur. Sonitu in-
tus latentem globulum facile prodeit.

Quidam

*Locus
Arboris de-
scriptae
videtur fo-
lia*

De iis Quedus in Hist. Ind. sic scribit. Sunt in
Hispaniolae insulis & continenti quaedam arbo-
res, quae à precariis sphaerulis & à saponi nomen
acceperunt, quarum folia Filicis folia nonnihil
referunt, licet minora sint. Celsae sunt & formo-
se, fructum ferentes Avellanarum aut Cerasii magni-
tudine, corolla insignitum minime edulem, qui
Sole exiccatus sublaevum colorem retinet: is os-
ticulum intus continet globulo bombardario æ-
qualem, rotundum, nigrum: at si Solis radiis op-
ponatur, subruffum, quod semen exiguum & a-
marum habet.

De fructu eadem penè tradit Monardes addit-
que punilam eorum esse arborem, incurvam ma-
gis quam rectam, veluti Ruscus, cuius folia Filici
sint similia. Sphaerulas adeo duras dicit, ut nisi
malleo aut alia quapiam re solida & dura con-
frangi nequeant.

*Vires & v-
lta.*

Officulis perforatis sunt precatoriae corollae,
non inelegantiores, quam si ex Ebena confectae
essent: immò illis praestant, cum quod laeviores
sint, tum non adeo fragiles. Fructu integro cum
aqua calida panni purgantur, potius atque sapo-
ne. At si quis frequentius eo utatur, pannos urit
& corrumpit. Semel duntaxat necessitatis causa
eluisse sufficit. Pulpa officulum ambiens ea est
quae saponis vicem praebet. Est verò is fructus, te-
ste Monarde, adeo amarus, ut nullum quadrupes,
aut avis, eum degustet. Iis vestes elute multò ni-
diores redduntur, quam si saponis librari pon-
dere elute forent: plurimam etenim spumam ex-
citant, eisdemque effectus praebent quos sapo,
paulatim liquecentes donec solae sphaerulae su-
per sint, quae in precarias coronas perforatae con-
cinnantur, uti dictum.

Anno 1609. Gener Cherlerus secum deferrebat
ex Anglia ut existimo duos globulos simul iun-
ctos eo modo, quo Clusius pingit Exot. lib. 2. cap.
16. minores paulò & non maiores, quam in icone
nostra: de iis autem ille scribit: Fructum accepi-
mus à Jac. Gareto orbicularem & semuncialem,
duro cortice testum instar fructus styracis, duplo
tamen maiorem, colorisque minùs illo splenden-
tis, & quasi fuliginosi, nucleum aliquem conti-
nentem, quia agitated strepitum edebat.

NUX PURGATRIX SIMILIS SPHAERULE SAPONARIAE, FUSCA.

Descriptio

Mittebatur, inquit Clus. Exot. lib. 2. c. 16. à Ja-
cobo Gareto, officulum non valde dissimi-
le saponariae sphaerulae, Nucis purgatricis appel-
latione: etenim orbicularem, ut ille, habebat
formam, & eandem magnitudinem, huius tamen

Tom. I.

color non adeo niger, sed fuscus potius in quo
apparent sublaevicentes quaedam venae. Alio
autem fructu comprehensum fuisse, & nucleum
duntaxat fructus alicuius esse, apparebat: nam
sectus, versicolore substantia constare depre-
hendebatur, magnis albis maculis fuscae substan-
tiae, & satis molli (ut quae cultello sine difficultate
inci di posset) permixtis.

PLANTA GLOBULORVM SAPO- NARIORVM.

CAP. LIII.

Globulorum saponariorum plantae folia sunt Descriptio
Perfici arboris, quaedam in duas partes divi-
duntur, alia in tres: saporem insignem non ex-
perimur. In horto Ill. Princ. nostrae Stutgardiae,
anno 1608. Iunii principio reposita haec planta
per Hyemem, triennalis erat, folia coepit pro-
trudere Aprili. Sphaerulas nobis dedit Illustriss.
nostra Princeps.

FRUCTVS RUGOSVS, PARVVS, GRAVIS, ORBICVLATVS PENÈ SI- GURVS, quasi compressus.

CAP. LIV.

Fructus exoticus minor, à Paludano datus, Descriptio
gravis, orbiculatus penè formae, planioris ta-
men & quasi compressus, rugosus, cineraceo serè
coloris, durus & solidus, aqua tamen meris non
subsidens. Eius nomen, ut etiam sequentis Palu-
dano ignotum, nec ex qua Provincia utrumque
accepisset significabat. Ex relatione Clusii Exot.
lib. 2. c. 20.

FRUCTVS PLANVS, FORMA COR- DIS, CVM MULTIS TUBERCVLIS.

CAP. LV.

Fructus exot. à Paludano missus, alter minor, Descriptio
[aut Clus. Exot. lib. 2. c. 20. planus, binas uncias
longus, totidem latus, summâ parte, cordis [ut
vulgò pingitur] formam quodammodo referens,
multis tuberculis eminentibus inequalis, fusci
coloris, laevis, aliquantulum carosus, quia im-
maturus collectus fuisse videbatur, an aliquo pu-
tamine inclusus fuerit, me latet, quia nullum pe-
tioli à quo pependisset, vestigium in eo appare-
bat.

FRUCTVS ORBICVLARIS, PER- POLITVS, MUCRONE GLANDIS.

CAP. LVI.

Clus. Exot. lib. 2. c. 25. Fructus exoticus, orbi- Descriptio
cularis formae, uncias penè tres ambitu com-
prehendens, laevis & perpolitus, spadicei colo-
ris, superna parte exiguo mucrone [veluti glan-
des] praeditus, infernâ, vestigio quodam, cui


Dd



pediculus inhaesit
se videbatur, levis
& aqua innatans,
tamen si nucleum
aut pulpam con-
tinens, ut ex stre-
pitu deprehende-
bam.

se apparet, non nihil angustior, & non ita rotun-
dus, asperior cortex facile acicula perforatur, in eo
nucleus: qualis medulla nobis nondum constat,
nondum enim aperuimus quia vnicus.

Hunc fructum etiam vnicum vidimus apud fra-
trem C. Bauhinum, figuram multum differentem,
breuiorem, minus compressum. Multo quā adha-
sit parte angustior, quasi umbilicus, aut oculus.
Crista item non ita apparet, repraesentat Staphi-
lodendron.



X

FRUCTVS SVBLONGVS, COR-
TICE DVRO, PVSCA TECTVS
Epidermide.

CAP. LVII.

Describe.



FRuctus exoticus tam descripto orbiculari nō
valde dissimilis: paulo tamen minor & oblon-
gior, tamen etiam reperiatur eisdem cum illo
magnitudinis, corticem verò habebat durum,
penē instar putaminis nucis ponticae, fuscā tectū
epidermide, internam autem partem cineracei
coloris: aqua mersus non subsidebat, sed innata-
bat, licet nucleum contineret avellanā non ita
noctem, cineraceum, rugosum ob vetustatem, non
adeo solidum ut primo intuitu apparebat, sed qui
culicello facile secaretur, subflaua carne, siue sub-
stantia, quae manducata, satis acris deprehende-
batur. Clus. Exot. lib. 1. c. 25.

Icon capite præced. habetur sub: N. II.

FRUCTVS INDICVS, VEL NV-
CLEVS LUTEVS PARVVS AVEL-
LANÆ oblongæ facie compressus.

CAP. LVIII.

Describe.



FRuctus qui
nunc descri-
bo Basileæ anno
1608. ante à me
descriptus est
Montbelgardis, ac
etiam picturā
expressus est: vn-
ciam ferè lon-
gus, flauus, la-
uis, lucidus, Ricci-
no maiori ali-
quomodo acce-
dens, vnciam semis
angustior, penē
compressus, v-
trinque tamen
ferè in medio
elatiore, vna parte
paulo latior &
rotundior, parte
autem quā haesit-

OSSICVLVM FRVCTVS INDICI.
TUBERC.

CAP. LX.

Describe.

Ossiculum quoddam alicuius fructus Indici
esse videtur, maius ossiculo Cerasi, subro-
tundum, vndique rugosis tuberculis asperatum,
colore pullo. Visum & depictum apud Ill. E. C.
Wirt. Icon habetur ante cum aliis cap. 57.

AVELLANÆ COMPRESSÆ FACIE
FRVCTVS VEL SEMEN.

CAP. LXI.

Describe.

Iacobus Cargillus doctiss. Medicus ex Angliā ad
nos misit fructum Anonymum quendam, vn-
ciam ferè longum, vix semunciam latum, modicè
compressum, durum, dilute croceum ac splendi-
dum, parte angustiore, quā adhaesisse putamus,
saturatius tinctum: longæ avellanae spe-
ciem quodammodo referre videtur, sed planè
exoticum esse & facies & notæ iam scriptæ satis
insinuant. Huius fructus Icon habetur cum
aliis ante cap. 4. & 53.

Anno 1605. inter exotica, quæ gener Cher-
lerus secum adferbat ex itinere Anglico & Belgi-
co, reperiimus duos fructus similes prædictis, nul-
lo adscripto nomine, quorum vnus eisdem ma-
gnitudinis cum nostra icone & eiusdem figuræ:
alter erat breuior & latior: color idem, vterque
asperius longiusculis maculis albescens, ex-
tremis parvis angustioris, scabra, & cinerei co-
loris, videntur etiam vna parte magis plani: cul-
icello perforatus vnus, cortex visus paulo firmiter,
quàm castaneæ & tenax, intus apparuit medulla
alba, tenera, quæ extracta per paruum foramen,
parua quantitate degustata, sapiebat cum acrimo-
nia:

nia: fortè commodius Ricino subnecterentur hæc semina, vel fructus.

SEMEN, TAMARINDI SEMINI
SIMILE, VNA EXTREMITATE
dentatum.

CAP. LXII.

Descriptio. **I**ngro, inquit Clus. Exot. lib. 2. cap. 16. cuius fructus semen, quod Iacobus Garetus mittebat, quod quidem Tamarindi semini non valdè dissimile erat figura, sed magis planum, & oris magis compressis, cortice spadicei coloris rectum, semen continente album, durum, & ob vetustatem rancidum: ipsum semen cum suo cortice ab una extremitate dentatum.

SEMEN FRUCTVS EXOTICI FOR-
TE CUCURBITACEI.

CAP. LXIII.

Descriptio. **C**lus. Exot. lib. 2. cap. 16. à Iacobo Garetto, accepit semen fructus potius, quàm fructum, vel cucurbitacei generis, vel alterius cuiuspiam: nam similem quodammodo formam habebat, licet aliquantulum crassior, nec adeò rugoso, verùm laxi, colorisque vel spadicei, vel ex spadiceo flavescentis cortice tegeatur: sed nec huius generis semina eiusdem erant magnitudinis, verùm quædam latiora, nonnulla angustiora: nucleus qui in eo continebatur, durus ob vetustatem & insipidus.

ARATACOV BRASIL SEMINE
MELONIS FVSCO, FERVIDO.

CAP. LXIV.


*Aratacov
descriptio.*

Dissimulus vir Richardus Garth, ut ait Clus. Exot. lib. 1. c. 17. mittebat fructum, quem à Brasilia accepisse significabat, quem non integrum accipiebam, & ab incolis *Aratacov* appellari adscriptum erat, sescuncialis longitudinis fuisse videbatur, quantum quidem ex fragmento summâ parte abrupto coniecturam facere licebat, de crassitudine nihil pronuntiare possum: sed illud fragmentum fungosâ quadam materiâ præditum erat, in qua latebant quaternæ aut quina semina fusci coloris, duobus ordinibus à summo ad imum serie quadam disposita, melonum seminibus formâ non valdè dissimilia, medio tumentia, medullâque continentia feruidi saporis, etiam toto quatuordecim annorum cuticulo, postquam accepissem elapso: ipse fructus foris inæqualis & fusci coloris. Cuius porro fuerit usus apud indigenas, me latet, & qui mittebat, nullam mentionem faciebat.

NVCS INSANÆ, BELGIS PRV.
NVLA INSANA, PVTAMINE FVSCO,
officulo membranaceo nigro, cum
macula alba.

CAP. LXV.

Iacobus Cuelenerus, autore Clus. Exot. lib. 2. c. 16. Vir ornatiss. & Commissarius in ea naue, cui Tom. I.



nomen Amstelredanum illius classis, quæ in Indiam Orientalem ablegata 1603, rediit, inferebat exoticum fructum quendam, quem nauta ab effectu malle *pruymfens*, hoc est, fatua siue in Lina prunula appellatur, ego nuces dicere maluissem, quia maiorem similitudinem cum nucibus habere mihi videbatur, quàm cum prunis, nisi ab ossi-

culo, quod continet, prunis sylvestribus in spinis nascentibus non dissimili, appellationem sumendam esse contendere.

Erat porro hæc nux prorsus orbicularis formæ: **Descriptio.** nam eius ambitus, siue à pediculo per longitudinem, siue per transversum metueris, paulo plus quàm binarum unciarum erat, putamine non valdè denso, satis tamen firma constans, foris subfusco, & non laxi, internâ autem parte spadicei coloris, & laxi, officulum membranaceum continens nigra quadam pulpa rectum, pruno silvestri nec forma, nec magnitudine abhincilem, infima & sessili parte, quæ petiolo respondebat, alba macula satis amplâ insignitum, sub quo nucleus, cineracei coloris durissimus latebat: ipsa nux breui crassiusculo quæ petiolo prædita erat, quàm maxima ex parte singularem, interdum autem geminam simul coniunctam nasci intelligebam in arbore cerasi magnitudinem æquante, cui sola essent longa & angusta, mali Perlicæ foliis non dissimilia.

*Pruno sil-
vestri non
abstineo*

Ceterum occasionem, cur istum fructum fatuum siue insanum nauta appellarent, præstat ut Lector intelligat ex ipsius Iacobi Cueleneri narratione scripto comprehensa vernaculo sermone, & ad me missa, quam sic Latinam faciebam.

Duodecimo die Octobris anno à nato Christo 1601. post longos errores, tandem singulari Dei beneficio, in Sinum quendam appulimus, situm vndecim gradibus & quadraginta quinque scrupulis ab Aequatore versus polum Arcticum. In eorum sinu prunorum quoddam genus reperiēbamus, quo cercopithecos [qui isthic valdè frequentes] vesci conspiciēbamus: nostri nautæ, qui alioquin alimentis non abundabant, id observantes, hæc pruna etiam legerunt & comederunt, nec ea re contenti nonnulli ipsa fructus officulum nucleis in aqua macerata coquentes, vorarunt: quotquot autem vorarunt, capitis vertigine & mentis alienatione correpti sunt, mirasque imaginationes habuerunt pro naturæ cuiusque temperamento: vnus enim arbitrabatur in suo cubili seu sponda, ædes fabricari, ad coquendam ceruiciam commodas, & quotquot propter stabant compellabat, dicens: Videtis quid ista vetula in meo cubili agat: alter singulos conuocans percontabatur, an pisces emere non cuperent, se enim cepisse omnis coloris genere præditos: tertius in sua sponda iacens, conquere-

Nata

Dd 2

batur sibi de toto corpore carnes detrahi: quartus vociferabatur ingentem nauem in suo cubili fabricari: quintus etiam in sua sponda iacens, quatuor aut quina vasa confringebat, dicens, multos humunculos istic adesse qui eius spondam occupare conarentur: sextus naucletū compellans, videlicet, inquit, diabolus in rostro navis sedentem & pisces captantem: septimus affirmabat se per navis alium anchoras in imo maris fixas conspiceret: nostri Naucletū filiolum ad patrem accedens, chare pater, inquit, plurimos homunculos per tuum nasum cursitantes video: sic ut ipse pater cum quodam metu admiraretur: quibus porro somno indulgere licebat, statim istarum rerum imagines evanescebant, nec defuerunt, qui per triginta sex horarum spatium, imò per integrum biduum dormierant: fuerunt etiam qui alui profluvio correpti sunt. Eiusmodi & pleraque aliarum imaginum iis contigerunt, qui naue Amstelredamum appellata vehebantur, quas nimis longum esset referre: inter reliquos autem nautas, Anglus quidam, in cælum suspiciens, illud apertum se videre affirmabat, atque voce inclamabat, O Domine te lubes sequor, variisque suis gestibus, risum omnibus qui circa ipsum erant mouebat: nihilominus semper in cælum suspiciens progrediebatur, ut parū abesset, quin in mare prolaberetur, nisi qui ipsi astabant, detinuisent. Haecenus Caelenerus. Quæ cum ita sint, mirari necesse est unius eiusdem fructus manducationem, tot tamque varias imagines, in hominum cerebro potuisse parere.

FRUCTVS DYSENTERICVS FLAVVS.

CAP. LXVI.

Descriptio Prouenit in India, autore Monarde, fructus Dysenteriam sanans, delatus ex Quito, qui videtur esse vasta arboris, altera parte laevis, flavus, altera asper, coloratissimus, ac veluti pullus. Ceterum qualis esset fructus, cuiusve arboris, nunquam peruestigare licuit. Clus. in versione sua vocat fructum Dysentericum: Hist. Lugd. Fructum & Corticem ad Dysent. Monard.

In pollinem tenuissimum redactus, & cum aq. capitum rosarum mane & vespere exhibitus, dysenterico fluxu miserè afflictum breui sanitati restituit, indicante Indo, qui sapiens expertus erat in aliis.

FRUCTVS PEREG. TUBEROSVS MAIOR CLVS.

CAP. LXVII.

Descriptio Alicuius fructus ossiculum sphaerica penè figura, cuius magnitudo penè vncialis, putamen crassum admodum & durum, perpetuis tuberculis undique obsitum: coloris flavescentis, linea eminentiore transversum secante, quam, ut in Iuglandibus, putaminum coniunctionem & commissuram esse arbitror. Clus. libello peregr. & Exot. lib. 2. cap. 31.

Iconem autem dedimus ante cum aliis cap. 50.

FRUCTVS IND. GRANVLOSVS VEL TUBEROSVS MINOR.


Descriptio Inter Pipera interdum reperitur fructus, quales duos habemus, alterum Pruni parui serotini magnitudine, alterum dimidio minorem, lapideæ & inuictæ ferè duritiei: forma utriusque oliuaris ferè, color rutilus: superficies externa granulis omni-genis asperata: ab umbilico modicè cauo ad oppositam partem leuiter elatam, inter prærupta veluti scopulorum quinque decurrunt rectæ lineæ in minore, in maiore dux duntaxat conspicitur.

Clus. de fructibus peregrinis & Exot. lib. 2. cap. 30. quintum facit, nostro iudicio, quem sic describit. Alicuius fructus ossiculum forma planè sphaerica est, magnitudo globuli minoris sclopi, putamen flavescentis coloris, & perpetuis tuberculis, at non aded crassis, obsitum, nullaque linea cinctum. Ex nostris fructibus depicti sunt.

Iconem etiam habetur ante cum aliis cap. 50.

NVCVLA EX GVINEA.

CAP. LXVIII.



Descriptio Nuclea Myristica ferè magnitudine & forma, lenis, concussa sonum edens, cuius alter finis styli quid simile habet, ex quatuor paruis sulcis siue eminentiis procedens, oppositus verò scrobiculum, vnde anulus videtur pediculus, unde radii recti producuntur: cortice mediocriter lævi subrufo tectus, quo abrafo subest albus durus qualis in Nuce moschata: huic subest alius

crassior, spadiceus, fungosus, politus: nucleum ambit immediatè quartus pertinaciter adhærens, pellicula tenuis inlita, rugosus, spadiceus quoque, ipse verò nucleus amplius, candidus, piguis, gustu dulci cum fastidioso quodam sapore. Primò accepimus munere Ill. E. C. Wirt. cui miserat D. Paludanus, qui postea etiam nobis communicauit nomine Nucularum ex Guinea. Prior cum ex uno putamine ex Ill. E. C. fructu depictus fuit, quem laconi destinant: posteriores ex nostris.

NVX IND. ALIA

CAP. LXIX.


Descriptio Minor est Iuglandis latitudine vnciali, paulloque longior, colore pullo obsoleto, fuscis maculis consperso. Desinit in breuissimum acumen, qua parte quinque parua esse videntur. Parte opposita pediculi pars adhæret lignæ prorsus, firma

forma crassaque, vnde coniectura arborum factum. Ipse alioqui fructus levis, minimè ponderosus. Interiora intropicere non licuit, quòd terræ commissa erat illustr. Ducissa V Virtemb. apud quam descriptus atque depictus. Hunc Eicon cap. præced. cum alia habetur.

NVCVLA INDICA, GLOBOSA, SONORA.

CAP. LXX.

Descriptio



Inter fructus peregrinos III. Celsit. Virt. pie memoriz Stutg. 1608. Orbicularis siue globosa, Gallæ parvæ, siue parvulo globulo similis, cinerei & maculosi coloris, costâ penè totus cinctus, sonorus, Cortex non admodum durus. Figuram indicat numerus I.

NVCVLA PYRIFORMIS INDICA ET SONORA.

CAP. LXXXI.

Descriptio

Fructus repertus inter Ill. C. pie memoriz peregrinos, articulo postremo pollicis non maior, exprimens parvum pyrum Moscatellinum, solidus, durus, rugosus, ferè cinereus, lignosus, sonorus: saporem manifestum non sentimus. Ill. Principissa, reservavit fructum 1608. Stutgard. sua magnitudine pictus est. Icon cum prægeilla sub Numero II.

FRUCTVS PYRIFORMIS, FVSCVS, LAEVIS, STRIATVS CVM CORNVLA, in quo nucleus.

CAP. LXXXII.

Descriptio

Ac. Gareus misit fructum, inquit Clus. Exot. lib. 2. cap. 16. vncialis magnitudinis, qui prorsus sulcus, penè orbicularis, striatus, lævis admodum & in aqua supernatans, illàmersus, tamen nucleus continere ex agitatione deprehenderetur: anteriore parte veluti coronulam striatam habens, in qua florem sedisse verisimile est, posteriore autem in oblongiusculum pediculum desinens. Figura ponitur etiam in præcedenti tabula sub numero III.

FRUCTVS TRIANGVLARIS SCISSVRAS OSTENDENS.

CAP. LXXXIII.

Exoticus fructus à Paludano concessus, de quo Clus. Exot. lib. 2. cap. 35. Triangularis formæ.

max erat, eminentibus enibus angulis, & scissuras ostendentibus, ex quibus, internas partes facile diuidi posse, intelligere licebat: levis erat, & aquæ innatans, nec unum petens, tantèsi diuturno tempore in ea hæretet: foris fusci coloris: an quidpiam interiore parte contineret, ignoro, quandoquidem confringere sum ventus, quòd vnicum illius generis haberet Paludanus: arbitraber tamen pulpam continere, quòd licet agitat, nullum strepitum ederet.

DE NVCE VNGVENTARIA.

CAP. LXXIV.

Nux vnguentaria arbor.




Nucula siue glans vnguentaria.

NVces Vnguentariæ dictæ, oblongæ ferè sunt, nuclei Aucellæ magnitudine, aut etiam nucleo cum suo putamine, sed minoris, figura triquetra: putamine teguntur albicante, medio-criter crasso, fragili, cui nucleus subest crassiuscula fungosa pellicula nuci coloris obductus, albidus, aucellæ nuclei aut Amygdalæ consistentia, pinguis, quique nobis iam in Nucibus ante triginta annos repositus non tan-cescerat, sapore tantum amaro præditus. Huius generis nucule aliz sessiles, aliz oblongæ, maiores, minores. Effigies triquetra, sed rotunda & glandis amula huic nomen generis aptavit.

Nascitur autè in siliqua, quam, (vt inquit Advers.) nullus Veterum aut Recentiorum literis mandavit, admodum eleganti,

palmum longa, carinula bifori conflata, tereti, rotunda, gracili, binisque loculis ventriosa, nempe ima mediæque sui parte, quâ protuberat, glandem singulam singulo claudens, summa verò, acuto stylo, quo, trostri instar, vel Rhododendri vel Periplocæ repentis, acutum mucronem, protendit: intus subrufo colore, foris pullo cinereo, & secundum longitudinem striis rugisque exarata: coriacea tota, flexilis & corticosa, ipsi



Fructus vnguentariae.

Siliqua vnguentariae.

Dd

*Aucorum
pianta.
Balanus.
Arbor de-
scriptio.
Theophr.
emend.*

pida, subastringens & sicca. Videamus quid de ea tradant Auctores.

Balanus Theophrast. quæ, ut ille tradit, nomē obtinuit à fructu. Folium habet Myrtosimile, sed longius. Ipsa arbor sincera & bene magna, non recta, (i. e. obliqua vel aduersa Gal.) pro eo quod in vulg. legitur aquil: nec improbat Scal. qui & ἀπὸς legit) sed contorta. fructus corticibus vtuntur Vnguentarii propter odoris iucunditatem: habet enim odoratos. Fructus verò ipse inutilis, qui magnitudine & aspectu capparis fructui similis ligno constat valido, cum ad alia, tum ad nauigia accommodato.

*Lignum
Balanus
Myrsinica.
Dalec. cor-
rect.*

Balanus Dioscoridi fructus est arboris Myrtice [μυρτις: fortè rectius legas cum Theophrast. μυρτιν vel μυρτιν, id est, Myrti) similis, magnitudine Nucis auellanz (πυρρὴ καρύς) cuius interna pars [nucleus: τὸ ἐντὸς, rectius quàm quibusdam visum, τὸ ἐκτὸς, de qua postea specialius] Amygdalarum amararum more tusa pressaque liquorem reddit, quo in pretiosa vnguenta pro oleo vtuntur. Nascitur in Aethiopia, Aegypto, Arabia & Petra oppido secus Iudæam. Præfertur recens, plena, candida, quæque facili cortice spoliatur.

Locus.

Dalec.

*Myrsinica.
num.*

Idem ferè & Plin. confirmans de eius differentiis quoque tradit, his verbis: Myrobalanum [quod illi, sicut & Actio idem est cum glande Vnguentaria, longè aliud ab Arabum Myrobal. de qua lib. superiori] Troglodytis, & Thebaïdi, & Arabiz, quæ Iudæam ab Aegypto determinat commune est, nascens vnguento, ut ipso nomine apparet. Quo item indicatur & glandem esse arboris, quâ dicimus inter herbas, Heliotropio simili folio. Fructus magnitudine Auellanz nucis. Ex his in Arabia nascens Syriaca appellatur, & est candida. Contrà in Thebaide nigra. Præfertur illa bonitate olei quod exprimitur: sed copiâ Thebaica. Inter hæc Troglodytica vilissima est. Sunt qui

*Heliotropij
folio
Differen-
tia earum-
que dele-
ctus*

*Syriaca.
Nigra.
Troglody-
tica.*

Aethiopica.

Aegyptia.

Arabica.

Petra.

Aethiopicam iis præferant, glandem nigram ac pinguem, nucleoqne gracili, sed liquore, qui exprimitur, odoratiori, [quod vitium est. Prorsus enim odoris expertem oportet esse liquorem eum Dal.] nascentem in campestribus. Aegyptiampinguiorè esse & crassiori cortice rubentè: [rubenti, Dal. tali ferè colore est durum putamen] & quamuis in palustribus nascatur, brevior, lixiorèmqne. E diuerso Arabicam viridem ac tenuiorè: & quoniam sit montosa, spissiorè [densiori & firmiori cortice.] Longè autem optimam Petram, ex quo diximus oppido, nigro cortice, nucleo candido. Vnguentarii autem tantum cortices premunt: medici nucleos, tundentes [tundunt, Dalec.] affusa eis paulatim calidâ aquâ.

Hæc Plin. qui cum Theophrast. in eo consentire videtur, vnguentarios cortice tantum vti ad vnguenta, vtrique sanè contra mentem Dioscor. qui ex nucleo exprimi oleum tradit, id quod verisimilius: quis enim vnquam vel dicat, vel credat ex exocco putamine, quale est Nucis vnguentariæ, elici Oleum, spreto nucleo, ut inquit Theophrastus?

*Theophr.
& Plin. not.*

Falsum etiam quod Plin. his postremis scribit verbis: vnguentarios tantum cortices, medicos premere nucleos: Nam ut & doctiss. testatur Dalechamp. nucleos vtrique premunt: sed vnguentarii absque igne & aqua calida, ut, quod fuit oleum, alienæ prorsus qualitatæ expert sit, nec rancescat: medici affusa calida, ut plus olei extundat. Ut vel in hoc nescio an Medicorum, an Pharmacopœorum potius avaritia notanda videatur, qui sincerius ad succum trahi videntes, ipsi copiosius

& minus sincerum ad sanitatem & vñus medicos conferre non erubescunt.

Eas difficultates aduertens Dalechamp. maluit legere apud Plin. Vnguentarii autem exocco cortice premunt, affusa eis paulatim calida aqua: medici nucleis tuls vtuntur. *αποκοκκιστος δὲ καὶ ἀδολος τις* apud Dioscor. tusa & expressa faciem. Plin. falsum putat idem Dalech. corrupta Theophr. licet, *τὸ κατὰ τὴν τῆς καρύος χυρταὶ ἢ μυρτινὴν ἀπὸ τῆς δαλ.* *δὲ κατὰ τὴν τῆς καρύος χυρταὶ ἢ μυρτινὴν ἀπὸ τῆς δαλ.* pro quibus ille sic legit: *τὸ κατὰ τὴν τῆς καρύος χυρταὶ ἢ μυρτινὴν ἀπὸ τῆς δαλ.* *δὲ κατὰ τὴν τῆς καρύος χυρταὶ ἢ μυρτινὴν ἀπὸ τῆς δαλ.* Vnguentarii putamine non vtuntur, sed tuso fructu. Is enim odorum suauitatem retinet. Est autem edendo inutilis. Sic sanè Theophrast. cum re ipsa & parandi modo consentiet. Quod sic etiam veterem Theophrast. lectionem retinere libeat, non tamen deerunt eum tuendi, eiusue sententiam in meliorem partem interpretandi rationes. Videtur autem Theophrast. ad vnguenti odorem potissimum respexisse, qui ei ex putaminibus conciliatur, quemadmodum & ipsa duratio. Nam, ut alicubi ait, *τὸ δὲ κατὰ τὴν τῆς καρύος χυρταὶ ἢ μυρτινὴν ἀπὸ τῆς δαλ.* *δὲ κατὰ τὴν τῆς καρύος χυρταὶ ἢ μυρτινὴν ἀπὸ τῆς δαλ.* etiam si tempus spectes, quia minimè pingue non rancescit, ut annotat doctiss. Const. qui & ipse testatur ex putaminibus quidem balani non extrahi oleum, sed ipsa tusa vel pressa in oleum conici, quo vtantur vnguentarii odoris stygmatisque causa: ad quæ oleum in odorum quod paratur ex nucleis Balani inutile sit: vñsurpari tamen in pretiosis vnguentis [ut ait Dioscor.] sed olei loco, ad suspiciendos odores, & ut rancor vitetur. Hoc & vtuntur medici. Sic Theophrast. Dioscor. Pliniusque cum aliis & inter se consentire, quodammodo videntur, & ut Const. putat, *ταῦτα ὁμοῦ* nodus expeditur, verusque sensus huius loci (verbis etiam & lectione Theophrasti antiqua stante) eruitur. At vñgeat aliquis. Cur ergo Theophrast. nucleum inutilem dixit: Dic tu vel cum Dalechamp. inutilem ad cibum: vel cum Const. ad odoratum, per se ita & hanc difficultatem solutam habes: quamuis ut ingenuè fateamur nimis crasse nobis locutus videatur Theophr. (si modò genuina, eius verba sint) quando ait, ex putaminibus tantum elici oleum: fructum verò inutilem esse: quem & Plinius, ut alias secutus est.

*Plin. locum
refert.*

*Theophr.
locum refert.*

*Theophr.
locum refert.*

*Obiectum
Sol.*

Ceterum ad Myrobalani quoque vocem, eandem glandem denotans, alluisse videtur Marcialis sic canens.

*Quod nec Virgilius, nec carmine dixit Homerus,
Hoc ex vnguento, constat, & ex Balano.*

Mesues porro in eo quoque à Dioscor. dissentit, quod, non ut hic, recentem, sed vetustam præferat. Sed & hic nodus faciliè dissolui queat, si dicas, Dioscor. ad id respexisse, quod recens plus olei reddat: Mesuem ad id, quod antiqua fundat sincerius: Ratio solutionis est: quia recens plus humiditatis excrementitiz continet, vetusta minus, idèque minus ventriculum subuertat, ad quod Mesues potissimum respexit. Cuius sententia & ex Mesue probatur, sic scribente. Balanus Myrsinica, id est, Glans vnguentaria, fructus est magnus quidem nucis Auellanz magnitudine, triangularis. Paruus verò ciceri similis, matus: vterque tamen medulla leni, & vñctuosa. Magnus est præstantior, præsertim si vetus est: cortice est albo, laui, tenui: medullâ intus albâ, leni, pingui: & vetus est innocentior.

*Contrari-
fin solutus*

*Balanus
Myrsinica.
Glans vñ-
guentaria.
Dalec.*

Balanos Galeno. Glans, quàm Græci *καρύς* Balanus vocant, Celso. Aegyptiæ meminit Hipp. differt à Glande

à Glande vnguentaria; quæ Nur odorata fide Moschata vulgò Veteribus incognita pvt existi-
mat & annotat Hermol. Cornar. com. in Gal. c. 1. l. 4. de comp. med. secundum loca *βάλανος αἰγυπτία* Critonem eo loco dicere existimat, quam mox sequi pharnaco *βάλανος αἰγυπτία* appellat, quam-
que glandem vnguentariam Latini, Myrobalanum Plin. vocat Aegyptiam autem dici patria appella-
tione, vbi & *μυροβάλανος* nasci affirmat, & *φαινοβάλανος* dictam, hoc est, Palmæ glandem: unde er-
ror vtiq; committi potest, vt altera pro altera sumi possit, à quo errore neque Plinius immunis fuit, nisi error Librario imputandus, qui lib. 23. c. 5. pro Phœnicobalano Myrobalanum substituit: quanquam idem Plin. lib. 12. cap. 21. vbi ait: Myro-
balano in vnguentis similem proximū, quæ v-
tum habet Palma in Aegypto, quæ vocatur ad-
ipso, viridis, colore Mali cotonei, nullo intus ligno, &c. videatur planè Phœnicobalanum cum Myrobalano confundere, quam tamen res sint diuersissimæ, & Palmæ succus in Vnguenta com-
modus nequaquam exprimat. Quare quod Diosc. de Palmæ fructu dixit *μυροβάλανος* Plinius in vnguentis similem proxi-
mū, quæ vsum habere ait, cum Diosc. id non ve-
lit, sed *μυροβάλανος* de aliquali figuræ similitudine dicat, non de vtu in re medica ac vnguentis. Imò planè alias vires Palmulis, quæ & Dactyli hodie vocantur, & Diosc. & Gal. adscribunt, quam Myrobalano sine glandi vnguentaria, vt ex suo pate-
bit loco. Idem doctiss. Dalech. apud Plin. legem-
dum censuit, Myrobalano vnguentaria similem proximamque figuram habet, ex cit. Diosc. lectio-
ne, quam similitudinem Plin. ad vnguenta negli-
genter retulit.

Myrobalanum verò Arab. à Diosc. dictam, non esse aliam, quam *βάλανος αἰγυπτία* ab eodem lib. 4. descriptam, vel hinc patere potest, quòd nul-
libi speciatim Myrobalanum describit, sicut ne-
que Gal. neque Aetius, neque Paul. vnum reli-
ctum, si diuersa ab illa ipsa esset. Quare certum esse, penitus sibi persuadet Cordus, Myroba-
lanum Græcorum Medicorum, nihil aliud esse, quam *βάλανος αἰγυπτία* ab eisdem dictam: quod ip-
sum & Aetius conceptis declarat verbis, cum ait: *ἀλλ' ὅτι μὴ μὲν λέγεται ὅτι ὁ μυροβάλανος ὁ αἰγυπτίος, ὅτι ὁ μυροβάλανος ὁ αἰγυπτίος, ὅτι ὁ μυροβάλανος ὁ αἰγυπτίος*, vti pluribus declarat diligentiſſimus Cordus.

Hanc eandem sententiam non solum secutus est Lacina, sed & in magno errore versari scribit eos, qui putant eiusdem generis esse Myrobala-
nos Arabum seu Officinarum cum Glande vn-
guentaria.

Arabes Ben vocant. Sic enim legimus apud Se-
rap. Haben, id est, granum Ben. Et Auicenn. Ben est granum maius Cicere, albidum, cui medulla lenis & vinctuosa. Et Hali Abbas: Ben per simplex e, inquit, & sine h, est fructus cuiusdam arboris, similis Myricæ, teste Diosc. &c. Audet tamen Tagaultius scribere Ben, Beu, vel Beben nomina esse Barbara, Arabibus Balanum Myreplicam deno-
tantia. Idem Meisem taxat, quòd Ben antiquum melius dixerit recent. Sed ipse met potius taxan-
dus videtur, qui Mesuei mentem non intellexit, de qua antè diximus. Mesues nostro iudicio præfert in vtu medico antiquum Ben, quia in eo consumptus humor quidam, siue serum acre ac malignum, quale obseruamus admixtum oleo, cum recens exprimitur. Eundem in modum Afari etiam radices & folia violenter purgant per infe-
riora & superiora, vbi virent, propter tale aliquod serum: si exsiccantur, amittunt vim illam mali-
gnam & vehementem. Quod idem quoque &

uenit Iridi, quæ virens vrit & purgat violenter: Exsiccata non item.

Cæterum Olei expressi magma residuum, vt annotat Syln. videtur esse *μυροβάλανος πίπμα*, id est expressum, quod cataplasmatis miscet Gal. lib. 11. & 13. Meth. & bis lib. 9. comp. ph. par. splenicis re-
mediis adhiberi scribit Gal. Quo in loco *μυροβάλανος* tantum, aliquando *βάλανος μυροβάλανος* leges: ali-
quando *μυροβάλανος ἀλίπμα*, id est, farina & puluis, & *μυροβάλανος ἀλίπμα*, id est, putamen & cortex & *μυροβάλανος ἀλίπμα κακομύκητος*, id est, Gal. lib. 11. Myrobalani testæ & cortices incisi & tusi cribra-
tique. Omnia hæc ad splenicis scribuntur, vt sit credibile maximè de fructu eodem, scilicet Ba-
lano Myreplicæ, & eius partibus omnia hæc intel-
ligi.

Matth. examinandum proponit, an Lilac dicta arbor sit ea, quæ glandem vnguentariam fert. Idem Theophr. reprehendit, quod è putamine fructus oleum elici tradat: Plinium addens & Theophr. & Diosc. sententiam comprobare. Verum tamen hac ætate ab omnibus tantum è nucleis à putaminibus repurgatis exprimi. Nec se credere ex solis putaminibus, vel fortissimo prelo pressis quicquam effluere, maximè cum hanc parandi rationem Diosc. prætermiserit, non solum cap. de glande vnguentaria, sed etiam libro primo, vbi tamen de Oleis & Vnguentis conficien-
dis latius differt.

Idem Manardum notat, quòd dubitavit, an Vnguentaria glandis oleum è nucleo, an è putamine exprimi debeat, Galenum tamen, qui rem hanc abundè enucleauit, constanter asseuerasse, Balanum oleum vnguentaria ex carne nucleo-
rum, non ex putaminibus exprimi. Id quod etiam facile ex Diosc. colligi possit, cum dicat consimili modo fieri Balaninum & Amygdalinum. Tandem & in eam cadit suspitionem Theophr. locum esse deprauatum, aut inuicem integros aut veraces fuisse authores, à quibus fortassis Vnguentaria glandis historiam acceperit. Sed de hac re abundè iam prius actum, vt ex quibus hæc & similis omnis difficultas de hac se facile vel tolli, vel explicari possit.

Andreas Marinus, inquit idem Matth. Medicus non vulgaris, in suis super Meisem annotationibus, plantam quandam pingit pro vnguentaria glande, à Cl. Pet. Ant. Michaelio Parrutio Veneto acceptam, quæ à præscriptis omnibus tota facie differt: sed an legitima sit, cur probet aut improbet, non habere. Titulum eius mendacem esse: siquidem Ben album inscriptum habeat. Itaque verendum ne & ipsa quoque imago tituli sequatur errorem.

Idem in post. com. cum magnis fig. addit. Plantam cuius imaginem damus, Constantinopoli al-
lata est, sub nomine Lilac. Eam cum inspexissem & fructus eius agnoscerem, Pistachiorum faciem perquam bellè referte, illico in suspitionem veni (inquit) an hæc fortassis glans vnguentaria dici posset. At mehercle Lilac fructus nihil habere nobis videtur, quod sit simile Pistachiis, vt clariùs patebit suo loco.

Amatus glandem vnguent. Pistachiis similem facit, non malè, si cortice extimo spoliata sit, quamuis minor sit, & forma triquetra.

Potè observatio digna sunt Bellonii verba, in hunc modum scribentis. In Arabia ad pagum Pharagon dictum, conscendimus rupes, vbi inue-
nimus arbores Balani Myreplicæ, prouementes ad altitudinem Betulæ inter rupes, cuius rami etiam similes, truncus albus est, ita vt è longinquo

120

Café au lait.

Loose end.

Stomach
Tempted
by doctor.

cum balanino, quod nobis quidem nemo facile persuadet: hoc *ag. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920. 921. 922. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 950. 951. 952. 953. 954. 955. 956. 957. 958. 959. 960. 961. 962. 963. 964. 965. 966. 967. 968. 969. 970. 971. 972. 973. 974. 975. 976. 977. 978. 979. 980. 981. 982. 983. 984. 985. 986. 987. 988. 989. 990. 991. 992. 993. 994. 995. 996. 997. 998. 999. 1000.* manifestam & efficacem habet, illa aut nullam aut certe obicuram, & quæ fortè simplicissimi olei olivarum vires non transcendat, quamvis altero pro altero vsui fuisse non magna consequi possit noxa.

Temperamentum. Vnguentarii, tradente Gal. vniuntur carnis eius succo, qui calidus est. Reliquæ autem vnde expressus est, vincentem habent qualitatem amaræ. Sed & admixta est quedam adstrictio Proinde extergentem simul & incidentem contrahentemque & stipantem effectum possident. Itaque (præter iam dictos vsus quos studio non repetimus) & lecur indurascencia liquant. Drach. pondere cum melicrato caro eorum pota, vomitum mouet: sæpè etiam per inferna aluum largiter subducit. Viscera expurgat. Externis noxis cum aceto administrari debet. Sic efficacius reddetur ad prædictos cutaneos morbos omnes: item ad Exanthemata quæuis alia, achoras, & vlcerosa, & quæcunque crassi sunt succi. Cicatricibus decoctem affert. Lienem illinendum cum farina quadam exiccante, ut Erui aut Lolii.

Cortex. Cortex eius admodum adstringit. Itaque vbi adstrictione opus, accommodari potest. Celsus ad lienem sic aptat. Glandis (quam *Ben* Græci vocant) cortex & nitrum, paribus portionibus contunduntur, respergunturque aceto quàm acerrimo. Vbi Cerati crassitudinem habet, linteo antea in aqua madefacto ulinitur, & sic imponitur, supraque farina hordeacea inicitur: sed manere ibi non amplius sex horis debet, ne Lienem consumat: sauiusque est bis aut ter fieri. Specialis, ac vi solet medicæ admodum, eiusdem vires Melæses persequitur, sic: calfacit maior initio ord. plicat 2. Humiditatem habet excrementosam & acrem, qua ventriculum subuertit, nauseam excitat, viscera conturbat. Pituitam crassam & lentam vomitu & deiectione purgat: quare confert colico affectui pituitoso & stultento, sumptus, balano, clystere iniectus, cataplasmate ex ipsius medulla hordei farina & melle appositus, & calore suo neruorum frigidis affectibus, spalmo, tetano, contractioni. Tumores quoque duros, strumas, nodos, & soluit cum melle. Hepa-

Canis. aut Lienem obstrueto, vel durato cum farina Lupinorum & spica confert imposita. Ad hæc fructus minor, & eius oleum efficacius admoventur. Idem oleum aut infusum, tinnitui, iibilo, surditati auxiliatur: cicatrices scidas, lentigines, alphas, & cætera cutis vitia emendat. Incidit enim, tenuat, terget, expurgat, aperit obstrueta. Paruus autem ad omnia est valentior, molestè purgat, vires dei cit, sudoremque frigidum mouet. Obid non vtendus etiam oleo, nisi emplastro, vntione, cataplasmate. Magnus ne ventriculo noceat, facit assatio. Ea enim humiditatem excrementosam & acrem horum symptomatum causam coquit & resoluit: tuncque solum deiectione purgat. Adduntur præterea ipsi, præsertim coquendo, semen anisi & fœniculi. Ex huius autem ita cocti medulla cum dimidio pondere Amygd. dulcium, & melle vuarum passarum, formæ fiunt Auellanarum effigie. Ipsi autem fructus integri, vel potius horum medullæ multum tritz aromatibus aliquibus, vel anisi aut fœniculi semine adiecto, inuoluuntur papyro, & maza: post coquuntur sub cinere calido.

Colica. **Sciendi mo.** **di Vary.** **Nervi.** **Spasmus.** **Tumores.** **Viscerum obstrueto.**

Qualitates. **Parus.** **Canis.**

Trachis.

Oleum. **quomodo.** **conficitur.**

nucleo fieri debere colligitur. Nucleus autem & corticem conuenit, & id tenerum, quod in cortice continetur, quod totum semen verius, quàm fructum dixeris: nam si totum fructum: mirum est, quod à corticibus ita siccis oleum exprimi possit: si tantum ab eo, quod intus est: videtur Dioscor. scripturæ repugnare. Sed dicendum ibi fructum pro eo, quod in semine continetur, accepisse, quod ostendit id, quod subdit: præferri, quæ facile delibretur: quasi delibratam assumi debere ex hoc significaret. Cui & hodiernus vsus, teste Maranthâ, adstipulatur. Vnguentarii enim ex seminis substantia, non ex toto semine oleum de Been [ita enim glandem vnguentariam appellant] eliciunt. Oleum autem quod ex his extrahitur datur à drach. sem. ad drach. j. & sem. Ben ex sententia Auicennæ. Fluxum sanguinis narium reprimi sua adstringenti facultate.

Decoctum radice colluendo os confert dolori dentium, Duritiem hepatis ac splenis aufert cum aceto drachm. ii. pond. potum. Sed stomacho noxium, nauseamque facit, aurei pondere cum melicrato haustus succus vehementer vomitum & aluum ciit. Loco eius ponitur tantundem Rubiæ, medium Cassiæ lignæ & decima pars Matris. Quæ Auic. verba huius supinè accipienda. Quod si nota ei arbor Ben eiusque radix, cur non describit? & quis ante ipsum has radici tribuit vires? Respiciat Lector ad d. sin. drachm. cum vnica tantum, vel ipsomet teste vehementem vomitum moueat. Diosc. drach. j. tantum præscribit. Maior dosi nobis suspecta. Quale obsecro succedaneum illud? docti iudicent.

Amatus testatur Medicos hodie, qui in India degunt, glandem vnguentariam in potu ad subducendam aluum & prouocandum vomitum ægris propinare.

Vnguentarii oleo vtuntur pro conficiendis odoratissimis vnguentis, in quæ & moschum, ambiram & zibetum addunt pro Chirothecis & manicis, aliisque suffitu perfundendis aut illinendis. Porro præ aliis omnibus oleis hoc potissimum celebrant Vnguentarii, non quod aliqua odoris præstantia commendetur (inodorum enim est, si Matth. credimus) sed quod nunquam vetustate rancorem contrahat. Ergo rancoris expers cum sit, omnium aptissimum habetur ad misturas [sic vocant] deliciis & lasciuiz causa excogitatas. Quandoquidem, si odorata prædicta alio quouis oleo liquecerent in vnguentum, aut quouis alio modo exciperentur, cōtracto inde nō multo post tempore rancore, [arare enim omne oleum præter Balaninum rancescit] non modò vniuersam odoris suauitatem exuerent, sed etiam putida foetidaque euaderent.

Itali odorato oleo de Ben, quale ad eum vsui studio singulari parant sibi cæsariem & barbam inungunt [teste Monarde] deliciarum gratia, & iam dudum hic luxus à meretricibus ad fœminas reliquas, & ipsos quoque viros transferri cepit, quasi inter sit homini bestiz odorem præ se tulisse. Et multi egregiè in hoc gestunt.

Matthioli & Amatus alique tradunt nunquam senescere nec rancidum fieri hoc oleum: imò (inquit hic) si oleo Amygd. gutta vna aut altera huius olei adiungatur, illud à corruptione præseruat.

Ben Gland

Vnguentaria

Dosis olei.

Lang.

Dolor d. sin.

substancia.

Am. m.

Canis.

Chirothecis

carum com.

Aut sem

factum.

Barba fœ.

can.

Senorè ca.

natur abu.

sus succum.

Præserua.

no d. d.


mygd.

AUELLANA PURGATRIX NOVI OBRIS.

CAP. LXXV.

Locus.

Descrip.



Novo orbe primū inuenio, insula D. Domoici, ut refert Monardes, quoddam genus Auculanarū misit, quæ colore & forma nostris sunt similes, putamine tenui, coloris spadicei, triangulares, medulla interiore alba & dulci, sic ut multi, dulcedine illece, decepti sint. Clus. addit: Aucellanā, cuius iconem hic exhibeo, lentus & mollis conte-

git cortex, partim ex cinereo candicans, partim nigricans: hunc sequitur putamen minus solidum, quam in vulgaribus Aucellanis: id nucleum continet Aucellanæ magnitudine candidum, solidum, Aucellanæ vulgæ aut Iligneæ, sapore, tenui membrana obductum. Integra aux altera parte sessilis est, & coniunctim binæ nasci videntur, ut interdum Castanæ. Monardes *Aucellana purgatrix* vocat, additque Medicorum vulgus *Ben magnum* vocare (nam esse duorum generum,) parū autem esse id de quo præced. cap. egimus, nempe ex quo oleum conficitur odoratum. Ben magnum Hist. Lugd. Nutes purgantes, frōmbde purgierende Baselnus Taber.

Ben magnum.

Nutes purgantes. Vires.

Purgant. Calida.

Dosis. Tempera.

Eodem Monarde teste, his Indi familiariter se purgant. Postea Hispani necessitate compulsi, illis etiam purgare se cœperunt, non sine vitæ discrimine. Pituitam & bilem supernè & infernè purgant. Nonnulli tamen earum vehementiam assatione infringebant. Coli doloribus præsens sunt remedium, status discutunt, & Clysteribus iniectæ, mediocriter euacuant. Dosis est à drach. i. ad drach. i. sed assandæ sunt. Calidi sunt temperamenti initio tertii gradus, & sic in secundo.

PINEI NUCLEI MALUCANI SIVE PURGATORII.

CAP. LXXVI.

Descript.

Folia:

Fructus Aucellana magnus.

Pinea Nucula. Monardi.

Alitur in hortis quibusdam Malabar, tum etiam in nonnullis sylvis spontè nascitur arbor magnitudine Pini, cuius folia infernè diluto virore prædita sunt, supernè autem saturæ, admodum tenella & mollia, quæ gustata valde acris deprehenduntur, & linguam diu vellicant. Fructus triangularis, Aucellanæ magnitudine, interius in multa receptacula distinctus, in quibus semen est album, solidum, rotundum Pineo nucleo seu putamine exempto par. A Costa.

Considerandum an eadem sint Pineæ Nuculæ cathartice Monardis, quas sic designat. Trāsmittit noua Hispania Pineorum nucleorum ge-



nus, quo Indi se purgabant: quos imitati sunt plurimi harum regionum. Nostris Pineo nucleis similes sunt, nascentes in strobilis magis, quales sunt Myci spica Muticæ: molliore putamine, & nigriore, quam nostri, rotundi, intus albi, pingues & gustu dulces.

Pignoli di Maluco, Canariis *Sepala*: Costa. Et mala edut: vulgo *Pinguones de Maluco*.

hoc est Pinei nucleus Malucaninus, quo nomine & Hist. Lugd. habet. An apud eandem Pinei nucleus cathartici Monardis? Etenim ex ipse quæ Pignoli purgatri & Pinei nucleus purgatorii dicuntur eidem Monardis?

Eo facto, auctor A Costa, frequenter vtuntur Indi, etiam in curandis quibusdam morbis, tum etiam in suis nequitiis. Binos Eiusmodi nucleos, tenui membrana quæ illos contegit liberatos terunt, & clysteribus vulgaribus admiscunt aduersus Schiaticam & vtriusque difficultatem: seu propinant cum g. lina in sculo ad educendos putridos, lentos, crassosque & frigidos humores & asthmaticos curandos, aduersus quem morbum plurimum commendant & frequenter vtuntur. Ex aqua tritis in pingues inunctæ, primum tamen diligenter confectæ & abasæ, probè & breui temporis spatio curantur, sed admodum viunt, ut experientia didicit eadem auctor. Improbè etiam mulieres illarum prouinciarum suis maritis parum æquæ, quatuor grana siue nucleos edendos præbent, ut eos interinunt. Nuclei pinei cathartici, ut scribit Monard. bilem, pituitam & aquas validissimè purgant: & licet Aucellanis mitiores, attamen vomitum eient, atque ventrem subducunt. Assi, neque tam valenter, neque cum tantis tortionibus purgant. Dantur in diuturnis morbis, & peculiari quadam facultate crassos humores expellunt. Quinque aut sex triti & vino diluti, dantur pro virum robore, præparato prius conuenientibus Syrupis humore, qui euacuandus est, & obternata, quæ decet, victus ratione. Etenim qui eis vtitur, illam obferuare oportet, quæ ab his obseruari solent, quibus purgans medicamentum propinatum est.

Calidi in tertio, & sicci in secundo, pinguedine tamen quadam præditi, quæ siccitatem nonnihil imminuit.

Quibus obtingent Pinei nuclei Malucani A-Temperata, vel Pinei nuclei cathartici Monard. siue diuersi, siue iidem sint, non temerè exhibeant ægros: siquidem, ut refert A Costa, grana quatuor interinunt, & admodum viunt. Monard. verò ad euacuandum quinque aut sex exhibet.

BERB

BERETINVS FRVCTVS.

CAP. LXXVII.

Descriptio
arbor.

IN Cancrorum insula celsissimas inuenerunt arbores, Quercu maiores, foliis Laurinis, crassis,

splendentibus, & minime in ambitu serratis, quæ oblongiusculum fructum ferunt, exiguis Iligneis glandibus similem, nullo tamen calyce, ut ipsi referunt, inclusum, cortice tenui cinereo, interdum atro, tectum, nucleum continentem oblongiusculum, candidum, nullo [cùm induruit] manifesto sapore præditum, tenui membrana tectum. Similibus arboribus abundat Beretina insula illi vicina, ad quam postea delati sunt: à cuius incolis illarum arborum fructum, quem prius non atugerant, edulem esse didicerunt. Eo deinde more leguminum delixio, aut in farinam contuso, & pulvis modo cocto & infusio, alterius cibi penuria, cùm in ea insula, tum in naui famem subleuarunt. Eam arborem etiam alunt omnes Moluccæ insulæ. Clus. qui sibi hunc fructum à Cancellariæ Londinensis Primicerio communicatum fuisse, tradit.



Locus.

dat Beretina insula illi vicina, ad quam postea delati sunt: à cuius incolis illarum arborum fructum, quem prius non atugerant, edulem esse didicerunt. Eo deinde more leguminum delixio, aut in farinam contuso, & pulvis modo cocto & infusio, alterius cibi penuria, cùm in ea insula, tum in naui famem subleuarunt. Eam arborem etiam alunt omnes Moluccæ insulæ. Clus. qui sibi hunc fructum à Cancellariæ Londinensis Primicerio communicatum fuisse, tradit.

Cm.

An Beretina fructus.

Est & nobis quidam fructus ex liberali Illustr. Ducis VVirttemberg. cuius figura ferè Corni est minoris, nempe oblongus, quatuor ferè, cortice tectus tenui, flavescente, & vngue haud difficulter separabili. Substantia intus albicat ut Dactylorum, sed firmitudine inferior, & cultello facilis, nullo gustu manifesto. Summa apex parvus & niger occupat: Ima adhesionis vestigium. Videtur autem nucleus quidam esse aliquo cortice tectus, quo nunc exutum habemus, nec suspicio ne caset, esse fortè Beretini iam descripti, de quo tamen nihil certi nobis adhuc constat.

GLANDI ILIGNEÆ QVODAMMODO
SIMILIS FRVCTVS, CORTICE
fragili.

Descriptio

EX fructibus peregrinis Ill. C. Wirt. 6. an. 1530. Stutgardiz offerebatur parvus fructus, parvam glandem Iligneam quodammodo exprimens formâ & ferè colore: cortex tenuis & fragilis, subest alter tenuis, flavescent: nucleus albus, durus. Conferendus est hic fructus cum Beretino, similis enim videtur.

FRVCTVS INDICVS, VILLOSVS,
PARVVS.

CAP. LXXVIII.

Descriptio

Inter fructus exoticos seu peregrinos Illustr. Celsi. VVirttemberg. p. m. 1608. repertus vnus



magnitudine auellanz vulgaris, constans tunica villosa, subflauis: cortice tenero, vna parte nigricante. Qualis fuerit intus nucleus, nos latet, quia casus corruptus.

NVX, PONTICAE NVCI NON VALDE
ASSIMILIS, SPADICEI COLORIS.

CAP. LXXIX.

A Mistelredami, inquit Clusius Exot. lib. 2. c. 16. Descriptio vnus / eius urbis ciue, Nucem spadicei coloris, Ponticæ nuci non valde absterilem, vnciam longam, eius ambitus vnciâ paulò maior, sessili siue infimâ parte angustior, extimâ crassior, & veluti decussatim formata, dura, solida, nec vllò motu strepitum edens: an aliquo calyce excepta fuerit, glandis aut auellanz instar, me latet, nec is sciebat qui illam mihi donabat: nam inter aromata illo anno adnecta fuerat. Huius iconem cum præcedenti damus.

NVCVLA INDICA, CORTICE TENERO,
FORTI BERETINI FRVCTVS.

CAP. LXXX.

A Me visus inter fructus peregrinos Ill. Celsi. Descriptio VVirt. Stutg. 1608. vnus fuscus, parum oliuz magnitudine, vna parte, vbi adhæsit, latiuscula, alterâ in acumen desinente, in quo parum costæ sex numerantur, rectæ non obliquæ: distinctus, sonorus est: cortex cedit vngue compressus: In hac tabella numerus primus, primam: secundus, alteram, & tertius tertiam denotat nuculam.

NVCVLA INDICA ALTERA COMPRES-
SA, CORTICE DVRO, COLORIS
castaneæ, sonora.

EX fructibus peregrinis Ill. C. VVirt. p. m. Stutg. 1608. vnus erat longitudinis vnguis, nuclei parvi Pruni quodammodo dosimilis, sublongus, eâ magnitudine, qua pictus, compressus, costis in vno latere constans, coloris penè castaneæ, lucidus, sonorus, duæ facies sunt depictæ.

NVCVLA INDICA TERTIA SPLENDI-
DIOR.



Hic fructus idem fortè cum præcedenti, color Descriptio penè idem, nisi dilutior & splendidior, magis

etiam compressus & latior, possimdm vnâ paste:
est etiam sonorus, duz facies pinguntur.

FRUCTVS INDICVS, OVI PARVI
VERE FORMA.

CAP. LXXXI.

Descriptio



EX fructibus peregrinis Ill. Ill. Cels. Wirt. p.m. 1608. Stutzgardie, parvus fructus, formâ ferè parui oui & iconis magnitudine, coloris quodammodo castaneæ, sed dilutionis, splendens, duz facies exprimuntur, circulus ambit ferè totum, qui non splendet, quid continuerit nescio, erat in utraque parte foratus.

NVCVLA SVBLONGA, VEL OS
FRUCTVS ALICVIVS INDICI.

CAP. LXXXII.

Descriptio

EX fructibus peregrinis Ill. E. C. Wirt. 1608. Nucula vel, os alicuius fructus Indici, vnciam longa, vnciam semis circiter lata, rotunda, fusci coloris, vna parte latior, lignosa, cava: in ea nucleus cortice tenui tectus, qui fuscus, intus filiosus, durus, albus & sapore manifesto delectatus. Nucula hæc in priori tabula expressa.

NVCVLA TRIANGVLARIS, INDICA,
CASTANELLÆ FERE FACIE.

CAP. LXXXIII.

Descriptio

Ventrida aspectu, nucula sessilis, triangulari, pilis inuoluta, haud maior, inter angulos compressa, ex vno latere commissura nigricante insignita, colore subfusco, in rufum quasi ex spadiceo in cinereum vergit. Concussa non strepit, ut quid intus lateat nos lateat, sed circulum perelegante in nucula concolorem, parte sessili innatum vel p. t. enatum (ham linea elevatior & nonnulli splendentis) intersectat commissuræ linea prædicta. Ex obs. Cherleri.

NVCVLA IND. OVATA FERE.

CAP. LXXXIV.

Descriptio

Nlli vtrinque acumen quoddam extaret, ovata esset figura. Longitudo vncialis, latitudo media: colore inter fuscum & pullum medio, maculis dilutionibus picturato. Costis quibusdam eminentibus, quales in Nuce vnguentaria Rep

dicta, insignita. Nucleus intus latet albus vt ex leuiter adaperto fructu deprehendimus, quem corrumpere non debuimus, vs integer terræ committit posset ab Ill. Ducissa Wirt. quæ aspectus & picturæ vsuram concessit.

NVCVLA QVÆDAM AFRICANA

CAP. LXXXV.

FRuctus peregrinus Clusii, nucis Auedlanæ magnitudine & eiusdem colore, putamine puro, veluti in duas partes diliso nucleum intus continens. Similes aliquando Granatæ in Hispaniis accepit idem ex Africa [El pennon de Velez arce ab Hispanis occupata] delatos, nucleum continentes album, dulcem, quos ad vnguentariæ Nucis genus aliquod referendos existimabat. Huius icon est cum Fr. Amygdaloide nitido peregrino.

OSSICVLVM SVLCATVM FRUCTVS
PEREGRINI.

CAP. LXXXVI.

Aliquis fructus Indici ossiculum esse videtur. Figura ovata est, vtrinque extremorum acuminatum, per longitudinem profundè satis sulcatum, colore pullo. Visum & depictum apud Ill. Ducissam VVitemb. &c.


Icon habetur cum aliis huius libri cap. 88.

OSSICVLVM TAMARINDI ADMIXTVM

CAP. LXXXVII.

EX prima navigatione Batavorum relatū Clusii. Ut videre est Exot. lib. 2. cap. 15. ossiculum cuiusdam fructus, vncialis ferè longitudinis, semuncialis crassitudinis, laui spadiceique coloris putamine tectum, superne quodammodo cristato, & coloris albi, atque paulò infra conum illum ad latus vestigio apparente, quo suo fructui inhaerent. Inter aromata ferunt repertum cum Tamarindorum seminibus & aliis quisquiliis, quæ sæpenumero us commisceri solent.

FRUCTVS EXOTICI OSSICVLVM ALIVD.
CAP. LXXXVIII.



Videtur & hoc peregrini cuiusdam fructus ossiculū esse: semuncialis longum, nucleo Pini ferè figuræ par, ambitu e. ti obiter turbato, durum, politum, læve. Colore rufescente, maculis quibusdam albicantibus aspersum. Visum & pictum apud Ill. E. C.

FRV.

FRUCTVS IND. CORNI FIGVRA.

CAP. LXXXIX.

Descriptio **D**iceret Corna esse, si rubri essent, aded figura & proportione respondent, sed niger est, laevis, splendidus, durus, pediculi residuo crasso. Concussus non sonat, & aqua iniectus sedit, ponderis argumento. Dono accepimus ab Ill. Ducissa V. Virtemb. &c. Eicon cum aliis cap. praeced. habetur.

FRUCTVS IND. OSSICVLVM PER-
ELEGANS.

CAP. XC.

Descriptio **M**agnitudo serè Amygdalæ est, sed figura nonnihil diuersa. Collo supernè donatus angusto: quatuor insignibus per longitudinem lineis notatus, cætera quoque parte nonnihil rugosus, colore pullo. Vidimus apud Ill. E. C. V. Virt. aperire nec licuit, nec interna describere.

HIBOVCOVHV AMERICANVS.

ITEMQUE CARAMENO FR-
uctus isdem.

CAP. XCI.

Tum **ver-**
mibus **A-**
mericanis
et **ab** **in-**
morbus.
Serapis.

Americanorum mirabilis morbus quidam est, quem exigui quidam vermes procreant, dum pedibus eorum se insinuant. Lingua illorum *Tom* dicuntur, nec Siroeum vulgè dictorum magnitudinem multum excedunt. Crediderimus in ipsis pedibus generari. Ita abundant interdum unico loco, ut tumorem mox excitent magnitudinis fabæ, nec sine dolore, partisque atrophia. Eadem plagâ & nos [inquit Theneus] aliquando vexati, dum in America ageremus, aded ut pedes eiusmodi tumoribus serè scaterent. Iis adaperitis vel spontè dehiscenibus, albus se in conspectum dabat vermiculus insipienti, cum puris tantillo. Hoc mali genus incolæ oleo ex fructu *Hiboucouhu* ipsis dicto sanant, qui *Dactylum* aliquo modo representat, nec edulis est. Oleum istud adseruant vasculis quibusdam ex fructibus excavatis paratis, quos *Carameno* suo idiomate nuncupant. Eo oleo vtuntur, ut si perhibent, felicissimo successu. Sed & corpora labore ac lassitudine fracta, eiuſdem afflicta refocillant. Experientia quoque docti fuere conferre vulneribus ac vlcerebus.

Remedium
Fructus
descriptio
Oleum.
Carameno
fructus.

Vulnera
et vlcera.

GOAN ARBOR TVTIAE, CUI NVCLÉVS
CVM PUTAMINE.

CAP. XCII.

Tutia quid **T**utia nos hic in India (inquit Garcias) vtmur, quamque in Lusitaniam & Hispanias reliquas Occidentales regiones exportant, è metallicis conflata non est, sed ex eorum est genere, quæ *Dioscoridis* *arboris* appellantur. Mihi enim retulit mercator harum similiumque rerum curiosus indagator, se certò accepisse à Persicis negotiatoribus hanc *Tutiam* in Quigon Persiæ regione, & Ormuz finitima [ubi etiam laudatissimum *Tom*. I.

totius Persiæ cumunum nascitur] fieri, atque conflari è cineribus arboris cuiusdam isthuc nascentis, nomine Goan, quæ fructum eiusdem nominis profert, cortice & putamine constantem: corticem verò & nucleum, qui putamine clauditur edules esse. Hanc Tutiam Alexandrinam vocari, non quod in Alexandria fiat, sed quod è Quigon Ormuz delata, deinde in Alexandriam exportetur, ex quazandem & Italiæ & Galliæ communicatur. *Hac ille.*

At nos non vidimus vllam hætenus in Officiis Germaniæ, Galliæ & Italiæ Tutiam præter Cadmiam Botryitem: De Tabaxir Arabum quod male Spodium dixerunt, & de Antispodiis irademus lib. 3. post Salices.

Cuminum.
Goan arbor.
Goan fru.
Bot.
Tutia Alex.
andrina.

Cadmia
Botrytes.
Tabaxir
Arab.

ARBOR GEHVPH SIVE COBBAN.

CAP. XCIII.



Descriptio **A**lit Tapro-
bana insula
hodie Sumatra
nuncupata, ar-
boream admiran-
te facultatis, ve-
fert Theneus,
quæ illic Gehvph,
in India Cobban
dicitur. Folius est
parvus, quemad-
modum & arbor
quæ siliquam ca-
tharticam fert,
ramis breviori-
bus, cortice fla-
vescente siue cro-
ceo, fructu cras-
sifusculo & ro-
tundo pilæ luso-
rix instar, in quo
Nux Auellanae

Gehvph.
Cobban.

Fructus
flavescentis
acutissimi.

par coërectur, quæ nucleum includit valde amarum, quilinguæ admodum radicis Angelicæ saporem refert.

Fructus ad sedandam sitim commodissimus. Eo tamen nucleus quamvis amarus longè præstantior: ex eo enim indigenæ oleum eliciunt, seduloque conseruant, quia ad Hepatis & Lienis dolores maximè confert, quibus doloribus eum affliguntur, primò dies aliquot parçissimo vtuntur victu: deinde octo dierum spatio oleum sumunt: quo tempore morbus paulatim minuitur, & tandem curatur. Quod si qui oleum sumere noluerint, veluti pueri & mulierculæ, eo ventriculum, spinam dorsæ & latera, inungunt. Idè articularis morbi, cui huius insulæ incolæ valde obnoxii sunt, summum est remedium.

Visus
Oleum.

Inunctio
Arthritidis.

Ex eadem arbore gummi manat utilissimum. Ex eo enim cum mediocri oleo supradicto dissoluto, cataplasmata conficiunt quæ pellibus illiunt, & partibus laborantibus applicant. Hanc arborem diligenter propè ædes suas, & in hortis colunt.

Gummi.

Cataplasma.


FRUCTVS ORBICVLARIS, CRASSI COR-
TICIS, TVBERCVLOS, NIGRI COLORIS.

CAP. XCIV.


APetro Gareto, inquit Clus. Exot. lib. 2. c. 14. nullus fructus orbicularis propemodum, bi-

Descriptio

Et



I



II

ferat. coniecturam faciebam. Icon in tabula habetur supra n^o. I.

FRUCTVS MULTIFARIAM FISSVS

CAP. XCV.



Descriptio Inter fructus peregrinos, quos adferebat Gener Cherlerus rediens ex Anglia & Belgio erat fructus ferè orbicularis totus, nisi vtrique parte esset nonnihil compressus, finditur circiter in duodecim partes, quæ fungosæ sunt, laporis manifesti nullius, inest internè ossiculum durum quid autem contineat ignoramus, nodū aperuimus, cortex totius fructus exterior, tenuis fuscus, & cinereus.

Sapor.

Corren

FRUCTVS IND. IVGLANDI SIMILIS, TUBEROSVS.

CAP. XCVI.

Descriptio

Ivglandē pulvinato suo calyce etiamnum intectum equat, perpetuis tuberculis, & longioribus iugis asperatus, ex cinereo rufescens, cuius interuenia tenuis replet cortex fuscus: infimaps umbilicū habet sessilem, opposita modice in conum fastigiatur: durus est & grauis fructus. Illustriss. nostro Principi à quo accepimus misit D. Paludanus nomine Indici fructus peregrini.

FRUCTVS IND. OVALIS, RYGOSVS.

CAP. XCVII.

Descriptio Ovali est figura, vncias ferè duas altus, quinque in ambitu basis colligens, in qua & pediculi vestigium apparet cum circulo penè fusco

Superficie est asperiuscula, & veluti sursum rosea, punctulis albidis, cinereis, ferrugineis varicolori: grauis est, & concussus resonat, nucleum contentum testatus. D. Palud. Illustrissimæ C. V. Wirtemb. peregrini fructus Indici nomine misit: Vidimus præterea Balilez apud D. D. F. Platerum sub titulo Dactyli cum cortice, quod nomen eidem non conuenit. Similem fructum attulit Gener Cherlerus posteaquam Londino rediisset 1606. sine nomine, à Iacobo Gareto datum, uti existimamus, eā est magnitudine, quā nostra icon.

Clus. Exot. lib. 2. c. 25. videtur pingere & describere his verbis. Exoticus fructus primus, secundalis longitudinis, binas [fortè legendum quin]as latus vncias, aut amplior eius ambitus, duro, inæquali, rugosūque cortice constans, fusci coloris, grauidus, hoc est, alium fructum vel ossiculum siue pulpam continens: nam agitur, strepitum edebat: quid verbū contineret, me latebat initio, quia, quum vnicus mihi esset, corrumpere nolebam: sed alium similem postea nactus, aperiebam, & nucleum continere deprehendebam, crassum, eiusdem cum ipso fructu formæ, cauum intus & inanem, substantiā tamen fuscā constantem, & sapore quali uetustæ & rancidæ amygdalæ. Nostra figura eleganter expressa nobis magis aridet, quā Clusii, quæ non correspondet aliis multis in libris suis passim expressis.

Icon cum alia precedenti capite habetur.

FRUCTVS EXOT. OBLONGVS,

ANGVLOSVS CINERACEVS.


CAP. XCVIII.

Descriptio Fructus Exoticus alter, eiusdem erat cum primo (modo dicto) longitudinis & crassitudinis, non quidem in rotunditate oblongus, ut ille, sed angulosus, cortice inæquali & valde fibroso, cineracei foris coloris, internè fusci, leuis, aquedum eā mergebatur, innatans, nucleum continens prorsus rugosum [quia fortè ante maturitatem levis] & substantiæ rufescentis, adstringentisq; laporis. Clus. Exot. lib. 2. c. 25.


Icon habetur cum alia cap. 94. supra n^o. II.

FRUCTVS IND. ECHINATVS, SONORVS

CAP. XCIX.



I



II

Descriptio Inter fructus peregrinos Ill. Principis, Ducis Wirtembergici pie memoriz, erat fructus, magnitudinis circiter nucis moschatæ, coloris cinerei, plurimis abundans tuberculis, obtusis, degustatus videbatur aliquid astringentis habere: pediculus crassus, ligneus, quid contineat, nos latet: sonorus est, non licuit aperire, quia Ill. Principissa sibi reseruauit. Quidam

dam vir doctus adscripserat se putare *Stramoniam*, verum ineptè.

FRUCTVS EXOT. STRAMONIE MODO
TUBERCVLIS OBSITVS.

CAP. C.

Descriptio

Navigatione Iauanà Batani retulerunt, auctore Clusio Exot. lib. 2. cap. 15. fructum sciscuncialis longitudinis, vnciam latum, pauld enim planiore erat formà, colore ex fusco subrubente. Totus tuberculis leuiter mucronatis obsitus, perinde fermè atque *Stramonie* fructus: nucleum autem continebat fusca quadam membrana tectum, oblongiusculum, læuem, spadicei coloris, qui albescentem medullam continebat, sed duram, [quia sicca] & quodammodo insipidam. Huius eicon cum alia cap. præced. habetur.

FRUCTVS PEREGRINVS NOVEM NER-
VIS DISTINCTVS.

CAP. CI.

Descriptio

Non inelegans erat, referente Clusio. Exot. lib. 10. cap. 10. fructus, quem Cl. V. Paludanus mutuò dabat, cuius tamen nomen & ipse ignorabat, & illi à quibus acceperat. Erat verò orbicularis formæ, sex vncias in ambitu crassus, tres longus, ducta à petiolo cui inhaerebat, ad extremum fructum lineà, hoc est, in toto illo ambitu sex vnciarum longitudinem explens, novem nervis à summo ad pediculum semunciam penè longum ductis, distinctus, fusci vel spadicei quodammodo coloris, levis, prægnans tamen, & nucleum vel pulpam ressecatam cum seminibus continens, quia agitated strepitum edebat.

FRUCTVS PEREGRINVS, ORBICVLA-
RIS, NOVEM NERVIS DISTINCTVS,
minor, cum officulo anguloso.

CAP. CII.

Descriptio

Fructus peregrinus, inquit Clusius: ære meo cum plerisque aliis exoticis redemptus erat quoque orbicularis formæ, novem similiter nervis à summo ad petiolum distinctus, ut iam descriptus, minoribus tamen neque adeò eminentibus, longè etiam minor: nam trium duntaxat vnciarum quaquaversum erat eius ambitus, nec strepitum ullum edebat agitated, quia maturitatem forsitan nondum adeptus, & levis ut alter: hunc aperiebam, & in eo multam pulpam cortici adhærentem inueniebam, cum officulo valde inæquali, & totidem angulis, quot fructus nervos habebat, ad summum corticem pertingentibus distinctum, cui sanè simile officulum nullum videre memini: qualem verò nucleum contineret, ignoro, quia confringere nolui.

FRUCTVS PEREGRINVS ORBICVLARIS,
SENI NERVIS DISTINCTVS.

CAP. CIII.

Descriptio

Fructus Clusio prorsus orbicularis figuræ, sed senis duntaxat nervis distinctus ab infimà se-
Tom. I.

de ad extremum vsque per longitudinem recta lineà excurrentibus, sciscunciam longus & crassus, fusci coloris, aliqua tamen ex parte cineracei, nucleum vel pulpam à cortice seunctam, & liberam continens: levis tamen erat, & aqua merfus, innatabat. Hunc ex Guinea acceptum Paludanus etiam concedebat ut describerem, quo nomine appellaretur ignarus.

FRUCTVS PEREG. EXIGVVS, ORBICV-
LARIS CVM SEX NERVIS.


CAP. CIII.



III



I



Fructus peregrinus, quem Petrus Garetus misit Clusio, à quo pingitur & describitur Exot. lib. 2. c. 14. valde exiguus & orbicularis penè formæ, vix semuncialis longitudinis, laui cortice prælitus, & sex quali æreus eminentioribus à pediculo ad summum caput æqualiter distantes spatio excurrentibus, distinctus, fusci coloris: quid verò conti-

neret, me fugit, quia agitated & commotus nullum strepitum edebat, & quia vnicus, cor fringere nolebam. Huius iconem exhibet in hac tabella numerus III.

FRUCTVS GUYANENSIS, OVALIS, CINE-
RACEVS.

CAP. CV.

Fructus peregrinus Clusio Exot. lib. 2. c. 6. anno 1598. Secundus ex Guyana delatus, valde solidus & grauis erat, ovalis formæ, penè binas vncias à pediculo ad extremum mucronem longus, tres cum semisse medi corporis ambitu completens, corio denso, fibroso, cineracei ex fusco coloris, tectus, ambiente putamen crassum admodum, durum, & nigricans, quod nucleum continebat ferè orbicularem, durum, cineracei penè coloris. Figura est in præcedenti tabula sub num. I.

NVCLEVS EX GUYANA SPADICEI CO-
LORIS MEMBRANA TECTVS.

CAP. CVI.

Tertius ex Guyana fructus allatus, ut ait Clusius, quem Garetus mittebat, cuius icon, in præcedenti tabella, pauld longior erat ovali: nam duarum vnciarum longitudinem superabat, non adeò tamen crassus ut superior, & magis inæqualis, ut verius dici mereretur nucleus alicuius fructus quàm fructus, spadicei coloris membrana

Eg. 2

Descriptio

Descriptio

batur sibi de toto corpore carnes detrahi : quartus vociferabatur ingentem nauem in suo cubili fabricari: quintus etiam in sua sponda iacens, quatuor aut quina vasa confringebat, dicens, multos humunculos istuc adesse qui eius spondam occupare conarentur : sextus naucletū compellans, videlicet, inquit, diabolum in rostro navis sedentem & pisces captantem? septimus affirmabat se per navis alium anchoras in imo maris fixas conspiceret: nostri Naucleti filiolus ad patrem accedens, chare pater, inquit, plurimos homunculos per tuum nasum cursitantes video: sic ut ipse pater cum quodam metu admiraretur: quibus porro somno indulgere licebat, statim istarum rerum imagines evanescebant, nec desuerunt, qui per triginta sex horarum spatium, imò per integrum biduum dormierunt: fuerunt etiam qui alui profluvio correpti sunt. Eiusmodi & pleræque aliarum imaginum iis contigerunt, qui naue Amstelredamum appellata vehebantur, quas nimis longum esset referre: Inter reliquos autem nautas, Anglus quidam, in cælum suspiciens, illud apertum se videre affirmabat, atque voce inclamabat, O Domine te lubes sequor, variisque suis gestibus, risum omnibus qui circa ipsum erant mouebat: nihilominus semper in cælum suspiciens progrediebatur, ut parū abesset, quin in mare prolaberetur, nisi qui ipsi astabant, detinuisent. Hastenus Cuelenerus. Quæ cum ita sint, mirari necesse est unius eiusdem fructus manducationem, tot tamque varias imagines, in hominum cerebro potuisse parere.

FRUCTVS DYSENTERICVS FLAVVS.

CAP. LXVI.

Descriptio Prouenit in India, autore Monarde, fructus Dysenteriam sanans, delatus ex Quito, qui videtur esse vastæ arboris, altera parte laevis, flavus, altera asper, coloratissimus, ac veluti pullus. Ceterum qualis esset fructus, cuiusve arboris, nunquam peruestigare licuit. Clus. in versione sua vocat fructum Dysentericum: Hist. Lugd. Fructum & Corticem ad Dysent. Monard.

In pollinem tenuissimum redactus, & cum aq. capitum rosarum manè & vespere exhibitus, dysenterico fluxu miserè afflictum breui sanitati restituit, indicante Indo, qui lapideus expertus erat in aliis.

FRUCTVS PEREG. TUBEROSVS MAIOR CLVS.

CAP. LXVII.

Descriptio Alicuius fructus ossiculum sphaerica penè figura, cuius magnitudo penè vncialis, putamen crassum admodum & durum, perpetuis tuberculis vndique oblitum: coloris flavescentis, linea eminentiore transversum secante, quam, ut in Iuglandibus, putaminum coniunctionem & commissuram esse arbitror. Clus. libello peregr. & Exot. lib. 2. cap. 31.

Iconem autem dedimus autè cum alia cap. 50.

FRUCTVS IND. GRANVLOSVS VEL TUBEROSVS MINOR.


Descriptio Inter Pipera interdum reperitur fructus, quales duos habemus, alterum Bruni parui serotini magnitudine, alterum dimidio minorem: lapideæ & inuictæ ferè duritiei: forma utique olivaris ferè, color rutilus: superficies externa granulis omni-genis asperata: ab umbilico modicè caua ad oppositam partem leuiter elatam, inter prærupta veluti scopulorum quinque decurrunt rectæ lineæ in minore, in maiore duæ duntaxat conspiciuntur.

Clus. de fructibus peregrinis & Exot. lib. 2. cap. 30. quantum facit, nostro iudicio, quem sic detestabit. Alicuius fructus ossiculum forma planè sphaerica est, magnitudo globuli minoris sclopi, putamen flavescentis coloris, & perpetuis tuberculis, at non adeò crassis, oblitum, nullaque linea cinctum. Ex nostris fructibus depicti sunt.

Icon etiam habetur autè cum alia cap. 50.

NVCVLA EX GVINEA.

CAP. LXVIII.



Descriptio Nuclea Myristi-
Nec ferè magnitudine & forma, levis, concussa sonum edens, cuius alter finis styli quid simile habet, ex quatuor parvis sulcis siue eminentibus procedens, oppositus verò serobiculum, unde avulsus videtur pediculus, unde radii recti producantur: cortice mediocriter laevi subrufo testus, quo abrado subest albus durus qualis in Nuce moschata: huic subest alius

crassior, spadiceus, fungosus, politus: nucleum ambit immediatè quartus pertinaciter adherens, pelliculæ tenuis instar, rugosus, spadiceus quoque, ipse verò nucleus amplius, candidus, piguis, gustu dulci cum fastidioso quodam sapore. Primò accepimus munere Ill. E. C. Wirt. cui miserat D. Paludanus, qui postea etiam nobis communicavit nomine Nucularum ex Guinea. Prior cum extimo putamine ex Ill. E. C. fructu depictus fuit, quem sationi destinant: posteriores ex nostris.

NVX IND. ALIA.

CAP. LXIX.

Descriptio Minor est Iuglande, latitudine vnciali, paulloque longior, colore pullo obsoleto, fuscis maculis consperso. Desinit in brevissimum acumen, qua parte quinque parva esse videtur. Parte opposita pediculi pars adhæret lignea prorsus, firma



de Glande vnguentaria, quæ Nux odorata fide Moschata vulgò Veteribus incognita, vt existimat & annotat Hermol. Cornar. com. in Gal. c. 1. l. 1. de comp. med. secundum loca *βάλανος αινουή* Critonem eo loco dicere existimat, quam mox sequi pharagou *βάλανος αινουή* appellat, quamque glandem vnguentariam Latini, Myrobalanum Plin. vocat Aegyptiam autem dici patria appellatione, vbi & *μυροβάλανος* nasci affirmat, & *μυροβάλανος* dictam, hoc est, Palmæ glandem: vnde et-
 tor vtique committi potest, vt altera pro altera sumi possit, à quo errore neque Plinius immunis fuit, nisi error Librario imputandus, qui lib. 23. c. 5. pro Phœnicobalano Myrobalanum substituit: quanquam idem Plin. lib. 12. cap. 21. vbi ait: Myrobalano in vnguentis similem proximūque vsum habet Palma in Aegypto, quæ vocatur adiplos, viridis, colore Mali cotonei, nullo intus ligno, &c. videatur planè Phœnicobalanum cum Myrobalano confundere, quum tamen res sint diuersissimæ, & Palmæ succus in Vnguenta com-
 mibus nequaquam exprimitur. Quare quod Diosc. de Palmæ fructu dixit *παρυσίον τῆς φράξας μυροβάλανος*: Plinius in vnguentis similem proximūque vsum habere ait, eū Diosc. id non velit, sed *παρυσίον* de aliqua figuræ similitudine dicat, non de vso in re medica ac vnguentis. Imò planè alias vires Palmulis, quæ & Daſyli hodie vocantur, & Diosc. & Gal. adscribunt, quā Myrobalano siue glandi vnguentariæ, vt ex suo patebit loco. Idem doctiss. Dalech. apud Plin. legendum censuit, Myrobalano vnguentariæ similem proximūque figuram habet, ex cit. Diosc. l. c. tione, quā similitudinem Plin. ad vnguenta negligenter fecit.

Myrobalanum verò Arab. à Diosc. dictam, non esse aliam, quā *βάλανος* de Lib. ab eodem lib. 4. descriptam, vel hanc patere potest, quòd nulli speciatim Myrobalanum describit, sicut neque Gal. neque Aëtius, neque Paul. minime reli-
 cti, si diuersa ab illa esset. Quare certum esse, penitus sibi persuadet Cordus, Myrobalanum Græcorum Medicorum, nihil aliud esse, quā *βάλανος αινουή* ab eisdem dictam: quod ipsum & Aëtius conceptis declarat verbis, cum ait: *ἀλλ' ἡ δὲ μυροβάλανος ὁ βάλανος ὁ αἰνουή*, vt pluribus declarat diligentissimus Cordus.

Hanc eandem sententiam non solum secutus est Lacuna, sed & in magno errore versari scribit eos, qui putant eiusdem generis esse Myrobalanos Arabum seu Officinarum cum Glande vnguentaria.

Arabes *Ben* vocant. Sic enim legimus apud Serap. *Habben*, id est, granum *Ben*. Et Auicenn. *Ben* est granum maius Cicere, albidum, cui medulla lenis & vinctuosa. Et Hali Abbas: *Ben* per simplex est, inquit, & sine h, est fructus cuiusdam arboris, similis Myricæ, teste Diosc. &c. Audet tamen Tagantius scribere *Ben*, *Been*, vel *Beben* nomina esse Barbara, Arabibus Balanum Myreplicam denotantia. Idem Mesuem taxat, quòd *Ben* antiquum melius dixerit recent. Sed ipse met potius taxandus videtur, qui Mesuei mentem non intellexerit, de qua antè diximus: Mesues nostro iudicio præfert in vso medico antiquum *Ben*, quia in eo consumptus humor quidam, siue serum acre ac malignum, quale obseruamus admixtum oleo, cum recens exprimitur. Eundem in modum Afari etiam radices & folia violenter purgant per infusoria & superiora, vbi virent, propter tale aliquod serum: si existant, amittunt vim illam malignam & vehementem. Quod idem quoque &

uenit Indi, quæ virens vrit & purgat violenter: Exsiccata non item.

Ceterum Olei expressi magma residuum, vt annotat Syllu. videtur esse *μυροβάλανος πημα*, id est expressum, quod cataplasmatibus miscet Gal. lib. 11. & 13. Meth. & bis lib. 9. comp. ph. par. splenicis remediis adhiberi scribit Gal. Quo in loco *μυροβάλανος* tantum, aliquando *βάλανος αινουή* leges: aliquando *μυροβάλανος αινουή*, id est, farina & puluis, & *μυροβάλανος λίπωμα*, id est, putamen & cortex & *μυροβάλανος λίπωμα निकομήδης ἢ πορσεύς*, id est, Myrobalani testæ & cortices incili & tusi cribra-
 tique. Omnia hæc ad splenicis scribuntur, vt sit credibile maximè de fructu eodem, scilicet Balano Myreplicæ, & eius partibus omnia hæc intelli-
 gi.

Matth. examinandum proponit, an Lilac dicta arbor sit ea, quæ glandem vnguentariam fert. Idem Theophr. reprehendit, quod è putamine fructus oleum elici tradat: Plinium addens & Theophr. & Diosc. sententiam comprobare. Verumtamen hac ætate ab omnibus tantum è nucleis à putaminibus repurgatis exprimi. Nec se credere ex solis putaminibus, vel fortissimo pressio pressis quicquam effluere, maximè cum hanc parandi rationem Diosc. prætermiserit, non solum cap. de glande vnguentaria, sed etiam libro primo, vbi tamen de Oleis & Vnguentis conficiendis latius differuit.

Idem Manardum notat, quòd dubitat, an Vnguentariæ glandis oleum è nucleo, an è putamine exprimi debeat, Galenum tamen, qui eam hanc abundè enucleauit, constanter asseuerasse, Balanum oleum vnguentariis ex carne nucleorum, non ex putaminibus exprimi. Id quod etiam facile ex Diosc. colligi possit, cum dicat consimili modo fieri Balaninum & Amygdalinum. Tandem & in eam cadit suspiciōem Theophr. locum esse deprauatum, aut minùs integros aut veraces fuisse authores, à quibus fortassis Vnguentariæ glandis historiam acceperit. Sed de hac re abundè iam priùs actum, vt ex quibus hæc & similis omnis difficultas de hac se facile vel tolli, vel explicari possit.

Andreas Marinus, inquit idem Matth. Medicus non vulgaris, in suis super Mesuem annotationibus, plantam quandam pingit pro vnguentaria glande, à Cl. Pet. Ant. Michaelio Parritio Veneto acceptam, quæ à præscriptis omnibus tota facie differt: sed an legitima sit, cur probeat aut improbet, non habere. Titulum eius mendacem esse: siquidem *Ben* album inscriptum habeat. Itaque verendum ne & ipsa quoque imago tituli sequatur errorem.

Idem in post. com. cum magnis fig. addit. Plantam cuius imaginem damus, Constantinopoli allata est, sub nomine Lilac. Eam cum inspexissem & fructus eius agnoscerem, Pistaciorum faciem perquam bellè referte, illicò in suspiciōem veni (inquit) an hæc fortassis glans vnguentaria dici posset. Ast mehercle Lilac fructus nihil habere nobis videtur, quod sit simile Pistacis, vt clariùs patebit suo loco.

Amatus glandem vnguent. Pistachiis similem facit, non malè, si cortice extimo spoliata sit, quamuis minor sit, & forma triquetra.

Potè observatiōe digna sunt Bellonii verba, in hunc modum scribentis. In Arabia ad pagum Pharagou dictum, conscendimus rupes, vbi inuenimus arbores Balani Myreplicæ, prouenientes ad altitudinem Betulæ inter rupes, cuius rami etiam similes, truncus albus est, ita vt è longinquo

Peter's

Café de la

Levin, Inc.

Lonic. Granum Ben, seu Glandem Vnguentariam, Nuculam triangularem vocat arboris similis Tamarisco: satis quidem temerè, quamvis corruptæ Dioscor. lectioni eius sententia inniti videatur. Nam cur non potius dixerit Myrti similis cum Theophrast. quæ ita audacter pronunciare audeat de arbore nec sibi visa aut cognita, nec de qua consentiant auctores? Eandem censuram meretur Tabern. qui idem facit. Sed dubitationem hanc tollit Io. Pona in descriptione Montis Baldi, proponens effigiem plantæ cum radicibus & foliis cui hunc titulum fecit: Leon legitima Glandis Vnguentariæ, &c.

C. Bauh. apud Marthiol. pollicetur se folia aliquando exhibiturum, qualia ex Alexandria adferantur nobis hactenus non visa.

Synonyma
Legebat

Βάσας: Βάλαος μιντλιν: η εὐμιντλιν εὐλ. α. α. α.
μιντλιν α. α. α., εὐλιν α. α. α. Archig. Ben Arab.
Maurit. atque etiam Offic. Glans Vnguentaria &
Myrsina Herbariis: Vnguentaria, Cathartica sili-
quata Aduers. Nucula Vnguentaria aliis: Glans Ae-
gyptia Plin. & fortè etiam Hipp. Myrobalanus
Graecorum: Germ. frembde Haselnüßlin/Salbe-
nüßlin. Belg. Myrobalan; teste Had. Jun. 1c.
Glanda Vnguentaria. Hist. Anciana de la India, Tar-
taro & Maia.

Differen-
tial.
Major.
Minor.

Sunt qui duas species faciant Nucis Vnguentariæ, vt Lacuna: Maiorem, magnitudine Anellæ, cortice fragili, cinereo, triplici costa, medulla alba, tenera, oleaginosa, acricum leui amaro: Minorè ciceris magnit. cortice adnigrum accedente, medulla ingrata, quam perniciosam existimati ait: maiorem solam esse in vsu. Scribit tamen Monardes ex Ben paruo Ciceris magnitudine Italos odoratum oleum exprimere: fortè omnes indifferenter intelligens. Sunt nobis quidem, vt in nostra descriptione notauimus, Balani seu glandes vnguentariæ diuersæ magnitudine, omnes tamen triangulares sunt. eas verò qualitatibus aut viribus vix diuersas putamus: sapore partim subdulci, partim subamato: quod & Cordus statuit. Superius locum citauimus ex Mesue, vbi magnas & paruas facit, hasque vitiosas dicit, vbi & de dele & u dictum, & postea in viribus non obscure patebit, valentiores paruas efficacioresque esse. Considerent tamen naturæ consulti & diligentes. Sepiasarii an Mes. & Lac. de alia quadam diuersa intelligant.

Dele&ins.

Superius aliquid traditum de modo parandi hoc
oleum, quemadmodum & de decotto. Ominino

apud ex nostris deligenda candida, bene magis
plena, album: minutè rugosum aut flavum nucleis
continentes.

Paratur autem Ol. Balaninum confusis & totis
nucleis, addita aqua Rosarum, ut annotat Lonic.
Sed hoc loco difficultas oritur ex Paulo, qui sic
tradit: lib. 7. *ἐν τῷ ἑξῆς ἀπὸ τοῦ παραφραστῆς τοῦ ἀπὸ
ἀμυγδαλῶν γίνεται, ἀπὸ τῆς τοῦ δρυὸς βελάνου.* Quid
est Quernis ne fiat glandibus oleum Balaninum, in
modum Amygdalini, uti verba sonant?

Lonicerus minus credulus hunc locum citans,
conquiescit. Ast nobis merito, nostrum quidem
iudicio Corn. Pauli codices corruptos dicit, quod
nullum oleum è Quernis glandibus exprimi so-
leat. Legendum igitur: *ἰνὴν τῆς ἀπὸ τῆς κοινῆς δρυ-
ὸς ἐλαίου ἀπὸ τῆς κοινῆς ἀπὸ τῆς κοινῆς ἐλαίου*: ex
quibus & Aetius parare docet, [& ipse quoque
Paulus disertè lib. 8.] qui & ipse Balsamum appel-
lat: alii oleum de Nuce seu Glande Unguentaria.
Ol. Myrsiticum. Hisp. *Azeite de Aulbana de La
India*. It. *Olio di Ben*. Dioscor. simpliciter ait,
similiter parari ut Amygdalinum, cuius parand-
i modum suo docuimus loco.

Dicta iam supra quædam de locis restant & hæc dicenda. In Arabia prope Pharagou, in itinere à Cairo ad Montem Sinai nascitur, autore Bellonio. Adfertur verò ex Syria & Aegypto in Europam, atque illuc putat Matthioli. ex Arabia aduehi, & fortè etiam adhuc ex Aethiopia, vbi ait Dioscor. nasci. Eodem tradente in Hispania frequentissima gignitur: adferturque hodiè copiosa in Italiam. Et in post. consulat. Glans vnguentaria, inquit, in quibusdam Hispaniæ locis (vt audio) copiosa provenit. Videt vt mitiget prius delictum? Vt audio, ait: at prius simpliciter & nulla circuitione, vbi in Hispania frequentissimam gigni tradiderat. Eandem nunc Pharmacopœi atque Matthioli. more suo fidentes quærant & colligant in Hispania Balanum Myrsicam, vel si lubeat etiam Balileæ aut Montbelgardi vbi indubiè inuenient Matthioli. Balanum myrsicam. at sciant interim: nunquam expressuros se oleum. Amaturn: si consulant, non ibunt in Hispaniam, vbi nasci negat: sed in Indiam, vnde ait in Hispaniam importari, si modò verum dicat. Aliter enim sentit Bellon. & ipse adeò Matth. in post. suis comment. Garcias profectò, qui diligentissimè de Indicis scripsit, Balanum myrsicam non tradit inter Indicas plantas nec quisquâ Veterum (quod sciamus) meminit eam in India nasci. Galat ex Barbarica regione adfert,

Glans vnguentaria, autore Dioscor. trita, & ex
posca drach. pondere pota, Lienem absumit.
Quin & eadem vlceri cum Lolifarina, itemque
podagricis cum aqua mulsâ imponitur. Cum ace-
to cocta, phorâ & lepram exterit: cum nitro,
vitilignes & cicatrices nigras emendat: & cum
lorio lentigines & varos, maculas à Solis ardore
contractas & papulas in facie tollit. Vomitiones
autem monet, aluumque soloit cum hydromelite:
sed valdè stomacho aduersatur. Oleum quod ex ea
exprimitur, aluum potu subducit: at cortex eius
magis astringit. Cæterum quod ex ea tusa expres-
sâque reliquum est, quasi recrementum seu ma-
gma, smegmatis immiscetur, quæ ad scabritias &
prurignes accommodantur. Ipsum etiam oleum
vim habet extergendi maculas, lentigines, varos
& cicatricum nigritias. Purgat idem aluum, sed
stomacho quoque aduersatur. Contra dolores au-
rium sonos atque tinnitus auxilio est cum anseri-
no adipe infusum. Cæterum obseruatione indi-
get quod Dioscor. ait seq. cap. Oleum sesamium
& Caryinum (è nucibus) eandem vim obtinere

Model per
randa.

*Lonic. mac-
P. m. m. m. m.
fig.*

Olei Symp-
nyum.

Locus

Wash. rep.
prob.

466 22

Vires & *
Sux.
Defir.
Lutu.
Podagrac.
Pfor. La
pra.
Visiliga.
Lentigo.
Vari.
Parala.
Vamcorib.
Pargame.
Oleum.
Cortex.
Magma.
Scaberrim.
Pungo.

Transmittal
by date.

cum balanino, quod nobis quidem nemo facile persuadetur: hoc ex *diapentha* & *diapentha* manifestam & efficacem habet, illa aut nullam aut certe oblectam, & quæ fortè simplicissimi olei oluarum vires non transcendat, quamvis altero pro altero vsum fuisse non magna consequi possit noxa.

Temperamentum. Vnguentarii, tradente Gal. videntur carnis eius succo, qui calidus est. Reliquæ autem unde expressus est, vincentem habent qualitatem amaræ. Sed & admixta est quedam adstrictio. Proinde exergentem simul & incidentem contrahentemque & stipantem effectum possident. Itaque (præter iam dictos vñs. quos studio non repetimus) & lecur indurascencia liquant. Drach. pondere cum melicrato caro eorum pota, vomitum mouet: sæpè etiam per inferna aluum largiter subducit. Viscera expurgat. Externis noxis cum aceto admirabiliter debet. Sic efficacius reddetur ad prædictos cutaneos morbos omnes: item ad Exanthemata quæuis alia, achoras, & vlcerosa, & quæcunque crassi sunt succi. Cicatricibus decorem affert. Lienem illinendum cum farina quadam exiccante, ut Erui aut Lolii.

Cortex. Cortex eius admodum adstringit. Itaque ubi adstrictione opus, accommodari potest. Celsus ad lienem sic aptat. Glandis (quam *βελαν* Græci vocant) cortex & nitrum, paribus portionibus contunduntur, respergunturque aceto quàm acerrimo. Vbi Cerati crassitudinem habet, linteo antea in aqua madefacto illinitur, & sic imponitur, supraque farina hordeacea iniicitur: sed manere ibi non amplius sex horis debet, ne Lienem consumat: satiusque est bis aut ter fieri. Specialis, ac vti solet medicè admodum, eiusdem vires *Melancholice* persequitur, sic: calcificat morbum initio ord., siccit 2. Humiditatem habet excrementosam & acrem, qua ventriculum subuertit, nauseam excitat, viscera conturbat. Pituitam crassam & lentam vomitu & deiectione purgat: quare confert colico affectui pituitoso & stultento, sumptus, balano, clystere iniectus, cataplasmate ex ipsius medulla hordei farina & melle appositus, & calore suo nervorum frigidis affectibus, spasmo, tetano, contractioni. Tumores quoque duros, strumas, nodos, resoluunt cum melle. Hepati autem aut Lieni obstructo, vel durato cum farina Lupinorum & spica confert imposita. Ad hæc fructus minor, & eius oleum efficacius admoventur. Idem oleum autem infusum, tinnitui, libilo, surditati auxiliatur: cicatrices scordas, lentiginis, alphas, & cetera cutis vitia emendat. Iracundia enim, tenuat, terget, expurgat, aperit obstructa. Paruus autem ad omnia est valentior, molestè purgat, vires dei cit. sudoremque frigidum mouet. Ob id non vtendus etiam oleo, nisi emplastro, vñctione, cataplasmate. Magnus ne ventriculo noceat, facit assatio. Ea enim humiditatem excrementosam & acrem horum symptomatum causam coquit & resoluit: tuncque solum deiectione purgat. Adduntur præterea ipsi, præsertim coquendo, semen anisi & sceniculi. Ex huius autem ita cocti medulla cum dimidio pondere Amygd. dulcium, & melle vuarum passarum, formæ sunt Auellandarum effigie. Ipsi autem fructus integri, vel potius horum medulla multum erit aromatibus aliquibus, vel anisi aut sceniculi semine adiecto, inuoluntur papyro, & maza: post coquuntur sub cinere calido.

Calica. *Viendi morbi.* *Gari.* *Nervi.* *Spasmi.* *Tumores.* *V. scorum obstructio.*

Sursum. *Qualitates.* *Parus.* *Sursum.* *Camia.*

Trochisci. *Oleum quomodo conficiendum.*

Non absque ratione dubitat Marardus, an vnguentarii glandis oleum conficiendum sit ex fructu, an ex eo, quod cortice obducitur, hoc est, fructus substantia: ex Diosc. namque scriptura ex

nucleo fieri debere colligitur. Nucleus autem & corticem continet, & id tenerum, quod in cortice continetur, quod totum semen verius, quàm fructum dixeris: nam si totum fructum: mirum est, quod à corticibus ita siccis oleum exprimi possit: si tantum ab eo, quod intus est: videtur Dioscor. scripturæ repugnare. Sed dicendum ibi fructum pro eo, quod in semine continetur, accepisse, quod ostendit id, quod subdit: præfetti, quæ facile delibretur: quasi delibratam assumi debere ex hoc significaret. Cui & hodiernus vsus, teste Maranthæ, adstipulatur. Vnguentarii enim ex seminis substantia, non ex toto semine oleum de Been [ita enim glandem vnguentariam appellant] eliciunt. Oleum autem quod ex his extrahitur datur à drach. sem. ad drach. j. & sem. Ben ex sententia Auicennæ fluxum sanguinis narium reprimat sua adstringenti facultate.

Decoctum radices colluendo os confert dolori dentium, Duritiem hepatis ac splenis aufert cum aceto drachm. ii. pond. potum. Sed stomacho noxium, nauseamque facit, aurei pondere cum melicrato haustus succus vehementer vomitum & aluum ciet. Loco eius ponitur tantundem Rubiæ, medium Calicæ lignæ & decima pars Macis. Quæ Auic. verba hæc suprà accipienda. Quod si nota et arbor Ben eiusque radix, cur non describit? & quis ante ipsum has radici tribuit vires? Respiciat Lector ad drach. ii. cum vnica tantum, vel ipsomet teste vehementem vomitum moueat. Diosc. drach. j. tantum præscribit. Maior dosi nobis suspecta. Quale obsecro succedaneum illud? docti iudicent.

Amatus testatur Medicos hodie, qui in India degunt, glandem vnguentariam in potu ad subducendam aluum & prouocandum vomitum ægris propinare.

Vnguentarii oleo vtuntur pro conficiendis odoratissimis vnguentis, in quæ & moschum, antibrum & zibetum addunt pro Chirotheis & manicis, aliisque suffitu perfundendis aut illinendis. Porro præ aliis omnibus oleis hoc potissimum celebrant Vnguentarii, non quod aliqua odoris præstantia commendetur (inodorum enim est, si Matth. credimus) sed quod nunquam verustate rancorem contrahat. Ergo rancoris expers cum sit, omnium aptissimum habetur ad misturas [sic vocant] delictis & lasciuie causa excogitatas. Quandoquidem, si odorata prædicta alio quouis oleo liquecerent in vnguentum, aut quouis alio modo exciperentur, contracto inde nō multo post tempore rancore, [arare enim omne oleum præter Balaninum rancescit] non modò vniuersam odoris suauitatem exuerent, sed etiam putida fetidaque euaderent.

Itali odorato oleo de Ben, quale ad eum vsum studio singulari parant sibi casariam & barbam inungunt [teste Monarde] delictiarum gratia, & iam dudum hic luxus à meretricibus ad scæminas reliquas, & ipsos quoque viros transferri cepit, quasi intersit homini bestie odorem præ se tulisse. Et multi egregiè in hoc gestiunt.

Matthiolus & Amatus alique tradunt nunquam senescere nec rancidum fieri hoc oleum: imò (inquit hic) si oleo Amygd. gutta vna aut altera huius olei adiungatur, illud à corruptione præseruat.

Ben Glans
Vnguentaria
Dosis olei.
Fluxus
Narum
Dolor dentium

Substituendum

Amatus

Camia

Chirotheis
Manicis
Antibrum
Zibetum


Barba fasciata
Senescere
Narum
Scæminas
Præse
mygd.

AUELLANA PURGATRIX NOVI OBRIS.

CAP. LXXV.

Locus

Descript.



NOuo orbe
Nptum in
uento, insula D.
Dominici, ut re-
fert Monardes,
quoddam genus
Auellanarū mi-
sit, quæ colore &
forma nostris
sunt similes, pu-
tamine tenui, co-
loris spadicei,
triangulares, me-
dulla anteriore
alba & dulci, sic
ut multi, dulce-
dine illecti, de-
cepti sint. Clus.
addit: Auellanā,
cuius iconem hic
exhibeo, lentus
& mollis conte-

git cortex, partim ex cinereo candicans, partim
nigricans: hunc sequitur putamen minus solidum,
quàm in vulgaribus Auellanis: id nucleum con-
tinet Auellanae magnitudine candidum, solidum,
Auellanae vulgaris aut Iligneæ, sapore, tenui mem-
brana obductum. Integra aut altera parte sessi-
lis est, & coniunctum binz nasci videntur, ut in-
terdum Castaneæ. Monardes *Auellana purgatrix*
vocat, additque Medicorum vulgus *Ben ma-*
gnum vocare (nam esse duorum generum,) parū
autem esse id de quo præced. cap. egimus, nempe
ex quo oleum conficiatur odoratum. Ben ma-
gnum Hist. Lugd. Nuces purgantes, frōmbde
purgierende Haselnuß Taber.

Ben ma-
gnum.Nucis pur-
gantes.
Vires.Purgant.
Colica.Dosis.
Temperat.

Eodem Monarde teste, his Indi familiariter se
purgant. Postea Hispani necessitate compulsi, il-
lis etiam purgare se coeperunt, non sine vix di-
scrimine. Pituitam & bilem supernè & infernè
purgant. Nonnulli tamen earum vehementiam
assauone instringebant. Coli doloribus præsens
sunt remedium, status discutunt, & Clysteribus
iniecitur, mediocriter euacuant. Dosis est à drach. i.
ad drach. i. sed assandæ sunt. Calidi sunt tempe-
ramenti initio tertii gradus, & sicæ in secundo.

PINEI NUCLEI MALVCANI SIVE
PURGATORII.

CAP. LXXVI.

Descript.

Folia:

Fructus
Auellanae
magnæ.Pineæ Nu-
clei.
Monardi.

Alitur in hortis quibusdam Malabar, tum
etiam in nonnullis syluis spontè nascitur ar-
bor magnitudine Piri, cuius folia infernè diluto
vixore prædita sunt, supernè autem saturo, admo-
dum tenella & mollia, quæ gustata valdè acia
deprehenduntur, & linguam diu vellicant. Fru-
ctus triangularis, Auellanae magnitudine, inte-
rius in multa receptacula distinctus, in quibus se-
men est album, solidum, rotundum Pineo nu-
cleo seu putamine exempto par. A Costa.

Considerandum an eadem sint Pineæ Nu-
culæ catharticae Monardis, quas sic designat. Trā-
migit noua Hispania Pineorum nucleorum ge-



nus, quo Indi se
purgabant; quos
imitati sunt plu-
rimi harum re-
gionum. Nostris
Pineæ nucleis si-
miles sunt, nasce-
tes in arboribus
magnis, quales
sunt Myrsipica
Mutica: molli-
re putamine, &
migiore, quàm
nostris, rotundi,
intus albi, pin-
gues & gustu
dulces.

Pignoli di Ma-
luco, Cananinis
Gepala: Costa. Et
in alia edit: vul-
gō Pinguones de

Synonyma

Gepala.

Maluco, hoc est Pinei nucleis Malucanici, quo no-
mine & Hist. Lugd. habet. An apud eandem Pi-
nei nucleis cathartici Monardis? Et an ex ipse quæ
Pignoli purgatiui & Pinei nucleis purgatori dicū-
tur eidem Monardis?

Eo fructu, autore A Costa, frequenter vtuntur
Indi, cum in curandis quibusdam morbis, tum et-
iam in suis nequiis. Binos Eiusmodi nucleos,
tenui mem. rana quæ illos contegit liberatos te-
runt, & clysteribus vulgaribus admiscunt aduer-
sus Schiaticam & vix difficultatem seu propi-
nant cum g. lina in sculo ad educendos putridos,
lentos, crassosque & frigidos humores & Asthma-
ticos curandos, aduersus quem morbum pluri-
mum commendant & frequenter vtuntur. Ex a-
qua trinis impetigines inunctæ, primum tamen
diligenter confectæ & abraçæ, probè & breui
temporis spatio curantur, sed admodum vrunt, ut
experientia didicit eadem aut. Improbè etiam
mulieres illarum prouinciarum suis maritis pa-
rum æquæ, quatuor grana siue nucleos edendos
præbent, ut eos intermunt. Nuclei pinei ca-
thartici, ut scribit Monardis, pituitam & aquas
validissime purgant: & licet Auellanis mitiores,
attamen vonutum cient, atque ventrem subdu-
cunt. Assi, neque tam valenter, neque cum tan-
tis torsionibus purgant. Dantur in diuturnis
morbis, & peculiari quadam facultate crassos hu-
mores expellunt. Quinque aut sex tris & vino
diluti, dantur pro virum robore, præparato prius
conuenientibus Syrupis humore, qui euacuan-
dus est, & obferuata, quæ decet, victus ratione.
Etenim qui eis vtetur, illum obferuare oportet,
quæ ab his obferuari solent, quibus purgans me-
dicamentum propinatum est.

Vires &
ViresSchiatrica
vix dif-
ficilis.

Impetigo.

Purgant.
Purgant.

Calidi in tertio, & sicci in secundo, pinguedine
tamen quadam præditi, quæ siccitatem nonnulli
imminuit.

Cautio.

Quibus obtingent Pinei nucleis Malucani A-
Costæ, vel Pinei nucleis cathartici Monardis. siue di-
uersi, siue iidem sint, non temerè exhibeant æ-
gris: siquidem, ut refert A Costa, grana quatuor in-
terimunt, & admodum vrunt. Monard.

verò ad euacuandum quin-
que aut sex exhibet.

BERE

BERETINVS FRVCTVS.

CAP. LXXVII.

Descriptio
arboris.

IN Cancrium insula celsissimas inuenerunt ar-
bores, Quercu maiores, foliis Laurinis, crassis,

splendentibus,
& minime in
ambitu serratis,
quæ oblongius-
culum fructum
ferunt, exiguis
iligneis glandi-
bus similem, nul-
lo tamen calyce,
vt ipsi referunt,
inclusum, cortice
tenui cinereo,
interdum atro,
rectum, nucleum
continentem ob-
longiusculum,
candidum, nullo
[cùm induruit]
manifesto sapore
præditum, tenui
membrana re-
ctum. Similibus
arboribus abun-

Fructus.



Locus.

dat Beretina insula illi vicina, ad quam postea de-
lati sunt: à cuius incolis illarum arborum fructum,
quem prius non attingerant, edulem esse didice-
runt. Eo deinde more leguminum delixo, aut in
farinam contuso, & pulvis modo cocto & inspi-
sato, alterius cibi penuria, cùm in ea insula, tum in
naui famem subleuarunt. Eam arborem etiam a-
lunt omnes Moluccæ insulæ. Clus. qui sibi hunc
fructum à Cancellariæ Londinensis Prænicerio
communicatum fuisse, tradit.

Causa.

An Beretina
fructus fru-
ctus.

Est & nobis quidam fructus ex liberali Illustr.
Ducis VVirttemberg. cuius figura serè Corni est
minoris, nempe oblongus, ouatus serè, cortice
tectus tenui, flauescens, & vngue haud diffi-
cile separabili. Substantia intus albicat vt Da-
ctylorum, sed firmitudine inferior, & cultello se-
ciliis, nullo gustu manifesto. Summa apex paruas
& niger occupat: Ima adhesionis vestigium. Vi-
detur autem nucleus quidam esse aliquo cortice
tectus, quo nunc exutum habemus, nec suspicio-
ne caret, esse fortè Beretini iam descripti, de quo
tamen nihil certi nobis adhuc constat.

GLANDI ILIGNEÆ QUODAMMODO
SIMILIS FRVCTVS, CORTICE
fragili.

Descriptio

EX fructibus peregrinis Ill. C. Wirt. 6. an. 1680.
Stutgardiz offerebatur parvus fructus, par-
uam glandem iligneam quodammodo expri-
mens formâ & serè colore: cortex tenuis & fra-
gilis, subest alter tenuis, flauescens: nucleus al-
bus, durus. Conferendus est hic fructus cum Be-
retino, similis enim videtur.

FRVCTVS INDICVS, VILLOSVS,
PARVVS.

CAP. LXXVIII.

Descriptio

Inter fructus exoticos seu peregrinos Illustriss.
Celsus VVirttemberg. p. m. 1608. repertus vnus



II



magnitudine æ-
uellanz vulgaris,
constans tunicâ
villosâ, substa-
tis: cortice tene-
ro, vna parte ni-
gricante. Qua-
lis fuerit intus
nucleus, nos la-
tet, quia casus
corruptus.

NVX, PONTICAE NVCI NON VALDE
ASSIMILIS, SPADICEI COLORIS.

CAP. LXXIX.

A Mistelredami, inquit Clusius Exot. lib. 2. c. 16. Descriptio
accipiebam ab ornâtissimo viro Henrico-
van os / eius vrbs ciue, Nucem spadicei coloris,
Ponticæ nuci non valde ablimilem, vnciam lon-
gam, eius ambitus vnciâ paulò maior, sessili siue
infimâ parte angustior, extimâ crassior, & veluti
decussatione formata, dura, solida, nec vllò motu
strepitum edens: an aliquo calyce excepta fue-
rit, glandis aut auellanz instar, me latet, nec is
sciebat qui illam mihi donabat: nam inter aro-
mata illo anno adnecta fuerat. Huius iconem
cum præcedenti damus.

NVCVLA INDICA, CORTICE TENERO,
FORTE BERETINI FRVCTVS.

CAP. LXXX.

A Me visus inter fructus peregrinos Ill. Celsi. Descriptio
VVirt. Stutg. 1608. vnus fuscus, parus oliuæ
magnitudine, vnâ parte, vbi adhæsit, latiuscula,
alterâ in acumen delinente, in quo parus costæ
sex numerantur, rectæ non obliquæ: distinctus,
sonorus est: cortex cedit vngue compressus: In
hac tabella numerus primus, primam: secundus,
alteram, & tertius tertiam denotat nuculam.

NVCVLA INDICA ALTERA COMPRES-
SA, CORTICE DVRO, COLORIS
castaneæ, sonora.

EX fructibus peregrinis Ill. C. VVirt. p. m. Stutg. Descriptio
1608. vnus erat longitudinis vnguis, nuclei
pari Pruni quodammodo dosimilis, sublongus, eâ
magnitudine, qua pictus, compressus, costis in
vno latere constans, coloris penè castaneæ, luci-
dus, sonorus, duz facies sunt depictæ.

NVCVLA INDICA TERTIA SPLENDI-
DIOR.


Hic fructus idem fortè cum præcedenti, color Descriptio
penè idem, nisi dilutior & splendidior, magis

etiam compressus & latior, potissimum vna parte: est etiam sonorus, duæ facies pinguntur.

**FRUCTVS INDICVS, OVI PARVI
FERE FORMA.**

CAP. LXXXI.

Descriptio



EX fructibus peregrinis Ill. Ill. Cels. Wirt. p. m. 1608. Stutgardia, parvus fructus, formâ ferè parui aui & iconis magnitudine, coloris quodammodo castaneæ, sed dilutionis, splendens, duæ facies exprimuntur, circulus ambiter ferè totum, qui non splendet, quid continuerit nescio, erat in utraque parte foratus.

**NVCVLA SVBLONGA, VEL OS
FRUCTVS ALICVIVS INDICI.**

CAP. LXXXII.

Descriptio

EX fructibus peregrinis Ill. E. C. Wirt. 1608. Nucula vel, os alicuius fructus Indici, vnciam longa, vnciam semis circiter lata, rotunda, fusci coloris, vna parte latior, lignosa, caua: in ea nucleus cortice tenui tectus, qui fuscus, intus filiosus, durus, albus & sapore manifesto destitutus. Nucula hæc in priori tabula expressa.

**NVCVLA TRIANGVLARIS, INDICA,
CASTANELLE FERE FACIE.**

CAP. LXXXIII.

Descriptio

Innata aspectu, nucula sessilis, triangula, pisi maiori haud maior, inter angulos compressa, ex vno latere commissura nigricante insignita, colore subfusco, in solum quasi ex spadiceo in cinereum vergit. Concussa non strepitat, ut quid intus laquet nos lateat, sed circulum perelegante æ nuculæ concolorem, parte sessili innatum vel pignus eratum (ham linea elevatior & nonnulli splendens) intersecat commissuræ linea prædicta. Ex obs. Cherlen.

NVCVLA IND. OVATA FERE.

CAP. LXXXIV.

Descriptio

Nisi utrinque acumen quoddam extaret, ovata esset figura. Longitudo vncialis, latitudo media: colore inter fuscum & pullum medio, maculis dilutionibus picturato. Costis quibusdam eminentibus, quales in Nuce ynguentaria Sep

dicta, insignita. Nucleus intus latet albus vter leniter ad aperto fructu deprehendimus, quem corrumpere non debuimus, ut integer terræ committere posset ab Ill. Ducissa Wirt. quæ aspectus & picturæ usuram concessit.

NVCVLA QVÆDAM, AFRICANA.

CAP. LXXXV.

Fructus peregrinus Cuius, notis Anellanz Descriptio magnitudine & eiusdem colore, putamine puro, veluti in duas partes diviso nucleus intus continens. Similes aliquando Granaræ in Hispaniis accepit idem ex Africa [El pennon de Velez arce ab Hispanis occupata] delatos, nucleus continentes album, dulcem, quos ad ynguentariæ Nuclei genus aliquod referendos existimabat. Huius icon est cum Fr. Amygdaloide nitido peregrino.

**OSSICVLVM SVLCATVM FRUCTVS
PEREGRINI.**

CAP. LXXXVI.

Alicuius fructus Indici ossiculum esse videtur. Figura ovata est, utrinque extremorum acuminatum, per longitudinem profundè satis sulcatum, colore pullo. Visum & depictum apud Ill. Ducissam V. Vitemb. &c.


Icon habetur cum aliis huius libri cap. 33.

OSSICVLVM TAMARINDI ADMIXTVM.

CAP. LXXXVII.

Ex prima navigatione Batavorum relatâ Clus. Descriptio ut videre est Exot. lib. 2. cap. 15. ossiculum cuiusdam fructus, vncialis ferè longitudinis, semuncialis crassitudinis, lœvi spadiceique coloris putamine tectum, superne quodammodo cristato, & coloris albi, atque paulo infra conumillum ad latus vestigio apparente, quo suo fructui inhaerarat. Inter aromata ferunt reperitum cum Tamarindorum seminibus & aliis quisquiliis, quæ sæpenumero us commisceri solent.

**FRUCTVS EXOTICI OSSICVLVM ALIVD.
CAP. LXXXVIII.**



Videtur & Descriptio hoc peregrini cuiusdam fructus ossiculū esse: semunciam longum, nucleo Pini ferè figuræ par, ambitu tenui obiter turbato, durum, politum, lœve. Colore rufescente, maculis quibusdam albicantibus aspersum. Visum & pictum apud Ill. E. C.

FR V.





tectus qui haud dubiè aliquo fructu aut nuçe fuerit inclusus, medullam siue pulpam continens albam, non ingrati saporis, licet vetustate contractior esset, & eius meducullum in lacunam dehisceret. *Huius figuram exprimit tabula antecedens, sub numero II.*

FRUCTVS RETICVLATO CORIO,
PEREGRINVS.

CAP. CVII.

Descriptio Fructus Clus. Exot. lib. 2. cap. 11. Duro corio, & multis fibris, retis in modum quodammodo inter se intertextis & duris connecto praeditus erat hic fructus,



foris quidem inaequali & rudi, intus verò lzui & splendente, coloréque ad spadiceum tendente, tres uncias cum semisse longus, binas & amplius latus, supernà in gibbum extuberans, infernà planus ferè, nucleum continens crassum, plenum, succulentum, & qui in naui, quâ

apens ex Guineâ aduectus fuerat, iam germinare inceperat, ut mihi referebat Pardinus, qui illum anno 1595. adquisierat: quique haud dubiè crevisset, si statim terræ commissus fuisset.

Toto porro decennio antè similem accipiebam Viennæ Austriz, à D. Richardo Girth. Londino missum, pro officulo magni cuiusdam suus in *Virgandecarv* siue Virginia nascentis, ut adscriptum erat. Eius pulpa licet solida, quia tamen vetusta, rugosa foris & sulci parè coloris, internà autem parte albicans, & acris al quantulum saporis: nullum eius nomen neque tunc, neque postea intelligere potui. Similem præterea conspiciebam anno 1603. illumque paulò ampliozem & magis planum, villos quibus tectus erat densos adhuc retinentem. partim crassiusculos & rudes, partim valde tenues & molles, omnes cineracei ex albo coloris.


FRUCTVS EXOT. BAMIAE INSTAR
ANGULOSVS.

CAP. CVIII.


Descriptio Fructus ex Iauana navigatione per Batauos delatus, auctore Clusio Exot. lib. 2. cap. 15. binas ferè uncias longus, vnam crassus, in quinque angulos distinctus, instar penè fructus Bamiae, siue Alceæ Egyptiacæ, durus, fusco colore (qui albedo permixta) praeditus, solidus, hoc est, nullū strepitum, quamvis agigaretur, edens, leuis, & in aqua non subsidens: & hic nullà appellatione

insignitus.

Huius iconem indicat in hac tab. num. I.



I



II.

NVX TRIFIDA EXOTICA.

CAP. CIX.


Descriptio Fructus exoticus Clus. Exot. lib. 2. cap. 25. vn-
cias parè tres ambitu comprehendens, sphaericae formæ, putamine cōstās qualinux iuglās, firmo, sulci externà parte coloris, internà spadicei, qui in tres æquales partes diuidebatur, & internà parte in 3. veluti cancamerations vel loculos separabatur, in quibus singularis grana, malorum vulgarium seminibus non valdè dissimilia.

Cum superi. vi se per numero II.


FRUCTVS EXOT. CINEREVS, CVM
LINEIS ET TVBERCVLIS, DVRS.

CAP. CX.

Descriptio



I



II

Fructus exoticus, quem Clus. Exot. lib. 2. cap. 19. scribit sibi missum à lac. Plateau, binas uncias cum semisse longus erat, quatuor in ambitu crassus, cineracei coloris, quem aliquo experimento tectū fuisse arbitratus: in quinque partes diuidi posse, vñz per longitudinem ductæ indicabant: alioqui eminentibus

aliquot tuberculis instar vesicularum, oblitus erat, quæ aperta, inanes & inæquales lacunas ostēdebant: spadicei coloris & splendentes, quasi semen aliquod continuissent: valdè durus autem erat is fructus, & astringente facultate praeditus. *Fructum hunc denotat num. I.*

FRV.

FRUCTVS MALO AVRANTIO RESIC-
CATO SIMILIS, LEVIS, AVREI
coloris, octo nervis distinctus.

CAP. CXI.


Descriptio

Iacobus Plateau, inquit Clusius, mittebat fructum exoticum, qui proculus orbicularis erat formæ, quatuor enim uncias erat eius ambitus, siue à pediculo circumferentiam metiretis, siue medio corpore, corio siue cute tectus coloris ex aureo flavescentis, ut exiguum aurantium malum resiccatum videretur, octo tamen nervos satis crassos à pediculo ad summum fructum omni ex latere ductos habebat [ut hac ratione inter exocos fructus nervis distinctos, reponi posset] eorumque nonnullos geminos, alios quaternos simul iunctos, alios singulares: valde autem levis erat, quia resiccatus: breviter omnes notas habebat mali aurantii, præter illam nervorum distinctionem. Est hic fructus cum superiori sub numero II.

FRUCTVS IND. ROTVNDVS, TV-
BERCVLIS ASPERVATVS, NIGER.

CAP. CXII.

Descriptio



AN nux sit ve-
de Phasiolo-
rum familia, pro-
certo adserere
non possumus.
Fructus Indicus
est, aspectu non
vsque adeo spe-
ciosus, circumferen-
tiæ ferè rotunditatis.
uncias duas penè
latus, compressus,
sed ed vsque
ut unciam mediâ
crassitie adæquet.
præsertim parte
gibbosiore: nam
vtrinque cœu gib-
bus quidam emi-
net. Cortice ve-
stitus nigro, tu-
berculis quibus-

dam asperato, duro: supernè umbilicatus, sub
cortice tunica intermedia albicans substantiam
internam nucleatam involuit, quam ritè conside-
tare aut gustu decernere non fuit, quippe quem
III. nostra Princip. VVirtemb. terræ committere
constituerit, apud quam vidimus, descripsimus
& figuram hanc sua magnitudine ferè depingi
curavimus.

AMYGDALA GVIANENSIS, QVODAM-
MODO TRIANGVLA CVM TVBERCVLIS.

CAP. CXIII.

Descriptio

Peregrinus fructus scribente Clasio Exot.lib.
2. cap. 6. anno 1598. ex Guyana ad me mitte-
bat Gareus, valde crasso & duro putamine erat
præditus, ut non immeritò nux appellari queat,
infima enim parte ferè rectilinea erat, & deprel-
Tom. I.



*

nucleum continere deprehendebatur, eiusdem
cum nuce figuræ, pelle siue membranâ opertum
rufa, sed interiore parte candidissimum, atque in
binas partes separatam, instar amygdalæ, cui et-
iam similem saporem habebat: quâ de causâ non
ineptè forsitan Amygdala Guyanensis, siue G. yanica
dici possit.

FRUCTVS EXOTICVS DVOBVS ANGV-
LIS DISTINCTVS.

CAP. CXIV.

Inter fructus per Batauos ex Iauana navigatio-
ne erat auctore Clasio Exot.lib. 2. cap. 15. nonus
unciam longus, minùs uncia latus, cortice den-
so constans, cineracei coloris, duobus angulis di-
stinctus, & extimâ parte mucronatus, levis, & in
aqua haud subsidens, tanetsi eâ mergeretur, du-
rus tamen erat, & agitarus strepitum non edebat.

Descriptio

FRUCTVS HEPATICVS INDICVS.

CAP. CXV.

Rariorum fructuum ex Indiæ Guinzæ nouè
impositorum hic vnus, Lutetiâ nobis mi-
sit insignis Botanicus Regius Robinus cum hac
inscriptione. Fructus qui Indiani veniunt in obstru-
ctis mibz Hepatis. Cuius an quisquam hactenus me-
minerit, nondum nobis constat. Figura sanè he-
pati quodammodo respondet. Est enim altera
parte gibba seu conuexa, altera sinuata & con-
cava, figura oblonga; magnitudo Castaneæ ma-
ioris, eique concolor, hoc est, spadiceus, sed ad
pullum accedens: Superficie tenus inæqualis, ru-
gosus, nihil corticuli habet, eademque ferè sub-
stantia interna. An alio cortice fuerit compre-
hensus, nobis incertum. Bivalvis est, aut gemi-
nus potius, sulco tamen satis insigni in ambitu
coherentiam designante: nec multa vî diuiduus.
Substantia tota glandulosa, Quernæ glandis
siccata, durior, præter leuem quandam quam
præbet adstrictionem, nullo nec gustu nec odore
insigni. Placuit curiosius describere pro-
pter nouitatem & facultatis pol-
licitationem.



Descriptio

Ec

FRUCTVS IND. DECUSSEATVS.

CAP. CXVI.

Descriptio



OVilli renis formam habet, tanquam ex pluribus parvis coagmetatus, castaneæ magnitud. & colore, oblongus, crassiusculus, parum cōpressus, interdum magis orbiculatus, paululum terræ sigillatæ (qualis in Officinis serè ostendi & haberi solet) forma & magnitudine adæquans, quæ vna quidem parte duo sulci decussati in quatuor partes suis radiis diuidunt: Opposita

verò parte, sigmoides sulcus duplex conformem porcam ambiens, aruficiose exaratus, inter cuius cornua triplex eminentia germinis sedet. Vnde habuerimus pulcherrimum hunc fructum Indicum non recordamur. Binos etiamnum inter Indica nostra monumenta seruamus. Figura vtramque faciem haud imperitè ostendit.


Hunc eundem fructum à Iacobo Gareto depictum exhibet, ni multum fallimur, Clus. Exot. lib. 2. cap. 16. addita hac descriptione. Elegans sextus fructus & veluti ex quatuor Auellanis simul connectis constans, lævibus, spadicei coloris, qui alio operimento tectus fuisse videbatur: nam inter interstitia, quibus singulæ nuces ab inuicem separatae, testabant adhuc membranaceæ cuiusdam fuscae cutis partes, quæ tecti fuerant. Constabant porro singulæ illæ auellanae putamine spadicei, ut dixi, coloris, firmo quidem sed non valde denso, in quo nucleus continebatur crassus, durus, foris sobrius, internâ parte candicans, neq; ingrati saporis.

FRUCTVS ATER, QVATVOR SVLCIS DISTINCTVS.

CAP. CXVII.

Descriptio

PRorsus ater erat XI. fructus à Iacobo Gareto, missus lævisque & splendens, quatuor sulcis supernè distinctus (tanquam in quatuor partes diuisus esset) quorū bini ad partis aduersæ umbilicem vsque ducti: planus alioqui, & orbicularis penè formæ, vnciâ paulò minor, supernâ parte aliquantulum tumescens, & quasi puluinatus, nisi quâ parte sulci deprimebant: aduersa pars vestigium retinebat foveam, quo fructui siue cortici, qui tegebat, firmiter inhaeruisse videbatur, quale in castaneâ equina conspicere est, verū non adeò amplum: durum autem & solidum deprehendebam, adeò ut etiam linam quodammodo respueret: eam ob causam, quem nucleum contineat, mihi incompertum. Huius mentionem



facit Clus. Exot. l. 2. cap. 16. Formam huius fructus depingit numerus I.

FRUCTVS ORBICVLARIS FERE, CVM TRIBVS SVLCIS ET TRIBVS FORAMINIBVS.

CAP. CXVIII.

FRuctus quem misit Iacobus Gareto, formam orbicularem habebat, inquit Clus. Exot. lib. 2. cap. 16. paulò tamen plantior erat, superna & sessili parte, vnciam latus, solidus, nec vllum strepitum dum agitaretur, edens: cineracei coloris, tribus canaliculis siue sulcis distinctus à summo vsque ad tria foramina, quæ in lateribus obtinebat, tribus aliis minoribus summâ parte præditus. *Ideam huius demonstrat tabula præcedentis num. II.*

Descriptio

FRUCTVS ORBICVLARIS FERE FORMÆ, FVSCI COLORIS.

CAP. CXIX.

FRuctus peregrinus quartus à Petro Gareto missus, [Clus. Exot. lib. 2. c. 14.] orbicularis formæ, vncialis magnitudinis, lævis, sulci coloris, breui quidem subnixus pediculo, sed cortice satis duro, tamen non valde crasso præditus, qui apertus [nam in binas partes diuidi posse ex signis apparebat] quatuor grana nigra continere deprehendebatur semunciam lata & longa, cordis humani formam quodammodo referentia, sed magis plana, binis duris membranarum, ut in nuce iuglandis, illa separantibus. *Exprimitur hac figura sub numero III. in præced. tab.*

Descriptio

NVX ORBICVLARIS, CINERACEI COLORIS.

CAP. CXX.


FRuctus (seu verius Nux) à Petro Gareto missus, orbicularis formæ, vnciæ tamen magnitudinis (plures enim conspiciebam,) quorum nonnulli ternas, aliqui binas duntaxat vncias ambitu comprehendebant: omnes duro sed non crasso præditi cortice, cineracei foris coloris, & qui alio operimento tecti fuisse videbantur: interna nucis pars fusca & splendens, atque nonnulla ex parte (quæ videbatur

Descriptio



HISTORIÆ

PLANTARVM



nus, supernâ in gibbum assurgens, infimâ parte quâ pediculo adhæserat, latior quàm extimâ, quæ in obtusum inuersionem defuisse videbatur: membrana autem dura & splendent, spadiceique coloris, fuscum corticem tegebat, continentem nucleum siue pulpam quandam cineracei ex albo coloris, quæ ore aliquantulum retenta, in farinaceam materiam resoluebatur quadam acrimoniâ præditâ.

batur: sed quod formâ Olive ossiculum utcumque referret, longè tamen maius, ut pote fescuncialis longitudinis, vinctalis verò latitudinis, rugosum, solidum: nucleum in se continens, ut ex agitati strepitu coniecturam facere licebat.

FRUCTVS OLIVÆ OSSICVLVM REFERENS, rugosum, cum tribus lineis.


CAP. CXXVII.

A Vuthore Clusio Exot. lib. 2. Fructus sextus concessus à Paludano, vnciam crassus erat, fescunciam serè longus, forma etiam oliuæ ossiculum quodammodo referens, maior tamen, rugosus, & veluti frequentissimis tuberculis oblitus, tribus nervis secundum longitudinem distinctus, extremâ alterâ parte obtusâ, alterâ verò mucronatâ, satis grauis, & nucleum aut tale quiddam continens, ut ex agitatione coniciebam: in aquam iniectus, non mergebatur. Descriptio

FRUCTVS OSSICVLA TERNA, AUT QUATERNA SIMVL IUNCTA, cortice non valdè duro, rugoso, cineraceique coloris.

CAP. CXXV.

Descriptio



Fructus inquit Clus. Exot. lib. 2. c. 14. à Petro Gareto acceptus, siue ut verius dicam, fructus ossiculû (terna enim aut quaterna simul coniunctim nata fuisse videbantur alio quodam fructu inclusa) binas vncias longum erat, totidè latum, mediâ parte tumente & sese attollente planis & compressis lateribus: quæ fidem faciebant, bina ad mi-

nimum alia adiuncta fuisse, cortice non valdè duro præditum, externâ parte rugosum & scabrum, cineraceique coloris, internâ autem laue & candidum: magnum nucleum continens prorsus implentem corticem, solidum quidem, non tamen durum, tenui membranâ tectum: ipsa autem interna materia siue pulpa, nucis vnguentariz penè odorem habebat, sed acriusculum saporem, an ob vetustatem, ignoro.

BACCÆ CVIVSDAM PRÆGRANDIS OSSICVLVM.

CAP. CXXVI.

Descriptio Fructus à Paludano concessus, inquit Clus. Exot. lib. 2. cap. 10. baccæ cuiusdam prægrandis ossiculum, ipsi quidem & mihi ignotæ, vide-

AVRANTII FORMA, COLORIS cineracei fructus, strepitum edens.

CAP. CXXVIII.

Fructus communicatus à Paludano, ut ait Clus. Exot. lib. 2. cap. 20. prorsus orbicularis erat, utriusque nostrum ignotus, parui mali, siue aurantii formâ, quatuor aut quinque vncias ambitu continens, levis, coloris serè cineracei, solidus & durus, pulpam aut nucleum iam resiccatum continens, quoniam commotus strepitum edebat. Descriptio

DATVÆ SEMINE FRUCTVS.

CAP. CXXIX.

Clus. Exot. lib. 2. cap. 20. scribit fructum sibi concessum à Paludano, orbicularis serè etiam formæ, qui tenui veluti membranâ constaret, breui petiolo præditus, penè cineracei coloris, intus inanis, nisi quædam rugola granula continuisset, iis quæ in Solano manico maiore conspiciuntur non valdè ab similia, inhærebat autem sarmentis quibusdam, vitis viniferæ sarmenta referentibus. Descriptio

NVCLEVS NVCIS QVODAMMODO conuolutus.

CAP. CXXX.

Annotatum à Clusio Exot. lib. 2. cap. 20. Paludano concessisse fructum in orbem quodammodo conuolutum, nucleum verius, quàm fructum, qui putamine aut nuce aliqua conclusus fuisse videbatur, solidus tamen & fusci exterioris coloris, internè albus: non ingrati quidem saporis, sed acidiusculi, quem tamen vermiculi albi, iis non dissimiles qui in Ponticis siue auellanis nucibus generantur, sed minores, valde appetebant, & breui tempore totum erodebant. Descriptio

BARY-





ter liquor glutinosus, seu melligo nigricans, cui alii vin causticam, Cordus saporem primum dulcem, mox acrem, deinde vehementissime adstringentem, aded vt fauces in angustiam constringat & strangulationis periculo respirationem detineat, adscribit. Nos in inueteratis, quæ habemus, vt substantiam diuersam concretæ melliginis splendido nigrore bitumen Iudaicum referentis & porose, inuenimus, ita & saporem penitus exoleuisse, & nihil quàm fatuam dulcedinem linguz offerri, nucleum verò in membranz nigricantis tenuitatem exaruisse, quem Cordus planum candidumque prodit. Obseruauimus & gemella, aut certe per medium diuisa, cuiusmodi curauimus vnum depingendum, & alium cum crasso pediculo, tertium apertum.

Baladar Serapioni est Anacardus fructus arboris similis Cordi auis, cuius color est rubens, cordi penè concolor, in quo continetur substantia quædam sanguinis æmula. Auicenna Anacardum similem ossi Tamarindorum facit: medullamque eius similem medullæ Amygdalæ dulcis, nec in ea vllum esse nocumentum: cortice raro, perforato, vel habente foramina, [sic interpretatur] hoc est, vt nos interpretamur, intus cauo, vt patet in sequentibus: nam addit in cuius raritate (cauitate) est mel viscosum, odoratum. Sunt qui cum Nuce masticent, absque vlla noxa.

Anacardi, & Anacardum montanum Rhaz. Inde confectio quam ab Anacardi cuiusdam arboris Indicæ [vt ille ait] fructu Anacardium appellant: & Anacardorum succus, qui ob similem mellis consistentiam mel Anacardium dicitur. Eorundem & Mesues meminit, vt dicitur in vrbibus *arabum* Medicis recentioribus, sicut legitur apud Paulum in quadam compositione, & apud Actuarius in antidoto aureo, Alexandri & in Dianacardo vocato.

Anacardus, Pediculus Elephantis ab imperitis perperam dicitur, teste Pandeet. At Platearius, Anacardi, inquit, sunt fructus in India nascentes: quidam dicunt, quod sint pediculi Elephantis, quod falsum est. Et tamen hortus sanitatis quoque Pediculum Elephantis vocat, in quo icon exhibetur: cuius plantæ sic, nos latet: saltem Anacardum non exprimit.

Ruell. & Matth. aperte dicunt veteribus Græcis incognitum, quemadmodum & Rheginus, cui Anacardus dicitur in masculino. Angul. optimè descriptum ait à Serap. *arabum* & Frischlino in Nomenclat. *Bergbaum*. Anacardium siue Anacardus. Germ. Anacardich, Elephanten aut Belssanten laus. *Abollador* in Oron. phil. Toxicit. Lacuna Anacardos inter Nuces refert. Garcias Anacardio nomen, inquit, indiderunt recentiores Græci [nam Veteribus ignotum fuit] à cordis tum similitudine, tum colore, Arabum vestigia secuti, quibus *Baladar*, Indis verò quoque *lybo* dicitur.

Vult autem Clusius legi *Beledhar*, ac notat Garciam sic scribens. An Anacardum habet aliquid simile cum Beledhar? an verò Beledhar habet cordis significationem? utroque modo acceptis, vtrumque falsum.

Lusitanis Fava Malaqua, quod viridis & in arbore pendens similis sit nostrarum maior Fabæ. Quod confirmans Acoſta, Anacardium, ait, fructus Fabæ vulgaris admodum similis dum adhuc viret, & recens est: exsiccatu verò niger & splendens: continet medullam Amygdalæ similem, inter quam & supremum corticem oleum admodum vrens inuenitur. Miramur verò neque

Garciam neque Costam arborem Anacardiorum descripsisse.

Casalpinus verò noua prodit opinione, quando ait: Ab Anacardo non abhorrent conditiones traditæ Perseæ: nam similis est Myxis rubentibus, vt Plin testatur: depressus autem est Amygdalæ modo, cui Theoph. comparat. Præterea venenum continet: licet alicubi innoxie comedatur. *Hæc ille.*

Illis quæ Veteres scripsere de Perseæ, lib. præcedenti relatis, Lector Anacardos conferre potest, potiss. cum verbis Theoph. quæ & ab ipso Casalp. citantur. Nucleum intus habet Perseæ, vt Prunus, longè minorem & molliorem: carnem vehementer dulcem, suauem, concoctu facilem: nec si comedatur, quicquam nocet. Anacardum verò non esse fructum similem Pruno nec Nucem, qualis est in Pruno, & ex pediculo Anacardis interdum adhærente satis patet, & ex tota aded facie & constitutione fructus. Præterea Anacardos nullam supra se habere carnem, qualem Pruna, neque habuisse nostros, manifestum esse putamus, & vel semel in Pharmacopœo constare possit.

Serapio scribit deferri ex Sim, & nasci in Sicilia in montibus ignis. Paludanus etiam testatur se virides ex arbore pendulos in Siciliæ monte Aethna vidisse. Monachi quoque tradunt è Sicilia optimos adferri Anacardos: & Curtius non in Sicilia tantum montibus, sed & in Apulia provenire inquit. Cordus verò adferri ex transmarinis partibus ad nos in Europam. Magna, inquit Garcias, [vt & Linschottanus navigationis suæ cap. 83.] eius est in Cananor copia, tum in Calcut, reliquisque Indiæ Provinciis, mihi cognitis, velut in Cambaia & Decan. Et Acoſta magnam refert esse copiam in Malabar & reliquis Indiæ regionibus, quod præter hos & Platearius, & Ruell. Gorrhæus, Rob. Const. & Curtius tradunt: hic speciatim etiam è Syria adferri.

Deligenda nigerrima, ponderosissima, candidum recentem nucleum & copiosiorē ac fluidiorem liquorem habentia, vt suadet Cordus, qui plurimis annis durare ait, antequam vetustate corrumpantur. Rhaz. præcipit ea [vasa] quibus conseruantur, semper infundenda & humectanda esse.

Anacardi, tradente Rhaz., calidissimi sunt, frigidis ægri tudinibus & obliuioni auxilium ferentes: sanguinis tamen generant adustionem, ac fortassis ad amentiam perducunt. Idem hausti acutos morbos creant. Confectio verò Anacardina dicta est theriaca Paralysis & Torturæ & Apoplexiæ. Baladar seu Anacardus ex Aben Mesuai apud Serap. calidus est in quarto gradu, & confert vitæ sensibus, memoriæ, & omnibus ægri tudinibus cerebri factis à frigidityte & humiditate, & nervis resolutis. Idem ex Gal. citat drach. eius dimidium sumptum conferre memoriæ, sed melius & efficacius eius partem internam, delere verrucas, & exulcerare cutem. Ex Abegerig citat, vehementer calidum esse, commouere *alguesques* & *bars* & lepram, & apostemata, præsertim iuuenibus & choleris, & fortè etiam interficere. Quapropter iis non exhibendos. Prodesse tamen Paralyticis, & ad eam proclimibus. Anacardium, Avicenna auctore calidum & siccum est in quarto recessu. Eius melligo exulcerat, inflamat, sanguinem & humores adurit. Verrucas delet & leucem, alopecias implet à pituita ortas, nervorum refractionibus & resolutionibus confert, memoriæ abolitæ aut imminutæ succurrit, præsertim

Perseæ

Casalp. not.

Locus.

Delicatus.

Vires & v. fus.

Mora.

Paralysis. Tortura. Apoplexia. Tempora.

Verruca. Causa.

Paralysis. Trepidam. Mora.

Locus. A. p. p. p.

*fiat v-
cuius.*

confectio ab Anacardis denominata, mentem ta-
men mouet. Hemorrhoides immodicè fluentes
lusu exiccat. Denique veneni non est expers,
quin adutendo humores occidit, cui occurrunt
ma. bid vaccino (fortè lacte) & oleo nucis.

*Elect. Ana-
cardis.*

Rhaza aduersus Anacardos in principio buty-
rum coctum & crudum, & oleum selami-
num, donec fuctio & mordicatio, si qua
sentitur in faucibus ac ventriculo, cesser, danda
præcipit, postea verò aquam hordei & lac vacci-
num acidum in potu, & oleum violaceum olfa-
ctui præbendum. Caput quoque epithematis,
qualia c. de alguelequi præscripsit, muniendum.
Sed & Psylli mucilago cum iulepo aliquo conue-
niente aut succo Granatorum in potu dari potest.
Noces verò proprietate quadam resistunt, eod-
em teste. Melius Elect. Anacardio speciatim
his vires tribuit. Ventris totius inferioris & cere-
bri affectus frigidus compescit, sanguinem reddit
purpurem, & inde spiritu animali reddito purga-
tore & tenuiore, sensus omnes apprehensione,
intellectum & memoriam iuuat, coloremque vi-
uidum corpori tribuit. Compositionem vide apud
eundem. Sed quod sextum demum mensem dan-
dum contulit ad diachilum cum aq. Fœnic. & Apii:
quo sumpto, vitandum laborem, iram, coitum,
ebrietatem. Ideo autem post sextum mensem da-
re iubet, quòd tum vis ferè eius maligna, ut censet
Sylvius, expirauit seruendo, antè namque uti est
periculosum. Apud Aetnar. quoque antidotum
diacardion habes, ad vertiginosos, comitiales,
difficiliter spirantes, & ilecos: menses pellit, in-
cipientem hydropem & cachexiam sanat, Para-
tur ut Mel Anacardium dictum, cui incocti sunt
Anacardi recentes & relict. Vsu frequens est, in
compositionibus, ut passim videre est apud Pra-
cticos. *Heu. Veteres.*

Temper.

*Myropola-
rum error.
Poria.
Serap. not.*

*Non Gene-
nati.
Asthma.*

*Lumbici.
et qu.*

*Causticum
Stemna.
ad obsi-
guandos
pannos.
Aut not.
Contraner-
sis de tem-
peram.*

Condion.

Calne.

Mangas.

Anacardi Mat. exsiccant & exiccat tertio ex-
cessu: præstat in medicinaliquor, etsi myropolæ
cōmuni errore & cortice & nucleo vtantur. Por-
ta Neapol. Anacardia noxia dicit, & deleteria non
vacare facultate, quibus remedium sit oleum ex
eorum nucleis expressum. Garcias Serap. repre-
hendit, quòd Gal. citat, tanquam huius fructus
meminerit, [cū tamen illi planè fuerit incogni-
tus, ut ille ait,] quòdque deleteriam habere facul-
tatem scribit, cui tamen experientia refragetur,
siquidem in Indiis è lactis sero maceratum asth-
maticis dari, & aduersus lumbricos. Præterea iis
vindibus (addit) & sale cōditis vtuntur in cibariis,
oluarum conditarum modo. Fructu verò sicca-
to caustici vice vtuntur in strumis: totaque India
huius cum calce misti vsus est ad pannos obfignā-
dos. Auic. idem taxat, quòd inter venena retu-
lerit, quæ deleteria sint facultatis. Nulla enim præ-
ditum esse venenosa facultate, ostensum: causti-
cam verò vim non nisi in siccato esse. Nonnulli,
infiridem, calidum & siccum constituunt in quar-
to, alii in tertio, nemo tamen mihi satisfacit, quā-
doquidem in virente clarum est deesse hunc ex-
calfacientem & exsiccantem excessum: neque ra-
tioni consentaneum videtur in eo caliditatis & sic-
citatis gradu constituere quo est Piper, nisi fortè
quod in Sicilia nascitur sit ea facultate præditum.
Eiusdem fructus facultates Acoſta persequitur in
hunc modū. Ego sanè vidi hunc fructum viridū, &
per multos dies sale & aqua conditum Oluarum
Hispanicarum modo venalem in foro proponi,
& edi non solum quidem, sed excitandæ appeten-
tiæ causa coctæ orizæ admisceri, uti solent fructum
Mangas vocatum, aliisque fructus astringentes
& acidos, alios minimè. Nonnulli in desiccato

extimum corticem demūt, eantque membranati,
quæ medulla tegitur, deinde medullam edunt
bibendi appetitum irritandum. Illud porro cer-
tissimum, oleum id quod inter corticem & nucleum
continetur, admodum causticum esse & veneno-
sum. Totà tamen provincia Malabar, illius vsus
est caustici vice. Si quis instillet in putridum &
cayum dentem, vrit, frangitque, & consumpsit
facile. Calce addita ad bombycinos pannos obfi-
gnandos, & alias res quaslibet notandas vtuntur
etenim notam adeò firmiter imprimit, ut nullā lo-
sione eximi queat. Solent interdum Indi non-
nulli hunc fructum cuspidi cultelli infixum candē-
læ ardenti imponere, qui dum vritur, mirum quos
strepitus edat, quas ignis scintillas quasi fulmina
eiciat diuersorum colorum, eaque ratione rudio-
ribus quibusdam & mulierculis imponunt, illis
persuadentes, se in his scintillis & flammæ radia-
bus spiritus conspiceret qui ipsis loquantur, & edoceat
quodcumque scire cupiant. Tali igitur commen-
to miseros fallunt, persuadentque quod volunt,
dantes responsa iis, qui ipsos consulunt, pro suo
arbitrio. Ut verò omnes isti Gentiles, augures, in-
cantatores, & diuinatores tardè loquuntur, & cum
mora ponderèque respondent, in suis responsis
semper sunt ambigui, & adeò astuti, ut quomo-
documque res, de qua consulti sunt, cadat, sua
existimatione minimè periclitentur, dicantque
se euentum prædixisse.

CAIOVS.

CAP. L.

Caii nomine innotuit fructus peregrinus (hic
cum precedenti pictus.) Castaneæ maiori par-
te renum, altera parte gibbosus, opposita la-
cunam impressam habens, quæ pediculi avulsi ve-
stigia apparet crassior, infima parte tenuior, cor-
tice autem tegitur cinereo, duobus maculis ma-
gis albicantibus utrinque lacunam dictam obli-
dentibus. Præter hunc corticem alius nucleum
complectitur pallidum, eà formā quæ & totus est
fructus, succulentum, sapore Amygdalæ dulcis,
substantia molliori: inter duos comices, qui cul-
mi ferè latitudine inuicem absunt, tophaceis ca-
uernulis coercetur melligo crassiuscula & lèta, se-
pè cerasorum colore & consistentia, saporis pri-
mum adstringente, mox insigni acrimonia lin-
guam vellicante, seruata tamen adstrictione.

Theueto depingitur & describitur arbor ipsa,
folio Piri, acutiore paulò, mucrone subrubente:
cortice item nonnihil rubente, satis amaro, mate-
rie molliuscula: fructum ferè pugni magnitudi-
ne, oui anserini forma, cuius huius Nux quædam
Castaneæ æqualis adnascatur, renis leporini for-
ma. In eius tamen figura accessariae nuculæ con-
nexum alium ostendit, quàm ipsius consideratio
doceat: siquidem, ut mox diximus, pediculus quo
primario fructui connectitur, non in tenuiori,
sed crassiore latiorèque parte conspicitur, quod
etiam melius demonstratur per figuram Linschot-
tani, qui hæc tradit de Caii.

Arbor in India ad Mahi fructus formam fert Pi-
ri magnitudine, flauo colore, posteriore parte a-
cuta, & anteriore crassa, molli tractu sunt matri-
ri, & contraria planè forma Pomis crescunt. Cū
enim Poma pediculo in crassiori parte arbori ad-
hæteant, hi fructus (quos Caii vocant) ibidem
Castaneam ostendunt, magnitudine pollicis prio-
ris articuli, alio sanè & diuerso à castaneis lacu-
colore.

*Poma
riom.
Oleum cas-
ticum.*

*Caui
demi.*

sigillum.

*Palstra
obseruata.*

*Indorum
impetura.*

Descripti.

*Melligo
Serap.*

*Arbori de
scripta
Theueto
Folia.
Fructus.*

*Thauet.
not.*

*Alia
descripti.*

Caii.

calore. Saporem quoque gratiorem habent, verum assari debent. Interiorum albescunt ut castaneæ Europæ, putamine tamen crassiore, cui coeruleus color ætundus est. *Caius* ipsi ea parte quæ anterior est pomo, caulem habent insitum arbori.

Geln. epistola ad Adolphum Oeconem: Fructus reni similis quodammodo, figura & magnitudine leporinum renem referens, Anacardiis vocatis congener, ut iure *αναναρδία* *ινδία* appellatione nominari possit. Qui namque *Αναναρδία* *ινδία* vocitant, minime mihi placent. Longè autem magis errant, qui *ελαιάριον* seu Olivellam aut Fabam Aegyptiam appellitant. Indigenæ quidem Indi, Canibales maxime & Anthropophagi arborem *Acaia* & *Caius* nuncupant: fructum verò Recentiorum quidam *αναναρδία*, id est, *castaneam brasiliensem*.

Rondel. in praxifua, quam manu mea transcripsi Monspelii [ego Bauh.] Castaneæ, inquit, quæ adferuntur ex India, quæ formam renis habent, ita ut videantur esse species quædam Anacardi, fructus ligni quod vulgò dicitur *Bresil*. Sed fallitur Rondel. Theuetus enim aliique Indicarum regionum *αναναρδία* Scriptores, Brasiliam ab hac arbore separant: Theuetus speciatim quoque Brasiliam ait fructu carere.

Clus. apud Garciam, Nucis genus vocat è Brasiliæ regionem, incolis Caius dictum, cuius arbor magna, fructum ferens oui anserini forma &c. quo utuntur Brasiliæ, [licet Theuetus contra afferat] in extremo fructu prominet Nux quædam renis leporini forma &c. Idem apud Acoftam: mirari satis nequeo, Acoftam non describere Nucem quæ in extremo fructu Caius nascitur. Caius pronuntiandum potius, quam Caias. Acofta notat *Cain* vulgò appellari fructum. Theueto Arbor Acaious. Depingunt arborem Theuetus & Linschottanus, nec figura admodum differunt, sed iunius tamen concinnior, quia ære exsculpta, quemadmodum & Bryfratrum. Caius Clus. Hist. Lugd. Cast. Dur. C. uones Paludan. qui omnes testantur quosdam Anacardiorum genus existimare. Sed H. Lugdun. Caius & alio loco denuò de eo tradit sub titulo Acaiou. Et Taber. Caium audacter Elephantem laus German. vocat, quod nomen & Anacardis quidam tribuunt, ut dictum cap. præced. quasi ipsi certò constaret ad Anacardos esse referendum. Et Cat. Francos. Caium appetit Anacardium Brasiliæ vocat. Lertius Brasiliæ arborem dicit elatam Vlmorum modo, cuius fructus à siluestribus Acaiou dicitur, crassitudine & figura oui gallinæ, per maturitatem Cydonio magis flavo, non tantum eduli, sed succo etiam acido, suavi, orique ito grato ut nihil supra, habere, que vim refrigerandi. Difficiliter propter altitudinem arborum decuti, nec sibi sibi licitum, nisi Simix caudatæ, quæ erus esu delectantur copiose deiecerint. Cæterum in huius historia hoc nobis obscurum videtur, quod Lertius & Acofta non meminerint Nucis à nobis depictæ, Theuetus verò non bene appingit. Præterea si quis ritè consideret Nucem nostram, est quod dubitet, an alteri fructui unquam adhærent, Vestigium ubi pependisse creditur, nescio quid aliud demonstrat: & potius tuberculum dicas à natura factum, quam pediculi aut adhærensionis vestigium. Perpendendum igitur, an idem nomen non tribuatur duobus diversarum arborum fructibus. In Canibalum Prouincia, vber est arborum Acaious prouentus, Theuet. per Indiam copiosi, eodem

Tom. I.

tempore quo Mangæ maturescunt. Linschott. E Brasiliæ regionem Vlyssipponem adferuntur, Clus. Adferuamus & nos aliquot fructus, & vinum inter hos speciosissimum ab Ecc. Herc. Saxonia Prof. L. Med. apud Patavinos celeberrimo cum aliis multis exoticis ad nos missum. Paludan. ait: Orientalis Indiæ proprii non videntur fuisse: verum ed ex Brasilia allatos voluit.

Saporem gratiorem habent quàm castaneæ Itaque, verum assari debent. Crudas nemo securre ore aperiet, quoddammodo cutem abradant, magno dolore eorum qui ignari temere eas relebant. Idem cultro aperiantur, aut igne vruntur ut manducari possint. Guttur autem peculiari natura cum deglutiuntur stringunt, gustu acido & succulento. In orbes idem scinduntur, adiuncta aqua, siue vino, saleque iniecto, quibus modis adstringendi illa facultas mitigatur, palato ita gratissimi. Mangis tamen Ananisque cedunt, viliores enim sunt: Linschott. Sunt qui ex fructu potum quendam conficiant, quanquam per se minime suavi gustu, sapore Sorbi mediæ maturitatis. Nuculæ accessorie nucleus non ingratus quoque parbet cibum leniter tostus. Ex melligine, quam cortices gemini claudunt, copiosius oleum possent incolæ elicere, quàm nos è luglandibus. Nullus apud Cannibales ligni usus, præterquam ad fouendum ignem, ut quibus aliorum non magna suppetat copia. Theuet. Clusius quoque testatur nucleo leuiter tosto incolas velci, gratiorem ita esse, & Venerem stimulare. Acci illo oleo nihil præstantius esse ferunt ad Lichenes & impetigines tollendas. Incolæ etiam aduersus scabielem utuntur.

Vires
Vfus.

Cautio.

Per palato
grati fiant.

Potus.

Nucleum
melligine.


Oleum.

Lignum.

Ad Venerem
stimulare.
Lichenes
impetigo.

AHOVAI, FRUCTVS VENENATVS.

CAP. CXLI.



A Houai fructus nobis Ioh. Robinus stirpium exoticarum cultor propendit singularis. Is triquetra figura deltoidea est, mediocriter castaneæ magnitudine, duobus cornibus compressionibus, cetero qui turgidus, coloris raii, superficie aliquantum inæquali: ac inter duo inferiora cornua rimam agit ad intima

Descriptio.

penetrantem: à summo apice, in quo foraminulum peruium, quatuor ducuntur sulci, in totidem quadrantes fructum diuidentes, qui conculsu nucleum inesse testatur.

Arbori, inquit Theuetus. altitudo Piri, folium verò duos tresve pollices longum, duos latum, æterni viridis: cortex albicat: rami vulnerari succum lacteum manant: odorem autem spirant amputati insigniter fetidum, quare siluestres isti nullo modo utuntur, ne ad ignem quidem fouedum.

Arboris descriptio.

Succus Lactis
fetidus.

Ff

Hauuay. Appellatur autem *Ahouai* & *Hauuay*: Veroque enim modo scriptum habet. De eadem *Lerius* sic scribit. Arbor in Brasilia sylvestribus hominibus dicta *Ahouai* tanti factoris & ita Allia redolens, ut eam scinditur aut igni adinuetur, odor tolerari non possit, foliis *Pomis* nostris ferè similibus: fructus quodammodo similis tribulo aquatico, nucleo summe venenato.

Lob. tradimus plantam nomine *Aspalathi*, cuius lignum grauiet quoque olet. Potuisset hic tradi, nisi nominis affinitas & similitudo quadam cum *Aspalatho* ibi describi postulasset. Nescimus tamen cuius arboris sit lignum.


Hist. Lugd. nat. Coropis se eiusmodi ligna ex Atlantico orbe allata subesse ille testatus, humanum stercus natis representasse perhibet. *Hist. Lugd. nat.* binis locis de ea agitur nomine Arboris fructu pernicioso *Hauuay* Theueti, ut etiam *Ahouai* & *Ab-uay* Theueti ex Clus. ac utriusque figuram proponit. *Ahouai* Theueti nomine & Clus. & Lob. & Tabern. habent.

Vires & Vires. *Ahouay* potè fructum fert venenatum, ut dictum, & perneabilem, verèque deleterium: talis autem potissimum est nucleus, quo exempto sylvestres putanibus tintinnabulorum loco videntur, quæ cruribus circumdata nihilo remissius sonant quàm campanulae nostrates. Tantùm verò abest, ut ii peregrinis fructus istos recentes donent, ut suis etiam liberis tactu interdicant, proutquam exemptus fuerit nucleus. *Theueti*.

NVCULA QUÆDAM FALSO HIGVERO ET AHOVAI PUTATA.

CAP. CXLIII.

Descriptio



Fructus quæ *Higvero* nomine accepimus *Phaeoh* vulgaris est magnitudine, nihilque aliud quàm putamen quoddam, leuissimum, nitidissimum, coloris spadicei obscurioris, intrinsecus striatum, rufum; gibbus foramine exiguo pertusus: siua pars tota patet, ut lembum mentiatur. Collisū mutuo tinulum sonum reddunt. Foraminula arguunt ex

funiculo traiecto pependisse. *Dono* accepimus à *D. Casp. Bauh.* & plusscula vidimus apud *D. Egl. Platerum*.

Clus. ad *Garciam* in edit. 4. *Ahouai* Theueti vocat. Olim verò sine nomine & descriptione posita erat figura. Quod deinde *Ahouai* Theueti nomine proposita sint, existimamus Typographi errore id factum.

Lob. & Hist. Lugd. *Hist. Lugd.* Fructum *Higvero* vocat ex *Clusio*. *Lob.* idem dicit. Atqui *Clus.* non vocat hunc fructum *Higvero*, quod adhuc quidem obseruauerimus, sed relinquit innominatum. *Higvero* longè alijs est fructus: quæ ratio quòd maiori cau-

tela *Taber. Higvero* fortè suspicatus sit, non definitè statuunt.

NUX PEREGR. OCVLATA, COMPRESSA

CAP. CXLIV.



Maior est Nuce vomica *Offic. dicta*, quæ hirsuta est: hæc verò circumscriptione haud ita rotunda, sed per ambitum nonnihil sinuata, altera parte in gibbum extuberante, altera compressa. Color cinereus vel in rufum declinans. Gibbus per declina ordine positos habet ocellos quinque impressos: compressa pars scrobiculos ha-

bet insculptos in umbilico quidem vix, unde & petiolus videtur prodire: in marginibus autem multi incerto numero. Ocellis respondent totidem locelli distincti, in quorum vnoquoque semen vnicum, *Pisum* aut *Pisum* seminibus simile, sed habitus, substantia pingui, oleosa, sapore *Auellana* circumiecta omnis substantia lapidea est duritia.

An *Serap. Leon. albi*, vel *albi*, id est, (ut reddit interpret) *Nux vomica*. *Habix*: Vomitus vehementer mouet, vel per se, vel cum alijs trita cum modico salis, quod faciliat vomitum. *Dosis* drach. ij. *Abraam* apud eundem: Est nux, inquit, colore inter glaucum & album medio, *Auellana* paulò maior, in qua sunt nodi, cuius corticis drach. j. trita & cribrata, sumpta cum duobus aureis *Anethi* triti aut semine *Forniculi*, addito melle, sicque mixta cum aqua calida vomitum eient, & humores cholericos eiciunt simul ac phlegmaticos, atque adeò alij quoque superfluitates per inferna subducunt. Non ausimus pro certo asserere *Nucem* nostram oculatam hic depictam esse *Vomicam* *Serapionis*, quia vires ignorat nobis sunt. Quod scribit in ea nodos esse, respondere videtur. *Bellun.* in *Arab.* nom. interpret. Illa *Nux* ait, quam *Venetii* *Nucem Metel* vocant & quæ reperitur inter *Nuces moschatas*, non habet spinas quas ei tribunt *Auic.* eademque *Nux*, quæ importatur ex *India*, ignoratur à *Phylicis Orientalibus* quid sit, & ab *Italis* connumeratur inter *stuppeas*, *Mauritani* *Nuces* memorant, quas *Vomicas* & *Metellas* vocant. Sed tam *Officina* quàm *medicorum vulgus* has magno errore confundunt, quòd plerumque legittimas *vomicas*, *Metellorum* loco usurpant, & contra *Metellus* nonnunquam *Vomicarum* vice. *Metellas* vocant, quæ nonnihil extuberantes, quibusdam nodis, veluti parvis oculis, per ambitum sunt repletae: eorum lapsus faciliè deprehendi potest *Serapionis* testimonio: ex sunt legitima *Vomica* *Serapionis*: Hæc *Matthiol.* qui tamen in *postr. com. Lat. & Ital.* non scribit esse legitimas *Serap. Vomicas*, sed in silentio

no praterit, ac potius negare videtur, aded sibi ipsi constare didicit in suis scriptis.

Nux vomica vera, & Pharmacopolis male Nux metella, Lacun. Nux vomica vera: Metella offic. Germ. Frænanglin/Lonic. Nux vomica Serapionis, & Metella Sephasiorum, Amat. Quidam volunt, inquit Angul. Nucem *metz*, vulgarem esse vomicam: verumilius est Metel commune esse Metel verum, quam vomicam. At nobis, ut iam diximus, nostra Nux oculata melius respondere videtur Nuci vomicae Serap. quam eiusdem Methel, si rite considerentur quæ Serapio scripsit. Nux methella Offic. Hist. Lugd. Fructus peregr. Taber. Et rursus fructus peregr. 6. Clus. eidem Hist. Lugd. quid eadem Nucem duobus duobus locis agit, non sine oscitantia.

Hist. Lugd. Clus. qui peregrinum & facit sic describit. Nucem vomica maior est, planusidem atque similis coloris, nempe cinereus, superna parte paulo eminentior, & in ambitu quodammodo sinuosus, infima vero, quinque grana inter se disuncta, & veluti ipsi impressa ostendens, Mespilorum Serapionum officulis non valde ablimilia, quæ exempta, satis alta lacunarum vestigia relinquunt. Totus lignea duritie præditus est.

Vires & vicia. Cæterum de vomicarum Serapionis facultatibus prius diximus: qui nullam vim lethalem eis tribuit, sed tantum vnius aut duarum drach. pondere cum Anethi decocto ac sale misce per superna, nihilominus quoque per inferna, humores biliosos pituitososque educere.

NVX MECHIL SERAP.

CAP. CXLV.

Descriptio De hac ita scribit Serapio, *Leum Alratbaba*, id est, Nux mechil. Hænet eben David, ex Arabis cuiusdam relatione dixit Rachah esse arborem magnam sicut Nux, foliis amaris Ficus magna, fructu Malogranati parvi nascente ad foliorum exortum, in modum Ficium, pediculo incurvo, ob fructus pondus & magnitudinem. Neque nominandum esse Iumruzen, id est, Ficus Pharaonis, quod non sit Ficus, sed Rachaha. Sed verò idem tradit in Oriente plures vidisse, Ficibus similes, cute densa, sapore dulci, suaves, odoratos, ideoque hominibus & pastoribus potissimum expetitos. Anninebeten apud eundem Serap. vult esse Nucem vomicam. Sed differunt nimirum inter se Rachaha & Nux vomica. *Hæc Serap.*

Nux vomica De eadem Monachi in Mesuen ita tradunt. Serapioni nux Mechil, sine Mochil (diuersa à nuce Methel) est quædam planta magna quæ in Syria copiose nascitur, specialim in deserto Iesu Christi, ubi nimirum 40. dies & noctes ieiunauit. Similis pendet in omnibus nuci Methel dictæ: sed fructus eius non est spinosus, & à pastoribus comeditur, ut plures fratres nostri ordinis retulerunt nobis: quæ planta videbatur eis esse species Solatri, quam plantam adhuc nonnulli ex Mauritanis Mochil vocant, & alii aliter vulgò nominant. Sic illi. Enimvero sanè, ut quod res est fateamur liberè, nec Serapionem neque Monachos rectè intelligimus. Et multum est, si ipsi met seipso intellexerunt. Quæ Monachi tradunt de nuce Methel, licebit videre capite de Strammonea. Scribit Bellon. Tatulam siue Solanum somniferum provenire circa Hiericho, quod notandum propter ea quæ Monachi dicunt de Solatro: Verum Tatula spinosa est.

Tom. I

NVX HENDEN ARABVM.

CAP. CXLVI.

Nucis nomen facit ut plantam nobis incognitam tradamus ex Arabum sententia, de quibus Lectoribus & nobis cum tempore iudicandum. *Leum hendem*, inquit Serap. dicitur Nux *hendem*, vel Nux *banden*. Rasis: dicitur *Adeps terra*, & *Petra terra*. Idem in Zaravi tradit, esse Tuber, ex quo fiat vinum cum melle. Isaac eben amram *leum banden* sunt tubera granata, sicut cætera alba, colore in glaucum vergente. Adfertur de Barcha, & de Corascen, estque illud cum quo vivificatur mel, & nominatur Tuber. Salomon eben habens: Nux hendem in Perside, est Tuber mellis, quod vivificat ipsum mel. Adfertur de Keruen, & vomitum ciet. Paulus: Ex sententia Galeni est sicca, modicè refrigerans, tollens impetigines, reslinguens calorem, & fluxum sanguinis comprimens. Liber de taltanethi. Hæc in Barbaria vulgato nomine dicitur Nux columbarum, & in Damasco Nux handen: de quibus vinum cange pronicitur in libras x. mellis: & in lib. j. minus tertiam aquæ calidæ, & agitur bene, postea cooperiatur vas. Ita vinum fit, quo Barbari utuntur Alchanzi: Impinguat & sperina auget. M. Iarugia idem ait, & modicè calidum dicit. Atabari verò & hæc tradit, & præterea addit libidinem excitare ad coitum, stuporemque dentium tollere. Rasis in libro aggregato: calidam & humidam dicit, & prohibere appetitum luti [an Picam?] *Hæc Serap.*

Audiamus & Avic. *B-z kenden* [vel *Kz kenden* Belhun.] id est, Nux hendem, est res levis sicut *Asue lutea*: in Rak. a vocatur stercus columbarum: in Bagaded, Nux handen: vel ut quidam scribunt Genden. Melior inter eas est Barbanca: sed Rakia inefficacior. Calida & humida est, in primo excessu: sunt qui tradant luites refrigerare, de quo nondum satis constat. Exicat & extinguit: quidam dicunt incidere sanguinem. Fit ex his vinum: Huius vini descriptionem tradit, ut & similis Serapio, scribitque uterque id & impinguare & vomitum ciet. Quod si hoc aliquid ad declarationem obscuræ huius Nucis historię facere queat, sciat lector *Asue* multis dici Muscum. Qualem igitur Muscum intelligat Avic. ut incomperum nobis, curiosioribus subtilioribusque considerandum relinquimus.

Quæ sequuntur ex alio Avic. loco, nempe lib. 2. tr. 2. c. 503. hanc historiam reddunt obscuriorem, scribit enim Nux hendem, est terra glutinosa, sicut cicer, alba, declinans ad citrinitatem, quæ defertur ex Barcha & Corascen, ex qua cum melle fit vinum. Paulus dicit habere virtutem refrigerandi, extinguendi, & exsiccandi parumper: Fluxum sanguinis inhibere: impinguare. Sanare impetigines, excitare coitum. Bellunensis ad marginem Avic. addit: Gianzi hendem totum hoc caput à Serapione accepit.

NVX VOMICA VVLGO OFFIC.
COMPRESSA, HIRSVTA.

CAP. CXLVII.

Epilasis vulgò Nux vomica nominata, orbiculata, nummo aureo quem scutatum vocant, æqualis, subinde minor, compressa, calaminum

F f i



scriptorium vix crassa, tenera, & tactu molli superficie villum holosericeū imitata, coloris ex casto cinerei, & vario lucis obiectu senidente, umbilico utrinque medium occupante, sed altera facie expressiore. Villus densatus comminuto Amianto similis quodammodo vel Cardo etiam teste. Fissa in geminas abiteu crustas, duntaxat ferè cornea,

colore ex fuluo cādicante, sapore insigniter amaro. Ipsa substantia tenui & confusu contumax, addidē solida lentaque est, nec nisi probè siccata frustula, & ea quidem ne vix ac ne vix quidem contundi, seu in puluerem redigi apta. Cū in duos orbiculos induntur, uterque in orbis circumferentia exiguum foramen habet, quo continetur, ut annotat Cordus, germinatur, & ex semine hoc fato exitur plantæ rudimentum: exiguo pediculo, & veluti paruo Tiliagineo aut Hederaeo, venoso, duplicique folio constans, tam exquisita perfectaque figura, ut cum veri solii consummata forma de perfectione certet: eius vnicā tantū pars, hoc est pediculus, prædicto foramine vel cauerna continetur, foliola verò duplicis fructus communiter clauduntur. Reperitur, sed rarius, formā oblongā. Vomica dicta quod vomitū ciere credatur, & solet.

Hæc itaque est *Nux vomica* quā hodie vtuntur officinæ, & quæ se vsum officinalis quo tempore testatur Cordus.

Nux vomica, inquit Monachi, quæ & *Castanea vomica* vel *Indica* dicitur, tenetur esse illa, quæ deservit ex Orientalibus plagis, quæ est velut placenta, denarii magnitudine, albicans, depressa & incurua. Non contrariante quoddam legatur in Serapione, esse maiorem *Auellana*, & quod in ea sint nodi. Nec etiam obstante quod in ipso Serap. & *Auic.* cap. de Nuce methel dicatur, esse similem *Nuci vomicae*, cū expressè videatur contrarium: forsitan quoddam vel uterque textus sit male translatus, vel quoddam ipsi intelligendi sint de virtutum seu proprietatum operationūque similitudine: alioqui in aliis qualitatibus in iis omnia vera competuntur.

Fuchsius *Tithymalum Myrsinitem*, cuius fructus *Caryites* [ut ille ait] dictus, esse qui *Nucem vomica*, *Germ. Bronághin* vocatam putent, tradit, nec refutat aut improbat, Quamvis reuera eorum opinio qui *Nucem* hoc cap. à nobis depictam atque descriptam *Myrsinitis* fructum putant, tam sit absurda, ut aliam refutationem non mereatur quàm lectionem utriusque descriptionis ab intelligente factam, in quo fortè aliquo pacto *Fuchsius* excusari possit, qui eandem hanc nostram *Nucem Vomitoriam* nuncupat.

Ryff. quoque testatur quibusdam *Tithym. Myrsinitis* fructum censei. Sed quibus?

Easdem Noces, uti refert *Matthiol.* memorant *Mauritani* quas vomicas & Metellas vocant. Sed

tam Officinæ quàm Medicorum vulgus has magno errore confundunt, quoddam plerumque legitimas vomicas *Metellorum* loco vsurpent, & contra *Metellas* nonnunquam *Vomicarum* vice [ut & cap. de Nuce oculata monuimus.] Nam *Vomicas* quidem eas appellant errore ducti, quæ *Lupinorum* instar compressæ sunt. *Serapioni* *Nux metella* arboris fructus est *Mandragoræ*, hirsuto cortice. Quas vomicas nuncupant, corticem hirsutum habent, facultatibus, non autem notis: ut quidam falsò existimant *Serapionem*, intellexisse, *Mandragoræ* fructus referunt.

Idem in post. com. Lat. & Ital. nunc primum intelligere scribit se in censendis *Mauritanorum* Nucibus *Vomicis* & *Metellis* in errore versatum esse. Credidisse enim noces quas *Vomicas* seplafix vocant genuinas esse *Metellas*, nec id sine ad stipulantibus indicis. *Nucem Vomica* quidem genuinam non esse *Auic.* & *Serap.* Itaque hanc caninam non vomica posthac appellare licet, quoddam canes deuorata, parua temporis morâ interimat.

Sed *Matthioli* seuernus ille censor *Guiland.* iam prius hanc opinionem priorem in suo *Theone* exploserat: *Nucem vomica* (inquit) falsò *Matthiol.* *Metellam* contra *Bellunenensis* sententiā decernit. Auctores habeo *Ebenbithar*, *Auic.* *Hæsen* & ceteros *Mauritanæ* Scriptores. Quæ censura coactus & plecter tandem suam opinionem retractauit.

Lacuna eandem pingit nomine *Nucis metellæ*, addicit *Pharmacopoeos* errare qui *Vomicas* vocent.

At *Amatus*, *Matthiol.* imitatus ait, *Nucem metellæ*, quæ vulgaris sit *Vomica*, similem dici *Mandragoræ* semine & virtute, non figura.

Nux metella vera Vomica Offic. Brēndāghin/ Lonic.

Aliquid noui importat *Anguil.* Non existimo, inquit, *Nucem vomica* communem, *Vomicam* esse nec *Methel*: non respondet notæ *Methelapitellexi* à *D. Io. Verelli* *Materano* *Apulensi*, *Nucem vomica* vulgarem radicem esse solis rotundis ac serpente: id si verum, certum nostram *Vomicam*, cū sit radix & non fructus, non veram *Methel*. Quidam volunt [addit idem] *Nucem vomica* vulgarem esse *Metel* veram: quod, ut verum sit, oportet secundum *Auic.* in ea contineri semen simile *Citro* aut *Mandragoræ*, quod non reperitur in ea.

Nux metel, autore *Crisalp.* vulgò & *Fungus Orientalis* appellatur osseum quiddam compressum, & circulare instar *Fungi* abiecto pediculo: aliud integro circulo, aliud deficiente ut *Luna* in centro apex quidam, in labro seminis medulla continetur, ob paruitatem invisibilis, ut in *Dactylorum* ossibus, quasi ab eis differat tantum: quia in *Dactylis* extrema ossis utrinque replicata sunt media quadam rimula constituta: in *Nuce metella* eadem sunt explicata & aperta, vnde circularis figura. Est autem id lanugine tenui obductum & candicante: vtuntur eo solum pro veneno ad canes interficiendos puluere inasperlo carnibus: idem pisces & aues obstupefacit. Putarunt quidam hanc esse *Nucem vomica* *Serap.* quæ describitur maior *Auellana* & nodosa, cuius corticibus pro medicamento vomitorio, non pro veneno utebantur: minore etiam fuerit quæ *Nux metel* apud eundem & *Auic.* traditur, fructui *Mandragoræ* similis, cortice scabro, licet ea obstupefaciens sit venenum, sed apud *Phn.* videtur inter *Palmæ* fructus poni, cū inquit, quibusdam osseum

Varicell.

Erymon.

Nux vomica offic.

Castanea vomica vel Indica.

Nux metel.

Fuch. not. Tithym. Myrsin.

Nux vomitoria.

Metellæ offic. er.

Mat. mauritan.

Nux canina.

Mat. maur.

Nux metella vera.

Nux vomica.

Nux vomica radicem.

Fungus Orientalis. Differentia.

Palmæ fructus.

officium continetur lunatumque, dente contra fa-
scinationes religione polium.

Amato
met. Acoſta Amato ſuccenſet, quodd, uelle putat,
exiſtimarit nucem Vomica & Metellam idem
eſſe, nec deſcribat plantam, quodq; referat quæ
Serap. dixit de Metella, quæ non ſunt diuerſa ab
opinione eorum, qui exiſtimant nucem Metel-
lam eſſe Stramoniam. Sed reſpondemus Aco-
ſta, Amatum ſatis demonſtraſſe, ſe non Stramono-
niam intelligere per nucem Metella: dicit enim
eſſe planam vtraque parte, quid minus Stramono-
niz fructui, quid melius competit Metellæ?

Acroſta
met.
Compila-
tor Hiſt.
Taber. met. Tabern. ait, ſe proponere duo genera Nucis
vomicae Brænaugen, ut figuræ demonſtrant.
1. genus Apothecariis dicta *Nux vomica*, verum
eſſe Nucem metellam: nam Nucem vomica eſ-
ſe Serap. &c. Sed is, quicumque tandem fuerit, qui
in lucem omiſit partem tertiam Hiſt. Tabern. eum
alibi paſſim, tum etiam hoc loco ſummam igno-
rantiam ſuam in re herbaria prodidit: & cur in fi-
guris dicit poni duo genera Nucum, quum ſint
quinque figuræ vnius eiſdemque fructus: præ-
terea quem pingit, non conuenit cum Metel. fru-
ctus quem vocat Nucem vomica Serapionis eſt
in hiſtoriz eius alio loco inter fructus peregrinos
numero vi.

Vires & v-
tes. Porro Noces vomicae vulgè nuncupantur, ſi
Matth. credimus, oleoſæ & guſtui non ingratæ
facultatibus, non autem noxiſ [ut quidam falſè
exiſtimant Serap. ſcribentem de nucem Metella in-
tellexit] Mandragoræ ſuctus referunt, eum au-
thore Serap. quarto refrigerent exceſſu, ita ut
drach. u. pondere eſicantur interimant, minore ve-
rò menſura temulentiam faciant. Quos quidem
effectus præſtare videmus non modò in canibus,
ſed etiam in hominibus, quibus hæc data fuerint,
quas vomicas eſſe contendunt. Verum iam antea
oſtendimus Matthiolum mutata ſententia non
exiſtimariſſe amplius nucem Vomica vulgarem
eſſe nucem Metel.

Matth. met. Illud notandum præterea, nos nucem Vomi-
cam vulgarem, de qua hoc loco agimus non o-
leoſam, & guſtui non ingratam, ut Matth. ſcribit,
ſed ſubſtantia corneam, & guſtu peramaram cum
aliis multis non deprehendiſſe, ut & lingua & o-
culi Matth. ſeſſiſſe videantur, quando de earum
qualitatibus decreuit.

Nux Vomica
ca narcoti-
ca. Cæterum nucem Vomica Narcoticam eſſe,
& vel opio deteriore, de quo prius dubitabat
Geſnerus, tandem factò experimento certius co-
gnovit hac ratione. Drach. ſemis exhibitam, canis
cum carne cruda deuorauit, poſt horæ quadran-
tem obdormiit, & inter dormiendum modò ca-
put mouebat, & conuelleretur, modò tibiaſ
anteriores, modò poſteriores, tandem poſt ho-
ras quatuor extinctus eſt. Tum ruriſ alter etiam
cani tantundem huius nucis ſimiliter dedit, &
poſt horas ſerè tres, cum grauiſ ſymptomata i-
pſum iam inuaſiſſent, Antidoti Saxonice Moiba-
ni drach. ſemis cum carne exhibuit, quod remo-
dum cum deuoraſſet, ſanatus eſt, & nihil mali
paſſus eſt, eſſi non euomuerit, forſè quòd tar-
dius antidotus data fuerit. Cani aliquando bene
magno atque robuſto, Anatomiz, in gratiam ſtu-
dioſorum, deficiente humano ſubiecto, deſtina-
to, integram exhibuimus cum caſeo: ſed ea die
ex illa nihil mali paſſus, ſequenti tamè die ſomno
oppreſſum interfecerunt ſtudioſi, impatienter
moram Anatomice inſpectionis ferentes. Alia
vice, diſſecta & ſoluitur in minutiora quædam fru-
ſcula vna & ſemis data cum caſeo maſſicato, pau-
cis horis interfecit canem, ſed prædicto multò
Tom. I

minorem. Ne autem pereant nuci Vomica ve-
neno canes, antecula eorum vulneranda [ubi iam
geſtus & ſactus mitos inſanientium edunt] ita ut
ſanguis exeat, aut etiam pars eius amputanda.

Penultima
remedium.
Electuarium de ouo, quod tantopere de prædi-
cant aduerſus Peſtem, nucem Vomica recipit:
Quam bene atque prudenter, docti ſoli & cir-
cumſpecti Medici iudicabunt. Geſnerus tamen
dubitabat adhuc, ut ipſemet ſateretur in epit. quadam,
an vi refrigerandi in quarto exceſſu palleat, ſicut,
aiunt. Adolphus Occo in ſua Pharmacoſtatur Lu-
lium Alexand. ad ſe ſcripſiſſe Nucem vomica
ablegandam eſſe, nec ad compoſitionis vilius u-
ſum ad mittendam, quippe aduerſatur un ſemper
naturæ humanæ, nec quicquam tamen interea
vnum commodi allaturam: quæ doctiſſimi vi-
ri ſententia nobis perplacet: nec quinquam hæ-
tenus vidimus qui ſuo experimento aliquid lau-
de dignum illorum uſu profeciſſe prodiderit.

CORDIS FIGURA NVX, PLANA, CINE- RACEI COLORIS.

CAP. CXLVIII.

Descriptio
Oſtendebat mihi inquit Cluſ. Exot. lib. 2. cap. 26.
Ornatiffimus Vir Chriſtianus Porretus,
quandam Nucem planam, cineracei coloris, ſer-
mam cordis, ut pingi ſolet, referentem, & quibuſ-
dam locis tumefcentem, eamque adeò lentò cor-
tice conſtantem, ut maxima cum difficultate ape-
rire poſſem, ad obſeruandum quid contineret:
reperiẽbam autem ſub eo alium corticem, non
minus lentum ſuperiore, ſubſtantiæ coloris, tegẽ-
tem nucleum candicantem, ſaliſ ſaporis, inuolu-
tum ruſcente membrana.

NVCVLA TAPHET HERC. SAXONIAE.


CAP. CXLIX.

Descriptio
Taphet nomine ab inſigni viro & Med. Herc.
Saxonia miſſa Nucula, amplitudine ſua vn-
guem medii digiti æquat. Selliſ eſt modicè, in
gibbum hæmiſphæricum penè elata, ita ut per
medium ſectum globum ſerè repræſentet. Corti-
ce munita eſt duro, cinereo, perinde atque Nux
hiſſuta, Vomica Offic. dicta. In centro partis
planæ foraminulum umbilicale impreſſum. Sub-
ſtantia interna nigra eſt, duritiæ cornea, ſine ſapo-
re notabili. Ad quod genus fructuum aliud refe-
renda ſit, quàm ad Nucem prædictam, nondum
conſtat, ex cuius forſè familia & claſſe & hæc vna
eſſe poſſit. Lectoribus tamen proponimus diſcu-
tiendum, an Cluſ. Exot. lib. 2. cap. 9. non memine-
rit huius Nuculæ in deſcriptione ſequẽtis fru-
ctus.

FRUCTVS ORBICVLARIS, PEREGR. CVM GRANIS NVCIS VOMICÆ ſimilibus?

Descriptio
Anno 1597. Amſtelredami oſtendebatur mi-
hi, inquit Cluſius lib. 2. c. 9. ab honeſto viro
Stephano Iohann. Scharm Pharmacopæo orbicu-
laris & ſphæricæ prout figuræ quidam fructus,
quem nauigatione Batavorum prædicti anni ex
Iava allatum aſſerebat: illum tamen oſtenſum
Ff 3

Descriptio




coniecturam facere licebat. Ex illo postridie petriso, educta sunt multa grana plana, nucis vomicae formam perbellè referentia, nisi minora fuissent, & oras minus crassas habuissent, saporè quoque minimè ut illa amarum: olea tamen eorum dunties.

FRUCTVS EXOT. LATVS COMPRES-
SVS, COLORE SVBERIS.

CAP. CL.

Descriptio



ut altera facies concava, altera in gibbum sublata atque convexa videatur. Cortice constat colore suberis ferè, non valdè duro, sed vel metliocri compressu fragili, nucis Auellanae crassitudine, fungoso quodammodo: sed interior pars magis fungosa est, sulca, insipida, quia euania, & magna ex parte caua. Quæ ratio quod & ipse fructus pro sua magnitudine admodum sit levis.

LIGNVM MOLVCENSE, PAVANA DI-
CTVM, FRVCTV AVELLANÆ.

CAP. CLI.

Descriptio

ARbor est domestica, Mali cotoneæ magnitudine, cuius folia Malus vulgaris folius sunt

Indis qui ex Iava adducti erant, negarunt apud se natum sed è Madagascar insula delatum. Dimensi autem siue per longitudinem lineâ ductâ, siue per transversum, ambitus erat pæne uncia novem, nonnihil tamen striatus erat, circa eam partem quâ pediculus adhaererat, coloris fusci, levis & intus cauus, aliquid tamen continens, ut ex strepitu quæ agitatus edebat,

similia, fructus verò Auellanis, sed minor, molliore cortice & nigricante, Costa: qui Lignum Molucense vocat: & cum istic gubernaret Lud. de Tuyde, ipsius nomine hanc arborem dictam fuisse testatur. Lignum Molucense Hist. Lugd.

Inuenitur in Moluccis. Seritur, coliturque in hortis diligenter, nec alibi facillè inuenias: tanti enim ab incolis æstimatur, ut peregrinos ne ad eius quidem aspectum admittant.

Huius ligni [inquit idem Costa] periculum feci, cum in nonnullis ægris, quorum curam habebam in nosocomiis, tum in variis morbis, qui in longa nauigatione plerumque oriri solent, cum in Lusitaniam redirem: partim adiutus facultatum relationibus quas intellexeram, & utendi methodo: partim iis quæ nobilis quidam in Moluccis dixerat. Illius semen iam antè videram, mihi donatum ad aues capiendum: Etenim eo in aucupis utuntur non modò in illa regione, sed etiam in multis Indiarum provinciis, ad quas eius rei gratia, venale deferitur. Huius paucillum cum ortza costâ mixtum, auihus sylvestribus exponunt: quæ degustant, illud decidunt sopitæ & stupidæ: quæ verò avidius id edunt, moriuntur antequam illis auxilium præberi possit, quod est, ut frigida caput perfundatur. Graculi omnium citissimè eo degustato extinguuntur. Nunc ad salubrem huius arboris materiam accedamus, cuius paucillū hodie plurimi facio. Intus sumptum, aut foris appositum, omnibus venenis resistit. Interdum assumitur magno comòdo ex aq. rosæ vel vulgari, auiūque iuculo, eius pulueris apta quantitas pro necessitate, & ægri natura, modò decem grana non excedat, sed infra id pondus consistat, & vipera- rum, Regulorum (qui serpentes pileati appellatur, & ad voduū noxii sunt) aliorū neque similibus aspidum aut serpentum morsus: Bibitur hic puluis ex aqua, ipsiusque moribus inspergitur. Eadem ratione præbent in vulneribus, quæ à sagittis toxico illius facta sunt, quibus illius regionis incolæ plurimū viuunt. Pulverem verò ex hoc ligno sibi parant lima è pelle martæ caniculæ confecta, aut tenui aliqua ferrea lima. Robustissimo cuique dimidiū eius scrupulus ex aqua limpida tepida aut rosacea, aut gallinarum iuculo tepente, summo mane datur, cætera autem diei præcedentis parca esse debet: euacuat enim omnes humores, præsertim crassos, lentos, & melancholicos: conuenit quartanis diuturnis, febribus continuis, Iliacis Colicisque doloribus, flatibus, hydropis, arenulis, renum calculis, vrinæ difficultatibus, & vixissimæ cholericæ passioni, atque morbis, veluti articulorum & gibbarum inueteratis doloribus, scythicis & serofulis. Omnis generis lumbricos necat, & appetentiam deiectam reuocat: & si nimia fiat euacuatio, bibat æger dimidiū Cyathum Cania, hoc est, decocti Orizæ, aut auiculam comedat, subito cessabit, quod sanè multa laude dignum est, paucisque medicamentis vulgare, ut in potestate sit medici aut ægri, purgari quantum cupierit. Huc accedit quod neque foetorem, neque tædium, neque metum, dum sumitur, pariat, possitque sine Dieta obseruatione, etiam iis qui sua negotia foris peragunt, propinari, ut ex iis deprehendi, qui vna mecum nauibebantur, nullum sentientes incommodum, tamen illi, dum purgarentur, nulla Dieta vterentur, viuerentque solutissimè. Obseruaui etiam illius præstantiam in inueteratis capitis doloribus, hemiplegia, apoplexia aurium tinnitu, arthritide, Ventriculi & vteri affectibus & asthmate. Propter

Vires & Vfus.

Semen. id aucupia.

Vtendi modus ad aucupia.

Ligni facultates. Ad venena.

Vt admissio in medicinis.

Ad serpentum morsus.

Vulnera. Generata. Pulvis.

Purgat. Quartana. Feb. Continua. Colica. Hydrops. Calculus. Vrina difficilis. Cholerica. Pajie. Arteriole. Scrofula. Lumbrici. Appetitus. Cania. Placens. Medicamentum.

Dolor. Cap. Apoplexia. Aurium tinnitus. Arthritide. Venter. L. V. ter. Asthma.



THE
LIBRARY
OF THE
UNIVERSITY OF
MICHIGAN



lum, cum tamen tenera herba sit annua, ideoque duplici ratione à frutice vel arbore distat. Plin. verò non herbam, sed arborem intellexit, quamvis fruticem nominet, quod constat, quia sua verba ex Theoph. transcripsit, qui de arboreo tradit non de herbaceo Gossipio, quamvis sub alio nomine, ut patebit postea.

Matth. tamen &iple de herbaceo tradens, de hoc, inquit Plin. ait: Parvulus est, similisque Barbatæ nuci defert fructum: ex quo patet Matthiolo, ut plerisque aliis, non fuisse cognitum, Gossipii diuersas fuisse plantas, herbaceam scilicet, & arboream, eique tantum herbaceam cognitam fuisse, quæ non cõuenit cum *Barbatæ nuci* Theophrasti. ut Matthiol. suspicari videtur, quamvis neget prius Græcis cognitum Gossipion seu Bombacem, licet & Fuchl. Lacun. At non fuit Theophrasto, nec Suidæ, neque Polluci, saltem arboreum: & iam antea monuimus Diosc. cognitam Bombacem. Apud Plin. verò nec fruticem exiguum, neque fruticulum, neque fruticem simpliciter legimus, ut ex eius verbis quauis à Ruellio (plantam non sibi cognitam, sed eandemmet cum Plin. describente,) licentiosè non nihil commutatis liquet: neque verò etiam parvulum apud eundem legitur, ut Matthiol. citat, licet compilerator Hist. Lugdunensis eandem vocem retinuerit, manifesto argumento ex Matthiol. potius commentis, quam ex ipso Plinio, Plin. transcripsisse verba.

A mali Cotonei similitudine id quod in hoc fructu gignitur, aut à pocilli forma, vulgò *Cottonem* vocatum Ruell. existimat: aliqui *Girbanem* à *Girb*, cui similem serè gerit in capite folliculum, appellant. Videtur tamen Ruellius suspicatus, (si ingenuè fateri velimus quod res est) nec obscure, Gossipium in diuersis nasci plantis, quamvis arboreum non agnouerit. Nam postquam aliquoties fruticem dixisset, subdit postea, gigni etiam in quadam arbore &c. de qua mox: & addit: Theophrast. lanigeras Indiarum arbores demonstrare Mori folio, corpore autem Cynorrhodi.

Cæterum meretur sanè Monachorum diligentia hoc loco Celebrari, qui Bombacem seu Cottonem uti vocant: ita scriptis tradiderunt. Lanugo ipsa (si ita dici libet) ab omnibus cognoscitur, quia in multis habetur usus. Est enim simillima bombycis serico albisimo. Planta autem ipsius non ita cognoscitur, quia non ubique provenit, sed in regno Apuliz copiosè. Bicubitalis herba est, & ramosa, effigiem parui arbuti ferens. Radix dodrantalis, alba atque lignosa. Folia ut vitis habet, minora valdè. Flores fert mellinos, è quibus scapi ad instar Nucis vsualis (luglandis) trifolii prodeunt: & in eis semen uti semen Citri, minus tamen & ordinatè positum, lanugine dicta vndiq; obductum. Qui scapi maturationis tempore, lanugine dicta intumescere, tripertitè diuiduntur, (nos & quadripertitos habemus) & tanquàm flos niueus, lanugo ipsa *Bombax*, seu *Bombax*, quasi *Bombyx* dicta vna cum suis granis siue seminibus scatet, ac inter de fluendum colligitur. Et licet ipsa *Bombax* sit albisima, ut nix. Semen tamen ipsum exterius vergit ad nigredinem potius, quam ad albedinem: interius verò est album, vinctuosum, gustusque non ingrati. Hallucinantur autem nonnulli putantes Bombacem arte dealbari. Sed scitote, ipsam à natura ita candidissimam nasci: in quo quidem dissidet à cæteris Lini generibus. Nam cum lauitur, non accipit, (quod nec potest accipere) aliquid albedinis: sed è contra amittit magnam partem sui nuci candoris, ut experientia testatur. Sci-

mus mulierculas quasdam lepidè deceptas, càm, nimis albedinis ornamentorum capitis illicio percussæ, ex bōbace telam texere curarent, ac eam multa lotionè rufescere, & pristinum nitorem amisisse aduertentes, ad Lini ordinariæ texturæ tandem redierunt. Hanc enim, quo sæpius lauetis, eò candidiorem efficies. Cæterum arte separantur grana ab ipsa bombace, hac ad lanificia, illis ad vsum medicum reseruatis, quamvis multa etià in ea residua inueniantur, nondum depexa: in qua, qui is indiget, semper inueniet.

Lacuna de eadem Plin. tradidisse scribit: sed fallitur existimamus enim Plin. de arbore scribere, quam in Arabia nasci tradit.

Eodem errore decepti, Matthiol. Rob. Const. & alii. Dod. Gossipion arborem lanigeram Theophrast. vocat, quamvis ei arbor nequaquam cognita fuerit, cuius ignorantia effecit ut etiam Theophrast. tacitè carpere voluisse videatur, quamvis intempestiuè, quando inquit: nec mirum videri debet, si stirpem incognitam & in remotis regionibus nascentem arborem esse putauerit, cum & hac ætate, quæ plurima in cognitionem venit, lanugo huius *Baumwoll* / id est, arborea lana à Germ. appelletur: quasi insinuare velit incognitum fuisse Theophrasto, esse herbam, cum ipsemet potius Dod. ignotum fuerit, esse etiam arborem.

Pena & Lob. lubenter Gossipium herbaceum voluissent Dioscor. facere Gnaphalium, aut eius speciem, & per descriptionem licetè putabant. Verum Theophrast. postea loco moniti, ad illius lanigeras vites referendam esse cõsuerunt, Theophrastique lectionem ibi corrigendam monuerunt, simulque Matthiol. reprehendunt, existimantem, nullam huius à Græcis antiquis factam mentionem. An vero Theophrast. vel Plin. hanc intellexerit alibi herbaceam Bombacem, nondum nobis innotuit.

Idem Pen. & Lob. *Sidew ientien* Guilandini dicunt, sed vel hic vel illi, vel utriusque decepti: non enim hæc arbor est.

Cæterum plantam istam Veteribus Græcis incognitam fuisse multi arbitrantur: sed illi, ex sententia Hist. Lugd. errant: quæ vult ad lanigeras Theophrast. vites planè referendam, ubi per fructum, non vescum intelligendum putat. At nusquam apud Theophrast. inuenimus mentionem factam Vitium lanatarum, sed arborum. Aut quidem folio esse vitis. Videtur Hist. Lugd. in hoc imitata Lob. & Penam.

Sed & ipse quoque Hon. Bellus vocis Bombacis seu Gossipii homonymia deceptus videtur, quando ait: Gossipium in Arabia & Egypto arborefcit & mukos annos durat: sed in Creta hyeme perit. Nobis verò dux diuersæ sunt plantæ, quæ non solum variant loco & duratione, sed specie ipsa. Illa enim Arabiæ & Egypti arbor est. Quæ in Creta perit, herba.

Cæsalp. in eundem impingit scopulum: sic enim scribit: Quamvis Serapio *Cotonem* seu *Bombacem* arborem tradat esse, non tamen putandum aliud genus Bombacis ostendere, quam id quod superius descripsi, [describit autem herbaceum] cum testetur eodem anno, quo facta est, Bombacem ferre, ac magis præferendam: sed apud nos aduentante hyeme pereunt ex toto eius plantæ, ob frigoris impatientiam. Fortè apud Plin. [addit] eadem sunt arbores, quas Gossipinos vocari tradit. At differt Gossipium Cæsalpini ab arbore diuersimodè: illud annuum & herba videtur: alteram arborum modo durat. Figura etiam istius specie ipsa diuersa, ut dictum: suntque folia arboræo

Matth. not.

Differencia

Matth. & Hist. Lugd. not.

Erymon.

Gubon.

Descriptio Monachorum.

Citrifolia.

Semen quale.

Lotione amittere albedinem.

Lacuna not.

Matth. & Const. not. Arbor lanigera.

Gnaphalium.

Vites lanigeræ.

Matth. not.

Lob. Pen. & Guilandini not.

Hist. Lugd. not.

Hon. Bellus not.

Cæsalpini error.

Cæsalpini not. In quibus differant Gossipium herbaceum & arboræo.

creo glabra : loca item ubi proueniunt diuersa, neque mutantur transplantatione in se inuicem. Quid? quod ex ipso etiam Serap. manifesta appareat distinctio, vti patebit ex eius verbis postea citanda.

**Synonyma
linguar.**

Porro et si Gossipium herba pletisque Veteribus Græcis incognitum fuisse videatur, nominum tamen Græcorum stipatu neutiquam caret, quæ sibi communi iure cum arboreo vindicasse videtur. Appellatur enim *βόμβυξ* siue *μύμυξ* & *μύμυξ*, *βόμβυξ*, *βόμβυξ* Suidæ. Vulgò Herbarius *βόμβυξ* *βόμβυξ* Pollux etiam *βόμβυξ* vocat. *βόμβυξ* Nico. Myrepsus : *βόμβυξ* quoque ipsam lanuginem Iuniconfultus, & ex eo Had. Iun. Latinis *Xylon*, *βόμβυξ*, *Bambax*, *b. myx*, *bombax* : vulgò etiam *bombax*, *bambaxium*, *b. myx*, *Cotton* vel *Cotte*, *ni* : seu *Cotton*, *ni*, seu *Cotton*, *ni* : seu *Cottonum*, *ni* : & alia plura pro vno & eodem, scilicet bombace, testibus Monachis in Mes. à iunioribus accipiuntur. Priores autem Latini prædictis serè Græcis nominibus vsi sunt : quidam *xylina* & *gossipium* dixerunt. Barbaris & Arabibus *cotton* & *bombax*, & *bombaxium*, & *bambaxium*. Sed genuino suo idiomate *bahlabah* : Troglodytz *bafur*, teste Scaligero. Ab hac planta ueltes *xylina* & *lina xylina*, nominantur. Iuniconfultus lanam eius *lineam* nuncupant : Syri *cot* : Gal. *cotton*. Ital. *c. tunc*, *bombace*, *bambaxia*. Hisp. *algodon*. Ang. & Belg. *Cotton* : His verd magna ex parte *Boommol* / *cotton* & *bombax* dicitur. Germ. *Baumwoll*. Boh. *Bawelna* : *Aegyptus* *Gnæsegia*, ut scribit Alpinus. Vngar. *Gyapott*. Olim, auctore Lacun. plantabatur solum in Aegypto, nunc serè per totam Europam habetur. Nam & in Gallia nasci, ex Italia delatum, Ruellius testatur. Fusch. nunc in Germ. hortis plantatur : qui tam ferulem tradit esse hunc fruticem, ut simulatque adoleuit, quod duorum sit spatio mentium, nunquam desinat florem & fructum proferre, donec asperitate & inclementia hyemis impediatur. Italia, ut scribit Bellon. tempore Romanorum abundabat *cotton* : nunc nulla planta inuenitur. Inter Marat & Halepum abundat. In Creta, insula Lemno, inter Hierosolymam & Damascum magna copia feritur, ubi pleni agri conspiciuntur, magnique ex eo fiunt redditus. Seritur & hac ætate in Cipro Maltha & Sicilia insulis, ubi copiosissime prouenit, quemadmodum & in regno Apuliz. Denique calidis gaudet locis Gossipium, inquit Alpinus, Aegypti ad ipsorum vsum aliunde aduehunt : neque enim apud ipsos herbacea illa planta, ex qua Syri vel Cypri Gossipium colligunt, nascitur, sed tantum quæ arboreus frutex est.

Tempus.


Seritur in Apulia Febr. vel Martio mensibus. Colligitur Septembr. & Octobr. testibus Monachis. Bellonio verd tradente, inter Marat & Halepum satum Maio aut Iulio, demetunt Septembri : nec manet satum in terra per medium annum, nam & in Creta hyeme perit, teste Bellon. In Germania Camerar. speciatim Norinbergæ ex semine prodiit & floruit, sed fructum ferre per æstatem fugacitatem non consuevit. Nobis quoque, ut Genevæ ita & Montbelgardi non semel creuit ex semine Massilia allato, & abundè floruit, flosculis pallidis, nucularumque primordia protrudit, sed subinde decidua, antequam grandescerent. Radice nitebantur profunda : Nouembri maruerunt. Creuit etiam Platero Basileæ. Solum amat tenue Cottonon, [quod nostrates [ait Quintin.] ab exotico animante detonsum credunt,] magis quam pingue, cælum utique siccum, vix

aliter habiturum Melitæ aruum. Miratus sum hoc quanquam calidius solum est, fimo misceri ab agricolis & stercorari, quum Sole statim inarescant omnia. Vere feritur, nec nisi pridie madefactum, & in aruo statim restibili [illo enim argum pinguescere ferunt] mox aratum integitur *Satio*, crate, vel rastro quod supertrahunt : suo saritur tempore, & runcatione quadam inuolubus herbis liberatur tam manu quam sarculo : dum vellitur, tunc pluuia horrent. Incolæ hoc maximè cupiunt ferere, & liceat : quoniam quæstus plus quam è frumento : cuius etiam admodum ferax non est insula. Hac vna re vel maximè felix, quod iuxta sita est Sicilia, solum omnium fertilissima, quæ illis pro horreo est, fame alioqui penuriz. Et paulò post Biferæ arbores, binæ sæpè messes : demissæ enim hordeo, mox *cottonum* succedit, vel Hordeum *grano*, aded terræ non cessat parere.

Quod ad vsum attinet, nullum Lini genus est, *Vires & sus.* quod huic candore & molliora præferatur, quam firmitatis in eo parum esse videatur. Exaltat auctore March. planta ipsa, & siccat. Vsa sitit sanguinis profluuiis : & præsertim in vulneribus. Seminis medulla dissidentibus & difficulter spissantibus mitis auxiliatur : genituram quoque auget, proinde Venærem stimulat. Osum è seminis medulla expressum lentigines, alphas, & cæteras cutis infectiones delet. Eiusdem lanugo manifestè quoque calefacit ac siccat : quæ si comburatur, mirum in modum inuicentem è vulneribus sanguinem sistit. Eadem accensa, & naribus suffita, vteri strangulatus auerit. Oleum seminis palpebrarum quoque asperitates lenit. Cottoni semen gratissimum præbet pabulum bubus, glandis sapore, Quindinus. Iuba ex eius lanugine tradit fieri lintea Indicis præstantiora. Lanugine eadem hodie passim vtuntur ad faciendas vestes fouendi caloris ergò. Fiunt & lintea ex ea diuersi artificii, ut femoralia, quæ *brachas* appellamus, siue subligacula, quæ sunt muliagi coloris, ut puniceæ & albicantis, nec non vermiculati. Nigritia etiam locupletioribus omnibus est habitus *ex Habit.* cottonina quadam alba admodum, quæ instar camisæ vestem eis suppeditat. Reticula quoque quædam magna ex bombyce parant Insulani fortunati, quæ in aëra suspendunt ac in illis dormitant. Ex relatione Lud. Rom. Lineis vestibus [verum verticoribus, amictuntur milites Sultani vrbs Aden in felici Arabia, arcendi algoris gratia : Xylon siue Gossipium, Neoterici bombicem appellant. Sunt enim gossipiorum huiusmodi vestes prælio namando non ineptæ, quas ob id iuri in bella eblamydis loco induunt. Idem Regi ac Reginz vrbs Calechut, incolisque, idolorum cultoribus haud dubiè dissimilis non est habitus : quippe qui Gossipino, haud sanè serico panno oblecta tantum velant : Chirurghi quidam solent *Chirurgi error.* post sectionem venæ bombacem applicare, quod ego rarè fieri velim, filamenta enim quæ vulnus ingrediuntur, conglutinationem retardant, & interdum in causa sunt, ut in eo aliquid puris generetur. Si tamen amplior sit sectio, & periculum ne vena iterum aperiatur, applicari potest.

XYLON ARBOREVM

Descriptio



Xyli arborei
Adolecenti-
orem plantu-
lam munere de-
dit D. Zuinge-
rus in horto
suo natam: cui
radix simplex
& singularis,
gracilis, palmū
longa: & cuius
capite duo ra-
muli prodeunt,
vnciales circi-
ter, foliis dona-
ti pulchris, vn-
cia minoribus,
ad Tuliz pri-
mū pullulan-
tis folia nonni-
hil accedentib*,
glabris, diuisura

tupior, profunda, acuta, vna in vnāquāque
femina excurrente, tacto idem nervis distin-
ctis. pediculis harentibus femina longioribus.

Alp. m.

Manifeste differt hoc Xylon arboreum ab her-
baceo, cui folia hirsuta non glabra, quā tamen
non dubitauit Alpinus, paucis his eam de-
scribens: Gossipium Aegyptiis est arboreus frutex,
in quibusdam tamen in viridariis proueniens, plu-
ribus annis vivens, dissimilis ab herbaceo tantū
proceritate caudicis, ramorum atque foliorum fi-
gura. Crescit ad decem vsque cubitorum altitu-
dinem, stipite ramisque duris lignosis, eandem
quam herbaceum fert lanuginem: quæ ob modi-
cam per se ipsos quæritatem in vsu non est.

Lanigeræ
arbor
Theophr.
Bellon.

Hoc *didger laniger* est Theophrast. quod sic
describit. In Tylo insula (quæ in sinu Arabico
est, parte ad Oriente spectante) lanigeras arbo-
res plurimas nasci proditum est: hæc folia habent
Vitis, verū minora: fructum nullum. [*ἡ δὲ τῆς
ἀντικειμένης τῆς Ἀραβίας*] Id quod Lanam continet.
Mali verni amplitudine est, clausum ac velut in si-
num contractum: vere compressum, maturitate
se recludens, unde lana eximitur, ex qua telas
texunt, aliās pretiosas, aliās viliores. Hoc idem
in India sit, & in Arabia. Quo loco obscuritas de-
claranda. Nam quid hoc est dicere, nullum fere
fructum, & fere aliquid Mali magnitudine, clau-
sum, in quo lana? Sunt qui ita explicant, nullum
fere fructum vescu. Sed hoc non satisfacit. Fru-
ctus enim essentia aut ratio formalis non est, vt
sic vescus: suntque fortè non pauciores non ve-
sci, vescis. Scaliger hic nihil olfecit. Nos ita le-
gendum ex re ipsa censemus. [*ἡ δὲ τῆς
ἀντικειμένης τῆς Ἀραβίας*] ita vt *ἀντικειμένη* expungatur. Sic consentiet lectio
Theophrast. cum re ipsa.

Theophr.
correct.

Eadem ex Theophrast. Plinius transcripsit, his
verbis. Tylos insula in eodem sinu [Arabico] est,
repleta syluis, quæ spectat Orientem, quæque &
ipsa æstu maris perfunditur. Eiusdem insulæ ex-
celliore suggestu lanigeræ arbores alio modo,
quàm Serikon. His folia infœcunda: (Lana secus
quā a) ud Scras, quorum in tractu Laniferæ ar-
bores folia lana operta gerunt. Dalechamp.) quæ,
si minora essent, Vitum poterant videri. Ferunt
Cotonei mali amplitudine Cucurbitas, quæ ma-
turate ruptæ ostendunt lanuginis pilas, ex qui-

Plin. i. l. 16.

bus vestes pretioso linceo faciunt. Hanc & ali-
bi pauld aliter sic describit: Superior pars Æ-
gypti in Arabiam vergens pignit fruticem, quem
aliqui Gossipion vocant, plures Xylon, & ideo li-
na inde facta Xylina. Paruus est, similemque bar-
batæ Nucis desert fructum, cuius ex interiore bō-
byce lanugo netur. Nec vlla sunt eis candore
mollitiæ præferenda. Mirum verò Plinium Xy-
li herbacei non meminisse: an quia suo seculo nō-
dum sereretur, aut ipsi saltem nondum innotuis-
set: an, quod verisimilius videtur, quod non a-
gnosceret discrimen. In Aegypto autem arboreū
nascitur, non herbaceum, vel Alpino teste.

Gossipion?
Xylon.

Bombax?

De eadem arborea intelligendus Serapio, sic
tradens: Cotton, id est, Bombax: Narrant quidam
medici de Kelbe, Cottonem nasci apud se in arbo-
ribus Antiperficorum similibus, durareque vigin-
ti annis. Præfetti nouum & recens, debitoque an-
ni tempore plantatum.

Cotton?
Bombax?

Scal. de arborib. Eriophoris Theophr. tradit qui-
dem: at non demonstrat an eadem sint cum Gos-
sipio, quamuis id insinuare videatur.

Dalech.

Mathiol. verò cum Xylon siue Gossipium à
Theophrast. *didger laniger* appellari ignoraret
[inquit Guilandinus in suo Theone] pñcis illis Græ-
cæ hominibus silentio præteritum assumere
non erubuit. Ipse verò etiam Guilandinus non
demonstrauit discrimen inter Xylon herbaceum &
arborem Laniferam Theophrasti. Apud Indos,
inquit Gorop. delicatissimæ vestes in arboribus
crescunt, Lana Xylina, & Bombycis tela, de qua
falsò credidere Veteres, arboribus depecti sole-
re, in quibus fuit Virgilius:

Dalech.

Guilandinus?

Virgil.

Velleræque ut / his depectunt mollia Seres.

Sciunt arborem esse, cuius Nux lanas inuoluit, &
quibus fiunt telæ mollissimæ hoc tempore Coto-
næ dicunt. Item in Vertumno.

Ceterum huius arboris laniferæ [vt annotat
Bellon.] primò mentionem fecit Herodotus,
quem postea secuti sunt Theophrast. & Plin. ac
plures alii, estque è numero semper virentium.

Bellonium carpit Bellon sic scribens: Bellon.
fuit sub arboris Lanigeræ nomine intelligit fru-
ticem *Offar*. Si verò hanc Lanigeram Theo-
phrast. aut Plinii esse putauit, valde hallucinatus
est: Lanigeræ Theophrast. nihil aliud sunt quàm
Gossipium, quod in Arabia & Aegypto arborefcit,
& multos annos durat: sed in Creta hyeme perit.
Hæc ille. At nobis sanè omnia quæ scribit Bellon. de
arbore Lanifera, videntur conuenire cum Xylo
arboreo, à quo nec Alpinus dissenit. Ipse verò
Bellus hallucinatus nobis videtur, opinatus Æ-
gypti arbores laniferas easdem esse cum Xylo
herbaceo Cretensium, quæ opinio in superiori-
bus sufficienter refutata.

Serapion?
Bellon.

Bellon.

Bellon. de
fenderat
aduersus
Bellon.
Bellon.

Casp. Bauh. Gossipium alterum arboreum vo-
cat. Eadem denique nomina atque Synonyma,
linguarum quæ suprà herbaceo assignata sunt, &
huic conuenire possunt, si arboris differentiam
addas.

Nascitur in Aegypto & Arabia, autoribus Al-
pino & Bellonio, qui & in hortis Cauri altitudi-
nem hominis excedentes inuenisse tradit, quæ
hyeme non periret: & in Arabia ignem fecisse ex
ligno arborum Laniferarum. Creuit hæc Anno
1595. in horto Cl. D. D. Zuingeri, Basileæ quam
mense Augusto in spiritum eam ferè altitudinem
excreuisse vidimus, paruulamque eius plantulam
iconi adiungi curauimus. Qui verò fructus in ea-
dem depecti sunt, mox describentur, à Xylo vtro-
que iam dicto diuersi.

Loca?

Vires & v-
sus.

Plinius eius lanugini candore mollitiæ nō-
lam











Flores numerosi, tenuibus quibusdam villis appensi laxent, in magni racemi modum, facie crocinis similes, sed multo minores, colore albi.

Ipsa verò vagina, Elate & Spatha pñcis scriptoribus dicta, flores & fructuum rudimenta primò claudens, mox hians, diuicias reconditas ostēdens, quale nos habemus, pedale quiddam est, tres uncias latum, modicè compressum, sed in medio nihilominus protuberans, utroque extremo angustius, in eus cauum, substantia corticosa, arundinaceam diceres: hanc nouo accedente vere, [vt Marcell. ex eorum relatione qui diu in Aegypto & Syria fuerunt, testatur.] cum noui in hac arbore fructus appetunt, tumet in summo trunco Palmæ, qua parte folia simul & fructus nascuntur, velut in frugibus spicarum vagina: & in utroque Dracunculo seminis corticosum inuolutum, tenera primum, mox lignola materia, quæ usque dum flores prodeunt cum latitudine aliqua in longum procedit: prolatis deinde floribus, & post flores racemoso Palmularum fructu arescit: reliquaque in arbore sequenti anno aufertur, non aliter quàm putatione, inutilia sarmenta in Vitibus nostris per ver aufertur.

Hanc florum & fructuum, vt ita dicamus, vaginam Theophrast. quoque expressit, inquit: maximè propria & peculiaris (ιδιότης) cum respectu reliquorum leminum cum eorum quæ ex ligno consistat fructuum (καὶ τῶν ἐκ ξύλων) est Palmæ generatio. Non enim à vetulis, nec à nouellis [germinibus] fructificat, sed à rudimentis &c: Inter alios quippe ramos virga [καὶ ῥαβδόν] oculū relictis dicere, nisi Græcum prohiberet] quæ fructum gerit, quemadmodum spica, (καὶ ὡς σπικὴ) erumpit. Cuius rei causam arboris siccitatem quis dixerit, & totam ad eò eius formam. (καὶ τὴν οὐρανίου μορφήν) Cum enim fructus egeat munimento quopiam ad conseruationem, & cum editi sunt, & cum exeunt: aliarum arborum fructibus hoc præsidium in frondibus comparatur: in Palma verò quoniam non est secundum frondem fructus, necesse fuit in ipso sinu confirmari atque consistere, vt non tener, sed validiusculus prodeat in aerem. Idcirco iunctus in cognato atque sibi necessario (καὶ τῷ συγγενεὶ ἀναγκαίῳ) (quasi gremio primò conceptus atque inchoatus, postea editus est, fortasse quia frugibus inspiciendis in morem eius fructificatio peragi debuit. Ergo si fructificatio hæc similis est spicarum fructificationi: quoniam hæc spicarum editio communis & multis: communem quoque cum illis multis Palmæ fructus causam obtinebit. Quod si soli Palmæ id contingit, priuata causa exquirenda erit. Mirum tamen inter omnes arbores soli Palmæ id euenire: nam si quid peculiare eueniat in congenerum aliquo, id verò iure quodam admirationem meretur. Quamobrem de hoc amplius cogitandum.

Ceterum Palma, vt idem Theophrast. fusè passim describit, ex earum arborum numero est, quæ semine exeunt: auctu difficilis, perpetua fronde, virens, & sola inter arbores nullis ramis consistit, prævalida alioqui ad sustinenda pondera, non enim flectitur deorsum, vt cætera ligna, sed pondere retinendo sursum incuruatur, materie tamen est leui, tractu facili ac molli, quemad. Suber: sed melior Subere, quia lenta: Suber enim fragile est: [Spatha]: non rigidum, vt Gaza vertit ex sua opinione, nec ad mentem Theophrasti.] quamobrem simulachra nunc ex Palmis faciunt, præta Suberis materie, vt incommoda. Neros non

per totum corpus diffundit, neque prolixos extendit, neque eodem positura modo cunctos porrigit, sed multifario. Siccari hæc materies potest, cum dolatur & ferratur. Vim genitalem in vertice candido tanquam in capite gerit, in quo medullæ copia continetur, quod cerebrum Palmæ [καὶ ἐν τῷ κεφαλῇ] vocatur: hinc & folia & fructus exeunt, quod cacumen si quis auferat, sterile scire videtur, nec nõ penitus interiore. Caudice seu trunco assurgit simplici [licet alicubi etiam bifidus & in plures partes diuisus assurgat vt dicitur postea] recto, firmo cortice scabro & veluti quæmmiss obducto, ligno neruoso, vt dictum, hinc tamen medullæ discrimine. Virgæ quas emittit foliis vestitur, harundineis, sed multis ex vno pediculo lignolo & crasso aculeisque prodeuntibus in multam longitudinem, angustis [sibi inuicem cum adhuc nouela sunt cohererentibus, colore subalvido, inodorus, [cultellos vocant, quos in sacris mysteriis vnâ cum Olea sumunt] villia ad nexus, & ad leuia capitis umbracula texenda. Eadem postea explicantur duriora esse & ac viridiora, inflexaque ad latera, ab eis ex medio stipite lucrescentibus. Figura folii explicati, qualis hominis Palma, (hoc in Palma, humili potius obseruatur, de qua postea) sed longissimis digitis numerosisque quandam differentias multas sortitur. Quædam enim etiam explicata nunquam tamen inuicem disjunguntur, vt in modò natis aut nascentibus Palmis omnibus, & in quodam genere peculiari: quædam diuiduntur, sed aliqua tantum parte, non ex toto, vt relinquat palmæ manus latitudinem, præter digitos, vt in humili genere apparet: quædam ex toto disjunguntur usque ad pediculum, vt in Palma, quæ dactylos fert, quæ hoc capite descripsimus & depinximus. Hæc in arborem prægrandem assurgit: cui folia ad longitudinem quatuor cubitorum, & cum sua virga incuruata veluti in orbem sparguntur, (cuiusmodi ramum pictura exhibet) quod Palmæ ramos vocant. His præteris vestigia in caudice frequentius relinquuntur ad scandendum opportunissima: vt pulchrè obseruari potest in eleganti & procerâ illa quæ in domo cuiusdam Patricii Montpelii visitur] alioqui si derelinquantur, impenetrabili vallo scandentibus aditum intercludunt, [vt in iuniore illa, quæ in horto Cl.D.D. Hütcheri professoris Regii & Cancell. Med. Vniuersitatis Montpel. conspicitur, annuaduerti potest, & quibusdam etiam aliis locis Narbonæ.] Fructus racemati velut ex Miliis iobis dependent, prodeuntibus non ex medio cerebro, vnde nouella exeunt foliorum germina, sed à latere. Vestitur initio racemus tunica conuoluta, similitudinem gerens ensis cuiusdam lati, sua vagina inclusi, (antea ex eodem Theophrast. diximus, &c. Spatham appellari.) ventre quodam medio elatiori, propè cubitali longitudine stans inter folia. Quæ ad aperta: & hiant, iuba illa, quæ intus latitabat, in conspectum se dat: ac in mare quidem flores tantum sine fructu, candidos puluisculo quodam repletos: in femina autem fructus sine flore. Nam Palmam τὸν ἀνδρῶνα ἀνδρῶνα καὶ τὸν γυναικῶνα γυναικῶνα, conceptis verbis statuit idem Theophrast.

Tradit præterea puluerem illum Maris feminæ aspersum, eam fecundiores reddere, neque fructificare ipsas Feminas, nisi ipsas Mas adfuerit, hoc est, iuxta ipsas consitus sit.

Alpinus ait, Palmæ caudicem in rectum se attollere, viginti passuum & amplius altitudine.

Caudicis

Quædam

Theophr.

Quædam
fructus
arborum.

Descriptio
arborum ex
Theophr.

Materialis.

Vase aut.

Palmæ
caudicis

Palmæ
caudicis

Palmæ
caudicis

Palmæ
caudicis

Fructus
racemati

Spatha

Materialis

Materialis

Materialis

Materialis

Materialis













Date	Description	Amount
1890	Jan 1 Balance	100.00
1891	Feb 10 Cash	50.00
1892	Mar 15 Cash	25.00
1893	Apr 1 Cash	15.00
1894	May 1 Cash	10.00
1895	Jun 1 Cash	5.00
1896	Jul 1 Cash	5.00
1897	Aug 1 Cash	5.00
1898	Sep 1 Cash	5.00
1899	Oct 1 Cash	5.00
1900	Nov 1 Cash	5.00
1901	Dec 1 Cash	5.00
1902	Jan 1 Cash	5.00
1903	Feb 1 Cash	5.00
1904	Mar 1 Cash	5.00
1905	Apr 1 Cash	5.00
1906	May 1 Cash	5.00
1907	Jun 1 Cash	5.00
1908	Jul 1 Cash	5.00
1909	Aug 1 Cash	5.00
1910	Sep 1 Cash	5.00
1911	Oct 1 Cash	5.00



THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PHYSICS DEPARTMENT

5300 S. DICKINSON DRIVE

CHICAGO, ILL. 60637

TEL: 773-936-5000

FAX: 773-936-5000

WWW.PHYSICS.UCHICAGO.EDU

PHYSICS 301

CLASSICAL MECHANICS

LECTURE 1

REVIEW OF MECHANICS

1.1. Kinematics

1.2. Dynamics

1.3. Energy

1.4. Momentum

1.5. Angular Momentum

1.6. Oscillations

1.7. Relativity

1.8. Quantum Mechanics

1.9. Statistical Mechanics

1.10. Cosmology

*Nucleus
preparatus.*

*Palpebra-
rum un-
guis.*

*Oculorum
vicia.*

*Vlcera.
Nucleo-
rum delo-
ent.
Spathæ &
fusi.*

*Spathæ de-
lectum.
Vlcera.
Luxatio.
Vlc. crum
affectus.*

Capilli.

*Alui vici-
que flus.
Scabies.*

*Medulla
candida.*

Sinus.

*Solium &
mucos.*

*Panis, mel-
limum: a-
cetum: tex-
tilia: car-
bones: in-
mentorum
cibus.
360. Palma
vtilitatis.
Differunt
& ribus
differunt
Palmarum.
Galenus.*

Temperat.

Nila.

gargarizatum vehementer adstringit & cohibet. Palmarum verò nuclei ceterorum omnium more in sicili nono cremantur, deinde restincti vino lauantur, & tanquam spodii vicem supplentes, ad ornandas decorandasque palpebras conducunt. Quod si non sufficienter vlti fuerint, illud idem iteratur. Vim habent adstringentem, & spiracula cutis obstruunt, ad oculorum pustulas, staphy- lomata, ciliorumque defluvia addito Nardo effi- cacem. Supercrementem carnem cum vino reprimunt, & vlcera ad cicatricem perducunt. Omnium verò aptissimi sunt Aegyptii nuclei, qui ex humilibus palmis excerpuntur. Palmæ spatha Vnguentarii in vnguentorum spissamenta vtuntur. Optima habetur odorata, adstringens, ponderosa, præclusa, interna parte pinguis. Vis ei adstrictoria, quæ vlcera depascencia sistit, laxatoque articulos committit, si trita malagmati & cataplasmati admisceatur. Prodest & præcordiis ac stomacho imbecilli, nec non & iecinoris affectibus, conuenientibus mista cataplasmati. Eius decoctum subinde affictum capillos denigrat. Potui verò datum, renum, vesicæ, aliorumque viscerum vitiis confert: alui, vterique fluxiones sistit. Ipsa verò scabiem sanat diebus viginti, si adhuc tenera cum resina & cera decocta imponatur. Fructus etiam qui sub ea continetur *Elate* quoque & *Borassus* dictus, & ipse adstrictorius cum sit, spathæ quoque præbet effectus: nisi quod ad vnguenta non æquæ est vtilis. Ceterum alba quoque caudicis medulla [*ἐξ αὐτῆς δὲ τῆς σπῆρας τῆς ῥίζης*] tum recens comesta, tum decocta ad eadem facit, ad quæ etiam *Borassus*. *Hæc Diosc.*

Aegyptiam Palmam sitim sedare, *Solinus* author est, apud quem in impressis cunctisque aliis legitur *αἰσθητὴν πικρὰν ὄντα*, nullo sensu: idem a quo legit *Marcellus* ex *Plinio*, dimittatur pro decoquatur rectè.

Ex Palma, tradente *Strabone*, apud *Harmenios* & *Babylonios* panis & mel & vinum & acetum fit, & textilia varia. Nucleis pro carbonibus *Faberrarii* vtuntur: qui in aqua macerati bobus & ouibus in pabulum dantur. Dicunt esse carmen quoddam *Persicum* in quo ccc. & lxx. Palmæ vtilitates numerentur. Nam vel *Galenus* auctore in palmis, respectu virium & facultatum, non parua est differentia. Quædam enim sunt siccæ & adstringentes, vt *Aegyptiæ*: alie molles, humidæ & dulces, vt quæ *Caryotæ* appellantur. Præstantissimæ autem hæc in *Syria* & *Palæstina* nascuntur, in *Hierichante*. Reliquæ omnes alie Palmulæ inter hæc duo genera sunt medix.

Difficiles autem sunt concoctu, capitique dolorem inferunt: verum ex his alie magis, alie minus sunt humidæ ac dulces, siccæ atque adstringentes. Verum constitutis extremis, iam omne quod in medio est, facillimè cognosces. Nulla certe ex ipsis est, quæ non dulcedinem quandam & adstrictionem habeat. Siquidem *Caryotæ* exigux adstrictionis, *Thebaicæ* obscuræ dulcedinis sunt participes. At succum quidem dulcem nutrire, austerum autem gratum esse stomacho, & ventrem sistere ostensum est. Palmulæ si largius sumantur, omnes concoctu sunt difficiles, & capiti dolorem afferunt: quædam autem & morsus cuiusdam sensum ori ventriculi inducunt. Succus autem qui ab ipsis in corpus distribuitur, crassus quidem omnino est, habet autem & lentoris copiam, cum Palmula ipsa pinguis fuerit, sicut *Caryotæ*. Quum autem dulcedo tali succo mista fuerit, celeritè quidem hepar ab ipsa obstruitur. Læditur autem maximè ab ipsarum esu, quod aut

inflammetur, aut scirrhus obsideatur: post hepar autem & lien obstruitur ac læditur. Maxime autem Palmulæ virides, si paulò largius sumantur, ad omnia sunt noxiæ, ac dulces quidem locum habent calidiorem, adstringentes frigiditatem. Quin & Palmulæ virides, sicut *Ficus*, flatus gignunt. In regionibus autem non admodum calidis palmulæ naud perfecte maturescunt, [vt & superius declaratum, adeo vt reponi queant: quo sit vt cum homines cogantur ipsis viridibus vesci, crudis succis impleantur, & rigonibus quæ ægrè calefiant, & hepatis obstructionibus præbendantur.

Confirmat hoc *Galenus*, cuiusdam sibi coætanei exemplo, qui *Alexandriæ* Palmulis unmacuris per complures dies ante & post balneum satiatas, absque febri sæpè horruit, ærigit. *Phoenix* seu *Palma arbor*, eodem auctore adstrictoria facultatis omnibus suis partibus est participes. Igitur ramorum succus austerus est, ex aquæ substantia tepida, & terrea frigida constans. Similis facultatis est *Encephalos*, hoc est, cerebrum esu aptum. At fructus eius, & maximè dulcis, non parua habet caliditatem. Ceterum eam edendo sit, multò est vsui, non tantum foris impositus, vbi quid roburare, desiccare, contrahere, stipare, densareque consilium est, sed etiam tanquam cibus sumptus & simul cum aliis, & per se. Paro quod *Elate* vocant, tenerum illud *Palmarum* germen, eandem cum cerebro eius facultatem obtinet. Quod verò velut integumentum eius est, adstringentem etiam qualitatem habet. Verum noli quàm dicta omnia exsiccat, vt pote quod essentia consistentia illis siccius est, & minime habet humiditatis. Itaque iure vtuntur illo ad vlcera putrescentia, ad articulos plus iusto laxatos. Ad hæc medicamentis hepaticis & stomachicis, seu interò sumantur, seu foris admoveantur. Sed & radix plantæ desiccatoris citra morsum facultatis est, adiunctum habens & ipsa adstrictionis quippiam. *Hæc Gal.*

Nicander in *Alexiphar.* Palmæ fructum cum lacte eponum ad hautam *Buprestium* commendat: quum ait:

— πρὸς γὰρ ἐν τῷ γάλατι

πρὸς αὐτὸν ποίνων. *ἡ δὲ γὰρ ἐν τῷ γάλατι ποίνων.*

Lac, inquit, vasi infundens sæpè admisce tenerum Palmæ fructum:

Sive recente reple nim magnum lacte Catinum,

Et tenerum misce vitrice ex arbore fructum.

Meminit & *Xenophon* lib. 2. expeditiouis *Cyri* cerebri Palmæ & palmularum. Peruenerant iam ad eos vicos, inquit ille, & quibus iussu ducum suorum commeatus captandi erant. Plurimum illic & frumentum & vinum è Palmulis aderat, acetumque ex iussu elixis paratum. Palmarum verò fructus [*βίλας τῆς φοίνικος* : glandes palmarum] quales apud *Græcos* videre non licet, seruis ac famulis præbebantur: seligebantur quas seruarent dominis, magnitudine & pulchritudine admirabiles, aspectu proflus *Electro* similes. Eis quidam arefactas in vsum bellatorum reponebant. Vinum quidem illud potu suaue erat, sed capiti graue. Milites eo primum in loco *Palmarum* cerebri estarunt, omnibus cui detractum id fuisset, exarescentibus, admirantibus cunctis eius cibi speciem ac suauitatem quandam peculiarem, quæ tamen valde caput tentat.

Herodotus lib. 1. eum de *Babylone* loquitur scribit: In eius toto agro *Palmas* generari, magna ex parte fructiferas, è quibus non solum vinum, mel, cibum conficiunt, sed illas etiam *Carli*:

Obserua-
tio

Arboris vi-
res.

Léptam.
Ramorum
succus.

Enceph-
alos

Daigly.

Elate.

Vlcera.
Luxatio

Radix vi-
res.

Frumentum
& vinum
& palmulæ.

Glandes
palmarum
magna El-
ectro similes

carum modo in ossa cogunt. Nicander in Georgicis.

Pallulantes in Palma st. latis [truncis] exscindunt,

Cerebrumque, ad adolescentibus expetitur cibum asferunt.

Diphilus Siphnius, [ut citat Athen.] narrat, Palmarum cerebrum plenitudinem corporis efficere, largius nutrire, ventriculum gravare, vix distribui, sium inuicere, alium coercere.

Paulus Aegineta palmulas stomacho commovere scribit, si non valde fuerint pingues. Et rursus alibi. Palma fructus maturus moderatè calidus, & corroborans, & stomacho gratus, siue inter sumatur siue foris imponatur. Verùm quod reliquum est in ipsa abundè adstringit: unde stomachicis & hepaticis compositionibus admiscetur. Omnium autem maximè adstringit id quod enalcentis fructus velut inuolucrum quoddam.

Simeon Sethi præter pleraque illa quæ ex Galeno adducta sunt de palmularum viribus hæc tradit. Palmulæ calidæ sunt secundo ordine, humidæ primo: rigorem difficulter incalcentem gignunt. Omnibus autem gingivæ dentibusque noxiæ sunt. Sed enim reliquis meliores sunt, quæ cum aliqua vi adstringendi, aliqua etiam duritie constant, vnde etiam modica dulcedine & non valde melles. Quæ verò in frigidis regionibus nascuntur, pessimæ sunt: quoniam non maturescunt & noxas cum rigore febrili infertunt, morbosque & quamplurimas obstructions: meliores autem quæ rubræ, gilvæ sūt. Quæ verò austere sunt, calidæ sunt primo ordine, sicca secundo: neque enim paruum inter Palmulas est discrimen: nam aliquæ sicca sunt & astringentes, ut Ægyptiæ: quædam molles & humidæ ut dulces, ut quæ in Bactris nascuntur. Mediæ inter has sunt reliquæ. Qui ex omnibus sanguis gignitur, turbulentus est.

Scribit Rufus, cum pineis nucleis fauces lenire, bonumque corporis habitum conferre, præsertim si frigidum sit temperamentum, sed assiduo usu vesicam explere. Oportet autem ab his abstinere, qui facili obstructions capiuntur, & anginis, & lippitudinibus, & dentium doloribus.

Audiamus paucis & Arabes. Raza Rotab minus calidos esse quam Dactylos, quique cum sint lenitui, stomacho profint. Apud Serap. legitur Rotab. Interpretes reddunt Dactylos. Aben Mesuaj apud eundem profert Rotab zuccharinos, & Haharad & Hayron. Est autem Hayron species Dactylorum colore citrino vel rubente, quæ cæteris præstat, post quos sunt glauci. Improbantur nigri. Ex Rasi Rotab citè conuertitur in bilem, & noxium est iis qui temperamento sunt calido, aut hepate. Deteriores ex eis sunt magni, dulciores. Frigidis naturis competunt, eoque impingunt. Cyflonis, [autore Aben Mesuaj apud eundem Serap.] id est, cordis Palmæ, temperies frigida est in fine primi gradus, sicca in medio eiusdem: confert cholera, calori & effervescentiæ sanguinis, sed stomacho gravis, ventrem astringit, parum nutrit. Sedat tamen dolores stomachi à proprietate quadam. Secundum Rasin, compescit fluxum sanguinis, stomachi arcer inflationes, sed tardè descendit ad fundum stomachi. Expeditiùs deuolvitur, si edatur cum zingibere condito, aliòve electuario quodam calido. Cæterum Spatha prolatis floribus & post flores racemoso palmarum fructu arescit: reliquaque in arbore sequenti anno aufertur, non aliter quam putatione inutilia sarmenia in vitibus nostris per ver aufcuntur: vti iam supra quoque dictum. Nec aliis

nunc eius toto illo Ægypti ac Syriæ tractu, quam ad ignes usus est, ut annotat Marcellus ex relatione eorum qui illa loca perlustrarunt.

Et Bellon. refert, vix alia ligna in Ægypto reperiri quam Palmæ, sed ad edificia & Architecturas nihil valere. Addit à rusticis eius regionis summitates præscindi, & medullam internam eximi, Alexandriamque venalem deportari: Ibidem enim crudam comedi, gustuque Carduum esculentum (artichaut) referre: illud ipsum esse quod Græci *ἰχθυόω*, & cerebrum Palmæ nuncupent.

Bellonio circa ligni usum contrariatur Alpinus, qui ait, non esse illam aliam arborem, Palmam humano generi vtiliorem: at Ægyptios ex truncis domorum trabes facere, ex ramis parietes, multaque alia ligneæ vasa ad usum, quæ Cissæ nominat. Et sanè Alpino etiam fauet Theophrast. qui & ea Africæ parte, in qua nunquam pluit, Palmas benè magnas & altas, optimasque provenire, & materiem earum diuturnam esse, quippe spissam, siccam lignosamque: quæ quidem optimæ sunt notæ ligni ad Architecturam expetiti.

Strabo quoque Palmaceis trabibus Babyloniam tantum robur tribuit, ut tecta quoque sustineant, ut amplius dicitur in fine capitis. Ex foliis [addit idem Alpin.] stabella & sportas, è caudicis cortice funes pro nautibus conficere.

Sed quem ipsi ad medendum usum habeant, nunc quoque dicendum. Ex Palma tria sunt, quibus Ægyptii sanitatis gratia vtuntur, quippe Spatha [Spartum ter legitur apud Alpin. quamvis eam vocem eo significatu apud nullum alium auctorem legerimus.] pulvis in spatha vel inuoluto contentus, atque Dactyli. Spathæ igitur membrana cum pulvis facta, vtuntur, tum ex ea parato decocto. Pulvis maximum usum habet per os sumptus ad Diarrhæam, Lienteriam atque Dysenteriam, nec minus ad omnes alias vel sanguinis, vel alterius humoris innaturales vacuationes compescendas: præcipuè verò ad hepaticum fluxum, hæmorrhoidum, atque vtericuentam vacuationem, atque ad sputum sanguinis. Eodem vtuntur ad refranenda vlcera depascentia, ad vocis relaxationem, ad firmandos dentes mobiles. Decocto ad omnia prædicta quoque vtuntur, sed læpè cum eo pulvere admixto: articulos debiles, aptosque defluxionibus mirum in modum iuuat eos firmando & roborando. Pulvere quoque albo in inuoluto veris tempore inuento, quando scilicet Palmæ florere incipiunt, vtuntur familiarissimè ad raucedinem, tussim & opit imias cum saccharo misto. Estque ipse dulcis & subastringens, quo mulieres Ægyptiæ familiarissimè vtuntur non tantum ad colubendos menses, sed ad reuendendum scutum. Eundem usum habent Dactyli immaturi in cibo per se, & ex decocto. Dactylorum maturorum usus frequens ad saucium raucedinem, tussim. Dispnoeam, pleuritum & peripneumoniâ. Decocti etiam ad iuuandas variolarum in pueris excretiones.

Lacuna ossa Dactylorum plurimum conferre putat ad roborandum eor, propter figuram illam quam cordi, ut ille ait, quodammodo similem habent. Sed parui facimus eiusmodi facultatum æstimationes à figuris, quas nullam per se agendi vim habere, boni Physici norunt, ac ne sanè occultam quidem, ut quidam opinari audent. Inuenias præterea multa cordi similia, etiamque lapides, immò fortè & venenata quædam, ut Anacardi. Ahouai fructus & cetera propterea cordi conferre dicemus: Mirum verò tot præcipuos auctores, ut ex antè dictis patet, noxam ex Palmularum elu capiti

Bellon.

Temper.

Nota.
Delectus.

Palmularum collatio.

Sanguine
Serap.
gignunt.

Quibus à
Palmula
abstinendū

Raza

Rotab
Zuccharini
Hayron
citrini.
Gilvæ.
Nigri.

Cyflis.

Dolor sto-
machi.
Fluxus sa-
guinis.
Stomachi
inflammatio.
Spatha ex-
plicata pro
liguo.

Ligna Pal-
ma

Bellon. me.

Palmæ G.
sus apud
Ægyptios
ex Alpino

Pulvis
Diarrhæa.
Lienteria.
Dysenteria.
Fluxus he-
paticus.
Hæmorrhoides.
Vtericuentam
vacuatio-
nem.
Sputum
sanguinis.
Vlcera.
Vocis relaxa-
tionem.
Dentes mo-
biles.
Articulos
debiles.
Raucedo.
Tussis.
Opit imias.
ad reuenden-
dum scutum.

Pestis
morbi
Varicella.

Lacuna
oss.

capiti vno consensu tradidisse, quemadmodum & vini earum potu, vnicum tamen Aretæum [quantum hactenus quidem nobis constat] scribere autem, omnia bellaria caput dolore infestare, præter Palmulas, Ficus & vnas: quod si ipsi soli & probè cognitum fuit, habet posteritas has sententiam eius confirmandi: sin minus, tementatem nris, scripta spongia castigandi. Inter Saturnalia dona olim palmulæ mittebantur, ut testatur Ovidius:

Quid vult Palma sibi, rugosaque carica dixi.

Et Marialis:

Aurea porrigitur Iani Caryæa Calendæ.

Vini è Palmulis in superioribus aliquoties mentione facta: quod ut conficias, tradente Diosc. Palmulas, quas Chydæas quasi vulgares vocant, bene maturas in doliolum in fundo perforatum & arundine picata obstructum mittes, ita ut foramen etiam lino sit obturatum. Tum denis Chœnicibus ternos aquæ congios affundes: quod si non admodum dulce id esse libeat, quinos congios infundes, & ad dies decem macerari sines. Extracto eo spatio, hoc est, die undecima, detracto ab arundine linteo, vinum crassum ac dulce excipito, atque reponito. Suave illud quidem, sed capiti noxium. Contra fluxiones, propter adstrictoriam vim, efficax: eandem ob causam stomachicis, colicis, & sanguinem excreantibus continet. Tamen qui eo non sunt assueti, & primum bibere cœperint, ventris fluxum cient, inquit M. Paul. Venet. Qui verò assueti fuerint, mirum in modum pinguescunt. Incolæ ciuitatis Coimosa pane triticeo non vescuntur, sed comedunt dactylos. Sunt qui addita rursum pari aquæ mensura, manantem deinde liquorem excipiunt: id quod tertio, quarto, & quinto faciunt, non item amplius: quando quod reliquum ab his est, aciescit. Meminit & Xenophon loco superius citato vini è palmulis optimi. Plinius verò lib. 14. c. 16. in vini præparatione à Diosc. discrepat, tum quòd Palmularum minorem quantitatem sumit, scilicet modicum, qui, teste Paulo, chœnices duntaxat octo continet, tum quia post macerationem palmulas ipsas exprimit: sicut: Fit & vinum è Palmis, quo Parthi & Indi vtuntur, & Oriens totus, maturarum [maturarum Vet.] quas vocant Chydæas modio in aque congiis tribus macerato, expressoque. At idem lib. 13. c. 4. E Caryotis fieri tradit, non è Chydæis. Dioscoridi etiam in eo contrariatur Plinius quòd Palmeum vinum ventri molliendo non inutile prædicat, quemadmodum & sanguinem excreantibus. Sed Librariorum potius, quàm Plinii errorem hunc putant: idèd Corn. pro molliendo, morando: Sarrac. molliori legit, eodem penè sensu. Ex Recentioribus Thevetus vinum Palmeum excellens esse prædicat, sed cerebrum lædere. Fit & Vnguentum ex palmæ Elate seu spatha apud Diosc. Sic: Tusam discerptamque Elatem in labrum conicito, & Omphacinum oleum affundito: in quo tridui spatio eam macerari sinito. Mox fiscella exceptam exprimito. Sint verò utraque paria pondere. Tandem ubi vase mundo reposueris vitor. Vim habet rosaceo proportionem respondentem: sed alium minimè molliet. Fal-litur Plinius, quando inquit: Est præterea arbor ad eadem vnguenta pertinens, quam alii Elatem vocant, quod nos Abietem: alii palmam, alii spatham. Nam vocis, Elate, homonymia ei imposuit. Exuleuit hodie huius vnguenti parandi modus & usus. Extat & compositio Diacalcitheos apud Gal. quam palmeo baccillo commiscendam præcipit: non alia de causa, ut quidam volunt, quàm

ut adstrictionis aliquid inde capiat.

Quibus deest Palma recens, pro Spathula ad empl. diachal. seu diapalmes, teste Ioub. suadet Melues radices Arundinis illud obire: Verùm non est similis horum facultas, ut alterum alteri possit substitui: quum radix prædicta euellat spicula ex alto, ut dicit Diosc. sustingente experientia. Palma verò potius constringendo repellat. Quam ob rem malim ego huic subrogare arundinis cannam seu calamum, vel spatham factam ex querno, mespilino aut alio eiusmodi adstringente ligno. Guido pineam substituit, Chirurg. par. 2. d. 1. cap. 3. cum antea spatulam de canna esse voluisset.

Ingrediuntur & dactyli optimam & selectissimam illam compositionem Meluci, Diaphœnicon à Palmulis dictam. Vulgò officinis à Palma dicitur Diapalma emplastrum. Paulus Aegin. in Epithemate ex vinaceis quatuordecim & diebus contere iubet.

Ad vulgaris Palmæ naturam illa quoque pertinet historia: Ex palmarum cinere, & oleo fieri aiunt Saponem, omnium præstantissimum, ad manuum candorem, notante Scaligero. Est apud Americanos, referente Stadio, natio quædam Karaya nomine, quæ ex Palmis saltem conficere solet in condimentum ciborum. Verùm qui ediberalius vtuntur, vitæ sunt breuioris. Parandi autem huius talis modum, quem & vidisse, & in parando semel iussisse testatur, hinc docet Palmam prægrandem incidunt, quam sciunt minutim. Hinc struem ex lignis aridis conficiunt, cui palmæ segmina superimponunt, & omnia simul ignibus subiectis cremant. Hinc ex cineribus illis lixuram parant, quod coctum cogitur, & sal illud producit. Ego quidem nitum arbitrabar, sed ignis exploratione secus se rem habere deprehendi. Sal sapiebat, & colore erat cinereo.

Restaret geminus palmæ honos, ac vterque præcipue nobilitatis dicendas, alter literarius: militans alter. Palmarum quippe solus primò scripturatum fuisse Plin. ex Varrone prodidit. Verùm quia Recentiorum quidam eam gloriam peculiariter tribuunt palmæ speciei, huic quoque rei caput proprium paulò post dicandum fuit. Nunc militare atque adeò triumphalem celebremus. Equis verò virtutis alumnus nescit palmam omnibus penè præcis & anteaetis seculis, (excepto vltimo hoc propemodum lordido) vincendum in certaminibus fuisse præmium? Quod sanè illustissimi quique, immò Reges & Imperatores ipsi, non modò non detrectarunt, sed omni nisu & conamine, atque adeò vel cum vitæ discrimine quesuerunt: ut qui maiorem apud suos exterosque gloriam spectarent, ac plenis arboream, quàm auream facerent. Qua non semel plurius contenti, ni iterum ac lapidis illa insignirentur, ut tantò plus se accepisse decoris existimantes, quò frequentius in ludis sacris & certaminibus vicissent. Ita vel euamnum hodie plurimorum triumphales statux palmæ ramum manu gestantes. Noti sunt triumphus Græcorum: noti Romanorum Còsulum & Imperatorum. L. Papyrius, & Sp. Caruilio Consulibus, deuictis Samnitibus, capulque illorum oppidis, Aquilonia videlicet & Coruino, Palma victoribus data: morè tunc primum è Græcia ad Romanos translato. Postea autem inoleuit, ut qui certaturi forent, spadicem haberent. Claudianus.

Nutant ad nutu Palma fœdera.

Cæsar in Hispania contra Pompeii liberos decertauit, eosque deuicit. Ergo in eo campo, ubi bel-

Mh 4

Aretæum.

Saturnalia.

Aurea Caryota.

Vinum palmulæ.

modo fiat.

Palmula Chydæa.

Vini qm.

Alia mon.

don.

Plin locus refut.

Vnguentum Elate.

nam.

Vires & v.

lus.

Plin. error.

Diacaltheos.

bas.

Diaphœnicon.

Sapo ex palma.

Sal.

Palma vincendum præmium.

Exemplum.

lacum. Palmæ ramus statim post victoriam agnatus: quod tamen non ad Cæsarem, sed ad Octavianum, è sorore filium portendit. Nam ibi prælians multa præclara armis facinora peregit, quibus clatus futurus erat. Hæc Xiphilinus in Epitome Dionis.

Suetonius Tranquillus in Octavio: Apud Mundam, inquit, Divus Iulius castris locum capiens, cum filiam exderet, arbores palmæ repositam conservari, ut omen victoriæ, iussit. Ex ea continuo nata loboles, adeo in paucis diebus adolevit, ut non æquiparet modò matricem, verum etiam obgreget, frequentareturque columbarum nidis: quamvis id autem genus duram & asperam siondem inaximè vitet.

*Genus palmæ
quæ coronatur.
Phœnicis
dicitur
quædam
est
palmæ
coronatur.*

*Difficilis
ad Alismam
aditum,
Coronatur
palmæ.*

Musa præterea (Plurimeto autore) Palma coronatur, propter homonymiam, quod Phœnicæ primi invenisse literas credantur. Nam Palma Græcè φ-ν-ι-ξ. Hanc tamen rationem non probat ille: verum ob arboris ténacitatem (vel potius inaccessam scabritiem, aut ramorum hispiditatem qua iudicem muniunt, nisi circumdantur, ut super his dictum, et nos interpretamur.) propter quam non facillè scanditur, sicut nec ad Musas & poëta, propter difficilem ad earum pulchritudinem accessum. Nam dulcissimos fert fructus. Ab huiusmodi corona Palmea postea usurpatum, ut æquè vocabulum Palma, atque arbor ipsa, victoriam denotaret. Cuius significationis vnum Ciceronis, alterum Virgili, tertium Ovidii locum citasse satis esse docimus. Ille de senectute:

quæ Palmam utinam Divi immortales tibi, Scipio, referant.

Aliter: Eliadum Palmas Epheios equarum. Hic: Et lenta victoris præmia Palma.

*Præmia
de palma.*

Vnde proverbia nata: *Palma dare Palmam ferre, deferre, tribuere, præcipere, accipere: Habere Palmam ex aliquo: Reservare alicui.* Quæ omnia ad victoriam referantur. Et *Palmarium*, autore Plin. quicquid in victoria sit. Dicitur etiam Vlpiano luric. *victoria salarium.* Terent. in Eunuch. tum hoc alterum, id verò est, quo mihi puto *Palmarium*. Victoriam: *Deam Palmarem* Apuleius vocat: &c. *Palmaris vestis*, siue *Palmaria*, propriè triumphantium fuit, quam merebantur, qui de hostibus Palmam reportassent. Etiam in pace Consul fuit. Ausonius in Panegyrico, *Palmaria vestis*, ut in pace Consul est, sic in victoria triumphalis. Et *Palmaris sententia*, quæ vincit. Cicero: *Sententia philolophorum Palmaris.* Et *Palmaris statua*, Cicero, quæ alicui propter victoriam erigebatur. Sed quo rapimur? An celebramus Palmam, ut Palmam in posteritatis Theatro mereamur? Felices verò eos qui Emblematicam illam Coronam cum Palma ex gladio mortis immortalis victoria reportant: ut habeant contra terrenos hos fastus quod trucibus Christianæ fidei oppressoribus atque tyrannis desuper occurrant: *Cessit victoria victis.*

*Dea Palmaris
vestis.*

*Palmaris
sententia
statua.*

*Martyrium
Emblem.*

*Cur palma
triumpho
dicata
prima ratio.*

*Delicata
palma.
Sæcra palma.*

Sed cur tandem Palma præ aliis arboribus præcipuis victoriæ triumphis dicata deoque ut & certaminum euaderet symbolum, attestante in Symposiis Plutarcho? Huius rei ut annotat Curtius hæc perhibetur ratio. Theseum devicto Minotauro, è Creta redeuntem, Delum appulisse ferunt, & in ea, ob adeptam victoriam, Apollini sacros ludos instituisse, in quibus victores Delica palma coronarentur: Alii ibi è sacra Palma ramum decerpisse, & secum detulisse, ut inde postea inoleverit mos, ut cuiusque certaminis victor, Palmæ ramis coronaretur. Pausanias etiam huic rei aliam causam attribuit. Nam Iasum

vbi in Olympicis vicisset, dextra Palmæ termitem gestasse scribit, & equo insidentem abiisse: ut inde, dextris Palma portata, victoriæ indicium sit. At Aristoteles, Plutarchus, Plinius & Autorum tam præcorum quàm posteriorum plerique qui de hac re aliquid prodiderunt, causam reddunt hæc, quod vrgentibus ac prementibus ponderibus minimè cedat: à qua vi atque natura Græci *victoriæ* dictam volunt, quasi *de non cedendo*: à non cedendo. Strabo sanè in xv. Geogr. scribit *Palmeas* trabes peculiare quiddam pati. Nam cum solidæ sint, cum inueterascunt, non cedunt (inquit) in partem inferiorem, sed in superiorem panduntur, propter onus, unde melius rectum sustinent. Quin & Theoph. in fornicem concurrari Palmam sursum versus pondus ait. Plinius. Palmæ arbor valida, induersum enim curvatur. At Populus, contra omnia inferiora pandatur: Palma è contrario fornicatur. Quamvis alii invalida legant, & ita in vulgatis habeatur: ita tamen ex Strabo & Theophrast. aliisque legendum, nisi contrarium huic velimus facere Plinium, qui ex eo hunc locum transcripsisse videtur: sicque etiam in m. f. exemplari legitur, teste Dal.

*Victoria
Græci
de dicta.*

Ea res in admirationem traxit Aulum Gellium sic scribentem. Perhercle rem mirandam Arist. in viii. probl. & Plutarch. in viii. Sympos. dicit: Si supra Palmæ (inquit) arboris lignum magna pondera imponas, ac tam graviter vrgas onerisque, ut magnitudo oneris sustineri non queat, non deorsum Palma cedit, nec intra flectitur, sed aduersus pondus refurgit, & sursum nititur, recurvatque. Propterea, inquit Plutarchus, in certaminibus Palmam signum esse placuit victoriæ, quoniam ingenium eiusmodi ligni est, ut vrgentibus opprimentibusque non cedat.

*Plin. lorum
refert.*

*Mira palma
ma natura.*

Idem testatur Cardanus, additque idem enenire Alinis Cantheliis ex Xenophonte. Cautas verò quas reddere conatur, tanquam futes & pueriles explodit Scaliger. exercitatione cxxxiii ipse tamen meliorem non addit, sed ingenuè fatetur nodum hunc se solvere nescire, quod rorum & mirum in tanto subtilitatis Professore. Plutarchi saltem conatus produxisset, qui tam stupendi in Palma experimenti (ut Guilend. ait,) triplicem causam recitat in libello de causis naturalibus, probl. xxxii. quod vna cum sequentibus octo in Græcis exemplaribus impressis desideratur. Vtrum, inquit, quod ignea, & spiritalis facultas, quæ maximè pollet, cum tentatur & irritatur, sese exercens, magis & magis erigit? An quoniam pondus ramos lubitò vrgens, aerem omnem, qui in his est, oppressum cedere rectè cogat, qui deinde resumptis paulò viribus aduersum onus non sustinètes, cum onus quiescit, paulatim se erigunt, & speciem, quasi contra illud allurgant, exhibent?

Card. vii.

*Rationes
cur palma
oneri res.
fuer.*

Sed neutra istarum nobis satisfacit: & frustra *non dicitur* queritur, vbi non constat de F. m. Nam Amatus Lusit. & Antonius Musa Bralauola, quæ de Palmæ ligno tradita sunt, suo experimento falsa esse comperisse testantur, nec enim contra pondera inniti aut recurvari, imò experientiam indicare, lignum hoc debile esse. Fortè hoc dicit Amatus, quia apud Plin. legerat, invalida. Aut si expertus sit, vel non rite expertus est, hoc est, vel in ligno non satis adulto, aut non rite secto: vel non adhibita mora temporis competente. Nam tot classicorum Autorum consensum vnius experimenti putari specie reiicere, prudentis non est. In inueteratis illud observari dicit Strabo. Ergo multo tempore opus. Aut si in inueteratis istud viderunt,

*Negatur
Sic ea palma
ma.*

videtur, cur locum non citant, quod fecit Strabo: aut experimenti sui modum assignant? Quamvis autem de hac re nihil certi nobis constet, attamen de summorum authorum consensus non patitur temere sibi fidem derogari. Immo nec ipsa quoque ratio, quam quodammodo dari posse putamus. Ergo audendum aliquid. Multum sane potest in lignis nervorum atque fibrarum ductu ad flexuram & incurvationem. Tales & palmam habere existimandum. Nam ita putamus. Quemadmodum rami ex trunco excuscentes mox in forticem incurvantur, ita incurvationis illam causam ex fibrarum trunci continuato ductu dependere. Quod si hoc in virgibus evenit, cur non idem in palmis strabibus eveniat, etsi mole pressis. Quid? quod & Abietina tigna in edificiis ponderi nequaquam cedere, sed cum tempore etiam sursum flexi nobis à peritissimis Architectis & Carpentariis relatum sit: de quo tamen amplius perquirendum. Nec dubitamus, si Palmæ arboris caudex secundum rectitudinem in quatuor vel plures divisuras funderetur, unamquamque earum quasi in arcum incurvatam iri, haud secus ac in rostellis Gerani exiccatis evenit, quorum veluti costæ in viridi ac integro adhuc rostro recto ductu coherent, at maturi aut siccitate satiscientis atque diuulsi filamentorum quorundam vi ita incurvantur partes illæ ut vermiculorum aut serpentum motum flexuosum iucundo spectaculo imitentur. Sed de hac re nunc satis.

PALMA VINIFERA THEVETI.

CAP. CLX.

Arbor est à Palmarum genere, uti refert Scalliger, à vulgari palma differens. Cæditur ad imum trunci: unde liquor. Aquâ succum temperant: alioqui ebrii futuri. Cum stiliat, dulcissimus est. Scrutus accessit, sapore non ingrato. Mignol vocat. Cardanus describit, quale à Ludouico Mellano accepit. Cæterum neque arborem, unde eliciatur, neque eius saporem indidem narrat. Postquam igitur Thevetus in lib. suo de singularibus Gallie Antarchie tradidisset, subdit: Promontorium vinde Palmis abundat, ex quibus Sylvestres Athiopes vinum parant, quod vocant Mignol. Est autem hæc palma pulcherrima siue proceritatem, siue perpetuam viriditatem, atque præspeciosæ arboris dotes contempleris. Fert paruos Dactylos austeros & acidos, ut non facile edi possint. Arboris tamen succus gustus suavissimus est, idem hunc magni faciunt Indi, quemadmodum nos vine generosa. Caudicem ima parte duorum pedum altitudine à terra perforant, ita liquor effluit, quem vase terreo ad foraminis altitudinem exceptum, & in alia ad id destinata transfusum, ad usum referunt. Hoc vinum, ut facilius à corruptione præseruetur, sale aliquantulum condiunt, quo humiditas illa putredini obnoxia consumatur. Colore vina alba Campanie & à Asia refert: putruque est præsuavi, & quoniam defruto Cidre Britannis dicto, Pirorumve vino præferendo. Apertissimum est ad ardorem & sitim, cui incolæ obnoxii sunt ob excedentem eius regionis calorem. Eodem Egypti olim mortuorum cadavera, antequam Balsamo condirent, ter quaterve ablucebant, ita tutiora futura existimantes à putrefactione: postmodum Myrrha & Cinnamomo inungebant. Eiusdem potus usus est in plurimis Aethiopie tribubus.

Cogitent verò Lectores an hoc palmæ genus non idem esse possit cum præcedenti, quamvis hoc modo ex illa vinum educi à nullo hætenus proditum obseruauerimus. Distinctionem tamen etiam ostendit Palmularum exiguitas & sapor acidus, ex quibus tamen vinum fieri ut ex prædictis Dactylis non docet Thevetus.

Consideret item Lector an possit esse illud palmæ genus, quod India profert, [ut Matth. ex Iosephi Indi navigationibus perhibet, & cuius truncis, excisis consulto ramis, mense Augusto distillat liquor, quem incolæ vasis excipiunt, chibuntque suavitæ vini vice: verumtamen nisi excoquatur, post triduum in acetum acerrimum defecit. Ea; propter illum decoquant, ut pos defecitum, sitque hoc modo, velut mel suauissimum, quod postmodum ex aqua resoluunt, & diebus viginti artificio quodam percolant, donec optime sit defecatum, atque pellucidum: quo artificio iucundissimus redditur potus, druque pereunat.

PALMA GVINEAE.

CAP. CLXI.

In Guinea circa metallicas auri venas [Castel de Mina nuncupant] abunde crescunt arbores ab inquilinis Palmæ appellatæ, ætate & crassitudine naualis mali, [ita enim describit Franc. Peninus apud Clusium hist. Aromat. Garcia] summo fastigio gestantes folia [foliorum alas intelligit] decursum inflexa, 12. aut 15. pedes longa, arundinum ritu incisa: sub his foliis [ramos aut foliorum alas verius appellat] nascuntur, breuissimis pediculis inherentes vix humani capitis magnitudine, in quibus congesti fructus prunis maiores, coloris aurei, quorum nucleos incolæ eximentes contundunt, ex his exit liquor olei lymphidi instar [cuius paxillum cum nuce ad te mitto specimenis gratia] oleum de palma ab ipsis appellatum, quem edulis miscunt, ad odoris colorisque gratiam conciliandam. Is liquor huc delatus frigore concreuit butyri instar, coloremque aureum contraxit. Eum liquorem siue oleum qui retulerunt, recentibus vulneribus & artubus contusione laxis vel afflicis illitu leuamen attulisse deprehenderunt. Incolæ, teretibus perfoliis arboribus ligneum paxillum induunt, ex eo foramine profluit liquor dulcis feri lactis instar, quorum melle sylvestri commixto, potionem conficiunt vini de palma appellatione quo liberalius hausto, etiam temulenti sunt. Arboris materia rubescens, flauis venis distincta, ad fabricas inutilis quia fissæ, tenuibus & gracilibus segmentis dissilit.

PALMA HUMILIS SEV CHAMAE.

RIPHÆ.

CAP. CLXII.

Palma humilis Hispania non spinosa.

Fructus Chamæpites quos habemus, magnitudine sunt & figura oliuari, triplici cortice obiecti: extimus colore Castaneæ, in rosso nigricans tenuis est: huic alter subiacet crassior, colore cinereo, in fila ductilis: tertius ad nucis mollior colore accedit, nucleum obuestiens duritie cornea, sapore dulcem, album, quem per-





CHAMÆRIPHES FORTE FOLIUM.

CAP. CLXIV.

Cum Chamæriphe superioris furculo mittebat idem Garetus folium, ab amico acceptum commodatò, ut illud conspiceret, atque etiam, si vellem, describere possem. Admirationem autem mihi pariebat, quòd adscriberet, illum, qui ipsi hoc folium mutuo dederat, adfirmare Nymphæ esse in Moluccis insulis natæ, & supra aqua haud secus spargi, quàm nostræ Nymphæ folia: illiusque florem non esse nostratis flori dissimilem, ei præsertim qui candidus est, sed colore dumtaxat differre, hoc est, non album esse, sed cæruleum. Ex illo autem folio concinnatum erat stibellum ad ventulum sciendum, atque ex duplicata pediculi eius parte manubrium confectum, quod manu teneri posset.

Descriptio

Huius porro stibelli ambitus erat trium pedum & nouem unciarum: Longitudo ad manubrium usque, siue ad folii pediculum, duodecim unciam, latitudo quæ maximè patebat, tredecim unciam: manubrii ex ipsius folii pediculo duplicato confecti, & vimineo vinculo adstricti, ut commodius manu teneri posset, longitudo, quinque unciam. Istius folii prona pars crassiorem nervum ostendebat, per medium folium secundum longitudinem procurrentem, ex quo oriebantur alii minores in latera expansi: ab uno quidè latere viginti tres, ab altero autè viginti quatuor: supina pars totidem plicaturas, quæ aded de causâ suspicio mihi oriebatur non esse Nymphæ sed Chamæriphe alicuius generis potius folium, quodque non in aquatica planta, sed in terrestri natum esset, qualis fortè illa, quam Batavi in insula Mauriti nascentem obseruabant, habentem [ut illius navigationis diarium refert] tam ampla folia, ut unico quispiam sese tegere, & ab imbre præseruare posset: pictura similiter quæ in eo diario addita, tamen ruditer expressa, meam suspicionem confirmare videbatur. Folii autem, ex quo stibellum concinnatum, color, flavus erat, qualis in culmis maturæ segetis conspicitur, parte tamen supinâ splendidior quàm pronâ: in folii verò ambitu, ad illud expansum retinendum, annexus erat vimineus limbus, illi penè similis quo manubrium adstrictum, rubro tamen colore infectus.

Nymphæ folium non est.

Palma.

PALMA HUMILIS PAPYRACEA ET DE papyro ex Palmis.

CAP. CLXV.

Descriptio **S**unt & humilia Palmæ, folio tam politæ superficie, ut eo pro chartis utantur ad scribendum in provincia Mangi: alterius arboris usus idem. Talis dicitur Scalig. Palmarum folia olim Papyri usum præstitisse, cum Plinius ex Varrone, tum alii plures auctores, (qui serè eorum mos esse solet, ut qua primùm data porta est, præcipites, & posteritatis nimis securi scriptores, irruant) tradunt: verum quæ sit illa Palmæ species, nemo hæcenus, quod equidem scimus, propriè atque distinctè exposuit, quàm Massæus & Scaliger: hæcque fortè, ut conicere est, ex relatione aliorum. Nam si eam notam habuisset, (quæ fuit eius viri erudiendæ posteritatis inimitabilis propemodum sagacitas) indubiè diserto lemmate declarasset.

Papyracea arbor Tal.

Humilium palmætorum folia polita dicit, ut pro charta utantur ad scribendum. Sed prius audiamus Plinium.

Hic lib. xiii. cap. xi. postquam de Aegyptiis arboribus, atque inter eas sanè ad longum & eleganter de Palmarum natura ac differentiis differuisset, sic inquit. Priusquam digrediamur ab Aegypto & Papyri natura dicetur, cum chartæ usu maximè humanitas vitæ constet, & memoria. Et hanc Alexandri Magni victoria repertam, autor est M. Varro condita in Aegypto Alexandria. Antè non fuisse chartarum usum: in Palmarum foliis primò scriptatum: deinde quorundam arborum libris.

Hæc Plin. de charta ex Palma.

Testatur quidem Io. Linschottanus in suis narrationibus Indicis, ex eo Palmæ genere, quam Nucem Indicam vulgò vocant Chartam Indos habere, verum non ex foliis, sed ex interiori medulla arboris, [fortè hæc una earum est, quarum libris deinde scriptatum Plin. dixit.] eam esse, omnèque libris Indicæ ex hac materia, natura producere in ipsa arbore plicas ad distinctionem foliorum.

At Massæus in sua historia Indica apertè ait, eius Palmæ, cuius fructum Nucem Indicam Lusitani dixerunt, [de qua nos pòst] folia librariis pro Papyro esse, & loco regularum imposita domibus arcere imbres, tum etiam in vestes forma facili simul ac spisso contextu necti. Verum hæc nec Palma humilis est de qua loquitur Scaliger, nec eius Folia aded lata ab Autoribus traduntur, (immo Palmæ vulgatæ aut arundini similia ait Garcias, Clus. simpliciter Palmæ comparat foliis, quæ sanè cultrata sunt & perangusta. A Costa ne foliorum quidem meminit in sua descriptione.) ut chartæ vices supplere queant. Adde quod Plin. suam Palmam, in Aegypto nasci satis manifestè declarat, in quo nemo auctorum, quod nobis quidem constat, Nucem Indicam dictam nasci prodit.

Quas fortè difficultates subolsaciens Doctissimus Guilandinus in eruditissimo illo suo opusculo de Papyro, [quod commentarii vice scripsit in Plinii caput de Papyro.] apud Plin. pto Palmarum foliis, Maluarum foliis, quoniam olim, ut ille putat, in Maluarum foliis scribebatur. Huius suæ audaciæ [sic enim vocat] non unam causam prætexit, sed quòd apud neminem Varrone antiquiorem compertit, Palmarum folia ad usum scribendi aliquando accommodata fuisse: tum quòd natura asperiora, durioraque sunt, quàm ut commodè in eum usum recipi queant, tum verò quòd arundinea passim obuia subrogari præstabat. Palmæ frondem Suetonius Trāquillus durā & asperam dixit. Accedit [addit Guil.] ad gratiam quòd Maluarum folia rectius opponuntur arborum libris, quàm folia Palmarum, quæ & ipsæ arbores sunt: præterquàm quòd Cinna antiquus Poeta, cuius Catullus & Seruius meminere, in Maluarum foliis scriptatum indicat. Adducit præterea Guilandinus tetrastychon ex lib. vi. Isidori, (quos vid. infra, Cap. de Malua) quibus dicitur, carmina Maluz libello scripta fuisse. Hæc Guilandinus sunt rationes quibus apud Plin. in Maluarum foliis primò scriptatum fuisse, legendum iudicat: quamvis & alios versus, ex Virg. iii. Aeneidos, ubi de Sibylla canit: ut ex lib. vi. eiusdem: Iuvenalis item Satyr. viii. in eum sensum quasi vi trahere conatur, in quibus tamen omnibus ne verbum quidem aut significatione aliqua Maluz sit mentio, sed simpliciter foliorum, quasi uerò Sibyllæ folia fuerint Maluz?

Suspiciamus denique etiam huc respexisse Pythagoram

Charta q. in humanis cas. constat. Quando reperita

Nucem Indica.

Plin. illud. Libris indicæ.

Folia N. cu. Indica pro Papyro

Plin. loc. cit.



Lantor. peculiaris illius generis pabore, quæ à laur Incolis Lantor appellatur.

ARECHÆ ARBORIS FRUCTVS
COFFOLA.

CAP. CLXVII.

Coffola.
Arecha.

Etere fuerunt, autore Ludon. Rom. lib. na-
uig. Calechuti fructum quendam, cui *Coffola*
nomen est: hunc mittit arbor *Arecha* nomine,
Palmæ non abfimilis, quæ Cariotas gignit etiam
non abfimiles. Hæc arbor, cuiusque fructus qualis
indagent Poskeri.

PAPYRVS VETERVM PALVDANO.

CAP. CLXVIII.

Descriptio

Papyri Veterum nomine à Cl. Paludano mil-
lum ceu folii Arundinacei speciem quandam
representat. Est illud tres cubitos longum, nec
tamen integrum, vt ex extremitatum laceratione
apparet, sescunciam latum, crassitudine pergamen-
ni crassioris, colore paleaceo, & non nihil ad cine-
reum tendente. Fibrarum stamina canabinis si-
milis, fragiliora tamen, utraque facie per rectitu-
dinem decurrunt, sine vlla ramentorum costarum stri-
arumue eminentia, quæ subtegminis vice aliz
transuersæ intercurrunt, ac vtrinque membranz
suz tenditatis leuissima quædam ac vix conspicua,
stylo tamen perceptibilia, vestigia imprimunt.
Quæ textura porosa quædam medulla farcitur.
Stylo supra scripsimus, sed scriptio impedimen-
tum aliquod obiecerunt intertexta stamina & fun-
gosus folii habitus. Nec apparebant characteres
nisi salua, vel aqua madefacti & affricti. Quo fa-
cto, legibiles illic apparent.

Varietas.

Eiusdem faciei foliaceum quiddam splendidius
ac lauius, [non tamen diuersum, vti putamus,
quamuis paulò latius, & ni fallimur, naturali sua
latitudine] ab eodem accepimus, vtrinque nigris
litteris Arabicis, ni fallimur quales aliquando vi-
dimus, aut certè his similibus insculptum acuto
quodam stylo, quatuor linearum ordine, nobis
sanè grauiusculum vetustatis monumentum. Iudi-
cium peritioribus relinquimus cuius plantæ pos-
sint esse ista folia. Fit quidem cap. de Nuce Indi-
ca mentio Chartæ à Linschottano D. Paludano
missæ: verum eandem asserere hæc folia temera-
rium nobis videtur.

PAPYRACEA ARBOR TAL.

CAP. CLXIX.

Descriptio



DE Papyracea arbore *Tal*, cuius mentionem
fecimus cap. de Palma humili Papyracea ex
Scaligero, quæ in provincia Lagni prouenit, hæc
scribit Theuetus in sua *Geographia*. In provincia
Magni est arbor *Tal* nomine, folio grandi, quod
chartæ vsum præbet in tota India. Fructus profert
magnis Napis similes. Quod cortici subest, tenerum
est, dulce, esu gratum. Cortex tamen melior &
suauior à quibusdam *Vernis* nominatur.

Fructus.

Vernis.

PAPYRACEA ARBOR GVALABARA.

CAP. CLXX.



Papyracea arbor nomen Oniedi in
Insula Hispaniola proue-
niens *Gualabara* Barbaris
dicitur, Hispanis
Vucro, ab vna, quod pro fru-
ctu vna ferat. Materia est re-
bescente, rotunda, densa, et
que idem optima, præsertim
ad carbonem ramis expansis.
Vnas edit rursus sparsas, et
que à se distantes, Moris fe-

Arbor.
Nucleum.

rè concolores, exigua earum parte esculenta:
nam acini sunt Auellanz nucis magnitudine, nu-
cleum tam crassum concludentes, vt parum car-
nis superfit. Folii figuram hic depictam vident,
ab aliarum arborum folijs planè diuersam, atque
idem memoratu dignam. Maximum palmæ ma-
nus magnitudine par est, dempto pediculo. In
Hispanis in insula Hispaniola & finitimis bellum
gerentibus Papyri & alimentum vsum præbebat.
Tota enim hæc regio charta ad scribendum & a-
tramento prorsus caret. Folium istud viride est,
aliquando rubrum, crassum & æquè spissum,
ac esse possent duo Hedera folia simul iuncta.
In parte tam prona quàm supina literas pin-
gebant acicula, aut stylo aliquo, modò recens es-
set, & eodem die decerptum, quæ candidæ appa-
rebant, aut ita diuersi à folio coloris, vt facile le-
gi possent: neque enim folium literas transmittit:
& costa per medium eius excurrens, et si crassius-
cula sit, tamen venulæ ab ea deductæ sunt tenu-
es, vt scribentis manum parum aut nihil re-
morentur.

An M. Fumei hist. Ind. Occid. gen. lib. 1. cap. 1. *Costa.*
Guibaras fructus habens nucleum? An Lerro
cap. 13. Arbor *Bresilia* proueniens, cuius folia testili
crassiora.


PAPYRACEA ARBOR COPEIA.

CAP. CLXXI.


Petrus Martir de rebus Oceani & insularibus, *Descriptio*
Dec. 3. lib. 8. E Copeia [inquit] arbor, pax
non aliter legitur, quàm ex Pinu, licet dicant ple-
rique stillicidio colligi, comburendo eius lignum. *Fructus.*
Fructus autem eius parvus est, vti Prunum, et
satis aptum. Arborescens esse hanc existimandum
est, cuius folijs, Chaldaei literarum primi reper-
tores, conceptus mentis absentibus significabant.
priusquam vsus chartæ reperiretur. Spithameum
est latitudine folium, rotundumque, et acutum
stylo



Nux Indica.



Palma Elephas Acofta.



ginosus, recens sapidus, subdulcis, inueteratus rancidus, in medio concavus: in quo maturo ac recenti liquor gustu suavi ac dulci continetur, qui ætate accescit ac rancefcit, donec tandem penitus concrefcit & exiccat.

Osseus cortex diligenter politus & argento decoratus apud plurimos hodie speciosi poculi vice in conuiuia venit, quale & nos habemus munere Ill. E. C. Wirtemb.

Arbor ipsa, autore Garcia, vastæ est magnitudinis foliis Palmæ aut Arundini similibus, aliquantulum tamen latioribus: flore Castaneæ, materia fungosa & ferulacea. Tradente quoque Costa, præalta est arbor, & recta, nec admodum crassa, præsertim in fastigio: nam ab infimo ad summum paulatim gracilefcit, & colore cinereo est: truncum à radicibus ad fastigium usque paruis quasi gradibus circumdant rami, qui ascensum scalarum vicem præbeant: flos Castaneæ similis: fructus vero integer capite humano maior, forma oblongiore, trianguli, & colore viridi, admodum diluto. Coccus ferentem arborem inquit Clus. apud Garciam palmæ modo crescere & in altum extolli,

ex Fabricii Mordentis Salernitani aliorumque relatu, qui eam nascentem conspexerunt, intelligebam: eius autem candicem minimè scabro, ut Palmæ Dactyliferae, sed laui cortice esse præditum. Eam ob causam vinculis ligaturisque ex spartho aut alia similia materia constantibus per interval- la subinde cingi solere, eaque vincula ferreis clavis trunco interdum adfigi, ut firmius hæreant, facilioremque ascensum præbeant: alioqui difficulter omninò scandi posse, nisi laqueis pedibus aptatis. Eius ramos, ut in Palma deorsum inflecti, arcus instar, dorsòque esse eminentiore oris utrinque in anteriorem siue supernam partem vergentibus, unde folia nascuntur Palmæ similia. Ex inferiorum ramorum, qua caudici inhaerent, alii, alios enasci ramos, qui quinas & senas proferant Noces crassas (imò etiam multò plures, interdum usque ad vicenas, quemadmodum mihi Amstelredami anno 1597. referebant Indi eodem anno à Iava maiore aduecti) suo multiplici densòque velamine testas. Porro aded vicinas interdum solère crescere Areæ & Cocciferæ Palmæ arbores aiebat Fabricius, ut illarum rami mutuo sese implicantes, pulcherrima umbracula præberent ad Solis radios æstusque arcendos. In his etiam commorantur plerumque Simiæ & Cercopitheci, pæcque ramos ex una arbore in alteram transcendunt, venatorum qui eas persequuntur conatus ea ratione subinde eludentes.

Illarum autem arborum materies non est fungosa, ut Palmæ illius quæ Dactylos fert, neque ferulacea, ut Garcias allerit, sed solida & ad fabricas idonea: neque minùs elegans est & splendens, quàm Iuglandis materia: & ipsemet paulò post, materiem ad plurima vtilem esse fatetur.

Eandem arborem & historiam eius pereleganter tradit Scaliger, in hunc modum. Coccum ferens palma trunco est recto, procerò, excelsæ altitudinis, ad summa usque in orbem sese effundentium ramorum initia inoffensæ luxuriantis. Palmæ folium, quo tegunt ædes factis ex eo storiis, certo aduersus iniurias cæli munimento, senum mensium utilitate. Conferunt gerit fructum, palmarum more, singulæ ad centenas, ducenave noces. Medulla recens esculenta est, tum per se, tum loco panis cum obsonio, Sapor Amygdali, sed iucundior. E sicca farinam faciunt, atque ex ea panem. Tegitur medulla cortice proximo ad carbonum usum accommodato. Aunfices sibi præcipuum habent. Vrunnt etiam ac cineres legunt ad medicamenta. Extimum corium multis inuolucris quasi stupeis, crassissimum ita interpolatur, ut ex eo tanquam Gossypium fiat: cuius tenuissimam partem ad pannos apparant, lericis non ignobiliores. Quod reliquum est, nent ad funiculos: de quibus deinde complexis, rudentes componunt. Eius stilum *Cambaya* vocant Indi. Vbi nux prodire, atque consistere incipit, simul intus aqua concreatur, simul atque perfecta nux est, completur aqua: cuius incrementi finis initium nuclei est. Ex eius namque condensatione concrefcit nucleus. Quantitas aquæ Cyathos mensarios interdum trinos explet. Eius sapor nõdareus cæteros omnes, ut aiunt, superat suauitate. Ex nuclei medulla pressa nobilissimum faciunt oleum. Ex fratribus fieri possunt cineres. Vbi arbor ad iustam adoleuit magnitudinem, quosdam è ramis Augusto mense ad medium amputant: eius, v. quod reliquum est, summitatem ferro paululum sciunt. Singulis appensus calix quatuor scyphorum completur in die. Crudus liquor bibitur cum sapore & vi. Coctus sapam excellentissimam

Descriptio
arboris.
Folia
Flores

Fructus.

Rami.

Folia Pal-
mae similia.

Noces.

Simiarum
habitu acule.

Scaligeri
descriptio.

Foliorum
Spor.

Fructus
conferunt,
ad edenda
esculentia.

Pannus.

Carbonis;
Cinere.
Extimum
corium.
Pannus.
Faves cy-
rudentes.
Cambaya.

Aqua in
nux.

Nucleus.
Quantitas
aquæ.

Sapor no-
dareus.
Oleum nu-
clei.

Cinere.
nuclei.
Modus sci-
rendo li-
quoris.



Regem Emanuele dedit, cum eo primum ap-
pulerunt Lusitani.

*Folia nuci
Indica an-
plissimum
& lassa.*

Inuectæ porro sunt Antuerpiam superioribus
annis ex India merces magnis foliorum nuci In-
dicæ [vt allerebant] fragmentis inuolucris : cubi-
talia erant ea fragmenta aut ampliora, crassiora
tamen quam vt quicquid his inscribi commodè
posset : nam et si per modicum aperta essent : inter-
dum bubalini cornu crassitudinem æquabant, la-
uia utrinque & perpolita, ac, quantum ex fragmen-
torum magnitudine colligere licebat, quaternos
aut quinos cubitos longitudine, binos verò lati-
tudine superauerant, ita vt non incommodè æ-
des & naues his tegere, vt Garcias asserit, pos-
sint.

Huius fragmentum penes se habere, idem tes-
tatur Clus. à Guilhelmo Andrea Pharmacopæo
Antuerpiensi acceptum. Cæterum, tametsi in-
quit Costa [Nare] huius arboris nucem vulgò
appellent cum Persæ, tum Arabes, negant ta-
men Persæ legitimum esse nomen, sed Nargel di-
cendum : ipsam arborem Darach Persæ vocant,
Arabes *Siger Indi* : Turci autem arborem, fructum
Cox Indi : Brachmanes arborem nuncupant *Maro*,
nucem *Narala*. Recentiores Græci *κάρυον Ἰνδικόν*
vocant, Nucem vel Coccum Indicam. German.
Indianische Palmenbaum : *Indianische Nuss*.
Necernuss. Ital. *Noce d'India*. Gal. *Noix des Indes*. Bo-
hem. *Grechy Indian* ff. *Zerechon dio* / Hungar.
Coccom Hisp. dicunt arborem, & *Palmeiras* nucas,
Coccos.

*Tengam-
yan.
Eleus.
Fructuum
numerus*

Linschott. testatur arborem Malauarihus Ten-
ga maran nuncupari : immaturum etiamnum
Eleus. Idem testatur fructus sub solis, veluti
clypeo latere, iunctos inter se decem subinde
numero, rarissime vnicam nucem separatim pro-
dite. Lignum spongiosum, rarè densitate, nec
perinde firmum esse. Radicem ipsam tenui spa-
tio porrectam, contra fidem ferè testæ inhzrere,
ubi inusitatam trunci proceritatem, vt ascendens
oculos animumque aspicientium nimia altitudi-
ne perturbet, cum desperatione Lusitanorum,
quibus id facinus terribile habetur. Nucem ipsam
interiorem *Coccos* magnitudinem ferè habere oui
Struthionis, quæ etiamnum culleolâ viridi tegan-
tur, vt Noces Babiliæ seu Iuglandes dicunt.

Cyprip.

*Elat. Spa-
che.*

Cæterum non desunt qui nucem Indicam ni-
hil aliud esse, quam *ἑλάνη* Dioscoridis
affirmare aui sunt, inter quos est Amatus, qui
scribit Diosc. per Elatem manifestè nucem Indi-
cam intelligere. Primum huius fructus corticem
esse, quem Dioscor. inuolucrum & operimentum
fructus Palmularum vocat : Corticem lignosum
quoque eundem Elatem dicere, veluti Borassum
ali, in quo foramina quædam similes figuram re-
presententia, ob quæ Nux hæc à Lusitanis Quo-
quos appelletur. Medullam internam cor Diosco-
ridi dici : arborem ipsam siue Palmam à multis,
Pauperum refugium. Fructum virentem seu *Lanba*,
Deorum Ambrosiam plurimis appellari. Destillare
quoque ex ista arbore liquorem qui olei munia
suppleat, de quo & melle Diosc. simul, tanquam
ab eadem arbore emanantibus, mentionem fecer-
it cap. de Elzomelite. *Hæc ille*. Qui præterea
scribit : In India verò, & insulis cap. viridis Pal-
miras hodie nasci nouimus, ex quibus non so-
lum oleum lucernis, & cibo deseruiens extrahi-
tur, sed etiam vinum, mel, fructus, linum pro
parandis facculis, & ligna igni deseruiencia colli-
gantur, vt mirum planè sit quantis dotibus hanc
natura dotauerit arborem.

*Quam
vixit*

Amatus videtur non cognouisse palmularum

inuolucrum verum, dum vult Elatem, & Sp-
tham esse extremum Nuci Indicæ corticem.

Apud eos, qui scripserunt de Nuce Indica, ne-
minem obseruauimus, qui scripserit, ex ea Palma
destillare liquorem, qui olei munia suppleat. Ex
nucleo quidem exprimitur oleum. In Syria et-
iam prouenire Palmam hanc nuciferam nondum
legimus. Plinius autem scribit, Elzomeli man-
te in Syria ex oleis, non ex Palmis.

Fuchs. putat *κάρυον* Theophrasti, seu *Coccos*
Plinii esse eam arborem, quæ nucem Indicam pro-
dit. Eadem etiam opinio est Rob. Constantini.
Vtrum autem hæc conueniant, considerare lo-
cutores. Nos Theophr. & Plinii verba posuimus,
paulo post sub titulo Palmæ Cuciophoræ, vbi
describitur, qui nobis melius respondere vi-
detur.

Dubitamus præterea, an Nux Indica, quod et
Const. proueniat in Arabia, & Aegypto, & verna-
culâ linguâ vocetur Cocos.

Solemus Medicus suspicatur in Plinii lectione
de Cuci mendum esse, & legi velares. pro verico-
lores : collatione factâ verbarum Plinii, cum
Theophrasti. Talis refert ille. Nos potius Theo-
phrastum ex Plinio corrigendum censemus, vt
postea indicabitur.

Ryffius asserit, Palmæ, seu Nuci Indicæ Vete-
res non meminisse : Actuarium verò in *Diatryt* &
ac *Diatomato*.

Histor. præterea Lugd. ad Plinii locum de Pal-
mis [vbi scribit gigni in frutice ramis cubitalibus,
folio latiore, pomò rotundo, sed maiore, quam
Mali amplitudine Cycas] annotat Cycas esse
Theophrasto Coicas, hodie Coccas, iis qui in A-
ethiopia nauigant, othenis Nucem Indicam.

Hic obseruandum Hist. Lugd. Exponitur hi-
storias tanto hiato profligente, quæ hanc arbo-
rem tam ferè lapsam, vt Nucem Indicam esse
Dactylum, seu Palmam Thebaidem, atque ex
frutice nasci crederet, adducens Plinii verba,
quæ nos superius cap. de Palma recitauimus. Cy-
cas vocant [addit Hist. Lugd.] Coicas Theophr.
Nos autem Coicas Theophr. cum Cycis predictis,
cum Hist. asserere non audemus, nec etiam esse
Nucem Indicam, vt verò liberum sit Lectori-
bus indicare de istis, subiungemus, quæ, præter
dicta, Veteres & Neoterici de his scripserunt.

Inter frutices ergò, folia nonnullis sunt Arun-
dinacea [vt Theophrast. ipse testatur] vt Palmæ,
Coici, cæterisque similibus, quæ [vt in vniuer-
sum loquatur prædictus author] foliis angulati-
bus constant. Bulbosa plura, nec us pauciora
notare licet. e.g. Violam albam [*κάρυον*] Cytoen
[Græcè *κάρυον*, lege *κάρυον*, Hist. Lugd.] Cæterum Coi-
cas dicuntur, inquit Hieron. à Coice frutice in A-
gypto textili, & ad nexus utili, à quo & Fissellæ
genus. Coix Atticè, vt inquit Pollux, quod Do-
ricè Cois dicitur. Ruellius Hieronolai verba re-
citât pro suis, nec demonstrat, vbi Theophr. scri-
pserit Coicen ad nexus utilem. Robert. Const.
legendum censet *κάρυον*, vt Hist. Lugdun. dicitur
plantam esse *κάρυον*, recensentem apud
Theophr. inter Bulbacea. Gesnerus in *carthago*
bit *Coix*, & *Coix*, Palmularum species.

Lythospermum Arundinaceum Dalech. quæ
dam putant esse Coicen Theophr. de quo scribit
Hist. n. lib. 8. sub Lachryma Iobi. Quædam
descriptio, & icon est in Hist. Lugdun. quæque
Myconus Gramen nodosum suspicatur, malè
atum, traditur in Hist. n. lib. 8.

Quibdam [inquit Hist. Lugd.] Coix est Gl-
diol [*κάρυον*] species, à nostrate diuersa. Videtur
autem

Cycas

Hist. Lugd.

Nux Ind.

Cycas

Coix

Ruellius

Coix

Lythospermum

Lachryma

Myconus

Gladus













parte ad Nuce[m] Indicam referri possent. Veremur eum de incognitis sibi scripisse: quosdam inter se arbores confudisse, aut saltem aliqua inter se similitudine petiisse.

PALMA ADY INSVLAE S. THOMAE
& fructus Abanga & Caryoces.

CAP. CLXXXII.

Descriptio Merito Arbori ex Manicongo subiicimus Palmam *Ady* in cuius descriptione multa conueniunt, licet icon appositae, huic non respondere videatur, sed Musz. Palma *Ady* de palmarum genere est, ut tradit Tobias Roellus in Epist. ad Clus. cum scribit: Insula S. Thomae Nigrorum habet palmam tertiam, illis *Ady* nominatam, arbor valde celsa est, & insigni proceritate, arborisque truncus crassus, nudus, & erectus est, non suffruticat, ipsaque Pinum superat altitudine, ut mihi à variis relatum fuit. Trunci atque ramorum materies rara est, succo praegnant: foliis prioris palmarum similibus constat. In vertice plurima excrescunt germina, quibus praecisis vel caesim laxis, vas aliquod idoneum appendunt: in quo Lachrymantem colligant succum, qui vini vicem apud Indos tenet, & facile inebriat. Dulce hoc enim est, verum post aliquot dies accescit: Non omnes Palmæ tunc vini liquorem fundunt, sed ea tantum quæ *Ady* ab ipsis Nigris nominatur: nec idcirco fructus suos facere desinunt eiusdem arboris reliqua germina, quæ à ferro intacta manserunt. Huius autem Palmæ *Ady* germen non edunt incolæ istius Insulæ, quæ quidem maiori cura & diligentia percontatus sum, quod apud Garciam legerim, Incolas regionum Orientalium, Palmarum germinibus vesci: & quod sublato germine pereat Palma. Sed hac ipse de Palma Indica generatim loquitur.

Trunci & ramorum materies. **Folia.** **Succus.** **Facile inebriat, & crescit.** **Pinum.** **Truncus.** **Caryoces.** **Abanga.** **Ufus.** **Oleum.**

Nunc superest ut de fructu palmæ *Ady* aliquid subiiciam. Integer fructus Lusitanis dicitur *Caryoces* & *Carioffo*, ab indigenis Nigris illius Insulæ *Abanga* nominatur: qui satione producit arbore. *Abanga* nucleum ad se misit, cui etiam cum putaminis præduri pars inhærebat: putamen huiusmodi tegit pulpa seu caro fuluescens, ac pariter luteus est exterior cortex. Itaque cortici caro subest (non aliter quam in malo Persico) quam pullum putamen osseum sequitur: hoc vero intus nigrum continet nucleum esui aptum, qui adempta pellicula candidus est. Fructus integer formæ & magnitudine est Citrii istius mali quod *Limon* vel *Limonem* vocant. Edunt ipsi hos fructus inassatos, frequenter etiam crudos: Caryoces nucleos integros inter edendum miscent farinæ Manyouæ. Hos nucleos credunt ipsi mirum in modum reparare languentes ex morbo vires, aded ut suis ægris bis terque in die confortandi causa tres quatuorve *Abanga* nucleos exhibeant. Quod ipsis tam familiare est, quam nobis est ouum sorbile, vel pullus gallinaceus, uti asseriebant Lusitani, qui Indorum præfecto tunc temporis aderant. Præterea ipsi ex hoc fructu oleum conficiunt: nempe ut carni à nucleis auulsa adiciant aquæ feruentis bonam partem, deinde iubent ut pulpa in lebetæ diu agitetur, commisceaturque exactè super ignem, deinde remotum ab igne lebetem tanto temporis intervallo stare sinunt, donec amurca omnis in fundum subsederit: tandem oleum aquæ supernatans cochleari excipiunt: quo exhansto, iterum affusa aqua feruente bene commiscunt ut

prius, & postquam decoxerint, quicquid olei supernatauerit vasculo rursus excipiunt. Olei color croceus est, qualem Caryoces pulpa esse diximus, cuius tibi nunc speciem mitto in vitro vase, concreuitque ex frigore nostræ patriæ, aliis autem liquidum est oleum. Nisi vereretur Epistolæ limites nimis excedere, mouerem quæstionem quæ inter scribendum occurrebat: Cur nimirum Oleum in aqua supernatet? Dicunt aliqui corpora ob grauitatem submergi, & ob leuitatem natante. Quod autem corpora non ponderis aut leuitatis ratione natent aut subsideant, sed pro Elementorum, ex quibus constant, proportionem & dominium, locum inter Elementa petant: paruum scrupulus in flumine ostendit, qui ob terream & compactam lapidis substantiam subsidet: in quo ingens trabs ligneæ, ob æream eius & porosam substantiam supernatat. Sed his præteritis ad Oleum Caryoces reuertor, quod famem non minus tollere potest, quam oliuarum oleum & butyrum nostrum vaccinum: quare pransuri vel conatur, suis edulis hoc oleum miscent. Et cum apud nos Medioburgi essent, pisces, carnes, pyra, poma, alæque cibaria ex hoc oleo in sartagine torrebant, atque ad omnia obsonia tam assa quam elixa exhibebant hoc oleum Nigræ, ad quæ videlicet videbant venustas nostras ancillas butyrum addere. Sed Butyri nostri ex Batavia allati sapor & odor magis mihi placet: ipsique profecto ancillis nigris Galliâ deformioribus cum oleo isto instructa fercula epulasque lubens relinquam, qualque cum oliuarum vel amygdalarum oleo, præstanteue Zelandiæ butyro, ancillæ nostræ colore genarum roseo decoræ apposuerint, sæper præferā. Olei huius usus apud ipsos etiam vulgaris est ad inungendas corporis partes rigidas, atque contractas, imprimisque neruos distentos relaxare dicunt. Exercitatos etiam, & quousque labore fessos toto corpore inungunt: nepe quod exercitiis similes corporis partes exsiccantur, & colliquecant: quod ipsum humectatione sua impedit huius olei pertunditoria ac lubrica frictio. Hoc ipsum acopum est, & insigne lassitudinis remedium esse prædicant. Olim hæc corporum inunctio frequenti in usu fuit tam apud Græcos, quam apud Romanos illorum in delitiis æmulos: & habita certe fuit non postrema salubrioris Medicinæ prophylactica, id est, sanitatis conseruatricis, pars, ut partim Galeni scripta perhibent.

Huius palmæ *Ady* meminit autor descriptionis Guinæ, Manicongi, Angolæ & vicinarum regionum occidentis Oceani, ubi dotes regni Congo refert, In campis proueniunt permultæ & varix Palmæ, ut pote, quæ Nuces fert Indicas, & quæ dactylos gignit. Crescit præterea alia ibidem Palmæ species, non multum à duabus primis fronde diuersa, ex qua oleum, vinum, acetum, fructus, ac panem colligunt: per viam expressionis fit oleum è fructus pulpa, uti ex oliuis fieri solet, colore & substantia simile nostro butyro: præterquam quod è viridi in flauum colore magis declinet. Utuntur eo ipsi pro butyro & oleo lampadum flammæ eo alunt, eodem oleo sua perungunt corpora, ut glabra & agilia reddantur. Denique cibi vicem gerit necessitatis tempore, uti nobis euenit, qui fame perissemus, nisi hoc oleum habuissemus. Huius palmæ vel fructus nomen non refert: verum ex orationis serie satis patet, hanc esse palmam *Ady* quæ fructum *Caryoces* fert, ex cuius pulpa fit istud croceum oleum.




ter sentire videtur, dum Mehesbethe varietatem facit.


PALMÆ FACIE CUCIOFERA.

CAP. CLXXXVI.


Descriptio
fructus.




Cortex
externus.



Nucleus.



Cortex
internus.



Germen
Cucioferæ.

Germen
Cucioferæ.
In quo dis-
ferat al-
ter.

gdalarum dulcium nucleus, semunciam crassa. Cavitates duas habet: alteram in totius fructus medio oblongam, fructus formæ respondentem, inæqualiter tuberosam, pulvis ex oryza facie, sed comæa duritie, cæteroqui inanem: alteram in parte turbinata paulò supra priorem incipientem, & ad corticem desinentem, oblongam, exiguam, quam exactè complet corpusculum quoddam, rufum, molle, dulce, quod germen existimamus, à quo per maiorem cauernam solum demittitur, duritie, colore & sapore cum nucleo conueniens.

Theophrast. lib. 2. cap. 4. de Aegypti arboribus tractans: *κυκιοφάρα* [inquit] appellata, Palmæ similis est, similitudinē habens in caudice & foliis. Sed differt ab ea: nam Palma individua simplēxque assurgit: hæc autem, ubi plussculum adoleuerit, diuiditur & fit bifida, [sic enim legen-

dum, non *αἰών*, ut in vulg. habetur, quasi diuisa fiat cacumen: inepto sensu.] atque uterque ramus rursus subdiuitur. Fert præterea virgas breues & paucas. Cortice, [sic enim] forte pedibus legas *εἰς* folio: quam lectionem Palmæ historia approbat.] sicuti Palmæ ad utensilium nexu videntur. Fructum peculiarem parit, magnitudine figura & succo [χυλός: non *χυλός* ut vulg.] à Palmæ fructu differentem: quippe magnitudine serè, quā manū adimpleat, rotundum, non oblongum, [sic enim] colore flauicantem; succo dulcem & ori grauisimum: cæterum non confertum, ut Palma, sed singillatim diuisum: nucleo magno, vehementer duro, ex quo velares detornant annulos, [sic enim] legimus cum Plin. vulg. *αἰών* habent: Gaza versicolores annulos verget.] ad lectorum pedes conficiendos: [quibus in singulariis vinculis vtuntur, Gaza.] Materies quoque à Palma plurimum differt: altera enim (nempe Palmæ) rara corpore, fibrosa & viridis: altera spissa, grauis, carnosaque, & cæsa crispa admodum, atque dura. Ideò & apud Persas ad lectorum vsum, quorum pedes ex ea conficerent, in pretio fuit.

Eadem serè & Plin. transtulit lib. 12. cap. 9. Casticulo. Cuci [inquit] in magno honore, Palmæ similis, quando & eius foliis vtuntur ad textilia. Differt quòd in brachia ramorum spargitur. Pomo magnitudo, quæ manū impleat, color fuluus, commendabilis, succo ex austero dulci. Lignum intus grande, firmæque duritie, ex quo velares detornant annulos. In eo nucleus dulcis, dum recens est. Siccatus durefcit ad infinitum, ut mandi non possit, nisi [nisi in M. deest.] pluribus diebus maceratus, Materies crispioris elegantior, & ob id Persis gratissima.

Cæterum textilem Persicum, quàm Theophr. plurimam in Aegypto memore Thebaico fuisse scribit, quidam [inquit Hermod.] pro Cuci capiunt Palmæ simili, alia à Persica.

Cordus nucem Indicam minorem vt cat, & Theophrast. Cuci appellari ait: cui tamen Cuciophora dicitur & Plinio. Cui sic describit: Cui dicta nuci Indicæ similis est, multò tamen minor: totus enim fructus tres aut quatuor uncias longitudine rarò excedit, idem superius latior est, quàm inferius, ubi pediculo adnascitur, figura triquetrus, foris carnosio venosoque cortice, intus lignoso constans, quo nucleus continetur oblongus, in summo quàm imò latior, vtriusque corticis modo triquetrus, vnus tamen angulus harum partium acutus est: reliqui duo obtusi ac teretes. Color nucleo & in superficie fulcus, intus candidus: habet etiam in medio cavitatem proportionem toti fructui respondentem, aequo volumine plenam, paulatim cum exiccatur euanescit. Substantia nucleus constat primum cartilaginosa, paulòque duriore, quàm maior nux Indica, sed cum inueteratus fuerit, cornu soliditate equat, qui pluribus diebus in calida aqua maceratus teneræ cartilaginis duritiem acquirit. Saporem habet, quemadmodum & odorem furrancidum, velut maior.

Cordi descriptionem hic totam dedimus, vt iussent Lectores vtra opinio verior, Nostra, qui ad Cucioferam referimus, an Caspari Bauhino, qui ab ea diuersam facit, vt antè dictum cap. de nuce Indica. An Anguill. epistola quarta Plinii Ariens, qui ait ex Nubia, distantissima regione, adferri, cuius fibrata substantia masticata paucam præbeat dulcedinem, reliquum expui: nucleum internum, Præpo similem esse, viridantem

THE
JOURNAL
OF
THE
ROYAL
ANTHROPOLOGICAL
INSTITUTE
OF GREAT BRITAIN
AND IRELAND
VOLUME 100
PART 1
2000



THE
JOURNAL
OF
THE
ROYAL
ANTHROPOLOGICAL
INSTITUTE
OF GREAT BRITAIN
AND IRELAND
VOLUME 100
PART 1
2000







lib. 12. cap. 5. ubi postquam de Ebena tradidisset, sic ait: Iba (in India videlicet) & spina similis, (Ebena dicitur) sed deprehensa vel lucernis &c.

PALMA YRI

CAP. CXCIV.

IN Brasilia, ut scribit Lenus, Palmarum quatuor sunt quinque species conspiciuntur: inter communes sunt, quas Sylva homines vocant *Gerau*, & quae dicuntur *Iri*, sed in nulla earum Dactylum vidit, existimat etiam non proferre. Yri quidem fructus est rotundus, Prunellorum seu Pruni sylva dicitur specie, sed in magnum racemum congestus, tantae magnitudinis, ac ponderis quantum homo vna manu attollere queat: sed meri sunt nuclei, necesse est nucleis maiores, quorum quidem sit vltus. S. d. & teneram quandam gerit summitatem inter folia istarum sed iuniorum, quam in cibum cadebat cum locis: testaturque nobilem à Ponte hzmorrhoidibus vexatum, dixisse eas sibi remedio fuisse. Antea egimus de Palma *Lauror* dicta fructu cerasi, sed ab hac diuersa.

EBENVS.

CAP. CXCV.

Ebenum coniungamus Palmis ansam praebet Plinius, qui Ebenum Palmarum generis facit. Hanc quoque modò descripta, quae à quibusdam Ebenus existimatur, Palmo est folio. Ceterum Ebeni lignum quale ad nos Europaeos importatur, (Hoc etiam testante Hen. Schuckart, industrio & peritissimo Ill. E. C. Witemb. Architecto) duum est generum: *Verum* seu genuinum: [Gutt Eben Germ.] & sylvestre: [Wild Eben] Vtiusque fructum egregium & perpolitum dono ab eo accepimus.

Estque illud quod *Verum* appellatur sylvestri ponderosius, nigrum, alicubi interdum colore ligni nocis luglandis, aut etiam pallidius, quam coloris varietatem in bonitatis notis habent. Passim ceu minutis quibusdam segmentis scarificatum, longè frequentibus aliis splendidantibus nec impressis refertum. Idem Architectus aliquando, sed rarius, hominis crassitudine truncos vidisse testatur, sed nullum vnquam quod non putredinis aliqua labe alicubi fuerit infectum: quale & nos aliud habemus, ac suberis quodammodò fungosa substantiae in parte quadam, quod ætati & corruptione tribuissimus, nisi monuisset aliter.

Sylvestre ab eo vocatum, prædicto nigredine ac pondere cedit, sed vix elegantia atque splendore: passim quoque lineis ceu scarificationis quibusdam vestigiis, verum non ut inprimis profundis aut incisis, nihilominus tamen splendidibus, conspicuum. Veri portio adolefcens flamma, non iniucundum spirat odorem, ut nobis quidè videtur, nò tamen sine odoris quadam gravitate peculiari. Vtrumque aquae iniectum protinus sidit: & vix aliud è lignis inuenias ponderosius. Videtur tamen sylvestris natura nonnihil pinguior & oleaginosior esse. Sed quid Auctores de hac tradiderint audiamus.

Theophrast. de arboribus Indicis tradens, Ebenus (id est: Gaza Habenum vertit.) quoque, in-

quit, eius regionis propria est: Cuius duo genera: alterum præstanti pulchroque ligno alterum vile ac ignobile. Rarum est id quod præstantius: aliud copiosè habetur. Coloris gratiam recandita & asseruata non acquirit, sed natura sua. Ipsa arbor fruticosa est, veluti Cytisus. (Sic enim Plin. & Gaza tantisper legamus, donec prodent qui nos doceat quid sit *habenum*, ut in vulg. exempl. legitur) Eius lignum Buxo [oixu] aspectu simile est, sed decorticatum, nigrum apparet: multae durationis est, ac naturae quodammodo perpetua: nam ne aresfactum quidem lenius redoluit. Graue est, quia densum.

Aristoteles Ebenum aquas subire ait propter densitatem in lib. de mistorum affectibus. Non autem fluitare ait, quia *habenum* dicitur. Quo ex loco & id obseruandum, quod ait: in *habenum* dicitur. Quasi etiam non nigra quæpiam sit Ebeni species, ut ne id quidem latuerit Virgilium, qui epitheton adiecit, tanquam necessarium, cum dicebat: Sola India nigrum fert Ebenum. Herodotus tamen ex Aethiopia post expeditionem Cambysæ vestigales Aethiopas factos, septenas Ebeni phalangas tributum nomine Persarum Regibus pendere solitos, scribit, ut mox quoque specialius dicetur ex Plinio. Id quod ad egit utros doctos (ut annotat Scal.) suspicari, Guaiacum iam vtu Venerem luis factum nobis populare, nihil esse aliud, quam Ebenum decolorem. Quæ si sunt assinia, pondus hominum opinionum, quam specie, meminimus, ab autoribus prodigiosas Ebeni Buxo similes: Guaiacinas vidimus allatas, Comari, Laurisue facie. De Pausania quoque in historia [inquit idem] mendacis est hic locus: Ebenum radicem esse operiam stipite. [Sed ex alterius sententia illud tradit, dicitur mox.] Contra, impostores & phalangas pedestres lanceas venditant è Terebintho, & ceteris atramento Populas assulas ad speculorum capsulas: & ad tessellatum emblematis ornatum Roboris frustilla, quod diu sub aquis natum fuerit nigredinem commendabilem.

Plin. de Ebena sic tradit: Vnam è peculiaribus Indiarum arboribus Virgilius celebravit Ebenum, nusquam alibi nasci professus. Herodotus eam Aethiopiae intelligi maluit, ac in tributum vicem regibus Persidis è materie eius centenas phalangas tertio quoque anno pensasse Aethiopas cum auro & ebore, prodendo &c. Romæ eam Magnus Pompeius in triumpho Mithridatico ostendit. Accendi eam Fabianus negat: vitur tamen odore iucundo. Duo genera eius: rarum, id quod melius, arboreum, trunco enodi, materie nigri splendoris, ac vel sine arte protinus iucundi alterum fruticosum Cytisi modo, & tota India diffusum. [De utroque id Theophrast. non tantum de viliori: ubi videas aliter hæc tradita loco paulò antè citato.] Spississima ex omni materie, idè & granissima iudicatur Ebenus & Buxus. Gracilis natura: (magis placet hæc sectio, pro vulgata illa, Ebenus & Buxus, graciles: nam paulò antè arboreum dicit: & vili sunt trunci arborum iuxta magnitudinis. At Theophrast. Buxum quidem totam gracilem dicit, Ebenum medulla) nec tamen in aquis fluitat. Cytisus proximè accedere ad Ebenum videtur. Quanquam non desunt, [ut Theoph.] qui Syriacas Terebinthos nigiores affirmant.

Porro quod antea de Pausania dictum nequam fabulosum existimat Matthiol. Ergo ut res proprius cognoscatur, verba eius producenda. Is Græciam describens sic ait: Audivi Cyprium hominem

Amegilla.
Ephorus.
Ephorus.
Amegilla.
Amegilla.

**Elements
of...**

**Edmund
Adams
Jr.**

Ebeni dele-
ti
Ebenus de-
thiopica.

**Ebenus
Sachs**

*Alia Ebena
adulterina.
Vt focus
diagnosticen-
do.*

Am Ecken
soll man sie
Dose.

March 1965

Cart. nat.

**After Care
ing error.**

Ebenum
Venerunt
esse Labor-
antes
Ebeni ma-
dalla Cysti-
sui.
Ebenus
Cretica.

Marsh, Wm.

Marshall
particular
of
Gardner,
not.

Offr. Eben.
Rus. S.
Species
Gmelin.

Lab. of Pol.
2002

Ebenum, ut ipsimet cap. de Agallocho aperte declarant: Et Lob. in Obl. ait, Hebenum: siue Xylaloë, officinarum legendum: nullo sanè labore resutantur: Non enim nigra est Xylaloë, cui quàm benè Guaiaci odorem tribuant, ipsi videntur.

Hist. Lugd.
m.

Hist. Lugd. quoque Ebenum officinas pro Xylaloë habere ait: quasi nec ipsa apud priscos illos Theophrast. Diosc. Plin. & alios legisset Ebenum esse nigrum.

An verò Ebenus sit species Guaiaci, uti censent, asserere non possumus. Sanè quæ Ebeni nomine hodiè habetur ligna, nec odore, nec sapore nec pinguedine cum Guaiaco conueniunt. Videntur & Guaiaco duriora, quamvis substantiæ soliditate ac pondere ad id quamproximè accedant. Hæc quoddam Ebeni putare, supra dictum. Lacuna plures Ebeni species esse scribit, excellentissimam autem quæ vulgò dicitur Guaiacum: Sed vnde hoc scit.

Synonyma
Lingual.
Hebenus.
Hebenum.
Ebenus.
Ebenum.
Eben.

Dicitur Græcis Ἐβένος, & Ἰβένος. Suid. Ebenus siue Ebenum, teste Seruio Mauro: vel uti alii scribunt, Hebenus & Hebenum. Sed melius Ebenus dici videtur, à nomine Hebræo Eben, quod lapidem significat, ut notat Gesn. Sanè & hæc Hebenus & hoc Hebenum cum aspiratione & sine ea scribitur à doctissimis autoribus. Luc. lib. 10.

— Hebenus Martensia vassus

Non operis posses.

Hebenus autem, inquit Seruius, arbor est, quæ cæcà durefcit in lapidem. Malimus tamen hæc in parte sequi Græcos [quod & ipsa Græca dictio esse appareat] qui sine aspiratione scribunt.

Haben.

Coropio notante, in Vertumno, Hebenum dicitur Haben apud Hebræos, ut est apud Ezech. c. 27. Verùm quia Hebenum vox est Latine, Græcis, Hebræis, Arabibus & Chaldæis communis, suspicatur iam ad antiquissimos referendam natales. Haben namque, quod [inquit] aliud est quàm Hant-been, [Cimbris id est lignum osseum, siue lignorum os. Arab. dicitur Habenum, vel ut alii volunt Abanus ut Serap. cap. 152. seu Abenus, Barbaris Ebanus. Germ. Ebenholz: Gal. Ebene noir: It. Ebano: Hisp. Castil. Ebano: Portug. Abenu: Apud Paulum Epulionem Marcorum, (qui in epistolis à se collectis scribit inter munera milia regi Hisp. Philippo per Regem Persarum, fuisse quattuor cornu de legno Audanico, quali resplendens como specchio, [per lignum Audanicum splendens ut speculum, Ebenum intelligendum suspicatur.

Locus

Theophrast. Indicam tantum dixit Ebenum: Dioscor. tam Aethiopicam, quàm Indicam. Virg. Georg. 2.

— Sola India nigrum

Fert Ebenum, sicut est thurea virga Sabeis.

Ad quam Virg. sententiam Seruius: Atqui, inquit, & in Aegypto nascitur. Sed Indiam omnem plagam Aethiopiæ accipimus, quàm & Virgilius, vel Constantino teste, Indiæ nomine complexus est. Lucanus per Mareoticam Habenum Aegyptiam videtur ostendisse, ut idem putat. Negat tamen Plin. in Aegypto nasci. Solinus exigua Aethiopiæ parte tantum crescere autumat. Strabo ex Megasthene scribit, apud Prasios (in India) nasci. Apud Plin. Meridiano Aethiopiæ cardine sylux Hebeno maximè virent: quod & Theuetus confirmat, additque etiam in Calecut nasci. Ex Pomponio Mela discimus etiam in Arabia, & aliis variis locis nasci, ut annotat quoque Amatus, qui addit, hodiè magnos truncos in officinis haberi ubi pectines fiunt, & eos egregios. Videas sa-

nè Venetis & Augustæ Vindelicorum tanta copia Ebenum, ut sint ibi artifices, qui nihil aliud ferè quàm hoc lignum tractent. Apud Magnum Ducem Hetruræ splendidissima opera affabrè facta ex Ebena nigerrimo, politissimo, nec vulgatae magnitudinis vidimus, & videre possunt curiosi qui Florentiâ transeunt. Ferunt, inquit Curtius, Ebenum in mari rubro nasci, solus Fructusque Olux proximo. Sed hæc nouitas morebatque titulum sui autoris.

Cariem inquit Plin. non sentit Ebenus: eandem maximè æternam potant, claro iudicio in templo Ephesæ Dianæ, de cuius simulacro Dea ambigitur. Ceteri ex Ebena esse tradunt.

Ebenum Theophrastus ad cotem tritum, oculis vtilem prædicat. Et, ut scribit Dioscor. vim habet ea extirpandi, quæ pupillis caliginem offundunt: pollet & ad veteres fluxiones ac pustulas. Quod si quis facta ex ea coticula (ἀκόρυς) vtatur ad terenda collyria, efficacius medebitur. Ad oculorum medicamenta efficax quoque redditur, si scobes ramentæ in vino Chio per diem ac noctem macerata, diligentèrque ad leuorem contrita, in collyria digerantur. Nonnulli ipsa prius trita cribro cernunt, ac deinde reliqua eo modo peragunt. Quidam pro vino aqua vtuntur. Vritur etiam in fustili nouo, donec in carbones redigatur: lauatique plumbi vsti modo: Itaque præparatum aridis scabrisque lippitudinibus conducit. Non tractamus, inquit, in medicina alienos orbes: non omittetur tamen Ebenus propter miraculum. Scobem eius oculis vnicè mederi dicunt: lignumque ad cotem trito cum passo, caliginem discutit. Ex aqua verò & radice, albugines oculorum. Item tussim pari modo Dracunculi radice adiecto cum melle. Ebenum medici & inter arrorentia assumunt. Consideratione quidem dignum quomodo intelligenda Plin. verba inter arrorentia.

Eiusdem meminit Gal. lib. 6. simpl. his verbis. Ebenus ex iis lignis est, quæ trita cum aqua faciliè in succum resoluuntur, quæ ac lapidum nonnulli. Vis ei inest excalfaciendi, extergendi & tenuium partium, quamobrem quæ pupillas offuscant vitia extergere creditur. Miscetur aliis remediis ocularibus, quæ ad vlcera vetera, fluxiones & bullas siue pustulas accommodata sunt. Ceterum variat nonnihil Plin. à Dioscor. qui Ebenum super coticula tritum collyriis indi ait: illo autem Ebeni ligno ad cotem trito caliginem discutit. At Serapio ex Ebena parati coticulam [fricatorium vertunt] cui collyria affricentur. Sed res eodem ferè redit, modò vis medicatrix collyrii dependeat ab Ebena. Aroris sanè voce Græci non modò coticulam intelligunt, sed & medicamentum ipsum ad cotem tritum, qualem ex Ebena fieri ad eum usum perinde ac ex hamatite nihil vetat.

Strabo autor est, Indicos exercitum, præcipuè frictionem probare, maximè strigilibus leuibus corpora expolire.

Ebeni licatos truncos, teste Matthioli, maximè hac ætate nouit Italia: namque innumeri videntur in eorum officinis, qui pectines conficiunt ad explicandos aptandosque capillos: item apud illos, qui globulos funiculo trahendos ad preces numerandas torno in orbiculos expolunt. Porro quod de frictione ait Strabo, id & Curtius probat ex Celso, quod corpus exedat, euocet, educat, leuetque exasperatum. Curtius etiam miratur, aliquos credere pectines & orbiculos deprecatorios, aliæque minima & leuia, corni opera, ut ille ait, ex Ebena fieri, præsertim verò cum tor-

& tam

Curtius
m.

Duratio.

Vires &
Vitis
Oculorum
caligo
Fluxiones.

Carboni.

Albugo
Tufa.

Galien.

Temper.
Sicca.

Strigil.

& tam varia venundanda exhibeantur. Existimat enim tantū pretii ac nobilitatis lignum in vulgatos hos vsus non venire, rariūque esse, quā ut eousque innotuerit vulgo.

Vrnsilia.
Scapra

Pet. Martyr de rebus Oceani & noui orbis, in insula Guanabana scribit esse vrnsilia ex ligno nigerrimo, lubrico, lucido, quod Hebenum Doctor I. Baptista Elysius esse contendit.

Detrum fr.
mulachra.
Pocula.

Contra
maleficia.

Reges Indos ex Ebena scapra gestare, Solinus author est. Eisdem non nisi ex Ebena Detrum suorum simulachra fingere: item pocula crateraque ex eo fabricare tradunt, quod si tanē credant contra maleficia efficacissimum esse, & quicquid venefici fuerit, tractu eius auerti. Ut itaque nil mirum sit, si peregrinū in pretio sit, cum etiam his apud quos nascitur & familiare est, ipsique addē Regibus summo in honore sit.

Refert enim Plutarchus in vita M. Antonii Cleopatram Aegypti Reginam, Alexandriæ, apud Isis adem, & in præclarissimis sepulchris, aurum, argentum, pretiososque lapides, Ebum quoque, & quicquid denique rarum ac pretiosum haberet, condidisse & occultasse, propter bellum, quod Octavius Cæsar contra eam, & Marcum Antonium gerebat.

Ad alligatum infantium cunis, tumultuosa insomnia prohibere scribit Albertus.

Hodie, ut dicebamus, varia opera ex ea fiunt, apud Magnates & Principes, thecæ, arcule, abaci, capsellæ, speculi thecæ, pectines, narthecæ, tragematothecæ, sellæ plicatiles, pocula, ad altaria exornanda, signa crucis, cingendas imagines Principum aut Sanctorum, & alia eiusmodi: prope modum infinita, eaque vel per se pura, vel auro, argento, aut ebore vario artificio adornata, qualia Venetiis, & Augustæ Vindelicorum apud artifices aut Magnates videri possunt.

EBENI VERSICOLORIS MATERIA ARBOR PYRIFOLIO.

CAP. CXC VII.

Descriptio

Vfus?

Scribit Theoph. lib. 5. cap. 4. vbi de Terebintho Syria agitur, quæ Ebena nigrior. Aliam arborem reddunt, quæ cum nigredine varietatem quandam præ se fert subrutilam, ut aspectus Ebena versicoloris appareat, fieri ex hac lectos, & subsellia, & reliqua lautiora opera narrant. Amplam maiorem in modum, & frondibus conditam pulchris, similēque Pyris eam assignant.

FRUCTVS PEREGRINVS TETRAGONVS.


CAP. CXC VIII.

Locus.
Descriptio
arboris.

Fructus.

Fructum peregrinum tetragonum referebant, teste Clusio Exot. Batavi Naucleri, qui inunte Septemb. anno 1601. ex Iana & Moluccis Insulis reduces Amstelredamum, in quali tamen arbore nasceretur intelligere nequii. Si tamen coniecturā uti licet, prægrandis alicuius palmæ cuiusmodi illa, quæ magnas Indicas nuces, vulgō Coccos appellatas, aut nucem Fausel, siue Apocam profert, fructum arbitror, atque plures simul ex crasso vno pediculo instar illarum pendere.

Binas autem eiusmodi nuces videre mihi contigit. Vnam magnam, quam Cl. V.D. Petrus Paauvius artis Medicæ Professor in Academia Tom. I.



Lugduno Batava, à Mercatorū societate cum aliis quibusdam exoticis adquisuerat. Alteram longē minorem, quam mihi donabat Amstelredami honestissimus vir V. Valchius Syuertz, illius vrbs Pharmacopæus, ab Isbrando Hieronymi F. Cheirurgo, qui eam retulerat redemptam. Vtraque verō quadrangularis erat

formæ.

Maior porro, nitidiore & luvioe cortice testâ, *Fructus maior.* septem uncias à summo fastigio ad pediculum *vt.* que longa, pedem cum semisse crassa erat, siue sesquipedalis eius ambitus: singuli enim anguli quatuor penē uncias cum semisse ab invicem distabant: cortex valdē densus, ex multis fibris, retis quodammodo formâ contextis, constans, materiam fungosam intermixtam continebat, corioque, ut dixi, laui & splendentē, spadiceo coloris, *Cortex.* exteriore parte tectus erat. Tota tamen nux valdē levis pro sua magnitudine: quid verō ea contineret, me latebat, quia, cum mea non esset, *Color.* perire nolebam. Sed minorem, quæ mihi donata, *Minor.* mediam secabam, ut me omni dubitatione exolucrem: nam quum Cheirurgus, qui illam attulerat, affirmaret, se in maris littore nascentem eruisse, mediâ ex parte arenâmersam, fibrisque in ea firmiter hærentem, & supernâ parte cauliculum promere lignosum, viridi cortice tectum, fastigio quina aut sena folia Myrtinis similia sustentem, eaque aded ratione bulbaceam esse plantam sibi *Planta bulbacea.* persuaderet: ego verō multas notas conspicerem, quæ me, ut arboris potius fructum esse crederem, impellerent: illam aperiebam.

Superiore longē minor hæc erat, ut quæ tres *Descriptio.* duntaxat uncias cum semisse longa, octo autem ambitus contineret, non nitido cortice testâ, ut superior, sed valdē rugoso, quo ante maturitatem adempta, & subrutâ cute testâ, quadrangularis, perinde atque superior, formæ, sed angulis magis inæqualibus, neque aded distinctē ab invicem coniunctis, sub externa cute, multis fibris, retis instar transuersim sese interfecantibus, cortice *Cortex.* constabat, quemadmodum etiam interiore parte, quæ ossiculum tegebat & inter illas fibras, fungosa materia insipida, & valdē resiccans, suberini corticis instar: ipsum ossiculum formam habebat ab infima *Ossiculum.* sede latiore in metam assurgentem, & crassiusculum erat, molle tamen [quia fructus immaturus] subrubente cute tectum, acidi saporis, sicut etiam nucleus qui in eo continebatur candidâ membranâ tectus.

Hæc sunt quæ de illo fructu, seu nuce, commentari potui: quia qui retulerant, nihil ad eius historiam plenius & accuratius describendam asseriebant, præter paucas illas incertas, quas entemerqui notas.






ter sentire videtur, dum Mehenbethe ne varietatem facit.


PALMÆ FACIE CUCIOFERA.

CAP. CLXXXVI.


Descriptio
fructus.




Cortex
externus.



Nucleus.



Cortex
internus.



Cavitas
interna.

gdalarum dulcium nucleus, semunciam crassa. Cavitates duas habet: alteram in totius fructus medio oblongam, fructus formæ respondentem, inæqualiter tuberosam, pultis ex oryza facie, sed comæ duritie, cæteroqui inanem: alteram in parte turbinata paulò supra priorem incipientem, & ad cordicem desinentem, oblongam, exiguam, quam exactè complet corpusculum quoddam, rufum, molle, dulce, quod germen existimamus, à quo per maiorem cavernam filum demittitur, duritie, colore & sapore cum nucleo conveniens.

Germen.
Cuciofera.
In quo
describitur
aliquid.

Theophrast. lib. 2. cap. 4. de Aegypti arboribus tractans: *κυκιοφάρα* [inquit] appellata, Palmæ similis est, similitudinē habens in caudice & foliis. Sed differt ab ea: nam Palma individua simplexque assurgit: hæc autem, ubi plussculum adoleverit, dividitur & fit bifida, [sic enim legen-

dum, non *ἀνὰ*, ut in vulg. habetur, quasi divisa fiat cacumen: inepto sensu.] atque uterque ramus rursus subdividitur. Fæst præterea, virgas breves & paucas. Cortice, [quæ æstote pectus] legas *εὐλα* folio: quam lectionem Palmæ historia approbat.] sicuti Palmæ ad vensilium nexu videntur. Fructum peculiarem parit, magnitudine figura & succo [χυλῶς non χυλῶς ut vulg.] à Palmæ fructu differentem: quippe magnitudine ferè, quā manū adimpleat, rotundum, non oblongum, [ἀσφαιδὲς] colore flavicantem; succo dulcem & ori grausissimum: cæterum non confertum, ut Palma, sed singillatim divisum: nucleo magno, vehementer duro, ex quo velares detornant annulos, [αἰκίς legimus cum Plin. vulg. αἰκίς habent: Gaza versicolores annulos vertit.] ad lectorum pedes conficiendos: [quibus in strigularis vinculis vivuntur, Gaza.] Materies quoque à Palma plurimum differt: altera enim (nempe Palmæ) rara corpore, fibrosa & viridis: altera spissa, gravis, carnosaque, & cæsa crispa admodum, atque dura. Idè & apud Persas ad lectorum usum, quorum pedes ex ea conficerent, in pretio fuit.

Eadem ferè & Plin. transtulit lib. 13. cap. 9. Cuci titulo. Cuci [inquit] in magno honore, Palmæ similis, quando & eius foliis utuntur ad textilia. Differt quòd in brachia ramorum spargitur. Pomo magnitudo, quæ manū impleat, color fulvus, commendabilis, succo ex austero dulci. Lignum intus grande, firmæque duritiei, ex quo velares detornant annulos. In eo nucleus dulcis, dum recens est. Siccatus desecit ad infinitum, ut mandi non possit, nisi [nisi in M. deest.] pluribus diebus maceratus, Materies crispioris elegantia, & ob id Persis gratissima.

Cæterum textilem Persicum, quàm Theophr. plurimam in Aegypto nemore Thebaico fuisse scribit, quidam [inquit Hermol.] pro Cuci capiunt Palmæ simili, alia à Persica.

Cordus nucem Indicam minorem ut eat, & Theophrast. Cuci appellari ait: cui tamen Cuciofera dicitur & Plinio. Cuci sic describit: Cuci dicta nuci Indicæ similis est, multò tamen minor: totus enim fructus tres aut quatuor uncias longitudine rariò excedit, idem superius latior est, quàm inferius, ubi pediculo adnascitur, figura triquetrus, foris carnosus venosusque cortice, intus lignoso constans, quo nucleus continetur oblongus, in summo quàm imo latior, utriusque corticis modo triquetrus, unus tamen angulus harum partium acutus est: reliqui duo obtusi ac teretes. Color nucleo & in superficie fuscus, intus candidus: habet etiam in medio cavitationem proportionem toti fructui respondentem, a quo solo humore plenam, paulatim cum exiccatur evanescēte. Substantia nucleus constat primū cartilaginosa, paulòque durior, quàm maior nux Indica, sed cum inveteratus fuerit, cornu soliditate equat, qui pluribus diebus in calida aqua maceratus teneræ cartilaginis duritiem acquirit. Saporem habet, quemadmodum & odorem subrancidum, velut maior.

Cordi descriptionem hic totam dedimus, ut inissent Lectores vtra opinio verior, Nostra, qui ad Cucioferam referimus, an Caspari Bauhini, qui ab ea diversam facit, ut antè dictum cap. de nuce Indica. An Anguill. epistola quarta *κυκιοφάρα* Plinii Ariana, qui ait ex Nubia, distantissima regione, adferri, cuius fibrata substantia masticata paucam præbeat dulcedinem, reliquum expui: nucleum internum, Præmo similem esse, viridantem

卷之四
詩集
五言古詩
六言古詩
七言古詩
五言律詩
六言律詩
七言律詩
五言絕句
六言絕句
七言絕句
五言排律
六言排律
七言排律
五言長律
六言長律
七言長律
五言律詩
六言律詩
七言律詩
五言絕句
六言絕句
七言絕句
五言排律
六言排律
七言排律
五言長律
六言長律
七言長律









lib. 12. cap. 5. ubi postquam de Ebena tradidisset, sic ait: Ibi (in India videlicet) & spina similis, (Ebena dicitur) sed deprehensa vel lucernis &c.

PALMA YRI

CAP. CXCV.

IN Brasilia, ut scribit Linius, Palmarum quatuor aut quinque species conspiciuntur: inter communes sunt, quas Sylva homines vocant *Gerani*, & quae dicuntur *Yri*, sed in nulla earum Dactylum vidit, existimat etiam non proferre. Yri quidem fructus est rotundus, Prunellorum seu Pruni sylva dicitur specie, sed in magnum racemum congestus, tantae magnitudinis, ac ponderis quantum homo vnam manu attollere queat: sed meri sunt nuclei, necesse est nuclei maiores, quorum quidem sit usus. Sed & teneram quandam gerit summitatem inter folia istarum sed minorum, quam in cibum cadebat cum locis: testaturque nobilem à Pontico haemorrhoidibus vexatum, dixisse eas sibi remedio fuisse. Antea egimus de Palma *Lantur* dicta fructu cerati, sed ab hac diuersa.

EBENVS.

CAP. CXCVI.

EBenum coniungamus Palmis ansam praebet Plinius, qui Ebum Palmarum generis facit. Hanc quoque modò descripta, quae à quibusdam Ebenus existimatur, Palmarum est folio. Ceterum Ebum lignum quale ad nos Europaeos importatur, (Hoc etiam testante Hen. Schickart, industrio & peritissimo Ill. E. C. Wirtemb. Architecto) duum est generum: *Verum* seu genuinum: [Gutt Eben Germ.] & *Sylvestre*: [Wild Eben] Vtrumque fructum egregium & perpolitum dono ab eo accepimus.

Estque illud quod *Verum* appellatur sylvestri ponderosius, nigrum, alicubi interdum colore ligni nucis luglandis, aut etiam pallidius, quum coloris varietatem in bonitatis notis habent. Passim ceu minutis quibusdam segmentis scarificatum, longè frequentibus aliis splendentibus nec impressis refertum. Idem Architectus aliquando, sed rarius, hominis crassitudine truncos vidisse testatur, sed nullum vnquam quod non putredinis aliqua labe alicubi fuerit infectum: quale & nos aliud habemus, ac suberis quodammodò fungosae substantiae in parte quadam, quod ætati & corruptelae tribuissimus, nisi monuisset aliter.

Sylvestre ab eo vocatum, prædicto nigredine ac pondere cedit, sed vix elegantia atque splendore: passim quoque lineis ceu scarificationis quibusdam vestigiis, verum non ut in prioribus profundis aut incisis, nihilominus tamen splendentibus, conspicuum. Veri portio adolefcens flamma, non iniucundum spirat odorem, ut nobis quidè videtur, nò tamen sine odoris quadam grauitate peculiari. Vtrumque aquae iniectum protinus fidit: & vix aliud è lignis inuenias ponderosius. Videtur tamen sylvestris natura non nihil pinguior & oleaginosa esse. Sed quid Auctores de hac tradiderint audiamus.

Theophrast. de arboribus Indicis tradens, Ebenus (id est: Gaza Hohenum verit:) quoque, in-

quit, eius regionis propria est: Cuius duo genera: alterum præstanti pulchroque ligno: alterum vile ac ignobile. Rarum est id quod præstantius: aliud copiosè habetur. Coloris graui, recondita & asseruata non acquirit, sed natura latet. Ipsa arbor fruticosa est, veluti *Cytisus*. (Sic cum Plin. & Gaza tantisper legamus, donec prodent qui nos doceat quid sit *uermis*, ut in vulg. exempl. legitur) Eius lignum Buxo [vulg.] aspectu simile est, sed decorticatum, nigrum apparet: multae durationis est, ac naturae quodammodo perpetuae: nam ne refectum quidem leuius reddunt. Graue est, quia densum.

Aristoteles Ebum aquas subire ait propter densitatem in lib. de mistorum affectibus. Non autem fluitare ait, quia *durissimum* est. Quo ex loco & id obseruandum, quod ait: *in India* & *Arabia*. Quasi etiam non nigra quæpiam *Ebeni* species, ut ne id quidem latuerit Virgilium, qui epitheton adiecit, tanquam necessarium, cum dicebat: Sola India nigrum fert Ebum. Herodotus tamen ex Aethiopia post expeditionem Cambysæ vectigales Aethiopas factos, centenas Ebum phalangas tributi nomine Persarum Regibus pendere solitos, scribit, ut mox quoque specialius dicitur ex Plinio. Id quod adiecit viros doctos (ut annotat Scal.) suspicari, Guaiacum iam vlu Venereis luis factum nobis populare, nihil esse aliud, quam Ebum decolorum. Quam si sunt affinia, potius hominum opinione, quam specie, meminerimus, ab autoribus proferri frondes Ebum Buxo similes: Guaiacas vidimus allatas, Comari, Laurusue facie. De Pausania hac quoque in historia [inquit idem] mendacis non est hic locus: Ebum radicem esse opertam sine stipite. [Sed ex alterius sententia illud tradit, ut dicitur mox.] Contra, impostores & phalangas pedestres lanceas venditant è Terebintho, & incoctis atramento Populus affulas ad speculorum capsulas: & ad tessellatum emblematis opus Roboris frustilla, quod diu sub aquis natum fuerit tagredinem commendabilem.

Plin. de Ebena sic tradit: Vnam à peculiari India arboribus Virgilius celebravit Ebum, nusquam alicubi nasci professus. Herodotus eam Aethiopis intelligi maluit, ac in tributi vicem egius Persidis è materie eius centenas phalangas tertio quoque anno pensitasse Aethiopas cum auro & ebore, prodendo &c. Romæ eam Magnus Pompeius in triumpho Mithridatico ostendit. Accendi eam Fabianus negat: virtutem tamen odore iucundo. Duo genera eius: rarum, id quod melius, arboreum, trunco enodi, materie nigri splendoris, ac vel sine arte protinus iucundi: alterum fruticosum Cytisi modo, & tota India dispersum. [De utroque id Theophrast. non tantum de virore: ubi videas aliter hæc tradita loco paulò antè citato.] Spississima ex omni materie, idè & grauiuscula iudicatur Ebum & Buxus gracilis natura: (magis placet hæc lectio, pro vulgata illa, Ebum & Buxus, graciles nam paulò antè arboreum dicit: & visi sunt trunci arboris iustae magnitudinis. At Theophrast. Buxum quidem totam gracilem dicit, Ebum medulla) neutrum in aquis fluitat. Cytisus proximè accedere ad Ebum videtur. Quanquam non desint, [ut Theoph.] qui Syriacas Terebinthos nigiores affirmant.

Potè quod antea de Pausania dictum nequam fabulosum existimat Matthiol. Ergo vix propriis cognoscatur, verba eius producenda. Is Guaiacum describens sic ait: Audiui Cyprium bonum.

minorem oppidū quā petītum in herbarum ge-
neribus ad mēdendi vltim notandis, qui diceret,
Ebenū nulla folia, nullūque omniā fructum
ferre, quia & stirpem nullam esse Soli expō-
itam: radices tantū terra occultari, quas eruant
Æthiopes, atque ii imprimis, qui quo maxime
loco reperiantur, norunt. *Hæc ille.* Quæ etiā fabulo-
sa fortasse videantur, facilius tamen illi creden-
dum censet Marth. quā Anguillario, qui mino-
rem Anagyrim, quam Ananienſes Eghenum vel
Eghelam vocant, vocis tantū similitudine fretus,
secundum Ebeni genus [ridendā sanē opinione,]
Theophrasto esse censet. Cū Eghenus scordiliſ-
ſima sit planta, & scribant Theoph. & Plin. id Ebe-
ni genus in India tantū nasci, & in India tota
diſperſum.

Sed quod de Pausaniz Ehenodictum, istud quidem haudquaquam fabulosum putat Matth. cum scribat Georg. Agricola, fossilium indagator maximus, reperiri etiam in Germania Ebenum fossile, ad 7. libri ferè calcem, his verbis. Quinctiâ Hildesheimii intra terram aluminosam iuxta lignum in lapidem mutatum, & in eius commissuris reperitur Ebenum fossile, quod & sparsum in aliorum lapidum cauernis, tanquam in aluo latere Theophrastus non ignoravit. Stirps est nigra, foliis fructique carens, cornu polito modo splendida, solida sed levis, omnino aspectu similis gagatz lapidi, sed naturâ admodum diuersa. Nam Ebenum ignem non sentit, Gagates accensus ardet & igni perit: *Hæc ille*. Sed verba Pausaniz videntur demonstrare potius adulterinum Ebenum, quàm verum, de quo hic agimus: aut saltem ei non notam eius arborem,

Quod si Matth. quoque credidit Ebenum illud
fossile & lapideum de quo Agricola agit , esse id
quod hoc capite descripsimus , tam errat , quàm
verè Pausaniæ narratio mendacium à Scalig. vo-
catur : ut taceamus Ebenum adulterinum , non
magis esse Ebenum , quàm statua , homo . Scribit
Goropius in Ad. lib. primo . Scabant ingentes sub
profunda terra trabes , quæ diuturno seculorum
decurfu Ebeni tum colorem tum duritiam con-
traxerant : documento , quod in hac regione Ebe-
num possimus imitari , quod illi nouerunt , qui
vermiculata è lignorum diuersitate opera com-
ponunt . Scaliger . de Plant. lib. 2 . similium Ebe-
num meminit ex diuersis lignis adulteratorum , de
quibus paulò antè .

Consulamus Dioscoridem. Ebenus, inquit, optima censetur Aethiopica, nigra, venarum pedunculumve expers, cornu elaborato lzuore similis, quæque fracta densa apparet, mordet autem gustu ac leniter adstringit. Prunis imposita cum odore iucundo & citra fumum vritur. Recens verò igni admoda ob pinguitudinem accenditur, & ad cotem trita subfulua redditur. Est & altera Indica, intercurrentibus lineis prædita, candidis & fulvis, itæmque maculis frequentibus: cæterùm prior bonitate antecedit. Nonnulli porrò Mori aut Acanthi ligna, quoddam consimilia sint, pro Ebeno vendunt. Ex eo autem internoscuntur, quoddam fungosa sint, & in asfulas ad purpuram vergentes resoluuntur, nihil mordacitatis in gustu, nec suavis odoris in suffitu præ se ferentia. *Hæc Diosc.*

Nunc quæritur an Ebenum, quod ad nos importatur, & hodie apud Magnates & artifices pro Ebena celebratur, quale duum generum supra descripsimus, sit vnum aliquod ex his à Dioscor. descriptis. Dubitationis occasionem præcipuam putat Matthioli. quod tassitum nullo commendetur odore. Nostrium sanè non solum non

fœter, sed & incundi quiddam spirare videbatur, flammâ adolescens. Quod verò *Marthair*, *Plinium* nullibi odorati *Ebeni* meminisse, ostendit se *Plinii* locum, vbi maximè de *Ebeno* differit, admodum oscitanter perpendisse.

Dalech. putat odorem eius tempore longo, per
maria & itinera evanescere posse, quod in totum
vix fieri potest in tam solido densoque ligno.

Curius quasi in nouum quendam orbem delatus de Ebena iudicat : Arborem vt plurimum esse tenuem , vimine raro , & in crassitudinem caudicis extuberato , cortice hirulco , & admodum reticulato , adeò venis debiliscenibus , vt per sinus ipsos intima pars tenui libro contegatur . Sed quo auctore hæc dicit ? aut vnde euentus est hanc Ebena descriptionem ? quis ei dixit arborem vt plurimum esse tenuem ? Quali verò ei nota fuerit . Neque hoc illi faterat , nisi hanc suam temeritatem ingeminaret alià : Theophr. autem [inquit] foliis ramisque , ac reliquis denique omnibus Terebinthino similem dicit , fructu tamen diuerso , & Amygdalis conformi . Plus sane ille vidit apud Theophr. si hæc vidit . Sed qui Theophr. consulat , facile agnoscat ipsam ei imponere . Ita enim ait L. 4. c. 5. *ἱστ. φασὶ τὸ δένδρον τὴν ἐν Ἰνδῷ τὴν ἐν τῇ περσικῇ τὴν ἐν τῇ καρχηδονικῇ τὴν ἐν τῇ ἀρμενικῇ τὴν ἐν τῇ ἰταλικῇ τὴν ἐν τῇ γαλιτικῇ τὴν ἐν τῇ ἰβηρικῇ τὴν ἐν τῇ ἰσπανικῇ τὴν ἐν τῇ ἰταλικῇ τὴν ἐν τῇ γαλιτικῇ τὴν ἐν τῇ ἰβηρικῇ τὴν ἐν τῇ ἰσπανικῇ* . Nihil hic de Ebena : sed Terebinthum Indicam comparat cum Terebintho Græca .

Anguill. liberè fateatur, Verum Ebenum quale sit, se ignorare, ac quum in nostro desit odor, qui à Diol. requiritur, verum Ebenum se dicere non posse. Et alibi: *Egano*, ait, videtur Ebena secunda species Theophr. [quam opinionem improbari à Matth. paulò antè dictum.] Totam Ebenum quæ utuntur Veneti, scio esse ex Egano quæ devehitur ex Syria & Cypro, vbi hodie adhuc vocatur *Hebena*. De hac Ebena Anguill. plura c. de Laburno. De Hô. Belli Cytiso vera, & medulla nigra Ebena Theophrast. agemus cap. de Cytiso vera & Maranthæ, & de Ebena Crenca Hon. Belli cap. de Cytiso Cretica flore rubro.

Guiland. Theonino suo dente Matthiolum peti-
tit, quodd Ebēni innumeros haberi in Italia trun-
cos adstruit, nec animaduertit, lignum quod vul-
gō Ebēni nomine venit, suffitum supra carbones,
iucundum odorem non efflare, neque ad eodem
allisum ruflescere, neque etiam cum aqua tritum
in succum abire: quapropter fœdum ait esse hunc
Matth. errorem. Sed, vt ita sit, ista omnia non
conuenire truncis istis, quos vterque intelligit,
tamen candidiūs cum Matth. agere debuit, qui-
ppe qui ipsemet falsus sit in suis scriptis, vt antea
dicebamus, Ebenum vulgō dictum, suffitum nul-
lo commendari odore. Deinde scire debuit Gui-
land. istas notas quas adducit non Indico sed Aë-
thiopico tantum tribui à Diosc. quapropter nihil
obstare quominus Indica Italis & Matthiolo fue-
rit cognita. Ita sæpē non videmus manticę quod
in tēgo est.

Amarus Ebeni secundam speciem, Guaiacum facit.

Verum nescimus quid sibi velint Pen. & Lob. quando in Adu. sic aiunt. Officinarum Hebenum [sine Xylaloes Offic. in marg.] quin sit species Guaiaci nihil obstat : nam præduræ assulæ , grauissimæ, quæ in Officinis videntur , & aquæ mer- sæ fidunt , tum pinguedo, quæ exudat igni , per- inde atque è Guaiaco, tum aspectus ipse, & vires, & sapor, videntur testari : nam odor etiam ei inest Guaiaci , vires ad eadem quæ Guaiacum com- mendantur. Sed si id intelligunt, quod in Offic. nomine Xylaloes seu ligni Aloës habetur, esse

Amegilla
Ephraea
Ephraea
Amegilla
Amegilla

**Elemento
Aque.**

**Electronic
advertisers**

Ebeni dolo-
Itan.
Ebenus Ac-
stropaca.

**Elephas
Indica.**

*Alia Ebrua
adulterna.
Et facit
dignoscere
dum.*

Am Ebe-
nstrom für
Dinge.

395

Keywords: child abuse; child sexual abuse; child sexual exploitation; child sexual abuse investigation; child sexual abuse assessment

Cont. no.

Also, the
error.

Ebenus
Venerans
offe Labor-
um
Ebeni mo-
alla Cysti-
us
Ebenus
Cretica

Abstract:

Martha's
parts en-
sur of
Island,
er.

Species
Tanager.

Lab. of For.
and Med.

Ebenum, ut ipsimet cap. de Agallocho aperte declarant: Et Lob. in Obl. ait, Hebenum siue Xylaloën, officinarum legendum: nullo sanè labore refutantur: Non enim nigra est Xylaloë, cui quàm benè Guaiaci odorem tribuant, ipsi videntur.

Hist. Lugd.
m.

Hist. Lugd. quoque Ebenum officinas pro Xylaloë habere ait: quasi nec ipsa apud priscos illos Theophrast. Diosc. Plin. & alios legisset Ebenum esse nigrum.

An verò Ebenus sit species Guaiaci, ut censent, asserere non possumus. Sanè quæ Ebeni nomine hodiè habetur ligna, nec odore, nec sapore nec pinguedine cum Guaiaco conveniunt. Videntur & Guaiaco duriora, quamvis substantiæ soliditate ac pondere ad id quamproximè accedant. *Hauri* quosdà *Ebeni* putare, supra dictum. Lacuna plures Ebeni species esse scribit, excellentissimam autem quæ vulgò dicitur Guaiacum: Sed vnde hoc scit.

Synonyma
Linguarū.
Hebenus.
Hebenum.
Ebenus.
Ebenum.
Eben.

Dicitur Græcis *ἑβένος*, & *ἑβένω*. Suid. *Ebenus* siue *Ebenum*, teste Servio Mauro: vel ut alii scribunt, *Hebenus* & *Hebenum*. Sed melius *Ebenus* dici videtur, à nomine Hebræo *Eben*, quod lapidem significat, ut notat Gesn. Sanè & hæc *Hebenus* & hoc *Hebenum* cum aspiratione & sine ea scribitur à doctissimis autoribus. Luc. lib. 10.

— *Hebenus Mareotica vasles*

Non operit postes.

Hebenus autem, inquit Servius, arbor est, quæ cæsa durefcit in lapidem. Malimus tamen hæc in parte sequi Græcos [quod & ipsa Græca dictio esse appareat] qui sine aspiratione scribunt.

Hauben.

Goropio notante, in Vertumno, *Hebenum* dicitur *Hauben* apud Hebræos, ut est apud Ezech. c. 27. Verùm quia *Hebenum* vox est Latinis, Græcis, Hebræis, Arabibus & Chaldæis communis, suspicatur iam ad antiquissimos referendam natalis. *Hauben* namque, quid [inquit] aliud est quàm *Haut-been*, [Cimbris] id est lignum ossium, siue lignorum os. Arab. dicitur *Habenum*, vel ut alii volunt *Abanus* ut Serap. cap. 152. seu *Abenus*, Barbaris *Ebanus*. Germ. *Ebenholz*: Gal. *Ebene noir*: It. *Ebeno*: Hisp. Castil. *Ebano*: Portug. *Abenu*: Apud Paulum Epulionem Marcaorum, (qui in epistolis à se collectis scribit inter munerata missa regi Hisp. Philippo per Regem Persarum, fuisse *quattro cornetti di legno Andauico*, quali risplendino como specchio, [per lignum Andauicum splendens ut speculum, *Ebenum* intelligendum suspicamur.

Locus

Theophrast. Indicam tantum dixit *Ebenum*: Dioscor. tam Aethiopicam, quàm Indicam. Virg. Georg. 2.

— *Sola India nigrum*

Fert Ebenum, silis est thurea virga Sabais.

Ad quam Virg. sententiam Servius: Atqui, inquit, & in Aegypto nascitur. Sed Indiam omnem plagam Aethiopiz accipimus, quàm & Virgilius, vel Constantino teste, Indiz nomine complexus est. Lucanus per Mareoticam *Hebenum* Aegyptiam videtur ostendisse, ut idem putat. Negat tamen Plin. in Aegypto nasci. Solinus exigua Aethiopiz parte tantum crescere autumat. Strabo ex Megasthene scribit, apud Prasios (in India) nasci. Apud Plin. Meridiano Aethiopiz cardine sylux *Hebeno* maximè virent: quod & Thevetus confirmat, additque etiam in Calecut nasci. Ex Pomponio Mela discimus etiam in Arabia, & aliis variis locis nasci, ut annotat quoque Amatus, qui addit, hodiè magnos truncos in officinis haberi ubi pectines fiunt, & eos egregios. Videas la-

nè Venetiis & Augustæ Vindelicorum tanta copia *Ebenum*, ut sint ibi artifices, qui nihil aliud ferè quàm hoc lignum tractent. Apud Magnum Duccem Hetruriz splendidissima opera assabre facta ex *Ebeno* nigerrimo, politissimo, nec vulgari magnitudinis vidimus, & videre possunt cunosi qui Florentiâ transeunt. Ferunt, inquit Curtius, *Ebenum* in mari rubro nasci, solius Fructuque Oluz proximo. Sed hæc novitas merebatur titulum sui auctoris.

Curiosus

Cariam inquit Plin. non sentit *Ebenus*: eandem maximè æternam putant, claro iudicio in templo Ephesiz Dianæ, de cuius simulacro Deæ ambigitur. Cæteri ex *Ebeno* esse tradunt.

Duritia

Ebenum Theophrastus ad cotem tritum, oculis vtilem prædicat. Et, ut scribit Dioscor. vim habet ea exterendi, quæ pupillis caliginem obsundunt: pollet & ad veteres fluxiones ac pustulas. Quod si quis facta ex ea coticula (*αἰκία*) utatur ad terenda collyria, efficacius medebitur. Ad oculorum medicamenta efficax quoque redditur, si scobes tamentæ in vino Chio per diem ac noctem macerata, diligentèrque ad laeuorem contrita, in collyria digerantur. Nonnulli ipsa prius trita cribro cernunt, ac deinde reliqua eo modo peragunt. Quidam pro vino aquâ vtuntur. Vritur etiam in fœtuli nouo, donec in carbones redigatur: lauatürque plumbi vlti modo: Itaque præparatum aridis scabrisque lippitudinibus conducit. Non tractamus, inquit, in medicina alienos orbes: non omittetur tamen *Ebenus* propter miraculum. Scobem eius oculis vnicè mederi dicunt: ligno quoque ad cotem trito cum passo, caliginè discutit. Ex aqua verò & radice, albugines oculorum. Item tussim pari modo Dracunculæ radice adiecto cum melle. *Ebenum* medici & inter arrorentia assumunt. Consideratione quidem dignum quomodo intelligenda Plin. verba inter arrorentia.

Vires & Vfus Oculorum caligine flauorum.

Carboni.

Eiusdem meminit Gal. lib. 6. simpl. his verbis. *Ebenus* ex his lignis est, quæ trita cum aqua faciliè in succum resoluuntur, æquè ac lapidum nonnulli. Vis ei inest excofaciendi, extergendi & tenuium partium, quamobrem quæ pupillas offuscant vitia extergere creditur. Miscetur aliis remediis ocularibus, quæ ad vlcera vetera, fluxiones & bullas siue pustulas accommodata sunt. Cæterum variat nonnihil Plin. à Dioscor. qui *Ebenum* super coticula tritum collyriis indi ait: illo autem *Ebeni* ligno ad cotem trito caliginem discutit. At Serapio ex *Ebeno* parari coticulam [fricatorium vertunt] cui collyria affricentur. Sed res eodem ferè redit, modò vis medicatrix collyrii dependeat ab *Ebeno*. *Auris* sanè voce Græci non modò coticulam intelligunt, sed & medicamentum ipsum ad cotem tritum, qualem ex *Ebeno* fieri ad eum vsum perinde ac ex hamatite nihil vetat.

Albug. Tapa.

Galien.

Temper. Plura.

Strabo autor est, Indicos exercitum, præcipuè frictionem, probare, maximè strigilibus leuibus corpora expolire.

Strigili.

Ebeni siccatos truncos, teste Matthiol. maximè hac ætate nouit Italia: namque innumeri videntur in eorum officinis, qui pectines conficiunt ad explicandos aptandisque capillos: item apud illos, qui globulos funiculo traiciendos ad preces numerandas torno in orbiculos expolunt. Porro quod de frictione ait Strabo, id & Curtius probat ex Celso, quod corpus exedat, euocet, educat, leuètque exasperatum. Curtius etiam miratur, aliquos credere pectines & orbiculos deprecatorios, aliæque minima & leuia, torni opera, ut ille ait, ex *Ebeno* fieri, præsertim verò cum tot,

& tam

etiam varia venundanda exhibeantur. Existimat enim tantæ præstæ nobilitatis lignum in vulgatos hos vius non venire, rariùsque esse, quàm ut eouique innotuerit vulgo.

Præstia Sæpura
Pet. Martyr de rebus Oceani & noui orbis, in insula Guanabana scribit esse vrensilia ex ligno nigerrimo, lubrico, lucido, quod Hebenum Doctor I. Baptista Elysius esse contendit.

Decorum p. mulachra. Pocula. Contra maleficia.
Reges Indos ex Ebena scripta gestare, Solinus author est. Eosdem non nisi ex Ebena Decorum suorum simulachra fingere: item pocula craterasque ex eo fabricare tradunt, quod si sanè credant contra maleficia efficacissimum esse, & quicquid veneficii fuerit, tractu eius auerti. Ut itaque nil mirum sit, si peregrinè in pretio sit, cum etiam his apud quos nascitur & familiare est, ipsiſque ad Regibus summo in honore sit.

Refert enim Plutarchus in vita M. Antonii Cleopatram Aegypti Reginam, Alexandriæ, apud Iudis ædem, & in præclarissimis sepulchris, aurum, argentum, pretiososque lapides, Ebenum quoque, & quicquid denique rarum ac pretiosum haberet, condidisse & occultasse, propter bellum, quod Octavius Cæsar contra eam, & Marcum Antonium gerebat.

Ad alligatum infantium cunis, tumultuosa insomniæ prohibere scribit Albertus.

Hodie, ut dicebamus, varia opera ex ea fiunt, apud Magnates & Principes, thecæ, arculæ, abaci, capsellæ, speculi thecæ, pectines, narthecæ, tragematothecæ, sellæ plicantes, pocula, ad altaria exornanda, signa crucis, cingendas imagines Principum aut Sanctorum, & alia eiusmodi propter modum infinita, cæque vel per se pura, vel auro, argento, aut ebore vario artificio adornata, qualia Venetiis, & Augustæ Vindelicorum apud artifices aut Magnates videri possunt.

EBENI VERSICOLORIS MATERIA ARBOR PYRIFOLIO.

CAP. CXCVII.

Descriptio
Vfus
Scribit Theoph. lib. 5. cap. 4. ubi de Terebintho Syria agitur, quæ Ebena nigrior. Aliam arborem reddunt, quæ cum nigredine varietatem quandam præ se fert subrutilam, ut aspectus Ebena versicoloris appareat, fieri ex hac lectos, & subcellia, & reliqua lautiora opera narrant. Amplam maiorem in modum, & frondibus conditam pulchris, similèſque Pyris eam assignant.


FRUCTVS PEREGRINVS TETRAGONVS.

CAP. CXCVIII.

Locus
Descriptio arboris
Fructus
Fructum peregrinum tetragonum referebant, teste Clusio Exot. Batavi Naucleri, qui inuente Septemb. anno 1601. ex Iava & Moluccis Insulis reduces Amstelredamum, in quali tamen arbore nasceretur intelligere nequiti. Si tamen coniecturæ uti licet, prægrandis alicuius palmæ cuiusmodi illa, quæ magnas Indicas nuces, vulgò Cocos appellatas, aut nucem *Pausi*, sive *Arecam* profert, fructum arbitror, atque plures simul ex crasso vno pediculo instar illarum pendere.

Hæc autem eiusmodi nuces videre mihi contigit. Vnam magnam, quam Cl. V.D. Petrus Paavius ætius Medicæ Professor in Academia

Tom. I.



Lugduno Batava, à Mercatorum societate cum aliis quibusdam exoticis adquisiuerat. Alteram longè minorem, quam mihi donabat Amstelredani honestissimus vir V. Valchius Syuert, illius urbis Pharmacopæus, ab Isbrando Heronymi F. Chirurgo, qui eam retulerat redemptam. Vtrique verò quadrangularis erat

formæ.

Maiores potè, nitidiore & lauiore cortice testæ, *Fructus maior.* septem uncias à summo fastigio ad pediculum *maior.* que longa, pedem cum semelle crassa erat, siue sesquipedalis eius ambitus: singuli enim anguli quatuor penè uncias cum semelle ab inuicem distabant: cortex valdè densus, ex multis fibris, retis quodammodo formâ contextis, constans, materiam fungosam intermixtam continebat, corioque, ut dixi, laui & splendentæ, spadiceæ coloris, *Cortex.* exteriore parte testæ erat. Totam tamen nux valdè levis pro sua magnitudine: quid verò ea contineret, me latebat, quia, cum mea non esset, æperire nolebam. Sed minorem, quæ mihi donata, *maior.* mediam secabam, ut me omni dubitatione exsoluerem: nam quum Chirurgus, qui illam attulerat, affirmaret, se in maris littore nascentem eruisse, mediâ ex parte arenâmersam, fibrisque in ea firmiter hærentem, & supernâ parte cauliculum promere lignosum, viridi cortice testum, fastigio quina aut sena folia Myrtinis similia sustinentem, *Planta bulbacea.* cæque aded ratione bulbaseam esse plantam sibi persuaderet: ego verò multas notas conspicerem, quæ me, ut arboris potius fructum esse crederem, impellerent: illam aperiebam.

Superiore longè minor hæc erat, ut quæ tres *Descriptio* duntaxat uncias cum semelle longa, octo autem ambitus contineret, non niudo cortice testæ, ut superior, sed valdè rugoso, quo ante maturitatem adempta, & subrusa cute testæ, quadrangularis, perinde atque superior, formæ, sed angulis magis inæqualibus, neque aded distinctè ab inuicem seiunctis, sub externa cute, multis fibris, retis instar transuersim sese interfecantibus, cortice *Cortex.* constabat, quemadmodum etiam interiore parte, quæ officulum tegebat & inter illas fibras, fungosa materia insipida, & valdè resiccans, suberini corticis instar: ipsum officulum formam habebat ab infima sede latiore in metam assurgentem, & crassiusculum erat, molle tamen [quia fructus immaturus] subrubente cute testum, acidi saporis, sicut etiam nucleus qui in eo continebatur candidâ membranâ testus.

Hæc sunt quæ de illo fructu, seu nuce, commentari potui: quia qui retulerant, nihil ad eius historiam plenius & accuratius describendam assererebant, præter paucas illas incertæ, quas entomæui notas.






DRACO ARBOR : ET DE EIVS

Lacryma, seu sanguine Draconis,
Cinnabari Veterum.

CAP. CGXI.

Descriptio
folii.Arboris de-
scriptio.

Rami.

Folia.

Fructus.

Lacryma
arboris, san-
guis Dra-
conis.
Lognum.

Locus.

BARO quidā Germanus, cuius nomen non amplius occurrat, olim ex Hispania nobis foliū attulit Lugd. nomine arboris sanguinis Draconis, simile folio depicto à Clusio, cuius iconem (ego Bauh.) pro Hist. plant. Lugd. curavi depingendam, qualem etiamnum in ea conspiceretur est. Accedit aliquo modo ad Palmæ foliū, commune ali-

quid cum folio Iridis, & potissimum palustris luteæ, habens, striatum, virescens, cubitos duos & semis longum, acuminatum: sescunciam latum, latius multo quā trunco adhæret, plusquam quincunciale, membranis velut alis utrinque donatum, & colore lucido ad luteum tendente prædium. Transuersim in tabella pictum vides.

Est verò Draco (ut auctor est Clus.) proætera arbor Pinum procul intuentibus referens, aded æquales semperque virentes sunt rami. Huic truncus crassius, octo aut nouem bicubitales ramos, æquales & nudos sustinens: hi rursus in summo finduntur, & in alios ternos aut quaternos ramos cubitales aut paulò ampliores, brachialisque crassitudinis desinunt, nudos item & sine foliis: qui in summo gestant capita plena cubitalium foliorum, mansculi pollicis latitudine, sensim in mucronem desinentium, in medio dentiorum, & eminentiore costa, ut in Iridis foliis, tenuium & rubentium in lateribus. Mucronem planè repræsentant ea folia, semperque virent, & Aloës & Iridis modo, inuicem amplexando nascuntur. Truncus perquam scaber, multis rimis dehiscit, humoremque fundit per Caniculæ æstus, qui in rubram lacrymam densatus, sanguis Draconis appellatur, ob quam causam, hanc arborem Draconem nuncupauit. Materia trunci firma est, ferrumque difficulter admittit, quod veluti fibris transuersim & obliquè excurrentibus constet, at rami cum multo succo prægnantes sint, satis faciliè cædi possunt. Eā arborem Vlysi pone primū vidisse testatur idem, Anno Christi 1564. post monasterium D. Virgini sacrum, cui nomen à Gratia: octo Palmorum crassitudine inter aliquot Oleas in colle nascentem, monachis ignoram & neglectam, quam neque florem neque fructum ferre assererent: rem tamen aliter se habere postea deprehendit, ramulo ex illa ipsa arbore anno sequente donatus ab amico. Est autem hic ramus (quem cum aliquot foliis, corticisque fragmento, & lacryma suis manibus exempta multo tempore seruare se ait.) pedali ampliore longitudi-

ne, cui inhaerent alii ramuli, multo fructu eadem matum compacto onusti. Fructui color flauescens, sapor aliquantulum acidus, magnitudo exigui cerasi. Eum in summis capitibus nasci verisimile est, ut in Palma dactyli nascuntur: spem tamen ut illos includi non intellexit. Huius porro arboris recentia capita tenella sunt, & humilium Palmarum siue Chamæripes modo, cuius cerebrum in deliciis est, edi possent, nisi amaritudo prohiberet. Hæc ex obs. Clus. quibus subiicienda quædam de eius succo à nobis obseruata.

Pulchros sanguinis Draconis grumos asseruimus, glebis Thuris æquales, rotundos ut plurimum, alios inæquales, foris ferrugineos, fractos pellucidos, coccineos, concretionem Vermicidarum, dentibus fragiles, saporis expertes, saluam statim & affatim rubore tingentes, qui candela admoti flammam concipiunt liquefuntque Resinarum instar. Admixta reperiuntur glebæ, quæ colorem præcedentis Resinæ egregiè mutantur, cæterum concretionem gummi Arabici: non enim acceduntur flammæ candela admotæ, sed bullas agunt, crepitantque, in aqua soluntur, quam & mucilaginosam reddunt, dentibusque lentore suo valde adhærescunt: & vix leuiter saluam rubore tingunt. In Offic. plerumque sortidior est, corticisque habet aduixtos, coloris ferruginei, nunc crassiores, nunc tenuiores, sapore adstringente, qui flammescunt quoque, vnde decedentes adnatæ lachrymæ liquefactæ tinguntur itidem. Atque hæc nobis obseruata sunt in sanguine Draconis, quàm lachrymam vocant.

Alium habent off. duum generum: Vnum quidem, licet ligni cuiusdam rubri admixtis impurus videatur, flammam tamen luculentam concipit, liquefuitque glebularum instar minorum præcedentium Thuris magnitudine: ut ab illis non nisi impuritate quadā discrepare sit verisimile. Alterum offis constat compressis, obscurioris & sortidioris coloris, nullo modo flammam concipiens, & gummi instar lentescens adulterinum. Cæterum quoniam iam suo seculo Dioscor. scribit Creditæ Cinnabarum esse sanguinem Draconis, placet eius ea de verba protorere. Cinnabarum [inquit] falsè putant nonnulli cum eo quod Minium appellatur vnum & idem esse: [reliqui vid. lib. 5.] Cinnabaris autem de qua hic agitur ex Africa quidem inuehitur, at magno constat: & vique aded rara est, vix ut verticulis pictorum lineis laus esse queat. Est porro altè & abundè colorata, & eam ob causam quidam sanguinem esse Draconis existimauerunt. (Alia Draconis: & Dioscorid.)

Vt iam Dioscor. non temerè à Galeno lib. 3. simpl. notetur, qui dicitur, in eadem & quædam, & quædam, qui non agnouit, & vocem esse æquiuocam, significat: & quæ etiam Minium illud arenarium, quod quis ex naturalibus arenis fieret, à Theophrast. dicitur, quum dictum est, quod vel ex hinc autore discere potuisset. Est forte qui cum Cinnabarum, sanguinem Draconis dixerunt, non animal, sed arborem hanc intellexerunt: quanquam Theophr. de quo ipse agit, & quædam creditum scribat, quod saturè rubro esset colore.

Fortassis & ea ipsa arbor est aut eandem saltem generis, cuius Strabo lib. 3. Geograph. ex Possidonio meminit, his verbis: De arbore in Gadibus existente scriptus prodidit Possidonius, quæ ramos humum vique incuruatos habeat, frondes spissimè mucronis speciem gestantes, quænam ad ci-



Cardanus: non enim regionis diuersitas efficit ut eius lachryma pro sanguine Draconis habeatur, sed color. Neque si coloris autorem dicat regionem, continuo rectè sentiat. Non enim regio est, sed forma. Tertiò: qui scit Cardanus, huius lachrymæ colore sanguinis Draconis coloris nudiùs esse commendabilem: cui, qualis illa sit Siderius, incompetitum est. Brassauoli quoque satis fagide turget auctoritate. Nam si Cardano nota fuisset, vel herba, vel lucus ille, à Serapione potius, atque Aboah accepisset qui primi omnium, quod è scriptis eodem constet, id ei nomen indiderunt. Alter enim *Alachun*, alter *Dem Alachun* vocat: quam ad rem cum testem citaret Dioscoridem: nonne sibi erat conscius incuriæ & audaciæ suæ? Quid tibi vult à nobis credi posthac? quando tibi è Siderio Dioscor. expressit sanguinem Draconis: At ille inter quatuor Sideritidum historiam, de eo nihil. Vbi verò castigat eos, qui Cinnabarin sanguinem Draconis existimarunt: tantum. At prætereā nihil. Vnde huc noua subtilitas emicet. Nostri enim Cinnabrum ab illa Cinnabari Dioscor. longè est diuersissimum. Cinnabarin Diosc. huius arboris succum existimo: Cinnabarini nostrum, siue Cinnabrium, è factitiam. Si Plin. Indicam Cinnabarini aliud à metallo fuisse docet, in illa sua vndericesimi libri declamatione. De sanguine Draconis autem tota fabula est. Atque ita quidem Scaliger & Cardanus perstringit, & suam de hac re sententiam liberè nullaque circutione vsus, explicat. Potuisset tamen miriùs tractare hominè Scaliger, si animaduertisset eum Serapionis textu aut fortasse eius interpretis versione lapsuque deceptum, qui ad illud Siderius caput Dioscor. citat, quasi ex eo desumpisset: Cui fidens Cardanus, Diosc. vltimis non consuluit, maiore sanè oscitantia, quàm tantum Philolophum decebat.

*Sanguis
Draconis
Cinnabarin
Indica
Plin.*

*Cinnabrium
factitium*

*Autorum
consensus
de Cinnabari
Diosc.*

Fuchf. ut.

Porro quum hodie Materiam Mancipes, & officinæ medicamentarix, sanguinem Draconis ostendant, quem ita nominant, ac pro Draconis sanguine diuendunt: non satis constat, an hic sanguis Draconis vera illa Indica Plinii cinnabaris sit, an adulterata, velut quibusdam videtur, qui iuxta Plin. ex sanguine hircino, bolo armena, & sorborum succo, aut aliis similibus succis (ut priùs dictum) factitium quiddam esse censent. Rem certè metallicam esse, nullo argumento, quod sciamus, probari posse, cum Cornario arbitramur. Est enim Cinnabaris vel Cinnabrium [licet ita cum Scal. vocare ad illius discrimen,] quod pictoribus & Officinis hoc nomine notum, res planè factitia, ex Sulphure & argento viuo multo igni inuicem calcinatis & reuerberatis [ut loquuntur] effecta. Est & aliud fossile, spontè per se nascens: quorum neutrum id est, quod sanguinem Draconis in offic. vocant: ac sanè ne illud quidem quod Cinnabarin Dioscorides, quæ ex Africa defertur, eadem facultate pollens, quæ hæmatites lapis, ut patebit in viribus, quas nemo Cinnabrio minerali, vel factitio, vel fossili tribuet.

Cinnabarin verò Dioscor. esse sanguinem arboris Draconis atque adeò hanc lachrymam quæ hoc nomine hodie habetur legitimam esse Diosc. Cinnabarin præter iam dictos autores, Matthiol. Amatus, Lacuna, Fallop. Castor Dur. Theuetus, Clus. Dalech. Hist. Lugd. & Celebriores Medici plerique, ut non malè iam Diosc. ætate, Sanguis Draconis, non animalis quidem, sed arboris fuerit nuncupata.

Fallitur verò Fuchf. de Matth. censura, quando

existimat, in Nic. Myreplici codice in Damasceni antidoto ab aliquo imperito additam esse cinnabarim. Nam non de factitia cinnabari vel fossili, sed de arboris Draconis lachryma, Dioscoridi Cinnabaris dicta intellexisse censendum. Deceptus autem fuit Fuchf. non tam vocis homonymia quàm rei ignorantia, ut quidem conuicere est. Verùm ipse Nicolai verbis doceri potuisset, quando ait: *υπερβαλει η αμα διδωται*.

Sed quid Theuetus de hac arbore tradit paucis quoque videamus. In insula Madera, inquit, quædam arbores certo anni tempore Gummi exudat, quod sanguinem Draconis vocant, perforata arbore propè radicem magno & profundo foramine. Eius fructus luteus est, magnitudine Cotæ nostratis, refrigerando corpori, & leuandæ febre, in febre aut ardorib. valde utilis. Non est dissimile à Cinnabari Diosc. de qua & Plin. Apud nos non reperitur nec Cinnabaris, nec Sanguis Draconis puri, quales descriperunt Veteres, sed uterque adulteratus. Prædictum igitur Gummi omnino existimo Cinnabaris & sanguinis Draconis astingente vi. Hæc Theuetus. Sed mirum cum sit istarum Insularum scriptor, eum arborem non describere, ac ne vlla vel notula quidem designare, non absque negligentiæ reuo. Videt etiam Lector recentiores hos Auctores, Aloisium Cadamustum, [cuius supra meminimus] & Thevetum in fructus colore nunimè conuenire, hic flauum dicit, cui subscribit Clus. ille Venetum, id est, cæruleum ut Vegetius interpretatur, vel marinum, & Thalassinum, ut Lucretius & Lampadius: vel ferrugineum, ut alii. Hi enim tres tantum ex Recentioribus, quod equidem sciamus, hanc arborem descriperunt. Sed fieri potest, ut fructus ipse variet, vel mutatione coloris, vel pro diuersitate arboris speciei varietate differens.

Ergo hæc arbor *δράκων* siue *δράκωνος το δίδωται*, Synonyma quamvis eius arboris veteres Græcos meminisse. Nondum apertum sit: Lachryma verò *υπερβαλει* Antiquorum & *αμα διδωται* recentiorum Græcorum. Draco arbor: Cinnabaris: sanguis vel lachryma Draconis. Germ. *Drackenbaum* / *Drackendlut*. Gal. *sang de Dragon*. It. *Sanguis Draconis*. Castil. *Sangre de Drago en lagrima*. Portug. *Vermellao*. Arborem quoque Hispani *Draconariam* vel *Draconem* appellant, unde eius liquor sanguis Draconis: quod nescientes decipit, ut sanguinem animalis esse crederent.

Apud insulas Maderæ & Canariæ, olim Fortunatas dictas magna ex parte prouenit, & forte etiam in Africa quæ Cinnabarim Dioscor. tempore subministrabat. Ex quibus locis in Italiam importatur parua quantitate, & carè venditur, recte Lacuna. Sed adulterata per totum serè mundum distribuitur. Aloisius Cadam. scribit sanguinis Draconis arbores præcipuè crescere in parua quadam insula Atlantica Oceani propè Maderam, quam Lusitani Portum sanctum appellant, ut dictum. Fructum fert Martio mense. *Ολον* pone nasci arbores, iam supra dictum.

Cæterum ad id, quod Strabo ex Possidonio arborem supra ex eodem descriptam in Gadibus nasci prodidit, ait Clusius, se, tametsi diligenter totam insulam perlustrarit, nullam arborem cõspexisse, qualem Possidonius scribit: sed neque villam aliam, præter aliquot salices, & vnam aut alteram siliquam, licet [ut ab incolis vicis fide dignis accepit] circa urbem Gades, recenti adhuc adhuc memoria, latissima viridaria fuerint, omni fructiferarum arborum genere exculissimas, quorum



cilè incidi potest: eà vulneratà, liquor ille effluit, quem sanguinem Draconis in lacryma dicunt, ab eo differens, quem sanguinem in pane vocant, quod in panes seu massas istuc cogatur, quemad. resina in Castella.

Casalpinus quoque ex Monarde meminit huius sanguinis Draconis: sed arboris precedenti cap. descriptæ non meminit. At Clus. refert, à Francisco de Hollebecque regis H. sp. hortulano sibi nūstros quosdam fructus Dragonalis nomine, ex quibus terræ cōmissis nonnulli prodierunt. Erant fere foliis Tridis, oblongis, viridibus, per oras rubris [quālia in grandi arbore Olysi pone conspexisse ait,] sed subsequēs hiems abstulit. Fructus is erat cerasi magnitudine aut Oxymirhines, rotundus, tenui pelle contectus; quā sublata, osseus nucleus conspicebatur, qualis est in fructu Rusci: sed is nullam animi alis, nedum Dracunculi tanto artificio fabrefacti figuram referebat. Verūm rotundus erat & lœvis, & totus osseus, ut dictum.

Hæc Clus.

Sed & in eo repugnat descriptio Clus. Monardis, quod hic arborem scribit esse cortice satis tenui: ille verò ferrum difficulter admittere, atque adeò truncum eius perquam scabrum esse, multisque rimis dehiscentem. Vnde Hist. Lugd. suspicatur Dracunculi fabulam esse cum mirando illo fructu, ac huius arboris historiam effictam, quod nos tanisper in medio relinquimus, & huius etiam historiam separatim hoc cap. apposita figura damus, non ut approbemus Monardis dicta contra sententiam Clusii [quam tamen directè neutiquam tenet] sed donec prodeat qui nos doceat uter illorum veriora tradiderit: nam sanè si uterque vera scripsit, necesse est duas esse diuersas sanguinis Draconis arbores.

AGNVS SCYTHICA, BOROMETZ.

CAP. CCXIV.

Hic Monardis Dracunculi fructui insculpti narrationi attexamus longè insolentiorē, ex Scaligero. Superiora ludum putes, prout est admirabilis Tartaricus frutex. Tartarorum horda primaria Zauolha est, vetustissimæ nobilitatis commendatione. In eo agro ferunt semen seminis Melonis simillimum, sed minis oblongum. Ex eo

Descriptio

Tartaricum frutex. Semen melonis.


satu plantam exire tradunt, quam Borometz, idest, Agnum vocant. Crescit enim Agni figura, ad pedum fere ternū altitudinem: quem pedibus, ungulis, auribus, toto capite, præterquam cornibus representat. Pro cornibus pilos gerit, singulatis Cornu specie. Obducitur corio tenuissimo: cuius detracti vsus ad capitum tegmina incolis. Ferunt internam pulpam Gam-mari referre carnes. Cæterum è vulnere quoque sanguinem manare. Dulcore esse admirabili. Radicem humo exertam surgere ad umbilicum que. Illud miraculi sonet magnitudinem. Quādiu vicinis obsideretur herbulis, tandiu vivet, quasi agnum in læto pascuo. Absumptis illis, hescere, atque interire. Idque non solam vel casta vel tractu temporis, sed etiam experiundi gratia, subtrahitis atque ablatis euenire. Quin illud auget admirationem: appeti à Lupis eam, non item ab aliis bestis, quæ carne vescantur. Hoc quasi condimentum, atque intritum, ad fabulæ & Agni allusionem. Illud scire velim. Ab vno stipite, quatuor dissita crura cum suis pedibus, qui possint provenire atque produci.

Laurentius etiam Seruius in Chronica Germani 1504. meminit huius seminis Meloni similis, ex quo in Tartaria proveniat Agnus, lanam, carnem & sanguinem habens, qui ex medio ventre talem habeat, terræ adhzrentem, qui vivat ex eæ adjacentis herbæ, quæ depasta moriatur. Lupos & rapacia animalia ei infesta esse: hanc historiam confirmari per multos insignes viros. Inter quos Io. Maria Bonard. de miner. Agno similis planta apud Tartaros, quæ voratur à lupis, quasi agnus esset.

Ex Caroto similis fructus in regione Cadissa, in qua animalculum reperitur cum carnibus, ossibus, & sanguine, simile Agno sine lana, quod comeditur cum fructu.

Eadem Sigismundus Liber refert in suis Comment. de rebus Moschouitarum, ut mirum sit Sciligerum nec hunc, nec alium à quo sortè accepisse potest, citare pro teste, præsertim cum hanc nec viderit, nec ab ullo visam proditum sit vquam. Merebatur sanè tanti miraculi [nisi sit fabula, quod valde veremur,] recitatio, autoris honore mastrari. Sed adeò nimirum omnia voluit scire, aut scisse putari ut ille sine æmulo maximus, ut vel in eo seipso fretus, noluerit alieni nominis subsidio gradum sibi facere ad gloriam suam.

FINIS LIBRI TERTII.











quod auellitur, radicis aut stipitis (*ῥιζώματα, ῥιζομήνη*: radicum esse aut ramorum) aliquid habere debet. Eius enim extrema germinare nequeunt: nisi id raro & præter naturæ consuetudinem eueniat. Nam nec rami prægrandis germine Lauri vnquam erumpit, ac ne avulsione quidem, nisi difficilè. Cuius causa siccitas & raritas. *Hæc Theophrast.* Cui non consentit Plin. quando ait: Testatum sic obiter & ramo Laurum feri, quoniam dubitauere Democritus & Theophrastus. Crebras deponere Lauros non plus nouenis pedibus distantes præcipiunt.

Quintilius inferi posse tradit Lauros mutuo, & in Sorbo & Fraxino. Diophanes baccas suadet legi circa Cal. Decemb. feri verò post Idus Martias: vitiradices transferri mense Octobri. Alii mense Ianuario Aquilonis afflatu siccante baccas legi præcipiunt, expandique raras, ne calefiant aceruo. Postea quidam fimo ad ferendum paratas vrina madefaciunt. Alii in qualo pedibus in profuente deculant, donec auferatur cutis, alioquin vligo infestat, nec patitur nasci. In sulco repastinato palmi altitudine vicenæ ferè aceruatim ponuntur mense Martio: eadem & propagine feruntur. Triumphalis talea tantum: Augusta & Baccalis pluribus modis: ab occasu Aquilæ ad occasum Sagittæ feri iubent. Baccis recentibus, [notante Trago] verno tempore in humo pingui, digiti altitudine depositis, Maio mense erumpunt, quæ si diligenter colatur, ac Autumno in figulina transplantetur, in arbutulam enadit mediocrem. Seritur & surculis apud nos, quos vere terra obruere conuenit, qua ratione & Lauendula propagatur. Nostra obseruatione scimus surculos difficulter admodum profouire: posse tamen: facilius si quid radice habeant, quales copiosè e matris radice pullulantes emergunt. Nostri in vasis colunt, & hyeme diligenter reponunt: verèque rursus exponunt, vel in eisdem vasis, scrobibus in arena excitatis, quod in Magnatum hortis fieri solet. Curam eandem adhibent, quam Cuius adhiberi diximus.

Laurus inquit Theophrastus calida est: idè ex ea ignaria facere solent. Est verò rara corpore: ideo senes ex ea pulchros & præleues baculos faciunt. Dioscoridi veraque Laurus [tam tenuifolia quam latifolia] exalfactoriam emollientemque facultatem habet. Itaque decoctum ex his infessu vuluæ ac vesicæ vitis conuenit. Virentia folia [*τὰ χαλὰ ῥιζώματα*: sic enim leg. non *ῥιζώματα*, vt quidam ex habent] nonnihil astringunt: trita & illita vespærum apumque ichibus opitulantur. Eadem adhibita cum polenta & pane ad inflammationem quamlibet leniendam valent. Pota verò stomachum grauant, & vomitiones mouent. In Græco legitur, *πρόνυμι δὲ πρᾶντι τὸν στόμαχον, ὡς ἐμῆτις καὶ*. Corn. pro *πρᾶντι*, id est, mitigant, *καρπύλλῃ*, id est, grauant. Facileque fuisse ait alteram vocem pro altera agnoscere. Plin. certè omisso priore membro, simpliciter dixit: folia pota vomitiones mouent. Marcello quoque verus lectio suspecta est, putatque aliud aliquod similiter desinens non adèd dissimile verbum substituendum: qualia sunt *πρᾶντι, πρᾶντι, aut ἀπᾶντι*, vel his simile aliquod aliud quod subuertendi, miscendi, & exasperandi significationem haberet. Sane in alterutro membro clausula errorem subesse ostendit eorum inter se repugnantia, vt rectè animaduertit Corn. Verum is nostro iudicio non in primo, vt placet Cornario, esse videtur, qui *πρᾶντι* legit, vt conformet cum sequentibus Tom. I.

inquit *πρᾶντι*: sed in his potius postremis. Certum enim est tum experientia tum ex Galeno, aromaticam esse totam, & amariantem cum nonnulla adflictione hepatis amica, qualia ventriculum tantum abest vt subuertant, vt nau-seabundum corroborent potius. Quare rectè retineti *πρᾶντι*, optimorum codicum fidem secuti, existimamus: non verò in textum irrepisse & expungendum esse: quemadmodum legisse verisimile est Galenum, alioqui hoc non taciturum. Plinius autem videri potest corrupto usus cortice, vt multis locis euenisse patet. Pro nostra opinione facit quoque Dodonæi obseruatio, quando scribit, Lauri folia à recentioribus non raro cum nonnullis cibariis præsertim piscibus coquuntur: verum inde nulla nausea accedit, sed cibus istis conditus sapidiior ac ventriculo gravior redditur. Nostra ætate à nonnullis cum carnibus suillis in eundem scopum coqui solent.

Porro Lauri baccæ (addit Diosc.) magis quam folia calefaciunt. Proinde in Eclegmate trita cum melle aut passu profunt tibi, orthopneæ ac thoracis rheumatismis. Contra scorpionum ictus ex vino bibuntur, & vitilignes emaculant. Expressus ex his succus animum doloribus auditusque grauitati auxiliatur, cum vino vetere & rosaceo instillatus. Inferitur & acopis & vnguentis tum etiam discutiendi vi præditis. Cæterum cortex radice calculos rumpit, partus recat & hepaticis prodest, tribus obolis in vino odorato potus. *Hæc Diosc.* Nostra ætas baccis non ad pulmonis aut pectoris morbos vitur: sed ad ventriculi, iocinoris, Lienis ac Vesicæ affectus folia exhibet: refrigeratum ventriculum concalfaciunt: concoctionem crudorum humorum promouent: languentem appetentiam excitant: cibi fastidium pellunt: iocinoris ac lienis obstructions aperiunt: vrinas ciunt: menses mouent, & ad secundarum expulsionem faciunt.

Plin. eadem ferè quæ Dioscor. habet, sed aliis quoque adaucta. Laurus inquit, exalfactoriam naturam habet, & foliis & cortice & baccis: itaque decoctum ex his, maximè e foliis, prodesse vuluis & vesicis conuenit. Illita folia vespærum crabronumque & apum, item serpentum venenis resistunt, maximè lepis, diptadæ & viperæ. Profunt & mensibus sceminarum cum oleo cocta. Cum polenta autem quæ tenera sunt trita ad inflammationes [Ruell. legit collectiones: quid si legamus inflationes?] oculorum: cum ruta, testum cum rosaceo, capitis dolores, aut cum irino. Quin & commanducata atque deuorata per tri-duum terna, liberant à tussi. Eadem profunt spiritis trita cum melle. Cortex radice cauendus granidis: ipsa radix calculos rumpit, iocinori prodest trib. obolis in vino odorato pota. Folia pota vomitiones mouent. Baccæ menses trahunt appositæ trita, vel potæ. Tussim veterem & orthopneam sanant bina, detracto cortice in vino potæ. Si & febris sit, ex aqua, aut eclegmate ex aqua mulla, aut ex passu decoctæ. Profunt & Phthisicis eodem modo, & omnibus thoracis rheumatismis. Nam & concoquant pituitam, & extrahunt. Aduersus scorpiones quaternæ ex vino bibuntur. Epinictidas ex oleo illitæ & lentiginis, & hucera manantia, & vlcera oris, & fursures. Cutis pruriginem [porriginem CH.] succus baccarum emendat & phthiriasin. Aurium dolori & grauitati instillatur, cum vino vetere & rosaceo. Perunctos eo fugiunt venenata omnia. Prodest contra ictus & potus, maximè autem eius Laurus, quæ tenuiora habet folia. Baccæ cum vino

Corn. & de re prælatæ

Tabes. Orthopneæ. Rheumatismis. Scorp. ictus. Phthisis. Aurium dolor. Calculi.

Appetitus.

Ad Vespærum & serpentis. Menses. Inflam. oculi & irino. Cap. dolor.

Tussis.

Granidis menses.

Menses.

Febus.

Phthisis.

Epinictidas.

des.

Phthiriasis.

- serpentibus, & scorpionibus & araneis resistunt.
- Gargareon.** Ex oleo & aceto illinuntur & leni & iocinori gargaris cum melle. Et in fatigatione etiam aut perfrictione succo eo perungi, nullo adiecto, prodest.
- Parti pro-**
mentu ra-
dia. Sunt qui celeritati partis multum conferre putent radicem, acetabuli mensura in aqua potam, efficacius recentem, quam aridam. Quidam aduersus scorpionu ietus, decem baccas dari iubent potui.
- Scorpionu**
ictu. Item & in remedio vix iacentis, [Gargareonis demissi & laxioris] quadrantem pondo baccarum foliorumve decoqui in aqua sextariis tribus ad tertias, eamque calidam gargarizare: & in capitis dolore, impari numero baccas cum oleo conterere, & calefacere. Laurus Delphica folia trita olfactuque subinde, pestilentiae contagia prohibent, tanto magis si & vrantur. Oleum ex Delphica ad cerata acopaque, ad perfrictiones discutientes, nervos lavandos, lateris dolores, febrisque frigidas [vel rigores febriles, vel hepialas & Lypurias, in quibus ardent simul zgri & algent. D.] vtile est. Item ad aurium dolorem, in madi Punici cortice tepesactum. Folia decocta ad tertias partes aquae, vnam cohibent gargarizatione: potu alui dolores, intestinorumque. Tenerima ex his trita in vino, papulas, pruritumque, illita noctibus. Proximè valent cetera Lauri genera, de quibus singulis specialius suo loco. Laurus quidem manifestè abdicat ignes crepitu & quadam detestatione: interancorum etiam vitia & nervorum ligno torquente. [etiam vitii vulu, vesicæ, & nervorum lassitudini medentur. D. alex. Diosc.] Eadem purificationibus adhibetur.
- Crepitum**
Lauri quid
denotet. Ceterum crepitum illum sonorum Laurini folii adolescentis portendere scilicet existimatum à Theocrito, Lucretio, Porphyrio: contra verò, Laurum iniectam igni & tacitam, tristitia: de qua re & supra quxdam attigimus.
- Potè non temerè existimamus vtendum foliis Lauri in inflammationibus oculorum & testium, nec etiam in capitis doloribus, quicquid dicat Plinius. Quod tamen doctionibus considerandum relinquimus.
- Plin. nat.** Nec displicet Ruellium legere pro inflammationibus, collectiones. Sed magis nobis probatur si legamus inflationes, quibus folia conferre posse neutiquam dubitamus.
- Plin. corr.** Herodianus lib. 1. in maxima peste, consulentibus Medicis, Commodum Imperatorem ob copiam arborum Lauri, Laureatum secessisse memorie tradidit.
- Refin.** Galeno Lauri arboris & folia & fructus desiccant & calfaciunt vehementer, plusque etiam fructus quam folia. At radicis cortex minus quidem acris est & calidus, plus tamen amarus, habetque etiam adstrictionis nonnihil. Quamobrem & calculos confringit, & icori prodest: bibitur ex vino fragrante trium obolorum pondere. Lauri potè folia pro bellariis apud Veteres habita fuisse, referente Athen. sic docet Callias, siue Diocles in Cyclopibus: Lauri folia tu arrodes.
- Calculu.** Idem Lauream coronam, quodd calefaceret & graue spiraret, computationibus inuilem esse iudicarunt. Fructus educit & euocat, teste Celso: calculosis prodesse Soranus Ephesius asserit.
- Cibit.** Radicis corticem ante Plinium Hippoc. partus celeritati plurimum conferre prodidit. Contra venenata animalia succi remedio, & contra alia venena, si Curtio credimus, munimur. Hoc etiam inuncti protegimur, vt etiam venenosa bestia
- Partu.**

nos fugiant. Lauri folia in aqua maxima decocta omnes pulices peluim ingredi compellunt. Oestrum, siue Tabanus bouem aliisque quadrupedum in amentiam precipitare solent, maxime perustinos calores: aduersus quas molestias, si Lauri baccam contuderis, & in aqua coxens, & eo loco vbi boues depastur, aut incubant sint, insperferis, prodeunt. Hæc Sotio. A mulcis autem nris infestenter, baccas Lauri contundito, atque oleo incoquito, & boues inungito.

Huius autem arboris vini propè diuinam, non ignorarunt aliquot animalia. Nam Coruus ^{Etiam be-} occiso Chamæleonte, qui etiam victori nocet, ^{stia Lauri} Lauro infestum virus enecat. Pignita quoque gallinas, præsertim messis ac vindemiarum tempore, ^{Sotio} vt plurimum infestat: illarum medicina est, vt ^{Purua} cubatus eorum in Lauri fumo fiat. Hoc autem sic ^{gallina} circa naturarum discordia, quam ^{Coru} ætæ medicæ vocant Græci. Aduersus bouum coriaginem, tradente Colum. prodeunt Laurum decoquere, & ea calida terga touere, multoque oleo & vino confusum subigere, ac per omnes partes apprehendere & attrahere pellem, idque optimè fit sub dio, Sole feruente. Idem animalis genus Cephalalgia, hoc est, capitis dolore torquetur: quod tunc ^{Cephalal-} dignoscitur, vbi aures demittens non comedit: ^{giam} tum foliorum Lauri, quantum manus apprehendat, in os iniicies.

Sed ad vilitates potius, quas homini præstat, redeamus. Baccæ Lauri à cortice exteriori mundatæ, deinde per noctem insula in vino albo quæque ad consumptionem, foriter exprimantur, liquor reponatur in vas vitreum: de eo in angulo lachrymali pone vnam vel alteram guttam, & ^{Lachryma} potenter lachrymas testringet. Eadem in vino ^{ocularu.} cocta, trita & oculis superposita dolorem & tumorem tollit, attestante Arnaldo. Amatus inter ^{Amato} selecta medicamenta combustionibus incedentia, siue ab igne vel aqua feruente, aut alia aliqua causa eueniat, hoc primatum obtinere certum ^{Amato} esse testatur ab Indico Medico acceptum. Super Lauri folia facies de alto cadere porcinarum carnem ignitam, quousque folia in cinerem vertantur. Eo vnguento combustam partem inuoges, bisque in die, & intra tres dies sanam reddes. Lauri ^{Aurum} tenerimas summitates cum Nardo in vino decoctas, aurium grauitati & tonis mederi, scribit ^{grammæ} Matthiol. si eius decocti calentis vapor in fundibulo in aures recipiatur. Laurus ex se vim habet ignem ^{Ignis in} producendi: quippe si exsiccata ramus ramo frequentius confricetur, superaspeito sulphuris puluere, ignis statim exiliet. Ex baccis in nodulo in vino aut cereuisia maceratis, vtilis fit potio ad colicum dolorem: dissipant enim baccæ status: ^{Colicu.} in quos usus asseruatur in Officinis Elect. de baccis Lauri nuncupatum. Lauri baccis laxata Columella sen vuula ad locum reducit, si cum æquali pondere Cymini, Hyllopi, Origani, ^{Vuula.} Euphorbi, melle excipiantur, & summo capiti calide applicentur. Eadem vncie pondere cum thitici vel hordei fursuris manipulo, baccarum iuniperi vncia semis, Allii bulbis tribus contusis, & assuis vini albi libris duabus ad emplastrum consistentiam decoctas, & pectini admotas, tanquam ^{Prime re-} singulare remedium ad vrinx retentionem, vel ^{tem} suppressæ prouocationem, prædicat. Septem Lauri baccas à prægnantibus propè diem paritibus, cum se dormitum recipiunt, deuorata, facilem felicemque partum præstare. Tenerimas ^{Partu.} Lauri Cymas cum Calamintha & sale contritas, ex tepida aqua sumptas, aluum ciere, pituitamque & lumbricos celeriter expellere. Baccæ Lauri & Pura

Dolor cap. & Pira Sylvestria contusa simulque imposita sibi & temporibus in linteolis, Camer. teste, sedant dolores capitis. Eadem baccæ cum pauca Scamonea & Croco trita in aceto & oleo rosacco, itaque linimenti applicatae in hemierania diuturna non parum prosunt. Lauri folia Veteres olim inter bellaria adhibebant ii, qui nolebant vinum sibi nocere: vi namque exsiccatoria solent, sumi ad caput elati adsumebantur: vel potius qui, cum vinosi essent, vinum tamen redolere nolebant, & sobrietatem mentiri conabantur: id quod Martialis facere & clare admodum significat.

*Fasce multo Myrtale solet vinum,
Sed follas ut nos, Folia denorat Lauri,
Merumque, cautâ fronde, non aqua nuset.*

Marborum amuletum. Aegyptiorum Hieroglyphica Picam solum Lauri ore tenentem pingunt, quo designabant hominem sibi ipsi medentem. Nam Pica ægrotans dicitur Lauri folia in nidum congerere & illis morbos arcere. Palumbes præterea, graculi, merulaeque, perdices quoque, ut noxias bestiolas fugent, nidulis suis Lauri folia ingerere traduntur. Scribit etiam Secundus, eas annum fastidium Lauri folio purgare. Refert insuper Horus Apollo in Hieroglyphicis literis, palumbum quoties ægrotauerit, Lauream frondem in suo nido apponere, quo remedio statim reconualecit. Quamobrem Aegyptii hominem sibi ex oraculi responso vtiliter medentem ostendere volentes, ut modò dictum, Picam, vel secundum alios, palumbum, Lauri folium tenentem effigiant.

Mirum quoque, quod de ea in suo Asino aureo scribit Apuleius, Adethi scilicet modicum cum Lauri foliis immisculum cum aqua fontana, lauacrum & poculum esse ad faciem pristina recipiendam, arte magica immutatam.

Conuenire etiam narrant in maleficiis amatoriis Laurum incendi, etiam amantium quærimoniae representet.

Antipathia Lauri. Columbae etiam pullis suis contra fascinationes precauentes, Laurinos ramulos nidis reponunt. Anser folium Lauri non exest, ne quidem si vel fame prematur, attingit: nec rosam Laurinam, neque etiam vi adhibita. Præclarè enim intelligit, si id comederit, vita se priuatam iri. Hæc Aelianus de Animalibus. Scribit etiam Lucianus, equo, asinoque Lauri cibum perniciosum, & è vestigio mori edentes.

Colum. vult boues satiari circa autumnum fronde Laureæ. Ex ante ipsum Cato, si metuitur mors, adhuc tamen sanis Laureæ folia trita cum sale & porri fibris danda præcipit.

Olei Laurini conficiendi rationes. Laurinum oleum apud Dioscor. è drupis, seu maturitate deciduis Lauri baccis [scilicet] in aqua decoctis conficitur. Tum enim ex ambiente cortice pinguitudinem quandam exudant, quæ maturius prius expresso è tritis baccis succo conchis excipitur. Nonnulli verò ubi Omphacinum oleum Cypero, iuncto odorato, & calamo prius inspissauerunt, tenera deinde Lauri folia in id coniecta simul decoquunt: Sunt qui Lauri baccas addant, dum iustus odor accesserit. Alii styracem & Myrrham admiscunt. Porro ad eiusmodi olei confectioem optima est Laurus montana & latifolia. Palladio ex Lauri baccis oleum conficitur, hoc modo, Lauri baccas quàm plurimas, & maturitate turgentes in aqua calida bullire facies, & ubi diu ferbuerint, olei quod ex se dimiserint, supernatantis vndam penni leuiter cogenibus in vasa transfundes. At Plin. fit inquit, è Lauro admixto druparum oleo. Quidamque à baccis expriment tantum: alii foliis modò: alii folio & corti-

ce baccarum, nec non Styracem addunt, aliosque odores. Optima Laurus ad id latifolia, sylvestris, nigra baccis. Sed non satis explicat Plin. an baccæ Lauri cum oleo druparum contineri ac exprimi debeant, aut ab expresso simul utroque fructu sic olei druparum admixtio fiat. Græci verò medici Aëtius, Actuarius, & Paulus, alterum Laurinum parum faciunt è Lauri baccis expressum: alterum mixtum, ita ut ad quinque oliuarum maturarum sextarios, de baccis Lauri sextarius vnus, aut etiam æqualis mensura addatur, & olei expressio fiat. Melfus verò baccæ Lauri maturæ & recetesteruntur in pila, ex aqua in Lebece coquuntur, post torculari plano exprimuntur in vas subiectum, in quo aquæ supernatans oleum colligitur. Simplex vilius, & quò recentius & viridius colore: amarissimum est & acre. Ex Gallia Narbonensi vtribus, ut commune, aduchitur, vnguentum similis quàm oleo. Nostri non parant, sed alatum emunt.

Vis ei exalfaciendi, emolliendi, spiracula venarum aperiendi, & lassitudines disentiendi. Quia & malis neruorum omnibus, doloribus aurium ac destillationibus confert: renum verò vitio ex frigore contra æto laborantibus illud est præstantissimum, & maximè, si quid aliud, vtilis. At potè idem nausiosum est. Ob vim eius exalfaciendi Paralyticis, Spasticis, Ichmaticis, luggillans, capitis doloribus, inueteratis destillationibus, auribus in calyce Punici calfactum illinitur. Apert, molit, dilcutit. Idè intemperiem omnem frigidam solam & cum pituita vel flatibus sanat, & ab his Colicis dolenti clystere infusum mirè prodest, ut partibus omnibus cerebri illitum, articulis, ventriculo, spinæ dorsæ, horroni febrili, denique omnibus neruorum vitis, algoribus, lassitudinibus, catarrhis, hepatis, Lienis, renum, vteri, frigidis affectibus. Scabie detergit eo in petiginibus, in balneo illitum: verum eo conuenit abstinere in lichenibus, psoriasis & aliis inflammationem manantibus, & in reliquis calidioribus & bilosis temperaturis. Vermes & pediculus tam agrestes, quàm domesticos & ledes enecat. Capitis furfures emendat: alopecias & quæ ophialis nominatur, corrigit. Ad hos enim, vltus in balneo illinendum: postea verò oportet vino & melle, vel ouo, cum melle & Fornugraci farina detergere. Cauendi ne capiti calorem tenienti hoc admoueatur. Ano suppositum vel injectum, hæmorrhoidum dolorem mitigat, & ex his profluentem sanguinem sistit, notante Curtio. Fit & uinum è Lauro, ut ait Plin.

Ex eius baccis conficitur emplastrum officinis frequentatum, autore Mesue. Recipit Thuris, Mastiches, Myrrhæ, sing. vnc. i. Baccar. Lauri vncias duas, Cyperi, Costi, sing. vnc. i. mellis colati quantum ad ea comprehendenda sufficiat. Si autem Cyperi seiscunciam admisceas, & sterus capræ aut vaccæ siccum ad pondus omnium, ad Hydropem fit mirabile. Alioqui ventriculi, intestinorum, hepatis, renum, velicæ, vteri, & partium aliarum dolorem, à flauibus, aut intemperie frigida ortum placat. Quare in colico dolore à flatu & pituita salubriter calidum ventri imponitur, vacuata plenitudine. In clystere quoque inicitur vncia vna, vel seiscuncia, cum cæteris eodem pertinentibus. Inflationem quamvis, id est, à flatu tensionem, & tumorem, eadem ratione iuuat.

Diuersum ab hoc Emplastro Malagma dicitur Apud Galenum, id est, è baccis Lauri, Nembro, Ammoniaco, Cera, Resina, Picea, Pice Bruta.

Electuarium de baccis Lauri fac. de Manliis in

in luminari maiori, cuius descriptio est apud Rhazam lib. 9. c. 72. cur à Lauro nomen acceperit, non videmus. Sunt enim in eo Electuario efficaciora & maiora quantitate, quam sit Laurus. *Igniaria.* Fiunt & igniaria ex lauri ligno. Exploratorum hoc usus in castris Pastorūque reperit, quoniam ad excutiendum ignem non semper lapidis occasio est. Tenitur ergo lignum ligno, ignemque concipit autem, excipiente materia aridi fomitis, fungit, vel foliorum facillimo conceptu. Sed nihil Hedera præstantius, quæ teratur, Lauro quæ teratur, auctore Plinio. Mercurio id inventum tribuit hymnus ad eum scriptus. Sanè plerique etiamnum pastores, inquit Tragus, coacti isto igne [Sic enim à Germanica voce *Wotseur* dicere possumus,] ad multas utuntur superstitiones, quæ seductæ & miseræ plebi longè magis arrident, quam veritas ipsa. Sed de hoc lauri attritu & prius quædam dicta: quemadmodum & de Mustaceis, quos sic facere iubet Cato Farinæ siliginæ modium vnum musto conspergito. Anisum, Cuminum, adipis. p. ii. Casei libram, & de virga Lauri deradito, eodem addito. Et ubi defixeris, lauri folia subtus addito dum concoques. Hinc Cicero ad Atticum ait, Bibulum in Amano cœpisse Laureolam in mustaceo, non sine cauillo. Quum enim quis absumpto mustaceo seridis aduenisset, faceret dicebatur: ille in mustaceo Laurus quærit, utpote cui præter sedimentum nihil superesset. Quum itaque deuictis, profligatisque à Cicerone Amani montis incolis, Romani populi sempiternis hostibus, Bibulus superuenisset, ut nonnihil gloriæ occuparet, falsè à Cicerone dictum est, eum in mustaceo laureolam quæsisse. Quod in eos quadrat, qui in minimis ac friuolis negotiis venantur gloriam.

Laurus insuper Alexipharmacum est aduersus venena, ut supra dictum: unde Græcum adagium, *Λαύρον εἰς φάρμακον*, hoc est, Laureum gesto baculum. Quod his conuenit, qui scilicet à periculo aufugissent, & tutos se asserere volentes illud pronuntiarent. Videntur portò apud Catonem Lauri folia intelligenda in illa Libi consfectione, quando ait: Casei pondo ii. in mortario bene disterat: ubi bene distriuerit, Farinæ siliginæ libram, aut si voles tenerius esse, se libram siliginis solum eodem indito, permiscetòque cum caseo bene, ouum i. addito, & vnà bene permisceto. Inde panem facito. Folia subdito. In foco calido sub testa coquito leuiter.

Cæterum præter vires medicas alias propè diuinas habere creditur Laurus, si modò vera sint, quæ Authores tradunt. Quippe iam supra ex Plinio dictum, quod & Tranquillus ait, solam fulmine non ici Laurus. Hinc Tib. Principem, qui tonitrua præter modum expauit atque exhorruit, tonante cælo, contra fulminum metus nunquam non Lauream coronam capite gestasse. Et Horatius:

*Tum spissa ramis Laureæ seruidos
Excludet istum.*

Quod & Colum. confirmat, quando ait: Plurimi etiam infra cubilium stramenta graminis aliquid, & ramulos Lauri subiiciunt: quæ cuncta remedia creduntur esse aduersus tonitrua, quibus vitiantur oua, pullique semiformes interimuntur, antequam toti partibus suis consummentur. Quidam etiam, teste Curtio, Lauri ramos in dolia imponunt, ne tonitrua & fulgura vina perueriant, per contrariam naturæ vim auxiliaturi. Sed hæret & non absque ratione Hier. Fracast. lib. de Sympath. & Antipath. rerum, vtrum in Lauro talis antipathia sit: quod nimirum à fulminis tactu

immunis tradatur,] illud magis inquit in causâ putarim, quòd Laurus rotunda admodum est, & corticis densi ac læuis, à quibus omnibus fit, ut ingidens vapor non inhæreat, propter quam rationem nec columnas, à fulminibus tangi videmus, quòd rotundæ teræque sint.

Contrarium etiam experimentum profert Læcuna, qui scribit anno 1539. Romæ in Palatio Ducis de Castro fulmine elegantissimam Laurum icam. Ut meritò ante eum Tragus videatur dixisse: fulmen non icere Laurus Veterum superstitione credidit: quod idem de aquila & vitulo marino affirmant.

Simile fortè & illud, quod tradunt odio maximo à Dæmonibus haberi. Aiunt enim plures sacrum morbum aliquem aut dæmonem eum locum infestare minimè, ubi Laurus adfuisse.

Quare Romani, boni Genii plantam vocauerunt, ut supra dictum, quia secundam valetudinem adferre existimatur. Proinde Laurus & Caricæ Ianuar. mensis prima die, à populo Principibus donabantur.

Rubigo autem segetum maxima pestis, Lauri ramis in aruo defixis abigitur, transitque ex aruis in earum folia, attestantibus Columella & Plinio.

Empedocles quoque philosophus Laurus tantum fecit, ut optimam conuersionem in arborem existimauerit, quasi post mortaliū vitam in bestiarum demigrandum sit.

Porro præcipuus quoque Lauro honos & usus ad victrices triumphantium coronas. Romanorum sanè Principum corona è Lauro fuit, ut legimus in historiis. Nam ut memoriz Appianus reliquit, Iulium Cæs. post ciuilia bella in urbem reuersum, multi Regem appellant, & ut aliqui ex sermone rem ipsam exprimerent, eius imaginem Lauro coronarunt, cænis albis insertis. Marcus Antonius Consul quoque, ut ex Plutarcho in illius vita est, illi in foro lauream portexit. Quam quam huic semel atque iterum repudiatum denuò obtulisset, iussit in Capitolium deferri, offerentem pauci faciens. Ipsi verò renuenti, plures congratulati, ut libertatis Reipublicæ afferenti. Scribit tamen Dion, ciuibz inuitis post victorias obtinuisse, ut in conuentibus, veste regia, & corona laurea, ornati perpetuò sibi liceret: cuius rei causam assererat, quòd olaus esset. Decretum insuper est, ut Augusti palatium Lauros propositas haberet, ex quibus corona cornea penderet: quasi ipse hostes perpetuò vinceret, & ciues conseruaret.

Iulianum autem nondum Principem, Socrates in Hist. Ecclesiastica refert, quandam ciuitatem ingressum, & Lauream coronam inter columnas pendente, rupto fune, super eum decidisse: & illum amplissimè coronasse. Quod qui viderent, hoc signum futuri imperii fore acclamarunt. A ludis, & illorum victoriis, inde obseruatum [referente Curtio] [ut qui de hostibus victoriam reportassent, simili honore afficerentur, ut propterea triumphantes ex Lauro corona caput suū cingerent. Nam, ut dicebamus ex Plinio, hæc propriè triumphis data fuit: unde in Aristide dicit Plutarchus: quicquid ob victoriam publicitus fiebat, id cum Lauro erat: ut ea præterea victoriæ signum remanserit. Quemadmodum enim in victoriis Delphicis lauro coronabantur, sic Romæ triumphantes. Quare de ea sic Ouidius:

*--- Tu ducibus latis, cum lata triumphis
Vox canes.*

Iuuen. Satyr. 8.

Nobilia







pio pulpo, flavi, quod quò magis ficeatur in arbore, dulcius redditur: intus nucleus est oliuarius, fragilior, perficitur Autumno incipiente: medulla interna amara. Sentitur opimè ramo. Fructum terræ diligenter commissum, etiam in fistilibus, minimè tamen germinasse sibi Clus. affirmat. Arbutulus autem Constantinopoli missæ germina, ubi paulò altius excreuissent, in terram inflexa radices egerunt, aliasque arbutulas dederunt.

Carnem aut furculis propagati, verum non sine labore.

Missæ porro fuit hæc arbutula Clusio Trahisson Curmasi nomine, quod Trapezantinam Dactylum interpretati sunt. Sed cum nihil cum Palma commune habeat, satis impropiè hoc nomen illi inditum censet.

Bellon. lib. 1. Obs. inter arbores perpetuè virescentes recenset Trapezantinam quandam serenam ceratam. Meminit & eo libello, cui de ratione cicurandi sylvestres arbores titulum fecit cap. xx. & Laurocerasum appellat: eius tamen historiam non describit nisi quod eodem capite illius ramum mali Citrix ramo æqualem facit, & eius prægrandem arborem Genus in horto Principis d'Orléans postea vidisse asserit. Cum verò huius nostræ folia maximam similitudinem cum Citrix foliis habeant nec desistant, & Trapezunte Constantinopolim, ut nomen indicat, primum allatam fuisse verisimile sit, eam esse omnino censet Clusius, quam Bellon. obseruauit.

Laurocerasi autem nomen conuenit ei impositum à foliorum Lauri similitudine, & fructu ceratis æquali: tamen si postremo loco ex Pliniana historia id euenisse asseruerit. Verum [inquit] nusquam apud Plin. Laurocerasi vocem legere memini: Is quidem lib. xv. cap. xxv. ubi Cerasi genera enumerat, de Cerasi Lauro insitis agit. Minus quinquennium est, ait, quod prodire quæ vocant Laureæ, non ingratæ amantibus, insita in Lauro. Hanc autem quam proponimus arborem, ipse non intelligere, vix se sibi persuadere posse Clus. scribit: Sed [addit] eum aptiore appellatione careamus, neque sine iudicio Bellonius eam vltus esse videatur, Laurocerasum cum ipso nuncupabimus donec ex Veterum monumentis commodior aliqua sese offerat. Sicut tamen Palmæ Trapezuntinæ vocabulum, quod Constantinopoli adepta est, aut Cerasi Trapezuntinæ vocabulum, ut Bellon. etiam Gallico sermone usurpat, magis arridet, ut eo possit. Itali Laurom regiam vocant: alii Laurom Trapezuntinam. Hortus Patav. Lauro regi d'Arzeto di Tribisfonda.

Dalechamp. eam secundam Loton Theophr. esse iudicauit, quam nonnulli docti Herbarii Laurocerasum nominant, ex Africa aduectam, Plinio & Matthioli. incognitam [si Hist. Lugd. credimus.] & in hortis principis Dorici Genus luxuriantem. Sed hæc Dalechamp. opinio de Clusii sententia minimè probanda: nam huius fructus non nascitur Myrti modo alternis, siue ut Græcus codex habet, *καὶ ἀπὸ τῆς μύρτης ἀνὰ ἑκάστην*, sed racematim, vix modo, quemadmodum & flores in hastula confertim plurimi nascuntur, ut dictum. Neque quod Dactylum Trapezuntinam esse statuit Lotum Africanam Matthioli, cui durum nucleum tribuit: quia de causa *διότι* Theophrast. esse vult, cuius, nucleis durus est, in qua opinione etiam est, marginalibus Athen. ab ipso Latino donatum scholiis. At, insit, Clus. Lotus Africana non nucleum sed semina duntaxat habet. De qua re vide plura capite de Guaiacano.

Tom. I.

Exterum iam prius dictum, videri Clusium duos fructus confudisse, nempe Laurocerasi cum Guaiacana, ex eo errore hic quoque denuò impetisse videtur, nec minus censura dignus quam Dalech.

Porro Laurocerasum primus nobis idem celebris medicus Dalech. Lugduni ostendit nomine Lauri regis Pisis missam, quam postea agnouimus in horto Cl. D. Fel. Plateri: ei pro ignota & innominata putata: & ut perhibebat, Lucernæ Heluetorum missa. Eadem hybernæ frigus aliquot annis non testis pertulit, fructusque Lucernæ protulit dulces, gratos, quorum partem in horto Montb. seimus, sed vana spe, partem inter naturalia nostra sicca etiamnum adseruamus.

LAVROCERASI FOLIO ARBOR.

CAP. IV.

A pud CL. Paludanum [inquit Clus.] conspiciebam anno 1595. ramulum peregrinæ arboris, qui erat circiter pedem longus, satis gracilis, foliis lauis, nigro colore præditus: intus cauis, summa parte nodosus: cui nimirum folia alternis iuxtahebant, ex aduerso semper sita, sena, aut octona, mali foliis maiora, magnitudine & forma proximè ad Lauri Cerasi folia, accedentia, superne læuia & splendentia, inferne minimè, sed venis à medio nervo in latera excurrentibus insignita, in ambitu non serrata. An perpetuè virescant, nec ne, mihi incompertum: sed fusca erant quæ videbam, utpote resiccata: sub singulorum autem foliorum exortu ad latera singulares nascebantur appendices, summa parte orbiculatæ, & densum inflexæ, siue quodammodo fornicatæ: summo rami fastigio sena, aut plura iuxtahebant valcula breui petiolo innixa, nuce ponticæ minora, membranacea, & densis nervis distincta, summæque parte in quinque lacinas siue foliola diuisa, exili nigro semine plena, satis feruidi saporis. Quo nomine apud incolas appelletur, aut quis illius apud eos usus, indicare non poterant, qui præcedenti anno ex Guinea attulerant nautæ. An verò huic simile folium illud, quod à Batavis naucleris anno 1597. ex Iava, vel Madagascar relatum, Brasias vocari Abdala Guzaratis mihi dicebat?

Descriptio

Folia

Vascula

Brasias

BNNA, BVNNV, ET BVNCHIOS
ARABVM.

CAP. V.

B vnz nomine, quem habemus fructum, magnitudine æquat, aut certè parum superat Ricini nostratis semen, oliuari figura, vna parte sulcatus, vel vtrique, cortice exteriore crassiore nigricante, interiore tenuiore, & quæ nucleum spectat rutilo, altera facie cinericea. Vtroque cortice detracto nucleum comperimus durum, Dactyli officuli effigie, lacunâ secundum longitudinem sulcatum, pallentis cineræ coloris, saporis amaricantis & ingrati. Ab umbilico ad oppositum mucronem ostendit gemina grana. Hunc fructum Bunz nomine à quamplurimis amicis accepimus.

Descriptio

Sapor amar.

N n









dicunt, quodque prudenter in aliis quibusdam editionibus nullum, sed ineptè ad iunctum in i-
cone Taberni, quam idem operum Matth. vindex
in pulcherrima Editione adaptare non debuit. Esi
verò ipse quoque Matthiam sua epitome retineat
solum illud, nullam tamen eius facit mentionem,
sed dicit, foliis esse Salicis.

In vltima quaque editione eius manifesta con-
tradictio, ut nuppiusmet antehis, tum patroni &
commentatoris ostantia polita & relictā, quan-
do primo ait, folia Cinnamoni vulgaris instar ha-
bet, sed rotundiora: postea verò, esse Salicis, in
quibus, quid appareat rotunditatis, ipsi vide-
rent.

Illud quoque considerandum, Matthiolum
contra aliorum opinionem crassos Caryophyl-
los, abortivos vocare, quos illi omnes unanimi
consensu fructus dicunt maturatos. Neque viden-
tur nobis Caryophylli provenire in extremis
Myrti modo: ut primum ab sit, quin existimemus,
ipsam Myrtum florentem nunquam aspexisse,
cuius foliuculos per ramulos inter folia emicare
vel trunclitres notunt Botanici.

C. Bauh. prater fallam iconem Tabern. apponit
etiam Clusii cum folio angusto, nec quale verum
& legitimum sit docet, at sic neutrum sibi cog-
nitum fuisse non obcurè declarat.

Amatus Caryophyllum festucarium quendam
florem vocat, arborem verò Buxo figura trunco
& foliis persimilem tradit: fallique eos qui ei-
dem folium Nucis aut Cinnamomi inesse autu-
mant, quum tenera arbor Caryophyllorum Buxi
folio vestiatur. Ut nunc ceteris fide dignis Scri-
ptoribus ad Indicas oras remigrandum sit, ut Ca-
ryophyllorum folia rectius inspiciant, qui Lauri
angustifolia, Perficis aut Salicis folio perhibue-
runt. Sed si tam bene constat Amato de Buxo
Caryophylli folio, cur non docet vade id sitat
ubi videtur: à quo habeat? nimirum ingens hæc
temeritas alio tegmine occultari non potuit,
quam experientia vel auctoritas [quam ipsi nullam
fuisse haud vanè suspicamus] silentio.

Lacuna quoque folia Cinnamomi foliis bre-
uiora & rotundiora dicit: sed aliorum fultus pro-
nunciato, plantam trunco & ramis Buxo similem
scribit, cum nihil ferè minus in furentis, si quis
eas cum Buxi ramulis conferat, appareat. Notan-
dum quod Garcias annotat, eos Caryophyllos,
qui in arbore hærent, crassiores fieri, neque ab a-
liis nisi vetustate disferre, tametsi falsè existi-
mat Auic. crassiores hunc mare esse.

Falsa quoque eorum opinio, qui Caryophylli
arborem cum Moschatæ nucis arbore eandem ef-
se putant.

Clusio Caryophyllum nihil aliud est, quam
rudimentum fructus.

Describit etiam Lud. Rom. l. 6. c. 25. & Maxim.
Trank. de Molucis insulis. At quem M. Paulus Ve-
netus lib. 2. cap. 28. exhibet, planè alia est planta.

Caryophylli folium inquit Clus. Laurino an-
gustius, Salicis aut Perficis mali folio simillimum
aliquando vidimus vñ cum Caryophyllorum ra-
mulis muria conditis.

Idem Clus. olim in fine Histor. Gal. Dodonci
scripsit Caryophyllon Plinii, Pauli & Sethi, flores
officinis dici & Caryophyllos fructus, Antophyl-
los, cum potius flos ita sit vocandus. Auicenna
florem esse feminam fructum marem.

Acosta tradit in arboribus Caryophyllos pro-
ferentibus nasci fructus Ficus modo, spissim per
ramos ad foliorum basin, binos, ternos, quater-
nos simul iunctos, vel vnicos interdum. Hæc sunt

descriptions & figuram aptavit, & ut ipse ait
Clus. vel hanc vel illam aliam ad viam imaginem
imitatus est, & scripta sua pleraque, præter illa
quæ imaginariè effinxit, ex Garciz Observationi-
bus desumpta.

Legimus iconem in Atomatum eiusdem
Garcie historia ex ipso ramo, muria condito, sa-
hibere Clus. testatur, vidisèque ait ramos an-
drantales & pedales siccos à Franc. Dracko nan-
clero Anglo, [qui vniuersum orbem circumnau-
gavit] ex Moluccis, sed omnes extrema parte
fructus protulisse.

Mouerat fortè Costam Matthioli temeritatem
iudicium, qui dixit, Myrti florum modo Caryo-
phylli flores ramulis adnasci, uti notatum est.
Voluit igitur Costa in sua iconè Caryophyllos eo
modo, quo Myrti flores nascuntur, flores inter-
ferere, non minus, mehercle, lepido, quàm vi-
dendo atque adeò nouo tradendaque Exotica-
rum Historiarum aucupio.

Franc. Alexander in suo Apolline refert, aut
uile se Citream malum Indicæ regionis esse: id
quod etiam comprobant Mentia Lulitana Illust.
Renati comitis Chihani vxor, quæ flores nostri-
um affectu iussit, hosque ablatis barbulis, viam
Caryophyllorum imaginem prius representante
indicauit: torrido autem Indicæ regionis Sole,
pomum non maturefcere, ac in eo grano, quod
Caryophyllis insidere consuevit terminare allece-
bat: siquæ ita sit, ipsi acceptum refert. Sed si sa-
diatus ille Apollineusque buccinator confidens
ter crassiores Caryophyllos, quos Anthophyllos
vocat, animaduertit eos in duas partes fidi,
quod in nullo Citri fructus rudimento fieri po-
test, ac vel eo solo argumento dicere potuisset
Caryophyllos ex nulla esse Citra malo, nec pas-
sus fuisset, vnius mulierculæ coniecturam in capite
se trahi opinionem.

Eius folia, quæ se habuisse testantur P. na-
Lib. fuerunt Arantii magnitudine, minus vici-
na: alia latiora ac rotundiora ostendebant Do-
ctissimi Comasus & Anguillara, hic Ferraria, ille
Venetiis. Spirabat istud Caryophyllum. Hæc ipsi.
Nihilominus Loban. suis Obser. & Icon. proponit
iconem folii qualem Clus. habebat, quod ipsorum
descriptioni minus conuenire videtur, quale &
nos exhibuimus.

Longicrus rudis prof. eto & incens planè, scri-
bit Clus. oder Indische blatter folio esse herma,
ut Nardus, iucundi odoris & saporis, cum potius
intellexit debuisse folium Indum siue Malaba-
thrum, quod malè pingit cum Caryophyllis pro
eorum foliis.

Ex salp. Caryophyllorum fructum cum perfe-
ctus est ad maturitatem vsque minus odoratum,
ac minus acrem esse annotat, figura & magni-
tudo constare Laurinæ bacce oblongæ, aut fru-
ctus Rosarum, semine intus durissimo, imple-
cato.

Antophylli apud Nicolaum intelliguntur
grandes Caryophylli, cum tamen verbum An-
thophyllon debuisset florenti fructui aptari, Ca-
ryophyllon autem fructui perfecto ab Nuce si-
militudinem. Idem perhibet ex eorum relatione
qui Indicas oras perlustrant folia esse Cinnamomi,
rotundiora ad Laurinam excedentia, in ap-
colorum cacuminibus fructus esse quoddecim aut
viginti simul, iniuo candidos, postea rubentes, ad
perfectam magnitudinem intumescant, caros
euadere & inuales, præter corticem. Saporis a-
credinem inesse etiam arboris cortici, ligno & fo-
lis virgibus, ut fructui.

Caryo-



Oceani, ultra finem Gangeticum, Locis montanis, & si alio transferatur, nequaquam viuere. Nascuntur & in Mare, auctore Loupetio. Nascitur, inquit Garcias, duntaxat Caryophyllon in *Maluccis* insulis, quæ sunt quinque numero [quarum primaria est *Gilolo*] nec procul nimium à mari, nec etiam locis mari nimis vicinis. Nascitur etiam in *Zelan*, nonnullisque aliis locis, sed nullibi fructifera est arbor, quàm in *Maluccis*, quæ sub *Linea Equinoctiali* sitæ. Ex præter Caryophyllon nihil ferunt, quod inde per orbem distrahatur. In locis quibus hæc arbores crescunt, nullum gramen esse perhibent: omnem enim succum ad cæderiuari.

Hic subscribit Maximil. Trans. ad Card. Salz. Insule, inquit, *Moluccæ* sunt numero quinque, *Tarante*, *Amthul*, *Theiori*, *Mate* & *Matthien*, tam citra, tum ultra, tum etiam sub ipso *Aequinoctiali* sitæ, vicinæ omnes, sed parua atque angustæ admodum. Quarum minima *Tarante*, proxima *Theiori*: quippe quæ paulo ultra sex miliarium Italicorum ambitum habent. Est huic finitima *Matthien*, & ea exilis. Hæc tres ex quinque *Moluccæ* insulis Caryophylli magnam copiam gignunt, sed longè eberiores in quartum annum. Arbores hæc non nisi in abruptis rupibus prouenire solent, & ita densantur, ut plerumque lucum faciant. A mari ad tormentum iactum, inquit *Linschott*. Caryophylli arbores distixæ crescunt, sponte sua, nulla curâ aut plantatione: humum decerunt ea incolæ duntaxat purgant subtus.

Colligendi modus.

In anni magnâ fertilitate Caryophylla foliorum numerum facile superant. Manu non colliguntur, sed ad ramos alligatis funibus multa velluntur. Idcirco hinc grauer arboribus fructus sequenti anno nullus est, spe in certum producta.

Tempus.

Colligitur Caryophyllum, auctore Garcia, à decimo quinto Septembris usque in Ianuarium & Februarium, non manu, ut nonnulli volunt, sed violenta flagellatione.

Repositio.

Decutiti Caryophylla biduum aut triduum siccantur, deinde assereantur, & *Malaccam*, in aliasque Prouincias mittuntur. Quæ in arbore hærent, crassiora sunt, nec ab aliis nisi vetustate differunt. Magni prouentus augurium est, si arbor plures flores produxerit quàm folia: necesse non debent nimium flagellari arbores, quia vehemens & nimia flagellatio steriores efficit Cauliculi seu fæculi simul decutuntur. Etenim in *Moluccæ* insulis Caryophylla nequaquam emundantur, raro autem in *India*, plurimumque venduntur cum matre, [sic *Anthophylla*, seu magna & ventriosa, quæ maturiora diximus, vocant,] puluere ac cauliculis. Quæ tamen in *Lusitaniam* mittenda veniunt, ea distinguuntur.

Satio.

Arbores alia ex deciduis Caryophyllis spontè crescunt, ut *Castaneæ*, quàm citissime ob imbrium abundantiam. Intra octo annos fructum ferunt, intra quod tempus adolescunt, duraturæ usque ad centennium, quemadmodum ipsi incolæ testantur.

Scaliger ex *Vartomani* relatione tradit, bis in anno legi, Decembri & Iunio. Quarto quoque anno liberiores esse prouentum. Triennio vacante vindemia, ita demum effecari, atque decernere. Cæsalp. ex eorum narratione, qui *Indicas* oras perlustrarunt, bis in anno sub utroque Solstitio colligi prodit: neque finire incolæ ut ad perfectam magnitudinem intumescant.

Caryophylli insulam apud Maluccanos.

Nullus autem preter fuisse Caryophylla ferunt apud *Maluccanos*, donec eo delati nauibus Chi-

neses, inde magnam eorum copiam in suam regionem exportarunt, & inde in *Indiam*, *Persiam* & *Arabiam*. Conseruari autem in sua bonitate marina aqua inspergantur, alioqui teredinem sentire. *Vindia* saccharo conseruata, ac in condimentum, quod *Acher* vocant, redacta, in *Malaccam* quoque ac *Indiam* mitit. Hodie quoque flores conditi cum petiolis & ramulis teneris, præcipuis quibuidam Europæ emporiis, ut, *Venetia*, *Genus* & *Antuerpiæ* visuntur, testibus *Pena* & *Lob.*

Ipsi quoque furculi, *Fusti* dicti vna cum Caryophyllis adferuntur, & hodie in quamplurimis locis, potissimum *Genus* & *Lugduni*, saccharo incruentantur. Sed folia raro cum his adferuntur, notante *Cordo*. Fructus potissimum seu Caryophylla ingenti lucro tam per *Aliæ* quàm *Europæ* Prouincias distrahuntur.

Caryophyllum deliques nigris, solidius, ponderosius, & copiosorem liquorem diuulsum, vingue, vel acu punctum, exudans, odoratum, fragili contumax ac lentum, recens linguam multicaui vna cum sanguibus penè adurens, acro & aromaticum. Annos quinque seruari posse ait *Syluius* loco temporis: nam in humidore putrescere, sicciore arefcere, & rugosius euadere atque imbecillius.

Minus probantur *Anthophylla* dicta, quippe quorum acrimonia remissior, ac interdum penè nulla. Ex furculis seu fustis dictis præferuntur quoque nigriores, pinguiore, liquorèque fructuum modo remittentes, odore ac sapore ad Caryophylla quamproximè accedentes.

Folia, si quis eorum vltius esse debeat, suadeat *Cordo*, deliquantur maiora, crassiora, firmiora, integriusque. Fracta verò in puluerem, aut fragmenta eorum, vitanda. Possis tamen his, quæ in modum & fusti, substituere ipsa Caryophylla, quæ abundè suppetunt.

Matth. scribit ramusculum Caryophyllis onustum, cuius iconem posuit, Veronâ sibi misisse *Calceolarium*, sed absque foliis.

Caryophylli *Paulo* *Æginetæ* sunt aromati, acres, subamari, calidi ac sicci circa tertium ordinem, multiplicis vltus tum in obsoniis, tum in aliis medicamentis. Auius in secunda calefaciendi siccandi que classe reponit. Auius in tertio utriusque qualitatibus. Et sanè, calor tam est huic aromati essentialis & genuinus, ut cum in *India* emendatur, si vas aliquod cum aqua alioue liquore adstet [teste *Linschott*.] id omne intra duos dies, etiam aliquatenus distitum, ingenti siccitate Caryophyllorum exhaustur, ut sepe numero experimentis comprobatur ait. Oni halitum commendat, ideo mulieres *Indorum* frequenter manducant, in eundem finem, quod & *Lusitanæ* semine & plerique alii ceterarum Nationum promiscui sexus iam dudum facere ceperunt. Ad oculi aciem conferunt, & nubeculas exterunt. Ventriculo robur addunt, & hepatici Vomitus compescunt, & nasæ aduertantur, auctore Auius. Drachmarum quatuor pondere [quæ dosis nobis satis magna videtur, quæ tamen & *Palud.* retinet: malimus scrupulos, quatuor cum Amato, quod prior dosis, præsertim delectorum & recentium, magnum incendium sit allatura, maxime in corpore bilioso.]

Veneris incentiuum sunt, *Serapiogi*: qui & ligni [furculorum] & fructus vltus esse ait: præfertque ea quæ ad ruborem inclinant, quæque sigillatim ex arbore digitis decerpantur: ubi subaudiendum putamus ad delectum. Alioqui nihilo præ-

plurima iudicantur decempta, quam vi decus-
sa, quod ex calidulo nihil iniqua effatu digna iis
accendere queat. Cor roborant, digestionem ad-
iuvant, sed alium cohibent, eadem. Simeon
Sethi pulmonem laedere ait. Auenzoar in proe-
mio libri de confer. san. scribit sibi à multo tem-
pore propria experientia competum esse, si hye-
me vertex subtilestimo Caryophyllorum pulvere
aspergatur, frigidos catarrhos & capitis humores
consumi. Attamen satius esse, capitis tumma
prius vino ardente madefieri, ut pulvis
facilius adhaereat, cuiusque vis penetrare queat,
quod melius & citius fiet, superligato linteolo aut
Cucupha, ne vis eius exhalet. Pulvis eorum ocu-
lindius visus claritatem adfert. Sed cautione
opus ad hanc rem, addendaque aquae quaedam oc-
culares, seruatorem eorum ex parte retundentes,
qualis esse possit rosarum, Euphrasiz, aut simi-
lium.

Conducunt porro caryophylli contra morbos
omnes cerebri frigidos, Apoplexiam, spasmus,
Dysalysin, Lethargum, stuporem, idem siue iustimento,
siue elu faciant contra aerem pestiferum. Ad anhe-
litos lectorem, cum vino allanitur pulvis ex cru-
sta panis fecalini, Galangae, cum paucis Caryo-
phyllorum. Contra nauscam & vomitum omne,
omnemque profluuium alui ex causa frigida, edi-
tur crusta panis, vino Cretico madens, pulvere-
que caryophyllorum aspersa, autore Matth.

Aduchatur olim odoris tantum gratia, vel
Plinio teste (si de nostro scribit:) nunc quoque
excrecente ad ingluviem auiditate, eodem ferè mores
asperant, ut sine caryophyllo dapes despiciantur.
Actantum potu. tinge. nola gula, ut non tantum
in huiusmodi pertinet inaspergeretur eorum pul-
vis, sed & gallinae capones, galli ludici, bubulae
linguae, iocinora vitulina, vaccarum vbera & alia
eiusmodi plura non nisi caryophyllis transfixa af-
ferunt. Quin & us fructus transigi & condituras,
ut Mala, Pira, Cotonea &c. à mulerculis contue-
nerunt.

Usurpant item ad olfa. Rosalia, & vestium odores.
Quidam Ceru. uis. laporem incundum coelant caryo-
phyllorum pulueratorum diach. tantundem
baccarum Lauri contusarum, sacculo inclusis in do-
lio suspendendo.

Animo inquentibus praemansi caryophylli na-
ribus offeruntur: ad idem valet acetum, in quo
macerati sint caryophylli & Rosae. Estque iam se-
re translatum apud Germaniae mulerculas caryo-
phyllis aliquot secum gestare ad obuiandum
eiusmodi affectui.

In Lixiuo suspenditur utiliter nodulus caryo-
phyllorum cotulorum, quo morbis frigidis labo-
rans caput abluitur.

Vnus est etiam in ventriculo dicatis scitis &
laccolis, tum ad vomitum, tum ad ventriculi &
ventris dolores à causa frigida, quales interdum
vulgo praescribere solemus cum crusta panis pul-
uerisata, asperso aceto ros. modico, aut vino ru-
bro odorato, additis aliis quoque aromatis ad id
pertinentibus. Quidam pulvere caryophyllorum
caput spargunt contra dolores capitis ac grauedi-
nes. Sed & urinam ciere sunt qui scribant.

Apud Indos quoque, ut prodit Garcias in mul-
tiplici usu sunt, tum ad obsonia, tum ad medica-
tiones: tamen expetuntur in laua crassiora illa &
annosipia caryophylla: à nobis verò tenuiora, quae
adhuc viridia aceto & sale apud Maluccanos con-
duntur, sed his teneriora saccharo asseruantur, in
magnam palati amonitatem.

Nostri quoque caryophylla saccharo inusta-

re solent, non inconcinno, ad placendum palatu,
& calefaciendum singulum stomachum, inuenio.

Ex caryophyllis quoque distillationis artificio
elicitur, Oleum, quod quidam omnibus pollere
Balsami facultatibus asserunt, tam interno quam
externo usu. Id camen calidius multo censemus
auctore Camerario. Guttæ aliquot exhibita cum
vino aut Gallinae intuscula, sunt praestantissimum
remedium in ingenti dolore Ventriculi, à flatibus
& pituita.

Lusitanæ mulieres, quæ apud Maluccanos
degunt, è caryophyllis viridibus aquam stillatiam
organis eliciunt, mira odoris suauitate fragran-
tem, & cordis affectibus utilem. Sed & sudor iis
qui Lue Venerea laborant excitatur caryophyllis,
Maci, nuce Myristica & longo nigroque Pipere.

Si quid autem sit, quod Cinnamomi vicem sup-
plere queat, caryophyllos esse Celsus indicat.

CARYOPHYLLORVM RESINA.

Hoc nomine Resinam asseruamus, glebâ (ut
Happaret) fusili, crocei coloris, siag. leni ad-
modum & siccam, nullum gustanti saporem offe-
rentem, (forte ob vetustatem) odore tamen ubi
adoletur, suauis, caryophyllorum: facile adest, cla-
raque incendia dat.

Caryophyllorum gummi (inquiunt Pena & Lob.)
quod eximio odoris est, glebæ Ammoniaci con-
cretionem & colorem seruiamus: quod Lob. postmo-
dum in sua hist. Belg. denudè repetit, & colore fo-
ris nigrante esse ait. Gerossels gummi vocat,
sed rectius, nostro quidem iudicio Resinam voca-
set, quod promptè flammam concipiat, cuius-
modi lacrymas Diote. generationi voce iure vo-
cat.

Serapio cap. 39. ex autoritate Albugerig: Glutè
inquit, [potius resina] Caryophyllorum est simi-
le glutino Albumi.

Scribit Auic. caryophyllorum gummi, Albumi
seu Terebinthinæ facultate respondere. Hanc
ob causam percontatum se ait Garcias ab iis qui ex
Maluccis caryophyllum aduehant, sed negasse se
huiusmodi gummi vidisse. At nos non in Moluc-
cis sumus, & vidimus tamen, & habemus inter
fructus repertum. Olius quoque testatur Cal-
ceolarium habere Gummi caryophyllorum: sed
cur non descripsit rem tam raram?

Clus. quoque annotat inter caryophylla, quæ
Antuerpiam adferuntur, inueniri interdum gum-
mi ex atro rufescens, odorem, & quod prunis in-
iectum caryophyllorum sine odorem reterat: su-
spicaturque idem esse gummi, de quo Auic. pro-
didit.

CARYOPHYLLO AROMATICO

similis fructus.

CAP. VII.

Fructus delatus in priore Batavorum naviga-
tion. anno 1597. ex laua de quo Clus. exot. In
binarum unciarum longitudinem, vel etiam am-
plorem, & vnguem crassitudinem excreuerat se-
pibus fructus: videham enim caryophylli aro-
matici vetustioris in fructum iam se formantis du-
taxat magnitudine, cui sanè valde similis, ut primo
intuitu mihi importeret. Totus fuscus erat, nec val-

Oleum C.
1596.

Aqua C.
1596.

Luxi Vm.

Cinnam.
arab.

Descriptio

Descriptio

Maruali & plerisque aliis ex Graecis & Latinis Scriptoribus dictum est: & ob odoris similitudinem, idem Nardino est creditum aliquando.

Nardino
Sag.
Sedg.
Sadegi.
Apud Serapion. legimus *Sedg*, id est Malabathrum, Diosc. est herba quae nascitur in India. Apud Auic. Folium Indum est *Sadegi* & Malabathrum. Folia & rami sunt *Sabesefram* [Garc. *Saisfram*] similes: flos frangibilis, [Dioscor. flos nullius meminit:] provenit in India paludibus, inquit aquae Lenticulae aquatica modo, & radici non appentum: ibidem ligant filo & exiccant. Quidam existimant esse folia Nereidis [Nardi Indica propter virium similitudinem: Garc. Golsam legit, quam vocem Clus. Nymphazam reddidit.] Arabes secundum quosdam etiam vocant *Tembul*, à quo differre postea dicetur.

Tembul.
Berbrum.
Bathrum.
Stymon.
Indi verò, apud quos provenit in regione Malabar, dicunt *Bethrum* vel *Bathrum*, unde composita à Graecis videtur dictio *Malabathrum*: hodieque apud Indos, etiamnum teste Garcia, paucis immutatis folium *Tamalapatra* nuncupatur. Quam vocem, ut putat Garcia, Graeci & Latini imitantes corruptè *Malabathrum* nuncupant.

Malabar.
Indu.
Cadegi.
Indi.
Arabes *Cadegi Indu*, id est, *Folium Indum* dicunt: nec dicitur Folium per excellenciam, sed quoniam Auic. lib. 2. cap. 259. ita vocavit: Qui & folia *Saisfram* esse ait, quamvis in quibusdam Exempl. *Sabesefram* legatur.

Malabar.
Indu.
Cadegi.
Indi.
Ital. *Malabathro* & *Folio Indiano*. Hisp. Castil. Catal. *Folio Indo*. Gal. *feuille des Indes*. Lacuna ait Lusitanis *Betea* & *Beter*. Sed vel is vel hi falluntur, qui nomen *Betere* alteri folio tribuunt. German. *Indianisch blat*. Quidam, qui tamen egregii Herbarii vulgò creduntur, temerè & nulla ratione solida, *Uegelbletter* vocant, ut Euch. Roslin, Lacuna & alii: ac temerario etiam magis ausu alii Caryophyllis adhaerentia pingunt, ut Tabern.

Ruell. not.
Ne fallaris, inquit Ruellius, [cui placet identidem Hermolai decocta ruminari, & pro suis venditare,] quod Officinae *Folium* nominant *Indicum*, Cinnamomi non Malobathri dicunt esse comam: profectò id quidem sub lingua Cinnamomi refert sapor, folio Juglandis, flavo, venisque tribus &c.

Cinnamomum folium.
Desiit, inquit Syluius, & *folium Syriacae arboris* Plinio celebratum. In horum locum Mauri inuenerunt folium Laurino proximum, sed maius, & heruis tribus folium intercurrentibus distinctum, odore incundo: Primum illud *folium Indum* dicitur Serapioni: tamen Actuarius in Hedychroo magmate, *cinnamomum* & *cinnamomum* ceu diuersa miscet. Idem in Antibal. vult pro Malabathro sumendum folium illud vulgare Indi dictum, quam opinionem quoque sequitur Placotomus.

Succedan.
Folium Indu.
Indu.
Malabathrum, ut tradit Cordus, crediderunt multi Nardi Indicae folium esse, verum decepti & falsò, ut Dioscorid. cum ipsa experientia contrarium testantur. *Indu* Graeci, Romani *folium* dixerunt, quoniam nihil aliud esset quam folium.

Malabathrum non esse Nardi folium.
Folium Indu.
Indu.
Iam verò amplius non affertur, praeterquam quod casu nonnunquam cum Nardo Indica affertur, quod descripsimus folio orbiculato. Eius in locum, Cassia, Cinnamomi & Caryophylli folia substituta sunt, quae pro Malobathro quidem in usum recipere licet cuilibet: sed eadem *Malobathrum* siue *folium Indum* appellare, non perinde licere arbitramur.

Malabathrum Indu.
Indu.
Cinnamomum folium.
Indu.
Idem alibi scribitur folium quod hodie pro Malabathro in usu est, & simpliciter *folium* magno errore vocatur, Cinnamomi folium à plerisque et-

iam Doctis creditur, sed male: nam sine dubio à viliori & non adeò efficaci Cassia producit, quod pediculi eius *stipes* manifestè indicat, qui planè rubentem & glutinosi saporis Cassiam refert, & nequaquam Cinnamomum. Nobis autem uti non certò constat, quid sit Malabathrum Veterum, ita etiam Cordi & vulgare Malabathrum non reuicimus. Atque ut Cinnamomi folium non esse & ipsi putamus, ita nec Cassia rubentis esse iudicamus: Malabathri enim siue Folii Indi vulgaris cortex tenuissimus est, nec similis cum Cassia rubente.

Bathrum.
Indu.
In Nauigationum Tomo primo ex Edit. tertia pinguntur folia Malabathri vulgaris seu folii Indi nomine *Betelle*, aut *Berre*: ubi scribitur *Betelle Persis* dicit, & Arabibus *Tembul*, in Italia, *folia Candia*, sed perperam, nostro quidem iudicio: uti in eodem Nauig. libro *Betelle* & *Tembul* planta, arborescens eadem exhibetur ab Odoardo Barboffa in folio Indo vulgò vocato. De *Berre* plura videant Lectores c. seq.

Bathrum.
Indu.
Malabathro, inquit Scal. non subest radix, si vera Graeci fabulantur. Et alibi apertius. Sine radicibus quaedam, ut Lenticula aqua. Nihil ei praeter folia. Nam de Malabathro Veteres somniant. Qui enim omnes Arabias, ac diuersas Indias penetramus hodie, nusquam folium illud mirabile compertum habemus. Et iterum alibi. Folii *Betelle* facies & magnitudo, quae & quanta Citrio: multis neruis, ac venis quasi striatur. An sit hoc, quo utimur, *folium*, cum de facie, tum ex effectione deprehendi potest. Mansum enim is, quae uoloco dicta sunt, indicis sese prodet. An verò sit hoc Malobathrum Antiquorum? Ad hoc non respondebo. Quia mendaces Graeci *folium Indum* in aqua natante palustri, sine radice, prodidit. Cuiusmodi toto Indici Orbe nullum compertum est.

Bathrum.
Indu.
Fuchsius lib. 1. de Comp. Med. quatuor folii differentias proponit. 1. à Diosc. pictum, folium Indum Graecis dictum à quo Vnguentum foliatum, à Nic. Myrepto descriptum. 2. Malabathrum, folium arboris cuiusdam Plinio, ac utrumque folium hodie adferri desisse. 3. Esse praeterea aliud cuiusdam plantae folium, Nucis Juglandis folio simile, in Malabar Indici regione natum, quod colz Batrum nominent. Hoc cerebrum & stomachum roborare, cor exhilarare, veneremur incitare, & halitum oris commendare: iudemque Indici incolis *folium* appellari. 4. In horum locum Arabes quartum inuexisse *folium*, Laurino proximum, sapore Cinnamomi iucundo. Vnde quibusdam Cinnamomi folium putatum: at Officinis, ut Mauritanis, simpliciter *folium* dicit. Et rursus postea: rarò hodie Cinnamomum affertur. Nam quo Cinnamomi nomine, utuntur Sepalsia, magna ex parte Cassia est. Ceterum arboris huius folia Nucis Juglandis foliis similia sunt: quae in Officinis falsò pro Malabathro venduntur. Hoc

Bathrum.
Indu.
Cuius quatuor species, si verum fateri licet, nec intelligimus ipsi, nec ipsummet vel nouisse, vel etiam, quid scriberet intellexisse, putamus. Suspiciamus enim eum bis idem tradere. Folium Barbaricum & Malabathrum res esse diuersas, inquit Anguill. ut dicam, facit autoritas Digestorum tit. de publican. & vestig. lib. 39. in Pandectis Florent. Videtur etiam Gal. facere duas compositiones: vni nomen *Foliatum*: alteri *Malabathrum*. Apud Nic. Myrept. in pluribus compositionibus praescribuntur Folium & Malabathrum. Apud Auic. in quodam medicamento lib. de v. lib. Cord. manifestum discrimen apparet. Malabathrum non cognosco. De folio Barbarico & folio simpli.





Indi vulg. batulos duos, vel lignum malè posuisse sub titulo Cinnamomi, sub quo etiam duos cortices Cinnamomi offic. siue vulgaris pinxit, & folium, quod Clusio Cinnam.

Sed ut tandem intricatam hanc Folia seu Malabathrum inuestigationem concludamus: Malabathrum neque Indicæ Nardi folium est, ut verè monet Dioscorid. Neque id folii genus, quod Arab. Berre, Persis Tembul appellatur. Diligentissimus Garcias multò minùs Canellæ aut Caryophylli folium esse censeat: sed sui generis Folium, non quidem in Syria aut Aegypto, ut voluit Plin. sed in India ex arbore præterea excerptum, hodièque, ut dictum, etiamnum Tamalapatra dictum. Non innatat aquis, ut scripsit Dioscor. & hunc secutus Plin. Decepti quoque fuerunt Serap. & Avic. qui eiusdem historiam ex Græcis mutuati sunt: qui cum Malabathrum non norint: ex eorum scriptis aliis innotescere non potuit. Non colligitur, inquit Garcias, ut Dioscor. perhibet: sed collecta in fasciculos colligantur, atque ita vaneunt. Dilutiore viridi colore nitent, non ex candido nigricant. Plin. in Syria & Aegypto nasci scribit: Medici Memphisici, Damasceni & Alepiti negant omnes. Non est tam validi odoris, ut Crocus, nec saporis Nardi, ut scripsit Plin. neque tam validi odoris atque spica Nardi, sed suavisioris. Falluntur qui Caryophyllorum foliū esse asserunt. Scribit Franciscanus quidam in Aethiopia gigni, sibi que datum cum inscriptione foliorum Canellæ. Verùm in Aethiopia nullæ sunt Canellæ arbores, neque Folium. Addit Clus. ad Garciam: Folium Indum, quale hic autor describit, ad nos etiamnum adfertur: legitimum coniunctio ex Garcie descriptione: differt à Caryophyllorum folio &c.

Ceterùm quod Folia Indi, quod in officinis habetur delectum attinet, deligendum recens, densius, crassius, maius atque integrum, quodque non faciliè in partes minutas frangitur, quod tam gustu quàm odore proximè ad Cassiam accedit, ut vult Cordus. Fragmenta verò & friatorum pulvere medicamentis ne commisceas. Sed Syluius inter bonitatis notas postulat, ut ad albedinem declinet, quam ex Dioscor. desumpsisse videtur.

De succedaneis quoque follici fuerunt Medici. Nam eo deficiente, idem pondus Thaisasar substituant, ex Avic. præscripto: quod quid sibi velit, Garcias fateretur se plane ignorare. Clusius Macerem intelligit. Nec opus erat, inquit idem, *arab. berre*, si diligentiores essent pharmacopola & medici Lusitani: siquidem tanta eius Copia hunc exportari poterat, quæ vniuersæ Europæ sufficeret. Eius autem penuria Canellæ foliis utatur, si ea nanciscuntur: sin minùs, Spica Nardi, non autem Maci, ut voluerunt nonnulli. Vbi opus est Malabathro, & illud abfuerit, Gal. Cassiam odoratam, vel Nardum Indicam supponendum vult.

Malabathrum Dioscoridi easdem cum Nardo vires sortitur, sed illud efficacius omnia præstat: at tamen Malabathrum & urinas ciendi magis vi pollet, & stomacho conuenientius est. Oculorum inflammationibus in vino seruesactum tritumque acillitum apprimè confert. Subditur & linguae ad commendandum oris habitum. Quin velisibus etiam vtiliter interponitur: eas siquidem & à tineis defendit, & odore non ineleganti tueretur. Ex eo olim pretiosissima fiebant vnguenta, de quo specialius idem tradit eadem habere quæ Nardinum spissamenta, Myrrhæ autem plusculem addi: qua de causa calfacit, Cincino aut amaracino vinibus respondens. *malabathrum* vocat.

Tom. I.

Apud eundem è Syriaca Nardo & Celtica Malabathroque Vinum paratur in hunc modum: singulorum minæ semissem in binos musti congios mittito, & post bimestre colato: Cyathum vnum cum tribus aquæ exhibero. Bene facit hoc vinum nephriticis, ictericis, hepaticis, urinae difficultate laborantibus, decoloratis & stomachicis. Sunt qui Acori vnciam vnam aut alteram, & Celicæ Nardi vncias tres in musti amphoram adiciunt. Plinio singuli succi nobilia vnguenta faciunt: Inprimis Malabathrum. Ipsum folium oculorum epiphoris vino expressum vtilissimè imponitur. Item frontibus dormire volentibus: efficacius si ex aqua bibatur. Cætera de viribus ex Dioscor. eadem habet. Iam prius ex Gal. diximus Foliato vnguento olim Romæ feminas ditiore oblini solitas: & oleum exprimi ad vnguenta ex Plin. & quàm variis immisceatur compositionibus apud diuersos autores. Vnguenti celebrem apud Veteres fuisse usum, velex Horat. patet ad Pompeium Varum sic canente.

Pompei meorum prime sodalium,
Cum quæ morantem saepe diem mero
Fregi, coronatus nitentes
Malabathro Syrio Capillus.

Martial. Epigr. II.

At meam libram foliari possit amica.

A quo Malobathratus eo vnguento delibutus. Quo vsus est Sidonius Apollinaris. In pretio quidem prodigio simile fuit (scribente Secundo) à singulis denariis ad trecentas peruenire libras, oleum autem ipsam in libras sexaginta. Consule etiam quæ supra ex Plinio de pretio tradita. Avic. Folium Indum calidum & succum facit, in secundo gradu. Decoctum in quâ rosacea & tritum vtiliter imponitur apostematibus calidis, etiam oculorum, eodem autore.

Vinum
Malabathrum.
Vini Syri.


Aloni modus.

Oculorum
epiphor.
Sonum cum
ciliis.

Pretium.

Apostematibus.

CINNAMOMI NOMINE EXHIBITVM

Lignum: nobis Lignum Folia Indi
Officinarum.

Habemus penes nos bacillos ligni Cinnamomi nomine exhibitos, palmo longiores, crassitudine plusquam pollicari, materie inter duram & mollem media, coloris cinericei, pectinibus rectis, cum micis exiguis transversis, in rectis fissiles, medulla iuncæam æquante, duriore multo: ex ipso medulla e-mergens foral-que vergens

callus nodosarum arborum forte non esse eximendam hanc arborem arguit. Sapor ligno nullus,

O O 2

Olor.
Sapor.

odor in cortice tenui ambiente, cinericeo, rugo-
loque ad Cinnamomum aliquatenus accedit, in
quo etiam sapor acrisculus, suavis, aromaticus,
Cinnamomo haud abfinilis, multo imbecillior:
nec mirum, cum iam ante annos triginta penes
nos sit, nec bene ab iniuriis aëris tuti lecti a bac-
cilli, & extra dubium sit, multos annos, parum a-
pud alios, partim in itinere haxisse.

Tales quoque fuisse videntur baccilli, de qui-
bus Clusius Cinnamomum, quod, duos ramulos in
Belgio vidi. Sunt ii recti, crassitudine pollicari,
non enodes, sed nodis quibudam sine ramulo-
rum vestigiis palmum ab invicem distitis intigen-
ti. Cortex tenuis est, subcinerei quodammodo
coloris, iucundi odoris, suavis gustus, sed qui sua
acrimonia aliquantulum linguam vellicet. Lignum
certè inodorum est & insipidum, non minus,
quàm Salicis ramus, cui perquam similis est. Re-
tinet autem cortex suavem illam cum odoris, tum
saporis iucunditatem [tamen totis quadraginta
annis à sua matre reuulsi sunt ramuli] atque eam
etiam maiorem, quàm nostra canella, cuius so-
lum lo. Placa Melius in Hispania in hi dedit.

Nos præter Clusii iconem addimus & nostri
baccilli non omnino teretis, sed per longitudi-
nem fissi.

Cassia.

Scribunt Pena & Lobel, se Cassiam ad Cinna-
morum verum proximè accedentem vidisse in
Offic. Guil. Dries Pharmac. Antuerpiensis, multo-
rum iudicio putatum furculum illum Cinnamo-
mi, bacillo solido, fractu facili, Cinnamomo
cortice oblecto, cui etiamdum cuticella pullo co-
lore obducta fuit. Folium verò seu pictum seu sic-
cum, multis in locis videre est.

Cinnamo-
mum.

Folium.

Hosidem Lob. in Hist. Belg. Cassiam, Cancelli
Zymmetroerlin. Gal. canelle. Hisp. & Ital. canella
vocat. Remin Obler. & Icon. nomine Cassia pro-
ponit.

Lob. Pena
& Clusius
Zantius.

Sed dum pressius bacillos nostros cum Clus. &
Lob. bacillis corticèque perpendimus, non pos-
sumus nobis persuadere, vel hos vel illos esse
Cinnamomi vel canellæ vulgares: id quod facile
discent, quibus eiusmodi ad manum fuerint: al-
ios docebit cortex cinericeus, tenuis vnicus &
simplex, nec alteri vel subiectus vel superiectus.
Quin collata nostrorum bacillorum tam materie
quàm cortice, magnam animaduertimus habere
affinitatem cum ramis Malabathri vulgaris: [qua-
les folius præditos referamus,] ut in eam ferè
propendeamus sententiam, ut ad Folium Offic.
seu ut volunt Malabathrum potius quàm canel-
lam referendum hoc lignum putemus.

Malaba-
thrum
Folium Of-
fic.

Folium ca-
nella.

De folio Canellæ quod pingunt, non habe-
mus quòd dicamus, an sit Cinnamomi nec ne,
quòd nemo id describat. Icon sanè diuersum à
folio Indo Offic. demonstrat.

Cassia ado-
rata.

Matth. scribit, Cassia odoratæ frustulum cum
cortice & ligno suo interiore sibi dono dedisse
Ferdin. Archiducem Austria, ab integro ramulo
abscissum, quem ipse reconditum habebat. Fumus
corticem colore quidem cinereo à nostro vulgari
Cinnamomo dissidère, non tamen odore ac gu-
stu: quandoquidem mansum, ad ipsum, quod vul-
gus Canellam vocat, ori planè repræsentaret. At
lignum quòd cortice contegitur, fragili constare
materie: neque vilo prorsus odore saporeque
commendari. Quare hinc facile colligi posse, cor-
ticis tantum eius vsum esse: atque etiam Theo-
phrastum non abs re memoriam prodidisse, huius
virgas in frustra secari, recentique bouis corio hæc
confusi, ut vermiculis, qui ex eo nascuntur, li-
gnum illud inutile erodatur.

Theoph.
Cinnam.

Ceterum hoc quoque Matth. lignum idem pa-
ramus cum eo, quod à nobis descriptum, quòd
que Amato Cinnamomum dicitur, cuius verba
postea tradentur: nam apertè dicit Cinnamo-
mum esse quius folia in Offic. pro Malabathro fal-
sò credantur. Sed interim nescimus an facile pos-
sit lignum tam tenui contextum cortice, sine li-
ctura huius à vermiculis erodi, ut Matth. de suo li-
gno ex Theoph. persuadere conatur.

Nostro iudicio Tabern. in tabella seu iconè
se proposita pro Cinnamomo, ligni, quod descri-
ptum bacillos duos pictos habet, quemadmo-
dum & C. Bauh. apud Matth. ex Tabern.

CANNELLE FRUCTVS QVIBVSDAM,

NOBIS POTIVS FOLII INDI.

Fructus quos supra in tabella iuxta Malaba-
thrum depictos dedimus, glandium figuram
ferè repræsentant. Calyci quippe pullo & su-
perne cristato angulisque inæquali glandula im-
merita est rufescens & spadicea. Pediculo dona-
tur crallo, lignoso, cupulæ concolori. Sapor Cin-
namomus aliquatenus, qualis Officinarum fo-
lii Indi, sed obtusior, & quia euandus fructus,
vel quia ad maturitatem non peruenit. Sunt
plures quàm 35 anni, ex quo habemus hos fru-
ctus à V. Ierando Dantoz: eodem etiam nos do-
nauit Cl. Fel. Platerus. Sed plures ad nos cum a-
liis exotice tantatis nomine nobis gratissimis, in-
signis illa Medicorum Italæ stella Hercules Sa-
xonia, sub titulo fructus Cinnamomi.

Cordus quoque prodidit Cinnamomum ferè cinna-
mum paruum, glandibus in acetabulis simi-
lem. Et Vib. Calu. apud Berzo. lib. 3. cap. 8. ponit
descriptionem ex Aug. Zarac. Hist. Peru. cuius fru-
ctus aut esse calyce Suberino aut Quercino simi-
lem. Lectores considerent descriptionem posi-
tam cap. de Cinnamomo siue Canella vulgari,
cum qua fortè confundit fructum Foli. Indi.

Sed & Clus. testatur à Cortuso accepisse se fru-
ctum exiguum glandis forma, cum hac inscriptio-
ne: Fructus canella ex quorundam sententia ex a-
liorum verò Tembul conuoluuli in India.

Eum quoniam dicitur interdum vnà cum folio
Indo vulgari ad nos adferri, [quandoquidem
Tembul fructus longè sit diuersus] folio Indo
Clus. imitatione appingendum curauimus.

At Lob. in Obs. fructum Tembul ait esse exiguum
glandis figura, quadruplo minore: & tamen ad-
pingit iconi folii Indici vulgaris, à quo si diuer-
sum putat, non assentimur. Sed nec Clus. nec alii
pro Tembul fructu recipiunt. Casp. Bauh. apud
Matth. eodem fructus Canellæ fructus nomine
sibi missos testatur.

CANNELLE ACOSTAE

Canella arbor, ut scribit Acosta, Mali aures
magnitudine est, nonnunquam maior, in-
terdum minor, ramosa admodum, cuius tenerio-
res rami recti sunt: folia Laurino simile, latius
tamen, colore dilatiore, & minus sicca, tribus
nerviis insignita. Flos candidus, odoris prope-
modum expers. Fructus sylvestris Oleæ bacis
par, virens initio, deinde rufescens, & ubi ple-
nam maturitatem consecutus est, niger atque
splendescens, [quo tempore colligi debet] offi-
culum inus conueniens sylvestribus Oleis simile,
simi-

Descriptio

Folium

Flor.

Fructus

Officinalis

Simi-

Liquor.

Oleum fa-
per.

Locus.

Folium de
AuroCanella de
maro.
Cinnamo-
num syl.Vires &
vires
Aqua de
lat.Stomachus
Colica.
Venenarum
Ad Genua
morbos.Ad Genua
Menses
& omnes.Spasmus
Convulsus
morbos.
Temperat.
Aqua ex
floribus.

similique car-
ne preditus,
ex quæstilla
oleo generis
quidam liquor
subitescens,
odore haccati
Lauri, sapore a-
cri cum pau-
xillo amarore
conmixto. Per-
ditus vero est
hic fructus sel-
sili parte par-
uo calyce, la-
tore, minuf-
que crispo,
quàm sint li-
cis calyces. Ma-
rum arborum
magna est fre-
quentia in syl-
vis provincie
Malabar: sed



Folia Betre Descriptio

nomine missa, folia.

qualia à pluri-
mus annis in
nostri Musai
thelauris habe-
mus, circum-
scriptione &
magnitudine
cum Tiliaceis
possent conser-
ri, rotunda, nisi
in mucronem,
non sensim, sed
maximè sineret,
glabra, atrou-
tentia, tenuia,
Patanogeton s-
modo, nervis
quinque aut se-
ptem, partim
rectis, partim
sinuatis ad mu-
cronem usque
excurrentibus,

pediculo vnciali appensa, sapore aromatico, te-
nuis, mansu nescio quid arenosi sub dentibus esse
videtur. Nisi iam parata fuisset signata, cum de-
scriptimus, iunximus ad latus tabellæ iconem
ex nostro folio depictam.

Garcias aliam à nobis descriptionem habet, Descriptio
hanc: Est Betre folium simile serè Mali medicæ fo-
lio, oblongius tamen & per extremum acutius, ve-
nas siue Costas per longitudinem excurrentes
habens, amarum. Optimum censetur bene ma-
turum, colore fulucente, tametsi nonnullæ mu-
lieres præferant quod immaturum est, quippe
quod maiorem sonum edat in ore, dum mastica-
tur. Corruptum si recens à planta collectum
diutius manibus tractetur. Fere Betre in Maluccis
fructum quendam contortum, Lacerti caudæ si-
mitem, quem illic edunt, quod bene illis sapiat.
Fuit id semen delatum Malacam, atque degustatū
optimi saporis inuentum est. Sentitur autem vitis
modo, addunturque stipites & pedamenta, per
quæ repens se sustineat, nostratis Hederae mo-
do.

Aloisius Cadamustus tradit viros & feminas
incedere per urbem Calecut, esitantes solum
quoddam, cui nomen sit Betelle: eo inficidentes
colore subrufo: hoc more abstinere tantum ob-
scuro loco natos: ubi verò ob funera pullam in-
duunt vestem in speciem moestitæ, ut imperare si-
bi à folio huiusmodi, ut & dentes præ se ferant
moerore: subrufo colori succedere nigricantem.
Verum Cadamustus colorem subrufum perpe-
ram Betelle tribuere videtur, qui potius acceptus
serendus Areca, quam simul masticare so-
lent.

Quoniam verò Betre à quibusdam Tembul A-
nic existimatur, ut mox apparebit, hic subiici-
mus quæ ille tradit. Tembul frigidum est in primo,
siccum in secundo ordine, stipticum & exlicans:
roborat gingivas: continuè masticant Indi, quia
ventriculo confert. Bellun. ad marginem anno-
tat, Tembul. Haly l. 2. c. 36.

Lud. Rom. scribit, Regem Calecut quandoque
adductum superstitione, ad annum à re Veneta
abstinere, & item animo destinare vasa nolle Be-
telle. Ea folia Ailysii mali frondis similitudi-
nem exprimere: hasque frondes in cibatu habere
gratissimas.

BETRE SIUE BETELLE.

CAP. X.

Non incommode potuisset de hac planta tra-
di inter scandentes: Verum quia nonnulli
Folia Indæ Offic. huius folia putant, atque adeo
cum hac confundunt, placuit eius historiam hinc
referre.

Tom. I

Oo 23







(~~Interdum~~ interdum quosdam nonetiam fabulantes) audiri par est : subinde quid nostrae auctoritatis observationis ac iudicii sit, interferi.

Cinnamomum Arab. *Qinnamum*, lib. 9. hist. an. c. 11. In Arabia Cinnamomum Auen. *Qinnamomum* appellari, quam Cinnamomum *Qinnamomum* comportare, & nidos *Qinnamomum* conficere tradunt: quamvis ubi & quomodo nascatur hæc planta, non assignent. Nidificat enim, ex his arboribus & ramis: sed incolas sagittis plumbatis nidos petere, atque ita decussum in terram Cinnamomum legere. Eadem & Solinus scribit, de Arabia tractans, additque Cinnamomum hæc amplioribus vendi pretis, quippe quod mercatores magis probent, quam aliud: sed autem ipsam non Cinnamomum, sed Cinnamum vulgo appellari.

Cinnamomum
Salom.
Cinnamomum
lyceum
Plinius.

Aristotelis verba & Plin. repetit. lib. 10. cap. 33. sed auem Cinnamomum vocat: at in Arabia, & Cinnami furculis nudi ficare: plumbatis eos sagittis decutere indigenas mercis gratia. Postea verò lib. 12. cap. 29. huius narrationis vel immemor, vel eandem dissimulans, vel sanè reprobens, insit: Cinnamomū & Calias s. bulbosē narrauit antiquitas, princeps sūe Herodotus, auium nidis, & priuatiū Phœnicis, in quo situ Liber pater educatus eisset, ex inuis rupibus a liboribusque decuti, carnis quam ipsi inferrent (ipse inferret. M.) pondere, aut plumbatis sagittis. Item Caliam circa paludes [gigni] propugnante vnguibus diro vespertilionum genere, aligerisque serpentibus: his commentis augentes rerum pretia. De Cinnamomi natalibus, delectu, pretio vario, colligendi more &c. plura Plinius, quæ breuitati studentes præmittimus. cū præsertim pluraque sint Theophrasti, ex cuius scriptis huc postea referentur.

Serpentum fabula ex Theophrast. lib. 9. h. st. c. 9. ita habet, ipso euan fabulam vocitante. Con-
tallibus, inquit, exire id nunt, in hisque serpentes
plurimos conuertiari, morsura hominibus morti-
ferum inferentes, aduersum quos incolae leptis
manibus pedibusque descendere, atque ita lege-
re Cinnamomum quod cum deportauerint, ac in
tres partes diuiserint, inire cum Sole sortiendi ra-
tionem: tum quæ portuo illi obtigerit, eam relin-
quere: abeuntelque flagrare pami spontè conse-
ssim cernere. Sed hoc planè fabula est. De Cinnamo-
mo & Casia [καυκάσιος & γαζία] eodem Theo-
phrast. autore, ista narrant: utrumque fruticem
esse non magnum, sed magnitudine Viucis seu Ag-
ni, [ἀγνί: perperam Gaza Amerinz reddidit.]
multis lignosisque ramis constantem. Cinnamo-
mum excisum in quinas partes diuidi: Id optimū
esse, quod germinibus proximum fuerit: quod
ad palmi longitudinem caditur, aut pauld maius.
Bonitate proximum, secundum, quod sequitur,
quod & breuius caditur, esse & tertium & quartū.
Vltimum omniūque vilissimum, quod radici
proximum: quod nimum corticis habeat: is e-
nim vtilis est non lignum. Quam ob causam
quod ex cacuminibus decerpitur omnibus præ-
sertur, quia plurimum corticis habeat. Hæc qui-
dem ita referunt. Alii fruticosum esse Cinnamo-
mum aiunt. Duo eius esse genera: nigrum & can-
didum. Atque de isto prædicta fabula narratur.
Casiam verd aiunt virgultis constare crassioribus
[καυκάσιος præ καυκάσιος rectè legere nobis vide-
tur Gaza.] valdè nervosis, nec suo cortice exui
possa: vtilem verd esse huius corticem. Quando
igitur secant virgas, in frusta duorum digitorum
[ὡς δισδάκτυλα πῖμνθ: Plin. habet longitudine
linum cubitorum] aut pauld maiora consecant,

recentique bonis corio ea consunt, tum ex eo & lignis putrescentibus vermiculos nasci, qui lignū exedant, corticem verò nequaquam attingant, ob amarorem odorisque acrimoniam. Atque ita quidem de Cassia & Cinamomo referunt. Gignitur Cassia & Cinamomum regione Arabum media circa Sabe & Adramytā, & Citibēna, & Manali. Per Cinamomum Caryopum Plinii Guland. intelligit Nucem moschatam. Frutex & Cassia est, *Cassia de* inquit Plinius, iuxtaque Cinnami campos nasci-*script. Plin.* tur, sed in montibus, crassiore sarmento, tenui-
ente vetius, quā in cortice, quem contra atque in Cinnamo leuari & exinaniri [tenue ac gracile esse] pretium est. Amplitudo fusticis trium cubito-
rum: Colos triplex. Cū primū emicat, candi-
dus, pedali mensura; deinde rubescit addito semi-
pede: ultra nigricans. Hæc pars maximè lauda-
tur, ac deinde proxima; dānq̃atur verò caridi-
da. Consecant surculos longitudine binū cubi-
torum. [Digitorum aut paulò ampliores Th.]
Probatur recens maximè, & quæ sit odoris mol-
lissimi, [grauissimi alii. Cur non gratissimi po-
tius?] gustūque quā maximè seruens potius,
quā lento tepore leniter mordens, colore pur-
pureo, quæque plūrima minimū ponderis fa-
ciat, breui tunicarum fistula, & non fragili. La-
dam (Ledam Vet. Lidam CH: fuisse Achy, ut
apud Dioscor.) vocant ealem barbaro nomine.
Alia est Balsamodes, ab odore simili appellata, sed
amara, ideòque vtilior medicis, sicut nigra vn-
guentis. Pretia nulli diuersiora. Adulteratur
styrace, & propter similitudinem corticum, Lau-
ri tenuissimis surculis.

Cinnamomiferam plagam postremam ad meridiem habitatam novimus, inquit Strabo. Habet India quæ Australis est Cinnamomum, Nardum & alia aromata, quemadmodum Arabia & Aethyopia, cùm his Sole per similes sit. In felicissima quoque Sabæorum terra Cinnamomum nascitur: pro combustibili materie, Cinnamomo & Casia utuntur. Aromatiferam regionem in partes quatuor diducunt. Ex aromatibus Thus, & Myrrham ex arboribus esse dicunt: Casiam verò ex lacubus. Sunt qui dicant magnam eius partem ex India adferri. Sed alia quadam divisione totam felicem regionem in quinque regna partiuntur, quorum aliud habet eos, qui opificia & artes tractant: aliud Myrrham fert, aliud Thus eadem tamen & Casiam & Cinnamomum & Nardum ferunt. Sed quænam Casia illa Virgili de qua agit Georg. 2.

O formosiores nimium, sua sibona, morintur,
Agricolae: quibus ipsa, proci discordibus ar-
mis,
Fundit huiusmodi victum in fustissima tellus.
Si non ingenium floribus d. m. n. s. alia superbis
Maue saluta animum totis vomit edibus undam:
Nec varios inbiant prolebra tecludine postes,
Illudque auro vestes, Ephreiaque ara,
Alba nec Assyrio fucatur lana veneno,
Nec Casia liquidi corrumpitur usus Olivi
As sacra quies & nescia fallere vita.

Equidem existimamus Virgilium hoc loco intelligere Casiam Aromaticam, diuersam, ab ea quam eo ipso lib. humilem Casiam apibus gratam ait, de qua postea c. proprio.

Casia Virgil. duo genera.

Sed quæ sit *Casia frondens* apud Colum. l. 3. c. 8. non æquè faciliè fuerit pronunciare. Sic scribit: *Tmolon*, & *Coriicion* florere croco, *Iudæam* & *Arabiam* pretiosis odoribus illustrem haberi, sed nec nostram civitatem [Romam] prædictis egere stirpibus, quippe cum pluribus locis vrbis: iam

Coleridge
Canning
Carlyle
Channing
Dickens
Emerson
Hawthorne
Melville
Nathaniel
Poe
Stowe
Tennyson
Whitman
Wilde

2. *Aspergillus*,
Claviceps,
Microascus

Apalsrii.

Loxus
serotini.

Lepus sylvaticus
prateris.

Casia ex-
lacubus.

*Cassia vir-
gil duo ge-
nera.*

Casia Co-
lumbella.

Dioscoridem, Plinium, plerique quæ de Cinnamomo & Cassia prodidit, ex aliorum relatione, non quod ipsimet vel in Arabia vel in Aethiopia viderint, tradidisse.

Insuper quoque Plin. ut rectè notat Dal. apud Aethiops nasci tradit, mox subiungens Aethiops mercari à conterminis. Si enim apud illos nascerentur, ab aliis non emerent. Multo magis etiam oscitat: cum per vasta maria eas merces Aethiops vehere scribit. Nam si contermini sunt, qui vendunt, Navigatione tam longa quorsum opus est?

Ut nunc, ita & olim, è Moluccis in superiorem Indiam Cinnamomum vehebatur, mercimonium id potissimum exercente, quæ ad rubrum mare iacet, Aethiopia Gerte, quos Abyssinos vocamus, ob commodam Oceanum propinquitatem: quæ res Plinium fefellit. Ergo per eos qui in Arabiam vehunt, non Aethiopes, sed Chinen- ses potius apud Plin. intelligendi.

Immo etiamnum hodie teste Garcii interro- gati Chineses, cinnamomum cassiam in Ormuz aut in Arabia oram maritimam aduehentes quæ- nam esse hæc aromata, & unde ea adueherent, fabulas illas narrabant, quas recenset Herodotus, ut his commentis earum mercium pretia augeret. De qua re plura dicentur postea ubi de de nostra cassia & cinnamomo tractabimus.

Nunc videamus quid in Veterum scriptis oc- currat quod nostræ cassiæ & cinnamomo minus competere videatur, & quæ præterea in iis no- tanda vel censenda occurrant.

Ac primò sanè non nullis at fruolis inniti vi- dentur rationibus qui cassiam & cinnamomum Veterum nostrum, quod utrumque in officinis hodie passim habetur, esse volunt. Nostrum pro- fectò cinnamomum non potuisset ab aulis in- tidos concinnari: neque verisimile est eis esse furculos de quibus Aristot. & Theophrast. & reli- qui agunt: non enim sunt furculi, sed cortices cinnamomorum ramorum, aut fortè etiam truncorum. Neque colligi nostrum ex virgultis [quod Theo- phrast. ait] satis apparet corticem circumuolutio- nibus, quæ apertè demonstrant ex crassis arborum vel brachiis vel truncis fuisse detractos, uti di- citur. Quod Theophrast. & Plin. tradunt, li- gnæ Cassiæ à vermiculis excavari, cortice incolu- mi & illæso ob suam amaritudinem, id fabulæ sa- nè similis quàm verò: & Dalechamp. apud Plin. aliique apertè fabulosum esse clamitant. Den- de quis credat nostrum Cinnamomum aut cassiam ex arbuscula Viticis magnitudine, ut inquit Theo- phrast. decerpit? Præterea quis nostrum Cinnamo- mo tribuat odorem Rutæ, quod facit Dioscor. & Gal. Quanquam quando Rutæ aut Cardamomo confert, quæ nihil minus quàm similia sunt odo- re, mendum ibi aliquod subesse possit. Coniectu- ram nostram suprà diximus, quamvis valdè ve- reamur ne inanem. Et quamvis montanum cin- namomum crassum dicam, tamen ne illud quidem nostrum esse posse videtur: addit enim & pumi- sum esse. At nos supra hominis altitudinem & crassos corticatos videmus interdum bacculos, quid igitur de eorum statuemus arbore?

Plinius folio Origani dicit: posteritas foliis Ci- treæ Mali, aut etiam Pipereis, quemad. in vulgaris habetur exemplaribus.

Galenus id cinnamomum quod maximum pe- dia Romani dimidium non excedere ait nostrum, quanta sit longitudine, nemo nescit. Quamvis ipse etiam Gal. parum sibi constare videatur, ac modò arborum, modò fructuum genere compe-

hendisse. Iam verò si cassia aliquando in cinna- momum vertatur, quod idem scribit, quis ritè philosophantium specie differre credat, nisi & credat, species in seindicem transmutari?

Tales & multe aliz difficultates, quas breuita- tis causa hoc loco omittimus, [aliquando latius in discussionibus Botanici D. F. explicandas] oc- currunt in Veterum de cassia & Cinnamomi hi- storis.

Ne tamen prorsus eorum cinnamomum aut cassiam nostro seculo incognitam credidisse videamur, fatendum cassiam fistulam Galeni haud teme- rè nobis videri in quibusdam nostro cinnamomo siue Canellæ vulgari respondere: sed eius muta- tionem cinnamomi in cassiam ingenue confite- mur nos nulla ratione intelligere aut compre- hendere posse. Quæ autem Aristoteles & Theo- phrast. de cinnamomi furculis & virgultis, Dios- cor. de virgis, Galenus de ramis Ellebori aut Da- masonii figura atque virgultis tradit, possent con- uenire cum ramis & furculis Folii Indi vulgò dicti, quod cum suis partibus descripsimus c. de Mala- bathro putato.

Nunc vires cassiæ & cinnamomi Veterum subil- ciamus, ut ne quid temerè nostris tribuamus, quæ an cum Priscorum sint eadem, nos adhuc incer- tos esse fassum sumus: quamvis ab usstem traditæ vires, nostris etiam competere posse neutiquam dubitemus.

Cassia, auctore Dioscor. vim habet calfaciendi, urinas mouendi, exiccandi & leniter astringendi. Cassiæ & Conuenit ad ea medicamenta, quæ exiccandæ oculorum aciei gratia concinnantur, & ad mala- gmata. Lentigines tollit cum melle illita, men- struæque cict. Quin & à vipera demorsis pota auxiliatur. Confert & epota internis inflamma- tionibus omnibus, renibusque affectis. Prodest quoque feminis cum infestum tum sustinu ad vteri dilatationem. Si desit cinnamomum, huius du- plum medicamenti admixtum eadem quæ illud præstat. Est denique ad multa perquam utilis. Caterum suspectum nobis est quod Dioscor. ait, internis inflammationibus omnibus epotam pro- desse, quam tamen calidam & siccam tradidit. In Græco est: *ἐπεὶ τὰς ἐνὶ τῷ κοιλίῳ καὶ τοῖς ὀφθαλμοῖς*. Ma- limus equidem *ἐπεὶ τὰς ἐνὶ τῷ κοιλίῳ καὶ τοῖς ὀφθαλμοῖς* &c: ad inter- nas pituitas, cum & huius offarctus eiusmodi me- dicamentum talique modo sumptum egregiè li- berare consueverit. Iudicium esto Doctiorum.

Pergit Diosc. Cinnamomum omne vim habet calfaciendi, urinas ciendi, emolliendi atque con- coquendi. Menstrua quoque ac fortis pellit cum Myrrha, tum epotum, tum & appositum. Contra bestias quæ virus ei aculuntur, venenæque conue- nit. Quæ pupillis caliginem offundunt, discutit, calfacit simul & attenuat. Illitum ex melle, lenti- gines & maculas à Solis ardore contractas exterit. Facit & ad tussis, de fluxiones, hydropem, renum vitia, viarumque difficultatem. Quin & vngu- entis præiosis admiscetur: ac in vniuersum ad mul- ta est utile. Quod diutius eduret, tritum vino excipitur, in umbra siccat, atque ita re- conditur.

Cinnamomi vnguenti descriptionem habes apud eundem Dioscor. lib. 1. quod hic non poni- mus, quia & ex multis aliis constat, & in usu ho- die non est.

Galenus Cassia exicat & excalfacit tertio quo- dammodo ordine: sed & tenuium admodum par- tium est: gustu verò plurimum habet acrimoniæ, leniter quoque non nihil astringens. Quamobrè hæc omnia incidit, simulque digerit, quæ in cor-

Cassia fistu- la Gal- nostri Cin- namomo in quibusdam respondet.

Folium In- diæ vulg.

Cassia & Cinnamo- mi Veterum vires & vltus.

Oculorum aciei.

Menstr.

Vipera morsus.

Inflamma- tiones.

Vitæ.

Cinnam.

Infus.

Diosc. corr.

Cinnamo- mi vires.

Ex Temp- ram.

Menstr.

Vipera morsus.

Caligo a- cul.

Lentigo.

Tussis.

Catarrhus.

Hydrops.

Renum vitia.

Gusta.

Reperit.


Tempera- mentum.

pore sunt recrementa, & adhuc robur etiam in-
strumens addit. Idoneam vero etiam suppreſſis
mentibus, cum videlicet ob copiam ſimul & craſ-
ſi uſum exercimentorum, quod ſufficiat euacua-
re nequeat. Cinnamomum ſummè tenuium
eſt partium, non ſimò tamen caſum, ſed ex
terio ordine. Nihil autem æquè delicate eorum
quæ pati ſunt excaſſandi facultate, propter te-
nuitatem ſcilicet eſſentia. At Cinnamomum eſt velut
inbecillum Cinnamomum. Nonnulli ipſum pſeudocin-
namum nuncupant.

DE CINNAMOMO ET CANELLA
VULGARI.

Canella ſeu Cinnamomum vulgare.

Deſcrip.



Cinnamomi arbor Theueti.



Coloris. Color ruber, ferrugineus, vel ſuſcus, & uterque
miſtione inſinità varians, raris cinericeus, idque
non vbique, ſed obiter hinc inde reſperſus. Sapor
acriſculus, ſubdulcis, ſuauiſ & aromaticus, ſed
cum ſit partium tenuium non ita multò poſt ena-
neſcens, cui etiam reſpondet odor, ſed exterior ſi-

teratur manducatum in puluerem quod multò
facileſ, lentoris non participem.

Cordus Cinnamomi characij, id eſt, viciſ, &
caſia aromaticæ genera ſibi cognita ſic deſcribit.
Cinnamomum characium, quod nunc vbique cin-
namomum ſive canella vocatur, cortex eſt rectus,
longitudine cubiti, aut maiore, ſiſtilis aut car-
modo excauus, colore in ſuſco ruſceto, craſ-
ſiſſioribus & inferiores partes, alio cineteo, ſeu
& ſcabiore cortice veſtiuntur, qui, quoniam in-
ubis penitus exiſtit, deraditur: baculi autem
boni à quibus deglubitur, pollicis aut digiti crif-
ſitudine ſunt. Saporem habet valde atrem, non
cum moleſtia pungentem, ſed iucundum, & ſupra
omnia aromata, ſuaui acrimonia linguam dul-
lantem. Odorem item ſuauiſſimum, ſive guſta-
tur, ſive aliàs tritum, aut contractum naribus ad-
mouetur, ſpirat. Optima autem eſt interior
corticis pars tenera, & in longum ſiſtilis: exterior
enim ſcabrior exiſtit, & remiſſiori acrimonia, et
que ſimul adſtringente conſtat: quod verò corti-
ce continetur, lignum inutile eſt, idèoque ab in-
colis, ubi naſcitur, abiicitur. Caſia apud Veteres
multa, quemadmodum etiam cinamomi genera
cognita fuerunt, quæ multis ſeculis iam deſue-
runt: iam verò tria roſus aſſerri coeperunt. Eſt
autem quodlibet horum Cinnamomo ſimilis ſu-
tex aut arbuſcula, quatuor plerumque, aut quin-
que cubitorum altitudine, ſectis candidibus & ra-
mis adoleſcens, duorum pollicum, aut vnius crif-
ſitudine: ſuperiores verò ramuli graciliores ſunt.
Folia habet denſa, Laurinis ſimilia, multò tamen
maiora, ad Citri potiùs folia accedentia, utrinque
ſaſtigata, ternas indiuiduaſque venas per longi-
tudinem tranſeuntes habentia, quarum media
craſſior reſtaque eſt, reliquæ duæ leniter curua-
tur, cæque à torſo eminent, & euidentiores ſunt,
quàm intus. Fructus ſert Laurinis bacis ſimiles,
minores tamen & rubentes, calycibus, ſeu capi-
lis glandium modo inſidentes, qui rariſſimè adſer-
runtur. Cortices verò eius, qui iam adſeruntur,
longitudine cinnamomo characip ſimiles ſunt,
craſſiores tamen & nigiores, præſertim deo-
prioribus: quorum vnus ſaporem habet acrem &
aromaticum, veluti ſiquis cinnamomum Galba-
gan & Caryophyllos æquis portionibus miſceat,
quodcè in ſuper glutinoſum: alter verò paulò te-
nuiorem, glutinoſum in guſtu lentorem inſer
Symphyti, reddens. Tertia ſpecies gracilior exi-
ſtit, colore & forma ad Cinnamomum accedens,
cui etiam ſaporem ſimilem habet, ſed tenuiſſiore
acrimonia & glutinoſo lentore lenitè adſtrin-
gentem. Quæ verò paſſim iam in omnibus Pha-
macopoliis habetur, appellata caſia lignea, pſeudore-
tina eſt, & à præſcriptis diuerſa penitus: radicem
enim cuiuſdam cortex exiſtit, nullum ſatu di-
gnum ſaporem, præter adſtringentem habens.

Et in Comment. ad Dioſcor. idem Cordus ſer-
bit: Caſia ſive caſia multiplices habet diſſerentia.
Eſt autem caſia Dioſ. Cinnamomo cognita arbu-
ſcula, cuius ramuli & ſurculi ſi cum ipſo cortice
ligno adhuc inhzrente vendantur, Xylocathia ap-
pellantur, cum verò exempto ligno cortices tan-
tùm adportantur, caſia Syringitis vel Syringa
nomine veniunt, quoniam excaui cortices li-
gnæ ſimilitudinem habeant. talis eſt caſia ſiſtilis
ſive ſiſtilaris caſia Antiquorum: Arabes etiam
introduxerunt. Veterum caſia ſiſtilaris ſive li-
gnæ multis ſurculis in Europa viſa non eſt. Nam
verò quocumque diligentia factum, ut aliquot
eius ſpecies ruſſum adſerantur: ſed tanta eſt quo-
tandam Pharmacopolarum ignavia & petulantia,
ut quædam

Cinnamomum

Deſcrip.

Lignum

Caſia

Caſia lignea

Caſia Syringitis

Caſia ſiſtilis

Folia

Caſia

Fructus

Caſia

Caſia

Caſia

Caſia

Caſia

Caſia

Caſia

Caſia

Caſia

Caſia

Caſia

Caſia

Caſia

Caſia

Caſia

Caſia

















Arboris
cortex.

Canella
Orientalis.

Cassia.
Cinnamo-
mum. Cas-
sia lignea.

Canella
Peruana
arboris de-
scriptio.

Non deco-
quenda.

Cultus.

Arbor ca-
nelliferax.
Folia Lau-
ri.

Sylvestris
& iuxta.

Canella ex Orientali India delata, cum nonnulla adstrictione coniunctam. In puluerem tritum, & edulius inspersum, eandem illis saporis & odoris gratiam conciliare quam Indica canella. Arboris corticem, qui crassus est, nullum canellæ spirare odorem, aut saporem referre. An interior tenuiorque inenitiana simile quid obtineat, ipsi iatere: nam et si rem duntaxat corticem, insumque fructum vidisse. Folia trita [inquiridem] tenuem quendam Canellæ odorem spirare ferunt: sed primaria vis in solo fructu consistit, contra quam in Orientalis Indiz Canella, quæ omnem odoris & saporis gratiam in cortice obtinet, ut omnibus notissimum. Verum quidem est, alteram alteri præstare, quoniam [licet eiusdem generis sint omnes arbores quæ Canellam ferunt] aliz tamen tenuiore cortice prælitæ sunt, qui magis commendatur, aliz rassiore, qui superiori bonitate cedit. Hinc factum est, ut nonnulli Canellam in varia genera distinxerint, videlicet in Cassiam, in Cinnamomum, & in Cassiam ligneam, cum tamen vnius arboris genus istos cortices proferat, & sola loci varietas faciat alteram alteri præstantiorem. Itaque Cassia & Cinnamomum solis nominibus differunt, cum utroque Canellæ tenuior & præstantior sit. Eam ob rem, ubi Cassia præscripta inuenitur, cinnamomum substitui potest & e contra. Hæc Monardes.

Quod ad Occidentalis, quam vocant, Indiz historiam attinet, tradit Garcias non verisimile videre canellam istic nasci, quandoquidem eam dicit calyces glandesque Suberis modo ferre, cum legitima canella veluti Oliuas ferat: sed aliam esse sui generis arborem. Quotquot tamen Peruanæ historiam descriperunt, istius canellæ, quam in Prouincia Sumaco nasci tradunt, meminerunt. teste Clus. Est verò, ex eorum descriptione, canella ea arbor vasta admodum, folio Laurino, fructu racematim coherente, sed qui calyce suber. no simili contineatur, ampliore tamen & magis cauo, colore nigricante. Huius arboris fructui, foliis, cortici & radicibus [licet canellæ saporem & odorem habeant] longè calyces præferuntur, quorum duntaxat puluis in usu est. Nam si canellæ modo cum cibus decoquantur, tantum abest ut suauitatem edulis concilient, quin potius eorum facultas & saporis gratia decoctione euanescit. Quamuis autem multæ sint huius generis arbores sylvestres, diligenter tamen & magna cura eas in suis prædiis colant, [sic enim cultu longè melior] atque in vicinas regiones deferunt, alias merces ad vitam humanam necessarias hoc aromate redempturi.

De hac etiam Fr. Gomara in Hist. Gen. c. 143. Aug. Carate lib. 4. Hist. Perua. cap. 2. & Pet. Cieca, parte prima Chronici Peruani, c. 40. Urb. Caluet. ad Benz. lib. 3. c. 8. eandem denotat hæc verbis. Regio Canellæ ferax in Quitensi Prouincia Otientem versus. Arbor Canellæ ferax in Prouincia Zumaco sub Aequinoctiali linea reperta, ampla est, foliis Lauri, minutis baccis racematim coherentibus, quæ calyce Suberino aut Quercino simili continentur, ampliore tamen & magis cauo, colore nigricante. Hæc etsi sylvestris per se sit, tamen culta longè nobiliorem Canellam quam illæ, producit: iccirco eam incolæ & diligenter colunt, & in magno pretio habent. Cæterum in hac Caluet. descriptione hoc obscurum videtur quod ait minutas esse baccas, quæ tamen calycem habeant Suberino ampliore, in quo contradictio esse videtur. Contrarium etiam dicit prædictis authoribus, præsertim Garciz & Monardi,

quando aliz, cultam longè nobiliorem Canellam gignere. Nam Garcias negat villam in ea India canellam gigni: & Monardes arboris corticem nullum Canellæ spirare odorem, aut saporem referre. Nescire tamen se ait, an interior membrana simile quid obtineat. Præcipuam vim in calyce ponit, quam annotauit Franciscus Loupes Gomara in Hist. sua Indiz. Suspiciamus igitur Calueti descriptionem ex diuersis arboribus compositam. Certiora docebit ingeniosa posteritas: Considerent Lectores etiam, an non pleraque in hac descriptione conueniant cum folio Indo, si calycum amplitudinem excipias. Thom. Hariot in Hist. Virginæ insulæ, cuiusdam arboris meminit, Alsopo nomine, valde similis Lauro, cui cortex calidus & ægis gustu, ac tradit eam multum referre arborem Indiz Occid. quam Monardes vocat Cassiam ligneam.

Calycum puluere, ut prædicti Authores tradunt, ad plerosque morbos vtuntur, sed præsertim aduersus Coli, intestinorum & stomachi dolores in potionibus propinant. Vtilis porro ad multa est hic fructus Canella vocatus: nam in pollinem tritus ventriculum roborat, flatus discutit, oris fetorem corrigit, cordi prodest, & colorem faciei commendat. Pulvis & cibus veluti Canella inspergitur, quoniam iisdem facultatibus præditus est. E vino aut aqua ad eam rem accommoda sumptus, muliebres purgationes molitur. Calidus est in tertio excessu, & siccus in primo, cum manifesto robore, ob adstrictionem quæ prædictus est.

CINAMOMI ET CASSIÆ SUBSTITUTA ET SUPPOSITITIA. ITEM ADVE- terna, & æquiuoca.

Cinnamomi & Cassiæ substituta paucis dicemus, non quod alicubi eorum defectum esse putemus apud nostros, sed ut vel facultatum similitudo ex Authorum sententia pateat, vel sanè dissimilitudo ex ratione. Ergo cinnamomo deficiente, Cassiæ aut Amomi duplum ad odoris gratiam ponit Galen. lib. 5. Comp. Med. in dentificio. Pro Cinnamomo duplum optimæ cassiæ, vel cum Quinto Medico duplum vel multum Carpesii, vel certè non parior cassia eidem supponitur lib. 2. & 3. Comp. Med. & lib. 1. Antid. Quidam carentes Cinnamomo in vicem eius ponunt æquale pondus ex Sem. Cardamomi. Syluius ait, se pro Cinnamomo cassiæ optimæ duplum miscere medicamentis, ut quantitate qualitatis imbecillitatem redimat. Colleg. Florent. cinnamomi vulgaris, quam canellam vocant, duplum. Nos selecte nostræ & interioris canellæ æqualem portionem sufficere existimamus. Tractatus Quid pro Quo, cinnamomo substituit duplum Cubebarum.

Præter rationem nobis videtur Ruta sylu. supponi pro Cinam. ut est in Antibal. Fuchsi & aliorum. Nempe nobilissimum & odoratissimum aroma petentibus, feridam obtrudunt herbam.

Sabinæ duplum pro Cinam. poni planè displicet, quod sit in Syluii substitutis & aliis.

Valerianæ Hortensis radicem pro Cinnamomo usum ex Cæsalpino ostendemus c. de Valeriana. lib. 27.

Cassiam existimari à quibusdam Malabathrum, siue solum Indum vulg. demonstratum est antea suo loco.

Cæsalpino Cassiæ speciei & odore simile est lignum.

gnum Sastaras. Pro Cassia cortice, inquit Syl-
ues, & Galib. 6. comp. med. Nardus Indica vel
Malabathi foliam.

Cassia substitui Sabinam inuenimus in tract.
Quid, pro Quo, Fuch. & Placotom. quod anti-
ballomeron nobis neut quam placeat.

Scribit Anguill. esse qui Sabinam, quæ Dioscor.
similis Tamarisco dicitur, esse Cassiam veram pu-
tens, quorum opinio nobis reprobanda vide-
tur.

Annōtat Platearius Sophisticari quandoque
Cassiam ligneam admixtione radicis Capparis.
Pro Cassia Poetica siue Hygini exhiberi Lauendula
dicitur in loco. Rosmarinus Coronarius
quibusdam existimatur Cassia Hygini & Virgili.
Cassalpino Cneorū Theoph. & Cassia Poetica est plan-
ta Chasio dicta Sanamur dā.

Cassiam videntur Latini appellasse Chamælam,
inquit Ruellius. Lob. autem & Pena dicunt
Gulandum hallucinari dum Chamælam cassiam
esse putat. Plin. Chamælam in petrosis nasci
tradit: videtur autem, inquit Cassalp. intelligere
Cneorū candidum Theophrast. quod inter Co-
ronarias Cassia à Latinis vocatur de qua nos nō x.
Cass. Matthiol. quam alio nomine Cneorū vo-
cat, est Chamæla species Tabernamontano.
Thymelæm Latini cassiam videntur appellare,
inquit Ruell.

Annōtat Tragus Thymelæm Dioscor. Hygi-
næ cassiam nuncupasse. Tragi autem Thy-
melæ videtur nobis dicta Laureola folio deci-
duo.

Caryophyllorum lignum quibusdā videtur ha-
bere similitudinem cum Cinnamomo Antiquorum.
Cassalp. caryoph. intelligit esse Carpesum
Quinti, & antiquos pro cinnamomo vlos.

Cassia loco in Diamarg. cal. Auic. male im-
ponitur Tapsia ob depravatam lectionem. Legeba-
tur Cassia, teste Lac. in annot. in prem. Dioscor.
Sed crassus & ridendus mercurius, est supero-
rum etiamque famolissimorum quorundam me-
dicorum error, qui cassia solutius siue purgati-
cis corticem singulari suæ vel oscitantæ vel insci-
tiz nro usurpant & præscribunt in affectibus
vuluebribus & aliis pro vera cassia.

In cassia nomine, inquit Marantha, facile est
errare: eam, quæ ab Hygino ita appellatur, at-
que si Gaze interpretationem insequamur etiam
à Theophrasto, ad menses educendos exhiben-
do, vice nimirum odoratz, vel ad aluum leniter
emolliendam cathartica credentes esse cassiam:
posset hic error hominem ad interitum facile
perducere: cum Hygini Theophrastique cassia
est enim Cneorū] vehemensissimè pituitam,
ulémque extrahat.

DE CASIA APVM, CORONRIA ET Poetica: eamque de Cneoro.

CAP. XIII.

Emerit tandem ex cinnamomi & cassia aroma-
tice tractatione, nihilominus de cognomine
vel potius æquiuoca Poetarum cassia, aliisque
huic similibus, si non isdem, tradendum restat.
De illa autem in Virg. Eclog. 2. sic canit.

Tum cassia arque cassis innoxens suauibus herbis,
Mollia luteola pingit Vatinia Caltha.

Item:

Nam ieiuna quidem clinosis glarea varis
Fœc humilis apibus cassas, roranteque ministrat.

Item Eccl. 4.

Tom. I.

Hæc circum (Nasionem apum) cassia viridis &
olentia lase

Serpilla &c.

Item:

Subiiciunt fragmenta, Thymum, cassiaque re-
centes [al. virentes.]

In. Frisius in suis ad Virg. Scholiis cassiam inter-
pretatur peregrinam pretiosum coactem, cina-
momum, Zimmet aut cinamo. o similem. Quam
postremam clausulam non incautè adiecit. Nam
similis esse nobis videtur: sed nonne fortè solo.
Verum, ne sit, & quidem ultra tropidam, habet ada-
gium. Ita nos de ipso. Obseruasset saltem Vir-
gilium cassiam inter herbas, easque domesticas
reponere, quamuis idem Georg. 4. ut dicebamus,
cassiam aromaticam intelligat, cum ait:

Nec cassia liquidi corrumpunt usus Oliui.

Quin & in nostro orbe legitur, [cassia] inquit
Plin. extremoque in margine imperii, quæ Rhe-
nus alluit, viuit [vidi. vet.] in alueariis apum sata.
Color adest ille torridus sole, & ob id simulem
od. it. Ex hoc fortè Plin. loco, ut dicebamus,
deceptus, vir aliqui ingeniosissimus Marcellus,
credidit cassiam aromaticam hic à Plin. intelligi,
quam ut in maiore Romanæ gentis fortuna ubi-
que in aluearibus confitam, & sub Septentrioni-
bus viuere coactam, nullibi (quod nouerit) no-
stra ætate in Italia nunc reperiri. Negatam ocu-
lis formam eius omnem & speciem Cassiam quam
nostræ ætatis mediciligneam appellant, vnguen-
tariis, vitæque delictis magis, quam medicina
quondam quasitum fruticem: ideoque ab omni-
bus Poëtis passim celebratum, diuersum ab ea ar-
bore, quæ eadem cum cassia appellatione siquas
potius quam fistulas fert. Cassiam Poëtarum
fruticem dicit, cum Virgil. manifestè inter herbas
recenseat. Ac eandem à cassia Vêterum aromatica
non distinguit, sed à purgatrice tantum.

Cæterum ad Plin. citatum locum annōtat Da-
lechamp. hæc verba: cassia, Lauendula nostra,
Theophrast. alba cassia: eidem nigra, nostra Liba-
notis coronaria. Cassiam Hygini, quæ Theoph.
cneorum est, cum Indica negligenter Plin. hic co-
fundit. At nos, quam plantam intelligat Plin.
asserere non possumus. An benè conueniat
descriptio cum Lauendula, Libanotide Corona-
ria & cassia Hygini, suis locis demonstrabitur.
Considerandum, ve alio etiam monebimus loco,
quænam conueniant cum Tamarisco in prædicta
Plin. verbis.

Rursus alibi Plin. In coronamenta folio venē-
re Melethron, Spiceon, [Spiræa M. & CH.] Tri-
gonon, [origanum ex Th. Thymum, CH.]
cneoron, quod cassiam Hyginus vocat: & quod cu-
nilaginem, quæ Conyza [Conyza, quam Cu-
nilaginem. Vet. Melissophyllon, quod Apia-
strum, Melilotum, quod Sertulam campanam
vocalamus. Item panis pds. Et Cneori duo gene-
ra, nigri atque candidi. Hoc & odoratum: ramo-
sa ambo. Florent post æquinoctium autumnii. Et
alibi, cassiam inter alia coronamenta iuxta aluea-
ria ferendam præcipit, Thymum, scilicet Apia-
strum, Rosas, Violas &c: quæ Theophr. ut sus-
fruticum genera [Hæc, panis, pds.] recenset, non ut
plantas à Coronamenta expositas.

Cneorum album Anguill. Lauendula nostra
utraque, mas & foemina. Cneorum nigrum, Li-
banotis coronaria siue rosmarinus, cuius nusqua-
sub alio nomine Theophrast. meminit, inquit i-
dem Dalechamp. Ergo videamus quid Theophr.
de Cneoro scribat. Eorum inquit, (suffruticem)
quibus aculeus deest, digestio nulla penitus ge-
Q1

inducunt Medici & Pharmacopœi, qui Roriz de-
gunt.

Rauwolf. in itin. de plantis montis Libani, scri-
bit, se reperisse cassiam Monspeliensem ibi voca-
tam *Machmudi* & *Machmisi*: baccas autem *Habel*
mickemes: suspicaturque an sit *Anacisum* Rha-
sis.

Cassia lignea maritima Hist. Lugd. quam [in-
quit] ligneam Herbarii vocant, cuius nominis
causam mihi adhuc incognita. In maritimis crescit,
caulibus lentis, fractibus contumacibus, foliis Lé-
ticulis, numerosis, gustu astringentibus: fructus
oblongus, niger, vinbilicatus, ita gustu astringens,
ut acerbatis non nihil habeat. Quidam Geni-
stæ marinz genus esse putant, licet siliquas nul-
las edat.

In eadem Hist. Lugd. traditur Polygonum ma-
ritimum 2. Dal. quod multa communia habet cum
iam dicto frutice.

Camer. & Cassiam Monspel. vocat, & cassiam
poëtiæ eorundem, additque nonnullos corti-
ce radices uti pro cassia lignea. Cassia quorundam:
Cassien Tab. Cassia Poët. Lob. I. Gerard.

Nec Virg. nec Hyginii est, inquit Casp. Bauhin.
quam odoratam dicunt: Olyridisque Plinii notas
aquas habere putat. Casalp. cassia lignea offic.
idem.

Ceterum *Cassia monsp.* dicta Romano, Narbo-
nensi agro vberè prouentu oritur ad ripas
Lani, propè pontem Castri noui, in sepibus, præ-
sertim quæ ad sinistram versus flumen ad montem
contenditur. Et ad ingressum *Perant* pagi ad sta-
gnum Volcarum siti, deinde siluula *Egremont* cœ-
nobio proxima, & in *Gramont*, Nec non Nemaus-
si plurimus locis, & alibi passim in Galloprovincia
iuxta sepes & oliuetarum margines. Variis etiam
Hispaniæ locis secundum vias: frequentissime au-
tem Granatensi & Valentino regno, teste Clus.
In Italiæ hortis quibusdam etiam cultam vidimus.
D. Rentzius Medicus Wirtembergicus dedit no-
mine *Cassia poetarum*, collectam propè Tergestu
versus mare Adriaticum, in monte dicto *Cars*.

Floret Iunio. semen rubet Augusto: Lob. floret
æstate: fructus Octobri vel antè maturescit Clus.
Nos & Aprili & Maio florentem obseruauimus.
Et Nemausi Iunio fructum. Communiter tamen
Augusto perficit toto illo tractu Narbonensi.

Totus frutex, ut dicebamus astringens est. An
verò rectè quidam radices huius cortice, pro Ca-
sia Veterum vsi sint, ut notat Camer. ipsi vide-
ant. Et quamvis eadem esset cum Olyride Plin.
non existimauerimus tamen, radicem decoctum
sanare arquatos: magna enim illa astrictio quæ
ei tribuitur, non videtur conuenire in obstructio-
ne hepatis insigni, qualis plerumque est arqua-
torum vel Ictericorum. Camer. notat Cassiam nihil
serè aromatici habere, sed radicem validè astrin-
gere. Nec non uti quosdam radices cortice in ob-
structione iecoris. Malimus nos in contrario
quodam eius affectu aut consimili alio intestino-
rum fluxu, præmissis præmittendis uti.

DE CASSIIS OFFIC. ADULTERINIS.

CAP. XV.

Officina, si Herbol. credimus, Tamaricis ra-
dicem *Cassiam* vocare solent: & quæ palam
imperiis Medicorum est, pro *Cassia odorata* vtun-
tur. Idem & Tragus ait, & Ruell. ex Hermol. il-
dem planè verbis, nec eo citato.

Tom. I.

Myricæ [eadem est cum Tamarisco] radices,
inquit Matthiol. pro odorata cassia venditabant
imperiis Impositores. Sed postquam fraus à peri-
tis deprehensa est, eius in offic. vsus penitus exo-
leuit. Quandoquidem verò Tamarix copiosè
prouenit ad ripam Rheni, subeunt memoriam
Plinii illa verba, quæ suprà citauimus, de cassia
quæ sentur extremo in marginè imperii, quæ Rhe-
nus alluit. Non tamen audemus affirmare ean-
dem.

Scribit Cordus, pro Veterum cassia fistulari &
multis seculis in Europa visa, corticem venosum
radicis cuiusdam gustus acerbi & tenuis vendi. Et
in Dispens. monet, pro cassia lignea in Dianiso
Mef. non sumendū esse paruum corticem saporis
insipidi ac stiptici, ut hactenus factum. Fortè
de hac eadem ait: Allatus est hactenus in totam
Europam pro cassia lignea cortex radices cuius-
dam crassiusculus, colore purpurascens, præter-
tium tractus, gustu stipticus, tenui odore, gustan-
tium palatum ad halitum commendans, quem ex
Aspalathi specie aliqua detractum opinamur: ni-
hil tamen affirmamus.

At securè Cornar. cassiam ligneam Offic. [in-
quit] cassiam veram Veterum censebimus. Sed
prudētius fecisset, si indicasset, quid intellexerit
per cassiam ligneam offic. & docuisset, cur veram
cassiam Veterum exillimet. Nam cortex ille, quo
sub cassiæ nomine hactenus vsi sunt pharmaco-
pœi non est vera Cassia, quod nec gustu cinna-
momum referat, aut acris sit, nec odoratu, ut &
Fuchf. annotauit. Sunt qui Genistæ radices corti-
cem esse putent.

Hactenus, ut scribit Matthiol. tum medici, tum
seplasiarii odorata cassiæ loco quædam incognita
arboris segmenta, nec odore nec viribus prædita,
semper capescunt. Veruntamen postquam non-
nulli nostræ ætatis viri stirpium historias diligen-
ter examinarunt, detectâ fraude, mercatores ex
Alexandria mercimonia Venetias comportantes,
in aliud nouum cassiæ genus segmenta illa com-
mutarunt: quæ sanè præter odorem, pariterque
saporem, quibus serè penitus exoleta sentitur, cas-
siæ à Dioscor. descriptæ admodum habetur con-
similis. Quapropter nec eos errasse crediderim,
qui dicerent, hanc Dioscor. Pseudocassiam esse:
quippe & crasso cortice constat, & in eius cauitate
lignosa etiam visitur materies, paululumque est
odorata, minimeque acris. Nonnulli hac non
contenti, quædam vocati cinamomi fragmina cas-
siæ vice usurpant, quæ cum nullo odore sapore-
que commendentur, potius Quercum vel Fagum
quàm cassiam referunt.

Cassiam, inquit Marantha, nullo odore, nullâ
habentem acrimoniam medicamentis apponunt
Seplasiarii, ut nihilò deterius quispiam lignum
quoduis admiscere possit: sic enim cum tanta ali-
cuius medicamenti quantitas tam citò exteri non
queat, in officina diutius seruat ac vetustate sic
elanguidum: illud tamen, ne mercedem perdant,
in compositis adhibent. Cronemb. & Manar-
dus quoque testantur nefariè hactenus cassiam
Ligneâ vocitatem, & pro ea diuenditam, nihil mi-
nus quàm germanâ esse cassiam inodorum quid,
& proin penitus abiiciendum. Quid verò cina-
momum [inquit Casp. Bauhin. apud Matthiol.]
cōmuniter pro cassia exhibent, nihil aliud esse vi-
detur, quàm Pseudocassia Dioscor. & fortè cassia
fistula Androm. iunioris apud Gal. antiq. licet alii
corticem cassiæ Monsp. esse velint. Sed optasse-
mus eum graphicè delineasse quid intelligat per
cassiam communiter exhibitam.

Q9

POLYGONVM MARINVM ANGVSTIFOLIUM DALECH.
CAP. XVI.


Descriptio

Radix.

Caulis.

Cortex.
Folia.

Polygonum
fol. Plinij.



Scilicet in
H. stor. Plant.
Lugd. Polygo-
num marinum
alterum Dale-
champii in mari-
timis, radice lignosa, ni-
gricante, modicè
fibrata, caulibus
multis, vno & al-
tero cubito pro-
ceris, cortice sub-
rubro vestitis, ra-
mosis: foliis ad-
modum dentatis,
ramos & surcu-
los operiensibus,
Polygono mari-
similibus, nonni-
hil angustioribus
& longioribus,

gustu in maritimis falso, alioqui adstringente.
Herbarii quidem Polygonum sylvestre à Plinio
descriptum esse putant. Quartum genus, inquit,
sylvestre appellatur, penè arboris modo scutex,
radice lignosa, surpe Cedri rubicundo: raris
spatiis binum palmorum, nigris geniculorum ter-
nis quaternisve articulis, suere qui Aizoum ma-
rinum vocant.

Considerandum quantum Polygonum Dale-
champii differat à frutice qui dicitur à Monspe-
liensibus, Cassialignea.

CASSIA ADVLTERINÆ VEL PSEUDO-
CASSIÆ NOMINE DATVS CORTEX.
CAP. XVII.

Descript.

Hoc nomine exhibitus cortex, crassitudine
ferè semuncialis, Maceris æquat corticem, co-
loris ferruginei, punctis albicantibus aspersis, su-
perficie tam conuexa quàm concaua leui, substan-
tia nullis fibris intertexta, sapore nullo euidenti,
anno 1589. Datus autem fuit hic cortex Patavii,
anno 1561. in Pharmacopolio ad Symbolum A-
quilæ.

Considerandum an de hoc cortice scripserit
Matth. Epist. l. i. ad Quakebennum: Corticis illius
frutium, cui titulus erat, Argillada, putarem ego
Pseudocassiam esse, quam nostri Pharmacopœi
cassiam ligneam vocant.

LIGNVM AROMATICVM, SEV PO-
TIVS CORTEX MONARDES.
CAP. XVIII.

Lignum a-
romaticum
Monard.

Bernardinus de Burgos Pharmacopola, inquit
Monardes, Italus ostendit mihi ligni cuius-
dam fragmentum, quod primo intuitu putabat
Lignum Sanctum potius diuini S. Iohannis. Li-
gnum est, quod adulescens candelâ, fragrantissi-
mi odoris fumum excitat, alioqui insipidum &
inodorum, haud secus ac lignum commune ali-
quod. Corticis verd odor aromaticus præstantis-
simus, Sapor Macis aut Nucis moschatae, eoque
etiam vegetior ac suauior, aromatica sua gratia
vel quoduis cinnamomum & acrimonia ipsum a-
ded Piper superans, & vel ex leni dentium atui-


Corticis a-
r. Sapor.
Acrimonia
maior
quam Pi-
per.

tu omnes fauces peruadens, ac tota serè die im-
buens. Magna huius ligni quantitas in monte
quodam sita fuerat à Nauclero & Hausna [porci
Cubæ, inquit Clusius, insula ad Septentrionem
sito, & Florida Prouincia serè opposito] seden-
te, & in nauera seu Liburnicam delata, ignis
struendi causa.

Clusius in Annot. ad cap. 26. lib. de Simp. Med.
Hist. Monardi ait: Simile lignum me nactum esse
arbitror anno 1597. Truncus enim quem in pueris
orbiculares partes terrâ resectum conspiciendam,
solida & durâ massa constabat, eaque non munda
grau: quàm Guayacum, candidiore tamen, licet
aliquot nigricantibus ventis distincta: illius etiam
cor nigrum instar Guayaci, odor autem valdè ve-
nens erat, vt qui vix percipi posset, Sapor verb
nonnihil citidus. Ceterum orbiculare illud fra-
gmentum quod accipiebam, palmaris erat lon-
gitudinis siue altitudinis, & quinque vnciarum
diametrum serè habebat, cortice suo dentatam:
quapropter initid nihil de illo pronuntiare pote-
ram, nisi Guayaci gentis aliquod vilius videri, de-
nec anno insequente aliud fragmentum suo cor-
tice adhuc resectum nancisceret: tum demum dili-
gentius obseruato & cortice & ligno, illud esse
de quo Monardes scripserat, confidentiâ asse-
re audebam. Comperiebam enim illius descriptio-
nem huic ligno prorsus conuenire, atque huius
corticem cortici ab illo descripto ita ad amissum
quadrare, vt quin ille ipse sit, nemo ambigere
posset. Quum verd in solo cortice sit illa odoris
& saporis gratia: mirari subit, cur Monardes li-
gno potius quàm cortici aromatici nomen im-
buere.

In ea porro sum opinione, ipsi ligno aliquas
in esse facultates, illis quæ Guayaco tribuuntur,
non dissimiles: & forsitan qui in Angliam re-
ferebant, arbitratos se quæritum ex eo, perinde
atque ex Guayaco facturos: verum cum sua spe se
frustratos animaduertent, ex eo globos ternari-
curatæ (vt mihi relatum) quibus exercitii gratia
ad iactum vterentur, propter ligni soliditatem &
grauitatem. In Hist. verd Lugd. Lignum aroma-
ticum Monardes dicitur.

CORTEX VVINTERANVS ACRISSIMVS
VE CANELLA ALBA.
CAP. XIX.



M. Vinter. M. Descriptio
Ducis
VVinter. Principis
nostri Cl. habe-
mus corticem E.
C. missum per D.
Paludanum, no-
mine prædicti
Canularius est,
crassitudine cas-
siae lignæ fusca,
fragilis, coloris
parte gibbâ ci-
nerei, conuexâ
fulci, per substan-
tiam cinerea
& fului, Sapore
imprimis & vesti-
gio luculentior e-
crem, subana-
rum, & aromati-
cum, qualem ha-
beret Zingiber mul-

Serapion autem *Seitaragi* siue *Sithrogi* siue *Sythragi* (Synonyma sunt haec apud Arabes) plura designare minimum fuerit intelligendum. Serapioni nihil aliud quam *Diolc*. Iberis siue *Lepidium*. Avicenna tria genera explicatur. Postremum nulli dubium est, quoniam *Seitaragi* Iberum designet sed ibi interpretis errore legitur *Cordumeni* pro *Cardami*.

Lepidium (inquit *Tragus*) quod & *Piperitis* dicitur, Germ. *Senfframe* / in *Serap.* vidi *Seitaragi* Indum (noster codex *Serap.* non habet Indum) & *Hassal* appellati: nolim tamen super hac re cum quoquam contendere.

Ruell. hoc *Lepidium* intelligere videtur cum *Seitaragi* *Baracem* Manica lingua *Lepidium* nominat. *Brassavolus* in exam. Pil. aggreg. *Seitaragi*, *Seitaragi* nonnunquam *Seitaragi* Arabum, est *Diolc*. *Lepidium*. Avic. confudit Iberidem cum *Lepidio*. *Lepidium* verò & *Sceterag* est *Penerella*. Colligendum est in hac pillul. comp. pro *Sceteragi* Arabes *Lepidion* intelligere: verum concipite nescio, quid in ea faciat, vel facere possit *Lepidion*.

Cordo in disp. supra pil. fortidas *Rhasis*, *Seitaragi* siue *Scytari* Indum est *Lepidium* maius: *Psefertraus*.

Monachi in *Mel. dist. 1. cens. 40.* in *Triphera* hoc idem tradere videntur *Seitaragi* siue *Lepidium*, cum aiunt: Non est multum à veritate alienum tenere *Piperellam* esse *Lepidium*. Iisdem *Lepidium* est illa, quae vulgari vocabulo apud Italos dicitur *Capinella* vel *Caprinella*. Quia dicit *Simon Ianensis* in litera *Seitaragi*, quod quidem *seitaragi* vocauerunt *Nucem* viduarum seu captivam. Considerandum an Monachi non intelligant *Raphanum* rusticarum Germ. dictum *Meerrenig*. Iisdem autoribus pro *Seitaragi* sumendum *Nasturtium*, quod viribus, odore & sapore simile.

Io. *Manlius*, teste *Trago*, *Nasturtium* agreste, *Seitaragi*, *Senation* & *Lepidion* vnius & eiusdem plantae nomenclaturas esse censet. Vbi pro *Seitaragi*, inquit Monachi, intelligitur *Lepidium*, si non habetur, sumatur *Rubia* ex Avic. & Gal. autoritate. *Rubiam* & tractat. Quid pro Quo substituit, quod sanè substitutum nobis pro nullo *Seitaragi* convenire videtur. *Vesalio* in *Rhas. lib. 9. cap. 9* *Seitaragi* est *Thaphsia* Indica: & habet Arabicarum dictionum antiqua interpretatio sub finem. Avic. *Seitaragi*, id est, *Thaphsia*. *Brassavolus* in exam. pil. aggreg. Nisi vocabulo *Seitaragi* addita esset particula *Indi*, lectionem corruptam esse putarem: & legendum esse *Sitarag*, id est, *Fumi terrae*, quem recipiendum suaderem, posteaquam *Carpeum* abesse certum est. *Apollo* accusat *Brassavolum* inconstantem, sed nostro iudicio immerito, ut suo loco amplius declarabitur. Arabico- rum nominum antiqua interpretatio habet *Seitaragi*, id est, *Fumus terrae*.

Ita habes sanè *Seitaragi* Arabum satis intricatam historiam, non tam ex vocis multiplici variatione, ut equidem opinamur, quam Arab. Scriptorem incondita barbarie (quam saepe vel inveni sequi cogimur, ne, verborum puritatem aut lenocinia sectantes, latentem nucleum vel penitus omittamus, vel intempestive pervertamus) obsequae proximè secutorum medicorum negligentia. Autorum nunc sententias dixisse, nostramque sententiam interposuisse sit satis, donec aliquid certius addiscamus de his quae ad *Cassii* historiam pertinere videbantur.

Arabum barbarum.

CORTEX ANTIRHEVMATICVS.

CAP. XXIV.

Refert *Monardes*, ex Peru missum esse crassum quendam corticem ex vasta arbore. *Vitmo* simili cum amplitudine tum forma, detractum. Ferunt nasci ad ripas fluminis cuiusdam viginti quinque leucis à *Lima* distantis: nec alibi facile in India reperi. Indos capitis defluxionibus, rheumatismis, aut aliis capitis grauedine laborantes huius arboris corticem in tenuissimum puluerem comminutum naribus indere: humores enim insigniter educere, eaque ratione liberari: quod verum esse expertum se testatur. *Vide* secundum caloris gradum excedere.

Locus

Vires

Catarrhus
Gravido.
Temperat.

PACAL ARBOR.

CAP. XXV.

Arbor *Pacal* eodem autore, multò minor est, quam arbor cuius cortex *Rheumaticis* utilis est, quae iam descripta. Nascitur in India ad fluminis cuiusdam ripas, viginti quinque leucis à *Lima* distantis.

Huius ligni viti cineribus cum sapone mixtis Indi ad tollendos lichenes etiam foedissimos videntur, cum qui in capite nascuntur, (de quibus *Marialis*).

Vires

Lichenes.

*Non vltus acce, pustulae lucenses,
Nec triste mentum, sordidusque lichen*]
tum qui reliquas corporis partes occupant. Sed & vetustas cicatrices emaculare dicitur. Paululum huius ligni accepit *Monardes*, ut eius facultates experiretur.

ARBOR AQVAM STILLANS.

CAP. XXVI.

Inter innumera penè naturae praecara atque memoranda, quae Ill. noster Princeps, *Dux Wirtemb.* in singularium suo Theatro amplissimo adseruat, est ramus ex arbore, quem ipsemet *Clementiss.* noster princeps nobis demonstravit, qui propria manu haec adscripsit verba. Mirabilis arbor ex insula dicta *Ferro*: quae arbor à multis centenis annorum sine mutatione consistit: & quotidie tantum fundit aquae, ut incolae satis pro potu habuerint. Missa per *D. Paludanum* 1600. Iun. 20. Eiusdem rami portionem liberaliter nobis communicavit Ill. E. C. quem primum à nobis describi conveniat: deinde quid alii Scriptores de ea prodiderint, subiici.

Locus

Ramus est crassitudine agundinis vulgaris, vel digiti pueruli, substantia lignea, sed satis fragili, colore subfusco, & quodammodo ad rufum tendente: per cuius medium medulla transit fungosa. Cortex exterior tenuis, cinereus, rugosus, multis nodulis scatens, cui adheret certis quibusdam locis muscus parvus, citrinus aut subviridis, ex minutissimis filamentis coaggestus, musco notatium arborum non multum ab similibus, sed bre-

Cortex

Muscus.





per aliquas, odorem ita acquirere palam est. Sæpe enim arcus celestis constitit, nec tamen arbores odoris spirasse quicquam, quod sensum mouere posset: cuiusque odor contrahitur (accidit enim id aliquando, acuta euenire narratur,) non in quaque materie contrahi potest. Causa verò ad arcum per accidens referenda est: præsertim si arcus ipse nulla est natura, quæ fixa & permanens sit: sed obutus tantum refringendi affectio & apparitio. Prouenit autem odoris affectus ille, non qualitercunque materies se habeat. Neque enim in viridi, neque in arida, sed in exusta, postquam, quæ arcui superuenerit, certam reddi suauitatem odoris, pastores referunt, præcipue ubi Aspalathus aut etiam Rhamnus est, aut id genus alia, quorum flos suauiter oleat. *Hæc ille.*

Aspalathus
arbores.

Diosc. locum
corr.

Flos odor.
arbores.

Inde, nec absque ratione Aspalathum quidam non inueniunt, ut in vulg. Diosc. cod. habetur legendum censent, sed ab incubitu & innixu Iridis, *Idem* ut videre etiam est apud Plutarchum in Sympo. l. 4. Quæst. 1. Notabis Aspalatho suauiter olentem tribui florem ab Aristot. neque negari ab arcus incubitu odorantiorum reddi. Cuius rei causam specialiorum idem summus Philosophus alibi tribuisse videtur halitui cuiusdam terræ præsuam, quem emittere solet eo loco, in quem celestis arcus decubuerit. Ita enim scribit lib. 37. Hist. Nat. Quod si admonendi sumus, qualis sit terræ odor ille, qui quæritur: contingit sæpe etiam quiescente ea, sub occasu Solis, in quo loco celestis arcus decubuerit capitibus suis. Ex quum à siccitate continua immaduerit imbre, tunc emittit halitum illum suum diuinum ex Sole conceptum, cui comparari suauitas nulla possit. Terra etenim quum feruet atque inurit, quod ediderit principid, bene olet. Etenim, quæ parca humido quendam in modum recaluerint, odorata redduntur: humor enim calore concoqui potest. Hinc quæ ad Orientem spectant; odoratiore exurgunt. Iridi verò efficere hoc putant, quoniam sine aqua effici nunquam potest. Quum verò materies immaduerit, caloræque interiori concoxerit, respirare iam incipit, vaporemque interitis conceptum emittit. Nec verò aquam nimiam accessisse oportet: eluit enim atque extinguit calorem ab igne iniectum. Quæ autem post arcum eueniunt, semper ferè mediocres sunt. Hæc qui non suspicantur, quum causam nullam reperirent insignem, iridi effectum contribuerunt, Aspalathum autem & odoratos flores odoratiore idem reddi, tum putauerimus, vel quoddam odor odori accedens, vegetior reddatur & copiosior, vel sanè quoddam in eo ipso halitu Aspalathi odor per aërem potentiùs diffundatur, ut ferè simili de causa euenire videmus in arboribus & herbis florentibus mensibus Aprilis & Maio, idque non tantum incumbente Iride, sed aliis etiam, postquam tepidum terræ halitum pluuia consimilis interuentu Solis vis euocarit, & florum vim vel adauxerit vel sanè latius sparserit. Subest & alia subtilitas. Quod eo tempore potissimum flores aperiri soleant: unde odor ille maior tantò, quanto recentium & nondum omnino hiantium florum odoratiore esse solet, quam iam dudum apertorum. Sed de his & similibus aliquando D. V. plura & specialiora in disputationibus Botanicis, & Quæstionibus mirabilibus Cheloni. Nunc ad Aspalathi vires transeamus, à Veteribus traditæ.

Aspalathi
vires.
Diosc.
Plin.

Aspalathus, ut tradit Dioscor. vim calæstricem cum adstrictione obtinet. Quo fit ut ad tetraotis viscera in vino decoctus collutusque conne-

niat: atque etiam ad genitalium domas, immundamque illuuiem, nec non ad ozænam commodè infundatur. Pesslo additus, scetus detrahunt. Eius verò decoctum aluum sistit. Quin & potu sanguinis reiectionem cohibet, vniuersæque difficultatem ac inflationes discutit. Addit Plin. præter iam dicta, rhagadia quoque sanare. Discutere & stragurias corticem, aluumque sistere, similia præstare syluestrem quoque putari. Fit & oleum ex Aspalathi succo in oleo macerato. Dioscor. quoque confectioem tradit ex Aspalatho, oleo omphacino, musto, calamo & iunco odoratis, nardo Celtica, spatha, costo, meliloto.

Galeno Aspalathus, gustu quidem acris simul & adstringens est: facultate verò ex dissimilibus constat: nempe partibus suis acris exaltans faciens: partibus verò aliis, austertis scilicet, refrigerans. Itaque vniuersæ ratione debet, & proinde ad putredines & fluxiones est utilis. Corticis vsum in medicamentis testatur idem lib. de Ther. ad Pis. & de Ther. ad Pamphyl. In signatè Hedichroo iubet recipi Aspalathi præparat. Idem testatur Aëtius in summario quodam.

DE LIGNO RHODIO: QVOD ALII ASPALATHVM RHODIVM VOCANT.

Rhodii ligni, siue Aspalathi Rhodii quibusdam putati historia nobis non minus obscura & intricata videtur, quam Aspalathi Veterum. Nos ut nulla desit stirpium indagatoribus occasio ad perfectiorem earum cognitionem perueniendi, & ut discant, non temerè omnibus Scriptoribus credendum, potissimum iis, qui vel ex leuiali quâ coniecturâ, quicquid in buccam & calamus veris quam mentem venerit, vel ex aliis hinc inde consarcinando ac scopas faciendo, pro notis sibi, atque aded suis produnt, lubet ea quæ à Neotericis de eo tradita sunt, interposita, vbi opus videbitur, censurâ, hic referre.

Exordiemur à Ruell. cui Aspalathus videtur id esse, quod nunc Officinæ vocant *Lignum Rhodium*, nonnullis, quanquam falsò, *Lignum Aloës*: vulgus *Rodofn*. Siquidem [inquit ille] lingule quæ à Plinio & Diosc. traduntur delineationes huic ad amissim, nullâ reclamante notâ, respondent: namque lignum fuisse fruticolum nodi satis testantur, quibus adhuc exasperatum scaret. Declarent etiam aculeorum vestigia nonnunquam id frequenter spinis inhoruisse, quamuis spinulis castratum & suis viduum furculis: quoniam potius cortice spoliatum, ad nos deferri soleat: modicam tamen arborem vel fruticem fuisse, satis nobis hæc ligni reliquæ docent. Ponderus eius graue sit lubrans manus perpendit, quod cæterorum more demersum aquis non protinus extat, sed lapidis modo confestim præceps fidit: nec sic obrutum quouis modo consuevit emergere. Adde quod hoc lignum subrubet, & in purpuram quandam exuto cortice tendit, quod oculis evidentiùs est, quam ut probari mereatur. Satis superque duritiam & spissitudinem tactus lentit, odoris quoque suauitatem, ligni suffusus indicat. Ceterum si lingua consilatur, lenem amaritudinem respere, & quadantenus amarescere constat. Gal. tamen gustu acrem Aspalathum adstringentemque deprehendit, cuius iudicio satis lingua subscribit, necius plura quæ ad eius cognitionem pertineant Diosc. scripta reliquit. Asportatur nos à Rhodiorum insulis: inde Rhodii appellatur.

Aspalathum num appellant, & *Aspalathum* esse affirmant, ut Ruell. sed erat plurimum, vir alioquin doctissimus, & regule lectionis. Sunt etiam qui hoc Oleastrum esse credant. Hæc Cordus.

Quem aut. in sanè fluctuantem incerta vada tenere patet. Nam postremo hoc loco plus tribuere videtur aromatici, quam fecit in Communi. ubi Aethiopicam Oleam putat: hic Indicam & Arabicam plantam. Quod, quamvis ex Agalochum auctoritate dixerit Agalochum in Arabia nullum gigni. Antea affirmavit esse Oleastrum lignum, hic quasi hæsitans aut ignorans, eam opinionem alius tribuit. Hæc sanè merentur considerationem.

Iam loco Agallochi, inquit Cordanus, diu vendiderunt Oleastrum. Hic enim Rhodius natus seu regionis natura, seu planta sit alterius generis, colore refert Agallochum: nec videtur omnino odoris ex pers: suauiter enim sed parum olet.

Quidam è Recentioribus *Aspalathum* Sandaligenus alterum arbitrantur: verius tamen constat, ait Curtius, Rhodium esse quod ad nos importatur, ex quo ad deprecationes orbiculi fiunt: quibus à diuitibus orbiculi aurei interseruntur: qui sæpè ex hominum luxu tenuiores in brachis & collo inuoluntur, quod nonnulli inficiantur, tanta est inuidentiæ inter Medicos labes. Sed si Curtius legisset, & probè intellexisset Cordi argumenta, non tam temerè ac intempestuè Medicorum inuidentiæ denunciatis, suam nec inficiam circa ea, quorum historias confascinat, detegeret.

Sylvio Agallochum, quod Offic. ostendunt, verius est *Aspalathum* acre & austerrimum Galeni.

Ruellii errorem & Scaliger explodit tanquam ridiculum, quod nimirum Rhodiensem arbusculam esse *Aspalathum* existimant. Et addit: Rhodii lignum illud, ex quo Sphæras faciunt, etiam nunc *Xilala* vocari. Arab. Hæc de quo postea plura trademus cap. de Agallocho siue ligno Aloës.

Sed lubet & Matth. Ruellium refutantem & de *Aspalatho* differentem introducere. Sic scribit. *Aspalathus* quidem ex Creta, Rhodo, vel Syria ad nos [quod ego sciam] non aduehitur. Ruellius mediocri censura non vacat, quod pro certo asserat, id legitimum esse *Aspalathum*, quod Rhodium Oleastrum nonnulli vocant: quo item quoddam Agallochi vice utebantur Myropolia. Cuius materiem cum & in Seplassis, & apud artifices, qui precatorias [ut ita dicam] coronas ad Deipara virginis salutationes torno conficiunt, diligentissime sim perscrutatus: ea sanè nigra partim, partim verò ex nigro flauoque venosa mihi sese obtulit. Rubram autem & subrubram [ut Ruell. inquit] nusquam me vidisse ingenuè fateri possum. Adhuc etiamnum, quod sit [quemadmodum Rhodii narrant] hæc planta ex Oleastrum genere, Rhodio tractui abundè proueniens, quæ Oliuas etiam proferat: sed nec multis spinis horrens, nec detracto cortice rigescens. Quamobrem [ut mea fuit opinio] *Aspalathus* non erit Rhodium Oleastrum, neque Santalum rubrum. Itaque nobis *Aspalathus* deest, qui tamen facile ex Rhodiorum insula afferri posset.

Idem in postrem. Edit. addit: sententiæ nostræ non subscribit Anguill. Ille Constantinum Myropoliā quendam Rhodium testem adducit: ego Rhodios alios, à quibus de his omnibus diligenter sum percontatus, qui plantam hanc Oleastrum, non *Aspalathum* vocari dicunt. Et quod Agallochum rarissimum esset, Officinæ fere omnes

eius loco suppeditabant Oleastrum Rhodium. Et in Apologia. Ego inquit, profecto Rhodium illud lignum multum distare ab *Aspalatho* certo scio: quod primum illud cortice tenui rubens non sit, sed potius albicans. Sed & id clarissima demonstrat Rhodium lignum nullam cum *Aspalatho* habere cognationem, quod scribat Gal. qui legitimum in Græcia fortasse pluries degustauit, hunc gustu esse acri, & simul adstringenti vi præditum: quod minime in hoc Rhodio ligno reperitur, quemadmodum nec præualens amaritudo, quam illi reddidit Dios. Quod autem huiusce ligni plantam si Oleastri species, id maxime fatentur Rhodii, qui eius historiam ex Melita insula ad me scripserunt his verbis. Lignum ex quo globuli toro no fiunt ad fundendas preces, truncus est arboris longitudine hominis metam non excedentis. Nasceitur arido & saxoso tractu, fronde perpetua, oleastri æmula, floribus albicantibus, bacis nigricantibus, paruis, caudice breui, contracto, brachiis instar crasso, à quo rami prodeunt: vni, spinis ferè nullis, aut admodum paucis, albicante toto cortice. Ligni materies cortice tenui candicat: medullis verò nigricat. Radicibus natis firmis, albicantibus. Quibus palam esse arbitror Rhodium hoc lignum ab *Aspalatho* admodum esse diuersum: & A. nat. Lusit. vnà cum Ruell. in eodem versari errore. Quippe *Aspalathus* tantum cortice tenui, non, ut ille existimasse videtur, in tota ligni substantia adeò saturatè rufescit, ut purpureus appareat. Huc usque Matth. Quem videt Lætar in tradendo ligno Rhodio planè contrarium esse Cordo licet cum illo neget esse *Aspalathum*, & velit esse Oleastrum Rhodium, dum ei denegit acrimoniam & amaritudinem, quam tamen allegit Cordus, ut demonstrat lignum Rhodium esse Oleastrum Aethiopicam. Ait enim: est etiam acre & odoratum, atque gustu Oleastri acrimoniam & amaritudinem respicit, sed utramque vehementer, quoniam terra & celo siccanti & feruido enatum. Sed vni iam credemus? Rursus post, quale sit Matth. Lignum Rhodium apparbit ex Ho. Bello. Amicus in Diosc. *Aspalathus* [inquit] Lignum Rhodium, Lignum aloës, Cortex Bagia, Arab. Darfsan: Hæp. Alargæ: Ital. Ligno aloës, de Rhodes. *Aspalathus* autem, ut Ruell. testatur & Recentiores Græci confirmant, lignum quod è Rhodiorum insula affertur, & illud lignum Aloës Rhodiorum Officinæ hodie appellant, ex quo coronæ ad fundendas preces parantur. Nec enim Matthiol. qui hoc tanquam fallum exerte contendit, audiendus est, cum reuera lignum hoc ex quo coronæ parantur, ex arbuscula humilis crebris spinis aculeata, in insulis Rhodiorum & aliis Græciæ locis cadatur, non verò ex Oliuæ speciem referente arbore. Vidimus enim apud Tho. Lucensem insignem Pharmacopolam Ferrar. à quo Monardus multa se didicisse libris suarum Epistolarum fatetur, huius ligni fructum, brachialis crassitudinis, solidum, graue, multum interceptum nodis, quod à Græcis hominibus sub nomine *Aspalathi* acceperat, & ex eo coronæ parantur. Erat autem lignum illud coloris subrubri, cui simile in Hispania apud Valentinos & Terraconenses præcipuè magna in copia reperitur: & illius radicis cortices, Officinæ sub cortice Bagia Mercatoribus vendunt.

Sed contendat quantum vult Amatus, non multum ei tribuimus ei, temerè, nostro iudicio, asserenti Lignum Rhodium prouenire in Græcia, & non speciem Oliuæ referre. Cordus enim, ut iam demonstratum, scribit, manifestè con-



neratim fieri potest: quippe cum foliorum diuersitas, amplitudine, paruitate, figuræque inuenta incertaque sit. Sunt autem genera eorum complura, magnas diff. rentias habentia, ut Hedera [*Malinus* *Cistus*] Melochrum, Rubia, Smerca, casia, [ita G. za. Græcè *κασία*, quam vocem debuit referuare] Origanum, Satureia, Petis [*leg. epa*] Marrubium, Pulicaria, Apiastrum. Hæc lib. 6. Hist. cap. 1. Mox seq. cap. cneon [casiz Giza: licentiosius, ut antè. Græcè *κασία*] duo genera: vnum album, alterum nigrum. Albi solum est eutaceum, [*κασία*] *Joblingum*, figura Oleæ quodammodo simile. Nigri verò Tamarisci simile, carnosum. Album humile est, & odoratum quidem, [*κασία*] sed nigrum suauissimi odoris [*κασία*] Giza legit *κασία*, & odore caret, vertit, secutus Plin. quem & Corn. & Const. sequuntur. At Dal. prior. electionem præf. it. Fortè non malè quis dicat cum Scal. *κασία*, olens, odore grauis. Niger autem odore bono.] Vtrique radix alta, magna, rami multi, crassi, lignosi, sive statim è terra, vel paulò supra diuisi. Materie lignosa quidem, sed lentà admodum constant [ita enim legimus: *κασία* *κασία* *κασία*] Idem his vitiliuin modo vtuntur ad colligandum & comprehendendum. Germinant florētque post æquinoctium Autumnia, adiu flouent.

Fateatur Coropius, Virgilium Casia nomen herbæ dedisse, odoratæ quidem, sed longè differentia *Casia Indorum*: qua tamen in re, dum semel, humiles, iterum, virides Caliz, dixit, satis ostendit [inquit *lib.*] de illa sese casia loqui, quam Hygino teste, Cneorum vocarunt.

Simplicium medicamentorum peritissimi, inquit Matth. [ut eorum testantur volumina] nihil inuicem differre consent, *Casia* quæ in arbore genere Diosc. & Gal. recensetur, & eam quæ Ant. quæ inter coronarias numerabatur herbas, quæque olim passim circa apum alucaria serabatur in Italia. Verùm eninuerò longè aliter hæc res intelligi postulat. Palam est ex Virg. & Plin. *Casia* coronariam, quæ tantoperè delectantur *Casia* herbam, non arborem fuisse, & credendum Cneorum Græcis vocatam, quod Theoph. candidum & nigrum facit. Sed quænam plantæ originem in Italia, vel aliunde eo afferantur, quæ Cneorum referant, quid veri referam non habeo. Hallucinatur Anguil. qui sibi persuadet Lavedulan Cneorum esse album: Nigrum verò Rosmarinum coronarium. Aberrant etiam qui contendunt, Theoph. Chamæleum esse vel Thymeleam. Inuenimus in Bohemia sylvis plantam, quæ omnibus suis paribus Cneorum candidum refert. Hæc Matth. Difficulus iudicari possit, inquit Clus. cur suffrutici, quem exhibet Matth. Cneori nomen accommodare voluerit. Multum mirantur. Postrema autem Editione, cap. de Thymelea lib. 4. aliud nobis Theoph. Cneorum adfert, nullis, ut ipsi vtamur verbis, deficientibus notis. Sed cum nudam tantum imaginem, addito Cneori nomine, nostris oculis subiciat, illiusque historiam planè subiecit, si parum fidei ipsius assertioni adhibuerimus, nemo, ut opinamur, vitio vertet.

Dioscor. & Gal. Cneorum, ad Thymeleam & Chamæleam referendum esse consent doctissimi quique. Anguil. arbitratu Gazam mendosum exemplar Theophr. secutum Cneorum nigrum legisse *κασία* pro *κασία*. Cuius rei causa iustificet illum exagitat. Aldinus sanè codex d. fertè habet: *κασία* *κασία*. Porro de Cneotis Matth.

his locis: de primis inter *κασία*. De *κασία* inter herbas nomine Saponaria. Dalech. sine Oymoidis nostri minoris. De Cneotis pro Thymelea suo quoque loco.

CASIA LIGNEA MONSPELIENSIS

CAP. XIV.

Casiam vel cassiam ligneam, alii Herbaceam Descrip. vncabant Monspelii, fruticem bicubitalem & tricubitalem, in multas virgulas rariè diuisam, fuscas, strigatas, lentas, virelcentes, interdum etiam nigricantes, præsertim cum nouella sunt, te. ste Clus. folia purpureascentia, angusta, sauis long. 2, interdum foliis Linariæ proxima, sapientia. Flores vt Ribes vulgò dicti, odore inueni. do, planè Gallium referente præditi, [Lob. ex vindi flauelcentes: Clus. adstrictioris facilitatis in eodem pediculo congesti.] Baccæ satis magnæ, per maturitatem rubræ, dulces, (Lob. glutinosæ valde, Clus. subdulces lentæ, tandem nonnihil acrimonia exercentes) in quibus osseus nucleus medullam continens albam, subdulcem. Cane. rario baccæ sunt sapore & odore ingrato. Totus frutex adstringentem nonnihil facultatem habet. Radix dura & lignosa, subiufo, crassaque cor. ce, valde adstringente testæ, vt notat Cap. B. hin.

Hæc planta sic tradita videtur à Cordo in Oes. syla. fruticulus teomibus & cubitalibus virgulis foliis Polygoni masculi: semine rotundò, nigro, lampentis Baccis simili: gultu acri: *κασία* est mih ex hortu Episcopi Cremonensis è Galis. & Petro B. lanno.

Casia Pectina Monspel. an Theophrast. Adu. Angu. & Guiland. non aliam proposuissent, quam hanc, si eam vidissent in Romano Narbonensi que agro, Cneocaposo Cneoti, vel *κασία* marini æmulo. Hanc Rondel. & Pelliserius Episc. Montpel. casiam fecerunt, quia in Diosc. d. erat, & in Theoph. supererat.

Casia quorundam Clus. qui refert, suo tempore Monspelii à studio suo *κασία* habitare, ac successores casiam appellare maluisse, quod nomen etiam nonnullis Hisp. locis obijnet.

Placa Medici & Professor Valentinus Polygonum Plin. existimabat: quod si fuerit, inquit Clus. ad quantum Polygoni Pliniani genus referendum esset. Nos tamen aliam plantam proponemus, quæ magis quadrare videtur. Hisp. *κασία* vulgus *Badia* & vicina incolens loca *κασία* nuncupat. Si quis cum Olyride Plinio describere conferet, aliquot notas conuenire deprehendet. Nihil tamen statim. Certe *κασία* Theophrast. quod casiam ab Hygino vocari Plin. tradit, cuiusque ex Theoph. duo quoque genera consistunt, minimè esse potest. Sed neque etiam Virgili casia, planta odorata, quamuis huius sententia videatur esse Lacuna, qui nihil aliud quam casiam Monspellianam describere videtur, sit inueniens. A casia odorata & à Casia solutina d. fert Virgiliana, Plinio coronaria dicta, cui rami quadrati, folia Rosmarini: fructus rufus, Asparagi modo rotundus, spatio pulcherrimus: aliqui Cneorum faciunt. Radices sunt: Bacchari similes, odore & sapore multo canela, cui adnumerari possent. Abundat hæc casia Romæ in vinea Ill. Margalitz Austriacæ. Cæterum an hæc planta odorem & saporem canelæ habeat, quæ mei tribuit Lacuna iudi.

Theophr.
c. 14.
κασία

Theophr.
κασία

Theophr.
c. 14.
κασία

Casia
Cneorum
Hygino

Casia coronaria
herba, non arbor.

Lavedulan
Anguil. re-
proh.
Rosmarini-
um. Chamæ-
leam.
Thymeleam.
Cneorum.
Matth. not.

Thymeleam.
Chamæ-
leam.

Folia

Flora

Fructus

Radix

κασία

κασία

κασία

κασία

κασία

κασία

κασία

κασία

κασία

κασία

κασία

κασία

κασία

κασία

κασία

κασία

inducunt Medici & Pharmacopœi, qui Rontæ de-
gunt.

Rauwolf. in itin. de plantis montis Libani, scri-
bit, se tepenisse cassiam Monspeliensem ibi voca-
tam *Mackmudi* & *Mackmisi*: baccas autem *Habel*
nickmes & suspicaturque an sit *Anacardium* Rha-
sis.

Cassia lignea maritima Hist. Lugd. quam [in-
quit] ligneam Herbarii vocant, cuius nominis
causam mihi adhuc incognita. In maritimis crescit,
caulibus lentis, fractisque contumacibus, foliis Lē-
ticulæ, numerosis, gustu astringentibus: fructus
oblongus, niger, vmbilicatus, ita gustu astringens,
ut acerbicatis nonnihil habeat. Quidam Geni-
stæ maritæ genus esse putant, licet siliquas nul-
las edat.

In eadem Hist. Lugd. traditur *Polygonum* ma-
ritimum 2. Dal. quod multa communia habet cum
iam dicto frutice.

Camer. & Cassiam Monspel. vocat, & cassiam
poëticam eorundem, additque nonnullos cor-
tice radices uti pro cassia lignea. Cassia quorundam:
Cassien Tab. Cassia Poët. Lob. I. Gerard.

Nec Virg. nec Hyginii est, inquit Casp. Bauhin.
quam odoratam dicunt: Olyridisque Plinii notas
quas habere putat. Casalp. cassia lignea offic.
idem.

Cæterum *Cassa munsf.* dicta Romano, Narbo-
nensi agro vberè proventu oritur ad ripas
Lani, propè pontem Castri noui, in sepibus, præ-
sertim quæ ad sinistram versus flumen ad montem
contenditur. Et ad ingressum *Peraul* pagi ad sta-
gium Volcarum sita, deinde siluula *Egremont* con-
nobilis proxima, & in *Gramont*, Nec non Nemaus-
si plurimis locis, & alibi passim in Galloprovincia
iuxta sepes & oliuetarum margines. Variis etiam
Hispaniæ locis secundum vias: frequentissime au-
tem Granatensi & Valentino regno, teste Clus.
In Italiæ hortis quibusdam etiam cultam vidimus.
D. Rentzius Medicus Wirtembergicus dedit no-
mine *Cassa poetarum*, collectam propè Tergestum
versus mare Adriaticum, in monte dicto Cars.

Floret Iunio, semen rubet Augusto: Lob. floret
estate: fructus Octobri vel antè maturescit Clus.
Nos & Aprili & Maio florentem obseruauimus.
Et Nemausi Iunio fructum. Communiter tamen
Augusto perficit toto illo tractu Narbonensi.

Totus frutex, ut dicebamus astringens est. An
verò rectè quidam radices huius cortice, pro Ca-
sia Veterum vsi sint, ut notat Camer. ipsi vide-
ant. Et quamvis eadem esset cum Olyride Plin.
non existimauerimus tamen, radicem decoctum
sanare arquatos: magna enim illa astrictio quæ
ei tribuitur, non videtur conuenire in obstructio-
ne hepatis insigni, qualis plerumque est arqua-
torum vel Ictericorum. Camer. notat Cassiam nihil
ferè aromatici habere, sed radicem validè astrin-
gere. Nec non uti quosdam radices cortice in ob-
structione iecoris. Malimus nos in contrario
quodam eius affectu aut consimili alio intestino-
rum fluxu, præmissis præmittendis uti.

DE CASSIIS OFFIC. ADULTERINIS.

CAP. XV.

Officiæ, si Hettbol. credimus, Tamaricis ra-
dicem Cassiam vocare solent: & quæ palam
imposita Medicorum est, pro Cassia odorata vtun-
tur. Idem & Tragus ait, & Ruell. ex Hermol. in-
dem planè verbis, nec eo citato.

Tom. I.

Myricæ [eadem est cum Tamarisco] radices,
inquit Matthiol. pro odorata cassia venditabant
impositi Impositores. Sed postquam fraus à peti-
tis deprehensa est, eius in offic. vsus penitus exo-
leuit. Quandoquidem verò Tamarix copiosè
prouenit ad ripam Rheni, subeunt memoriam
Plinii illa verba, quæ suprà citauimus, de cassia
quæ sentur extremo in margine imperii, quæ Rhe-
nus alluit. Non tamen audent affirmare ean-
dem.

Scribit Cordus, pro Veterum cassia fistulari à
multis seculis in Europa visa, corticem venolum
radicis cuiusdam gustus acerbi & tenuis vendi. Et
in Dispens. monet, pro cassia lignea ita Diabolo
Mef. non sumendum esse paruum corticem saporis
insipidi ac stiptici, ut hactenus factum. Fortè
de hac eadem ait: Allatus est hactenus in totam
Europam pro cassia lignea cortex radices cuius-
dam crassiusculus, colore purpurascens, præter-
tim fractus, gustu stipticus, tenui odore, gustan-
tium palatum ad halitum commendans, quem ex
Aspalathi specie aliqua detractum opinamur: ni-
hil tamen affirmamus.

At securè Cornat. cassiam ligneam Offic. [in-
quit] cassiam veram Veterum censebimus. Sed
prudentiùs fecisset, si indicasset, quid intellexerit
per cassiam ligneam offic. & docuisset, cur veram
cassiam Veterum existimet. Nam cortex ille, quo
sub cassiæ nomine hactenus vsi sunt pharmaco-
pœi non est vera Cassia, quod nec gustu cinna-
momum referat, aut acris sit, nec odoratu, ut &
Fuchs. annotauit. Sunt qui Genistæ radices corti-
cem esse putent.

Hactenus, ut scribit Matthiol. tum medici, tum
seplariani odoratæ cassiæ loco quædam incognitæ
arboris segmenta, nec odore nec viribus prædita,
semper capescunt. Veruntamen postquam non-
nulli nostræ ætatis viri stirpium historias diligen-
ter examinarunt, detecta fraude, mercatores ex
Alexandria mercimonia Venetias comportantes,
in aliud nouum cassiæ genus segmenta illa com-
mutarunt: quæ sanè præter odorem, pariterque
saporem, quibus ferè penitus exoleta sentitur, cas-
siæ à Dioscor. descriptæ admodum habetur con-
similis. Quapropter nec eos errasse credendum,
qui dicerent, hanc Dioscor. Pseudocassiam esse:
quippe & crasso cortice constat, & in eius cavitate
lignosa etiam visitur materies, paululumque est
odorata, minusque acris. Nonnulli hac non
contenti, quædam vocati cinamomi fragmina cas-
siæ vice usurpant, quæ cum nullo odore sapore-
que commendentur, potius Quercum vel Fagum
quàm cassiam referunt.

Cassiam, inquit Marantha, nullo odore, nulla
habentem acrimoniam medicamentis apponunt
Seplariani, ut nihilò deterius quispiam lignum
quoduis admiscere possit: sic enim cum tanta ali-
cuius medicamenti quantitas tam cito exteri non
queat, in officina diutius seruatur ac vetustate fit
elanguidum: illud tamen, ne mercedem perdant,
in compositis adhibent. Cronemb. & Manar-
dus quoque testantur nefariè hactenus cassiam
Ligneam vocitatum, & pro ea diuenditam, nihil mi-
nus quàm germanam esse cassiam inodorum quid,
& proin penitus abiiciendum. Quod verò cina-
momum [inquit Casp. Bauhin. apud Matthiol.]
comuniter pro cassia exhibent, nihil aliud esse vi-
detur, quàm Pseudocassia Dioscor. & fortè cassia
fistula Androm. iunioris apud Gal. tantid. licet alii
corticem cassiæ Monsp. esse velint. Sed optasse-
mus cum graphice delineasse quid intelligat per
cassiam communiter exhibitam.

Myrica
radix

Offic. error.

Descriptio

Aspalathi
species.cassia ve-
ra Ger.
Corn. rei
prob.Genistæ ra-
dis.Cassia of-
fic. aliaPseudocaf-
sia Diosc.Cinamomi
fragmina
exoletaCassia in-
odoraCassia Ca-
nam.Pseudocaf-
sia Diosc.Cassia fi-
stula Androm.Cortex
Cassi. Monsp.

C. Bauh.

POLYGONVM MARINVM ANGVSTIFOLI-
VM DALECH.
CAP. XVI.


Descriptio

Radix.

Caulis.

Cortex.
Folia.

Polygonum
styl. Plum.



Scribitur in
H. stor. Plant.
Lugd. Polygo-
num marinum
alterum Dale-
champii in mari-
timis, fruticat, ra-
dice lignosa, ni-
gricante, modicè
fibrata, caulis
multis, vno & al-
tero cubito pro-
ceris, cortice sub-
rubro verrucis, ra-
mulis: foliis ad-
modum dentis,
ramos & furcu-
los nper. eibus,
Polygono mari-
similibus, nonni-
hil angustioribus
& longioribus,

gnatu in maritimis falso, alioqui adstringente.
Herbarii quidem Polygonum sylvestre à Plinio
descriptum esse putant. Quattuor genus, inquit,
sylvestre appellatur, penè arboris modo scutex,
radice lignosa, stirpe Cedi rubicundo: ra-
tis
spatiis in palmorum, nigris geniculorum ter-
nis quaternisve articulis, suere qui Aizoum ma-
rium vocauerint.

Considerandum quantum Polygonum Dale-
champii differat à frutice qui dicitur à Monpel-
liensibus, Cassia lignea.

CASSIA ADVLTERRINAE VEL PSEUDO-
CASSIAE NOMINE DATVS CORTEX.
CAP. XVII.

Descript.

Hoc nomine exhibitus cortex, crassitudine
ferè semunciali, Maceris aquat corticem, co-
loris ferruginei, punctis albicantibus asperis, su-
perficie tam conuexa quàm concava leui, substan-
tia nullis fibris intertexta, sapore nullo euidenti,
anno 1589. Datus autem fuit hic cortex Patavii,
anno 1561. in Pharmacopolio ad Symbolum A-
quilæ.

Considerandum an de hoc cortice scripserit
Matth. Epist. l. 3. ad Qualebenum: Corticis illius
fruticium, cui titulus erat, Argillada, putarem ego
Pseudocassiam esse, quam nostri Pharmacopoi
cassiam ligneam vocant.

Argillada.

LIGNVM AROMATICVM, SEV PO-
TIVS CORTEX MONARDES.
CAP. XVIII.

Lignum a-
romaticum
Monard.

Bernardinus de Burgos Pharmacopola, inquit
Monardes. Italus ostendit mihi ligni cuius-
dam fragmentum, quod primo intuitu putabat
Lignum Sanctum potius diuini S. Iohannis. Li-
gnum est, quod adolefcens candelà, fragrantissi-
mi odoris fumum excitat, alioqui insipidum &
inodorum, haud secus ac lignum commune ali-
quod. Corticis verd odor aromaticus prasantis-
simus, sapor Macis aut Nucis mollior, eoque
etiam vegetior ac suauior, aromatica sua gratia
vel quoduis cinnamomum & acrimoniâ ipsum a-
dèd Piper superans, & vel ex leni dentium atui-

Corticis a-
dor.
Sapor.
Acrimonia
maior
quam Pi-
per.

tu omnes fauces petardens, ac tota fere die im-
buens. Magna huius ligni quantitas in monte
quodam exstiterat à Nauclero à Hauana [portu
Cubæ, inquit Clusius, Insulæ ad Septentrionem
sito, & Flondæ Provincæ ferè opposito] cedente
, & in nauem seu Liburnicam delata, ignis
struendi causa.


Clusius in Annot. ad cap. 26. lib. de Simp. Med.
Hist. Monardi ait: Simile lignum me nactum esse
arbitror anno 1597. Truncus enim quem in phares
orbiculares partes terræ relectum conspicebam,
solida & durâ malisà constabat, eaque non minde
grau. quàm Guayacum, candidiore tamen, licet
aliquot nigricantibus venis distincta: illius etiam
cor nigrum instar Guayaci, odor autem valde ve-
nens erat, vt qui vix percipi posset, sapor verb
non nihil edulus. Cæterum orbiculare illud fra-
gmentum quod accipiebam, palmaris erat lon-
gitudinis siue altitudinis, & quinque vnciarum
diametrum ferè habebat, cortice suo denudatum:
quapropter initid nihil de illo promuntiare pote-
ram, nisi Guayaci genus aliquod vilius videri, do-
nec anno insequente aliud fragmentum suo cor-
tice adhuc tectum nancisceretur: tum demum dili-
gentius obseruato & cortice & ligno, illud esse
de quo Monardes scripserat, confidentius asse-
re audebam. Comperiebam enim illius descriptio-
nem huic ligno prorsus conuenire, atque huius
corticem cortici ab illo descripto ita ad amissum
quadrare, vt quin ille ipse sit, nemo ambigere
posset. Quum verd in solo cortice sit illa odoris
& saporis gratia: mirari subit, cur Monardes li-
gno potius quàm cortici aromatici nomen tri-
buerit.

In ea potèd sum opinione, ipsi ligno aliquas
inelle facultates, illis quæ Guayaco tribuuntur,
non dissimiles: & forsitan qui in Angliam id ad-
ferebant, arbitratos se quatuor ex eo, perinde
atque ex Guayaco facturos: verum cum sua spe se
frustratos animaduertent, ex eo globos tornan-
curale (vt mihi relatum) quibus exercitiis gra-
diactum viderentur, propter ligni soliditatem &
grauitatem. In Histor. verd Lugd. Lignum aroma-
ticum Monardes dicitur.

CORTEX VVINTERANVS ACRIS
VE CANELLA ALBA.
CAP. XIX.

Vntere M. Descriptio

M Ducis
VVint. Principis
nostri Cl. habe-
mus corticem E.
C. missum per D.
Paludanum, no-
mine prædicto:
Canulatus est,
crassitudine as-
sæ lignæ fuscæ,
fragilis, coloris
parte gibbi vi-
nerci, conuexa
fusci, per substan-
tiam cineræ
& fului. Sapore
inipmit & vesti-
gio lucule mæ-
crem, suban-
rum, & aromati-
cum, qualem ha-
beret Zingiber
mul-





Schreger. *Syr.* *Seitaragi* siue *Sichroni* siue *Sytragi* (Synonyma sunt haec apud Arabos) plura designare nuncupatione sunt intelligendum. Serapioni nihil aliud quam Dioscor. Iberis siue Lepidium. Auicenna uero genera explicatur. Postremum nulli dubium est, quod legitimum Iberim designet sed ibi interpretis errore legitur Cordumeni pro Cardami.

Lepidium (inquit Tragus) quod & Piperitis dicitur, Germ. *Senffraut* / in Serap. vidi *Seitaragi* Indum (noster codex Serap. non habet Indum.) & *Hausel* appellati: nolim tamen super hac re cum quoquam contendere.

Rursus hoc Lepidium intelligere videtur cum *Serap.* *Seitaragi* Manrica lingua Lepidium nominant. Brasauolus in exam. Pil. aggreg. *Seitaragi*, *Satragi* nonnunquam *Seitaragi* Arabum, est Diosc. Lepidium. Auic. confundit Iberidem cum Lepidio. Lepidium uero & *Seitaragi* est *Penerella*. Colligendum est in hac pilula. comp. pro *Seitaragi* Arabum Lepidium intelligere: verum concipere nullo, quid in ea faciat, vel facere possit Lepidium.

Seitaragi.

Auic. not.
Penerella.

Seitaragi.

Cordo in comp. supra pil. fortidas *Rhalis*, *Seitaragi* siue *Seitaragi* Indum est Lepidium maius: *Pfesseraut*.

Monachi in Mel dist. i. cens. 40. in Triphera hoc Iberim tradere videntur *Seitaragi* siue Lepidium, cum aiant: Non est multum à veritate alienum tenere Piperellam esse Lepidium. Iisdem Lepidium est illa, quae vulgari vocabulo apud Italos dicitur *Capriella* vel *Caprinella*. Quia dicit Simon Ianuensis in litera *Seitaragi*, quod quidem *Seitaragi* vocauerunt Nucein viduarum seu captiuam. Considerandum an Monachi non intelligant *Raphanum* rusticarum Germ. dictum *Wecreterig*. Iisdem autoribus pro *Seitaragi* sumendum *Nasturtium*, quod viribus, odore & sapore simile.

Nasturtium.

Nasturtium.

agreste.

Seitaragi.

Seitaragi.

Seitaragi.

Seitaragi.

Seitaragi.

Seitaragi.

Seitaragi.

Seitaragi.

Seitaragi.

Seitaragi.

Seitaragi.

Seitaragi.

Seitaragi.

Seitaragi.

Seitaragi.

Seitaragi.

Seitaragi.

Seitaragi.

Seitaragi.

Seitaragi.

Seitaragi.

Seitaragi.

Seitaragi.

Seitaragi.

Seitaragi.

Seitaragi.

Seitaragi.

Seitaragi.

Seitaragi.

Seitaragi.

Seitaragi.

Seitaragi.

Seitaragi.

Seitaragi.

Seitaragi.

Seitaragi.

Seitaragi.

Seitaragi.

Seitaragi.

Seitaragi.

Seitaragi.

Seitaragi.

Seitaragi.

Seitaragi.

Seitaragi.

Jo. Manlius, teste Trago, *Nasturtium* agreste, *Seitaragi*, *Senation* & *Lepidion* vnius & eiusdem plantae nomenclaturas esse censet. Vbi pro *Seitaragi*, inquiunt Monachi, intelligitur *Lepidium*, si non habetur, sumatur *Rubia* ex Auic. & Gal. autoritate. *Rubiam* & tractat. Quid pro Quo substituit, quod sanè substitutum nobis pro nullo *Seitaragi* conuenire videtur. Vesalio in *Rhalis*, cap. 9 *Seitaragi* est *Thaphsa* Indica & habet Arabicarum dictionum antiqua interpretatio sub finem. Auic. *Seitaragi*, id est, *Thaphsa*. Brasauolus in exam. pil. aggreg. Nisi vocabulo *Seitaragi* addita esset particula Indi, lectionem corruptam esse putarem: & legendum esse *Sitarag*, id est, *Fumiterra*, quem recipiendum suaderem, posteaquam *Carpesium* abesse certum est. Apollo accusat *Brasauolum* inconstantem, sed nostro iudicio immerito, ut suo loco amplius declarabitur. Arabico-rum nominum antiqua interpretatio habet *Seitaragi*, id est, *Fumiterra*.

Sitaragi.

Fumiterra.

Fumiterra.

Fumiterra.

Fumiterra.

Fumiterra.

Fumiterra.

Fumiterra.

Fumiterra.

Fumiterra.

Fumiterra.

Fumiterra.

Fumiterra.

Fumiterra.

Fumiterra.

Fumiterra.

Fumiterra.

Fumiterra.

Fumiterra.

Fumiterra.

Fumiterra.

Fumiterra.

Fumiterra.

Fumiterra.

Fumiterra.

Fumiterra.

Fumiterra.

Fumiterra.

Fumiterra.

Fumiterra.

Fumiterra.

Fumiterra.

Fumiterra.

Fumiterra.

Ita habes sanè *Seitaragi* Arabum satis intricatam historiam, non tam ex vocis multiplici variatione, ut equidem opinamur, quam Arab. Scriptum incondita barbarie (quam saepe vel inuiti legi cogimur, ne, verborum puritatem aut lenocinia sectantes, latentem nucleum vel penitus omittamus, vel intempestive peruertamus) obsequae proximè secutorum medicorum negligentia. Autorum nunc sententias dixisse, nostramque sententiam interposuisse sit satis, donec aliquid certius addiscamus de his quae ad *Casie* historiam pertinere videbantur.

Seitaragi.

Seitaragi.

Seitaragi.

Seitaragi.

Seitaragi.

Seitaragi.

Seitaragi.

Seitaragi.

Seitaragi.

Seitaragi.

Seitaragi.

Seitaragi.

Seitaragi.

Seitaragi.

Seitaragi.

Seitaragi.

Seitaragi.

Seitaragi.

Seitaragi.

Seitaragi.

Seitaragi.

Seitaragi.

Seitaragi.

Seitaragi.

Seitaragi.

Seitaragi.

Seitaragi.

CORTEX ANTIRHEVMATICVS.

CAP. XXIV.

Refert Monardes, ex Peru missum esse crassum quendam corticem ex vasta arbore Virmo simili cum amplitudine tum forma, detractum. Ferunt nasci ad ripas fluminis cuiusdam viginti quinque leucis à *Lima* distantis: nec alibi facile in India reperiri. Indos capitis defluxionibus, rheumatismis, aut alicui capitis grauedine laborantes huius arboris corticem in tenuissimum puluerem comminutum naribus indere: humores enim insigniter educere, etque ratione liberari: quod verum esse expertum se testatur. Vide-secundum caloris gradum excedere.

Locus.

Vires.

Catarrhus.
Gravido.
Temperat.

PACAL ARBOR.

CAP. XXV.

Arbor *Pacal* eodem autore, multo minor est, quam arbor cuius cortex Rheumaticis utilis est, quae iam descripta. Nascitur in India ad fluminis cuiusdam ripas, vigintiquinque leucis à *Lima* distantis.

Huius ligni vsti cineribus cum sapone mixtis Indi ad tollendos lichenes etiam scedissimos vtuntur, cum qui in capite nascuntur, (de quibus *Martial.*

Vires.

Non vltus acro, pustulae lucenses,

Lichenes.

Nec triste mentum, sordidus lichenet

tum qui reliquas corporis partes occupant. Sed & vetustas cicatrices emaculare dicitur. Paululum huius ligni accepit Monardes, ut eius facultates experiretur.

ARBOR AQVAM STILLANS.

CAP. XXV.

Inter innumera penè naturae praeclara atque memoranda, quae Ill. noster Princeps, Dns Wirtemb. in singularium suo Theatro amplissimo adseruat, est ramus ex arbore, quem ipsemet Clemens Ill. noster princeps nobis demonstrauit, qui propria manu haec adscripsit verba. Mirabilis arbor ex insula dicta *Ferro*: quae arbor à multis centenis annorum sine mutatione consistit: & quotidie tantum fundit aquae, ut incolae satis pro potu habuerint. Missa per D. Paludanum 1600. Jun. 20. Eiusdem rami portionem liberaliter nobis communicauit Ill. E.C. quem primum à nobis describi conueniat: deinde quid alii Scriptores de ea prodiderint, subiici.

Locus.

Ramus est crassitudine arundinis vulgaris, vel digiti pueruli, substantia lignea, sed satis fragili, colore subfusco, & quodammodo ad rufum tendente: per cuius medium medulla transit fungosa. Cortex exterior tenuis, cinereus, rugosus, multis nodulis scatus, cui adheret certis quibusdam locis muscus parvus, citrinus aut subviridis, ex minutissimis filamentis congestus, musco non Arrium arborum non multum abfimilis, sed bre-

Cortex.

Muscus.



















Agallochum, **Lignum Aloes**, **Xylaloe**, **Xylum Aloes**, **Calambucum**, **Lignum Taprobanum**, **Tarum Plin.** **Lignum Paradisi**, omnia pro vno & eodem ponuntur. 2. **Lignum Aloes filu.** **Lignum Comonum** vocat: vult Aloes holz. **Lignum Aloes vulgare**, de quo mox trademus, gemin **Paradis holz.** **Retorm.** **Worn.** idem.

Vires & Vires.
Agallochi Viretum.
Oni hali- fuc.
Suffumma.
Servachon.
Latris & Hep. dolor.
Dysenteria.
Tempera- mentum.
Alus for- um.
Hepaticis- fruct.

Pediculus gignunt.
Indica pro- hiber.

Temper.

Agallochum cominanducatum, itemque decocto collutum, halitus oris commendat: ac totum quoque corpori sicum tutumque odoris gratia inspergitur. Ad suffimenta denique thuris instar adhibetur. **Radix** vero drach. i. pondere posita, stomachi superfluos humores, imbecillitatem, ardoremque mitigat. his quoque quos latens & icterici dolor ex cruciat, ac Dysenterici aut tormenosis ex aqua bibita opituiatur. **Diosc.**

Autore **Sechio**; Cuncta **Xylaloes** species calida sunt & sicca, & ventrem liliunt, & stomacho bona, praesertimque **Humida**, & post **Indica**. **Czterz** vero minus. **Corroborant** autem partes interiores, & quae lecore sunt obstructions solvunt, humiditatemque ventriculi absumunt. **Czterz** vero species, si crebro suffiantur, propter dulcedinem pediculos gignunt. Sed **Indica** sola prohibet horum generationem, ob suam acriditatem. **Arabari** apud **Serap.** quoque calidum est & siccum, & stipiticum, ideoque viscera corroborat & reficit gratia sua aromatica, corporisque superfluum humiditatem absorbet. **Rhasis** idem ferè ait. **Isaac eben amram**, calidum & siccum in secundo ordine facit, & bonum ait esse cerebro, à quo pituitam detrahat, discutere flatus, referare obstructions, prohibere urinæ stillicidium involuntarium, causatum a frigore & debilitate vesicæ. **Avic. cap. de Agallocho** easdem vires tradit cum **Dioscor.** At cap. de **Xylaloe** addit: Calidum & siccum est, in secundo gradu, ut puto. Subtilium est parvum, aperit, & confortat omnia membra, & nervos quoque. Cerebro imprimis confert, & corroborat sensus. Cordi etiam robur addit, ipsumque exhilarat. **Lignum Aloes** eidem simile est viribus **Ambræ**, sed ea inferius. Recentiores quidam eius usum prædicant etiam ad diapalmata, de qua re non contemnenda habes apud **Marcellum Virgilium** commentar. in **Dioscor.**

LIGNVM ALOES OFFIC. ET AGALLOCHUM plerisque putatum.

Descriptio

Lignum peregrinum, quod **Xylaloe** vel **Lignum Aloes** vocant officina, pectinibus plerumque densis & rectis est contextum, quodque transversum sectum **Quernei** ligni pectines æmulatur, partim albicans, durum, graue, pingue, sapore amaricante cum quadam acrimonia aromatica, prunis iniectum bullas agit totumque lentim colliquefcit, suavissimum spirans odorem, tandem vero si sufflando pergas, flammescit. Tale habetur in officina indultrii viri **Theob. Noblot. Ill. E. C. Wirt. pharmacop. Montbelgardi.**

Agallochum crassissimum & usu probatissimum hodie magna copia **Venetis** habent **Institores**, ut referunt **Pen. & Lob.** gustu astringenti, præficco, non multum amaro, suffitu suavissimum reddit odorem, & succum aut liquorem pinguem, odore, qualem in **Hebeno** vel **Guaiaco** videas, cui concolor, & fortè congenet. **Eidem Lob.** in



Obli. Agallochus præstantissimus verior siue **Xylaloe.**

Istius autem **Xylaloes** quæ **Officinis** notissima, altera species **Antuerpiæ** aduecta, præmulum nobis visa, & munere data ab optimo **pharmacopoto Antuerpiano** **Fræc. Pennino**, in cuius instructissima officina præstat **Frustrum** quod habemus è trunco vulsum, ponderosum est, multis venis constans, pro-

batissimæ **Xylaloes** officinarum ferè concoloribus, sulcis, odore & sapore non dissimilibus, sed suavioribus, amaris, & pinguioribus multò, quæ manducatz lentescant ceræ modo, reliqua ligni materia & superficies alba est, fragilis & fractu facilis, minus aromatica: istud sanè lignum aloes omnium quæ vnquam vidit, sapore & odore vegeussum esse testatur idem **Lob.** ex quo desumpta est icon inferna parte posita. Superior desumpta ex **Taber.**

Porro scribit **Lud. Rom.** in suis nauig. **Ind. Or.** (& ex eo **Cronemb.** qui eius historiam corrupit, tanquam ipse vidisset) triplex genus eius arboris haberi: Primum quod ibi **Calampar** vocatur, optimum, vendi in vrbe **Sarnau**, apud quos nascitur, aureis decem in libras, sed hoc distribui inter reges illarum provinciarum nec ferri ad nos: eius fragmentum duarum vnciarum manibus contritum, inenarrabilem odoris suavitatem super omnia suffimenta spirare: Duo alia genera in insula **Taprobana** haberi: quorum vnum flumine quodam importatur, quod **Lubam** vocant: Alterum, **Bochor**, cuius ortus illis manifestus est: quæ duo genera ad nos conuehuntur.

Ipsa arbor, teste **Garcia Olex** instar est, interdum maior: Vidit enim ramum eius cum foliis. **Fructum** aut **florem** videre non contigit, ob difficilem & periculosam huius arboris diuturnam observationem, frequenter in illis locis ubi crescit, grassantibus **Tigris**. Ferunt autem recens dissectum **Agallochum** nullam odoris fragrantiam gratum esse, nec nisi siccatum, odoratum esse: imò eum odorem per vniuersam ligni materiem non diffundi, sed in ipso arboris corde sine matrice coaceruari. **Crassum** enim esse corticem, & ligni materiem odoris expertem. **Haud negauerim** tamen, (inquit **Garcias**) quin putrescente cortice & ligno, oleosus ille & pinguis humor matrici sese insinuet, illamque odoratiorem reddat: sed ut odor **Agallocho** concilietur, minimè putredine opus est. **Multi** enim sunt adeò experti & dextri in **Agallocho** dignoscendo, ut etiam de recens dissecto indicare possint, siue odoratum futurum, an nulla odoris iucunditate spiraturum. **Etenim** in omni lignorum genere aliud aliò præstantius est. **Solent** autem **Malacæ incolæ** **Agallochum**

Triplis
genus ar-
boris ligni
Aloes.
Calampar

Lubam
Bochor.

Descriptio
arboris.









nec inuicundum in suffitu odorem: gustu nullam ferè qualitatem præ se fert, præter siccantem: estque huius rei causa, quod nimis inueteratum ad nos afferatur.

Narcaph-
thon.

Narcaphthon, inquit Diosc. quoddam *arboris*, vocant ex India quoque deferunt. Est vero corticosum quiddam, Mori *[c. 1. 1. 1.]* libro simile, quod secundi odoris gratia suffitur. Facit suffimentis inferitur: vuluam quoque adstrictam suffitu iuuat.

Vfus.

Lacaphtho.

Agin. nar.

Paulus quoque Narcaphthon Indicam aromam dicit, eiusdem vsus. At in compositione Cypheos Solaris *[c. 1. 1. 1.]* dodrantem admiscet, & ait esse corticem Pini *[c. 1. 1. 1.]* aut alterius cuiusdam arboris. Qua sua hesitantia & inconstantia efficit, ut incertum sit vilius viris doctissimis, an idem Narcaphthon cum Lacaphtho putandum sit. Cuius sanè alii Scriptores non meminerunt, ut sicut ipsorum, ita & nostro seculo, [si idem non sit cum Styrae rubra] penitus ignotum videtur. Apud Plutarch. tamen lib. de Iside & Osiride, in compositione eiusdem Cypheos heliaci, pro *[c. 1. 1. 1.]* largetur habet *[c. 1. 1. 1.]*, corruptè ut videtur, & censet Const. Non est tamen ut quis credat Pini aut Piceæ, [utrovis tandem modo] vocem *[c. 1. 1. 1.]* corticem Narcaphthon esse. Nam si harum arborum corticem Narcaphthon appellarent Auctores, nihil prope vilius in Europa Narcaphtho esset. Quoniam verò ex alio Orbe ad nos adfertur certum est, nihil minus quam Pini aut Piceæ cortex fuerit. Nisi sicca Storax appellata, Narcaphthum fuerit, propterea nos remanere cum Cordo facimus. Certè non consistit unde afferatur, & cuius arboris cortex sit. Ex India non adest, arguit vilitas, quamvis alius quoque indicis consistat.

Narcaph-
thon.

Theophr. lib.
c. 1. 1. 1.

Ceterum quid sit *[c. 1. 1. 1.]* apud Theophr. difficile est pronuntiare in tanta breuitate, cum eius semel tantum meminerit non inuenimus. Suspicio tamen est posse esse Narcaphthon Dioscor. maxime cum Theophr. lib. 9. Hist. cap. 1. inter ea medicamenta recenset, quorum vsum esse ait ad vnguenta, quæ sunt omnia aromatica. Auget coniecturam quoddam ex loco ex Diosc. *[c. 1. 1. 1.]* legendum censent. Hermol. Lacaphthon idem putat cum Narcaphtho: hocque à Plinio prætermisum arbitratu consulto, quia incerta esset natura eius, ut aliorum quoque plurimum, quæ ille Orbi nostro tantum nominibus cognita esse tradit, ut Serichatum Gabaliūque. Marcellus quoque fatetur, nihil de Narcaphtho à se inuentum Theophr. aut Plinium docuisse. Ideoque illis incognitum fuisse suspicatur. Immo in antiquissimo sibi probatissimo codice, nullibi etiam illud caput de Narcaphtho apud Diosc. legi, ac ne vestigium quidem eius ab eodem deprehensum: non leui, nisi Paulus id confirmaret, suspitione, cum liceret Plinio, ab eodem Diosc. à quo plura alia acceperat, hoc etiam accipere, quod tamen ne verbo quidem fecit. Sed Paulus suspitionem amouit, qui eadem penè cum Diosc. dicit. Pro eo verò quod diximus, vuluam adstrictam, habetur

Diosc. lib. 1.

gemina lectio in Codicibus. Sunt enim in quibus *[c. 1. 1. 1.]*, & in quibus *[c. 1. 1. 1.]* legatur, ut vel angusta præclusaque, vel adstricta nec humores remittens matrix intelligenda videatur. Nos cum Marcello & aliis doctioribus Interpretibus id malimus quod ab antiquo medicina auctore Paulo Agin. confirmabatur. Sed de Plinio nondum transactum. Sunt enim qui cum Narcaphthum intellexisse putent per Serichatum, quando *[c. 1. 1. 1.]*: Ed comportatur & Serichatum &

Sericho-
thum.

Gabaliū, quæ intra se consumunt Arabes, nostro Orbi tantum nominibus cognita, sed cum Cinnamo Casiaque nascentia. Peruenit tamen aliquando Serichatum, & in vnguenta additur aliquibus. Permutatur in libras x. vi. Ex obsecrissimo hoc tripode, quasi Latrum memordisset, velut edicto quodam pronuntiat Amatus, Plinium non Narcaphthum appellari voluisse, sed magis Serichatum, huiusque descriptionem, tantum rei sibi incognitæ prætermisisse, tantum ab aliquibus in vnguenta addi, dicere contentum. Ergo Plinio incognitum fuit, & nihilominus Amato cognitum, Serichatum apud Plin. esse Narcaphthum: cum tamen ingenue falsus sit nostro Orbi tantum nomine cognitum. Ut iam non immerito *[c. 1. 1. 1.]* eiusmodi coniectores appellari doctus quidam, qui tantæ securitate pronuntiare, tantæ facilitate diuinare, atque adeo tam audacter pronuntiare didicerunt, quid auctores senserint in his præsertim, quæ velut non intellecta præterierunt, contenti nomina tantum apponere, ut de Serichato & Gabaliū fecit Plinius. Sed fortè illud mouit Amatus, quod ut vnguenta addi Plin. ait, quod idem & de sua Narthe Theophrastum scribere diximus, quam quidam Narcaphthum putant: quodque idem tradat Dioscor. Sed & his & talibus coniectari aut suspicari liceat: ne utiquam verò temerè interpretari assuere.

Mirum etiam Gal. nihil de Narcaphtho tradidisse, quem tamen Diosc. libros diligenter consultasse liquet.

Serapio Abicis cuiusdam testimonio fretus tradit, siccam vocatam Storacem corticem esse arboris Storacem [Styracem resinam] fundentis, qui decoctæ & expressæ liquidæ Styraci superat, quod tanquam verisimile, inquit Cordus, non impugnamus. Hoc tamen reticendum hand exstimamus, nobis videri aliam esse & diuersam arboris, liquidam Styracem fundentem, ab ea quæ calamitam sudat Styracem, ut de Styrace docti sumus. Hoc enim loco non de Styrace, sed Narcaphtho nobis tradendum. Io. Rhoder. Lusitanus Narcaphthum putat esse pretiosam illam arboris cuiusdam Indicæ materiam, quam *[c. 1. 1. 1.]* nomine instructiores Lusitanorum Officine seruant. Sed cum hoc lignum non sit cortex, sed arboris cuiusdam Indicæ materia, Agallocho similis [cuius etiam speciem esse arbitramur] non asumus eius opinionem confirmare. Siquidem Narcaphthum cortex est arbori sax. detrahus. Aquilæ verò lignum, non cortex, sed lignum est, quamuis nonnunquam etiam cortice vestitum afferatur, sed raro, & cui non sit eadem, quæ ipsi ligno in odore & sapore gratia, de quo plura diximus cap. de Agallocho & Ligno aloës. Fatetur itaque ingenue Cordus sibi nihil certi de Narcaphtho constare, horratūque alios ut id inquirent. Idem in Diacastorio D. Nicolai annotat hæc: Storacis rubæ: hoc enim loco non est accipiendus *[c. 1. 1. 1.]* ille fuscus & aridus, quem vocant Thymiana, atque malè Storacem rubeam: sed Storacis Calamitæ purissimæ guttæ, quibus rufus est color. Item ad Troch. Alyptæ Molch. Styrax rubra hic non significat Thymiana, aridum illud nigrum corticem &c.

Non desunt interpresia, inquit Maub. [si modò ad nos hodie deferatur] id omnino esse Narcaphthum, quod vulgò Offic. vocant Tignam. Nam Tignam non aliud integrat quam Thymiana apud Græcos. Serap. Narcaphthum *[c. 1. 1. 1.]* vocat dicitur etiam Arab. Nabach. Ital. Agallocha atque etiam

Serapio

Serapio

Serapio

Serapio

Serapio

Tignam

Lafabara

Nabach









Santalum
magna of-
fusus.
Descriptio
arboris.
Folia.
Lanceola.
Flos.
Fructus.
Arbor re-
centi modo-
ra.

Santali arbores esse affinitatem, ut pallidum à candido discerni non possit, nisi forte ab ipsis incolis, qui eas eas mercatoribus vendunt. Ceterum Santalum in Nucis Juglandis magnitudinem attollitur, foliis admodum virentibus Lenticuli æmulis: flos ex cæruleo nigricans: fructus Cerasi magnitudine, primum viridis, deinde niger, insipidus, & facile decidens. Inodorum ferunt esse arborem, nisi detracto iam cortice exiccata.

Quantum igitur ex hac Santali descriptione colligere licet, valde [inquit Clusius not. ad Garc.] erit dubitandum, an legitimum Santalum pallidum habeamus: quandoquidem scribit vix in Lusitaniam deferri, quoniam eius pretium maius sit apud ipsos Indos quam apud Lusitanos. Fieri igitur poterit, ut aliquod aliud odoratum lignum nobis pro legitimo Santalo obtrudatur. Certe candidum nostrum planè inodorum est. At legitimi pallidi libræ fragmentum, è stipite aliquot pedes longo, semipedem crasso, recisum, donavit mihi anno 1581. Morganus fragrantis admodum odoris. Est verò id graue, solidum, nodosum, colore intus flauum, odore suauiter reficiens cerebrum, & grato sapore palatum feriens.

Santalum
arbor.

Apud antiquiores Græcos nullam Santalorum mentionem inuenimus, sed apud Arabes qui ea nobis ostenderunt, & tria fecerunt, *album*, *rubrum* & *luteum*, quorum placita de Santalis infra inter vires videre licet.

Santalum
herba, Plin.
arboris.

Apud Plin. Sandalum non est arbor, sed herba frumentacea, de qua suo loco. Sunt tamen qui Sericatum Plini Santalum flauum esse coniectentur, à Serici crudi colore, ut annotat Dalechamp. Sed optauerimus tales Laurum in solidum momordisse, qui ex tam leui occasione coniectari, & ut ipse censent, interpretari, nos, ludificari, audent.

Videtur tamen Galenus de Santalis tradidisse, quoniam eum citat Auicenna: sed valde suspicamur ne id falsò: Nam si cognita fuissent Santala Galeno, utique eorum passim non vno tantum in loco meminisset: ut nemo nunc quiritari queat ea capita vel libros perisse. Extat quidem de Sandali libellus, sed falsò Galeno inscriptus cui de secrete Galeni titulus est. In eo ubi de Ictero traditur, Santalorum sit mentio quamuis non santalum, sed Mahazari legatur, quam vocem Recentiores quidam, santalum citrinum interpretati sunt, ut postea specialius dicetur. His autem non exhibendam esse fidem doctissimi iudicarunt. Ed quod ab Arabe quodam collectus sit is libellus, & Galeni nomine inscriptus. Actuarius verò ex recentioribus Græcis in Diaromaton suum Basilicum inter alia, recipit Santali tria genera, nempe *Citrinum*, *rubrum* & *candidum*: totidem & Hermol. genera facit: sed citrinum *Luteum* vocat.

Tria genera ista, ex tribus distinctis arborum generibus ex quorundam sententia prouenire tradit Curtius: quorum primum rubrum, inodorum: alterum luteum: tertium album, quod in abscessu frigiditatis sibi gradum vendicat. Rubrum verò aliquantò ceteris frigidius existimari, omnibus præferri luteum, si pingui quodam scateat. Et statim subdit: & quia odorum, quod rubrum est, secundas partes obtinet. Album tertiam sibi classem arrogat, quod inodorum est, duobus prioribus suauiter spirantibus. Ut nunc in magna suspitione versetur bonus ille vir, ne credatur neutrum istorum vidisse, contrectasse, ac minus etiam olfecisse. Nam quid sibi velit, dicēs rubrum inodorum: & postea odorum, & suauiter spirare, nec scimus ipsi, nec intellexit ipse. Quis

Tom. I.

odor rubri sit, post dicetur. Santalum citrinum inuentu rarum Plateario & Syluio: Hic speciatim Santalia [sic enim vocat] quæ sunt in officinis, acri sapore, linguam mordentia, præsertim Citrinum, minimè in vsum recipienda censet: quod non aliam ob causam scripsisse videtur, quam quod Santala ab Arabibus in tertio refrigeranti ordine collocari videret, quam temperiem, vel potius temperiei excessum Santalis hodie in Officinis prostantibus vix nostro iudicio rectè tribuerit: ut ex hoc, quoque dubitari queat, an nostra Santala sint Arabum. Monachi in Mes. tradunt, Santalum citrinum non amplius adferri. Aromaticos hodiernos excauare medullam ex albo, & pro Citrino obtrudere: immò illud ipsum esse allerere. Sed magnopere errare. Vnumquodque enim eorum genus suam propriam habere arborem, esseque diuersas arbores, & non duas. Omnium testimonio album esse minus bonum. Inde colligunt: si Citrinum fuisset pars albi, non fore melius rubro, sed potius eo vilius quod est contra omnes autores. Addunt, repertum quandoque scriptum Sandali Mazabari: quod accipiendum sit pro citrino. Sed hæc vox tum hoc tum alios non parum torlit. Etenim in descriptione aromatici rosati Gabrielis, & in aromatici rosati min. & in aromatici. Cariophyl. & in confect. Ramich, & in cap. de Tamarindis, & in cap. de Sorda & aliis similibus post Sandalum immediate sequitur Machazari, vel Mazahari, vel Macizir &c. De Santalo autem dubitant debere intelligi Citrinum: quia semper [ut plurimi testantur] si legatur Sandalus absolute, Citrinus intelligitur: qui est magis aromaticus & præstantior, teste etiam Serapione. Vocabulum proximè sequens Sandalum multo ex iunioribus voluit referri ad Santalum tanquam adiunctum: unde & pro Citrino siue luteo exponunt.

Quod confirmauit Simon Ianuensis, qui scribens de Citrino. Vocati ab Aben Melux Mazahan. Ultra septuaginta Barbaras variationes huius barbari vocabuli, per varios codices, in variis descriptionibus reperimus: *Machazari*, *mazahari*, *mazazari*, *mazazir* &c.: & nonnulli simpliciter legunt *Sandali*. Quidam ex Recentioribus, *Sandali citrini*. In quibusdam antiquis exemplaribus, & in priori impressione librorum Mesues, inter simplicia sunt quædam Synonyma in quibus legitur *Machazir*, id est, odoriferi. Quæ sanè explicatio bene conuenit Santalo citrino. Garcias tamen Arabicarum vocum non indiligens vestigator & interpret se prorsus ignorare fateretur, quid sibi velint ista vocabula, nisi forte *Machazari* significet è Malaca pretium: aut *Mazafrani* legendum sit, quod pallidum aut croceo colore infectum sonat. Antid. Rom. Sandalum *Nazzambari*, Sandalum citrinum seu odoratum exponit. Io. Wittichius, in febre Epidemica præscribit *Santalum Machaziri*, quod itidem interpretatur citrinum odoriferum. Medicorum inscitiam, vel pharmacopolarum ignauiam, taxat Bellon. qui Sandala nulla ratione vulgò Cedrum vocant. Nullam autem Sandalus cum Cedro habet affinitatem, & à neotericis Arabibus tantum cognitus. Sed error hinc emanauit, quod cum Theriaca Cedri ramos admittat, quibus illi carent, Sandalon pro Cedro assument.

Cæsalp. duo tantum Santalorum genera agnoscere videtur, quæ ligna odorata vocat: *candidum*, & *rubrum*: *Flauum* autem quod hodie habetur, esse candidi medullam multo suauiore reliquo ligno quod album est.

53 3

Santalia:

Anuspha
Santala
fructu ara-
bum.
Santala
Citrino
non carere.
Tres arbo-
res duntax-
ta.

Machazari
vi.
Mazahari
vi.
Sandalum
absolutum
quod.

Mazafra
vi.
Nazzambari
vi.
Machazari

Cedrum

Error mo-
dorum
et Phari-
macop.

Sunt tamen plures alii qui tria distincta genera cum Arabibus agnoscunt, de quo, cum arbores ipsas non nouerimus, nihil certi statuere audeamus.

In Santalorum collatione inter se, & estimatione non consentiunt Authores. Ruell. omnes in frigidorum classe ponit, sed rubrum aliquantò frigidius dicit: satis temerè, quoniam ex suo cerebello. Excusandus fuisset, si dixisset ex Arabum sententia. Matth. omnibus præfert pallidum: secundum locum tribuit albo: postremum rubro, quodd, ut ille ait, nullò commendetur odore: priora verò duo suauiter spirent. Remissius quàm in Italicis lucubrationibus, inquit Apollo, ubi utrumque odoratissimum dixit: & si demum rebus nares adinuisset, deprehendisset utique id, quod vulgò citrini seu flauo nomine circumferatur, multò fragrantius esse albo. Amato quoque luteus siue citrinus odoratissimus est, & ceteris melior. Tertius verò albus, medium inter rubrum & citrinum possidens. Præfert igitur rubrum albo, cum tamen hunc odoratum, illum inodorum plerique faciant. Lacuna sanè citrina & alba valdè odorata dicitur de rubro, dicit nullum habere odorem effatu dignum, sed aliquem tamen acquirere ab aliis Santalis. At radians ille Apollo citrina seu flaua sola ferè odorata dicit, quamuis alba communem ligni colorem habentia, & flauo inserta [ut ille ait] aliquantulum etiam redolent: Bissanolumque reprehendit, quodd in examine vnguenti Santalini falsò nihil omnino habere odoris censeat. At non videt tot radiis stipatus, à se quoque non nisi per accidens tribui odorem albo, quando ait flauo inserta aliquantulum etiam redolere, satis apertè his verbis asserens, quod animo & contradicendi studio taxat. Idem Musa Rubrum tradit, omni fragrantia destitui, etsi pro Santalo absolute, illud quidem accipiendum velint, quasi magis insuadens, ipsi tamen Apollini [Serapionis auctoritate freti, qui ex Santalis melius esse dicit flauum] magis flauum ardet, quamuis calidius.

Cordum insuper taxat, quodd per Sandalum Michoxiri, vel ex Genuensi codice Mazahari apud Meluem speciem Citrini Santali, à vulgari diuersam atque odoratiorem supponit: hoc nimirum eius adolescentiæ inurendum esse dicens, quodd vetustate exanimata citrina Santala, recentibus collata, minus fragrare compererit, proinde in specie diuersa existimauerit, quum præter enarrata non sic dare quartam speciem Santalorum. Quod verò quidam Cedrum putarunt, & calida officinarum Santala cum Syluio, id in rubro nullo pacto admittendum censet. At nos nec alba quidem Cedrum existimari debere censemur. Ipse verò Apollo nobis videtur nimis securè asserere, non dari quartam speciem Santalorum: quasi ille solus omnia viderit. Si diutius vixisset Cordus, utique docuisset eum, quid intellexerit per quartam suam Santali speciem, [quam sanè ne nos quidem intelligimus] nec suam famam eius radiis obfusari vnquam tulisset, iuuenis quotquot vnquam vixerunt præter ætatem de Repub. Medica meritis.

Interim quoque mirari subit, ubi C. Bauh. legit, Fr. Alexandrum in suo Apolline quartum Santalorum genus esse voluisse: cum ex prædictis eius verbis apertè pateat, eum contrarium asserere.

Porro apud authores scriptum inuenias *Santalum* & *Sandalum*: *Santalum* & *Sandalum* lignum: *Serap.* Auc. & Mauritanis ceteris itémque Persis

corrupto nomine *Sandal*: Ab incolis locorum, in quibus nascitur *Chandanac* teste Linschott. In Timor insula omnibusque Prouinciis Malacæ vicinis *Chandama*: à Decaninis, Gutaratis, Cananinis, aliisque Indis *Sercandaa*. Lusitanis & Italicis *Sandalo*. Gal. du *Santal*. Germ. *Sandel* *Sandels*holz.

Ceterum in pallidi penuria albi & rubri partes æquales præscribendis non censet Garcias, vult Sepulveda, sed potius solum candidum. Magis enim pallido affine est album, quàm rubrum. Pen. & Lob. in Adu. alicubi Medicum quendam anonymum obiter carpunt, qui ridiculè conquecebatur perperam fieri hodie, quodd Santalum citrinum adulteretur Ligno aloës. Ita quidam imperiti de rebus incognitis quiritari solent, ne nihil scuisse videantur. Sed soli docti eiusmodi Leones ex vngue norunt, & à verè petitis discernunt.

Scribit Matth. Santalum in vtraque India Syluis densissimis ingentissimisque nasci: Syluium, ex agro Calicuti Indiæ emporii aduehi à Lusitanis. Sed de hac re certiora nos docent Garcias & Linschott. Album & flauum ex insula Tymor aduenit, quæ lauis adiacet, vndique portuosa. Integre ibi albi flauique Santali tylox visuntur, frequenter hinc commercio per totam Indiam distrahuntur. Aduehitur autem vtrumque Santalum Lusitanorum Liburnicis ex Malacca & in Couchin & Goa maxima totius Indiæ emporia inuehitur. Peruenit enim nunc Calicut amplissimum olim emporium. Inde scilicet ex Couchin & Goa potissimam partem exportant in Malacur, Canara, Bengala, Decan, & Guzarate: minima verò defertur Ormuz, in Arabiam & Lusitaniam. Inde vix in Lusitaniam legitimum Citrinum deferri putat Garcias, cum multò pluris ibi ematur, quàm in Lusitaniam delatum vendi possit. In exteras regiones delata Santali arbor etiam crescit. Vidisse enim idem testatur in Andanager totius regni Decan vrbe primaria, ubi regiam suam habet Nizamoxa, attamen non fuisse odoratum. Habet autem Nizamoxa istos hortos amplissimos, omni peregrinarum arborum, etiam nostrarum, genere excoltissimos, quæ fructiferae sunt. Significatum ipsi fuisse, in insula D. Laurenti Santalum etiam inueniri, & ipsos Aethiopes incolas sic asserere. Verum intellexisse postea non esse Santalum, sed ligni duntaxat genus odoratum, cuiusmodi ibi plurima inueniuntur. Massæ tradit in Chersoneso insula primæ notæ Santalum album nati. Leuin. Huius in Nauig. Holand. Insula, inquit Madagascar, id est, Lunæ, nunc S. Laurentii, quæ ex maximis & distissimis insulis censetur totius orbis in India Orientali abundat Santalo, Ambato & Ebores.

Serapio ex multorum Arabum autoritate Santalum frigidum esse statuit in tertio gradu. Auct. verò in hinc secundi ordinis ad tertium vsque, sic cum in secundo vterque. Rubrum tamen Serap. frigidius esse dicit albo & citrino: illudque præ ceteris, humorum fluxum inhibere, Erysipelatis, inflammationibus, podagræ à bile ortæ ex succo Solani, aut Sedi, aut Portulacæ, aut Lenticulæ palustris vtiliter imponi. Simile esse Fausel frigiditate & siccitate, atque adstrictione, robore gingiuas & stomachum. Omnia Cardiacæ à bile & calidis febribus aduersari. Trita & mixta cum aq. ros. & modico camphoræ vtiliter temporibus illini ardori capitis. Santala alba mediâ quantitate sarcocollæ adiecta, & cum albumine oui temporibus imposita, ad idem valere, & aduersus descensum humorum in oculos, incipientisque



utrumque inodorum sit. Musi quoque diuersa-
rum arborum ligna esse testatur. Et sanè ipsa
lignorum facies & color, paulò diligentioribus
sensibus, ita differentiam ostendunt.

*An odor. et inest vbi-
talem rub.* *Cur. not.* *Odor Ca-
stori.* *Loc.* *Descriptio* *Fructus* *Similitudo* *Loc.*
Lis inus est et Authores de odore Santali
rubri. Odorem ei inesse negant Mat. h. eolus. A-
matius, Musa, Lacuna, Scaliger, Apollo, Calp.
Bauh. alique: & si forte non nihil redoleat, ei
per accideris inesse illum odorem, quod cum a-
liis importati hileat, quidam ex his dicunt. Cur-
tus in utrumque paratus, modò inodorum, mo-
dò odoratum, & laute spirare pronuntiat. Non
desunt verò, qui tenus quiddam etiam per se spi-
rare sentiant: præsertim recens, quibus contige-
rit videre tales iudicant. Cæsalpinus aliquid non
importat: varia forte videri, quoddam exiguum o-
doris, quod a nullius, quoddam præterea lon-
gè odoratus flano, non sine quadam Castori
simulatione, sed metæ coniectura.

Inficere negant Garcias, Acosta, C. Bauh. At
Clutius testatur Santalum suum inficere. Et
Hiltor. Lugd. Santalum rubrum sepe inficere so-
lere tradit. Indistinctum & in singularibus versatissi-
mus Medicus F. J. Platerus Archiatros Basilin suo
libro de febribus, ad febres continuas, Santalum
rubrum, aqua maceratum, & rubrum colore con-
colorat. Omnia nostra fragmenta, habemus
autem non paucis de diuersis locis conquisi-
ta, in madefacta & linteaminum affricata, rubro id
tingunt, sed leuiter: in alia, alia magis, alia mi-
nus saluum inficiunt, quoddam nihil ferè. Aquam
maceratione non facile tingunt, nisi in puluerem
reducta diu macerentur, aut ebulliant. Pyxidula
toto recensere laborat, vel per se, vel saluam
madefacta linteola affricata imbuebat, colo-
rem eliciunt quidam aceto, alii Aqua vitæ, ac ru-
bro colore inficiunt Tragacantham ex saccharo. Si
qui sunt qui contrarium obseruauerunt in suo, ha-
bent quod dicant, vel differre inter se Ligna San-
tali, vel in eo saltem, vel se aut nos non verum
Santalum agnouisse. Iudicium feret aliquando
possibilitas.

Synonymia *ling. ar.* *Descriptio* *Fructus* *Similitudo* *Loc.*
Hispani *Sandalo rojo* & *bermeja* vocant. Ital.
Santal. rosso. Gal. *Santal rouge*. Germ. *Roter San-*
del.

Santalum *rojo* *rub.* *Descriptio* *Fructus* *Similitudo* *Loc.*
Io. V. Vittich. de Feb. Epid. cum mania præscri-
bit Santalum rosaceum rubrum: & postea iterum
Rhodosantalum, id est, rubeum odoratum, non
vulgare, seu Pseudosantalum, quod nihil valet.
Sed existimamus bonum illum virum, præscribere
Santalum sibi incognitum. Tale enim nullum ha-
cenus nobis innotuit.

Adulterium. *Descriptio* *Fructus* *Similitudo* *Loc.*
Cæterum Verzini vulgò dicti, seu Ligni Basi-
liani rubri puluere adulterari odoratum Sanea-
lum, annotat Cæsalp. Sed si odoratum esset ru-
brum, facile detegeretur succus ex his arboribus, vel
ex odore remissiori. Non diffitemur tamen posse
& solere Santali rubri puluerem illius loco ab im-
postoribus diuendi: talem enim & nos habemus,
ab infitore quodam Santali rubri nomine da-
tum. Sed ex diluitori colore & facillimè inficien-
te facile succum deprehendes.

Si succum *depreh.* *Descriptio* *Fructus* *Similitudo* *Loc.*
Santalo absolute apud authores posito, qui-
dam rubrum accipi volunt: quorum sententiam
non temerè improbauerimus, si ad calidos affe-
ctus usus esse debeat, quicquid ex Serap. clami-
tet Apollo. Quicquid enim virium antea ex Ara-
bis aliisque aduersus ardores & varios morbos
calidos præscriptum est, hinc potissimum compe-
tere existimamus, quippe quod frigiditati proxi-
mum, aut in primo refrigerantium [secundè ni-
mirum in tertio Enoch. Roel. statuit,] collocatum,

insuper etiam lenem quandam additionem ad-
tineat, in prædictis affectibus conuenientissimum.
Consule itaque cap. præced.

Rubri Santali apud Indos exiguum est visus, & *Descriptio* *Fructus* *Similitudo* *Loc.*
rarus. Veniunt tamen contra feruidas febres, eo
tempore, frontem, & arterias inungentes. Ad alias
regiones magna copia transfertur, potissimum in
Lusitaniam Occidentalemque regiones, quod
summi in Medicina usus sit. Indi ex eodem ligno
idola sine Pagodis & delubra sua interdum fabri-
cant: quæ de causa crassiora ligna magis exporan-
tur, maioriq; pretio redimuntur, auctore Gar-
cia. Festiuè laus D. Platerus docet in febribus ar-
dentibus delirantes decipere infuso aut decocto
santalorum rubrorum, eos qui vinum expetunt.
Gratius & melius etiam efficietur, si addito Gra-
natorum succo vini aliquem saporem ei concil-
lies.

Porro rubrum Santalum non nascitur in Ti-
mor, sed loco valde distante, videlicet in India *Loc.*
intra Gangem fluvium, in Tanasarium, & mari-
mis quibusdam Charamandel: ex his locis omne
Santalum rubrum adferri pro certo asserit Gar-
cias.

ABELICEA SIVE SANTALVS ADVLTE- RINA CRITICA.

CAP. XXXVII.


Descriptio *Fructus* *Similitudo* *Loc.*
Abelicea auctore Hon. Bello, arbor est ma-
gna, recta, multis ramis prædita, aspectu
pulchra, cui folia Alaterni, sed rotundiora, po-
fundè serrata: [quos flores proferat, ignorare se
fatetur.] Fructus magnitudine Pipenis, figurâ qua-
si rotundus, colore inter viridem & nigrum me-
dio: materies ligni dura, & paululum odorata,
pulis enim huius Santali imitatur: vnde Pseu-
do-santalus Critica iure appellari posset. Arbor
hæc in solis montibus Leucis, eorumque adiacen-
tis iugis provenit, & ex ea trabes fiunt.

Antiquis idem ignotam fuisse putat, si sit Vi-
mus montana Theoph. descripta l. 3. c. 14. Sed folia
neque leuiter serrata esse, neque magna, verum
longè minora. Vocatur *Abelicea*.

BRASILIVM LIGNVM

CAP. XXXVIII.

Descriptio *Fructus* *Similitudo* *Loc.*
Brasilium vulgò dictu-
rum & ponderosum lignum
est, delibratumq;
ad nos importa-
tur, pectinibus
satis rectis, colo-
re sanguineo, for-
is, & quæ parte
imbres Solisq;
est pallum, in-
trinsecus autem
dilucidius ruse-
scit: sapore dulci
est, salivamque
commansum, aut
liquore cui fuerit
infusum, colo-
re rubro tingit.
Cordus sic de-
pin-



pingit. Presilium lignum aliquam in materia com-
Acere habet similitudinem, colore tamen rubet:
inuenitur etiam in ruffo candicans, sed prædictum
melius est: crassitudine Guaiaco æquiparatur: pe-
ctines habet rectos, idcircoque faciliè finditur, leco-
bina asperiore in assulas redigitur, quæ in liquo-
rem, quo decoquantur, rubedinem suam depo-
nunt, tinctoribus expetitam, scribendis etiam
rubris literis aptam. Eligito materiam eius ruber-
tissimam. Decorticata ad nos adfertur, ut pluias,
vel alias ex industria assulas aquas faciliùs imbibe-
re possit: hoc enim pacto id quod pallidius est,
floridior emacquirat colorem: quidam etiam li-
xiuo humectant: faciliè deprehenditur: purpu-
rascit enim in superficie, intus remanente pallo-
re. Saporem habet modicè dulcem.

Delectus

Terni data-

gunt

Descriptio

Arbor

Cardano

Folia quer-

cino.

Quomodo

Presilium

inuenitur

fit

Folia Buxi

Lignum

naturali-

ter sicum.

Dalmagis

Rondelet

Calons.

Verzinum

Aspalathum

Synonyma

Arborem Cardanus non magnam tradit, Enzi-
nz similem, sed tenuiorem, & magis obliquam:
solum quercinum non tamen asperum: corticem
ex arbore propter siccitatem spontè excidere. Li-
gnum colorum varietate, cum aliis arboribus cer-
tare. *Verzinum* vocari.

Longè aliter describit Theuetus, simulque
modum tradit quo reperta sit hæc arbor. Portu-
galenses (inquit) regiones perquiritentes, (nem-
pe terre Americæ) viderunt pennas rubras, qua-
rum tingendarum rationem resciscere voluerunt.
Quibus ab incolis lignum Bresilium ostensum
fuit, visu pulcherrimum. Cortex exterior totus
cineritius est: lignum internè rubet, maxime in
medullis, quod excellentius, cuius etiam plus
asportant. Tunc igitur magnam aduexere Portu-
galenses quantitatem, quod adhuc fit. Hæc ar-
bor folia fert si nuda Buxo, ita parua, sed spissa &
crebra. Nullum gummi emittit, ut quædam alie.
Olim maioris liebat quàm nunc sit, maxime in
Oriente.

Lenius arbores in Quercuum æt tudinem ex-
crescere scribit, quasdamque arbores tantæ est
crassitudinis, ut tres homines amplexi non pos-
sint. Folia Buxi esse viridiora, fructum non ferre.
Lignum non esse humidum ut pleraque ligna, sed
naturaliter siccum: vtendo minimè & penè nul-
lum fumum emittere, cinereum quoque tingere.
Qua ratione *Bresilium* lignum dicitur à *Santalum* ru-
bro, antea dictum.

Apud Veteres nihil de hoc ligno proditum no-
uimus. Existimatur tamen primò Lignum hoc ex
Regina Saba Salomoni delatum, cuius sit mentio
in historia 1. Regum dictum *Dalmagin*, ut notat
Theuet. Magnus ille dux Onesicritus in itinere
intulz Taprobanz sitz ad mare Indicum Orien-
tale, attulit huius magnam quantitatem, quod
multum probauit Alexander.

Rondel. in praxim. l. cap. de Apoplex. tradit
Castaneas quæ adferuntur ex India forma renis,
esse fructus Ligni, quod vulgè dicitur *Bresil*. Ve-
rùm cum Theuetus dicat Brasilianam arborem
non ferre fructum, per Castaneam Rondeletii in-
telligimus *Calons*.

Peculiare quid, more suo Calalp. quoque sa-
pit. Spinam vulgarem fulloniam, quam in Hi-
spania Aspalathum vocari à quibusdam testatur
Plin. hodiè *Verzinum* vulgè vocari. Lignum ru-
brum crassitudine tibiam excedens, rubeo co-
lore inficiens, cuius puluere adulterent odoratu
Santalum. Sed eius opinio de Aspalatho iamdu-
dum explota est à pluribus, aduertat etiam Lector
arboris Brasilii crassitudinem, longè aliam traditā
ex Lelio.

Olorius in Brasilia admodum frequentes & al-
tissimas dicit arbores. Earum quoque aliquoties

meminit Pet. Martyr. de rebus Oceanici & noui
orbis, Arbores Coccineas vocans, quarum lignū
mercatores Itali *Verzinum*, Hispani *Bresilium* ap-
pellant. Gesn. *Bresilium* lignum & *Bersilicum*. Fuchl.
notat *Verzinum* vel *Bresilium*, quod è *Brasilia* adfe-
ratur. Incolæ *Arborem*, Theuet. It. *Ligno Ver-*
zino. Gal. *Arbre de Bresil*: *Bois de Bresil*. Germ.
Presilgenholz.

Calp. Bauhin. apud Matthi. Bresili ligni duo ge-
nera facit: alterum rufum, alterum citrinum: ruf-
sum aliud ruberrimum esse, aliud in ruffo candica-
re: hoc tinctoribus expeti. Citrinum verò *Sagia*
vocari. Verùm hæcenus apud neminem legi-
mus vllum Bresilium citrinum sine Bugiā ex Bra-
silia adferri.

Cæterum iam suorum nostrorum memoria de-
portari cæpit hoc Lignum ex Brasilia aliisque in-
tulis longo Libugæicarum nauigatu quaesitis.
Munsterus in Calce & regno Pego nasci scribit.
Massee teste, ea Regio vbi crescit *S. Guis* nomi-
ne vocata in aliquot annos: sed à Bratilio rubro
ligno, superinductum Brasiliæ cognomen.

Theuetus monet Bresiliū quod provenit ver-
sus fluuium Ianairel, Maripon, & Capo de Frie,
melius esse altero, quod vocatur verius Caniba-
les & totam regionem Marignan.

In Officiis Europæ hodiè nihil frequentius. Vfus,
imbuendis magnopere velleribus aliisque rebus
expetitum, ex quo Infectores in lignum faciunt
quæstum. Non ut obiter dicit Ruell. in tenuissi-
ma segmenta vel taleolas findunt, & aliquot die-
bus macerant lanas, elutriatæque cortinis inco-
quant, ut succum liberaliter ebibant. Colos tan-
tò dulcior, quantò saturitate fraudatā, minus
sanies huius epotantur. Sed si plūs sitiant velle-
ra, vel largi succo saturantur, inebriantur, lub-
nigante colore resurgunt. Centaret is infestis-
simus color cum purpura, si pannis tam pertinaci-
ter hæreret ut primam gratiam gestatu attento, aut
vfu non exueret. Sed vellus huius succo non sem-
per tenax, in rubrum colorem degenerat.

Qui librorum mangonio dant operam, segmē-
ta ligni aceto tantisper macerant, dum omnē colo-
ris vim ad se rapiat, cui nonnihil gummi, ne char-
tas penetraret adiciunt.

Alii lixiuo potenti, & adhuc feruente illius sco-
be immittunt: vitro deridim, optimum est ad
hanc rem, quia tenuissimum, suffi itaque ligni pars
octava, additoque modico alumina inter cine-
res calidos per horam excoquitur, proutiūque
in vsum admittitur. Nec opus hic guami Arabi-
co, nisi splendicantes literas habere voles. Alii
etiā loco aceti aut lixiui aquam simplicem sumūt,
sed efficacius priora tincturam eliciunt. Si diu-
tius coquas quàm par sit, sanguineum colorem ac-
quiret: sed si pergas, cæruleus aut atropurpureus.
Neutro tamen modo, ni protinus in vsum admitt-
tatur diu seruari potest. Tempore enim muta-
tur, quemadmodum & in velleribus ipsis. Hæc
que non ineleganti purpureo librorum margines
ductis concinniter lineis exornant. Idem atra-
menti scriptorii vice, voces quas velle margini-
bus adnotari, hæc rosacea sanies ipsam exarant.
Quare roseum, vel potius Rosetum vulgus no-
minant. Hoc tam elegantè venerè libros com-
mendat, ut lassos & continuo conspectu nigri-
tis & candoris fatigatos, oculos sua iucunditate
recreet.

Cinis quoque tingit lintea colore rubro, ut
nullo sapone possit elui: quod & se obseruasse ali-
quando testatur Lenius. Indi eodem ligno vtun-
tur ad tingendos tuniculos suos bombacinos &

Arbor

coccinea.

Bresilium.

Bersilicum.

Verzinum.

nunc.

Gemma

duo.

C. Bauh

not.

Locus

Delectus

Vfus.

Tropendi

modus.

Liquor

rubens ad

scripturam

Alia pa-

randi ratio

Rosetum.

pennas, quibus elegantissimam colonis gratiam conciliare norunt.

Iam in multas rerum perpulchrarum formas lignum tonatur. Hoc etiam fabri lignarii ad tenebrellulas, ad operum pretiosiorum lautitiam & elegantiam videntur. Eodem etiam gladiorum cultellorumque manubria munantur & alia leuia ope a tam tornatili quam dolatili opera fabricantur. Nec omittendum hoc loco Fallopii experimentum, quo dignoscas alumen in aquis medicatis seu thetinahibus contineri. Coquatur lignum Bresiliu ex aqua donec penè nigrescat, de qua affunde supra sedimentum distillationis illius aquæ, & si alumen adsit, color ille ad nigredinem vergens mox reddetur dilutior clariorque. Huius ligni vis medica nulla hactenus innotuit nobis.

*Vi digno-
scas alumen
contineri
in aquis
medicatis.*

BRESILIO SIMILE LIGNVM VERNIM- BOCK GERMANIS DICTVM.

CAP. XXXIX.

Descriptio Vidimus apud quendam Fabrum lignarium Vnam metueam, ponderosam admodum, quippe quæ aquæ iniecta statim fidebat, solida Ebeni instar, rubens. Id lignum Vernimbach nominabat. Aient in oppido Wirtembergico Balb Insector eo vti ad tingendum. Vlmæ Braunpresteren nominant, quasi dicas, Bresiliu purpureu. Argentina non incelebrum portio perquiruntibus, quid esset Vernimbach, frustra duo obtulerunt Initores, exteriùs nigrescentia, intus rufescentia, solida valde, & pondere suo aquæ fundum petentia. Ingeniosus D. Frid. Meyer, Armamentarius Argentinenfis elegantem colorem rubrum pro scripturâ parare dicebat, addito gummi & alumine. Idem aiebat, adiecto puluere concharum laqueum purpureum reddi colorem.

*Vfus.
Liquor ad
scripturam*

*In quo des-
ferat
Bresilia*

Hoc lignum differt à Bresilio nobis Geneur pro Santalo rubro exhibitum, quod non fideat, habetque quo cū Fagineo ligno nonnihil conueniat, [si colorem demas] præsertim maculis illis transuersis atque crispantibus per substantiam eius sparsis, neque dulcorem illum masticeum præbet.

Vernimbach vocant fortè Germani descriptum lignum, à loco unde defertur: scribit enim Theuetas, constitutam esse arcem à Lusitanis, quæ nominatur Fernambou, vbi syluestres homines mercaturam cum eis exercent.

An Cordo in Obs. Materia arboris cuiusdam peregrinæ, colore inter Sandalum rubrum & Bresiliu medio, ex qua faciunt capulos cultorum Nonnbergæ.

ARBOR ΜΗΤΡΟΣΙΑΜΡΟΣ SCALIG.

CAP. XL.

Descriptio GRæcum fortasse nomen à nobis inditum plus Historiæ conueniet, quam ingenio nostro. Tam enim est prope mendacium, quam nos à voluntario mendacio alieni. Animi tamen gratia reponetur hic. In Iava maiore, aient, raram esse arborem, cuius in edulla ferrea sit: exilis illa quidem, cæterum porrecta ab imo ad summum plantæ saligium. Atque eam fructum gere-
*Mirabili-
ter.*

re ferro impenetrabilem. Eadem refert Nic. Costinus in luneratio suo. Deinde expersificabatur.

LIGNVM BRESILIO SIMILE COERV.

LEO TINGENS.

CAP. XLI.

Descriptio Haud ita dissimili sacie Bresilio est lignum quoddam à Porentruyensi Pharmacopæo nobis donatum, colore & pectinibus Bresili vulgans, sapore tamen luculentiore, & cum dulcedine nonnihil acris, & odore grato, quem acquisitum ægant: sed lignum esse recensius, quod odoratus: in segmenta diuisum solent Officina Gallie diuendere, quibus dicuntur *Bou d'Inde*: Germanis *Pesèil*: hoc etiam leniter masticeum cæruleo colore tingit, idè à tinctoribus expectant, ad coriorum & telarum tinctoriam.

Montbelgardenses & Porentruentes accersunt ex Trecenti vrbe & Argentina, emunt libram aliquot grossis: tinctoriam meliorem reddi dicunt, addito Alumine.

LIGNVM VIOLACEVM BRESILIANVM.


CAP. XLII.

Descriptio Vidimus in Bresilia, inquit Leriùs, lignum naturaliter violacei coloris, & eo ligno attulimus regulas. An Hist. Lugd. ex Theueto Arbores in America ligno purpureo, ex quo pulcherrima tinctoria fieri posset?

De hoc autem ligno sic Theuetus: In America provenit lignum colore purpureo, ex quo meo iudicio, pulcherrimæ sculpturæ parari possunt. Dubito an fuerit Lignum purpureum, in quo Plutarchus scribit Caium Marium Rutilium primum Dictatorem ordinis popularis inter Romanos, curasse sculpi bellum, personarum imagines 369. digitis minores: delatum fuerat lignum ex suprema Africa. Est & quoddam lignum Violaceum *Erratib.* dictum Leonis Africano in Descript. Africa, quo videntur Medici ad Luem Veneream curandam: Iuniperus maior Scalig. quam suo loco trademus.

LIGNVM NEPHRITICVM, COERVIO FLAVO TINGENS.

CAP. XLIII.



Industria & studitis Idol. Ducis VVitem. Medicus & collega noster Dr. Schopffius mandante E.C. misit nobis nomine *Pali* Indiani crater ligni huius, fabre sanè factu, amplum satis, cuius Diameter fere spithameus: cuius pulchritudo non vulgaris ex variantium linearum emblemate resultans. Et simul eiusdem ligni scobem, colore rufescentem, sapore nullo manifestò: quæ in aqua macerata eam breui spatio mirabili colore cæruleo & flauo tingit, quæ luminob-

ni obuersa Opali lapidis Gemmæ variantem colorem pulchrè repræsentat, ita vt in ea vario modo igneus, luteus, & ruilus splendor, & fulgens purpura, & virens mare incredibili pariter mixtura transluceant.

Eiusdem ligni speciem, eodèque colore variante tingens fructulum accepimus nomine ligni Bezoardici seu aduersus Venena, à quodam Italo, cuius historiam mox recitabimus. Hoc saturatus rubet Santalo, & ad spadiceum nonnihil tendit, pectinibus rectis, nullo nec odore nec sapore, fortè quia euanidum, materie satis dura.

Mittit, inquit Monard. noua Hispania ligni quoddam genus crassum & enode, materia Pitti, cuius vsus iam diu receptus fuit in his regionibus ad renem vitia, vrinæ difficultates & incommoda. Postea experimento compertum est, eius aqua iniectionis & lienis obstructionibus vtilem esse. Fit autem hoc modo. Lignum assulatum & minutim concitum in optima & limpidissima fontana aqua maceratur, atque in ea relinquitur, donec aqua à bibentibus absumpsa sit. Dimidia hora post iniectum lignum, aqua cæruleum dilutiorem colorem contrahit, qui sensim intenditur pro tēporis diuturnitate, tametsi lignum candidum sit. Id adulteratur ligno illi simili, quod aquam croceo colore inficit: de quo postea. Hac aqua qui assidue vtuntur, eā vinum diluentes, mirabiles experientur effectus sine vlla humorum commotione, neq; alio opus est victus ratione, quàm temperata: aquæ enim sapor non magis immutatur ligni iniectione, quàm si pura esset, & nihil in ea maceratum. Calidum & siccum est in primo gradu.

Cum poculo & scobe prædicta, missa ab E.C. adiunctum erat hoc scriptum. Palligni Iadiani scobis vnc. j. an vncias iij. aquæ font. loco calido horis 12. infusa, & tepida assumpta infusio manè stomacho ieiuno, in dolore lumborum & prouocanda vrina plurimum valet. Idem præstat si aqua aliquandiu in poculo ex eiusmodi ligno parato infusa tepida bibatur, repetendo quoties opus fuerit.

Ceterum Italus, quem dicebamus, sui Bezoardici ligni libram j. duodecim coronatis Solaribus æstimabat, promisso experimento extemporaneo. Cōuenit studiosorum non paucus numerus, (qui hæc nostra commentaria legentes, hoc ipsum testari possunt) inter quos & ego Cherlerus, ducente, & præunte nobis, more Monspelienfibus laudatissimo, Cl.D.D. Pradilxo, profess. Regio, viro Gratiissimo. Adfuit gallinæ duæ, cuique eum pulce farinacea intruditur Arsenici scrupulus. Sed alteri de aqua, quam ex infusione scobis prædicti ligni paratam habebat, apponitur, quam missella gallina ob intus excitatum ardorem auidè haurire, ex parte refocillata quidem, nihilominus tota ea die moribunda simillima videbatur. Euasit tamen tandem, vt aiebat Pharmacopæus, nescio an corruptus vel largitione delinitus. Altera verò, quæ nihil de illa aqua auferat, variis stationibus conuulsionibusque fatigata, miserè interiit. Hic studiosorum ceterus alteram superuenientem conspiciens, certatim de ligno polcere cœpit, soluto pretio, sed remissiori, [pro singulis vncias mediū coronatū, vel asses aut solidos 30. regios, nisi fallor.] D.D. frustulum obtulit dono. At ego quititari & causari, aquæ frigiditati ac copiz potius eam vim dicandam, quæ ardentissimi veneni vim retunderet. Italus imposturā detectā, seque præsentis lucro priuatum iri vidēs, me tanquam boni frustulo beare, blanditiisque delinire seli-

cius potuit, quàm debuit, vt tacerem. Nec caruit experimento suspicio. Nam sequenti die præsentibus aliquot studiosis idem penitus obseruatum in columbis, quibus iudem Arsenicum exhibitum, altera epotā aquā simplici sed frigidissimā sospes euasit, altera interiit.

Porrò dubitamus an de hoc ligno intelligat Goropius, quando ait: Lignum quod à colicis doloribus curandis quidam mihi nominarunt, nec dum ad vsum medicum vocauit.

Czsalpinus qui nunquam non aliquā nomitate stipatus incedere solet, ex Fraxini genere suspicatur lignum in noua Hispania repertum, cuius ramenta in aqua post horæ dimidium cæruleum elegantissimum reddunt, cum ipsa candida sint.

Vtuntur (addit idem) aqua prædicta in potu quotidiano vsu cum vino ad Renum morbos, vrinæ difficultatem, & Ilehiadicos. Eiusdem ex eodem meminit Camer. Hist. Lugd. Lignum ad dolores renum vocat. Catal. Francof. Lignum nephriticum: Græssholz.

LIGNVM CROCEO TINGENS.

CAP. XLV.

Hoc est illud lignum quod paulò antè diximus nephritico ligno substituit, & aquam croceo tingere, vt testatur Monardes. Plura de eo dicenda non habemus.

An Theuet. Americæ Lignum luteum ex quo aliqui suos parant enses?

Considerandum an tale quid insinuet Serap. quando ex autoritate Aben Mesuai tradit vire affert ex prouincia Iaiemen, esse corticem arboris, ex quo paratur color similis croco. Sub vire nomine eodem loco meminit aliarum plantarum ex variorum autoritate, de quibus suo loco.

LIGNVM CANDIDVM FVNGOSVM
cotis vicem præbens.

CAP. XLVI.

Anno 1597. à laua maiore delati ligni fragmentum datum sibi, ait Clus. Exot. l. 1. cap. 8. valde leue, vt nihil nisi Sambuci medulla quodammodo videretur, fungosā materiā constans & candidā, cortice admodum tenui, & quasi membranaceo tecta, cineracei coloris. Interrogatus à me Abdala Guaratensis, quem Bataui nautæ Amstelredamum aduexerant ex laua, vbi aliquot annis vixerat [aliqua enim ex parte Lusitanicam linguam callebat] quod esset huic ligno nomen, & quis esset eius vsus, de nomine quidem nihil responderebat, sed educto suo cultello, signis mihi innuebat, ad cultrorum obtusam aciem exacundam inseruire: & sanè postea faciebam, atque ad id præstandum valde commodum esse deprehendebam.

Ligni exotici flauescens, venis à centro ad circumferentiam ductis à Gareto accepti descriptionem tradit Clus. Exot. l. 1. c. 7. ex quo petenda relinquitur.

Lignum Bezoardicum

Vires & Vfus. Renum si. Prima def. scobis. Obstructio Glycerum.

Modus Gremdi.

Dolor lumborum.

Expressio. In aduersus Venena.

Impositura detecta.

Lignum ad colicam.

Fraxini genus.

An vire. Serap.

Descriptio

CANDIDISSIMVM LIGNVM BRASILIANVM.

CAP. XLVII.

D. Scriptio IN Brasilia scribit Leriis vidisse se Lignum candidum vt charta siue Papyrus. Theuetus quoque tradit in America nasci arbores ligno candidissimo & tenerrimo, nullius tamen apud Americos pretii. Consideretur Tocut gehit arbor, cuius lignum summi candoris, Authore Fragolo, cuius meminimus Hist. n. l. 9.



LIGNVM LEVISSIMVM.

CAP. XLVIII.

Descriptio Gener. Io. Henricus Cherlerus rediens ex Anglia attulit ligni portionem cum hac annotatione: Ligni leuissimi frustum crassitudinis crassioris carpi, vlnaris longitudinis habuit D. Jacob. Garetus Pharmacopœus Londinensis peritissimus, misit D. Clusio, deditque mihi portionem. Hoc sanè lignum leuissimum est, per transversum secta rotula, suâ circumferentiâ maiori ex parte rotunda, in quadam parte totum fungosum, cuius superest etiam aliquid corticis tenuis cinerei, totum suberi simile flavescent, distinctum circularibus lineis, ignem facillè concipit, odor nidorulentus, sanot subsalsus, quem acquirat suspicamus. De quo ligno etiam Clus. Exot. l. c. 8.

COCCIGRIA: SIVE COTINVS PVTATA.

CAP. XLIX.

Descriptio



Folia

dullâ multâ farctos, quibus folia pediculis subtubentibus semuncialibus & vncialibus alternatim adnascuntur, ex oblongo rotundata. Pistachiorum foliis paria, glabra, neruosa, odore quodammodo Lentiscino, gustuque adstringente, non iniucundo tamen: sub æstatis finem rubescunt, elegantissimoque nitore oculos oblectant, id notante Clus. Ramulorum fastigia infinitos propemodum Mzandros tenuissimorum sed rigidorum filamentorum latè diffusos sustinent,

Dvo suadebant hoc loco de Cotino, arbore propius ad Orbem nostrum accedente tradi: tum quod & ipsa tinctoria sit, tum quod à quibusdam pro Brasilio habita, eodémque nomine sit appellata. Arbuscula est fruticosa, contortis caudicibus, non crassis, ramis crebris, mediocris crassitudinis, quos rubens rufusve cortex tegit, me-

lis plumatim obsitos: & in his obiter semina compressa rubentia Lenticulis æqualia: Cæsalpino flarescentia, quasi citrogula, duro putamine, sed ob tenuitatem impartibili. [vtilis loquitur.] Materies flaua, solida, pectinibus rectis, externis orbibus abicantibus, interna parte usque ad matricem fungosa. Flores scabiti Clus. esse ex herbido pallecentes: radicem duram, lignosam, raris fibris donatam, vt in Terebintho.

Huius arboris lignum videtur nobis sic à Corido describi. Presilium Citrinum, id est, Bugia, longi sunt baculi, crassitudine quâ ferè manum impleant, rectis per longitudinem descendentes pectinibus. Colorem habet flauum vel citrinum, dolabris in tenues & fasciis similes assulas scinditur, quæ in aqua decoctæ, luteum vel citrinum remittunt colorem, quo fullones tingendis lanis & pannis vtuntur, in gustu ferè nulla qualitate linguam afficit.

Hoc est illud lignum quod C. Bauh. apud Mathiol. Brasili [quod ex Brasilia adferatur,] alterum genus, nempe Citrinum, quod Bugia vocetur, facit: verum hoc lignum ex Brasilia vel India adferri, apud neminem hætenus legimus, vt cur Brasiliū dicatur, aut dici debeat nondum nobis constat.

Si quæ alia planta hodie cognita, certè hæc, quam modò descripsimus & pictam damus, ad κακκινία Theophr. referri posse videtur, quam sic describit. Coccymeles [κακκινία] Arbuto & Adrachne folio similis est, sed arbuscula parua. Peculiare in hac, fructum eius in pappum facessere ac resolui [κακκινία δὲ τὸν καρπὸν]. Hoc enim de nulla alia arbore accepimus. Sed planè videtur ea vox κακκινία esse mendosa, etiam doctissimorum Herbariorum calculo. Gaza antiquam vocem retinens, & hanc potius respiciens satis securè conuertit Prunum. At quod Pruni genus in pappum seu lanuginem abeat, vel quæ Prunus similis sit Arbuto, nec scivit ipse, nec hætenus observatum. Prudentius igitur Græcam vocem retinisset. Potuisset etiam animaduertere apud eundem Theophr. aliam κακκινία, hoc est, Prunum ab hac planta diuersam esse descriptam, quod sanè augeat suspicionem lectionis mendosæ.

Mendosè in Hist. Lugd. legitur κακκινία. κακκινίας legit Ruell. Certum verò est Plinium legisse κακκινίας, doctissimorumque virorum iudicio eandem ille Cotinum vocat.

Eandem etiam esse cum Coccigria eiusdem Plin. censent Anguil. Dod. Pena & Lob. Dalech. Cont. Taber. Casp. Bauh. Sed videntur in tanta breuitate Cotinum nimis securè eandem facere cum Coggygia. Nam quid similitudinis habent inter se Coggygia & Cotoni descriptiones Plin.

Clus. certè consultissimus Botanens satis circumspexit: Cotini, inquit, Plinius meminit breuiter, vt nemo facillè colligat, an ei stirpi, quæ apud Herbariorum, vulgus tale nomen obtinuit, Cotini appellatio rectè applicata sit. Coggygiam tamen eiusdem fatetur plurimas notas habere nostræ stirpi conuerientes. Dicamus iunioribus quales. Parua est arbor. Est & nostra. Nec folia malè conueniunt. Sed an nostræ semina vel fructus, in papposa illa filamenta facessant, nondum observatum. Iisdem observatum adhærere, qualia antea descripsimus. Vt & hoc dubium explicandum restet. Camer. quoque hæsitante pronuntiat, in eo imitatus Clusium. Dubitat quoque Cæsalp. non segnis alioqui ad pronuntiandum.

Sed

Plin. 17. Sed nec Plin. sbeat absque censura. Falsam enim quod ait: nullius arboris præter Coggygiae fructum amitti lanugine, seu pappo: nec videtur agnouisse Salices, Populum & similes, aut Coccinearum non recordatum. Cautius Theophrast. de nulla id alia inaudisse. Cæterum, de sententia Clusii, apud hanc stirpem Coccone-
*Coccone-
leian.* leian, aut Coggygiae [si quis fortè Theophr. sic scripsisse cum Plin. ceniet.] appellabimus quam Cotinum: cum *rimo* & Theophrast. & Dioscor. Oleaster sit.

*Cotinus.
Scythicus.
Thapsus.* Sunt verò, (vt Dalechamp.) qui Plinii Cotinum esse putent, quod Scytharion, tanquam Scythicum lignum Græci vocauerunt: alii Thapsium: alii Chrysoxylon, flauo melinòque colore, & lanas tingens, & capillum.

Matthiol. in post. com. Cotinum esse ait foliis odore subgravi, Gallæ contusæ modo, caudice humano brachio paulò minore: gerere plumosam congenem, umbellæ ferè speciem præ se ferentem, colore ex candido rufescente, in qua si-
Matth. 17. liquæ oblongæ, Hyperici ferè similes: in quibus semen conclusum: vocari vulgò *Rose* & *Sc. rano*. At hæcenus non legimus à quoquam obseruatis siliquas, nec ipsi obseruauimus. Sed fortè Matth. non recordatus se de hac planta alibi scripsisse, imaginatione sua fuit deceptus.

Gesn. l. Hort. *Barba Iouis Plinii*, arbuscula Terebintho cognata. Spontè circa Urbanum nascitur: fortè Cocygia Theophrast. *Idem* alibi eiusdem operis: Styracem arborem inquit, ad quatuor cubitos enatam si bene memini, idque è semine, ni fallor, vidi Augustæ in horto doctiss. meo. Ad. Occonis, qui ad me scripsit, his verbis: Styracem meam quodammodo bifurcatam, in duas partes radiculis, & ex vna arbuscula duas fecit satis insignes. Hæc arbor mirificè me delectat, tum quòd sciam nullam eius generis reperiri in Germania nostra, præsertim finitimis huic nostræ ciuitati regionibus: tum quia foliorum etiam florum pulchritudo speciosa videtur: de fructu in hisce partibus despero. Sed idem Gesn. in alia quadam Epist. ad eundem scribit: Non est Sty-rax, quam mihi demonstraues arborem Augustæ, sed Barba Iouis à me olim existimata, quod incanam veluti barbam circa fructum suum funderet. Rectè Gesn. Styracem esse negat, quod vel ex eo patet, quod hæc nostra folia nō habet lanuginosa vt Sty-rax: neque hæc Barbam fert. Iouis quoque barbam Plinii, non censemus, cui folia argentea, quod nostræ arbusculæ non conueniunt. Terebintho quoque cognatam non ausimus dicere: non enim est resinifera. Folia quoque manifestam differentiam faciunt: in illa plura ex vna costa emergunt, vt in luglande in hac nostra singularia sunt.

*Barba Iouis non est.
Gesn. 17.
Terebintho non vide-
tur agna-
ta.* Turner. pingit sub titulo Rhus: descriptio tamen quam ponit, non quadrat figure.
*Turner.
17.* Clus. annotat, hoc frutice ad paranda Coria, vt Corianos non minùs quàm Rhoe, cum alibi, tum circa Viennam Austriæ, ibique etiam Rhois vulgare nomen Sumach indidisse.

*Sumach.
Cotinus.
Coriaria.
Dod. 17.* Hinc Dod. Cotinum coriariam vocat: sed quando ait esse Vlmi foliis, prodit se plantam cuius iconem exhibet non nouisse. Vlmi folium hirsutum est, asperum, longum, serratum.

Plin. 1. Lob. & Penà & adu. Rhus 2. Theophrast. dicunt. Sic enim habent: Coccigia Theophrast. Cotinus Plin. & Theophrast. Rhus alterum: vt vel Cotinum Theophr. dicere velint, vel Theophrast. Rhus alterum. At nullam Cotinum apud Theophrast. nouimus, quæ Plin. Cotino
Tom. I.

possit respondere. Rhus quoque Theophrast. esse non potest, cuius meminit lib. 1. cap. 18. vbi Giza vertit: fortè in Adu. non legendum Rhus alterum, sed Rhus Allobrogum. Neque enim credimus Pen. & Lob. tam differentem plantam cum hac nostra seu Coggygia confundere voluisse, quam eleganter sic depingunt. *Rhus* sunt cirrei flocci, quales in galeis aut galli gallinacei vertice visuntur, quæ de similitudine floris, dictus fuit hic frutex, qui è summis virgulis, quoniam cubitorum altis, pulcherrimum lanitium tollit, sericeo vellere & contextu calami stratum: quod crispatur & explicatur in latam Casariam, cristibus puniceis, foliis tortilibus, semine lentis minore, ex nigro rufescente: caudice & virgulis fuscis, vimineis: foliis circinatis, densis, rigidis, Cappatis, Pistachiam aut Terebinthum redolentibus, & concoloribus. Quo magis miramur, tantæ venustatis stirpem frequenti vsu & mercatu ad coria curanda expetitam indicari esse Commentatori Matthiolo.

Casp. Bauhin. annotat. Oleam Aethiopicam Hippoc. nominari solitam à Guilandino. Pannonis *Farblauß*/ Dod. fortè leg. *Farblaub*. Sabaudis *du Fustet*: Allobrogi. *Rhu* fuscò, sed propter vsu in tinctura: Appennini incolis *Sestano* & *Scutens* corrupta Cotini voce, Const. Quidam & vsus & similitudinis argumento Germ. *Gelb presilgen holz* quasi dicas *Bresilium flauum*. *Scotannu luteum* Scaligero.

Copiosè nascitur in Italia Lombardica inter sepes, vt obseruauimus Patauio, per Vicentiam Veronam, Bressiam, Pergamum, [finitimasque vrbes animi gratià lustrantes] Mediolanum tendentes Iunio, quo iam defloruerat, & cirrorum fructuumque specimen ostendebat: sed humiles ferè sunt omnes, & vix videas hominis altitudinem superantes, paucas æquant. *Fl. ret* circa Viennam Austriæ *Mais*: calidioribus locis maturius. Fructus maturus est Iulio & Augusto. Crescit spontè in monte, Badensibus thermis quæ à Vienna quatuor miliaribus absunt, imminente, vicinisque quibusdam montanis locis, vbi interdum ad eòdè pumila nascitur, ut vix cubitalem altitudinem attingat. Clus. Prouenit & copiosè in Tridentino agro, potissimè in Apennino monte: in Histrix alpihus, in Pannonia superioris siue Austriæ: tum & in Hungaria ac Bohemia arduis syluis, si Dod. credimus. Auriaco agro quatuor miliaribus Auenione, quæ insulas & aquas Sextias itur, magnus prouentus est. Lob. Ex ramo aucto diu viridis remansit sed non re-
Sano geminavit lata Gesnero: vnde colligit plantam hanc diu durare posse si semel apprehendat. Vidimus etiam inter Camberium & Lugdunum quòd lignum copiosè aduehitur ad tincturas, quæ admodum & ad alia loca tinctoris officinis celebria. Itali qui Serici confectionem & tincturas instituunt ostenderunt nobis Stutgardia 1600. ramenta ex Italia delata nomine *Scodans*. Valer. Dourez ad ipsam plantam annotauit Guilandino dici Chrysoxylon apud Anac. ita etiam vocabat Vlyss. Aldroandus cum essemus Bononiæ.

Radicibus vtuntur insectores, illisque pannum russo [rosso] colore inficiunt. Foliorum etiam & ramulorum vsus apud Corianos in repurgandis coriis. Anguill. Idem ramis luteo tingunt, teste Const. qui tamè Plin. verba explicans, quando ait: ad lineamenta modo conchylii colore insignis, id de cortice intelligendum tradit. At nos ligni tantum vsu, nullum corticum obseruauimus cum Anguill. & Casalp. qui ait: cau-
Ti

Cotinus
Sed & d. 17.

Matth. 17.

Olea de
hispica.

Locus

Tempus

Sano

Scodans

Chrysox-
ylon.Virca. &
vsus.

Tinctura.


Tēperam.

Vlcera oris
Defluxio in
fauces.Vlcera ge-
nitalium.
Menfes.Alui deflu-
xiones.

dicibus decorticatis infiores vtuntur: flauo enim colore tingunt. Vis illi adstrictoria insignis, exiccans, colubensque. Sanantur foliorum decocto in collutionibus oris & linguarum vlcera, quin etiam columellae & faucium defluxiones. Valet item ad genitalium quoque vlcera, si eo saepe abluantur. Adduntur folia in deflectionibus, quae ad mentes cohibendos parantur. Siccorum foliorum ac ramusculorum puluis, ventri prius aceto rosaceo illito, insperius, alui defluxiones quascunque compescit. Matth. Possis etiam eiusdem decocti collutione dentium dolorem incipientem fluxione calida arcere.

B V X V S.

CAP. L.



Descript.

Materia.

Folia.

Observa-
tio.Globuli.
Flosculi.

Fructus.

Semen.

Chamae-
box.Buxus hu-
milis.

teretis durissima, flaua, nulla intus medulla, valde aequali, ponderosa, adeo ut aquae iniecta recta sit. Imò nec canem sentire in aquis, norat Matth. Folia creberrima, aeterni vitoris, splendentia, laeva, Myrtis obtusiora, firmiora, interdum concava, & quod notatu dignum, duplicia, quaeque diligenti vel cultello ita à se inuicem separari possunt, ut tenuissima & serè pellucida alterius plantae esse exercitissimo cuique videantur: suntque Buxi folia odore parum grato, sapore tamen ingratiore, quorum ortus, sicuti & ramorum serè est aduersus: ex quorum alis secundum ramulos globuli racemati cohaerent, qui mox in flosculos stamineos flauescientes explicantur, quos vascula excipiunt vireolis similia, viridia, Myrti baccis paulò maiora, superiore parte umbilicata, & tribus vel quatuor veluti aulis donata, in quibus semen continetur lucidum, Fraxinellae semini simile. Radix magna ex parte nodosa tuberosaque, parte praesertim superna, & ex parte eminenti, qua materies eius crispa & elegans ad varia opera expetita. Reliqua radix non magna, nec profunda, materies cum ligno eadem.

Vesuntii nomine Chamabuxi ostendit nobis CLD.D. Chiffletius, eius urbis Archiater & amicus noster singularis, arbusculam Buxi humilem admodum & vix bipedaneam, stipitem tamen crassiusculo, cuius folia valde parua, Myrti Tarentinae. Similem ramum nobis postea exhibuit le. Chiff. iuuenis Iac. Miege. Basil. Med. studiosus, nomine Buxi humilis, dodrantalem, in aliquot mi-

nores dimisum, foliis praeclatis, quem etiam in Herbario nostro sicco adseruamus. Buxum & Dod. describit ad duos aut tres tantum pedes it-
colli, ramos tenues admodum, foliis esse rotundioribus & diluuiis virentibus. Theophr. Buxus [mēg.] non est magna arbor, folio Myrti, as-
scitur locis algidis atque asperis: Etenim Cyreni montes tales sunt, in quibus abundè prouenit. Olympus quoque Macedoniae frigens, in quo gignitur, sed non magna. Maxima autem & vili-
cherrima in Cyrene. Nam procera est, & ceteras crassitudine longè superat. Idem mel insuauis, Bu-
xum redolens, attamen multum & copiosum. Se-
rouina admodum fert fructum, ingustabilem cun-
ctis animalibus. Materies eius grauis, quia den-
sa, quae ne arefacta quidem lenis redditur. Obni-
miam spissitatem omnino enodis, aut paucissimis
nodis. Hac ille. Quod postremum non perpetua vi-
detur veritatis. Vidimus enim, imò habemus in
syluestribus natas, penitus propemodum nodis
scatente ligno: sed id rariùs tamen obseruatur.
Cum autem id ouenit, id fieri suspicamus à crebris
ramorum ipsius superiorum abruptione. In cul-
tis & maioribus, quod sciamus nunquam.

Ennius lib. 7. Buxum amaro corpore dicit:

--- Longèque Cupressi

Stant vultu foliis, & amaro corpore Buxum.

In primis verò materies honorata Buxo est, An-
quit Plin. raro crispicanti, nec nisi radice: ceterò
lenis quies materis, silentio quodam & duritie
ac pallore commendabilis, ipsa verò arbor topia-
rio opere. Tria eius genera 1. Gallicum, quod in
metas emittitur, amplitudinèque proceriorem.
2. Oleastrum in omni usu damnatum, grauem pra-
fert odorem. 3. Tertium genus nostrae vocant
syluestre, ut credo, mitigatum sat: diffusius, &
densitate parietum virens semper ac tonsile. Flos
non spernendus, sed causa amaritudinis mellis,
praesertim in Corsica. Semen illius cunctis ani-
mantibus inuisum. Buxo è syluestrium genere
folia non decidunt, quae concava. Plurima fert
Buxus, nam & semen suum, & granum, quod
Carthegon [Cratagum. Vet. & ch.] vocant, & à
Septentrios e viscum, à Mendie Hyphear. In qui-
busdam omnino nullus fructus, ut in suo genere
Buxo. Hac cum Ebena spississima ex omni mate-
rie, idem & grauisima, graciles natura: neutra
in aquis fluitat. Hac Plin.

Oleastrum, nisi mendosus locus sit, id Buxi
genus vocant, [annotat Dal.] quod Oleastri mo-
do semper humile sit, ac vix vnquam in arbuscu-
lae magnitudinem allurgat: & quod reliquum
neribus solum minus habet, quemadmodum O-
leastri folia, si cum Olea conferas, breuiora &
angustiora sunt. Idem prorsus deceptum fuisse
Plin. aut eius libertum Scribam putat. Nam cum
apud Authorem Graecum reperisset secundum
Buxi genus ἀγέρων ὄν, omnino syluestre & a-
greste esse, ingantè legisse, ἀγέρων ὄν, Olea-
strum esse. Idem ineptè scripsit semen Buxi Car-
thegon vocari. Nam cum apud Theoph. Histore
Buxi statim & Crategi descriptionem subiecisset,
Plin. huius partem cum illius historia contudit.
Ineptius idem Buxo tribuit, quae de Illice Theo-
phrast. scripserat. Sic enim ait Theophr. Praeter
glandem, puniceum granum Illex fert, ac insuper
viscum & Hyphear, ut interdum contingat fru-
ctibus quatuor onerari, &c. quae ille ostendit ad-
scribit Buxo.

Virg. crispas Buxi radices dixit.

Diosc. Buxi historiam non habet, quod mirum,
arbo.

arboris tam vulgate. Sed cum is ad vires potissimum respiceretur, & usus eius in arte medica expitum suo seculo agnosceret, idem forte omisit. Merminitamen eius aliquoties: ut cum ait, Vili folium esse Buxi folio simile. Et alibi Lycium dicit foliis Buxi densis.

Elaiz 30. legimus: Scribe ei supra Buxum.

Porro et si Buxus nullius in medicina usus, ut Veteres prodidere, non desunt tamen & Recentioribus, ut notat Matthiol. qui velint, non aliud esse Italis Buxum, quam Ind. s. lignum quod Guaiacum vocant, ea tantum ratione ducti, quod pluries experimento conpertum sit, eius decocto etiam facilius eos sanatos esse, qui Gallica Lue affecti erant: quod si experientia concedi possit, aliud Buxi lignum præstare: attamen quod Buxum in Italia nascens, & Guaiacum ab Indis petentem vna & eadem sint planta [ut in secunda centuria Amatus Lusit. asserere videtur,] nunquam profecto crediderim. Siquidem Guaiacum pingue, resinosumque visitur: materie intus nigra, Ebeni ferè modo. Quia & sapor huic amarior & acris, quibus omnibus notis siccam Buxi materiem carere constat. Quin etiam Guaiaco (ut narrant ii, qui ab Indis ad nos redeunt) folia sunt Plantaginis, breviora, crassiora, durioraque: lucci flores, & fructus luglandis magnitudine. Buxus verò fert folia Myrti, breviora: flores herbaceos, & fructum Myrto nusquam grandiorum.

Nihilominus sunt impostores qui propter vicinum utriusque colorem, sæpe pro Guaiaco in Italia præsertim exponunt, inquit Cronenburg. At, mehercle, stupidos protius atque rerum ignaros oportet esse eos, qui Buxum sumant pro Guaiaco: dixerimus penè Cretam pro Carbone, ut Cronenburgius parum in eo suæ experientia consulere videatur, dum vicinum utriusque colorem asserit. Etenim quamvis venæ & radii interdum in Guaiaco appareant ad Buxi colorem accedentes, tamen ita substantiâ differunt atque odore, ut non magis ceram aut aliud quodvis flavescent lignum cum eo convenire dicas.

Dubitat Cæsalp. an Oleastrum Plin. possit esse densissimus frutex, qui in scopulis maritimis spontè vi ventorum condetur Buxi modo, quem alaternum alibi vocat: quod tamen nobis non sit verisimile. Vide cap. de Alaterno.

Cæsp. Bauhin. Buxum fruticem dicit, quamvis quædam etiam in arborescens: at nos omnem buxum arborescens potius quam fruticem dicendam censem, considerata eius materie, & ipsa adeo arboris definitione. Fruticare creditur, quia tardè admodum crescit, satis clarè tamen vixit arboris notas exhibet. Quam verò idem adiungit Chamæpyxum Tragi & Tabern. non videtur ad Buxum referenda.

In Græcis dicta, ut ex qua tabula ad scribendum olim fiebant, vix dicta, unde & Pyxis. Latini Y in V mutarunt, ut in plurimis aliis, testibus Festo & Prisciano. Buxus igitur, Capro arbor, arbor: Buxum verò materies erit. Hebr. *Thaasus*, teste Trago. Germ. *Buxbaum*. Belg. *Buxboom* & *Buxbaum*: vulgò *Dalboom*, teste Dod. Gall. *Bouis*. It. *Boss* & *Buxa*. Hsp. *Box*. Angl. *Boxe* & *The Boxe tree* & *Buxa*. Boh. *Poss*. Hung. *Duzpang*. Buxi paruum genus *Hamabuxus*, *Humbuxus*. Angl. *Dwarf Boxe*.

Poetis celebrata *Ismenia*, *Berecynthia*, *Comisa*, *frondosa*, *annosa*, *solida*, *confilis*, *crispata*, *conspiciens*. Ex ea enim fiebant multiforatales tibie. Unde & pro musico instrumento interdum accipitur. Ver-

Tom. I.

gil. Aeneid. l. 9.

Tympana vos, Buxusque vocat Berecynthia Locut. matris.

Buxum in Cytho provenire ex Theophrast. dictum. Plin. in Pyrenæis montibus legisse videtur, nisi in altero mendum sit vicinitate vocabulorum enatum, ut suspicatur Ruell. Locis feruidis difficillimè prodit. Cythoris quoque montibus plurima & Berecynthia tractu. Cythorus, habet Thesaur. ling. Latine, Paphlagoniz mons Buxo abundans, quem Macedonia esse magno errore credidit Servius. Vergil. lib. 2. Georgicorum.

Et inuat undantem Buxo spectare Cythorum.

Ab hoc, quæ Buxa sunt, Cythoracadi dicta, Ovid. lib. Metam. 4.

Sæpe cythoraco diducit pedine crines.

Sed l. 6. aliter

Vixit cythoraco radium de monte tenebat.

Crassissima in Corsica. In Olympo Macedonia gravior sed brevis. Amat frigida, aprica, montes. Nulla magis quam hoc gliscunt montes & colles in Delphinatu & Galloptouincia. Quibusdam etiam aliosis ad Septentriones, eluosis, incultis, frutescent & arborescent. In Helvetia, Sabaudia, Burgundiaque montibus non infrequens. Etsi verò spontanea sit, tamen in laudioribus hortis tam Italia quam Germaniæ Galliaque aliamque circumacentium provinciarum huius passim colitur, quippe quæ tandem topiario operi facili, & perpetui virentate amant. Patam vidimus in horto quodam prope templum à Sancto cognominatum. Labryn inter opere topiario pulcherrimum ex Buxo. Item Verona & in Italia magnam quorundam hortus Buxi plantas artificiose amantia virentes experimentes. Hortum E. C. Witt. Monthe gardienlem virentes Buxo cinctis ex vicinis sumptis, videas amantem fide etiam Hyeme virentem. In Germaniæ & Burgundia quibusdam cultibus, non tamen in pagana huius templum videas, quod non vna aliæ egregia Buxi arbore stipantur.

Floret communiter Feb. & Martio. Genæ etiam Decembri florum rudimenta observantur. Fructum fert Autumno, quod danum semen perficit, cum sanctu dei arbore adhuc tunc, nisi anellatur. Aprilis nova gemma prout. Sed prius lignum secari consulem, si magis flavam cupis. Facile ferit & ramis: Scoloribus etiam multiplicari locis consita testantur. An semine oriatur facile, indagandum. De infusionis mangonio nihil adhuc specialis curam conpertum habemus. Constantius ait: plantari aulione, & clavis & ramis, depositis in plantatio post Idus Nouemb. Gaudere autem humidis locis, quod semper vireat.

Porro maximè æternam eius materiam putant, vetustatèque non sentire cum tamen nos in Ducatu Wirtemb. anno 1608. hyemali sæntie gelique eum consumptum observaverimus.

Durities quoque eius cum amatore terebines in ea nasci prohibet. Eius materies pertinacius feris resistit, earumque dentes replet æqualitate inertis: qua de causa artifices alternâ inclinatione egerit scobem.

In igni duritia quæ ferro, nec flamma nec carbone vili, inquit Plin. Atqui observatum est, Buxum, præsertim benè exiccatum optimos ac viucissimos ex se remittere Carbones, quavis cum Plin. & Tragus & Lonic. asserant contrarium. Somen quoque & formicis reconditur in hyemem, inquit Soler. Quamobrem non est cunctis amantibus ignisum ut Theophrast. & Plin. existi-

Te 2

Febrilis. marunt. Hodie pectinum dote commendatur auxi materies, ex qua laudatissimi sunt. Vnde Martialis de Calno.

*Quid faciet nullis hic inuentura capillus
Milesibus Buxis qua tibi dente datur.*

Pyxides.

Fiunt & vnguentaria pyxides, quarum plurimas torno varia figura, perelegantique fabre effictas habemus, praesertim & radicum topis. Commendatur etiam Ruellio ad plaustrorum axis, & aratorum buras item C. J. Hicaria Folio cum materiei scobina & Chamo capillum rufant, nec nullus in medicina vti est haec arbor, vt Ruellius putat.

Axia.

Bura.

Chicaria.

Ruell. uor.

Vfus medi-

cus.

huc v. m.

Quippe Amarus testatur, se huius succellu vsum Buxi decocto in Librario Luc Venerea: moderatius fortis temperamentum, quam Guaiacum, ac proinde quae calidior sunt temperatura, & morbo calidiori affliguntur. Maxime in aestate, liberaliter ex decocto dabit, nec putat Guaiaci & Buxi abores inter se alter differre quàm sub diversificatione, quod supra refutatum. Buxi vero lignum vti dicitur plus iusto calidum commendare, vt sudorem egregie eucare, multa experientia sibi compertum esse testatur. Idem in

Amat. uor.

fecit.

Sudorificum.

Hemidra-

ma.

Centuriis curationem recenset Hemeritace per consensum ventriculi facta, & per auxilii decocti potionem curata. Item de dolore in genu cum tumore per tres vel quatuor menses perdurante, Buxi decocto postea curato. Huc sententia contrariatur Herc. Saxon. differens: licet Amatus se quendam hoc morbo laborantem Buxi decocto integre curasse profiteatur, tamen vt dicitur, vna illiundo non facit Ver, non est Buxus lignum Indicum, vt ille putat: Natat enim Buxus in aqua. Lignum in sicum residet in fundo, vt etiam Ebenus, vt ex penderz, colore, & densitate facile quique conicere poterit. Sic & Leuon.

Centuriis.

Hemeritace.

per.

consensum.

ventriculi.

facta.

per.

auxilii.

decocti.

potionem.

curata.

Item.

de.

dolore.

in.

genu.

cum.

tumore.

per.

tres.

vel.

quatuor.

menses.

perdurate.

Buxi.

decocto.

postea.

curato.

Huc.

sententia.

contrariatur.

Herc. Saxon.

differens.

licet.

Amatus.

se.

quendam.

hoc.

morbo.

laborantem.

Buxi.

decocto.

integre.

curasse.

profeatur.

tamen.

vt.

dicitur.

vna.

illiundo.

non.

facit.

Ver.

non.

est.

Buxus.

lignum.

Indicum.

vt.

ille.

putat.

Natat.

enim.

Buxus.

in.

aqua.

Lignum.

in.

sicum.

Residat in fundo, vt etiam Ebenus, vt ex penderz, colore, & densitate facile quique conicere poterit. Sic & Leuon. Lemnius nequaquam probat eos, qui Buxo tanquam Guaiaci anthalomano vtuntur, miramque historiam hac de re commemorat in Biblicarum herbarum explicatione. cap. 41. Testatur nihilominus, Lob. virgulta, lignum & folia decocta, Guaiaci modo, sudores elicere, huiusque decocto

Lob. Virg.

famulam.

pauperulam.

Anglam.

a.

Luc.

Venera.

vindicatam.

Ditionibus.

propter.

ingratum.

&.

etiam.

modorem.

reueit.

Recentiores.

inquit.

Fuch.

temperatam.

Buxi.

essentiam.

esse.

statuunt.

id.

quod.

non.

videtur.

ver-

isimile.

Haud.

dubie.

verò.

adstringit.

atque.

ad.

exiccat.

Scobem.

eius.

decoctam.

in.

aqua.

alui.

profluita.

sanare.

tradunt.

quod.

&.

Match.

confir-

mat.

Quibusdam.

Buxi.

decoctum.

cum.

vino.

rubro.

profuit.

in.

doloribus.

dentium.

a.

frigidis.

fluxioni-

bus.

Lonicero.

quoque.

adstringentis.

&.

siccantis.

naturae.

dicunt.

additque.

folia.

siccata.

&.

in.

pulue-

rem.

redacta.

data.

cum.

aqua.

Lauendulae.

tollere.

insaniam.

&.

maniam.

Verum.

quum.

umbra.

ipso.

Lonicero.

atque.

etiam.

Fusch.

teste.

[.

qui.

art.

formosus.

sub.

hac.

arbore.

cerebro.

vehementer.

incommo-

date.

quod.

eius.

odor.

naturae.

proflus.

aduerfetur.

naturae.

fit.

contrarius.

minuatque.

intellectum.

non.

ausimus.

praescribere.

folia.

ad.

insaniam.

ne.

forte.

eam.

adaugeamus.

odore.

illo.

gravi.

ad.

cere-

brum.

raptio.

Nam.

quod.

quidam.

etiam.

Buxi.

com-

mam.

tutam.

apoplecticis.

propinent.

ratione.

car-

ret.

ait.

Dodon.

nam.

fructus.

vel.

odore.

frequenti.

quem.

tamen.

exiguum.

habet.

cerebro.

ac.

capiti.

molestus.

est.

Multum.

quoque.

&.

a.

veritate.

ab-

erabit.

qui.

huius.

scobe.

ligni.

Guaiaci.

loco.


vt.

vo-

luerit.

PALMÆ SANCTÆ SIMILIS ARBOR.

CAP. LII.



Ferebat quidem Insti-
tuti nostri ratio ut Buxo
substitueremus Guaiacum, li-
gnum illud Indicum Anti-
quistum Græcistum Latinis
incognitum, quod à mirabi-
li effectu quem
in curandis
morbis perni-
ciosissimis &
contumacissi-
mis præbet, Li-
gnum Sanctum,
Lignum Benedi-
ctum, Palum
Sanctum, Pal-
mam Sanctam.

Sec. vocitauerunt. Verum, nonnullas graues ob-
causas, hic tantum ex Pen. & Lob. de Palmæ
Sanctæ simili arbore agemus, alio loco Guaiaci
Historiam fusè traditur.

Descriptio
Palma
Sancta si-
milis ar-
bor.
Folia Curri-

Ex naucleris, inquit, qui ex India Occidua
in Angliam remeant, habuit Morganus, & nos
ab illo, sureulos, qui rami sunt arboris grandioris,
recti, cortice arboris Indæ, folio Curri, carnoso,
nudo, Lauro latiore, breuiore, neruoso: horum
in summis hærent folliculi pallidi, coriacei, circina-
te rotunditatis, admodum compressi, nummo
Coronæ Gallicæ pares, quorum medio insunt se-
mina Lentis effigie & colore, compressiora, gustu
amaricante. Hanc quidam arbitrantur *Palmam*
aut *Palum Sanctum*, quæ species diuersa à Guaiaco
est, quamvis similis designetur: nempe non va-
sta, ut Fraxinus, sed minor, ei concolor cortice:
folia cuiusmodi plantago, sed crassiora, minora,
pinguiora, breuiora: fructus Iuglandis magnitu-
dine, aluo subducendæ idonei.

Semina
Lentis.
Palma aut
Palus
Sanctus
Quæ palmæ
Sanctæ
differt
à Guaiaco

Eadem Aduersaria in appendice & Ic. Pl. Tom.
2. p. 187. sicut & Hist. Lugdunensis descriptæ arboris
folliculum ferentis iconi à nobis ex iis propositæ,
inscripserunt: *Palma Sancta similis arbor*. Qualem
verò, intelligant *Hebenum* de quo tradunt mox
post *Palum Sanctum*, ignoramus. Sic aiunt: Of-
ficinarum *Hebenum* siue *Xylaloës*, quin sit spe-
cies Guaiaci, nihil obstat: nam præduræ assulæ,
grauissimæ, quæ in Offic. visuntur, & aquæ meris
fidunt, tum pinguedo, quæ exudat igni, perinde
atque Guaiaco, tum aspectus ipse, & vires, ac sa-
por videntur testari: nam odor etiam ei inest Guaiaci:
vires ad ea ad quæ Guaiacum commendantur.
Ne porro quis obiiciat, solam Indiam nigrum fer-
re *Hebenum* ex Poëta, dicimus *Hebeno* idem e-
uenire posse ut Guaiaco, quod non
modo in Traprobanz finitimis ad
Orientem, Austrum sed etiam
in India Occidua longissi-
mè diffusa, frondet.


Hebenum
Offic.
Xylaloës.

Tom. I

FRUCTVS GVAIACI PVTATVS

ET FOLIA.

CAP. LIII.



CL. apud **Descriptio**
Basil. Me-
dico & Profes-
sori Casp. Bau-
hino, fratri &
adfini nostro
amantissimo ac-
ceptum ferim-
us fructum
Indicum, eidem
ex Italia, nomi-
ne fructus Gua-
iacini, qui ge-
minus arctè co-
hæret, ambitus
unguis pollicis
ris, nisi quodd
breuior paullo,
effigie cordis,
in breuem mu-
conem reflexū
(in exiccato)

terminans in medio vtrinque extuberans, circa
extrema in ambitu compressus, coriaceus quasi te-
staceo, penè rufescente, quem externis alius ambit
tenerior, valde amarus. Nucleos singuli binos
continent, sed membrana intergerina disinctos,
quæ mediante gemina nuclea combinata, formæ
& magnitudine Ricini vulgati, subintradura, ac
osseæ: quam tenuis inuellit pellicula. Perhibetur
descriptus ab Ouedo, qui autor nobis nunc
non ad manus. Lob. fortè Hupalsium fructus
Guaiaci, de quo antè: sicut & Cardani. Lector
consideret fructum Arbutis tristis, Acostræ, mox
sequens: in cuius descriptione competet ferè
similia, si non eadem.

An fructus
arboris
tristis

Quia porro figura, quam hoc in loco proponi-
mus ex Clusii Exot. lib. 10. capitis 10. mutata est,
fas erit quoque verba eius describere. Sub ini-
tium anni 1601. accipiebam, inquit, à Petro Gare-
to, ramulum legitimi Guaiaci, qui pedalis erat lō-
gitudinis, valde contortus, & frequentibus no-
dis distinctus, scriptoris calami, siue anserinæ pen-
næ crassitudinem infernâ parte vix attingens, ma-
teriâ durâ & pallecente præditus, atque cortice
tectus rugoso, cineracei coloris: supernâ verò
parte in tenues ramulos diuisus, quorum nonnul-
li folia adhuc retinebant, alii etiam flores, & fru-
ctus rudimenta: nata autem erant folia, seu veriùs
foliorum alæ, in tenellis ramis contrario inter se
situ, singulis alis quaterna, aut sena foliola Lentu-
sci modo ex aduerso temper nascentia obtinenti-
bus, crassiuscula, orbiculata, & multis venis di-
stincta, quæ siccitate facillè defluerent, manebat
nuda alis, & foliorum, vbi sita fuerant, vesti-
gia duntaxat retinentibus: in superiorum ramu-
lorum nodis nata erant veluti tubercula, à qui-
bus conianctim exorti erant seni, octoni, deni,
interdum plures, tenues, vnciamque longi petioli,
sustinentes singuli florem, non magnum, sex fo-
liolis constantem (albini, an flauis, aut cærulei
coloris essent, propter siccitatem iudicare nequi-
bam) è quorum umbilico multa prodibant stami-
nula, & in nonnullis floribus fructus rudimentū
medium emergere incipiebat, binis lateribus præ-

Ramulus.
Descriptio

Materia.
Cortex.

Folia.

Lentisci.

Flos.

Tt 3

Folia. ditum, & penè formatum instar loculorum But-
Radix. la palloris vulgaris. *Caterum* à Francisco Peninio
Locus. 29. Iulii biennio ante eum acceperam Guaiacan ar-
Fructus. boris folia, sed singularia Ziziphinis formâ & ma-
 gnitudine, non multum ablinthis, firmiora ta-
 men, & multis venis prædita: præterea radicis fra-
 gmentum, vinctis crassitudinis, aut amphoris,
 in terra flavescente constans, & denso, succulen-
 tiusque cortice emictum, ex Trinitate Insula dela-
 tum. Insequente vero Septembri Amstelredamo
 ad me intulit Walchus Syveriz. Guaiaci fructus
 aliquot, quorum nonnulli singulares, alii comuni-
 tati è longis pediculis dependebant, geminis lo-
 culamentis constantes, fructibus Aceris quodam-
 modo instar, sed hæc differentes, quod hic alis illis
 ea eret, quibus Aceris fructus est præditus, locu-
 lamen taq̃e non haberet alio distincta, ut Ace-
 ris fructus, tam cetum quod alterum loculamen-


tum plerumque esset inane, alterum plenum, nu-
 cleum continens durum, ex albo flavescentem, *Fructus.*
 sed qui immaturus fuisse videretur. Accipiebam
 & à Pona fructus Guaiaci appellatione insigni-
 tos, pluresque magis crassos, & integros, quorum v-
 nus tribus loculamentis præditus: ossicula in illis *Ossicula.*
 reperta longiuscula erant instar ossiculorum Euo-
 nyam penè, & materiâ valde durâ, corneaque
 constabant, ossiculorum Dactylorum instar, nu-
 cleum, planum, inanem flavescentis coloris conti-
 nentia. De Gummi ita scribit: Guaiacan arboris
 gummi quod à F. Peninio acceperam calidi sapor-
 is erat, & manducatum dentibus cedebat instar
 resinae Malthichinæ, fusci tamen coloris. Quod au-
 tem Londino Jacob. Gareus ad me mittebat, ni-
 gri coloris erat, lenti tamen & splendentis, igni
 adnotum, non iniuncti odoris.

ARBOR TRISTIS.

Arbor tristis Ac. f. a.

Arbor tristis Cl. f. a. l. c. n. l.

Non aliâ.



Descriptio
Folia Pen-
ino.

ARbor tristis Oleæ est magnitudine, foliis
 Pruno similibus, flore noctu odoratissimo:
 Garcias. Vel, ut tradit Acosta, Arbor magnitudine
 & formâ ferè Pruni, multis prædita ramis tenui-
 bus, & recta per spatia nodulo distinctis, à quo
 utrinque singulana folia enascuntur, Pruni folio-
 rum magnitudine, molia, & lanuginosa parte a-
 uersa, quemadmodum ferè Salix folia, & vici-
 dia, nonnihilque aspera, parte interiore, non a-
 ded serrata in circuitu ut Pruni folia, neque tam
 multis venis prædita. E singulorum foliorum se-
 de nascitur pediculus quinque capitula summâ
 sui parte sustinens, quæ quatuor foliolis subro-
 tundis constant, è quorum medio quinque flo-
 res exiliunt candidi, elegantes, Aurex mali flori-
 bus magnitudine & figura pares, tenuiores ta-
 men, elegantiores & odoratiores, pediculo ma-
 gis ad rubrum, quàm ad flauum colorem ten-
 dente, quo in illis regionibus Indicis edulia tin-
 gunt, quemadmodum apud nos vulgò fit Croco.
Fructus es-
figue cordis.
 Fructus magnitudine Lupini est, virescens, cor-
 dis effigie, per medium secundum longitudinem
 sectus, continens in vtriusque parte quoddam re-
 ceptaculum, in quo semen occluditur magnitu-
 dine seminis Ceratii siue Siliquæ, cordis effigiem
 retinens, album, tenerum, membrana subui-

rer te lectum, nonnihil amarum.

Ab Acosta figura aliam, longèque diversam,
 eodem tamen nomine posuit Cluius apud Gar-
 ciam cum hac inscriptione: Viennæ Austriae ha-
 nestus vir Fabricius Mordenti. Salernitanus mul-
 ta de Arbore tristimibi referebat, cuius naturam
 [dum Goæ viueret] summo perè esset admiratus:
 Assurgere eam arborem interdum ad trium ho-
 minum altitudinem, iustamque crassitiem acqui-
 rere dicebat, & ramos ferè multis alis concavos,
 & folis Myrti quam similibus onustos. In tene-
 rioribus autem ramis nasci flores pediculis ob-
 longis ex foliorum internâ sede prodeuntibus
 inhaerentes, copiosos, hoc est, ternos, quater-
 nos, aut plures simul ferè congestos, candidos, lasini-
 ni floribus formâ, magnitudinèque pares, solis-
 que mucronatis, ut illi, constantes, sed pleni-
 ores, multiplicique foliorum texturâ, odoris fra-
 grantissimi, & haud multum à lasini florum o-
 dore dissimiles, nocturnum autem solè in flores ex-
 plicari, & oriente Sole, simulatque ab ipsis ra-
 diis illustrari incipiunt, illic decidere, vel anti-
 pathiâ quadam, vel præ nimia succi tenuitate,
 quem Solares radii absumant: nam quos Sol non
 attingat, diutius in arbore hætere. Studiosè au-
 tem colligi eos flores, propter odoris fragran-
 tiam,

Flora.

Tinctura
es.

Fructus es-
figue cordis.

Remem.

Descriptio
Cin.

Folia Myr-
ti.

Flora.

Lasini
dora.

Mogli a-
qua dicta.
Fructus.
Rubi Spar-
tem Hispan-
sim.
Taka Sals.
Stramon.
Alves Lom-
bois non si-
miles.
Romer.
Arbo visci.

nam, & vitreis organis odoratissimam ex illis a-
quam elici, quæ [asserente Fabricio] *aqua de Mo-*
gli dicitur, quoniam Malabarico sermone arbor
Mogli appellatur, cuius flores idem nomen reti-
nent. Fructum observasse negabat. Ceterum an-
no 1601. mihi mittebat amicus Amstelredamo
fructum eius arboris suo pediculo adhuc inherē-
tem, quem ab illis qui ab India Orientali redie-
rant, acceperat: erant verò plures fructus siue
lobi, vnciarum binarum, longo ramulo siue cras-
so pediculo nati, satis conugui, similes penè his lo-
bis, quos Spartium 11. Hispaniacum cap. 70. lib. 1.
mez plantarum Historiæ descriptos habet, siue
fabæ vulgari minori, quæ apud Belgas in iumen-
torum pabulum cedit magnitudine pares, satis
crasso cortice constantes, coloris cineracei, qui a-
perti, sex semina continere deprehendebantur, ut-
roque latere terna. Stramonix seminibus quodam-
modo similia, sed immatura. Qualem autem ac-
cipiebam, in eadem tabella cum ramulo suis floribus
onusto, exprimi curabam, in illorum gratiã
qui hoc studio delectantur. Altero autem post
acceptum & descriptum illud semen anno, mul-
ti eius arboris flores C. V. D. Petro Pauvrio mit-
tebantur: ique oblongo & tenui arboris alicuius
aut herba folio trajecti corollarum instat, & quib.
licet prorsus aridis, eam tamen formam agnosce-
re poteram, quam Fabricius mihi descriplerat:
quæ sane longè dissimilis est his floribus qui à nō-
nullis proponuntur leucoio similes, quatuor dū-
taxat foliis constantes.

Ab Acoſtæ inſuper iconẽ & deſcriptione, diſcre-
pare Cluſii deſcriptio & binæ eius icones, quæ
quidem & ipſæ, cū non parū inter ſe diſ-
ferant, occaſionem inde ſumpſimus, ut omnes
tres appoſuerimus. Prima igitur Acoſtæ ſit, aliæ
verò dux Cluſii. Prior, cui olim in notis in Gar-
ciæ Arom. hiſt. p. 12. floris Mexicani fructum ap-
pinxerat. Altera, in qua in poſtr. Exot. dictum
fructum omiſit, alium racemolum addens, qui
non multū differt à fructu, qui Guaiaci dicitur,
qualem diximus forſe deſcriptum ab Acoſta.

Ab his figuris etiam diuerſa icon Io. à Doet. tam
foliis quàm florum forma, quæ quadripartita pin-
git. In nominatus quoque quidam iconem à pro-
poſitis differentem habet, cuius flores quinque
partiti &c: ſic adſcribit. Arbor *Arbi triſti* qualibet
poſte [poſt occaſum Solis] virides ſuos fructus
denonat, floribus ſuluis (quorum pediculi crocū
imitantur) egregiè ornata. ¶ contrā verò de die,
poſt ortum Solis fructus ſuos deſicit, totāque mar-
ceſcit.

Figura ænea Bry fratrum obſcura eſt, ipſā forſe
obſcuritate exprimere volentes, quod non potue-
runt vel auſi ſunt aperte & clare. Florem qua-
dripartitum habent. Iudicent qui viderunt arbo-
rem, vter horum rectius pinxerit. P. Hogger ad
fig. æneam.

----- ramum nigra quem nox ſuauibus or-
nat,

Exiis ornatum floribus alma dies.

Ut deus hoc una vigetque & deſuat hora

Continuas obeunt illa dieſque vices.

Traxit & hinc nomen triſti quod ſqualida trāco

Anricum rutilo cū niter orbi iubar.

Mand ſecus & noſtro, quæ ſenſu ſplendida ſumus

Eſſe ſidem veri Lux redimina facit.

Triflis ar-
bor Suda
Synonyma
Linguar.
Mogli

Hanc autoribus prædictis Goæ Parizataco, in Ma-
layo Singadi vocant: in Decan Pul. Arabibus
Guatt: Perſis & Turcis Gul. lingua Malauarica
Mogli, quo nomine & flores appellantur: vnde
nomen liquori ſtillatio, *Aqua de Mogli.* *Arbore*

triſte Io. à Doet. *Arbor triſti* Herbar. qui de ea tra-
didit: quod nomen illi indicum quod noctu tan-
tūm floreat.

Peculiaris eſt hæc arbor Goæ, quam à Malaca Locu-
allatam aſſerunt, nec ſe alibi per Indiam viſiſſe
reſtat Garciaſ. Multi in Luſitaniam transferre
voluerunt, ſed irritò conatu. In Malabar autem
& Goæ, lociſque vicinis, cum tanta facilitate na-
ſcitur, ut quilibet rami in terram depaſti compre-
hendant.

Fabulantur autem indigenæ, Satrapæ cuidam
nomine Parizataco elegantem fuiſſe filiam, quæ
Solem deperiens: ab illo compreſſa fuerit: Cū
verò poſtea illam relinqueret alterius amore irre-
titus, Parizatæ filiæ præ amotis impatientia ſibi
ipſi mortem conſeuiſſe. Ex cuius crematæ cine-
ribus [nam adhuc vruntur in ea regione cadaue-
ra] hanc natam eſſe arborem, cuius flores aded
Solem exhorrent, ut eum videre non ſuſtineant.
Miranda ſanè res & obſervatione longè digniſſi-
ma, inquit Coſta, elegantiffimam hanc arborem
intueri noctu pulcherrimis ſuauiffimæque ſpiran-
tibus floribus illuſtratam lætam, atque odora-
tiſſimam: eadēq; flores, ut primū radis Solaris
illuſtratos, deponere atque abſcedere ipſam ve-
rò arborem totam vnā cum foliis ſuis veluti
marcidam apparere.

Sanè quotquot hæc annis odoratus ſum flo-
res, horum ego nullum [ſi quid meriti dicit eſt, quæ ſuauis
hiſce prætulit, nedum cerè contulerim: aded
ſuauiter ſpirat, præſertim primū locum ingre-
dientibus, ubi arbor colitur. Iidem, manibus cō-
taſti, ut euaniſci redduntur & inuiles. Flos ſapo-
re eſt ſubamaricante, quem ex nuper collecto &
deguſtato deprehendi. Eum cor reſocillare inco-
læ cenſent. Nam & Gentiles ibi medici ſemen
eius inter Cardiacæ referunt. Garciaſ nullum ſe
uſum eius nouiſſe tradit, propter teneritatem: ni-
ſi quod florum pediculis, qui lutei ſunt, Goæ in-
colæ vſantur cibis tingendis, quos Croci modo
inſiciant. Velle etiam nonnullos aquam ſtillati-
onem florum oculis vtilem eſſe, admoto lino
panno hac intincto. In quem uſum ſtudioſè
colliguntur ab incolis & propter odoris fragran-
tiam, quam inſignem habere teſtatur Cluſe are-
latione Fabricii.

ARBOR INDICA DORMIENS.

CAP. LV.

Theophrastus apud Libanum in India arbo-
rem perhiberi ait, foliosam instar Roſæ, quæ
noctū conſueat, & oriente Sole iterum ſe ex-
pandat ſeu aperiat, meridiè planè explicet, & hinc
iterum paulatim in noctem componat: Incolas
dicere eam dormire.


ARBORES ET HERBÆ TACTVM reſugientes.

CAP. LVI.

Nāſcitur circa Memphim peculiaris quædam
materia [Gaza vertit: Guilandinus autem
quiddam: Phinius arbor] non foliis, vel ramis, vel
totā formā peculiare quid ſortita, ſed euentu.
Te

Herba vina Acoſta.

F. lium

Theoph.
vult. est

Quippe facies
eius ipſa ſta: Po-
mum Fuci ſimile.
[Theoph. : ita &
G. Z. Pan. legit
etiam, id eſt. pē-
nas.] Sed quum
ramulos quil-
piam contingit,
folia veluti are-
ſcentia & lan-
guetia con-
trahi aunt, [vul-
gata ex. haec
leguntur in G. Z.
legit etiam
vult. : nam hebe-
tata conuulſa,
duroſenta. Leg.
a quoniam cum
Scal. obareſcentia]
deinde paulo

pōit ad vitam redire & viuere. Theoph. lib. 4. l. 1.
cap. 3.

De eadem & Plin. Sylueſtris fuit & circa Mem-
phum regio tam vallis arboribus, vt terminant
rent vel circumplecti, vnus peculiari miraculo,
nec pomum propter, vſumve aliquem, ſed cū-
tum. Facies enim ſpinæ folia habet ceu pennas,
quæ tactis ab homine ramis, cadunt protinus, ac
poſt à reſcuntur. Hinc arbori affinem herbam
prodidit Apollodorus Democriti diſcipulus, quā
ideò Aſchynomēnen appellabat, quia admo-
tum reſugere manuſoliorum contractione.

Hinc Guiland. d. Papyro: Annon, inquit, Aſ-
chynomēnen narratam Apollodoro Democ. diſ-
cipulo, cum ſuperioribus annis in Arabia pere-
grinaret, appropinquante manu, folia contra-
hentem his oculis vidi. Quæ, aut eadem fuerit, aut
ei ſimillima, cum ea, quam Luſitania hodie Her-
bam vinam appellat, ex braſilia Prouincia primum
ſubuectam, quæ attracta non ſolum reſugit, ve-
rum etiam omnia folia ceu indignabunda ad ter-
ram deiicit. Octonum circiter pedum eſt plantæ
proceritas, quæ oritur in Prouincia Malabar: ea
rerum acceſſum videtur ſenſu percipere: appro-
pinquante homine aut animali ramos conſtrin-
git, recedentibus, pandit. Folia Polypodii, flores
verò luteos habet. Hanc Veteres ignorariſſe, vt
cenſet Garcias Hortus, Proregum in India Ori-
entali Medicus celeberrimus, non puto: quinimò
ſuſpicio de hac loquentum eſſe Theoph. lib. 4. cap.
3. peculiare quiddam circa Memphim naſci tra-
dentem: Ego iturpem iſtam diu, multumque in
Aegypto circa Memphim, Heliopolim, Tanim &
Alexandriam quaſitam nuſquam offendere po-
tui. Hæc Guilandinus, quem voluiſſemus deſcri-
piſſe ſuam viſam Aſchynomēnen, ac indicariſſe,
eſſe ne herba, aut arbor.

Meminis & M. Fumee in Hiſt. Ind. Gen. Arbo-
rum, quarum folia tacta in Nicaragua areſcunt.
At Monardes ſcribit ſibi duas herbas ſiccas dela-
tas: vnā, quæ ſuo ſolo ſtans ac in vigore, ſi manu
tangatur, ſubièd in terram quaſi mortua decidat:
alteram ſupra terram delapſam, ſi tangatur vt col-
ligatur, criſpati & contrahi, vt braſſica Murcia-
na.

Sed herbæ vinæ hiftoriam Acoſta ſic tradit.
Nonnullis inquit Aſiæ locis planta quædam in-
uenitur, vulgò *Herba vina* nuncupata, à Circum-

ſtantiis illis *logues* appellatis, *Herba amoris*, ab
Arabibus & Turcis *antac*, & à Perſis *Suluque*. Exi-
tam habet radicem, è qua ſupra terram exiliunt
octo rami duos digitos longi, foliis vtrinque in
ordinem digiſtis, & inter ſe reſpondentibus onu-
li, quæ plurimum ad Erui tenella folia accedunt,
nec diſtincta ſunt foliis prioris Polypodii, cuius
conem Lacuna exhibet l. 4. cap. 187. in Dioſc. ſed
longè tenuiora, & vtrinque læuia, & grato virore
oculos paſcentia, vt Tamarindorum folia: è me-
dio radice capite exiliunt pediculi [nam caule ca-
ret] quatuor, ſinguli ſuum florem ſuſtinentes,
flauum, aſpectu pulcherrimum, minoribus Ca-
ryophyllis ſimilem, ſed ſine odore. Naſcitur
calidis & humidis locis. Adèd mira eſt huius plan-
tulæ natura, vt eam humana ratio aſſequi ne-
queat. Nam cū maximè vires, gratiſſimæque eſt
aſpectu, ſi quis illam apprehendere cupiat, illicò
ſona contrahit, atque ſub tenues ramulos recon-
dit: ſi verò apprehendat, ſubièd adèd marcida
conſpicitur, vt exſiccari pntet. Sed quod maiore
admiratione dignum eſt, ſi manu detrahat, illicò
ſuum nitorem recuperat, & toties marceſcit,
atque reſeſcit, quouies comprehenditur, aut
manus ab ea retrahitur.

Teſtatur autem Acoſta ſibi relatum fuiſſe, Phi-
loſophum quendam in Malabar, dum nimis cu-
rioſè huius plantæ naturam obſeruare & per-
pendere cuperet amentem eſſe redditum. Plan-
tam te conſpexiſſe, eamque cum ſuo caſpite, ni-
hil inuſ quàm de ipſa cogitans, eruiſſe, & in
hortum quendam tranſuſiſſe, vbi permanſerit, ac
ſtatim minimè vidit. Herbam Aſchynomēnen
Apollodori, Luſitani [Authore Dalecham. apud
Plinium.] vocant Herbam vinam. Eius meminit
Theoph. 3. l. 4. Ouid. in America Hiſt. & Iulius
Caſ. Scalig. nec non Garcias.

Hiſt. Lugd. quoque ſcribit eſſe, qui exiſtunt,
Arborem pudicam Scalig. eſſe eandem quam deſcri-
pſit ſolis Polypodi, & Theoph. ſolis Filicis. Sed
illa ſeparat, & tribus diſtinctis locis agit de *Arbore
pudica* Scal. de *Herba vina Acoſta*, & de *herba tacta
ſtanteſcente*, & alia ſe contrahente Monardis, ita vt
quatuor faciat differentias hoc capite deſcripta-
rum plantarum, inter ſe diſtinctas.

Nonnulli indigenæ Medici, vt Acoſta perhi-
bet, *Herbam vinam* aſſerunt vtilem eſſe ad vir-
gines corruptas, in integrum [ſi credere fas eſt]
reſtituendas, & ad reconciliandum amorem viri
eſſe efficacem. Gentilis Medicus, & pro ea regio-
ne ſatis doctus, cū adèd cupidum cognoscendi
huius herbæ facultates conſpiceret, ait, vnā ſe
edocturum adèd compertam & certam, vt cerui-
cem pro pignore deponeret, niſi ſic ſe habere
comperiret. Nempe vt illi cuiuſpiam mulieris,
qualiſcunque etiam ſtatus, nomen modò indica-
ret, ſe effecturum vt illa in omnibus ſibi [Aco-
ſte] obſequeretur, dummodò ex ipſius præſcri-
pto herba vteretur. Sed conditionem reſpuiſſe
ait, in re tam illicitā. Nihil igitur aliud poſt di-
gentem inquisitionem de hac planta intelligere
potuiſſe, quàm apud Gentiles, præſertim verò
Brachmenes Canarinos & *logues* in magna ex-
timatione eſſe. Quodam die ſibi accidiſſe plantas
conquienti non procul à ſumme Mangate, vt
Gentile. n. quendam humi ſedentem, & verba
quædam obmurmurantem, tanquam oraret, ſor-
tè conſpiceret, quem cū compellaſſet, nihil re-
ſpondiſſe, ſed ſuo interpreti, quem comitem du-
xerat Acoſta, manu duntaxat innuiſſe: eum ho-
mine intellecto celeriter ſe inde proripiſſe, &
ſe quoque ſcedere iuſſiſſe, dicentem, Gentilem
illum

Herba Si-
na deſcri-
ptio.

Locus.

Folia Poly-
pody.
Flores.Garcia re-
pro.Dna ſpe-
cies.Braſſica
Murciſana.Herba Si-
na qua &
Herba a-
moris ex-
a deſcri-
bitur.
Suluque.
Suluque.
Erui folia.
ſem Polypodii.

Flores.

Miraplantæ
naturæ.Philosophi
curioſam
hiſtoriam.Vires & v-
tus.
Verginitatis
reſtoratione.
Amoris ut-
licitas.

Hiſtoria.

Descriptio *Herba impudica* *Herba quæ*
illam incantatorem esse cuiusdam illius regionis
Capitanæ, quem Caymal appellant, & illic for-
teriacre supra Herbam suam: id fieri solere re-
purgato prius circa ipsam plantam solo ad homi-
nis longitudinem, recitarique quædam concepta
verba, & expectari primam auem, aut rem anima-
tam, quæ istam plantam prætergrederetur, dum
verba obmurmuraret, cuius sanguine (si compre-
hendi posset) perluenda esset: sin minus, alte-
rius eiusdem speciei, idque cum multis cæremoni-
is hic prætermittendis, cum indigne sint, ut scri-
pta mandentur. Idem testatur contempisse se de-
inde istam plantam siccam inter suppellectilem
mulieris prostituta pudicitia. Vt iam nobis videat-
ur hæc herba potius impudica dicenda, quam pu-
dica.

ARBOR VENEREM EXTINGVENS.

CAP. LVII.

Descriptio *Herba impudica* *Herba quæ*
Hic tam impudicæ herba, aliam plantam tā-
quam prostituta pudicitia addidisse cōueniat. Arbor quædam in India Peru-
ana inuenitur, matene spongiola, ex qua Indi
nunquam ignem struent, tamen si quis illis mor-
tis periculum minitetur. Aiunt enim, quotquot
ad eius flammam siue ignem accedunt, aut quos
fumus solummodo pertingit, in re Venerea im-
potentes fieri: Refert Monar. ex epistolis Petri
de Olina. Quæ res, si fide non caret, lepidè sa-
ne inuertet illud Terentii, Accede ad hunc ig-
nem propius, & frigescas plus satis.

ARBOR AMBVLANTIBVS FOLIIS.

CAP. LVIII.

Descriptio *Herba impudica* *Herba quæ*
Infula Cimbulon vicina est alia, in qua nascitur
arbor, cuius folia, cum in terram deciderint,
gradiuntur perire ac si viverent. Ea Mori foliis
multum similia sunt, parte vtraque binos pedes
breues & acutos habent: quibus abstractis sanguis
minimè manat. Statim atque folium quis attige-
rit, illud mouetur & abicit.

M. Ant. Pigasetta, qui hæc refert in itinera-
rio, testatur se octo dies vnū in scatula habuisse, quod
cum tangeret, circa scatulam iuisse: nec alia re
quàm aëre viuere existimabat.

Scaliger Eadem & Scaliger prodidit, sed nullo citato
autore. Quasi ipse vidisset & habuisset. Varia
tamen in eo, quod non pedibus abstractis, sed
compressis nullum exire sanguinem scribit. Im-
menum profectò naturæ miraculum, nisi sub-
sit id, quod suspicamur: nempe folia illa ex corrupte-
le quadam & proprietate specifica ex arbore sua
delapsa nobiliorem vitam acquirere, nempe sen-
tiam, licet obscurè, quàm perpetuò cum motu
coniunctam esse Physici tradunt. Iamque non
amplius erit de censu plantaceo, quia non sub
plantæ forma, sed sub perfectiori. Mouentur e-
nim immò seipsas mouent & promouent. Imò
& sentiunt. Tactæ enim abeunt ac refugiunt. Vi-
trunt igitur nunc vitam animalis. Quanquam e-
quidem summum etiamnum videatur naturæ mi-
raculum arboris folio animalem sociare sentiam &
gressum.

Locum Eandem celebrat doctiss. Guiland. libello de

Papyro, his verbis: Mirabilem plantam, qui Ma-
gellanicæ circumnavigationi interfuerunt memo-
rant. Quippe in insula Cimbulon, quæ proxima
est insulæ Burnei, conspexerunt arborem, cuius
frondes in terram lapsæ, reptione quadam seipsas
promouent: &c.

An M. Fume in hist. gen. Ind. Arbor cuius folia
si cadant supra terram conuertuntur in vermes?
Prouenit in Borney insula Indiz.

AMBVLON ARBOR.

CAP. LIX.

Descriptio *Herba impudica* *Herba quæ*
Nominis affinitas & hanc iungat. Ambula-
bat ista reipsa: hæc nomine solo. Arbor est,
cui nomen Ambulon, quam fert Arucher insula:
cuius è cortice fructus exir candidus, Saccharati
specie, & magnitudine Coriandri. Scaligerum vi-
disse & nouisse dicas, tam confidenter refert, nec
dicto autore.

ARBOR MVSCARVM SPLENDENTIVM.

CAP. LX.

Descriptio *Herba impudica* *Herba quæ*
Versamur sanè inter mirabilia. Ad quandam
figuram Cosmographicam ab Anonymo
quodam hæc annotata. De arborum specie legi-
tur, quæ nullos peculiare atque viui aptos pa-
riunt fructus: sed noctu examine muscarum cin-
guntur, quatum quæque radiantem lucem de se
spargit, non aliter ac si plurius candelæ interea ar-
borem accendat essent, haud exiguum admiratio-
nem & terrorem incutientes iis, qui eius rei igna-
ri, de improviso in eam incidunt.

ARBORE MAXIMAE ALTITVDINIS
& crassitudinis: vt Cerebæ.

CAP. LXI.

Descriptio *Herba impudica* *Herba quæ*
Inter hæc arborum miracula, libet & naturæ po-
tentiam celebrare in arborum vasta & prope-
modum immensa altitudine & magnitudine.

Scribit Strabo lib. 15. de Indiciis arboribus. Qui
dixerunt trans Hyarouldem visam fuisse arborem,
quæ vmbra in meridie faceret quinque stadio-
rum, cunctos exuperant de arborum magnitu-
dine.

Refert Theophrast. In Corsica (vulg. Basil. co-
dex 2. p. 177, pro eo quod in Aldin. legebatur 2. v. 177. *Corfien de*
Corfien. Correctionem approbant Scal. & Gaza.) *heres ma-*
nasci ligna ad miraculum, vique procera, enodia, *heres ma-*
luta, sed vastâ magnitudine arbores, magnoque
discrimine reliquis excedentes. Et quamuis in
Latino agro Abietes & Pini [*indixim*] tam magni-
tudine quàm pulchritudine inter omnes arbores
præstent, has tamen nihil esse ad illas. Romanos
enim aliquando oppidi condendi causâ in eam in-
sulam nauibus quinque & viginti profectos, tam
vastis arboribus locus dicitur excepsisse, vt navi-
gantes per sinus quosdam & portus, telas & vela
densosque malos passim & variè pertruperint &
dilacerarint: & omnino totam illam insulam con-
ferissimam & quasi effertatam immani illo arbo-

rum stipatu. Quamobrem Romanos à condendo oppido destitit. Sed nonnullos ingressos exiguo loci spatio, tam largam exardisse materiem, ut ratem perconderent quinquaginta velis duccendam, quam in Pelago petiisse addunt.

Annotat Scal. nunc in Corsica non esse ea miracula arborum, quæ iactat Theophr. Et Romanos fauos, qui à litore non abisterent prius, quam arborum proceritate, atque frequentia, quas procul liceret [ut mos est navigantibus] conspici, vela scinderentur. Fidem propemodum excedit quod canit Virg. Georg. 2.

Aut quos Oceano proprius gerit Iulia lucos,

Extremis finis orbis? ubi aëra vincere summum

Arboris hand ulla iactu potuere sagitta.

Virgilium & Valerius Flaccus imitatur, eandem arborum enormitatem exprimens. Quod cum legisset Plin. aut fortè aliunde quoque vel auditione lectione ve didicisset, in India tam altè scripsit arbores ascendere suis fastigiis, ut sagittæ superari nequeant. Constituit etiam quibusdam designatam proceritatem, ad centum scilicet quadraginta quatuor [44111. CH.] pedes: sed eas quia nonne tenus tradidimus suis locis.

Sic & Petrus Martyr de rebus Oceanicis & nouo Orbe, illarum arborum altitudinem prædicat tantam, ut nulla virilis lacerti vis sit, quæ domum ædificatam in illius altitudinis attingere possit. Ex illis arboribus plerasque dimensos brachiorum ambitu viros septem interdum octo stantes vix complexos esse. Idem alibi: Arborea ibi esse ita proceras habuit, ut pleræque sexdecim hominum manu iunctorum in gyrum vix lacertis concludi queant.

Ac utrumque hominum numerum pro amplexu confirmat quoque M. Fumeæ in Hist. Gen. Ind. Occid. traditque ibi vnam ingentis esse altitudinis, supra quam morabatur Indus Caciua Abihaba. Et rursus alio loco: Arborea, inquit, altissimæ in Nicaragua, inter quas quædam vocatur Cerba, tantæ crassitudinis, ut quindecim homines amplecti non possint.


Referunt enim, ut annotat Cardanus, ibi quandam inuentam è Cerba genere [nam hoc est arboris genus omnium maximæ] trifidam inter ceteras, cuius singuli trunci viginti pedum ambitu cingebantur. Spatia verò ipsa inter truncos iuxta terram totidem pedibus distabant: per ipsa verò spatia cuius onustus pulchrè duci poterat. At ubi trunci in vnum coibant: hoc autem à terra procul ferè pedibus quindecim, crassitudo arboris pedum erat quadragintaquinque. Ab ima parte crassioris trunci, usque ad locum ubi primò prodibant rami, pedes octoginta: superior pars, ex qua rami pendebant, absque mensuræ modo. Huius tantæ proceritatis causa solum fecundum, cæli robur, arboris natura: nam Lignum eius leuissimum est, terræ modicum & tenuioris habens, humidum plurimum. Eandem arborem Cerba in Nicaragua nasci ex autoritate Historiographi Ind. Occid. refert, ut quindecim homines eam circumplecti nequeant. Ex eodem narrat duas visas, alteram octo, alteram sexdecim hominum amplexus excedentem. Tot sanè Authorum consensus fidem sibi derogari vetat. Mirum tamen, nullum eorum, qui de Indicis plantis ex professo prodidit, qui quidem hæcenus ad nostras peruenierit manus, illas arbores descripsisse, non Garciam, non Acostam, non Monardem.

ARBOR FARINIFERA.

CAP. LX.

Non admiratione caret, [inquit Clus. Exot.] Descrip. arboris Farinifera natura, quam illi, qui generoso viro Francisco Drake, Equiti, [dum to-

tum Orbem circumnavigant] comites fuerunt, obseruabant. Referebant, anno 1581. præcedentem anno inde reduces in Tarsenate Insula æquatore proxima ad Arcticum Polum vergente nasci arboream quandam plantam, cuius truncus humanæ coræ crassitudinem æquaret, decem verò pedum altitudinem attingeret: summo fastigio in orbiculatum caput Brassicæ



capitæ instar extuberantem, in cuius medulla natura quandam candidam farinam produceret ad illius insulæ homines tenuioris fortunæ sustentandum: Eam diligenter colligere, deinde assusâ, siue in aspersa verius, modica aqua, fermentare, pinere, & in formulas quasdam coctili latere constantes inmittere longa serie, atque prunis ardentibus circumquaque admodum & super eam impositus coquere. Erant verò ii panes [liba, Panes] siue placentæ interdum palmares, vnciali crassitie, quibus illius insulæ incolæ calidis & recentibus coctis vesci solebant: at ubi indurassent, tepida aqua macerantes pulvis modo ederent. In stipidi saporis esse, cum degustarem, hic panis mihi videbatur. Verum iniecto Piperis aut Canamoni momento cum saccharo, nonnullis deliciæ esse queat. Eiusmodi panis bina fragmenta, qualia nostri Morgani opera accepimus, hac tabella exprimi curauimus.

An hæc porro Zaga, cuius meminit Ferd. Lopez Ind. Hist. 6. c. 11. Scribit enim ex eius medulla panem fieri in hunc modum. Medullam exemptam in sicilia inicientes, aqua salia macerant, post aliquot dies soli exponunt, refectam mandant, vel ex eius farina seu polline panem conficiunt, nostro [vidi enim] qui ex secale fit, colore & sapore persimilem.

Antonijs Pigafetta, qui primus orbem nauæ, cui insignis Victoria circumit, in suo Itinerario Sagu per Linon per se scribit.

Nec incommode fortassis ea censerè possit, cuius meminit M. Polus Veneris lib. 2. sui Itinerarii, de regno Sansar agens, his verbis, quæ de Italico sermone ita reddidit: etenim Latinus interpres satis negligenter suo munere functus mihi videtur. In ea, inquit, Prouincia, vastarum arborum genus est quas durum virorum vix vix amplecti queant: hanc adempto cortice, qui tenuis est succedit ligni materies, medullam in se

Vasta arb.
Ind. Hist. 6. c. 11.

Petrus
Martyr.

Mira ar-
borum
crassities.

Cerba ar-
bor.

Cerba ar-
boris de-
scriptio.

Lignum le-
uissimum.

Vita.

Panes.

Zaga.

Preparatio
ad panem.

Sagu.

Polus Veneris
arboris Sa-
nsar.

con-

continens farinaceam, similem [vernaculo eius sermone utat] à quella de caruol [scilicet lignori]. Hæc in figulinum vas aqua plenum, iniecta, baculo agitatur, vsus huius & lodes supernatet, purgata farina subsidat: effusa deinde aqua, sit è repurgata farina, massa ad vari generis edulia conficienda, idonea, quæ sæpius edisse, & non nulla Venetas vsque detulisse refert, panis hordeaceo, colore & sapore similia. Illius arboris lignum ferro confecti potest, nam in aquam iniectum, sicut illico & mergitur, directèque, vt harundo donax finditur. Ex eo incolæ lanceas sibi parant, sed breues [longas enim ob nimiam grauitatem ne ferro possent quorum extimam partem in cuspidem exacuunt, & adurunt: his quamlibet armaturam facilius penetrant, quàm si ferrea cuspidem munire essent. Alibi lib. 2. cap. 16. scribit Fernatem insulam, naque Oryzam ferre, aut alias fruges, è quibus panem conficere queant, eam ob causam ab arbore matrem illos petere necesse quæ panis loco vtiatur. Eam itaque arborem rectam in multas partes findunt, quas malleis ex crassa arundine factis condunt, atque inde eliciunt veluti farinam quandam ipsi Sagge appellatam [ea haud dubiè sagu, seu Zagu, de qua mox dictum] scilicet lignorum, quæ sic ita relecta sunt, similem, ex qua panis satis albi placentas quadrangulas conficiunt palmi magnitudine, quibus non modò vescuntur, sed magnà ferè ex parte sua mercumonia exercet, harum permutatione alias res quibus indigent, redimentes.

ARBOR FARINIFERA VENENATI SVCCI

CAP. LXIII.

Arbor cuius scarificatè liquor venenatus Rissagali modo mortifer, radix tamen edulis, ex qua faciunt farinam Syluestres in insulis Canibalinis dictis, vt sit in America, licet arbor differat trunco, ramis, & foliis.

Quæ de Luca traduntur, habent quæ conueniunt cum hac arbore, vt videre est sub cap. de Manihot & Luca. Meminit & Scalapud Theophr. exitialis Indiæ plantæ, cuius è farina, succo abiecto, conficiunt panes.

BAXANA ARBOR VENENATA
aliaque similes, si non eadem.

CAP. LXIV.

Ansula Ormuz decem miliaribus distat ea quæ Queione nominatur, è regione illius sita, olim Principum quorundam delicia, nunc inculta & deserta, tum quod magna ex parte diruta sit ob vehementes terræ motus, tum ob viperarum, aspidum, colubrorum, qui colore à nostris valde differunt, atque serpentium omnis generis copiam, quæ illic stabulantur: ex quibus tam venenata & pestilens aura exhalat, vt non solum homines perimat, qui vel aliquantulum moram illic fecerint, sed etiam stupres ipsas inficiat, in quibus est arbor Baxana, cuius fructus vel minimum degustatus, mox suffocat: ad quod ipse etiam umbra præstat, si quis vel quadrantem horæ sub ea moretur. Cum tamen alius in regionibus eiusdem arboris radix venenorum omnium sit

antidotus, illic lethalis, nec non & folium ipsius, & fructus qui Rabuxit vocatur. Thevet.

De eadem aut certe simili arbore scribit Pet. Martyr de rebus Oceani & noui Orbis. Est arbor, cuius si folia nudum corpus tetigerint, vibices eleuent ingentes: & nisi illis aqua marina vel salina matutina medeatur, illico lethalem suo veneno excitent dolorem. Hanc arborem & Hispaniola parit. Eius etiam lignum olfactu aiunt esse mortiferum, nec portari à quoquam lignum posse sine vitæ periculo. Repertum eo ligno voluisse Primarios noctu dormientes suffumigatos interimere. Habent ipsi genus herbæ, cuius odore sulti remedium sibi comparant ab eius ligni veneno, vt portare illud queant indemnes.

ARBOR VENENATA ALIA.

CAP. LXV.

Inter Peru & Canibales multa sunt insulæ, quæ Lynius imperio patent, quem Casique nominant: in quarum maximæ, in qua sæpius Rex habitat, arbor nascitur fructum ferens magnitudine pilæ Palmæ, visu speciosum, sed venenatum. Huius succo Barbari sagittas imbunt, ut aduersus hostes in præliis vti. Thevet.

ARBORES NAUTICÆ, VT ANGELINA.


CAP. XLVI.

Ad figuram æneam à Io. Linchottano annotatum, in Oriente Arbores esse crassitudine mirabiles, ex quibus etiam nauigia consulantur. Circa Cochinum Arborem esse, quam Angelinam vocant, ex qua itidem naves ædificantur, quas Tones nominant, integro trunco capacissimo & durissimo: nam & ferrum duritie sua rodere. Nullas in hisce nauigiis commissuras esse: ita excavatum duntaxat lignum pelago innatare. An Aegosta easdem intelligit quando ait. Colubrinum lignum proueniens locis humidis & inter arbores præsertim secundum eas quæ Angelini nuncupantur, nec procul à mari.

An easdem Oforius? Brasilianorum nauiculæ sunt ex magnis arborum corticibus, quædam ita amplæ, vt 10. homines facile capiant, Nam Indi alueis ex singulis arboribus cauatis nauigant, quas Cymbas illi Piraguas vocant, & earum maximæ quinquaginta circiter homines ferunt: vt notat Benzo.

ARBOR CANOARVM SIVE NAVICULARUM INDOARVM.

Arbor est aliquot ramulos supernè protrudens, ex qua Indi suas carinas, quas Canoas illi, Nostris Nachen vocant, conficiunt. Bry fratres Icon. part. 4. Ind. Or. Earundem meminit Itinerarium anni 1599. quarum vsus in Insula S. Mariz. Canoas insuper incolæ Hispani insulæ norunt, cymbas siquidem, non tamen ferro, sed core præacuta excavant, easque Canoas appellant. Testa-

Arbor na-
uigii.

Arbores in interiore latioris parte Aphyllon In-
dicum.


tur hoc Maximilianus Transiluanus, dominusque : accedunt
etiam ex illa Insulam Indiarum, ubi
duas Canoas Indorum conspi-
ciunt, sic enim hoc genus nauigii,
quod peregrinum est, ab Indis nuncupari
solet, est enim excisum, cau-
tioneque ex unico arboris trun-
co, capitque vnum, vel ad
summum, alterum hominem.


ARBORIS YGA CORTEX AD NAVIGIA.

Sunt arbores [Inquit Io. Scadius] in regione
Yga, Yuera dictæ, hæcque integras decorti-
cant, a summo usque ad imum, & ut cortex il-
lus detrahatur, peculiari apparatu arbores cin-
gunt, hinc cortices detractos in montes prope ma-
re ferunt, & ignibus excalescitos, in utraque ex-
tremitate multum incuruant, per medium ligna
transuersa religant ne dilatentur : & scaphas ita
conformant, quarum singulæ vel triginta viros
armatos bello inuicere sufficiant.

Cortex hic pollicaris est crassitudinis, latus
quatuordecim pedes, longus vero quadraginta,
alij etiam longiores sunt, alij breuiores. Has illi,
scaphas summa agilitate impellunt, & quod libet
locorum in eis vehuntur. Si mare impetuosum est,
subducunt eas in terram, donec serenitas redeat,
Ultra duo miliaria in altum non progrediuntur
sed secus litus pro libitu procul excurrunt.

FINIS LIBRI QUARTI.






HISTORIAE UNIVERSALIS PLANTARVM

LIBER QVINTVS.


ARBORES ET FRVTICES BACCIFEROS;
MINORESQUE BACCAS FERENTES HABET.



Est variam illam exotici Orbis diuitiarum Illustrationem, nunc propius ad nostrum Orbem gressum & oculos dirigentes, unâ quasi tribu complexas dicamus Bacciferas. Baccas iam non adeò stricte sumi velimus, quarum ex edito Plinio, inens signum, & extra caros, ut Vinis, Cerasis: nec tam vago significari, ut eadem his cum Pomis natura tribuatur cum eodem: sed potissimum, quas verius bacculas dicat: quanquam & Ebuli baccas dixerit Virgilius, & Hederam bacciferam Seneca, nobile, Hercle, minus ac Oleari, I autum &c. Inter illas Choragii ins tribuatur Myrto, ne eam negligentes, forè ad Myrtum canere iubeamur.

DE MYRTIS IN GENERE

CAP. I.



Myrto Theoph. ramos tenues tribuit, perpetua coma virentes, folijs crebris angustis & odoratis: flores fructibus insidentes: ait fructificare ex annotinis: fructum esse vinosum. In fruticem transire, nisi sæpius purgetur: monte Cyrcæo Coronarij generis videri, cum cæteræ ampla exeat magnitudine. Semine satam degenerate, & ex fructu nigro rubrum fieri. In Ægypto tenuem esse, & odore longè præstantiorem: fructu exiguo, nec candido sed nigro. Hæc sparsim Theoph. cum iis quæ suis dicenda locis. Agnoscit igitur has differentias: Coronariam, cui quasi opponit magnitudine amplam, candidam, & nigram, respectu fructuum. Agnouit & Myrtum absque semine ægypti, sed arte & Mangonio factam, uti dicitur.

Quærit Aristoteles, cur nigræ Myrti copiosiores sunt frondes, quàm albæ? An inquit, quod nigræ generis sunt siluestrioris? Cuius iudicium, quod locis rusticis istæ proueniunt, minimè quæ ex cultu mutantur. Humida autem omnia fronde crebriore conduntur. Quod enim minus suos fructus decoquere possunt, idcirco ad frondem alimentum se conuertit.

Idem quærit, quam ob causam Myrta collisa in manu dulciora sentiamus, quàm integra? An quemadmodum racemorum acini vindemiati dulciores sunt quàm non vindemiati. Etenim musto, quod natura suaue est excepti acini quasi conduntur: quippe qui vel extrinsecus mustum resudent, at qui in racemo cohererent, utique insuauiores existunt. Ergo Myrta quoque natura dulcia, intus-

que suam dulcedinem acinorum in modum vuz continentia, vbi manu compressa, confictataque sunt, diffusâ intestina dulcedine, parte quoque exteriore inopplentur: itaque dulciora non immerito sentiuntur.

Sed cur Myrta enucleatiora [ἀνελκυστέρα] sunt quæ minora? An quia minus perfecta sunt quæ minora: idcirco semen continent imperfectum, cū perinde, ut finis, nucleus deputatus est: quamobrem & minora sunt, utpote fustuli quidem agnati exteriores partisque imperfecti, & minus dulcia, quàm quæ iustum continent nucleum: sunt enim minus concocta. Concoctio autem, non nisi perfectio est.

Cur denique fructus Myrtorum non conditarum magis quàm folia, desuuant, conditarum autem, reseruatorumque Alga [τῆς ῥαχῆς] ut sit, folia desuuant, fructus adhæreant? An ita euenit non conditis: quoniam natura sancitum est, ut fructus peracta decoctione flaccescant ac decidant: quæ quidem decoctio in repositis fieri non potest, sed Algæ vapore prohibetur, ne humor fructus peruertatur ac immutetur: folia contra cū tiecescant, decidunt. Algæ autem, ut salsa, exiccandi vim habent. Ergo non idem folijs accidit arbori adhærentibus, & conditis, modo quo dictum est. Hæc ferè Arist. de Myrtis habet.

Apud Diosc. est *Myrtus* quæ, id est, latius: & *Myrtus* ægypti, siluestria, id est, Ruscus. Satiua duplex, uisara, & *Myrtus*: nigra & alba: & in eo ipso genere accommodatior *Myrtus*, montana. Myrto siluestri tuæ, folium tribuit Myrti, sed latius &c. de qua alibi.

Cato Myrtum coniugulam habet & albam &c.

V u

Differentia
Theop.

Coronaria

Magna

Candida

Nigra

Ægypti

Quæritur

de Myrto

Differentia
Diosc.
Satiua
Nigra
Candida
Montana

Tom. I.

nigram: sed Colum. duo tantum Myrti genera agnoscit, nigrum & album.

*Martida-
nam Hip.
Ruell. not.*

Hippoc. Martidanum videtur nominasse, ut observavit Ruell. Myrtidanum vero ipsum Piper. Hinc forte Ruell. satis imperite Myrti baccis, Piperis gustu tribuit: quamvis idem magna securitate dicat Curtius.

Succus.

Myrto Plin. tribuit folia perpetuo virentia, angusta, disposita. Sed succorum natura, ut idem refert ex Theoph. præcipuam admirationem in Myrto habet, quando ex una omnium Olei viarumque bina genera sunt, de quibus inter vireas. Arbor ipsa, inquit idem, in Europæ ceterisque cælo; [solo. Dal.] quod à Ceraunijs montibus incipit, primum Circeijs in Elpenoris tumulo villa traditur: Græcumque ei nomen remanet, quo peregrinam esse apparet. Fuit ubi nunc Roma est, iam tum eum conderetur. Quippe ita traditur: Myrtea Verberna Romanos Sabinosque, cum propter raptas virgines dimicare voluissent; depositis armis purgatos in eo loco, qui nunc signa Veneris Cluacinae habet. Cluere enim antiqui purgare [pugnare. Gr. Gyal.] dicebant. Et in ea quoque arbore sufficienti genus habetur. Ideo tum electa, quoniam coniunctioni, & huic arbori Venus præest. Haud scio, an prima etiam omnium in locis publicis Romæ facta sit, fastidico quidem & memorabili augurio. Inter antiquissima namque delubra habetur Quiriti, hoc est ipsius Romuli. In eo factæ fuere Myrti duæ, ante ædem ipsam per longum tempus; altera patritia appellata: altera plebeia. Patritia multis annis prævaluit, flaccescente plebeia, exuberans ac læta: quamdiu Senatus quoque floruit, illa vicens, plebeia retortida, & lqualida. Quæ posteaquam eualuit flaccescente patritia Marlico bello, languida autoritas Patrum facta est, ac paulatim in sterilitatem emarcuit maiestas. Quin & ara vetus fuit Veneri Myrteæ, quam nunc Murtiam vocant. Caro tria genera Myrti prodidit: nigram, candidam, coniugulam, fortassis à coniugijs: ex illo & Cluacinae genere. Nunc alia distinctio: sativæ aut silvestris, & in utraque latifolia. In silvestri propria oxymyrtiline. Satiarum genera topiarij faciunt. Tarentinam folio minuto, nostratam patulo, exoticam densissimo, senis foliorum versibus. Hæc non est in usu. Ramosa utraque alia. Coniugulam existimo nunc nostratam dici. Myrtus odoratissima est in Aegypto.

*Roma sacra
Myrto duo*

*Patritia,
Plebeia.*

Veneris

Myrtea.

Caro tria

Myrti.

Coniugula.

Cluacina.

Differentia

silva.

Silvestris.

Tarentina.

Nostrata.

Exotica.

Coniugula.

Myrtus

Myrtea.

Caro tria

Myrti.

Coniugula.

Cluacina.

Differentia

silva.

Silvestris.

Tarentina.

Nostrata.

Exotica.

Coniugula.

Myrtus

Myrtea.

Caro tria

Myrti.

Coniugula.

Cluacina.

Differentia

silva.

Silvestris.

Tarentina.

Nostrata.

Exotica.

Coniugula.

Myrtus

Myrtea.

Caro tria

Myrti.

Coniugula.

Cluacina.

Differentia

silva.

Silvestris.

Tarentina.

Nostrata.

Exotica.

Coniugula.

Myrtus

Myrtea.

Caro tria

Myrti.

Coniugula.

Cluacina.

Differentia

silva.

Silvestris.

Tarentina.

Nostrata.

Exotica.

Coniugula.

Myrtus

Myrtea.

Caro tria

Myrti.

Coniugula.

Cluacina.

Differentia

silva.

Silvestris.

Tarentina.

Nostrata.

Exotica.

Coniugula.

Myrtus

Myrtea.

Caro tria

Myrti.

Coniugula.

Cluacina.

Differentia

silva.

Silvestris.

Tarentina.

Nostrata.

Exotica.

Coniugula.

Myrtus

Myrtea.

Caro tria

Myrti.

Coniugula.

Cluacina.

Differentia

silva.

Silvestris.

Tarentina.

Nostrata.

Exotica.

Coniugula.

Myrtus

Myrtea.

Caro tria

Myrti.

Coniugula.

Cluacina.

Differentia

silva.

Silvestris.

Tarentina.

Nostrata.

Exotica.

Coniugula.

Myrtus

Myrtea.

Caro tria

Myrti.

Coniugula.

Cluacina.

Differentia

silva.

Silvestris.

Tarentina.

Nostrata.

Exotica.

Coniugula.

Myrtus

Myrtea.

Caro tria

Myrti.

Coniugula.

Cluacina.

Differentia

silva.

Silvestris.

Tarentina.

Nostrata.

Exotica.

Coniugula.

Myrtus

Myrtea.

Caro tria

Myrti.

Coniugula.

Cluacina.

Differentia

silva.

Silvestris.

Tarentina.

Nostrata.

Exotica.

Coniugula.

Myrtus

Myrtea.

Caro tria

Myrti.

Coniugula.

Cluacina.

Differentia

silva.

Silvestris.

Tarentina.

Nostrata.

Exotica.

Coniugula.

Myrtus

Myrtea.

Caro tria

Myrti.

Coniugula.

Cluacina.

Differentia

silva.

Silvestris.

Tarentina.

Nostrata.

Exotica.

Coniugula.

Myrtus

Myrtea.

Caro tria

Myrti.

Coniugula.

Cluacina.

Differentia

silva.

Silvestris.

Tarentina.

Nostrata.

Exotica.

Coniugula.

Myrtus

Myrtea.

Caro tria

Myrti.

Coniugula.

Cluacina.

Differentia

silva.

Silvestris.

Tarentina.

Nostrata.

Exotica.

Coniugula.

Myrtus

Myrtea.

Caro tria

Myrti.

Coniugula.

Cluacina.

Differentia

silva.

Silvestris.

Tarentina.

Nostrata.

Exotica.

Coniugula.

Myrtus

Myrtea.

Caro tria

Myrti.

Coniugula.

Cluacina.

Differentia

silva.

Silvestris.

Tarentina.

Nostrata.

Exotica.

Coniugula.

Myrtus

Myrtea.

Caro tria

Myrti.

Coniugula.

Cluacina.

Differentia

silva.

Silvestris.

Tarentina.

Nostrata.

Exotica.

Coniugula.

pod Athen. coronas etiam Myrti celebrat:

A. Coronas fortassis valeis, an e Serpyllis,

An e Myrto? alia deservimus.

Has e Myrtos nos volumus:

Alia omnes his exceptis vendito.

Controversum fuit apud Græcos, quodnam corone genus esset Anacreonti Naucrarides appellatum. Et pluribus visum est, non aliud esse, quam ex Myrto, Rosis comitantibus: quamvis alii aliter interpretentur. Celebris est Hyppoliti & Phædræ amoribus Træzenia, cuius folia, ut inquit Pausan. prope Veneris delubrum satz, perforata nascebantur: iniuriam videlicet ferentia læuientis vnguibz & calamistris feminæ.

Alia commentum sunt Græci Fabulam: Myrsinē Atticam fuisse puellam pulchritudine ac robore insignem, ut reliquas puellas omnes, ipsosque adeo iuvenes fortitudine superasse, ideoque Palladi, vel ut alii, Mineræ gratissimam. Hanc in palaestris ac ludis semper versatam, & vincetes coronasse. Cum autem certamine iuvenes quosdam superasset, ab eis ob invidiam interfectam: Sed Mineræ favore in Myrtum conuersam. Ita factum ut ne mors quidem eius amicitiam deleuerit, Myrto à Dea illa etiamnum peramara. Eiusmodi iugis Græculi suas spes & cogitationes delectabant, ex quibus tamen mysticum sensum elicere norunt ingeniosi ac docti.

Lesbi, ut inquit Athen. Myrti ramulos hypothymidas vocant: iis se coronant implexis floribus: Alii pectorales coronas, quibus & ceruices quoque redimibāt, hypothymidas hypothymidasque dicebant. E Myrto constant & Hellorides vocatz, ambitus ingentis, cubitorum vicenā: ab Europa dictæ, quam Ellorida Corinthii appellant, quod eius ossa in Myrto condita ferantur. Quidam Elothida & Mineruam dictam volunt. *Canere ad Myrtum* prouerbio dicitur. In conuiuio enim mos antiquus fuit, ut unusquisque suam canticum cantillaret. Quod si quis cytharā accipere recusasset, (quod & Themistocli euenit, aliis doctissimo, sed eo ipso indoctiori habito) utpote Musices ignarus, is per iocum accepto ramo vel Laureo, vel Myrteo, ad eum canere cogeatur.

Plutarchus in prim. simp. aliter: Mos antiquus fuit ut in principio cōviviū voce cōmuni primum, Deum canerent: deinde Myrti ramū, quem *drapē* vocarent, unicuique traderent post circumlatam lyram. Alii dicunt Myrtum ordinē non solum circumducere, sed & sponda ad spondam transferri, ut postquam cecinisset is, qui in prima sponda primus sedebat, ei traderet qui in sec. lecto prim. accumberet. Hic rursus tertii lecti primo. Deinde rursus primi lecti secundus secundo, in secunda sponda sedenti, ut ad hunc modum per omnes iret. De ignaris dicitur.

Redeamus ad Myrti historiam: quam Ouid. unico versu geminam dixit:

Myrtica silva subest bicoloribus obsita bacis.

Baccas quippe candidas, vel in purpura albicantes, candida: nigra nigras parit.

Barbari ex Myrtis, Myrcillis & Cubebis differentiam facientes, Cubebas vocant *Myrtos albas*: nigras verò *Myrcillas*.

Bellon. meminit Myrti sterilis, & fructifera folio lato circa Athos montem, nulla facta mentione coloris fructus: verum alibi scribit se reperisse, in Amari montis inferiore parte Myrtum fructu albo, item planiciem Casataz Ciliciæ abundare eā, & planiciem in qua Alexandri & Darii confectus habitus, copiosam, sed tantum fructu albo: sed non docet quo folio sit Myrtus alba. Post

verò annotat inueniri inter Alexandriam & Rōsettā iuxta mare paruas Myrtos nigras.

Matthiolo Myrtus tam latua quam silvestris nigra & alba, vna icone folio latiore expressa: secunda Tarentina: Tertia Exotica. Lacunæ quoque & domestica & silvestris fructu est albo & nigro.

Turnerus in Anglico suo Herbario Myrti differentias ex Diosc. ita digessit, & his aptavit. Duo, [inauit] habet Myrti genera Diosc. De Myrto satua libro primo agit: De silvestri, Latine Rusco, lib. 4. et si innuere videatur, prater Ruscum, aliam esse Myrtum silvestrem. Duo facit idem Diosc. Myrti satiaz genera: Albam, [Angl. *White myrt* vel *myrtel tree*] & Nigram: [Angl. *Black myrtel tree*] quarum vnam vidisse ait Bononiæ, quincuplo minoribus foliis, quam à Matth. nomine Myrti vulgaris satiaz proponitur. Eandem vidisse in Apennino: sed qui demonstrabant, Myrtum silvestrem denominasse: illam verò foliis minoribus, [quam reuera censet Myrtum satiam Tarentinam] solam Myrtum satiam. Ego tamen [inquit ille] hac in re Matthiolo potius assentior quam contrarium sentientibus. Quamquam videtur mihi Matth. Ruscum nimis exiguis foliis pingere, Myrtum autem [alterius ratione] nimis latis, magnisque, siquidem Diosc. in Myrti silu. seu Rusci descriptione [Angl. *Boehmeria*] folia ei tribuit latiora quam satiaz Myrto. Vtramque vidi. Et certè erratum est in tenuitate foliorū Rusci, ut in Rusco dicitur fusiū.

Satiaz Myrti rami lenti, cortex ruber, folia longa, æterni viroris, ad Punicæ folia accedentia. Albæ folia candidiora: Nigræ nigriora. Vtrisque flores albi, odorati. Satiaz baccæ maiores, quam silvestribus.

Cæterum Turneri Myrtis visa Bononiæ nobis videtur Tarentina, quæ sanè olim non pingebatur à Matth. Dubitamus an Turner. viderit in Apennino Myrti illius speciem spontaneam, quā Matth. pro satua & vulgari pingit. Scimus autem cultam non minora habere folia Rusco: & apud Turner. parte secund. cap. de Rusco positam iconem Myrti vulgaris pro Rusco, non tamen bonam; sub titulo Sabine. Non displicet illa sententia, quæ asserit Tarentinam esse satiam Diosc. ut postea dicitur.

Dod. notante, Myrtus frutex haud magnus, cultura in exiguum arboris speciem quandoque adolescit: folia vni minuta, alteri verò maiora, & Vincæperuincæ vulgaris æmula: tertia autem media magnitudinis. Sunt eadem nonnullis rariora, quibusdam frequentia. Fructus sunt baccæ oblongæ, colore aut nigre aut subalbide. *Har Dod.* qui pro suis differentiis quatuor proponit icones plantarum, sibi non bene (ut existimamus) cognitarum: nec etiam videntur ritè eius accommodatæ differentiis. Olim in hist. Gal. duas tradebat Myrtos sub vna icone, magnam & parvam.

Annotat Cus. se in Hispanica sua peregrinatione aliisque locis multa genera Myrtorum obseruasse, nec dubitare quin ex sarione maior adhuc varietas oriri possit. Myrtus Græcis *μύρτος*, *μύρτις*, vel *μύρτιν*: illud apud Aristoph. & Plat. hoc apud Gal. *μύρτις*. Theophrastus *μύρτις*. Archilochus Myrtos vocat, & Græci Cōmici phibaleon, ut Antiphanes, notante Hermol. Non phibaleon, ut habet Currius. Pro Ficu inuenimus apud Etym. nullibi pro Myrto. Quod verò Rishus notat, Myrtam dici Varroni fructum, hoc apud eum nondum reperimus. Colum. quidem tradit

Para. 1
Myrtus 21
874
Differentia
Matth.

Myrtus
Silvestris
latua.

Satua ab
ba.

Myrtus
Tarentina.

Satua
Myrtus
in quibus
differt
alba & ni-
gra.

Dod.

Synonyma
Linguar.

Myrtus
phibaleon
Myrtus
Myrtus

Myrra.
Interp. Nic.
Myrra.
Myrrida.
Myrrida.
Myrra.
Erima.

Nadas.
Ar. Alas.
As.

Olea genus l. 5. c. 7. quod vocat Murram. Fructus
mulla Nic. in ther. Interp. *myrrine* *myrrina* sic enim
legendum, non *myrrine*, *Myrrina* Græcis dici
monet Curtius: Vbi id legerit, nos latet. *Myrra*
aliiquid dicta: *Myrrili*: *Myrra bacca*. Inuenimus &
myrride dictas *Myrra* baccas & *myrra*. Sunt qui
velint *Myrrum* sic vocatam propter *Myrrha* quan-
dam æmulam odore gratiam, quâ pollent baccu-
le, vt annotant Aduersaria: quamvis dubium
adhuc sit, vtum Græcis innotuerit prius, *Myrrha*,
an *Myrrus*: nobis sanè longè petita videtur nomi-
nis deriuatio, & *Myrrhe* odorem longè diuersum
à *Myrra* bacculis agnoscimus. Has *myrride* vocat
Lonic. Hebræis *Hadas*: Esa. 55. Arab. *As Alas*
sive *As*. It. *Myrra*, *Marrina*, & *Mortella*. Hisp.
Catal. & Portug. *Murra*: Castil. *Arraihan*. Gal.
Myrra & *Myrra*. Germ. *Myrrenbaum*, *Welsch*
oder *Frömbder Heydelbeerbaum*. Belg. *Myrrus*.
Angl. *Myrral-tree*.

Nunc à nobis & Recetioribus obseruatas Myr-
ti differentias proponamus.

MYRTVS VVLG. NIGRA ET ALBA; SATIVA ET SILV.

Genera.

Sativa des-
cripta.

Folia.

Flores.
Bacca.

Marcell.
Silvestris.

Sapor.

Locus.



Huius Myr-
ti quam
exhibemus, no-
tante Matthiol.
produntur duo
genera: *sativa*,
quod in candi-
dum & nigrum
diuiditur, & *sil-
vestre*. *Sativa* in
arbores facile a-
dolescent, ramis
flexilibus ac len-
tis: rubro corti-
ce: foliis longius-
culis, perpetuo-
que virentibus.
Punicæ æmulis,
quanquam in
nigris nigriora,
in candidis can-
didiora spectan-

tur. Flores omnibus insident candidi, odorati.
Baccæ oblongæ, agrestes Oleas quadantenus re-
ferentes, multò sanè silvestribus maiores, etsi con-
trarium asseueret Marcellus.

Inter silvestres quoque alba & nigra reperitur,
quarum quamplurimas plantas vidisse mille locis
testatur Matth. quibus maturæ inerant baccæ non
sanè nigre.

De eadem Myrto existimamus Clus. hæc trade-
re. Myrti quartum genus, sive Myrtus Bætica silu.
non adeò densè fruticat, neque admodum as-
surgit, ramis tenuibus & fragilibus, folijs eiusdè
cum Myrti Bæticæ angustifoliæ folijs magnitudi-
nis, similiter mucronatis, duplici serie rariùs cir-
ca ramos nascentibus, nigricantibus, odoratis:
flos alijs similis: fructus rotundus, oblongis pe-
diculis ex foliorum alis prodeuntibus inhaerens,
copiosus, primùm viridis, deinde candicans, per
maturitatem verò niger, vinosus, grati admodù
cū adriktione quadam saporis. Spontè prouenit
plerisque agris & collibus Extremaduræ (quæ
Bæticæ pars est, ad Anam flumen sita) & Lusita-
niæ illi conterminæ, adeò copiosè vt per aliquot
miliaria, nulli ferè alijs frutices conspiciantur.

Octobri interdum florentem, sed maxima ex
parte fructu onustam hanc Myrtum colligebam,
cùm Madritio Vlissiponem proficisceretur, locis
incultis & procul à mari, procul à fluminibus dis-
sitis, nunc latioribus, viridioribusque & ampli-
oribus folijs, nunc planè exsuccis, & ferè tigen-
tibus pallidioribusque, pro locorum natura &
situ. Nam in conuallibus nata, multò latior &
viridior semper erat. Hispani simpliciter *Arayhan*
& *Myrra* vocant: eam siluestrem iudico, quò-
niam spontè locis incultis prouenit.

Plinius siluestrem Myrtum, minore semine. Cor-
dus fruticem arborescentem dicit, folijs Lentisco
vel Buxo similibus, acuminatioribus tantùm igu-
stu aliquid aromatis præ se ferentibus & odora-
tis; quæ hodie cum fructu ex Italia afferunt.

An Bellion. Myrti semperverentes, in vallibus
montis Athos prouenientes, folio lato, steriles &
fructifera.

Brassauolam quoque facile crediderimus, Myrti
nigre & albe titulis, in suo exam. latifoliam in-
telligere.

Matth. sanè testatur silvestri Myrto vniuersa ferè
Tyrreni littora virescere: siquidem in agro Se-
neni, in maritimis, ac in vniuerso Liguriæ tra-
ctu: Romano, atque Neapolitano, vbique Myrtos
spontè prouenire constat.

Pro iconè Matthioli aliam posuit Camer. in Epit.
& Hist. Germ. Matth. ad quam & nostra facta. Ca-
mer. dicitur Myrtus communis Italica, *Mortella*.
C. Bauhin. aliam iconem habet titulo Myrti Ro-
manæ. Eiusdem Myrti, de qua hic agimus iconè
habent Lonic. & Ryff. sed non placet. Minus ve-
rò quod ille ait, aquaticis locis libenter proueni-
re. Lacuna, qui Hispanus: & Amatus, qui Lusita-
nus, nihil docent de ea præterantè dicta, *sativa* tam
esse & siluestrem: vtramque fructu nigro & albo,
adhibita Match. iconè. Hic Hispan. *Rasad* & *Mor-
ra* dici ait.

Scribit Anguill. in epist. Myrtum albam non esse
speciem separatam a nigra: differre tamen colore
notissimam vtramque esse in Italia, Regno Nea-
politano & Tuscana: vocari *Mortellam* & *Myr-
tellam*.

An Aduers. Myrtus maior vberius in Gallopro-
uincia maritima fruticans, propter baccas, la-
nulas effigiantes, maior dicta: folia item maiora,
Phylereæ aut Granati minora, floribus albidis &
Myrti minoris similibus: Alterius modi ex hortis
Franciscanorum Venetorum habuimus folijs al-
bidioribus, & fructu albo pari & simili, nec ali-
oqui ita diuiso, illis alba Myrtus vocatâ. Itè Obs.
Myrtus vulgaris folia promit paulò minora quàm
exotica Myrtus sive Mauritanica, in angustum
desinentia.

Icon. Plant. Myrti maioris 5. species. Item Obs.
Myrtus 3. folio est oblongo, supernè latiusculo,
cum superiore (videlicet postea à nobis posita ti-
tulo latifoliæ Belgicæ densiore folio) ferè pari bac-
ca alba.

Sed peritis tamen perpendendum relinquimus,
an iam locis citatis de eadè Myrto alba tradatur:
à Clus. Myrto alba diuersam esse manifestum est,
de qua postea. Dod. in Hist. Gall. hanc nostram
videtur vocare magnâ Myrtum, arbulculam in Bel-
gio crescentem ad altitudinè hominis, folijs Vin-
cæ pervincæ. Hæc fortè erit quam alteram vocat
in postrema Hist. Lat. pro qua ibi videtur propo-
nere duas Icones: vni, titulus Myrtus 1. quæ à
Lob. posita pro Myrto Laureæ maxima: alteri i-
coni titulus est, Myrti ramuli cum flore ac semi-
ne, quæ Lobel. Myrtus vulgaris.

Folia
Myrra
Myrra
Myrra

Locus

Myrra
Myrra
Myrra
Myrra
Myrra

Myrra
Myrra
Myrra
Myrra

Alba

Catal.

Cesalp. Myrtus arbor est fruticosa, in sterilibus & maritimis nascens, subrufo cortice, materie candida, foliis Buxo latioribus in acutum deline-ribus, odoratis: Flores candidi, foliati, multis in medio staminibus, ex alis foliorum longo pediculo prodeuntes: fructus oblongi: Intus semina triplici septo membranaceo distincta: color in maturitate alius niger, aliis ex rubro candicans. Turnero an nota fuerit, dubitamus: Leon tamen, sed non admodum bano posita videtur incuria, synographica Cap. de Rusco sub titulo Sabine. Cæterum nostram Myrtum vulgarem, folio latiore, non ausimus cum Matth. facere Diosc. sari- uam, etiamsi colatur: quia ipse Diosc. scribit cap. de Rusco, sariæ folia esse minora quam Rusci, quod in hac nostra nondum observatum. Quam verò depictam dedimus, eandem censemus cum iis quas Frontignani & Monspelii vidimus in ali- quod hortis.

Locus.

Parauit cum baccis mense Decembri, in horto à Cortuso ostensa: Veronæ cū iisdem Martio. Colunt & Bononiæ in hortis: Basileæ Platerus, & Lutetia Robinus hortulanus Reg. aliquot egregias arbusculas colunt, sed magna cura hyeme recondunt. In Plateri Myrto mense Aprili obser- uauimus baccas & folia binario numero distribu- ta, sapore astringente, amariulo & aromatico, odore grato terendo. Ex horto Stutgardiano, ubi plures habentur, in Montbelgardensem transtuli- mus, sed non feliciter prouenit, cum tamen Ta- rentinæ rami depacti facillè radices agant.

MYRTVS BOETICA LATIFOLIA
DOMESTICA.

Descriptio.



Hæc autore Clus. His- panis dicta *Arayban morisco*, hoc est, Mauri- tanica Myrtus, tamis est satis crassis, foliis du- plici serie rariùs dispositis, ma- gnis, ut interdū ad Lauri tenui- foliæ aut Arburi foliorum ampli- tudinem ferè atcedant; colo- re dilutiùs pau- lò virente, odo- ratis: rariùs hæc floret aut fru- ctus fert, quod

ea sepibus texendis, quas tondere solent, plerum- que vrantur. Nusquam hoc genus vidisse ait, ni- si in Monasterio quodam Hispali & in lætissimis Mauritanorum Granatæ viridariis, in quibus pis- cinas & lacus clauderant sepes hoc Myrti genere constantes, & ex alio quodam, non multum hinc dissimili, minoribus tamen & paulò densioribus foliis, cuius nos hic picturam damus, quamuis mi- nus peritè nostram a pictore ex Clusiana depi- ctam agnoscamus.

Descriptio.

Myrtus Batica 1. latifolia sine Laureæ Clus. Item Myrtus Batica 2. Clus. Lob. Obs. ubi eadem icon cum Clusiana.

Myrtus Batica latifolia exotica.

Myrti Baticæ latifoliæ secundum genus alius quam Batica latifolia domestica fruticat, & a ra- dice plurimos, densos, crassos, firmosque ramos promit: folia dictæ secundæ speciei similia, sed aded confertim nascentia, ut mutuo ferè sese con- tingant pediculi interdum duplici tantum serie, sæpenumero triplici, admodum odorata: flos eius candidus, quinque folijs constans, Cerasio- rum floribus ferè similis, villis candidis plenus, odoratus: cui fructus succedit paulò oblongior, quam in Tarentina, primum viridis, deinde cum maturefcere incipit, purpurascens, tandem ubi plenam maturitatem adeptus est, niger, vinolus, sapore grato, grana candida incutur in se conti- nens. Clus. qui hoc genus primò conspexisse scri- bit in Complutensis arcis horto, multis fructi- bus serie quadam & ordine dispositis, elegantis- simo spectaculo cum semper vireat. Deinde Cor- dubæ in quibusdam hortis. Nos quoque Stutgar- diæ obseruauimus Myrtum, odore perquam fra- granti, cui ex certis interuallis folia ferè semper terna indidem prodeuntia, lata: an verò eadem cum prædicta sit asserere non audemus.

Locus.

An Lob. Obs. Exotica Myrtus Plin. pluribus foliorum versibus, siue 4. amatoria Venerique sa- cra: *Arayban Morisco* maior Hisp. vocata, folijs [tertiæ Myrto vulgari albæ] non disparibus, sed canulatis, & confertim in eundem speculo stipatis.

Clus. in Hisp. nullam habebat iconem: in po- strema hist. eandem habet quam Lob. pro Myrto Batica angustifolia, de qua nunc.

MYRTVS EXOTICA ANGUSTIFOLIA

Descriptio.



MYRTUS Batica angustifolia exotica eadem est folio- rum densitate & serie, quæ Myrtus Batica exotica latifolia verum folio mi- note & satura- tius virente; fru- ctu etiam maio- re & magis or- biculari, qui, re- liquorum Myr- torum fructus imitat, a baccæ in- flexa grana ferè, minora tamen quam præceden- tis.

Huius gene- ris vnicam arborem vidisse refert Clus. in Hiero- nymitum monasterio, primo ab vrbe Corduba militari. Hispani *Arayban morisco*, hoc est, Myrtum Mauritanicam vocant. Latini de Clus. sententia poterit esse Exotica, licet æternis ad summum folio- rum versibus distinctam idem viderit, cum Plin. senos versus suæ exotica tribuat: verum quidem est, aded dense stipata interdum nasci in exotica latifolia antè dicta & in hoc genere folia, ut pluri- bus versibus constare videantur.

Pro Myrto exotica angustifolia Clus. ponit ico- nem à Lob. exhibitam pro exotica Myrto Plinij pluribus foliorum versibus, de qua antè.

De Myrto exotica angustifolia Clus. hæc scribit

scribit Lob. Myrtus 10. Pluribus foliorum versibus: Myrtus Mauritanicus alter Hisp. *Arayhan*, Morisco minor, folijs item canularis confectis & densissime striatis, vulgatz Myrto fetè paribus. Iconi iam dictæ ex Lob. & Clus. Dodonæus in post. hist. Lat. nomen indidit Myrti 3. cuius folia tradit mediæ magnitudinis.


Matth. in Diosc. olim sine descriptione pro Myrto exotica Plin. exhibuit iconem. In postremis autem scribit: Exotica habetur nunc in Italiz hortis & viridarijs, folio nostrati non absimili, dilutius tamen, acuminatiore copiosioreque, aded densio, ut eo rami ubique stipentur. Fructum fert oblongum è longoque pediculo dependentem, seminibus reterum, communi Myrto haud absimilem. Flores albicantes, ut in cæteris generibus: topiarijs operibus peridonea habetur. Item post. com. Lat. Exotica Myrtus nunc habetur in Italiz hortis, folio nostrati non absimili &c: Et in hist. Germ. ubi figura à Camer. appicta: *Der Aufblendische Myrtenbaum*, Myrtus exotica, quod olim Italiz peregrina, aliunde translata, maximè verò in Regnum Neapol. &c. Baccæ oblongæ, ut in Myrto vulg. sed sapore non aded grato, venim asperiore & magis acerbio.

Camer. iconem novam posuit in Epit. ex hist. Germ. Matth. & Gesnerianis, ut existimamus, ad quam & nostra depicta.

Ceterum Myrtum *canalicam* Matth. à nobis visam Veronæ apud Calcæolarium inter Italicas nostras observationes inuenimus: eodem nomine & titulo D. C. Bauh. ramum attulit Ferrariæ lectum.

MYRTVS LATIFOLIA BELGICA; FORTE ROMANA.

Descriptio.



Ramena.

Canalicula.

Latifolia que Belgicis in hortis colitur, inquit Clus. amplo est folio quo latifolia Bætica primæ magnitudinem non æquat, viridi, ratiore ordine, & eo duplici circa ramos disposito. Hanc Romanâ dici posse existimat idem, quam Plin. eandem cū coniugula Cætonis esse putat: eam ex Italia & Roma in Belgiâ illam certum esse, in Hispania

sibi non visam.

Lob. in obs. Myrtus prima omnium maxima; Laureæ dicta a folio Laurino, Lauro Tino siue Regiæ simili, sed minori & magis acuto, atronitente nigraque bacca: alitur in altissimo Paradiso D. Philippi *Denrægle* D. de *Vrylandr*. Dod. iconem hanc ponit pro Myrto 2. cui folia Vincperuince.

Myrtus Romana alia species.

C. Bauh. Myrti Romanæ nomine attulit ramum Myrti Bononiæ in hortis nascentis cuius folia Myrti exotice, sed nonnihil latiora, in acumen

desinentia, longitudine vnciali, sed longè alio ordine disposita: quippe bina tibi opposita, ex intervallo penè vnciali, qua in re multum etiâ differunt ab exotica, & accedunt Myrto vulgari sed ab hac quoque diffidet mollitie, foliorumque latitudine maiore.

Myrtus latifolia Belgica minor.

Myrtus alia, teste Clus. in hortis Belgicis provenit, paulò minor præcedenti interdum vegetiore viridiorèque folio, quandoque pallidiorè & tristiore. An Lob. Obs. Myrtus 6. inter maiores minima, folio Oleæ silu. siue Oleastris.

Myrtus latifolia Belgica densiore folio.

In Belgicis hortis observavit Clus. Myrtum densiore folio & magis mucronato quàm præcedens Belgica, eodemque nunc vegetiore & latiore, nunc etiam pallidiorè. An Lob. Obs. Myrtus 2. folia habens paulò minora [quàm prima omnium maxima] superne item mucronata, & in acutum fastigiata.

Myrtus Belgica medio folio.

Myrtum quandam tradit idem in Belgicis hortis visam, medio folio & Myrto Bæticæ silu. non multum absimili, sed minùs nigricantibus & quodammodo pallescentibus virgultis, longiore etiam fructu. An Lob. obs. Myrtus 7. inter minores maior, folio angusto Phillyreæ tenuifolia breuiore. Hanc eandem existimamus à nobis observatam Vesuntini in instructissimo exoticorum horto D. de Bellefontaine: folia erant paulò maiora, quàm in Tarentina & acuminatiora.

MYRTVS TARENTINA.



Nostro cælo solumque reliquis notior est Myrtus Tarentina, duplici triplicique versa dispositis folijs, crebris, parvis: hilari virore nitidis, fragrantibus: Flores quinque folijs candidis aliâmore constant, quorum mediâ occupat numerosa staminâ, odore grato & amabili. Baccæ per (maturitate haud secus ac alia) nigrescunt,

semine plenæ, inflexo, albo. Huius iconem olim Matth. exhibuit sine descriptione. At in post. com. hanc tradit nomine Myrti Tarentinæ, quam ait à Tarento Apuliæ ciuitate, ubi copiosè proveniat ita vocatam, folio nostrate [id est latiore vulgari] longè minuiore, robustioreque: fructu minore, copiosiore & in summitate pluribus apicibus coronato, colore ex nigro purpurascente, minutis, crebris, albicantibusque intrus ossiculis: floribus communi Myrto similibus. Topiarijs peridonea.

De eadem sic Clus. In Belgio Myrtus provenit minore folio omnium frequentissima in Septentrionalium regionum hortis, antequam minor domesticæ fructu alba nota esset. Eius cum ramuli facilius

cilius radices agat, si pingui solo pangantur, quā n huius, etiam satis vulgaris facta est multis Germaniæ hortis. Habet verò minor hæc conferta admodum folia, duobus ut plurimum versibus in ramulis disposita, nonnunquam ternis: quemad. in alijs generibus aliquando etiam accidit. Floret plerumque in Belgio autumnō: fructus rarissime ad maturitatem pervenit, sed in ipsa planta tota hieme hærens, cum rursus sud veris finem aëri exponitur, inanis & immaturus decedit. Ad Tarentinam Myrtum referenda est: nisi quis potius ita censeat, candidam minutissimo omnium folio Tarentinam esse vocandam. Nam cum Caro tantum nigra, alba, & coniugula meminerit: iam verò coniugula Plin. sit Romana, nigra & fructu satis nota: restat candida, quæ ad nullum Plinio descriptum genus referri possit quā ad Tarentinam. Sic Hortensis in Belgio proveniens minutiore folio non incommodè Ægyptiam Theoph. descriptam referet.

Minoris Myrti nomine Aduersaria tradunt, Offic. notiorē esse suis baccis, adeoque totam hortis Septentrionalium delicias & ornamentum. Fruticare virgis tonsilibus, rectis, flexilibus, nigricantibus, ethigie Buxi, folio minore, sed Rusci mucronato, baccis nigris Hederæ, vineum succum pressu remittentibus: quibus post vindemias saginentur aues, tamque suaves illas edendo fieri, ut integræ, non exenteratæ essentur, eoque proverbio feratur, stercus earum præstare carnibus.

In Galloprovincia maritima, vbi siccanus collis nullus, cui ardeat paullo placidior aura, nō multavernat hæc Myrtus, autore Lobelio & Penna. Sed, quod aiunt Myrtum minorem suis baccis officinis notiorē, vix cōcedere possumus, licet in Belgio frequentior sit, teste Clusio. Consideret lector unde afferantur baccæ. In Belgio sanè non inaurantur, quot eis sufficiant: sed nec istud placeat, quod folio Rusci mucronato dicant.

Hanc eandem censens Lob. obs. Myrtum 2. minorem vulgata, brevioribus [quam 7. 2] folijs stipatam: vbi sicut & in Icon. Plant. proponitur titulo Myrti minoris vulgaris. Gal. perit Myrte, quo nomine & Dod. in Hist. Gal. describere videtur: qui iconem habet, quam tamen non docet an maioris sit vel minoris, quasi neutram probe cognitam habuerit: Nos minoris esse putamus. In post. hist. Lat. omissa descriptione, meminit tantum Myrti folijs minutis: ac iconem à Lob. positam pro Myrto noua angustifol. & à Clus. pro Myrto domest. fructu albo, exhibet is titulo Myrti prioris: nec distinguit Tarentinam à minore, nec à Myrto fructu albo.

Camer. Myrti Tarentinæ titulo iconem Gesneri habet aliquando ex nostra ipsi transmissa planta sicca, paratam. Ei quippe (ego Bauh.) omnes meas plantas siccas cum descriptionibus & observationibus per Italiam, Galliam, aliasque provincias collectas lubens, eo id flagitante, transmissi. In ea icone folia sua magnitudine picta.

CÆSALP. fortè Myrti Hispanicæ genus angustissimi folij, sed numerosissimi. Ceterum quod Diosc. ait l. 4. de Rusca: ἀγρία, ἡ δὲ αὐτὴν μύρτην ἔχει, mouet nobis dubium, an sariua eius Myrtus non sit referenda ad Myrtum Tarentinam. An Turner. Myrtus sariua Tarentina, de qua antè.

Porro Myrtus Tarentina pulchra apud Matth. picta quanquam folia crebriora possent appingi, Abundat Monspelij in hortis & in maiusculam arborem excreuit. Fructum fert Augusto mensē


& autumnō. Floret Iulio aut Iunio. In Italia multis hortis copiose colitur: Item in magnatum tam Germaniæ quā Gallie hortis, sed raro fructum fert aut certe rarum, quemad. & apud nos Montbelgardi, vbi plures alimus, aliquot etiam duos cubitos altas, stipite pollicari, iam à multis annis. Floret æstate & aduentante autumnō: sed fructum pluitæ autumnales intercipiunt. Feliciter propagatur ramis & surculis depactis: sed annotinæ vix hiemem ferunt, nondum firmis actis radicibus, nisi curiose muniantur. De loco & cultura quemad. & viribus omnium Myrtorum postea.

Myrtus domestica fructu albo.

Myrtus domestica fructu albo, siue candido, tradente Clus. satis altè fruticat, tenellorum & rubentium ramorum frequentia densa, folijs omnium minimis, angustioribus & magis mucronatis, quā in vlla Myrto, saturatius virentibus, fragrantis odoris. Flos par reliquis tum etiam fructus, qui initid quidem viret, maturitate autē non nigrescit, ut reliquorum, sed exalbidus manet. Primum hoc genus eidem conspectum in hortulo Ill. Viri Dn. Ferdinandi Colinho Lusitani peregrinarum studiorum, cuius hortuli sepes ex hoc Myrti genere constabant. Conspicitur etiam apud Cl. V. D. Io. Boissor, qui omnium primus ex seminibus ab eodem communicatis aluit.

Hæc fortè Tarentina Plin. ut cap. præced. dictum. Hæc eandem fortè Diosc. tradente Clus. in Hist. Hisp. eius iconem non ponit: verum in postrema exhibet eandem quam Lobel. posuit pro angustifolia minima, ex quā nobis mox eodem titulo proponitur. Myrti domesticæ alteræ ex Hispania allatæ fructu albo se Clusium donasse ait Camer. sed frigoris impatientem periisse.

MYRTVS ANGVSTIFOLIA MINOR.



Clus. tradit Myrti domesticæ fructu albo inueniri aliam speciem eiusdem formæ, sed per omnia teneriorem, exiliore folio, primum visam in hortulo Ill. prædicti viii.

An hæc Lob. in obs. Myrtus 9. minima, foliolis angustis, Thymi Cretensis longioribus: cuius iconem proponit in appendice & in iconatione Myrti 9. angustifoliz. Clus. verò in postrema sua historia posuit pro Myrto domestica fructu albo.

Nos Lutetiz in horto cultissimo Robini Botanici Regni diligentissimi obseruauimus Myrtum angustiore & minore folio quā Tarentina, alias nulli, quod equidem sciamus, nobis visum ac ne siccam quidem. Iconem hanc, ut antè dictum, Dod. ponit pro Myrto priorē. Hactenus Myrti differentias digessimus, prout censemus distingui posse. Nunc aliquid etiam de Myrtidano tradendum:

MYRTIDANVM.

Descriptio. **Q**uod *μυρτιδανον* dicitur, teste Diosc. id est, quod Myrto adnascitur, inaequabile, verrucosum, intumescensque & concolor: quod perinde, quasi manus, Myrti candicem amplectitur. De hoc ipso locus videtur Gal. l. 7. simpl. his verbis: *ὁ μυρτιδανος τὸ καλὸν τῆς τοῦ καλῶς αὐτοῦ ἐπὶ τῶν οὐδὲν ἔχει μυρτιδανος ὀνόματι.* Verum Paul. Aegin. non *μυρτιδανον*, sed *μυρτιδα* hoc ipsum appellauit. Idem Gal. Gloss. Hip. Dioscoridem citans, inquit: *μυρτιδανον, οἰκιστὶς ἰσθμίου πίνου. ἀποκατείδετο δὲ ὁ Ἀνδρόκλεις, ἐν τῷ πύλῳ περὶ ἑλάνης, ἐπὶ τῇ ἀνὰ μὲν αὐτὴν καὶ οὐδὲν ἔχει τῷ μύρτινος περὶ τῶν. ὁ γὰρ μύρτινος ἵπποκράτους τῶν ἀγρῶν ἔχει ὀνόματι ἐν τῷ γούρῳ, ὅπου αὐτὸς ἐπὶ τῇ ἀνὰ μὲν αὐτὴν πίνου. μέμινε αὐτὴν μυρτιδανὸν Hip. in secundo de morb. mul. Ergo aliter ab Hip. aliter à Diosc. accipitur τὸ *μυρτιδανον*. Galeno verò homonymum est & utramque significationem agnoscit. De Hip. myrtidano dicitur cap. de Pipere. Plin. verò longè aliter myrtidanum accepit, nempe vinum ex siluestribus myrtis bacis factum, de quo postea.*

*Myrtidano
vini Plin.*

*Parua
Myrtum.
Epimyrum.
Brassau ro-
prou.*

Scribit quoque Brassau. in exam. Myrto adnasci parua Myrtum, quæ Myrtidanum dicatur & Myrtida à Paulo. Id enim intelligere se per adnatum id, quod circa corticem nascitur. Epimyrum vocat, & frequentissime à se visum, quāvis à Gal. Myrtida sobolem Myrti solum intellexerit. Ac facere nobis videtur Brassau. intelligendo, ut nulli intelligat. Nam aperte ex Gal. locis modò citatis patet à Gal. per Myrtida non tantum sobolem Myrti intellectam, cum ipsum etiam Diosc. citet. Immo ubi sobolem per *μυρτιδα* intelligat, nondum vidimus. Non enim æquè feliciter nobis Brassau. sobolem dicit, quod Diosc. & Gal. *ἐπὶ τῶν* vocitantur. Et iam nobis Brassau. parua Myrtum facit ex myrtidano, quod Diosc. si non excrementosum quid, sanè pars quædam tuberosa & excrementitia dicta: quam nobis seuerus ille examinatus nunquam rectè parua Myrtum dicit.

Agricola not.

Idem tradit, Myrti semen ab Hip. myrtidanò dici. Locum nondum vidimus. Si tamen quis per Myrtidanum vel myrtida, æquè intelligere velit parua Myrtum, magnè adnasc entem, quod & Agricola fecit, ac adnatum id, quod circa corticem nascitur: primum est ut doceat nos quæ & qualis sit illa Myrtus parua, ut aliud nomen à matre sua habuerit, quāvis rami aut furculi: aut quo autore istud faciant. Non enim putamus ut Cisto hypocistis, ita Myrto Epimyrum seu hypomyrtum innasce. Nec quicquam hæcenus, quod et quidem sciamus, simile obseruatum.

Martidano.

Hermol. sanè myrtidanum seu myrtadanum virgultum & sobolem myrti vocat, qualis fortasse in Ficu quoque fruticet, exiens ab radice: eundem fruticem ab Hip. *Martidanum* appellatum, *Myrtidanum* verò ipsum Piper. Quo verò in loco is apud Hip. legerit martidanum, nec addit, nec notum est nobis. Ruellius ex eo Imeminit martidani. De ea autem voce nihil Grammatici nostri. Nihil etiam de martidano seu myrtidano frutice recentiores Herbarii: quod legerimus. Quod autem autem Diosc. myrtidanum nominatur, vulgò notissimum est, ubi Myrtus fruticosa nascitur, vel Matth. teste.

*Myrtidano
descriptio.*

Annotis Myrti arboribus, inquit Camer. in ramis nascitur inaequale & tuberosum, colore vario, excrementum, quod manus instar, arborem complectitur, quod Myrtidanum appellant. Attingentius autem quævis Myrti vel folia vel semen.

Horum neuter fruticis aut stolonum meminit. Myrti adnascencias dicit Lonic. An eadem intellexit Nicand. in Ther. per *ἐπὶ τῶν*, Hispania Myrta. Myrtades quippe Myrto ipsa efficacis parte & obstruere apud omnes in confesso. Nun Natales Myrtorum in genere dicamus.

De Myrti Natalibus non conuenit inter Virgilium & Quidium. Ille, Amantes frigora Myrtos, dixit: hic, Metuentem frigora Myrtum. Nodum soluisse putat Camer. scilicet: Ouid. loqui de plantis tenellis, Virgil. de adultis: nam & hic Eclog. 7.

Dum teneras defendo frigore Myrtos. Sanè tenellas Myrtos, ut facile à frigore, ita facile à Solis aestu pari experimèto scimus. Malimus utque sic. Vtrumque de Myrto etiam adulta locuti, sed Quidium magna frigora, Virgilium, loca umbrosa & frigidiuscula intellexisse. Magna frigora Myrtus perire nequit. Sub ardenti sole non feliciter fruticat. Non umbras amat quod breui radice sit autore Theoph. qui tamen in Aegypto regione calidissima Myrtum mirum in modum odoratam assurgere scribit, ubi cetera omnia bebecunt. Hermol. vitam ei, ut quibuscumque animalibus, ambiguum esse ait, hoc est, terram & aquam. Ita Virgilius

Amantes litora Myrtos.

Litora Myrtis latissima.

Et Ouidius *Litora Myrtis*. Subeunt & in montosa autore Plin. Sed Myrtum in feruidis locis nasci etiam Theoph. autor est, minimeque in frigidis durare, minus adhuc Myrtum quāvis Laurum, argumento, quod in Olympo Laurus multa, Myrtus nulla omnino, in Ponto autem tota neutra sit: quanquam summo studio omnique solertia ferere conati sint ad vsus religionis. Hinc Plinius circa Bosphorum Cimmericum in Panticappo urbe, omni modo laborauit Mithridates Rex, & ceteri incolæ, sacrorum certè causa Laurum Myrtumque habere: non contigit, quia repositi arbores abundantibus. Circum promontorium, quod vocant excellum, refert Theoph. Myrto scate, quod Circen incoluisse tradunt indigene, & in Elpenoris inibi tumulo coronario genere nasci, in quo primum vlsa traditur, Græcæque ei nomen remanet, quo peregrinam esse Italiæ apparet. Libenter Myrtus in sepulchris nascitur. Fingit etiam Vergilius à Polydori in Thracia sepulchro cornu & Myrtum agnatas: ad quas cum Aeneas venisset, & vellet sacrificare, & eam frondibus contegerit, nixus est Myrtum euellere, & cuius radicibus sanguis effluxit.

Fortè fuit iuxta tumulus, quo Cornu fenum

Virgulta & densa basilibus horrida Myrtus dec. Hoc verò è consuetudine Græcorum Poetam floruisse censet Turnebus, qui tumulis & basilibus alia virgulta, tum Myrtum imponere solebant, quod eruditissimus vir Victorinus annotauit. Io. Agric. ex Hermol. ut putamus, tradit Myrtum modò in terris, modò in aquis nasci. Idem repetit Ruell. Sed nos contra non existimamus Myrtum aliquā veram in aquis nasci. Si intelligunt Oxycocca Vacciniaz quorundam aquatica, valde errant, quæ errorem iamdudum annotauit Turnerus Anglus. Copiosè verò nascitur in Galloprovinciæ maritimis tractibus, quemadmodum & Italiæ & Hispaniæ. Sed non omnis. Loca ptopria differētis assignauimus: Clusius annotat, omnia Myrti genera Hispanica præter Beticam latifoliam domesticam conspecta apud cl. v. D. I. Boissot, qui omnium primus ex feminibus à se comunicatis aluit: deinde apud plerosque alios quibus comunicauit. Rami enim in terram pacti radices agunt, ut mox dice-

sur. Apud eundem & alias illustres viros & nobiles matronas in Belgio alia myrti genera ab Hispanicis diuersa aluntur. Coluntur in Italiae hortis & Galliae, sed rarius Germaniae nec nisi Margaritarum, diuersa genera, potissimum Tarentina & latifolia. In Italia eleganter in topiaria opera incinnare solent, quoniammodum & in Galliae locis quibusdam. Myrtum Ferrariae in horto Comitum cuiusdam cum artificiose Liburnicam referentem vidimus, ut nihil supra. Triremem item tam pulchre tres triremorum ordines exprimentem, & ramos in ea totius opera tam apte in humanam effigiem aptatos tam Romae quam Venetiis vidimus, ut ab eo tempore ad opera topiaria myrto nihil aptius, nihil sequacius indicauerimus. Quamuis autem passim in hortis Italiae colantur abunde myrti, nihilominus in montibus caduntur ad coria depellenda, ut Rhus & Lentiscus, teste Celsopino. Tarentina facile germinat in Germaniae hortis sata & culta: paulo difficilius, latifolia. Montbelgardi saepius à nobis sata nigra & alba: sed frustra. Folia cum baccis ex citatis regionibus, maxime Italia & Galloprovincia importantur.

Sunt qui diuturnissimam & validissimam myrtum esse affirmant, autore Theoph. Serò suum perficiunt fructum apud nos in Germania, aut rarissimum. Florent pro ratione loci, calidioribus, frigidis tardius: communiter aestate, Iunio & Iulio mensibus. Quae citò occidunt, inquit Plin. velocia sunt, ut ficus, myrtus, &c. & tamen antecedunt diuturnis. In trimatu enim ferre incipiunt, ostendentes & antè. Ita vides circa durationem & aetatem myrti Plin. non consentire cum Theoph.

Scrutur ligno, ramis & semine: sed terra iugiter accumulanda, dum germinantes ramuli roborentur. Ligna tamen eius haudquaquam palmo minora diuidi oportet, inquit Theoph. Crebras serere, non plus, quam nouenos pedes distantes praecipunt. Myrti genera omnia in Campania feruntur, ut Plin. tradit. Romae propagine Tarentina. Democritus & alio modo feri docet, grandissimis baggarum tuis leuiter ne grana frangantur, eaque intrita restem circumlini, arque ita feri: sic parietem fore mita densitatis ex quo virgulae differantur. Sic & spinas sepius causa serunt, tomice moris spinarum circumlita. Pullas autem Lauros & Myrtos oenopas [ita enim leg. cum Dal. pro eo quod in vulgatis habetur: Pulas autem Lauros & Myrti inopia.] à trimatu tempestiuum est transferre. Sic inquam legendum. Nam Lauri & myrti terra emergentes & nouellae, coloris sunt herbacei: grandiores vero obscurius virescunt & adultae subnigrae visuntur, quas inuicem vocant. [Quidam legunt Pullulos autem Lauri & myrti, in inopia à trimatu &c. Alij: Pullos autem &c.]

Myrtus & tales feruntur eodem auctore. Graeci locis editioribus feri praecipunt, quod vicina odis suauitate tepleat. Aquilus Iloio, aut termes à caecumine decerptus, proceritate subiectus pampitur: qui solo stercore satiatus, quousque ramulos emittat, exaggerari debet. Sunt qui cubrales palos, crassitudine manus, scrobibus; Olearum more, in obliquum mergunt. Alij ex baccis seminaria faciunt, quas leuiter tundas, & restibus luto contextis involutas, fossulis obducunt. Alij melius fructificare arbitrantur si in caput plantentur.

Inferitur in suum genus, & candida nigrae ac vice versa; item Pinice, malo, mespilo, Ilochio, &c. Combani. Ex myrto per iniectionem malum

Punicum crescere Plutarch. in sympol. testatur. Democritus quandam sympathiam esse naturalem myrto ad mala granata scribit: Proximè enim conficis; foetidiores fieri, earumque radices inuicem connecti, & si non multum etiam propinquae sibi fuerint. Idem scriptum reliquit Sim. Sethi.

Si verò iuxta ipsam plantentur Rosae, latiore coma virebit, vberioreque fructum pariet utraque. Baccas Myrti in areolas ab Idibus Feb. vel etiam Calendis dissecare praecerunt.

Baccas sine internis nucleolis creabit crebro aquae tepentis imbre rigata, autore Theoph. Deprehensum id est fortuitum, cum myrtus iuxta balneum staret neglecta: Ab hac enim vacua nucleo semina petentes serebant atque ita genus huiusmodi Athenis esse coepit, inquit idem: quod tamen nobis rationi minus consonum videtur, necimus an experimento competum, cum in acinis seu nucleis utique vis generatiua potissima consistat, tanquam in semine. Quae tamen huic obducta pellicula & caro, semen non est, sed seminis operimentum.

Etiā igitur a Plinio nasci fructum ex quorundam relatu tradat Theoph. quod & Constantinus Geoponicus confirmat, ex eodem tamen alias nasci aut vnumquam natus minime putamus. Vt vel a Plinio Theoph. pro a Plinio accipiendum videatur, respectu reliquorum, hoc est, pauciora semina ferentium: vel sanè magna dubitatio relinquatur, quomodo ex fructu a Plinio nasci queat myrtus. Scaliger difficultatum alioqui morosissimus examinatur, super hunc locum nihil, quod acutius eius redoleat. Historiam perspicuam ait: In myrto mutationem fieri per balnei strigmenta & lotes: diuturna illa aspersione talem factam; adeo ut in naturam transierit. Ex ea namque species eas fuisse postea Athenis, hoc (addit) fortuitum fuit. At sit fortuitum, tepidae aspersu, vel, ut ille explicat, sordium, a Plinio factam: at non ideo fortuita fuit eius propagatio. Decepta quippe ab Atheniensibus semina, sataque ordinato naturae cursu similes produxerunt species, quae in principio (ut ex Plinio, ut Theophrast. loquitur, οὐκ ἐστὶν ἡ ἀρχὴ αὐτῆς) casu fortuito talis facta. Sanè & ipse Theoph. subdubitasse videtur. Quid enim sibi aliud vult illud ex Plinio τὸν ἀπὸ τῆς ἀρχῆς ἔχειν, habetia aliquam probabilitatem vel fidem. Sed nobis magis hac apud vulgus, quàm illa apud sapientes, credemur acutius. Quid si per a Plinio non omnino enucleatum aut exacinatam intelligamus myrti fructum, sed nucleis tantum duri, aut talis, qualis in ceteris, expectem? Sic eodem sensu a Plinio pro Malo Punici genus, cui lignosus nucleus abest, quales blandiores acinos dixit, minus amatos, distinctos membranis. Et Apollonem apud eundem l. 3. eiusdem: ἵνα τὸν ἀπὸ τῆς ἀρχῆς ἔχειν, ὅτι τὸν ἀπὸ τῆς ἀρχῆς ἔχειν. Non igitur per a Plinio, omnino nucleis carettem intelligimus, alioqui nihil inde nasceretur: Sed carentem tali & tali, sive speciei consueto, & impleto, duro &c. Nā & Apyrena Punica grana habere & acinos in confesso est: cur nō & Apyreni Myrti? Porro Myrtis etiam validius sterco congerendum praecipit, inquit Theoph. nempe spurcitiam pullum, vrinamque quum germina prolescent: quasi fructus ita reddi apyrenos (sic enim malumus, quàm exacinati, aut nucleo carens) queat.

Gaudet Myrtus iugi repurgatu; ita in altiore proceritate adolescit: Degenerat in stricem, nisi crebro purgetur. Maximam purgationem quaerere Andronicon est auctor: Latius enim germi-

Sympathia
Myrti cum
Granato

Serendi
tempus.
Vt baccas
ne nucleis
nascentur.

Theoph. rati-
ficat ex
Plinio.

Scaliger moro-
sus difficult-
tatum
examinatur.

Cultus.
Vt latius
germinat

nat. & ex anniculis fructificat sarculis, à qua plura fuerint adempta, largioremque fructum ministrabit.

V. ex anniculis fructificat.
Ysaia.

Assidue quoque circumpurgata, cum ad textilia vasa, tum ad iacula ac spicula apta sit, autore Constantino Geoponico ex Græcorum testimonio. Humanā vel ouilla virina rigari desiderat: siquidem ea, ut produnt, mirè letatur. Plantas Myrti à trimatu tempestiuum est transferre. Diligenter à frigore mutianda, quoniam & tota arbor minus calida est, & proinde facile gelatur. Eiusdem maiores plagæ, si aliquæ fortè inferantur, contegendæ, ne adinittatur vel Sol vel aër: nam alioqui periculum est, ne morbum contrahat quod lauciatum fuit. Sed nec corticē detrahendum censent Geoponici, quod alioqui in alijs quibusdam vtiliter fit: obsepit enim, conseruatque arboris vitam. Breui quoque intervallo conferendæ, ut se contentu operiant murgo, arque Solis nimios æstus aufugere possint. Myrtus mulso macerata, melius redolere incensa putatur, uti prodit Theophr.

Repositio.

Virgas Myrteas si voles cum baccis seruare, inter se alligato, fasciculos facito, eos in amurcam demittito, supra ster amurca facito. Sed ea, quæ demissurus eris, subito paulò aterbiora. Vas, quo condideris, oblinito planè: Care Myrti baccæ in vasa non picata coniectæ & coopertæ, ad multum tempus virides habebuntur. Alij vnâ cū ramulis ipsas componere præstabilius putant. *Const.* Myrti fructus Soli expositus mox arefcit: in ymbra autem posita, Solemque modicè sentiens, humorem suum, qui exiguus, seruat, & paulatim coalescit.

Myrtorum vicia & vici.

Induperam.
Sang. sp.
tum.
Vesica cr.
fo.
Stomachus.
Phalang.
marjæ.
scorp.

Capillorum.
tum.
Vlcera.
Ophthalmia.
Agilope.
Vinum.

Myrtines.
Crapula.
Produrci.
dentia.
et Gula.
Fluxiones.
Furures.
Vlcera.
cap.

Papula.
Capillar.
defect.
Luxatio.
Fractura.
Vuligo.

Aures purulenta.
Capillorum.
infectio.
Humida.
Sicca.

Fluxiones.
Cahata.
Herpetes.
Erysipel.
Tessum in.
flum.

Myrtus sativa nigra, docente Diosc. medicinz vtilior quam candida: & in eo ipso genere accommodatior montana: fructum tamen insicaciorē habet. Vis tum ipsi Myrto, tum etiam fructui astringentia. Ac fructus quidem seu viridis, seu etiam aridus in cibo datur sanguinem excreantibus, vesicæque erosionē laborantibus. Virentibus baccis expressus succus eisdem effectus exhibet, stomacho vtilis est, vrinamque ciet. Prodest cum vino à phalangio demorsis & à scorpione ictis. Fructus quoque decoctum, capillum tingit. Is ipse cum vino subseruatus & impositus, vlcera in extremitatibus corporis nata sanat. Cū tenuissimo verò polentæ polline impositus, oculorum inflammationes lenit: quin & ad agilopas illinitur. Vinum porò myrtites, quod expresso & aliquantū seruetur fructu sit, (aliter enim paratum acefcit) præsumptum, crapulam arect, & ad eadem ad quæ fructus ipse valet. Vtile quoque ipsum in deflectionibus vuluatum & sedis proidentia, itemque feminis fluxione vuluæ laborantibus: detergit etiam furfures, vlcera capitis manantia, & papularum eruptiones: fluentes quoque capillos continet. Additur & in Emplastris lenibus, quæ liparas vocant, velum etiam quod ex ipsius folijs conficitur oleum. Quin & foliorum decoctum ad infellus conuenit: eoque laxati & ægrè solidescētes articuli, itemque fracta, quæ non conferbuere, vtiliter fouentur. Vitilignes quoque emaculat: Ad aures purulentas, denigrandosque capillos infunditur. Sed & corū succus eadem efficit. Ipsa verò folia trita & ex aqua illita, humidis vlceribus & partibus omnibus fluxione laborantibus, coeliacisque prosunt. Siquidem admisto oleo omphacino, aut exiguo rosaceo cum vino, valent ad herpetas, Erysipelata, testium inflammationes epinyctidas & cōdylomata. Arentia verò folia trita paronychijs & pterygijs, itemque alis feminibusque humenti-

bus, adeoque tetrum virus spirantibus vtiliter insperguntur, & cardiocorum sudores prohibent. Cæterum cremata, aut etiam cruda, cum ceratō ambustis, pterygijs & paronychijs medentur. Exprimuntur & folijs succus affuso vino vetere aut aqua celesti, cuius recentis vsus est. Nam exiociatus situm contrahit, viresque amittit.

Quod verò Myrtidanum dicitur, magis quam Myrtus astringit. Tatum verò & vino aultero addito coactum in pastillos, siccatumque in ymbra reponitur. Efficacius porò est tum fructu tum folio, ceratis, pessis, infellionibus & cataplasmatibus admistum, vbi constringendum aliquid est. *Ita- nus Diosc.*

In quibusdam Hipp. exemplaribus de nat. mul. legitur: Myrti nigra (μύρτη μαύρη) fructum tritum, aqua maceratum, & polentā immixta ebibitum vteros purgare. At me quidem quod attinet, Hippocratis codices hoc capite grauitè transcribendo conturbatos existimo, cum præsertim in ad fluxum muliebrem rubrum myrti baccas nigras (μύρτη μέλαινα) commendat.

De Myrti viribus & Plin. tradit, sed admodum confuse, quædam etiam repetita. Labet tantum ex eo præcipua colligere, & à Diosc. non tradita, vel aliter. Succorum (inquit) natura præcipuam admirationem in Myrto habet, quando ex vna omnium Olei vique bina genera sunt. Item Myrtidanum ut diximus. Et alius vsus baccæ fuit apud Antiquos, antequam Piper repetiretur, illius obleniens vicem, quodam etiam generosi oblonii nomine inde tracto, quod etiam nunc Myrtatum vocatur. Eademque origine aprorum sapor commendatur, plerumque ad intinctus additis Myrtis. Folia & per se siccantur in farinam ad vlcerum remedia in corpore humano leniter mordaci pulvere, ac refrigerandis sudoribus. Quinimò oleo quoque (mirum dictu) inest quidam vini sapor, simulque pinguis liquor, præcipua vi ad corrigenda vina, saccis antè perculis. Retinet quippe tæcem, nec præter purum liquorem transire patitur, datque se comitem præcipuam commendatione liquato. Virgæ quoque eius gestatæ manaviatori prosunt in longo itinere pediti. Quin & virgæ annuli expertes ferri inguinum tumori medentur. Quin & virga iaculi (sic repetente Turnebo) fortasse quod è Myrto iacula nonnunquam fierent, quorum hostile nondum ferro spiculatorum Virgam vocant. Virg.

Cerebr. fissilibus horrida Myrtus.

Iterum,

Et pastorem præfixa cuspidē Myrtum.

Itaque virgæ iaculi dici possunt, tam grandes, ut pro iaculo muniri ferro possint. Nic. in Ther. Myrta constipantia & obstruentia dixit.

Myrtus, tradente Galen. ex contrariis substantiis constat: vincit tamen in ea frigidum terrenum. Habet verò etiam tenue quiddam calidum. Itaque valenter desiccatur, Porò tum folia tum germina, tum fructus tum succus, non parum in se in astringentia dissidēt. Myrtada verò quanto diutius siccus est, tanto & astringit vehementius. Quidam id rondenres reponunt, postea vino subigentes, in pastillos formant. Folia item arida viridibus plūs desiccant: viridia enim humiditatem quandam habent. Succus non tantum ex virentibus folijs exprimitur, sed & fructu. Restringendi vinum hæc omnia habent tum foris imposita, tum intro sumpta in corpus.

Simeoni Sethi Myrti Baccæ frigida sunt & sicca primo ordine; opitulantur à scorpionibus percussis, & iis quibus alius fluit. Eam enim fortiter sustinent.

Myrtidanum.
Condy-
loma.
Paronychia.
Pterygia.
Ala dente.
Cardiacorum.
Sudor.
Ambr.
Foberum.
Lucius.
Myrtidanum.
Succus.
Pastilli.

Myrtidanum.
Condy-
loma.

Myrtidanum.
Condy-
loma.

Myrtidanum.
Condy-
loma.

Myrtidanum.
Condy-
loma.

Myrtidanum.
Condy-
loma.

Myrtidanum.
Condy-
loma.

Myrtidanum.
Condy-
loma.

Myrtidanum.
Condy-
loma.

Myrtidanum.
Condy-
loma.

Myrtidanum.
Condy-
loma.

Myrtidanum.
Condy-
loma.

Myrtidanum.
Condy-
loma.

Myrtidanum.
Condy-
loma.

Myrtidanum.
Condy-
loma.

Myrtidanum.
Condy-
loma.

Myrtidanum.
Condy-
loma.

Myrtidanum.
Condy-
loma.

Myrtidanum.
Condy-
loma.

Myrtidanum.
Condy-
loma.

Myrtidanum.
Condy-
loma.

Myrtidanum.
Condy-
loma.

Myrtidanum.
Condy-
loma.

Myrtidanum.
Condy-
loma.

*Alia sunt
Nec*

*Dentium
dolor.*

*Capillus
defluens.*

*Myrtus
anum me-
dicina.
Contra El-
leborum.*

Oris odor.

Dysenteria.

*Hydrops.
Dolor den-
tium.*

Pulvis.

*Aqua su-
avis.*

*Semen
saccharo
condita.*

*Asubrum
morbis.*

*Porta re-
preh.*

*Adversus
Bungorum
strangula-
tos.*

*Idem
troph.*

Myrtus.

Myrtus.

Myrtus.

sunt, sed vesicæ nocent. At alba & dulces, ali-
cuius sunt participes caliditatis. Cunctæ verò
alium compescunt, solvuntque calidas & humi-
das exhalationes: eademque ratione ipsius plan-
tæ folia odorata, & capiti impolita. Medentur &
dentium doloribus, qui ex calore fiunt, si ipsarum
decocto calido os coluatur. Baccæ utique ad de-
fluentes capillos simul cum galla valent, cum oleo
si conterantur, & capiti imponantur. Foliorum
verò succus, viperæ & serpentis ictus sanat, si eius
libræ dimidium sumatur.

Myrtean coronam meri vapores inhibere, ex
sententia Philonidis testatur Athen. Turdus suis
nidulis uti bestiolas noxias abigat, Myrtum inge-
rit. Coturnices etiam, ut Didymus auctor, est, El-
leborum pastæ, in tantum vitæ descremen addu-
cuntur, ut distendantur conuellanturque, ceu ver-
tigine correptæ illis auxiliantur Myrti baccæ. O-
dorem oris commendant, vel pridiæ commenduca-
tæ: quod hoc hemistichio comprobatur Serenus:

Myrtusque emendat oris odorem.

Dysenteria denarii pondere dantur. Folia No-
xiis bestiis & venenatis, quæque exulcerando no-
cent, medentur. Ex vino articularibus morbis
& collectionibus. In vino verò decocta dysente-
ricis & hydropicis potui dantur. Aceto, in quo
eadem decocta fuerint, os ad dentium dolores col-
luitur. Coliculi autem cum flore decocti, & in
novo atque operto fictili, in furno cremantur, po-
stea ex vino teruntur: Pulvis hic ad omnia, quæ
foliorum pulvis potest, efficaciter administratur.
Aqua ex floribus Myrti destillata, odoris suavit-
tate Myropolis plurimum expetitur.

Semen siue baccas eius Musa Brasian. primus
saccharo condire docuit, optimum variis morbis
condimentum, & ægris magnopere placens.

Camer. ideo veneri dicatam Myrtum iudicat;
quia multos habeat usus in morbis muliebribus:
Sanè in quibuscunque fluxionibus rite admini-
strata, plurimum potest.

Porta puniceas species tam fructu quam corti-
ce sanguinis excretionibus & mensibus opitulari
scribit, & non atras. Aded in coloribus is atque
figuris suos medicandi fontes hausit? Quis autem
nigris Myrtillis astrictionem denegare aulit, cui
genus sanus est?

Scribit Diosc. Fungos strangulatus suspendio si-
miles concitare; quibus contestum succurrebat.
Communiter ex oleo vomere cogendos &c. Quod &
Marth. approbat: & rectè. Ut minimum sit; qua ra-
tione idem Marth. Myrti vsum tantopere commē-
det in eodem casu, ut etiam mirificè præstare di-
cat. Nobis contra minus tutus eius usus videtur.
Nam cum ex iam citatis autoribus astringat, a-
stringentia autem coarctando oesophagum & ori-
ficiū ventriculi vomitum impediant, atque aded
fungorum retentionem adiuvent, non videtur tu-
tus Myrti usus: Nec etiam foliorum Pistilli, quā-
vis id Diosc. tradat. Horum tamen usus aliquis
si possit esse in eo casu, tunc maxime futurum cen-
semus, si superveniat à Fungis: Aut certe eiectionis
iam vomina Fungis, & multa agitatione laxato &
prostrato ventriculo. Myrti baccis, ultimā maturi-
tatem adeptis, Italice mulieres utuntur ad intin-
ctus, qui cum assatis carnibus escari maximam
cum palato incutit gratiam, teste Marth. ac simile
quiddam videtur fuisse quod Plin. Myrtatum, Ca-
to Myrtatum vocavit: Attamen myrteum condi-
mentum seu sp. Cappa languidos ventriculos robo-

Nec differunt viribus inter se Myrti species. Fo-
lis succis omnium generum, quotquot habere pos-

sunt utuntur Coriarii ad spissanda crispandaque
Coria. Bellon. quoque scriptis prædidit Illyricos
Myrti follis coria perficere.

Fit & vinum è Myrto; quod Theophr. non i-
gnoravit, qui Myrto æquè vindum ac oleosum
tribuit succum, quamvis verumque obscurum.
Habere enim ait talem quoque humorem, qui
vino cum sacco transmittitur ac colatur, innatet,
quem detrahunt, & ad lumen lucernatum accen-
dunt, quod Plin. admirationem creavit, gemi-
nos hos succos ex vna re promanare. Sed vini ra-
tio duplex est, ut bina etiam appellatione distin-
guatur. Primum enim Myrtum vocant, siue Myr-
tidanum, Myrtanum, Myrtile, vel Myrteum vinum,
quod ex baccis: alterum Myrtinum, quod ex tota
arbore fieret. Plin. Myrtidanum quoque vocat,
quod ex silv. mori baccis conficitur. Myrtei vi-
ni parandi rationem habet præcipit Cato. Myrtum
nigram in umbra arefacito: ubi verò iam passa,
servato ad vindemiam, in vnam musti condito
(alii habent contundito) Myrtæ semodium. Id ob-
linito. Vbi defuerit servare multum Myrtum ex-
imito. Id est ad alvum crudam, & ad lateris do-
lorem, & ad celiacum, & si alvus non consistit.
Habet & suam ex Catone Plinius: Habent etiam
fusi Dioscorides. alique Græci: sed apud omnes
Autores (ex quibus petendæ) admodum variant,
ut vel ex hac sola variationis diligentia apertum
fiat, quantæ existimationis fuerit, cum propter gra-
tiam, tum propter vim medicam, quam ex Catone
iam diximus.

Attestante verò Columella quoque Myrtites
valet ad tormina, ad alvi profluviū, & ad im-
becillum stomachum. Nam Diosc. teste, potenter;
astringit, & ubicunque styptici utendum, valet.
Reiectiones sanguinis inhibet; & alvi stomachi-
que rheumatismus prodest; itemque contra inte-
stinas ulcerationes, fluoremque muliebrem: de-
nique capitis etiam denigrat capillos. Myrtinæ,
eodem autore, contra manantia capitis ulcera;
fursures, papularum eruptiones, gingivarum ac
consillatum inflammationes, & aures purulentas
efficax est, ac sudores quoque cohibet.

Myrtei quoque Olei, siue Myrtini, duplex ra-
tio. Aut enim è baccis fit, aut è foliis. E' baccis in
Ianuario ita fieri docet Palladius. Vnciam bacca-
rum (in vulg. ex. legitur foliorum) per olei libram
ynam mittes, & per vncias x. vini veteris styptici
hemina, & cum oleo bullire facies. Iccirco au-
tem vino respergentur folia, ne frignantur an-
tè quam decoquantur. Tale hodie non est
in usu, sed ex Arabum præscripto paratur ex
Myrti baccis, & oleo omphacino, hoc est, im-
maro. Commodè etiam adderetur succus, si
haberi posset. Hoc oleum Myrtillorum vulgò vo-
cant ad differentiam Myrtini; quod ex foliis fit,
cuius cōficiendi rationem geminam tradit Diosc.
Myrti nigæ seu silvestris seu satine tenerissima que-
que folia tundito atque exprimito, succo deinde
Omphacini olei parè mensuram admisceto, &
ad prunas calcacito, donec simul cocta fuerint,
tollens id quod supernatatum fuerit verò minus
operosa confectio si foliorum mollissima contusa
in aqua & oleo decoquas, & quod innatat, adi-
mas. Peculiari quoque modo, si exposita soli fo-
lia in oleo maceres. Nec desunt, qui oleum prius
inspissent Malicorio, cupresso, Cypero ac lunco
odorato. Ita vnguentum Myrtinum descriptum
Plin. E' vilissimis quidem hodie est ob id cre-
ditum, & id in vetustissimis esse, quod constat o-
leo Myrteo, calamo, Cupresso; Cypro, Lentisco,
malogranati cortice: nimirum hic calamus addit,

*Ad Coria
paranda.*

Vinum.

Oleum.

*Vini duplex
ratio.*

*Myrtei Vini
Ga. y parand
do modo.*

*Alvum cru-
da.*

*Lateris do-
lor.*

*Celiaca.
Alvi Baccas.*

*Myrtis
vires.*

Tormina

Alvi fluxus

Stomach.

Sanguis fluxus.

Dysenteria.

Menses.

*Capillarum
tristitia.*

Myrtinæ.

*Quæ vltima
cap. Pabula*

Faucium

inflam.

*Ol. Myrti-
næ.*

Ol. è baccis.

*Ol. Myrti-
llorum.*

*Ol. Myr-
tini.*

Myrtum.

Myrtum.

Myrtum.

Myrtum.

Myrtum.

Myrtum.

Myrtum.

re, ne cogamur alibi repetere. Quidam enim & huic, & sequentibus Vitis Idæa nomen tribuunt.

Vitis Idæa, [*Idæa*] inquit Theoph. nascitur in ea parte Idæ quam Phalacras nuncupant. [calvas Lat. dixeris] Paruis virgultis fruticat, ramosque cubitales emittit, quibus acini ad latera adherent nigri, fabæ [*fabæ*] magnitudine, dulces, vinaceorum (*vinaceorum*) instar, aliquid intus continent, molle (*molle*) : quam vocem Gaza omisit. Folium rotundum, indiuiduum, paruum. Per *Idæa* uero non est quod Fabam nostratem intelligas, alioqui nec figura nec magnitudine conueniet. Const. intelligit de Fabæ Græciæ, à cuius similitudine etiam *Idæa* dictus est *Idæa* bestiola multipes, vulgò Afellus dicta, de qua in hist. Insect.

Porro eadem planta est Vitis Alexandrina Plin. quæ vitis Idæa Theoph. nam planè iam dicta verba Theophr. sub eo nomine transcripsit Plinius sic: Alexandrina appellatur vitis circa Phalacrâ, brevis, ramis cubitalibus, acino nigro Fabæ magnitudine, nucleo molli & minimo, obliquis racemus prædilectibus, folio paruo & rotundo, sine diuulsuris.

Du Choul in descriptione montis Pilari ait: In ipso montis penè umbilico passim conspicitur humilis admodum frutex, *Arelles* aut *Aurette* nominant.

Vitim Idæam Theoph. inquit Cl. Milerus vocant Phalacras. Itali (ut accepimus) *Idæa* vocitant. Quæ sanè descriptio huic nostræ satis competit. Verùm in eo fallitur, quod dicit Theoph. vocari Phalacras, cum nomen hoc sit partis montis Idæ ut modò dictum.

An Cæsalp. *Baccularum* vulgò in Alpibus, quasi *Bacculari* in alterum genus, fructu minore constans [quam Vitis Idæa angulosa, de qua paulò post] & paucioribus intus sensibus: foliis infernè albicantibus, specie Mali coronei, sed pusillis. Videntur hi frutices quasi humiles Mespili. Hæc ille: Nolumus tamen pro vero statuere hanc Cæsalp. descriptionem nostræ esse Vitis Idæ, quia multa continet quæ conueniant cum Cotonastro, de quo lib. 1. Præterea nostra Vitis Idæa magna nihil commune habet cum Mespilo.

An Camer. Hort. Vitis Idæa Gesu. maior, quam cretense tradit in silua prope Megeldorff / pago mille passus à Norimberga urbe sito, quam Clus. in Pan. Zegabeer / & frater eius Ludouicus Trindelbeer nominari aiebat, quia copiosior eorum usus aliquem quasi inebriet.

In horto plantata non comprehendit.

Myrtillus grandior: Großen Beidelbeer: Bosberen: Drumpelberen, Bruchberen / Trago. Vitis Idæa maior Suevis dicta: Mosberi Helueticis, Gesner. Vitis Idæa 2. maior: Groß Beidelbeer Tab. Compilerator eius historie, satis clare sua prodit descriptione, se nescire quid scribat.

Gerar. Anglus huius plantæ iconem posuit pro Vaccinijs rubris, quæ non parum differunt ab hac Vitis Idæa maiore.

Vaccinium Alpinum Schuenecker. in Catal. Silës. quæ & Vitim Idæam 2. Clus. & Vitim Idæam nigram maiorem Thal. & Vitim Idæam maiorem Gesn. eadem planè satis confidenter facit, quod tamen non temerè negauerimus.

Nascitur, eodem teste, in montibus & solitudinibus & siluosis. Tradente Clus. inuenitur in Deitzalben iugo duobus supra Neuberg Germanicis miliaribus, postea etiam in descensu herrenalben supra Tschepf, multo fructu onusta, atque in Säckero Austria monte supra Garingam, Repe-

ritur etià in silua Norimbergensi ubi proxima, ad Latomias, ubi & vulgares nigri & rubri bacis maxima copia nascuntur sub Pinastris, Piceis & Abietibus. Nos in Burgundiæ locis alpinis frigidis obseruauimus, & in inferiore parte montis *Idæ*, loco paludoso, dicto *Malsaigne* ubi Burgundi *Dauermer* vocant, item in montibus Vogelis Lotharingiæ adiacentibus (*Ballon* vocant) in cacumine, sed loco itidem paludoso. Copiosam etiam vidimus in montibus inter Nagel arcem Wirtembergicam & Therias III. Marchionum Badensium. Sæpe in hortum Montb. transfulimus, fructusque seuimus, sed frustra.

Bacis inebriandi vim inesse referunt venatores, & aratores: testanturque du Choul, Camer. alique, præsertim copiosius denotatis. Nec mirum. Sunt enim sapore vinoso & grato. Folia quoque aliquid aciditatis habent, sed astringentiam maiorem. Quare tum his tum virgultis Tinctores vtuntur, idem præstantibus quod Ledum Alpinum, ut dicebamus.

VITIS IDÆA FRUCTU NIGRO.

CAP. V.



Hanc Clus. Descriptio. priore facit, ramis flexilibus, & humi diffusis, gracilibusque, multis germinibus, vix è Musco (quo ramis occultantur) prominentibus, in quibus nullo ordine digesta sunt folia, prioris Ledi Alpini foliis penè similia, paulò tamen longiora, angustiora, teneriora, minusque crassa, admodum venosa, superne videntia, inferne

dilutiora, leuiter per oras crenata, & mollibus quibusdam villis hirsuta, longo pediculo inherencia, gustus valde astringentis. In summis germinibus præcedentis anni, bacis fert rotundas, Cerasi nonnunquam magnitudine, oblongis & tenuibus pediculis dependentes, coloris imitò viridis, deinde rubri, postremò nigri, succulentas, non ingratisagoris, nulla ossicula continentes, sed planè duntaxat semina, alba, numero ut plurimum quina. Radix lignosa quibusdam fibris donata, & rami per terram sparsi similes fibras nonnunquam agunt.

Maturis & immaturis omnium hunc fruticem iuxta Ericam bacciferam alteram nascentem, in vntus Sackalben iugi supra Neuberg scopulis mense Augusto eruebat idem. Florem non obseruauit.

An verò in classem Vitis Idæ rectè retulerit, alijs indicandum relinquit: nec enim sibi ipsi in illius nomenclaturâ satisfacere ait.

Ledi alpini generibus adscribi posset, nisi bacce, quibus prædita est, & aliæ quedam notæ refragarentur. Simlerus ad Com. de Alpibus eius

meminisse videtur, & Carlobostaden appellare : nam parum à Rosæ montanæ frutice differre asserit. Huius folia satis ad illam accedunt. Hæc Clus.

Taber. Vitim Idzam ꝑ. vocat, & Heydelbeer: Sed compilator eius iconem & descriptionem Clus. proponit, nulla eius facta mentione: flores appingi curauit, quos nec describit, nec Clus. vidisse fatetur.

Gerardus Anglus figuram Compilatoris habet: ac Vaccinia Pannonica, siue Vitim Idzā appellat.

VITIS IDEÆ ANGULOSA.

CAP. VI.



Vitis Idæa angulosa virgultis fruticat plerumque pedibus, interdum cubitalibus, satis crebris, virentibus, angulosis & frætu cômumacibꝫ, in multos ramulos diuisis: in quibꝫ folia crebra, tenera: virentia, caduca, vnciam circiter lōga, plusquam semunciam lata, acuminata, glabra, per ambitum argutis denticellis cre-

ata, sapore partim acido, potissimū primū emergentia, partim austero. Flores in singulis hæret, inter folia, bullati siue vtreolum referentes, colore ex albo punicante, stylo croceo. Succedunt bacce, singulares quoque, luniperinis ferè pares, per maturitatem violaceæ potius quàm nigre, umbilicata, sapore grato & acido primū degustatæ, quæ tamē paulò post nescio quid nauseabundi in ore relinquunt, purpureo violacea, satisqꝫ pestinacitinctura: cui grana immerguntur multa, parua, rubentia. Radix tū recta, tū obliqua quaquauerſu agitur, & supina etiam parte stolones emittens.

Hanc perperā quosdam Myrtum existimasse ex his Cordi liquet verbis, quando ait: Myrtus non est exiguus ille fruticulus, quem Germ. **Heidelstrauch**, (al. **Heidel** vel **Heidelstand**;) & cuius baccas **Heidelbeer** appellant, vt hætenus falso à plerisque creditur etiam **Straudelbeeren**. Plerisque hodiè Myrtilli Latine dicuntur.

Quidam etiam fructus eius Vaccinia nigra appellant, autoritate Virgilii. Sed insulsi homines videntur, inquit Tragus: nam Virg. de flore loquitur, Hyacinthum eum intelligens cuius Diosc. l. 4. historiā proponens, Romanis testatur Vaccinium dici. Huius alterum genus **Ropbeeren** / **Drumpelbeeren** & **Bruchbeeren** dicitur. Myrtillos Auerrhoes lingua sua Arabica vocat **Hes**.

Non Austr. Non placet figura Tragi, in qua folia non serrata. Nec quod scribit foliis vestiri solidis, Buxi per o nnia similibus, sed tenerioribus. Quid si non distinguat Vitim Idzā fructu rubro, folio semper virente ab hac? eius enim non meminit, licet scriptis cum hac progeniat.

Quoniam verò Germani & Bohemi legitima

Myrto se carere perspicerent, aliam in filiis nascentem sibi compararunt pharmiscopolæ, eamque myrtillum vocauere, nempe hanc plantam, vt annotat Matth. Quod verò idem de hac planta scribit, folijs vitere Buxo ferè similibus, sed tenuioribus, Myrti minoribus, robustis, non placet. Considerent quæso herbarum studiosi: quænam sit hinc cum Buxo similitudo, quodque robur in folijs. Suspiciamur Matth. minds versatum in Myrtillorum differentiis, pauciores probè nouisse. In Epit. **Myrtillus**: Ananienibus **Celanus** & **Dodon. Confus** in quibusdam Galliar locis: **Brabantis Craefbesien / pestelbesien** & **Hamersbesien** / qui ait posse dici Latine Vaccinia, non tamen Virgilij: melius tamen conuenire nomen Vacciniorum, quàm Myrtillorum, vt quidam apellant.

Videntur autem Vaccinia dicta à baccis, quasi Baccinia.

Quicquid sit, Vaccinia hæc nostra dici possunt, & cum Vaccinijs Plin. ac Vitruuij (de quibus loco) in eo conueniunt, quod velles telæque lineæ tingi purpureo colore his queant. Cum Theoph. autem ac Plin. Vitis Idææ descriptione haud quaquam conuenire satis manifestum: humilis enim est frutex, vix cubitum altus, panicis, breuibus, & nequaquam cubitalibus ramulis; haud racemos, vt Plin. ait, nec vuarum acinis similes fructus sed veluti Taxi baccas, profert; non dulces, sed subacidas & adstringentes; in quibus quoque non molle, sed multa exigua, candida, plana semina: folium non rotundum, sed rotundo longius. Iam & credibile est hunc in Italia, Græcia, ac minore Asia non reperiri, cum Germaniæ proprium Matth. asserere videatur: tantum abest vt Vitis Idæa aut Alexandrina dici haberiue queat. Porro non placet Dod. icon quam in hist. Gallica proponit, nec illa quam in Latina, quamuis priore melior videatur: in eo tamen peccatum quodd ad recta picta, in speciem arboris, nec foliorum serraturas expresserit.

Arelle du Choul non est ea stirps quam Dod. pro Vaccinijs nigris exhibet, vt ipse putat, sed ea de qua proximè egimus.

Cæterum Vitim Idzā, **Heidelbeer** vulgò dictam, esse à se primū obseruatā gloriatur Gesn. & viros aliquot eruditos consentientes inuenisse. Aduersari quendam de re herbaria bene meritum, & Vitim Idzā interpretari illam quæ Passillas Corinthiacas vulgò dictas ferat. Se verò nobilissimum illud vix passæ genus non in Ida, nec alijs præaltis niuosisque montibus nasci putare: sed vel in planicie collibus apricis, magna hominū cura.

Idem de collectione stirpium Vitim Idzā Theoph. esse ex eiusdem descriptione interpretari ait: quæ tamen opinio paulò antè refutata per Dodod. Item in Catal. plant. **Dryophorum**, offic. nemoralis Myrtus: **Spurelow**: **Cassius**. & Myrtus offic. Ryff.

Lonicerus qui pleraque sua Botanica ex Trago consarcinauit, eundem de Myrtillis tradentem parum diligenter legisse videtur, quando ait, posse statui duplicem differētiā, magnā & paruā, ambas tamen eiusdem esse figuræ: nam apertè Tragus docet, maiorem & minorem figurā differre. **Myrtillus**, (vt annotat Rob. Const. ad Theoph. & in Lex.) Galeno **Myrtillus** planta est, id est, **Vua vrsina**, in Apennino adhuc vocatur **Vigna dell' orso**, quam vult esse Vitim Idzā Theoph. Anguillara: Vulgò **Azeres**, alijs **Annelles**, it. **Vua dolce**, apud Northmannos nihil copiosius prouenit, præsertim in Bellocasiorum agro ubi vocant

Marth.

Chama.

Vaccinia.

Baccinia.

Myrtillus.

Dodon.

Passilla.

Myrtillus.

Myrtillus.

cant *Myrtus*. Sed si Const. intelligit nostram Vitim Idream angulosam, ut suspicamur, dubii adhuc sumus an sit *Vigna del Orso* Anguil. siue *Vua Vrsina* Gal. quia tribuitur ei fructus ruber, qui in hac purpureo violaceus & multis niger dicitur.

Vua Vrsina
differt a
Vua Idæa
Myrtilli
Germanæ.

Quod nonnulli *vua* n. vrsi Gal. à Theoph. Vite Idæa non differre putent, falluntur Clusi iudicio, cui Vitis Idæa nihil aliud esse videtur, quam Myrtillus Otic. Germaniæ. Idem in Pan. tradit Vitim Idæam Theoph. rei herbariæ peritis esse Myrtillum Germ. vulgarem baccis nigris.

Et Aduers. Herbariorum *Vaccinia* nigra & rubra sunt Myrtilli Otic. An Idæa radix. Maturitate (inquit) affecta baccæ nigre vineo succo turgent, prædulci gustu: flores Ericæ aut Vnedonis, minores, pallentes, radix lignosa multa edit virgulta pede altiora. Folia effigie Myrti aut Rusci rotundiora, molliora, sed hieme decidua.

Vaccinia.

Lob. Obs. *Vaccinia* nigra & rubra, Idæa Vitis Theoph. Dalech. Clus. Myrtillus Otic. Germ. & myrtus montana: *Vua* Vrsi Anguil. Gal. *Aurelle* Aird. It. *Vua Orsa*. At figura Lob. non placet, quia nullas foliorum serraturas ostendit, quarum nec in descriptione meminit: non placet etiam comparatio foliorum cum Myrto & Rusco: nec quod duas plantas velit vnâ eademque illâ figurâ complecti, licet neutra conueniat. De *Vua* Vrsi Anguil. paulo post.

Vitis Idæa
Myrtus
montana.

Aduers.
Lob. not.

Bacula.
Cobur.
Casalp. not.

Audiamus Casalp. *Bacula* (inquit) vulgò in Alpibus quasi bacculæ, fructus dulces, subacidi, paruis vuis similes, in maturitate nigri quos citant Alpini: fert eos paruos frutex dodrantali altitudine, ramulis virentibus & striatis, foliis in rotunditate oblongis, leuiter serratis, sine pedicello annexis alternatim: flosculis radiantibus, concavis ut Arbuti, qui summis fructibus insident. Alterum genus &c: Videntur hi frutices quasi humiles Mespili. *Hec ille*. Quæ tota descriptio satis conuenit cum nostra Vite Idæa angulosa, si excipias quod ait, Vuis similes, & quod videantur quasi humiles Mespili. Nos sanè considerata eius descriptione ac etiam ipsa planta nihil videmus quod respondeat cum Mespilo, cuius folia sunt hirtuta, longa, ramis nec virentes nec striati, sed rotundi: flores ex flosculis constant: fructus in totum diuersus, figura, colore, substantia, & sapore. Quid verò sibi velit cum flosculis radicanibus, in hac planta non apparet, nisi fortè legendum sit candicantibus.

H. Lugd. not.

Vitis Idæa
minor.

Chamae
fine.
Myrtus
terrestris
seu Pumila.

Locos.

Hist. Lugd. in ea est opinione, esse Vitim Idæam Theoph. & Vitim Alexandrinam circa Phalacrum Plin. In Auernis montibus (vbi prouenit) dici *Airelles*, Italis *Vua del orso*: Germ. *Beiderbeer*: *Vua* Vrsi Anguil. vocare: Dod. *Vaccinia* nigra & *Cusina*. Ab hac Idæa Vite differre à Lob. pictam Myrtum Germ. foliorum incisuris, de qua tradat Matth. in Germ. & Bohem pharmacopoeis Myrtillum dici. Sed frustra Hist. Lugd. duas facit plantas, cum duæ insignes vnus plantæ, quarum prior deterior.

Vitis Idæa minor passim in Hercynia Saxothuringica, Thal. An Camer. in hort. Vitis Idæa nigra passim in siluis. Item paulo post: *Vaccinia* nigra. Dodonæi *Vaccinium* nigrum. *see canavetm* Peuc. Myrtus terrestris seu Pumila: *Blauwe Heidelbeer* / *Strandbeer* / *Rosbeer* Schuuenckf. Vitis Idæa siue Myrtillus. Tab. Angl. *Blacke Whortles* or *Whortle Berries* / Gerar. Myrtilli & *Vua* Vrsi Anguil. C. Bauh.

Nascitur tam in alpibus quam in vastis desertis, virginolis & tenebrosis vallibus aliisque humectis locis Germaniæ, Galliæ, Angliæ, Seuenæ inaccessis,

alpibus Tridentinis, monte Fraßo iuxta Lucernam Helueticorum, in sylua Hercynia, testibus Trago, Gesn. & Lob. In Helueticis alpibus & syluosis non paucis locis obseruauimus. Item Asiaticæ, Burgundiæ, Sabaudiæ: speciatim in Burgundia prope Castellum *Mesibe* vbi fructus vescuntur & *heulter* vocant: Item in cacumine montis *R. pberg* prope Mesocomium: circa Befordiam, in monte *Salun* Locharingiz vicino.

Beulter.

Fructus Augusto maturos legimus. Eodem Tempus mense Richenvillâ proficiscentes ad Rodinas à S. Maria cognominatas, multos pueros atque puellas obuiantes plenosque calathos ad cibum referentes offendimus. Floret Maio. Fructus interdum etiam Iulio maturos edit.

Tempus

Baccis terream & frigidam inesse substantiam ait Tragus, quare cibo quam medicinz accommodatior esse. At nobis medicinz quam cibo aptiores videntur: si vera tradit Matthiol. fructus refrigerare, exsiccare, roborare, reprimere, cohibere, quæ omnes facultates medicamenti potius sunt, quam alimenti. Dari baccas cum recentes, tum quoque stecæ deuorandas Dysentericis & Colicis. Has igitur Germanis vnâ cum Vniuersa planta haud inefficaciter Myrti vicem prestare ideam censet. Cui hac in parte non assentimur: Myrti fructus aromatici sunt: hi minimè. Præterea nostro iudicio Matth. perperam tribuit Myrti vires Vitis Idææ angulosæ, licet ei valde sint similes. Quare Dod. & Camer. potius subscribimus, quorum sententiâ si crude edantur baccæ ventriculum debilem & frigidum offendunt & aluum perturbant sua frigiditate, tantum abest, ut aluum adstringant, aut fluentem reprimant: quod succus illorum excoctus donec crassescat (*Rob* vocant) addito melle & saccharo, ut coferretur, haudquaquam efficit. Idco ab aliquibus parari solet ad hæc mala siue ex ipsorum esu, siue aliunde contracta. Ceterum eodem Dod. tradente *Vaccinia* hæc facultate secundo ordine, eoque satis intenso frigida sunt, & vnâ cum manifesta adstrictione resiccant. Ventriculo astuanti conueniunt: sitim sedant: ardentium febrium calores mitigant: aluum reprimunt: vomitum sistunt: dysenteriam ex flaua bile natam curant: aduersus cholera morbum proliunt. Sed ad hos usus *Rob* seu succus cum saccharo vel melle inspissatus ipsis baccis longè præferendus, ob rationes dictas. Pueris tamen qui omnia deglutiunt, itemque auiculis *stercoribus* ob dulcedinem & suauitatem cibo gratissimæ sunt. Paupercula quoque plebs, ut annotat Schuuenckf. in Silesia ex baccis pulres cum farina coquit, haud inartatas, ut ille ait: *pidiores*, hercle, existimarem abique farina, & in simplicem sapam, vè per se integras coctas, more cerasiorum. Sed ut magis nutrantur, ideò farinam addere putamus.

vires & usus.

Tragus not.
re. b.
Téperam.
Dysenteria.

Matth. not.

Temperam.
Ventriculi
ardor.

Cibus
Puerorum.

Lonicerus huic plantæ multas vires adscribit, parum rationi contentus, & forte in eius cerebello natas. Folia & fructus in vino moderato & epotos urinam ciere ac mentes pellere calculum vesicæ, quas vires quædam rei adstringentis adeoque frigide & terree *[suppletur]* tribuat, ipse viderit. Item tradit confectum ad effusionem bilis & dolore capitis, quod partim adstringendo & cohibendo bilem, partim calores & vapores reprimendo prestare posse rationabilius. Foliorum succus in ore retentus aphthas mitigat. Sed quod consilio idem ait eundem succum mixtum cum lacte, & auribus illitum in ambitu, omnia eorum vitia tollere, atque adeò visum acueri, iudicent docti. Succus cum saccharo epotus spumo sanguinis resistit, & generationi calculi in renibus: licet etiam

Vitis Idæa
minor.
Calculum.
Puerorum.
Stercoribus.
Dolor cap.

Aphthæ.

Sanguinis
epotum

Calculus.
Vulnere.
Cere p-
viti.
Tumores
pudenda-
rum.

eius verba explicamus, quibus ait conferre ad cal-
culum renum. Radicis pulvis vulneribus inspet-
sus, carnis excrecentiam & putrilaginem cohibet
& adimit, & efficaciter cicatricem promouet. Ad
pudendorum tumores in emplastrum cum oleo
ros. concinnata folia eos tollunt absque noxa. Ra-
dix cum Aniso & Feniculo pari doli puluerisata,
addito saccharo, & ieiuno quantum cochlear ca-
piat sumpta, certo remedio est flatibus & colicis
doloribus, inquit ille: in quo sanè circumforaneo
empirico similior videtur, quàm rationali Medico:
Nam cur rem terrestrem, frigidam, & adstringen-
tem, cum calidis, & discutientibus commiscet, qua
vi flatus carminare, & colicos cruciatus putat
compescere id, quod temperamenti sui ratione
nihil minus prestare, fortè etiam citius causare
possit? Abeat ad Scholas, ad Scholas, immodè ipsam
potius rei naturam, optimam & fidissimam medi-
corum scholam, & melius discat, rerum tempera-
turas in vsus dispensare, vulgoque credulo vanis
suis pollicitationibus imponere.

Scribit Marth. Germanos Pharmacopœos bac-
cis passim vti Myrti baccarum vice, cum iis desti-
tuantur: quinetiam æstate edi fragorum vice à
Pastoribus & aliis, quod gustui placeant. Peculiariter
autem iis vtuntur Infectores ad inficienda lin-
teamina & chartam cœruleo colore, ac etiam à
Pictoribus. Succus cum alumine & Gallâ coctus
eleganti cœruleo tingit chartas. Lintheamina eo-
dem colore ita tinges. Ollæ huius succi plenè
affundes poculum aceti vini, aluminis puluerisati
unc. ij. squammæ æris itidem in puluerem redactæ
drach. ij. bulliant vna: tum retenti decocto im-
merge linthea: siccetur in aëre, demum frigida a-
qua laua, & pereleganti cœruleo tinctum habe-
bis. Si dilutius uelis, omitte squammam æris: si
saturatius, etiam plus adde. Sic docet Lonicerus.

Cœruleo
Tingendi
modis

VITIS IDÆA SEMPER VIRENS, FRUCTU RUBRO.

CAP. VII.

Descriptio.

Folia.

Floris.

Bacca.



R Amis hæc
fruticat
dodrantalibus,
rotundis, non
angulosis, quos
veltiunt folia
satis frequētia,
crassiora quàm
Vitis Idææ an-
gulosa aut ma-
gnæ, oblonga,
modò per ex-
tremum rotun-
da, modò leui-
ter acuminata,
non serrata, in
quibus nervi
subtus potissi-
mum apparent,
gustu astringē-
te & amarian-
te. Flores ra-
cematim co-

herent in virgularum extremis Liliij conuallium
floribus similes, albi, interdum blandè rubentes:
quibus delapsis bacca similiter racemosa suc-
crescunt, sex, plus minus, racemulo vno, Pili mino-
ris magnitudine, ex albo luteoq. rubentes, sapore

acido, valdè iucundo, carne simili Vacciniis palu-
stribus, cui immersa grana paruula lutea. Radix
obliqua ferè, tenuibus capillamentis fibrata.

De hac, ni fallimur, scribit Camer. Epit. Marth.
his verbis: Vitis Idæa rubra, nonnullis Rhus mi-
nimus Plin. Germ. Rot Beidelbeer, Steinbeerling,
Bronbeer: Gal. Anelles rouges. Suffrutex est exi-
guus, foliis Buxi, interdum leuissimè cœulescentis
in marginibus, flosculis Arbuti, candidis, confertis,
ex quibus Bacca rubentes in summitate, cœu corona
quædam, denticulata nascuntur, sapore acidæ
& astringentes. Radix tenuis serpit.

Anguil. Epist. 5. Vna vrsi Galeno dicta l. 7. de
comp. loc. c. 4. Arctostaphylos hodierna die in
Appennino vocatur adhuc igna del' vrsi. Hanc idè
à Theoph. appellatam Vitis Idæam censet. Inue-
niri ait in omnibus Italiæ montibus, vbi niues. Ga-
leni verba cap. sequentibus tradimus. Hanc autè
potius suspicamus ab Anguil. dici vnam vrsi,
quàm præcedentem, conferendo eam cum Gal.
descriptione.

Gesn. scribit Vitis Idææ speciem esse, acinis ru-
bris Coldenbergiæ, Vaccinia rubra: pingi à Dod-
bis, altera iconè meliore: acinos acidiores esse,
sine umbilico. At nos apud Dod. vnicam tantum
huius Vitis Idææ iconem inuenimus, quæ pla-
cet: nobis etiam gratiores videntur bacca: Prior
apud Dod. quæ duplicet est Vitis Idææ angulosa.

Vitis Idæa buxeis folijs nec deciduis, baccif-
que rubris Clus. quamvis minùs benè simpliciter
Buxea dicat: id potius conuenit sequenti plantæ,
quàm Radicem Idæam suspicamus.

Vaccinia rubra Herbarior. & offic. Myrtillos
dicunt Aduers. vt & præcedentia: an Idæa Radix
sit dubitant: ac tradunt fruticem lætiore, & habi-
tione aspectu semperuivere: non perinde vt nigræ
frequentem, nec tamen nigræ dissimilia folia,
sed paulò maiora & ad Myrtum albam siue maio-
rem, & Rhus Plinianum accedentia, rotundiora:
Bacculas nec dissimiles, sed rubras, astringentes
magis, nec perinde succulentas ferre. Radicem æ-
què lignosam fibris serpente Erica ritu. Flores ex
oblongis calyculis paruulis subpurpureis apiculos
è medio exere. Sed ista descriptio Aduers. Vac-
ciniorum rubrorum non placet: folia namque
nobis videntur valdè dissimilia, & ad Myrtum
vel Rhus nullo modo accedere.

Iconem certè non spernendam proposuerat Dod.
in Hist. Gal. quam etiam retinuit in postrema
vbi notat Gesnero Vitem Idæam rubris acinis di-
ci, sed multò minùs quàm nigram cum Idæa vite
hanc conuenire, ipsarum baccarum exortus ostē-
dit. Non enim ad latera Cauliculorum, veluti ni-
gra, sed è ramulorum cacuminibus, Corymborum
instar, dependent.

An Cam. b. 11. Vitis Idæa vulgaris. An Thal.
Vitis Idæa seu Vaccinia rubra Dod. Idem Tha-
lius refert, hanc stirpem olim Aemilium existi-
masse esse Rhum Plin. minorem. Vulgò Brane-
beer dici: Noricis Rote preßelbeer / quorum Sil-
uz hoc frutice refertissimè sunt. Belg. Roote
Erafesien, teste Dod. Red Robottes or Whor-
tle, Anglis.

Vaccinia rubra Gerard. qui figuram habet ex Ta-
ber. quæ posita erat pro vite Idæa maiore, à qua
Vitis Idæa fructu rubro multum differt. Vbi au-
tem Taber. ac etiam Tragus de hac scripserint,
nescimus, nisi fortè sub Chamæbuxo, vti monui-
mus Cap. de Radice Idæa.

Schuenckfeld. in suo Catal. Siles. varia nomina
diuersa imponit, hæc: Vaccinium rubrum, &
Vitis Idæa rubra Marth. [sed vbi?] Erica

Radix.

Vitis Idæa
rubra
Rhus mini-
mus Plin.

Vna vrsi
Gal.
Arctostaphylos.

Vitis Idæa
Vaccinia
rubra.

Clus.

Aduers.

Gesn. re-
preh.

Rhus Plin.
minor.

Gerard.
ms.

Schuenck-
feld. cat.

Erica bacellifera latifolia Taber. Vna vrsi Anguil.
Rote beydelbeer/ Rote preußelbeer/ preußelbeer,
Kausch Taber. sed an sine confusione, ipse vide-
rit & Herbatum periti.

Locus.

Gaudet & hæc locis siluosis, saxosis ac opa-
cis: itemque alpinis: Monte tracto Heluetic.
Item in similibus Brabantia locis. Copiosissima
circa Wernigerodam in Brockenbergo & vicinis
montibus. Item circa Walckenridam, Gerrenro-
dam, aliisque locis quampluribus, teste Thallio.
Vastis etiam siluis circa Bolellaniam & Laganum
silex plurimum: Schuencxf. Nobis vero obser-
uata in cacumine montis Rossberg prope Meso-
comium tractus Alfarici Octobri pulchre virens,
cum angulosa folia decidissent fere omnia. Hanc
semper virente existimamus. Item in monte Ballon

Tempus.

Lotharingia vicino, cum Vite Idæa angulosa, & a-
lia fruticosiore siue magna. Augusto iam racemu-
los gerebat, sed tum primum bacca nonnihil in-
cipiebant maturefcere, cum aliarum iam dicta-
rum omnino essent maturæ: unde patet serotinam
magis esse. Communiter etiam sub Abietibus at-
que piceis crescere videas quod & Camer. annota-
uit. Floret Maio & Junio. Septembri demum
perfecte maturatur. Cum bacca sint acide ma-
gisque adstringentes cæteris, nec perinde succu-
lentæ ut Myrtillis, facultatem utique frigidam sic-
cantque habebunt, quam & Dod. alique ipsi tri-
buunt. Quapropter ad eos usus, ubi adstrictione
opus accommodari posset. Hinc usus eorum in
Dysenteria non contemnendus: item in diarrhœa,
& superius dictis affectibus plerisque. Quæ verò
ratione pulvis ex acinis aridis exhibeatur calcu-
losis, ut scribit Camer. & repetit Schuencxf. nec
nouimus ipsi, nec facile declarabunt isti. Possis &
ex harum succo Rob conficere addito saccharo
aut melle, ad viscerum calores & sitim in febribus
calidis. Quidam ad *fulicula* commendant, addi-
tis aromatibus. Foliorum usus ob adstrictionem
idem esse possit, qui precedentium.

Vitis & vna.

Temperamentum.

Camer. & Schuencxf. fœd. ut.

Folium.

RADIX IDÆA PVATA, ET VVA VRSI.

CAP. VIII.

Descriptio.



Vitis Idæa
rubra affi-
nis est quam
Radice Idæam
Diole. vocant, à
qua tamen ma-
nifeste differt:
liquidem folia
habet denfiora,
ad Buxum acce-
dentia, ex oblo-
go rotundata,
angustiore ad
pediculum cer-
uice, utrinque
rugosa, nec ner-
uos, ut illa, præ-
ter vnicum, qui
secundum lon-
gitudinem de-
currit, exhiben-
tia, quamvis pi-

stor perpetam quasdam propagines laterorum
appuixerit, gustu cum amatore adstringente,
quemadmodum Vitis rubra fructu. Hærent autem ea

ramis lignosis, pedalis, cortice tenui & facile
cedenti testis. Flores racemosi, concavi, rubri. *Flo.*
Fructus ut in Vite sempervirente racemosus in ex-
tremis ramulorum. Quæ de radice Idæa Diole.
& Plin. scripsere, annotata sunt postea, quibus
bene consideratis fortè erit, quod monet Fab. Co-
lumn. *Bonifacia*, siue *Bislingua*, cum qua melius vi-
dentur convenire, quæ Veteres de ea scripserunt:
Ab aliis positam plantam dicit nullam cum radice
habere affinitatem.

Valerandus Donrez, sagacissimus alioqui stir-
pium investigator ac censor olim putabat Vaccinia
rubra Dod. & Myrtum montanum Cordi esse hanc
ipsam: sed ut tempore & hominum curæ omnia fi-
unt clariora, ita & in apicem data, in opacis alio-
qui delitescensium suffruticum distinctiones à no-
bis propositæ.

Quum verò Tragus Vitis Idæa rubra non me-
minerit cap. de suis Myrtillis, licet coniectari eum
de hac scribere, aut certe de Radice Idæa his ver-
bis: In altissimis Walgonia siluis non procul à Cæ-
sareo Luthro humo arenosa, exigua stirpis species
Erica haudquaquam maior reperitur. Hæc folia
habet Buxo aut Myrtillis quam simillima, humi-
que magis procumbit, quam in altum sese attollat.
An verò ea Chamæpyxos fuerit, ait se affirmare
non ausum.

Considerandum an eadem sit Vva Vrsi Galeni
apud Clus. quam scribit fruticare pedalis fere
ramulis flexilibus & lentis, humi diffusis, rubes-
cente cortice testis, ut teneriores Arbuti ramuli:
folia illi frequentia, Arbuti folijs minora, carno-
sa, Chamæleæ Italica foliorum planè æmula, mi-
nimè tamen hirsuta, cum adstrictione amaricantia.
Extremis ramulis flores proferre ex candido pur-
purascentes, siue candidos, quibus leuiter purpu-
rascens color admixtus sit, cauos, Arbuti floribus
similes, & vix modo simul congestos: fructum
non vidit: sed incolæ rubentem, rotundum, exigui
cerasi instar acidum referebant. Radicem parvam
sed lignosam. Perpetua fronde virente. Peritiores
quidam Hispani, quibus eam ostendebat, Chamæ-
daphnen esse existimabant, crassitudine foliorum
procul dubio decepti.

Clusio verò ad amissum quadrare videtur
quam Gal. lib. 7. c. 4. *radix Idæa* sic describit:
Vva Vrsi in Ponto nascitur, planta humilis & fru-
ticosa, folio memæcyli, fructum ferens rubrum,
rotundum, gustu austerum. Sed icon Vux Vrsi
Clusij nobis scrupulum iniicit, an eadem sit cum
Radice nostra Idæa, in qua non apparent nervi
transcurrentes ut pinguntur in Clusij icon.

Lob. cum Pena obscure admodum de his plan-
tis scripserit, ut apparet ex eorum Aduers. ubi ait:
Alpigena Chamærhodendros odora, frutex, flore
purpureo, pinguis tora &c. Alpina *Alprosen*: Bac-
culas Asparagi vel Taxi pares & concolores, Septe-
briedit. Et in Obs. Genuina Vva Vrsi Galeni apud
Clus. eadem videtur cum Alpigena Chamærho-
dendro exhibita in Obs. p. 199. & Adu. p. 154. cuius
flores Arbuti similes, sed ex candido purpurei aut
candidi compiculantur. Hæc Lob. qui figuram
eamdem habet cum Clus. Is pagin. Obs. prædicta
figuram habet aliam cum bacca lateralibus, & nō
in extremitatibus, his titulis: Alpigena Chamæ-
rhodendros odora Aduers. p. 154. Balsamum Ita-
licum vulgare, siue Rhododaphne parva rusti-
ca: Terionarcha Plin. putata Guilandino. Sed Lo-
botium diuersa nomina, plantæ & icones confun-
dere clare patebit rem ipsam, eiusque, & Clusij ver-
ba considerant. Nec minus an extet aliqua Cha-
mærhodendros odora bacellifera. Si extet grati

Vaccinia
rubra
Myrtum
montanum.Chama
pyxos.An Chamæpyxos
Galeni ex
Clusio.Chama-
daphne.

Arctostaphylos.

Descriptio
Gal.Chamærho-
dendros.

Vva Vrsi.

Chamærho-
dendros
Alpigena
Balsamum
Italicum
Rhododa-
phne
Therionar-
cha
Lob. error.

erimus erga demonstrantem.

Asp. Lugd.
Vepch.

Radix Idææ
Therionar-
cha.

Poma baci-
fera latifo-
lia.

Tabern.
mar.

Chama-
pyx.

C. Bauh.
lami.
Vaccinia
Vrsi.

Idæus

Tempus

vis.

Asp. Lugd. more suo duas vel tres confun-
dit, dum vni huic diuersarum stirpium hæc nomi-
na tribuit: Idæa radix, siue Idææ vitis species: Dod.
Vaccinia rubra: Clusio Vus vrsi Gal. Italis Rhodo-
daphne parua rustica: quibusdam Balsamum Itali-
cū vulgare: Therionarcha Plin. Idæa radix Diosc.
Plin. Gal. Tam egregie Chaos istud stirpes digerere
consuevit.

Tabern. proponit figuram Ericæ bacciferæ la-
tifoliæ nomine, quam & *Rausch* Germ. vocat, sine
descriptione, quæ exprimere videtur nostram
Idæam radicem. De *Vua vrsi* quam idem ex Clus.
habet, iam diximus nostram sententiam. Chama-
rhodendron Alpinam latifoliam & is sanè con-
fundit cum *Ledo* Alpino: Figuram etiam
proponit Lobelianam, cuius natus iam de-
teximus. De Chamæpyxo eius idem dicimus,
quod de Tragi Chamæpyxo, nobis videri eo
nomine tradi Vitis Idææ speciem, cuius ico-
nem si quis consideret, fortè suspicabitur po-
tius accedere ad vitim Idæam rubro fructu, quam
ad Radicem Idæam. Rem Leoribus consideran-
dam relinquimus. Quicquid sit, cum D. Casparo
Bauhino Botanico versatissimo existimamus non
esse ex genere Buxi.

Gerard. quoque Chamærhodendros alpigena
dicitur: Angl. *Swearffe rose Baie*: Item Vaccinia
Vrsi siue Vua vrsi Clus. *Bearts Wesortle berries*.

Ceterum *Vua vrsi* Clusio non nisi vnico loco
nascentis visa arido solo & aprico, via regia in colle
imminenti cuidam viculo, *l'ence el babul* vocato,
inter Guadix & Baca, regno Granatensi, iam flo-
rens Martio. Serius tamen plerumque florere, fru-
ctum æstate maturescere, & in planta ad hiemem
vsque perdurare ipsi incolæ affirmabant. Nos in
montibus circa Genuam obseruauimus. Proue-
nit etiam Basileæ via quâ tenditur ad S. Chrischo-
niæ fanum iuxta vineas. Legimus etiam in Vega-
ganijs Narbonæ montibus.


Ill. Princeps noster Frid. Dux Wirtemb. misit
nobis plantam siccam monens copiose reperiri
circa Curiam Rhetorum, ferre baccas rubras:
magni fieri hanc plantam à tinctoribus pro tinctu-
ra nigra, ac eis dici *Rausch*.

CHAMÆBUXVS SIVE CHAMÆPIXOS.

QUIBUSDAM.

CAP. IX.

Descriptio.



Radix.

in silis radicanter: alioqui & radicem habet, si-

Quamuis
hæc planta
non sit de tribu
bacciferarum,
iungendam ta-
men censuimus
propter quandā
similitudinem
cum præceden-
ti, à quibusdam
Chamæbuxus
putata. Hunc
suffraganeum iti-
dem Chamæbu-
xi dicere, mul-
tis virgultis te-
nuibus, lentis,
spithamam cir-
citer longis præ-
ditum, quæ vbi
terram attinge-
runt, fibris de-

pè non multò ipsis virgulis breviorè, lignosam, ex
cuius capitibus (quæ plura possidet) ipsæ emergunt. Folia
Folia per ramos incondita, Buxis quodammodo
similia, magis acuminata, carnosæ, pediculis bre-
vissimis herentia, [gustantibus primùm ingrata,
deinde amara & acris Clus.] amaricaria: ex quo-
rum alis, in ramulorum extremis flores emicant
Colureæ scorpioidis floribus similes, simul plures
iuncti, qui, teste Clus. odoris expertes, nonnul-
lis verò locis odoratissimi & Narcissinam quan-
dam fragrantiam emulantes, tribus foliolis con-
stant, quorum duo alba sunt, & alarum mode-
sursum expansa, galeolâ exalbida illorum exorta
integens, tertium folium in oblongum veluti ca-
bulum conuolutum est, sursum per lanuginem a-
pertum, per extremitatem braccæ modo efforma-
tum atque luteum, & vetustate interdum omni-
no purpurascens aut rubescens. Floribus succedunt
latæ & compressæ siliquæ, Thlaspi latifolii filiquis
paulò minores, virides, quæ bina plerumque [no-
nunquam verò vnicum tantum] continent grana,
exigui Erui magnitudine, colore ex cinereo ni-
gricante, hirsuta & veluti quoddam animalculi
ementia, Polygalæ vulgaris maioris rubræ semi-
ni haud absimilia, sed minora, quæ apertis
sele per latera loculis, spontè decidunt.

Interdum etiam pro loci natura floris colorem
variare deprehenditur: nam bina illa folia alati
instar, sursum expansa, galeolæque eorum exor-
tum tegens, alba non sunt, sed pulcherrimè ex
purpura rubent: tertium autem veluti in tubulum
conuolutum flavescit, eiusque extrema pars au-
rea est.

Cordum existimamus in Obs. silua de hac pla-
ta ita tradidisse: [licet Thalius aliud referat] Femi-
culus exiguus, humi prostratus, iuncis viridibus-
que virgulis: foliis myrtinis, duris, acuminatis, po-
rennibusque: floribus papilionaceis ferè, disperso
colore, videlicet albo, flauo & rubente: extima
quidem albet, proximum flauet, intima rubet.
Nascitur in siluis montanis circa Egeram, in Ba-
uaria & Vindelicia.

A *renus* Colureæ flore, siue elegans Clus. qui à
nemine adhuc descriptam putat. At nos à Cendo.
Quidam à perpetua viriditate wintergrün appel-
lari dixerunt, quod nomen aliqui & Vinet per-
vinç conuenit.

Anonymos Peruiçæ folio: Camer. Gesn. iam olim
[cùm ego Bauhinus ipsi conuierem] Chamæbuxi
seu Chamæpyxon vocauit. Argentinè vidimus in-
ter Plantas D. Agerii siccas nomine myrtogeni-
stæ, quod nomen non displicet: nec sanè male post
Genuam ponit Clusius. Sed magis arctice Cha-
mæbuxi.

Frequens est prior teste Clus. non modo in
montibus Calenberg, Medeling, & Badensibus
thermis imminetibus, sed & in alijs ad Austria-
cas & Sciriacas Alpes excurrentibus, qui omni
Resiniferarum arborum genere integuntur, inter
saxa. Plurimis etiam Pannoniæ locis est obuia, ve-
luti ad Polonium, Sopronium & Zolotock. Alie-
ra verò rarior inuentu.

Floret utraq; Aprili & Maio. Semen peditis Tempus.
[nam alterius non obseruauit] Iusto petichit: D.
C. Bauh. attulit Parauo in horto lectam, his no-
minibus: Vitis Idæa Theoph. cum baccis Myrti,
Olea Ethiopica Diosc. Guilandino. Sed decepi
fuere qui ita vocarunt, nisi nomina casu ad plan-
tam fuerint adiecta. Tiguri etiam obseruauimus
& collegimus. Locus particulatis nunc non suc-
currit. Hactenus neglecta fuit hæc planta, nec in
vsum Medicum vocata, quod sciamus.

VITIS

VITI IDÆE AFFINIS POLIIFOLIA
MONTANA.

CAP. X.

Descriptio.

Folia.



Ortu & facie est Poli nostratis, virgultis crebris, dodstante longioribus, lignosis, ex nigro rubentibus, magna ramorum lobole fecundis. Folia Poli nostratis, acutiora, nervosa, vncialia, angusta, superius viridantia, pronâ parte cinerea vel glauca, nervo elatiore per longum currete. Extremis ramulorum petiolis calyculi hærent perexigui, foliosi, rubentes, unde angulosa pyramis exilit Conchylata, baccæ alicuius rudimentum promittens. Pro radicibus passim ex ramis nascuntur capilli instar tenues fibræ terram morsu comprehendentes. Appingitur quimus latusculum folium, iuxta angustum, cuiusmodi pauca plantæ à nobis collectæ adhæserunt.

Calyculi.

petiolis calyculi hærent perexigui, foliosi, rubentes, unde angulosa pyramis exilit Conchylata, baccæ alicuius rudimentum promittens. Pro radicibus passim ex ramis nascuntur capilli instar tenues fibræ terram morsu comprehendentes. Appingitur quimus latusculum folium, iuxta angustum, cuiusmodi pauca plantæ à nobis collectæ adhæserunt.

Locus.

Hanc plantam reperimus vliginosis, muscosis, & frigidis locis cum alijs Vitis Idææ speciebus, Maij principio in montibus Hærcinix silva inter vallem Griesbachianam ubi fontes acidi, & Kiselsaumen, ubi etiam fons acidus. Vidimus quoque cum flore apud D. Platerum Basileæ, sed siccam, collectam in monte Pilati.

Myrtus tenuifolia.

Hanc eandem videtur Thalius in Hærcynia sua Myrti tenuifolia nomine sic descripsisse. Copiose reperitur in vligine illa, ultra Andersbergum urbem, Brockenbergum montem versus, quam nominant Denroten Bruch, hoc est, Vliginem rubeam, quod totus ille vliginosus tractus sub radicibus Brockenbergi, & vicinorum montium rubro musco plenus sit, quæ videlicet ex Andersbergi viapater Goslarium versus. Fruticulus est lignosus, palmaris, viticulis multis, incurvis: folijs oblongiusculis, vncialibus, Myrti folijs angustioribus, quorum extrema plerumque in tergu contorquentur. In exiguis recurvis pediculis profert circa autumnum flosculos parvos, rubicundiusculos ex albo. Fructum nunquam adipisci potuit, cumque sero admodum floreat, eo autem loco, ubi nascitur, hiems citius, quam alibi incipiat, citius etiam grandiores ibi niues cadant, opinatur raro eius maturos fructus haberi posse. Cognatum forte quid cum hoc habere putat fruticulus illum exiguum Cordi, folijs Myrtinis, quem nos diuersum censemus, ac Chamæbuxum præcedentem.

Tempus.

Vitis Idæa rubra Bauarica.

An Camer. Vitis Idæa rubra Bauarica, baccis insipidis sine succo. Fruticulus est supinus, crassiore caudice quam vulgaris (ea forte, quæ rubro fructu) quæ apud nos passim cum nigra (forte angulosa) in silvis crescit, & Steinbeerlin voca-

tur: folijs item oblongioribus, acuminatioribus & angustioribus, per autumnum rubentibus. Crescit circa Monacum in campis asperis inter Ericas. In horto adhuc viuit & viget, nedum vt siluestres huiusmodi plantæ videretur interitura. Hæc ille. Quam verò nobis cerò non constet; quod sit referenda hæc Vitis Idæa Bauarica, hic lubuit eius descriptionem referre, donec melius nobis innotescat.

Locus.

OXYCOCCVS SIVE VACCINIA
PALUSTRIS.

CAP.

Descriptio.



Prolongis viticulis, lignosis, ex atro rubentibus, lētis & fractu contumacibus, inque adnatas propaggines ductis serpit, quas folia vestiunt crebra, positu ferè pinato, dura, serpylli folijs paria, superius viridantia, subius ex cinereo rubentia. Baccæ figura, vt inquit Cordus, rotundæ & cordis modo infe-

Folia.

Bacca.

rius iuxta annexum turbinatæ, colore foris primum candicantes, mox puniceæ & purpureis contiguisque maculis & punctis conspersæ, intus verò in candido modicè rubentes, & quatuor exiguis cavitatibus parua & veluti abortiua semina claudentes: ex vna cum caulyculis humi procumbunt, nonnunquam etiam in musco tanquam absconditæ latent. Flores in extremis & capilli instar tenuibus furculis, Glycypteridos stirpibus simile, colore propemodum puniceo. Radicibus nititur breuib; capilli modo tenuissimis & flauis, ex viticulis subinde demissis. Saporem coliculi & folia habent adstringentem: baccæ verò egregiè & simpliciter acetosum.

Semina.

Flores.

Radix.

Sapor.

Dod. scribit se obseruasse radicem esse instar tentis bacilli, obliquam, ex qua sursum complures coliculi & inferius fibræ aliquot demittantur.

Thalius autem hæc annotat: oxycoccon copiose in Brockenbergo & vicinis montibus humidioribus, folijs non ita subtriangulosis, vt est eius icon apud Cordum, sed oblongioribus ac strictioribus, lenticulæ ferè, brevioribus tamen: quorum ambitus versus dorsum vtrinque leniter reflectitur. Longis lignosisque ac obliquis protegit in vliginosis musco viticulis, radicibus constans tenuibus, multifidis, lignosis, quibus ex pillaceæ fibræ multæ adhærent. Flosculi exigui sunt, purpurei, veluti exigui Citinij.

Vaccinia palustris Dod. videntur fortè eiusdè stirpis fructus esse, vel congeneris. Tantus autem radicem truncus nostro oxycocco non est, quantum icon Dod. suorum vacciniarum exhibet. Hic idem in hist. Gal. Vaccinia palustris aie Belgicè vocari Deendesen & Deencoren: Gal: Covines des marais: nullumque aliud nomen sibi co-

Vaccinia palustris.

Grana.
Radix.

Locus.

purpureo succo, uti Mora, plenz, in quibus multa inaequalia & veluti triangula grana. Radix lignosa & dura est. Hanc florentem, & viridibus baccis onustam, multasque adhuc superioris anni maturas retinentem, inuenit idem in præceli montis; Vulgo Dechse lappellati, scopulis, quinto supra Neapolim Austriæ urbem miliari, mense Iunio: Postea etiam Augusto, immaturo & maturo fructu plenam in Sneberg & Snealben Celsissimarum Austriæ & Styriæ alpium iugis. Illius etiam arenosis Hollandiæ tumulis erutz ramum suis baccis maturis & immaturis onustum misit ad eundem N.V. Io ab Hoghelande. Miramur verò in Clus. iconem ramos pingi hirsutos, nec tamen fieri mentionem in descriptione: alioqui icon angustis foliis melius convenit cum Erica à nobis descripta, quam icon Camer. à nobis proposita:

Iam antea monuimus Penam & Lob. & hos sequitur Schuuenkf. existimasse Vaccinia palustria esse Ericam bacciferam Matth. quem errorem dudum deprehendimus. Sed quoniam idem Schuuenkf. feld. Oxycoccon dicit esse Ericam bacciferam Matth. & Thalii, cum ex eo aperte contrarium pateat nempe Thalii diuersum esse à Vacciniis: placet eius historiam totam subiicere, quæ sic habet. Erica baccifera Matth. Nam hanc de qua nunc agimus, eandem esse censemur. Angli verò in Aduersar. Vacciniorum palustrium nomine eam proponunt, quamvis hæc nostra in palustribus non nascatur. Fruticulus est humi procumbens, in oblonga, multifidaque brachia rubetia, lignosa, obsequiosa ac foliosa latè super terram se prorepando explicans: foliolis dense obestitur breuib., oblongiusculis, strictis, suffuluis, sæpe etiam nonnihil cæruleis, splendentibus, ex quorum alis in ramulorum extremitatibus æstate sub Syrii æstu micant tenuissima staminula, breuique, filamentorum sericorum ferè instar, quorù summitatibus apicula insident, coloris ex rubro nigricantis aut spadicescentis ferè: hæcque filamenta & apicula florum vicem explent, iisque decidens, emergunt baccæ splendentes, luniperinis minores, umiles baccis Vitis Ideæ seu Vacciniorum nigrorum Dod. rotundæ, ex purpura nigricantes, dulci pulpâ constantes, cui infarcta continentur semina purpurascens. Prouenit copiose in summo Brockenbergi iugo & saxorum aridorum fissuris. Saxones qui montem illum accolunt, vocant hosce fructus *Apenbeer* / hoc est, Simiarum baccas. Vnde, si quis neque Ericæ, neque Vacciniorum speciem stirpem istam esse voluerit, is nomine confecto *Thalii* appellare posset. Inde autem ei hoc nomenclaturæ inditum est, quod æsus ipsorum vberior capiti noxia inferat quædam symptomata, ad quæ deliræ subiequantur gesticulariones, ratione nonnihil interturbata, ut is, qui ipsis usus fuerit copiosus, simiarum instar sese habere gestu risibundo videatur. Hinc plantulam hanc deleteriâ facultate minime carere contendunt, & ab eius usu omnino abstinere, aliisque ipsorum vitium sanctè interdicitur. At amicus quidam noster Andreas Roselerus, pharmacopœus Halberstadiensis, vir opt. & rei herbariæ non triualiter gnarus, hanc stirpem Chamætaxum vocare solet, tum ratione qualitatis istius malæ, tum foliorum oblongiusculorum Texi, sed breuiorum. Similius eam olim, cum necdum illo tempore à quoquam esset hæc stirps descripta, Corios speciem faciebat, Cadin Brockenbergensem nominans. Reperiuntur & vetulæ herbariæ in Saxonia, quæ hanc plantam *Gichsfraus* vocitant, commen-

dantque eam mulierculis ut præsentaneum præsidium contra istiusmodi morbum, nempe Conuulsionem. Matth. fatetur se de sua Ericæ bacciferæ qualitatibus nihil certi habere.

ANONYMOS FRUTICOSA,
FOLIIS ERICÆ BACCIFERÆ MATTH.

CAP. XIII.



Elegantissimi huius fruticelli ramo pulchello nos donauit Cl. D. Agerius Med. Argent. & stirpium sagacissimus vestigator, qui surculosus, lignosus, variè diuisus, imâ parte rufus aut fuscus, annotinorum ramulorum principium dilutè rubens, extrema flauescunt. Ex inæqualibus internodijs foliola emittit ma-

gna ex parte bina, nec tam numeroso ac denso agmine, ut in præcedenti, altero verò latiora, crassiora, & in totum maiora, dilutè virentia, & Buxi recentis in morem flauescens. Ramulorum summa surrectis & longiusculis petiolis rufis insidentia occupant vascula Ledi Narbonensis aut Nerij Montani quodammodo similia, foliaceo calyculo suscepta. Folia magis quam præcedentis amata, nec sine adstrictione.

De hac Aduer. ut putamus sic scribunt: Chamæthododendros altera cellis & rigidissimis cautibus, floribus purpureis perquam exiguis, Ericæ foliolis, non deciduis, prouenit: humilis tota, à nobis tantum sicca visa.

Gesn. de hort. Rosæ alpinæ altera species, foliolis minimis, Acinariæ palustris nostræ foliolis persimilibus.

Nascitur in Adula monte Rhætorum: inde autumno allata, in hortulo plantata, ubi nunc media hyeme egregiè viret nec perdit folia: duratur tamen vix ipso, altissimis, siccis, ventosis & apriis frigidisque locis assuetam. Species hæc Rosæ alpinæ rarissima est.

Ex Clus. Ran. desumpta est nostra icon, sed minus feliciter pictor imitatus est: titulus erat folijs Thymi: de ea scribebat nondum sibi constare, quod esset referenda, eam ob causâ etiam relinquere: nisi fortè ea sit quam Pena & Lob. in Adu. Alpinam alteram vocant, & statim post Chamæthododendron odorem collocant.

In nostr. hist vocat Chamæcistum. Olim (inquat) non mihi constabat, quod istam plantulam referre deberem, quod mediam naturam inter Chamæcistum & Cneorum Matth. obtinere videretur: eam ob causam inter vtriusque capita locaueram. Sed diligentius postea obseruatam, inter Chamæcisti genera reponere placuit, impel-

Pen. Lob. & Schuuenkf. error.

Semina.

Locus.
Simiarum baccæ.

Parhyocis cur dictum.
Nomen ex baccis.

Deleteriam esse.

Chamætaxum.

Corios speciem.
Vitis.
Conuulsio.

Folia.

Rosula.

Sapor.

Flora.

Rosæ alpinæ species.

Locus.

Anonymus folijs Thymi.

Chamæcisti genera.

lentibus me aliquot causis. Oblongis quandoque dodrantalibus tantum serpit ramis humi distilis, nigricantibus, in multos alios breues ramulos diuisis: folia frequentia & conferta sunt, bina semper inter se opposita, [non semper hoc obseruatum in planta] exigua, serpilli minora, Thymi durioris folijs haud maiora, crassa, superiore parte viridia, infernè candicantia, amaricantis saporis. Extremis ramulis innascuntur bini aut quaterni flosculi simul iuncti, perpusilli è quinque foliolis compositi, carnei quasi coloris. His succedunt capitula, maturitate in quinas crenas sese aperientia, & semen exile admodum ostendentia. Radix dura, lignosa, aliquot fibris donata: quinque etiam rami subinde tenues fibras agunt. Exiccata planta non iniucundo spirat odore.

Flascu. Nasceitur tenui solo inter saxa, in summis Sneberg, Snealben, & alijs Austriacarum Styriacarumque Alpium supercilijs.

Capula. Floret Iunio, interdum etiam paulò maturius, pro temporis, quo nix quæ iuga illa tegit maturè aut serò soluitur, ratione.

Locus.

Tempus.

ERICA BACCIFERA LVSITANICA.

CAP. XIV.

Descriptio.


Folia.

Fructus.

Non flores.

Camari-
lara.

Acacali.



ERica folijs Corius Clusio fruticosa est, cubitalibus asurgens ramulis, fragilibus, nigriore quàm relique cortice, folia quoque iis similia, sed nigriora & crassiora, gustu cum adstrictione calidiusculo, trino ordine circa ramulos sunt disposita. Fructum a reliquis Ericis differetem summis ramulis inhaerentem gerit, vniones obscuriores tum forma tum colore referentè, succulentum, sapore acido, tria granula dura plerumque continentem, qui exiccatus per se decidit. An floreat, nondum constat: incolæ negabant, & fructum paullatim intumescere amplioremque fieri donec maturè sceret affirmabant.

Et verò hæc longè diuerfa à Matth. Erica baccifera. Lusitani vulgò *Camari-lara*: fructum verò *Camari-lara* dicunt. Erica baccifera Lob. Erica baccifera tenuifolia Tab. qui & *Rausch* vocat. An verò & hoc nomen Germanicum, quod pluribus plantis tribuebatur, & huic conueniat, considerandum.

Lat. *Acacalis* Amato in Com. ad Diosc. Est verò *Acacalis* eidem planta fructum ferens albam, rotundum, paruis margaritis persimilem, quem Lusitani sua voce *Camari-lara* appellant: neque putat fructum istum in Europa vniuersa, præterquam apud Olyssiponem crescere. Planta media est inter Myricem & Ericen quæ de causa Diosc. prudentissimè eam de Myrice & Ericæ sermonem fecisset, de hac illic de caput se-

quens constituit. Fructus est esui gratus: Verùm *Cacalia* herba longè alia est, quamquam Plin. illi quoque fructum margaritis simillimum inesse dicat. Quæ *Acacali* conueniunt, *Cacaliæ* Plinium tribuisse deprehendimus, dicentem: *Cacalia* siue *Leontice* vocatur semen margaritis minutis simile &c. De *Acacali* Paulus quoque ex Diosc.

Bry fratres Hist. Ind. Oriental. notant quoque Lusitanis *Camari-lara* vocatas folijs esse equileti, sed obscurioribus. Fructus esse baccas rotundas, perlacæ candoris, sapore subacido.

In vna Lusitania hanc plantam obseruauit Clus. non procul Vlyssipone inter *Riofrío* & *Aldea Calaga*, & etiam supra Vlyssiponem, solo admodum arenoso, copiosè suo fructu albo onustam: ait initio *Mannæ* grana isti frutici inhaerentia existimasse, adè procul ipsi insipienti imposuisse. Septembri & Octob. fructum fert, qui Nouembri exiccatur & per se decidit. Fructus Sept. & Octob. mensibus Vlyssipone inuenitur, febrientibus exhibent, ad sitim quæ premuntur, restinguendam: autè etiam idem fructus à pueris & mulierculis expetitur, Si *Acacalis* est, aquam in qua maduerit eius fructus, ad Collyria quæ ad excitandam oculorum aciem conueniunt, addi, testis est Diosc. Amatus quoque testatur fructum esui esse gratum, eoque mulieres & effrenatos pueros in cibo frequenter uti.

LIGVSTRVM.

CAP. XV.



Ligustrum folijs Coriandæ arborescens, folijs hinc inde per obliquum spargens, tres aut quatuor cubitos altas & maior, crebris virgis lentis & in ramos diuisis constans, cortice cinereo obiectis, præsertim verò stipites & rami crassiores tali cortice vestiuntur: nam ramuli virides leguntur, materie albida, dura. Folia bina aduerso seu ex interuallis o-

riuntur, oblonga, angusta, figura ad Salicis folia quodammodò accedentia, sed breuiora, crassioraque, atrouirentia, læuia, nitentia, glutinosa & subamaro, non sine adstrictione. Flores in ramorum summis profert suauiter olentes, candidos, racematim congestos, quorum singuli quaternis, quinis, aut semis foliolis constant, apicibus ex luteo herbidis, qui decerpti statim flaccescunt: quos excipiunt Baccæ racematim quoque in Pyramidis figuram aggestæ, Hædæ baccis minores, læuiore ac nigrescentes, luniperimurales, initio virentes, per maturitatem nigricantes, continentes bina grana, hinc gibba, inde compressa, cortice spadiceo, carne exalbida, vel digitorum leni pressu fragilia: sapore amato ac iniucundo, quamvis quibusdā aliquid dulcedinis habere videantur.

Tragus

Tragus annotat huius generis nonnullos fructus subluteo comari flore, atque eos quidem inuentu rariores esse.

Ligustri meminit Virgil. celebrato illo carmine: ubi flores intellexisse videtur.

Alba Ligustra cadunt, Vaccinia nigra leguntur. Et Colum. in hortis: *For Calatbis Violam, Et Nigro permixta Ligustro Balsama* &c: ad fructum potissimum respiciens: ut censet Tragus.

Marcellus sibi persuadet, Ligustrum hoc vulgare idem esse cum Cypro Diosc. ut satis aperte insinuat, quando ait: Quos Maro cecinit pastoribus negligi & inutiliter perire Ligustri Flores, medicina & Vnguentariorum Officina libenter exceperunt. Nostra ætate nulla aut exigua eius ratio est, cum alioqui vulgaris & ubique paratus frutex hic sit. Cisalpina omnis adhuc Gallia sic vocat. Hetruria corrupta appellatione *Rumisticum* De Diosc. & Plin. Cypro cap. seq. Sunt tamen qui & Plin. Cyprum eam esse Arborem censeant, quæ etiamnum in Italia Ligustrum vocatur, ut dicetur in progressu.

Ipsiusmet Ligustri paucissimis meminit Plin. Ligustra iniquis non nisi in aquosis provenire, telluris vilissima. Alex. ab Alex. tessaras hinc luforias interpretatur: Dal. verò rectius nostro iudicio lignea signa, vinum, frumentum, oleum aut aliud quippiam significantia, & promittentia, quibus in congiariis & publicis largitionibus Imperatorum vrebantur.

Porro magna difficultas orta est inter Herbarios An Ligustrum sit Cyprus Diosc. & Plin.

Cyprum quidam, ut Plin. inquit, esse dicunt arborem, quæ in Italia Ligustrum vocatur.

Et Ruell. Ligustrum apud nos eadem est arbor, quæ in Oriente & Græcia Cyprus, Gallis *Troenea*, Sueffionibus *Drynna*, officinis ad Barbaros delinquentibus tum *Alcana* tum *Heune*.

Virgil. pro flore usurpavit *Alba Ligustra*. Cypri, id est, Ligustri, florem putat corollis intorquentum.

Scio, inquit Tragus, qui Phyliream Diosc. velint, (ut Fr. Massarius Venetus & illius Simia) mihi verò est *xyris*, Lat. *Ligustrum*, de quo Diosc. Quidam immerito vocant *Sarrigeli*.

Cordus quoque scribit, Ligustrum sine dupio arbusculam esse quæ Græcis Cyprus vocatur: propterea Plinium idem scripsisse nunquam poeniteat.

Annotat Corn. Posterioribus plerisque omnibus esse Cyprum: nec tam multis annis confirmatam opinionem velut errorem damnari debere, quum magna adeo sit inter Cyprum & Ligustrum similitudo. Eidem aut Cypros est Italix Ligustrum, aut Philerea: eos tamen addit qui Italix Ligustrum viderunt magis Philyreæ simile id quam Cypro depingere.

Eorundem sententiam tueretur Matth. & in errore versari tradit novum quendam Herbarium [Anguillaram] qui censet Cyprum & Ligustrum diuerfas esse stirpes, friuolis argumentis ex Plin. desumptis. Hallucinari qui non videant Ligustrum omnibus suis notis referre Cyprum, Sed Anguillæ argumenta non videntur Matth. sufficienter refutare, & nimis audenter pronuntiare hallucinari eos, qui suæ opinioni non assentiuntur de Ligustro.

Ab eorundem partibus stant Io. Agric. & Turner. Hic speciatim, eius notas omnes cum Cypro Diosc. conuenire scribit: ac quanquam Massar. Venetus lib. de Piscibus strenue neget Ligustrum esse Cyprum, rationes tamen quibus nititur non tam habere vim quin confutari possint. Ac optasse

mus sanè refutasset viuis rationibus, si potuisset, aut à reprehensione abstinuisset.

Amatus ne ambigendum quidem censet Cyprum Ligustrum esse, quum Plin. dicat arborem Agypto familiarem, in Italia Ligustrum vocari. Ideo omnino falli Mass. Venetum, Cyprum aliam arborem à Ligustro esse contendentem. Ligustri verò radicibus hodiè Mauros suos inficere capillos, velut equorum quoque crines, quod olim quoque fieri Diosc. tradidit. Verum vel ex eo facile conuincitur Amatus, Ligustrum nostrum neque esse Cyprum, neque id lignum quo Mauri capillos inficiunt, quia nihil tale præstat Ligustri nostri lignum, sed *Heune*, quod Cyprum existimamus.

Amati errorem verumque ruminatur Lacuna, (vir nostro iudicio parum in re Botanica versatus) nempe & *xyris* esse & Ligustri radicibus à Turcis tingi caudas equorum: additque Poetas huius arboris flores vocare Ligustra, & fructus eius Vaccinia: sed dubium non est duas ab eo confundi plantas: non enim nostratis Ligustri, sed alterius exotice arboris radice, de qua postea, tinguntur pili equorum.

Ad vniuersam huius plantæ historiam idem Lacuna accumulat & tertium errorem. Ponit Ligustri iconem ex Matth. & aliam habet eiusdem plantæ nomine Halimi, cum quo nullo modo conuenit, Cæcis ita imponendum est, non nobis & diligentibus studiosis.

Monachis etiam Cyprus Græcorum & Ligustrum Latinorum vnum & idem sunt, quemad. & *Alcana*, ut legentes [inquiunt] Serapionem, & Diosc. cū Plinio conferentes non lateat. Addunt in oleo Cyprino Actuarius legi florum Ligustri, Græcis Cyprus dicti.

Lonicero *Ligustrum* Diosc. Philyra est & Cypris, cuius duas species facit, magnam & parvam. Esse Virg. alba Ligustra, & Colum. Nigra Ligustra. Ita vides non minori ignorantia quam oscitantia ab illo vni plantæ tribui tria diuersarum plantarum nomina. Præterea vultus plantæ duas icones, minorem & maiorem ponit, & propter eas potius, quam ex re ipsa, aut quod viderit, vel ab aliquo didicerit, duas tradit species, à nemine hætenus, quod equidem sciamus, obseruatas.

Eius priorem iconem Ryff. prædicto non magis in re Herbaria versatus, pro Ligustro ponit, scribens: *Ligustrum* Plinij aliorumque Latinorum, cuius picturam damus omnes fere hætenus Diosc. Cyprum interpretati sunt, sed illos nuper redarguit Massarius, demonstrans Ligustrum esse *xyris* non Cyprum. Ryff. igitur qui ineptè posuit pro Cypro iconem Ligustri vulgaris, uti dictum, cap. sequenti iconem maiorem eiusdem plantæ cum eodem Lonic. ponit pro Philyrea Diosc.

Altiùs sapuisse sibi persuadent Pen. & Lob. in Adu. quando *Ligustrum* Diosc. nostras vocitant, subolfacientes fortè nostrum diuersum esse à Dioscoridæ, & nihilominus ad illud reduci posse aut debere existimantes, ut equidem candidè interpretaremur nisi sequentia eorum verba diuersum proderent, quando aiunt: de florum fortura Cyprus dictus Græcis videtur: *xyris* enim floreus est, quod alluisse visus est Maro, ubi *alba Ligustra* cadunt, canit. Auic. dicit baccas esu sanguineum lotium aut potius colore cruentum ciere, quod præstitisset Rhetorarijs experiri, quam Ligustrum verum inficari. Quæ tamen Alkanæ afferuntur assulæ, vel baccilli, luteo sunt intus ligno, coque si crinem (ut videtur Auic. ex Diosc. velle) ruffant, sunt sanè aut melioris notæ Ligustri, quæ diuersæ

Turner. ca.

fig.

Amatus refut.

Lacuna not.

Ligustra

Pier

Vaccinia

Pier.

Tertius Lacuna error.

Lonic. ca.

fig.

Alter eiusdem error.

Ryff.

error.

Ryff.

error.

Cyprus Græc.

fig.

plantæ, Quibus postremis verbis & notis non temere seu recidiua quadam hæitatione iactari nobis videntur, adeoque nihil certi statuisse. Non placet igitur eos prius *Ligustrum* & *Cyprum* idem dixisse: nec quæ huius nostre ascribant de vna tractata, quod decebat illos potius experiri prius, quam redarguere eos qui negant *Cyprum*, cum ipsi dubitent, ut aperte docent eorum verba de *Alkana*, de qua nos seq. cap.

Cyprum Denique *ligustrum* nostras etiam *Cyprum* Diosc. faciunt Cast. Durantes, [qui non bene duas figuras & descriptiones vnius plantæ ponit, quasi diuersæ sint plantæ.] Taber. & Cæsalp. Lonic. addit *Cyprum* ab insula dici.

Ligustrum His omnibus strenuè se opponunt, iam sæpè citatus Massarius, Fuchf. Dod. Anguil. Rob. Constant. pod. Amati, Goropius, Porta, alique quorum iudicio & rationibus sanè in hac re plus tribuimus, eisque hætenus subscribimus, donec prodeat aliquis, qui nobis diuersum persuadeat. Quamquam Diosc. *Cyprum* descriptio propius ad nostrum *Ligustrum* accedere videatur quam Plinii: quamuis nostram vix propriè & simpliciter arborem dicas, adhuc minùs peregrinam. In nostri quoque *Ligustri* foliis nihil tale quid apparet, quod capillos ruffet, quæ notæ nostrum *Ligustrum* à Diosc. *Cypro* potissimum distinguere videatur, quamuis & alix fortè sint circa vires, nondum obseruatz. Sed quid multa opus velitatione, cum alia planta, nec frutex, sed arbor Recentiorum industria inuenta sit, melius cum Diosc. *Cypro* conueniens.

Nec Cyprum Sed nec *Cypro* Egyptiæ descriptioni Plinii quadrat nostrum *Ligustrum*. Plinii namque *Cyprum* semen habet Coriandri, peregrinaque est arbor. At *Ligustrum* nostrum grana non Coriandro similia habet, ut facillè ex descriptione nostra proposita conferenti notæ cum Coriandro patebit. Nec sanè nostrum *ligustrum*, quod spontè in sepibus & senticetis passim occurrit nascitur in Egypto. Rectè igitur Fuchf. *Ligustrum* quo nomine Græcis appellatum sit, nondum certò nobis constat, neque enim, ut ferè omnes hodie putant, *Cyprus* est.

Plin. not. Dod. quoque ipsum in hac re aded Plin. reprehendere audens, eum scribit perperam *Ligustrum* eandem arborem esse censere, quæ in Oriente *Cyprus*. Quam censuram mitigans Anguil. *Cyprum*, inquit, quidam volunt esse *Ligustrum* in Italia dictum: verum credere non possum *Conastrella*, quam habemus in Italia esse *Cyprum*: notæ non respondent. Plin. etiam non affirmat *Cyprum* esse *Ligustrum*, quamuis alio loco id asserere videatur. Verum fortè Plinio addita quædam aut doctus Plinius sibi contrarius. *Conastrella* non potest esse *Cyprus* Plin. l. 12. c. 25. *Ligustrum* Latinorum non negarim. Quæ planta sit *Cyprus* ignoro. *Conastrella* est *Philyrea* ut patet ex descriptione. Hæc ille. Qui existimando *Conastrella* esse *Philyream*, fallitur, de qua mox tractabimus.

Ligustrum Eadem ferè & Rob. Const. confirmat his verbis. Quid sit *Ligustrum* siue *Cyprus*, profectò ignotum est his nostris temporibus. In hoc solum Diosc. & Plin. consentiunt, quod uterque dicat esse arborem quæ vel solà notà excluditur vulgaris illa planta ab huius consortio, quam nobis pro *Ligustro* & *Cypro* ostendunt Herbarij, quæ fortasse est *Ligustrum* Virgil. non autem *Cyprus* Diosc. aut Plin. *Ligustrum*, imò nec Columelle. Hic enim frutex in sepibus maximè communis, vix unquam visus est arborefcere: nos Galli vocamus de *Træfæ*: sed *Cyprus* siue *Ligustrum*, id est, *Arabum Alkana*, arbor rara est, & inter pretiosa

simplicia semper adnumerata.

His ac similibus rationibus motus doctus. Goropius, *Ligustrum* alterum Veteribus dicere maluit, & aperte ait Virgilij *Ligustrum* non intelligendum esse de *Cypro* flore odorato. Sed cur *Ligustrum* alterum Veterum dicat, ubi duo genera *Ligustri* apud Veteres inuenit: sanè nisi id intelligat vel apud Plin. vel hoc nostrum *Ligustrum* seu alteram *Ligustri* Veterum speciem agnoscat, quid aliud velit nondum olfactus. Nam, ut dicebamus, præter *Cyprum* solum aliquoties meminuit, & *Ligustrum* sæpius citat, ut in sequentibus patebit, nec tamen hoc idem esse cum illo categoricè affirmat: imò lib. 12. c. 24., ut & l. 23. c. 4. videtur ambigere, utrum ea *Cyprus* sit, quæ in Italia *Ligustrum* vocabatur: dum id ita esse, non ex sua, sed ex aliorum potius sententia pronuntiat. Certissimum quoque diuersitatis nostri *Ligustri* & *Cyprum* Antiquorum argumentum producit Porta, ab ipso experimento desumptum, nempe, inquit, *Ligustri* vulgaris folia non capillum reddunt: quare non est *Cyprus* Diosc. igitur primam difficultatem excusamus.

Altera difficultas est an *Ligustrum* nostrum sit *Alkana* & *Henne Arabum*.

Asserunt Ruell. Tragus, Marth. Lacu. Monachi, Lonic. Brunfels. Bouius, Comes à Neuenar, & Cast. Dur. ac in genere omnes ferè ij qui, nostrum *Ligustrum* cum *Cypro* Veterum idem faciunt, cum Arabes pleraque sua de *Alkana* ex Diosc. cap. de *Cypro* transcripserint. Sed hinc non sequitur nostrum *Ligustrum* esse *Alkanam* Arabum, sed verisimile tantum sit hanc & *Cyprum* Diosc. esse idem. Idcirco fallitur, quisquis ille sit, qui apud Cordum annotauit *Ligustrum* Arabicè dici *Alkana*, *Henne*: Nam ut dictum *Henne* quidem est *Cyprus*, sed non *Ligustrum* nostrum vulgare. Rectè igitur Bellon. Arabum interpretes, Quinios *Henne* seu *Alkana* falso *ligustrum* vertere notat, cum diuersa sit arbor. Quod verò idè *Henne* siue *Alkana* deferre tradit à *Cypro* aut *Ligustro* Gallicè dicto *Træfæ*, quod hinc *Henne* non deponat folia ut *Ligustrum*, nobis non probatur. Nam cum *Henne* & *Alkana* Serap. sit *Cyprus* Diosc. *Ligustrum* verò nostrum, vel ipso teste, non sit *Henne* & *Alkana*, ne *Cyprus* quidem erit, aut rectè dicetur.

Cæterum cum (ut ex Adu dicebamus) quæ *Alkanæ* nomine importantur lignæ assulæ sint lites, satis patet à nostro *Ligustro* differre, & non veræ & genuinæ sint *Alkanæ*.

Leoniceum carpit Agricola, quod *Cyprum* similem *Ligustro* fecerit, nec se eum sequi, aut ipsemet tamen idem *Ligustrum* facit & Græcis *Cyprum* dictam: ac in eo hallucinatus est, quod similitudinem nequaerit, & quod ipse cum plerique idem putarit. Melius igitur fecisset, si melius sententem secutus fuisset.

Tertia difficultas est, An *Ligustrum* nostrum sit *Philyrea*, ut voluit Massarius, Fuchf. Anguil. Gesn. Euchar. R. et alii. Dod. (qui malè non tantum *Philyream* *Ligustrum* facit, sed & eam, quæ existimatur *Philyrea*, ponit pro *Cypro*.) Sed Gesn. ex aliorum potius, quam sua sententia id dixisse videtur, Fuchf. quoque eorum fortè suæ opinioni tribuens iudicium per præ prudentem lectionem esse voluit. Aperte negant Tragus, Dod. & nos, aperti rationibus mori, quas suo loco trademus.

Baccas, sunt qui velint, dici *Vaccinarum*, de quo Vitruu. Archit. l. 7. c. 14. certò affirmari non potest. Sunt qui & *Ligustri* baccas à Virg. *Vaccinæ* vocari putent, sed male, inquit Marth. Non debuerunt, qui existimant *Ligustrum* esse *Mauritanorum* caprifolium, sed perperam. Sunt qui *Ligustrum*

Synonyma
linguae.

strum dictum velint, a ligando; quod sepius ligandis & muniendis conveniat: Alkanna & Henne omnibus ferè itis, qui Cyprum esse putant, vti dictum. Germ. Beinbölzlin / quod lignum ossis instar durum habeat: propter duritiem dicitur etiam, Hartigel, sed perperam, ut notant Tragus, & Hier. Brunch. Herdholz Taber. Aliis dicitur Mundholz / Weisholz: Reintveiden / quod salicifolium sit, & Rheno ripa copiose nascatur: Mundveiden / quod oris viceribus medeat, quamvis Fuchf. Ligustrum officinis inusitatum dicat, ut reuera est, potest tamen commodè in vsum revocari. Aut tamen Matth. sed male Officinis Alkanna dici, alii Alhanna scribunt) & scutitanis kenne, [alii Chenne scribunt] Hanne, seu Hanne. Belg. Seelener, Renteilgen / Thuenckf. qui Ligustrum inter Silésie plantas hortenses refert, ait Germ. Edelweiden dicit Gal. Troeser, Frezillon. It. Herrulcis G. strico, quod ibi etiam aliqui Oliuetta, nonnulli Oliuella, quidam Champrossene vulgò vocant: alii Callostro. A mulieribus & pueris Romæ Fior fiorello Alphab. scribit & Chrysetus dicit: Conastrello Patavinis. Hisp. Alhena, Alfena: Castil. arbor de Parayso, aut de Alhena: Portug. Alfenheyo. Bohem. Pracii Job Vngar. fagyalsa. Apud Bollenfes in ducatu Wirtemp. Schuarze Sunzbeeren vocant. Vt annotavit aliquando Solerius Delphinatibus dicitur sanguis Hanc, & Provincialibus eximier sanguage.

Oliuella

Loca

Lib. v.

Nascitur magna ex parte in locis asperis, potissimum vepribus & sepiis, frequens admodum passim Germaniæ, Galliæ, Italiæ. Ad Rhenum abundat. Lob. ait nulli calidiorum regionum hodie deesse, paulò licentiosius: non enim inveniunt in Ægypto Ligustrum Italicum, teste Alpino vti dictum: copiose provenit etiam in Diocesi Cantabrigiensi ad sepes, & propemodum in omnibus Londini viridariis. Quin & in frigidioribus regionibus in hortis colunt, quorum septis & arceis cingendis accommodata quia tonsilis, & tam floribus quam racemulis tota æstate lata. Floret Aprilis & maio, citius aut tardius pro locorum ratione. Flores tota ferè æstate durant, aliis prætereuntibus, aliis emergentibus. Septembri racemuli maturescunt, & subinde per totam ferè hyemem restant, non sine singulari utique providentia Dei, præcipuum auculatum famis refugium per seculissimas hyemes futuri. Folia ad hyemis initium durant, postea decidunt, & vere nova repascuntur.

vires &
vires.
Temperamentum
Aqua stillata
Oliuella
Inflammatio
ora. Vlcera
pudenda
rum. Anglia
pro.

Virium Ligustri meminit Galenus libro septimo simplicium medicamentorum, sic inquit. Cypri seu Ligustri folia, summaque germina in vsum veniunt, & facultatis & temperamenti maxime misti: habent enim quiddam digerens cum aquea substantia modicè calida: habentque etiam adstrictorium quiddam ex terrenâ substantia frigidas, &c.

Folia, flores & acini Ligustri vti prodidit Tragus, adstrictoriam vim habent: hodie apud nos extrinsecus ferè vsurpatur. Aqua è teneris Ligustri foliis Maio mense, aut è floribus Iunio destillata, gargarisatu exulcerationibus oris auxiliatur, neque non feruidis inflammationibus, carbunculisque & pudendorum viceribus ambustisque igni prodest collutu. Hoc enim remedio ad prædictos morbos Chirurghi per omnes vtuntur. Flosculi aceto macerati, fronti que impositi, capitis dolorem sedant. Acinis Ligustri maturis quidam rubello Vino nigrum inducunt colorem, & ut crassius euadat efficiunt, quod magis sit veniale. Solent etiam illi tam nigrum quam Ve-

Cap. dolo
rim. flos.

Chirurgi
rim.

Aqua stillata
rim.

Tom. I.

netum colorem præstare, quo nomine ab his, qui chartulas luforias, aliasue picturas colonibus variis illuminant, leguntur. Pueri bacculis inscunt decoctis in aqua, & atramenti loco scriptitant, quod & se aliquando conficere solitum testatur idem: sed pictura in coeruleum quadantenus spectat.

Aqua stillatina, & floribus Ligustri, tradente Matth. potu menses superfluos contrahit, utilis aduersus hæmorrhoidum & diarrhoeam. Eadè per se, aut cum Pompholyge in oculos instillata, ruborem eorum & lippitudines tollit. Ex floribus conficitur & oleum, quod ad inflammationes vulnerum insigne est, si calidum illinatur: idem dolenti à calore capiti benefacit. Hieme baccis vescuntur aues, præterrim Merula ac Turdi. Ex virgis flexilibus, solida tamen materie, caueæ sunt ad canoras seruandas aues, ac virgæ ad instruendos equos. Nullum repagari posse, insit idem, medicum tam inexpertum crediderim, qui non nouerit Ligustrum iis omnibus præstare viribus, quibus pollere scriptum reliquerunt Diosc. & Gal. Atqui Herbario illi [Anguillaræ] venia danda, quod in noscendis tantum plantis, non autem earum facultatibus examinandis, operantur nauarit. Hæc Matth. vti iam nobis desquariatibus quidam esse videatur, qui solus omnia inuenit, vel inuenisse somniarit. Sed quæ hæc temeritas, de re sibi incognita statuere, & alios insuper reprehendere, cum ipse potius redarguendus est quod præcipuum illam notâ Ligustri quod Cyprum existimat, non examinatis, an eius folia rufent Capillu, ut docet Diosc. Et vehementer profectò miramur qui tam audacter ausit pronuntiare de viribus Ligustri, quod ex sua perturbatione vult esse Cyprum quam nouit.

Acinos Ligustri contra Phthiriasim & Gallinarum pituitam prodesse, scribit Schuuekf. qui ea desumit ex viribus attributis Cypro: Lectores, poterunt sine periculo experiri an nostrum Ligustrum hæc præstet. Iac. du Fouloux de venat. in cura morbi canum ad dolorem aurium commendat fruticem dictum Troeser qui nihil aliud est, quam Ligustrum. Zesiriel in fulmine laudat ad Arthritidem intra median horam Oleum florum Ligustri, Veronensis dictum n Conastrello factum ad Solem, aut in Balneo Mariæ, calidè applicatum. Frutex, vti dicebamus, aptissimus est sepiementis, propter lenta & flexibilia vimina, ex quibus reticulato plexu Garyophyllei flores in vasis circumsepuntur à nonnullis, non sine elegantia. Sic & ad copiaras scenas expetitur à nonnullis, quas non ineleganter conuehit. Foliorum succum quidam celebrant ad oris vlcera & inflammationes. Nec vires à Matth. traditas negamus, sed ab eo potius effictas rationabiliter, & aliunde mutatas censemus, quam experimento cognitæ. Ex gustu facile quicquid vel mediocriter versatus vnicuique plantæ vires probabiliter assignare possit. At pro veris & compertis proderent non item.

Tandè minùs reprehendendi
ir, qui id non faciunt, nec
facere volunt, nec
debent.

Diarrhoea.
Lippitudo
Oleum florum
Ligustri
dolor cap.
Animum
Ad canas
autem
pa ad domandus
quos.

Anguilla

Phthiriasis
& pituita
Gallinarum
Dolor aurium
canis.

**Description.**

Index

Search

Feb.

Notes

Superior
Court.

Diese Ver-
zest. & it-
dust.

Cyrus A.
Lynch, Jr.

Ligustrum

Legend:

Liguſtri: Ægyptiaci, à ſe propoſiti racemos nobis dono dedit Alpinus: cuius bæccę multũ numeroſiſſimę, noſtratis Liguſtri bæccis terẽ pæſes, magni ſcſſiles, coloris cinerei ſerẽ, [in ſiccã] quatuor decuſſatas, impreſſiones oſtẽtantes, ſemine referta copioſiſſimo, minuto, Melo-chiæ, & figura anguloſa, &

magnitudine equali, coloris rufi, saporis strenue
adstringentis, idque citra omnem morſum. *Folia*
admiſta Liguſtri noſtratis ſatis ſimilia, ſed minus
lata & candidiora, ſapore acidulo ſubadſtringēte.
Flores autore Alpino, coloris cinericei, non albi,
ſambuci floribus proximi, minores tamen; odor
admodum acutus, & Liguſtri odore ſuavior. *Flores*
Rauwolfiæ ex luteo pallidi ſunt, odoris ſuauiſ
Moſchi: conſimiles floribus baccilli: tota hye
me viret: ſemen ei pulchellum, ſpadiceum, pira
midale, trigonum eleganter exprimens, baſi iſa
æquali, vt iurrectum latrunculi inſtar ſtet.

Hanc veram Diosc. Cyprum censemus, quo tradente, *Ki-ner* arbor est foliis circum virgulta Oleæ similibus, sed lanioribus, mollioribus & viridioribus: floribus candidis, muscosis, odoratis: semine nigro, sambuci fructui simili. Optima nascitur in Ascalone & Canopo. Idem Phylitream tradit esse arborem similem Cypro. Pro muscosis floribus *βρωμιά* habent vulgata exemplaria: Oribasius accommodatius videtur legisse *βρωμιά*, id est racemosos: sunt enim in racemi speciem digesti. Vetus utraque voce caret, & simpliciter *βρωμιά* dicit *βρωμιά*.

Cyprum *Aegyptium* describit Plin. his verbis: *Cyprus in Aegypto est arbor ziziphi folijs, semine Coriandri, flore candido odorato. Coquitur hic in Oleo, premiturque postea, quod Cyprus [Cyprum Dal.] vocatur. Pretium ei in libras quinque. Oprimum habetur e Canopica in ripis Nili nota. Secundum Ascalone Iudae. Tertium Cypro insula odoris suauitate. [prezippum Dal.] Quidam hanc esse dicunt arborem, quae in Italia Ligustrum vocatur. Item alibi. Ligustrum eadem arbor est, quae in Oriente Cypros. Monet tamen Corn. in vetusto Plin. exemplari legi: Ligustrum si eadem arbor &c.*

Huic ex Virgil. competere videtur : *Alba*
Liguſtra cadunt dec : Et Ouid. 13. Metam.

Candido fultoniensis Galathea ligata.

Ut quod florū Virg. folijs Ovidius tribuat, quæ
candiant in hac non in præcedenti: quamvis
Virgilium de præcedenti locum esse, nihil vetat,
ut qui in Italia vixerit vhrilla, non in Egypto

vbi hæc nascitur.

Hinc etiam competere censemus omnia illa nomina Arabita, à plerisque præcedenti attributa. Apud Serap. Hære, id est *Algarum*, cuius flos similis est floribus Myrti, sed racematim digestus, albus, & nonnihil ad glauccedinem declinans, odoris æduti. Hæc ex Isaacii testimonio. Cirat. & Diosc. eiusque superscripta verba.

Cyprus Hebraeis *Cypher*, Cantic. i. ut Gesius
 interpres reddidit. Hanc etiam intellexisse vide-
 tur Hieron. in Cant. Cant. hom. i. his verbis
 Borrus Cyperi [Cypri] fraterculus meus mihi in
 vineis Engaddi. [ἑταῖρος τῶν κίπων]. Quantum au-
 tem ad literæ explicationem, habet aliquid am-
 biguum: quia & vva florens *Cyperus* [Cyprus]
 appellatur, & species quædam exornatus vir-
 gulei est quæ *Cyperus* (Cyprus) dicitur, ferens
 etiam ipsa floridum quendam fructum, in modum
 florentis Vvæ prolatum. Sed videtur magis ad fru-
 ctum Viris respicere sermo, quandoquidem Vi-
 nearum Engaddi facta est memoria: &c: Hanc
 igitur cognitam habuisse quidem, sed non eam,
 verum ipsam Vitum in Canticis intelligi voluisse
 Hieronymum satis apertum esse arbitramur.

P. Berchorius in reductorio, Cyprum seu Cyperum, vtrunque legi tradit Cyprum esse arborem similem Oliuæ in folijs, quæ secundum Hieronymum & Plin. suauissimi est odoris cuius semen si cum oleo coctum fuerit &c: Sed Berchorius videtur ignorasse discrimen inter Cyperum arborem & Cyperum herbam, cuius radix quoque suauissimi odoris: quapropter confundit has duas plantas. Cyperus etiam ab Hieron. scriptus videtur, ut notauimus. Idem ibidem rectè: Cyprus inquit, cum Nardo, Nardus & Crocus, Nigella & Cinnamonum cum Vniuersis lignis Libani. Et Ioseph. historicus Lib. 4. οὐκ ἔστιν ἄλλοτερον τὸ δι' ὁποῦ ἀλλοθεν ἢ δι' Ἱερουσαλὴμ τὸ ἀπὸ παλαιῆς καὶ νέας ἰσχυροῦς ἀλάτος & subdit esse σπινθὴρ ἀλάτος καλλίστη. Videas Cyprum apud Veteres in magno pretio fuisse.

Thcophr. ~~num~~ dicitur vnguentum ipsius
quod & Cyprinum vocatur, ~~καὶ τὸ αὐτὸ καὶ~~ Cy-
pro.. Sed an ab hac, an alia quadam herba Cypr-
dictâ, vt magna securitate asserit Lonic. non
ausimus statuere.

Placet iudicium Constantini, *zuvor*, in qua
arbor Ægypti affimilis ei quam Ligustrum vocat
Italia : quam quidam etiam cum Ligustro cand
esse contendere Plin. temporibus : sic ut ferè is
terpretes omnes eandem Ligustrum reddant
cùm diversæ sint, ut rectè cenet Mallarius.

Marcell. apud Diosc. legit cyprum, Roman
Ligustrum dicunt: cuius lectionis nullam nec
nè nec auctoritatem addit. Videtur Plin. lectione
rus id fecisse. Quod si ita est, abutitur sanè eius au
toritate, qui ne ipse quidè id ex sua sententia le
aliorum pronuntiare sic ausus, quamvis id ali
loco id fecisse quibusdam videatur: aliis ex vero
ri lectione, aliter. Sed Dioscoridi addere ex Pl
nio, tanquam genuina, nobis non videtur in
grum, neque consultum. Equis scit, quid ill
sit, quod olim Romani Ligustrum appellatum
Enimverò sanè cum Italica planta sit Ligustru
vulgare atque adèd Romæ cognita, cyprus n
quaquam, illam Romanum Ligustrum esse ve
similius, quàm hæc.

Sed à Diosc. & Plin. sententia preceedit. Bellon. fructum solummodo dicent, non arborem. Sic autem scribit de ea, ac seipsum declarat. In Egyptu invenimus parvum fructicem, nominatum *Hemau dienne*, quem refecant & colunt diligenter.

Larini interpretes Arabes dixerunt Gallorum *Troesne* Latine dictum *Ligustrum*, sed id falsum est, quia arbor *Troesne* differt ab ea. Hanc provenit ad altitudinem Mali Granati verum sectus, profert tantum tenues virgas, ut *Salix*. Magnus eius est reditus in *Agypto* [ut dicitur in viribus] propter tincturam. Item alibi: Arbor *Henne*, nascens in *Agypto* alio nomine *Alcanna*, in hoc differt a *Cypro* aut *Ligustro*, quod Galli *Troesne* nominant: huic enim folia decidunt: *Henne* vero retinet. *Heracle*. Ergo cum *Henne* differat a *Ligustro* vulgari, ut testatur *Bellon.* patet quoque non esse *Cyprum*, cum *Henne* & *Alcanna* apud *Serap.* nihil aliud sit quam *Cyprus* *Diosc.* cuius verba recitat.

Alpin. sequens depravatam Interpretum versionem, ait esse *Diosc.* *Ligustrum*: & addit esse *Alcanna* *Ausc.* *Cyprum* *Plinio*, *Aegyptijs* *Elhanne* ac *Tamarchendi*. *Bellon.* & *Alpini* sententia non approbat quoque *Rauwolf.* additque *Græcis* cum nuni vocabulo *Schenna* dici: ex huius radice Arabes utere *Spodium*, ut etiam meminit *Auc.* c. 17. Melius convenire *Cypro* *Diosc.* de qua *Salom.* in cantico, quam nostras *Ligustrum*. *Figura* suæ titulum fecit, *Cyprus* *Græcis*.

Amatus & *Lacuna* hanc cum *Ligustro* confundunt. Denique falluntur omnes, qui vel *Plin.* non intellecta mente, vel vulgata eius lectione, vel sua decepti opinione censent esse *Ligustrum* nostras, quos in superiori cap. sufficienter refutauimus.

Annotat *Dod.* à *Turcis* vocari *Henne*: cur vero in eius historia pro *Cypro* ponantur duæ icones *Phillyrea* nescimus, nisi *Cyprum* *Phillyrea* putarit, quorundam Recentiorum errorem secutus, qui *Ligustrum* *Italo*rum & nostras, ac ipsius etiam fortasse *Plinij* cum *Diosc.* *Phillyrea* unum & idem esse existimant. *Cyprus* *Græcorum* *Hist.* *Lugd.* quæ præter sententiam *Alpini* atque figuram quam habet ex *Rauwolfio* in descriptione sua dicit flores duobus digitis longiores.

Ligustrum, huc *Cyprus* *Diosc.* *Portæ*: quod è *Turcia* nobis adfertur, vulgò *Uchena* dictum, cuius folia contrita, cræcca huc ruffa ruffum capillum reddunt, ut idem inquit, non autem vulgare *Ligustrum* *Marth.* Videat etiam *Lector* quæ cap. præced. notauimus de *Alkana* assulis.

Iam ex *Diosc.* dictum optimam *Cyprum* nasci in canope & *Ascalone*. *Plinio* *Cyprus* in *Agypto* nascitur. *Bellonio* *Alkana* *Aegypti* incolæ est, ubi omnibus notissimam testatur *Alpinus*. Speciatim refert *Rauwolf.* *Tripoli* & *portis* in *Cairo* provenire. Eam *Turcas* & *Mauritanos* propter gratum & suavem odorem *Moscho* similem, quæ flores exhalant, diligenter in vasis custodire, & hieme, ne frigore pereat, in cubiculis & subterraneis locis servare. Et quia tardè nova folia protrudat, nempe *Augusto*, quosdam irrigare aqua sapone infecta; alios radici calidè ad nocere, ut citius floreat. Ad nos multi bacilli adferuntur. Pulvis viridis in instructionibus libetur officinis saccis plenis ex *Agypto* & *Africa* delatis. Onustæ naues devehuntur per *Turciam*, eodem teste. Eiusdem pulverem subtilissimum habemus munere *Valerandi Dourez*, cum inscriptione, *Henne* *Bellon.* Est is ex fusco flavescent. Verum cum semine nobis misit *D. Paladus* non nunc. Pulchello stracemulos intermixtos, nostra peregrina servamus à *Ch. Alpino* nunc horti *Patauni* præfecto dignissimè accepta.

Cypri folia, ex *Diosc.* astrictoria vim habent: quare oris vlcera commanducata medentur, & illa tum feruidis alijs infusa nationibus, tum etiam

carbunculis profunt. Eorundem decoctura igni ambustis applicatur. Ruffant & capillos trita, & illita folia, huc in *Struthii* succo maduerint. Flos ex aceto tritus & fronti inductus capitis dolores sedat. Ceterum quod ex eo preparatur *Cyprinum* vnguentum, odoratum est, ac nervos exaltat & mollit: siquidem feruenti natura præditorum medicamentorum misturam recipit. *Plin.* *Cyprinum* oleum vocat, quo autore, exaltat, mollit nervos. Folia stomacho illinuntur: & vulgè conserunt, [singinem emittenti vel procidenti] succus quoque eorum apponitur, Folia recentia commanducata, vlcibus in capite manantibus, item oris, medentur, & collectionibus, condylo natis: Decoctum foliorum ambustis & luxatis prodigit. Ipsa ruffant capillum rufa, adiecto *Struthii* mali succo. [Fallitur *Plin.* & vocis homonymia: *Struthii* & habet. *Diosc.* De *Struthii* herbe seu *Lanaria* succo, non *Struthii* Mali intelligendum.] Flos capitis dolores sedat cum aceto illitus. Idem combullus in crudi olla nomas sanat, & putrescentia vlcera per se & cum melle. Olor doris olet, qui somnum facit. Succus *Ligustri*, seu *Cypri* eodem teste nervis, articulis, algoribus; folia ubique [utique ver.] veteri vlceri cum salis mica, & oris exulcerationi profunt. Acini contra *Phthiriasin*, item contra intertrigines, foliaque sanant & gallinæ eorum puitas acini. *Cypri* arboris folia, inquit *Gal.* summaque germina in usum veniunt, & facultatis sunt ac qualitatis maxime mixtæ: habent enim quiddam digerens cum aquea substantia, modicè calida: habentque etiam astrictorium quiddam ex terrena substantia frigida. Itaque eorum decocto quidam ambusta fouent. Utuntur vero etiam aduersus igneas phlegmonas & carbunculos. Nam absque molestia & morbo desiccant. Quinetiam spontè prouenientibus in ore vlcibus, aphthodesi, & ipsi puerorum aphthis comensa accommodata sunt. *Paulus* in viribus hoc amplius quam *Diosc.* *Cypro* tribuit, ut aptè remediis his miscatur, quæ ad lienem consueuntur: quod demixtur aliquis, inquit *Marcell.* nisi quia mollit *Ligustrinum* vnguentum, duratio *Lieni* idè accommodatum sit. Nec mirabitur, qui, ut dicebamus ex *Plin.* aduertet, calida quoque medicamenta recipere, quæ utique vim habent aperiendi & discutendi, præter vim remollientem, quam habet. *Serap.* præterea quæ *Diosc.* & *Gal.* habet, addit, in muliebribus affectibus idem præstare, quod sanguis draconis. *Cypri* florem *Plutarchus* putat collis intorquendum, quod placidum suauemque somnum potioribus accersat, quippe qui lenem auram & mitem expiret, quæ temulentorum salubrosas asperitudines sensim leuiget, ita ut conciliata tranquillitate hebes crapula retundatur, & caloris officio percoquatur. Folia madentia & igne discutiunt (ut ait *Celsus*) ea, quæ in aliqua corporis parte inhaerent. Vnguentum è *Ligustro* *Alexandro* magno misit *Abdelonymus Sicyonius*, ut scribit *Pollux*. *Auc.* tradit, quod si quis hominem tinxerit *Ligustro* quod producit florem album, *Alchannam* vocat ipse, cum misturam urinam nigram: Sed durum est credere, id euenire ex illitione externa, nec apud vllum aliam id legimus. Certum quidem est, apud *Turcas* admodum consuetum esse illitionem ex eo. Attamen de ea re nihil hactenus accepimus: nec verisimile est. Magni porro *Aegyptijs* (ut scribit *Bellon.*) ex *Cypro* reditus: folia enim resiccata in pulverem redigunt ad tincturas flauas. Ex eo in *Turcico* imperio censetur 3000 ducatorum superat. Quam luxè iam patet *Turcia*, consuetum feminis hoc

Oris vlcera. Inflam-
mationes.
Ambusta
Capillis: ut
vinctura
Cyprinum
Vnguentum

Serap. ut
dixerit.

Luxata

Plin. error.
Cap. dolor
Noma. vlc.
Cera putres-
da.

Contra ph-
thiriasin.

Tépream.

Ambusta.
Inflam-
mationes.
Carbonis.
Oris vlcera.
Aphthæ.

Lien.

Noma.

Auc. ut
Magni
Turci
Cypr.

Quæ diffi-
vat Henne a
Ligustro.

Alpin. ut.
Alcanna.
Ausc. Cy-
prus vlc.

Elhane.
Tamarchen-
di
Schenna.

Amatus.
Lacuna. ut.

Henne.
Dal. repræ-

Non est.
Phillyrea.

Marth. ut.
Locust.

Tempus.
Colpus.

Vires
fuit.

meminisse videtur, & *Garlobastaden* appellare: nam parum à *Rosæ montanæ* frutice differre asserit. Huius folia satis ad illam accedunt. Hæc Clus.

Taber. *Virum Idæam* 3. vocat, & *Heydelbeer*: Sed compilator eius iconem & descriptionem Clus. proponit, nulla eius facta mentione: flores appingi curauit, quos nec describit, nec Clus. vidisse fatetur.

Gerardus Anglus figuram Compilatoris habet: ac *Vaccinia Pannonica*, siue *Vitum Idæa* appellat.

VITIS IDÆA ANGVLOSA.

CAP. VI.



Vitis Idæa angulosa virgultis fruticat plerumque pedatibus, interdum cubitalibus, satis crebris, virentibus, angulosis & frætu cœmucib⁹, in multos ramulos diuisis: in quib⁹ folia crebra, tenera: virentia, caduca, vnciam circiter lōga, plusquam semunciam lata, acuminata, glabra, per ambitum argutis denticellis cre-

ata, sapore partim acido, potissimū primū emet genis, partim austero. Flores in singulis hæret, inter folia, bullati siue vtreolum referentes, colore ex albo punicante, stylo croceo. Succedunt baccæ, singulares quoque, luniperinis ferè pares, per maturitatem violaceæ potius quam nigre, vmbilicata, sapore grato & acido primū degustatæ, quæ tamè paulo post nescio quid nauseabundi in ore relinquunt, purpureo violacea, satiq; pestinacitinctura: cui grana immerguntur multa, parua, rubentia. Radix tū recta, tū obliqua quaquauerſu agitur, è supina etiam parte stolones emittens.

Hanc perperā quosdam Myrtum existimasse ex his Cordi liquet verbis, quando ait: Myrtus non est exiguus ille fruticulus, quem Germ. *Heidelstrauch*, (al. *Heidel* vel *Heidelsiaud*;) & cuius baccas *Heidelbeer* appellant, vt hætenus falsò à plerisque creditur etiam *Straudelbeeren*. Plerisque hodie Myrtilli Latine dicuntur.

Quidam etiam fructus eius *Vaccinia nigra* appellant, autoritate Virgilii. Sed insulsi homines videntur, inquit Tragus: nam Virg. da flore loquitur, Hyacinthum cum intelligens cuius Diosc. l. 4. historiā proponens, Romanis testatur *Vaccinium* dici. Huius alterum genus *Ropbeeren*, *Drumpelbeeren*, & *Bruchbeeren* dicitur. Myrtillos Auerrhoes lingua sua Arabica vocat *Her*.

Non placet figura Tragi, in qua folia non serrata. Nec quod scribit foliis vestiri solidis, Buxi per omnia similibus, sed tenerioribus. Quid si non distinguat *Vitum Idæam* fructu rubro, folio semper virente ab hac: eius enim non meminit, licet sepius cum hac progeniat.

Quoniam verò Germani & Boheimi legitima

Myrto se carere perspicerent, aliam in siluis nascentem sibi compararunt pharmacopola, eamque Myrtillum vocauere, nempe hanc plantam, vt annotat Matth. Quod verò idem de hac planta scribit, folijs virere Buxo ferè similibus, sed tenuioribus, Myrti minoribus, robustis, non placet. Considerent quæso herbarum studiosi: quænam sit his cum Buxo similitudo, quodque robur in folijs. Suspiciamur Matth. minus versatum in Myrtillorum differentiis, pauciores probè nouisse. In Epit. *χαρακτηρισμὸς* l. Myrtilli: Ananienibus *Calanxas* Dodon. *Conspues* in quibusdam Gallia locis: Brabantis *Craefebesien* / *pestelbesien* & *Bamerbesien* / qui ait posse dici Latine *Vaccinia*, non tamen Virgilij: melius tamen conuenire nomen *Vacciniorum*, quàm *Myrtillorum*, vt quidam appellant.

Videntur autem *Vaccinia* dicta à baccis, quales *Baccinia*.

Quicquid sit, *Vaccinia* hæc nostra dici possunt, & cum *Vaccinijs* Plin. ac *Vitruuij* (de quibus suo loco) in eo conueniunt, quod vestes telesque lineæ tingi purpureo colore his queant. Cum Theoph. autem ac Plin. *Vitis Idæa* descriptione haud quaquam conuenire satis manifestū: humilis enim est frutex, vix cubitum altus, paucis, breuib⁹, & nequaquam cubitalibus ramulis; haud racemos, vt Plin. ait, nec vuarum acinorū similes fructus, sed veluti *Taxi* baccas, profert, non dulces, sed subacidas & adstringentes; in quibus quoque non *μαλακία* 7. molle, sed multa exigua, cœndida, plera semina: folium non rotundum, sed rotundo longius. Iam & credibile est hunc in Italia, Græcia, ac minore Asia non reperiri, cum Germaniæ proprium Matth. asserere videatur: tantū abest vt *Vitis Idæa* aut *Alexandrina* dici haberetur queat. Potrò non placet Dod. icon quam in hist. Gallica proponit, nec illa quam in Latina, quamuis priore melior videatur: in eo tamen peccatum quòd ad recta picta, in speciem arboris, nec foliorum serraturas expresserit.

Arrelle du Choul non est ea stirps quam Dod. pro *Vaccinijs* nigris exhibet, vt ipse putat, sed ea de qua proximè egimus.

Ceterū *Vitum Idæam*, *Heidelbeer* vulgò dictam, esse à se primū obseruatā gloriatur Gesn. & viros aliquot eruditos consentientes inuenisse. Aduersari quendam de re herbaria bene meritum, & *Vitem Idæam* interpretari illam quæ *Pastillas Corinthiacas* vulgò dictas ferat. Se verò nobilissimum illud vix passæ genus non in Ida, nec aliis præaltis niuosisque montibus nasci putare: sed vel in planicie collibus apricis, magna hominū cura.

Idem de collectione stirpium *Vitum Idæam* Theoph. esse in eiusdem descriptione se interpretari ait: quæ tamen opinio paulò antè refutata per Dodod. Item in Catal. plant. *Dryophorum*, Offic. nemoralis *Myrtus*: *δρυοφύλλον*: *Cuscuta*. *Myrtus* offic. Rff.

Lonicerus qui pleraque sua Botanica ex Trago consarcinauit, eundem de Myrtillis tradentem parum diligenter legisse videtur, quando ait, posse statui duplicem differētiā, magnā & paruā, ambas tamen eiusdem esse figuræ: nam aperte Tragus docet, maiorem & minorem figurā differre. *μαλακία* 7. *Idæa*, (vt annotat Rob. Const. ad Theoph. & in Lex.) Galeno *ἀγρίος* inquit planta est, id est, *Vua* vrsina, in Apennino adhuc vocatur *Vigna dell' orso*, quam vult esse *Vitum Idæam* Theoph. *Anguillara*: Vulgò *Arrels*, alijs *Arrelles*, it. *Vua dolce*, apud Northmannos *an* copiosius prouenit, præsertim in Bellocasiorum agro ubi videntur

Descriptio.

Folia.

Floris.

Bacca.

Grana.

Myrtilli.

Non Annot. Tragi.

Marth.

Chama-myrtus.

Vaccinia Myrtilli.

Baccinia.

Nam est Ph. vit. Idæa Theoph. aut Alexandrina Plin.

Dod. me.

Pastilla Corinth.

Vitis Idæa Theoph.

Dryoph. nemoralis Myrtus offic. Rff.

Annot. me.

cant *Mourets*. Sed si Const. intelligit nostram Vitim Idæam angulosam, ut suspicamur, dubii adhuc sumus an sit *Vigna del Orso* Anguil. siue Vua Vrsina Gal. quia tribuitur ei fructus ruber, qui in hac purpureo violaceus & multis niger dicitur.

Vua Vrsina
differt a
Vua Idæa
Myrtilli
Germania.

Quod nonnulli vnam vrsi Gal. à Theoph. Vite Idæa non differre putent, falluntur Clusi iudicio, cui Vitis Idæa nihil aliud esse videtur, quam Myrtillus Offic. Germaniæ. Idem in Pan. tradit Vitim Idæam Theoph. rei herbariæ peritis esse Myrtillum Germ. vulgarem baccis nigris.

Et Aduers. Herbariorum Vaccinia nigra & rubra sunt Myrtilli Offic. An Idæa radix. Maturitatem (inquiunt) affecuta baccæ nigra vineo succo turgent, prædulci gustu: flores Ericæ aut Vnedonis, minores, pallentes, radix lignosa multa edit virgulta pede altiora. Folia effigie Myrti aut Rusci rotundiora, molliora, sed hieme decidua.

Vaccinia.

Lob. Obs. Vaccinia nigra & rubra, Idæa Vitis Theoph. Dalech. Clus. Myrtillus Offic. Germ. & myrtus montana: Vua Vrsi Anguil. Gal. *Aurelle Aircelle*. It *Vua Orsa*. At figura Lob. non placet, quia nullas foliorum serraturas ostendit, quarum nec in descriptione meminit: non placet etiam comparatio foliorum cum Myrti & Rusci: nec quoddas plantas velit vna eademque illa figura complecti, licet neutra conueniat. De Vua Vrsi Anguil. paulò post.

Vua Idæa
Myrtus
montana.

Aduers.
Lob. not.

Bacula.
Cibus.
Cafalp. not.

Audiamus Cafalp. *Bacula* (inquit) vulgò in Alpibus quasi bacculæ, fructus dulces, subacidi, paruis vuis similes, in maturitate nigri quos esitant Alpini: fert eos paruus frutex dodrantali altitudine, ramulis virentibus & striatis, foliolis in rotunditate oblongis, leuiter serratis, sine pediculo annexis alternatim: flosculis radiantibus, concavis ut Arbuti, qui summis fructibus insident. Alterum genus &c: Videntur hi fructices quasi humiles Meipili. *Hec ille*. Quæ tota descriptio satis conuenit cum nostra Vite Idæa angulosa, si excipias quod ait, Vuis similes, & quod videantur quasi humiles Meipili. Nos sanè considerata eius descriptione ac etiam ipsa planta nihil videmus quod respondeat cum Meipilo, cuius folia sunt hirsuta, longa, ramis nec virentes nec striati, sed rotundi: flores ex foliolis constant: fructus in totum diuersus, figura, colore, substantia, & sapore. Quid verò sibi velit cum flosculis radicanibus, in hac planta non apparet, nisi fortè legendum sit candicantibus.

H. Lug. not.

Vitis Idæa
minor.

Chamæp.
fin.
Myrtus
carroffris
feu Pumila.

Hist. Lugd. in ea est opinione, esse Vitim Idæam Theoph. & Vitim Alexandrinam circa Phalacrum Plin. In Auernia montibus (vbi provenit) dici *Arcelles*, Italis *Vua del' orso*: Germ. *Schnee Beer*: Vnam Vrsi Anguil. vocare: Dod. Vaccinia nigra & *Cassina*. Ab hac Idæa Vite differt à Lob. pictam Myrtum Germ. foliorum incisuris, de qua tradat Matth. in Germ. & Bohem pharmacopoeis Myrtillum dici. Sed frustra Hist. Lugd. duas facit plantas, cum duæ sint figuræ vnius plantæ, quarum prior deterior.

Locus.

Vitis Idæa minor passim in Hærcynia Saxothuringica, Thal. An Camer. in hort. Vitis Idæa nigra passim in siluis. Item paulò post: Vaccinia nigra. Dodonæi Vaccinium nigrum. *Lat. anapardyn* Peuc. Myrtus terrestris seu Pumila: *Blauwe Heidelbeer / Standelbeer / Rosbeer* Schuuenckf. Vitis Idæa siue Myrtillus, Tab. Angl. *Blacke Whortles or Whortle Berries* / Gerar. Myrtilli & Vua Vrsi Anguil. C. Bauh.

Nascitur tam in alpibus quam in vastis desertis, viginolis & tenebrosis vallibus aliisque humectis locis Germaniæ, Galliæ, Angliæ, Seuenæ inaccessis,

alpibus Tridentinis, monte Fractò iuxta Lucernam Helueticorum, in sylua Hærcynia, testibus Trago, Gesn. & Lob. In Helueticis alpibus & syluosis non paucis locis obseruauimus, Item Aisariæ, Burgundiæ, Sabaudia: speciatim in Burgundia propè Castellum *Mesibe* vbi fructu vescuntur & *Beulter* vocant: Item in cacumine montis *R. Berg* prope Melocomium: circa Befordiam, in monte *Kallon* Lotharingiæ vicino.

Beulter.

Fructus Augusto maturos legimus. Eodem Tempore Richenvillâ proficiscentes ad *Madinas à S. Maria* cognominatas, multos pueros atque puellas obuantes plenosque calathos ad cibum referentes offendimus. Floret Maio. Fructus interdum etiam Iulio maturos edit.

Tempus

Baccis terream & frigidam inesse substantiam ait Tragus, quare cibo quam medicinz accomodatior esse. At nobis medicinz quam cibo aptiores videntur: si vera tradit Matthiol. fructus refrigerare, exsiccare, roborare, reprimere, cohibere, quæ omnes facultates medicamenti potius sunt, quam alimenti. Dari baccas cum recentes, tum quoque siccas deuorandas Dysentericis & Coliacis. Has igitur Germanis vna cum Vniuersa planta haud inefficaciter Myrti vicem præstare idem censeat. Cui hac in parte non assentimur: Myrti fructus aromatici sunt: hi minime. Præterea nostro iudicio Matth. perperam tribuit Myrti vires Vitis Idææ angulosæ, licet ei valde sint similes. Quare Dod. & Camer. potius subscribimus, quorum sententiâ si crudè edantur baccæ ventriculum debilem & frigidum offendunt & aluum perturbant sua frigiditate, tantum abest, ut aluum adstringant, aut fluentem reprimant: quod succus illorum excoctus donec crassescat (*Rob* vocant) addito melle & saccharo, ut cõseruetur, haudquaquam efficit. Ideo ab aliquibus parari solet ad hæc mala siue ex ipsorum esu, siue aliunde contracta. Cæterum eodem Dod. tradente Vaccinia hæc facultate secundo ordine, eoque satis intenso frigida sunt, & vna cum manifesta adstrictione resiccant. Ventriculo æstuant conueniunt: sitim sedant: ardentium febrium calores mitigant: aluum reprimunt: vomitum sistunt: dysenteriam ex flaua bile natam curant: aduersus cholera morbum profunt. Sed ad hos vsus *Rob* seu succus cum saccharo vel melle inspissatus ipsis baccis longè præferendus, ob rationes dictas. Pueris tamen qui omnia deglutunt, itemque auiculis & mulieribus ob dulcedinem & suauitatem cibo gratissimæ sunt. Paupercula quoque plebs, ut annotat Schuuenckf. in Silesia ex baccis pulres cū farina coquit, haud imitatas, ut ille ait: sapidiore, hercle, existimaremus absque farina, & in simplicem sapam, vel per se integras coctas, more cerasiorum. Sed ut magis nutriantur, ideo farinam addere putamus.

vires & vsus.

Tragus re. pr. b. Tèperam. Dysenteria.

Matth. not.

Temperam. Ventriculo ardet.

Cibus Pauperum.

Lonicerus huic plantæ multas vires adscribit, parum rationi consonas, & fortè in eius cerebello natas. Folia & fructus in vino temperatos & epotos vrinam ciere, ac menses pellere calculum vesicæ: quas vires quæ ratione rei adstringentis adeoque frigida & terrea (vix ipsemet fateatur) tribuat, ipse viderit. Item tradit confectum ad effusionem bilis & dolorem capitis, quod partim adstringendo & cohibendo bilem, partim calores & vapores reprimendo præstare posse rationabilius. Foliorum succus in ore retentus aphthas mitigat. Sed quæ consilio idem ait eundem succum mixtum cum lacte, & auribus illitum in ambitu, omnia eorum vitia tollere, atque adeò visum acuiere, iudicent docti. Succus cum saccharo epotus sputo sanguinis resistit, & generationi calculi in renibus: sic enim

Vrinam cit. Menses Calculum. Lonic. not. Bilis effuso. Males cap.

Aphtha.

Sanguinis sputum.

*Calculus.
Pulver.
Cura pu-
eril.
Tumores
pudendo-
rum.*

eius verba explicamus, quibus ait conferre ad cal-
culum tenum. Radicis pulvis vulneribus inspet-
tus, carnis excrescentiam & putrilaginem cohibet
& adimit, & efficaciter cicatricem promouet. Ad
pudendorum tumores in emplastrum cum oleo
ros. concinnata folia eos tollunt absque noxa. Ra-
dix cum Aniso & Fœniculo pari doli puluerisata,
addito saccharo, & ieiuno quantum cochlear ca-
piat sumpta, certo remedio est flatibus & colicis
doloribus, inquit ille: in quo sanè circumforaneo
empirico similior videtur, quàm rationali Medico:
Nam rem terrestrem, frigidam, & adstringen-
tem, cum calidis, & discutientibus commiscet: qua
vi flatus carminare, & colicos cruciatus putat
compescere id, quod temperamenti sui ratione
nihil minùs præstare, forte etiam citius causare
possit? Abeat ad Scholas, ad Scholas, immò ipsam
potius rei naturam, optimam & fidissimam medi-
corum scholam, & melius discat, rerum tempera-
turas in vsus dispensare, vulgoque credulo vanis
suis pollicitationibus imponere.

Scribit Marth. Germanos Pharmacopœos bac-
cis passim vti Myrti baccarum vice, cum iis desti-
tuantur: quinetiam æstate edi fragorum vice à
Pastoribus & aliis, quod gustui placeant. Peculiariter
autem iis vtuntur Infectores ad Inficienda lin-
teamina & chartam cœruleo colore, ac etiam à
Pictoribus. Succus cum alumine & Gallâ coctus
eleganti cœruleo tingit chartas. Lintheamina eo-
dem colore ita tinges. Ollæ huius succi plenæ
affundes poculum aceti vini, aluminis puluerisari
unc. j. squamæ æris itidem in puluerem redactæ
drach. ij. bulliant vna: tum retenti decocto im-
merge linthea: siccetur in aëre, demum frigida a-
qua laua, & pereleganti cœruleo tinctum habe-
bis. Si dilutius uelis, omitte squammam æris: si
saturatius, etiam plus ad des. Sic docet Lonicorus.

*Carnes
Tingendi
modis*

VITIS IDÆA SEMPER VIRENS, FRUCTU RUBRO.

CAP. VII.

Descriptio.

Folia.

Flora.

Bacca.



R Amis hæc
fruticat
dodrantalibus,
rotundis, non
angulosis, quos
veltiunt folia
satis frequētia,
crassiora quàm
Vitis Idææ an-
gulolæ aut ma-
gnæ, oblonga,
utodò per ex-
tremum rotun-
da, modò leui-
ter acuminata,
non serrata, in
quibus nerui
subtus potissi-
mum apparent,
gustu astringē-
te & amari-
cante. Flores ra-
cematim co-

hærent in virgularum extremis Lilij conuallium
floribus similes, albi, interdum blandè rubentes:
quibus delapsis baccae similiter racemose suc-
crescunt, sex, plùs minùs, racemulo vno, Pisi mino-
ris magnitudine, ex albo luteo-ue rubentes, sapore

acido, valdè iucundo, carne simili Vacciniis palu-
stribus, cui immersa grana paruula lutea. Radix
obliqua ferè, tenuibus capillamentis fibrata.

De hac, ni fallimur, scribit Camer. Epit. Matth.
his verbis: Vitis Idæa rubra, nonnullis Rhus mi-
nimus Plin. Germ. Bot. Heidelbeer, Steinbeerling,
Bronabeer: Gal. Anreles rouges. Suffrutex est exi-
guus, foliis Buxi, interdum leuissimè ceu seratis
marginibus, Rosculis Arbuti, candidis, confertis,
ex quibus Baccae rubentes in summitate, ceu coro-
na quadam, denticularæ nascuntur, sapore acidæ
& astringentes. Radix tenuis serpit.

Anguil. Epist. 5. Vna vrsi Galeno dicta l. 7. de
comp. loc. c. 4. Arctostaphylos hodierna die in
Appennino vocatur adhuc igna del' orf. Hanc idè
à Theoph. appellatam Vitim Idæam censet. Inue-
niri ait in omnibus Italiz montibus, vbi niues. Ga-
leni verba cap. sequentibus trademus. Hanc autè
potius suspicamus ab Anguil. dici vnam vrsi,
quàm præcedentem, conferendo eam cum Gal.
descriptione.

Gesn. scribit Vitis Idææ speciem esse, acinis ru-
bris Coldenbergio, Vaccinia rubra: pingi à Dod-
bis, altera iconè meliore: acinos acidiores esse,
sine umbilico. At nos apud Dod. vnicam tantùm
huius Vitis Idææ iconem inuenimus, quæ pla-
cet: nobis etiam gratiores videntur baccae: Prior
apud Dod. quæ duplicet est Vitis Idææ angulolæ.

Vitis Idæa buxeis folijs nec deciduis, baccif-
que rubris Clus. quamvis minùs benè simpliciter
Buxea dicat: id potius conuenit sequenti plantæ,
quàm Radicem Idæam suspicamus.

Vaccinia rubra Herbarior. & offic. Myrtillos
dicunt Aduers. vt & præcedentia: an Idæa Radix
sit dubitant: ac tradunt fruticem lætiore, & habi-
tione aspectu semperuirere: non perinde vt nigræ
frequentem, nec tamen nigræ dissimilia folia,
sed paulò maiora & ad Myrtum albam siue maio-
rem, & Rhus Plinianum accedentia, rotundiora:
Bacculas nec dissimiles, sed rubras, astringentes
magis, nec perinde succulentas ferre. Radicem æ-
què lignosam fibris serpente Ericæ ritu. Flores ex
oblongis calyculis paruulis subpurpureis apiculos
è medio exerere. Sed ista descriptio Aduers. Vac-
ciniorum rubrorum non placet: folia namque
nobis videntur valdè dissimilia, & ad Myrtum
vel Rhus nullo modo accedere.

Iconem certè non spernendam proposuerat Dod.
in Hist. Gal. quam etiam retinuit in postrema.
vbi notat Gesnero Vitem Idæam rubris acinis di-
ci, sed multò minùs quàm nigram cum Idæa vire
hanc conuenire, ipsarum baccarum exortus ostē-
dit. Non enim ad latera Cauliculorum, veluti ni-
gra, sed è ramulorum cacuminibus, Corymborum
instar, dependent.

An Cam. b. vi. Vitis Idæa vulgaris. An Thal.
Vitis Idæa seu Vaccinia rubra Dod. Idem Tha-
lius refert, hanc stirpem olim Aemilium existi-
masse esse Rhum Plin. minorem. Vulgò Brans-
beer dici: Noricis Rote preßelbeer / quorum Sil-
ur hoc frutice refertissimæ sunt. Belg. Roote
Erafesien, teste Dod. Red Roborrees or Whor-
ele, Anglis.

Vaccinia rubra Gerard. qui figuram habet ex Ta-
ber. quæ posita erat pro vite Idæa maiore, à qua
Vitis Idæa fructu rubro multùm differt. Vbi au-
tem Taber. ac etiam Tragus de hac scripserint,
nescimus, nisi fortè sub Chamæbuxo, vti monui-
mus Cap. de Radice Idæa.

Schuenckfeld. in suo Catal. Siles. varia nomina
diuersa imponit, hæc: Vaccinium rubrum, &
maimzer: Vitis Idæa rubra Matth. [sed vbi?]
Erica

Radix.

*Vitis Idæa
rubra
Rhus mini-
mus Plin.*

*Vitis Idæa
Gal.
Arctostaphylos.*

*Vitis Idæa
Vaccinia
rubra.*

Clus. not.

Aduers. not.

*Ciste re-
preh.*

*Rhus Plin.
minor.*

*Gerardus
not.*

*Schuenck-
feld. not.*

Erica baccifera lanifolia Taber. Vva vrsi Anguil.
Rote beydelbeer/ Rote preusselbeer/ preusselbeer,
Rausch Taber. sed an sine consensione, ipse vide-
rit & Herbatum periti.

Locus.

Gaudet & hæc locis siluosis, saxosis ac opa-
cis: itemque alpihus: Monte fracto Heluetiæ:
Item in similibus Brabantæ locis. Copiosissima
circa Wernigerodam in Broccenbergo & vicinis
montibus. Item circa Walckenridam, Gerenro-
dam, aliisque locis quampluribus, teste Thelio.
Vastis etiam siluis circa Boleslauiam & Saganum
silesiæ plurimum: Schuencckf. Nobis verbò obser-
uata in cacumine montis Rossberg pro Meso-
comium tractus Alsatici Octobri pulchre vitens,
cum angulosa folia decidissent ferè omnia. Hanc
semper virete existimamus. Item in monte Ballon
Lotaringiæ vicino, cum Vite Idæa angulosa, & a-
lia fruticosiore siue magna. Augusto iam racemu-
los gerebat, sed tum primum baccæ nonnihil in-
cipiebant maturefcere, cum aliarum iam dicta-
rum omnino essent maturæ: vnde patet serotinam
magis esse. Communiter etiam sub Abietibus at-
que piceis crescere videas quod & Camer. annota-
uit. Floret Maio & Iunio. Septembri demum
perfectè maturatur. Cum baccæ sint acidæ ma-
gisque adstringentes cæteris, nec perinde succu-
lentæ vt Myrtillis, facultatem vtique frigidam sic-
camque habebunt, quam & Dod. alique ipsi tri-
bunt. Quapropter ad eos vsus, vbi adstrictione
opus accommodari posset. Hinc vsus eorum in
Dysenteria non contemnendus: item in diarrhœa,
& superius dictis affectibus plerisque. Quæ verò
ratione pulvis ex acinis aridis exhibeatur calcu-
losis, vt scribit Camer. & repetit Schuencckf. nec
nouimus ipsi, nec facile declarabunt isti. Possis &
ex hatum succo Rob conficere addito saccharo
aut melle, ad viscerum calores & sitim in febribus
calidis. Quidam ad iulchura commendant, addi-
tis aromatibus. Foliorum vsus ob adstrictionem
idem esse possit, qui præcedentium.

Tempus.

Vitis &
vitis.

Temperamentum.

Camer. &
Schuencckf.
falsè not.

Taber.

ramis lignosis, pedalis, cortice tenui & facile
cedenti rectis. Flores racemosi, concaui, rubri. Flo.
Fructus vt in Vite sempervirente racemosus in ex-
tremis ramulorum. Quæ de radice Idæa Diosc.
& Plin. scripsere, annotata sunt postea, quibus
bene consideratis fortè erit, quod monet Fab. Co-
lumn. Bonifacia, siue Bislingua, cum qua melius vi-
dentur conuenire, quæ Veteres de ea scripserunt:
Ab aliis positam plantam dicit nullam cum rusco
habere affinitatem.

Valerandus Dorez, sagacissimus aliqui stir-
pium vestigator ac censor olim putabat Vaccinia
rubra Dod. & Myrtum montanum Cordi esse hanc
ipsam: sed vt tempore & hominum cura omnia fi-
unt clariora, ita & in aprium data in opacis alio-
qui delitescens suffruticuli distinctiones a nobis
propositæ.

Quum verò Tragus Vitis Idæa rubræ non me-
minerit cap. de suis Myrtillis, licet coniectari eum
de hac scribere, aut certè de Radice Idæa his ver-
bis: In altissimis Walgouix siluis non procul à Ce-
sareo Luthro humo arenosa, exigua stirpis species
Erica haudquaquam maior reperitur. Hæc folia
habet Buxo aut Myrtillis quàm simillima, humi-
que magis procumbit, quàm in altum sese attollat.
An verò ea Chamæpyxos fuerit, ait se affirmare
non ausum.

Considerandum an eadem sit Vva Vrsi Galeni
apud Clus. quam scribit fruticare pedalis ferè
ramulis flexilibus & lentis, humi diffusis, rubel-
cente cortice rectis, vt teneriores Arbuti ramuli:
folia illi frequentia, Arbuti folijs minora, carno-
sa, Chamælex Italica foliorum planè æmula, mi-
nimè tamen hirsuta, cum astrictione amaricantia.
Extremis ramulis flores proferre ex candido pur-
purascentes, siue candidos, quibus leuiter purpu-
rascens color admixtus sit, cauos, Arbuti floribus
similes, & vix modo simul congestos: fructus
non vidit sed incolæ rubentem, rotundum, exigui
cerati instar acidum referebant. Radicem parua
sed lignosam. Perpetua fronde virere. Peritiores
quidam Hispani, quibus eam ostendebat, Chamæ-
daphnen esse existimabant, crassitudine foliorum
procul dubio decepti.

Clusio verò ad amissum quadrare videtur
quàm Gal. lib. 7. c. 4. & ad idem sic describit:
Vva Vrsi in Ponto nascitur, planta humilis & fru-
ticosa, folio memzelyi, fructum ferens rubrum,
rotundum, gustu austerum. Sed icon Vux Vrsi
Clusij nobis scrupulum iniicit, an eadem sit cum
Radice nostra Idæa, in qua non apparent nerui
transuersi vt pinguntur in Clusij iconè.

Lob. cum Pena obscure admodum de his plan-
tis scripserunt, vt apparet ex eorum Aduers. vbi aiunt:
Alpigena Chamærhodendros odora, frutex, flore
purpureo, pinguis tota &c. Alpinis Alpigen: Bac-
culas Asparagi vel Taxi pares & concolores, Septe-
briedit. Et in Obs. Genuina Vva Vrsi Galeni apud
Clus. eadem videtur cum Alpigena Chamærho-
dendro exhibita in Obs. p. 199. & Adu. p. 154. cuius
flores Arbuti similes, sed ex candido purpurei aut
candidi conspiciuntur. Hæc Lob. qui figuram
eandem habet cum Clus. Is pagin. Obs. prædicta
figuram habet aliam cum bacculis lateralibus, & nō
in extremitatibus, his titulis: Alpigena Chamæ-
rhodendros odora Aduers. p. 154. Balsamum Ita-
licum vulgare, siue Rhododaphne parua rusti-
ca: Terionarcha Plin. putata Guilandino. Sed Lo-
bodium diuersa nomina, plantas & icones confun-
dere clarè patebit rem ipsam, eiusque, & Clusij ver-
ba consideranti. Nec minus an extet aliqua Cha-
mærhodendros odora baccifera. Si extet grati

Vaccinium
rub.
Myrtum
montanum.Chamæpy-
xos.An Vva Vrsi
Galeni ex
Clusio.Chamæda-
phne.Aristoteli
philos.Descriptio
Gal.Chamærho-
dendros.

Vva Vrsi.

Chamærho-
dendros
Alpigena
Balsamum
Italicum
Rhododa-
phne
Therionar-
cha
Lob. error.

RADIX IDÆA PUTATA, ET VVA VRSI.

CAP. VIII.

Descriptio.



Vitis Idæa
rubræ affi-
nis est quam
Radice Idæam
Diosc. vocant, à
qua tamen ma-
nifestè differt:
quidem folia
habet dentiora,
ad Buxum acce-
dentia, ex oblo-
go rotundata,
angustiore ad
pediculum cer-
uice, utrinque
rugosa, nec ner-
uos, vt illa, præ-
ter vnicum, qui
secundum lon-
gitudinem de-
currit, exhiben-
tia, quamuis pi-

ctor perperam quasdam propagines laterorum
appinxerit, gustu cum amatore adstringente,
quemadmodum Vitis rubra fructu. Hærent autem ea

primus erga demonstrantem.

*Idz. Lugd.
Veprob.*

*Radix Idz.
Thermar-
cha.*

*Pera bac-
fera latifo-
lia.*

*Tabern.
nov.*

Chama-

*C. Bamb.
Lent.
Vaccinia
Vrf.*

Locus

Tempus

visu.

Alit *Hist. Lugd.* more suo duas vel tres confun-
dit, dum vni huic diuersarum stirpium hæc nomi-
na tribuit: Idzæ radix, siue Idzæ vitis species: Dod.
Vaccinia rubra: Clusio Vuz vrfi Gal. Italis Rhodo-
daphne parua rustica: quibusdam Balsamum Itali-
cū vulgare: Therionarcha Plin. Idzæ radix Diosc.
Plin. Gal. Tam egregie Chaos istud stirpes digerere
confecit.

Tabern. proponit figuram Ericæ bacciferæ la-
tifoliæ nomine, quam & *Rausib* Germ. vocat, sine
descriptione, quæ exprimere videtur nostram
Idzæ radicem. De *Vuz vrfi* quam idem ex Clus.
habet, iam diximus nostram sententiam. Chama-
rhodendron Alpina latifolia & is sanè con-
fundit cum Ledo Alpino: Figuram etiam
proponit Lobelianam, cuius nomen iam de-
teximus. De Chamæpyxo eius idem dicimus,
quod de Tragi Chamæpyxo, nobis videri eo
nomine tradi Vitis Idzæ speciem, cuius iconem
si quis consideret, fortè suspicabitur po-
tius accedere ad vitim Idzæ rubro fructu, quam
ad Radicem Idzæ. Rem Le. oribus consideran-
dam relinquimus. Quicquid sit, cum D. Casparo
Bauhino Botanico veratissimo existimamus non
esse ex genere Buxi.

Gerard. quoque Chamærhodendron alpigena
dicitur. Angl. *Swearffe rose Baie*: Item Vaccinia
Vrfi siue Vuz vrfi Clus. *Beares Wefortie berries*.

Ceterum *Vuz vrfi* Clusio non nisi vnico loco
nascentis visa arido solo & aprico, via regia in colle
imminenti cuidam viculo, *Vena el babul* vocato,
inter Guadix & Baca, regno Granatensi, iam flo-
rens Martio. Scripsit tamen plerumque florere, fru-
ctum æstate maturefcere, & in planta ad hiemem
vsque perdurare ipsi incolæ affirmabant. Nos in
montibus circa Geneuam obseruauimus. Proue-
nit etiam Basileæ via quæ tenditur ad S. Chrischo-
næ fanum iuxta vineas. Legimus etiam in Vega-
ganijs Narbonæ montibus.

III. Princeps noster Frid. Dux Wirtemb. misit
nobis plantam siccam monens copiose reperiri
circa Curiam Rhetorum, ferre baccas rubras:
magni fieri hanc plantam à tinctoribus pro tinctura
nigra, ac eis dici *Kausch*.

CHAMÆBUXVS SIVE CHAMÆPIXOS.

QVIBVS DAM.

CAP. IX.

Descriptio.



Radix.

n illis radican- tur: alioqui & radicem habet, læ-

QVamuis hæc planta non sit de tribu bacciferarum, iungendam tamen censuimus propter quandam similitudinem cum præcedenti, à quibusdam Chamæbuxus putata. Hunc tuffaticem itidem Chamæbuxum dixere, multis virgultis tenuibus, lentis, spithamam circiter longis præditum, quæ vbi terram attingunt, fibris de-

pè non multò ipsis virgulis breviorè, lignosam, ex cuius capitibus (quæ plura possidet) ipsæ emergunt. Folia per ramos incondita, Buxis quodammodo similia, magis acuminata, carnosa, pediculis brevissimis herentia, [gustantibus primum ingrata, deinde amara & acris Clus.] amaricaria: ex quorum alis, in ramulorum extremis flores emicant Coluteæ scorpioidis floribus similes, simul plures iuncti, qui, teste Clus. odoris expertes, nonnullis verò locis odoratissimi & Narcissinam quandam fragrantiam emulantes, tribus foliis constant, quorum duo alba sunt, & alarum modo sursum expansa, galeolæ exalbidæ illorum exortu integente, tertium folium in oblongum veluti tubulum conuolutum est, sursum per lanuginem apertum, per extremitatem braccæ modo efformatum atque luteum, & vetustate interdum omnino purpurascens aut rubescens. Floribus succedunt lævæ & compressæ siliquæ, Thlaspi latifolii siliquis paulò minores, virides, quæ bina plerumque [nonnunquam verò vnicum tantum] continent grana, exigui Erui magnitudine, colore ex cinereo nigricante, hirsuta & veluti quoddam animalculi ementita, Polygalæ vulgaris maioris rubræ semini haud absimilia, sed minora, quæ aperientibus sese per latera locustis, spontè decidunt.

Interdum etiam pro loci natura floris colorem variare deprehenditur: nam bina illa folia alaræ instar, sursum expansa, galeolæque eorum exortum tegens, alba non sunt, sed pulcherrimè ex purpura rubent: tertium autem veluti in tubulum conuolutum flavescit, eiusque extrema pars aurea est.

Cordum existimamus in Obs. sibi de hac planta ita tradidisse: [licet Thalius aliò referat] Frutculus exiguus, humi prostratus, iuncis viridibusque virgulis: foliis myrtinis, duris, acuminatis, perennibusque: floribus papilionaceis ferè, diuerso colore, videlicet albo, flauo & rubente: extimam quidem albet, proximum flauet, intimum rubet. Nascentur in siluis montanis circa Egeram, in Ba-

uaria & Vindelicia. A vrbano Coluteæ flore, siue elegans Clus. qui à nemine adhuc descriptam putat. At nos à Cordo. Quidam à perpetuâ viriditate wintergrün appellari dixerunt, quod nomen alioqui & Vinæ per vineæ conuenit.

Anonymos Peruiæ folio: Camer. Gesn. iam olim [cum ego Bauhinus ipsi conuiuerem] Chamæbuxum seu Chamæpyxon vocauit. Argentine vidimus inter Plantas D. Agerii siccas nomine myrtogenis, quod nomen non displicet: nec sanè male post Genistam ponit Clusius. Sed magis arris Chamæbuxi.

Frequens est prior teste Clus. non modò in montibus Calenberg, Medeling, & Badensibus thermis imminetibus, sed & in alijs ad Austriacas & Striacas Alpes excurrentibus, qui omni Reliniferarum arborum genere integuntur, inter saxa. Plurimis etiam Pannoniæ locis est obuia, veluti ad Polonium, Sopronium & Zolozock. Altera verò rarior inuentur.

Floret vtrique Aprili & Maio. Semen peditis Tempus. [nam alterius non obseruauit] Iunio perficatur D. C. Bauh. attulit Patauio in horto lectam, his nominibus: Vitis Idzæ Theoph. cum baccis Myrti, Olea Ethiopica Diosc. Guilandino. Sed decepti fuere qui ita vocarunt, nisi nomina casu ad plantam fuerint adiecta. Tiguri etiam obseruauimus & collegimus. Locus particularis nunc non faccurrit. Hactenus neglecta fuit hæc planta, nec in vsum Medicum vocata, quod sciamus.

VITIS

VITI IDÆE AFFINIS POLIIFOLIA
MONTANA.

CAP. X.

Descriptio.

Folia.



Calyculi.

tioliscalyculi hærent perexigui, foliosi, rubentes, unde angulosa pyramis exilit Conchylia, baccæ alicuius rudimentum promittens. Pro radicibus passim ex ramis nascuntur capilli instar tenues fibræ terram motu comprehendentes. Appingi curavimus latiusculum folium, iuxta angulum, cuiusmodi pauca plantæ à nobis collectæ adhæserunt.

Locus.

Hanc plantam reperimus vliginosa, muscosis, & frigidis locis cum alijs Vitis Idææ speciebus, Maij principio in montibus Harsinæ silvæ inter vallem Griebachianam vbi fontes acidi, & Râdselantzen, vbi etiam fons acidus. Vidimus quoque cum flore apud D. Platerum Basileæ, sed siccam, collectam in monte Pilati.

Myrtus idæe.

Hanc eandem videtur Thalins in Harsynia Quâ Myrti tenuissimæ nomine sic descripsisse. Copiose reperitur in vligine illa, ultra Andersbergum urbem, Broccenbergum montem versus, quam nominant Den roten Bruch, hoc est, Vliginem rubeam, quod totus ille vliginosus tractus sub radicibus Broccenbergi, & vicinorum montium rubro musco plenus sit, quæ videlicet ex Andersbergo viaparet Goslariam versus. Fruticulus est lignosus, palmaris, viticulis multis, incurvis: folijs oblongiusculis, vntialibus, Myrti folijs angustioribus, quorum extrema plerumque in tergum contorquentur. In exiguis recurvis pediculis præfert citra autumnum sterculos parvos, rubicundiusculos ex albo. Fructum nunquam adipisci potuit, cumque serò admodum floreat, eo autem loco, vbi nascitur, hiemæ citius, quam alibi incipiat, citius etiam grandiores ibi nives cadant, opinatur rarò eius maturos fructus haberi posse. Cognatum forte quid cum hoc habere putat fruticulus illum exiguum Cordi, folijs Myrtinis, quem nos directum censemus, ac Chamæbuxum præcedentem.

Vitis idæe rubra.

An Camer. Vitis Idææ rubra Bauarica, baccis insipidis sine sucro. Fruticulus est supinus, crassiore caudice quam vulgaris (ea forte, quæ rubro fructu) quæ apud nos passim cum nigra [forte angulosa] in silvis crescit, & Steinbeckerlinvo ca-

tur: folijs item oblongioribus, acuminatioribus & angustioribus, per autumnum rubentibus. Crescit circa Monacum in campis asperis inter Ericas. In horto adhuc vivit & viget, nedum ut silvestres huiusmodi plantæ videretur interitura. Hæc ille. Quam verò nobis cerò non constet, quò sit referenda hæc Vitis Idæa Bauarica, hæc lubuit eius descriptionem referre, donec melius nobis innotescat.

Locus.

OXYCOCCVS SIVE VACCINIA
PALVSTRIS.

CAP.

Descriptio.



Folia.

Bacca.

Semina.

Flores.

Radic.

Sapor.

fidis iuxta annexum turbinatæ, colore foris primum candicantes, mox puniceæ & purpureis contiguisque maculis & punctis conspersæ, intus verò in candido modicè rubentes, & quatuor exiguis cavitaribus parva & veluti abortiva semina claudentes: ex vna cum cauliculis humi procumbunt, nonnunquam etiam in musco tanquam absconditæ latent. Flores in extremis & capilli instar tenuibus furculis, Glycypicridos floribus similes, colore propemodum puniceo. Radicibus nititur brevibus, capilli modo tenuissimis & flavis, ex viticulis subinde demissis. Saporem coliculi & folia habent adstringentem: baccæ verò egregiè & simpliciter acetosum.

Dod. scribit se observasse radicem esse instar lentis bacilli, obliquam, ex qua sursum complures coliculi & inferius fibræ aliquot demittantur.

Thalins autem hæc annotat: oxycoccon copiose in Broccenbergi & vicinis montibus humidioribus, folijs non ita subtrundiusculis, ut est eius icon apud Cordum, sed oblongioribus ac strictioribus, lenticulæ serè, brevioribus tamen: quorum ambitus versus dorsum vtrinque leniter reflectitur. Longis lignosisque ac obliquis protegit in vliginosa musco viticulis, radicibus constans tenuibus, multifidis, lignosis, quibus capillaceæ fibræ multæ adherent. Flosculi exigui sunt, purpurei, veluti exigui Citinij.

Vaccinia palustris Dod. videntur forte eiusdæ stirpis fructus esse, vel congeneris. Tantis autem radicem truncus nostro oxycocco non est, quantum icon Dod. suorum vacciniarum exhibet. Hic idem in Hist. Gal. Vaccinia palustris ait Belgicè vocari Deerbessen & Deencoren: Gal: Confinis des marais: nullumque aliud nomen sibi co-

Vaccinia palustris.

*Orna.
Radix.*

Locus.

purpureo succo, vti Mora, plenæ, in quibus multa inæqualia & veluti triangula grana. Radix lignosa & dura est. Hanc florentem, & viridibus baccis onustam, multasque adhuc superioris anni maturas retinentem, inuenit idem in præcelli montis, Vulgò Dechse appellari, scopulis, quinto supra Neapolim Austriæ urbem miliari, mense Iunio: Postea etiam Augusto, immaturo & maturo fructu plenam in Sneberg & Snealben Cellissimarum Austriæ & Styriæ alpijū iugis. Illius etiam arenosis Holandiæ tumulis erunt ramum suis baccis maturis & immaturis onustum misit ad eundem N.V. Io ab Hoghelande. Miramur verò in Clusicone ramos pingi hirsutos, nec tamen fieri mentionem in descriptione: alioqui icon angustis foliis melius conuenit cum Erica à nobis descripta, quam icon Camer. à nobis proposita:


Iam antea monuimus Penam & Lob. & hos sequutum Schuuenkf. existimasse Vaccinia palustria esse Ericam bacciferam Matth. quem errorem dudum deprehendimus. Sed quoniam idem Schuueck. feld. Orycoccō dicit esse Ericam bacciferam Matth. & Thalii, cum ex eo aperte contrarium pateat nempe ~~non~~ diuersum esse à Vacciniis: placet eius historiam totam subiicere, quæ sic habet. Erica baccifera Matth. Nam hanc de qua nunc agimus, eandem esse censemus. Angli verò in Aduersar. Vacciniorum palustrium nomine eam proponunt, quamuis hæc nostra in palustribus non nascatur. Fruticulus est humi procumbens, in oblonga, multitudaque brachia rubria, lignosa, obsequiosa ac foliosa latè super terram se prorepando explicans: foliolis densè obæstatur breuibz, oblongiusculis, strictis, suffuluis, sæpè etiam nonnihil cæruleis, splendentibus, ex quorum alis in ramulorum extremitatibus æstate sub Syrii æstu micant tenuissima staminula, breuique, filamentorum sericorum ferè instar, quorū summitatibus apicula insident, coloris ex rubro nigricantis aut spadicescentis ferè: hæcque filamenta & apicula florum vicem explent, itque deciditibus, emergunt bæccæ splendentes, luniperinis minores, umiles bæccis Viris Idææ seu Vacciniorum nigrorum Dod. rotundæ, ex purpura nigricantes, dulci pulpâ constantes, cui infarcta continentur semina purpurascens. Prouenit copiose in summo Broccenbergi iugo & saxorum aridorum fissuris. Saxones qui montem illum accolunt, vocant hosce fructus Apenbeer / hoc est, Simiarum bæccas. Vnde, si quis neque Ericæ, neque Vacciniorum speciem stirpem istam esse voluerit, is nomine coniecto ~~non~~ appellare posset. Inde autem ei hæc nomenclaturæ inditum est, quod ætus ipsorum vberior capiti noxia inferat quedam symptomata, ad quæ delictæ subsequantur gestulationes, ratione nonnihil interturbatæ, ut is, qui ipsis vltus fuerit copiosius, simiarum instar sese habere gestu risibundo videatur. Hinc plantulam hanc deleteriâ facultate minimè carere contendunt, & ab eius usu omnino abstinere, aliisque ipsorum vltum sanctè interdiciunt. At amicus quidam noster Andreas Rosalerus, pharmacopœus Halberstadiensis, vir opt. & rei herbariæ non triualiter gnarus, hanc stirpem Chamætaxum vocare solet, tum ratione qualitatis istius malæ, tum foliorum oblongiusculorum n. Taxi, sed breviorum. Amilius eam olim, cum necdum illo tempore à quoquam esset hæc stirps descripta, Corios speciem faciebat, Cōrin Broccenbergensem nominans. Reperuntur & vetulæ herbariæ in Saxonia, quæ hanc plantam Gichtkraut vocitant, commen-

dantque eam mulierculis vt præsentaneum præsidium contra istiusmodi morbum, nempe Conuulsionem. Matth. fatetur se de sua Erica baccifera qualitatibus nihil certi habere.

ANONYMOS FRUTICOSA,

FOLIIS ERICÆ BACCIFERÆ MATTH.

CAP. XIII.



Elegantissimi-
Emi huius
fruticelli ramo
pulchello nos
donauit Cl. D.
Agerius Med.
Argent. & stir-
pium sagacissi-
mus vestigator,
qui furculosus,
lignosus, variè
diuisus, imâ
parte rufus aut
fuscus, annoti-
norum ramu-
lorum princi-
pium dilutè ru-
bens, extrema
flauescent. Ex
inæqualibus in-
ternodijs folio-
la emittit ma-
gna ex parte binæ, nec tam numeroso ac denso ag-
mine, vt in præcedenti, altero verò latiora, cras-
siora, & in totum maiora, dilutè virentia, & Buxi
recentis in morem flagescentia. Ramulorum sum-
ma surrectis & longiusculis petiolis rufis insiden-
tia occupant vascula Ledi Narbonensis aut Nerij
Montani quodammodo similia, foliaceo calyculo
suscepta. Folia magis quam præcedentis anata,
nec sine adstrictione.

De hac Aduer. vt putamus sic scripsit: Cha-
marhodendros altera celis & rigidissimis cau-
tibus, floribus purpureis perquam exiguis, Ericæ
foliolis, non deciduis, prouenit: humilis tota, à
nobis tantum sicca visa.

Gesn. de hort: Rosæ alpinæ altera species, foli-
olis minimis, Acinariæ palustris nostræ foliolis
perfamilibus.

Nascitur in Adula monte Rhætorum: inde au-
rumno allata, in hortulo plantata, vbi nunc me-
dia hyeme egregiè viret nec perdit folia: duratu-
ram tamen vix spero, altissimis, siccis, ventosis
& apicis frigidisque locis affueram. Species hæc
Rosæ alpinæ rarissima est.

Ex Clus. Ran. desumpta est nostra icon, sed mi-
nus feliciter pictor imitatus est: titulus erat
folijs Thyti: de ea scribebat nondum
liber constare, quod esset referenda, eam ob causâ
etiam relinquere: nisi forte ea sit quam
Pena & Lob. in Adu. Alpinam alteram vocant,
& statim post Chamæhododendron odorem col-
locant.

In post. hist vocat Chamæcistum. Olim
(inquit) non mihi constabat, quod istam plantu-
lam referre deberem, quod mediam naturam in-
ter Chamæcistum & Cneorum Matth. obtinere vi-
deretur: eam ob causam inter vtriusque capita lo-
caueram. Sed diligentius postea obseruatam, in-
ter Chamæcisti genera reponere placuit, impel-

*Pen. Lob. &
Schuuenkf.
auer.*

Semina.

*Locus.
Simiarum
bæccæ.*

*Phytocist
cur dictum.
Nomen
bæccæ.*

*Deleteriam
esse.*

*Chamæ-
taxum.*

*Corios
speciem.
Vlt.
Commis-
sa.*

Folia.

ascula.

sapor.

floras.

*Rosæ alpinæ
species.*

Locus.

*Anonymus
folijs Thyti.*

*Chamæcisti
genera.*

lentibus me aliquot caulis. Oblongis quandoque
 dodrantalibus tantum serpit ramis humi distalis,
 nigricantibus, in multos alios breues ramulos
 diuisis: folia frequentia & conferta sunt, bina
 semper inter se opposita, [non semper hoc obser-
 uatum in planta] exigua, serpilli minora, Thy-
 mi durioris folijs haud maiora, crassa, superiore
 parte viridia, infernè candicante, amaricantis
 saporis. Extremis ramulis innascuntur bini aut
 quaterni flosculi simul iuncti, perpusilli è quinque
 foliolis compositi, carnei quali coloris. His suc-
 cedunt capitula, maturitate in quinas crenas sese
 aperientia, & semen exile admodum ostendentia.
 Radix dura, lignosa, aliquot fibris donata: quinque
 etiam rami subinde lenues fibras agunt. Exiccata
 planta non iniucundo spirat odore.

Flascul. Nasceitur tenui solo inter saxa, in summis Sne-
 berg, Sualben, & alijs Austriacarum Styriacarū-
 que Alpium supercilijs.

Capitula. Floret Iunio, interdum etiam paulò maturius,
 pro temporis, quo nix quæ iuga illa regit maturè
 aut serò soluitur, ratione.

Locus.

Tempus.

ERICA BACCIFERA LVSITANICA.

CAP. XIV.

Descriptio.


Folia.

Fructus.

Non florere.

Canari-
 bora.

Acacalia.



Erica folijs
 Corios Clu-
 sio fruticosa est,
 cubitalibus as-
 surgens ramulis,
 fragilibus, ni-
 griore quàm re-
 liquo cortice, fo-
 lia quoque iis si-
 milia, sed nigrio-
 ra & crassiora,
 gustu cum ad-
 strictione cali-
 diusculo, trino
 ordine circa ra-
 mulos sunt dis-
 posita. Fructum
 a reliquis Ericis
 discretem sum-
 mis ramulis in-
 harentem gerit,
 vniones obscu-
 riores tum forma tum colore referentē, succulen-
 tū, sapore acido, tria granula dura plerumq;
 continentem, qui exiccatus per se decidit. An floreat,
 nondum constat: incolæ negabant, & fructum
 paulatim intumescere amplioremque fieri donec
 maturefceret affirmabant.

Et verò hæc longè diuerfa à Matth. Erica bac-
 cifera. Lusitani vulgò *Canarinbara*: fructum verò
Canarinbas dicunt. Erica baccifera Lob. Erica
 baccifera tenuifolia Tab. qui & *Rausch* vocat.
 An verò & hoc nomen Germanicum, quod pluri-
 bus plantis tribuebatur, & huic conueniat consi-
 derandum.

Acacalia, Lat. *Acacalis* Amato in Com. ad
 Diosc. Est verò *Acacalis* eidem planta fructum fe-
 rens album, rotundum, paruis margaritis per-
 similem, quem Lusitani sua voce *Canarinbam*
 appellant: neque putat fructum istum in Euro-
 pa vniuersa, præterquam apud Olyssiponem cre-
 scere. Planta media est inter Myricem & Ericen
 quæ de causa Diosc. prudentissimè eam Myricem
 & Ericem sermonem fecisset, de hac illic deaput se-

quent constituit. Fructus est esui gratus: Verum
Cacalia herba longè alia est, quamquam Plin. illi *Cacalia*
 quoque fructum margaritis simillimum inesse di-
 cat. Quæ *Acacali* conueniunt, *Cacalix* Plinium
 tribuisse deprehendimus, dicentem: *Cacalia* sine
 Leontice vocatur semen margaritis minutis simi-
 le &c. De *Acacali* Paulus quoque ex Diosc.

Bry fratres Hist. Ind. Oriental. notant quoque
 Lusitanis *Canarinbam* vocatas folijs esse equiseti,
 sed obscurioribus. Fructus esse baccas rotundas,
 perlacci candoris, sapore subacido.

In vna Lusitania hanc plantam obseruauit Chl.
 non procul Vlyssipone inter *Riofriso* & *Aldea* *Casta-*
ga, & etiam supra Vlyssiponem, solo admodum
 arenoso, copiosè suo fructu albo onustam: ait tri-
 tid Mannæ grana isti fructici inharrentia existimasse,
 aded procul ipsi insipienti imposuisse. Septem-
 bri & Octob. fructum fert, qui Nouembri exicca-
 tur & per se decidit. Fructus Sept. & Octob. men-
 sibus Vlyssipone inuenitur, febrientibus exhibe-
 rent, ad sitim quæ premuntur, restinguendam: an-
 tiquè etiam idem fructus à pueris & mulierculis ex-
 petitur, Si *Acacalis* est, aquam in qua maduerit
 eius fructus, ad Collyria quæ ad excitandam oculo-
 rum aciem conueniunt, addi, testis est Diosc. A-
 matus quoque testatur fructum esui esse gratum,
 eoque mulieres & effrenatos pueros in cibo fre-
 quenter vti.

LIGVSTRVM.

CAP. XV.



Ligustrum
 tex est arbo-
 rescens, radicem
 hinc inde per
 obliquum spargens,
 tres aut quatuor
 cubitos altus &
 maior, crebris
 virgis lentis &
 in ramos diuisis
 constans, cortice
 cinereo obiectis,
 præsertim verò
 stipites & rami
 crassiores tali
 cortice vestiun-
 tur: nam ramuli
 virides leguntur,
 materie albida,
 dura. Folia bi-
 na aduerso situ
 ex interuallis o-
 riuntur, oblonga, crassa, figura ad Salicis
 folia quodammodo ædientia, sed breviora, cras-
 sioraque, atrouirentia, læuia, nitentia, glutinosa
 & subamaro, non sine adstrictione. Flores in
 ramorum summis profert suauiter olentes, candi-
 dos, racematim congestos, quorum singuli quater-
 nis, quinis, aut senis foliis constant, apicibus ex
 luteo herbidis, qui decerpti statim flaccescunt:
 quos excipiunt Baccæ racematim quoque in Pyra-
 midis figuram aggestæ, Hædæ baccis minores,
 læuiore ac nigrescentes, luniperum æquales, immo
 virentes, per maturitatem nigricantes, continentes
 bina grana, hinc gibba, inde compressa, cortice
 spadiceo, carne exalbida, vel digitorum lani pressu
 fragilia: sapore amaro ac iniucundo, quamuis qui-
 busdam aliquid dulcedinis habere videantur.

Tragus

Tragus annotat huius generis nonnullos fructus sublateo comari flore, atque eos quidem inventu rariotes esse.

Ligustri meminit Virgil. celebrato illo carmine: ubi flores intellexisse videtur.

Alba Ligustra cadunt, Vaccina nigra leguntur. Et Colum. in hortis: *Fer Calathis Violam, Et Nigro permixta Ligustro Balsama &c.* ad fructum potissimum respiciens: ut censet Tragus.

Marcellus sibi persuadet, Ligustrum hoc vulgare idem esse cum Cypro Diosc. ut satis aperte insinuat, quando ait: Quos Maro cecinit pastoribus negligi & inutiliter perire Ligustri Flores, medicina & Unguentariorum Officina libenter exceperunt. Nostra æstate nulla aut exigua eius ratio est, cum alioqui vulgaris & ubique paratus frutex hic sit. Cisalpina omnis adhuc Gallia sic vocat, Hetruria corrupta appellatione *Runisticum*. De Diosc. & Plin. Cypro cap. seq. Sunt tamen qui & Plin. Cyprum eam esse Arborem censeant, quæ etiamnum in Italia Ligustrum vocatur, ut dicitur in progressu.

Ipsiusmet Ligustri paucissimis meminit Plin. Ligustra inquiens non nisi in aquosis provenire, relieris utilissima. Alex. ab Alex. tessaras hic tuforias interpretatur: Dal. verò rectius nostro iudicio lignea signa, vinum, frumentum, oleum aut aliud quippiam significantia, & promittentia, quibus in congiariis & publicis largitionibus Imperatorum utebantur.

Porro magna difficultas orta est inter Herbarios *An Ligustrum sit Cyprus Diosc. & Plin.*

Cyprum quidam, ut Plin. inquit, esse dicunt arborem, quæ in Italia Ligustrum vocatur.

Et Ruell. Ligustrum apud nos eadem est arbor, quæ in Oriente & Græcia Cyprus, Gallis *Troenea*, Sueffiolibus *Dryna*, officinis ad Barbaros desinentibus tum *Alcana* tum *Heune*.

Virgil. pro flore usurpavit *Alba Ligustra*. Cypri, id est, Ligustri, florem putat corollis intorquentum.

Scio, inquit Tragus, qui Phyliream Diosc. velint, (ut Fr. Massarias Venetus & illius Simia) mihi verò est *xyces*, Lat. *Ligustrum*, de quo Diosc. Quidam immeritò vocant *Barrigel*.

Cordus quoque scribit, Ligustrum sine dubio arbusculam esse quæ Græcis Cyprus vocatur: propterea Plinium idem scripsisse nunquam pœniteat.

Annotat Corn. Posterioribus plerisque omnibus esse Cyprum: nec tam multis annis confirmatam opinionem velut errorem damnari debere, quum magna adeo sit inter Cyprum & Ligustrum affinitas & similitudo. Eidem aut Cypros est Italix Ligustrum, aut Phylirea: eos tamen addit qui Italix Ligustrum viderunt magis Phylireæ simile id quam Cypro depingere.

Eorundem sententiam tuetur Matth. & in errore versari tradit novum quendam Herbarium [Anguillaram] qui censet *Cyprum* & *Ligustrum* diversas esse stirpes, friuolis argumentis ex Plin. desumptis. Hallucinari qui non videant Ligustrum omnibus suis notis referre Cyprum, Sed Anguillatæ argumenta non videtur Matth. sufficienter refutare, & nimis audenter pronuntiare hallucinari eos, qui suæ opinioni non assentiuntur de Ligustro.

Ab eorundem partibus stant Io. Agric. & Turner. Hic speciatim, eius notas omnes cum Cypro Diosc. convenire scribit: ac quanquam Mallar. Venetus lib. de Piscibus strenuè negat Ligustrum esse Cyprum, rationes tamen quibus nititur non eam habere vim quin cōfutari possint. Ac optasse-

mus sanè refutasset viuis rationibus, si potuisset, aut à reprehensione abstinuisset.

Amatus ne ambigendū quidem censet Cyprum Ligustrum esse, quum Plin. dicat arborem Egypto familiarem, in Italia Ligustrum vocari. Ideo omnino falli Mass. Venetum, Cyprum aliam arborem à Ligustro esse contendentem. Ligustri verò radicibus hodiè Mauros suos inficere capillos, velut equorum quoque crines, quod olim quoque fieri Diosc. tradidit. Verum vel ex eo facile convincitur Amatus, Ligustrum nostrum neque esse Cyprum, neque id lignum quo Mauri capillos inficiunt, quia nihil tale præstat Ligustri nostri lignum, sed *Heune*, quod Cyprum existimamus.

Amari errorem utrumque ruminatur Lacuna, (vir nostro iudicio parum in re Botanica versatus) nempe & *xyces* esse & Ligustri radicibus à Turcis tingi caudas equorum: additque Poetas huius arboris flores vocare Ligustra, & fructus eius Vaccinia: sed dubium non est duas ab eo confundi plantas: non enim nostratis Ligustri, sed alterius exoticæ arboris radice, de qua postea tinguntur pili equorum.

Ad vnius huius plantæ historiam idem Lacuna accumulat & tertium errorem. Ponit Ligustri iconem ex Matth. & aliam habet eiusdem plantæ nomine Halimi, cum quo nullo modo convenit, Cæcis ita inponendum est, non nobis & diligentibus studiosis.

Monachis etiam *Cyprus* Græcorum & *Ligustrum* Latinorum vnum & idem sunt, quemad. & *Alcana*, ut legentes [inquiunt] Serapionem, & Diosc. cū Plinio conferentes non latet. Addunt in oleo Cyprino Actuarij, legi florum Ligustri, Græcis Cyprus dicti.

Lonicero *Ligustrum* Diosc. Phylira est & Cyprus, cuius duas species facit, magnam & parvam. Esse Virg. alba Ligustra, & Colum. nigra Ligustra. Ita vides non minori ignorantia quam oscitantia ab illo vni plantæ tribui tria diversarum plantarum nomina. Præterea vultus plantæ duas icones, minorem & maiorem ponit, & propter eas potius, quam ex re ipsa, aut quòd viderit, vel ab aliquo didicerit, duas tradit species, à nemine hæcenus, quod equidem sciamus, observatas.

Eius priorem iconem Ryff. prædicto non magis in re Herbaria versatus, pro Ligustro ponit, scribens: *Ligustrum* Plinij aliorumque Latinorum, cuius picturam damus omnes fere hæcenus Diosc. Cyprum interpretati sunt, sed illos nuper redarguit Massarius, demonstrans Ligustrum esse præcipue non Cyprum. Ryff. igitur qui ineptè posuit pro Cypro iconem Ligustri vulgaris, uti dictum, cap. sequenti iconem maiorem eiusdem plantæ cum eodem Lonic. ponit pro Phylirea Diosc.

Alius sapuisse sibi persuadent Pen. & Lob. in Adu. quando *Ligustrum* Diosc. nostras vocitant, subolfacientes fortè nostrum diversum esse à Dioscoridæ, & nihilominus ad illud reduci posse aut debere existimantes, ut equidem candidè interpretaremur nisi sequentia eorum verba diversum proderent, quando aiunt: de florum fœtura Cyprus dictus Græcis videtur: *xyces* enim floreo est, quòd allusisse visus est Maro, ubi *alba Ligustra* cadunt, canit. Auic. dicit baccas esse sanguineum lotium aut potius colore cruentum ciere, quòd præstitisset Refractarijs experiri, quàm Ligustrum verum inficari. Quæ tamen Alkannæ afferuntur assulæ, vel baccilli, luteo sunt intus ligno, eoque si crinem (ut videtur Auic. ex Diosc. velle) ruffant, sunt sanè aut melioris notæ Ligustri, quæ diversæ

Turner. ca.

fig.

Amatus

refut.

Lacuna non

Ligustra

Pict.

Vaccinia

Poet.

Tertius Lacuna error.

Lonic. ca.

fig.

Alter eiusdem error.

Ryff.

error.

Ryff.

error.

Cyprus Græcis

do.

plantæ, Quibus postremo verbis & notis non tenet ceu recidua quadam habitatione iactari nobis videntur, adeoque nihil certi statuiffe. Non placet igitur eos prius *Ligustrum* & *Cyprum* idem dixisse: nec quæ huic nostræ ascribunt de vrina cruenta, quod decebat illos potius experiri prius, quam redarguere eos qui negant *Cyprum*, cum ipsi dubitent, ut aperte docent eorum verba de *Alkana*, de qua nos seq. cap.

Cyprum Denique *ligustrum*, nostras etiam *Cyprum* Diosc. faciunt Cast. Durantes, [qui non bene duas figuras & descriptiones vnius plantæ ponit, quasi diuersæ sint plantæ.] Taber. & Celsus. Lonic. addit *Cyprum* ab insula dici.

Ligustrum His omnibus strenue se opponunt, iam sæpe citatus Massarius, Fuchs. Dod. Anguil. Rob. Const. apud Amaratū, Goropius, Porta, alique quorum iudicio & rationibus sanè in hac re plus tribuimus, eisque hætenus subscribimus, donec prodeat aliquis, qui nobis diuersum persuadeat. Quamquam Diosc. *Cypri* descriptio propius ad nostrum *Ligustrum* accedere videatur quam Plinii: quamvis nostram vix propriè & simpliciter arborem dicas, adhuc minùs peregrinam. In nostri quoque *Ligustri* foliis nihil tale quid apparet, quod capillos videret, quæ notæ nostrum *Ligustrum* à Diosc. *Cypro* potissimum distinguere videatur, quamvis & aliæ fortè sint circa vires, nondum obseruatae. Sed quid multa opus velitatione, cum alia planta, nec frutex, sed arbor Recentiorum industria inuenta sit, melius cum Diosc. *Cypro* conueniens.

Nec Cyprum Sed nec *Cypro* Ægyptiæ descriptioni Plinii quadrat nostrum *Ligustrum*. Plinii namque *Cyprus* semen habet Coriandri, peregrinaque est arbor. At *Ligustrum* nostrum grana non Coriandro similia habet, ut faciliè ex descriptione nostra proposita conferenti notas cum Coriandro patebit. Nec sanè nostrum *ligustrum*, quod spontè in sepibus & senticetis passim occurrit nascitur in Ægypto. Rectè igitur Fuchs. *Ligustrum* quo nomine Græcis appellatum sit, nondum certò nobis constat, neque enim, ut fecerunt omnes hodiè putant, *Cyprus* est.

Plin. not. Dod. quoque ipsum in hac re aded Plin. reprehendere audens, cum scribit perperam *Ligustrum* eandem arborem esse censere, quæ in Oriente *Cyprus*. Quam censuram mitigans Anguil. *Cyprum*, inquit, quidam volunt esse *Ligustrum* in Italia dictum: verum credere non possum *Conastrello*, quam habemus in Italia esse *Cyprum*: notæ non respondent. Plin. etiam non affirmat *Cyprum* esse *Ligustrum*, quamvis alio loco id asserere videatur. Verum fortè Plinio addita quædam aut doceptus Plinius sibi contrarius. *Conastrello* non potest esse *Cyprus* Plin. l. 12. c. 25. *Ligustrum* Latinorum non negarum. Quæ planta sit *Cyprus* ignoro. *Conastrello* est *Philyrea* ut pater ex descriptione. Hæc ille. Qui existimando *Conastrello* esse *Philyream*, fallitur, de qua mox transigemus.

Ligustrum Eadem ferè & Rob. Const. confirmat his verbis. Quid sit *Ligustrum* siue *Cyprus*, profectò ignotum est his nostris temporibus. In hoc solum Diosc. & Plin. consentiunt, quod uterque dicat esse arborem quæ vel solâ notâ excluditur vulgaris illa planta ab huius consortio, quam nobis pro *Ligustro* & *Cypro* ostendunt Herbarij, quæ fortasse est *Ligustrum* Virgil. non autem *Cyprus* Diosc. aut Plin. *Ligustrum*, imò nec *Columelle*. Hic enim sentex in sepibus maximè communis, vix unquam visus est arborefcere; nos Galli vocamus *du Trœsne*, sed *Cyprus* siue *Ligustrum*, id est, *Arabum Alkana*, arbor rara est, & inter pretiosa

simplicia semper adnumerata.

His ac similibus rationibus motus doctiss. Goropius, *Ligustrum* alterum Veteribus dicere maluit, & aperte ait Virgili *Ligustrum* non intelligendum esse de *Cypri* flore odorato. Sed cur *Ligustrum* alterum Veterum dicit, ubi duo genera *Ligustri* apud Veteres inuenit: sanè nisi id intelligat vel apud Plin. vel hoc nostrum *Ligustrum* ceu alteram *Ligustri* Veterum speciem agnoscat, quid aliud velit nondum olfacimus. Nam, ut dicebamus, præter *Cyprum* [cui aliquoties meminimus] & *Ligustrum* sapius citat, ut in sequentibus patebit, nec tamen hoc idem esse cum illo categoricè affirmat: immò lib. 12. c. 24., ut & l. 23. c. 4. videtur ambigere, utrum ea *Cyprus* sit, quæ in Italia *Ligustrum* vocabatur: dum id ita esse, non ex sua, sed ex aliorum potius sententia pronuntiat. Certissimum quoque diuersitatis nostri *Ligustri* & *Cypri* Antiquorum argumentum producit Porta, ab ipso experimento desumptum: nempe, inquit, *Ligustri* vulgaris folia non capillum reddunt: quare non est *Cyprus* Diosc. igitur primam difficultatem excusimus.

Alterâ difficultas est an *Ligustrum* nostras sit *Alkana* & *Henne Arabum*.

Asserunt Ruell. Tragus, Matth. Lacu. Monachi, Lonic. Brunfels. Bouius, Comes à Neuenar, & Cast. Dur. ac in genere omnes ferè ij qui, nostrum *Ligustrum* cum *Cypro* Veterum idem faciunt, cum Arabes pleraque sua de *Alkana* ex Diosc. cap. de *Cypro* transcripserint. Sed hinc non sequitur nostrum *Ligustrum* esse *Alkanam Arabum*, sed verisimile tantum sit hanc & *Cyprum* Diosc. esse idem. Idcirco fallitur, quisquis ille sit, qui apud Cordum annotauit *Ligustrum* Arabicè dici *Alkana*, *Henne*: Nam ut dictum *Henne* quidem est *Cyprus*, sed non *Ligustrum* nostrum vulgare. Rectè igitur Bellon. *Arabum* interpretes. Dicitur *Henne* seu *Alkana* falso *ligustrum* vertere notæ, cum diuersa sit arbor. Quod verò idè *Henne* siue *Alkana* deferre tradit à *Cypro* aut *Ligustro* Gallicè dicto *Trœsne*, quod hinc *Henne* non deponat folia ut *Ligustrum*, nobis non probatur. Nam cum *Henne* & *Alkana* Serap. sit *Cyprus* Diosc. *Ligustrum* verò nostrum, vel ipso teste, non sit *Henne* & *Alkana*, ne *Cyprus* quidem erit, aut rectè dicetur.

Cæterum cum (ut ex Adu dicebamus) quæ *Alkanæ* nomine importantur lignæ assulæ sint lotæ, satis patet à nostro *Ligustro* differre, si modo veræ & genuinæ sint *Alkanæ*.

Leoniceum carpit Agricola, quod *Cyprum* similem *Ligustro* fecerit, nec se eum sequi, ut ipse met. tamen idem *Ligustrum* facit & Græcis *Cyprum* dictam: ac in eo hallucinatus est, quod similitudinem negauerit, & quod ipse cum plerique idem purarit. Melius igitur fecisset, si melius lectentem secutus fuisset.

Tertia difficultas est, An *Ligustrum* nostrum sit *Philyrea*, ut voluit Massarius, Fuchs. Anguil. Gesn. Euchar. Ruellin, Dod. (qui malè non tantum *Philyream* *Ligustrum* facit, sed & eam, quæ existimatur *Philyrea*, ponit pro *Cypro*.) Sed Gesn. ex aliorum potius, quam sua sententia id dixisse videtur, Fuchs. quoque parum fortè suæ opinioni tribuens iudicium per præudentem lectorem esse voluit. Aperte negant Tragus, Dod. & nos, apertis rationibus mori, quas suo loco trademus.

Baccas, sunt qui velint, dici *Vaccinium*, de quo Vitruu. Archit. l. 7. c. 14. certò affirmat non potest. Sunt qui & *Ligustri* baccas à Virg. *Vaccinæ* vocari putent, sed male, inquit Matth. Non delirant, qui existimant *Ligustrum* esse *Mauritanorum* caprifolium, sed perperam. Sunt qui *Ligustrum*

Synonyma
hæc sunt.

strum dictum velint, a ligando, quod sepius ligandis & muniendis contigit: Alkanna & Henna omnibus fere itis, qui eorum esse putant, ut dictum. Germ. Beinhölzlin / quod lignum ossis instar durum habeat: propter duritiem dicitur etiam, Hartigel, sed perperam, ut notant Tragus, & Hier. Brunch. Berchholz Taber, Aliis dicitur Mundholz / Geisholz: Reinweiden / quod salici similis sit, & Rheno ripa copiose nascatur: Mundweiden / quod oris viceribus medeatur, quamvis Puchl. Ligustrum officinis inusitatum dicat, ut reuera est, potest tamen commodè in usum revocari. Aut tamen Matth. sed male Officinis Alkanna dici, alii Alibanna scribunt) & Mauritius Kenae, alii Chenne scribunt) Henna, seu Hana. Belg. Beclerit, Reinweilgen / Shuenckf. qui Ligustrum inter Silesiæ plantas hortenses refert, ait Germ. Echnweiden dicit Gal. Troscus, Frezillon. It. Herruleis G. Africo, quod libet etiam aliqui Olivetta, nonnulli Olluella, quidam Champrossene vulgò vocant: alii Callostro. A mulieribus & pueris Romæ Fior fiorella Alphab. scribit & Chryseus dicit: Conastrello Patavinis. Hisp. Alhena, Alfenar: Castil. Arbo de Paraiso, aut de Albenar: Portug. Alfenbeyro. Bohem. Practi Job Vngar. fagyalsa. Apud Bolleses in ducatu Wirtemp. Schaarze Hingbeeren vocant. Ut annotavit aliquando Solerius Delphinatibus dicitur sanguin Hana & Provincialibus Minier saunage.

Locu.

Locu.

Nascitur magna ex parte in locis asperis, potissimum vepribus & sepiis, frequens admodum passim Germaniæ, Galliæ, Italiæ. Ad Rhenum abundat. Lob. ait nulli calidiorum regionum hodie deesse, paullo licentiosius: non enim inveniuntur in Ægypto Ligustrum Italicum, teste Alpino ut dictum: copiose provenit etiam in Diocesi Cantabrigiensi ad sepes, & propemodum in omnibus Londini vicinariis. Quin & in frigidioribus regionibus in hortis colunt, eorum leptis & arboribus cingendis accommodata quia tonsilis, & tam floribus quam racemulis tota æstate læta. Floret Aprilis & maio, citius aut tardius pro locorum ratione. Flores tota fere æstate durant, aliis prætereuntibus, aliis emergentibus. Septembri racemuli marurescunt, & subinde per totam fere hyemem restant, non sine singulari utique providentia Dei, præcipuum avicularum famis refugium per seculissimas hyemes futuri. Folia ad hyemis initium durant, postea decidunt, & vere nova repascuntur.

vires & vici.

Temperam.

Aqua f.

Infusum.

Infusum.

Infusum.

Infusum.

Infusum.

Infusum.

Infusum.

Infusum.

Infusum.

Infusum.

Infusum.

Infusum.

Infusum.

Infusum.

Infusum.

Infusum.

Infusum.

Infusum.

Infusum.

Infusum.

Infusum.

Infusum.

Infusum.

Infusum.

Infusum.

Infusum.

Infusum.

Infusum.

Infusum.

Infusum.

Infusum.

Infusum.

Infusum.

Infusum.

Infusum.

netum colorem præstare, quo nomine ab his, qui chartulas luforias, aliasque picturas coloribus variis illuminant, leguntur. Pueri bacculis inficiunt decoctis in aqua, & atramenti loco scriptitant, quod & se aliquando conficere solitum testatur idem: sed pictura in coeruleum quadantenus spectat.

Aqua stillantia, & floribus Ligustri, tradente Matth. potum menses superfluos constringit, utilis adversus hæmoptosium & diarrhoeam. Eadem per se, aut cum Pompholyge in oculos instillata, rubores eorum & lippitudines tollit. Ex floribus conficitur & oleum, quod ad inflammationes vulnerum insigne est, si calidum illinatur: idem dolenti à calore capiti benefacit. Hieme baccis vescuntur aves, præsertim Merula ac Turdi. Ex virgis flexilibus, solida tamen materie, cavæ sunt ad canoras servandas aves, ac virgæ ad instruendos equos. Nullum reperiri posse, in se idem, medicum tam inexpertum crediderim, qui non noverit Ligustrum iis omnibus præstare viribus, quibus pollere scriptum reliquerunt Diosc. & Gal. Atqui Herbario illi [Anguillare] venia danda, quod in noscendis tantum plantis, non autem earum facultatibus examinandis operam navarit. Hæc Matth. ut iam nobis Sciquaristæ quidam esse videatur, qui solus omnia invenerit, vel invenisse somniavit. Sed quæ hæc temeritas, de re sibi incognita statuere, & alios insuper reprehendere, cum ipse potius redarguendus est quod præcipuum illam notâ Ligustri quod Cyprum existimat, non examinat, an eius folia rufent Capil lû, ut docet Diosc. Et vehementer profecto miramur quæ tam audacter ausit pronuntiare de viribus Ligustri, quod ex sua perquisitione vult esse Cyprum quam novit.

Acinos Ligustri contra Phthiriasim & Gallinarum pituitam prodesse, scribit Schuenckf. qui ea desumit ex viribus attributis Cypro: Lectores, poterunt sine periculo experiri an nostrum Ligustrum hæc præstet. Iac. du Fouloux de venat. in cura morbi canum ad dolorem aurium commendat fruticem dictum Troscus qui nihil aliud est, quam Ligustrum. Zehriell in fulmine laudat ad Arthritidem intra mediam horam Oleum florum Ligustri, Veronensis dictum n Conastrello factum ad Solem, aut in Balneo Mariæ, calidè applicatum. Furex, ut dicebamus, apertissimus est sepiementis, propter lentæ & flexibilia vimina, ex quibus reticulato plexu Garyophyllei flores in vasis circumsepuntur à nonnullis, non sine elegantia. Sic & copiaras scenas experitur à nonnullis, quas non inéleganter conuellit. Foliorum succum quidam celebrant ad oris vicera & inflammationes. Nec vires à Matth. traditas negamus, sed ab eo potius efficitur rationabiliter, & aliunde mutatas censemus, quam experimento cognitæ. Ex gustu facile quivis vel mediocriter versatus unicuique plantæ vires probabiliter assignare possit. At pro veris & compertis prodero non item.

Tantò minùs reprehendendi
illi qui id non faciunt, nec
facere volunt, nec
debent.

Diarrhoea.
Lippitudo.
Oleum florum
Ligustri
Infusum
dolor cap.
Animum
causæ
ad causam
causam
ga ad do-
mandat
gaus.

Anguillare

Phthiriasis
& pituita
Gallinarum
Dolor auri-
um canum.
Arthrit.

Latini interpretes Arabes dixerunt Gallorum *Troesne* Latine dictum *Ligustrum*, sed id falsum est, quia arbor *Troesne* differt ab ea. Hanc prouenit ad altitudinem Mali Granati verum sectus, profert tantum tenuis virgis, ut *Salix*. Magnus eius est reditus in *Egypto* [ut dicitur in viribus] propter tincturam. Item alibi: Arbor *Henne*, nascens in *Egypto* alio nomine *Alcanna*, in hoc differt à *Cypro* aut *Ligustro*, quod Galli *Troesne* non narrant: huic enim folia decidunt: *Henne* vero retinet. *Heculle*. Ergo cum *Henne* differat à *Ligustro* vulgari, ut testatur *Bellon.* parer quoque non esse *Cyprum*, cum *Henne* & *Alcanna* apud *Serap.* nihil aliud sit quam *Cyprus* *Diosc.* cuius verba recitat.

Alpin. sequens deprauatam Interpretum versionem, ait esse: *Diosc.* *Ligustrum*: & addit esse *Alcanna* *Auic.* *Cyprum* in *Plinio*, *Egyptijs* *Elhannae* ac *Tamathendi*. *Bellon.* & *Alpini* sententiam approbat quoque *Rauuolff.* additque Graecis communis vocabulo *Sichenna* dici: ex huius radice Arabes vrere *spodium*, ut etiam meminit *Auic.* c. 17. Melius conuenire *Cypro* *Diosc.* de qua *Salom.* in cantico, quam nostras *Ligustrum*. *Figura* suae titulum fecit, *Cyprus* Graecis.

Amatus & *Lacuna* hanc cum *Ligustro* confundunt. Denique falluntur omnes, qui vel *Plin.* non intellecta merite, vel vulgata eius lectione, vel sua decepti opinione consent esse *Ligustrum* nostras, quos in superiori cap. sufficienter refutauimus.

Annotat *Dod.* à Turcis vocari *Henne*: cur vero in eius historia pro *Cypro* ponantur duae icones *Phillyreae* nescimus, nisi *Cyprum* *Phillyrea* putarit, quorundam Recentiorum errorem secutus, qui *Ligustrum* Italicum & nostras, ac ipsius etiam fortasse *Plin.* cum *Diosc.* *Phillyrea* vnum & idem esse existimant. *Cyprus* Graecorum *Hist.* *Lugd.* quae praeter sententiam *Alpini* atque figuram quam habet ex *Rauuolffio* in descriptione sua dicit flores duobus digitis longiores.

Ligustrum huc *Cyprus* *Diosc.* *Porta*: quod è Turcia nobis adfertur, vulgo *Alchenna* dictum, cuius folia contrita, cracea huc ruffa ruffum capillum reddunt, ut idem inquit, non autem vulgare *Ligustrum* *Marth.* Videat etiam *Lector* quae cap. praeced. notauimus de *Alkana* assulis.

Iam ex *Diosc.* dictum optimam *Cyprum* nasci in canope & *Asealone*. *Plinio* *Cyprus* in *Egypto* nascitur. *Bellonio* *Alkana* *Egypti* incolae est, ubi omnibus notissimam testatur *Alpinus*. Speciatim refert *Rauuolff.* *Tripoli* & poriss. in *Cairo* prouenire. Eam *Turcas* & *Mauritanos* propter gratum & suauem odorem *Moscho* similem, quae flores exhalant, diligenter in vasis custodire, & hieme, ne frigore pereat, in cubiculis & subterraneis locis seruare. Et quia tardè noua folia protrudat, nempe *Augusto*, quosdam irrigare aqua sapone infecta; alios radici calceam ad nocere, ut citius floreat. Ad nos multi bacilli adferuntur. Pulvis viridis in instructionibus habetur officinis saecis plenis ex *Egypto* & *Africa* delatis. Onustae naves deuehuntur per *Turciam*, eodem teste. Eiusdem puluerem subtilissimum habemus munere *Valerandi Dourez*, cum inscriptione, *Heculle*. *Bellon.* Est is ex fusco hauescens. Verum cum non semine nobis misit *D. Paladanius* non nunc. *Paleologo* stracemulos inter ceteros, nostra peregrina seruamus à *Cl. Alpino* nunc horti *Parauini* praefecto dignissi non accepta.

Cypri folia, ex *Diosc.* astrictoria vim habent: quae oris vlcera comanducata medentur, & illa tum feruidis alijs inda nationibus, tum etiam

carbunculis prosunt. Eorundem decoctura igni ambustis applicatur. Ruffant & capillos trita, & illigata folia, huc in *Struthii* succo maduerint. Flos ex aceto tritus & fronti inductus capitis dolores sedat. Ceterum quod ex eo praeparatur *Cyprinum* vnguentum, odoratum est, ac neruos exaltat & molit: siquidem feruenti natura praedictorum medicamentorum misturam recipit. *Plin.* *Cyprinum* oleum vocat, quo autore, exaltat, molit neruos. Folia stomacho illinuntur: & vulgæ concitant, [si sanguinem emittenti vel procidenti] succus quoque eorum apponitur. Folia recentia comanducata, vlcibus in capite manantibus, item oris, medentur, & collectionibus, condylo natis: Decoctum foliorum ambustis & luxatis prodest. Ipsa ruffant capillum rufa, adiecto *Struthii* mali succo. [Fallitur *Plin.* ex eadem vocis homonymia: sed non habet. *Diosc.* De *Struthii* herbe seu *Lanariae* succo, non *Struthii* Mali intelligendum.] Flos capitis dolores sedat cum aceto illipus. Idem combustus in quada olla nomas sanat, & patrescentia vlcera per se & cum melle. Olor doris olet, qui somnum facit. Succus *Ligustri*, seu *Cypri* eodem teste neruis, articulis, algoribus: folia vbique, vtrique vet. veteri vlceri cum salis mica, & oris exulcerationi prosunt. Acini contra *Phthiriasin*, item contra intertrigines, foliaue. Sanant & gallinaceorum piritas acini. *Cypri* arboris folia, inquit *Gal.* summaque germina in usum veniunt, & facultatis sane ac qualitatis maxime mixtae: habent enim quiddam digerens cum aqua substantia, modicè calida: habentque etiam astrictorium quiddam ex terrena substantia frigida. Itaque eorum decocto quidam ambusta fouent. Utuntur vero etiam aduersus igneas phlegmonas & carbunculos. Nam absque molestia & morbo deficiant. Quinetiam sponte prouenientibus in ore vlcibus, aphthodell, & ipsis puerorum aphthis comensa accommodata sunt. *Paulus* in viribus hoc amplius quam *Diosc.* *Cypro* tribuit, ut aptè remediis his miscatur, quae ad lienem conficiuntur: quod demum alius, inquit *Marcell.* nisi quia molit *Ligustrinum* vnguentum, durato *Lieni* idè accommodatum sit. Nec mirabitur, ut dicebamus ex *Plin.* aduertet, calida quoque medicamenta recipere, quae vtrique vim habent aperienti & discutiendi, praeter vim remollientem, quam habet. *Serap.* praeter ea quae *Diosc.* & *Gal.* habet, addit, in muliebribus affectibus idem praestare, quod sanguis draconis. *Cypri* florem *Plutarchus* putat collis intorquendum, quod placidum suauemque somnum potioribus accersat, quippe qui lenata auram & mitem expiret, quae remulentorum salubrosas asperitudines sensim leuiget, ita ut conciliata tranquillitate hebes crapula retundatur, & caloris officio percoquatur. Folia madentia & igne discutiunt (ut ait *Cellus*) ea, quae in aliqua corporis parte inhaerent. Vnguentum è *Ligustro* *Alexandro magno* misit *Abdelonymus Sicyonius*, ut scribit *Pollux.* *Auic.* tradit, quod si quis hominem tinxerit *Ligustro* quod producit florem album, *Alchannam* vocat ipse, cum misturam vrinam nigram: Sed durum est credere, id euenire ex illitione externa, nec apud vltum alium id legimus. Certum quidem est, apud *Turcas* admodum consuetum esse illitionem ex eo. Attamen de ea re nihil haecenus accepimus: nec verisimile est. Magni porro *Egyptijs* (ut scribit *Bellon.*) ex *Cypro* reditus: folia enim resiccata in puluerem redigunt ad tincturas flauas. Ex eo in *Turcico* imperio censetur bono ducatorum superat. Quam late etiam patet *Turcia*, consuetum feminis hoc

Oris Gule.
ra. Inflam-
mationes.
ambusta.
Capillorum
tundura
Cyprinum
Vnguentum

Struthius,
Menjer.

Luxata-

Plin error.
Cap. dolo.
Noma. Ph-
tera pueri-
da.

Contra ph-
thiriasin.

Tepetam.

Ambusta.
Inflam-
mationes
Carbunculi.
Oris Gule.
Aphtha.

Lien.

Noma.

Auic. not.
Magni
dunt
Cypro.

puluerem manus, pedes, partesque pilosas flauo rufoque colore tingere, viris verò eodem vngues rubere: additoque alumine capillos pueris tam matribus quàm femellis inficiunt: nec non equis pilos, pedes, muscarum. Regionum illarum feminis decorum habetur, femora, epigastrium, partesque pudibundas flauo colore tinctas habere, id quod hoc puluere efficiunt balneo egressi. Tunc enim tinctura facilius imbibitur. Tantis verò est eius usus, ut non solum Turcis familiaris sit, verum etiam in Daciam & Bosnam exportetur. Sæpe fit ut Alexandriæ naues hoc solo onustæ Constantinopolim appulsæ derepentè faburræ diuendant. Vtuntur & ad alias res aureo colore tingendas, ad quem usum magna sunt eius in Ægypto commercia. Flores apud eodem, auctore Alpino, sunt in usu frequentissimo dolenti capiti appositi, non tamen cum aceto, ut Diosc. atque alij meminerunt: quod si fecissent, manifestius, ut arbitror, ijs floribus iuuarentur, intus medicamento vi, aceto penetrationem adiuuante, deducta. Ex folijs puluerem confectum, quem *Archenda* vocant, ad ruffandos ornatus gratiâ capillos, nō succo Lanariz vel Struthij, ut ait Diosc. sed simplici aqua miscentes, aquam auream faciunt. Ex hoc puluere cum aqua mulla parato Emplastro vtuntur ad humidos pedes, fluxionibus obnoxios, ac multum exsudantes ferentelque pedibus ipsis appolito, ac per horam retento: maximè enim pedes, & quasunque alias partes corporis appolitus pulvis exsiccat ac adstringit: nihil enim habent Ægyptij, quod exsudantes pedes plus exsiccat, quàm prædicta isthæ massa apposita & aliquandiu retenta. Puluere etiam hoc ad Vlcera oris, gingiuarumque & pudendorum maximè vtuntur. Vfus bacularum, ut refert Rauuolff. est, si contendantur extrema earum ad absterisionem dentium, si affricentur. Idem folijs pulueris & mixtis cum Citrij succo scribit tingi rubro colore vngues & crines puerorum, qui color videtur interdum apud nos in crinibus equorum Turcicorum.

Daler capiti.

Pulvis Archenda.

Aqua aurea Emplastrum.

Ad humidos & fæcetes pedes.

MOLLE.

CAP. XVI.

Descriptio.

Folia.



compressa nalli, gatis, per ambitum equalibus, tā-

Molle prope arbor & patula, (ut à nobis visa in horro magnatis alicuius, Romæ, à Coruino industrio pharmacopoeo culta) folijs Lentisci longioribus muled, angustioribus, acuminatis, læuibus, obliquis venulis a nervo per longum decurrente expositis, coniugatis ad costam latusculam

tillum nonnunquam per extremum serratis. Flores peculiari ramulo turculo hærent, numerosissimi, perpusilli, stellati. Virgineis patet, quos baccæ excipiunt, Alparagi baccis ferè paræ, ac similes, pingues, rugosum ossiculum nucleatum continentes, sapore & odore baccarum Iuuperi, acris cum amarore aliquo.

Clusius suo *Molle* folia tribuit serrata, quæ ab arbusculis reuulta, lacteo succo, coque leno & viscido & odorato manant, & ipsa folia grata Fœniculi odorem reddunt, gustataque adstringentis facultatis nonnihil habere videntur. Trunco erant arbusculæ, [adhuc tenellæ] ex viridi nigricante, multis consperso veluti maculis cinereis. Idem *Molle* suum, quem ad serrato folio describit, ita etiam pingit, vnde nos folia tria ex summitate auulsa mutuati sumus: reliquam figuram ex nostra sicca planta, folijs non serratis, aut saltem crenâ vnâ aut alterâ per extremum donatis, delineandam curauimus: fierique potest ut nature lusus sit, quemad. in Sorbo aucuparia adolescente & adulta obseruamus.

Lob. quoque nouellas plantas profunde crenatas ait.

Porro est nobis Resina Ill. E.C. Wittenb. à D. Paludano mulla, Gummi *Molle* arboris nomine, ceræ depuratæ instar, lenta, alicubi nonnihil friabilis, flauescens undique, odore pingui, resinoso & aromatico, vehementi, quæ candellæ admodum clarum incendium exardescit liquefcitque, manducata non adhærescit, sed lenteicens magis magisque colorem album contrahit, sapore satis grato, obscure amaro. Et sanè magnam habet similitudinem cum eo, quod in Oñe. prostat nomine *Gummi Elemi*, nisi quod paulò videtur candidior. Peritiores rem omnem diligentius perpendant. Hanc resinam ex arbore iam dicta, Romæ visa, detractam habemus dono eiusdem Coruini.

Videtur & Petrus de Osma apud Monar. ut sentit Clus. *Molle* describere, quando in epist. quadam ait: Fructus arboris cuiusdam, illicis magnitudine, cortice Cetri Ægyptijs simili, folijs Fraxini. Eiusdem descriptionem Petrus Cieca dat cap. 111. primæ partis Chronici. Sed quando Lob. *Molle* Clusij vocat, & addit, eius semen & herbam à D. Brancipon communicata, credere visus, esse herbam quam tamen scire debuit, vel ex alijs, esse arborem. Sed deceptus forte fuit vocis homonymia: non enim *Mollis* arboris erat illud semen & herba, sed herbæ Mimolæ, quæ etiam dicitur *Molle* herba: de qua suo loco.

Apud eundem lib. de Balsamo, Carpobalsami species eximie odoris fragrantia, cuius fructus apprimè quadrare videtur cum Galenico & Antiquorum Carpobalsamo: eoque merito Carpobalsami species censendus. Eius iconem proponit, & annotat, *Mollis* arboris amolæ frondes extremas prominentes nullis incisuris diuisas aut serratas esse. Ibidem *Molle* seu *Milly* vocat, eiusdemque trimestris & quadrimestris eligiè habet.

Io. Fragol. Medico & Chirurgo regio de rebus ex Indijs importatis Hispanico Idiomate conscripto libro, Arbor *Mollis* seu *Muelle* cuius folia referunt Fraxini folia præterquam quod angustiora & minutiora, aliquantulum crenata vertus terminum: Gummi albidissimum, Mannam referens: Hæc ille.

Huius Carpobalsami, id est *Mollis* fructus rufi & extrelli liquor, eo modo paratus, qui dicitur, in aquam iniectus & agitur, ut scribit Clus. celticæ liquatur, diluitur & lactis modo albescit quibus notis à Diosc. Syncetum Balsamum à vi-

Flores.

Bacca.

Liquor.

Folia.

Gummi.

Molle.

Elemi.

Resina.

Arbor.

Elemi.

Cortex.

Herba.

Molle.

Carpob.

Elemi.

Molle.

Milly.

Molle.

Muelle.

Balsam.

Elemi.

Vi-

riato coarguitur: Vnde colligere licet, *Mollem ar-*
boris esse veri Balsami speciem. Sic Lob. sentit.
 Verum quia ipsa arbor nulla ferè in re ad Balsa-
 mi descriptionem accedit, cur ex ea sola nota &
 odoris suauitate ex fructu seminisque magmate
 expresso laticis Balsami veri & genuini species
 censenda sit, nulla adhuc occurrit ratio. Sit qui-
 dem liquor Balsamodis & odoratus: an ipsam
 proinde arborem multum à Balsami veri frutice
 diuertam eius speciem dicemus? Sed odoratam
 tamen laticem *Mollem arboris* melius dixerit Balsa-
 mi similem liquorem quam *Mollem arboris* veri
 Balsami speciem.

Mollis & *Lentiscus* Peruvianus Cast. Durantis,
 cuius figuram habuisse ait ab Odoardo Lopes
 medico quæ sanè multum differt à Clusiana & à
 nostra.

Locus Abundatè nascitur in conuallibus & locis pla-
 nis Peruanæ regionis, ut referunt omnes, qui Oc-
 cidentalium Indiarum descriptionem dederunt.
 Eius arboris pusillas duas plantas vidisse testa-
 tur Clusius horto splendidissimo Ill. viri D. Ioan-
 de Brancion, sed quæ tertio anno perierunt hyemis
 iniuria. Annotat Lob. enatam ex semine in An-
 glia, ut Londini. Camerario satis sequenti vere
 exaruit, cum tamen magno studio ab eo fuisset
 asseruata: liquorem ubi folia decerpebantur,
 emittebat lacteum, odoratum admodum.

Tempus Romæ, ut dicebamus, proceram arborem ob-
 seruauimus in horto quodam à D. Coruino phar-
 macopeo Romano peritissimo culto: Mai initio
 nondum floruerat, vix ante finem eius floribus le-
 ta futura, ut iudicabat nobiscum idem Coruinus
 quo tempore tamen alijs citius florere referebat
 Vere calidiori. Ex eadem tamen arbore pul-
 chros ramos, quales pictura ostendit ex parte, cum
 floribus & bacis dono accepimus ab eodem: Mi-
 sit ad nos baccas recentes, ut putabat, Doct. Casp.
 Bauh. quæ tamen frustranea spe satz Montbel-
 gardi.

Viridis & vltus. Refert Clus. ex Petro Cicea, *Molle* cortice a-
 deo commendato esse, ut eius decocto crurum
 dolores & inflationes summa cum utilitate so-
 ueantur. Ex ramulis sunt densifolia vilissima
 Ex fructu cum aqua decocto, pro cocturae modo,
 fit aut vinum, siue potio admodum bona, aut ace-
 rum, aut mel: tantoque in pretio sunt apud Indos
 hæc arbores, ut quibusdam locis eas consecratas
 suis Idolis habeant: addunt nonnulli eius arboris
 foliorum decoctum, doloribus ex frigida causa
 ortis auxilio esse. Gummi verò eius, quod Man-
 nat modo candidum esse tradit, lacte dissolutum,
 caliginem oculorum abstergere. Coruinus, qui
 nos eiusdem Gummi participes fecit, testatur
 eius drach. vnam & semis, egregie aluum eiere,
 sequæ experientia vim eius cathartica cognouit-
 se. M. Eumec in hist. Ind. gen. quoque testatur ex
Mollis arboribus fructiferis fieri mel, & potio-
 nem. Notat Cardanus huius corticem adeo salu-
 tarem esse, ut si aquæ incoquatur, soluat lotio il-
 la lassitudines ac tumores: ramuli pergit idem,
 gingiuis ac dentibus utiles sunt: cum eis dentes
 fricantur, purganturque: Fructum, quem fert exi-
 guum, si iniicias aquæ, sola coquendi diuersitate,
 mel, vinum & acrum facit. manifestum est au-
 tem, prius vinum fieri, quam acrum: mel verò
 dulcedine vinum præcedit, crassitie subsequetur.
 Monardæ quoque teste, magnis viribus pollet hæc
 arbor: nam corticis eius puluis vulneribus ins-
 persus, ea mundat, deinde carnem generat, & per-
 fectè curat. Dentes eodem puluere fricati, stabili-
 untur, gingiue abscedentes sanantur. Foliorum

decocto intincti pannus, & calidi vulneribus, aut
 puluere corticis illius insperso impositi, curatio-
 nem eorum accelerant, & humorum eò defluxum
 prohibent. Ex ea manat liquor odoratus, qui fru-
 ctibus adiunctus, siccitibus idoneus est ad mul-
 tos capitis morbos, & ad Emplastrum. Eius quoque
 potio, quam ex fructu parant Indi saluifera ad-
 modum est. Ipsa arbor quini tempore odorata est.
 Scribit Io. Fragos. Corticem eius tantum viri-
 um esse, ut crurum dolores, tumoresque ingentes
 (si eius decocto aliquoties lauentur) breui ollat.

Mollis arboris fructus, inquit Lob. Carpo-
 bal-
 samum verum virtute longè superat, tum expres-
 sus ex fructu liquor vero Balsamo viribus quam
 proximè accedit, eiusque defectu conuenientis-
 simum erit succedaneum. Huius fructus vnciæ
 octo rusæ drachmas septem præstantissimi & viri-
 lissimi laticis, artificiose rotularis pressu, sului
 ex atro coloris, crassamenti quorum olei ferè &
 diuini fragrantia, simillimi ipsius seminis odoris
 inter tundendum, & saporis Xyloaloes optimæ
 notæ, nobis dedere. Hic liquor recens expressus
 albescit & spumat: in laneam vestem sulus, &
 simplici ablutione aquæ lotus, notam non relin-
 quit. Ex magmate seminis iterum tuso, & panca
 rosacea asperso, pressu forti, laticis vnguinosis
 resinacei, instar grani Iuniperini drach. duas
 eliciui, qui maculam non relinquit: quin etiam in
 aquam iniectus & agitur, celerrimè liquatur,
 diluitur & lactis modo albescit. Quibus notis
 colligit idem *Mollem arboris* esse veri Balsami
 speciem, de qua re prius.

MOLLIS ARBORIS RESINÆ SIMILES, FOENICVII ODORI.

CAP. XVIII.

D Onabat mihi honestus vir Petrus Garerus [in-
 quit Clus. Exot. lib. 4. c. 3.] succum octauum,
 quem acceperat ex nauigatione longinqua anni
 1600. Erat densa resina, nec transparens, foris
 subrufa, inferiore parte alba, & digitis aterita
 satis friabilis, odorisque non iniucundi, sed fœni-
 culi odorem quodammodo referentis, ut suspicio-
 nem mihi moueret *Mollis* Arboris resinam esse
 posse, sapor erat amariusculus & acriusculus:
 nec dentibus cedebat, nec ore retenta mollescebat
 igni tamen admodum liquecebat instar cere, atque
 splendida fiebat, flammam tamen non concipie-
 bat.

Nonus verò, Resina erat cineracei ex albo co-
 loris, adeo autem strigosa & retorrída, ut gleba
 aut lapidis fragmentum potius videretur, quam
 resina: licet quispiam suspicari posset eiusdem
 generis esse cum superiore, sed magis impuram,
 quia simili odore & sapore prædita erat cum ea, nec
 dentibus cedebat, nec ore retenta mollis fiebat,
 igni tamen admodum perinde atque illa liquecebat,
 & flammam non modò concipiebat, sed simul
 etiam ardebat.

ELEMI RESINA.

CAP. XIX.

G ummi Elemi in massas cylindræas cogitur,
 quas pollice & medio digito complectaris,
 duarum palmarum circiter longitudine. Substan-
 tia verò est ferè vniiformi, ceræ flauæ & colore

Calculus.
Vulnere.
Cere pueri.
Tumores
pudendo-
rum.

eius verba explicamus, quibus ait conferre ad cal-
culum renum. Radicis pulvis vulneribus inspet-
sus, carnis excrecentiam & putrilaginem cohibet
& adimit, & efficaciter cicatricem promouet. Ad
pudendorum tumores in emplastrum cum oleo
ros. concinnata folia eos tollunt absque noxa. Ra-
dix cum Aniso & Fœniculo pari doli puluerisata,
addito saccharo, & ieiuno quantum cochlear ca-
piat sumpta, certo remedio est flatibus & colicis
doloribus, inquit ille: in quo sanè circumforaneo
empiricis similior videtur, quàm rationali Medico:
Nam cum terra tetrestrem, frigidam, & adstringen-
tem, cum calidis, & discutientibus commiscet, qua
vi flatus carminare, & colicos cruciatus putat
compescere id, quod temperamenti sui ratione
nihil minùs præstare, fortè etiam citius causare
possit? Abeat ad Scholas, ad Scholas, inquit ipsam
potius rei naturam, optimam & fidissimam medi-
corum scholam, & melius discat, rerum tempera-
turas in vsus dispensare, volgòque credulo vanis
suis pollicitationibus imponere.

Scribit Marth. Germanos Pharmacopœos bac-
cis passim uti Myrti baccarum vice, cum iis desti-
tuantur: quinetiam æstate edi fragorum vice à
Pastoribus & aliis, quod gustui placeant. Peculiariter
autem iis vtuntur Intectores ad Inficienda lin-
teamina & chartam coeruleo colore, ac etiam à
Pictoribus. Succus cum alumine & Galla coctus
eleganti coeruleo tingit chartas. Linteamina co-
dem colore ita tinges. Ollæ huius succi plenè
affundes poculum aceti vini, aluminis puluerisati
unc. j. squammæ æris itidem in puluerem redactæ
drach. ij. bulliant vna: tum retenti decocto im-
merge lintea: siccetur in aëre, demum frigida a-
qua laua, & pereleganti coeruleo tinctum habe-
bis. Si dilutius uelis, omitte squaminam æris: si
saturatius, etiam plus addes. Sic docet Lemicærus.

VITIS IDÆA SEMPER VIRENS, FRUCTU RUBRO.

CAP. VII.

Descriptio.

Folia.

Flores.

Bacca.



R Amis hæc
fruticat
dodrantalibus,
rotundis, non
angulosis, quos
vestiunt folia
satis frequētia,
crassiora quàm
Vitis Idææ an-
gulosæ aut ma-
gnæ, oblonga,
modò per ex-
tremum rotun-
da, modò leui-
ter acuminata,
non serrata, in
quibus nervi
subtus potissi-
mùm apparent,
gustu alstringē-
te & amarican-
te. Flores ra-
cematim co-

hærent in virgularum extremis Liliij conuallium
floribus similis albi, interdum blandè rubentes:
quibus delapsis bacca similiter racinose suc-
crescunt, sex, plùs minùs, racemulo vno, Pisi mino-
ris magnitudine, ex albo luteoq̃ue rubentes, sapore

acido, valdè iucundo, carne simili Vacciniis palu-
stribus, cui innumera grana paruula lutea. Radix
obliqua ferè, tenuibus capillamentis fibrata.

De hac, ni fallimur, scribit Camer. Epit. Matth.
his verbis: Vitis Idæa rubra, nonnullis Rhus mi-
nimus Plin. Germ. Rot Heidelberg, Steinbeerling,
Bronbeer: Gal. Aareles rouges. Suffrutex est exi-
guus, foliis Buxi, interdum leuissimè ceu serratis
marginibus, flosculis Arbuti, candidis, confertis,
ex quibus Bacca rubentes in summitate, ceu coro-
na quædam, denticulatæ nascuntur, sapore acidæ
& alstringentes. Radix tenuis serpit.

Angul. Epist. 5. Vna Vrsi Galeno dicta l. 7. de
comp. l. loc. c. 4. Arctostaphylos hodierna die in
Appennino vocatur adhuc igna del' vrs. Hanc idè
à Theoph. appellatam Vitim Idæam censet. Inue-
niri ait in omnibus Italiæ montibus, vbi niues. Ga-
leni verba cap. sequentibus trademus. Hanc autè
potius suspicamus ab Angul. dici vnam vrsi,
quàm præcedentem, conferendo eam cum Gal.
descriptione.

Gesl. scribit Vitis Idææ speciem esse, acinis ru-
bris Coldenber. Vaccinia rubra: pingi à Dod.
bis, altera icone meliore: acinos acidiores esse,
sine umbilico. At nos apud Dod. vnicam tantùm
huius Vitis Idææ iconem inuenimus, quæ pla-
cet: nobis etiam gratiores videntur bacca: Prior
apud Dod. quæ duplicet est Vitis Idææ angulosæ.

Vitis Idæa buxæis folijs nec deciduis, baccif-
que rubris Clus. quamuis minùs benè simpliciter
Buxea dicat: id potius conuenit sequenti plantæ,
quàm Radicem Idæam suspicamus.

Vaccinia rubra Herbarior. & offic. Myrtillos
dicunt Aduers. vt & præcedentia: an Idæa Radix
sit dubitant: ac tradunt fruticem lætiore & habi-
tione aspectu semperuivère: non perinde vt nigræ
frequenter, nec tamen nigræ dissimilia folia,
sed paulò maiora & ad Myrtum albam siue maio-
rem, & Rhus Plinianum accedentia, rotundiora:
Bacculas nec dissimiles, sed rubras, alstringentes
magis, nec perinde succulentas ferre. Radicem æ-
què lignosam fibris serpere Erica ritu. Flores ex
oblongis calyculis paruulis subpurpureis apiculos
è medio exerere. Sed ista descriptio Aduers. Vac-
ciniorum rubrorum non placet: folia namque
nobis videntur valdè dissimilia, & ad Myrtum
vel Rhus nullo modo accedere.

Iconem certè non spernendam proposuerat Dod.
in Hist. Gal. quam etiam retinuit in postrema.
vbi notat Gesnero Vitim Idæam rubris acinis di-
ci, sed multò minùs quàm nigram cum Idæa vite
hanc conuenire, ipsarum baccarum exortus ostē-
dit. Non enim ad latera Cauliculorum, veluti ni-
gra, sed è ramulorum cacuminibus, Corymborum
mitat, dependent.

An Cam. b. vt. Vitis Idæa vulgaris. An Thal.
Vitis Idæa seu Vaccinia rubra Dod. Idem Tha-
lius refert, hanc stirpem olim Aemilium existi-
masse esse Rhus Plin. minorem. Vulgò Bran-
beer dici: Noricis Rote preßelbeer / quorum Sil-
uæ hoc frutice refertissimè sunt. Belg. Roote
Crakessien, teste Dod. Red Ropertes or Whor-
tle, Anglis.

Vaccinia rubra Gerard. qui figuram habet ex Ta-
ber. quæ posita erat pro vite Idæa maiore, à qua
Vitis Idæa fructu rubro multum differt. Vbi au-
tem Taber. ac etiam Tragus de hac scripserint,
nescimus, nisi fortè sub Chamæbuxo, vt monui-
mus Cap. de Radice Idæa.

Schauenckfeld. in suo Catal. Siles. varia nomina
diuersa imponit, hæc: Vaccinium rubrum, &
maius: Vitis Idæa rubra Marth. [sed vbi?] Erica

Radix.

Vitis Idæa
rubra
Rhus mini-
mus Plin.

Vna Vrsi
Gal.
Arctostaph-
ylos.

Vitis Idæa
Vaccinia
rubra.

Clus. not.

Aduers. not.

Gesl. re-
preh.

Rhus Plin.
minor.

Gerardus
not.

Schauenck-
feld. not.

Erica baccifera latifolia Taber. Vva vrsi Anguil.
Rote beydelbeer/ Rote preußelbeer/ preußelbeer,
Rausch Taber. sed an sine confusione, ipse vide-
rit & Herbatum petiti.

Locus.

Gaudet & hæc locis siluosis, saxosis ac opa-
cis: itemque alpinis: Monte tracto Heluetic:
Item in similibus Brabantia locis. Copiosissima
circa Wernigerodam in Brockenbergo & vicinis
montibus. Item circa Walckenridam, Gerenro-
dam, aliisque locis quampluribus, teste Thilio.
Vastis etiam siluis circa Boleslaniam & Laganum
Silesia plurimum: Schuenckf. Nobis vero obser-
uata in cacumine montis Rossberg prope Meso-
comium tractus Alfarici Octobri pulchre virens,
cum angulosa folia decidissent fere omnia. Hanc
semper virere existimamus. Item in monte Ballon
Lotaringia vicino, cum Vite Idæ angulosa, & al-
lia fruticosiore siue magna. Augusto iam racemu-
los gerebat, sed tum primum baccæ nonnihil in-
cipiebant maturescere, cum aliarum iam dicta-
rum omnino essent maturæ: unde patet serotinam
magis esse. Communiter etiam sub Abietibus at-
que piceis crescere videas quod & Camer. annota-
uit. Floret Maio & Iunio. Septembri demum
perfecte maturatur. Cum baccæ sint acidæ ma-
gisque adstringentes cæteris, nec perinde succu-
lentæ ut Myrtilli, facultatem utique frigidam sic-
camque habebunt, quam & Dod. aliique ipsi tri-
buunt. Quapropter ad eos usus, ubi adstrictione
opus accommodari posset. Hinc usus eorum in
Dysenteria non contemnendus: item in diarrhoea,
& superius dictis affectibus plerisque. Quæ verò
ratione pulvis ex acinis aridis exhibeatur calcu-
losis, ut scribit Camer. & repetit Schuenckf. nec
nouimus ipsi, nec facile declarabunt isti. Possis &
ex hatum succo Rob conficere addito saccharo
aut melle, ad viscerum calores & sitim in febribus
calidis. Quidam ad *in Cuiusda* commendant, addi-
tis aromatibus. Foliorum usus ob adstrictionem
idem esse possit, qui precedentium.

Tempus.

Vitis & vras.

Tempus.

Camer. & Schuenckf. feld. etc.

Feld. etc.

Feld. etc.

Feld. etc.

Feld. etc.

Feld. etc.

Feld. etc.

Feld. etc.

Feld. etc.

Feld. etc.

Feld. etc.

Feld. etc.

Feld. etc.

Feld. etc.

Feld. etc.

Feld. etc.

Feld. etc.

Feld. etc.

Feld. etc.

Feld. etc.

Feld. etc.

Feld. etc.

Feld. etc.

Feld. etc.

Feld. etc.

Feld. etc.

Feld. etc.

Feld. etc.

ramis lignosis, pedalis, cortice tenui & facile
cedenti testis. Flores racemosi, concavi, rubri. Flo.
Fructus ut in Vite sempervirente racemosus in ex-
tremis ramulorum. Quæ de radice Idæ Diosc.
& Plin. scripsere, annotata sunt postea, quibus
bene consideratis fortè erit, quod monet Fab. Co-
lumn. *Bonifata*, siue *Bislingua*, cum qua melius vi-
dentur conuenire, quæ Veteres de ea scripserunt:
Ab aliis positam plantam dicit nullam cum rusteo
habere affinitatem.

Valerandus Donrez, sagacissimus aliqui stir-
pium vestigator ac censor olim putabat Vaccinia
rubra Dod. & Myrtum montanum Cordi esse hanc
ipsam: sed ut tempore & hominum cura omnia fi-
unt clariora, ita & in aprium data, in opacis alio-
qui delitescuntium suffruticum distinctiones a no-
bis proponit.

Quum verò Tragus Vitis Idæ rubræ non me-
minerit cap. de suis Myrtillis, licet coniectari eum
de hac scribere, aut certè de Radice Idæ his ver-
bis: In altissimis Walgouia siluis non procul à Cæ-
sareo Luthro humo arenosa, exigua stirpis species
Erica haudquaquam maior reperitur. Hæc folia
habet Buxo aut Myrtillis quàm simillima, humi-
que magis procumbit, quàm in altum sese attollat.
An verò ea Chamæpyxos fuerit, ait se affirmare
non ausum.

Considerandum an eadem sit Vva Vrsi Galeni
apud Clus. quam scribit fruticare pedalis fere
ramulis flexilibus & lentis, humi diffusis, rubes-
cente cortice testis, ut teneriores Arbuti ramuli:
folia illi frequentia, Arbuti folijs minora, carno-
sa, Chamælex Italica foliorum planè æmula, mi-
nimè tamen hirsuta, cum attritione amaricantia.
Extremis ramulis flores proferte ex candido pur-
purascentes, siue candidos, quibus leuiter purpu-
rascent color admixtus sit, cauos, Arbuti floribus
similes, & vix modo simul congestos: fructum
non vidit: sed incolæ rubentem, rotundum, exigui
cerasi instar acidum referebant. Radicem paruum
sed lignosam. Perpetua fronde virere. Peritiores
quidam Hispani, quibus eam ostendebat, Chamæ-
daphnen esse existimabant, crassitudine foliorum
procul dubio decepti.

Clusio verò ad amissum quadrare videtur
causam quam Gal. lib. 7. c. 4. *quædam* sic describit:
Vva Vrsi in Ponto nascitur, planta humilis & fru-
ticosa, folio memæcyli, fructum ferens rubrum,
rotundum, gustu austerum. Sed icon Vva Vrsi
Clusij nobis scrupulum iniicit, an eadem sit cum
Radice nostra Idæ, in qua non apparent nerui
transuerti ut pinguntur in Clusij icon.

Lob. cum Pena obscure admodum de his plan-
tis scripserit, ut apparet ex eorum Aduers. ubi ajūt:
Alpigena Chamærhodendros odora, frutex, flore
purpureo, pinguis tota &c. Alpina *Alprofen*: Bac-
culas Asparagi vel Taxi pares & concolores, Septe-
briedit. Et in Obs. Genuina Vva Vrsi Galeni apud
Clus. eadem videtur cum Alpigena Chamærho-
dendro exhibita in Obs. p. 199. & Adu. p. 154. cuius
flores Arbuti simile, sed ex candido purpurei aut
candidi compinguntur. Hæc Lob. qui figuram
eandem habet cum Clus. Is pagin. Obs. prædicta
figuram habet aliam cum bacculis lateralibus, & nō
in extremitatibus, his titulis: Alpigena Chamæ-
rhodendros odora Aduers. p. 154. Balsamum Ita-
licum vulgare, siue Rhododaphne parua rusti-
ca: Terignarcha Plin. putata Guilandino. Sed Lo-
bodium diuersa nomina, plantas & icones confun-
dere clare patebit rem ipsam, cuiusque, & Clusij ver-
ba considerant. Nec scimus an extet aliqua Cha-
mærhodendros odora baccifera. Si extet grati

Vaccinia
rubra
Myrtum
montanum.Chamæpyxos
xviAn Vva Vrsi
Galeni ex
Clusio.

Chamædaphne.

Arctostaphylos.

Descriptio
Gal.

Chamærhodendros.

Vva Vrsi

Chamærhodendros
Alpigena
Balsamum
Italicum
Rhododaphne
Theriacale
Lob. error.

RADIX IDÆA PUTATA, ET VVA VRSI.

CAP. VIII.

Descriptio.



Vitis Idæ
rubræ affi-
nis est quam
Radice Idæam
Diosc. vocant, à
qua tamen ma-
nifestè differt:
Siquidem folia
habet dentata,
ad Buxum acce-
dentia, ex obli-
quo rotundata,
angustiore ad
pediculum cer-
uice, utrinque
rugosa, nec ner-
uos, ut illa, præ-
ter vnicum, qui
secundum lon-
gitudinem de-
currit, exhiben-
tia, quamvis pi-

lor perperam quasdam propagines laterorum
appinxerit, gustu cum amatore adstringente,
quemadmodum Vitis rubro fructu. Merent autem ea

erimus erga demonstrantem.

*Hist. Lugd.
Theophr.*

*Radix Idææ
Therionar-
cha.*

*Præa bac-
særa latif-
olia.*

*Tabern.
mor.*

Chama-

*C. Bauh.
Lent.
Vaccinia
Vrsi.*

Locus

Tempus

visu.

At *Hist. Lugd.* more suo duas vel tres confun-
dit, dum vni huic diuersarium stirpium hæc nomi-
na tribuit: Idæa radix, siue Idæa vitis species: Dod-
Vaccinia rubra: Clusio Vua vrsi Gal. Italica Rhodo-
daphne parua rustica: quibusdam Balsamum Itali-
cū vulgare: Therionarcha Plin. Idæa radix Diosc.
Plin. Gal. Tam egregie Chaos istud stirpes digerere
consuevit.

Tabern. proponit figuram Ericæ bacciferæ la-
tifoliæ nomine, quam & *Rausib* Germ. vocat, sine
descriptione, quæ exprimere videtur nostram
Idæam radicem. De *Vua vrsi* quam idem ex Clus.
habet, iam diximus nostram sententiam. Chamæ-
rhodendron Alpinam latifoliam & is sanè con-
fundit cum Ledo Alpino: Figuram etiam
proponit Lobelianam, cuius nœuos iam de-
teximus. De Chamæpyxo eius idem dicimus,
quod de Tragi Chamæpyxo, nobis videri eo
nomine tradi Vitis Idææ speciem, cuius iconem
si quis consideret, fortè suspicabitur potius
accedere ad vitim Idæam rubro fructu, quam
ad Radicem Idæam. Rem Lectoribus consideran-
dam relinquimus. Quicquid sit, cum D. Casp. Baulino
Botanico veratissimo existimamus non
esse ex genere Buxi.

Gerard. quoque Chamærhodendros alpigena
dicitur: Angl. *Smearffe rose Baie*: Item Vaccinia
Vrsi siue Vua vrsi Clus. *Beares Wesortle berries*.

Ceterum *Vua vrsi* Clusio non nisi vnico loco
nascentis visa arido solo & aprico, via regia in colle
imminenti cuidam viculo, *l'entel babul* vocato,
inter Guadix & Baca, regno Granatensi, iam flo-
rens Martio. Serius tamen plerumque florere, fru-
ctum æstate maturefcere, & in planta ad hiemem
vsque perdurare ipsi incolæ affirmabant. Nos in
montibus circa Geneuam obseruauimus. Proue-
nit etiam Basileæ via quæ tenditur ad S. Chrischo-
næ fanum iuxta vineas. Legimus etiam in Vega-
nisijs Narbonæ montibus.

III. Princeps noster Frid. Dux Wirtemb. misit
nobis plantam siccam monens copiose reperiri
circa Curiam Rhetorum, ferre baccas rubras:
magni fieri hanc plantam à tinctoribus pro tinctu-
ra nigra, ac eis dici *Kausch*.

CHAMÆBUXUS SIVE CHAMÆPXYXOS.

QUIBUSDAM.
CAP. IX.

Descriptio.



Radix.

Q Vamuis hæc planta non sit de tribu bacciferarum, iungendam tamen censuimus propter quandam similitudinem cum præcedenti, à quibusdam Chamæbuxus putata. Hunc iustitiam itidem Chamæbuxi dixere, multis virgultis tenuibus, lentis, spithamam circiter longis præditum, quæ vbi terram attingunt, fibris den-
tis radican- tur: alioqui & radicem habet, sa-

pè non multò ipsis virgulis breuiorè, lignosam, ex
cuius capitibus (quæ plura possidet) ipsæ emergunt. *Folia*
Folia per ramos incondita, Buxis quodammodo
similia, magis acuminata, carnosa, pediculis bre-
uissimis herentia, [gustantibus primum ingrata,
deinde amara & acia Clus.] amaricaria: ex quo-
rum alis, in ramulorum extremis flores cinicant
Coluteæ scorpioidis floribus similes, simul plures
iuncti, qui, teste Clus. odoris expertes, nonnul-
lis verò locis odoratissimi & Narcissinam quan-
dam fragrantiam emulantes, tribus foliolis con-
stant, quorum duo alba sunt, & alarum modo
sursum expansa, galeolâ exalbida illorum exortu
integente, tertium folium in oblongum veluti tu-
bulum conuolutum est, sursum per lanuginem ap-
ertum, per extremitatem braccæ modo efforma-
tum atque luteum, & vetustate interdum omni-
no purpurascens aut rubescens. Floribus succedunt
latæ & compressæ siliquæ, Thlaspi latifolii siliquis
paulò minores, virides, quæ bina plerumque [nō
nunquam verò vnicum tantum] continent grana,
exigui Erui magnitudine, colore ex cinereo ni-
gricante, hirsuta & veluti quoddam animalculū
ementita, Polygalæ vulgaris maioris rubræ semi-
ni haud absimilia, sed minora, quæ apertis
sele per latera loculis, spontè decidunt.

Interdum etiam pro loci natura floris colorem
variare deprehenditur: nam bina illa folia alarū
instar, sursum expansa, galeolæque eorum exor-
tum regens, alba non sunt, sed pulcherrimè ex
purpura rubent: tertium autem veluti in tubulum
conuolutum flauescit, eiusque extrema pars au-
rea est.

Cordum existimamus in Obs. silua de hac plā-
ta ita tradidisse: [licet Thalius aliò referat] Fruti-
culus exiguus, humi prostratus, iuncis viridibus-
que virgulis: foliis myrtinis, duris, acuminatis, pe-
rennibusque: floribus papilionaceis ferè, diuerso
colore, videlicet albo, flauo & rubente: extimam
quidem albet, proximum flauet, intimum rubet.
Nascitur in siluis montanis circa Egeram, in Ba-
uaria & Vindelicia.

A *rubra* Coluteæ flore, siue elegans Clus. qui à
nemine adhuc descriptam putat. At nos à Cordo.
Quidam à perpetua viriditate wintergrün appel-
lari dixerunt, quod nomen alioqui & Vinæ per-
vineæ conuenit.

Anonymos Peruicæ folio: Camer. Gesn. iam olim
[cum ego Baulinus ipsi conuierem] Chamæbuxū
seu Chamæpyxon vocauit. Argentine vidimus in-
ter Plantas D. Agerii liccas nomine myrtogeni-
stæ, quod nomen non displicet: nec sanè male post
Genistam ponit Clusius. Sed magis arrisit Cha-
mæbuxi.

Frequens est prior teste Clus. non modò in
montibus Calenberg, Medeling, & Badensibus
thermis imminetibus, sed & in alijs ad Austria-
cas & Scythicas Alpes excurrentibus, qui omni
Resiniferarum arborum genere integuntur, inter
saxa. Plurimis etiam Pannoniæ locis est obuia, ve-
luti ad Posonium, Sopronium & Zolotoek. Alte-
ra verò rarior inuentu.

Floret vtræque Aprilis & Maio. Semen prioris
[nam alterius non obseruauit] iunio perficitur. D.
C. Bauh. attulit Patauio in horto lectam, his no-
minibus: Vitis Idæa Theoph. cum baccis Myrti,
Olea Ethiopica Diosc. Guilandino. Sed decepti
fuere qui ita vocarunt, nisi nomina calu ad plan-
tam fuerint adiecta. Tiguri etiam obseruauimus
& collegimus. Locus particularis nunc non suc-
currit. Hactenus neglecta fuit hæc planta, nec in
vsum Medicum vocata, quod sciamus.

YITIS

VITI IDÆÆ AFFINIS POLIIFOLIA
MONTANA.

CAP. X.

Descriptio.

Folia.



Calyculi.

tiolis calyculi hærent perexigui, foliosi, rubentes, unde angulosa pyramis exilit Conchyliata, baccæ alicuius rudimentum promittens. Pro radicibus passim ex ramis nascuntur capilli instar tenues fibræ terram moris comprehendentes. Appingi curamus latiusculum folium, iuxta angulum, cuiusmodi pauca plantæ à nobis collectæ adhæserunt.

Locus.

Hanc plantam reperimus vliginosa, muscosis, & frigidis locis cum alijs Vitis Idææ speciebus, Maij principio in montibus Harcyniæ silvæ inter vallem Griefbachianam ubi fontes acidi, & Râs Belsantven, ubi etiam fons acidus. Vidimus quoque cum flore apud D. Platerum Basileæ, sed siccam, collectam in monte Pilati.

Myrtus tenuifolia.

Hanc eandem videret Thalius in Harcynia sua Myrti tenuifoliæ nomine sic descripsisse. Copiose reperitur in vligine illa, ultra Andersbergum urbem, Broccenbergum montem versus, quam nominant Den roten Bruch, hoc est, Vliginem rubeam, quod totus ille vliginosus tractus sub radicibus Broccenbergi, & de vicinorum montium rubro musco plenus sit, quæ videlicet ex Andersbergo viapater Goslarium versus. Fruticulus est lignosus, palmaris, viticulis multis, incurvis: folijs oblongiusculis, vncialibus, Myrti folijs angustioribus, quorum extrema plerumque in tergum contorquentur. In exiguis recurvis pediculis profert circa autumnum flosculos parvos, rubicundiusculos ex albo. Fructum nunquam adipisci potuit, cumque sero admodum floreat, eo autem loco, ubi nascitur, hiems citius, quam alibi incipiat, citius etiam grandiores ibi niues cadant, opinatur raro eius maturos fructus haberi posse. Cognatum forte quid cum hoc habere putat fruticulus illum exiguum Cordi, folijs Myrtinis, quem nos diuersum censemus, ac Chamaebuxum precedentem.

Vitis Idææ rubra Bauarica.

An Camer. Vitis Idææ rubra Bauarica, baccis insipidis sine succo. Fruticulus est supinus, crassiflore caudice quam vulgaris (ea forte, quæ rubro fructu) quæ apud nos passim cum nigra [forte angulosa] in silvis crescit, & Strinbeerlin voca-

Ortu & facie est Polii nostratis, virgultis crebris, dodrante longioribus, lignosis, ex nigro rubentibus, magna ramorum sobole fecundis. Folia Polii nostratis, acutiora, nervosa, vncialia, angusta, superius viridantia, pronâ parte cinerea vel glauca, nervo elatiore per longum currere. Extremis ramulorum peti-

tur: folijs item oblongioribus, acuminatioribus & angustioribus, per autumnum rubentibus. Crescit circa Monacum in campis asperis inter Ericas. In horto adhuc vivit & viget, nedum ut silvestres huiusmodi plantæ videretur interitura. Hæc ille. Quum verò nobis cerò non constet, quid sit referenda hæc Vitis Idæa Bauarica, hic lubuit eius descriptionem referre, donec melius nobis innotescat.

Locus.

OXYCOCCVS SIVE VACCINIA

PALUSTRI.

CAP.

Descriptio.



Prolongis viticulis, lignosis, ex atro rubentibus, lētis & fractu contumacibus, inque adnatas propagines ductis serpit, quas folia vestiunt crebra, positu ferè pinato, dura, serpylli folijs paria, superius viridantia, subtus ex cinereo rubentia. Baccæ figura, ut inquit Cordus, rotundæ & cordis modo infe-

Folia.

Bacca.

rius iuxta annexum turbinatæ, colore foris primum candicantes, mox puniceæ & purpureis contiguisque maculis & punctis conspersæ, intus verò in candido modicè rubentes, & quatuor exiguis cavitatibus parua & veluti abortiva semina claudentes: ex una cum calyculis humi procumbunt, nonnunquam etiam in musco tanquam absconditæ latent. Flores in extremis & capilli instar tenuibus surculis, Glycypteridos floribus similes, colore propemodum puniceo. Radicibus nititur brevibus, capilli modo tenuissimis & flavis, ex viticulis subinde demissis. Saporem coliculi & folia habent adstringentem: baccæ verò egregiè & simpliciter acetosum.

Semina.

Flores.

Radix.

Sapor.

Dod. scribit se observasse radicem esse instar tentis bacilli, obliquam, ex qua sursum complures coliculi & inferius fibræ aliquot demittantur.

Thalius autem hæc annotat: oxycoccon copiose in Broccenberg & vicinis montibus humidioribus, folijs non ita subtrundiusculis, ut est eius icon apud Cordum, sed oblongioribus ac strictioribus, lenticulæ ferè, brevioribus tamen: quorum ambitus versus dorsum utrinque leniter reflectitur. Longis lignosisque ac obliquis precepit in vliginosa musco viticulis, radicibus constans tenuibus, multifidis, lignosis, quibus capillaceæ fibræ multæ adhærent. Flosculi exigui sunt, purpurei, veluti exigui Citinij.

Vaccinia palustris Dod. videntur fortè eiusdem stirpis fructus esse, vel congeneris. Tantus autem radicem truncus nostro oxycocco non est, quantum icon Dod. suorum vacciniarum exhibet. Hic idem in hist. Gal. Vaccinia palustris ait Belgicè vocari Deenbesien & Deencorin: Gal: Coennes des marais: nullumque aliud nomen sibi co-

Vaccinia palustris.

*Grana.
Radix.*

Locus.

purpureo succo, uti Mora, plenæ, in quibus multa inæqualia & veluti triangula grana. Radix lignosa & dura est. Hanc florentem, & viridibus baccis onustam, multasque adhuc superioris anni maturas retinentem, inuenit idem in præceli montis, Vulgò Dechse lappellati, scopulis, quinto supra Neapolim Austriæ urbem miliari, mense Iunio: Postea etiam Augusto, immaturo & maturo fructu plenam in Seneberg & Senealben Celsissimarum Austriæ & Styriæ alpium iugis. Illius etiam arenosis Holandiæ tumulis eruxit ramum suis baccis maturis & immaturis onustum misit ad eundem N.V. Io ab Hoghelande. Miramur verò in Clusicone ramos pingi hirsutos, nec tamen fieri mentionem in descriptione: alioqui icon angustis foliis melius convenit cum Erica à nobis descripta, quam icon Camer. à nobis proposita:

Iam antea monuimus Penam & Lob. & hos sequutum Schuuenkf. existimasse Vaccinia palustria esse Ericam bacciferam Matth. quem errorem dudum deprehendimus. Sed quoniam idem Schuueckfeld. Oxycoccon dicit esse Ericam bacciferam Matth. & Thalii, cum ex eo aperte contrarium pateat nempe Thalii diuersum esse à Vacciniis: placet eius historiam totam subicere, quæ sit habet. Erica baccifera Matth. Nam hanc de qua nunc agimus, eandem esse censemus. Angli verò in Aduersar. Vacciniorum palustrium nomine eam proponent, quamvis hæc nostra in palustribus non nascatur. Fruticulus est humi procumbens, in oblonga, multifidaque brachia rubetia, lignosa, obsequiosa ac foliosa latè super terram se prorepando explicans: foliolis dense obstititur breuib, oblongiusculis, strictis, suffuluis, sæpè etiam nonnihil cæruleis, splendentibus, ex quorum alis in ramulorum extremitatibus æstare sub Syriæ æstu micant tenuissima staminula, breuique, filamentorum sericorum ferè instar, quorù summitatibus apicula insident, coloris ex rubro nigricantis aut spadicescentis ferè: hæcque filamenta & apicula florum vicem explent, usque deciditibus, emergunt baccæ splendentes, luniperinis minores, iuniles baccis Vitis Idææ seu Vacciniorum nigrorum Dod. rotundæ, ex purpura nigricantes, dulci pulpâ constantes, cui infarcta continentur semina purpurascencia. Prouenit copiosè in summo Broccenbergi iugo & saxorum aridorum fissuris. Saxones qui montem illum accolunt, vocant hosce fructus *Spenbeer* / hoc est, Simiarum baccas. Vnde, si quis neque Ericæ, neque Vacciniorum speciem stirpem istam esse voluerit, is nomine confecto *Simiarum* appellare posset. Inde autem ei hoc nomenclaturæ inditum est, quod æsus ipsorum vberior capiti noxia inferat quædam symptomata, ad quæ deliræ subsequantur gestulationes, ratione nonnihil interturbata, ut is, qui ipsis vsus fuerit copiosus, simiarum instar sese habere gestu risibundo videatur. Hinc plantam hanc deleteriâ facultate minime carere contendunt, & ab eius usu omnino abstinere, alijsque ipsorum vltimè sanctè interdicitur. At amicus quidam noster, Andreas Roßlerus, pharmacopœus Halberstadiensis, vir opt. & rei herbariæ non triualiter gnarus, hanc stirpem Chamætaxum vocare solet, tum ratione qualitatis istius malæ, tum foliorum oblongiusculorum Taxii, sed breviorum. Emilius eam olim, cum necdum illo tempore à quoquam esset hæc stirps descripta, Corios speciem faciebat, Cōrin Broccenbergensem nominans. Reperiuntur & vetulæ herbariæ in Saxonia, quæ hanc plantam *Gichtfrant* vocitant, commen-

dantque eam mulierculis ut præsentaneum præsidium contra istiusmodi morbum, nempe Conuulsionem. Matth. fatetur se de iux Ericæ bacciferæ qualitatibus nihil certi habere.

ANONYMOS FRUTICOSA,
FOLIIS ERICÆ BACCIFERÆ MATTH.

CAP. XIII.



Elegantissimi-
mi huius
fruticelli ramo
pulchello nos
donauit Cl. D.
Agerius Med.
Argent. & stir-
pium sapacissi-
mus vestigator,
qui furculosus,
lignosus, variè
diuisus, imà
parte rufus aut
fulcus, annoti-
norum ramu-
lorum princi-
pium dilutè ru-
bens, extrema
flauescunt. Ex
inæqualibus in-
ternodijs folio-
la emittit ma-
gna ex parte binæ, nec tam numero-
so ac denso ag-
mine, ut in præcedenti, altero verò latiora, cras-
siora, & in totum maiora, dilutè virentia, & Buxi
recentis in morem flauescentia. Ramulorum sum-
ma surrectis & longiusculis petiolis rufis insiden-
tia occupant vascula Ledi Narbonensis aut Nerij
Montani quodammodo similia, foliaceo calyculo
suscepta. Folia magis quam præcedentis amara,
nec sine adstrictione.

De hac Aduer. ut putamus sic scribunt: Cha-
methododendros altera cellis & rigidissimis cau-
tibus, floribus purpureis perquam exiguis, Ericæ
foliolis, non deciduis, prouenit: humilis tota, à
nobis tantum sicca visa.

De hac Aduer. ut putamus sic scribunt: Cha-
methododendros altera cellis & rigidissimis cau-
tibus, floribus purpureis perquam exiguis, Ericæ
foliolis, non deciduis, prouenit: humilis tota, à
nobis tantum sicca visa.

Gesn. de hort: Rosa alpina altera species, foli-
olis minimis, Acinaria palustris nostræ foliolis
persimilibus.

Nascitur in Adula monte Rhætorum: inde au-
tumno allata, in hortulo plantata, ubi nunc me-
dia hyeme egregiè viret nec perdit folia: duratu-
ram tamen vix spero, altissimis, siccis, ventosis
& apricis frigidisque locis affuetam. Species hæc
Rosa alpina rarissima est.

Ex Clus. Pan. desumpta est nostra icon, sed mi-
nus feliciter pictor imitatus est: titulus erat
anonymus folijs Thymi. de ea scribebat nondum
sibi constare, quod esset referenda, eam ob causâ
etiam relinquere: nisi forte ea sit quam
Pena & Lob. in Adu. Alpinam alteram vocant,
& statim post Chamæmethododendron odorem col-
locant.

In nostr. hist vocat Chamæcistum. Olim
(inquit) non mihi constabat, quod istam plantu-
lam referre deberem, quod mediam naturam in-
ter Chamæcistum & Cneorum Matth. obtinere vi-
deretur: eam ob causam inter vtriusque capita lo-
caui. Sed diligentius postea obseruata, in-
ter Chamæcisti genera reponere placuit, impel-

Semina.

*Locus.
Simiarum
baccæ.*

*Phytocell
eur didum.
Nona ex
baccæ.*

*Deleterium
esse.*

*Chamæta-
xum.*

*Corios
spec.
Vire
Cneorum.*

Folia.

Rosa.

Sapor.

Flora.

*Rosa alpina.
Species.*

Locus.

*Anonymus
folijs Thymi.*

*Chamæcisti
genera.*

- Flascul.** lentibus me aliquor caulis. Oblongis quandoque
dodrantalibus tantum serpit ramis humi diffusis,
nigricantibus, in multos alios breues ramulos
diffusis: folia frequentia & conferta sunt, bina
semper inter se opposita, [non semper hoc obser-
uatum in planta] exigua, serpillio minora, Thy-
mi durioris folijs haud maiora, crassa, superiore
parte viridia, inferne caudicantia, amaricantis
saporis. Extremis ramulis innascuntur bini aut
quaterni flosculi simul iuncti, perpusilli & quinque
foliolis compositi, carnei quali coloris. His suc-
cedunt capitula, maturitate in quinas crenas sese
aperientia, & semen exile admodum ostendentia.
Capitula. Radix dura, lignosa, aliquot fibris donata: quinque
etiam rami subinde tenues fibras agunt. Exiccata
planta non iniucundo spirat odore.
- Locus.** Nasceitur tenui solo inter saxa, in summis *Sne-
berg, Snealben*, & alijs Austriacarum Styriacarum-
que Alpium supercilijs.
- Tempus.** Floret Iunio, interdum etiam paulò maturius,
pro temporis, quo nix quæ iuga illa tegit maturè
aut serò soluitur, ratione.

ERICA BACCIFERA LVSITANICA.

CAP. XIV.

Descriptio.


Folia.

Fructus.

Non florere.

Camarin-
bura.

Acacalis



Erica folijs
Corios Clu-
so fruticosa est,
cubitalibus af-
surgens ramulis,
fragilibus, ni-
grolore quam re-
liquis cortice, fo-
lia quoque iis si-
milia, sed nigrio-
ra & crassiora,
gustu cum ad-
strictione cali-
diusculo, trino
ordine circa ra-
mulus sunt dis-
posita. Fructum
a reliquis Ericis
differetem sum-
mis ramulis in-
hærentem gerit,
vniões obscu-
riores tum forma tum colore referentē, succulen-
tū, sapore acido, tria granula dura plerumq; conti-
nentem, qui exiccatus per se decedit. An floreat,
nondum constat; incolæ negabant, & fructum
paullatim intumescere amplioremque fieri donec
maturelceret affirmabant.

Et verò hæc longè diuerfa à Matth. Erica bac-
cifera. Lusitani vulgò *Camarinbura*: fructum verò
Camarinbas dicunt. Erica baccifera Lob. Erica
baccifera tenuifolia T. B. qui & *Rausch* vocat.
An verò & hoc nomen Germanicum, quod pluri-
bus plantis tribuebatur, & huic conueniat, consi-
derandum.

Acacalis, Lat. *Acacalis* Amato in Com. ad
Diosc. Est verò *Acacalis* eidem planta fructum fe-
rens album, rotundum, paruis margaritis per-
similem, quem Lusitani sua voce *Camarinbas*
appellitant: neque putat fructum istum in Euro-
pa vniuersa, præterquam apud Olyssiponem cre-
cere. Planta media est inter Myricem & Ericen
quæ de causa Diosc. prudentissimè eandem Myrice
& Ericæ sermonem fecisset, de hac illic de caput se-

quens constituit. Fructus est esui gratus: Verùm
Cacalia herba longè alia est, quamquam Plin. illi *Cacalia*
quoque fructum margaritis simillimum inesse di-
cat. Quæ *Acacalis* conueniunt, *Cacalis* Plinium
tribuisse deprehendimus, dicentem: *Cacalia* siue
Leontice vocatur semen margaritis minutis simi-
le &c. De *Acacali* Paulus quoque ex Diosc.

Bry frates Hist. Ind. Oriental. notant quoque *Camarinbas*
Lusitanis *Camarinbas* vocatas folijs esse equiseti,
sed obscurioribus. Fructus esse bæccas rotundas,
perlacci candoris, sapore subacido.

In vna Lusitania hæc plantam obseruauit Clus.
non procul Vlyssipone inter *Riofrin* & *Aldea Calte-
ga*, & etiam supra Vlyssiponem, solo admodum
arenoso, copiosè suo fructu albo onustam: ait ini-
tiò Mannæ grana isti frutici inhærentia existimas-
se, adeò procul ipsi insipienti imposuisse. Septem-
bri & Octob. fructum fert, qui Nouembri exicca-
tur & per se decedit. Fructus Sept. & Octob. mien-
sibus Vlyssipone inuenitur, febrientibus exhi-
bent, ad sitim quæ premuntur, restinguendam: aui-
dè etiam idem fructus à pueris & mulierculis ex-
petitur, Si *Acacalis* est, aquam in qua maduerit
eius fructus, ad Collyria quæ ad excitandam oculo-
rum aciem conueniunt, addi, testis est Diosc. A-
marus quoque testatur fructum esui esse gratum,
eoque mulieres & efficitur pueros in cibo fre-
quenter uti.

LIGVSTRVM.

CAP. XV.



Ligustrum se-
tex est arbo-
rescens, radicem
hinc inde per o-
bliquum spargens,
tres aut quatuor
cubitos altus &
maior, crebris
virgis lentis &
in ramos diuisis
constans, cortice
cinereo obiectis,
præsertim verò
stipites & rami
crassiores tali
cortice vestiun-
tur: nam ramuli
virides leguntur,
materie albida,
dura. Folia bi-
na aduerso situ
ex interuallis o-
runtur, oblonga, angusta, figura ad Salicis
folia quodammodo æquidistantia, sed minora, rat-
sioraque, atrouidentia, læuia, nitentia, gustu acri
& subamaro, non sine adstrictione. Flores in
ramorum summis profert suauiter olescentes, candi-
dos, racematim congestos, quorum singuli quater-
nis, quinis, aut senis foliis constant, apicibus ex
luteo herbidis, qui decerpti statim flaccescunt:
quos excipiunt Baccæ racematim quoque in Pyra-
midis figuram aggestæ, Hædæ baccis minores,
læuiore ac nigrescentes, luniperinæ quales, initio
virentes, per maturitatem nigrescentes, continentes
bina grana, hinc gibba, inde compressa, cortice
spadiceo, carne exalbida, vel digitorum lèni pressa
fragilia: sapore amaro ac iniucundo, quamvis qui-
busdā aliquid dulcedinis habere videantur.

Descriptio.

Folia.

Flores.

Bacca.

Grana.

Tragus

Tragus annotat huius generis nonnullos frutices sublateo comari flore, atque eos quidem inventu rariore esse.

Ligustri meminit Virgil. celebrato illo carmine: ubi flores intellexisse videtur.

Alba Ligustra cadunt, Vaccinia nigra leguntur. Et Colum. in hortis: *Fer Calarbis Violam, Et Nigra permixta Ligustro Balsama* &c: ad fructum potissimum respiciens: ut censet Tragus.

Marcellus sibi persuadet, Ligustrum hoc vulgare idem esse cum Cypro Diosc. ut satis aperte innuat, quando ait: Quos Maro cecinit pastoribus negligi & inutiliter perire Ligustri Flores, medicina & Vnguentariorum Officina libenter exceperunt. Nostra ætate nulla aut exigua eius ratio est, cum alioqui vulgaris & ubique paratus frutex hic sit. Cisalpina omnis adhuc Gallia sic vocat, Hetruria corrupta appellatione *Ruusticum*. De Diosc. & Plin. Cypro cap. seq. Sunt tamen qui & Plin. Cyprum eam esse Arborem censeant, quæ etiamnum in Italia Ligustrum vocatur, ut dicitur in progressu.

Ipsiusmet Ligustri paucissimis meminit Plin. Ligustra inquit non nisi in aquosis provenire, telluris vtilissima. Alex. ab Alex. tessaras hic luforias interpretatur: Dal. verò rectius nostrum iudicio lignea signa, vinum, frumentum, oleum aut aliud quippiam significantia, & promittentia, quibus in congiariis & publicis largitionibus Imperatorum utebantur.

Porro magna difficultas orta est inter Herbarios An Ligustr. sit Cyprus Diosc. & Plin.

Cyprum quidam, ut Plin. inquit, esse dicunt arborem, quæ in Italia Ligustrum vocatur.

Et Ruell. Ligustrum apud nos eadem est arbor, quæ in Oriente & Græcia Cyprus, Gallis *Troenea*, Suectionibus *Dryna*, officinis ad Barbaros desinentibus tum *Alcana* tum *Henne*.

Virgil. pro flore usurpavit *Alba Ligustra*. Cypri, id est, Ligustri, florem putat corollis intorquendum.

Scio, inquit Tragus, qui Phyliream Diosc. velint, (ut Fr. Massarias Venetus & illius Simæ) mihi verò est *æneis*, Lat. *Ligustrum*, de quo Diosc. Quidam immerito vocant *Barrigel*.

Cordus quoque scribit, Ligustrum sine dupio arbusculam esse quæ Græcis Cyprus vocatur: propterea Plinium idem scripsisse nunquam poeniteat.

Annotat Corn. Posterioribus plerisque omnibus esse Cyprum: nec tam multis annis confirmatam opinionem velut errorem damnari debere, quum magna aded sit inter Cyprum & Ligustrum affinitas & similitudo. Eidem aut Cypros est Italia Ligustrum, aut Philetea: eos tamen addit qui Italiae Ligustrum videntur magis Philyreae simile id quàm Cypro depingere.

Eorumdem sententiam tuetur Matth. & in errore versari tradit novum quendam Herbarium [Anguillaram] qui censeat Cyprum & Ligustrum diversas esse stirpes, friuolis argumentis ex Plin. desumptis. Hallucinari qui non videant Ligustrum omnibus suis notis referre Cyprum, Sed Anguillare argumenta non videtur Matth. sufficienter refutare, & nimis audenter pronuntiare hallucinari eos, qui suæ opinioni non assentiuntur de Ligustro.

Ab eorundam partibus stant Io. Agric. & Turner. Hic speciatim, eius notas omnes cum Cypro Diosc. convenire scribit: ac quanquam Massar. Venetus lib. de Piscibus strenue neget Ligustrum esse Cyprum, rationes tamen quibus nititur non eam habere vim quin confutari possint. Ac optasse-

mus sanè refutasse viuis rationibus, si potuisset, aut à reprehensione abstinuisset.

Amatus ne ambigendum quidem censet Cyprum Ligustrum esse, quum Plin. dicat arborem Aegyptio familiarem, in Italia Ligustrum vocari. Ideo omnino falli Mass. Venetum, Cyprum aliam arborem à Ligustro esse contendentem. Ligustri verò radicibus hodiè Mauros suos inficere capillos, velut equorum quoque crines, quod olim quoque fieri Diosc. tradidit. Verum vel ex eo facile convincitur Amatus, Ligustrum nostrum neque esse Cyprum, neque id lignum quo Mauri capillos inficiunt, quia nihil tale præstat Ligustri nostri lignum, sed *Henne*, quod Cyprum existimamus.

Amati errorem utrumque ruminatur Lacuna, (vir nostro iudicio parum in re Botanica versatus) nempe & *æneis* esse & Ligustri radicibus à Turcis tingi caudas equorum: additque Poetas huius arboris flores vocare Ligustra, & fructus eius Vaccinias: sed dubium non est duas ab eo confundi plantas: non enim nostratis Ligustri, sed alterius exotice arboris radice, de qua postea tinguntur pili equorum.

Ad vnius huius plantæ historiam idem Lacuna accunulat & tertium errorem. Pōnit Ligustri iconem ex Matth. & aliam habet eiusdem plantæ nomine Halimi, cum quo nullo modo convenit, Cæcis ita imponendum est, non nobis & diligentibus studiosis.

Monachis etiam Cypris Græcorum & Ligustrum Latinorum vnum & idem sunt, quemad. & *Alcana*, ut legentes [inquiunt] Serapionem, & Diosc. cū Plinio conferentes non later. Addunt in oleo Cyprino Actuarius legi florum Ligustri, Græcis Cyprus dicti.

Lonicero *Ligustrum* Diosc. Philyra est & Cyprus, cuius duas species facit, magnam & parvam. Esse Virg. alba Ligustra, & Colum. Nigra Ligustra. Ita vides non minori ignorantia quàm oliscantia ab illo vni plantæ tribui tria diversarum plantarum nomina. Præterea vnius plantæ duas icones, minorem & maiorem ponit, & propter eas potius, quàm ex re ipsa, aut quod viderit, vel ab aliquo didicerit, duas tradit species, à nemine hactenus, quod equidem sciamus, observatas.

Eius priorem iconem Ryff. prædicto non magis in re Herbaria versatus, pro Ligustro ponit, scribens: *Ligustrum* Plinij aliorumque Latinorum, cuius picturam damus omnes fere hactenus Diosc. Cyprum interpretati sunt, sed illos nuper redarguit Massarius, demonstrans Ligustrum esse *æneis* non Cyprum. Ryff. igitur qui inepte posuit pro Cypro iconem Ligustri vulgaris, uti dictum, cap. sequenti iconem maiorem eiusdem plantæ cum eodem Lonic. ponit pro Philyrea Diosc.

Altiùs sapuisse sibi persuadent Pen. & Lob. in Adu. quando *Ligustrum* Diosc. nostras vocitant, subolsacientes fortè nostrum diuersum esse à Dioscoridæ, & nihilominus ad illud reduci posse aut debere existimantes, ut equidem candidè interpretaremur nisi sequentia eorum verba diuersum proderent, quando aiunt: de florum fortuna Cyprus dictus Græcis videtur: *æneis* enim floreo est, quod alluisse vilius est Maro, ubi *alba Ligustra* cadunt, canit. Auic. dicit baccas esu sanguineum lotium aut potius colore cruentum ciere, quod præstitisset Refractarijs experiri, quàm Ligustrum verum inficari. Quæ tamen Alkanae afferuntur assulæ, vel baccilli, luteo sunt intus ligno, eoque si crinem (ut videtur Auic. ex Diosc. velle) ruffant, sunt sanè aut melioris notæ Ligustri, quæ diuersæ

Parvitas.
2.
20. et 21.

Marcell.
20.

20. et 21.

Tessera in
Ligustro.

Ligustrum
est Cy-
prum.
Ligustrum
Cyprus.

Troenea
Alcana
Henne.

Massarius
20.
Philyrea
non est
Cyprus.

Anguillare
10. et 11.

Matth. 20.

Massarius
20.

Tutius ca.

10.

Amatus
20.
Lacuna non.

Ligustra
Pect.
Vaccinia
Pect.

Tertius La-
cuna error.

Lonicæ
fig.
Alter eius-
dem error.

Ryff
error.

Ryff
error.

Cyprus 20.
20.

plantæ, Quibus postremis verbis & notis non temere ceu recidua quadam hæitatione iactari nobis videntur, adeoque nihil certi statuiffe. Non placet igitur eos prius *Ligustrum* & *Cyprum* idem dixisse: nec quæ huic nostræ ascribunt de vrina cruenta, quod decebat illos potius experiri prius, quam redarguere eos qui negant *Cyprum*, cum ipsimet dubitent, ut aperte docent eorum verba de *Alkana*, de qua nos seq. cap.

Caspar Dur.
err. Denique *ligustrum* nostras etiam *Cyprum* Diosc. faciunt Cast. Durænes, [qui non bene duas figuras & descriptiones vnius plantæ ponit, quasi diuersæ sint plantæ.] Taber. & Casalp. Lonic. addit *Cyprum* ab insula dici.

Ligustrum non esse Cyprum Diosc. His omnibus strenue se opponunt, iam sæpe citatus Mallarius, Fuchf. Dod. Anguil. Rob. Const. apud Amari, Goropius, Porta, alique quorum iudicio & rationibus sanè in hac re plus tribuimus, cisque hætenus subscribimus, donec prodeat aliquis, qui nobis diuersum persuadeat. Quamquam Diosc. *Cypri* descriptio propius ad nostrum *Ligustrum* accedere videatur quam Plinii: quamuis nostram vix proprie & simpliciter arborem dicas, adhuc minis peregrinam. In nostri quoque *Ligustri* foliis nihil tale quid apparet, quod capillos sufficit, quæ notæ nostrum *Ligustrum* à Diosc. *Cypro* potissimum distinguere videatur, quamuis & aliæ fortè sint circa vires, nondum obseruatæ. Sed quid multa opus velitatione, cum alia planta, non frutex, sed arbor Recentiorum industria inuenta sit, melius cum Diosc. *Cypro* conueniens.

Nec Cyprum Egyptiæ Plin. Sed nec *Cypro* Egyptiæ descriptioni Plinii quadrat nostrum *Ligustrum*. Plinii namque *Cyprus* semen habet Coriandri, peregrinaque est arbor. At *Ligustrum* nostrum grana non Coriandro similia habet, ut facillè ex descriptione nostra proposita conferenti notas cum Coriandro parebit. Nec sanè nostrum *ligustrum*, quod spontè in sepibus & senticetis passim occurrit nascitur in Egypto. Rectè igitur Fuchf. *Ligustrum* quo nomine Græcis appellatum sit, nondum certò nobis constat, neque enim, ut fere omnes hodiè putant, *Cyprus* est.

Plin. not. Dod. quoque ipsum in hac re aded Plin. reprehendere audens, eum scribit perperam *Ligustrum* eandem arborem esse censere, quæ in Oriente *Cyprus*. Quam censuram mitigans Anguil. *Cyprum*, inquit, quidam volunt esse *Ligustrum* in Italia dictum: verum credere non possum *Conastrella*, quam habemus in Italia esse *Cyprum*: notæ non respondent. Plin. etiam non affirmat *Cyprum* esse *Ligustrum*, quamuis alio loco id asserere videatur. Verum fortè Plinio addita quadam aut doceptus Plinius sibi contrarius. *Conastrella* non potest esse *Cyprus* Plin. l. 12. c. 25. *Ligustrum* Latinorum non negarim. Quæ planta sit *Cyprus* ignoro. *Conastrella* est *Philyrea* ut pater ex descriptione. Hæc ille. Qui existimando *Conastrella* esse *Philyream*, fallitur, de qua mox transigemus.

Ligustrum Virgil.
Non esse Ligustrum Columella. Eadem fere & Rob. Const. confirmat his verbis. Quid sit *Ligustrum* siue *Cyprus*, profectò ignotum est his nostris temporibus. In hoc solum Diosc. & Plin. consentiunt, quod vterque dicat esse arborem quæ vel solâ notâ excluditur vulgaris illa planta ab huius consortio, quam nobis pro *Ligustro* & *Cypro* ostendunt Hesperi, quæ fortasse est *Ligustrum* Virgil. non autem *Cyprus* Diosc. aut Plin. *Ligustrum*, imò nec *Columella*. Hic enim frutex in sepibus maximè communis, vix vnquam visus est arborefcere: nos Galli vocamus du *Trieur*: sed *Cyprus* siue *Ligustrum*, id est, *Arabum Alkana*, arbor rara est, & inter pretiosa

simplicia semper adnumerata.

His ac similibus rationibus motus doctis. Goropius, *Ligustrum* alterum Veteribus dicere maluit, & aperte ait Virgilij *Ligustrum* non intelligendum esse de *Cypri* flore odorato. Sed cur *Ligustrum* alterum Veterum dicat, ubi duo genera *Ligustri* apud Veteres inuenit: sanè nisi id intelligat vel apud Plin. vel hoc nostrum *Ligustrum* ceu alteram *Ligustri* Veterum speciem agnoscat, quid aliud velit nondum olfacimus. Nam, ut dicebamus, præter *Cyprum* [cuius aliquoties meminimus,] & *Ligustrum* sæpius citat, ut in sequentibus patebit, nec tamen hoc idem esse cum illo categoricè affirmat: imò lib. 12. c. 24., vi & l. 23. c. 4. videtur ambigere, utrum ea *Cyprus* sit, quæ in Italia *Ligustrum* vocabatur: dum id ita esse, non ex sua, sed ex aliorum potius sententia pronuntiat. Certissimum quoque diuersitatis nostri *Ligustri* & *Cypri* Antiquorum argumentum producit Porta, ab ipso experimento desumptum: nempe, inquit, *Ligustri* vulgaris folia non rufum capillum reddunt: quare non est *Cyprus* Diosc. sic igitur primam difficultatem excusimus.

Altera difficultas est an *Ligustrum* nostras sit *Alkana* & *Henne Arabum*.

Asserunt Ruell. Tragus, Matth. Lacu. Monachi, Lonic. Brunfels. Bouius, Comes à Neuenar, & Cast. Dur. ac in genere omnes fere ij qui, nostrum *Ligustrum* cum *Cypro* Veterum idem faciunt, cum Arabes plerique sua de *Alkana* ex Diosc. cap. de *Cypro* transcripserint. Sed hinc non sequitur nostrum *Ligustrum* esse *Alkanam* Arabum, sed verisimile tantum sit hanc & *Cyprum* Diosc. esse idem. Idcirco fallitur, quisquis ille sit, qui apud Cordum annotauit *Ligustrum* Arabicè dici *Alkana*, *Henne*: Nam ut dictum *Henne* quidem est *Cyprus*, sed non *Ligustrum* nostrum vulgare. Rectè igitur Bellon. Arabum interpretes Latinos *Henne* seu *Alkana* falso *ligustrum* vertere notat, cum diuersa sit arbor. Quod verò idè *Henne* siue *Alkana* differre tradit à *Cypro* aut *Ligustro* Gallicè dicto *Troesne*, quòd hinc *Henne* non deponat folia ut *Ligustrum*, nobis non probatur. Nam cum *Henne* & *Alkana* Serap. sit *Cyprus* Diosc. *Ligustrum* verò nostrum, vel ipso teste, non sit *Henne* & *Alkana*, ne *Cyprus* quidem erit, aut rectè diceretur.

Cæterum cum (ut ex Adu dicebamus) quæ *Alhanna* nomine importantur lignæ assulæ sint luteæ, satis patet à nostro *Ligustro* differre, si modò veræ & genuinæ sint *Alkanæ*.

Leoniceum carpit Agricola, quòd *Cyprum* similem *Ligustro* fecerit, nec se cum sequi, aut ipsemet tamen idem *Ligustrum* facit & Græcis *Cyprum* dictam: ac in eo hallucinatus est, quòd uimilitudinem negauerit, & quòd ipse cum plerique idem purarit. Melius igitur fecisset, si melius sentientem secutus fuisset.

Tertia difficultas est, An *Ligustrum* nostrum sit *Philyrea*, ut voluit Mallarius, Fuchf. Anguil. Gesn. Euchar. Roesslin. Dod. (qui malè non tantum *Philyream* *Ligustrum* facit, sed & eam quæ existimatur *Philyrea*, ponit pro *Cypro*.) Sed Gesn. ex aliorum potius, quam sua sententia id dixisse videtur, Fuchf. quoque parum fortè suæ opinioni tribuens, iudicium penus prudentem lectorem esse voluit. Aperte negant Tragus, Dod. & nos, apertis rationibus moti, quas suo loco trademus.

Baccas, sunt qui velint, dici *Vaccinium*, de quo Vitruu. Archit. l. 7. c. 14. verum certò affirmari non potest. Sunt qui & *Ligustri* baccas à Virg. *Vaccinia* vocari putent, sed malè, inquit Matth. Non deservunt, qui existimant *Ligustrum* esse Mauritanorum caprifolium, sed perperam. Sunt qui *Ligustrum*

Nondum plantæ constat an Plin. *Cyprus* & *Ligustrum* eadem sit: Quod igitur murum si à Recentioribus quoque dubitatum?

An *Ligustrum* nostras sit *Alkana* & *Henne* Arabum.

Cordus commentatur: non Arabum interpretum error.

Bellonius prob.

Agricola not.

An *Ligustrum* sit *Philyrea*: Dod. generum non esse.

Non esse *Philyrea*.

Synonyma
Ligustr.

strum dictum velint, a ligando, quod sepibus ligandis & muniendis conveniat: Alkanna & Henne omnibus ferè ills, qui Cyprum esse putant, vti dictum. Germ. Beinholzlin / quodd lignum ossis instar durum habeat: propter duritiem dicitur etiam, hartrigel, sed perperam, vti notant Tragus, & Hier. Brunch. Herckholz Taber. Aliis dicitur Mündholz / Weisholz: Reinweiden / quodd salici similis sit, & Rheno ripa copiose nascatur: Mündweiden / quodd oris vlceribus medeatur, quamvis Fuchsl. Ligustrum officinis inusitatum dicat, vti reperi est, potest tamen commodè in vsum reuocari. Ait tamen Matth. sed male Officinis Alkanna dici, alii Alchanna scribunt) & mauritanis Kenne. salii Chenne scribunt) H me, seu Hanne. Belg. Becleruyt, Reinweilgen / Shuuenckf. qui Ligustrum inter Silésie plantas hortenses refert, ait Germ. Edelweiden dicit Gal. Trosne, Frezillon. It. Herruleis G. strico, quodd inibi etiam aliqui Oliuetra, nonnulli Oliuella, quiddam Chambrillene vulgè vocant: alii Callostro. A mulieribus & pueris Romæ Fior fiorello Alphab. scribit & Chryseluo dicit Conastrello Patavinis. Hisp. Alben, Alfen: Castil. Arbo de Parayso, aut de Alben: Portug. Alfenbeyro. Bohem. Praci Job Vngar. fagyalsa. Apud Bollenfes in ducatu Wirtemp. Schuarze Hungberrèn vocant. Vt annotauit aliquando Soletius Delphinatibus dicitur sanguin blanc, & Provincialibus Olivier farrage.

Loca.

Temp.

Nascitur magna ex parte in locis asperis, potissimum repribus & sepibus, frequens admodum passim Germaniæ, Galliæ, Italiæ. Ad Rhenum abundat. Loh. ait nulli calidiorum regionum hodie deesse, paulò licentiosius: non enim inuenitur in Ægypto Ligustrum italicum, teste Alpino vti dictum: copiose provenit etiam in Dioecesi Cantabrigiensi ad sepes, & propemodum in omnibus Londini vicinariis. Quin & in frigidioribus regionibus in hortis colunt, quorum leptis & arboribus cingendis accommodata quia tonsilis, & tam floribus quam racemulis tota æstate læta. Floret Aprilis & maio, citius aut tardius pro locorum ratione. Flores tota ferè æstate durant, aliis prætereuntibus, aliis emergentibus. Septembri racemuli maturescunt, & subinde per totam ferè hyemem restant, non sine singulari utique providentia Dei, præcipuum avicularum famis refugium per seuissimas hyemes futuri. Folia ad hyemis initium durant, postea decidunt, & vere noua renascuntur.

Virg.

Temperam.

Aqua fol.

Infusum.

Decoctum.

Infusum.

Decoctum.

Infusum.

Decoctum.

Infusum.

Decoctum.

Infusum.

Decoctum.

Infusum.

Decoctum.

Infusum.

Decoctum.

Infusum.

Decoctum.

Infusum.

Decoctum.

Infusum.

Decoctum.

Infusum.

Decoctum.

Infusum.

Decoctum.

Infusum.

Decoctum.

Infusum.

Decoctum.

Infusum.

Decoctum.

Infusum.

Decoctum.

netum colorem præstare, quo nomina ab his, qui chartulas lutorias, aliasue picturas coloribus variis illuminant, leguntur. Pueri bacculis inscruunt decoctis in aqua, & atramenti loco scriptitant, quod & se aliquando conficere solitum testatur idem: sed pictura in coeruleum quadantenus spectat.

Aqua stillatitia, & floribus Ligustri, tradente Matth. poru mentes superfluos constringit, vtilis aduersus hæmoptoysem & diarrhoeam. Eadè per se, aut cum Pompholyge in oculos instillata, rubore eorum & lippitudines tollit. Ex floribus conficitur & oleum, quodd ad inflammationes vulnerum insigne est, si calidum illinatur: idem dolenti à calore capiti benefacit. Hieme baccis vescuntur aues, præsertim Merula ac Turdi. Ex virgis flexilibus, solida tamen materie, caueat fiant ad canoras seruandas aues, ac virgæ ad instruendos equos. Nullum reperiri posse, insit idem, medicum tam inexpectum crediderim, qui non noverit Ligustrum iis omnibus præstare viribus, quibus pollere scriptum reliquerunt Diosc. & Gal. Atqui Herbario illi [Anguillare] gentia danda, quodd in noscendis tantum plantis, non autem earum facultatibus examinandis operam nauarit. Hæc Matth. vti iam nobis Sciquianistæ quidam esse videatur, qui solus omnia inuenerit, vel inuenisse somnari. Sed quæ hæc temeritas, de re sibi incognita statuere, & alios insuper reprehendere, cum ipse potius redarguendus est quodd præcipiam illam non Ligustri quodd Cyprum existimat, non examinari, an ejus folia rufent Capillu, vti docet Diosc. Et vehementer profecto miramur qui tam audacter ausit pronuntiare de viribus Ligustri, quodd ex sua perquisitione vulgè esse Cyprum quam nouit.

Acinos Ligustri contra Phthiriasim & Gallinarum pituitam prodesse, scribit Schuuekf. qui ex desumit ex viribus attributis Cypro: Lectores, poterunt sine periculo experiri an nostrum Ligustrum hæc præstet. Iac. du Fouloux de venat. in cura morbi canum ad dolorem aurium commendat fruticem dictum Trosne qui nihil aliud est, quam Ligustrum. Zesriel in fulmine laudat ad Arthritidem intra median horam Oleum florum Ligustri, Veronésibus dictum n Conastrello factum ad Solem, aut in Balneo Mariæ, calidè applicatum. Frutex, vti dicebamus, apertissimus est sepimentis, propter lentæ & flexibilia vimina, ex quibus reticulato plexu Garyophyllei flores in vasis circumsepuntur à nonnullis, non sine elegantia. Sic & ad topiarias scenas expetitur à nonnullis, quas non ineleganter conuectit. Foliorum succum quidam celebrant ad oris vlcera & inflammationes. Nec vires à Matth. traditas negamus, sed ab eo potius effectas rationabiliter, & aliunde mutatas censemus, quam experimento cognitæ. Ex gustu facile quibus vel mediocriter versatus vnique plantæ vires probabiliter assignare possit. At pro veris & compertis proderet non item.

Tantò minus reprehendendi
qui id non faciunt, nec
facere volunt, nec
debent.

Diarrhoea.

Lippitudo.

Oleum florum.

Infusum.

Decoctum.

Infusum.

Decoctum.

Infusum.

Decoctum.

Infusum.

Decoctum.

Infusum.

Decoctum.

Infusum.

Decoctum.

Infusum.

Decoctum.

Infusum.

Decoctum.

Infusum.

Decoctum.

Infusum.

Decoctum.

Infusum.

Decoctum.

Infusum.

Decoctum.

Infusum.

Decoctum.

Infusum.

Decoctum.

Infusum.

Decoctum.

Infusum.

Decoctum.

Infusum.

Decoctum.

Infusum.

Decoctum.

Infusum.

Decoctum.

Infusum.

Decoctum.

Infusum.

Decoctum.

Infusum.

Decoctum.

Infusum.

Decoctum.

Infusum.

Decoctum.

Infusum.

Decoctum.

Infusum.

Decoctum.

Infusum.

Decoctum.

Infusum.

Decoctum.

Infusum.

Decoctum.

Infusum.

Decoctum.

Infusum.

Decoctum.

Infusum.

Decoctum.

Infusum.

Decoctum.

Infusum.

Decoctum.

Infusum.

Decoctum.

Infusum.

Decoctum.

Infusum.

Decoctum.

Infusum.

Decoctum.

Infusum.

Decoctum.

Infusum.

Latini interpretes Arabes dixerunt Gallorum *Troesne* Latine dictum *Ligustrum*, sed id falsum est, quia arbor *Troesne* distat ab ea. *Henne* provenit ad altitudinem Mali Granati verum sectus, profert tantam tenuis virgis, ut *Salix*. Magnus eius est ceditus in *Agypto* [ut dicitur in viribus] propter tincturam. Item alibi: Arbor *Henne*, nascens in *Agypto* alio nomine *Alcanna*, in hoc differt à *Cypro* aut *Ligustro*, quod Galli *Troesne* non nuntiant: huic enim folia decidunt: *Henne* vero retinet. *Hucille*. Ergo cum *Henne* differat à *Ligustro* vulgari, ut testatur *Bellon.* pater quoque non esse *Cyprum*, cum *Henne* & *Alcanna* apud *Serap.* nihil aliud sit quam *Cyprus* *Diosc.* cuius verba recitat.

Alpin. sequens depravatam Interpretum versionem, ait esse *Diosc.* *Ligustrum* & addit esse *Alcanna* *Aule.* *Cyprum* *Plinio*, *Aegyptijs* *Elhanne* ac *Tamarchendi*. *Bellon.* & *Alpini* sententiam approbat quoque *Rauwolf.* additque Græcis communem vocabulo *Sihenna* dici: ex hulus radice Arabes vrere *Spodium*, ut etiam meminit *Auic.* c. 17. Melius convenire *Cypro* *Diosc.* de qua *Salom.* in cantico, quam nostras *Ligustrum*. Figuræ suæ titulum fecit, *Cyprus* Græcis.

Amar. & *Lacuna* hanc cum *Ligustro* confundunt. Denique falluntur omnes, qui vel *Plin.* non intellecta mente, vel vulgata eius lectione, vel sua decepti opinione, censent esse *Ligustrum* nostras, quod in superiori cap. sufficienter refutauimus.

Annotat Dod. à Turcis vocari *Henne*: cur verò in eius historia pro *Cypro* ponantur duæ icones *Phillyrea* nescimus, nisi *Cyprum* *Phillyrea* putarit, quorundam Recentiorum errorem secutus, qui *Ligustrum* Italoꝝ & nostras, ac ipsius etiam fortasse *Plinij* cum *Diosc.* *Phillyrea* unum & idem esse existimant. *Cyprus* Græcorum *Hist.* *Lugd.* quæ præter sententiam *Alpini* atque figuram quam habet ex *Rauwolfio* in descriptione sua dicit flores duobus digitis longiores.

Ligustrum huc *Cyprus* *Diosc.* *Portæ*: quod à Turcia nobis adfertur, vulgò *Alchenna* dictum, cuius folia contrita, crocea huc ruffa ruffum capillum reddunt, ut idem inquit, non autem vulgare *Ligustrum* *Marth.* Videat etiam *Lector* quæ cap. præced. notauimus de *Alkana* assulis.

Iam ex *Diosc.* dictum optimam *Cyprum* nasci in canope & *Ascalone*. *Plinio* *Cyprus* in *Agypto* nascitur. *Bellonio* *Alkana* *Aegypti* incolæ est, ubi omnibus notissimam testatur *Alpinus*. Speciatim refert *Rauwolf.* *Tripoli* & *poriff.* in *Cairo* provenire. Eam *Turcas* & *Mauritanos* propter gratum & suauem odorem *Moscho* similem, quæ flores exhalant, diligenter in vasis custodire, & hieme, ne frigore pereat, in cubiculis & subterraneis locis seruare. Et quia tardè noua folia protrudat, nempe Augusto, quosdam irrigare aqua sapone infecta; alios radici calidè ad nouere, ut citius floreat. Ad nos multi bacilli adferuntur. Pulvis viridis in instructionibus habetur officinis saccis plenis ex *Agypto* & *Africa* delatis. Onustæ naues deuehuntur per *Turciam*, eodem reite. Eiusdem puluerem subtilissimi habemus munere *Valerandi Dourez*, cum inscriptione, *H. 111* *Bellon.* Est is ex futeo nascentis. Verum cum non semine nobis misit *D. Paludanus* nomine *Phillyrea*. *Pulchello* *tracemulos* inter *Alkana*, nostra peregrina seruamus à *Cl. Alpino* nunc *horti Patavini* præfecto dignissimi non accepta.

Cyprum folia, ex *Diosc.* astrictoria vim habent: quare oris vlcerâ commandacata medentur, & illiæ tum feruidis alijs infla nationibus, tum etiam

carbunculis profunt. Eorundem decoctum igni ambustis applicatur. Ruffant & capillos trita, & illiæ folia, huc in struthii succo maduerint. Flos ex aceto tritus & fronti inductus capitis dolores sedat. Ceterum quod ex eo preparatur *Cyprinum* vnguentum, odoratum est, ac nervos exaltat & mollit: siquidem feruenti natura præditorum medicamentorum misturam recipit. *Plin.* *Cyprinum* oleum vocat, quo autore, exaltat, mollit nervos. Folia stomacho illinuntur: & vulgæ concitant, [sanguinem emittenti vel procidenti] succus quoque eorum apponitur. Folia recentia commandacata, vlceribus in capite manantibus, item oris, medentur, & collectionibus, condylo natis: Decoctum foliorum ambustis & luxatis prodest. Ipsa ruffant capillum rufa, adiecto *Struthii* mali succo. [Fallitur *Plin.* eadem vocis homonymia: conditum x. u. habet. *Diosc.* De *Struthii* herba seu *Lanaria* succo, non *Struthii* Mali intelligendum.] Flos capitis dolores sedat cum aceto illitus. Idem combustus in crudi olla nomas sanat, & putrescentia vlcerâ per se & cum melle. Olor doris olet, qui somnum facit. Succus *Ligustri*, seu *Cypri* eodem teste nervis, articulis, alioribus: folia ubique [vique vet.] veteri vlceri cum salis mica, & oris exulcerationi profunt. Acini contra *Phthiasin* item contra intertrigines, foliaque sanant & gallinæcorum pituitas acini. *Cypri* arboris folia, inquit *Gal.* summaque germina in usum veniunt, & facultatis sunt ac qualitatis maxime mixtæ: habent enim quiddam digerens cum aquea substantia, modicè calida: habentque etiam astrictorium quiddam ex terrena substantia frigida. Itaque eorum decocto quidam ambusta fouent. Utuntur verò etiam aduersus igneas phlegmonas & carbunculos. Nam absque molestia & morbo desiccant. Quinetiam spontè proueniuntibus in ore vlceribus, aphthodeli, & ipsis puerorum aphthis commensa accommoda sunt. *Paulus* in viribus hoc amplius quam *Diosc.* *Cypro* tribuit, ut aptè remediis his miscetur, quæ ad lienem consueptur: quod demiretur aliquis, inquit *Marcell.* nisi quia mollit *Ligustri* num vnguentum, durato *Lieni* idè accommodatum sit. Nec mirabitur, qui, ut dicebamus ex *Plin.* aduertet, calida quoque medicamenta recipere, quæ vique vim habent aperiendi & discutendi, præter vim remollientem, quam habet. *Serap.* præter ea quæ *Diosc.* & *Gal.* habet, addit, in muliebribus affectibus idem præstare, quod sanguis draconis. *Cypri* florem *Plutarchus* putat corollis intorquendum, quod placidum suauemque somnum potioribus accerlat, quippe qui lenem auram & mentem expiret, quæ remulentorum salubrosas asperitudines, sensim leuiget, ita ut conciliata tranquillitate hebes crapula retundatur, & caloris officio percoquatur. Folia madentia & impuncta discutunt (ut ait *Celsus*) ea, quæ in aliqua corporis parte inhaerent. Vnguentum è *Ligustro* *Alexandro magno* misit *Abdelonymus* *Sicyonius* scribit *Poilux.* *Auic.* tradit, quod si quis hominem tinxerit *Ligustro* quod producit florem album, *Alchannam* vocat ipse, cum misturam yrinam nigram: Sed durum est credere, id euenire ex illitione externa, nec apud vllum alium id legimus. Certum quidem est, apud *Turcas* admodum consuetum esse illitionem ex eo. Attamen de ea re nihil hactenus accepimus: nec verisimile est. Magni porro *Aegyptijs* (ut scribit *Bellon.*) ex *Cypro* ceditus: folia enim resiccata in puluerem redigunt ad tincturas flauas. Ex eo in *Turcico* imperio censetur 3000 ducatorum superat. Quam late iam patet *Turcia*, consuetum feminis hoc

Oris vlcerâ.
ra. Inflammationes
ambusta.
Capillum
tinctura
Cyprinum
Vnguentum

Stomachus.
Dienter.

Luxata.

Plus error
Cap. dolor
Nauis. 1. l.
era purg.
da.

Contra phthiasin.

Tepetam.

Ambusta.
Inflammationes
Carbunculi.
Oris vlcerâ.
Aphtha.

Lien.

Nona.

Auic. 111
Magni 111
Iuni 111
Cypr.

Lob. ar.

ilato coarguitur: Vnde colligere licet, *Mollem arborem* esse veri Balsami speciem. Sic Lob. sentit. Verum quia ipsa arbor nulla ferè in re ad Balsami descriptionem accedit, earum ea sola nota & odoris suauitate ex fructu seminisque magmate expresso Latice Balsami veri & genuini species censenda sit, nulla adhuc occurrit ratio. Sit quidem liquor Balsamodis & odoratus: an ipsam proinde arborem multum à Balsami veri fructu differant eius speciem dicemus? Sed odoratam tamen laticem *zalegantide* melius dixisset Balsami similem liquorem, quam *Mollem arborem* veri Balsami speciem.

Mollis.

Mollis & *Lentiscus* Peruvianus Cast. Durantis, cuius figuram habuisse ait ab Odoardo Lopes medico quæ sanè multum differt à Clusiana & à nostra.

Locus

Abundanter nascitur in conuallibus & locis planis Peruanæ regionis, ut referunt omnes, qui Occidentali in Indiæ descriptionem dederunt. Eius arboris pusillas duas plantas vidisse testatur Clus. in horto splendidissimo Ill. viri D. Ioan. de Brancion, sed quæ tertio anno perierunt hyemis iniuria. Annotat Lob. enatam ex semine in Anglia, ut Londini. Camerario sata sequenti vere exaruit, cum tamen magno studio ab eo fuisset asservata: liquorem ubi folia decerpebantur, emittebat lacteum, odoratum admodum.

Satio.

Tempus.

Roma, ut dicebamus, proceram arborem obseruauimus in horto quodam à D. Coruino pharmacopeo Romano peritissimo culto: Manu initio nondum floruerat, vix ante finem eius floribus lecta futura, ut iudicabat nobiscum idem Coruinus quo tempore tamen aliàs citius florere referebat Vere calidiori. Ex eadem tamen arbore pulchros ramos, quales pictura ostendit ex parte, cum floribus & baccis dono accepimus ab eodem: Misit ad nos baccas recentes, ut putabat, Doct. Casp. Bauh. quæ tamen frustranea spe satæ Montebellardi.

Vires &

vires.

Cynus

dolor

Peregrina

Acetum.

Mel.

Idolus sa-

cra.

Dolores fri-

gido.

Gummi su.

Purgant.

Pimenta.

Dentium

vobur.

Gingiva ab-

scedentes.

Refert Clus. ex Petro Cicea, *Molle* cortice adeo commendato esse, ut eius decocto crurum dolores & inflationes summa cum utilitate foueantur. Ex ramulis sunt denticulata utilissima. Ex fructu cum aqua decocto, pro coctura modo, fit aut vinum, siue potio admodum bona, aut acetum, aut mel: tantoque in pretio sunt apud Indos hæc arbores, ut quibusdam locis eas consecratis suis Idolis habeant: addunt nonnulli eius arboris foliorum decoctum, doloribus ex frigida causa ortis auxilio esse. Gummi verò eius, quod Manar modo candidum esse tradit, lacte dissolutum, caliginem oculorum abstergeret. Coruinus, qui nos eiusdem Gummi participes fecit, testabatur eius drach. vnam & semis, egregie aluum cicere, seque experientia vinum eius catharticam cognouisse. M. Fumea in hist. Ind. gen. quoque testatur ex *Mollis* arboribus fructiferis fieri mel, & portionem. Notat Cardanus huius corticem adeo salutarem esse, ut si aqua incoquatur, soluat lorio illa lassitudines ac tumores: ramuli, pergit idem, gingiuis ac dentibus utiles sunt: cum eis dentes fricantur, purganturque: Fructum, quem fort. exiguum, si iniicias aquæ, sola coquendi diuersitate, mel, vinum & acetum facit. Manifestum est autem, prius vinum fieri, quam acetum: mel verò dulcedine vinum precedit, crassitie subsequetur. Monarde quoque teste, magnis viribus pollet hæc arbor: nam corticis eius pulvis vulneribus inspersus, ea mundat, deinde carnem generat, & perfecte curat. Dentes eodem puluere fricati, stabiliuntur, gingiuæ abscedentes sanantur. Foliorum

decocto intincti pannus, & calidi vulneribus, aut puluere corticis illius insperso impositi, curationem eorum accelerant, & humorum eò defluxum prohibent. Ex ea manat liquor odoratus, qui fructibus adiunctus, suffribus idoneus est ad multos capitis morbos, & ad Emplastra. Eius quoque potio, quam ex fructu parant Indi salutifera admodum est. Ipsa arbor omni tempore odorata est. Scribit Io. Fragos. Corticem eius tantum virum esse, ut crurum dolores, tumoresque ingentes (si eius decocto aliquoties lauentur breui collat.

Dum de-

lor de in-

1011.

Mollis arboris fructus, inquit Lob. Carobalsamum verum virtute longè superat, cum expressus ex fructu liquor vero Balsamo viribus quam proximè accedit, eiusque defectu convenientissimum erit succedaneum. Huius fructus vnicuius octo tunc drachmas septem præstantissimi & verissimi laticis, artificioso torcularis pressu, sului ex atro coloris, crassamenti ouorum olei ferè & diuinae fragrantia, simillimi ipsius seminis odoris inter tendendum, & saporis Xyloaloes optimæ notæ, nobis dedere. Hic liquor recens expressus albescit & spumat: in laneam vestem sulus, & simplici ablutione aquæ lotus, notam non relinquit. Ex magmate seminis iterum tuso, & pauca rosacea asperso, pressu forti, laticis vnguinosis resinacei, instar grani lumpetini drach. duas elicui, qui maculam non relinquit: quinciam in aquam iniectus & agitatus, celerrimè liquatur, diluitur & lactis modo albescit. Quibus notis colligit idem *Mollem arborem* esse veri Balsami speciem, de qua te prius.

Balsami

succedaneum.

Expressus

laticis.

Balsami n;

ra.

MOLLIS ARBORIS RESINÆ SIMILES, FOENICULI ODOR.

CAP. XVIII.

DOnabat mihi honestus vir Petrus Garetus [in- Descriptio.
quit Clus. Exot. lib. 4. c. 8] succum octatium, quem acceperat ex navigatione longinqua anni 1600. Erat densa resina, nec transparens, foris colore f-

colore fa-

mille.

Sapor.

subrufa, inferiore parte alba, & digitis attrita satis friabilis, odorisque non iniucundi, sed femineuli odorem quodammodo referentis, ut suspicionem mihi moueret *Mollis Arboris* resinam esse posse, sapor erat amariuscule & acriuscule: nec dentibus cedebat, nec ore retenta mollescebat igni tamen admota liquecebat instar cere, atque splendida fiebat, flammam tamen non concipiebat.

Resina alia

Nonus verò, Resina erat cineracei ex albo coloris, adeo autem strigosa & retorrída, ut gleba aut lapidis fragmentum potius videretur, quam resina: licet quispiam suspicari posset eiusdem generis esse cum superiore, sed magis impuram, quia simili odore & sapore prædita erat cum ea, nec dentibus cedebat, nec ore retenta mollescebat, igni tamen admota perinde atque illa liquecebat, & flammam non modò concipiebat, sed simul etiam ardebat.

ELEMI RESINA.

CAP. XIX.

Gummi Elemi in massis Cylindraceas cogitur, quas pollice & medio digito complectaris, duarum palmatum circiter longitudine. Substantia verò est ferè vniiformi, cere flauæ & colore

Descriptio.

yy 3

& consistentia simili, facile hanc concipiens color alias intensior, substantia resinacea, sub dentibus facillime lentescit dealbaturque, sapore non ingrato nonnihil acri & subamaro, odore ferè Fœniculi. Obvolvuntur autem glebæ, quæ ad nos importantur, pulchro folio, à cuius nervo medio parallelæ oblique in margines creberrime feruntur venæ, quod canna indicæ videtur esse. Funiculis præterea Xylinis simul omnia cōstringuntur.

*Palium quo
annuitur.*

Illud autè quod à tringita annis Gummi Elemi nomine asseruimus, magis est friabile & exlucum, colore ferè croceo, quorum vitumque vetustati videtur adscribendum: alioqui folio eodem involutum est. Multa habet communia cum Resina Gummi dicitur ab arbore, nonnisi à D. Paludano, id quod Doctorum & Peritorum crutina dignum est eamque ob causam hoc loco de eo agere placuit.

*An gummi
stille ar-
boris.*

Quidam Aethiopicæ Oleæ lachrymam esse censent, Gummi Elemi dictum, ut annotat Cordus, & ante illum Herimolus, quasi Enhæmum: quod ut non negamus, inquit ille, ita etiam non affirmamus. Apud eundem in margine annotatum. Gummi Elemi suspicantur aliqui esse lachrymam cedri.

*Olea æ-
thiopice
lachryma.*

Marcel. Ficinus in Antid. Epid. ait Elemi quibusdam Gummi cedri esse.

*An Lachry-
ma Cedri.*

Fuchs. de comp. med. Oleæ, inquit, Aethiopicæ lachryma Officinis corruptè Gummi Elemi nominatur: videntur verà carere.

Nimium securè Rythius in Diosc. scribit de lachryma Aethiopicæ Oleæ Gummi Elemi ab Eleæ, vel corruptè Enhæmum.

Ita vides nostrâ etiam ætate obscurata admodum esse Elemi originem, quod & suo tempore annotavit Matthioli. qui negat Gummi Elemi Recentioribus Medicis & Officinis dictum, esse Aethiopicæ Oleæ lachrymam, quia gustu mordax non sit ea lachryma [et si improprie Gummi appelletur] non in Gummi quidem, sed verius in resinarum genere recipienda.

*Resina est
ma Gummi.*

Matthiolo ad stipulam Hist. Lugd. traditque vehementer errare qui putant Oleæ Aethiopicæ lachrymam esse. Gummi verò improprie dici, cum in Resinarum genere sit potius, ut ex eo intelligeret, quod igni exposita hæc lachryma statim colliquescit ac diffunditur, non aliter quam Resina, quæ ex Pinis, Piceis, reliquisque resiniferis stirpibus manat: nullum autem Gummi genus igni liquatur, nisi addito aceto, aut liquore alio, sed vritur.

Lacuna autor est, Gummi oleæ silu. siue Aethiopicæ hodiè non adferri, quamvis aliqui credant esse Gummi Elemi vocatum, quod potius resina sit sed ex qua arbore, ignorari.

Amatus tradit dici hodiè Gummi Elemi corruptè quasi oleæ, quum Oleæ Aethiopicæ lachryma esse debeat. Quæ verò in offic. hodiè habetur, iucundi sanè si prunis inieceris odoris est, quæ an vera vel falsa sit debatur, quia Gummi Elemi offic. non habet affinitatem & similitudinem cum scammonio, & sit resina, ut iure censendum sit vero gummi Oleæ Aethiopicæ nos carere.

Autore Cæsalpino Scribit Diosc. Oleastrum in Aethiopia lachrymam fundere Scammonio similem, mordaci gustu, fulvæ, stillis constantem exhibus.

*Lachryma
Theoph. ad
sist. sang.*

In mari Rubro peculiarem describit Theoph. è cuius Lachryma Medici medicamentum componunt sistendo sanguini. Plin. Enhæmon appellati Oleæ lachrymam in Arabia singula in effectum.

contrahendis vulnerum cicatricibus. Hoc fortè fuerit illud quod a recentioribus Chirurgis vocatur Gummi Elemi.

*Enhæmon
lachryma
Gummi.*

Io. de Vigo l. 8. c. 19. Oleum Hypericonis tradit, quod recipit Gummi Elemi. Cronenburg. exponit esse lachrymam Oleæ Aethiopicæ apud Diosc. corruptum initio in Eleæ, postea in Elemi & Elemni doctam Medicorum scholam credere. Nostrum autem vulgare potius ab odore, resinam Piceæ siue Pinus esse edendum esse, quam verum Gummi: qui ambigit, inquit, supra ignem expectatur, nam continuo colliquescit ac diffunditur, resinarum instar, quod Gummi non faciunt, atque sic controuersit suæ ipse iudex sit.

*Gummi A-
lemni.*

*Resina Picea
vel Pinus.*

Nescimus cur Alex. Bened. vulgare hoc gummi tertium genus Haliini censuerit, quum tamen Diosc. fruticem, alij plantam asserant, ac prorsus de lachryma nihil Apollo supra Balsamum artificiale: Gummi Heleni siue Elemi, quasi Enhæmi, non vsu venit nisi addito aceto aut vino, odoratum valde. Verum ex quam planta refudet, incomptum esse ait, nullam notam habere cū lachryma Aethiopica communem. Nos, inquit idè, quandoque suspicati sumus lachrymam esse Oleæ maritimæ Theoph. & Pinii Enhæmum: Nos verò contra non probamus Apollinem marinam plantam dicere maritimam, Theoph. l. 4 c. 3. scribit in mari provenire, non autem iuxta mare: quæ occasio, ut nullo modo possit esse olea Aethiopica, nec etiam Gummi Elemi.

*Gummi He-
leni.*

Cæsarpinus sanè scripsit in mari rubro provenire Theoph. plantam: si ita est, ut sanè ex Theoph. apparet, non potest esse Gummi Elemi, ut ille etiam suspicatur, nec olea Aethiopica.

Lonicerus Elemi & Elestem esse gummi tradit, simile Gummi oleæ Aethiopicæ, nimirum quasi utrumque tam probè notum habuerit, atque adeo maiori etiam temeritate vires ei tribuit lachrymæ Aethiopicæ, non declarans interim quid sit.

*An Lachry-
ma Olea
maritima
Theoph. &
Plin.
Elemni.*

De Loco natali eius nihil adhuc certi accepimus, Indagabit posteritas.

*Lonic. generis
est.*

Testantur plerique qui de eo scripserunt mirabiles eius vires esse in vulneribus capitis quo namine tam apud medicos quam Chirurgos celebratissimum habetur. Practici quoque in calvarie fracturis ac vulneribus nunquam id in suis Emplastris ac vnguentis omittunt, mirabilem eius usum continuo experimento edocti, quæ de causa ex eo & vnguentum & ceratum à pharmacopolis diligentioribus concinnatum habetur. Eius loco nonnulli officinarum mangones (nō tante id Anato) Hedera gummi non sine agrotorum detrimento accipiunt.

*An Lachry-
ma Olea
maritima
Theoph. &
Plin.
Elemni.*

*Hedera
gummi pro
malis.*

PHILLYRÆA ET MAHALEB

C A P. XX.

DE Phillyræa & Mahaleb merito hoc libro agimus, ut baccifera planta. Cuius tractatio cum maxime intricata sit & apud Autores controuersa, primum more nostro in talibus consuetudo ex autoritate Veterum de ea trademus in genere, passim ubi opus videbitur Neotericorum nostræque placita inferentes. Distinguiamus autem à Phillyræa arborem quæ proprie quædam Græcis, Latinis *Tilia* dicitur de qua lib. 8. agemus.

quædam Diosc. arbor est cypri magnitudinem æquans, folijs Oleæ similibus, sed latioribus & nigrioribus, fructu Lentisci, [xno] nigro, subdulci

Locus.
Cordus re-
preh. La-
nic.

dulci, & quasi racemato. Locis asperis nascitur. Procius autem hallucinatur Cordus, qui ad Diosc. hunc locum annotat: Quæ hoc capi, ab eo describitur Tilia omnino eandem esse cum Ligustro, quem oscitanter quoque Lonicerus secutus est, eorum opinionem merito Matth. ante nos reiecit, qui errorem paullo potius apertius detegimus.

Temerè quoque plerique interpretes Phyllyreæ vocem in Tiliam transmutarunt, non agnoscetes manifestum discrimen inter hanc *quidam* & Latinorum Tiliam, quæ nostro sanè iudicio Theoph. est *amara*, ab eodem in matrem & feminam distincta.

Theoph. cor-
rept. & il-
lustr.

Sunt tamen qui apud Theoph. non absque ratione legant & intelligant hanc, quando ait: Ex siluestribus perpetuò virent *amara*, (sed illi *amara* legunt, Gaza vertit Philyca, quamvis in eius versione Philyca scribatur, an ex veteri aliquo codice, vel suo cerebello, nos later: nec scimus ubi locorum Theoph. vel eius interpretes & imitator Plinius Philycam commemoret.) quæ in olympo monte provenit. Hæc l. i. c. 15. hist. Forè & l. i. c. 8. legendum *amara*, quando scribit: Quædam cortice tenui ut Laurus, *amara*, [Gaza Tiliam reddit: quam tamen nemo nescit cortice esse crassissimo] seu uti nos, Phyllytea.

Plin. quoque Tiliam non distinguens à Phyllytea, Tiliæ dotes eas assignat, quæ à Diosc. Phyllyreæ tribuuntur.

Plin. error.

Sic & Paulus Aegin. veramque manifesto errore confundens, eadem & quidem rotidem verbis suæ Phyllyreæ ascribit, quæ Diosc. Phyllyreæ.

Ruell. Gazæ versione deceptus priore loco apud Theoph. legit Philycam. Verum enimvero quomodo Theoph. Tiliam folio deciduo diceret Philycam, vel ut nos potius legendum censemus, Phyllyreamque perpetuò viret?

Ruell. re-
preh.

Audiamus Arabes, qui *Mahaleb* vocant.

Mahaleb.

Mahaleb Diosc. (inquit Serapio) est arbutum simile arbori Alcannæ: dixit Gal. in tractatu nouo quosdam putare esse Carpobalsamum. Scribit Albasarti, *Almahaleb* esse calidum & siccum, de ferri ab Andargen & Nahand: Melius esse, quod simile Margaritis minoribus & boni odoris. Isaac eben Amram Almahaleb diuersas species tradit, album, nigrum, & viride: albo grana esse parua: maius esse magnitudinis Cicerellæ, adferri ex insula: Hispanicum autem minus esse. Melius esse albidius & nitidius, meliorisque odoris: deterius verò nigrius. Vsum esse medullæ sine cortice, qui niger est, & internè albus deferri ex monte Sebuon & Deibegen & de Nahand, cuius arbores grandes: colligi Septembri, vsum esse grani & corticis. Verum apud eundem Serap. in margine malè scribitur Mahaleb esse Tiliam Diosc. præstitisset retinere nomen Græcum Phyllyreæ, de qua Serapionem scribere manifestum est ex verbis, quæ ex Diosc. citat.

Almahaleb.

Differentia
album.
Delectus.

Tempus
Serap. in-
serptum er-
ror.

Mahaleb. error.

Matth. [ut etiam indicauimus l. i. c. de Cerafo amara, Mahaleb putata] non sine errore concedit errasse Serapionem, existimando Phyllyream & Mahaleb Arabum idem esse, quia facultates ex Arabibus sint diuersæ à Phyllyreæ facultatibus. Nos sanè nihil adhuc videntius in Serap. ex quo sententia Matth. confirmari possit. In viribus notandum Diosc. scribere de folijs, Arabes de granis. Quinimò quod Diosc. ait vrinas ducere, respondet viribus ab Arabibus traditis. Serap. id interpretatur de granis. Non concedimus igitur Marthiolo Serapionem capite de Mahaleb erras-

se, hanc eandem facientem cum Phyllytea.

Auicenna *Mahaleb* vel *Mahaleb* eligit album & purum. Bellunensi Mahaleb est grauum tructus, simile ossi ceraserum, notum in Syria, & commendatum contra calculos renum.

Serap. defen-
ditur aduer-
sus Mahaleb.
Hermol.
Marcell.
repreh.

Hermolaum, virum aliqui doctissimum, miramur *amara* apud Diosc. interpretatum Tiliam, id eandem cum illa facientem, ut amplius docebitur in historia Tiliæ. Maior etiam uicinis admiratio habet, eundem secutum Marcellum, nullam aliqui occasionem omittere solitum, si quando Hermolaum capere possit. Hos more suo sequitur Ruell. ac Hermolai verba pro suis venditat. Mirum tantum discrimen & doctissimi viris non obstratum, inter Phyllyream, inquam, & Tiliam seu Philycam. Sed quid non possit securitas ac confidentia tum sui, tum erga alios? Quanquam satis evidens sit eos parum in stirpium cognitione versatos.

Agricus excusabitur Tragus, vir pro ea ætate in persecutandis stirpium historiis ac naturis sagacissimus. Nam nec is quidem distinguit.

Sed prædictos Diosc. interpretes aliosque nominis vicinitate deceptos putamus, non agnoscences Tiliam Græcis *amara*, non autem *amara* dici. Quid si eos Plinii quoque autoritas in eum errorem traxisset? qui tradit Tiliam arborem esse proceritate perquam modica, cum ipso sensu constet contrarium: Forè & huic nominis similitudo imposuit. Inde factum, ut dicebamus, ut Tiliæ eas attribuerit vires, quas Diosc. suæ Phyllyreæ, quem errorem etiam Ruell. incautè secutus est.

Plin. error.

Lonicerus asserit, nulli allatâ ratione autoritatè, Ligustrum & Phyllyream vnam & eandem esse plantam, contenditque caput hoc Diosc. de Phyllytea spurium esse. Quid spurium? Ac codices Græci non solum impressi, & si quidem probatissimi, sed etiam Oribasi codex manu scriptus habent & caput illud, & Phyllyream nomine tenus, quemadmodum & Paulus, & Serapio, quem Arabico sermone Mahaleb appellasse diximus.

Ruell. not.

Imperitum in re herbaria Lonicerum deceptisse videtur quod Phyllyreæ descriptio a Ligustri, quod Græcis Cypros dicitur, non parum conueniat.

Lonic. re-
preh.

Porro *Mahaleb*, inquit Cordus, seu ut Arabes vocant *Mahaleb*, nuclei sunt, figurâ, quantitate & colore cerasorum nucleis similes, gustu tamen teneriores, vehementiores & odorati, ideoque suauis odore oris halitum commendantes. Eligito recens, hoc est, plenum, in candido subrufum, odoratum, & minimè vetustate rancidum. Afferitur ex Africa & Aegypto in Italiam, Galliam & Hispaniam: in Germaniam verò rarissime, quia apud Germanos nullus adhuc eius usus inualuit. Arbor autem in qua nascitur, qualis sit, nobis nondum constat. Hæc Cordus. Cui Gesn. addit iconem Cerasi amari, de qua egimus suo loco, non tamen existimauerimus Cordum hanc plantam intellexisse.

Mahaleb.
Mahaleb.
deferre.

Locus.

De eadem sic scribit Rauwolf. Halepi apud aromatarios vidi parua semina alba, *Mahaleb*, quæ duro cortice cōtinguntur, longiuscula, acuminata, obducta tenui tunica, Pistachiorum modo. Ex istis regionibus multa transportantur in Syriam, quibus vtuntur ad odoratum saponem. Arbutulas in quibus proueniunt, non vidi: quantum intellexi proueniunt in vicinia, potissimum in montibus itineris Persiani. Ab incolis hodierno adhuc dicuntur Serap. nominatur *Nahand* ille tractus.

Osseus
repreh.
Mahaleb.

Nahand
Serap.

Phyllytea propriè quid Latine significet, se nesc-

*Mahaleb
Syracum
spinosum
Almahaleb*

Oleum.

*Math. re-
preh
Alter eiu-
dem error.*

*Ligustri
speciei
amar. not.*

*Lacuna not.
Chamae-
cerasus.*

Gesl. reproh.

*Theop. e-
mend.*

cite fatentur Monachi apud Mes. Arabicè autem esse Mahaleb, de quo præter iam dictos Arabes etiam Rhafis & alij plures Arabicæ linguæ Scriptores percreta agunt. Mahaleb autem arbusculum in Syria notissimum esse, & modè ibidem vulgò Mahaleb vocari. Eam (quod illic sciunt) non reperiri in Italia. Esse enim spinosam, folijs Oliuæ similibus, ferre grana quasi racematim in ramis, ut Lentiscus, paullo crassiora tamen: è quibus Syri oleum exprimant, valde odoriferum, ex quo conficiant saponem. olfactu suaves, & alia plura. Sequæ habuisse ramos eius allatos à sui ordinis quodam fratre, qui ex ijs partibus redierat. Ergo [addunt] Mahaleb non sunt fructus Cerasi sylvestris, ut ferè omnes iuniores hallucinantes interpretati sunt. Fortasse quia cum immediate post oleum de cerasis, Melius posuerit oleum Almahaleb, & in eius descriptione dixerit, oleum de Almahaleb fortius esse in omni re, quam oleum de cerasis, inde fortè putantes, Mahaleb esse cerasiam sylvestrem: sed reuera satis differunt inter se. Ex quibus pater oleum de Almahaleb non esse oleum de cerasis sylvestribus. Quod si vera scribunt Monachi, Mahaleb spinosum in Syria proueniens, planta erit diuerfa à nostra Phillyrea, aut certè eo ipso varians, quod sit spinosa: nam cætera conueniunt.

Marthiolo assentimur, Cerasum amaram de qua suo loco egimus, à multis dictam Mahaleb, non esse Phillyream Diosc. sed esse Mahaleb Arabum non concedimus. Nec etiam scimus an vnguentarij, quod ille scribit, illius plantæ nucleis vtantur, ad lineamenta odorata paranda, an potius ut nos censemus, ijs qui ex Syria adferuntur, eò aliunde illata, ut dictum. A nemine hactenus annotatum, quod equidem sciamus, ex ceraso amara colligi & reponi pro vnguentariis grana. Nihil tamen certi adhuc statuere possumus, cuius plantæ sint illa semina cum eam, ut dictum, Monachi spinosam faciant, qualis sanè nostra Phillyrea non est.

Amatus Phillyream speciem Ligustri facit, & ait Hisp. *Otrasuerte* de Alhenam dici: forteque Germ. *Bartrigel*: Arab. *Mahaleb* &c: sed non docet quæ aut qualis sit illa Ligustri species, aut an cognitam habuerit. Nomen etiam Germanicum Phillyrea nostræ minimè cõuenit. Tam hic quam Lacuna erroris accusant eos qui per Phillyream Diosc. Tiliam intelligunt: & merito, sed interim ij nuda figura contenti, quam Lacuna ex Marth. proponit, non docent quid sit.

Gesl. in epist. ad Collinum in fine descriptionum Cordi notat à Dalech. chamaecerasum nominari arbusculam, quæ Arab. Mahaleb dicatur. Aduchi ex Syria, quamuis ubique per sepes circa Lugdunum nascatur, sed fructu minùs habito, ut ille ait, nucleo & semine tenuiore. Ast nos Chamaecerasum hanc non existimamus Mahaleb, quia Mahaleb & Phillyrea non differunt, Chamaecerasus verò multum differt à Phillyrea.

Adstipulantur quoque Pen. & Lob. frondosam illam patulam Theoph. *amara* Tiliam esse, non hanc, in alle tamen se legere *amara* huc Olea amariam istam, quam Diosc. describit per congruam descriptionem, & Olea non modò similem, sed etiam sociam, ut ab Oleastris, quibuscum frequens reperitur, nihil ferè discrepet: cuius duo modi, de quibus postea.

Apud Theoph. *amara* scribitur, non ut illi habent, *amara*. Taber. & eius cõfarcinnator Braja de hac nihil tradunt, præter ea quæ acceperunt à Clusio, quasi sibi conperta, nisi quod Germ.

Steinlinden vocent, quod nomen non placet. Quid Phillyrea commune cum Tilia, quæ Linden Germanis: Steinlinden autem Tiliam laxatilem significat. Sed iam differentias à Neotericis & nobis obseruatas videamus.

PHILLYREA ANGUSTIFOLIA: SIVE VARIETAS.



Hanc primò dicamus, tanquam notissimam hoc seculo, & ad Veterum Phillyream omnium optimè accedentem, ut adeò eadem esse videatur, quod *Folia*. tamen nolumus ita temerè pro certo & indubitato asserere aulimus. Ergo frutex, quem Monspelii nostro tempore Phillyrea vocant, nonnūquam arbo-

rescit, cortice cinereo obiectus, materie alba, ramis sibi inuicem oppositis, folijs Oleæ situ aduerso respondentibus, nigrioribus, nec unà ut Oleæ candicantibus, modò angustis, & olearum folijs angustioribus, nunc mucronatis, aliàs subrotundis, interdum nonnihil in ambitu serratis, duris, acrimoniæ cuiusdam & amaritudinis nequaquam expertibus: ad quorum exortum flores multi vtrinque ramulos coronant ex herbarum albi. Succedunt bacæ rotundæ, patule, ceruleæ, vel potius violaceæ, breuissimis pedicellis racematim ramulis adhærescentes, dulces cum aliquo amaro: in quarum unaquaque officulum paruum, in quo nucleus.

Ut verum fateamur, cum essemus Monspelii, minùs diligenter obseruauimus an sine species diuersæ quæ ibi proueniunt, an tantum naturæ lusus.

Camer. ad hist. Germ. & in Epir. Marth. proponit iconem ex nostra sicca iam olim depicta per Gesnerum, quæ angusto admodum folio pingitur, eadem tamen nobis videtur cum Clusiana à nobis proposita. Is Phillyream 4. facit, traditque humanam altitudinem æquare, ramos tamen minores & frequentiores habere quam Phillyrea folio llicis & Phillyrea latiori folio non crenato, nigriore cortice rectos: folia Oleastris, angustiora, viridiora, amaritudinis non expertia: flores etiam exiguos albicantes, Oleæ similes, simul congestos, & inter foliorum alas circa ramulos nascentes: quibus succedit fructus, maturitate niger, baccarum Myrti magnitudine, officulo duro præditus. Abundè in Castella noua Hispaniæ, locis incultis, non procul à Tago flumine dilicis inuenitur, & frequenter agro Monspeliano in sepibus. Monspelianæ Academiæ studiosi olim, modò Oleastrum, interdum etiam Halimum appellabant. Hispani huic & sequentibus duabus indifferenter nominant dabant modò *Piadera*, modò *Laderna*, nunc *Lentisco*, nonnulli etiam *Tornisco*, quod *Thymelea*.

Descriptio.

Flores.

Bacca.

Officulum.

Phillyrea 4.

Clus.

Flores.

Loc.

le.

lex proprium.

Phillyrea quinta eidem Clusio dicta, iam descripta, forma & magnitudine similis, in hoc differens, quod eius rami tenuiores, ratiore, minusque conferti: frequentiores etiam habet virgas à radice germinantes, fructu satis contumaces. Folia etiam ex aduerso disposita, paulò longiora & angustiora quam prædicta, oleastrinorum modo firma, saturatius virefcentia, subacris saporis. Hanc & fructu & flore carere incolæ affirmabant: sed utrumque superiori similem proferre non dubitare se idem Clus. scribit. Nec alibi hanc vidisse, quam in incultis Hispaniæ Castellæ veteris & Bæticæ.

Locus. Non dubitamus de Phillyrea quam hoc loco depictam damus, scriptisse Penam & Lob. in Adu. ubi duas icones exhibent quæ minùs placent: dubitamus tamen an per minorem suam intelligant Clusij quartam, & per maiorem, Clus. 1. de qua postea. Labet lectori eorundem verba proponere, quæ sic habent. Phillyrea duo modi arborescunt in Galloprovinciæ viarum marginibus & oliuetis Massiliæ vicinis: & quæ maior, rarior persimilis pumilæ Oleæ, caudice ramisque nigrioribus, longioribus quam oleæ agrestis, & folio magis ad Ligustrum accedentibus. Bacculæ multæ in ramis, etiam oliua agrestis minores, non amaræ (ut oliuæ) sed subdulces, nucleo intus Cerasi. Minor multò frequentior ipsæ in naturalibus & Monspelij collibus glareosis: folio æquè longo, sed angustiore duplò: duplòque minor tota planta: similes acinij Lentiscinis & similiter racematim proximè hærentes admodum curto pediculo, quæ item maturæ subdulces sunt, aliquantum acres, sed neutiquam ingratae, ut sunt Oliuæ sativæ & agrestes.

Matth. nat. Senentis (Matth.) intareit plaustro verbosarum autoritatum, nec tamen, quam dat describit.

Varietates plures. Lob. in obs. Phillyrea Narbonensis florida. **Varietates:** Belgicis hortis Hispano semine angustioribus folijs gemina Phillyrea visitur. Item latifoliam cristatam & tenuifoliam munere Georgij Rye plerique habent in Viretis Belgicis. Phillyrea angustifolia flores. Apud eundem pro Phillyra Narbonensi posita est icon, de qua paulò post. Pro angustifolia ea quæ à nobis ex Clus. iam proposita duas figuras ponit Lob. in iconibus, omittis ipsas quas habebat in Adu.


Matth. nat. Scribit Cæsalp. *Ilacrum* vulgò appellari, alijs *Limerum*, fruticem in maritimis tractibus frequentissimum veluti oleam quandam parvâ, multis ramis fruticantibus: folijs oleæ durioribus ac viridioribus, similiter perpetuis: florere à lateribus in alis foliorum, non oblongo racemulo, ut olea, sed acervatis granulis fructum ferre nigrum, Ligustro similem: unico intus ossiculo, tenui purpureo, figura oliuari. Frequentior in hac sterili, quasi in eo genere mascula, quam Plin. Alaternum vocat inter steriles quæ fructum nullum ferunt, ei folia, inquit, sunt inter Ilicem & oliuam. Vidimus tamen quandam angustiori folio quam olea, quandam latiori breviorique, ad Ilicem valde accedente. Hanc (addit idem) videtur Theoph. Phillyream appellasse, perpetuò virentem, unde illi honor in alendo pecore, cum semper fronde abundet. Obdientissima est materies, candorque ei Celastri modo. Germinat ineunte vere: Fructum reddit post occasum Vergiliarum. Montibus est propicia. Diosc. Phillyream vocat. *Hætenus Cæsalp.*

Phillyrea minor Penæ & 4. Clus: Alaternus minor Dalech. Hist. Lugd. Dodonæus in hist.

Lat. nomine Cypri proponit à nobis hic exhibitam, sine ulla descriptione. Cur id faciat, nescimus: cum Cypro sanè non conveniat.

Cypri.
Dalech.

PHILLYREA LATIVSCVLO FOLIO.



Hanc Clus. Phillyrea tertiam minorem ut plurimum tradit, ea, quæ folio est Illicis, ac ea cui folium Alaterni: illius tamen arborescunt vidisse, ait, duorum hominum altitudinem æquantem, & ab illa ramulum suis floribus onustum avulsi se, è quo suam iconem delineari curavit.

Eius autem rami, inquit,

exalbido cortice teguntur, ut in alterâ, [quæ folijs Alaterni] aliquantulum rugoso: folia habet iam modò citatis angustiora, nullis crebris serrata, eiusdem ut in præcedente coloris, adstringentis gustus: Flores Oleæ similes, pusillos, ex herbaceo candicantes, conferti inter totum exortus nascentes: fructum deinde rotundum, superiori similem. Desertis Bæticæ locis nascitur. Eius etiam unica arborescunt in Narbonensi Gallia ab eodem conspecta, ad ingressum pagi Perani vicini Volcarum stagno, secundo à Monspelio miliari ubi, inquit, libenè memini Alader dicebatur. Hispanis ipsædem nominibus, ut præcedens.

An Penæ & Lob. Phillyrea maior de qua antè Lob. sanè in Obs. iconem Clusij ponit pro Phillyrea Narbonensi florida Adu. p. 420. Idem in icon. Plantini.

Matth. more sibi consueto iconem habet sub titulo, Phillyrea: descriptionem autem nullam. Vnde conicere licet, nunquam ei visam. Ait quidam Phillyream arborem longè diuersam à Tiliâ, in Italia provenire, asperis tantum montibus, quibus maximè gaudeat, fructum Lentisco similem, racematim coherentem, rubentem, granis, quæ vocant Paradisi, non absimilem. Oportebat demonstrare ubi talem fructum viderat, alioqui vix ei credendum censemus. In epit. ait esse Mahaleb Arabum: nihilominus pag. seq. ponit aliam plantam pro Mahaleb mauritanorum, nempe Cerasum amarum: docuisset saltem aperte quid intelligat per suam Phillyream: quanquam icon ab eodem proposita non malè respondere videatur iconi hac ex Clus. appositæ.

Lob. & Penam scimus Matth. Phillyream ad frequentem referre. Nos verò cunctabundi hæremus, nec quicquam affirmamus, quia nescimus quantum Lobeliana sequens differat ad hac.

An Cæsalp. *Ilacrum* latiore breviorique folio, ad Ilicem valde accedente, de qua antè.

Gesl. in sine hist. Cordi. à Matth. pictam Serap. Mahaleb vocat. An eidem de hortis Phillyrea Bellon. in hortis Luteriæ conlita, quæ etiam Ve-

Descriptio.

Folia.

Flora.

Locus.

Slader.

Matth. nat.

prob.

Matth.

sur. (si præcedentem non intellexit) his verbis: Phillyrea videlicet ea, quam Diosc. descripsit, non illa quæ Lat. vocatur Tilia, arbor est mediocriter magnitudinis, candidæ satis crasso, quæ ubi ad iustam magnitudinem adoleuerit, vtraque manu nemo complectatur, cum ambiguum quatuor non raro dodrantes impleat. Cortex illi levis, nec ita scaber ut alijs plerisque arboribus, præsertim in ramis & furculis, colore cinericeus, & Ligustro similis, qui etiam materiam habet non dissimilem. Ramuli minores, & furculi cruciformi & alternante positi aduersi sibi in geniculis seu exortibus respondeant. Folia fescunciam longa, vel paullo longiora, semunciam circiter lata, breuibuspediculis hærentia, utroque capite in angustum fastigiata, Oleæ folijs similia, obtusiora tamen & proportionè latiuscula, nec ita candida ut ergo nec in lateribus retrorsum reflexa, sed æqualiter lata, glabra, nitentia, & egeste viridia, multâ circa ramulos frequentia, & inuicem aduersa sibi in exortu, crassiuscula ut Buxi, hyeme non decidua, Vere autem subnascens alijs nouis decidunt. Quæ verò circa nouellos stolones sunt folia, alijs plerumque duplò longiora existunt, & leniter per ambitum serrata. Flores, quibus singulæ succedunt bacce, similiter ut flores in racemos digestæ, rotundæ, paruis luniperi aut Lentisci bacis similes & æquales, principio virides, in maturitate purpureæ, rotundo intus nucleo, gustu cum aliqua dulcedine adstringentes. Folia item gustu adstringunt, cum amaritudine & acrimonia aliqua, quemad. & immaturæ bacce, eodem modo; quo Ligustrum, oleaster & olea. Materia arbori lenta, alba & satis solida. Radicibus nititur multifidis, non rectâ descendens, sed per obliquum deorsum adis. Nascitur in montibus, asperis locis, iuxta fossas in aggeribus, ac fossis in Hetruria agro Florentino. Non ubique in arbore excreuit, sed Ligustri modo, parua manet & fruticosa.

Phillyream Illicis folio cognominantur. Quædam à Phillyreis excepta. Clus. cuius iconi non male accederet, nisi folia essent paullo longiora latioraque & pediculos haberet longiusculos: descriptio aliqui non repugnat.

Non minus tamen ex fragmento palmari tantumtaxat sens foliorum oppositis coniugatorum veribus stipato, pro certo adstruere esse. Clus. Phillyream, quam ipse sic describit: Phillyream dictam folio Illicis magnitudine superat, multis ramis candicante cortice obiectis prædicta: folijs Alaterni prioribus, pene similibus, firmioribus tamen, & minus nigricantibus, saporis quidem aliquantulum acris, sed in quo amaritudo sentitur. Neque illius florem conspexi: ipsum autem fructum racematim inter folia præpendentem, magnitudine granorum Piperis, aut fructus Myrti, rotundum, nigrum, calidi gustus, ossiculum & durum nucleum, candido & fragili nucleo obductum continentem. Decembris initio legebam.

Variis Lusitanie locis, in sepibus, sed nusquam copiosior, quam circa Tomar in lignem pagum, unde plurimum fructum in Belgium detuli. Lusit. dicitur Adorna.

Est item nobis ramus Phillyreæ Montpelio delatus, cuius folia bene respondent iconi Clus. quæ hic exhibemus, verum quædam folia non sunt serrata, alia medio tenus caputem serrata, quædam per totum fere ambitum: ramuli tenuiores quam in præcedenti, foliorum color etiam magis vitæ. An diuersa sit à præcedenti, an eadem cum Clusiana hac, diligentibus inquirere edam relinquimus.

PHILLYREA FOLIO ILICIS.



Est autem quæ folio est Illicis, Clus. teste, aliud assurgit quam Ilex Cocigera, ramulosque habet pollicaris est etiam amplius crassitudinis, cortice viridi, sed candicantibus maculis asperso-rectos: folia Illicis cocigera, maiora, viridiora, crassiora, in ambitu non nihil spinosa, adstringentis quidem gustus, sed non ingratum.

Huius flos eadem non conspectus, sed fructus. Lenticino æqualis est foliorum alis dependens, maturitate niger, ossiculum continens.

Frequens est in Lusitanie incultis circa Eboram. Quibusdam vernaculo Hispanorum sermone Alab. dicitur, illius semen Oxyacanthæ nomine ad Belgas missum.

Hist. Lugd. Phillyream Clus. priorem vocat. An Lob. obl. Phillyrea latifolia cristata. An Cordo Philycina, quæ sub * [sic ille habet, Quid?] à ros latif. Phillyrea.

Arbuseula est fruticosa, Phillyreæ aspectu similis: siquidem ligno, ramulis, corticis colore, & cruciformi ramulorum furculorumque positu,

PHILLYREA FOLIO ALATERNI



CL. D. Ag. Cui Medici Argentiniensis, & egregii Botanici munere est nobis parvus arboris ramus, datus titulo Alaterni collecti in hort. Veneto. Differt à Spina Bourgi, Montsp. colore corticis cinerei fere. folia etiam non ita vitent, bino ordine per caulem procedunt, vnciam longa & lata,

in ambitu pulchrè & ordinatè serrata, serraturæ denticellis veluti in aculeos desinentibus, ad folia à Clus. pro Alaterno & picta accedentia, differunt tamen latiori basi quàm ramis adhærent, eo modo, quo Clus. pingit in sua Phillyrea primo, quam nos

Alaternus
Spina Cer-
uina.

An Alaternus
Gefneri.

Perfici fru-
it.

Alaternus

Cortex.

Folia.

Lap.

Flora.

Alaternus

Cortex.

Folia.

Flora.

Tempus.

Locus.

Alaternus

Plan.

Celastrus

Theoph.

Plinio Al-

aternus fere-

lus.

Plin repr.

Philyca

Theoph.

& Anguil. Spina ceruina quorundam. Lob. præte-
rea locis citatis iconem ex Clus. ponit, cui titulus,
Secunda Alaterni humilior lato folio Clusii. At
nos diffinitionis a Pena & Lob. in descriptione
Spinae Bourgi, qui bacculas didymas dicunt. Nos
non didymas obseruauimus, sed semina teria in
singulis bacculis.

Alaterni Clusii si non sunt iidem tam nostra
spina, sanè valdequam sunt similes, & congeneres
nostro iudicio, ne tamen fallantur fortè Studiosi,
totam earum historiam subiicimus, quæ sic ha-
bet. Alaterni fruticis perpetuè virentis duo ge-
nera: vnum arborefcens interdum, longis ramis,
non admodum crassis, neque in multas alas diui-
sis, flexilibus deinde virgultis, quæ externo cortice
candido virescente integuntur, latente subeo
membrana quadam flauescente quæ lignum am-
bit. Ramos vestiunt incondito ordine disposita
folia, mediâ inter Oleæ arque Ilicis folia magni-
tudine, crassiuscula, leuiter per ambitum serrata,
ex viridi nigricantia, gustu ingrata, & cum amari-
tudine paululùm mordicantia. Ad singulorum
foliorum, qui in ramulis nascuntur, exortus, flo-
res oleæ similes, coloris ex herbido pallefcents,
racemarum ex oblongis pedicellis dependent ve-
re, interdum etiam mediâ hieme. Nullum in hoc
fructum vidi. Alterum multò humilior est, ramis
breuioribus, cortice quæ eos ambit, ex albo viridi,
& purpurascens, coloribus simul permixtis infe-
cto. Folia illi superiore minora, magis circinata
rotunditatis, in ambitu etiam serrata. Ex folio-
rum alis flores & logiusculis pediculis dependent,
ut in superiore, illis tamen maiores, & coloris
magis herbacei: quibus succedit fructus racema-
tim coherens, Lentiscini magnitudine, initio viri-
dis, deinde nonnihil rubescens, qui tribus nucleis
constare videtur. Plenioris & nigri coloris ma-
turityte fieri arbitror: nam immaturo fructu col-
legebam Aprili, & floribus onustum Febr. & Mar-
ti initio. Primum genus Vlysi ponenti agro, locis-
que vicinis in Lusitania obseruabam. Alterum e-
tiam iisdem locis. Præterea multis Bæticæ; cum
Granatensi regno & Valentino.

Plin. l. 16. c. 26. Alaterni meminit, cui folia in-
ter Ilicem & Oleam tribuit. Hæc aded causa fuit
cur huic frutici Alaterni nomen dederim, non Ce-
lastris, quem Theoph. etiam inter perpetuè viren-
tes recenset, & tardè fructum maturare ait. Nec
refert quod Plin. Alaternum neget fructum fer-
re: Etenim in Arbore non valde sibi nota hallu-
cinari potuit, quemadmodum in cæteris, quas eodem lo-
co commemorat. Fructum, inquit, arborum solæ
nullum ferunt, hoc est, ne semè quidem, Tamarix
scopis tantùm nascens, Populus, Alnus, Vlmus Atti-
nia, Alaternus, cui folia inter Ilicem & Oleam. Nemo
enim rei herbariæ adeò ignarus est, qui Alnos ex
semine, quod in globulis aduolutes ferunt, nasci
non sciat, cum & ipsis rusticis id sit notum. Tama-
rix sanè ex semine non semel nata: Populos, Sa-
lices seminibus papposa lanugine inuolutis
prouenire, Vlmus item Attinias ex samaris [fe-
runt enim semen sed minùs quam latifolia] ple-
rumque visum.

An Alaternus Gefneri frutex qui Tiguri nas-
citur, rarissimus alibi, juxta fluuii Sali ripam,
Perfici arboris sapore foliorum fere, fructu &
semine nullo, quod is obseruauerit, quem fruti-
cem Persicum appellare licebit, donec aliud no-
men reperiatur, nam Alaternum esse non-
dum affirmauerit, quod folia latiuscula videan-
tur. Sed quomodo hunc fruticem Persicum ap-
pelleret non video, quum Persica Malus fructum

ferat, arborque sit.

Cæterum Alaternum eandem cum Theoph.
Philyca esse, Bellon. l. 1. obs. c. 42. censet. Ne-
mo est in monte Atho, inquit, cui arbor Plinio
Alaternus dicta, veteri legitimo nomine, quo
ipse Theoph. illam donauit, Philyca, ignota sibi
Corcyrenses, verò & Cretenses *Alaternus*: ap-
pellant, quia eius folium inter Ilicem & Oleam
medium est, teste Plinio.

Theoph. quidem varijs locis in sua plantarum
historia *Alaternus* dicitur, sed nonnihil, sed
formam non describit: veramque tantùm matu-
rè germinare, & serò fructum ferre, Philycæ
honorem in alendo pecore, semper etiam fron-
de abundare, maxime flexibilem esse, candore-
que Celastris.

Porro Lusitanis prior Alaternus, eodem Clus.
tradente, *Celastris* appellatur, quibusdam *filigera*
& *sanguenta*: Gallis Bellonio teste, *Dalader*,
& *sanguin blanc*: Lucensibus *Herce*. Anguil. A-
laternum vocari tradit vulgari appellatione *Al-*
ternus & *Lincerna*.

Quoad nos, non possumus dicere Philycam
Bellon. esse Clusii Alaternum, quia Bellon. l. 1.
obs. c. 17. dicit Philycam arborem glandiferam
magnam, quam cap. 55. scribit nos non habere.
Nondum reperimus apud Bellonium vbi Alater-
nus dicatur Dalader & Sanguin blanc. Philycæ
sue, siue Alaterni Bellonius nomen Gallicum
attribuere nò potest, siue in Italia non proueniat,
siue in vniuersum in istis Europæis tractibus eo
careamus. Ista diligentius perquirenda. Quæ de
Philyca Bellon. scriptis recensebimus libro de
Glandiferis.

Antè verò l. 4. scripsimus quosdam existimare
Lanum Tinam Plinii eandem esse cum Philyca
Theoph.

Non omittendum Macrobio Alaternum *sau-*
guine infelicem dici. Infelices autem arbores
Plin. teste, existimantur, damnatæque religione,
quæ neque scuntur unquam neque fructum fe-
runt. Vocantur & infelicem, ad quam capitis
damnatus suspensio necaretur, obiecto, velat-
que capite, quod constat ex illo prisco diro car-
mine.

Caput obnubito, arbori infelici suspendito,
Sed in viam redeamus: libet enim, antiquitatis
studio illectum nonnihil deitare.

Quæ Anguil. scribit de Alaterno, non malè
conuenire videntur nostræ Bourgi spinæ: scribit
autem, in territorio di Lanzano ad S. Vitum
hanc plantam Alaternam dictam, & in Apuliz
Lincerna: in Sclauoniæ [Illyriæ] insula dicta
Vergada, & *moricham*. Excrescere in arboris spe-
ciem, folio inter oleam & Ilicem medio, sed atro-
uidente. Bacculas quasdam ferre paruas Lentis-
cinis similes nullius usus, quod sibi constet.

Hist. Lugd. l. 2. c. 64. non hanc arborem intelli-
git, sed præcedentem Phillyream. Dalech. hanc
curauerat depingendam, & Apharcam vocabat,
Hinc Hist. Lugd. l. 2. c. 15. de hac tradit: Herbarii
quidam Apharcam Theoph. esse putant, alii Ly-
cium, alii Phillyream Græcorum. Monspel. Phar-
macopæi *Bourgespine*, id est, Spinam Burgundi-
cam vocant. Frutex hic in arborem etiam crescit,
magnitudine Mali Punice, radice crassa, caudi-
ce ex cinereo albicante, aspectu tristi, foliis imâ
parte angustis, superâ latiusculis, Portulacæ mo-
do, obtusis aliquando, interdum in acutum fasti-
gium terminatis, per ambitum infectis, incisura-
rum eminentiis rigidiusculis, carnosulis, Ilicis, aut
Oleæ modo, venolis, clara costâ, per medium diui-

Synonyma.
linguat
Dalader.
Herce
Alaternus.
Lincerna
Philyca gl.
dis-rub. lly.
Clus. m.

Alaternus
sanguine
infelix
infelices ar-
bores quæ.

Comarica.

Apharca
Theoph.
Lycium.
Phillyrea
Græcorum
Spina Bur-
gundica

lis: flore albo: baccis racematim coherentibus, cum maturuerunt nigris, gustu subdulcibus. Arbor ista perpetua fronde viret, ea dore Laurum, llicem, & ceteras sua coma semper ornatas pronocans.

De eadem nempe Spina Bourgi dicta, & Casalp. prodidit in hunc modum: Philyrea mas Theoph. vulgo in agro Plumbinensi vocant *legno Pozo*, & *Purine*, quasi lignum putridum: copiosa ibi nascitur. Arbutula est, Lauro similis, folijs breuioribus, leuiter serratis, similiter perpétuis, leuibz, lentis: flosculos fert racematim circa ramulos herbaceos: baccas paruas, ternis intus officulis, rotundas, cortice interno pallido: materie rarissima: medulla rufa: putant quidam Philyream Diosc. sed magis placet vt Philyra mas dicatur apud Theoph. seu Tilia mas, vt Plin. vocat nā & multa steriles in his reperiuntur, vt in Alaterno. *Haden Casalp.* In nostra Spina Bourgi fœtere lignū nō obseruauimus, nec alij, quod adhuc legerimus. Mospelienses obseruent, & considerent an differat à Ligno putrido Casalpini, quod nullo modo pro Philyra siue Tilia mare recipere possumus quicquid scribat ille, habere conditiones. Nemo, hērele, nobis persuadebit Theoph. arbutulam Lauro similem fecisse marem tantæ arboris, quāta est Tilia scemina, cum qua nulla similitudo. Equz enim possit esse inflexibilitas & durities in tenui cortice arbutulæ? Materies dura, qualis à Theoph. requiritur in mare, nobis multum differre videtur à rara & leuissima, qualis in ligno putrido, teste ipsomet Casalpino. Prouenit *Apharce*, Hist. Lugd. tradente, in asperis & saxosis præmaritimæ locis, non procul à Mospeliensi vrbe, qua *Vicum* nunc, pagum Apiano vino percelebrem. Nos *Bourgi spinam* Mospeliensibus dictam in filia *Egremont* abunde proueniētem obseruauimus. Floret mense Martio. Baccæ à Septembri in Aprilcm & Maium per hientem in arbore sua hæret. Trevis quoque Gallo-Campaniæ celebri vrbe in horto cuiusdā Canonici cultam vidimus. Fatetur ingenuè Clus. vtriusque sui Alaterni nullum se vltum nouisse. Sed Lusitanos asseruisse eius cortice in aqua decocto piscatores sua retia subrutilo colore inficere: & tinctores è fragmentorum ligni, quod pallet decoctione, nigrescentem è caruleo colore conciliare. Ex gustu, ad præscriptum Galeni, vbi occasio & necessitas requirat, industrius medicus & ad vsus medicos transfere rationis auspicijs possit.

SAMBVCVS VULGARIS.

CAP. XXIII.

Descriptio:

Non magnum descriptionis apparatus desideraret vulgarissimæ notitiæ Sambucus, nisi diligentis Historiographi esset, etiam peregrinis, & quibus ea non vulgata, morem gerere. Ea in arboreâ procentatē excrefcit, caudice plurimā parte lignoso, in quo exiguū admodū medullæ, tamen satis fragili, sūdique facili, quāuis Casalp. quādoque tamen ramis suis fruticosa permanet, cortice scabro, rimoso, cinericeo colore sordescens. Rami tamen & baculi, præsertim iuniores geniculis ex longiusculo intervallo articulati, materie pauca cōstantes, medulla plurima alba eaque leuissima facti, quorū cortex lauis, dilute cinereus, & quasi argenteus, sed super excrementum viridans. Cinereo subest aliud lignum immediate inue-

niens, medianus offic. dictus, totus herbidus ac vitens, neruosis tamen suis fibris nequiquam carens, quorum etiam materies caudicis duritie multum



cedit, magisque exalbida. Ramos patulo obliqua folia vestiant, terna aut quina, interdum septena rard octona (gusta amaro & nescio quid propriæ nauseosæ habere, odore graui, viroso, sed confusori gratior) ad costam vnam annexa, oblonga, acuta, serrata, atroxirentia. Flores in patula umbella non ingrati odoris, albi, è foliolis

quinque totidem staminibus ad luteū vergentibus umbilicoque compositi, exiguo petiolo innixi & horum rursus grandiusculo, donec tandem omnes in vnum comunem ac insignem cōeant. Baccæ initio vitentes, per maturitatem atropurpureæ, succum concolorem reddunt, grana continentes exigua, plana, oblonga, communiter terna. In extremitatibus ramulorum & ad pediculos florum solent sæpe nasci veluti pediculi nigri, de quibus alio loco. Multos stolones à vitis à radice.

Est & alia Sambucus iam descriptæ quoad frondem, flores, ac materiem similis, nisi, quod odorem attinet, ad sibilum quodammodo accedere videretur. Ac insignis differentia nota est, quod acinos ferat albos. Tragus ex candido luteos dicit, ac in ceteris vulgari similem: hec multis visam putat.

At apud Theoph. descripta clarè Sambucum exprimit: atque vtiā omnes essent tales eius reliquorumque Veterum descriptiones, non tæ difficultatibus implicati hæssissent sæpe doctissimi Herbariorum. Sed in eius versione minus placet Gaza, qui quidam etiam omittit. Genuina eius historia hæc est. Nascitur & sambucus [in?] maximè circa aquas, & vmbrosis locis: at tamen & in alijs quoque prouenit. Fruticosa est, virgis anniculis vique ad foliorum defluuium in longitudinem excrefcens, postea verò in crassitudinem. Virgarum altitudo non admodum magna, sed senum ad summum cubitorum. Caudicum vetustiorum crassitudo quæ tabis in nauium prora super carinam posita. [Sed non meminerat.] Cortex lauis, tenuis, acutus. [Sed non meminerat.] Matēies fungosa, quæ exiccata, lauis, medullam mollem habens, vt virgæ totæ concuantur, ex qua & baculos faciunt leuitate præcipuos. Vbi siccata est, valida fit, nec sentit vetustatem, etiam si madercat aquis, & cortice nudata sit. Amittit autem illum sua sponte, cum arefcit. Radices per terræ summam spargit, nec multas, nec magnas. Folium singulare seu particulare exie molle, oblongum, sicut Lauri latifolia, verum maius & latius, & circa media parteque inferiore rotundius, nam suprema parte in acutum contrahitur, in ambitu inci-

23. Hung. bozza fa. In post. com. Ital. Marth. cum magnis figuris figura Sambuci trāspolita ponitur sub titulo sambuci montani; mirum idem fieri in com. Lat. cum magnis fig. & in hist. Germ. non sine erroris suspitione.

Lob. pro sambuco alba nouam & diuersam, attamen non necessariam habet, cum facie tenus eadem sit cum nigra, & utramque vnā commo- de exprimat.

Differentia Dicamus quædam de differentiis. Nigram, hoc est, vulgatam, & Albam diximus. Vtramque obseruauimus nobiscum Dod. Pen. & Lob. item Tragus. Camer. annotat quibusdam in locis viridibus baccis inueniri. Hieron. Argent. in sua Apodixi Sambuci tres species dicit: *Sambucum*, *Ebulum*, & *Sambucum rubrum*. Et addit quosdam scribere de sambuco agresti omnino incognito. Verum sambucum esse alium fruticem: Ebulum vero herbam: vnde versus.

Sambucus stellaris, sed Ebulus est bene satis.

Nos præter iam dictas, hoc est, nigram & albam obseruauimus, *Sambucum herbaceum*, quam Ebulum vulgò dicunt: *Sambucum racemosum acinis rubris*: *Sambucum aquaticum*: & *Sambucum roseum*: quibus si addas *viridem* Camer. septem habebis differentias Sambuci titulo insignitas. Sed *Vulgarissima* historiari persequamur.

Locus. Sambucum aquarum esse accolam iam supra ex Theoph. dictum, qui eandem alibi minùs durare ait, quod aquis propinqua nascatur. Nascitur tamen & alibi eodem autore. Non temerè tamen in montibus visæ sambuci, teste Plinio. In Germania sanè inter arbores omnes, vt & Tragus annotat, vix aliam quamcunque reperias vulgatiorē, & quæ ad id sine nullo negotio & plerumque humectis & tenebrosis locis, iuxta muros, sepes alijsque incultis nascatur, atque Sambucus. Creberrima Basileæ & in toto tractu Alsatico. In Italia & Gallia rarior, præsertim regionibus calidioribus, amat enim pinguiā. Monspelij tamen etiam obseruauimus. Maturè germinat, cum tamen frigora patiatur.

Tempus. Ordine naturæ siluestrium, inquit Plin. primæ florent Sambucus, cui medulla plurima, & cui nulla, Cornus mascula, Urbanarum Malus post, vt simul videri possint Pirus, & Cerasus, & Prunus. At apud nos longè præcedit Cornus & Laureola flore deciduo, multò post Malus, Pirus, & Cerasus, & Prunus, potissimum siluestris: Sambucus verò Maio floret, interdum adhuc Iunio, atque ad id paulò ante vites florere solet, ex frigidiorē pluuia aut pruina facti defluunt flores, non sequentibus baccis simili. Apud vulgus omine, ne idem vitibus eueniat. Gemmas & folia tempestiuè admodum protrudit, vt Martio & Aprilis initio. Genæ etiam Febr. principio folia exerentem obseruauimus. Appropinquante autumno, maturitate nigrescunt acinjs.

Sem. Cultus. Ex semine sesamaceo frutices noni progigni queunt, si seratur, teste Trago.

In hortis si colatur, diu viuit, & in arborem satis crassam & proceram euadit: Eam quæ bacculas fert albas primùm vidimus Argentorati cultam in horto instructissimo D. Frid. Meier, magistri armamentarij primarij, amici nostri singularis, ex qua semina legimus, & in H. E. C. hortum Montb. scimus. Multò tamen ante vnicam & eam quidem spontaneam obleruit Chelidius Gener in vinearum sepibus Basileæ ex transportam Cineream ad dextram flētendo.

Vires & vlt. Hippocratis auro in medicina celebris fuit Sambucus, quo autore, acini poti, acceptabili

menfurā, vrinam mouent. Coxendicibus, mulierum vuluæ morbis, vel earum locellis, plurimum medentur, etiam semen eius. Manducari verò ac poti, aquas per aluum educunt: folia idem præstant. Hinc idem in doloribus capitis oculorum & aurium a bile ortis folia comedenda, vel succum sorbendum, præcipit, ad soluendam aluum deturbandamque bilem. Quidam ex oleo & sale comedunt.

Dioscor. eandem tam sambuco quam Ebulu vires assignat, nimirum, inquit, exiccant & aquas aluo detrahunt: at stomachum offendant. Folia olertim modo cocta, pituitam bilemque purgant. Sed & caules teneri in patinis cocti, eadem præstant. Radix in vino decocta, & in cibis data, hydropicos adiuuat. Prodest & contra viperarum morsus eodem modo pota. Decocta verò ex aqua ad infessum, vuluam emollit, eiusque spiracula patefacit, ac ipsius denique vitia emendat. Acini in vino poti eundem præbent effectum. Denigrant & capillos inuncti. At folia recentia molliaque illita ex polenta, inflammationes mitigant: ambustis & canum moribus illitu profunt. Vlcera verò limosa glutinant, & iis qui podagra tentantur, cum seuo taurino aut hircino illita profunt. *Hæc Diosc.* Apud quem dubia lectio in voce *Spanthi* pro, *Spanthi* quæ alias legitur, quam vocem & Marcellus legisse videtur. Sic vertit: siccant, adstringunt, refrigerantque. At Actuarius. Sambucum & Ebulum, omnia morandi vi, refrigerandi facultatem habere tradit, quod & Plin. confirmat, vt mox dicetur: imò & ipse addit Diosc. qui & inflammationibus & ambustis adhibet. Quinquam doctissimi Sarraceni iudicio neque Sambucus neque Ebulus per se refrigerare videantur, nisi fortè ex accidenti, dum bilem educant: calefacere verò utramque certum est, inquit, licet in primo gradu duntaxat: id quod Iatis innuit Gal. simpl. Nos quoque Sambucum existimamus minùs nocuam ventriculo, quam Ebulum. Folia etiam non ita fuerit, baccæque non tantam euacuandi vim habent, vt Ebuli. Indicium est inspissatus è baccis, quo Germani crebrò utuntur ad mouendos sudores, & pueris etiā præbent cum pane, quo & quidam non infelicitè vti sunt in iis qui ad hydropem procliuēs fuerit, Germani vocant *Goldermus*. Coquuntur baccæ ex aqua, & crebro transmittuntur, denuoque coquuntur ad saporem consistentiam, apud Helueticos vltatissimè ad vltus prædictos.

De sambuci viribus eadem Plinius quæ Diosc. habet: dixerat verò alibi: frigidissima, quæcumque aquatica: lentissima autem, & ideo scutis facienda aptissima, quorum plaga contrahit se protinus, cluditque suum vulnus, & ob id contrumacijs transmittunt ferrum, in quo sunt genere Sambucus, Populus utraque. Sed non assentimur hac in parte Plinio omnia aquatica, hoc est, secus aquas aut in ijs nascentia, frigidissima esse: nam nec Sambucum nec Populum, frigidas existimamus, tantò minùs frigidissimas, licet aquaticæ plantæ existimetur. Nec sufficit ratio à loci natura desumpta, inspicendus potius sapor, odor, & ipsi effectus: forte Plin. intelligit tantum de ligno, & non de cæteris partibus. Galenus sapè ad amaritudinem & modicam eius astringentem respiciens, & huic & Ebulu siccantem vim tribuit, glutinantemque, & moderatè discutientem.

Galenum quoque sequuntur Fuchius & Amatus, qui sic insit: Dioscoridi Sambucus & Ebulus refrigerant, sicuti & Actuarius: nobis verò considerato sapore, odore, ac operationibus, inuenimus potius

Caudo.
Matur.

Nata.

Val. a
durant.

Tepetam.

Diosc. non
proh.

Succus vlt.
inspissatus.

Tib. re
proh.

potius inclinare ad caliditatem quam frigiditatem. Quanquam, ut verum fateamur, nusquam legamus apud Diosc. ab eo tradi simpliciter refrigerare, licet ex eo colligi possit, ut dictum ante.

Lonic. error

Lonic. scribit Sambucum calidam & siccam, qui tamen paulo subdit folia & flores refrigerare, & aquam ex ijs destillatam: parum, hercle, sibi constans.

Hydrop.

Aetius Sambucum vstum & Cerato liquidissimo exceptum [sic ille loquitur] illinendum praecipit: augere hoc pilos ait, densare cutem, & defluuium prohibere. Aetius radicem in vino coctam hydropicis exhibendam suadet, *αυτον* iubens: & hoc est, inquit Corn. quod Diosc. dixit, *αυτον* *αυτον* *αυτον* id est, *αυτον* *αυτον* *αυτον*, manere videlicet, antequam quis cibum capiat. Aetius in primis sambucum ad recens ambustum commendat.

Albertus perfusio.

Albertus tradit, Sambuci ab imo sursum corticem rasum ventrem supernum, contra infernum euacuare. Aded superstitionis plena pleraque sunt eius hominis placita: Quasi non utrumque contrario modo ralus cortex id prestare queat, si tales in se vires habeat: simile ferè illud ab Hermol. annotatum: Ille sambuco magis canoram buccinam iubarque credit pastor ibi caesa, ubi gallorum cantum frutex illè non exaudiat. Baccæ quoque cum suis granis grato sunt cibo auiculis, potissimum passerulis, turdis & surnis.

Buccina.

Asium cib.

Iudicio Tragi, tam flores quam folia Sambuci recentia refrigerandi vi pollent: potissimum verò earum facultatum air esse aquam à floribus destillatam, quæ utiliter utrinque, tam intrinsecus, usurpari possit. Sed nostram sententiam Galeno & rationi conformem antea diximus. Nec repudiamus reliquas à Trago traditas vires. Radix namque eius vino decocta & pota hydropem potenter exigit. Cortex mediis efficacissimus est: quapropter prudentia & consilio opus est, si quando hisce uti velimus.

Corticis f.

Prodidit apud Gesnerum vir quidam probus & admodum senex, se huius corticis decoctum cum theriaca duntaxat exhibuisse, eoque plurimos, qui peste infecti erant, sanasse. Nullo præterea alio prophylactico se usum unquam, cum tamen gravissimis non raro pestilentijs interfuerit.

Turionum f.

Turiones siue folia tenera vere lecta, modo quo diximus usurpata, non perinde sunt efficacia, & imbecillioribus magis conueniunt. Idem in puluerem redacti, & ex iure pisorum poti, duram alium emolliunt. Eisdem facultates habet aqua à medio cortice destillata. Quædam mulierculæ cascos flore Sambuci quasi condiunt. Flosculorum conditura Gallos pretiosius acetum facere testatur Ruellius. Sed & à racemorum Succo admodum laudatum & rubrum parare nouimus, & suum habet Lob. Possis & vina ex iisdem racemis reddere coloratiora, haud sanè secus ut Ebuli baccis id facere consueverunt in agro Lombardico, notante Scaligero. Et si credimus Camerario Prunus in Sambucum [ut se expertum testatur] insita fert fructus purgantes.

Austia.

Aqua sambuci (inquit Tragus) illita calorem à Sole prosectum restinguit, siue is caput, siue quamcunque aliam cutis partem tentarit. Eadem ardentes & subitos capitis dolores, & quascunq; inflammationes sedat, aduersus ictus serpentum & viperarum utiliter applicatur, & vlcera in fistulam deliscentia agglutinat. Succus ex acinis expressus corticeo colore inficit vestes laneas. Succus à radicis cortice expressus, vomitum valen-

tius commouet, & aquam inter cutem pellit, sic est Matth.

Paratur è Sambuco vnguentum præstantissimum ad ignis ambustiones hoc pacto. Sumito viridis Sambuci corticis, qui statim sub primo delitescit libro, herbacei coloris, libram, olei pluries loti ex stillatitia florum Sambuci aqua, libras duas: ferueant simul aliquandiu, & deinde percolato, & exprimito, & addito ceræ nouæ odoratæ, succi succulorum Sambuci, cuiusque unæ quatuor: rursus ut feruescant finito, quousque succus euascat: tollito tunc ab igne, & rudicula agitato, omniaque misceto: ad finem addito vernicis liquidæ unæ duas: Thuris albi in tenuem pollinem contriti unæ quatuor, quinetiam duorum ouorum album, diu prius cochleari agitatum. Subinde misceto diligenter omnia, & mûdo vase asseruato.

Hydrop.
Vnguentum ad ambust.

Exusta Sambuci folia, & in puluerem trita, emanantem è naribus sanguinem sistunt. Baccarum sambuci succus à recremento repurgatus, & cum melle optimo coctus ad lulpij spissitudinem aurium dolores tollit, si calidis imponatur. Sambuci tenerrima folia, quæ primo statim germinatu prodeunt, vnâ cum pari pondere radicum plantaginis suisque axungie veteris contrita subaque podagricos dolores præsentaneo auxilio mulcent. Hæc Matth.

Folia pul.
Sanguis flux. nar.
lulpus
Sambuci
aurium dol.
ad podagri.
cor dolores
expirant.

Florum umbellam domestici nostri polentæ immergunt, fringunt, gratumque inde parant edulium ac salubre. Possunt etiam cibo aliquo permisceri, vel cum ouis frigi, nam blandè deiectionem moliantur, quod & Dod. obseruauit. Simile quid Platina patare docet illo suo libello de honesta voluptate *Fritellas ex Sambuco* vocat. Casteo tritum veteri, tum recenti, farinæ parum, ouorum alba menta quædam, lactis aliquid, sacchari plusculum addes, & simul in eodem mortario contres. Tritis è mortario & in catinum translatis, flores Sambuci integros superasperges & miscabis. Hanc condituram, aut manu aut cochleari, aut aliqua alia forma in patellam inditam, ubi optimum liquamen vel butyrum vel oleum ferueat coquito. Calidè edantur necesse est. Ex compositione quid profit oblitus, deprehendes. Resiccari verò flores, simul cum humiditate, purgandi potentiam amittunt: digerendi & attendendi retinent.

Fritella ex Sambuco.

Acetum in quo & hi iam aridi macerati sunt, in cibis ventriculo gratum, appetentiam excitat, crassos crudosque humores incidit ac attenuat.

Aceti Sambuci f.

Pro duodecim conuiuiis in ieiunio, idem Platina tale florum sambuci condimentum parare docet. Ex sicco sambuci flore tres uncias in aqua frigida per horam sines: expressa inde aqua, dimidiu cum libra ac semisse Amygdalarum mundatarum tundes, addesque excauatum ac molitum panem, scilicet libram sacchari, parum gingiberis: si croceum voles, addes & parum Croci. Hæc omnia in cacabum per setaceum fundes: feruere ubi ceperint, reliquos flores integros indes. Coctum cum aromatis conuiuiis appones. Hoc si noster Labeo non gustu solum, verum etiam olfactu reicit, pectori tamen, hepati, melancholia & hæmorrhoidibus laboranti prodest. Habes apud eundem Tortam Sambucæam.

Condimentum florum

Seminis Sambucini facultas, auctores Dod. paullo quam reliquarum eius partium mitior. ventrem quoque mouet, & humores aquosos detrahic in puluerem redactum, & drachmæ pondere

Pollus.
Hepar.
Melancholia.
Seminis facultas.
Purgans.
agregum.

*Reponendi
modus.*

Hydrops.

*Mira vis
semen
Sambuci.*

Hydrops.

Vomitus.

Aq. Sita.

*Medulla
Sfus.*

Hydrops.

Scabies.

*Diarrhoea.
Dysenteria.
Purgans.
Extractum
granorum
Sambuci.*

Tinctura.

*Defic.
Vitis suffo-
catis.*

exhibiturum. Recens collectum in aceto id macerari expedit, ac deinde reticari, commodè facis vini arida per pondus, & non nihil feminis Anisi, sic etenim citra omnem molestiam potentiam suam exercet, & hydropicis subuenit. Continuis autem aliquot diebus exhibendum, cum modico vini, quibus placet.

Bovius mirabilem, inquit, comperio virtutem & efficaciam in femine Sambuci & Ebuli: soleo dare de his duas aut tres drach. optimè tritas, mixtas cum Zuccaro rosato, aut diantho, aut Diamarindo, aut simili aliquo medicamento aegro grato, delicatulis do drach. Ol. horum sem. extracti per exprell. cum vino odorato aut iusculo. Mira eius efficacia in phlegmaticis natura, aut per accidens, & in hydropicis: colliguntur baccae maturae priusquam flavescant; Aut necentur. Detractis pediculis, imponuntur in aquam multam, contringuntur, postea inclinato vase, effunditur aqua, ac noua affunditur: & iterum effunditur, id toties fit donec semina munda remaneant, quae deinde siccantur & reponuntur. Semen primi anni mouet vomitum, secundi minus, tertii adhuc minus, sed per inferiora purgant multam pituitam & serum. Gesnerus è baccis Sambuci & Ebuli liquorem aq. vitae similem destillari posse credit.

Nouellorum ramulorum medulla qualitatis experta est: hæc ressecata, atque nonnihil compressa aut contorta, ad fistularum angustiora ora dilatanda imposita, conducit.

Scribit Camer. succum acinorum admixtum iusculo gallinae, in quo multum radice Petroselinii decoxerit, & expressum, plurimum conferte Hydropicis. Cortex medius scabie vexatis utiliter administratur. Flores odorati, inquit Schuuenekf. caseis inferuntur. Saccharo etiam ad hepatis affectus conseruantur. Rob ex succo baccarum per se vel cum saccharo parato plebecula vititur in alui fluxibus biliosis & Dysenteria. Nuclei abstergunt ac per aluum & vomitum purgant vehementer. Rusticorum medicina. Ex granis, ut docet Quercetanus in Pharmac. Dogmat. Sambuci it extracti genus, siue sapa quaedam hydro-pisi congrua & salutaris, Chymici vocat Extractum granorum, actes, cuius preparatio sequentibus verbis continetur. Collige magnam copiam granorum Sambuci optimè ad umbram exsiccatorum cæterisque omnibus abiectis sola grana accipe, quibus ad median partem imple matracium magnum cum longo collo, superaffundendo fortissimum spiritum vini, acidulum redditum cum liquore acido vel vitrioli, vel, Sulphuris, ut materiam tres quatuorve digitos supernatet. Vase clauso ut nihil expiret, fiat digestio in B.M. per 3. aut 4. dies, donec spiritus vini in colorem rubini tinctus apparuerit, quem separabis per inclinationem, cauendo, ne quid ex faecibus aut turbulenta materia simul transeat. De qua tinctura iam, non etiã separato prius menstruo, hoc est, aqua vitae, quæ sine corruptione aut alteratione ulla diutissime adseruabitur, & cui, si voles addes parum sacchari gratioris gustus causa. Exhibemus semicochlear argenteum, aut cochlear plenum, mulieribus, quæ ex æteri præfocatione miseris modis excruciantur, & subito effectus sequitur exoptatissimus. Ex improviso enim & quasi miraculose expergent, pristinaque valetudinis integritati restituentur, atque Scificam histeriam. Rursus si velis, separa inde aquam vitae per Alembicum in balneo vapo-

roso, donec in fundo remaneat extractum rubicundissimum de quo exhibebis scrup. i. pro dosi: idque dissolues in sua propria aqua destillata, aut in quibusdam aliis convenientibus, aut vino albo quod inde rubescere incipiet. Hac usque Quercetanus, cuius verba de verbo aduerbum recitare nobis visum est, ut habeant Chymia tri sub hoc exemplo veturi tractatum integrum parandi extracta, eadem enim ratio est reliquorum. Ebuli sc. baccarum Iuniperi &c. sicque elicere poteris ex hoc nostro Thesauro totam artem Chymicam, nec non pharmaceuticam, ubi dabitur occasio. Sunt qui & Oleum parent ex infusione florum, vel iis in oleo decoctis. Folia contusa scabiei & digitorum Paronychiis imposita breui sanare tradit Lonici. Folia & baccas ex aqua salsa decocta, tollere tumores pedum. Corticis usum porissimum senibus utilem esse ad absumentas humiditates superfluas. Odorem capiti molestum esse & ex facili sanguinis fluxum narium ciere, potissimum ab homine calidi temperamenti odoratum. Constat & nobis Sambuci tam foliorum quam florum odorem aliquibus molestum esse, & caput tentare. Superstitiosum verò illud eiusdem putamus, quando ait: si Sambuci surculus capiti equi imponatur, non nociturum etsi si bibat in æstu. Quæ enim huius rei ratio esse queat, & quis adeo confidat ei, ut contrarium euentum non metuat?

Triplicis aquæ modum & usum habes: ex cortice viridi: ex foliis, ex floribus. Primæ usus ter iteratus in die ad vnciam vnam & semis, nepe mane, circa meridiem & vesperi, apprimè prodest hydropicis. Trium vnciarum dosi pota à ieiuno, potenter sed sine noxa aluum cit: & itidem hydropicos leuat. Extrinsecus admota calores euocat. Secunda æstuantibus tibiis ac pedibus & corruptis fracturis multa & iterata lotione spontanea exiccatione benefacit. Tertia mane & vesperi ad vnciam vnam & semis hausta, remollit pectus, & in eo infarctus, tumores hydropicos & oedematosos exhaurit, hepatis obstructions reserat Lienis ac renum, tertianam abigit, fluxus Melancholicos emendat, & stomachum confortat. Trium vnciarum pondere sumpta egregiè & absque molestia purgat, & alleviat corpus. Oculis infusa, ardores extinguit. Manus tremulas sæpius iterata lotionem sanat. Vetera & frigida vlcera sanat, si linteo in ea madefacto sæpius foueantur. Macer Castalpino flosculos panibus inspergi cum oleo: Sambucum multas virgas ferre à radice dicebamus: idem ad hororum septa à nonnullis quæritur, quamuis non magnam firmitatem habeant. Ex virgis parantur comoda candelarum emunctoria & retinacula foliorum librorum apertorum. Curtius pollicetur aqua macerationis [malimus decoctionis] cauliculis aspersa, necari pulices: foliorum decocto abigi muscas. Inuenit & inter pastores gratiam calamus Sambucinus, ex eo canoras buccinas, rubasque conficientes, utilioresque in eo usu existimantes, ut iam prius obiter attigimus. Denique quouis anni tempore nihil aptius inuenias ex quo citius tubulos vel canaliculos conficias ad quosvis usus,

quam ex virgis
Sambucinis.



SAM-

*Extracti
dosis.*

*Oleum sam-
bucinum.*

*Scabies
Paronychia
Tumor pe-
dum.*

Noxa.

*Triplicis a-
qua.
E carum
Sfus.*

*Astus po-
dum.*

Fractura.

Tumores.

*Hepatis Ob-
structio
Sfus.
Tertianæ
Purgans
Manus tre-
mula.
Vlcera Sa-
luta.
Edula.*

*Aduersus
pulices.*

SAMBUCI FUNGVS.

Descriptio.

A Dnaſcuntur vt annotat Tragus interdum Sambuci veteris præſertim radicibus fun- gi quidam incani, quos gummi quoddam vocat Dodon. & fruticum caudicibus quoque adnaſci ait, molle, nigricans, tenue membranofumque, hominis auriculam quodammodo ſubinde re- ferens, quod ablatum reſiccaturumque contrahi- tur ac dureſcit.

Excrementum corticoſum.
Locus
luda aurea.

Huiusmodi & nos aliquando è ſtipite naſcen- tem obſeruauimus, ſed fungi potiùs membrana- rei ſpecie, quàm gummi, & colore nec albi nec nigri, & obſoleſci, hoc eſt, ex utroque quo- dammodo mixti.

Pena, & Lobel. excrementum corticoſum vo- cant coriaceumve, & annolis arboribus apud Boreales præſertim accreſcere tradunt, multis dotibus cognitu digniſſimum, plebique Angliæ & Germaniæ luda aurea vocatum, propter ethi- giem auris, quam cartilagineo plexu multis plicis & mæandris æmulatur: ſed colore pul- lo, prædurum, aquis merſum molleſcens, ſpon- giæque ritu tumens, guſtu penè inſipido, cutis elixæ aut corii.

vires
vius.

Fungus Sambuci, & Auricula luda ad imam Sambuci caudicis ſedem oriens. Germ. *Selunder Schmemlin*: *Braen holderschwam*. Acini rubri in aqua ſorum Sambuci aut ro- ſacea priùs macerati, deinde impoſiti ma- ximè conducunt ad ardentes & ſubitos capitis dolores & quæſcunque inflammationes, teſte Trago. Adſtringendi ac reſiccandi vim obtinet, vt vult Dodon. dilutum eius in quo paucis ho- ris maceratum fuerit collutione ac gargarifatio- ne oris tonſillarumque incipientes inflammatio- nes ſedat, & collumellam laxiorem reprimi- tur: quin &, ſi Pen. & Lobel. credimus, Anginis cer- tiſſimo experimento utiliſſimum, & tumoribus intus forſique nunquam ſatis laudatum. Lonic. aquam ex eo deſtillare ſuadet, aut ipſos etiam in aq. roſ. maceratos inflammationibus oculorum efficaci remedio infundere, & imponere. An- notat Camer. præcipue notæ medicum quen- dam eodem puluerilatos aduerſus hydropem propinallè.

Dolor cap.
Inflammatio.

Inflamma-
tio oris &
tonſillarum
Collumella
laxata.
Ad angui-
nam capu-
rum.

Aqua.

SAMBUCVS LACINIATA.

Descriptio.




Sambuci e- ſlegantiffimâ ſpeciem foliis admodum ſi- ſis, & multum laciniatis, vidi- mus in culti- ſſimo horto Ro- bini Botanici Regii, Lutetiæ a quo & ſemi- na accepimus pro horto Il- ſt. E. Wir- temberg. Flores a- lioqui & bac- cae iam deſcri- pte vulgari, quæ baccis ni- gris eſt, ſimil- ſima.

Eandem & Dod. & Lob. obſeruarunt. Hic ſpe- ciatim in hortis Belgii. Taber. Germ. *Bolder mit außgeſchnittenen blättern*

EBVLVS SIVE SAMBUCVS

HERBACTA.

CAP. XXIV.

**E**A Ebulo

Descriptio.

Enigmatica ut inter herba- ceum genus & frutices ambi- gere quis di- cat, veriùs ta- men de tribu herbacea, aded tamen Sambu- ci amula, vt illius nomen pumila adie- ctione apud Græcos, ſub voce *χαυράδης*, promerue- rit: ſiquidem non vt illa in arborem graui- deſcat, raro hominis pro-

ceritatem æquans, plurimùm infrà ſubiſtens, & magna ex parte ſeliquibito non altior: cau- le herbaceo, ſtriato, Sambuci ritu medulloſo, hi- bernis menſibus contabefcente: ad quam acce- dunt & folia, ordinatiùs diſpoſita, è tribus qua- tuorue coniugationibus ad rachin annexis, impa- rique extremo folio compoſita, odore grauiore: Flores quorum ſingularia Sambucinis longiora, acutio- ra: pares tamen umbellæ albæ ſoſculorum quin- quepartitorum, odoratorum, & neſcio quid nucle- orum Perſicorum magnatis ſpirantium, ſed eſu vix ferendorum, ferrugineis apicibus, quos ſta- mina ſuſtinent candida: quibus ſaſpiceſcibus aci- ni ſuccedunt per maturitatem nigri, & chorulis multis anguloſi ante maturitatem, & penè trian- guli, poſt verdè magis rotundantur, ſucco ſuo ma- nus rutilâ quadam purpura inficientes, ſemina continentes terna, altera parte gibba, altera an- gulola. Radix longa, digitalis craſſitudinis, non li- gnola, late ſparſa.

Folia.

Flores

Acini

Semina

Radix

Hæc Dioſc. *ἡ δὲ ἐν τῇ γῇ χαυράδης* dicta, humilis eſt ac longè Sambuco breuior, & ad ge- nus herbaceum *ἡ δὲ ἐν τῇ γῇ χαυράδης* propiùs accedens, caule quadrangulo, crebris diſtincto geniculis: foliis per interualla circa ſingula genicula utrinq- ue expansis, iſſque Amygdalinis, at in ambitu ſerratis, longioribusque & graui odore. In cacu- mine verdè umbellæ, flore ac fructu Sambuci. Ra- dice nititur longa, craſſitudine digitali.

Plinio Sambuci alterum genus, magis ſilueſtre, quod Græci *Χαυράδης*, alii *Helion* vocant, mul- to breuius. Et alibi *Actæ*, quam quidam eſſe Ebulo putant. Rurſus alibi: *Actæa* graui odore, caulibus aſperis, [anguloſis vt. quædam exēpl. legūt Anis], teſte Herimol. geniculatis, ſemine nigro, vt Edere, baccis mollib. Huius Virg. quoq; mentio in Gallo.

Folia.

Actæ.

Actæa.

Pin. Deus Arcadia venit, quem vidimus ipſi ſanguineis Ebuli baccis nuiſſimoque rubentem.

Cuius rei originem & Veterum conſuetudinem diximus antè. Baccas quoque florefve Ebuli aut Sambuci videtur intellexiſſe Plaut. cùm dixit in Captiuis: *Laridum atque Ebulum foueri ſo- culis teruentibus*: niſi quis herbulas in eo verſu leſitare malit: aut quod propius eſt verdè, cpulas.

Her. nol. hanc aut valdè ſimilem putat eſſe quam Plin. *Actæam* vocauit: nos eandem cœſemus.

Schucus
pumila.
Mecon Aphroden.

Apul. m.

Sambuci 2.
genus fil.
Thamniates.
Sambucus.
Hiebulum.

Plin. m.

Plin. def.
cunra Cur-
tium.

Heliosacte
fil. Euboea.
Sambucus.
Chamae-
cte.
Athen.
Kamaedie.
Heliosacte.
Agrion dte

Locus.

Vires &
vius.

Stomacho
nec.
Purgat.
Amulsa.
Capillorum
tinctura.

quamvis Leoniceus diuersam opinionem tueri, videatur. Idem Herimol. Sabicum pumilam vocat.

Chamaecten, inquit Apuleius, alij Chamaessen, alij Mecon Aphroden, alij Agrion Asten, alij Euboean, Galli Durane, Daci Olma, Itali Ebulum vocant: tamis rotundis, (nobis striati & angulosi obseruati) digitalibus, teretibus prostratis (surrecti sunt, quamvis humiles, & paruli) succo plenis, folijs lenticularis; fructu sine semine rotundo, radice tenui. Vt videas Apuleium hoc loco manifestè duas diuersas plantas, & nomine & descriptione cõfusas miscuisse: vnde insignem rei herbariz ignorantiam cernas Apulei, tam differentes, & vix quicquam commune habentes herbas, Ebulum inquam & Chamaecen confundentis; hinc factum vt à viribus quas ille recenset, transcribendis nobis temperauerimus, ne fortè posteritati cum ipso imponeremus, qui ipsemet nesciuit, quid scriberet, vt taceamus vanitatis plenum illud remedium (si Dijs placet) quod ad colubri morsum ex Ebulo præscribit.

Serapio nihil habet de Ebulo præter ea quæ à Diosc. tradita, & nomina præced. cap. allegata.

Platina in opusculo suo de honesta voluptate, sambuci alterum genus magis siluestre dicit, additque alijs Thamiatem, alijs Ebulum vocari.

Ruell. Aetnam quasi Sambuceam interpreta-
tur, & Gallis Hiebulum dicunt: Mecon, Brun-
chueig.

Iniquè fert Curtius Ebulum à Plin. & alijs qui
busdam Sambuci 1. genus statui, seque scribit
inter frutices, quod herba sit, ne numeraturum
quidem. Age verò sit herba: at idè non negabit,
opinor, Curtius, & specie, & viribus sambuco
simillimam, vt nihil in eo peccatum sit, si vel
Sambucum 2. cum Plin. vel humilem cum Diosc.
vel Sambucum herbaceam, nostro titulo vocite-
mus.

Heliosacte fil. aut Euboea Sambucus, Tra-
go, qui & sambucum æstiualem dici posse tradit:
Summer holder aut Heilender. Chamaecte
(χάμαεκτε) Galeno: & Paulo: Kameactis A-
rab. Durane & Olma Barbaris, teste Lonic. Ebu-
lus, & Ebulum Lat. Dod. Pumila humilisve sambucus Diosc. Pen.
& Lob. Germ. Atrich: Burger feldholder: Uide-
rer holder. Belg. Wilde Olier / baddick: Gal.
Pieble: perit Sambucus, Valeriol. It. Ebul. Hisp.
Hierguos, vel vt Castil. Yegros, Sabuco pequeno:
Portug. Engos: Angl. Walwort / & Bloemurt /
& Oasurt: Boh. Cheddi. Vngar. fodi dozza.

Nascitur in opacis aquosisque locis, atque etiã
asperis, si Plin. credimus. Læto gaudere solo Co-
lum. testatur hoc carmine:

Acque habilis natura soli, qua gramine læto
Parruric & rusilas creas Baccas,

Sic passim Germaniz, Heluetiz, Galliz, ac Ita-
liz, potiss. Lombardiz videas nasci vdis, incul-
tis & palustribus locis; sæpissimè ad aruorum mar-
gines, florentem Iunio & Iulio, baccas Augusto &
Sept. maturantem.

Quas Diosc. Ebulo vires assignat, cap. præced.
diximus, qui easdem ei cum sambuco tribuit. Plin.
quoque vtriusque iunctim tradit, quando sic scri-
bit: Sambucus habet alterum genus magis silue-
stre, quod Græci Chamaecten, alij Helion vocant,
multo breuius. Vtriusque decoctum in vino ve-
teri foliorum, vel seminis, vel radice, ad cyathos
bino potum, stomacho inutile est, alio detra-
hens aquam. Refrigerat etiam inflammationem,
maximè recentis ambugi: & canis mortuum ca-
n

polenta mollissimis foliorum illiis. Succus cere-
bri collectiones, priuatimque membrane, quæ
circa cerebrum est, lenit intusus. Acini eius in-
firmiores, quàm reliqua, tingunt capillum. Poti-
acetabuli mensura, vrinam mouent. Foliorum
mollissima ex oleo & sale eduntur, ad pituitam
bilemque detrahendam. Ad omnia efficacior quæ
minor. Radicis eius in vino decoctæ duo cyathi
poti, hydropicos exinaniant, & vulvas emolliat, &
folijs insidentium decoctæ, [al. & foliorum deco-
cta insidentium] Caules teneri minoris Sambuci,
in patinis cocti, aluum solunt. Relinunt folia &
serpentium ictibus in vino pota. Podagricis cum
seuo hircino vehementer prosunt cauliculi illiti,
idemque in aqua macerantur, vt eã sparsa pul-
ices necentur. Foliorum decocto si locus sparga-
tur, muscæ necantur. Cortex interior tritus, ex vi-
no albo potus, aluum soluit. Idem alibi: Ebuli
quoque quem nemo ignorat, fumo fugantur ser-
pentes. Ebulum tenerum cum folijs tritum, ex
vino potum calculos pellit, impositum testes sa-
nat. Inter ea quæ hydropicos sanant, habetur
Ebuli recentis radix, excussa tantum, nec collata,
quantum duo digiti comprehendant, ex vini ve-
teris calidi hemina. Et mox: Aetne quam quidam
esse Ebulum putant, radice contrita in vini cy-
athis tribus, si febris absit: vel semine ex vino ni-
gro. Præcipue tamen Chamaectes succus aprissi-
mus creditur. Et rursus: Ebuli folia contrita, & è
vetere vino imposita, etiam boam sanant, id est
rubetes papulas. Datur & Aetna acetabulo pleno
interioribus feminarum morbis. Si verum est E-
bulum refrigerare, vt vult Plinius, non consultum
est applicare mortui canis, vt Diosc. facit, qui tem-
per. suspectus esse debet, non enim est tutam fri-
giditate occludere vulnus, & repellere ad inte-
riora.

Scribit Platina florem Ebuli in cibarijs sum-
pium, hepaticis, splenicis, cardiacis atque hy-
dropicis prodesse. Nos nollemus cum Platina in
cibarijs dare flores ob ingratitudinem.

Gal. huic, vt & Sambuco potentiam tùm defic-
candi tùm conglutinandi, modiceque digerendi
tribuit.

Ebuli semen vt prodidit Matth. per diutinas a-
quæ lotiones à nigro circumstante succo expur-
gatum, datur vtiliter drachmæ pondere ex Cha-
maeyctis decocto, podagricis, ichiadicis, &
Gallica Lue laborantibus: mulcet enim deiecto-
ria vi mirificè eorū dolores, cum humores ede-
fluentes tum reuocet tum delicias. Sunt qui Ebu-
lo albugines ictusque oculorum sanent hoc mo-
do. Ebulum contrundito, eiusque succum penna
in oculum instillato, per triduum, & persanabi-
tur. Sunt etiam qui ex Ebuli radicibus succum e-
liciant, insolentque subinde, & in pastillos re-
digant, seruentque ad vsus. Hic clistere intusus
tam intestinorum, quàm coxendicorum dolores tol-
lit à frigiditate & flatu genitos. Supponitur con-
uenienter feminarum locis ad euacuandos men-
ses, præsertim si lana exceptus intromittatur. Subi-
untur Ebuli decocto commodè ii, qui diuturna
russi vexati ad malum deueniunt habitum, si ta-
men ventriculus & iecur interea roboretur odo-
ratiss adstringentibus, & ad id conferentibus me-
dicamentis. Scillaritia cum Ebuli tum Sambuci
radicum aqua hydropes timpanite laborantes mi-
rificè iuuat, si huius quaternas vncias, illius ve-
rò binas vtriusque simul mistis hauriant affecti,
diebus triginta continuis. Illitus Ebuli radicem
succus procidentem sedem reprimat, & angina
tollat, vbi circa gulam calidum cum lincolis il-
lina-

Urina mo-
nent.
Fugant
Urina mo-
nent.

Purgant.
Serpentium
ictus.
Podagro.

Purgant.

Calculos.
Testes sa-
nat.
Hydrop.

San. papula

Ac. b. se-
mi. d. m.

Téperam.

Podagra.
Ictus.

Pastille.
In. d. m. et
con. d. m.

Atrope.

Timpanite

Am. proc.
dentia.
angina.

linatur.

Temper.
Cautio.
Nota.

Observatio.

Acinorum
preparatio.

Oedem.

Vnguentum
ad Arthriti-
am.

Oleum.

Hydriop.

Temperamentum, inquit Dodon. Ebulus habet calidum ac siccum, utrumque ordine tertio, & facultatem non modò, quam ei Gal. tribuit, digerendi exiguam; sed & purgandi per alium eximiam & validam habet: efficacissimæ radices sunt: folia digerendi ac discutiendi potentiâ præstant. Educunt autem radices non modò pituitam, verum & aquosos potissimum humores: utiles iccirco ad hydropicorum purgationes, ut dictum, sed tamen correctæ, & ubi vires suffecerint. Purgant enim cum molestia: Ventriculū libuerrunt: interioraque viscera omnia perturbant. Malè omnibus usus earum succedit, quibus hepar obduruit: ut quando ex regio morbo Ascites successit. Scimus cuidam nobili femina, arthritidi obnoxia, & quæ non facillè medicamenta assumebat, sæpius de ventriculo conquirenti, cum in purgatione semen Ebuli additum fuisset, excuisse magnos dolores ventriculi & molestem vomitum. Quamobrem nec temerè, nec nisi valde robustis ex Ebuli radicibus medicamentum aut portionem dandam censet Dod. Acinos verò ait, & semina multò clementius ac minori cum molestia purgare, præsertim prius aceto infusa, ac deinde semine Anisi vel alijs aromaticis vnâ permixtis. Radix in vino decoquitur, si causa morbi frigida, & febris abest: alijs pro affectus natura temperanda potio est. Folijs tumores oedematosi discutiuntur, cataplasmatibus vel fomentis additis.

Lacuna longè maiores vires tribuit Ebulo, quàm sambuco, traditque magnam habere proprietatem ad mitigandos iuncturarum dolores, & resoluendos membrorū tumores, potissimum à frigidityte obortos: eius radices decoctum ad tres quatuorve uncias, calideque potum omnis generis obstructions referare, quāvis noceat ventriculo. Paululum spicæ Nardī addendum suadet. Folia & radices coquit in facti lixiuio aut aceto, addito sale, & cum eiusmodi decoctione calida fouendum iubet ventrem hydropicorum torum & pedes spongis: non esse præstantius remedium in eo casu. Imponit postea & folia. Parat & vnguentum hoc modo. Uncias duas succi radicis, totidemque succi foliorum & cum sex uncijs olei Chamæmelini decoquit ad succorum consumptionem, tandem & cere vnciam semis addit & aliquid aceti rosacei ad maiorem penetrationem. Vnguenti huius efficacissimam pollicetur vim ad resoluendas omnes humorum superfluitates in doloribus podagricis cuiuscunque membri, siue à frigida siue à calida causa obortis.

Oleum etiam paratur ex Ebulo, quod appropinquè conueniens est in quouis articulorum dolore mulcendo, si eo articulorum regiones, iuncturæque illinantur. Oleum quidem præparat Bonius ex semine Ebuli per torcular, mirabilis, ut affirmat effectus: consuevit dare ægriis drach. cum medio cochleari pulegi. Ut verò pareat oleum diligenter, terit semen, aspergit pauco vino albo, dein terculari subiicit. Ex li. seminis Ebuli, extrahitur OL. vncia.

Ut porro, quod equidem Fernellius testatur, Sambubi & Ebuli contusa folia & apposita ambusta parti persanant, sic & Oleum, sale tamen addito. Ebulus, inquit idem, meth. meden. calidus ac siccus ordine secundo, hydropicorum aquas facillè per alium deducit, nonnuquam & vomitione rejicit. Est autem ventriculo aliquantū ingratis, succi vis efficacior purgat vncie vni.

pondere. Elicitur autem vel è radice, vel è mediano cortice stipitis contuso, affusa aqua hordei vel vuarum passarum, cum Cinnamomi, vel nucis Moschatæ momento & cum Saccharo. Cocturâ vis eius purgandi perit & exoluitur, neque, ut Dioscorides scribit, eam persistere vlti comperitum est; Fructum nonnulli condiunt duplo sacchari & Cinnamomi parte octaua, exhibentque vnciam vnâ: acinorum verò drachma vna tusa, idem ex mulla aut vino albo præstat. Sambucus eodem temperamento iisdemque pollet viribus, sed Ebulo aliquantò infirmior. Inter ea quæ aquas ducunt ebulus imbecillis & prægnantibus, sed ne temerè quidem decerni potest.

Lonic. quoque non esse aliud efficacius & præsentius remedium scribit ad hydropem, quàm Ebuli radix, si ex ea bibatur. Eandem & in rursi frigida celebrat. Folia ex aqua cocta, & ea potatiliam siccam sanare promittit, & conferre angina. Item ad vulturam, addito in eius decocto Pyrethro. Succum Ebuli cum pulvere Tithymalli radicis, addito saccharo, quotidianis febribus commodum medicamentum prædicat: Eius tamen usum minus tutum & non nisi magnâ cautela administrandum censemus. Folia podagricis doloribus imposita, eos mitigare ait. Aqua destillationis foliorum ad vncias duas aut circiter, alium mouet. Eodem modo manè & vespere pota hydropicos tumores exhaurit, quotidianam febrem abigit, & laterum dolores mitigat. Prodest & extrinsecus linctaminibus in ea madefactis imposita. Cento experimentorum Wirtembergicus inter alia habet, Ebuli radicis in vino contusæ succo sæpius abluto capite, crispari capillos. Io. de Monte Experimentum est, si capra nutriatur Ebulo per diem & noctem, lacte eius ventriculū repurgatum iri. Camer. approbat mures fugere Ebulum. In Vicentinis, & Tarvisinis refert Scal. olim vina ex Ebulo fieri consueisse coloratiora: alioqui plebeculæ minus venalia.

Succus.
Dosis.

Conditura.

Tusis frigi-
da
Angina

Cautio.

Feb. quotid.

Crispatis
capillis.Purgam
lac.Aduersus
mures.Vini man-
coloratio.SAMBUCVS RACEMOSA, ACINIS
RVERIS.

CAP. XXV.



Quāquam cum vulgari Sambuco multa habeat communia, sic ut floribus aut baccis vidua, in re Botanica non versatofacile imponere posset, folijs tamē est paululò minus fœtidis: at in floribus & baccis clarissimū discrimen. Flores enim nullam umbellam faciunt, ut in vulgata, sed in racemum ob-

Destititio.

Folia.

Flores

Bacca.

longum digressi, stellati, colore ex albido in luteolum in inguente. Baccæ consimili modo racematim frequentes succrescunt ex rubentibus pediculis,

ipſe quoque per maturitatem coccineæ, inuicūdi planè ſaporis, è quibus nouæ plantulæ ſiſtantur, progignuntur, teſte Trago. Matthiolo verò perpetuò rubeſcentes, vinoſe ac ſucci plenæ. Lobelio colorate, puniceæ, non inſuaves per Auguſtum eſui.

Hanc eandem Currium intellexiſſe cenſemus, quam deſcribit arborem generis fruticoſi, fructum racematim producentem, colore per maturitatem rubeo, non, vt in noſtra, nigro. Sambuci genus minus, floribus & baccis in racemo conſtitutis, Cordo Sambucus ſilu. & Ceruina, Trago. An Hieron. Brunſchueig. in apodix. Germ. apud Brunſ. Sambucus rubens, & ſilu. & ageſſis docto- rum quorundam? Sambuci 2. genus montanum & ſilu. Matth. apud quem in poſt. comm. Ital. cum magnis iconibus cap. 175. figura huius tranſpolita ponitur titulo Sambuci, qui idem error quoq; cōmiſſus in Hiſt. Germ. ubi vocatur Sambucus montana. Tertia Sambuci ſpecies Alpina, cætera Sambuco ſimilis, baccis rubris, Turneſo. Sambucus montana vel rubra, Geſn. Sambucus cum m- cenſo Anguil. Sambucus montana racemofa Pen. & Lob. qui in edit. Teut. duas icones proponit. Sambucus 4. ſilu. & Sambucus Ceruina. Dod.

Lonic. eius iconem ſub titulo Aceris ponit, Germ. Thorn: & eandem rursus ſub nomine Sambuci Ceruini, quod utique eius ignorantia tribuendum cum ſimiles errores paſſim in ſuo Herbario committat, quippe qui in ſtudio Botanico, tanquam Venator Helucius in ſilua Bohemica verſatus fuerit.

Plin. quoque montanum ſambuci genus videtur cognouiſſe, cum in montibus etiam naſci tradat. An Cæſal. Sambuci 2. genus in montibus, umbellis paruis, baccis rubentibus? Sambucum ſilu. ſive montanum Dalech. eam ſuſpicatur, quam Theoph. ſignificat l. 3. c. 14. quamuis Pygos in verſione Gazæ omiſſa ſit. Sambucus ipſe deſcribitur aut eſt Thaliæ: qui annontat, in Hærcynia Saxothuringica eius folia ignaris vetulas pro Ebuli folijs obtrudere, ac diuendere, atque adeo vulgo Aitich vocari. & in Germ. Ed. alas ſter: Berchholder/Wilder holder/ Waldholder, Hirschholder/ Bergholunder.

Annotat Camer. in Palatinatu verſus montes Bohemicos inueniri interdum cum baccis albis. Matth. teſte in montioſis & algentibus locis naſcitur. Prouenit maxime in opacis viginioſiſque ſiluis, ferarum luſtris inuiſis, in Hærcynia Saxothuringica circa Stolbergam & Honſtenium, Thal. in Cotariſiana propè Symphorianopolim agri Lugdunenſis ditionis. In Latonijs ab vrbe Norimberga ad mille paſſus ſitis copioſe creſcere teſtatur Camer. & in Italiz monte Veronenſi Baldo, Anguil. Paſſim in opacis Comitatus Montbel. & Burgund. ſiluis & montibus obſeruauimus, potiſſimum etiam in montibus Lotharingicis, in monte Roſſibero circa Maſſinſter, ubi mēſe octobri cum pulchris acinis coccineis, decidentibus folijs videas, quas & Auguſto maturas legimus in Lotharingia, & Iunio circa Geneuam in monte ſalene, & in Rhatiz pluribus. Veronæ quidam in hortis colunt. Floret menſe Aprili.

Scripſit aliquot ex vicinis locis, in hortum E. C. Montbelg. plantandos curatiſſimus. Tradit & Curtius ſe in hortum ſuum (Lugdun.) in ordinem cæterarum decuſſatarum arborum redegiſſe, verum diu non duraiſſe, quod loca amēt opaca, & manus aſpernetur.

Experimento didicit Tragus Ceruam Sambuci

ſilueſtrem, ſicut & ſolanum (ſiliaticum) magno deſiderio inquirere. Solent binæ hæc ſurpes plerumque eodem ſitus occupare: folia vtriuſque, non baccas decerpit. Vnde intelligi poteſt, fructuſque horum frigidioris eſſe qualitatis, & ſeris, nec dum alijs iumentis & hominibus minus laturæ obſeruauit idem. Ceruam ſolum folijs hanc plantarum veſci, non autem Ceruam, niſi ea prægnans fuerit, & ceruam in vtero geſtauerit. Ideo ſambucum ſilu. frigide naturæ eſſe iudicat, ita quidem, ut pro Mandragora, ſi illa deſit, uſurpari queat. Sic & Lonic. Sambucus ſilu. inquit, ſimilem naturam habet cum vulgari Solano: frigida eſt, potiſſ. baccæ. Somnum conciliat. Multus uſus nocuus eſt. Matth. ſcribit vires urbane ſambuco inbecilliores habere: ipſe ſibi ipſi & prædictis autoribus contrarius: nam in hiſt. ſua Germ. eiſdem naturæ cum vulgari Solano dixit. Camer. quoque teſtatur, frigidas eſſe baccas, ſoporofos reddere edentes, multumque earum eſum eſſe nocuum: Lob. quoque ſubſcribit, & veterum quoque inducere teſtatur, præſertim baccarum eſum. Scribit tamen Schuenckfeld. a nonnullis ſuccum baccarum cum melle ad intineſtus coqui. Nos ſic paratas non parum mellis calore caſtigari cenſemus. Tuius tamen abſtinere.

SAMBUCVS AQUATICA.

CAP. XXVI.



Aquatica Descriptio
hæc ſambuci ſpecies indeque cognominata, arbuſcula eſt quinq; aut ſex cubitorum altitudine, caudice craſſitudine ſua manum cōplente, ligno teneto, candido, fragili, fungoſa intus medulla, polito cortice cinereo obtecto, geniculis tamis gemellis ordine viti-

que vno brachiatæ ex quorum geniculis folia exeunt lata, anguloſa, rugoſa, Aceris minoris foliorum amula, vel Sorbi Terminalis. Flores non nihil odorati, in umbella candidi, tam lati, quādo, vt pollicis vnguem æquent, quinquepartiti [Trago verò quadripartiti] ſed circa umbilicum continui, maxime verò ij qui extimi in ambitu ſunt, expanduntur, medijs intra umbellam exiguis conſeſſis, ſeriusque ſe expandentibus, flauelcentibus. Acini rubri ſeu languinei, magnitudine baccarum Spini albi, ſemen continent planum, latum, rubrum, cordis effigie. Cæſalpino nuclei duo, ſimiles ſemini Atriplicis, compreſſi. Hæc baccæ, autore Trago, ingrati planè ſunt ſaporis, ita vt deguſtanti nauſeam & taſtidia continua pariant: Matheolo, vinoſo & amaro ſucco refertæ: Cæſalpino ſiccæ vuis paſſis ſimiles, cum

Sambuci
genus mi-
nus.
Matthioli.

Alpina.
Montana.

Pygos
Theoph.

Varietas
cum baccis
albis.

Locus.

Satio.

Cultum af-
pernetur.

Vicia &
vici.

..

Tempe-
ram.

Obſeruatio.

Significatio.

Aceris
Matthioli.

Nocuum.

Intineſtus.

Paras.

Alcous
Semen.

Sapor.

dulcedine austeræ: Cordo baccarum succus Autumno amarus, modiceque dulcis & acerosus est, insequentem autem Verem, cum hyeme passus factus fuerit, magis astringit. Cortex amari & astringentis saporis.

An Ruell. Opulus Corno similis (inquit) arbor arbusculo Gallico faciendo idonea: Obierus vel Opulus apud nos ruri dicitur: Vlni proceritate adest, caudice recto, enodi, rarioribus ramis brachiato, frondibus ferè vitigineis, baccis racematis dependentibus, prima pubertate viridibus, à maturitate puniceis. Vitem Opulus alit: verum quoniam frondem non habet idoneam, à plebique repudiatur. Ieiunum solum horret &c. Si Ruell. per Obierum intelligit Sambucum aquaticam uti nobis videtur, male sanè describit: non enim adest ad altitudinem Vlni, nec caudice recto est: is aliquot plantas confundit.

Curtius cap. proprio eandem Opuli descriptionem habet, ex Ruell. ut existimamus, desumptam, citans Varro nem & Columellam. Nondum legimus apud hos vel apud alios Opulum ferre baccas: ideo Ruell. & Curtium hanc cum Sambuco racemosa confudisse modò diximus. Nos de Opulo alio loco trademus.

Opulus apud Theoph. l. 4. c. 1. hist. Sambucus aquatica siue Palustris, vulgò (Gallis) Obier putatur, ut annotat Rob. Const. cuius opinionis etiam Dalech. fuit, & multi alij ut notat Hist. Lugd. sed hæc coniectura incerta, quum nulla sit descriptio: paucula enim tantum hæc verba habet Theoph. Taxus quoque & Thraupalus maxime gaudent umbrosis. Quis inde certi quiddam statuatur? Esto hæc igitur una à nobis pro derelictis habita, sitque primi occupatis, ut sit quum incerta est vacua possessio, ne omnia occupasse aut tenuisse videamur.

Lycostaphylos femina Cordo, qui figuram Tragi habet, cum hac annotatione: nostri Sambucum aquaticam vocant: Saxones lupinam uiam, quod nomen Græcè exprimere voluit Cordus.

An Anguil. epist. 4. Aceris species 3. dicta &c. Patavij & in Patavino agro Pieduca & Platano aquatica.

Dodonæi sententia est, de sambuco aquatica siue palustri nihil Veteres memorie prodidisse: neque enim Opulum esse, ut nonnullos temere suspicari contigit: multò minus Platani speciem. Sambucus palustris, vel aquat. flore simplici Gesn. qui fruticem esse ait, & si cicuteretur, arbuscula fieri. Nec probat eos qui Chamæplatanum vocant.

Aste & sambucus aquat. siue rosea, Pen. & Lob. & Taber. dñi Ind. pr. Germ. Wasserholder / Bachholder. Schwelken / Schwelkenbaum: quibusdam Maßholder / Schneballen / Tabern. Silei. Ballnckenbaum, Tainnckenbeer: Belgis Gelders rosen. Gall. Obier vel pier. Sambucus palustris femina, Camer. Sambucus palustris folio Opuli, Cæsalp. Hist. quoque Lugd. negat opulum esse. Patavij cum ceteris D. Presburgius indicavit vocari *chastrobion* Theoph. Lectirotariam, Sambucum aquat. & Platanum feminam Guilandino.

Nascitur in silvis & dumetis, & umbrosarum emonarumque riparum quas blandè rigant aquæ: socola communiter inter Alos visitur in Germaniæ, Galliæ, Angliæ, Italiæ, Pademontiumque præsentibus, vdis, conualliumque marginibus. A loco & hanc Aste nomen sibi ascripsit Lob. memorat. In Helvetia, Burgundia & circumiacentibus locis non rara. Nascitur & in palustribus Pisani: Basileæ in monte Murenli stirpium varietate Studiosis qui illuc quotannis con-

flunt clarissimo.

Nos eam in hortum Montb. translata eleganter copiaro operi, præsertim contegendis Adonidis domunculis hororum optandam cura: uisus, ubi non inelegans visitur tota hieme, absque corruptione, coccineas baccas ostentans. Umbellæ cum floribus Maio late conspiciuntur: Autumno baccæ perficiuntur: nihilominus in Tempus regra hieme durantes: quo tempore cum reliquæ tum potissimum Bonolæ aures [baseldpuner] summo opere eas expectant, ut non rarò etiam illis inescata decipiantur ab aucupibus, notante Trago: cuius indicio in Eclegmate exhiberi possent ad vomitiones sciendas. Flores cum suauiter odorati sint, solent æstate voluptatis gratiâ legi & conclauibus inferri. Matthiolo baccæ deuoratæ vomitionem cient, succo vis inest abstersoria, qui cum melle (inquit Schuizen x. f.) ad syrupi coquitur consistentiam, aduersus tussim, vulgi experimento. Tradit Rob. Constant. nescimus quo autore, Aquatici sambuci destillatos flores ad frangendum calculum efficacissimum omnium esse remedium.

SAMBUCVS ROSEA.

NB Huius Sambuci Icon Errone typographico paulò antè sub titulo Sambuci Aquatici posita fuit: Sic ut Sambuci Aquatici Icon sub hoc.

Descriptio.



Mabili florum candidorum magnorum, quinquepartitorum, unaque se expandentium, glomeratorum, pike niueæ unde nomen apud vulgus Germanici inuenit. Instar, spectaculo, hortos decorat fragipeda ista aquatica Sambucus: floribus paucis destituitur: cetera præcedenti similis, niu

quod flores propemodum odore destituti videantur. Gesner. annotat sibi celatum etiam purpurei coloris flore Basileæ in hortis reperiri. Verum quanquam ibi multoties, & quæ est illic frequentia pluribus hortis viderimus, nusquam tamen nobis purpureo flore obseruata. At Montbelgardi Anno 1600. in horro E. C. Wirtemb. ubi albam abundè habemus, semel ex improviso visi sunt ex quadam aeris constitutione omnes flores purpurascetes: qualem colorem in ea antè non obseruaueramus.

Lycostaphylos mascula Cordo. Rosa Menapia, & Sambuci aquatici siue palustris species, Dodon. Sambucus palustris, hortensis flore multiplici albo, Gesn. qui aliquibus Schneballen / id est, Globos formosos nuncupant. Basilienses globos niueos, à figura & colore, Schneballen vocant. Sambucus rosea siue aquatica Penz & Lob. Sambucus palustris mas, flore conglobato Camer. Sambucus aquat. polyanthos, Gesn. Schneballen: Item Sambucus 6. rosea, flore purpureo multiplici Tabern. quem non necesse erat

Opulus.
Obierus.

Ruell. an.

Curtius de
flor.

Lycostaphylos.

Patavij.

Curtius.

Curtius.

Chamæplatanus.

Tabern.

Locus.

Aste.

Autum. or.
lus.

Vires &
vitis.

Vomitoria.

Ad calculum.

Fructus
res.
Flores.

Purpurei
Flores.

Tabern.
calcul.

Locus.

duabus figuris opus suum stipare, vnius eiusdemque plantæ floris colore variantis : quem tamen num viderit dubitamus. Sanè nihil indicat ipse.

Ceterum, tota hortensis creditur hæc, inquit Dod. & culture mangonio talis facta, apud Germanos superiores & Belgas haud infrequens hortorum incolæ. Cordus refert nasci iisdem locis, quibus præcedens simplex, sed in Germania partius, ideoque in hortos propter florum elegantiam translata, præsertim Angustæ Vindel. Ratibonæ & Norimbergæ. C. Bauh. scribit in Gallis & Italijs sibi nuspiam visam : nec nobis sanè quod recordemur, nisi in orto instructissimo Robini Botanici Regij, Lutetiæ, (Lugdunum enim & Geneuam à nobis primùm introducta:) Item Vesuntij in cuiusdam Canonici orto, qui perhibebat Gallis *Roses de Guelbres* vocari.

Vires & usus. Sapor.

De huius usu & viribus nihil hæcenus innotuit nobis. Attamen corticum sapor subastringens est & deterforius cum modica quadam amaritudine : vnde rationabiliter conicimus, ad eisdem cum præcedenti usui aptari posse, præsertim cum eius species & varietas esse videatur.

AZADARACHENI ARBOR. CAP. XXVII.

Descriptio.

Folia.



Flos.

Fructus.

Macha.

Iusta magnitudinis est arbor, cortice in nouellis læui, in adultioribus scabro & rimoso. Folia Fraxini ferè, serrata, cubito longiora, ex foliolis multis sibi mutuo respondentibus ad costam vnâ ramosam adherentibus constantia, saturè viridibus & nigricantibus, & sub hiemem cum suis pediculis decidentibus. (Clus.

Barbæ caprinæ folia comparat.) Flores ex longo pediculo, dodrante maiore, in ramusculorum extremis ad exortum foliorum copiosi, racematum coherentes, parui, odorati, sapore nullo, ex quinque foliolis expansis constantes : in quorum medio veluti calyx longiusculus, ex purpureo nigricans, in quo stamina. Floribus succedunt bæccæ frulex, luteæ, magnæ, amaræ cum dulcedine quadam, initid virides, maturitate candicantes, magnitudine Mespili Aroniz, fætidæ, ingrati saporis, in quibus nuclei duri, eleganter angulosi, nunc pentagoni, nunc hexagoni, medullam continent albam, valdè ingratam.

An de hac Auicennas l. 2. traçt. 2. c. 17. *Azedarach*, id est, *Azedarach* : arbor nota, cui fructus similis Nabach [id est Loti quibusdam.] In Rechi vocant Arborem Myrobalanorum & c.

Monachos aliosque qui eandem cum Sycottoro faciunt, reprehendunt merito Gesnerus & Matthiolus : Bellonius Siliquam nominat, quod miteris, cum bæccas non siliquas ferat.

Monspelij meo tempore, inquit Clus. *Arbor sancta* dicebatur, Pellicerio Episcopo *Lotus alba* existimabatur, alijs vero *Zizyphus alba* : quam opinionem adhuc retinere magni nominis viros miror, cum nullas notas habeat, quæ albæ Zizypho conueniant : Italis Herbarijs inceptè & imperitè Sycomorum vocari audio. Baticis vulgari sermone. *Arbo Parayso*, Castellanis *Zizyphus alba*, Italis *Perlaro* vocari audio. Tripoli, ut notat Rauuolff. *Zenselach*. Rhazi & Auic. *Astigar* aut *Astergir* & *Azadarach*. Lob. & Pen. Adu. *Zizypha candida Monspel.* quæ perperam Venetorum Sycomorus.

Apud Hist. Lugd. *Zizyphus alba* Dalech. & Matth. siue *Pseudosycomorus* : Turcis *Tbespic*. Eadem icones duas habet, quarum Dalechampi deerior : folia enim falsa.

Non parum errant, ait Dod. qui Lotum arborem affirmant. *Taber* Cæsalpino.

Nic. Braun malè *brustberlin* : hæc nimirum Germanica voce, quæ thoracis bacculas significat, incautus periculum præparans, qui iuiubarum loco in thoracis affectionibus uti vellent. Apago verò istos Rhizotomos cum suis *weissbrustbeers* lin/ quod idem est, ac si albas iuiubas dicas. Dolendum, hercle, unicuique statim se Medicum aut Herbarium profitenti, statim fidem adhiberi, cum in nullo mendacio periculum sit maius.

Porro *Azadarach*, teste Bellun. reperitur Venetijs, Patavijs & in Syria. Gesnero è semine prodijt : sed dodrantalem spondyli erosa radice perdidit. Hieme reponi debet sub tectum. Bellonij curâ Lutetiæ aliquot huius arboris plantæ iam dudum spectari cœperunt. Plerumque visitur in Monachorum claustris & in templorum plateis, si Matth. credimus. Clus. nusquam spontè nascentem vidit in multis Baticæ viridarijs, atque etiam secundum vias regias alitur : sed nullibi maior eidem conspecta, quam Hispali in Regio Palario. Tota hieme perdurat, nullis degustantibus auibus, vnde facile venenatam & malignam eius qualitatem intelligas. Tripoli in vrbis plateis ad vmbram excolunt : Rauuolff.

Camerario prouenit ex semine.

Vidimus Nematus elegantissimam arborem cultam, quæ hyemes rigidiusculas tolerat. Sed & Monspelij in orto quodam vidisse meminimus. Alebat & aliquando Platerus Basileæ in elegantissimo suo orto. Nobis etiam ex semine prouenit Montbelgardi in orto E. C. Wirt. Patavio misso, verum non rite reposita frigore interijt : Est enim durioris frigoris impatiens. Primum omnium, quod equidem sciamus, visa nobis Monspelij in orto Celeberr. præceptoris nostri Guil. Rondeletij. Arelatæ in Prouincia maximam arborem ostendit nobis insignis Medicus Valleriola, qui Sycomorum nominabat : postea vidimus Patavij orto publico & alijs bæccis onustam mense Ianuar. & Febr. Ferrariæ in orto Ducis (vbi Struthocamelos tres conspeximus) multas arbores. Folia & flores simul erumpunt mense Iunio. Bæccæ autumnò maturescunt, totaque hieme in arbore durant, maxime in Italia. Sturgardiz in orto Ill. E. C. vidimus Iunio & Iulio pulchrè florentem. Elegantem etiam videas Pliedelberge in orto Electoris instructissimo, qui hieme tegitur. Narbonæ frequens est, teste Lob. Belgis colitur in hortis. Merebatur rara arboris elegancia, paullo specialius loca designari.

Azedarach Rhazæ calida & sicca est, conuenit obstructionibus capitis, capillos prolongat. fructus ventriculo valdè nocuus, & interdum pern-

Vires & usus. Tèperam.

arbusculæ partibus coriarii ad deplanda coria utebantur, ob id *ros* *syriacus* Græcis dicta: quam Colum. *Rorem sutorium* semel dixit, alioqui & *Scytopedicos* dicatur, ut notat Hermol. qui tradit, habere se, unde hoc *Rhus Syriacum*; (nam in argillosis Syriæ potissimum nasci ait: alias ubique) siue ut Colum. & Pallad. appellant *Rhus Syriacus* parum distare videatur ab hoc nostrate, qui frutex excoriarius, & *Rhus crythros* à colore subrotulo vocatur Dioscor. & Plin. crassitudine digitali, altitudine bicubitali: quanquam Plin. nisi librariorum ea sit incuria, cubitali prodidit. Duo faciunt omnino Græci genera: *Mageiricon*, quod additur in obsonia: idem est cum Syriaco, ut opinor: alterum quod *Excortarius*, id est, excoriarium. (notabis utrumque ex eadem planta esse, ut antè dictum, vltus tantum differentes, in quo deceptus videtur Hermol.)

Marc. Virgil. in Colum. lib. 9. capit. 13. malè *Rorem sutorium* legi tradit: *Rhus* enim non *Rorem* legi illic oportere. Considerandum igitur qualis sit eius *Rhus* in *Echruia* folio *Myrti*, illaque quam pani nautico condimenti loco inspergi tradit. Vera *Rhus* *Theophrast.* & *Diosc.* non habet folia *Myrti*, sed potius *Vlmi*: nullam nouimus plantam folio *Myrti*, quæ ferat baccas viles pro pane nautico præter veram *Rhoen*, cui non sunt folia *Myrti*, sed *Vlmi*. Suspiciamus Marcellum non intellexisse quæ scripsit. De *Rhoen* *Myrtifolia* *Plinii* putata, postea trademus. Actuar. in quibusdam compositionibus *Sumachum* tradit *Rhon* appellari, quod nomen omnes usurparunt officinæ, à barbaris emendicatum quibus *Sumach* dicitur, quæ vox etiam coriis communis aliquibus locis est: non aliunde, ut credimus, quàm quia ex foliis huius fruticis confecta fuerint.

Ruell. *Rhois* descriptiones convenientes ponit quidem: Verùm in fine addit: rura nostra *Vurnam* appellant, flexu ferè inuictam: unde satis apparet eum *Rhoen* cum *Lantana* confundere de qua postea.

Rhus Culinaria *Cordo.* oportet autem (inquit illè) enucleatum & pulpam eius accipere. Verùm minùs placet, quando ei *Laurinos* ramulos alternatim geniculatos tribuit, Per erotem *Syriacum* *Celsi* *Crinitus* intelligit *Mannam* sed perperam, vnde nec immeritò à *Manardo* eo nomine reprehenditur. *Manna* enim intelligi non potest apud *Celsum*, nisi inscitia rei medicæ *Celsus* ipse notetur. Quæ enim vis *Mannæ* nostræ, ut mala vlcera oris, de quibus inibi scribit, per eam sanescant, Sed fortè deprauata lectio *Celsi*, ut vult *Manardus*.

Celsus ab errore vindicare conatur *Amatus*, non solum *Crinito*, sed & *Manardo* ipsi errore impunitis his verbis. *Ros Syriacus* siue *Cixiacus* siue *Cytenaicus* aut *Medicus* dictus, *Laserpitii* succus est. *Manardum* non minùs ac *Crinitum* erratum est: illum per *Rorem Syriacum*, *mannam* intelligentem, hunc verò *Rhus* *Sumach* dictum. *Hac ille*: temerè, & imperitè, ut patebit legenti ipsum *Celsum* l. 6. c. 11. à quo *Ros*, vel (ut rectè legit *Plantin.*) *Rhus Syriacus*, præscribitur pueris vel lactantibus infantibus, & aut vlceribus oris laborantibus. Quis verò præscribat *Laserpitium*. Quare *Cornel.* *Celsum* rectè à *Manardo* interpretatum omnino nobis persuademus.

Cotereau in sua versione Gall. apud Colum. l. 9. c. 31. non benè vertit *Benioin*: Nos cum doctioribus *Rhoen* *Syriacum* legendum censemus.

Idem *Cotereau* lib. 12. cap. 41. Colum. malè vertit *Roufec de Syrie*; ubi traditur conditura ex *Cydoniis*. In nostro sanè quodque exemplari non benè legitur *Ros Syriaci* pro *Rhois Syriaci*.

Monachi tradunt *Rhos Ponticum* quale ipsis *Patau* ostensum fuit, habere fructum in racemulis. Verùm suspicamus *Monachis* *Patau* demonstratum *Sumach* siue *Rhus obsoniorum*, quamuis dicant: aduerte quod *Rhus Ponticum* differt à *Sumach*, quod est *Rhus obsoniorum*.

Espartacam & *Ponticam* *Rhus* *Damocrates* *Rhus Ponticum* probat ut l. 7. comp. med. ostendit Gal. Eam autem à loco natali sic cognominatam existimamus, non quòd species sint distinctæ: nam & paulò post hunc locum Gal. inter parabilia astringentia recenset *Culinarium* & *Coriarium* *Rhoen*, & succum qui ex *Syria* adfertur. Habetur & apud *Marcellum* medicum *Rhus marinus*, siue *Rhus Orientalis*: ut etiam apud Colum. *Rhoen marinum* legi possit, pro *Rorem marinum*. Num igitur tot species dicemus si tot diuersa sint nomina, & ea quidem patria?

Nec intellexit *Lonicus* quid scriberet, quando *Rhois* duo genera dicit: *Mageiricum*, hoc est, *Rhus obsoniorum*: alterum *Byrsoedysicum*: & à *Diosc.* describi arborem: à *Ruell.* fruticem in *Gallia* prouenientem: ponitque duas icones, quarum posterior est *Ryffij* similis, pro posteriore *Ruellij*, quam ineptè *Viburnum* vocat, & tamen descriptionem ex *Ruell.* habet, quæ neutiquam *Viburno* *Ruellij* conuenit, sed *Rhois* est eiusdem.

Tam *Ryffiana* quàm *Euch.* *Roslin.* icones nullius momenti sunt.

Etsi autem *Galenus*, ut annotat *Matth.* plura *Rhois* nomina & genera explicasse videatur, ut qui id modò *Syriacum* appelleret, modò *Ponticum*, modò *obsoniorum*, modò *coriarium*, modò *rubrum*: non tamen propterea censendum, *Rhois* arbores inter se genere vlt specie differre. *Rhus obsoniorum* nihil aliud est, quàm semen: *coriarii* verò nil aliud, quàm folia & fruticis ramusculi. *Rhus rubens* nihil aliud est, quàm eius semen immaturum, cui maior adstringendi facultas inest, quàm maturo, cuius acini quadantenus nigricant. *Syriaca* præterea atque *Pontica* *Rhus* nihil genere distat ab *Italica* & *Iberica*.

Hallucinantur ergo *Monachi*, qui *Rhoen Ponticam* alterius esse generis crediderunt ab ea cuius vsus exitit apud Antiquos in obsonijs, *Plin.* fortè lectione vulgata decepti.

Errat & *Fuchs*, qui præter *Culinarium* & *coriarium*, etiam tertium genus *Syriacum* inter se omnia differentia purat.

Fatetur *Matth.* id, quod *Gaza* *Fluidam* interpretatus sit, sibi errandi ansam præbuisse, ut puratit *Fluidam* *Theoph.* esse eam arbuticulam, quæ vulgò *Lantana* vocatur, idè postea eundem errorem reuocat.

Miramur etiam doctiss. *Cæsal.* separasse *Theoph.* *Rhus* à *Dioscoridis* *ros* & *pros*.

Lat. *Rhus*. *Rhus terginus* vel *tergorarius* *Cæl. Aurel.* l. 4. *Chronicor.* ita namque minore lectionis fraude cum *Had. Iun.* legimus, quàm, ut vulgati codices habent, *Vutherginario* incompta & barbara voce pro *rhoen tergorario*, quo *tergora*, id est, coria depellere mos est.

Arab. *Sumach*, *Adurion*, *Rasbar*, *Sadisticos* seu *Rasidicos*. It. *Rhu* & *Samacho*. Belgæ contracta Arabica vocè *Smack* vocant: Itè *Ren*, *Rin*. Gal. *Roux* vulgò: quibusdam *Change*, alij *Rhon*. Hisp. Castil. & Catal. *Sumaque*: Port. *Sumagre* G. *Gerberbaum*. Scanis seu

Rhus Syriacus

Rhus Syriacus
Frutex excoriarius.

Plin. amand.

Hermol. am.

Marcellus
am.

Sumach.
Actuar.
Sumach.

Plin. am.

Ruell. error.

Rhus Culinaria

Cordi laps.
am.

Amatus.
repreh.

Cotereau
gemini or
am.

Coluth.
emend.
Monacho-
rum error.

Rhus Culinaria
Rhus marini.
Rhus marinus.
Rhus Orientalis.

Ryff.
Roslin.

Nominum
diuersitas
non diuersas
facit species.

Rhus rubens.

Fuchs.
error.

Cæsal.
error.
Synonyma
linguar.

Cæl. Aurel.
locus error.

seu acinorum color coccineus flammescens no-
men imposuisse videntur, ut per spodiis diceretur:
Semen aliqui in perilla vocatur.

Locus. De hac arbuscula Italia, potissimum Gallia Narbonensis, Gallo prouin. & Hispania gloriantur. Speciatim Montispelii vidimus circa castellum nouum locis glaucosis & macilentis, Sorbo vulgari aded summem, vt vix sit internoscere, nisi attentius perpendenti. Quo loco multo procerior, quam Diosc. memorat, nascitur, ac penè Sambuci maioris magnitudine, vt obseruauit Lob. Locis Galloprovinciæ aridioribus & ruderosis, desitis, incultis, pumila, & quanta qualisque apud Dioscor. descripta bicubitalis arbuscula visitur. Incolæ territorii Siderocapæ dicti, copiose colligunt folia, ad depstanda coria, teste Bellon. Notissimus quoque Rhus nomine Sumach ad Marranum Castellum Marix, Lanza & per Vmbram Anguil.

Clusius in Hispanica sua peregrinatione magnum eius prouentum Salmaticensi agro esse, utique questus gratia diligenter coli obseruauit. Multi, inquit, agri eo conuerti, nec minore ibi cura coluntur quam uineta, alioqui nec tam late assurgit, aut si cultura absit, degenerat & siluescit. Imò non desunt qui vitibus interserant, culturae compendium quærentes, ut eadem opera cum vitibus fodiantur. Cæduntur singulis annis enati surculi cubitales ad radicem usque aut summam tellurem, deinde desiccantur, in pollinem rediguntur, & in usum conuertuntur ad paranda coria, quo usu in tota Hispania celebratissimus habetur.

Refectus 110. Camerario ex semine provenit, quemad. & nobis aliquando in horto Montbelg. sata, & multis annis in fistilibus asservata, hiemeque reposita tandem exaruit. Felix Platerus etiam non repositam hiemes aliquot annis in cultissimo suo horto aluit. Montpelii Augusto Hostentem vidimus.

Tempus. Tardè fructus suos perficit ad perfectam maturitatem: rubros tamen racemos circa autumnum tempus vidimus & legimus ibidem, quos & apud Phœrmacopolas diligentiores inuenias, quemad. & ex eo vel solius expressum succum spissum rubentem, ex Hispaniis, ut putamus, illatum. Alioqui in Germania ceterisque Septentrionalibus prouinciis spontè non nascitur.

Vires & usus. Iam ex Dioscor. dictum, fructus corticosam tunicam perquam utilem esse, atque acinorum etiamnum hodie ad condimenta multus in culinis usus. Eodem tradente, folia vim habent stringendi, & Acaciae effectus praebent. Decoctum eorum capillos denigrat: dysentericis infunditur, abijdem bibitur, & ad insectum usus patitur: nec non & purulentis auribus instillatur. Pycrygia & Gangranas cohibent folia, ex aqua, trumelle illita. Succus elinitur Lycii in

Cæterùm, Hipp. ad fluorem muliebrem & quemvis vteri morbum Rhoe diuersimodè vtitur. Quæ de re si certior fieri cupis, cum consulis. Illud duntaxat examinandum, cur de nat. mul. ad vteros purgandos eius folia præscribat & fructum ex vino bibendum det. Ticulus fortè transpositus, & quædam confuse transcripta. Ad hæc non intelligo Hippocratem, quomodo dicat medicamentum sanguinem ex vtero expellere. Fortassis error quidam libraries. Aridis foliis, inquit Plin. vt Malicorio, coria perficiuntur. Medici autem rhoicis utuntur ad contusa: item cæliacos & sedis vlcera. At quæ phagedænas vocant, folia trita cum melle, aut illita cum aceto sanant. Fit & Stomatice decoctis ramis ad eadem, quæ ex Moris, sed efficacior admisto alumine. Minuitur eadem hydropicorum tumoribus. Semen (Rhois Erythra) vim habet astringendi refrigerandique. Aspergitur pro sale [cum sale, vet. nec aliter sapit palato Cornar. quamvis & sine sale condimentis inspergi possit,] obsoniis. Aluos soluit [malinus, stringit.] omnesque carnes cum silphio suauiores facit. H ulceribus medetur manantibus cum melle: asperitati linguæ, percussis, liuidis, desquamatis eodem modo. Capitis vlcera [vuln. CH.] ad cicatricem celerrimè perducit: & foeminarum abundantiam sistit cibo.

Rhus, inquit Galenus, fruticosa planta adstringit, desiccatur. Nam & Coriarij tinctorum ad desiccandum & adstringendum coria utuntur: unde *Superdolanum* Græcis dicta. Porro medicis in usu sunt imprimis fructus eius & succus multum austere qualitatis. Consentaneus est usus particularis ipsi gustus sensui. Fuerit igitur ex tertio ordine exiccantium, & secundo refrigerantium. Utilem vero præsertim sic experimento agnovisse tradit ad crustas, vulvæ inflammationes, alium fluidam, fluxiones, & sanguinis eruptiones.

Foliorum decoctum vtilissimum habetur ad
confirmandos dentes. Colum. ad profluvia alui
apum præscribit vas passas cum Rore Syrico
[leg. Rhoë syr.] pari mensura pinfitas & aulero
vino insuccatas. Nonnulli Rotem maxium
(Rhoën marinum legit Corn.) aqua multa deco-
ctum, cum gelauerit imbricibus infusum præbent
libandum. Turci, inquit Bellon. habent officina-
sas, in quibus æterum capita & pedes cocti pro-
stant, quos calidos aceto & sale asperfos Embam-
mare ex semine sumach, alliorum succo cum pin-
guedine optimè conditos ementibus offerre ex
tempore norunt. In Heraclea etiam, ubi in vicini-
is montibus abundat, magnos saccos venales
videas huius fructu plenos, quibus confusis cum
sale & alijs suis cibis non iusuagiem gratiam
conciliare norunt, asperso hoc condimento tam
assis quam elixis cibis.

Notat Syluius Rhod. succum esse vicē Omphacii in Gallia Narbonensi.


Rhois victæ obsoniis immisceri docet Diosc.
immatura Mora sicca & tusa.

Ad vsus medicos verò varia eius habes succedanea apud Gal. l. 6. comp. med. 27. *Verus*: quem consule.

LANTANA VULGO, ALIIS VIBURNUM.

CAP. XXIX.

Hic frutex arborescens est grandis quan-
doque, licet in amplitudinem magis diffun-



Folia.

Flores.

Bacca.

Alnus.

Ruellii mult.
exemplis error.Alnus Ruell.
error.
M. arch. 1800.

Lonic. 1800.

adur quam in
altum assurgat,
lignoque con-
stat fungoso &
medulloso. E
radice summo
cuspide uagan-
te ramos digi-
tali crassitudi-
ne emittit bi-
cubitales, e-
tiamque lon-
giores, cortice
ruffo, farina-
ceo, puluisculo
consperso, ma-
terie pauca ac
viridi, medul-
la amplissima
& albi. Folia
ad Alnum vel
porius Sorbum

alpinam accedentia, opposita, lata, sublonga,
crassiuscula, in ambitu crenata, hirsuta, & puluisculo albo, maxime internâ parte, quæ ob id etiam magis candicat, conspersa, gustu astringente. Flores in umbella odore florum Sambuci, candidi, caduci, quinque foliis extrorsum modicè reflexis constantes, singuli, in quorum medio stamina quina surguntur longa, albicantia, apicibus luteis. Quos excipiunt superuenientes bacca, primùm virides, dein rubra, per maturitatem nigra, compressa, dulces & viscosæ, sapore tamen nostro palato minus gratæ, semen vnum continentes, latum, compressum, & striatum, offeo cortice intectum.

De hac Ruell. lib. 1. cap. 35. Halymus in sepibus apud nos [Gallos] frequens frutex, quem *Blanche purain* rura vocant. Et l. 1. c. 125. *Rhus* Diosc. Theoph. Plinio: *Ros Syriacus* Colum. Actuarius *Sumachum*: Offic. *Sumach*. Rura nostra *Vernam* appellant, flexu ferè inuictam, & ob id fascibus ligandis vruntur. Sed folia & frutex incano ferè colore nitent, ruborem tantùm procidentia præ se ferunt: Ita bene onustus Veterum ineptè corralis nomenclaturis abijt Ruellius, & ignaros decipit. Ecce non descripsit suam *Blanche purain* quam præter rationem putat Halymum. Reliqua *Rhois* synonyma tam conueniunt huic plantæ, quam verum est, ipsum vtramque cognitam habuisse. Enimvero sanè, si Sumach Offic. consulisset cum baccis Lantanæ, discrimen facillè animaduertisset, nec inordinatam illam appellationum congeriem discendi cupidis studiosis obtrusisset. Idem lib. 1. cap. 152. de Vite silu. eam *Viorne* & *Hardeau* à Gallica voce *Hard*, quæ vinculum & funem significat, nominari tradit. Vt necesse sit aut Ruell. hæc obliuio se confudisse, aut duas illas plantas, Halymum inquam, vel *Rhoem* suum, & *Vitem* silu. æquè vocari à Gallis *Viorne*: quo nomine appellari iure possent alia quædam lentæ, flexiles, victæ, vt annotat Histor. Lugd. Patum quoque decebat tantum stirpem Commentatorem Martii dicere: Halimus, si Ruellio credimus: vel illi subscribere etiam non intellecto quid per Halimum & *Rhoem* intelligat.

Lonic. quoque duobus locis eandem tradit plantam, nempe l. 4. c. 81. vbi & *Rhoem* & *Viburnum* Virg. ex Ruell. sententia dicit: & lib. 4. c. 71. Vbi Klein *Wetelbaum* vocat, additque quoddam velle esse *Hambichen* / [Fagum sepium]

aut *Erhine* / [Alnum.] Sed quid quæso commune habet hæc nostra cum *Lagb* sepium aut *Alno*?

Annotat Clus. nonnullis *erhine* Theoph. putari. An verò *Spiræa Viburnum* sit Virg. an potius vitis silu. parum refert, inquit Hist. Lugd. clem utraque planta, si cum Cupressso compareretur [vt facit Virg.] humilis sit, & altitudine longè inferior. Flexilis tamen lentor [addit eadem] Viti silu. magis conuenit, quam *Spiræe*. Præterea obseruandum monet, quod Ruell. non animaduertit, *Rhoem* & *Vitem* silu. coriarias esse plantas, sed à *Vite* silu. coria deplari, à *Rhoem* perfici. Dixerat autem eadè l. 1. c. 62. Ruell. cū de *Rhoem* scriberet, vt *Rhoem* quæ non nouerat, in Lucetia suburbanis repetiret, fruticem depinxit, quem antea l. 1. c. 35. solo nomine Halimi indicauerat, & à Gallis *Blanche purain* vocari dixerat. Verùm dum Hist. Lugd. notat Ruellium *Rhoem* non nouisse, simili reprehensione digna videtur dum *Blanche purain* non describit: descriptio namque Ruellii vt diximus, est ipsius *Rhois*, non *Spiræe*, exceptis postremis verbis Ruellii de viti silu. de qua eodem cap. scribit Hist. Lugdun. Fruticem hunc *Spiræam* esse Theoph. primū animaduertit Dalech. cuius sententiam approbat Rob. Constant. in Lex. annotans *Spiræam* fruticem esse lentum & vitilem, ita vt in *Spiram* torqueri possit; vnde & nomen *Spiræe* de qua Theophrast. & Plin. eam plantam Ruellium pro Halimo deceptum esse patet.

Videamus ergo quid Theoph. & Plin. de *Spiræa* tradant. lue lib. 1. cap. 1. hist. Arborum alia in cacuminibus fructum gerunt, alia à lateribus, alia utrinque. Verùm plura ex ceteris generibus fructum cacumine ferunt, quam in arborum genere: ut frugum, quæ spicam pariant: fruticem Erica, *Spiræa*, & *Vitex*. *Spiræa* habet vetus codex: Babil. *erhine*: Vnde Gaza *Piræa*. Sed magis placet Dal. & Const. *Spiræa* legi: sanè verò & nobis. Pro vitice Gaza Amerinam substituit: In Græco enim est *ἄμεινον*. Alius locus est lib. 6. cap. 1. Eorum quæ non aculeata sunt, diuisio nulla generalis dari potest: quod foliorum in iis diuersitas, amplitudine, paruitate & figura, immensa propemodam sit atque incerta. Quapropter alia ratione diuisio eorum tentanda. Sunt verò eorum genera complura magnas differentias sortita, vt *Hedera*, *Melothrum*, *Ereutodanum*, [alii ipse] *Spiræa*, [corrupte habetur in Græco] *Spiræa* pro *Spiræa* nec alii rectè emendauerunt, *Spiræa*, Const.] *Cneorum* (Gaza, Casia ex Plin.) *Origanum*: pro quo Plin. videtur legitur *Lecharv*. Sic enim is lib. 21. cap. 9. Ergo in coronamenta folio venere *Melothrum*, *Spiræon*, (quasi *ορίαν* legisset: Const. *Spiræon* legi vult.) *Trigonon* (an *Origanum*?) *Cneoron* quod *Casia* Hyginus vocat. Hæc veteres de *Spiræa*.

Verùm ex his tam paucis difficile est asserere nostram Lantanam esse *Spiræam*. Habemus tamen quod dicamus, hanc in cacumine fructum gerere, fruticem esse, & non aculeatum: Imò & lentum & vitilem, vt in *Spiras* torqueri possit, vnde & nomen accepisse videtur *Spiræe* de qua Theophrast. Sed ad hanc opinionem obest potius quam prodest Plin. Nam quis credat Lantanæ folia vnquam in coronamenta venisse? Nisi fortè intelligamus folia (quæ tamen per se satis quoque speciosa) cum floribus seu baccis pulchrè sanè & venustè coccineis: tandem & ni-

Hist. Lugd.

Spiram.
Theoph.

Theoph. cor.

Gaza.

Theoph. 10
red.Antiquo
Gedertum

& nigris. Clus. pro Spirea aliam proponit, de qua paullo post.

Locus.

Inculto maxime solo inter reliquas vepres & sentes in dumetis nascitur. humo gaudens argillosa & fortis. Interdum & inter sepes nasci videas. Quanquam vero non ubique locorum in Germania hic frutex gignatur, tamen in Alsacia & apud Mediomatenses, nec non in monte tonitru magna in copia repetitur, Trago teste. Basilea in monte Montez stirpium varietate celebrato, item rundo contra Rhenum versus pagum Brentza, & opposita eiusdem Rheni ripa passim, alibi que. Frequens quoque circa Norimbergam, Tiguri & passim in Helvetia, Burgundia, circa Montbelg. In Italia inter Veronam & Castelfranc Martio mense penè floridam observauimus.

Tempus.

Lugduni Aprili: Genevæ Maio: In Helvetia & Alsacia Iunio: In ò circa Basileam Octobri adhuc florentem vidimus, & propè Lurach in monte cum fructu maturo mense Augusto. Magna tamen ex parte acini tubescunt Iulio: Augulti fine demum & Sept. nigrescunt.

Virtus & usus.

Purgans. Dentes Sac. collantes.

Viburni fructus, inquit Matth. ubi ad ultimam provenit maturitatem, alium exolvit. Folia adstringentis sunt facultatis, ideoque præstant ad vacillantes dentes confirmandos, & gingivarum rheumatismos, si decoquantur in vino austero: atqui longè magis valebit, si cum Oliæ foliis decoquantur in aqua & aceto, & ex hoc decocto sepe foveantur dentes. Gargarizatur idem ad columellæ prædientiam & ad faucium fluxiones. Vuarum acini arefacti antequam maturecant, & in pulverem triti ac poti, alui fluxiones sistunt. Paratur & radicum corticibus sub terta maceratis, & subinde decoctis, & diu rufis, viscum ad aucupia haud inutile. Folia in lixivio decocta, capillum denigrant, & eosdem fluentes sistunt. Sed peritis considerandum relinquimus quæ Matth. tradit fructum alium solvere, & acinos eandem sistere. Res est experimenti, quod vix credimus hac in parte Matthiolo compertum. Veremur ne multa tribuerit Viburno quæ sunt Rhois, cum easdem aliquando putarit, vti dictum. Eas tamen, quas diximus, vires, Viburno neutiquam denegamus: maxime cum ipse etià Dodon. proprio nomine similes eidem attribuat vires, qui scribit Lantanz & folia & baccas refrigerantis, reliccantis, & astringentis esse facultatis. Quomodo igitur baccæ alium movebunt vti prodidit Matthioli? Ex succulis paratur optima aqua ad oculos. Camer. Rustici nostri, & alibi ferè passim ubi provenit, virgis commodè vruntur in ligandis sepiibus & lignorum fasciculis. Multi etiam vescuntur baccis, quas, ut citius maturecant, supra paleas aut fœnum reponere alterno stratu solent.

Isperam: M. d. m. n.

SPIRÆA THEOPH. FORTE, CLVSIO.

CAP. XXX.

Nominis similitudo, vel potius identitas, vti sic loquamur, hanc non bacciferam, sub hanc classem coëgit: quippe quam, Clus. Spiræam, [quam nos cum nonnullis doctis præcedentem potius credimus] Theoph. suspicatur, cuius hanc tradit historiam.

Long. Silenz mibi Viennæ misit elegantem hanc fruticem D. Sebiziis, ipso Vere Anno



186. qui in meo hortulo repositus, egregie provenit (vimbroso enim loco collocari ut facilius comprehenderet) & sequente anno flores semina protulit. Duorum autem cubitorum altitudine assurgit, tenuibus ramis seu virgis puniceo cortice obductis, per quos sine villo ordine sparsa sunt frequen-

Descriptio.

tia, longiusculâ & angusta folia, salignis proxima, per ambitum serrata, superne diluore viriditate prædita, inferne veluti ærugine aspersa, exsiccantis cum quadam amaritudine coniuncti gustus. Extremi ramuli, digitalis ferè longitudinis, satis crassam spicam ferunt exiguorum florum, vix in modum congestorum, quibus foliis constantium, è quorum umbilico multa staminu prodeunt, coloris cum suo flore ex albo rubescentis siue carnei, nullo peculiari odore præditorum, nisi qualis ferè in florenti Olea est. Illis enascentibus succedunt pusilla pentagona capitula, quæ ad plenam maturitatem peruenientia tenuissimâ & pulvereum quodammodo semine flauescens effundunt. Mense Iulio florēt. Sub Aug. finem semen maturescit. Qui mittebat Sebiziis, percontabatur an ad Syringam referri posset: propter pentagona capitula forsitan quæ Syringæ albo flore capitulis haud abimilia, minora tamen, pollicem potius, quam semen effundentia. Sed ego, inquit Clus. ad Syringam, cuius Theophrast. lib. 1. cap. 23. hist. inter frutices qui spicam pariunt meminit, commodè referri posse iudico: [verba Theophrast. præced. cap. citauimus] & fortasse commodius quàm Viburnum Matth. quod nonnulli omni quæ esse volunt. Hæc ille.

Folia

Spica florū

Semen.

Tempus.

Syringæ.

Anteriori

inducunt.

Ligustrum.

RHUS PLIN. PVTATA

CAP. XXXI.

Rhus Plinii quibusdam dictus frutex, & etiamnum hodie Montpellii. pro eodem

Descriptio.

Flos.

Flores

Fructus.

S. semina.



bitus, ramulis quadrangulis bicubitalibus est donatus, per quos, ordine & serie quadam, folia oriuntur bina ut in Nymularia, & Iuiubis, Iuiubarum quoque foliis similia, sed acutiora & maiora multo. Flores parui, virides siue chlori, racematim quasi congesti, cum apicibus multis, partim nigricantibus.

Fructus Pisorum magnitudine: pentagoni, culus seminula, ut notat Lob. intra angulosam tunicam inclusa sunt, cochleara.

Hist. Lugd. sic describit. Frutex ad hominis altitudinem adolefcit. Caule est crassitudinis pollicaris, fragili, cauo, Sambuci modo, cortice cinereo, maculoso, membrana rufescente subiecta, paribus interuallis in nodos quosdam intumescens, a quibus surculi siue ramuli prodeunt, lenti, & flexiles, in quibus folia sunt aequalibus spatiis bina, aduersum disposita, Myrto lili. & latifoliae omnino similia, aliquantulum ampliora, venosa, altera parte rubescentia. Flores purpurei in summis virgis hinc illinc nascuntur: fructus nigri & tenui pediculo pendent, aliquantulum compressi, veluti stris quibusdam canaliculati: fibris quaternis discreti, sapore acerbo: semen intus album, rugosum, vinaceis simile. Ergo florum & fructus congerie, eiusdem sapore, foliorum effigie cum Rhois natura & Pliniana descriptione satis conuenit, nisi fruticis proceritate caulis crassitudine & ramulorum longitudine discrepare viderat.

Hanc tamen Rhun siue Rhoen Plinii Myrsiniam volunt & dicunt Pen. Lob. Tab. Camer. & alii plerique. Gesnerus, ut annotat Camer. potius Clymenum esse vult, cum disertè Rhun in herbam & fruticem distinguat Plinius: planta verò hæc quam nunc dicimus, frutex sit, non herba. Myrri quidem folia etiam Coriario tribuit Marcell. verum de Rhu herba nihil apud alios. Clymeno verò continentur 1. *Myrsin* 2. *Myrsin* 3. *Myrsin* 4. *Myrsin* 5. *Myrsin* 6. *Myrsin* 7. *Myrsin* 8. *Myrsin* 9. *Myrsin* 10. *Myrsin* 11. *Myrsin* 12. *Myrsin* 13. *Myrsin* 14. *Myrsin* 15. *Myrsin* 16. *Myrsin* 17. *Myrsin* 18. *Myrsin* 19. *Myrsin* 20. *Myrsin* 21. *Myrsin* 22. *Myrsin* 23. *Myrsin* 24. *Myrsin* 25. *Myrsin* 26. *Myrsin* 27. *Myrsin* 28. *Myrsin* 29. *Myrsin* 30. *Myrsin* 31. *Myrsin* 32. *Myrsin* 33. *Myrsin* 34. *Myrsin* 35. *Myrsin* 36. *Myrsin* 37. *Myrsin* 38. *Myrsin* 39. *Myrsin* 40. *Myrsin* 41. *Myrsin* 42. *Myrsin* 43. *Myrsin* 44. *Myrsin* 45. *Myrsin* 46. *Myrsin* 47. *Myrsin* 48. *Myrsin* 49. *Myrsin* 50. *Myrsin* 51. *Myrsin* 52. *Myrsin* 53. *Myrsin* 54. *Myrsin* 55. *Myrsin* 56. *Myrsin* 57. *Myrsin* 58. *Myrsin* 59. *Myrsin* 60. *Myrsin* 61. *Myrsin* 62. *Myrsin* 63. *Myrsin* 64. *Myrsin* 65. *Myrsin* 66. *Myrsin* 67. *Myrsin* 68. *Myrsin* 69. *Myrsin* 70. *Myrsin* 71. *Myrsin* 72. *Myrsin* 73. *Myrsin* 74. *Myrsin* 75. *Myrsin* 76. *Myrsin* 77. *Myrsin* 78. *Myrsin* 79. *Myrsin* 80. *Myrsin* 81. *Myrsin* 82. *Myrsin* 83. *Myrsin* 84. *Myrsin* 85. *Myrsin* 86. *Myrsin* 87. *Myrsin* 88. *Myrsin* 89. *Myrsin* 90. *Myrsin* 91. *Myrsin* 92. *Myrsin* 93. *Myrsin* 94. *Myrsin* 95. *Myrsin* 96. *Myrsin* 97. *Myrsin* 98. *Myrsin* 99. *Myrsin* 100. *Myrsin* 101. *Myrsin* 102. *Myrsin* 103. *Myrsin* 104. *Myrsin* 105. *Myrsin* 106. *Myrsin* 107. *Myrsin* 108. *Myrsin* 109. *Myrsin* 110. *Myrsin* 111. *Myrsin* 112. *Myrsin* 113. *Myrsin* 114. *Myrsin* 115. *Myrsin* 116. *Myrsin* 117. *Myrsin* 118. *Myrsin* 119. *Myrsin* 120. *Myrsin* 121. *Myrsin* 122. *Myrsin* 123. *Myrsin* 124. *Myrsin* 125. *Myrsin* 126. *Myrsin* 127. *Myrsin* 128. *Myrsin* 129. *Myrsin* 130. *Myrsin* 131. *Myrsin* 132. *Myrsin* 133. *Myrsin* 134. *Myrsin* 135. *Myrsin* 136. *Myrsin* 137. *Myrsin* 138. *Myrsin* 139. *Myrsin* 140. *Myrsin* 141. *Myrsin* 142. *Myrsin* 143. *Myrsin* 144. *Myrsin* 145. *Myrsin* 146. *Myrsin* 147. *Myrsin* 148. *Myrsin* 149. *Myrsin* 150. *Myrsin* 151. *Myrsin* 152. *Myrsin* 153. *Myrsin* 154. *Myrsin* 155. *Myrsin* 156. *Myrsin* 157. *Myrsin* 158. *Myrsin* 159. *Myrsin* 160. *Myrsin* 161. *Myrsin* 162. *Myrsin* 163. *Myrsin* 164. *Myrsin* 165. *Myrsin* 166. *Myrsin* 167. *Myrsin* 168. *Myrsin* 169. *Myrsin* 170. *Myrsin* 171. *Myrsin* 172. *Myrsin* 173. *Myrsin* 174. *Myrsin* 175. *Myrsin* 176. *Myrsin* 177. *Myrsin* 178. *Myrsin* 179. *Myrsin* 180. *Myrsin* 181. *Myrsin* 182. *Myrsin* 183. *Myrsin* 184. *Myrsin* 185. *Myrsin* 186. *Myrsin* 187. *Myrsin* 188. *Myrsin* 189. *Myrsin* 190. *Myrsin* 191. *Myrsin* 192. *Myrsin* 193. *Myrsin* 194. *Myrsin* 195. *Myrsin* 196. *Myrsin* 197. *Myrsin* 198. *Myrsin* 199. *Myrsin* 200. *Myrsin* 201. *Myrsin* 202. *Myrsin* 203. *Myrsin* 204. *Myrsin* 205. *Myrsin* 206. *Myrsin* 207. *Myrsin* 208. *Myrsin* 209. *Myrsin* 210. *Myrsin* 211. *Myrsin* 212. *Myrsin* 213. *Myrsin* 214. *Myrsin* 215. *Myrsin* 216. *Myrsin* 217. *Myrsin* 218. *Myrsin* 219. *Myrsin* 220. *Myrsin* 221. *Myrsin* 222. *Myrsin* 223. *Myrsin* 224. *Myrsin* 225. *Myrsin* 226. *Myrsin* 227. *Myrsin* 228. *Myrsin* 229. *Myrsin* 230. *Myrsin* 231. *Myrsin* 232. *Myrsin* 233. *Myrsin* 234. *Myrsin* 235. *Myrsin* 236. *Myrsin* 237. *Myrsin* 238. *Myrsin* 239. *Myrsin* 240. *Myrsin* 241. *Myrsin* 242. *Myrsin* 243. *Myrsin* 244. *Myrsin* 245. *Myrsin* 246. *Myrsin* 247. *Myrsin* 248. *Myrsin* 249. *Myrsin* 250. *Myrsin* 251. *Myrsin* 252. *Myrsin* 253. *Myrsin* 254. *Myrsin* 255. *Myrsin* 256. *Myrsin* 257. *Myrsin* 258. *Myrsin* 259. *Myrsin* 260. *Myrsin* 261. *Myrsin* 262. *Myrsin* 263. *Myrsin* 264. *Myrsin* 265. *Myrsin* 266. *Myrsin* 267. *Myrsin* 268. *Myrsin* 269. *Myrsin* 270. *Myrsin* 271. *Myrsin* 272. *Myrsin* 273. *Myrsin* 274. *Myrsin* 275. *Myrsin* 276. *Myrsin* 277. *Myrsin* 278. *Myrsin* 279. *Myrsin* 280. *Myrsin* 281. *Myrsin* 282. *Myrsin* 283. *Myrsin* 284. *Myrsin* 285. *Myrsin* 286. *Myrsin* 287. *Myrsin* 288. *Myrsin* 289. *Myrsin* 290. *Myrsin* 291. *Myrsin* 292. *Myrsin* 293. *Myrsin* 294. *Myrsin* 295. *Myrsin* 296. *Myrsin* 297. *Myrsin* 298. *Myrsin* 299. *Myrsin* 300. *Myrsin* 301. *Myrsin* 302. *Myrsin* 303. *Myrsin* 304. *Myrsin* 305. *Myrsin* 306. *Myrsin* 307. *Myrsin* 308. *Myrsin* 309. *Myrsin* 310. *Myrsin* 311. *Myrsin* 312. *Myrsin* 313. *Myrsin* 314. *Myrsin* 315. *Myrsin* 316. *Myrsin* 317. *Myrsin* 318. *Myrsin* 319. *Myrsin* 320. *Myrsin* 321. *Myrsin* 322. *Myrsin* 323. *Myrsin* 324. *Myrsin* 325. *Myrsin* 326. *Myrsin* 327. *Myrsin* 328. *Myrsin* 329. *Myrsin* 330. *Myrsin* 331. *Myrsin* 332. *Myrsin* 333. *Myrsin* 334. *Myrsin* 335. *Myrsin* 336. *Myrsin* 337. *Myrsin* 338. *Myrsin* 339. *Myrsin* 340. *Myrsin* 341. *Myrsin* 342. *Myrsin* 343. *Myrsin* 344. *Myrsin* 345. *Myrsin* 346. *Myrsin* 347. *Myrsin* 348. *Myrsin* 349. *Myrsin* 350. *Myrsin* 351. *Myrsin* 352. *Myrsin* 353. *Myrsin* 354. *Myrsin* 355. *Myrsin* 356. *Myrsin* 357. *Myrsin* 358. *Myrsin* 359. *Myrsin* 360. *Myrsin* 361. *Myrsin* 362. *Myrsin* 363. *Myrsin* 364. *Myrsin* 365. *Myrsin* 366. *Myrsin* 367. *Myrsin* 368. *Myrsin* 369. *Myrsin* 370. *Myrsin* 371. *Myrsin* 372. *Myrsin* 373. *Myrsin* 374. *Myrsin* 375. *Myrsin* 376. *Myrsin* 377. *Myrsin* 378. *Myrsin* 379. *Myrsin* 380. *Myrsin* 381. *Myrsin* 382. *Myrsin* 383. *Myrsin* 384. *Myrsin* 385. *Myrsin* 386. *Myrsin* 387. *Myrsin* 388. *Myrsin* 389. *Myrsin* 390. *Myrsin* 391. *Myrsin* 392. *Myrsin* 393. *Myrsin* 394. *Myrsin* 395. *Myrsin* 396. *Myrsin* 397. *Myrsin* 398. *Myrsin* 399. *Myrsin* 400. *Myrsin* 401. *Myrsin* 402. *Myrsin* 403. *Myrsin* 404. *Myrsin* 405. *Myrsin* 406. *Myrsin* 407. *Myrsin* 408. *Myrsin* 409. *Myrsin* 410. *Myrsin* 411. *Myrsin* 412. *Myrsin* 413. *Myrsin* 414. *Myrsin* 415. *Myrsin* 416. *Myrsin* 417. *Myrsin* 418. *Myrsin* 419. *Myrsin* 420. *Myrsin* 421. *Myrsin* 422. *Myrsin* 423. *Myrsin* 424. *Myrsin* 425. *Myrsin* 426. *Myrsin* 427. *Myrsin* 428. *Myrsin* 429. *Myrsin* 430. *Myrsin* 431. *Myrsin* 432. *Myrsin* 433. *Myrsin* 434. *Myrsin* 435. *Myrsin* 436. *Myrsin* 437. *Myrsin* 438. *Myrsin* 439. *Myrsin* 440. *Myrsin* 441. *Myrsin* 442. *Myrsin* 443. *Myrsin* 444. *Myrsin* 445. *Myrsin* 446. *Myrsin* 447. *Myrsin* 448. *Myrsin* 449. *Myrsin* 450. *Myrsin* 451. *Myrsin* 452. *Myrsin* 453. *Myrsin* 454. *Myrsin* 455. *Myrsin* 456. *Myrsin* 457. *Myrsin* 458. *Myrsin* 459. *Myrsin* 460. *Myrsin* 461. *Myrsin* 462. *Myrsin* 463. *Myrsin* 464. *Myrsin* 465. *Myrsin* 466. *Myrsin* 467. *Myrsin* 468. *Myrsin* 469. *Myrsin* 470. *Myrsin* 471. *Myrsin* 472. *Myrsin* 473. *Myrsin* 474. *Myrsin* 475. *Myrsin* 476. *Myrsin* 477. *Myrsin* 478. *Myrsin* 479. *Myrsin* 480. *Myrsin* 481. *Myrsin* 482. *Myrsin* 483. *Myrsin* 484. *Myrsin* 485. *Myrsin* 486. *Myrsin* 487. *Myrsin* 488. *Myrsin* 489. *Myrsin* 490. *Myrsin* 491. *Myrsin* 492. *Myrsin* 493. *Myrsin* 494. *Myrsin* 495. *Myrsin* 496. *Myrsin* 497. *Myrsin* 498. *Myrsin* 499. *Myrsin* 500. *Myrsin* 501. *Myrsin* 502. *Myrsin* 503. *Myrsin* 504. *Myrsin* 505. *Myrsin* 506. *Myrsin* 507. *Myrsin* 508. *Myrsin* 509. *Myrsin* 510. *Myrsin* 511. *Myrsin* 512. *Myrsin* 513. *Myrsin* 514. *Myrsin* 515. *Myrsin* 516. *Myrsin* 517. *Myrsin* 518. *Myrsin* 519. *Myrsin* 520. *Myrsin* 521. *Myrsin* 522. *Myrsin* 523. *Myrsin* 524. *Myrsin* 525. *Myrsin* 526. *Myrsin* 527. *Myrsin* 528. *Myrsin* 529. *Myrsin* 530. *Myrsin* 531. *Myrsin* 532. *Myrsin* 533. *Myrsin* 534. *Myrsin* 535. *Myrsin* 536. *Myrsin* 537. *Myrsin* 538. *Myrsin* 539. *Myrsin* 540. *Myrsin* 541. *Myrsin* 542. *Myrsin* 543. *Myrsin* 544. *Myrsin* 545. *Myrsin* 546. *Myrsin* 547. *Myrsin* 548. *Myrsin* 549. *Myrsin* 550. *Myrsin* 551. *Myrsin* 552. *Myrsin* 553. *Myrsin* 554. *Myrsin* 555. *Myrsin* 556. *Myrsin* 557. *Myrsin* 558. *Myrsin* 559. *Myrsin* 560. *Myrsin* 561. *Myrsin* 562. *Myrsin* 563. *Myrsin* 564. *Myrsin* 565. *Myrsin* 566. *Myrsin* 567. *Myrsin* 568. *Myrsin* 569. *Myrsin* 570. *Myrsin* 571. *Myrsin* 572. *Myrsin* 573. *Myrsin* 574. *Myrsin* 575. *Myrsin* 576. *Myrsin* 577. *Myrsin* 578. *Myrsin* 579. *Myrsin* 580. *Myrsin* 581. *Myrsin* 582. *Myrsin* 583. *Myrsin* 584. *Myrsin* 585. *Myrsin* 586. *Myrsin* 587. *Myrsin* 588. *Myrsin* 589. *Myrsin* 590. *Myrsin* 591. *Myrsin* 592. *Myrsin* 593. *Myrsin* 594. *Myrsin* 595. *Myrsin* 596. *Myrsin* 597. *Myrsin* 598. *Myrsin* 599. *Myrsin* 600. *Myrsin* 601. *Myrsin* 602. *Myrsin* 603. *Myrsin* 604. *Myrsin* 605. *Myrsin* 606. *Myrsin* 607. *Myrsin* 608. *Myrsin* 609. *Myrsin* 610. *Myrsin* 611. *Myrsin* 612. *Myrsin* 613. *Myrsin* 614. *Myrsin* 615. *Myrsin* 616. *Myrsin* 617. *Myrsin* 618. *Myrsin* 619. *Myrsin* 620. *Myrsin* 621. *Myrsin* 622. *Myrsin* 623. *Myrsin* 624. *Myrsin* 625. *Myrsin* 626. *Myrsin* 627. *Myrsin* 628. *Myrsin* 629. *Myrsin* 630. *Myrsin* 631. *Myrsin* 632. *Myrsin* 633. *Myrsin* 634. *Myrsin* 635. *Myrsin* 636. *Myrsin* 637. *Myrsin* 638. *Myrsin* 639. *Myrsin* 640. *Myrsin* 641. *Myrsin* 642. *Myrsin* 643. *Myrsin* 644. *Myrsin* 645. *Myrsin* 646. *Myrsin* 647. *Myrsin* 648. *Myrsin* 649. *Myrsin* 650. *Myrsin* 651. *Myrsin* 652. *Myrsin* 653. *Myrsin* 654. *Myrsin* 655. *Myrsin* 656. *Myrsin* 657. *Myrsin* 658. *Myrsin* 659. *Myrsin* 660. *Myrsin* 661. *Myrsin* 662. *Myrsin* 663. *Myrsin* 664. *Myrsin* 665. *Myrsin* 666. *Myrsin* 667. *Myrsin* 668. *Myrsin* 669. *Myrsin* 670. *Myrsin* 671. *Myrsin* 672. *Myrsin* 673. *Myrsin* 674. *Myrsin* 675. *Myrsin* 676. *Myrsin* 677. *Myrsin* 678. *Myrsin* 679. *Myrsin* 680. *Myrsin* 681. *Myrsin* 682. *Myrsin* 683. *Myrsin* 684. *Myrsin* 685. *Myrsin* 686. *Myrsin* 687. *Myrsin* 688. *Myrsin* 689. *Myrsin* 690. *Myrsin* 691. *Myrsin* 692. *Myrsin* 693. *Myrsin* 694. *Myrsin* 695. *Myrsin* 696. *Myrsin* 697. *Myrsin* 698. *Myrsin* 699. *Myrsin* 700. *Myrsin* 701. *Myrsin* 702. *Myrsin* 703. *Myrsin* 704. *Myrsin* 705. *Myrsin* 706. *Myrsin* 707. *Myrsin* 708. *Myrsin* 709. *Myrsin* 710. *Myrsin* 711. *Myrsin* 712. *Myrsin* 713. *Myrsin* 714. *Myrsin* 715. *Myrsin* 716. *Myrsin* 717. *Myrsin* 718. *Myrsin* 719. *Myrsin* 720. *Myrsin* 721. *Myrsin* 722. *Myrsin* 723. *Myrsin* 724. *Myrsin* 725. *Myrsin* 726. *Myrsin* 727. *Myrsin* 728. *Myrsin* 729. *Myrsin* 730. *Myrsin* 731. *Myrsin* 732. *Myrsin* 733. *Myrsin* 734. *Myrsin* 735. *Myrsin* 736. *Myrsin* 737. *Myrsin* 738. *Myrsin* 739. *Myrsin* 740. *Myrsin* 741. *Myrsin* 742. *Myrsin* 743. *Myrsin* 744. *Myrsin* 745. *Myrsin* 746. *Myrsin* 747. *Myrsin* 748. *Myrsin* 749. *Myrsin* 750. *Myrsin* 751. *Myrsin* 752. *Myrsin* 753. *Myrsin* 754. *Myrsin* 755. *Myrsin* 756. *Myrsin* 757. *Myrsin* 758. *Myrsin* 759. *Myrsin* 760. *Myrsin* 761. *Myrsin* 762. *Myrsin* 763. *Myrsin* 764. *Myrsin* 765. *Myrsin* 766. *Myrsin* 767. *Myrsin* 768. *Myrsin* 769. *Myrsin* 770. *Myrsin* 771. *Myrsin* 772. *Myrsin* 773. *Myrsin* 774. *Myrsin* 775. *Myrsin* 776. *Myrsin* 777. *Myrsin* 778. *Myrsin* 779. *Myrsin* 780. *Myrsin* 781. *Myrsin* 782. *Myrsin* 783. *Myrsin* 784. *Myrsin* 785. *Myrsin* 786. *Myrsin* 787. *Myrsin* 788. *Myrsin* 789. *Myrsin* 790. *Myrsin* 791. *Myrsin* 792. *Myrsin* 793. *Myrsin* 794. *Myrsin* 795. *Myrsin* 796. *Myrsin* 797. *Myrsin* 798. *Myrsin* 799. *Myrsin* 800. *Myrsin* 801. *Myrsin* 802. *Myrsin* 803. *Myrsin* 804. *Myrsin* 805. *Myrsin* 806. *Myrsin* 807. *Myrsin* 808. *Myrsin* 809. *Myrsin* 810. *Myrsin* 811. *Myrsin* 812. *Myrsin* 813. *Myrsin* 814. *Myrsin* 815. *Myrsin* 816. *Myrsin* 817. *Myrsin* 818. *Myrsin* 819. *Myrsin* 820. *Myrsin* 8

Paulbaum & Leisbaum à fœtido tam colore
tum sapore.

*Alnus ni-
gra.
Alnus bac-
cifera.
Frangula.
Aornus
Cresc.
Siler Plin.
Arbor fœti-
da. Calycos
Thomp.*

Alnus nigra plerisque, ut Dod. Pen. Lob. Hist. Lugd. Thallio & alijs plerisque. *Alnus baccifera* quibusdam. *Frangula*, Matth. & Camet. Dicta autem frangula quoddam eius bacculi, recentes præsertim, facile frangantur. *Aornus* Petro Crescen-
tio: *Siler Plinij* secundum nonnullos: *Arbor fœtida* Lonic. & Schuuenckf. Pen. & Lob. suspicatur esse *Calycos Theoph.* Quod verò Lob. dicit flores albos, nobis non observatum. *Tragus* ait ex pal-
lido albicantes, Dod. inalbescentes.

Anagyris.

Anagyris, inquit Cornar mea sententia est ar-
bor parva, quæ nostris *Scheybeerbaum* id est, *granatum cationis arbor*. Si intelligit Alnum ni-
gram, ut suspicamur, & quæ Germanica dicitur, ex-
cusari sanè non potest. Considerandum tamen an
non intellexerit Cornum feminam, aut cum ea
confuderit. Vide cap. de Corno femina. In hanc
suspicionem nos traxit quoddam eodem fere nomine
Cornum feminam vocat, quo *Tragus* hanc plan-
tam de qua nunc agimus.

*Ligustrum
aquat.
Cistaceo.
Pulsif. spi-
nos.
Lari species.
Rob. Conf.
arbor.
Matth. nigr.
Hist. Lugd.
Lupul.*

Ligustrum aquat. Geln. Vocatur & Germ.
Berenholz/Belg. Sporkenhaut, & à pueris *Pist-
hout* dicitur, quia pueri inde suas sagittas confi-
ciunt, testibus Dod. & Hadr. ltm. Gal. *Antineutr*:
Hericurix oppido *Dacis Wirtzob.* ad comit.
Montbelg. fito, vocant du *Pinerne* aut *pisselang*,
quia vulgo sibi persuadent animalia eo ligno ver-
berata sanguinem mingere. Rob. Const. inter Lo-
tos referebat: quæ opinio non placet. Bohem.
Brusena. Baccæ non sunt gemellæ, ut pingit
Matth. ex planta sicca.

Histor. Lugd. more suo duobus distinctis locis,
diuersis iconibus & nominibus de hac tradit. i.
sub Alno nigra. i. sub Frangula Matth. Figura quæ
sub Alno nigra posita melior est. Eandem Hist.
Lugd. carpit C. Bauh. in suis animaduers. ex pro-
fesso in eam editis, quoddam in sua descriptione non
meminerit in baccis quandam fissuram apparere,
quasi ex duabus coaluissent: item sequenti libro
nempe secundo, huius figuram aliam Frangulæ
nomine exhibere, assumpta Figura Matth. nulla
interim facta plantæ mentione, in posteriori figu-
ra in baccis fissuram eleganter ostendi. Scrupulo-
sa profecto animaduersio, quæ si locum habeat
eodem errore culpandi *Trag. Dod. Pen. Lob.* alii
que qui elegantis istius fissuræ non meminere.
Nobis sanè non placet in icone Matth. ut iam di-
ximus, tætopere apparere quasi gemellæ esset bac-
cæ. Nam quod Matth. scribit fructum per mediam
diuisum, adeo ut duabus simul baccis constare vi-
deatur, quodam artificio simul coniunctis, exi-
stimamus ab eo non observatum nisi in sicca
planta: tales enim apparent in sicca. At ipsemet
C. Bauh. in expolito & recocto suo Matth. ponit
iconem ex Taber. in qua nulla apparet fissura.

Fallitur quoque Matth. qui flores albos dicit.
Nobis, ut iam plus satis inculcatum, in luteolum
palléscentes observari.

*Varieta.
1.
Alnus nigra
pumila.*

Videntur Thallius duas species, aut varietates
observasse in sua Hæcynia. i. Alnū hanc nigram,
quam *Sporker* ait vocari. i. Alnum nigram
pumilam, in Brockenbergi vertice: nisi id loci
naturæ tribuendum videatur. In saxolis namque
provenientes plantæ, ut plurimum pumilæ esse
solent. Considerent diligentius qui ea loca adi-
bunt.

Locum.

Nascitur magna ex parte in siluosis, montosis,
vdīs, ut circa Basileam in monte Murenli & A-
quacida vulgò *Wasserfall* dicta, in monte pro-
pe *Brenzach*, & in *Leuzach* quoque. Prope

Montbelg. in itinere versus pontem *Tavianorum*
in silvis: item inter *Arbonum* & *Adincontium*
pagos, inter *Septem* & *fructa Meridiem* spectan-
tia. Habetur & in horto E. C. Montb. nostra cu-
ra plantata. Genevæ in monte *salena* observau-
mus florentem Maio: in monte *Mutero*, fructu
maturo Octobri. Geln. ait Septembri quoque
fructum habere. Nascitur etiam passim in Bohe-
miæ silvis & nemoribus. Matth. Scribit Lob. ob-
uiam paucioribus locis, nisi ad Septentriones, ut
Angliæ, Germaniæ, & Northmanniæ iduosis &
vdīs.

Tempus

Flavus huius arboris & medius cortex tritus
cum aceto, & scabiei illitus, intra paucos dies
illam sanat & exsiccat. Estque hoc experimentum
singulare. Idem cortex in aceto decoctus putridis
dentibus collutione prodest: nam & dolorem mi-
tigat, & dentes ipsos purgat. Cortici vis inest
non modica cum exolvens, tum etiam astringens.
Ideoque *Rhabbari* modo alium deiecit, & vis-
cera roborat. Idem bilem & pituitam expurgat:
quinetiam hydropicorum aquas ducit. Decoqui-
tur cortex cum *Eupatorio* communi, *Pontico* Ab-
sinthio, *Agrimonia*, *Cuscuta*, *Lupulo*, *Cinnamo-
mo*, *Feniculi*, *Apij* & veriusque *Intybi* radici-
bus, ad hydropem, malum corporis habitum, &
Ictericam: daturque potandus ita affectis quin-
que vntiarum pondere, magno sanè auxilio. At-
qui operæ pretium est, ut prius extremitatū hu-
mores, qui in ventriculo, & primis locinoris ve-
nis decumbant, expurgentur. Soluit enim alium
sine vilo incommodo, bellè sicut expurgans, &
roborans, adeo ut quidam, qui scyrroso fœcoris
& Lienis affectu laborabant, hoc medicamento
curati sint. Aperit enim omnium viscerum ob-
structiones, & vasa omnia à crassorum excremen-
torum infarctu expedit. Extimo cortici facultas
est astringens: intimo autem exsolvens. Vterque
simul ab arbore delibari debet, in ipso statim Ve-
ris principio, ad deinde in umbra læcari. Siqui-
dem viridis nullus debet esse vltus, quod vomitio-
nes moueat. Bohemis vltus, eius vulgaris est. De-
coctum quod hinc paratur, quiescat prius oportet
antequam propinetur, duobus aut tribus diebus,
quousque flavus color in nigrum vertatur, alias
vomitioes mouere quandoque solet. Idem po-
tum, ubi alium non exsoluitur, appetentiam pro-
vocat, ob eam quam possidet astringendi facul-
tatem. Ad febrem quotidianam. Cortex interior
Frangulæ, Absinth. Cichor. Lupul. rad. Fœnic.
Apij. Asparagi, omnia simul coquantur, addito-
que Cinnamomo, Saccharo, Oxyphylite, fiat potio.

*Vires &
vltus
ad Scabiem
cap. et im-
m-
tam*

*Téperam.
Purgans.
Hyargi.*

*Itterus
Vindera-
m.*

Obscuratio.

*Obscuratio
Sistum
et Sistum*

*Corticis
Fœniculi.*

*Modus ad-
ministrandi
decoctum.*

*Ad appeti-
tum.*

*Ad febrem
quotidianam.*

*Ad Splenis
affectionem.*

*Vasa fœcoris
purganda.*

Ad *Tertianam*: Idem cortex coquitur cum *Endi-
uia*, *Borrag.* *Cichor.* *Oxalid.* rad. *Fœnic.* & bibitur
decoctum. Præ ceteris autem facit hic cortex ad
Splenis affectionem, coctus cum *Asplenio*, *Ruta* mi-
rar. corticib. *cappari* & *Fraxini*, rad. *Fœnic.* & *Pe-
trof.* Atque hæc quidem potio, ut maxime non
soluat alium, appetentiam tamen excitat: id quod
non facit, si purget. Notandum tamen ante huius
vltum, Venam, si opus sit, esse prius aperiendam,
& corpus purgandum, uti dictum. Præstat cortex,
Matth. iudicio radici quam trunco detractus.
Præcedentia de interiore cortice flavo intelligen-
da: exterior enim qui nullius efficacis cultello
separandus, retento flavo, exsiccat, & ad vltus
reposito.

Hic, ut scribit *Dodon.* licet temperamenti est
in vino maceratus aut cerevisia, deinde epotus,
potenter vomitum mouet, pituitam & humores
putridos contentos in ventriculo pellit. Interior
hic cortex apud rusticos nonnullos in vltu est,

Rafinatum
medicina.

Nota.

Def.

Contra scabiem.

Cautio.

Apibus gra-
vis ferat.

qui eius vruntur diluto, quando corpus expurgare cupiunt. Expurgat enim, ut dictum, tum crassos & pituitosos humores, tum & biliosos: & non modo per inferiorem sedem, sed frequenter etiam vomitione, cum magna ventriculi perturbatione ac molestia. Rusticorum ideo magis est medicamentum, quam urbanorum: ac eorum qui crassa victus ratione vruntur, quam delicate viventium. Plerique tamen cum Matth. & Camer. asserunt, corticem aridum mitiorem esse, & minores molestias excitare: recenti siquidem ac nondum resiccato humiditatem quandam superfluum adesse, quæ torsiones adferat ac vomitiones exciter, ventriculumque perturbet. Taber. ad duplum Rhabarbari dandum suadet. Sed malimus paullo inferius subsistere, si tam forte sit medicamen, ut ille ait.

In multis locis Saxonie hoc tempore vruntur loco Rhabarbari, teste Camer. quod interdum propter imensum pretium non cuius præscribi potest: possunt corrigi & castigari adiectione anisi, cinnamomi, spicæ, aut similia. Vulgus Silesiorum corticem luteum flore lactis incoquit, contra scabiem præsentissimum remedium.

Novi tamen, inquit Schuuenckf. eius usu Agricolas hydropicos factos & penè suffocatos fuisse, repentina malignæ materiæ percussione. Ea propter ab eius usu abstinendum suadeo, nisi prius fuerit probè euacuatum corpus. Flores apibus grati. Folia lætum feruntur bubus, ac præcipue vaccis pabulum, quæ horum pastu lac reddunt copiosius. Ex ligno sagittas parant.

ALNUS NIGRA BACCIFERA, RUGOSIORE FOLIO, SEU MAIOR.

CAP. XXXIII.

Descriptio
Cortice.

Folia.

Rafinatum.

Per omnia maior est hæc species, caudex, rami, reliqua: cortex exterior tenuis foris cinereus, intus virescens, cui alius subest crassus, in plures diuiduus, intus facie quæ lignum attingit, flavus, laminae verò in quas deduci potest, vel crocaturæ vel versicolores, ruffo, flavo, filamentisque albidis, sapore amaro. Folia, quam in vulgari Alno nigriora, multo ampliora, palmo longiora, duas vietas & semissem lata, subrotunda, rugosa, atrouirentia, splendida, crenata. Flosculubini simul aut singulares ex petiolo non longo adhxrent, colore herbaceo, in quatuor lacinias mucronatas diuisi, totidem apicibus virescentibus interiectis, stylo intra cornicula extorsum reflexa dissecto.

An Lonic. Creutzbeer seu Rh. mni Diosc. species? Eius Icon huic nostræ quadraret, si hæc

numerosiores non essent simul iunctæ. Rhamnus esse non potest nostra Alnus quia non spinosioris etiam suam spinosam negat, & tamen cum Rhamno in idem cogit caput, nescit forte quid scribit, nec cuius plantæ iconem exhibere non enim describit.

Prope S. Hippolytum, Burgundorum asperis locis, montosis, soli meridiano expolis, prouenit. Obseruauimus etiam inter R. mni & Loffe eiusdem Burgundie montosis locis ad Dubim, & iuxta castellum Maibe: item inter Cerenel oppidum E. C. Wirt. Burgundicum, & Baulme itidem montosis & lapideis. Nec non prope C. mni illam admirabilem Passauantiam in Eiusdem C. Wirtemb. ditione sitam, [in qua æstiuissimis æstatis temporibus glacies concrefcit] quæ eadem Principi curram plenum reditu annuo debet Montbelgardum deferenda, ad vinorum refrigeria æstiuis canicula diebus: hyeme verò liquefcit glacies, & cauerna calet, cum extrinsecus omnia rigent glacie ac niuibus.

Atque S. Hippolitani ligna colligi ad puluere bombardicum parandum, eorumque carbones ad eam rem vehementer commendari prædicat.

DAPHNOIDES ET LAVREOLA.

CAP. XXXIV.

Anrequam Laureolam vulgiorem folio perpetuo proponamus, quæ accedit ad Daphnoidem Veterum, si non eadem: placet prius generalia & Veterum placita de ea præmittere.

De ea igitur sic scribit Diosc. Daphnoides aliqui Eupetalon, alij Chamadaphnen, alij e. t. n. vocant. Exiguus frutex est, [Diosc.] cubitalis, ramis multis à medio sursum versus fori modo flexilibus & obsequiosis, iisque foliosis. Ramulos vestiens cortex supra modum viscosus est: at folia sunt Lauri, verum molliora, fractuque contumacia, quorum gustatu os faucesque mordentur & accenduntur. Flores candidi: fructus cum ematuruit, niger: radix superuacua. Nascitur in montosis. Sed in Diosc. lectionis varietas occurrit. Basil. & vulg. codices folia huic Lauro ixveta: Vet. cod. autore Lacuna ixveta habet, quod magis placet. Nam & Plin. quoque Daphnoidem crassiore, mollioreque quam Laurum folio esse prodidit, ut mox patebit. Quin & Serap. ixveta potius, quam ixveta legisse dicas, si aduersas eius interpretem tenaciora conuertisse. Marcell. validiora vertit, mimimum veterem lectionem secutus, quæ naturæ foliorum Laureolæ vulgò dictæ magis conuenire videtur.

Plin. l. 16. c. 30 de Lauri generibus tradens: Id quoque, inquit, quod Daphnoides vocatur genus, in nominum ambitu est. Alij enim Pelasgum, alij Eupetalon, alij Stephanon Alexandri vocant. Et hic frutex est ramosus, crassiore, [graciliore, Dal.] ac molliore quam Laurinis folio, cuius gustatu accenditur os atque guttur: baccis è nigro rums. Idè & alibi præter hæc nomina & siluestrem Laurum dici ait. Quidam legunt: baccis nigris & ruffis: nigris vel ruffis: Vet. Dal. At si vulgatam lectionem retinere lubeat, dicere queas Plin. de baccis nondum perfectè maturis intelligendum esse: alioqui nec rei nec Dioscoridi consentiret.

De Laureola nihil Theophrastus, nisi forte hæc quæ habentur l. 9. c. 15. Nascitur apud Arcades Elleborus uterque, albus & niger: item de iure, de iure, ne sit: (Sic enim legimus & distinguimus apud Theoph.) id est. Daucus, Daphnoides crocea:

Locus.

Camerus
glacialis
media æst.Vires &
vires.Daphnoides
Eupetalon.vires.
Diosc. l. 16. c. 30.Folia.
Flores.
Fructus.

Diosc. l. 16. c. 30.

Pelasgus.
Eupetalon.Silu. Laur.
rums.Theoph.
crocea.

Crocea: Gaza nō *Agrostis* non separat à *Lauris*, sed Dauci sine Pastinacæ speciem facit. Cæsalp. quoque ad Daucum sine Carotam refert, ut dicitur suo loco de Pastinaca: Marcell. & Curtius, ut in sequentibus patebit, intelligunt Daphnoidem, diuersam omnino plantam à Dauco.

Hist. Lugd. scribit: Albam seu feminam Laureolam nostram, Daphnoidem alteram esse ignoraremus, si Theoph. aperte non docuisset Daphnoidis esse genera duo, fructu præcipue distincta, qui niger in altera est, in altera Croci colore, nempe staminum, quæ à flore Croci auulsa reconduntur, non autem Croci liquore diuti, ut meritis hæc Daphnoides, crocea nominari possit. *Hæc illa*: Nobis autem nondum occurrit adhuc locus, ubi Theoph. meminerit Daphnoidis nigræ.

Sed quam aut qualem Daphnoidem intelligit Galenus: quando l. 6. simpl. sic ait: Chamædaphnes germina tenera edi quoque assolent. Est autem perlimilis Daphne Alexandrinæ sicut sanè & quod Daphnoides nuncupant. Certè non existimamus eius germina posse edi, si eandem cum Dioscoride intelligit. Dalech. sententia fuit Galeni similitudinem Daphnoidis cum Chamædaphne & Lauro Alexandrina ostendisse absque Diosc. testimonio, sic tamen ut ei fides constet, si vel *describit*, accipiamus non quidem vlcerrantem & vrentem fruticem Laureolam nostram, sed Cleinatiden Galeni secundam, quam paulò post *Agrostis* etiam vocari testatur. Ambabus enim vis est astringens & sicans. Vel si parem utriusque vim, Chamædaphnes, inquam, & Daphnoidis cathartice, in prouocandis tantum mensibus intelligas: mentes enim & hæc & illa ciet. Proprio capite ostendemus cleinatiden secundam specie dici à Diosc. Gal. & Plin. Daphnoidem.

Apuleius more suo nominum fasciculum confarcinat, sic scribens c. 58. Herba Victoriola, Euphepos Græcè, Daphnoides, Hypoglossion, Eupetalon, Diglossos, Nycephyllon, Pelleon, Idæa Daphne, Samothracia Daphne, Alexandrina Daphne, Mitrion, Danaë, Stephane Alexandru, Chamædaphne, Carpophyllon, Daphnitis, Latine Peruinca, Victorix folium, Laurus Alexandrina, Macedonica, Laurago, Mustellago terrestris vocatur. Et addit: frutex est sæpius cubitalis, folijs ut Myrtus, [in omnibus exēpl. sine intellectu legebatur, muria: nos reddimus Myrtus. Humelb.] paulò maioribus, & non infractis, id est, non facile fragilibus, sed lentis. Hum.] gustu remordentibus & incendijs. Herba Victoriolæ folia pinsabis, & succum eius cyathis duobus dabis cum melle bibere ieiuno, mox phlegmata intercider. (hoc est, dissiciet, dissipabit, deducet, purgabit. Hum.) Quod si prædictorum nominum rationes scire cupis, tradit eas idem Humelbergius in suis ad Apuleium notis.

Nobis sanè Apul. diuersas plantas confundere videtur: inter alias Daphnoidem, Laurum Alexandrinam & Peruinca, cum in nominibus, tum in descriptione. Potissimum tamen videtur nobis scribere voluisse de Daphnoide, quod apparet ex descriptione cum ait, folia incendijs: & ex viribus, si intercidit interpretandum ut Humelbergius vult. Fuch. tamen aliter sentit: Victoriolam Apulei existimat Laurum Alexandrinam, & hanc cum illa confundi ab Apuleio. Profectò Apul. posset creare temerarijs magnum periculum: Si intelligit Laurum Alexandrinam, de eius succo dari posse concedimus: verum non duos

cyathos, ut ille vult. De daphnoide verò nequaquam. Quis enim plenos præbeat cyathos eius succi, cuius foliorum aut corticis masticatum absque magno incendio lingua & fauces ferre nequeant? Verissimè in Apuleium retorqueri potest, quod scribit in præfat. sui libri aduersus medicos: nimirum eius scripta de medicaminibus herbarum, earumque viribus, esse vendicationes potius quàm curas: ipsumque inertiam plerumque & imperitiā enixum, lucripetam verum, aut sine literata scientia, de qua se iactat, temerarium nuncupandum, quique aded ipsius seuior morbis existat. Ipse enim tantā & tam supina quadam imperitiā & temeritate, confundit plantas & earum vires salubres cum insalubribus, cum immenso vrentium periculo, ut ex hoc loco & alijs quamplurimis hoc opere detegendis patebit, ut satius fuisset, si obscuri sui Almi metamorphosin suæ sortis hominibus explicasset, quàm in re tam sacra, hominumque visibus aded necessaria temerarium & iactabundum suum iudicium & stylum adhibere. Apagē verò pestilētes hos scopulos. Nos certiora meditamur tutioraque. Discant verò interim herbarum & medicinarum studiosi, nullibi huic herbarum alieno Commentatori temerè fidendum esse, donec illud clariùs & ad oculum cunctis patefaciamus.

Ipse verò etiam Humelbergius nobis non videtur meliùs intellexisse historiam Daphnoides, quàm Apuleius, dum asserit, Laureolam & Syland esse, & eandem quidem, qualem Apul. describit, eam non declarat quàm Laureolam intellexerit, folijs perpetuo an deciduo? Quæ propriè Laureola dicitur, ignota est Cordo: quæ folio deciduo, eadem est Thymelæa, Fuch. vero verò Daphnoides & Zeilant, quam suspicamur Humelburgium intelligere. Quæquid sit, neutra conuenit cum descriptione Apulei. Neutra enim folia habet Myrto vllatenus similia: per Myrtum autem apud Apuleium intelligimus siluestrem, id est, Ruscum: quæ similitudinem Rusco non tribuitur à Veteribus Daphnoidi, vel Laureolæ, sed Lauro Alexandrinæ: præterea Laureola folio deciduo, folia non sunt lentia, sed facile fragilia. Neutram Laureolam coronis adhibitam fuisse censemus, & Laurum Alexandrinam potius in eum usum vocatam, quam vllam lignæ istæ plantæ. Hypoglossum male dici de Daphnoide, clarum nobis videtur. Si quis consideret Apulei caput 27. de Chamædaphne, hanc cum à Daphnoide distinguere vix amittet. Carpophyllon non potest dici de Daphnoide, quod id nomen proprium sit Lauro Alexandrinæ & Rusco. Hæc fructum supra folium gerit: non illa. Peruinca quoque vocabulum minime Daphnoidi conuenit, ut apparet ex Plin. sed cleinatidi secundæ, quæ etiam Chamædaphne dicitur. Cur Apuleius Mustellaginem terrestrem vocauit suam Victoriolam, cum tamen aperte scripserit c. 27. Chamædaphnen dici Italiam Mustellaginem?

Sed quid multis stirpium ignorantissimo refutando inhareremus? Audiamus Serapionem. Laurus Daphnoides: lili & Gar species alia, quæ dicitur Daphnoides & c. ex Diosc. Ortus eius [alij & rectius. Virtus eius.] est sicut Chamædaphnes, & ex Galeno.

Hermol. de Daphnoide pauca habet hæc, Daphnoides & ipsa Laurus lili. Herbarij nostri Laureolam & hanc & Chamædaphnen Diosc. vocant. Folio huius crassiora Plinio quàm Laurus, graciliora Dioscoridi: cuius verba mihi nō videntur, quibus dicitur: Alypo similem hanc herbam

Confusa
Apulei.

Humelberg.
taxat.

Neque carpophyllon.

Gar.

Laurus lili.

Chamædaphne.

Daphne Alexand.

Daphnoides.

Cleimatiden Gal.

Herba Victoriola.

Diglossos.

et.

Non temere
fidendum
Apuleio.

Sylphides.

etic, floribus Nymphae. Inuenio & qui Alypoides hanc vocant. Herille. Verum non docet quā plantam per Laureolam intelligat.

Laureola
Ruell. in
Diosc.

Non Laurum, inquit Marcell. in Diosc. sed Lauri formam & speciem: neque eam toto corpore, Verum in folijs & fructu tantum habentē herbam Graeci *Daphnoides* dixerunt. Laureolam vocant. Explosumus quod à capitis principio apud Diosc. statim legebatur Alypo simile *Daphnoides*: & florem Nymphae habere: & quod sequitur: in medio florisse Cono simile quiddam, in quo semen: quoniam non responderent *Daphnoidis* historiae, & nullibi in antiquissimis Graecis & Latinis ea legerentur, & paulò pòst de flore eius, legitimo loco ageretur. Nasci multum *Daphnoides* hoc Theoph. in Arcadia testatus est, numeraturque ab eo inter ea quae præcipuam purgandi vim habent. Ceterum non videmus cur Marcellus *Daphnoidem* dicat herbam, cum existimet Laureolam, quae frutex bicubitalis & maior interdum, & ipse Diosc. dicat *Daphnoidem*. Addendum & illud: *Daphnoidem* à Theoph. nō solum numerari inter purgantia, sed etiam inter alia non purgantia. Ruell.

Marcell.
not.

Ruell. taliter

Ruell. *Daphnoidis* historiam non illustrat, sed cum Hermolao, cuius consuetudo sibi more verba transcribit, non citato eo, dicit Herbarios nostros appellare Laureolam, eiusque descriptionem subiungit, non ad ipsam plantam factam, sed ex Diosc. inuoluntate repetitam.

Stephanus
Alexandri.

Curtius notat Alexandri Stephanon à nonnullis vocari, quod à Alexander Magnus coronari solitus sit. Hic velimus Antiquitatum studiosos exerceri, nōs certe ipsi, abique autore, non credimus. Sic & de eadem *Daphnoide* ex Veterum placitis historiam pangit, ac si sua essent, non dignatus correctionis honore, quod plagiarium est. Sed quid ille curat, qui passim plagio ita attritus, ut iam dudum durissimum contraxerit calum. Nunc Laureolam nostram vulgatam describamus.

LAUREOLA SEMPERVIRENS, FLORE LYTCOLO.

Descriptio



Pala

Laureola Recentioribus dicta ad cubitos duos & altius grandescit, stipite lento, aliquando simplici aliàs in ramos aliquot diuiso, quem subcinereus tegit cortex, & fractu contumax, & flexuosus: folijs sèrè nudis, quae circa fastigium potissimum gerit, eaq; satis frequentia, Laureolarum & na-

la, nec per hiemis asperitates caduca, ex angustiore principio ceu ceruice sensim dilatata, tandem quae in nastronem definentia, crassa, glabra, nigricantia, splendentia, Laurinis fere similia, sed mi-

Fiori

nora, inter quae longiusculos, graciles, cautes multos stellaros proferunt flosculos luteos, [Diosc. viridiores subcandicantes: Lob. ex herbaceo albo vel luteolos] succedentibus baccis glomeratis proximè ad ramos cohaerentibus, lumperinis paribus, nonnihil oblongis, primis viridibus, per maturitatem nigris, nucleo intus duro, rariore semine paulò longiore, medulla interiore candida. Radix subest in aliquot partes diuisa, longa, crassa, lenta, quae difficulter euelli potest. Sapor toti fructu feruidus.

Bacca.

Nucleus.

Radix.

An Hermol. Herbariorum Laureola, cuius verba paulò antè citata.

Scribit Marcellus *Daphnoidem* Diosc. nostrae aetatis peritiores Herbarios priuatim Laureolam vocare, ac ostendere Laurinis folijs surgentem à terra surculosum fruticem confertis coaceruatque sub folijs seminibus, quae Laurinarum baccarum figurae sunt, nigris maturitate. Florem videre non licuisse. Quod si Marcell. intelligit Laureolam quam nos hic, haec repugnant. 1. Quod non sit herba, qualem ipse dixit *Daphnoidem* (ut antè dictum) praeferat tamen Diosc. 2. flores non candidi. 3. radix non inutilis, quibus notis designatur à Diosc. *Daphnoides*. An etiam huius nostrae folia molliora sint Laurinis, ut de sua *Daphnoide* Diosc. ait, dubitamus.

Marcell. 771
proh.

An Ruell. hanc pro *Daphnoide* & Laureola Herbariorum intellexerit, vix sciri potest, quia Laureolam imaginariè, nec sibi visum aut cognitam describit, ut dictum prius.

Candidè & apertè Cordus de rebus Recentiores Laureolam vocant, quae in nostris onic. non habetur, nec ego quae sit compertum habeo. Hic Germanus fuit sicut & Cornar. ipsi coruus, qui tamen duobus distinctis locis apud Diosc. magna securitate tradit. *Daphnoide* Officinis Laureolam vocari: Germ. *Zilant*. 1. cap. seq. Officinis & herbarijs *Chamaedaphne* etiam Laureolam vocari. Et postea inferius alio cap. ait, esse hodie apud suos, qui cum *Daphnoide* *Chamaedaphne* confundant, eundem *Zeilant* appellantes: qui sanè non ritè nobis videtur distinguere has plantas: & ut verum fateamur, nescimus quam Laureolam intelligat pro *Daphnoide*.

Officinis
ignota.

Monachi quoque Laureolam vulgò dictam *Daphnoidem* vocitant. Ac eos (inter quos Pandectarius) hallucinari scribunt, qui Laureolam volunt esse *Mezereonis* speciem.

Pandect.
error.

Quin & Anguil. *Daphnoidem* ait hodiè vocari Laureolam, *Oliuellam*, *Oriolam*, & notissimam esse in Italia.

Oliuella,
Oriola.

Chamaedaphne, inquit Marth. quam Laureolam marem plerique vocant, folijs ac fructu à *Daphnoide* non longè differt: verum haec tantum intercedit differentia, quod *Chamaedaphne* singulari rectoque caule constat, cui folia circumquaque prominent, aded ut in cacumine in orbem umbellae instar diradiantur, semine inde prodeunte *Daphnoides* modo. Haec Marth. cuius icon habere videtur aliquid commune cum Laureola folio semper virente, Sed quae hic tradit non distinguunt à *Daphnoide*. In Epit. nullam ponit descriptionem præter Diosc. & iconem, scribens Italici dici *Laureola minore*. In Com. cum magnis con. Lat. & Ital. aliam ponit iconem cum folijs acutioribus & tribus virgis additis floribus. In hist. Germ. omisit & iconem & descriptionem Diosc.

Laureola,
mar.
Chamaedaphne.Marth. ad-
modum
vires in hist.
Laureola.

Camer. in sua Marth. epitome posuit iconem iam dictam cum tribus virgis, addens, sibi repertam similem aliquando plantam in montibus

Chamaedaphne
Camer.

Daphnoides. Silesia altissimis versus Moraviam, sed folijs crassiss, duris, & caule satis denso, baccis nigris. Quapropter verisimile esse, potius ad Daphnoidem referendam: nec immerito de hac stirpe, & inquam incognita, nonnullos dubitare. Idem in hist. Germ. ait, provenire cum baccis nigris, folijs latis, in quidam montanis locis propè Lacum Lemannum & ad Rhenum: videri speciem Chamædaphnes Matthioli.

C. Bauh. apud Matth. Chamædaphne, inquit, Matthioli: Daphnoides seu Laureola Lugd. de qua stirpe nonnulli dubitant tanquam de incognita: alij tamen ad Daphnoidem referunt: suspicantur Matth. Laureolam Offic. exprimere voluisse. *Hac ille:* ubi incuria typographica pro Chamædaphne, posita icon Lythymachia siliquosa specioso flore.

Vt liberè dicamus, quod sentimus, videtur nobis Matth. non novisse discrimen inter Laureolam folio deciduo, & folio semper virente, atque aded nescivisse, quas plantas suis nudis iconibus proponeret. Si pro Chamædaphne intelligit Laureolam semper virentem, id sit cum summo periculo. Quis medicinae peritus volet exhibere ad ardores stomachi mulcendos, & sedanda tormina, menses & urinas ciendas, & in pessis (ad quæ omnia Chamædaphne commendatur) tam feruidam & malignam stirpem, qualis Laureola; Ea præterea non respondet descriptioni: fructus non est *ipodermis*, ruber: nec *capitis* *testis* quibus *ipodermis* habet.

Lacum iconem Matth. proponit nomine Chamædaphnes, dicens, vocari Laureolam marem, non demonstrans quæ sit, aut qualis. *Cæcus cæcum sequitur.*

Eadem censurâ dignus Lonic. qui Chamædaphnes iconem Matth. proponit, nihil addens de suo: sed cautè euitavit hos scopulos: melius tamen suæ existimationi consuluisse, si Diosc. & Matth. citasset, ex quibus sua assumpsit & transcripsit nullo plagij metu. Videri nempe voluit probè novisse sibi ignotam stirpem.

Dod. eandem facit cum Diosc. sic tradens: *Supra.* *Ne* Latini posteriores Laureolam dixere. Vocatur & *ipodermis* ac *πικρία*. Huius baccas Piper montanum ab Italis nuncupari, sunt qui affirmant: alij à Germanis etiam Zeilande dictum volunt.

Idem putat Theoph. Cneorum nigrum esse posse, folio siquidem Myrtum satis referre: (quod ei nunquam concesserimus) & ramolam, [stirpe etiam unicaulis est] lentam, obsequiosamque stirpem, albæ radicis, absque odore, fructu nigro, quæ potissimè notæ sunt Cneori nigri Theoph. Nos pro eo etiam proponemus suo loco. Placet alioqui Dod. figura, quam hic proponimus, quanquam magna ex parte unico caule à nobis sit conspecta.

Gesl. in horto ait Laureolam seu Daphnoidem spontè circa Lacum Lemannum nasci folijs ferè Lauri, angustioribus, solidis, gustu feruidis. Item in append. Daphnoides, inquit, & Sabaudia missum, ubi ad Lacum Lemannum spontè provenit, autumno superiore plantatum viret adhuc, sed non satis lætum & tenuioribus folijs, quæ ad Daphnoides nostrum vulgare ferè accedunt. Quibus verbis sanè duas species insinuat, hanc ut putamus, quæ Sabaudica, & per vulgare eam quæ folio deciduo.

Cronemb. ad pilulas Mezerconis Pandectarium & Dinum reprehendit, qui Mezercon putarint Laureolam esse, ut copiosius postea dice-

mus in hist. Laureolæ folio deciduo. Nos verò per Laureolam cuius mentionem facit Cronemburg. existimamus intelligendam, quæ perpetuo folio.

An eandem intelligit censor Apollo quando ita insit Rad. 1. Serap. & Mesue non implicant cū Mezerco Laureolam & Lortolam vulgi, cuius historiam reddidit Diosc. l. 4. Daphnoidem dictam non admiscunt: quanquam Matth. nescio quâ mente huic capiti insitam assuerare audeat: eius enim reminiscitur Serap. cap. de Lauro: Mesue dicitur &c. Præterea in commento Daphnoidis, Matth. ut etiam Fuchs. aliud esse Mezercon à Chamæle scriptum reliquit: huius verò sententiæ immemor, cap. de Chamæle, idem esse Mauris Mezercon, quod Chamæle, Thymelea ac simul admixta Laureola, comminiscitur.

Idem Apollo rad. 10. Daphnoides Offic. Laureola ex Diosc. Laureola fœmina medicamentariis. Verùm Apollo ita irradiat nobis, ut non possumus asserere, quæ sit eius Laureola, nedam intelligere de qua planta loquitur.

Lob. & Pen. Daphnoidis siue Laureolæ ut nomenclatio, sic natura prosum Pusillam Laurum imitatur, ut plebecula vix conspectam dicitur Laurum. Vbiuis ferè Germaniæ, Galliæ & Angliæ, præsertim Mulomedicis & mulierculis clinicis nimis quàm nota, ut mirum sit Commentatorem Senensem tam ieiunè & manca descriptione hanc designasse, certo indicio ignorationis: quippe figura quam nullis floribus dat, fortè Mezerco Germanici surculum refert potius quàm Laureolam.

Lob. Obs. Daphnoides siue Laureola, Germanicè Zeiland: Gall. Laureole, Ital. Oliuella: perperam Thymelea Tragi. Sed fallitur Lob. non enim Tragus hanc posuit de qua hic agimus pro Thymelea, cuius nec icon nec descriptio hanc nostram ostendit. Clusius scribit Pyrolæ fruticantis folia carnosa, supernè saturatius virentia & splendentia Chamædaphnes, quam vulgus Laureolam vocat, folijs, formâ & magnitudine propè similia.

Schuenckfeldius Chamædaphnen Clusii quæ perpetuifolia est cum alia confundit, ut postea dicetur.

Hist. Lugd. tradit Dale champ. cum Dodon. Laureolam Offic. siue Laureolam inarè Diosc. Daphnoidem esse rectè censuisse, quæ Matth. sit Chamædaphne. Hisp. Laureola. Iconem quoque habet Chamædaphnes Matth. titulo Daphnoidis seu Laureolæ: habet & aliam titulo Daphnoidis seu Laureolæ cum flore: & cap. sequenti pro Laureola folio deciduo cur posuerit iconem Dodon. titulo Laureolæ cum fructu, nec nos scimus, nec illa excusabit: erat enim ponenda pro sempervirente. Sed ita evenire solet de sibi incognitis commentantibus.

Tabern. Bellerbale Germanicè vocat.

An Cæsalp. Daphnoides Italis Laureola dicta?

Gignitur magna ex parte in silvis ac montibus vmbrosis incultis & frigidiusculis. Tamen in Italia circa Patauium observauimus inter montem Gemulam & di-venda, necnon in huius descensu versus Balneum Aponense, sed quæ & ipsa loca frigidiuscula sunt respectu reliqui tractus. Florebat mense Februario stoculis parvis luteolis stipata. Vidimus etiam Patauii, Veronæ, Ferratiæ, & Bononiæ in hortis cultam. Genæ circa Castellum la Bassie dictum iam Decembri florere incipientem, ubi & Feb. & Martio aliàs florere solet Basileæ propè Dornacum, & in horto D. Th. Zuing.

Laureola.
non est Me-
zercon.

Laureola
vulgi.

Matth. re-
preh.

Fuchs. me.

Apollo me.

Matth. me.

Tragus
contra Lob.

H. Lugd. tra-
dit.

Daphnoides
Cæsalp.

Lotus.

Tempus

Serie.

Zuingeri, ex quo & Montbelgardum in hortum transtulimus, ubi & floruit & baccas tulit. In Burgundicis etiam montibus aliquot obseruauimus, unde etiam transplantauimus. Iam prius dictum apud Lemanium lacum reperiri, & non paucis iuxta Rhenum ac Mosâ locis. Flores, inquit Dod. præmature germinant, paulo post Autumni æquinoctium: hyeme aut primo vere perficiuntur: fructus Maio & Iunio Lob. autore: media æstate etiamnum virent, demum æstatis fine & aduentante Autumno maturitatem assequuntur, & nigrescunt. Tota hyeme viret, foliaque obdurant, ut in cæteris stirpibus perpetuo virentibus.

Vires & vus.

Esti pro certo & indubitato asserere non possumus hanc esse ueram & genuinam Diosc. & Plin. Daphnoidem, reclamantibus superscriptis aliquot notis: quia tamen vires ab iisdem traditæ apprimè huic conveniunt, lubet easdem hic recensere. Folia gustatu os faucesque vellicant & inflammant. Eadem seu arida, seu etiam recentia potu pituitosa per alvum deiciunt: vomitus quoque ac menses cient: quin & commanducata pituitam à capite extrahunt, & sternutamenta mouent. Cæteram & quindenæ ipsius baccæ potæ, purgât. Paulo aliter Plin. Daphnoides, inquit, [huic his nominibus quæ diximus] silvestris Laurus prodest, alvum soluit, vel recenti folio vel arido, drachmis tribus cum sale in hydromelite manducata. Pituitas extrahit folium & vomitus, stomacho inutile. Sic & baccæ quinquæ denariis, purgationis causa sumuntur.

Purgans. Vomitoria. Menses. Caput pituita.

Plin. Germ. Lactis defec. Astur contra Sarac.

Sunt tamen qui Plinii lectionem ad Diosc. aptandam & emendandam censeant, ut Sarracenus. Nos sanè in Plin. nihil præter rationem dictum inuenimus. Nam & stomacho incommodam hanc plantam censemus, insignis suæ acrimoniæ & ardoris gratiâ, & quinas baccas malumus quàm denas, has quàm quindenas, purgationis ergo exhibere: quod vel paulo maior dosis in talibus nobis semper suspecta videatur, præsertim cum Dei beneficio mitiora tutioraque habeamus.

Cautio.

Téperam.

Corrosio.

Laureolam certè Dod. in Hist. Gall. calidam & siccam ad tertium gradum, accedentem ferè ad quartum tradit, subuertere admodum ventriculum, inflammare, lædere, & adurere partes internas. Folia eius corrigi & ad sumendum commodiora reddi eo modo quo Chamæleæ. Idem in Hist. Lat. temperie & facultate similè facit Chamæleæ Germanicæ ea vniuersa suâ substantiâ acré & feruidam esse. Ut non temerè sanè hanc præscripserimus, propter insignè eius acrimoniam.

LAUREOLA FOLIO DECIDVO, SIVE MEZERION GERMANICVM.

CAP. XXXV.

Descriptio.

Radix.

Vitis.

Coriis.

Lanugo. Lignum. Flores.

Quæ verò deciduo est folio Laureola, frutex est interdum ad trium cubitorum altitudinem excrescens, radice in aliquot partes diuisa, minimi digiti crassitudine, vel etiam crassiore, longâ, atque se demittente, albâ; ex qua assurgunt plerumque virgule singulares, lentæ, teretes, tenues, obliquiolas, comice duplici recte, exteriore cinereo, tenuj, fragili, interiore exteriùs virente, interiùs albicante: valdè lentæ, & fractu còrumbaces, lanuginem quandam bombycinam, dum diuelluntur ostentantes, cui subest lignum candidum, solidum, medullâ pauca præditum. Flores ad ramulorum latera sine pediculo, nunc singulares, nunc plures simul iuncti, ex nodulo



ante folia producent pulchellâ, ex rubello purpurascens, colore ad flores Persicæ accedentes, oblongi, in quatuor foliola unctonata reflexa diuisi, odore suauj: in medio staminula aliquot crocea. Folia ex tuberculis plerumque plura simul, colore herbaceo. Laureolæ folio perpetuo accedentia, molliora, nec ut illa, splendicantia.

Folia.

Baccæ cum maturitate rubentes, quæ resiccatæ, nigricant, (inquit Dod.) quarum interior nucleus Cannabis semini similis, medulla candida. Tota planta ut odore graui est, exceptis floribus, ita sapore acerrimo & vrentissimo. De hac Ruellius sic scribit: Chamælam Romani Cilibracam, alij Oleaginem vel Oleastellum vocant. Olea Cilibraca vocatur autore Colum. sed Calabrica legendum puto. Recentiores Oliuetum appellant: Oitic. Mezereon, quasi lathaleum & viduiferam. Oliuella surculosa fruticat ramis palmaribus, folijs Oleæ similibus, tenuibus, amaris, quæ gustata linguam acriter mordent, faucesque ac guttur vellicatu laceffunt. Lactè manat copioso, animalibus cunctis intacta. Baccas fert si bene memini vitides, per maturitatem ex parte rubescentes. Ex hac granum Cocci plerique falsè nasci existimauere. Recentiores Chamæleam cum Thymelæa, & vtramque cum Daphnoide turpius confundunt. Hæc ille: qui dum alios reprehendit, seipsum accusare videtur: dubitamus an ullam harum plantarum nouerit. Fortè intelligit nostram hanc Laureolam folio deciduo. Non conuenit tamen, quod ait lactè manare copioso: nec etiam Chamæleæ est, multò minùs Olea Cilibraca Columellæ. Quando folijs Oleæ dicit, & postea baccarum rubrarum meminit, Chamælam cum Laureola confundens, neutram sibi cognitam fuisse satis clarè prodit.

Bacca & nucleus.

Odor & sapor.

Chamæla. Cilibraca. Oleastellum. Olea.

Oleago. Oliuetum.

Mezereon.

Ruell. reprehendens reprehenditur.

Multiplex cum error.

Brussell. somnium.

Brussell. murex.

Brussell. nescit quæ scribit Tom., dum Laureolam Teut. Bellerophals dici ait, Græcis Daphnoiden, flores illi candidos radicem inutilem: passim per siluam. Et cap. sequ. Thymelæam vel Coccum Cnidium quoque Bellerophals vocat, floribusque esse candidis. Quis hanc incuriam ferat? Dioscoridis descriptiones sublegens cum Bellerophals Germanorum confundit, nec docet quæ ea sit: nec existimamus reperiri Laureolam flore albo in Hæcynia. Vbi quis fide dignus monuerit, aut miserit, credemus.

Cordi opinio non opus habet longa refutatione: ipsa per se satis ruit, quando apud Diosc. tradit Thymelæam quoque Mezereon & Coccognidium, & grana quoque Mezereon vocari: nimirum nostram Laureolam vult esse Thymelæam, & sequè cap. hanc fruticem esse dicit quem Germ. Zebast & Bellerophals appellant, ex quo Granum Cnidium colligatur, quod etiam Coccognidium vocitetur. Quasi verò.

Curti opinio errata.

Thymelæa. Mezereon.

Coccognidium.

An Cornac. Thymelæa ex qua granum Cnidium, oitic.

offic. & notum & in usu? sane videntur esse: nam addit, *Barbata voce Mezereon*, Germ. *Bellerphala* dicitur: forte ab eo quod collum, id est, fauces offendit & vitit. Sed cespitar. Differunt enim multum *Thymelæa* & *Mezereon*, quo nomine à *Scrapione* & *Mesue* vocatur.

Tragus horrenda nomina tribuit: Ex *Mesue* dicitur, infit, *Rapiens vitam: faciens viduas*: (sic & meliora sperantibus per accidens prodesse posset, si iocari liceat) *Scidelbast* aut *tenßtraut* Germ. *Baccas* Ari *baccis* confert: sed non probatur nobis quando folia per omnia *Liguliro* aut *Olex* similia tradit: immo vix vllum h. n. similitudinem aduertimus, quæ dici mereatur. Neque etiam est *Diosc. Chamelæa*, ut sibi persuadet. Cur verò apud eundem huius *Laureolæ* alia icō posita sit, sub titulo *Thymelææ*, *Zelandi* & *Bellerphala*, nos latet: quam autem plantam suspicemur cum intelligere paulò post dicemus.

Neque concedimus *Fuchlio* huic, (quam *Agrostis* vocat, *Daphnoides*, offic. & *Herbariorum Laureolam*) omnes *Diosc.* notas præter floris colorem conuenire, ut ille scribit: quia *Diosc.* suæ tribuit folia *de lora*, fructu contumacia: talia non sunt folia huius nostræ: nec habet *apocynum*, fructum nigrum, sed rubrum, ac potius coccineum: folia quoque vix propriè *Lauri* folia dici posse putamus. In eodem censura dignum, quod, quam prius fruticem dixerat, postea in annot. herbam vociter facientem viduas. Dubitamus quoque an hæc fuerit *Offic. Laureola*. Probamus quod taxat, mirum in modum errare *Othocinas*, quod folijs *Daphnoidis* pro *Mezereon* vrantur: & eius fructu pro *Cocco Cnidio*, qui *Thymelææ* fructus est *Thymelææ* verò non esse *Laureolâ* hodiè appellatam herbâ ex eo colligi potest, quod *Diosc.* autore *Linum* nonnullis nominata sit.

Matthiolus, ut passim varius à seipso & fluctuanti similis, ita & in huius plantæ historia, sicut ex diversis eius editionibus & historiis patet. Videtur itaque *Camer.* nō accipere pro *Daphnoide* *Matth.* nostram *Laureolam* folio deciduo, sed fortè eam quæ est folio perpetuo, vel aliam aliquam. At *C. Bauh.* apud eundem ponit eam quæ est folio deciduo.

Quod ad nos attinet, satis colligimus ex ipsius *Matth.* verbis, ei non bene cognitâ has plâtas, ac ab eo confundi, quamvis eius icones & descriptiones melius cōueniant cum nostra *Laureola* folio deciduo. Reclamant tamen nota quædam ne sit *Daphnoides* *Diosc.* quicquid dixerit *Matthiolus*, sicuti antè dictum aduersus *Fuchlium*. Cur verò folia in eius edit. *Germ.* dicantur viscosa, seu glutinosa, ne suspicari quidem licet: in neutra *Laureola* hoc obseruauimus. De *Amati* quoque sententia omnino falluntur, qui *Daphnoidem* *Laureolam* dictam *Mezereon* esse credunt. Esse enim, inquit, *Laureolam* herbam siue fruticem [differunt hæc duo] cui flores albi purpurascens intint, & eam *pharmacopolas* omnes satis cognitâ habere. Sed an ipse etiam *Amatus* probe cognitâ habuerit utramque *Laureolam* & *Chamelæam* est cur multum dubitemus. Scribit enim l. 4. *Chamelæa*, Lat. *Oleasellum*, Arab. *Mezereon*, vulgò *Mezereon*, Gall. *Boys geurt*: Non describit. Nomen Gallicum conuenit *Laureolæ* folio deciduo: figura quæ apposita, est alterius plantæ, de qua non videtur locutus *Amatus*, nempe *Chamelææ* tricocce, de qua postea.

Lacuna *Matthioli* simia diuersam ab eo habet figuram pro *Daphnoide*, quæ potius semperuirentem *Laureolam* exprimit, quam hanc: interea tamen Tom. I.

nem *Matth.* limitatus, vel potius, more suo, ex eo transcribens ait, *Daphnoidem* nonnullos, vocare *Laureolam* femininâ. Aliquos confundere cū *Mezereon*, quod non differat à *Chamelæa* *Diosc.* Sed facile patet non oculatiorem fuisse magistro suo in istarum stirpem dignotione ac historia.

Piper montanum, infit *Anguil.* quod quidam existimant *Chamelææ*, sine dubio non est *Chamelææ*, potius dixerim *Coccum Cnidium* *Theoph.* Nos de *Cocco* seu *Grano Cnidio* *Theoph.* postea trademus.

Dodo. vocat *Chamelæâ* Germanicâ, ac videtur ei esse *Cneorum* album *Theoph.* nihil tamen affirmare posse dicit propter breuitatē. Ast quā *Cneorum* album *Theophrasto* candido dicatur folio, figura quodammodo *Oleagineo* simile, vix concesserimus nostram hanc *Laureolam* esse *Cneorum*, licet id sibi persuadere videatur *Dod.* dicens non multum dissimilem esse *Olex*. At nos multum dissimilem dicimus. Et si etiam similis esset, desiderantur & aliæ adhuc notæ. Et ut reliquas omittamus, quis, nisi iuscus fortè aut parum oculatus, *Laureolæ* folium candidum dicat?

Negat *Gesnerus* in hortis, *Piper montanum* *Ital.* dictum, & *Germ.* *Zylant* rectè *Laureolam* vocari: cui sanè haud grauiter subscriberemus; nisi iam dudum apud omnes penè *Herbarios* istud nomen inoleuisset, & in quibusdam cum *Laureola* haberet similitudinē. Alioqui non semper uirēs est, quā in re differt à *Laureola* æquē ac *Lauro* leperuientibus. Quapropter & ipse quoque *Gesn.* alibi non vno loco, latè vulgi incedens via, modò *Daphnoides* nostrum vulgare, modò *Laureolam* vulgarem, modò *Daphnoidem* *Fuchsi* vocitat, *Thymelææ* tamen speciem potius esse, iteratò diuersis locis inculcat.

Ah *Apollin. Rad. 10.* *Chamelæaphne*, *Laureola* etiam medicamentariis dicta, eaque mas? nimirum ita irradiat nobis more suo ambiciosus suis radijs, ut non ausimus asserere, nec alius forte id facile ex eius verbis queat, num hanc intelligat vel aliam: non sine suspitione ipsiusmet id nesciuisse.

An *Altomari* de med. c. 91. *Mezereon* *seplasia* priorum communiter dicta, & propterea, quam *Diosc.* nuncupat *Chamelæam*, ut ille vult, qui ex ea parat pilulas, quas sum. nē laudat ad educationem aquarum. Si hanc nostram intelligit, fallitur quod *Diosc.* *Chamelæam* putet.

Cronemb. l. 5. comp. ad *Pillulas* ex *Mezereon* *Mesue*: *Mezereon*, inquit, frutex omnibus officinis & quibusdam alijs *Almezereon* vocatus in magnam controuersiam agitur, dum quidam *Chamelææ* *Diosc.* alii *Thymelææ* eam vocem tribuendam contendunt. *Auic. 2. can. c. 467.* & *Scrap. simpl. c. 363.* quos, ut præceptores suos, sequitur *Mesue*, *Chamelæam* cum *Thymelæa* turpiter confundunt. *Tragus Pandectario* & *Leoniceno* subscribit eleganter vulgarem *Mezereonem* picturâ sua ob oculos ponens, dum ait: In Ianuario plantam antè folia germinare, flores purpureos edere. In cap. præced. *Thymelæam* *Germ.* peculiariter *Bellerphala* referens *Diosc.* sine dubio fidelitèr ea grana pingit, quæ nostri [Germani] *Pharmacopolæ* ex *Mezereon* vulgari colligunt? nam rotunda esse dicit, maiora canabinis, linguam vrentia. *Diosc.* clariùs, fructum habere *Myrti* in modum, rotundum &c. Hæc si vera sunt, ut omnino iudicari debent, non iam *Mezereon* *Chamelæa*, sed *Thymelæa*, ex qua granum sine *Cocco* *Cnidium* colligi & *Theoph. l. 9. cap. 11.* & *Diosc.* autor est. Constat hinc *Tragum* hic pa-

Cypripis

Rapieris

Tragus

Tragus

Tragus

Officinarum

Daphnoides

Pieris

Coccum Cnidium

Cneorum album

Dod. opinio

Non rectè

Laureola

Laureola

Laureola

Chamelæaphne

Laureola

Mezereon

seplasia

Chamelæa

Scrap.

Mesue

Thymelæa

Tragus

Thymelæa

Tragus

rum attentum fuisse, dum floribus quidem Meze-
reoneum vlitatum, seminibus aut fructibus Thy-
melæam representat.

Sylvius Mezereon Mesue Thymelæam rectis-
simè decetnit.

Pandest.
injurya.

Laureola.

Daphnoides
D. Florent.
error.

Arabum la-
bes deterf.

Lactariarum
maxima.
Lactici-
um mayu
Monachum
crepantur.

Vitam ra-
piens. Va-
dam facit
Cancer.

Aggitarum
impugnata.

Laci ac pe-
culosi er-
rores Loda-
cori detra-
guntur.

Pandectarius Simonē Genuesē redarguens c. 124.
hanc malè Laureolam cōstituit: deinde c. 170. eos
improbat qui Coccognidiū [quod aliās semē Me-
zereonis dixerat] semē Laureolæ putant. Amplius
c. 483. disertè Laureolam Laurum Alexandriæ &
Daphnoidem interpretatur: vnde manifestum sit
quantoperè sibi dissideat. Simili quoque errore
D. Florentinus includitur c. 1. in Mes. commen-
tans: Vterque facillè hinc arguitur, quòd Diosc. di-
uersa capita omnium earū herbarū instituat, quodq;
Arabes omnes (Si Serap. excipiamus) Mezereon-
em copioso lacte manare scribant, quod tamen
nec profert Laureola, nec etiam Mezereon vul-
gare. Et quamuis Mesue Lactariarum maximam
dixerit, & Auic. Lacticium magnum, id esse fal-
sum oculari fide monstratur. Nihilque moror
Monachos in Mes. vbi confidenter Lonicerum &
Fuch. cauillantes, ac Serapioni iniquo iure patro-
cinantes, idem contendunt.

Non dubium quin Diosc. Chamelæa sit Sera-
pionis Mezereon, quam Arabes & eorum discipu-
li non tantum multiplici verborum imperitiā
confuderunt, sed insuper cum Chamæleone al-
bo ac nigro lethali errore commiscuerunt. Atqui
illud horrendum quod Mesue initio sermonis
Mezereon *vipers vitam*, ac *viduas faciens* dixerit,
vnde seriò vitus eius ab agyrtis & circumforaneis
formidari debet, qui integra grana (quia paucū-
lum ore comminuta, fauces accendunt & linguam
misere vellicant) transglutienda exhibent, extre-
mo hominis periculo. Noui (addit Cronemb.) im-
pudentissimam ostetricem Nouiomagii (quæ pri-
maria vrbs Geldriæ) Gretam nomine, quæ passim
quibusvis: & quod intolerabili scelere sit, etiam
gravidis ac pueris propinat: ô flagitiosam femi-
nam! Quare, prudenti etiam necessario consilio,
Mesue aceto corrigantur folia. *Hæc ille.* Cæterum
Cronemburgium per Mezereonem vulgarem in-
telligere Laureolam nostram folio deciduo satis
clarum: Laureola autem eius fuerit fortè ea, quæ
folio perpetuo virente. Quæ autem sit Thyme-
læa vera, & Mezereon Mesue imponendum in
pilulis Mesue, non indicat. Apud Theoph. vt
citatur a Cronemb. nuspam inuenimus in qua
planta colligatur Cocco enidium. Verum de
hac re postea.

Nunc exei ac periculosos terrores Lonicer. dete-
gendi. Is lib. 4. c. 4. 9. suæ historiæ sic scribit: *Bel-
lerbals*, aut *Zyland*, aut *Zebast*/Diosc. Thyme-
læa, fructus Granum Cnidium aut Cocco eni-
dium: alii Daphnoides Diosc. volunt, quamuis
non respondeat descriptio huic *Bellerbals*.
Quo loco Lonicer. posuit falsam figuram Matthioli.
Thymelæa, cui appletur baccæ triecocæ: quam
plantam intelligat nescimus, nec ipsum sciuisse
existimamus: nomina tamen Germanica conue-
niunt nostræ Laureolæ folio deciduo. Cap. seq.
quod so. sic tradit: *Seidelpast*/Leusfrant/Diosc.
Chamelæa, Barbaris Arabibus & Offic. Meze-
reon, *Rapens vitam*, *Faciens viduas*. Quidam con-
fundunt hunc fruticem cum *Bellerbals* cap.
præced. descripto, propter similem figuram & vi-
res. Ambas indiscriminatim vocant Mezereon.
Hoc cap. Lonicer. ponit figuram Chamelææ Matth.
descriptio autem est Laureolæ folio deciduo ex
Trago, cui dicitur Chamelæa, vt antè annota-
tum. Sic ille, magis etiam cæteris, more suo omnia

confundit. Lib. 5. cap. 208. iconem Laureolæ folio
deciduo ex Matth. ponit pro *Lorberfrant* Daph-
noide: ascribit quosdam velle esse *Bellerbals*
Zyland. Is præterea malè scribit. Cocco eni-
dium semen esse Thymelææ apud Myropolas in
vfu.

Ritius quoque apud Diosc. notat Chamelæam
G. dici *Zyland*/Gallis *Bois gentil* & cap. sequenti
Thymelæam esse Mezereon Mesue & officina-
rum, cuius granum Cnidium Diosc. Officinis sit
Cocco enidium Germ. *Bellerbals*.

Sed eadem ignorantia nota inurendus est
Ritius, qui eandem plantam facit Chamelæam &
Thymelæam, cum tamen neutra sit.

Lectores perpendant in quanta pericula isti
ignari Herbarii coniciant non solum miseram
plebem, verum etiam Medicos stirpium ignaros,
quorum maiorem numerum scimus, quam vulgus
crederet.

Pen & Lob. Aduers. Chamædaphne siue pusilla
Laurus: an Germ. Mezereon granum vocitant Pi-
per rusticum, & Cnidium granum Pharmacaria
inficitia, quā ponit iamdudum Senensis, decipitque de-
ceptris, sibi incognitas, *hirsutum prorsum*, confundit.
At ipsi interim Aduersarii dubii hærent, an sit
Chamædaphne. Corrigit tamen versionem, &
vires Diosc. exponunt, vt suæ opinioni accommo-
dent, vt apparebit infra inter vires. Nec ullam
vidimus tãtam similitudinem, vt mereatur nomen
pusillæ Lauri.

Camer. annotat Chamæleam Germanicam (sic
enim vocat) flore quandoque reperiri albo. Sed
vbi? & si vidit, cur locum non indicat?

An Turner. Daphnoides, quibusdam dicta Lau-
reola? Angl. *Lauriel* vel *solbry* quam in Germa-
nia se vidisse negat: in Anglia tamen ad sepes
propè Cantabrigiam & *Barctway* frequentem.
Videtur Turnerus intelligere Laureolam semper-
virentem: quamvis figura non respondeat, nec
quadret ex Diosc. flos albus.

Chamelæa, inquit Cæsalp. quam vulgò in alpi-
bus Olinellam vocant, duplex est: vtraque paulò
minor Daphnoide obsequiosa, &c.

Qualem autem suspicemur Cæsalpini priorem
Chamæleam dicemus. Altera videtur nostra Lau-
reola folio deciduo.

Histor. Lugd. pro Laureola scemina proponit
iconem Matth. præterea eodem cap. habet iconē
sub titulo, Laureolæ cum fructu, quam Dod. ex-
lubuerat pro Laureola siue Daphnoide quæ per-
petuo viret, diuersa ab ea de qua Hist. Lugd. eo
loco agit.

Schuuenchf. in Cat. Siles. Laureola, *quædam*
Diosc. Chamædaphne Clus. At non videmus cur
hæc planta simpliciter Laureola dicenda sit, nulla
tanta similitudo. Chamædaphne Clus. non est,
vt prius dictum. De Diosc. Chamædaphne postea.

C. Bauh. apud Matth. Daphnoides Laureola
folio teneriore & deciduo: Glycyrrhizam mon-
tanam nominare solemus, vt rei herbariæ ignaros
fallamus.

Castor. Daphnoides & Laureola maior. Pla-
taque linguarum nomina iam supra dicta spar-
sim Hist. & Ital. *Laurcola*. Gal. *Laurcola*. Germa-
etiam *Scheißlorbeer*en quasi cæcationis Lausi-
baccæ, quia sedem potenter mouent: Silesi *Zei-
lang*/Zieglig. Sequanis & Montpelgardenibus,
Bois gentil. Rustici circa Basileam, vt ex Cl. De
Fel. Platero accepimus, nominant *Camar*. Belg-
quoque vt Germ. *Bellerbals* dicitur, his etiam
Leusfrant: pediculorum herba, fortè quòd eos
abigar Boh. *Wlen* *Laybo* *Wenß* / teste Matth.
Eadem

Mulsi me-
dici stirpi-
um ignari.

Piper rusti-
cum
Matth. su-
gillatur.
Camer. ex
Lob. accipit.

Chamelæa
duplex in
Cæsalpino.

Hist. Lugd.
et Clusius.

Seislerf
repro
Glycyrrhi-
za montana.
Daphnoides.

Loca.

Eadem ferè loca cum precedenti amas, siluatica, montana. Plurima cum in Germania & Heluetia, tum in Allobrogum & Ligurum Delphinatusque montibus & collibus siluosis, opacis, in vallis Anoniz montibus Tridentini agri reperitur in monte Amano, teste Bellon. quam ille Bellerfraut Germ. dici ait, quanquam temetè herban vociter. Circa Basileam in Moutero monte. Denique in plerisque pinguibus & opacis, asperis atque desertis Germaniz locis. In Italia hortis quamplurimis cultam vidimus. Translata enim ad frugem peruenit ac diu durat, quales plures in hortum E. C. Montb. transferri curauimus, quæ adhuc vigent, ubi & Ian. & Feb. Martio atque Aprili florentem obseruauimus, pro natura & clementia hiemis. Communiter tamen Martio floret: Sed horum gemmas seu germina statim post autumnum promere solet, qui mox hieme, si clemens sit, alioqui ineunte vere, panduntur. Folia post flores demum exeunt. Tandem æstate & bacce quæ Augusto magna ex parte rubræ factæ maturantur. Subinde folia amittit.

Latit.

Tempus.

V. & Vitis.

Hydrys. Flores n. riores. Flosa cru. fusa.

Prodidit Tragus se Chamelzā [intelligit autem hanc de qua hic agimus] quosdam agytas & impostores non paucos ad orcum mittere vidisse. Eiusdem iudicio Pilulæ quas è Chamelza Mes. & Serapio conficiunt, ad hydropem maximi sunt momenti. Existimat decoctionem florum tutioris & minus noxij vsus esse. Nemini tamen autorem aut magistrum hac in parte se velle esse, proficetur. Folijs cum melle tritis sordida vlcera & crustosa repurgari. Mulieres quæ formæ student, hoc medicamento vti posse: nam faciei maculas intra paucos dies illitu extirpare & purgare. Nostrum consilium est, ne quis temerè vtatur Pilulis de Mezereio dictis, præsertim si imponatur Chamelza Tragi, quia non paratæ sunt vt decet. Qui smegma Tragi vult vsurpare in imaginatibus, caueat nec inflammet faciem, & pustulas excitet ipsis maculis deteriores. Nam erodentis & admodum inflammantis est facultatis. Folium vnū siue recens siue siccum comestum pituitam viscidam per deiectiones vacuare, vomitum mouere & mentes Matth. tradit. Baccas quindecim potu assumptas efficaciter purgare. Folium in nares inditum sternutamentum excitare. Cum passulis folium vnum masticatum, à capite pituitam & saliuam ducere. Nimirum hæ ipsæ sunt vires quas suæ Daphnoidi tribuit Diosc. quas mutuatus Matth. suæ Laureolæ applicat. Vt iam aperte videant Studiosi, quantum ei sit fidendum. Dosis baccarum periculosa, & quam ipse non sumpsisset, nec sine noxa alijs propinasset.

Causa.

Purgant.

Matth. non fidendum. melle fr. gunt.

Tempus.

Dodonæo folia, cortex, radix, & fructus sunt calida & sicca ad tertium ferè gradum, eiusdemque ferè qualitatibus cum Thymelæa. Folia, inquit, purgant potenter & violenter per inferiora pituitam & humores biliosos ac aquosos, his vti officinas loco foliorum Chamelæ. Eadem vires habere baccas, easque commanfas tantum calorem ac feruorem in faucibus relinquere, vt vix potius copiâ resingui possit. Idem hanc plantam sine dubio nocuam esse hominibus, cum sit vsque adeo calida, vt vehementer violenterque operetur, ideoque lædat & noceat partibus internis. Huius folia preparari vt folia chamelæ; eademque ratione preparandos esse fructus & corticem, si sumendi exhibeantur in aliqua medicina. Idem in hist. lat. scribit, officinas Germaniæ & Belgij huius folijs (si quando opus sit) vti pro chamelæa, quod citra errorē fieri potest, quod & Cam. repetit. Menses quoque ducit, vt perhibet Schvvenckf.

Cortex verò aduersus Quartanam, Hydropisim & venena pro se cū Saccharo, vel liquore aliquo bibitur, corrigitur Lacte, vel Aceto. Experietur qui volat? Nos non facile periculum fecerimus, nisi deficientibus alijs medicamentis, aut in casu desperato eius vsum suaserimus idque cum magna consideratione.

Suspectum porro nobis est & illud Ant. Roiet medicamentum, quod peste laborantibus exhiberi tradit. Foliorum, inquit, Laureolæ exsiccatonum pondus coronati, plus minùve pro ratione vitium ægroti, per biduum in aceto macerant, & bibendum præbent, quod sudorem mouet, vomitum & aluum: & hac ratione venenum expellit. Suspectum vt diximus, est nobis hoc medicamentum: si eo vtendum esset, velimus potius folia Laureolæ macerata per biduum in aceto cum alio liquore propinare.

Nam vel Pen. & Lob. testibus, ac ipso adeo sensu, fauces, œsophagumque [aliter quam Euphorbium Gesner.] adurit, diu multumque vexante impressione. Non minùs hæc per aluum deiecit crassum viscidumque Phlegma, & intestinorum ramenta abradit quàm Laureola, cui non dispar, sed vehementior facultas inest, eademque in aceto maceratio ad corrigendum debetur. Sic enim vtuntur etiam Medicorum quorundam præcepta Pharmacopœa. Quare [inquit] facit hæc virium expensio, vt minùs quis putet Chamædaphnen legitimam. Quippe quoniam Diosc. *καπνὸς ἀγρῆς*, id est, capitis doloribus & stomachi ardoribus mulcendis comendet, vt interpretes vertit. At si vlla ratio iniri queat, quâ tam feruida planta pro Diosc. Chamædaphnæ agnosci queat, ea interpretatione commodiore & veriore videtur sita: namque *καπνὸς ἀγρῆς* id est, capitis doloribus & stomachi vitionibus accommodat, vltimas, non incommodo sensu intelliges folia tusa admodum capitis dolori, puta à frigore, vel flatu, mederi: Stomachique vitionibus faciendis admoueri, ad diurnas fluxiones sistendas aque stomacho auertendas: vt Paulus ex Antiquis docet faciendum, lib. 6. de stomachi vitione, ferro vel caustico non vrente actu, cuiusmodi sunt fungi, aut nigri Agarici frustilla, aliæque inibi scripta, quibus non secus atque folijs huius vsu sunt Antiqui. Sic Diosc. magnam præsidium putat Arabicam vocatam vitionem à Græcis, quæ huiusmodi fuit spirillis caprinis, oleo feruenti immixtis, & pollicis cauo inustis. Sic illi.

Diosc. autem præf.

Arabica n. flos qualis.

Vfus ad n. m. n. n.

Nobis nondum verisimile videtur hanc esse Diosc. mentem, estque valde longè petita hæc interpretatio, nec consuevit aut opus habuit Diosc. ab Arabibus discere, quos nec vidit nec agnouit. Quæ nostra sit aliorumque hæc de re sententia cap. de Chamædaphnæ declarabimus. Non enim concedimus, hanc de qua hic agimus, esse Chamædaphnen Diosc. Nec tacendus tamē alius eius vsus quem Moibanus inuenit, in cuius Antidorum alias Saxoniam vocatam aduersus venena eius radix quoque in aceto macerata venit, quam antidotum alio commodiore loco referemus.

CHAMELÆ HIRSVTÆ NOMI-
NE DATA.

CAP. XXXVI.

CHAMELÆ nomine, & Gallicè Bois Gris, id est, Ligni nobilis nobis datam (non



recordatur a quo] plantam in loco nostro herbario inuenimus & etiamnum asseruimus. Fruticis parui speciem habet, uti praecedens: Caudex lignosus, rami palmares, nigricantes (in sicca.) Folia similia ferè cum praecedenti Laureola folio deciduo, breuiora tamen, & multò angustiora, in acumen desinentia, nonnihil hirsuta.

bium accendens. Aliqui non rectè Laureolam vocant. Facile nascuntur: crassior enim radice & tenax est cortex. Item de Colledisimpl. Laureola puto species in monte prope Curiam, parua, angustis folijs, paulò maioribus, quam Rosmarini. Flosculis purpureis odoratis, ut in Zyland. Cauliculus lignosus est, non ultra septem digitos altus. Floret Iunio. Considerent periti an Gesn. de duabus plantis scribat, an de vna tantum. Item an intelligat Thymelaeam Cordi vel Cneorum Matth. fruticosum, potissimum per eam Laureolam, quae prouenit Curia: Icon à Gesn. addita Thymelaeae minori Cordi non quadrat cum Cneoro Matth. Stipium studiosi obseruabunt circa Augustam Vindel. & Ratibonam, Thymelaeam minorem, & conferent cum Cneoro fruticosa Matth.

Tragus de sua Thymelaea sic scribit: Rellerebale & Zeilandi Germ. Latinis nonnullis Linum fil. Olivella & Les terra: apud Diosc. *Quercus* & *Quercus* Plin. *Pyrosachne*, Cnestron & Cneorum vocari tradit. Syri *Apolia* nuncupant: Hyginus *Capiam*. *Liparenti* cuiusdam Acrius mentionem facit, qui & Cnestron nominari tradit. Num. sed ad hunc fruticem & pertinet appellatio, nonnime constat. Fructus Thymelaeae *Cra* in *Gnidium* vel *Cocum Gnidium*, ut loquuntur Offic. appellatur. Errant Recentiores, qui *Coccognidium* & *Chamaelea* nasci existimant. Multò maiori errore versantur, qui *Chamaeleam* cum *Daphnoides* seu *Laureola* confundunt. ac si ad vnam & eandem herbam utraque appellatio referenda sit. Vid. Christoph. de honestis & Jac. Manlium, super Confect. Mezercon. Frutex est, arbutusae instar proficiens, virgis multis, tenuissimis, tripedaneis, aut breuioribus, folijs exiguis & pinguibus, flore candido, fructu rotundo, seminibus Cannabis haud maiori, linguam si mandaret adurent, non aliter atque *Chamaelea* de qua proximo capite. Non vbiq; obuia est, sed incultis, altissimisque montosis & siluis prouenit. Hae *Tragus* cur id euenit quod reprehendit in alijs. *Laureolam* folio deciduo bis pingit, pro *Chamaelea* & *Thymelaea* ut dictum, licet neutra possit esse nec eius Thymelaeae descriptio respondeat iconi, quae fortè ex Diosc. desumpta, ipsis plantis non probè ei cognitis, vel sanè superficialitè consideratis. Considerandum tamen an forte intelligat Thymelaeam minorem Cordi modò dictam.

An Apollo de hac Rad. sp. 96. Thymelaea ex qua *Granum Gnidium*, *Chamaelea* similior. An item Anguill. in epist. Thymelaea ex qua fructus *Cocum Gnidium* dictum. Adeò superficialitè vel intricatè de his tradunt, ut quid statuendum nesciamus.

CNEORVM MATTH. SVFRVTEX.

CAP. XXXVIII.

Pro Cneoro, exhibet Matth. plantam Thymelaeae Monspelulanae aliquatenus similem, ex radice crassa, nigra, plura lignosa virgulta, dodrantem circiter alta, ramola, cortice nonnihil rufescente teratà proferente: in quibus poccificia fastigijs, folijs conferta, viticcia: Thymelaea multò breuiora, obfusiora, glabra, nervo vno secundum longitudinem donata. Flores ramulorum extremis insident multi, simul congesti, purpureascentes, ac interdum albi, quorum singuli & Laeb. Matthioli floribus formà non absimiles, ex oblongo tubulo in quatuor

THYMELEA MINOR CORDI

CAP. XXXVII.

Descriptio.

Folia.



Thymelaea minor Cordi, parvulus est frutex, plures ab vna radice imitens virgas, longitudine pedales aut dodrantes, per terram stratas, lentas, flexiles, & distrectu commacosa: folijs numerosis, viridique vestitis, figurà oblongis, utrinque acuminatis, crassiusculis, superius viridibus, inferius pallidioribus, Olea

Sapor.

Floru.

Radix

Sapor.

Locu.

Myrtique folijs multò minoribus, ac potius fruticoso Polio similibus, paulò tamen maioribus, gustu glutinoso. Flores, Sole Taurum occupante, producit in summis virgis oblongos, inferius angustos, superius in quaternis folia parua se pandentes, è purpura in puniceum atque candicantem colorem vergentes, densos: & ab vno principio sese in Corimbos diffundentes, suauiter odoratos, & mellis aliquem odorem redolentes. Floribus singule succedunt baccæ. Radice nititur longa, candicare, nervosa, lenta, flexili, infragili & perenni: quæ ad aliquot horas fauces & palatum Coecognidii modo excalfaciente & scarificante. Nascitur frutetosus & muscosus tam planis quam editis locis: nonnunquam etiam sub Iuniperis. Copiosa autem circa Vindelicorum Augustam, & Ratibonam.

An de hac Gesn. de hort. Piper montanum in Italia multis vocatum, quod nostri Zyland, Dod. Chamaeleam falsam: eiusdem species alpina minor superiore autumno hortulo meo commissa, viret etiamnum. Vis utriusque caustica, omnibus partibus os & palatum non aliter quam Euphor-

Chamaelea
falsa.



taor lacinias
radiatam dispo-
sitas facillimen-
tes. Placet &
diligentissimi &
peritissimi Her-
barii Clus. des-
criptione sub-
iicere. Elegans,
inquit, suffru-
tex, cui multi
sunt rami gra-
ciles, flexibiles,
lenti, surculosi,
ad una proci-
nus tellure e-
mergentes &
humis diffusi.
Folia nullo or-
dine disposita
ramulos am-

biant, viridia, cutanea, Thymelaeae vere pro-
xima, ingrati primum, deinde amari saporis, nul-
li aut perexigua (quantum quidem gustanti de-
prehendere licuit) acrimonia praedita. Flores in
summis surculis, sex, septem, aut plures, conferti,
quatuor foliolis constantes, ex rubro purpuras-
centes, Centaurij minoris florum penes aemuli, in-
grati etiam & amari saporis, aspectus tamen pul-
cherriimus, atque odorati, caput (si diutius naribus
admoveantur) tentantes: ijs succedit fructus exi-
guus, Thymelaeae fructui haud dissimilis, non ru-
ber quidem, sed candidus: oblongiusculus, semen
continens cinerea membranâ tectum, rotundum,
Thymelaeae grano par. Radix longa, minimi di-
giti ut plurimum crassitudine, interdum nigri-
cans, maiore vero ex parte flavescent, lenta, su-
perna parte nonnunquam gracilior, unde rami
flexibiles & humi dispersi emergunt, & subinde
secundum alarum caua, latis crassas fibras flaves-
centes agunt.

Marth. in com. cum magnis icon. Lat. & Ital.
iconem proponit huius plantae nomine cneori
Marth. ubi scribit: inuenisse se in Bohemica silvis
plantam, quae omnibus partibus suis cneorum can-
didâ referat: flores in surculorû cacuminibus pur-
pureos, odorati Testiculi odore &c. In epit. sua
iconem ponit diuersam à praecedenti, pro cneoro
candido: de quo agemus suo loco, nempe capit.
de Ocymoidae vel saponaria minore. Hanc
non describit, sed tantum ait: cneori candidi, de
quo meminuit Theoph. hic imaginem damus, ut
qui chamelaeam faciant, ad mentem redeant.
Profecto in ipsomet mens requiritur, qui sibi pa-
rum constans quod affirmavit audacter in dubi-
um reuocans, aliam plantam pro Cneoro, nem-
pe herbam, à praedicta toto genere differentem
exhibeat, parum mentis eorum quae prius tradi-
derat. Certè camer. in Epitome Matthioli figu-
ram omisit. C. Bauh. in auctis & illustratis Matth.
commentarijs l. i. c. 13. Cneorum prius fruticosum
posuit, addens: Cordum fortè nomine Thymelaeae
minoris exprimere voluisset nihilominus illu-
strans Matthiolum, l. 4. c. 167. cneori titulo her-
bae iconem ponit adiectis adèd his Matth. verbis:
Cneorum de quo meminuit Theoph. nullis defici-
entibus notis misit ad me Româ vir quidam no-
bilissime clarus, cuius imaginem hic appingi cura-
uimus, ut qui chamelaeam & Thymelaeam cneo-
rum faciunt ad mentis sanitatem redeant. Est au-
tem ea icon reuera Ocymoidis minoris. Vtrum

iam verum erit cheotum Matthiolo? frutex ne
hic descriptus, au dicta iam herba? Ut merito de
stirpium historiis meritis Clusius in hac
verba proruperit. Marth. hunc fruticem pro cneoro
albo Theoph. proponit. Cui verò quale sit
difficiliter indicari possit, cur huius stirpi cneori
nomen accommodare voluerit, multi mirantur.

Postrema Com. editione l. 2. aliud nobis Theo-
phrastii Cneoron adfert, nullis, ut ipsius verbis v-
tan, deficientibus notis. Sed cum nudam tantum
imaginem, addito, cneori nomine oculis subiiciat,
illiusque historiam planè subiciat, si parum huius
ipsius assertioni adhibuerimus, nemo, ut opinor
vitio vertet. Ceterum, addit Clus. nisi in hac plan-
ta, (cuius & ipse satis elegantem figuram exhibet)
acrimonia, quae quidem sensu percipi possit, abes-
set, ad Thymelaeae genera aut ipsi co. generem suf-
fruticem referendam esse censere. Nonnulli
rustici Steinoselin / hoc est, Petra. in Rosul. in
vocat. Nos autem ante monuimus cap. de Thy-
melaeae minore Cordi considerandum esse, an Gesne-
rus hanc fortè intellexerit nomine Laureolar par-
ae, cuius descriptionem ibi posuimus.

Est verò id notatu dignum, quod obseruauit
Myconus, medicus Barcinonensis, rei herbariae
studiosissimus à nullis animantibus, fruticem
hunc attingi aut arrodi. Et cum mille huiusmodi
plantas folijs & floribus onustas viderit, nullam
vquam reperire potuisse asserit, in qua praecisum
aut arrosum aliquid fuisset.

Braun apud Tabern. ponit iconem hoc titulo:
De Bellerophale aut Zeiland cap. Marth. Chamelaeae
species: subiungit duas descriptiones, & pos-
tea duas icones Thymelaeae, de quibus postea.
Casie, quam vocat, Matthioli, descriptionem o-
mittit, quam inuenisset apud Marth. sub Cneoro,
sic parè oculus vno capite diuersas plantas con-
funde nâ se & alios fallit: qui leget caput eius quod
est l. 2. vix intelligat an in descriptione priori
intelligat Cassiam, ut vocat, an Thymelaeam.

Prouenit Cneorum Marth. ut tradit Clus. in
multis montibus Viennae vicinis tantâ abundan-
tiâ, ut rusticae mulieres, dum floribus abundat,
multos eius manipulos in forum venales adfe-
rant, cum aliis variis generis floribus, exornando-
eum tricliniorum gratiâ. Nascitur etiam in Pan-
noniae silvis editiore loco sitis ultra flumen Ra-
bum siue Arabonem. Prope etiam crescit qui-
busdam siccioribus pratis Francusforti ad Mo-
num vicinis, praesertim silva quadam quercubus
confita, circiter miliare infra eam urbem ad sini-
stram fluminis, inter Ericas, ubi illam candidis e-
tiam floribus variantem conspexit Clus. cuius e-
tiam manipulos rusticae mulieres in foro venales
proponunt.

Aprili plerumque florere solet, nonnunquam e-
tiam Maio. Fructus maturus est Iunio. Adèd
autem secundus est hic suffrutex, ut saepenumero
ter eodem anno floreat, nouis floribus semen se-
per consequentibus, quod probè maturum, bis co-
dem anno de vna eademque planta collegit idem
Viennae Austriae.

Camer. testatur Cneorum Marth. sibi in horto
è semine natum: sed non docet an herbaceum in-
telligat, an fruticosum. Duo enim Cneora habet
Marth. eaque valde differentia, si probè meminisse
quae antea scripsimus. C. Bauh. suffruticem intel-
ligit.

Toscanus Carolus pharmacopoeus Burgundus
in Campagniola, diligens stirpium indagator, flo-
re albo & purpureo ad nos misit nomine Balsa ni

alpini, quas in hortum E. C. Moniberg. plantari curauimus.

CHAMÆDAPHNE, LAURVS ALEXANDRINA HIPPOGLOSSVM, RADIX IDEÆ, BISLINGVA, SIVE BONIFACIA.

CAP. XXXIX.

Quandoquidem multi ad Laureolam referunt Dioscoridis Chamædaphnen, ut ex precedentibus liquet, quam ipse subnectit suæ Daphnoides nos cum secuti, hoc loco tradimus eius historiam, addentes & subnectentes hinc *Laurum Alexandrinum*, *Hippoglossum*, *Radix Ideam*, quæ à Diosc. pro quatuor distinctis plantis traduntur, ab alijs verò una eademque stirps existimantur, ac putantur esse, vulgò dicta *Bislingua* siue *Linifacia*. Quod si cui videatur hæc planta interrompere nostrum ordinem, quo similes plantas, quantum fieri pote, iungere studemus: is sciat, facilioris doctrinæ & vitandarum repetitionum ergo nos quasi coactos de ea hic tradere. Habet tamen aliquid in quo conveniat cum precedentibus: videlicet, nomina, baccas, & quod sit fruticosa planta, constans virgis hieme non percutibus.

CHAMÆDAPHNE.

Descriptio. Chamædaphne, quam & *Λαξάδρην* aliqui vocauerunt, autore Diosc. virgas promit singulati ramulo constantes, [μικράδες: decrat in vulg. exempl. Latinum Ruell. ex Plin. Græcam vocem Sarac. ex vet. cod. adiecit] cubitales, rectas, tenues ac lances. Ex huic quoque folia sunt Lauri similitudine, sed multò lauiora (αυτῶν ἄλλα addunt ex veteri codice Lacuna & Sarracenus) tenuiora que ac viridiora: fructus rotundus, rubens, folijs adnatus: [πρὸς φύλλοις ἐπιπλεκόμενος.] Huius folia tria illitaque capitis doloribus & stomachi ardoribus [ἐν τριῶν φύλλων ὀξυπύου vulg. codices habet. Sarac. legit ἰμπεριπλάσσαν & inflationes vertit, ex autoritate Serap. qui est ipse inflationes reddit.] quod verisimile non sit, Chamædaphnen, cuius eadem est, Gal. teste, natura, quæ Daphnoidis & Lauri Alexandrinæ (quas vocat) ardoribus stomachi succurrere: quæ eximio suo calore stomachi potius ardorem excitare debeat. Fuerit autem verò similis illam ut tormina à flatibus concitata, ita & stomachi inflationes discutere. Vbi nam legit Sarrac. Laurum Alexandrinum eximium calorem Daphnoidis habere? Galen. non videtur per Daphnoidem intelligere Dioscoridis Daphnoidem, sed clematidem 2. Præterea non omnes ardores sunt à causa calida, sed sæpius à frigida: facilius potuit esse lapsus Scriptoris, vel Correctoris apud Serapionem, qui scripserit inflationis, pro inflammationis. Plinius etiam Dioscoridis lectionem comprobat. Quæ hæc de re sit Aduers. sententia seu opinio, superius dictum succurrunt. Eadem pota cum vino tormina [ἐν οἴνῳ] sedant. Succus cum vino potus, mentes urinæque ciet: idem quoque subditus in pello præstat. Dixerat autem Diosc. cap. præced. Daphnoidem quoque nonnullis chamædaphnen appellari, de qua Daphnoides purgante ut ab hac chamædaphne differenti paullo antè egimus.

Porro χαμαδάφνη germina tenera, inquit Gal. edi quoque solent. Est autem persimilis vitibus

Daphnæ Alexandrinæ, & cur sanè & quod Daphnoides nuncupant. Quale igitur hoc fuerit Daphnoides Galeni? Certè Daphnoides Diosc. mordet fauces, nec existimamus eius germina à quoquam comedi posse. Quidam [Paulus & Serapio] intelligunt per Gal. Daphnoidem eam plantam, quæ dicitur clematis Daphnoides, & clematis secundum

Plinio Chamædaphne visco ramulo est, cubitali ferè, folio tenui, Lauri similitudine. Semen rubens admixtum: [annexum: melius ex vet. cod. testibus Corn. & CH.] folijs illinitur caput. doloribus recens. Ardores refrigerat: Ad tormina cum vino bibitur. Menses succus eius, & urinam ciet pota, partusque difficiles in lana appositus. Quæ sanè Plinij chamædaphnæ descriptio ita cum Diosc. conuenit, ut ex eo descripta videatur.

Cæterum idem Plin. ubi de Lauri generibus scribit: Est, inquit, & Chamædaphne siluestris frutex, est & Alexandrina [videl. Laurus] quam aliqui Ideam, alij Hippoglossion, alij Daphnion, alij carophyllon &c. quæ postea dicitur sub Lauro Alexandrina.

Merito autem Leonceus Plinium carpit, qui l. 17. Chamædaphnen describit, & eandem l. 24. iterum: eidem plantæ differentes descriptiones afferens. Est enim prior descriptio in Daphnæ Alexandrina, non autem in Chamædaphnæ. l. 4. à Diosc. tradita. Esse verò Chamædaphnen à Daphnæ Alexandrina differentem non solum Diosc. sed Gal. pariter & Paul. ostendunt. Chamædaphne tamen, ut à Diosc. describitur non multum ab Alexandrina Lauro differt: hodie, inquit Cornar. non cognoscitur, si alia & diuersa est ab Alexandrina Lauro.

Chamædaphnen Græcis, quam Vincam Peruinam vocant, Plin. tradit l. 11. c. 11. & c. 27. de qua nos cap. de clematide altera siue Daphnoides. Fortè hæc ipsa fuerit de qua Theoph. l. 3. hist. c. 18. ubi tradit: arborem Euonymum magnitudine esse Mali Punice, atque folio eiusdem, sed maiori, quam Chamædaphnæ. [ἐν χαμαδάφνη: Gaza mox suo audacter lasciuens Vincam peruinam reddit, Relinquendum nomen suo auctori, in re præsertim non probè cognita: sed hoc non nouum ipsi, interpretis fidem excedere.]

Chamædaphne, inquit Apuleius, à Græcis quibusdam *Daphnites*, aliquibus verò *Daphne*, alijs *Hydragogo* seu *Caragogo* dicitur: Itali *Mustellaginem* dicunt, alij *Lactilaginem*: Galli *Engubim*, *Vibem*: In puluerem redacta mollissimum, & in aqua calida potui data aluum concitat. Annotat apud eundem Humelb. Qualis sit herba chamædaphne nos docet Diosc. & Plin. ex quorum descriptione facile intelligere est, non esse vulgò Laureolam Germ. Zyland, neque est herba quam nostri temporis Herbarij Vincam peruinam appellant. Hydragogos Apuleio dicitur, quasi aqua & humidorum subductrix: in vetustis exemplaribus non Hydragogos sed caragogos scriptum est: sicque dici potuit, quod caput, quod Græcè *ἀγὰ* dicitur, à noxijs humoribus expurger. Mustellago nomen à Lauro sortita est, quam Pompon. Leneus, eo quod Mustaceis subijocetur, Mustacem appellauit, ut auctor est Plin. Lactilago dici potuit, quod iucundo sapore, seu Lac in cibi usu aliquando fuerit, quod & Paul. Eg. testatur l. 6. & c. 1. Apuleius potius tenere, nec ex literata scientia, inuicis adeo medicis, chamædaphnen dicit aluum concitare: si ex aliquo auctore id habet, cur non monet; quanquam non putandū, peritum hunc Herbarium pariter ac medicum

Daphne alex.

Galeni, Euc. Clematis Daphnoides.

Chamædaphne Plin.

Parracoditis.

Plin. ad Galen. l. 24. Leonceus.

Clematis Daphnoides sine Pinca Peruinca.

Gaza mox suo audacter lasciuens Vincam peruinam reddit.

Daphnites Daphne.

Caragogo Mustellago Lactilago.

Engubim.

Apuleius l. 6. c. 1.

[si credere fas est] quicquam ab vilo autore mutasse, qui remedia, quæ ciuibus suis, inuitis etiam medicis profuisse iactat, promulgat. At saltem docuisset nos, aut didicisset ipse, si nesciuit egregius Herbarius, quâ in re differat à Victoriola sua, quam etiam Daphnetin, chamædaphnem & Mustellaginem silu. cognominat. Quid si confundat chamædaphnem cum Daphnoide? quod ei non nouum. Dubium igitur relinquatur nobis, quæ sit chamædaphne Apulei purgans, & an eadem cum Diosc. Plin. & Pauli ut censet Hypocritæ.

Hermol.
jugillatur.

Hermol. dum nimium Plinianè scribere studet, obsecro reddat Chamædaphnes historiam ac suo nomine pronunciat, quæ Plin. prodidit: Chamædaphne Diosc. & Plin. quæ sit, non demonstrat Hermol. fugit hos scopulos, quemad. & Ruell. qui suo more ex Hermol. eo non citato sua docerit & suffragatur.

Ruell. pla-
garius.

Chamædaphnem Marcellus humilem & terrestrem Lauri interpretatur, atque Latinis Vincam peruinca dici, ac eius meminisse quidem Theophrastum, sed tam breuiter, ut nihil possit ab eo intelligi, quam ferre chamædaphnem fructum folijs adnatum [ubi autem id scribit Theophrastus locum sanè nondum inuenimus apud eum, & vix credimus extare: neque enim adeo alieni aut peregrini sumus in lectione Theophrasti, ut si hæc diceret non alicubi id obseruassemus: indagandum tamen etiam in posterum.]

Humilis
Laurus.
Theophr.
Laurus.

Apertè & ingenuè Anguil. faterur, nondum sibi perspectum esse, quænam sit chamædaphne.

Amaturo.

Amatus in Diosc. dicit, Chamædaphnem Hisp. Laureolam dictam, affinem esse Daphnoidei, non esse Vnicamperuinca, ut multi falsò reantur, sed aliam herbam cubitalis altitudinis, ut Plin. describit: interim quæ sit illa non docet, unde satis patet ei non cognitam fuisse, præsertim cum nec doceat in quo differat à Daphnoide. Cornar. & Chamædaphnem, & Daphnoidei, utramque, Plinii, Officinis & Herbariis Laureolam vocari tradit. Sed iam antea dictum nobis videri Laureolam Cornario ignoram fuisse. Præterea Chamædaphne videtur à Laureola non parum differre.

Laureola.
Cornar.
reprob.

Et, ut tandem & nostrum iudicium de Chamædaphne dicamus, placet nobis opinio Fab. Columnæ, qui vult Chamædaphnem Diosc. Plin. & Galeni esse *Bislinguam* siue *Vnicamperuinca*, de qua paulò post.

LAURVS ALEXANDRINA.

Huius Theoph. meminit l.c. 17. sic scribens: Illa quoque propria Idæ sunt, Laurus Alexandrina dicta, & Ficus quædam, Vitisque Lauri Alexandrinæ hoc proprium est, quod in folio fructum gerat [*ἐν τῷ φύλλῳ φέρει τὸν καρπὸν*] quemad. & Myrtus silu. seu Ruscus [*ἐν τῷ φύλλῳ φέρει τὸν καρπὸν*]. Vtrique enim fructus ex folijs ipsius dorso [*ἐκ τῆς πλάτης τοῦ φύλλου*] nascitur. Hic obiter Theophrastum ridens Scal. Festiuium vocat *ἡμετέριον*: Nam (addit) Quomodo Idæ fuerit propria Laurus ea, quæ Alexandrina nominatur? Pro Theoph. & pro se responsum habes apud Plin. l. 5. c. 39, quem consules. Idem Theoph. eadem paulò aliter circumscribit, cuius verba Græca lubet ascribere, non ad ostensionem, ut quibusdam id solemne visum, sed quia vel ipsis Latinis sint magis significantia, & nescio præ iis quam *ἡμετέριον* habeant.

Theoph.
Laurus cum
tra Scal.

sic ait: *ἡμετέριον* ὅτι φέρει τὸν καρπὸν ἐκ τῆς πλάτης τοῦ φύλλου. Quorum verborum sensum minùs fideliter explicuit Gaza, sic inquit: fructiferæque nonnulla fructum folijs interceptum vel pediculo tenui cantum gerunt, quales sunt et, quæ ad foliorum insertionem seu exortus angulum, fructum exerunt. Pleniùs ita: Quædam fructifera eo modo, ut fructum veluti sinu foliorum suorum comprehendant. Lenocinium addas cum Scal. molliusculè sic: Quorundam inuolucro, aut sinu fructus obducitur adeò, ut ipsa (folia) fructifera dici mereantur, quemad. Alexandrina Laurus, in folijs vel super folijs fructum ferens.

Gaza re-
probat.

Audiamus & Plin. Est inquit (& chamædaphne silu. frutex: est & Alexandrina, [Laurus] quam aliqui Idæam aliqui Hippoglottion, alii Daphnetin, alii Carpophyllon, alii Hypelaten vocant. Ramos spargit à radice dodrantes, topiarij ac coronarij operis, folio acutiore quàm Myrti, molliore & candidiore ac maiore, semine inter folia rubro. Plurima in Idæ, & circa Heracleam Ponti, nec nisi montosis. Id quoque quod Daphnoide & c. Dixerat autem iam priùs: accedit in topiario opere Taxa [Laurus] exetrescente in medio folio parvulo, veluti lamina folii. Item alibi. Laurus Alexandrina siue Idæa parvis celeres facit, radice pota trium denariorum pondere in vini dulcis cyathis tribus: secundas etiam pellit, mensesque eodem modo pota.

Laurus A.
lexandrina
Plin.
Laurus
Idæa.

Diosc. idem
Laurus
Taxa Plin.

Adeamus Dioscoridem: Laurum Alexandrinam, inquit, alij *ἰδαία*, alii *αλεξάνδρινα*, alii *ἡμετέριον*, alii *ἡπυλλότιον*, alii denique *δαφνέτιον* vocant. Foliis est Myrti siluestris [*ἡμετέριον*] seu Rusci similibus, maioribus tamen, mollioribus & candidioribus: fructu in medijs folijs [*ἐκ τῆς πλάτης τοῦ φύλλου*] Ruell. inter folia: maluit cum Plinio loqui, quàm fidem præstare auctori [*ἡμετέριον*] rubro, ciceris [*ἡμετέριον*] magnitudine. Ramos verò per terram [*ἐκ τῆς γῆς*] spargit (fortè rectius è terra mittit, aut supra terram profert) dodrantes, interdum etiam maiores: radicem similem Rusco [*ἡμετέριον*] maiorem tamen, odoratam & molliorem. Nascitur in montosis. Eius radix succurrit in difficili puerperio drachmarum sex [alij quinque] pondere in vino dulci pota. Succurrit & vrinae stillicidi vexatis, & menses educit. Pro quibus postremis verbis habetur: *ἐκ τῆς αἵμας* Sanguinem extrahit: Sarac. per quem nihil aliud quàm menstruum cum Plin. & Cornar. intelligimus. Illud non omittendum: pro eo quod folijs quàm Rusci maioribus diximus, in Græco haberi *μεγέστερα*. Marcell. vertit minoribus quasi legisset *μεινότερα*: sed malè, adstipulante etiam Cordo, immò Plin. quoque & Serapione, hoc speciatim, qui Lauri Alexandrinam & Gar Alexandrinam vocans nihil præter Diosc. & Gal. verba transcribit. Corrupti igitur codices putandi quæ *μεινότερα* habent. Galen. Daphnen herbam vocat *ἡμετέριον* inquit, quam & Daphnen Alexandrinam appellitant, temperatura euidenter est calida, & gustantibus acris simul & subamara, potaque cum vrinas tum menses prolicie.

Menses.

Diosc.
Hippoglot-
tion
Zalaa.

Descriptio.
Diosc.

Difficilis
partus.
Vrina stil-
licidum.
Menses.

Marcell.
idem.

Daphne
herba Gal.
Sapor &
temperam.
Apuleius
idem.

Apuleius cap. de Victoriola sua Laurum Alexandrinam cum Daphnoide confundit, ac etiam, vel suspicamus, Chamædaphnem, ut iam priùs laudis ostensum.

Ceterum Laurum Alexandrinam & Laurum Taxam eandem plures esse cum Hippoglottio & Bonifacia seu Bislingua statuunt: de qua re postea specialius trademus. Cornar. verò negat Laurum. Alexandrinam esse Hippoglottum, sed

Rafinatum
medicina.

Nota.

Def.

Contra-
fieri.

Causa.

Apibus gra-
vifloris.

qui eius vtuntur diluto, quando corpus expur-
gare cupiunt. Expurgat enim, ut dictum, tum
crassos & pituitosos humores, tum & biliosos
& non modo per inferiorem sedem, sed frequen-
ter etiam vomitione, cum magna ventriculi
perturbatione ac molestia. Rusticorum ideo
magis est medicamentum, quam urbanorum: ac
eorum qui crassa victus ratione vtuntur, quam
delicate viventium. Plerique tamen cum Marth.
& Camer. afferunt, corticem aridum mitiorem
esse, & minores molestias excitare: recenti si-
quidem ac nondum reficcato humiditatem quan-
dam superfluum adesse, quæ torsiones adferat
ac vomitiones excitet, ventriculumque pertur-
bet. Taber. ad duplum Rhabarbari dandum sua-
det. Sed malimus paulo inferius subsistere, si
tam forte sit medicamen, ut ille ait.

In multis locis Saxonie hoc tempore vtuntur
loco Rhabarbari, teste Camer. quod interdum
propter immensum pretium non cuius præscribi
potest supponit corrigi & castigari adiectione ani-
si, cinnamomi, spicæ, aut similium. Vulgus Sile-
siorum corticem luteum flore lactis incoquit,
contra scabiem præsentissimum remedium.

Novi tamen, inquit Schuuenckf. eius usu Agri-
colas hydropicos factos & penè suffocatos fuisse,
repentina malignæ materiæ percussione. Ea-
propter ab eius usu abstinendum suadeo, nisi prius
fuerit probe euacuatum corpus. Flores apibus
grati. Folia lætum feruntur bubus, ac præcipue
vaccis pabulum, quæ horum pastu lac reddunt co-
piolius. Ex ligno sagittas parant.

ALNUS NIGRA BACCIFERA, RUGOSIORI FOLIO, SEU MAIOR.

CAP. XXXIII.

Descriptio.
Cortex.

Folia.

Stylus.

PER omnia
maior est
hec species,
caudex, rami,
reliqua: cortex
exterior tenuis
foris cinereus,
intus virescens,
cui alius subest
crassus, in plu-
res diuiduus,
intima facie
quæ lignum at-
tingit, flavus,
lamina verò in
quas deduci
potest, vel cro-
co saturata vel
versicolore, ru-
fio, flavo, fila-
mentisque al-
bidis, sapore a-

maro. Folia, quam in vulgari Alno nigriora, mul-
to ampliora, palmo longiora, duas vias & se-
missam lata, subrotunda, rugosa, atrouirentia,
splendida, crenata. Flosculi bini simul aut singu-
lares ex petiolo non longo adhaerent, colore her-
baceo, in quatuor lacinias mucronatas diuisi, co-
ridem apicibus virescentibus interiectis, stylo in
tria cornicula extrorsum reflexa dissecto.

An Lonic. Creutzbeer seu Rh. mini Diosc. 1. spe-
cies? Eius icon huic nostræ quadraret, si hanc

numerofiores non essent simul iunctæ. Rhamnus
esse non potest nostra Alnus quia non spinosa:
is etiam suam spinosam negat, & tamen cum Rha-
mo in idem cogit caput, nescit forte quid scribit,
nec cuius plantæ iconem exhibet non enim de-
scribit.

Prope S. Hippolytum, Burgundorum asperis lo-
cis, montosis, soli meridiano expostis, provenit.
Observauimus etiam inter Basiliæ & Loffe eius-
dem Burgundie montosis locis ad Dubim, & iux-
ta castellum Mebe: item inter Cerenol oppidum E.
C. Witt. Burgundicum, & Baulme itidem monto-
sis & lapidosis. Nec non prope Cernam illam
admirabilem Passavantium in Eiusdem C. Wir-
temb. ditione sitam, [in qua æstiuissimis æstatis
reporibus glacies concrefcit] quæ eadem Principi
curram plenum reditu annuo debet Montbelgar-
dum deferenda, ad vinorum refrigeria æstiuis ca-
nicula diebus: hyeme verò liquefcit glacies, &
cauerna calet, cum extrinsecus omnia rigent gla-
cie ac niuibus.

Autem S. Hippolytani ligna colligi ad puluerem
bombardicum parandum, eorumque carbonem
ad eam rem vehementer commendari prædicat.

DAPHNOIDES ET LAVREOLA.

CAP. XXXIV.

Antequam Laureola, n vulgarem folio per-
petuo proponamus, quæ accedit ad Da-
phnoidem Veterum, si non eadem: placet prius
generalia & Veterum placita de ea præmittere.

De ea igitur sic scribit Diosc. Daphnoides ali-
qui Eupetalon, alij Chamadaphnen, alij e. l. n. vo-
cant. Exiguus frutex est, [quatuor] cubitalis, ra-
mis multis a medio sursum versus fori modo flexi-
libus & obsequiosis, iisque foliosis. Ramulos
vestiens cortex supra modum viscosus est: at fo-
lia sunt Lauri, verum molliora, fractaque contu-
macia, quorum gustatu os faucesque mordentur
& accenduntur. Flores candidi: fructus cum e-
maturuit, niger: radix superuacua. Nasceitur
in montosis. Sed in Diosc. lectionis varietas oc-
currit. Basil. & vulg. codices folia huic Lauro
ixætra: Vet. cod. autore Lacuna ixætra habet,
quod magis placet. Nam & Plin. quoque Daph-
noidem crassiore, mollioreque quam Laurum fo-
lio esse prodidit, ut mox patebit. Quin & Serap.
ixætra potius, quam ixætra legisse dicas, si ad-
uertias eius interpretem tenaciora conuertisse.
Marcell. validiora vertit, minitum veterem le-
ctionem secutus, quæ naturæ foliorum Laureolæ
vulgò dictæ magis conuenire videtur.

Plin. l. 16. c. 30 de Lauri generibus tradens: Id
quoque, inquit, quod Daphnoides vocatur genus,
in nomen ambitu est. Alij eam Pelasgum, alij
Eupetalon, alij Stephanon Alexandri vocant. Et
hic frutex est ramosus, crassiore, [graciliore, Dal.]
ac molliore quam Laurinis folio, cuius gustatu
acceditur os atq; guttur: baccis è nigro rums. Idè
& alibi præter hæc nomina & siluestrem Lau-
rum dici ait. Quidam legunt: baccis nigris & rus-
fis: nigris vel rufis: Vet. Dal. At si vulgatam le-
ctionem retinere lubeat, dicere queas Plin. de
baccis nondum perfectè maturis intelligendum
esse: alioqui nec rei nec Dioscoridi consentiret.

De Laureola nihil Theophrastus, nisi forte hæc
quæ habentur l. 9. c. 15. Nasceitur apud Arcades
Elleborus uterque, albus & niger: item de e. n. de
e. n. c. 15. (Sic enim legimus & distingui-
mus apud Theoph.) ad est. Daucus, Daphnoides
croceæ:

Locis.

Contra-
fieri.
glacialis
media æst.Vires &
vires.Daphnoides
Eupetalon.Vires.
Daphnoides
Diosc.Folia.
Lauri.
fracta.Diosc. l. 1.
emend.Pelagum.
Eupetalon.Silo Lau-
rum.Theophr.
emend.

Crocea: Gaza n. *daquoidis* non separat à *dauco*, sed Dauci siue Pastinacæ speciem facit. Cæsalp. quoque ad Daucum siue Carotam refert, ut dicetur suo loco de Pastinaca: Marcell. & Curtius, ut in sequentibus patebit, intelligunt Daphnoidem, diuersam omnino plantam à Dauco.

Hist. Lugd. scribit: Albam seu feminam Laureolam nostram, Daphnoidem alteram esse ignoraremus, si Theoph. aperte non docuisset Daphnoidis esse genera duo, fructu præcipue distincta, qui niger in altera est, in altera Croci colore, nempe staminum, quæ a flore Croci auulsa reconduntur, non autem Croci liquore diuti, ut merito hæc Daphnoides, crocea nominari possit. *Hæc illa*: Nobis autem nondum occurrit adhuc locus, ubi Theoph. meminerit Daphnoidis nigra.

Sed quam aut qualem Daphnoidem intelligit Galenus? quando l. 6. simpl. sic ait: Chamædaphnes germina tenera ediquoque assolent. Est autem persimilis Daphne Alexandrinæ sicut sanè & quod Daphnoides nuncupant. Certè non existimamus eius germina posse edi, si eandem cum Dioscoride intelligit. Dalech. sententia fuit Galeni similitudinem Daphnoidis cum Chamædaphne & Lauro Alexandrina ostendisse absque Diosc. testimonio, sic tamen ut ei fides constet, si vel *daucoides*, accipiamus non quidem vlcera-tem & vrentem fruticem Laureolam nostram, sed Clematiden Galeni secundam, quam paulò post *daucoides* etiam vocari testatur. Ambabus enim vis est astringens & sicca. Vel si parem vtriusque vim, Chamædaphnes, inquam, & Daphnoidis cathartica, in prouocandis tantum mentibus intelligas: mentes enim & hæc & illa ciet. Proprio capite ostendemus clematiden secundam specie dici à Diosc. Gal. & Plin. Daphnoidem.

Apuleius more suo nominum fasciculum confarcinat, sic scribens c. 58. Herba Victoriola, Euphelios Græcè, Daphnoides, Hypoglossion, Eupetalon, Diglossos, Nycephyllon, Pelleon, Idæa Daphne, Samothracia Daphne, Alexandrina Daphne, Mittrion, Danaë, Stephane Alexandru, Chamædaphne, Carpophyllon, Daphnitis, Latine Peruinca, Victoriæ folium, Laurus Alexandrina, Macedonica, Laurago, Mustellago terrestris vocatur. Et addit: frutex est sapiens cubitalis, folijs ut Myrtus, [in omnibus exopl. sine intellectu legebatur, muria: nos reddimus Myrtus. Humelb.] paulò maioribus, & non infractis, id est, non facile fragilibus, sed lentis. Hum.] gustu remordentibus & incendiis. Herba Victoriolæ folia pinsabis, & succum eius cyathis duobus dabis cum melle bibere ieiuno, mox phlegmata intercider. (hoc est, dissiciet, dissipabit, deducet, purgabit. Hum.) Quod si prædictorum nominum rationes scire cupis, tradit eas idem Humelbergius in suis ad Apuleium notis.

Nobis sanè Apul. diuersas plantas confundere videtur: inter alias Daphnoidem, Laurum Alexandrinam & Peruinca, cum in nominibus, tum in descriptione. Potissimum tamen videtur nobis scribere voluisse de Daphnoide, quod apparet ex descriptione cum ait, folia incendiola: & ex viribus, si interciderit interpretandum ut Humelbergius vult. Fuchf. tamen aliter sentit: Victoriolam Apulei existimat Laurum Alexandrinam, & hanc cum illa confundi ab Apuleio. Profectò Apul. posset creare temerarijs magnum periculum. Si intelligit Laurum Alexandrinam, de eius sacro dari posse concedimus: verum non duos

cyathos, ut ille vult. De daphnoide verò nequam. Quis enim plenos præbeat cyathos eius lucci, cuius foliorum aut corticis masticatum absque magno incendio lingua & fauces ferre nequeant? Verissimè in Apuleium retorqueri potest, quod scribit in præfat. sui libri aduersus medicos: nimirum eius scripta de medicaminibus herbarum, earumque viribus, esse vendicationes potius quàm curas: ipsumque inertia plerumque & imperitiâ enixum, lucripetam verum, aut sine literata scientia, de qua se iactat, temerarium nuncupandum, quiq; adeò ipsis sauior morbis existat. Ipse enim tantâ & tam supina quadam imperitiâ & temeritate, confundit plantas & earum vires salubres cum insalubribus, cum immenso vrentium periculo, ut ex hoc loco & alijs quamplurimis hoc opere detegendis patebit, ut satius fuisset, si obsceni sui Atini metamorphosin suæ sortis hominibus explicasset, quàm in re tam sacra, hominumque vrbis adeò necessaria temerarium & iactabundum suum iudicium & stylum adhibere. Apage verò pestilētes hos scopulos. Nos certiora meditamur tutioraque. Discant verò interim herbarum & medicinarum Studiosi, nullibi huic herbarum alieno Commentatori temerè fidendum esse, donec illud clariùs & ad oculum cunctis patefaciamus.

Ipse verò etiam Humelbergius nobis non videtur melius intellexisse historiam Daphnoides, quàm Apuleius, dum asserit, Laureolam & Zyland esse, & talem quidem, qualem Apul. describit, eecur non delectat quàm Laureolam intellexerit, folio perpetuo an deciduo? Quæ propriè Laureola dicitur, ignota est Cordo: quæ folio deciduo, eidem est Thymelæa, Fuchfio verò Daphnoides & Zeilant, quam suspicamur Humelburgium intelligere. Quicquid illa, neutra conuenit cum descriptione Apulei. Neutra enim folia habet Myrtæ vllatenus similia: per Myrtum autem apud Apuleium intelligimus liluestrem, id est, Ruscum: quæ similitudo cum Rusco non tribuitur à Veteribus Daphnoidi, vel Laureolæ, sed Lauro Alexandrinæ: præterea in Laureola folio deciduo, folia non sunt lenta, sed facile fragilia. Neutram Laureolam coronis adhibitam fuisse censemus, & Laurum Alexandrinam potius in eum usum vocatam, quàm malignæ illæ plantæ. Hypoglossum male dici de Daphnoide, clarum nobis videtur. Si quis consideret Apulei caput 27. de Chamædaphne, hanc cum à Daphnoide distinguere vix ammaduerteret. Carpophyllon non potest dici de Daphnoide, quod id nomen proprium sit Lauro Alexandrinæ & Rusco. Hæc fructum supra folium gerit; non illa. Peruinca quoque vocabulum minime Daphnoidi conuenit, ut apparet ex Plin. sed clematidi secundæ, quæ etiam Chamædaphne dicitur. Cur Apuleius Mustellaginem terrestrem vocauit suam Victoriolam, cum tamen aperte scripserit c. 27. Chamædaphnen dici Italiam Mustellaginem?

Sed quid multis stirpium ignorantissimo refutando inharemus? Audiamus Serapionem. Laurus Daphnoides: Est & Gar species alia, quæ dicitur Daphnoides & ex Diosc. Ortus eius [ali] & rectius. Virtus eius, sicut Chamædaphnes, & ex Galeno.

Hermol. de Daphnoide pauca habet hæc. Daphnoides & ipsa Laurus sulu. Herbarij nostri Laureolam & hanc & Chamædaphnen Diosc. vocant. Folio huius crassiora Plinio quàm Laurus, graciliora Dioscoridi: cuius verba mihi nō videntur, quibus dicitur: Alypo similem hanc herbam

Censura
Apulei.

Humelberg.
taxatur.

Neque car-
pophyllon.

Gar.

Laurus f. l.

Chamæ-
daphne.

Daphne
Alexand.

Daphnoides.

Clematis
Gal.

Herba Vo-
ictoriola.

Diglossos.
D.

Non temere
fidendum
Apuleio.

Alypoides.

elic, floribus Nymphaeae. Inuenio & qui Alypoides hanc vocent. Hec ille. Verum non docet quam plantam per Laureolam intelligat.

Laureola.
Ruell. in
Diosc.

Non Laurum, inquit Marcell. in Diosc. sed Lauri formam & speciem: neque eam toto corpore, Verum in folijs & fructu tantum habentem herbam Graeci *Daphnoides* dixerunt. Laureolam vocant. Explosumus quod à capitis principio apud Diosc. statim legebatur Alypo simile *Daphnoides*: & florem Nymphaeae habere: & quod sequitur: in medio floris esse Cono simile quiddam, in quo semen: quoniam non responderent *Daphnoidis* historiae, & nullibi in antiquissimis Graecis & Latinis ea legerentur, & paulo post de flore eius, legitimo loco ageretur. Nasci multum *Daphnoides* hoc Theoph. in Arcadia testatus est, numeraturque ab eo inter ea quae praecipuam purgandi vim habent. Caterum non videmus cur Marcellus *Daphnoidem* dicat herbam, cum existimet Laureolam, quae frutex bicubitalis & maior interdum, & ipse Diosc. dicat *Laureola*. Addendum & illud: *Daphnoidem* à Theoph. non solum numerari inter purgantia, sed etiam inter alia non purgantia. Ruell.

A Theoph.
inter pur-
gantia re-
lata.Marcell.
not.

Ruell. caten.

Ruell. *Daphnoidis* historiam non illustrat, sed cum Hermolao, cuius consuetudo sibi more verba transcribit, non citato eo, dicit Herbarios nostros appellare Laureolam, eiusque descriptionem subiungit, non ad ipsam plantam factam, sed ex Diosc. in litteris repetitam.

Stephanus
Alexandri.

Curtius notat Alexandri Stephanon à nonnullis vocari, quod à Alexander Magnus coronari solitus sit. Hic volumus Antiquitatum studiosos exerceri, nos certe ipsi, abique autore, non credimus. Sic & de eadem *Daphnoide* ex Veterum pl. citis historiam pangit, ac si sua essent, non dignatus citationis honore, quod plagium est. Sed quid ille curat, qui passim plagio ita attritus, ut iam dudum derisum contraxerit calum. Nunc Laureolam nostram vulgatam describamus.

LAUREOLA SEMPERVIRENS, FLORE LUTEOLA.

Descriptio.



Folia

Laureola Recentioribus dicta ad cubitos duos & altius grandescit, stipite lento, aliquando simplici aliàs in ramos aliquot diuiso, quem subcinereus tegit cortex, & fractu contritax, & flexuosus: folijs ferè nudis, quae circa fastigium potissimum gerit, eaq; satis frequentia, Laureolam æna-

Flores

la, nec per hiemem asperitates caduca, ex angustiore principio seu ceruice sensim dilatata, tandemque in macronem desinentia, crassa, glabra, nigricans, splendens, Laurinis ferè similia, sed mi-

nora, inter quae longiusculos, graciles, caues & multos stellatos proferit strobilos luteos, [Diosc. virore subcandicantes: Lob. ex herbaceo albos vel luteolos] succedentibus baccis, glomeratis proximè ad ramos coherentibus, lumperinis paribus, nonnihil oblongis, primùm viridibus, per maturitatem nigris, nucleo intus duro, cannabis semine paulo longiore, medulla interiore candida. Radix subest in aliquot partes diuisa, longa, crassa, lenta, quae difficulter euelli potest. Sapor toti frutici feruidus.

Bacca.

Nucleus.

Radix.

An Hermol. Herbariorum Laureola, cuius verba paulo ante citata.

Scribit Marcellus *Daphnoidem* Diosc. nostrae aetatis peritiores Herbarios priuatim Laureolam vocare, ac ostendere Laurinis folijs surgentem à terra surculosum fruticem confertis coaceruatilque sub folijs seminibus, quae Laurinarum baccarum figurae sunt, nigris maturitate. Florem videre non licuisse. Quod si Marcell. intelligit Laureolam quam nos hic, haec repugnant. 1. Quod non sit herba, qualem ipse dixit *Daphnoidem* (ut ante dictum) praeter ramentum Diosc. 1. flores non candidi. 2. radix non inutilis, quibus notis designatur à Diosc. *Daphnoides*. An etiam huius nostrae folia molliora sint Laurinis, ut de sua *Daphnoide* Diosc. ait, dubitamus.

Marcell. r.
prob.

An Ruell. hanc pro *Daphnoide* & Laureola Herbariorum intellexerit, vix sciri potest, quia Laureolam imaginariè, nec tibi visam aut cognitam describit, ut dictum prius.

Candidè & aperte Cordus & Recentiores Laureolam vocant, quae in nostris vix non habetur, nec ego quae sit compertum habeo. Hic Germanus fuit sicut & Cornar. ipsi cozuus, qui tamen duobus distinctis locis apud Diosc. magna securitate tradit. *Daphnoide* Officinis Laureolam vocari: Germ. *Zeilant*. 1. cap. seq. Officinis & herbarijs *Chamaedaphne* etiam Laureolam vocari. Et postea inferius alio cap. ait, esse hodie apud suos, qui cum *Daphnoide* *Chamaedaphne* confundant, eundem *Zeilant* appellantes: qui sanè non rite nobis videtur distinguere has plantas: & ut verum fateamur, nescimus quam Laureolam intelligat pro *Daphnoide*.

Officinis
ignora.

Monachi quoque Laureolam vulgò dictam *Daphnoidem* vocitant. Ac eos (inter quos Pandectarius) hallucinari scribunt, qui Laureolam volunt esse *Mezereonis* speciem.

Pandect.
error.

Quin & Anguil. *Daphnoidem* ait hodiè vocari *Laureolam*, *Oliuellam*, *Oriolam*, & notissimam esse in Italia.

Oliuella.
Oriola.

Chamaedaphne, inquit Matth. quam Laureolam marem plerique vocant, folijs ac fructu à *Daphnoide* non longè differt: verum haec tantum intercedit differètia, quod *Chamaedaphne* singulari rectoque caule constat, cui folia circunquaque prominent, adeò ut in cacumine in orbem umbellae instar dirradientur, semine inde prodeunte *Daphnoides* modo. Hae Matth. cuius icon habere videtur aliquid commune cum Laureola folio semper virente, Sed quae hic tradit non distinguunt à *Daphnoide*. In Epit. nullam ponit descriptionem praeter Diosc. & iconem, scribens Italis dici *Laureola minore*. In Com. cum magnis con. Lat. & Ital. aliam ponit iconem cum folijs acutioribus & tribus virgis additis floribus. In hist. Germ. omisit & iconem & descriptionem Diosc.

Laureola.
mat.
Chama-
daphne.Matth. ad-
modum Sa-
cras in hist.
Laureola

Camer. in sua Matth. epitome posuit iconem iam dictam cum tribus virgis, addens, sibi repertam similem aliquando plantam in montibus

Chama-
daphne Ca-
mer.

Daphnoides. Silesia altissimis versus Morauiam, sed folijs crassiss, duris, & caule satis denso, baccis nigris. Quapropter verisimile esse, potius ad Daphnoidem referendam: nec immerito de hac stirpe, & inquam incognita, nonnullos dubitare. Idem in hist. Germ. ait, prouenire cum baccis nigris, folijs latis, in quidam montanis locis prope Lacum Lemannum & ad Rhenum: videri speciem Chamædaphnes Matthioli.

C. Bauh. apud Matth. Chamædaphne, inquit, Matthioli: Daphnoides seu Laureola Lugd. de qua stirpe nonnulli dubitant tanquam de incognita: alij tamen ad Daphnoidem referunt: suspicantur Matth. Laureolam Offic. exprimere voluisse. *Hæc ille:* ubi incuria typographica pro Chamædaphne, posita icon Lyimachia siliquosa specioso flore.

Matth. var. Ut liberè dicamus, quod sentimus, videtur nobis Matth. non nouisse discrimen inter Laureolam folio deciduo, & folio semper virente, atque adeò nesciuisse, quas plantas suis nudis iconibus proponeret. Si pro Chamædaphne intelligit Laureolam semper virentem, id sit cum summo periculo. Quis medicinae peritus volet exhibere ad ardores stomachi mulcendos, & sedanda tormina, menses & vrinas ciendas, & in pectus (ad quæ omnia Chamædaphne commendatur) tam feruidam & malignam stirpem, qualis Laureola; Ea præterea non respondet descriptioni: fructus non est *ipud* r, ruber: nec *ipud* r *is* quibus *ipud* r *is* habet.

Lacuna var. & Lonic. Lacun. iconem Matth. proponit nomine Chamædaphnes, dicens, vocari Laureolam marem, non demonstrans quæ sit, aut qualis. *Cæcus cæcum sequitur.*

Eadem censurâ dignus Lonic. qui Chamædaphnes iconem Matth. proponit, nihil addens de suo: sed cautè euitauit hos scopulos: melius tamen suæ existimationi consuluisse, si Diosc. & Matth. citasset, ex quibus sua assumpsit & transcripsit nullo plagij metu. Videri nempe voluit probè nouisse sibi ignoram stirpem.

Daphnoides Dod. Laureola. Eupetaly. Pipera. Dod. var. Dod. eandem facit cum Diosc. sic tradens: *Latini posteriores Laureolam dixere. Vocatur & ὑμνιτάν ac πύλαι.* Huius baccas Piper montanum ab Italis nuncupari, sunt qui affirmant: alij à Germanis etiam Zeilande dictum volunt.

Am. Idem putat Theoph. Cneorum nigrum esse posse, folio siquidem Myrtum satis refert: (quod ei nunquam concesserimus) & ramosam, [sæpè etiam vnicaulis est] lentam, obsequiosamque stirpem, albæ radicis, absque odore, fructu nigro, quæ potissimè notæ sunt Cneori nigri Theoph. Nos pro eo etiam proponemus suo loco. Placet alioqui Dod. figura, quam hic proponimus, quanquam magna ex parte vnico caule à nobis sit conspecta.

Locus Gesn. in horto ait Laureolam seu Daphnoidem spontè circa Lacum Lemannum nasci folijs ferè Lauri, angustioribus, solidis, gustu feruidis. Item in append. Daphnoides, inquit, & Sabaudia missum, ubi ad Lacum Lemannum spontè prouenit, autumnio superiore plantatum viret adhuc, sed non satis lætum & tenuioribus folijs, quæ ad Daphnoides nostrum vulgate ferè accedunt. Quibus verbis sanè duas species insinuat, hanc ut putamus, quæ Sabaudica, & per vulgate eam quæ folio deciduo.

Cronemb. ad pilulas Mezereonis Pandectarium & Dinum reprehendit, qui Mezereon putarint Laureolam esse, vt copiosius postea dice-

mus in hist. Laureola folio deciduo. Nos verò per Laureolam cuius mentionem facit Cronemburg. existimamus intelligendam, quæ perpetuo folio.

An eandem intelligit censor Apollo quando ita insit Rad. 1. Serap. & Mesues non implicant cū Mezereo Laureolam & Loriculam vulgi, cuius historiam reddidit Diosc. 1.4. Daphnoidem dictam non admiscunt: quanquam Matth. nescio quâ mente huic capiti insitam asserere audeat: eius enim reminiscitur Serap. cap. de Lauro: Mesue dicitur &c. Præterea in commento Daphnoidis, Matth. vt etiam Fuchs. aliud esse Mezereon à Chamælea scriptum reliquit: huius verò sententiæ immemor, cap. de Chamælea, idem esse Mauris Mezereon, quod Chamælea, Thymelea ac simul admixta Laureola, comminiscitur.

Idem Apollo rad. 10. Daphnoides Offic. Laureola ex Diosc. Laureola famina medicamentariis. Verum Apollo ita irradiat nobis, vt non possumus asserere, quæ sit eius Laureola, nedum intelligere de qua planta loquitur.

Apoll. var. Lob. & Pen. Daphnoidis siue Laureolæ vt nomenclatio, sic natura prosum Pusillam Laurum imitatur, vt plebecula vix conspectam dicitur Laurum. Vbiuis ferè Germaniæ, Galliæ & Angliæ, præsertim Mulomedicis & mulierculis clinicis nimis quàm nota, vt mirum sit Commentatorem Senensem tam ieiunè & manca descriptione hanc designasse, certo indicio ignorationis: quippe figura quam nullis floribus dat, fortè Mezerei Germanici surculum refert potius quàm Laureolam.

Matth. var. Lob. Obs. Daphnoides siue Laureola, Germanicè Zeiland: Gall. Laureole, Ital. Oliuella: perperam Thymelea Tragi. Sed fallitur Lob. non enim Tragus hanc posuit de qua hic agimus pro Thymelea, cuius nec icon nec descriptio hanc nostram ostendit. Clusius scribit Pyrolæ fruticantis folia carnosæ, supernè saturatiùs virentia & splendentia Chamædaphnes, quam vulgus Laureolam vocat, folijs, formâ & magnitudine propè similia.

Schuenenckfeldius Chamædaphnen Clusii quæ perpetuifolia est cum alia confundit, vt postea dicetur.

H. Lugd. var. Hist. Lugd. tradit Dale champ. cum Dodon. Laureolam Offic. siue Laureolam marè Diosc. Daphnoidem esse rectè censuisse, quæ Matth. sit Chamædaphne. Hisp. Laureola. Iconem quoque habet Chamædaphnes Matth. titulo Daphnoidis seu Laureolæ: habet & aliam titulo Daphnoidis seu Laureolæ cum flore: & cap. sequenti pro Laureola folio deciduo cur posuerit iconem Dodon. titulo Laureolæ cum fructu, nec nos scimus, nec illa excusabit: erat enim ponenda pro sempervirente. Sed ita euenire solet de sibi incognitis commentantibus.

Tabern. Bellerbale Germanicè vocat.

An Cæsalp. Daphnoides Italis Laureola dicta?

Daphnoides Cæsalp. Gignitur magna ex parte in siluis ac montibus vmbrosis incultis & frigidiusculis. Tamen in Italia circa Patauium obseruauimus inter montem Gemulam & di-venda, necnon in huius descensu versus Balneum Aponense, sed quæ & ipsa loca frigidiuscula sunt respectu reliqui tractus. Florebat mense Februario stoculis paruis lareolis stipata. Vidimus etiam Patauii, Verone, Ferratiæ, & Bononiæ in hortis cultam. Genevæ circa Castellum la Bassie dictum iam Decembri florere incipientem, ubi & Feb. & Martio aliàs florere solet Basileæ prope Dornacum, & in horto D. Th. Zuïng.

Laureola
non est Me-
zereum.

Laureola
vulgi.

Matth. re-
preh.

Fuchs. var.

Apoll. var.

Matth. var.

Tragusula
contra Lob.

H. Lugd. var.

Daphnoides
Cæsalp.

Locus.

Tempus.

Semia.

Zuingeri, ex quo & Montbelgardum in hortum transtulimus, ubi & floruit & baccas tulit. In Burgundicis etiam montibus aliquot obseruauimus, unde etiam transtulauimus. Iam prius dictum apud Lemanium lacum reperiri, & non paucis iuxta Rhenum ac Mosâ locis. Flores, inquit Dod. prematurè germinant, paulò post Autumnû æquinoctium: hyeme aut primò vere perficiuntur: fructus Maio & Iunio Lob. auctores: media æstate etiamnum virent, denuum æstatis fine & aduentante Autumnò maturitatem assequuntur, & nigrescunt. Tota hyeme viret, foliaque obdurant, vt in cæteris stirpibus perpetuò virentibus.

Vires & vus.

Et si pro certo & indubitato asserere non possumus hanc esse ueram & genuinam Diosc. & Plin. Daphnoidem, reclamantibus superscriptis aliquot notis: quia tamen vires ab iisdem traditæ apprimè huic conueniunt, lubet easdem hic recensere. Folia gustatu os faucesque vellicant & inflammant. Eadem seu arida, seu etiam recentia potu pituitosa per alvum deliciunt: vomitus quoque ac menses cient: quin & commanducata pituitam à capite extrahunt, & sternutamenta mouent. Ceterùm & quindenæ ipsius bacca potè, purgat. Paulò aliter Plin. Daphnoides, inquit, (huc his nominibus quæ diximus) silvestris Laurus prodest, alvum soluit, vel recenti folio vel arido, drachmis tribus cum sale in hydromelite manducata. Pituitas extrahit folium & vomitus, stomacho inutile. Sic & bacca quinquè denariis, purgationis causa sumuntur.

Purgans.
Vomitorium.
Menses.
Capit. p.
rulla.Plin. Germ.
L. 10. de fer.
ditur contra
Sarc.

Sunt tamen qui Plinii lectionem ad Diosc. aptandam & emendandam censuant, vt Sarracenus. Nos sanè in Plin. nihil præter rationem dictum inuenimus. Nam & stomacho incommodam hæc plantam censemus, insignis suæ acrimoniæ & ardoris gratiâ, & quinas baccas malumus quàm denas, has quàm quindenas, purgationis ergò exhibere: quòd vel paulò maior dosis in talibus nobis semper suspecta videatur, præsertim cum Dei beneficio mitiora tutioraque habeamus.

Causa.

Tèperam.

Corrosio.

Laureolam certè Dod. in Hist. Gall. calidam & siccam ad tertium gradum, accedentem ferè ad quartum tradit, subuicere admodum ventriculum, inflammare, lædere, & adurere partes internas. Folia eius corrigi & ad sumendum commodiora reddi eo modo quo Chamæla. Idem in Hist. Lat. temperie & facultate similè facit Chamæla Germanicæ ca vniuersa suâ substantiâ acré & feruidam esse. Vt non temerè sanè hanc præscripserimus, propter insignè eius acrimoniam.

LAUREOLA FOLIO DECIDVO, SIVE MEZEREON GERMANICVM.

CAP. XXXV.

Descriptio.

Radix.

Fraga.

Cortex.

Lanugo.
Lignum.
Flores.

QUæ verò deciduo est folio Laureola, frutex est interdum ad trium cubitorum altitudinem excrescens, radice in aliquot partes diuisa, minimi digiti crassitudine, vel etiam crassiore, longâ, atque se demittente, albâ, ex qua assurgunt plerumque virgulæ singulares, lentæ, teretes, tenues, obliquiolas, cortice duplici testæ, exteriore cinereo, tenui, fragili, interiore exterius virente, interius albicante: valdè lentæ, & fractu cõrumaces, lanuginem quandam bombycinam, dum diuelluntur ostentantes, cui subest lignum candidum, solidum, medullâ pauca præditum. Flores ad ramulorum latera sine pediculo, nunc singulares, nunc plures simul iuncti, ex nodulo



ante folia prodeunt pulchelli, ex rubello purpurascetes, colore ad flores Perticæ accedentes, oblongi, in quatuor foliola mucronata reflexa diuisi, odore suau: in medio staminula aliquot crocea. Folia ex tuberculis plerumque plura simul, colore herbaceo, Laureolæ folio perpetuo ac-

Folia.

Bacca
& nucleus.Oder & sap.
per.
Chamaela.
Cilibraca.
Oleaster.
Oleago.
Olivella.

Mezereon.

Ruell. re.
prehendens
reprehendi-
tur.
Multiplum
eius error.Brunfels.
Iomnium.Brunfels.
Iomnium.Cardi opus
erronea.
Thymela.
Mezereon.
Coccognidum.

cedentia, molliora, nec vt illa, splendecantia. Bacca cum maturitate rubentes, quæ relictae, nigricant, (inquit Dod.) quarum interior nucleus Canuabis semini similis, medulla candida. Tota planta vt odore graui est, exceptis floribus, ita sapore acerrimo & vrentissimo. De hac Ruellius sic scribit: Chamælam Romani Cilibracam, alij Oleaginem vel Oleasterum vocant. Olea Cilibraca vocatur auctore Colum. sed Calabrica legendum puto. Recentiores Olivellam appellat: Olib. Mezereon, quasi læthalem & viduiferam. Olivella surculosa fruticat ramis palmaribus, folijs Oleæ similibus, tenuibus, amaris, quæ gustata linguam acriter mordent, faucesque ac guttur vellicatu lacessunt. Lacte manat copioso, animalibus cunctis intacta. Baccas fert si bene memini virides, per maturitatem ex parte rubescentes. Ex hac granum Cocci plerique falsò nasci existimauere. Recentiores Chamælam cū Thymelæa, & vtramque cum Daphnoide rucpiet confundunt. Hac ille: qui dum alios reprehendit, seipsum accusare videtur: dubitamus an vllam harum plantarum nouerit. Fortè intelligit nostram hanc Laureolam folio deciduo. Non conuenit tamen, quod ait lacte manare copioso: nec etiam Chamæla est, multò minùs Olea Cilibraca Columellæ. Quando folijs Oleæ dicit, & postea baccarum rubrarum meminit, Chamælam cum Laureola confundens, neutram sibi cognitam fuisse satis clarè prodit.

Brunfels. nescit quæ scribit Tom. 7. dum Laureolam Teut. Bellerophals dici ait, Græcis Daphnoiden, flores illi candidos radicem inutilem: passim per siluam. Et cap. sequ. Thymelæam vel Coccum Cnidium quoque Bellerophals vocat, floribusque esse candidis. Quis hanc incuriam ferat? Dioscoridis descriptiones sublegens cum Bellerophals Germanorum confundit, nec docet quæ ea sit: nec existimamus reperiri Laureolam flore albo in Hæcynia. Vbi quis fide dignus monuerit, aut miserit, credemus.

Cordi opinio non opus habet longa refutatione: ipsa per se satis ruit, quando apud Diosc. tradit Thymelæam quoque Mezereon & Coccognidium, & grana quoque Mezereon vocari: nimirum nostram Laureolam vult esse Thymelæam, & sequè cap. hanc fruticem esse dicit quem Germ. Zebast & Bellerophals appellant, ex quo Granum Cnidium colligatur, quod etiam Coccognidium vocitetur. Quasi verò.

An Cornac. Thymelæa ex qua granum Cnidii, Olib.

Corresponden-
cia.

Trans
cage.

rum attentum fuisse, dum floribus quidem Meze-
reoneum vlitatum, seminibus aut fructibus Thy-
melzam representat.

Sylvius Mezereon Mesue Thymelzam rectis-
sime decessit.

*Pandell.
confusa.*

Laureola.

*Daphnoides
II Florent.
error.*

*Arabum la-
bei deterf.*

*Lactariarum
maxima.
Lactari-
um mayon-
Monachum
crepantur.*

Pandectarius Simonē Genuesē redarguens c. 124
hanc malē Laureolam cōstituit: deinde c. 170. eos
improbat qui Coccognidiū [quod aliās semē Me-
zereonis dixerat] semē Laureolae putant. Amplius
c. 483: difertē Laureolam Laurum Alexandriæ &
Daphnoidem interpretatur: vnde manifestum fit
quantoperē sibi dissideat. Simili quoque errore
D. Florentinus includitur c. 1. in Mes. commen-
tans: Vterque facili hinc arguitur, quod Diosc. di-
uerfa capita omniū earū herbarū instituat, quodq;
Arabes omnes (Si Serap. excipiamus) Mezereonem
copioso lacte manare scribant, quod tamen
nec profert Laureola, nec etiam Mezereon vul-
gare. Et quamvis Mesue Lactariarum maximam
dixerit, & Auic. Lacticinium magnum, id esse fal-
sum oculari fide monstratur. Nihilque moror
Monachos in Mes. vbi confiderent Lonicerum &
Fuchf. canillantes, ac Serapioni iniquo iure patro-
cinantes, idem contendunt.

Non dubium quin Diosc. Chamelza sit Sera-
pionis Mezereon, quam Arabes & eorum discipu-
li non tantum multiplici verborum imperitiā
confuderunt, sed insuper cum Chamaleone al-
bo ac nigro lethali errore commiscuerunt. Arqui
illud horrendum quod Mesue initio sermonis
Mezereon *vapere vitam*, ac *viduas faciens* dixerit,
vnde seriō vltus eius ab agyrtis & circumforaneis
formidari debet, qui integra grana (quia paucū-
lūm ore comminuta, fauces accendunt & linguam
misere vellicant) transglutienda exhibeat, extre-
mo hominis periculo. Noui (addit Cronemb.) im-
pudentissimam ostetricem Nouiomagii (quæ pri-
maria vrbis Geldriæ) Gretam nomine, quæ passim
quibusvis: & quod intolerabili scelere fit, etiam
gravidis ac pueris propinat: ô flagitiosam femi-
nam! Quare, prudenti etiam necessario consilio,
Mesue aceto corrigantur folia. *Hæc ille.* Cæterum
Cronemburgium per Mezereonem vulgarem in-
telligere Laureolam nostram folio deciduo satis
clarum: Laureola autem eius fuerit fortē ea, quæ
folio perpetuo virente. Quæ autem sit Thyme-
læa vera, & Mezereon Mesue imponendum in
pilulis Mesuei, non indicat. Apud Theoph. vt
citatur a Cronemb. nuspian inuenimus in qua
planta colligatur Coccognidium. Verum de
hac re postea.

*Cari ac pr-
uulsi re-
vires Lodi-
cori deto-
guantur.*

Nunc cæci ac periculosi errores Lonicer. dete-
gendi. Is lib. 4. c. 4. 9. suæ historiæ sic scribit: *Bel-
lerphale*, aut *Zylant*, aut *Zebast*/Diosc. Thyme-
læa, fructus Granum Cnidium aut Cocco cni-
dium: alii Daphnoides Diosc. volunt, quamvis
non respondeat descriptio huic *Bellerphale*.
Quo loco Lonicer. posuit falsam figuram Marthiod.
Thymelææ, cui appiētæ baccæ triecocæ: quam
plantam intelligat nescimus, nec ipsum sciuisse
existimamus: nomina tamen Germanica conue-
niunt nostræ Laureolæ folio deciduo. Cap. seq.
quod 50. sic tradit: *Seidelpast*/Leußfrant/Diosc.
Chamelzæ, Barbaris Arabibus & Offic. Meze-
reon, *Raphis vitam*, *Faciens viduas*. Quidam con-
fundunt hunc fruticem cum *Bellerphale* cap.
præced. descripto, propter similem figuram & vi-
res. Ambas indiscriminatim vocant Mezereon.
Hoc cap. Lonicer. ponit figuram Chamelzæ Marth.
descriptio autem est Laureolæ folio deciduo ex
Trago, cui dicitur Chamelzæ, vt antè annota-
tum. Sic ille, magis etiam cæteris, more suo omnia

confundit. Lib. 5. cap. 108. iconem Laureolæ folio
deciduo ex Marth. ponit pro *Lorderfrant* Daph-
noide: ascribit quoddam velle esse *Bellerphale*
Zylant. Is præterea nullē scribit Coccum Cni-
dium semen esse Thymelææ apud Myropolas in
vfu.

Ritius quoque apud Diosc. notat Chamelzæam
G. dici *Zylant*/Gallis *Bois gentil* & cap. sequenti
Thymelzæam esse Mezereon Mesue & officina-
rum, cuius granum Cnidium Diosc. Officinis sit
Coccum gnidium Germ. *Bellerphale*.

Sed eadem ignorantia nota inuendus est
Ritius, qui eandem plantam facit Chamelzæam &
Thymelzæam, cum tamen neutra sit.

Lectores perpendant in quanta pericula isti
ignari Herbarii coniciant non solum miseram
plebem, verum etiam Medicos stirpium ignaros,
quorum maiorem numerum scimus, quam vulgus
crederet.

Pen & Lob. Aduers. Chamædaphnæ siue pusilla
Laurus: an Germ. Mezereon granum vocitant Pi-
per rusticum, & Gnidium granum Pharmacaria
i ascribit, quæ ponit iamliu Senensis, decipitque de-
ceptus, sibi incognitas, *hirsutem proferem*, confundit.
At ipsi interim Aduersarii dubii hærent, an sit
Chamædaphnæ. Corrigit tamen versionem, &
vires Diosc. exponunt, vt suæ opinioni accommo-
dent, vt apparebit infra inter vires. Nec ullam
vidimus rātam similitudinem, vt meceatur nomen
pusillæ Lauri.

Camer. annotat Chamæzæam Germanicam (sic
enim vocat) flore quandoque reperiri albo. Sed
vbi? & si vidit, cur locum non indicat?

An Turner. Daphnoides, quibusdam dicta Lau-
reola? Angl. *Lauriel* vel *Isbry* quam in Germa-
nia se vidisse negat: in Angliā tamen ad sepes
propè Cantabrigiam & *Barckway* frequentem.
Videtur Turnerus intelligere Laureolam semper-
virentem: quamvis figura non respondeat, nec
quadraret ex Diosc. flos albus.

Chamelzæ, inquit Cæsalp. quam vulgò in alpi-
bus Oliuellam vocant, duplex est: vtraque paulo
minor Daphnoide obsequiosa, &c.

Qualem autem suspicemur Cæsalpini priorem
Chamelzæam dicemus. Altera videtur nostra Lau-
reola folio deciduo.

Histor. Lugd. pro Laureola femina proponit
iconem Marth. præterea eodem cap. habet iconē
sub titulo, Laureolæ cum fructu, quam Dod. ex-
hibuerat pro Laureola siue Daphnoide quæ per-
petuo viret, diuersa ab ea de qua Hist. Lugd. eo
loco agit.

Schuenenchf. in Cat. Siles. Laureola, *χαραιδας* n
Diosc. Chamædaphnæ Clus. At non videmus cur
hæc planta simpliciter Laureola dicenda sit, nulla
tanta similitudo. Chamædaphnæ Clus. non est,
vt prius dictum. De Diosc. Chamædaphnæ postea.

C. Bauh. apud Marth. Daphnoides: Laureola
folio teneriore & deciduo. Glycyrrhizam mon-
tanam nominare solemus, vt rei herbariæ ignaros
fallamus.

Castor. Daphnoides & Laureola maior. Pla-
taque linguarum nomina iam supra dicta spar-
sim Hist. & Ital. Laureola. Gal. Laureola. Germ.
etiam Scheißflorbeerem quasi cacationis Lauri
baccæ, quia sedem potenter mouet: Siles. *Zeis-
lang*/Zieglig. Sequanis & Montpelgardensis, *Bois gentil*.
Rustici circa Basileam, vt ex Cl. D.
Fel. Platero accepimus, nominant *Samar*. Belg.
quoque vt Germ. *Bellerphale* dicitur, his etiam
Leußfrant & pediculorum herba, fortē quod eos
abigat Boh. *Wlen Laybo Wetss* & c. ex Marth.
Eadem

*Mulsi me-
dici sunt
ignari.*

*Piper rus-
ticum
Marth. su-
perior.
Camer. 3.
Lob. acco-
l.*

*Chamelzæ
duplex es-
se sapio.*

*H. & J. Lugd.
et Marth.*

*Schædel.
repreh.
Glycyrrhe-
za montana.
Daphnoides.*

Locis.

Eadem ferè loca cum precedenti amat, siluatica, montana. Plurima cum in Germania & Heluetia, tum in Allobrogum & Ligurum Delphinatusque montibus & collibus siluosis, opacis, in vallis Anoniz montibus Tridentini agri reperitur in monte Amano, teste Bellon. quam ille *Bellerfraut* Germ. dici ait, quanquam temerè herbam vociter. Circa Basileam in Moutero monte. Denique in plerisque pinguibus & opacis, asperis atque desertis Germaniz locis. In Italia hortis quamplurimis cultam vidimus. Translata enim ad frugem peruenit ac diu durat, quales plures in hortum E. C. Montb. transferri curamus, quæ adhuc vigent, ubi & Ian. & Feb. Martio atque Aprili florentem obseruauimus, pro natura & clementia hiemis. Communiter tamen Martio floret: Sed horum gemmas seu germina statim post autumnum promere solet, qui mox hieme, si clemens sit, aliqui incunte vere, panduntur. Folia post flores demum exeunt. Tandem æstate & bacce quæ Augusto magna ex parte rubræ factæ maturantur. Subinde folia amittit.

Satis.

Tempus.

V. in
vitis.Hydrys.
Flores
riores
Vitis
cra-
ssa.

Prodidit *Tragus* se *Chamelæa* [intelligit autem hanc de qua hic agimus] quosdam agytas & impostores non paucos ad oreum mittere vidisse. Eiusdem iudicio *Pilula* quas & *Chamelæa* Mes. & *Scrapio* faciunt, ad hydropem maximi sunt momenti. Existimat decoctionem florum tutioris & minus noxij vsum esse. Nemini tamen autorem aut magistrum hac in parte se velle esse, proficetur. Folijs cum melle tritis sordida vlcera & crustosa repurgari. Mulieres quæ formæ student, hoc medicamento vti posse: nam faciei maculas intra paucos dies illitu exterere & purgare. Notum consilium est, ne quis temerè vtatur *Pilulis* de *Mezerco* dictis, præsertim si imponatur *Chamelæa* *Tragi*, quia non paratæ sunt vt decet. Qui *smegma* *Tragi* vult usurpare in magmatibus, caueat nec inflammet faciem, & pustulas excitet ipsis maculis deteriores. Nam erodentis & admodum inflammantis est facultatis. Folium vnū siue recens siue siccum comestum pituitam viscidam per deiectiones vacuare, vomitum mouere & mentes *Matth.* tradit. Bacças quindecim potu assumptas efficaciter purgare. Folium in nares indicum sternutamentum excitare. Cum passulis folium vnum masticatum, à capite pituitam & saliuam ducere. Nimirum hæc ipsæ sunt vires quas suæ *Daphnoidi* tribuit *Diosc.* quas mutuatus *Marth.* suæ *Laureolæ* applicat. Vt iam aperte videant *Studioli*, quantum ei sit fidendum. Dosis baccarum periculosa, & quam ipse non sumpsisset, nec sine noxa alijs propinasset.

Causa.

Tempus.

Marth. non
falsum
multa
falsi-
tatis.

Tiptum.

Dodonæo folia, cortex, radix, & fructus sunt calida & sicca ad tertium ferè gradum, eiusdemque ferè qualitatibus cum *Thynelæa*. Folia, inquit, purgant potenter & violenter per inferiora pituitam & humores biliosos ac aquosos, his vti officinas loco foliorum *Chamelææ*. Eadem vires habere bacças, easque commanfas tantum calorem ac feruorem in faucibus relinquere, vt vix potius copia restingui possit. Idem hanc plantam sine dubio nocuam esse hominibus, cum sit vsque adeo calida, vt vehementer violenterque operetur, ideoque lædat & noceat partibus internis. Huius folia preparari vt folia *chamelææ*; eademque ratione preparandos esse fructus & corticem, si sumendi exhibeantur in aliqua medicina. Idem in hist. lat. scribit, officinas Germaniz & Belgij huius folijs (si quando opus sit) vt pro *chamelæa*, quod citra errorem fieri possit, quod & *Cam.* repetit. Menses quoque ducit, vt perhibet *Schwenckf.*

Cortex verò aduersus *Quartanam*, *Hydropisim* & venena pro se cū *Saccharo*, vel liquore aliquo bibitur, corrigitur *Lacte*, vel *Aceto*. Experimentum qui volat? Nos non facile periculum fecerimus, nisi deficientibus alijs medicamentis, aut in casu desperato eius vsum suaserimus idque cum magna consideratione.

Suspectum porro nobis est & illud *Ant. Roiet* medicamentum, quod peste laborantibus exhiberi tradit. Foliorum, inquit, *Laureolæ* exsiccatum pondus coronati, plus minùve pro ratione virium ægroti, per biduum in aceto macerant, & bibendum præbent, quod sudorem mouet, vomitum & aluum: & hac ratione venenum expellit. Suspectum vt diximus, est nobis hoc medicamentum: li eo vtendum esset, velimus potius folia *Laureolæ* macerata per biduum in aceto cum alio liquore propinare.

Nam vel *Pen.* & *Lob.* testibus, ac ipso adeo sensu, fauces, œsophagumque [aliter quam *Euphorbium* *Gesner.*] adurit, diu multumque vexante impressione. Non minùs hæc per aluum deiecit crassum viscidumque *Phlegma*, & intestinorum ramenta abradit quam *Laureola*, cui non dispar, sed vehementior facultas inest, eademque in aceto maceratio ad corrigendum debetur. Sic enim vtuntur etiam Medicorum quorundam præcepta *Pharmacopœæ*. Quare [inquiunt iidem] facit hæc virium expansio, vt minùs quis putet *Chamædaphnen* legitimam. Quippe quam *Diosc.* *καμαδαφνη*, id est, capitis doloribus & stomachi ardoribus mulcendis commendat, vt interpretis vertit. At si vlla ratio iniri queat, quæ tam feruida planta pro *Diosc. Chamædaphne* agnosci queat, ea interpretatione commodiore & veriore videtur sita: namque *καμαδαφνη* id est, *καμα* id est, capitis, *δαφνη* id est, stomachi, id est, capitis doloribus & stomachi vitionibus accommodat, vettas, non incommodo sensu intelliges folia tusa admodum capitis dolori, puta à frigore, vel flatu, mederi: Stomachique vitionibus faciendis adiuuari, ad diurnas fluxiones sistendas aque stomacho auerendas: vt *Paulus* ex Antiquis docet faciendum, lib. 6. de stomachi vitione, ferro vel caustico non vrente actu, cuiusmodi sunt fungi, aut nigri *Agarici* frustilla, aliæque inibi scripta, quibus non secus atque folijs huius vti sunt Antiqui. Sic *Diosc.* magnam præsidium putat *Arabicam* vocatam *vitionem* à Græcis, quæ heri solita fuit *Spirillis* caprinis, oleo feruenti immixtis, & pollicis cavo inustis. Sic illi.

Diosc. inter-
pret.Arabicam u-
ocatam
vitionem.Vfus ad
venena.

Nobis nondum verisimile videtur hanc esse *Diosc.* mentem, estque valde longè petita hæc interpretatio, nec consuevit aut opus habuit *Diosc.* ab Arabibus discere, quos nec vidit nec agnouit. Quæ nostra sit aliorumque hæc de re sententia cap. de *Chamædaphne* declarabimus. Non enim concedimus, hanc de qua hic agimus, esse *Chamædaphnen* *Diosc.* Nec tacendus tamē alius eius vsum quem *Moibanus* inuenit, in cuius *Antidoto* aliàs *Saxonicam* vocatam aduersus venena eius radix quoque in aceto macerata venit, quam antidotum alio commodiore loco referemus.

CHAMELÆE HIRSVTE NOMI-
NE DATA.

CAP. XXXVI.

CHAMELÆE nomine, & Gallicè *Sais Gren-
ail*, id est, Ligni nobilis nobis datam (non



recordatur a quo] plantam in seco nostro herbario inuenimus & etiamnum asseruamus. Fruticis parui speciem habet, uti precedens: Caudex lignosus, rami palmares, nigricantes (in sicca.) Folia similia ferè cum precedenti Laureola folio deciduo, breuiora tamen, & multò angustiora, in acumen desinentia, nonnihil hirsuta.

bium accendens. Aliqui non rectè Laureolam vocant. Facile nascuntur: crassior enim radiis & tenax est cortex. Item de Collect. simpl. Laureola pito species in monte prope Curiam, parua, angustis folijs, paulò maioribus, quam Rosmarini, foliis purpureis odoratis, et in Zyland. Cauliculus lignosus est, non ultra septem digitos altus. Floret Iunio. Considerent periti an Gesn. de duabus plantis scribat, an de vna tantum. Item an intelligat Thymelæam Cordi vel Cneorum Matth. fruticosum, potissimum per eam Laureolam, quæ provenit Curia: Icon à Gesn. addita Thymelææ minori Cordi non quadrat cum Cneoro Matth. Scirpium studiosi obseruabunt circa Augustam Vindel. & Ratibonam, Thymelæam minorem, & conferent cum Cneoro fruticosa Matth.

Tragus de sua Thymelæa sic scribit: Rellera-bala & Zeilandi Germ. Latinis nonnullis Linum file. Olivella & Les terra: apud Diosc. buoia & zauria: Plin. Prosachne. Cnestron & Cneorum vocari tradit. Syri Apelin nuncupant: Hyginus Capiam. Liparum cuiusdam Aetius mentionem facit, qui & Cnestron nominati tradit. Nunc vero ad hunc fruticem & pertinet appellatio, ut nime constat. Fructus Thymelææ Cratum Gnidium vel Cocum Gnidium, ut loquantur Offic. appellatur. Errant Recentiores, qui Cocognidium ex Chantrea nasci existimant. Multò maiori in errore versantur, qui Chamelæam cum Daphnoides seu Laureola confundunt, ac si ad vnam & eandem herbam utraque appellatio referenda sit. Vid. Christoph. de honestis & Jac. Manlium, super Confest. Mezereon. Frutex est, arbutus instar proficiens, virgis multis, tenuissimis, tripedaneis, aut breuioribus, folijs exiguis & pinguibus, flore candido, fructu rotundo, seminibus Cannabis haud maiori, linguam si mandatur aduente, non aliter atque Chamelæa de qua proximo capite. Non vbiq; obuia est, sed incultis, altissimisque montosis & siluis provenit. Hac Tragus curid euenit quod reprehendit in alijs. Laureolam folio deciduo his pingit, pro Chamelæa & Thymelæa uti dictum, licet neutra possit esse: nec eius Thymelææ descriptio respondeat iconi, quæ fortè ex Diosc. desumpta, ipsis plantis non probè recognitis, vel sanè superficialitè consideratis. Considerandum tamen an fortè intelligat Thymelæam minorem Cordi modò dictam.

An Apollo de hac Rad. ep. 95. Thymelæa ex qua Granum Gnidium, Chamelæa simillima: An item Anguill. in epist. Thymelæa ex qua fructus Cocum Gnidium dictum. Aded superficialitè vel intricatè de his tradunt, ut quid statuendum nesciamus.

CNEORVM MATTH. SVFRVTEX

CAP. XXXVIII.

Pro Cneoro, exhibet Math. plantam Thymelææ Monspeulanz aliquatenus similem, ex radice crassa, nigra, plura lignosa virgula, dodrantem circiter alta, ramola, cortice nonnulli efflorescente retia proferente: in quibus potèst etiam fatigui, folia conferta, viridia: Thymelæa multò breuiora, obscuriora, glabra, nervo vno secundum longitudinem donata. Flores ramulorum extremis insidentes multi, simul congesti, purpurascens, ac interdum albi, quorum singuli & stach. Matthioli. Floribus formà non absimiles, ex oblongo tubulo in quatuor

THYMELÆA MINOR CORDI

CAP. XXXVII.

Descriptio.

Folia.



Thymelæa minor Cordo, parvulus est frutex, plures ab vna radice imitens virgas, longitudine pedales aut dodrantes, per terram stratas, lentas, flexiles, & distrecta commacosis folijs numerosis, vndique vestitis, figurà oblongis, utrinque acuminatis, crassiusculis, superius viridibus, inferius pallidioribus, Oleæ

Sapor.

Flora.

Radix

Sapor.

Locus.

Chamelæa

Folia.

Myrtique folijs multò minoribus, ac potius fruticoso Polio similibus, paulò tamen maioribus, gustu glutinosi. Flores, Sole Taurum occupante, producit in summis virgis oblongos, inferius angustos, superius in quaternis folia parua se pandentes, è purpura in puniceum atque candicantem colorem vergentes, densos: & ab vno principio sese in Corimbos diffundentes, suauiter odoratos, & mellis aliquem odorem redolentes. Floribus singule succedunt bacce. Radice nititur longa, candicare, nervosa, lenta, flexili, infragili & perennis: gustu ad aliquot horas fauces & palatum Cocognidii modo excalfaciente & scarificante. Nascitur frutetosus & muscolis tam planis quam editis locis: nonnunquam etiam sub Iuniperis. Copiosa autem circa Vindelicorum Augustam, & Ratibonam.

An de hac Gesn. de hor. Pipex montanum in Italia multis vocatum, quod nostri Zyland, Dod. Chamelæam falsam: eiusdem species alpina minor superiore autumno hortulo meo commissa, virer etiamnum. Vis utriusque caustica, omnibus partibus os & palatum non aliter quam Euphor-



maior lacinias
radiantem dispo-
sitas facientes.
Placet & diligētissimi &
peritissimi Her-
barii Clus. des-
criptionē sub-
iicere. Elegans,
inquit, suffru-
tex, cui multi
sunt rami gra-
ciles, flexibiles,
leni, surculosi,
ab ima protin-
us cellure e-
mergentes &
humi diffusi.
Folia nullo or-
dine disposita
ramulos am-

biant, viridia, cutanea, Thymelaeae verē pro-
xina, ingrati primum, deinde amari saporis, nul-
la aut perexigua (quantum quidem gustanti de-
prehendere licuit) acrimonia praedita. Flores in
summis surculis, sex, septem, aut plures, conferti,
quatuor foliolis constantes, ex rubro purpuras-
centes, Centaurij minoris florum penē emuli, in-
grati etiam & amari saporis, aspectus tamen pul-
cherrimi, atque odorati, caput (si diutius naribus
admoecantur) tentantes: ijs succedit fructus exi-
guus, Thymelaeae fructui haud dissimilis, non ru-
ber quidem, sed candidus: oblongiusculus, semen
continens cinerea membrana rectum, rotundum,
Thymelaeae grano par. Radix longa, minimi di-
giti ut plurimum crassitudine, interdum nigri-
cans, maiore verò ex parte flavescentia, lenta, su-
perna parte nonnunquam gracilior, unde rami
flexibiles & humi dispersi emergunt, & subinde
secundum alarum caua, satis crassas fibras flaves-
centes agunt.

Matth. in com. cum magnis icon. Lat. & Ital.
iconem proponit huius plantae nomine cneori
Matth. ubi scribit: inuenisse se in Bohemiae silvis
plantam, quae omnibus partibus suis cneorum can-
didum referat: flores in surculorum cacuminibus pur-
pureos, odorati Testiculi odore &c. In epit. sua
iconem ponit diuersam à praecedenti, pro cneoro
candido: de quo agemus suo loco, nempe capite
de Ocymoidae vel saponaria minore. Hanc
non describit, sed tantum ait: cneori candidi, de
quo meminit Theoph. hic imaginem damus, ut
qui chamelaeam faciunt, ad mentem redeant.
Profecto in ipsomet mens requiritur, qui sibi pa-
rum constans quod affirmavit audacter in dubi-
um reuocans, aliam plantam pro Cneoro, nem-
pe herbam, à praedicta toto genere differentem
exhibeat, parum memor eorum quae prius tradi-
derat. Certe tamen in Epitome Matthioli figu-
ram omisit. C. Bauh. in auctis & illustratis Matth.
commentarijs l. i. c. 19. Cneorum prius fruticolum
posuit, addens: Cordum fortè nomine Thymelaeae
minoris exprimere voluisset: nihilominus illu-
strans Matthiolum, l. 4. c. 167. cneori titulo her-
bae iconem ponit adiectis aded his Matth. verbis:
Cneorum de quo meminit Theoph. nullis defici-
entibus notis misit ad me Romā vir quidam no-
bilitate clarus, cuius imaginem hic appingi cura-
uimus, ut qui chamelaeam & Thymelaeam cneo-
rum faciunt ad mentis sanitatem redeant. Est au-
tem ea icon reuera Ocymoidis minoris. Vtrum

sam verum erit cneorum Matthioli: frutex ne
hic descriptus, au dicta iam herba? Ut merito de
stirpium historiis meritissimus Clusius in hac
verba proruperit. Matth. hunc fruticem pro cneo-
ro albo Theoph. proponit. Cū verò quale sit
difficiliter indicari possit, cur hūc stirpi cneori
nomen accommodare voluerit, multi mirantur.

Postrema Com. editione l. i. Aliud nobis Theo-
phrastii Cneoron adfert, nullis, ut ipsius verbis v-
tar, deficientibus notis. Sed cum nudam tantum
imaginem, addito, cneori nomine oculis subiiciat,
illiusque historiam planè subiceat, si parum hūc
ipsius assertioni adhibuerimus, nemo, ut opinor
vitio verten. Caterum, addit Clus. nisi in hac plan-
ta, (cuius & ipse satis elegantem figuram exhibet)
acrimonia, quae quidem sensu percipi possit, abes-
set, ad Thymelaeae genera aut ipsi co. generem suf-
fruticem referendam esse censeat. Nonnulli
rustici Eteinrosclun / hoc est, Petta. in Rusul. m
vocant. Nos autem antè monuimus cap. de Thy-
melaeae minore Cordi considerandum esse, an Gesne-
rus hanc fortè intellexerit nomine Laureolae par-
ae, cuius descriptionem ibi posuimus.

Est verò id notatu dignum, quod obseruauit
Myconus, medicus Barcinonensis, rei herbariae
studiosissimus à nullis animantibus, fruticem
hunc attingi aut arrodī. Et cum mille huiusmodi
plantas folijs & floribus onustas viderit, nullam
vquam reperire potuisse asserit, in qua praecisum
aut arrosolum aliquid fuisset.

Braun apud Tabern. ponit iconem hoc titulo:
De Bellerphale aut Zeiland (epi. Matth. Chamelaeae
species: subiungit duas descriptiones, & po-
stea duas icones Thymelaeae, de quibus postea.
Cassia, quam vocat, Matthioli, descriptionem o-
mittit, quam inuenisset apud Matth. sub Cneoro,
sic parū ocularus vno capite diuersas plantas con-
funde ns se & alios fallit: qui leger caput eius quod
91. est l. a. vix intelligit an in descriptione priori
intelligat Cassiam, ut vocat, an Thymelaeam.

Prouenit Cneorum Matth. ut tradit Clus. in
multis montibus Viennae vicinis tantā abundan-
tiā, ut rusticae mulieres, dum floribus abundat,
multos eius manipulos in forum venales adfe-
rant, cum alijs varijs generis floribus, exornando-
rum tricliniorum gratiā. Nasceatur etiam in Pan-
noniae silvis editiore loco sitis ultra flumen Ra-
bum siue Atabonem. Frequens etiam crescit qui-
busdam siccioribus pratis Francusforti ad Mo-
num vicinis, praesertim silua quadam quercubus
confita, circiter miliare infra eam urbem ad fini-
stram fluminis, inter Ericas, ubi illam candidis e-
ciam floribus variantem conspexit Clus. cuius e-
riam manipulos rusticae mulieres in foro venales
proponunt.

Aprili plerumque florere solet, nonnunquam e-
tiam Maio. Fructus maturus est Iunio. Adeo
autem secundus est hic suffrutex, ut saepenumero
ter eodem anno floreat, nouis floribus semen se-
per consequentibus, quod probè maturum, bis eo-
dem anno de vna eademque planta collegit idem
Viennae Austriae.

Camer. testatur Cneorum Matth. sibi in horto
semine natum: sed non docet an herbaceum in-
telligat, an fruticosum. Duo enim Cneora habet
Matth. eaque valde differentia, si probè meminisset
quae antea scripsimus. C. Bauh. suffruticem intel-
ligit.

Toscanus Carolus pharmacopoeus Burgundus
in Campagniola, diligens stirpium indagator, flo-
re albo & purpureo ad nos misit nomine Balsa ni

[si credere fas est] quicquam ab ullo autore mutasse, qui remedia, quæ civibus suis, inuitis etiam medicis profuisse iactat, promulgat. At saltem docuisset nos, aut didicisset ipse, si nesciuit egregius Herbarius, quâ in re differat à Victoriola sua, quam etiam Daphnirin, chamædaphnem & Mustellaginem sibi cognominat. Quid si confundat chamædaphnem cum Daphnoide? quod ei non nouum. Dubium igitur relinquitur nobis, quæ sit chamædaphne Apulei purgans, & an eadem cum Diosc. Plin. & Pauli ut censet Hymelbergius.

Herimol. dum nimium Plinianè scribere studet, obscuriorem reddit Chamædaphnes historiam ac suo nomine pronunciat, quæ Plin. prodidit: Chamædaphne Diosc. & Plin. quæ sit, non demonstrat Herimol. fugit hos scopulos, quemad. & Ruell. qui suo more ex Herimol. eo non citato sua decerpit & suffurat.

Chamædaphnem Marcellus humilem & terrestrem Lauri interpretatur, atque Latinis Vincam peruincam dici, ac eius meminisse quidem Theophrastum, sed tam breuiter, ut nihil possit ab eo intelligi, quam ferre chamædaphnem fructum folijs adnatum [ubi autem id scribit Theophrastus locum sanè nondum inuenimus apud eum, & vix credimus extare: neque enim adeo alieni aut peregrini sumus in lectione Theophrasti, ut si hæc diceret non alicubi id obseruassemus: indagandum tamen etiam in posterum.]

Apertè & ingenuè Anguil. fatetur, nondum sibi perspectum esse, quænam sit chamædaphne.

Amatus in Diosc. dicit, Chamædaphnem Hisp. Laureolam dictam, affinem esse Daphnoidei, non esse Vincamperuincam, ut multi falsò sentiunt, sed aliam herbam cubitalis altitudinis, ut Plin. describit: interim quæ sit illa non docet, unde satis patet ei non cognitam fuisse, præsertim cum nec doceat in quo differat à Daphnoide. Cornar. & Chamædaphnem, & Daphnoideam, utramque, Plinii, Officinis & Herbariis Laureolam vocari tradit. Sed iam antea dictum nobis videri Laureolam Cornario ignotam fuisse. Præterea Chamædaphne videtur à Laureola non parum differre.

Et, ut tandem & nostrum iudicium de Chamædaphne dicamus, placet nobis opinio Fab. Columnæ, qui vult Chamædaphnem Diosc. Plin. & Galeni esse *Bislinguam* siue *Laurum*, de qua paulò post.

LAURVS ALEXANDRINA.

Huius Theoph. meminit l. c. 17. sic scribens: Illa quoque propria Idæ sunt, Laurus Alexandrina dicta, & Ficus quædam, Vitisque Lauri Alexandrinæ hoc proprium est, quod in folio fructum gerat [*ἡ ἀνδρὶς ἀπὸ τοῦ φύλλου* quemad. & Myrtus sibi, seu Ruscus [*ἡ ἀνδρὶς ἀπὸ τοῦ φύλλου*. Vtrique enim fructus ex folijs ipsius dorso [*ἐκ τοῦ πλάτους τοῦ φύλλου* &c.] enascitur. Hic obiter Theophrastum ridens Scal. Festiuium vocat *ἡ ἀνδρὶς ἀπὸ τοῦ φύλλου*: Nam (addit) Quomodo Idæ fuerit propria Laurus ea, quæ Alexandrina nominatur? Pro Theoph. & pro se responsum habes apud Plin. l. 4. c. 39. quem consules. Idem Theoph. eadem paulò aliter circumscribit, cuius verba Græca lubet ascribere, non ad ostentationem, ut quibusdam id solemne visum, sed quia vel ipsis Latinis sine magis significantia, & nescio præ his quam *ἡ ἀνδρὶς ἀπὸ τοῦ φύλλου* habeant.

sic ait: *ἡ ἀνδρὶς ἀπὸ τοῦ φύλλου* *ἡ ἀνδρὶς ἀπὸ τοῦ φύλλου* *ἡ ἀνδρὶς ἀπὸ τοῦ φύλλου*. Quorum verborum sensum minus fideliter expleuit Gaza, sic inquit: fructiferaque nonnulla fructum folijs interceptum vel pediculo tenus tantum gerunt, quales sunt ex, quæ ad foliorum insertionem seu exortus angulum, fructum exerunt. Pleniùs ita: Quædam fructifera eo modo, ut fructum veluti sinu foliorum suorum comprehendant. Lenocinium addas cum Scal. mulliusculè sic: Quorundam inuolucro, aut sinu fructus obducitur aded, ut ipsa (folia) fructifera dici mereantur, quemad. Alexandrina Laurus, in folijs vel super folijs fructum ferens.

Audiamus & Plin. Est inquit (& chamædaphne sibi frutex: est & Alexandrina, [Laurus] quam aliqui Idæam aliqui Hippoglottion, alii Daphnirin, alii Carpophyllon, alii Hypelaren vocant. Ramos spargit à radice dodrantales, copiarum ac coronarum operis, folio acutiore quam Myrti, molliore & candidiore ac maiore, semine inter folia rubro. Plurima in Ida, & circa Heracleam Ponti, nec nisi montosis. Id quoque quod Daphnoideis &c. Dixerat autem iam prius: accedit in copiarum opere Taxa [Laurus] excrecente in medio folio paruulo, veluti lamina folii. Item alibi. Laurus Alexandrina siue Idæa parrus celeres facit, radice pota triam denariorum pondere in vint dulci cyathis tribus: secundas etiam pellit, mensesque eodem modo pota.

Adeamus Dioscoridem: Laurum Alexandrinam, inquit, alij *ἡ ἀνδρὶς ἀπὸ τοῦ φύλλου*, alij *ἡ ἀνδρὶς ἀπὸ τοῦ φύλλου*, alij *ἡ ἀνδρὶς ἀπὸ τοῦ φύλλου*, alij *ἡ ἀνδρὶς ἀπὸ τοῦ φύλλου* vocant. Folius est Myrti siluestris [*ἡ ἀνδρὶς ἀπὸ τοῦ φύλλου*] seu Rusci filibus, maioribus tamen, mollioribus & candidioribus: fructu in medijs folijs [*ἐκ τοῦ πλάτους τοῦ φύλλου*] Ruell. inter folia: maluit cum Plinio loqui, quam fidem præstare auctori rubro, ciceris [*ἡ ἀνδρὶς ἀπὸ τοῦ φύλλου*] magnitudine. Ramos verò per terram [*ἐκ τοῦ πλάτους τοῦ φύλλου*] (forte rectius è terra emittit, aut super terram profert) dodrantales, interdum etiam maiores: radicem similem Rusco [*ἡ ἀνδρὶς ἀπὸ τοῦ φύλλου*] maiorem tamen, odoratam & molliorem. Nascitur in montosis. Eius radix succurrit in difficili puerperio drachmarum sex [alij quinque] pondere in vino dulci pota. Succurrit & vrinae stillicidi vexatis, & menses educit. Pro quibus postremis verbis habetur: *ἡ ἀνδρὶς ἀπὸ τοῦ φύλλου* Sanguinem extrahit: Sarac. per quem nihil aliud quam menstruum cum Plin. & Cornar. intelligimus. Illud non omittendum: pro eo quod folijs quam Rusci maioribus diximus, in Græco haberi *ἡ ἀνδρὶς ἀπὸ τοῦ φύλλου*. Marcell. vertit minoribus quasi legiset *ἡ ἀνδρὶς ἀπὸ τοῦ φύλλου*: sed malè, ad stipulante etiam Cordo, immò Plin. quoque & Serapione, hoc speciatim, qui Laurum Alexandrinam & Gar Alexandrinam vocans nihil præter Diosc. & Gal. verba transcribit. Corrupti igitur codices putandi qui *ἡ ἀνδρὶς ἀπὸ τοῦ φύλλου* habent. Galen. Daphnen herbam vocat *ἡ ἀνδρὶς ἀπὸ τοῦ φύλλου* inquit, quam & Daphnen Alexandrinam appellant, temperatura euidenter est calida, & gustantibus acris simul & subamara, potaque cum vrinas tum menses prolicat.

Apuleius cap. de Victoriola sua Laurum Alexandrinam cum Daphnoide confundit, ac etiam, uti suspicamur, Chamædaphnem, ut iam prius latius ostensum.

Ceterum Laurum Alexandrinam & Laurum Taxam eandem plures esse cum Hippoglottio & Bonifacia seu Bislingua statunt: de qua re postea specialius trademus. Cornar. verò negat Laurum Alexandrinam esse Hippoglottum, sed

etiam verum Hippoglosson in suo commentario indicat. Nescio enim quam spicatam lanuginem inducere conatur, cum tamen nullus unquam autor alicuius lanuginis, vel spicae, in hac herba mentionem faciat. Mihi profecto Hippoglosson, siue Hippoglossidion, siue Hippoglosson eadem esse videtur cum Lauro Alexandrina. *Hec Cordus*, cui partim consentit, partim refragatur Hist. Lugd. scribens: Marcelli mentem non satis intellexisse videtur Cordus, quum scribit: Marcellum Hippoglossum male legi censere: imò Hippoglossum legi vult. Multò verius dixit iste, Marcellum nequaquam verum Hippoglossum indicare: praeterea cum eodem Cordo sentio, cum praepositione Graeca iam scribendum esse. Ita ab eodem dissentio dicente, Hippoglossum eandem esse plantam cum Lauro Alexandrina, eam nimirum, quam pro Lauro Taxa exhibuimus [videlicet Bilinguam]. *Hec Hist. Lugdunensis.*

Nos conperimus apud Marcellum ei placere Hippoglossum dici, quasi grandem linguam, sed nescimus ubi velit Hypoglossum legi. Unde autem Marcellus opinionem desumpserit, lanuginem requiri in Hippoglossò Dioscoridis, nondum intelligimus. Hist. Lugd. exhibenti Polygonati genus pro Hypoglossò assentire non possumus, ut copiosius dicemus, suo loco.

Cornarius approbat Cordi lectione, eam scribit Verus noster codex aperte Hippoglosson habet, & non Hippoglosson, velut fere vulgata Diosc. exemplaria. Anguil. hic rursus aperte profectur qualis planta sit Hippoglossum dicere se non posse: nullam plantam sibi visam quae respondeat descriptioni, nulloque modo respondere Bonifaciam. Penz & Lob. in Adu. Laurus Alexandrina Diosc. quae Theoph. Rusci folia *ἐμυδάριον* siue super folio baccifera, ab Hippoglossò differt, ut in promptu esse dicunt ex Theoph. & Diosc. noscere: quippe fructum siue baccam coccineam medijs in folijs hærere, nullius linguae facta mentione uterque asserit: foliaque molliora, maiora, & albidiora quam Rusci inesse Diosc. subdit, vitesque diuersas reddi, & radicem maiorem, odoratam. At Hippoglossi radix minor &c. Vide postea de Bilingua.

Fabius Columna in Hist. Lugd. inuenitur, quod existimet Hippoglossum ab Hippoglossò differre, inque doctiores insurgat, male illos Hippoglossi etymon intelligere asserens. Nullam quidem aliam inter illarum historias esse differentiam, nihilque ad plantae cognitionem facere, ut iam vel iam dicatur, cum sciamus Plin. Diosc. & Galenum eandem plantam designare voluisse. Quod verum quidem est: sed interest tamen Dioscoridi classico & probatissimo auctori genuinam & veram, non adulterinam lectionem restituere. Si vero & id nihil facit ad plantae cognitionem, necat facit etymon, ad quod & Gal. respexit, exactam cognitionem, atque adeo ad ipsam adeo plantae formam. Nam quicquid ille dicat, aliud est si sciam *ἵμα*, id est, infra folium linguam esse: aliud, si sciam *ῥῆμα*, quasi equi linguam esse. Quid enim aliud denotet *ῥῆμα*, nostri magistri nos non docuerunt. Sed hæc ad patetribus Grammaticos releganda.

Ut tandem concludamus, hoc Hippoglossum multis idem videtur cum Bilingua, de qua paulò post specialius differemus: alij negant.

RADIX IDÆA VETERVM.

Idæa radix
Idæa
Descriptio. **E**thanc quoque distinctam facit Diosc. a prædictis, distinctoque capite de ea tradit. Idæa

radicis, inquit, folia Oxymyrsinen (Ruscum) referunt: iuxta ipsa verò exigui sunt veluti capreoli seu pampini [*ῥῆμα*] ex quibus etiam flos emergit. Radix valde astringens est, iis proinde tonueniens quæ adstrictione indigent. Bibitur & aduersus alui profluvia, *Ruscumque muliebrem*, & omnem sanguinis eruptionem sistit. Sunt autem *ῥῆμα*, ut censet Fab. *Colpium*, vtriusque parue seu petioli, ab Hist. Lugd. *ῥῆμα* autem, *ῥῆμα* Autorem plantarum *ῥῆμα* vocat, quasi nemo ante eum de plantis *ῥῆμα*, *ῥῆμα* *ῥῆμα* putari, verborum *ῥῆμα* *ῥῆμα* *ῥῆμα* opinionis improprietate extorquebat, *ῥῆμα* planta ab ipsa depicta Hypoglosson videri potuisset.

Plin. non Idæam radicem, ut Diosc. a parte potiore, sed herbam Idæam vocat, eademque dicit: nempe Idææ herbæ folia esse quæ Oxymyrsinen: adherere his veluti pampinos, *ῥῆμα* flos. Ipsam autem alium, nescisque, [*ῥῆμα* *ῥῆμα* *ῥῆμα*], hoc est, fluxu mulierum transcripsit] & omnem abundantiam sanguinis sistere. Spissandi cohibendique naturam habet.

Idæa radix, inquit Gal. gustu admodum acerbata est: ac, si opere periculum facias, eandem vum præferet, nimirum sanguinis profluvia, alui fluxus, Dysenterias, profluvium mulierum, & quæcunque eius sunt generis, tum pota, tum toris imposita curant. Quibus sanè verbis, ut annotat Columna, Gal. Idæam radicem non cognouisse videtur, cum taceat vim calefaciendi & frigefaciendi, quarum aliqua prædictam esse hanc plantam necesse est: nec quo ordine, siue excessu, scribat, ut in alijs solet, calefaciat, refrigeret, & an moderata sit, vel contrarijs constet facultatibus.

Conqueritur Clusius Idææ radicis descriptionem apud Diosc. valde mutilam esse, ut difficile sit certi quippiam statuere. Quapropter non abs re alicubi maximorum ingeniorum simul Scalliger Dioscoridem aliquantulum negligentem fuisse prodidit.

Fab. Columna Bilinguam, de qua paulò post, vult esse Radicem Idæam. Sunt etiam qui velint esse plantam Viti Idææ quibusdam dictam æthinem, de qua antea egimus titulo Radicis Idææ. cui vires melius conuenire videntur: non tam figura folij Rusci.

BONIFACIA SIVE
BILINGVA.

Noteticis Descriptio
Bonifacia
siue Bilingua
nuncupata scilicet
quicubitalibus,
lentis, hilari vi-
tore perfusis,
striatis vimini-
bus multis à ra-
dice adolescit,
per quos alter-
nata ferè folia,
interdum plu-
ra veluti ex ge-
nibus radicata
visuntur, nunc
latiora, nunc
angustiora, pul-
chre virentia,
crassiuscula,
neruosa, verà a



obliquiosa, acuminata, quorum vnicuique, mirabili natura industriâ, in medio enascitur aliud foliolum, consimili formâ, non item magnitudine, cuius è sinu flosculi ita exigui ac ita dissecti, vt veluti muscoli videantur, micat, colore herbido dilutiore, & in silium seu pallidum inclinante: quibus delapsis bacca succedit, masculula, quam

semel tantum vidisse meminimus Romæ in horto quodam, vbi coli à multis solet, quæ primulum rubere incipiebat. Fab. Columna paulò specialius describens Radicem Rusci similem dicit maiorem verò, à qua plures rutiones, Asparagi, vel Rusci modo exeunt, cibo apti, qui postea in virgas distenduntur, cubitales ferè, vel cultu maiores, laues, virides, flexibiles, à medio ad summum vsque folia habentes formâ acutæ Myrto, Rusci scilicet, similia, maiora verò & formâ parum angustiore, ad nouella Rusci folia accedentia, viridiora & molliora: nec ita pungentia, etsi acuta sint: alternatim virgas circundant, sed quæ proximiora sunt terræ, Rubi modo terna circum virgas hærent. In ipsis folijs viticula parua seu petioli enascuntur, tenues, breues, sed Rusci longiores, in quorum extremo vere flos exit herbaceus, stellatus, sex foliolis constructus, medium habens purpureum, non dissimile Rusci flori. Fructum edere minimè vidit, sicuti & amici multi, qui plantam viginti annis coluere, nec vnquam nisi florem edere animaduertuerunt. Quod solo & celo imputandum est: alibi enim fructus perficere rubros cicetis magnitudine, vt Rusci asseritur. Ligulam è folio exeuntem etiam alij non obseruauerunt.

Hippoglossum. Hermol. quoque acinos rubentes Rusci modo sibi visos testatur. *Hippoglossum* & *Hypoglossum* vocat. Corollæ genus *Hypoglossidæ* vocari ait, aut ex Lauro Alexandrina, quam & *Hypoglossida* appellabant.

Laurus. Marcel. *Laurus Alexandrina* est: *monobryon*, vt ait Theoph. *Idea Laurus* etiam dicta. *Stephanon* itidem, id est, coronam, quod pro Lauro ad coronas fortè vterentur, dictam ait: censetque Alexandrinam Laurum dictam quod Alexander victor ea usus fuerit, etsi Plin. Daphnoidi id tribuat.

Alexandrina Laurus. Sciendum illud etiam, inueniri aliquando in ea simplicia folia, quæ super narum illud folium minus non habent: Sed sterilia ea sunt, manifesto argumento supernasci illud folium fructus causa.

Parina. *Hypoglossum* & *Hypoglossidion* à quibusdam vocari eandem Diosc. ait: idem monuit Plin. factumque id nomen à lingua est: nec aliud significat quàm quod sub lingua habetur aut huiusmodi quippiâ. Credit Marcellus potuisse quondam sic dici, quod ad siccandam linguæ nimiam humiditatem in pueris fortè vterentur. Idem Laurum Alexandrinam non separat ab Hippo-

glossio Diosc.

Hippoglossum hodie vulgus italicum *Bonifacia* vocat: multi *pagum Linguam*, autore Ruell. *Hypoglossum* *Vularia* Brunt. *Laurus Alexandrina* Theoph. & *Epiphyllocarpos* eidem: cuius duo genera constituit: vnum quod duplici folio constat: aliud quod simplici folio est: duas quodque figuras habet distinctas, nomine maris & femine.

Tragus quoque Laurum Alexandrinam Diosc. dicit, & à Theoph. *monobryon* eleganter dicitur: Hunc secutus est Emericus Cordus in colloquio suo de herbis: Ruelliam notans quod non cognouerit Laurum Alex. cum *Hippoglossum* eandem esse: à foliolo, inquit, Lingula aut Vula appendice simillimo apud Germ. nomen inuenit *Zapflintraut*, hoc est *Vularia*: dicunt etiam *Zapffenblat* & *Rothenblat*. Suspiciatur etiam eandem esse *Chamzaphnen* Diosc.

Fuchsius quoque *Daphnen Alex.* & *Ideam* vocat, Germ. *haueblatt* & *Zapffenblatt* Theoph. *monobryon* & Apulei *Victoriola*: quod nimirum ea pro Lauro in triumphis & victoriæ signum vterentur, quanquam in eo capite Apul. *Daphnoida* cum *Victoriola* confundat.

Cornar. nimis audenter pronuntiat in *Vularia* nullum fructum comparere, alij viderent, vt Tragus, nos &c.

Hippoglossum, tradente Turnero, Offic. & Herbariis *Vularia* vulgò dicitur & *Bonifacia*. Accedit multum ad Laurum Alexandrinam dictam: sed illud lingulas & semen habet in foliis: Hæc verò duntaxat fructum inter folia, non autem lingulas. Videntur ergo in hoc differre. In monte Athos, vbi *Hippoglossum* frequens, testis Bellon. dicitur *Ceras Vularis*, id est, Gallicè *herbe de la Cornille*: Herba cornicis.

De Lacunæ quoque opinione, *Hippoglossum*, seu *monobryon*, vt legi ait in quibusdam codicibus, non est idem cum Lauro Alexandrina, vt quidam putarunt. quia, inquit, ea non producit ex folijs parua folia, sed tantum fructum. Id duas icones proponit ex Matth.

At Arnato *Hippoglossum*, Hisp. *Lengoa de Caualhor* est idem, nisi, inquit, quod plerumque in *Hippoglossum* ex maiori & vero folio minus folium è medio non oritur: quod si illi inesse aut nasci contigerit, nunquam inter illa duo folia, fructum illum rubrum gigni videbitur, qualem in Lauro Alexandrina oriri percipimus. Ea de causa Laurum Alexandrinam à Theoph. *Epiphyllocarpos* nominatur, quam nonnulli masculum. *Hippoglossum* verò feminam dicunt. Lauri Alexandrinæ folia longè quàm Rusci sunt maiora, quamvis in nonnullis exemplaribus Diosc. per Marcellum versis non sine mendo legatur minora folia quàm Rusci.

Guiland. quoque suam opinionem habet. Laurum Alexandrinam (inquit) fructum inter folia serere contra veterum autorum sententiam dixit Matth. Diosc. *monobryon* nasci eum rectè tradente, atque Theophrasto *monobryon* asserente, quicquid dicat Plin. Non modò non differt, quod Matth. negat, Laurum Alex. & *Hippoglossum*, sed nec *Chamzaphne*. *Hippoglossidæ* coronæ mentionem fecere Plato comicus in Ioue: Theodorus in Articiis dicit. & Pamphylus in libris de nominum compositione, quam ex *Hippoglossi* folijs constituisse satis apparet. Nec me mouet Gal. Paul. & Diosc. separantes. Dod. duas species tradit reperiri, nempe præter *Hippoglossi*, *Bilinguae* alia adhuc species, in qua ex doctorum testimonio

no foliolum non accrescat folio: hanc hippoglossum feminam, illa. n. marem dici: tamen vnam tantum figuram habet. Idem *Virg. Georg.* Recensitoribus Victoriolam, & *Plin. Hist. Nat.* & *de Serp. Ind.* ab Ida Troas monte, quæ & Alexandri Troas dicta est, eandem indicat. Nec referre ait, quod Diosc. de Hippoglossis vno loco, alio verò de Lauro Alexandrina scripserit. Nam de vna stirpe quandoque sub diuersis appellationibus separatimque locis agere Dioscoridem & alibi se ostensum, veluti cap. Tussilaginis. Nec etiam refert (addit) quod Ruell. versio habet femina inter folia exire, aut quod talem iconem Ruellianæ interpretationi respondentem Matth. exhibuerit, fructu videlicet & longis pediculis. Ruellii autem conuersionem non esse fidelem & ipse Matth. postea agnouit. Mirum tamen tam falsam & imaginariam iconem in suis commentariis relictam fuisse. Hec ille. Verum de hac Matth. icone plura dicemus cap. de Polygonato ramoso.

Lonicet. in sua historia more suo duas icones Bilinguæ ponit pro diuersis plantis, nimirum prioritulum faciens *Zapffenfraut* / quam dicit Laurum Alexandrinam & Victorialem: alteri capit. seq. *Zungenblat* / Hippoglossum. Idem in comment. l. 4. c. 12. in Diosc. euidenti repugnantia dicit Hippoglossum, id est, equinam linguam sibi incompetam: & c. 142. tradit Laurum Alexandrinam Germ. vocari *Zapffenfraut* & *Bochenblat*. In nunc silubet, & eiusmodi varianti Scriptori vel potius nugatori nescio, fidem adhibeto.

Ryffius quoque in Diosc. bis ponit eandem iconem, sed non pro diuersa planta: scribit se Laurum Alex. Diosc. eandem putare cum eius Hippoglossis. Verum nescimus quid sibi velit cum ait, Nec me fugit nullam in ea qua vix medetur familiaritatem inueniri, à qua tamen ei inditum nomen, ut hinc etiam Germanis Vuulz folium dicatur: immò ne aliquem quidem foliorum usum. Quid hoc est? quomodo conueniunt cum his quæ sequuntur? Sub lingua teneri solita sunt folia, vel hodie, non tantum apud Insuabes ut Marcell. ait, aliasque alibi Gentes, sed etiam in Germania nostra sit, quoties abundantem puerorum saluam & distillantem in fauces humiditatem, unde vel prolixa columella, id est, vuulz, vel fauces balbutie linguae impedimentum oritur, cohibere & siccare opus est. Sane, ut ipsa locutio satis obicura, sic contradictio satis manifesta apparet.

Gelnero melius Hippoglossus, quam Hippoglossus scribitur, quam & Laurum Alex. vocat, & cum Rusco aliquid cognationis habere censet. Ceterum Laurum Alexandream Diosc. quæ Ruscifolia Theoph. (ut annotant Aduer.) aliam esse ab Hippoglossis, cuius in promptu est: De Theoph. & Diosc. nosce: Hippoglossi siue Linguae radix minor, gracilior, brevior: foliū tenue, paruum, cui medio quasi cauo aliud foliolum, lingula instat, insitum: aculeo rigido, infesto, mucronatum vtrumque, inter quæ bacculi etiam rubra Rusci videntur, suspiciendo naturæ, propter raritatem, opere. Quare versionem Plinii legenti, satis liquet, diuersas esse plantas, lectionemque Hippoglossi apud Diosc. laxatam fuisse: videturque Plin. legisse, non *vuulz*, sed *vuulz*, id est, non comosa, sed caua folia, siue infesta, cuiusmodi planè sunt etiam nostratis Bilinguæ siue Bonifaciæ.

Senensis quæ ingenij est opulencia & liberalitate, ubi ceteri Scriptores putarant descriptio-

nem, nomenclaturamque geminam esse, duntaxat vnius & eiusdem plantæ, non solum dedit, ut patet fuit, *Bonifaciam* pro *Hippoglossis*, sed insuper duas commentus fuit. Alteri nempe affixis affabre lingulis, quam postea, prudentior factus, delendam curauit: Alteri datis in petiolis longis baccis, quam Sigillum Sodomonis meritis suspicantur, in illumque quasi impostorem ignarum debacchantur isti Critici, quod tunc, totque annos, cum versaretur aut versare debuit diligenti, ac fidei manu, oculis, ac ingenio hanc plantam, tandem non animaduertit Theophrasto & Diosc. Lauro medijs in folijs fructum, non in petiolis insisse: sed illam deimpram, quali foret à se fictam commentarijs penultimis, commodiorem multò fuisse: quippe cui similior est ea, quam quidam Herbariorum peritissimi in hortis colunt & veram affirmant Alex. Laurum.

Sed argumenta quibus negant Aduerf. Bonifaciam seu Hippoglossum esse Laurum Alexandrinam, nobis videntur parui momenti: & quod aiunt, folia Hippoglossis esse spinosa, quod & Clus. dicit, id negant Cæsalp. Dod. & Fab. columna: Verum hi fortè describunt cultam, illi siluestrem & spontaneam, cuiusmodi fere cultis solent esse rigidiore aut hispidiore. Lectores videant, quæ antea de Lauro Alex. tradita.

Anguillæ iudicio Laurum Alex. nihil aliud est quam Bonifacia: & alibi tradit Hippoglossum non conuenire vilo modo cum ea quæ dicitur Bonifacia & Bilingua: nullam ferre comam spinosam, nec ex corymbis prodire vllas linguas. Matth. in com. in Diosc. l. 4. c. 142. Bonifaciam seu Bilinguam scribit non esse Laurum Alex. aut Idzam, ut existimat Fuchs. in suo comm. de plant. historia. Quippe Laurum Alex. è foliorum umbilico nullam exerere linguam: sed tantum fructum rotundum, Tiliæ modo: longiori pediculo appensum, proferre. Idem postea c. 143. Si, inquit, Laurum Alex. & Hippoglossum vnam & eandem plantam esse sentisset Diosc. ut quidam existimat, superuacuum erat de ipsius diuersis & proximis capitibus differere: diuersas quoque verisquonotatas assignasse. In Lauro Alex. nec linguarum meminisse nec aculeorum è folijs produntium: ferre fructum rubeum inter folia, non autem in medijs folijs. Ex his notis, cum ex viribus, quæ in hisce duabus plantis maxime pugnare deprehendantur, omnibus abundè constare arbitratur, hallucinari eos, qui putant vnam & eandem plantam esse. Se equidem illam, cuius dat figuram, legitiman Laurum Alex. censere. Huic alteram adiecit, quam & ipsam haud dubie Laurum Alex. fore: si huic fructum in medijs folijs innasci concedatur. In Epit. primò pro Hippoglossis ponit, & postea pro Lauro Alex. Sed sciat lector primam omnium iconem Matthioli pro Lauro Alex. positam esse Polygonatum ramosum, de quo alibi trademus. Secunda similis est Hippoglossis, sed in ea fructus appingitur sine foliis, quam in comment. cum magnis fig. Lat. & Ital. omisit, fortè quia contrariari videbat suis verbis, quibus dixit, Laurum Alex. non ferre fructum in medijs folijs, sed inter folia, contra manifestum textum Diosc. & Theoph. Plinium potius & Ruell. sequi maluit, ut tueretur suum Polygonatum ramosum, cui male in hist. Germ. tribuit nomina & vires Vuulz, seu Bonifaciæ. Camer. in epit. eiusdem Matth. omisit quoque alteram Laurum Alex.

C. Bauh. in vltima Matth. editione tradit Hippoglossum duplex esse, alterum in quo fructus pediculo, alterum in quo folio insidet: quod etiam

Matth. im.
p. 10. r. 10.

Pena
Lob. opus
relecta

An folia
spinosa.

Bonifaciam
non esse
Laurum
Alex.
Fuchs. not.

Matth.

Hippoglossi
sum dupl.
C. Bauh.

HISTORIAE PLANTARVM

elic, floribus Nymphææ. Inuenio & qui Alypo-ides hanc vocant. *Hec ille*. Verum non docet quâ plantam per Laureolam intelligat.

Non Laurum, inquit Marcell. in Diosc. sed Lauri formam & speciem: neque eam toto corpore. Verum in folijs & fructu tantum habentem herbam Græci *Daphnoides* dixerunt. Laureolam vocant. Explosumus quod à capitis principio apud Diosc. statim legebatur Alypo simile *Daphnoides*: & florem Nymphææ habere: & quod sequitur: in medio floris esse Cono simile quiddam, in quo semen: quoniam non responderent *Daphnoides* historiam, & nullibi in antiquissimis Græcis & Latinis ea legerentur, & paulò post de flore eius, legitimo loco ageretur. Nasci multum *Daphnoides* hoc Theoph. in Arcadia testatur est, numeraturque ab eo inter ea quæ præcipuam purgandi vim habent. Cæterum non videmus cur Marcellus *Daphnoidem* dicat herbam, cum existimet Laureolam, quæ frutex bicubitalis & maior interdum, & ipse Diosc. dicat *Surirex*. Addendum & illud: *Daphnoidem* à Theoph. nò solum numerari inter purgantia, sed etiam inter alia non purgantia. Ruell.

Ruell. *Daphnoidis* historiam non illustrat, sed cum Hermolao, cuius consuetudo sibi more verba transcribit, non citato eo, dicit Herbarios nostros appellare Laureolam, eiusque descriptionem subiungit, non ad ipsam plantam factam, sed ex Diosc. innotiter repetitam.

Curtius notat Alexandri Stephanon à nonnullis vocari, quòd o Alexander Magnus coronari solitus sit. Hic volumus Antiquitatum studiosos exerceri, nos certe ipsi, absque autore, non credimus. Sic & de eadem *Daphnoide* ex Veterum pl. citis historiam pangit, ac si sua essent, non dignatus eos citationis honore, quod plagium est. Sed quid ille curat, qui passim plagio ita attritus, ut iam dudum durissimum contraxerit calum. Nunc Laureolam nostram vulgatam describamus.

LAVREOLA SEMPERVIRENS, FLORE LUTEOLA.

Descriptio.



Folia

Floris

la, nec per hiemis asperitates caduca, ex angustiore principio seu ceruice sensim dilatata, tandemque in naetonem desinentia, crassa, glabra, nigricantia, splendens, Laurinis ferè similia, sed mi-

nora, inter quæ longiusculos, graciles, cauos & multos stellatos proferit stiloculos luteos, [Diosc. viride subcandicantes: Lob. ex herbaceo albo vel luteolo] succedentibus baccis glomeratis proximè ad ramos coherentibus, luniperinis paribus, nonnihil oblongis, primùm viridibus, per maturitatem nigris, nucleo intus duro, cannabis semine paulò longiore, medulla interiore candida. Radix subest in aliquot partes diuisa, longa, crassa, lenta, quæ difficulter euelli potest. Sapor toti frutici feruidus.

An Hermol. Herbariorum Laureola, cuius verba paulò antè citata.

Scribit Marcellus *Daphnoidem* Diosc. nostræ ætatis peritiores Herbarios priuatim Laureolam vocare, ac ostendere Laurinis folijs surgentem à terra furculosum fruticem confertis coacervatisque sub folijs seminibus, quæ Laurinarum baccarum figuræ sunt, nigris maturitate. Florem videre non licuisse, Quod si Marcell. intelligit Laureolam quam nos hic, hæc repugnant. 1. Quod non sit herba, qualem ipse dixit *Daphnoidem* (ut antè dictum) præter, tamen Diosc. 1. flores non candidi. 2. radix non inutilis, quibus notis designatur à Diosc. *Daphnoides*. An etiam huius nostræ folia molliora sint Laurinis, ut de sua *Daphnoide* Diosc. ait, dubitamus.

An Ruell. hanc pro *Daphnoide* & Laureola Herbariorum intellexerit, vix sciri potest, quia Laureolam imaginariè, nec sibi visam aut cognitam describit, ut dictum prius.

Candidè & apertè Cordus *De medicis*. Recentiores Laureolam vocant, quæ in nostris onic. non habetur, nec ego quæ sit compertum habeo. Hic Germanus fuit sicut & Cornar. ipsi coxius, qui tamen duobus distinctis locis apud Diosc. magna securitate tradit. *Daphnoide* Officinis Laureolam vocari: Germ. *Zeilant*. 1. cap. seq. Officinis & herbarijs *Chama-daphne* etiam Laureolam vocari. Et postea inferius alio cap. ait, esse hodie apud suos, qui cum *Daphnoide* *Chama-daphne* confundant, eundem *Zeilant* appellantes: qui sanè non ritè nobis videtur distinguere has plantas: & ut verum fateamur, nescimus quam Laureolam intelligat pro *Daphnoide*.

Monachi quoque Laureolam vulgò dictam *Daphnoidem* vocitant. Ac eos (inter quos Pandectarius) hallucinari scribunt, qui Laureolam volunt esse *Mezereonis* speciem.

Quin & Anguil. *Daphnoidem* ait hodiè vocari Laureolam, *Oliuellam*, *Oriolam*, & notissimam esse in Italia.

Chama-daphne, inquit Matth. quam Laureolam marem plerique vocant, folijs ac fructu à *Daphnoide* non longè differt: verum hæc tantum intercedit differètia, quòd *Chama-daphne* singulari rectoque caule constat, cui folia circumquaque prominent, adèd ut in cacumine in orbem umbellæ instar diradientur, semine inde prodeunte *Daphnoides* modo. Hæc Matth. cuius icon habere videtur aliquid commune cum Laureola folio semper virente, Sed quæ hic tradit non distinguunt à *Daphnoide*. In Epit. nullam ponit descriptionem præter Diosc. & iconem, scribens Italis dici *Laureola minore*. In Com. cum magnis con. Lar. & Ital. aliam ponit iconem cum folijs acutioribus & tribus virgis additis floribus. In hist. Germ. omisit & iconem & descriptionem Diosc.

Camer. in sua Matth. epitome posuit iconem iam dictam cum tribus virgis, addens, sibi repertam similem aliquando plantam in montibus

Bacca.

Nucleus.

Radix.

Marcell. vi. prob.

Officinis vocata.

Pandect. error.

Oliuella Oriola.

Laureola. max. Chama-daphne.

Matth. admodum virens in hist. Laureola.

Chama-daphne Camer.

Daphnoides. Sileste altissimis versus Morauiam, sed folijs crassiss, duris, & caule satis denso, baccis nigris. Quapropter verisimile esse, potius ad Daphnoidem referendam: nec immerito de hac stirpe, tanquam incognita, nonnullos dubitare. Idem in hist. Germ. ait, prouenire cum baccis nigris, folijs latis, in quidam montanis locis prope Lacum Lemanum & ad Rhenum: videri speciem Chamædaphnes Matthioli.

C. Bauh. apud Matth. Chamædaphne, inquit, Matthioli: Daphnoides seu Laureola Lugd. de qua stirpe nonnulli dubitant tanquam de incognita: alij tamen ad Daphnoidem referunt: suspicantur Matth. Laureolam Offic. exprimere voluisse. *Hac ille:* ubi incuria typographica pro Chamædaphne, posita icon Lythmachæ siliquosæ specioso flore.

Matth. nor. Ut liberè dicamus, quod sentimus, videtur nobis Matth. non nouisse discrimen inter Laureolam folio deciduo, & folio semper virente, atque aded nesciuisse, quas plantas suis nudis iconibus proponeret. Si pro Chamædaphne intelligit Laureolam semper virentem, id fit cum summo periculo. Quis medicinz peritus volet exhibere ad ardores stomachi mulcendos, & sedanda tormina, menses & vrinas ciendas, & in pessis (ad quæ omnia Chamædaphne commendatur) tam feruidam & malignam stirpem, qualis Laureola; Ea præterea non respondet descriptioni: fructus non est *ipudger*, ruber: nec *apudger* *7is quidam* *temperata* habet.

Lacuna nor. *cy Lense.* Lacun. iconem Matth. proponit nomine Chamædaphnes, dicens, vocari Laureolam marem, non demonstrans quæ sit, aut qualis. *Cæcus cæcum sequitur.*

Eadem censurâ dignus Lonic. qui Chamædaphnes iconem Matth. proponit, nihil addens de suo: sed cautè euitauit hos scopulos: melius tamen suæ existimationi consulisset, si Diosc. & Matth. citasset, ex quibus sua assumpsit & transcripsit nullo plagij metu. Videri nempe voluit probè nouisse sibi ignotam stirpem.

Daphnoides Dod. *Laureola.* *Emperale.* *Peplum.* *Dod. nor.* Dod. eandem facit cum Diosc. sic tradens: *Apudger* *Ne* Latini posteriores Laureolam dixere. Vocatur & *ιν πύλαις* ac *πύλαις*. Huius baccas Piper montanum ab Italis nuncupari, sunt qui affirmant: alij à Germanis etiam Zeilande dictum volunt.

Ann. Idem putat Theoph. Cneorum nigrum esse posse, folio siquidem Myrtum satis referre: (quod ei nunquam concesserimus) & ramolam, [*szpè* etiam vnicaulis est] lentam, obsequiosamque stirpem, albæ radice, absque odore, fructu nigro, quæ potissimè notæ sunt Cneori nigri Theoph. Nos pro eo etiam proponemus suo loco. Placet alioqui Dod. figura, quam hic proponimus, quanquam magna ex parte vnico caule à nobis sit conspecta.

Locus Geln. in hortis ait Laureolam seu Daphnoidem spontè circa Lacum Lemanum nasci folijs ferè Lauri, angustioribus, solidis, gustu feruidis. Item in append. Daphnoides, inquit, & Sabaudia missum, ubi ad Lacum Lemanum spontè prouenit, autumnis superiore plantatum viret adhuc, sed non satis lætum & tenuioribus folijs, quæ ad Daphnoides nostrum vulgare ferè accedunt. Quibus verbis sanè duas species insinuat, hanc ut putamus, quæ Sabaudica, & per vulgare eam quæ folio deciduo.

Cronemb. ad pilulas Mezereonis Pandectarium & Dinum reprehendit, qui Mezereon putarint Laureolam esse, ut copiosius postea dice-

mus in hist. Laureolæ folio deciduo. Nos verò per Laureolam cuius mentionem facit Cronemburg. existimamus intelligendam, quæ perpetuo folio.

An eandem intelligit censor Apollo quando ita insit Rad. 1. Serap. & Mesues non implicant cū Mezereo Laureolam & Lariolam vulgi, cuius historiam reddidit Diosc. l. 4. Daphnoidem dictam non admiscunt: quanquam Matth. nescio quā mente huic capiti insitam asserere audeat: eius enim reminiscitur Serap. cap. de Lauro: Mesue dicitur &c. Præterea in commento Daphnoidis, Matth. ut etiam Fuch. aliud esse Mezereon à Chamæle scriptum reliquit: huius verò sententiæ immemor, cap. de Chamæle; idem esse Mauris Mezereon, quod Chamæle, Thymelea ac simul admixta Laureola, comminiscitur.

Idem Apollo rad. 10. Daphnoides Offic. Laureola ex Diosc. Laureola scilicet medicamentariis. Verum Apollo ita irradiat nobis, ut non possumus asserere, quæ sit eius Laureola, nedum intelligere de qua planta loquitur.

Lob. & Pen. Daphnoidis siue Laureolæ ut nomenclatio, sic natura prosum Pusillam Laurum imitatur, ut plebecula vix conspectam dicitur Laurum. Vbiuis ferè Germaniæ, Galliæ & Angliæ, præsertim Mulomedicis & mulierculis clinicis nimis quàm nota, ut mirum sit Commentatorem Senensem tam ieiunè & manca descriptione hanc designasse, certo indicio ignorationis: quippe figura quam nullis floribus dat, fortè Mezerei Germanici surculum refert potius quàm Laureolam.

Lob. Obs. Daphnoides siue Laureola, Germanicè Zeilande: Gall. *Laureole*, Ital. *Oliuella*: perperam Thymelea Tragi. Sed fallitur Lob. non enim Tragus hanc posuit de qua hic agimus pro Thymelæa, cuius nec icon nec descriptio hanc nostram ostendit. Clusius scribit Pyrolæ fruticantis folia carnosa, supernè saturatius virentia & splendentia Chamædaphnes, quam vulgus Laureolam vocat, folijs, formâ & magnitudine propè similia.

Schuenckfeldius Chamædaphnen Clusii quæ perpetuifolia est cum alia confundit, ut postea dicitur.

Hist. Lugd. tradit Dale champ. cum Dodon. Laureolam Offic. siue Laureolam mare Diosc. Daphnoidem esse rectè censuisse, quæ Matth. sit Chamædaphne. Hisp. *Laureola*. Iconem quoque habet Chamædaphnes Matth. titulo Daphnoidis seu Laureolæ: habet & aliam titulo Daphnoidis seu Laureolæ cum flore: & cap. sequenti pro Laureola folio deciduo cur posuerit iconem Dodon. titulo Laureolæ cum fructu, nec nos scimus, nec illa excusabit: erat enim ponenda pro sempervirente. Sed ita euenire solet de sibi incognitis commentantibus.

Tabern. *Kellerhals* Germanicè vocat.

An Cæsalp. Daphnoides Italica Laureola dicta? Gignitur magna ex parte in siluis ac montibus vmbrosis incultis & frigidiusculis. Tamen in Italia circa Patauium obseruauimus inter montem Gemulam & di-venda, necnon in huius descensu versus Balneum Aponense, sed quæ & ipsa loca frigidiuscula sunt respectu reliqui tractus. Florebat mense Februario flosculis paruis luteolis stipata. Vidimus etiam Patauii, Veronæ, Ferrariæ, & Bononiæ in hortis cultam. Genevæ circa Castellum *la Bassie* dictum iam Decembri florere incipientem, ubi & Feb. & Martio aliàs florere solet Basileæ prope Dornacum, & in hortis D. Th. Zuing.

Laureola.
non est Mezereon.

Laureola
Galga.

Matth. re-
preh.

Fuch. nor.

Apollo nor.

Matth. nor.

Trag. ureola
cum Lob.

H. Lugd. tro-
ror.

Daphnoides
Cæsalp.

Locus.

Tempus

Sed et

Zuingeri, ex quo & Montbelgardum in hortum transtulimus, ubi & floruit & baccas tulit. In Burgundicis etiam montibus aliquot observauimus, unde etiam transplantauimus. Iam prius dictum apud Lemantum lacum reperiri, & non paucis iuxta Rhenum ac Mosâ locis. Flores, inquit Dod. præmature germinant, paulò post Autumnû æquinoctium: hyeme aut primo vere perficiuntur: fructus Maio & Iunio Lob. autore: media æstate etiamnum virent, denum æstatis fine & aduentante Autumnû maturitatem allequuntur, & nigrescunt. Tota hyeme viret, foliaque obdurant, vt in cæteris stirpibus perpetuò virentibus.

Vires & vili.

Esti pro certo & indubitato asserere non possumus hanc esse ueram & genuinam Diosc. & Plin. Daphnoidem, reclamantibus superscriptis aliquot notis: quia tamen vires ab iisdem traditæ apprimè huic conueniunt, lubet easdem hic recensere. Folia gustatu os faucesque vellicant & inflammant. Eadem seu arida, seu etiam recentia potu pituitosa per alvum deliciunt: vomitus quoque ac menses cient: quin & commanducata pituitam à capite extrahunt, & sternutamenta mouent. Ceteram & quindenæ ipsius baccæ portæ, purgat. Paulò aliter Plin. Daphnoides, inquit, [huic his nominibus quæ diximus] silvestris Laurus prodest, alvum soluit, vel recenti folio vel arido, drachmis tribus cum sale in hydromelite manducata. Pituitas extrahit folium & vomitus, stomacho inutile. Sic & baccæ quinquæ denariis, purgationis causa sumuntur.

Purgans.
Vomitorium.
Menses.
Capitum pituita.

Sunt tamen qui Plinii lectionem ad Diosc. aptam & emendam censeant, vt Sarracenus. Nos sanè in Plin. nihil præter rationem dictum inuenimus. Nam & stomacho incommodam hanc plantam censemus, insignis suæ acrimoniæ & ardoris gratiâ, & quinas baccas malumus quàm denas, has quàm quindenas, purgationis ergò exhibere: quod vel paulò maior dosis in talibus nobis semper suspecta videatur, præsertim cum Dei beneficio mitiora tutioraque habeamus.

Plinii Græci
lectio defen-
ditur contra
Sarrac.

Cautio.

Tèperam.

Corrodit.

Laureolam certè Dod. in Hist. Gall. calidam & siccam ad tertium gradum, accedentem ferè ad quartum tradit, subuertere admodum ventriculum, inflammare, lædere, & adurere partes internas. Folia eius corrigi & ad sumendum commodiora reddi eo modo quo Chamæleæ. Idem in Hist. Lat. temperic & facultate similè facit Chamæleæ Germanicæ ea vniuersa suâ substantiâ acré & feruidam esse. Vt non temerè sanè hanc præscripserimus, propter insignè eius acrimoniam.

LAVREOLA FOLIO DECIDVO, SIVE MEZERION GERMANICVM.

CAP. XXXV.

Descriptio.


Radix.

Virga.

Cortices.

Lanugo.
Lignum.
Flores.

QVæ verò deciduo est folio Laureola, frutex est interdum ad trium cubitorum altitudinem excrescens, radice in aliquot partes diuisa, minimi digiti crassitudine, vel etiam crassiore, longâ, alteque se demittente, albâ; ex qua assurgunt plerumque virgule singulares, lentæ, teretes, tenues, obtequiosæ, cortice duplici testæ, exteriori cinereo, tenui, fragili, interiore exterius virente, interius albicante: valdè lentæ, & fractu cõtumaces, lanuginem quandam bombycinam, dum diuelluntur ostentantes, cui subest lignum candidum, solidum, medullâ pauca præditum. Flores ad ramulorum latera sine pediculo, nunc singulares, nunc plures simul iuncti, ex nodulo



ante folia prodeunt pulchelli, ex rubello purpurascetes, colore ad flores Persicæ accedentes, oblongi, in quatuor foliola anucronata reflexa diuisi, odore suauj: in medio staminula aliquot crocea. Folia ex tuberculis plerumque plura simul, colore herbaceo, Laureolæ folio perpetuo ac-

Folia.

Bacca
& nucleus.Oder & sap.
Chamaelea.
Cilibraca.
Oleaster.
Oleaster.
Oleaster.

Mezerion.

cedentia, molliora, nec vt illa, splendcantia. Baccæ cum maturitate rubentes, quæ relictae, nigricant, (inquit Dod.) quarum interior nucleus Cannabis semini similis, medulla candida. Tota planta vt odore graui est, exceptis floribus, ita sapore acerrimo & vrentissimo. De hac Ruellius sic scribit: Chamæleam Romani Cilibracam, alij Oleaginem vel Oleasterum vocant. Olea Cilibraca vocatur autore Colum. sed Calabrica legendum puto. Recentiores Oliuellam appellant: Olic. Mezerion, quasi lethalem & viduiferam. Oliuella surculosa fruticat ramis palmaribus, folijs Oleæ similibus, tenuibus, amaris, quæ gustata linguam acriter mordent, faucesque ac guttur vellicatu lacessunt. Lactè manat copioso, animalibus cunctis intacta. Baccas fert si bene memini virides, per maturitatem ex parte rubescentes. Ex hac granum Cocci plerique falso nasci existimauere. Recentiores Chamæleam cū Thymelæa, & vtramque cum Daphnoide rursus confundunt. Hæc ille: qui dum alios reprehendit, seipsum accusare videtur: dubitamus an vllam harum plantarum nouerit. Fortè intelligit nostram hanc Laureolam folio deciduo. Non conuenit tamen, quod ait lactè manare copioso: nec etiam Chamæleæ est, multò minùs Olea Cilibraca Columellæ. Quando folijs Oleæ dicit, & postea baccarum robrarum meminit, Chamæleam cum Laureola confundens, neutram sibi cognitam fuisse satis clarè prodit.

Ruell. re-
prehendit
reprehendi-
tur.
Multiplum
eius error.Brunfels.
fornicium.

Brunfels. nescit quæ scribit Tom., dum Laureolam Teut. Bellerophals dici ait, Græcis Daphnoiden, flores illi candidos radicem inutilem: passim per siluam. Et cap. sequ. Thymelæam vel Coccum Cnidium quoque Bellerophals vocat, floribusque esse candidis. Quis hanc incuriam ferat? Dioscoridis descriptiones sublegens cum Bellerophals Germanorum confundit, nec docet quæ ea sit: nec existimamus reperiri Laureolam flore albo in Hæcynia. Vbi quis fide dignus monuerit, aut miseret, credemus.

Brunfels.
incuria.

Cordi opinio non opus habet longa refutatione: ipsa per se satis ruit, quando apud Diosc. tradit Thymelæam quoque Mezerion & Coccognidium, & grana quoque Mezerion vocari: nimirum nostram Laureolam vult esse Thymelæam, & sequè cap. hanc fruticem esse dicit quem Germ. Zebast & Bellerophals appellant, ex quo Granum Cnidium colligatur, quod etiam Coccognidium vocitetur. Quasi verò.

Cordi opinio
erronea.
Thymelæa.
Mezerion.
Coccognidium.

An Cornar. Thymelæa ex qua granum Caidiū, olic.

offic. & notum & in usu sunt videtur esse: nam addit, *Balsam* voce Mezereon, Germ. *Beiersbals* dicitur forte ab eo quod collum, id est, fauces offendit & vit. Sed cessat. Differunt enim quidam Thymelæa & Mezereon, quo nomine a Serapione & Mesue vocatur.

Tragus horrenda nomina tribuit: Ex mesue dicitur, inquit, *Rapiens vitam: faciens viduas*: (sic & meliora sperantibus per accidens prodesse possit, si iocari liceat) *Seidelbasi* aut *temifraut* Germ. Baccas Ari baccis confert: sed non probatur nobis quando folia per omnia Ligustro aut Oleæ similia tradit: immo vix illam similitudinem aduertimus, quæ dici meretur. Neque etiam est Diosc. Chamelæa, ut is tibi persuadet. Cur vero apud eundem huius Laureolæ alia scô politica sit, sub titulo Thymelææ, *Selandi* & *Bellersbals*, nos latet: quam autem plantam suspicemur cum intelligere paulo post dicemus.

Neque concedimus Fuchlio huic, (quam *Apollin* vocat, *Daphnoidem*, offic. & Herbariorum Laureolam) omnes Diosc. notas præter floris colorem conuenire, ut ille scribit: quia Diosc. sive tribuit folia *vix luxa*, fractu contumacia: talia non sunt folia huius nostræ: nec habet *apollin* fructum nigrum, sed rubrum, ac potius coccineum: folia quoque vix proprie Lauri folia dici posse putamus. In eodem censura dignum, quod, quam prius fruticem dixerat, postea in annot. herbam vocitet facientem viduas. Dubitamus quoque an hæc fuerit Offic. Laureola. Probamus quod taxat, mirum in modum errare Officinas, quod folijs Daphnoidis pro Mezereon utantur: & eius fructu pro Cocco Cnidio, qui Thymelææ fructus est Thymelæa vero non esse Laureolâ hodiè appellatam herbâ ex eo colligi potest, quod Diosc. autore Linum nonnullis nominata sit.

Matthioli, ut passim variis a seipso & fluctuantibus simillimus, ita & in huius plantæ historia, sicut ex diversis eius editionibus & historiis patet.

Videtur itaque Camer. non accipere pro Daphnoide Matth. nostram Laureolam folio deciduo, sed forte eam quæ est folio perpetuo, vel aliam aliquam. At C. Bauh. apud eundem ponit eam quæ est folio deciduo.

Quod ad nos attinet, satis colligimus ex ipsius Matth. verbis, ei non bene cognitæ has plantas, ac ab eo confundi, quantum eius icones & descriptiones melius conueniant cum nostra Laureola folio deciduo. Reclamant tamen notæ quædam ne sit Daphnoides Diosc. quicquid dicitur Matthioli, sicuti ante dictum aduersus Fuchlium. Cur vero folia in eius edit. Germ. dicantur viscosa, seu glutinosa, ne suspicari quidem licet: in neutra Laureola hoc obseruauimus. De Amati quoque sententia omnino falluntur, qui Daphnoidem Laureolam dictam Mezereon esse credunt. Esse enim, inquit, Laureolam herbam siue fruticem [differant hæc duo] cui flores albi purpureascentes insunt, & eam pharmacopolas omnes satis cognitam habere. Sed in ipse etiam Amatus probe cognitam habuerit utramque Laureolam & Chamælæam est cur multum dubitemus. Scribit enim l. 4. *χαμαίλα*, Lar. Oleastellum, Arab. Mezereon, vulgo Mezereon, Gall. *Bois genti*: Non describit. Nomen Gallicum conuenit Laureolæ folio deciduo: figura quæ apponitur, est alterius plantæ, de qua non videtur locutus Amatus, nempe Chamælææ tricoceæ, de qua postea.

Lacuna Matthioli simia diuersam ab eo habet figuram pro Daphnoide, quæ potius sempervirentem Laureolam exprimit, quam hanc: interea ta-

men Matth. imitatus, vel potius, more suo, ex eo transcribens ait, Daphnoidem nonnullos, vocare Laureolam femininâ. Aliquos confundere cum Mezereon, quod non differat a Chamælæa Diosc. Sed facile patet non oculatiorem fuisse magistro suo in istarum stirpium dignotione ac historia.

Piper montanum, inquit Anguil. quod quidam existimant Chamælææ, sine dubio non est Chamælæa, potius dixerim Coccum Cnidium Theoph. Nos de Cocco seu Grano Cnidio Theoph. postea trademus.

Dodo vocat Chamælæâ Germanicâ, ac videtur ei esse Cneorum album Theoph. nihil tamen affirmare posse dicit propter breuitatē. Ast quæ Cneorum album Theophrasto candido dicatur folio, figura quodammodo Oleagineo simile, vix concessimus nostram hanc Laureolam esse Cneorum, licet id sibi persuadere videatur Dod. dicens non multum dissimilem esse Oleæ. At nos multum dissimilem dicimus. Eui etiam similis esset, desiderantur & aliæ adhuc notæ. Et ut reliquas omittamus, quis, nisi luscus forte aut parum oculatus, Laureolæ folium candidum dicat?

Negat Gesnerus in hortis, Piper montanum Italis dictum, & Germ. *Zyländ* rectè Laureolam vocari cui sanè haud grauatum subscriberemus, nisi iamdudum apud omnes pene Herbarios istud nomen inoleuisset, & in quibusdam cum Laureola haberet similitudinē. Alioquin non semper uirēs est, quæ in re differt a Laureola æquæ ac Lauro leperuientibus. Quapropter & ipse quoque Gesn. alibi non vno loco, latè vulgi incedens via, modò Daphnoides nostrum vulgare, modò Laureolam vulgarem, modò Daphnoidem Fuchsi vocitat, Thymelææ tamen speciem potius esse, iteratò diuersis locis inculcat.

Ah Apollin. Rad. 10. Chamædaphnæ, Laureola etiam medicamentariis dicta, eaque inas? nimirum ita irradiat nobis more suo ambitiosis suis radijs, ut non ausumus asserere, nec alius forte id facile ex eius verbis queat, num hanc intelligat vel aliam: non sine suspitione ipsummet id ne ciuile.

An Altomari de med. c. 91. Mezereon *seplasia* riorum communiter dicta, & proprie ea, quam Diosc. nuncupat Chamælæam, ut ille vult, qui ex ea parat pilulas, quas summè laudat ad educationem aquarum. Si hanc nostram intelligit, fallitur quod Diosc. Chamælæam putet.

Croneimb. l. 5. comp. ad Pillulas ex Mezereon Mesues: Mezereon, inquit, frutex omnibus officinis & quibusdam alijs Almezereon vocatus in magnam controuersiam agitur, dum quidam Chamælææ Diosc. alii Thymelææ eam vocem tribuendam contendunt. Auic. 1. can. c. 467. & Serap. simpl. c. 363. quos, ut præceptores suos, sequitur Mesue, Chamælæam cum Thymelæa turpiter confundunt. Tragus Pandectariorum & Leonicensi subscribit eleganter vulgarem Mezereonem picturâ sua ob oculos ponens, dum ait: In Ianuario plantam ante folia germinare, flores purpureos edere. In cap. præced. Thymelæam Germ. peculiariter *Bellersbals* referens ex Diosc. sine dubio fideliter ea grana pingit, quæ nostri [Germani] Pharmacopolæ ex Mezereon vulgari colligunt: nam rotunda esse dicit, maiora canabinis, linguam vrentia. Diosc. clariùs, fructum habere Myrti in modum, rotundum &c. Hæc si uera sunt, ut omnino iudicari debent, non iam Mezereon Chamælæa, sed Thymelæa, ex qua granum sine Cocco Cnidio colligi & Theoph. l. 9. cap. 22. & Diosc. autor est. Contat hinc Tragum hic pa-

C. Bauh.
cap. 12.

Rapiens vitam
faciens viduas

Tragus
i. p. 12.

Aliter Tragus
1. p. 12.
Testatur
eandem

Officinarum
eius.

Daphnoidem
Laureola.

Pinos de
mari cypr.

Coccum Cnidium

Cneorum album

Dodo, apud
residuum.

Non rectè
dicit
Laureolam.

Laureola
vulgare

Chamædaphnæ
phoc.
Laureola
ma.

Mezereon
seplasia
Chamælæa.

Aut. Serap.
et Mesue
arguunt.

Thymelæa
Tragus

Tragus
1. p. 12.

rum attentum fuisse, dum floribus quidem Meze-
reoneum vltatum, seminibus aut fructibus Thy-
melzam representat.

Sylvius Mezereon Mesue Thymelzam rectif-
simè decernit.

*Pandol-
temora.*

Laureola.

*Daphnoides
D. Florent.
error.*

*Arabum la-
bes deterf.*

*Lactariarū
maxima.
Lactici-
um magis
Monachum
crepantur.*

Pandectarius Simonē Genouensē redarguens c. 124.
hanc malè Laureolam cōstituit: deinde c. 170. eos
improbat qui Coccognidiū [quod alijs semē Me-
zereonis dixerat] semē Laureolæ putant. Amplius
c. 483. diserte Laureolam Laurum Alexandriæ &
Daphnoidem interpretatur: vnde manifestum fit
quantoperè sibi dissideat. Simili quoque errore
D. Florentinus includitur c. 1. in Mes. commen-
tans: Vterque facile hinc arguitur, quòd Diosc. di-
uersa capita omnium earū herbarū instituat, quodq;
Arabes omnes (Si Serap. excipiamus) Mezereonem
copioso lacte manare scribant, quòd tamen
nec profert Laureola, nec etiam Mezereon vul-
gare. Et quamuis Mesue Lactariarum maximam
dixerit, & Auic. Lacticinium magnum, id esse fal-
sum oculari fide monstratur. Nihilque moror
Monachos in Mes. vbi confidenter Lonicetum &
Fuchf. cauillantes, ac Serapioni iniquo iure patro-
cinantes, idem contendunt.

Non dubium quin Diosc. Chamelæa sit Sera-
pionis Mezereon, quam Arabes & eorum discipu-
li non tantum multiplici verborum imperitiā
confuderunt, sed insuper cum Chamæleone al-
bo ac nigro lethali errore commiscuerunt. Arqui
illud horrendum quod Mesue initio sermonis
Mezereon *vapere vitam*, ac *viduas faciens* dixerit,
vnde scriò vltus eius ab agyrtis & circumforaneis
formidari debet, qui integra grana (quia paucū-
lūm ore comminuta, fauces accendunt & linguam
misere vellicant) transglutienda exhibent, extre-
mo hominis periculo. Noui (addit Cronemb.) im-
pudentissimam obstetricem Nouiomagii (quæ pri-
maria vrbs Geldriæ) Gretam nomine, quæ passim
quibusuis: & quod intolerabili scelere sit, etiam
gravidis ac pueris propinat: ò flagitiosam fœmi-
nam! Quare, prudenti etiam necessario consilio,
Mesue aceto corrigantur folia. *Hec ille.* Ceterum
Cronemburgium per Mezereonem vulgarem in-
telligere Laureolam nostram folio deciduo satis
clarum: Laureola autem eius fuerit forte ea, quæ
folio perpetuo virente. Quæ autem sit Thyme-
læa vera, & Mezereon Mesue imponendum in
pilulis Mesuei, non indicat. Apud Theoph. vt
citatur à Cronemb. nuppiam inuenimus in qua
planta colligatur Cocco enidium. Verum de
hac re postea.

*Caci ac pe-
riculosi er-
vires Lado-
ceti deter-
gantur.*

Nunc caci ac periculosi terrores Lonicet. dete-
gendi. Is lib. 4. c. 4. 9. suæ historiæ sic scribit: Bel-
lerbale, aut Zyland, aut Zebast/Diosc. Thyme-
læa, fructus Granum Cnidium aut Cocco cni-
dium: alii Daphnoides Diosc. volunt, quamuis
non respondeat descriptio huic *Bellerbale*.
Quo loco Lonic. posuit talsam figuram Matthioli.
Thymelæa, cui appictæ bacce triecocæ: quam
plantam intelligat nescimus, nec ipsum sciuisse
existimamus: nomina tamen Germanica conue-
niunt nostræ Laureolæ folio deciduo. Cap. seq.
quod so. sic tradit: Seidelpast/Leusifraut/Diosc.
Chamelæa, Barbaris Arabibus & Offic. Meze-
reon, *Rapens vitam, Faciens viduas*. Quidam con-
fundunt hunc fruticem cum *Bellerbale* cap.
præced. descripto, propter similem figuram & vi-
res. Ambas indiscriminatim vocant Mezereon.
Hoc cap. Lonic. ponit figuram Chamelææ Matth.
descriptio autem est Laureolæ folio deciduo ex
Trago, cui dicitur Chamelæa, vt ante annota-
tum. Sic ille, magis etiam cæteris, more suo omnia

confundit. Lib. 5. cap. 203. iconem Laureolæ folio
deciduo ex Matth. ponit pro Gerberfrut Daph-
noide: ascribit quosdam velle esse *Bellerbale*
Zylandi. Is præterea malè scribit. Cocco Cni-
dium semen esse Thymelææ apud Myropolas in
vfu.

Risius quoque apud Diosc. notat Chamelæam
G. dici Zyland/ Gallis *Bois gentil* & cap. sequenti
Thymelæam esse Mezereon Mesue & othcinarum,
cuius granum Cnidium Diosc. Officinis sit
Cocco gnidium Germ. *Bellerbale*.

Sed eadem ignorantia nota inuendendus est
Ryffius, qui eandem plantam facit Chamelæam &
Thymelæam, cum tamen neutra sit.

Lectores perpendant in quanta pericula isti
ignari Herbarii coniciant non, solum miseram
plebem, verum etiam Medicos stirpium ignaros,
quorum maiorem numerum scimus, quam vulgus
crederet.

Pen & Lob. Aduers. Chamædaphnæ siue pusilla:
Laurus: an Germ. Mezereon granum vocitant Pi-
per rusticum, & Cnidium granum Pharmacaria
infestitia, quæ ponit iamdud Senensis, decipitque de-
ceptus, sibi incognitas, *hirsutū prorsum*, confundit.
At ipsi interim Aduersarii dubii hærent, an sit
Chamædaphnæ. Corrigit tamen versionem, &
vires Diosc. exponunt, vt suæ opinioni accommo-
dent, vt apparebit infra inter vires. Nec vltimū
vidimus rātam similitudinem, vt mereatur nomen
pusillæ Lauri.

Camer. annotat Chamæleam Germanicam (sc.
enim vocat) flore quandoque reperiri albo. Sed
vbi? & si vidit, cur locum non indicat?

An Turner. Daphnoides, quibusdam dicta Lau-
reola? Angl. *Lauriel* vel *Isbry* quam in Germa-
nia se vidisse negat: in Angliā tamen ad sepes
propè Cantabrigiam & *Barchway* frequentem.
Videtur Turnerus intelligere Laureolam semper-
virentem: quamuis figura non respondeat, nec
quadret ex Diosc. flos albus.

Chamelæa, inquit Cæsalp. quam vulgò in alpi-
bus Olinellam vocant, duplex est: vtraque paulo
minor Daphnoide obsequiosa, &c.

Qualem autem suspicemur Cæsalpini priorem
Chamelæam dicemus. Altera videtur nostra Lau-
reola folio deciduo.

Histor. Lugd. pro Laureola fœmina proponit
iconem Matth. præterea eodem cap. habet iconē
sub titulo, Laureolæ cum fructu, quam Dod. ex-
hibuerat pro Laureola siue Daphnoide quæ per-
petuo viret, diuersa ab ea de qua Hist. Lugd. eo
loco agit.

Schuenenhs. in Cat. Siles. Laureola, & *quædam*
Diosc. Chamædaphnæ Clus. At non videmus cur
hæc planta simpliciter Laureola dicenda sit, nulla
tanta similitudo. Chamædaphnæ Clus. non est,
vt prius dictum. De Diosc. Chamædaphnæ postea.

C. Bauh. apud Matth. Daphnoides: Laureola
folio teneriore & deciduo: Glycyrrhizam mon-
tanam nominare soleamus, vt rei herbariæ ignaros
fallamus.

Castel. Daphnoides & Laureola maior. Pla-
raque linguarum nomina iam supra dicta spar-
sim Hisp. & Ital. *Laureola*. Gal. *Laureole*. Germ.
etiam *Scheißlorbeeren* quasi cacationis Lauri
bacca, quia sedem potenter mouent: Siles. *Zet-
lang*/ *Zieglig*. Sequanis & Mompelgardensibus,
Bois gentil. Rustici circa Basileam, vt ex Cl. Di
Fel. Platero accepimus, nominant *Damar*. Belg.
quoque vt Germ. *Bellerbale* dicitur, his etiam
Leusifraut & pediculorum herba, forte quòd eos
abigat Boh. *Wleß Laybo Wetsy* / teste Match.
Eadem

*Mulsi me-
dici sup-
pignora.*

*Piper' rus-
ticum
Murch ju-
gillatur.
Camer &
Lob. accu-
sant.*

*Chamelæa
duplex co-
salpina.*

*His. Lugd.
et. iustit.*

*Sibonets
repreh
Glycyrrh-
za motum.
Daphnoides.*

Locus.

Eadem ferè loca cum precedenti amat, silvatica, montana. Plurima cum in Germania & Heluetia, cum in Allobrogum & Ligurum Delphinatusque montibus & collibus siluosis, opacis, in vallis Anoniæ montibus Tridentini agri reperitur in monte Amano, teste Bellon. quam ille *Bellerfrut* Germ. dici ait, quanquam temerè herbam vociter. Circa Basileam in Moutero monte. Denique in plerisque pinguibus & opacis, asperis atque desertis Germaniæ locis. In Italiæ hortis quamplurimis cultam vidimus. Translata enim ad frugem peruenit ac diu durat, quales plures in hortum E. C. Montb. transferri curamus, quæ adhuc vigent, ubi de Ian. & Feb. Martio atque Aprili florentem observauimus, pro natura & clementia hiemis. Communiter tamen Martio floret: Sed horum gemmas seu germina statim post autumnum promere solet, qui mox hieme, si clementer sit, aliqui incunte vere, panduntur. Folia post flores demum exeunt. Tandem æstate & bacce quæ Augusto magna ex parte rubræ factæ maturantur. Subinde folia amittit.

Sæcul.

Tempus.

V. et
vlt.Hydops.
Flores
vires
Flosa com-
pota.

Causa.

Purgans.

Nath. non
fidendum
multa
genui.

Tiptum.

Prodidit *Tragus* se *Chamelæ* (intelligit autem hanc de qua hic agimus) quosdam agytas & impostores non paucos ad orcum mittere vidisse. Eiusdem iudicio *Pilulæ* quas *Chamelæ* Mes. & *Serapio* conficiunt, ad hydropem maximi sunt momenti. Existimat decoctionem florum tutioris & minus noxii usus esse. Nemini tamen autorem aut magistrum hac in parte se velle esse, proficetur. Folijs cum melle tritis sordida vicia & crustosa repurgari. Mulieres quæ formæ student, hoc medicamento uti posse: nam faciei maculas intra paucos dies illitu extirpare & purgare. Notum consilium est, ne quis temerè utatur *Pilulis* de *Mezereio* dictis, præsertim si imponatur *Chamelæ* *Tragi*, quia non parata sunt ut decet. Qui *sinigma* *Tragi* vult usurpare in magnatibus, caveat nec inflammet faciem, & pustulas excitet ipsis maculis deteriores. Nam erodentis & admodum inflammantis est facultatis. Folium vñ siue recens siue siccum comestum pituitam viscidam per deiectiones vacuare, vomitum mouere & mentes *Matth.* tradit. Baccas quindecim potu assumptas efficaciter purgare. Folium in nares indicium sternutamentum excitare. Cum passulis folium vñum masticatum, à capite pituitam & saliuam ducere. Nimirum hæ ipsæ sunt vires quas suæ *Daphnoidi* tribuit *Diosc.* quas mutuatus *Matth.* suæ *Laureolæ* applicat. Ut iam aperte videant *Studio*si, quantum ei sit fidendum. Dosis baccarum periculosa, & quam ipse non sumpsisset, nec sine noxa alijs propinasset.

Dodonæo folia, cortex, radix, & fructus sunt calida & sicca ad tertium ferè gradum, eiusdemque ferè qualitatis cum *Thymelæa*. Folia, inquit, purgant potenter & violenter per inferiora pituitam & humores biliosos ac aquosos, his uti officinas loco foliorum *Chamelæ*. Easdem vires habere baccas, easque commanfas tantum calorem ac feruorem in faucibus relinquere, ut vix potius copiâ restingui possit. Idem hanc plantam sine dubio nocuam esse hominibus, cum sit usque adeo calida, ut vehementer violenterque operetur, ideoque lædat & noceat partibus internis. Huius folia præparari ut folia *chamelæ*; eademque ratione præparandos esse fructus & corticem, si sumendi exhibeantur in aliqua medicina. Idem in *hist. lat.* scribit, officinas Germaniæ & Belgij huius folijs (si quando opus sit) uti pro *chamelæ*, quod citra errorē fieri potest, quod & *Cam.* repetit. Menses quoque ducit, ut perhibet *Schwenck.*

Cortex verò aduersus *Quartanam*, *Hydropisim* & venena pro se cū *Saccharo*, vel liquore aliquo bibitur, corrigitur *Lacte*, vel *Aceto*. Experimentum qui volat? Nos non facile periculum fecerimus, nisi deficientibus alijs medicamentis, aut in casu desperato eius usum susceperimus idque cum magna consideratione.

Suspectum porro nobis est & illud *Ant. Roiet* medicamentum, quod peste laborantibus exhiberi tradit. Foliorum, inquit, *Laureolæ* exsiccatiorum pondus coronati, plus minùve pro ratione virium ægroti, per biduum in aceto macerant, & bibendum præbent, quod sudorem mouet, vomitum & aluum: & hac ratione venenum expellit. Suspectum ut diximus, est nobis hoc medicamentum: si eo utendum esset, velimus potius folia *Laureolæ* macerata per biduum in aceto cum alio liquore propinare.

Nam vel *Pen.* & *Lob.* testibus, ac ipso adeo sensu, fauces, & esophagumque [aliter quam *Euphorbium Gesner.*] adurit, diu multumque vexante impressione. Non minùs hæc per aluum deiecit crassum viscidumque *Phlegma*, & intestinorum tamenta abradit quam *Laureola*, cui non dispar, sed vehementior facultas inest, eademque in aceto maceratio ad corrigendum debetur. Sic enim videntur etiam Medicorum quorundam præcepta *Pharmacopœa*. Quare [inquit idem] facit hæc virium expansio, ut minùs quis putet *Chamadaphnen* legitimam. Quippe quam *Diosc.* *καμαδαφνη*, id est, capitis doloribus & stomachi ardoribus mulcendis commendat, ut interpretis vertit. At si vlla ratio iniri queat, quâ tam feruida planta pro *Diosc.* *Chamadaphne* agnosci queat, ea interpretatione commodiore & veriore videtur sita: namque *καμαδαφνη* & *καμαδαφνη* idem est, id est, capitis doloribus & stomachi vitionibus accommodat, veritas, non incommodo sensu intelliges folia tusa admodum capitis dolori, puta à frigore, vel flatu, mederi: Stomachique vitionibus faciendis adiuuari, ad diurnas fluxiones sistendas aque stomacho auerendas: ut *Paulus* ex Antiquis docet faciendum, lib. 6. de stomachi vitione, ferro vel caustico non vrente actu, cuiusmodi sunt fungi, aut nigri *Agarici* frustilla, aliæque inibi scripta, quibus non secus atque folijs huius vñ sunt Antiqui. Sic *Diosc.* magnam præsidium putat *Arabiam* vocatam *usitionem* à Græcis, quæ hæc solita fuit *Spirillis* caprinis, oleo feracanti immixtis, & pollicis cavo inustis. Sic illi.

Nobis nondum verisimile videtur hanc esse *Diosc.* mentem, estque valde longè petita hæc interpretatio, nec consuevit aut opus habuit *Diosc.* ab Arabibus discere, quos nec vidit nec agnouit. Que nostra sit aliorumque hac de re sententia cap. de *Chamadaphne* declarabimus. Non enim concedimus, hanc de qua hic agimus, esse *Chamadaphnen* *Diosc.* Nec tacendus tamē alius eius usus quem *Moibanus* invenit, in cuius *Antidoto* alia *Saxonicam* vocatam aduersus venena eius radix quoque in aceto macerata venit, quam antidoto alio commodiore loco referemus.

CHAMELÆ HIRSVTE NOMI-
NE DATA.

CAP. XXXVI.

CHAMELÆ nomine, & Gallicè *Sais* Germ. *Gil*, id est, Ligni nobilis nobis daram (non



recordatur a quo] plantam in seculo nostro herbario inuenimus & etiamnum asseruamus. Fruticis parui speciem habet, uti praecedens: Caudex lignosus, rami palmares, nigricantes (in sicca.) Folia similia ferè cum praecedenti Laureola folio deciduo, breuiora tamen, & multo angustiora, in acumen desinentia, nonnihil hirsuta.

bium accendens. Aliqui non rectè Laureolam vocant. Facile nascuntur: crassior enim radice & tenax est cortex. Item de Collect. simpl. Laureola pulio species in monte prope Curiam, parua, angustis folijs, paulò maioribus, quam Rosmarini, flosculis purpureis odoratis, ut in Zyland. Cauliculus lignosus est, non ultra septem digitos altus. Floret summo. Considerent periti an Gesn. de duabus plantis scribat, an de vna tantum. Item an intelligat Thymelaeam Cordi vel Cneorum Matth. fruticosum, potissimum per eam Laureolam, quae prouenit Curia: Icon à Gesn. addita Thymelaeae minori Cordi non quadret cum Cneoro Matth. Stirpium studiosi obseruabunt circa Augustam Vindel. & Ratisbonam, Thymelaeam minorem, & conferent cum Cneoro fruticoso Matth.

Tragus de sua Thymelaea sic scribit: Kellerbals & Zeilander Gerum: Latinis nonnullis *linum fil.* *Olinella* & *Leo terra*: apud Diosc. *busia* & *linum fil.* *quiana*: Plin. *Pyrosachne*. Cnestron & Cneorum vocari tradit Syri *Apelin* nuncupant: Hyginus *Capiam*. *Liparitis* cuiusdam Aetnæ mentionem facit, qui & Cnestron ito mutari tradit. Num vero ad hunc fruticem & pertinere appellatio, minime constat. Fructus Thymelaeae *Cratium Gnidium* vel *Cocum Gnidium*, ut loquuntur Offic. appellatur. Errant Recentiores, qui *Cocognidium* ex Chamelae nasci existimant. Multo maiori errore versantur, qui Chamelaeam cum Daphnoide seu Laureola confundunt, ac si ad vnam & eandem herbam veraque appellatio referenda sit. Vid. Cristoph. de honestis & Jac. Manlium, super Confect. Mezereon. Frutex est, arbutulae iussu proliens, virgis multis, tenuissimis, tripedaneis, aut breuioribus, folijs exiguis & pinguibus, flore candido, fructu rotundo, seminibus Cannabis haud maiori, linguam si mandatur adurent, non aliter atque Chamelaeae de qua proximo capite. Non ubique obuia est, sed incultris, altissimisque montosis & siluis prouenit. Haec Tragus curid euenit quod reprehendit in alijs. Laureolam folio deciduo his pingit, pro Chamelaeae & Thymelaeae uti dictum: licet neutra possit esse: nec eius Thymelaeae descriptio respondeat iconi, quae fortè ex Diosc. desumpta, ipsis plantis non probè cognitis, vel sanè superficialitè consideratis. Considerandum tamen an fortè intelligat Thymelaeam minorem Cordi modò dictam.

An Apollo de hac Rad. l. p. 96. Thymelaeae ex qua Granum Gnidium, Chamelaeae similima: An item Anguill. in epist. Thymelaeae ex qua fructus Cocum Gnidium dictum. Adeo superficialitè vel intricatè de his tradunt, ut quid statuendum nesciamus.

CNEORVM MATTH. SVFFRUTEX.

CAP. XXXVIII.

Pro Cneoro, exhibet Matth. plantam Thymelaeae Monspellanae aliquatenus similem, ex radice crassa, nigra, plura lignosa virgulta, dodrantem circiter alta, ramola, cortice nonnihil rufescente tota profertur: in quibus pocius rufa fatigui folia conferta, virentia: Thymelaeae multo breuiora, obtusiora, glabra, nervo vno secundum longitudinem donata. Flores ramulorum extremis insident multi, simul congesti, purpurascens, ac interdum albi, quorum singuli Ratach Matthioli floribus formam non absimiles, ex oblongo tubulo in quatuor

THYMELEA MINOR CORDI

CAP. XXXVII.

Descriptio:

Folia.



Thymelaea minor Cordi, paruulus est frutex, plures ab vna radice imitens virgas, longitudine pedales aut dodrantes, per terram stratas, lentas, flexiles, & distrectas: contumaces folijs numerosis, vndique vestitis, figura oblongis, vtrinque acuminatis, crassiusculis, superius viridibus, inferius pallidioribus, Olor

Sapor.

Flores.

Radix


Sapor.

Locus.

Myrtique folijs multo minoribus, ac potius fruticoso Polio similibus, paulò tamen maioribus, gustu glutinosi. Flores, Sole Taurum occupante, producit in summis virgis oblongos, inferius angustos, superius in quaternia folia parua se pandentes, è purpura in puniceam atque candicantem colorem vergentes, densos: & ab vno principio sese in Corimbo diffundentes, suauiter odoratos, & mellis aliquem odorem redolentes. Floribus singulis succedunt baccae. Radice nititur longa, candicante, nervosa, lenta, flexili, infragili & perenni: gustu ad aliquot horas fauces & palatum Cocognidii modo excofaciente & scarificante. Nascitur frutetosus & muscosus tam planis quam editis locis: nonnunquam etiam sub Iuniperis. Copiosa autem circa Vindelicorum Augustam, & Ratisbonam.

An de hac Gesn. de hort. Piper montanum in Italia multis vocatum, quod nostri Zyland, Dod. Chamelaeam falsam: eiusdem species alpina minor superiore autumnio hortulo meo commissa, viret etiamnum. Vis vtriusque caustica, omnibus partibus os & palatum non aliter quam Euphor-

Chamelae
falsa.



tuor facinias
radiatim dispo-
sitas facellen-
tes. Placet &
diligētissimi &
peritissimi Her-
barii Clus. des-
criptionē sub-
iicere. Elegans,
inquit, suffru-
tex, cui multi
sunt rami gra-
ciles, flexibiles,
lenti, surculosi,
ab ina proxi-
mus cellure e-
mergentes &
humi diffusi.
Folia nullo or-
dine disposita
ramulos am-

biant, viridia, cutanea, Thymelaeae verē pro-
xina, ingrati primum, deinde amari saporis, nul-
la aut perexigua (quantum quidem gustanti de-
prehendere licuit) acrimonia praedita. Flores in
summis surculis, sex, septem, aut plures, conferti,
quatuor foliolis constantes, ex rubro purpuras-
centes, Centaurij minoris florum penē similes, in-
grati etiam & amari saporis, aspectus tamen pul-
cherrimi, atque odorati, caput (si diutius naribus
admoueantur) tentantes: ijs succedit fructus exi-
guus, Thymelaeae fructui haud dissimilis, non ru-
ber quidem, sed candidus: oblongiusculus, semen
continens cinerea membrana rectum, rotundum,
Thymelaeae grano par. Radix longa, minimi di-
giti ut plurimum crassitudine, interdum nigri-
cans, maiore verò ex parte haescentes, lenta, su-
perna parte nonnunquam gracilior, unde rami
flexibiles & humi dispersi emergunt, & subinde
secundum alarum caua, latis crassas fibras haes-
centes agunt.

Matth. in com. cum magnis icon. Lat. & Ital.
iconem proponit huius plantae nomine cneori
Matth. ubi scribit: inuenisse se in Bohemiae silvis
plantam, quae omnibus partibus suis cneorum can-
didam referat: flores in surculorum cacuminibus pur-
pureos, odorati Testiculi odore &c. In epit. sua
iconem ponit diuersam à praecedenti, pro cneoro
candido: de quo agemus suo loco, nempe capit.
de Ocymoides vel saponaria minore. Hanc
non describit, sed tantum ait: cneori candidi, de
quo meminit Theoph. hic imaginem damus, ut
qui chamelaeam faciant, ad mentem redeant.
Profecto in ipsomet mens requiritur, qui sibi pa-
rum constans quod affirmavit raderet in dubi-
um reuocans, aliam plantam pro Cneoro, nem-
pe herbam, à praedicta toto genere differentem
exhibeat, parum memor eorum quae prius tradi-
derat. Centē camer. in Epitome Matthioli figu-
ram omisit. C. Bauh. in auctis & illustratis Matth.
commentarijs l. i. c. 13. Cneorum prius fruticolum
posuit, addens: Cordum fortē nomine Thymelaeae
minoris exprimere voluisse: is nihilominus illu-
strans Matthiolum, l. 4. c. 167. cneori titulo her-
bae iconem ponit adiectis adeò his Matth. verbis:
Cneorum de quo meminit Theoph. nullis defici-
entibus notis misit ad me Romā vir quidam no-
bilitate clarus, cuius imaginem hic appingi cura-
uimus, ut qui chamelaeam & Thymelaeam cneor-
um faciunt ad mentis sanitatem redeant. Est au-
tem ea icon reuera Ocymoidis minoris. Verum

sam verum erit cneorum Matthioli? frutex ne
hic descriptus, au dicta iam herba? Ut merito de
stirpium historiis meritis Clusius in hac
verba proruperit. Matth. hunc fruticem pro cneoro
albo Theoph. proponit. Cū verò quale sit
difficiliter indicari possit, cur huius stirpi cneori
nomen accommodare voluerit, multi mirantur.

Postrema Com. editione l. i. c. 167. nobis Theo-
phrastii Cneoron adfert, nullis, ut ipsius verbis v-
tar, deficientibus notis. Sed cū nudam tantum
imaginem, addito, cneori nomine oculis subiiciat,
illiusque historiam planē subiciat, si parum huius
ipsius assertioni adhibuerimus, nemo, ut opinor
vitio vertet. Ceterum, addit Clus. nisi in hac plan-
ta, (cuius & ipse satis elegantem figuram exhibet)
acrimonia, quae quidem sensu percipi possit, abes-
set, ad Thymelaeae genera aut ipsi co. genitum suf-
fruticem referendam esse censeam. Nonnulli
rustici Scitinosclm / hoc est, Petta. in Rosul. m
vocat. Nos autem ante monuimus cap. de Thy-
melaeae minore Cordi considerandum esse, an Ge-
nerus hanc fortē intellexerit nomine Laureolar par-
ae, cuius descriptionem ibi posuimus.

Est verò id notatu dignum, quod obseruauit
Myconus, medicus Barcinonensis, rei herbariae
studiosissimus à nullis animantibus, fruticem
hunc attingi aut atrod. Et cū mille huiusmodi
plantas folijs & floribus onustas viderit, nullam
vquam reperire potuisse asserit, in qua praecisum
aut arrosolum aliquid fuisset.

Braun apud Tabern. ponit iconem hoc titulo:
De Bellerphale aut Zeiland (asi. Matth. Chamelaeae
species: subiungit duas descriptiones, & po-
stea duas icones Thymelaeae, de quibus postea.
Casae, quam vocat, Matthioli, descriptionem o-
mittit, quam inuenisset apud Matth. sub Cneoro,
sic parū ocularis vno capite diuersas plantas con-
funde ns se & alios fallit: qui leget caput eius quod
est l. i. vix intelligat an in descriptione priori
intelligat Cassiam, ut vocat, an Thymelaeam.

Prouenit Cneorum Matth. ut tradit Clus. in
multis montibus Viennae vicinis tantā abundan-
tiā, ut rusticae mulieres, dam floribus abundat,
multos eius manipulos in forum venales adfe-
rant, cum alijs vari genotus floribus, exornando-
rum tricliniorum gratiā. Nasceatur etiam in Pan-
noniae silvis editiore loco sitis ultra flumen Ra-
bum siue Arabonem. Frequens etiam crescit qui-
busdam siccioribus pratis Francusforto ad Mo-
enum vicinis, praesertim silua quadam quercubus
confita, circiter miliare infra eam urbem ad lini-
stram fluminis, inter Ericas, ubi illam candidis e-
tiam floribus variantem conspexit Clus. cuius e-
tiam manipulos rusticae mulieres in foro venales
proponunt.

Aprilis plerumque florere solet, nonnunquam e-
tiam Maio. Fructus maturus est Iunio. Addeò
autem secundus est hic suffrutex, ut saepenum-
ter eodem anno floreat, nouis floribus semen se-
per consequentibus, quod probè maturum, bis eo-
dem anno de vna eademque planta collegit idem
Viennae Austriae.

Camer. restatur Cneorum Matth. sibi in horto
e semine natum: sed non docet an herbaceum in-
telligat, an fruticolum. Duo enim Cneora habet
Matth. eaque valde differentia, si probè meministis:
quae antea scripsimus. C. Bauh. suffruticem intel-
ligit.

Toscanus Carolus pharmacopoeus Burgundus
in Campagniola, diligens stirpium indagator, flo-
re albo & purpureo ad nos misit nomine Balsani

[si credere fas est] quicquam ab vilo autore mutasse, qui remedia, quæ ciuibus suis, inuitis etiam medicis profuisse iactat, promulgar. At saltem docuisset nos, aut didicisset ipse, si nesciuit egregius Herbarius, quâ in re differat à Victoriola sua, quam etiam Daphnirin, chamædaphnem & Mustellaginem silu. cognominat. Quid si confundat chamædaphnem cum Daphnoide? quod ei non nouum. Dubium igitur relinquatur nobis, quæ sit chamædaphne Apulei purgans, & an eadem cum Diosc. Plin. & Pauli ut censet Hymelbergius.

Hermol.
jugillatur.

Hermol. dum nimum Plinianè scribere studet, obsecratiorem reddit Chamædaphnes historiam ac suo nomine pronunciat, quæ Plin. prodidit: Chamædaphne Diosc. & Plin. quæ sit, non demonstrat Hermol. fugit hos scopulos, quemad. & Ruell. qui suo more ex Hermol. eo non citato sua decerpit & suffuratur.

Ruell. pla-
gaturus.

Chamædaphnem Marcellus humilem & terrestrem Laurum interpretatur, atque Latinis Vincam peruincam dici, ac eius meminisse quidem Theophrastum, sed tam breuiter, ut nihil possit ab eo intelligi, quam ferre chamædaphnem fructum folijs adnatum [vbi autè id scribit Theoph. locum sanè nondum inuenimus apud eum, & vix credimus extare: neque enim aded alieni aut peregrini sumus in lectione Theophrasti, ut si hæc diceret non alicubi id obseruauimus: indagandum tamen etiam in posterum.]

Humilis
Laurus.
Corrosiva
Laurus.

Apertè & ingenuè Anguil. fatetur, nondum sibi perspectum esse, quænam sit chamædaphne.

Amatus.

Amatus in Diosc. dicit, Chamædaphnem Hisp. Laureolam dictam, affinem esse Daphnoidei, non esse Vnicamperuincam, ut multi falso rentur, sed aliam herbam cubitalis altitudinis, ut Plin. describit: interim quæ sit illa non docet, unde satis patet ei non cognitam fuisse, præsertim cum nec doceat in quo differat à Daphnoide. Cornar. & Chamædaphnem, & Daphnoidei, utramque, Plinii, Officinis & Herbariis Laureolam vocari tradit. Sed iam antea dictum nobis videri Laureolum Cornario ignotam fuisse. Præterea Chamædaphne videtur à Laureola non parum differre.

Cornar.
toprob.

Et, ut tandem & nostrum iudicium de Chamædaphne dicamus, placeat nobis opinio Fab. Columnæ, qui vult Chamædaphnem Diosc. Plin. & Galeni esse *Bislinguam* siue *Vulgarium*, de qua paulo post.

LAURVS ALEXANDRINA.

Huius Theoph. meminit l.c. 17. sic scribens: Illa quoque propria Idææ sunt, Laurus Alexandrina dicta, & Ficus quædam, Vitisque Lauri Alexandrinæ hoc proprium est, quod in folio fructum gerat [*ἡ ἀλεξάνδρινα ὡς ἡ μυρτιά*] quemad. & Myrtus silu. seu Ruscus [*ἡ ῥοδάκνη*]. Verique enim fructus ex folijs ipsius dorso [*ἐκ τῆς πλάτης τοῦ φύλλου*] nascitur. Hic obiter Theophrastum ridens Scal. Festiuium vocat *ῥοδάκνη*: Nam (addit) Quomodo Idææ fuerit propria Laurus ea, quæ Alexandrina nominatur? Pro Theoph. & pro se responsum habes apud Plin. l. 4. c. 39. quem consules. Idem Theoph. eadem paullo aliter circumscribit, cuius verba Græca lubet ascribere, non ad ostentationem, ut quibusdam id solemne visum, sed quia vel ipsis Latinis sint magis significantia, & nescio præ iis quam *ἡ ἀλεξάνδρινα* habeant.

Theoph.
Laurus cum
tra Scal.

sic ait: *ἡ ἀλεξάνδρινα ὡς ἡ μυρτιά* [*ἡ ἀλεξάνδρινα ὡς ἡ μυρτιά*]. Quorum verborum sensum minùs fideliter expleuit Gaza, sic inquit: fructiferaque nonnulla fructum folijs interceptum vel pediculo tenus tantum gerunt, quales sunt et, quæ ad foliorum insertionem seu exortum angulum, fructum exerunt. Pleniùs ita: Quædam fructifera eo modo, ut fructum veluti sinu foliorum suorum comprehendant. Lenocinium addas cum Scal. molliusculè sic: Quorundam inuolucro, aut sinu fructus obducitur aded, ut ipsa (folia) fructifera dici mereantur, quemad. Alexandrina Laurus, in folijs vel super folijs fructum ferens.

Gaza
prob.

Audiamus & Plin. Est inquit (& chamædaphne silu. frutex: est & Alexandrina, [Laurus] quam aliqui Idæam aliqui Hippoglottion, alii Daphnirin, alii Carpophyllon, alii Hypelaten vocant. Ramos spargit à radice dodrantales, topiarij ac coronarij operis, folio acutiore quàm Myrti, molliore & candidiore ac maiore, semine inter folia rubro. Plurima in Idæa, & circa Heracleam Ponti, nec nisi montosis. Id quoque quod Daphnoides &c. Dixerat autem iam priùs: accedit in topiario opere Taxa [Laurus] excrecente in medio folio paruulo, veluti lamina folii. Item alibi. Laurus Alexandrina siue Idæa pattus celetes facit, radice pota trium denariorum pondere in vini dulcis cyathis tribus: secundas etiam pellit, mensesque eodem modo pota.

Laurus A.
lexandrina
Plinio.
Laurus
Idæa.

Diosc. illu-
str.
Laurus
Taxa Plin.

Adeamus Dioscoridem: Laurum Alexandrinam, inquit, alij *ἰδæα*, alij *ἀλεξάνδρινα*, alij *ῥοδάκνη*, alij *ὑπελάτη*, alij denique *ὑπὸ γλῶττι* vocant. Folijs est Myrti siluestris [*ῥοδάκνης*] seu Rusci similibus, maioribus tamen, mollioribus & candidioribus: fructu in medijs folijs [*ἐκ τοῦ μέσου τοῦ φύλλου*] Ruell. inter folia: maluit cum Plinio loqui, quàm fidem præstare auctori [*ῥοδάκνης*] rubro, ciceris [*ῥοδάκνης*] magnitudine. Ramos verò per terram [*ἐκ τῆς γῆς*] spargit (fortè rectius è terra emittit, aut suprà terram profert) dodrantales, interdum etiam maiores: radicem similem Rusco [*ῥοδάκνης*] maiorem tamen, odoratam & molliorem. Nascitur in montosis. Eius radix succurrit in difficili puerperio drachmarum sex [alij quinque] pondere in vino dulci pota. Succurrit & vrina stillicidio vexatis, & menses educit. Pro quibus postremis verbis habetur: *ἡ ἀλεξάνδρινα* Sanguinem extrahit: Sarac. per quem nihil aliud quàm menstruum cum Plin. & Cornar. intelligimus. Illud non omittendum: pro eo quod folijs quàm Rusci maioribus diximus, in Græco haberi *ῥοδάκνη*. Marcell. vertit minoribus quasi legisset *ῥοδάκνη*: sed malè, adstipulante etiam Cordo, immò Plin. quoque & Serapione, hoc speciatim, qui Laurum Alexandrinam & Gar Alexandrinam vocans nihil præter Diosc. & Gal. verba transcribit. Corrupti igitur codices putandi qui *ῥοδάκνη* habent. Galen. Daphnen herbam vocat *ῥοδάκνη* inquit, quàm & Daphnen Alexandrinam appellant, temperatura euidenter est calida, & gustantibus acris simul & subamara, potaque cum vrinas tum menses prolicie.

Asenjes.

Danae.
Hypoglot-
tion
Zalaa.

Descriptio.
Diosc.

Difficilis
partus.
Prima fil-
ludum.
Menjes.

Marcell.
not.

Daphne
herba Gal.
Sapo &
temperam.
Apuleius
Laurus.

Apuleius cap. de Victoriola sua Laurum Alexandrinam cum Daphnoide confundit, ac etiam, vel suspicatur, Chamædaphnem, ut iam priùs latius ostensum.

Cæterum Laurum Alexandrinam & Laurum Taxam eandem plures esse cum Hypoglossò & Bonifacia seu Bislingua statuunt: de qua re postea specialius trademus. Cornar. verò negat Laurum Alexandrinam esse Hypoglossum, sed

Cordoba

Hoff, Lloyd
resub.

*Euforbia
epiphylla
var.*

**Feb Column
on Hift.
Engd.**

Life Support

Idea radi
Fase.
Decriptio

Description

Téperam.
 plus fluxus
 minus (im-
 perius.

Herb. Ind. Eur.

Super

Dysferria.

BONIFACIA SIVE
BILINGVA.



Falsch

non foliolum non accrescat folio: hanc hippoglossum feminam, illu. n. matrem dicit: tamen vnam tantum figuram habet. Idem *Virg. Georg. 4. v. 1000*, Recentioribus Victoriam, & *Virg. Georg. 4. v. 1000* ab Ida Troas monte, quæ & Alexandri Troas dicta est, eandem indicat. Nec referre ait, quod Diosc. de Hippoglossis vno loco, alio vero de Lauro Alexandrina scripserit. Nam de vna stirpe quandoque sub diuersis appellationibus separatimque locis agere Dioscoridem & alibi à se ostensum, veluti cap. Tussilaginis. Nec etiam refert (addit) quod Ruell. versio habet femina inter folia exire, aut quod talem iconem Ruelliana interpretatione respondens Matth. exhiberit, fructu videlicet & longis pediculis. Ruellii autem conuersionem non esse fidelem & ipse Matth. postea agnouit. Mirum tamen tam falsam & imaginariam iconem in suis commentariis relictam fuisse. *Hac illa*. Verum de hac Matth. iconem plura dicemus cap. de Polygonato ramoso.

Lonicet. in sua historia more suo duas icones Bilinguæ ponit pro diuersis plantis, nimirum prioritulum faciens *Zapfenfrant*, quam dicit Laurum Alexandrinam & Victoriam: alteri capit. seq. *Zungenblat* / Hippoglossum. Idem in comment. l. 4. c. 12. in Diosc. euidenti repugnantia dicit Hippoglossum, id est, equinam linguam sibi incompetentem: & c. 142. tradit Laurum Alexandrinam Germ. vocari *Zapfenfrant* & *Bochenblat*. Inunc si lubet, & eiusmodi varianti Scriptori vel potius nugatori nescio, fidem adhibero.

Ryffius quoque in Diosc. bis ponit eandem iconem, sed non pro diuersa planta: scribit se Laurum Alex. Diosc. eandem putare cum eius Hippoglossis. Verum nescimus quid sibi velit cum ait, Nec me fugit nullam in ea qua vix medeatur familiaritatem inueniri, à qua tamen ei inditum nomen, ut hinc etiam Germanis Vuula folium dicatur: immò ne aliquem quidem foliorum usum. Quid hoc est? quomodo conueniunt cum his quæ sequuntur? Sub lingua teneri solita sunt folia, vel hodie, non tantum apud Insulares ut Marcell. ait, aliaque alibi Gentes, sed etiam in Germania nostra sit, quoties abundanter puoram saluam & distillantem in fauces humiditatem, unde vel proluxa columella, id est, vuula, vel fauces balbutie linguæ impedimentum oritur, cohibere & siccare opus est. Sanè, ut ipsa locutio satis obscura, sic contradictio satis manifesta apparet.

Gelnero melius Hippoglossis, quam Hippoglossis scribitur, quam & Laurum Alex. vocat, & cum Rusco aliquid cognationis habere censet. Ceterum Laurum Alexandream Diosc. quæ Ruscifolia Theoph. (ut annotant Aduer.) aliam esse ab Hippoglossis, cuius in promptu est: De Theoph. & Diosc. nosce: Hippoglossi siue linguæ radix minor, gracilior, breuior: foliū tenue, paruum, cui medio quasi cauo aliud foliolum, lingua instar, insitum: aculeo rigido, infesto, mucronatum utrumque, inter quæ bacculi etiam rubra Rusci videntur, suspiciendo naturæ, propter raritatem, opere. Quare versionem Plinij legenti, satis liquet, diuersas esse plantas, lectionemque Hippoglossi apud Diosc. laxatam fuisse: videreturque Plin. legisse, non *stam*, sed *stam*, id est, non comosa, sed caua folia, siue infesta, cuiusmodi planè sunt etiam nostras Bilinguæ siue Bonifaciæ.

Senensis quæ ingenij est opulencia & liberalitate, ubi ceteri Scriptores putant descriptionem,

nem, nomenclaturamque *geminam esse*, duntaxat vnius & eiusdem plantæ, non solum dedit, ut par fuit, *Bonifaciam* pro *Hippoglossis*, sed insuper duas commentus fuit. Alteri nempe affixis asfabrè lingulis, quam postea, prudentior factus, delendam curauit: Alteri datis in petiolis longis baccis, quam Sigillum Salomonis merito suspicantur, in illumque quasi impostorem ignarum debacchantur isti Critici, quod tones, totque annos, cum versarit aut versare debuit diligenti, ac fidei manu, oculis, ac ingenio hanc plantam, tandem non animaduertente Theophrasto & Diosc. Lauro medijs in folijs fructam, non in petiolis inesse: sed illam deimpram, quasi foret à se fictam commentarijs penultimis, commodiorem multò fuisse: quippe cui similior est ea, quam quidam Herbariorum peritissimi in hortis colunt & veram affirmant Alex. Laurum.

Sed argumenta quibus negant Aduerf. Bonifaciam seu Hippoglossum esse Laurum Alexandrinam, nobis videntur parui momenti: & quod aiunt, folia Hippoglossis esse spinosa, quod & Clus. dicit, id negant Cæsalp. Dod. & Fab. columna: Verum hi fortè describunt cultam, illi siluestrem & spontaneam, cuiusmodi fere cultis solent esse rigidiore aut hispidiore. Lectores videant, quæ antea de Lauro Alex. tradita.

Anguillaræ iudicio Laurum Alex. nihil aliud est quam Bonifacia: & alibi tradit Hippoglossum non conuenire vilo modo cum ea quæ dicitur Bonifacia & Bilingua: nullam ferre comam spinosam, nec ex corymbis prodire vllas linguas. Matth. in com. in Diosc. l. 4. c. 142. Bonifaciam seu Bilinguam scribit non esse Laurum Alex. aut Idæum, ut existimat Fuch. in suo com. de plant. historia. Quippe Laurum Alex. è foliorum umbilico nullam exerere linguam: sed tantum fructum rotundum, Tiliæ modo, longiori pediculo appensum, proferre. Idem postea c. 14. Si, inquit, Laurum Alex. & Hippoglossum vnam & eandem plantam esse sentisset Diosc. ut quidam existimat, superuacuum erat de iisdem diuersis & proximis capitibus differere: diuersas quoque versisquenotas assignasse. In Lauro Alex. nec linguarum meminisse nec aculeorum è folijs prodeuntium: ferre fructum rubeum inter folia, non autem in medijs folijs. Ex his notis, tum ex viribus, quæ in hisce duabus plantis maxime pugnare deprehendantur, omnibus abundè constare arbitrat, hallucinari eos, qui putant vnam & eandem plantam esse. Se equidem illam, cuius dat figuram, legitinam Laurum Alex. censere. Huic alteram adiecit, quam & ipsam haud dubiè Laurum Alex. fore: si huic fructum in medijs folijs inhæsi concedatur. In Epit. prius pro Hippoglossis ponit, & postea pro Lauro Alex. 2. Sed sciat lector primam omnium iconem Matthioli pro Lauro Alex. positam esse Polygonatum ramosum, de quo alibi trademus. Secunda similis est Hippoglossis, sed in ea fructus appingitur sine foliis, quam in comment. cum magnis fig. Lat. & Ital. omisit, fortè quia contrariari videbat suis verbis, quibus dixit, Laurum Alex. non ferre fructum in medijs folijs, sed inter folia, contra manifestum textum Diosc. & Theoph. Plinium potius & Ruell. sequi maluit, ut tueretur suum Polygonatum ramosum, cui malè in hist. Germ. tribuit nomina & vires Vuulariæ, seu Bonifaciæ. Camer. in epit. eiusdem Matth. omisit quoque alteram Laurum Alex.

C. Bauh. in vltima Matth. editione tradit Hippoglossum duplex esse, alterum in quo fructus pediculo, alterum in quo folio insidet: quod etiam

Matth. in postura.

Præter
Lot. opus
reuerit

An folia
spinosa.

Bonifaciam
non esse
Laurum
Alex.
Fuch. not.

Matth.

Hippoglossi
sum dicit
C. Bauh.

ponit in sua Matth. editione nomine Lauri Alex. Idem insuper in Animaduers. in Hist. Lugd. annotat Laurum Taxam cum Lauro Alexandrina vera non confundendam esse, cum diuersæ sint, utramque se à D. Agerio habere: aliam fructum habere cum pediculo, in altera fructum insidere folio. Sed num Bilingua vulgari, quia pediculum habet fructus, ideo folio non insidere dicemus? Cæsalp. & Clus. meminerunt quidem Hypoglossi siue Bilingue sine medio folio aut glossario, fructu ex petiolo pendente. Glossaria nobis videntur facere differentiam, non pediculi.

Cæsalpin. equidem, ut industrius Botanicus, mirari satis non possumus Laurum Alex. Diosc. à Lauro Alex. Theoph. & Plinii distinguentem, ac putantem polygonatum ramosum eam esse, atque adeò Rusci affinem dicere, quam longè differentem alio loco trademus. Paulò antè dictum Penz & Lob. Bilingue folia esse pungentia, quod negat Cæsalpinus.

Polygonatum ramosum
Laurus.
Taxa.
Manardus
man.
Laurus
Fraxinea.
Manardus
repech.

Manardus, ut observauit Hist. Lugd. pro Laurum Taxa Plin. Laurum Fraxineam vel Fraxinum Lauream (vtrum enim velit non satis explicat) legendum esse censet, quoniam Lauri folio Fraxineum simile sit. Sed cum inter tot Lauri genera nemo vnquam Fraxinum retulerit, nec Lauri Fraxineæ vllus vnquam meminerit, percutari debuerat, quænam esset illa Laurus Taxa, potius quam Plinii lectionem sine ratione mutare.

Taxa unde dicta.

Chamaedaphne.

Laurus
Alex. d. uer.
sa à Bilingua.
Hist. Lugd.
error.

Laurus Taxa Dalechampsio ea est, quæ Matth. & Dod. Hippoglossum. Lauri & Taxæ appellationes optime conueniunt: Lauri quidem à Laurinis foliis figurâ: Taxæ verò à colore, figurâ, magnitudine fructus, qui Taxi baccas omnino refert. Dalechamp. chamaedaphnem esse non sine multis & validis rationibus arbitratur. Ex eiusdem sententiâ, Hippoglossum Diosc. ac Galeni & Hippoglossa Plinii est frutex diuersus à Bilingua: intelligit polygonatum) Laurus Alex. Diosc. & Theoph. etiam diuersa. Hæc Hist. Lugd. vel eius confarinator Molinæus: qui pro Lauro Alex. ponit iconem matth. in qua fructus sine lingulis foliis appicti: nescimus an Dalechamp. fuerit eius sententiæ quam ei attribuit: si ita est, indigna profecto opinio tã docto viro: aliquid statuere ex sola iconè à Matth. proposita, cuius nulla extat descriptio, ac ne loci quidem notatio, ubi vel à Matth. vel à Dalech. visa, temerarium iudicamus: quamuis fortè possemus. Nolumus tamen ex umbra metiri rem, quod aiunt. Præterea Hippoglossum illud quod exhibet, de quo cap. de polygonato agemus, non est frutex. Argumenta eius contra Cordum putantem Hippoglossum & Laurum Alex. eandem esse plantam, cum F. Columna parui facimus: quandoquidem pro his proponit icones plantarum sibi incognitarum, ut tuam struat opinionem.

Tertius lap.

Laurus
Alex. esse
Hypoglossum.

Dalech. m.

Clusius veram Laurum Alex. nunquam vidisse ingenuè fatetur se scribit, si ab ea quæ vulgò Bilingua dicitur & Hippoglossum Dioscor. esse censetur, diuersa sit. Theophrastus enim nusquàm Hypoglossi mentitur, sed Lauri Alex. duntaxat. Eiusdem Clusio Dalechampsii Laurus Alex. quam hæc in medio foliorum impressis, nec vlla epiglotide rectis exhibet, valde suspecta est: an ipse similem viderit dubitare videtur, sibi sanè nusquam conspectam fatetur. Memorât in ult. sua historia, anno 1596. misisse ad se virum eruditissimum Sim. de Touar Hispanensem medicum, speciminis gratiâ veræ Lauri Alex. folia cum suis bacis, ad Theoph. descriptionem paulò superius memoratam ad amantissimam congruere: atque postea

ab aliis quæ ex Italia redierunt, istic in quibusdâ hortis satis frequentem eam plantam admonitus fuit.

Tabern. quoque Hippoglossi in & Laurum Alex. eandem censet, duplicem dicens matrem & feminam, quæ mari valde similis sit, nisi angustioribus & acutioribus esset folijs. Duas icones habet satis bonas c. 117 & 118: Nolæ sunt ex Guarrinianis emptis.

In qua dicitur
variante
a matre.

Nic. Braun apud eundem Tabern. posuit iconem Bonifaciæ siue foliolis ex folio, addens hæc verba: Cur Autor (Tabern.) hanc herbam Laurum Alex. Matth. nominet scire non possumus, quandoquidem ille improbat eorum opinionem qui hanc herbam Laurum Alex. vocant. Matth. Laurum Alex. posuit Tabern. inter Polygonata, vbi

mutet. Sed notari poterunt, ait Marantæ, qui Bonifaciæ vulgarem pro Lauro Alexandrina depingunt quando hæc ramos in terram spargere debebat, at Bonifaciæ in rectum magis ramos profert, ac propterea Hippoglossum potius censenda.

Tandem & industrius herbarum exploratorum Fab. Columna patetis audiamus. Is tradit nullam sibi repertam plantam, quæ ad radicem Idæam Diosc. folio Rusci referri queat, quam illam quam depictam exhibet: [est autem Bilingua: eadem nimirum cum ea quæ à nobis proposita.] Eandem, inquit Veteres, Diosc. & qui sequuntur ipsum Gal. & Plin. Hippoglossum appellant. Hippoglossum autem, Laurum Alex. Laurum taxan, & Chamaedaphnem eandem plantam cum Radice Idæa censo: nec nisi nominum diuersitatem habere à Scriptoribus diuersis impositam, quam Diosc. & qui sequuntur sunt cum non animaduertunt. Valerius Cordus in eâ est opinione, ut Hippoglossum & Laurus Alex. eadem planta sit, quam etiam Hist. Lugd. autor reicere conatus sit, non tamen suum consecutus est finem.

Radix Idæa
Diosc.

Gaudet vmbrosis & montanis: frequentissima in Liguriæ alpinis, Vrbinati agro, & quibusdâ siluosis montibus, Matth. spontè etiam nascitur montosis, saxosisque & aspectis, incultis Genæ, Portus Lunæ, Saonæ, Nicæ, aliisque alpinis sterilibus calidiorum tractuum: Aduert. Est & in monte Athos frequens: Bellon. Apud Germanos non prouenire Brunfels. scribit, causam suspicatur cæli qualitatem illi contrariam. Ex Vngaria adfertur. Clusio autore, in montibus nascitur, & abundanter quidem in monte imminenti oppidulo cui nomen D. Georgij, in Transdanubiana Pannonia, tribus ab urbe Posoniensi miliaribus, inuenitur: vnde Rhizotomi plurimam adferunt Viennæ, & eius vrbis mulierculis vendant: nam magno illis est in vsu, præcipuè autem ad vix procidentiam. In Silesiæ hortis viret ex collibus Pannoniæ Danubianæ allata: teste Schuenckf. Patauini quidam in hortis colunt: Romæ abundant horri, ut notat Lacuna, ubi & à nobis visa sub Maij finem baccula iam rubere incipiebat. Visa nobis etiam Florentiæ florens April: Ferrariæ in orto Monasterij S. Dominici al' Angeli: Bononiæ in orto di S. Saluator aliisque. Habuimus aliquando in orto Illustriss. Cels. Wirtenb. Monbelg. missam cuidam industrio Botanico & Pharmacopoto ex Burgundiâ: verum non diu durauit. Generis refert in hortis satam prouenire quidem, sed pumilam manere neque fructificare. Radix quidem satis crassa, carnosa & geniculata cum sit herbam viuacem ostendit. Raro tamen si Camer. credimus ultra annum vel alterum in orto, ut pote nimis montana, durat.

Locus.

Temper.

Sarri cy
plantatio.

**Virus &
vfu.**

Quæ Veteres de Lauri Alex. Hypoglossi, & Chamædaphnes virib. tradidère, licebit vidère in præcedentibus. Libuit enim ibi particulatum cuiusque suas, ut illi fecerunt, tribuere, ne in re dubia & tam controuersa, ut patuit, temerè & præter mentem illorum Veterum scripta, quod plerique magna securitate facere solent, temerè dispense-
mus.

Sed quid Recentiores de *Bonifacia* viribus tradi-
diderint, nunc videamus. Est ei, teste Marcello
Virg. acrimonia & caletaciendi vis, ideòque Prisc-
us ad siccandam linguæ nimiam humiditatem in
pueris adhibebatur, unde *Hippocresio* dictam putat.
Insuæres aliquæ Gentis aliquæ eodem autore, in
balbutientibus pueris vtuntur eâ iubentque sub
lingua habere mares duplex eius folium & sterili-
dum: simplex verò & sterile illud fœminas: quod
superstitione carere vix credimus. Germani, vt
obseruat Tragus, in fœcium Vlceribus & humectâ
supra modum Columellâ & anginâ duntaxat ho-
diè vtuntur. Herba & radix in puluerem reda-
cta, exsiccat manantia & fluentia vulnera ac vl-
cera, quemadmodû vulgaris *Aristolochia*. Corn-
ulum eius ad Columellam prolapsam leuandam
prædicat. Constat, inquit Cordus, certissimis
vulgi experimentis Vuulariæ radicem etiam siccâ
bubones in peste maturare. Hinc est, quod ma-
læsticam vim Hippoglossi radici Autores tribuunt.
Vuularia difficulter prientes epota adiuuat, mē-
tes cit, & calculos pellit, quæ licet omnia vulgi
experimenta sint, tamen easdem etiam facultates
Lauro Alexandrinæ Autores ascribunt. Tradit
ex vino potam strangulatis vteri succurrere:
herniis ab prolapsu interaneorum extuberanti-
bus mira celeritate mederi: siquidem dissiliencia
iungit protinus, sed infibulandus est æger, aut fa-

• Nonnulli appendunt hanc her-
bam pueris, vt nimia illo-
rum humiditas ex-
siccetur.

Tom. 2.

RVSCVS.

CAP. XL.



Descriptio

Ruscus duo-
rum do-
drantum, non-
nunquam etiā
duū cubitorū
altitudine den-
sis viminibus,
lentis fractūq;
contumacibus,
& striatis fructi-
cat, usque in
multos ramu-
los deductis in
quibus conferti-
ssima folia,
Myrtinis paria,
rigidula, neruo-
sa, inuicem in-
festo pungen-
tia, nullo pedi-
culo ramis ha-
rentia, parte

prona ad latus inflexa, vt non sursum & deorsum,
sed dextrorsum sinistrorsumque spectare videan-
tur, dura & robusta: sapore amara, & adstricto-
ria vi efficacique pellenzia, ad quorum medium
flos minimus, per breui pediculo harens, enas-
citur, qui vbi primum oritur, aciculz nodulum fi-
gura sua exprimit: expansus verò trina lacuscula
foliola, inferiore quidem sui, auersa que parte, so-
lum, cui quasi stragulo incumbunt, respicien-
tia, linteris in modum excavata, sinuataque or-
ditat omnia, reliquis interim tribus, quæ trinorum
instar radiorum sunt efformata, in angustum a-
picem desinentibus. Florem deinde fructus se-
quitur rotundus [non item folium] Asparagorum
hæccis maior, rubescens, subdulcis, sub cuius pel-
licula bina latent semina magna, sulca, altera
parte gibbosa, altera plana, insignis duritiei, ita
vt si in paumentū conueantur resulent, & vt ait
Lob. vix vili frangenti ictui cedant. Succrescit
quotannis noua Asparagorum simillima propa-
go, aromatica aliquantulum, amara, vt annotat
Lob. Radices crassæ, obliquæ, implexæ, fibras de-
mittunt crebras, Asparagorum fibris similes, al-
bas, longas, & amaras: Trago: Dod. verò gustu dul-
ce quiddam respicientes.

Hanc ipsam plantam Dioscorid. ^{μυρτιν λεγουν} Myrti sylvestris nomine describit : Quidam & ^{λεγουν} *Oxymyrten* dicunt : solum inquit, fert Myrti, sed latius, ad formam lanceæ mucronatæ : fructum rotundum, medio folio inhaerentem, qui per maturitatem rubet, nucleumq; ossis inflat durum completur. Ramuli ab una eadēque radice numerosi exeunt, vitilium modo levi, fractu contumaces, cubitales, foliosi. Radix Graminis similis, gustanti acerba, & subamara.

Ruellan in sua Diolcor. versione minus apposi-
te conuertit, bacca à medio folio pendentes, cum Ruell ro-
Græcè legatur, *καὶ τὸ σῆμα τὸ πτερόν* ^{prob.} *πτερόν*, ^{Dise illa}
id est, habet in medio folia rotunda: neque enim ^{fr. et c.}
ex foliis pendunt, sed ipsi adherent, *et uita lin te mend.*
docetis. Aut quid si cum doctissimo Saraceno
legamus *et c.* alioqui ex his vocibus, *καὶ τὸ σῆμα* &
πτερόν alterutram redundare necesse fuerit.

Scrapio verò, postquam fructum hunc inveni
Ccc

Ccc

Alypoides.

elic, floribus Nymphaeae. Inuenio & qui Alypoides hanc vocant. *Hec ille.* Verum non dolet quā plantam per Laureolam intelligat.

Laureola. Recens. in Diosc.

Non Laurum, inquit Marcell. in Diosc. sed Lauri formam & speciem: neque eam toto corpore, Verum in folijs & fructu tantum habentē herbam Graeci *Daphnoides* dixerunt. Laureolam vocant. Lapsosinus quod à capitis principio apud Diosc. statim legebatur Alypo simile *Daphnoides*: & florem Nymphaeae habere: & quod sequitur in medio floris esse Cono simile quiddam, in quo semen: quoniam non responderent *Daphnoidis* historiae, & nullibi in antiquissimis Graecis & Latinis ea legerentur, & paulò post de flore eius, legitimo loco ageretur. Nasci multum *Daphnoides* hoc Theoph. in Arcadia testatus est, numeraturque ab eo inter ea quae præcipuam purgandi vim habent. Cæterum non videmus cur Marcellus *Daphnoidem* dicat herbam, cum existimet Laureolam, quae frutex bicubitalis & maior interdum, & ipse Diosc. dicat *Daphnoidem*. Addendum & illud: *Daphnoidem* à Theoph. nō solum numerari inter purgantia, sed etiam inter alia non purgantia. Ruell.

*Marcell. ait.**Ruell. ait.*

Ruell. *Daphnoidis* historiam non illustrat, sed cum Hermolao, cuius consuetudo sibi more verba transcribit, non citato eo, dicit Herbarios nostros appellare Laureolam, eiusque descriptionem subiungit, non ad ipsam plantam factam, sed ex Diosc. inuenter repetitam.

Stephanus Alexandri.

Curtius notat Alexandri Stephanon à nonnullis vocari, quod o Alexander Magnus coronari solitus sit. Hic velimus Antiquitatum studiosos exerceri, nōs certè ipsi, abique autore, non credimus. Sic & de eadem *Daphnoide* ex Veterum pl. citis historiam pingit, ac si sua essent, non dignatus correctionis honore, quod plagiarium est. Sed quid ille curat, qui passim plagio ita attritus, ut iam dudum durissimum contraxerit calum. Nunc Laureolam nostram vulgatam describamus.

LAUREOLA SEMPERVIRENS. FLORE LUTEOLA.

Descriptio.*Flora.*

Laureola Recentioribus dicta ad cubitos duos & alius grandescit, stipite lento, aliquando simplici aliàs in ramos aliquot diuiso, quem subincereus tegit cortex, & fractu contumax, & flexuosus: folijs sgrè nudis, quae circa fastigium potissimum gerit, eaq; satis frequentia, Laureolam annua,

la, nec per hiemis asperitates caduca, ex angustiore principio seu ceruice sensim dilatata, tandem in nocronem definentia, crassa, glabra, nigricantia, splendentia, Laurinis ferè similia, sed nua-

nora, inter quae longiusculos, graciles, canescentes multos stellatos proferit flosculos luteos, [Diosc. virore subcandicantes: Lob. ex herbaceis pilis vel luteolos] succedentibus baccis glomeratis proximè ad ramos cohaerentibus, tumperinis, paribus, nonnihil oblongis, primis viridibus, per maturitatem nigris, nucleo intus duro, canabitis semine paulò longiore, medulla interiore candida. Radix subest in aliquot partes diuisa, longa, crassa, lenta, quae difficulter euelli potest. Sapor toti frutici feruidus.

*Bacca.**Nucleus.**Radix.*

An Hermol. Herbariorum Laureola, cuius verba paulò antè citata.

Scribit Marcellus *Daphnoidem* Diosc. nostrae aetatis peritiores Herbarios priuatim Laureolam vocare, ac ostendere Laurinis folijs surgentem à terra furculosum fruticem confertis coaceruatilque sub folijs seminibus, quae Laurinarum baccarum figuram sunt, nigris maturitate. Florem videre non licuisse, Quod si Marcell. intelligit Laureolam quam nos hic, hæc repugnant. 1. Quod non sit herba, qualem ipse dixit *Daphnoidem* (ut antè dictum) præter tamen Diosc. 1. Flores non candidi. 2. radix non inutilis, quibus notis designatur à Diosc. *Daphnoides*. An etiam huius nostrae folia molliora sint Laurinis, ut de sua *Daphnoide* Diosc. ait, dubitamus.

Marcell. ait. prob.

An Ruell. hanc pro *Daphnoide* & Laureola Herbariorum intellexerit, vix sciri potest, quia Laureolam imaginariè, nec sibi visam aut cognitam describit, ut dictum prius.

Candidè & apertè Cordus *De vitiis*. Recentiores Laureolam vocant, quae in nostris omne non habetur, nec ego quae sit compertum habeo. Hic Germanus fuit sicut & Cornar. ipsi coarvus, qui tamen duobus distinctis locis apud Diosc. magna securitate tradit. *Daphnoide* Officinis Laureolam vocari: Germ. *Grilanz*. 2. cap. seq. Officinis & herbarijs *Chamaedaphne* etiam Laureolam vocari. Et postea inferius alio cap. ait, esse hodie apud suos, qui cum *Daphnoide* *Chamaedaphne* confundant, itidem *Grilanz* appellant: qui sanè non ritè nobis videtur distinguere has plantas: & ut verum fateamur, nescimus quam Laureolam intelligat pro *Daphnoide*.

Officinis nota.

Monachi quoque Laureolam vulgò dictam *Daphnoidem* vocitant. Ac eos (inter quos Pandectarius) hallucinari scribunt, qui Laureolam volunt esse Mezereonis speciem.

Pandect. error.

Quin & Anguil. *Daphnoidem* ait hodiè vocari Laureolam, *Oliuellam*, *Oristam*, & notissimam esse in Italia.

Oliuella. Orisla.

Chamaedaphne, inquit Marth. quam Laureolam marem plerique vocant, folijs ac fructu à *Daphnoide* non longè differt: verum hæc tantum intercedit diffèrentia, quod *Chamaedaphne* singulari rectoque caule constat, cui folia circumquaque prominent, adeò ut in cacumine in orbem umbellæ instar diradientur, semine inde prodeunte *Daphnoides* modo. Hæc Marth. cuius icon habere videtur aliquid commune cum Laureola, folio semper virente, Sed quæ hic tradit non distinguunt à *Daphnoide*. In Epit. nullam ponit descriptionem præter Diosc. & iconem, scribens Italis dici *Laureola min. re*. In Com. cum magnis con. Lat. & Ital. aliam ponit iconem cum folijs acutioribus & tribus virgis additis floribus. In hist. Germ. omisit & iconem & descriptionem Diosc.

*Laureola. mas. Chamaedaphne.**Marth. admodum varietas in hist. Laureola.*

Camer. in sua Marth. epitome posuit iconem iam dictam cum tribus virgis, addens, sibi repertam similem aliquando plantam in monachibus

Chamaedaphne. Camer.

Daphnoides. Silex altissimis versus Morauiam, sed folijs crassiss, duris, & caule satis denso, baccis nigris. Quapropter verisimile esse, potius ad Daphnoidem referendam: nec immerito de hac stirpe, tanquam incognita, nonnullos dubitare. Idem in hist. Germ. ait, prouenire cum baccis nigris, folijs latis, in quidam montanis locis prope Lacum Lemanum & ad Rhenum: videri speciem Chamædaphnes Matthioli.

C. Bauh. apud Matth. Chamædaphne, inquit, Matthioli: Daphnoides seu Laureola Lugd. de qua stirpe nonnulli dubitant tanquam de incognita: alij tamen ad Daphnoidem referunt: suspicantur Matth. Laureolam Offic. exprimere voluisse. *Hæc ille:* ubi incuria typographica pro Chamædaphne, posita icon Lylmachiz siliquosæ specioso flore.

Matth. mor. Ut liberè dicamus, quod sentimus, videtur nobis Matth. non nouisse discrimen inter Laureolam folio deciduo, & folio semper virente, atque aded nesciuisse, quas plantas suis nudis iconibus proponeret. Si pro Chamædaphne intelligit Laureolam semper virentem, id sit cum summo periculo. Quis medicinz peritus volet exhibere ad ardores stomachi mulcendos, & sedanda tormina, menses & vrinas eiendas, & in pessis (ad quæ omnia Chamædaphne commendatur) tam feruidam & malignam stirpem, qualis Laureola; Ea præterea non respondet descriptioni: fructus non est *spadix*, ruber: nec *capitulum* habet.

Causa in Matth. Lacun. iconem Matth. proponit nomine Chamædaphnes, dicens, vocari Laureolam marem, non demonstrans quæ sit, aut qualis. *Causa causæ sequitur.*

Eadem censurâ dignus Lonic. qui Chamædaphnes iconem Matth. proponit, nihil addens de suo: sed cautè euitauit hos scopulos: melius tamen suæ existimationi consuluisse, si Diosc. & Matth. citasset, ex quibus sua assumpsit & transcripsit nullo plagij metu. Videri nempe voluit probè nouisse sibi ignotam stirpem.

Daphnoides Dod. Eadem facit cum Diosc. sic tradens: *Asper-N.* Latini posteriores Laureolam dixere. Vocatur & *ινπιδαν* ac *πιδαν*. Huius baccas Piper montanum ab Italis nuncupari, sunt qui affirmant: alij à Germanis etiam Zeilande dictum volunt.

Idem putat Theoph. Cneorum nigrum esse posse, folio siquidem Myrtum satis referre: (quod ei nunquam concesserimus) & ramolam, [tæpè etiam vnicaulis est] lentam, obsequiosamque stirpem, albæ radice, absque odore, fructu nigro, quæ potissimè notæ sunt Cneori nigri Theoph. Nos pro eo etiam proponemus suo loco. Placet alioqui Dod. figura, quam hic proponimus, quanquam magna ex parte vnico caule à nobis sit conspecta.

Gesl. in hortis ait Laureolam seu Daphnoidem spontè circa Lacum Lemanum nasci folijs ferè Lauri, angustioribus, solidis, gustu feruidis. Item in append. Daphnoides, inquit, & Sabaudia missum, ubi ad Lacum Lemanum spontè prouenit, autumnio superiore plantatum viret adhuc, sed non satis lætum & renuioribus folijs, quæ ad Daphnoides nostrum vulgate ferè accedunt. Quibus verbis sanè duas species insinuat, hanc ut putamus, quæ Sabaudica, & per vulgare eam quæ folio deciduo.

Cronemb. ad pilulas Mezereonis Pandectarium & Dinum reprehendit, qui Mezereon putat Laureolam esse, ut copiosius postea dice-

mus in hist. Laureolæ folio deciduo. Nos verò per Laureolam cuius mentionem facit Cronemburg. existimamus intelligendam, quæ perpetuo folio.

An eandem intelligit censor Apollo quando ita insit Rad. 1. Serap. & Mesues non implicant cū Mezereo Laureolam & Lariolam vulgi, cuius historiam reddidit Diosc. l. 4. Daphnoidem dictam non admiscunt: quanquam Matth. nescio quā mente huic capiti insitam asserere audeat: eius enim reminiscitur Serap. cap. de Lauro: Mesue cōtinet &c. Præterea in commento Daphnoidis, Matth. ut etiam Fuchs. aliud esse Mezereon à Chamæla scriptum reliquit: huius verò sententiæ immemor, cap. de Chamæla, idem esse Mauris Mezereon, quod Chamæla, Thymelea ac simul admixta Laureola, comminiscitur.

Idem Apollo rad. 10. Daphnoides Offic. Laureola ex Diosc. Laureola fœmina medicamentariis. Verum Apollo ita irradiat nobis, ut non possumus asserere, quæ sit eius Laureola, nedum intelligere de qua planta loquitur.

Lob. & Pen. Daphnoidis siue Laureolæ ut nomenclatio, sic natura prosum Pusillam Laurum imitatur, ut plebecula vix conspectam dicitur Laurum. Vbiuis fermè Germaniæ, Galliæ & Angliæ, præsertim Mulomedicis & mulierculis clinicis nimis quàm nota, ut mirum sit Commentatorem Senensem tam ieiunè & manca descriptione hanc designasse, certo indicio ignorationis: quippe figura quam nullis floribus dat, fortè Mezerei Germanici surculum refert potius quàm Laureolam.

Lob. Obs. Daphnoides siue Laureola, Germanicè Zeiland: Gall. Laureate, Ital. Olinella: perperam Thymelea Tragi. Sed fallitur Lob. non enim Tragus hanc posuit de qua hic agimus pro Thymelea, cuius nec icon nec descriptio hanc nostram ostendit. Clusius scribit Pyrolæ fruticantis folia carnosa, supernè saturatiùs virentia & splendentia Chamædaphnes, quam vulgus Laureolam vocat, folijs, formâ & magnitudine propè similia.

Schuenckfeldius Chamædaphnen Clusii quæ perpetuifolia est cum alia confundit, ut postea dicitur.

Hist. Lugd. tradit Dale champ. cum Dodon. Laureolam Offic. siue Laureolam marè Diosc. Daphnoidem esse rectè censuisse, quæ Matth. sit Chamædaphne. Hisp. *Laureola*. Iconem quoque habet Chamædaphnes Matth. titulo Daphnoidis seu Laureolæ: habet & aliam titulo Daphnoidis seu Laureolæ cum flore: & cap. sequenti pro Laureola folio deciduo cur posuerit iconem Dodon. titulo Laureolæ cum fructu, nec nos scimus, nec illa excusabit: erat enim ponenda pro semperuirenti. Sed ita euenire solet de sibi incognitis commentantibus.

Tabern. Bellerbale Germanicè vocat.

An Celsalp. Daphnoides Italis Laureola dicta

Gignitur magna ex parte in siluis ac montibus vmbrosis incultis & frigidissculis. Tamen in Italia circa Patauium obseruauimus inter montem Gemulam & di-venda, necnon in huius descensu versus Balneum Aponense, sed quæ & ipsa loca frigidissima sunt respectu reliqui tractus. Florebat mense Februario stoculis paruis luteolis stipata. Vidimus etiam Patauii, Veronæ, Ferrariæ, & Bononiæ in hortis cultam. Genevæ circa Castellum *la Bassie* dictum iam Decembri florere incipientem, ubi & Feb. & Martio aliàs florere solet Basileæ prope Dornacum, & in hortis D. Th. Zuing.

Laureola non est Mezereon.

Laureola vulgi.

Matth. reprob.

Fuchs. mor.

Apollo mor.

Matth. mor.

Tragus et Lob.

H. Lugd. reprob.

Daphnoides Celsalp.

Lotus.

Tempus

Satio.

Zuingeri, ex quo & Montbelgardum in hortum transfulimus, ubi & floruit & baccas tulit. In Burgundicis etiam montibus aliquot obseruauimus, unde etiam transplantauimus. Iam prius dictum apud Lemanium lacum reperiri, & non paucis iuxta Rhenum ac Mosâ locis. Flores, inquit Dod. præmaturè germinant, paulò post Autumni æquinoctium: hyeme aut primo vere perficiuntur: fructus Maio & Iunio Lob. autore: media ætate etiamnum virent, demum ætatis fine & adueniente Autumno maturitatem assequuntur, & nigre fiunt. Tota hyeme viret, foliaque obdurant, vt in cæteris stirpibus perpetuò virentibus.

Vires & visus.

Etli pro certo & indubitato asserere non possumus hanc esse ueram & genuinam Diosc. & Plin. Daphnoidem, reclamantibus superscriptis aliquot notis: quia tamen vires ab iisdem traditæ apprimè huic conueniunt, lubet easdem hic recensere. Folia gustatu os faucesque vellicant & inflammant. Eadem seu arida, seu etiam recentia potu pituitosa per alvum deiciunt: vomitus quoque ac menses cient: quin & commanducata pituitam à capite extrahunt, & sternutamenta mouent. Ceterum & quindenæ ipsius baccæ potæ, purgât. Paulò aliter Plin. Daphnoides, inquit, [siue his nominibus quæ diximus] silvestris Laurus prodest, alvum soluit, vel recenti folio vel arido, drachmis tribus cum sale in hydromelite manducata. Pituitas extrahit folium & vomitus, stomacho inutile. Sic & baccæ quinquæ denariis, purgationis causa sumuntur.

Purgans.
Vomitorium.
Menses.
Capit. prout.Plin. Germ.
Lectio defen-
ditur contra
Sarrac.

Sunt tamen qui Plinii lectionem ad Diosc. aptadam & emendandam censeant, vt Sarracenus. Nos sanè in Plin. nihil præter rationem dictum inuenimus. Nam & stomacho incommodam hanc plantam censemus, insignis suæ acrimoniæ & ardoris gratiâ, & quinas baccas malumus quàm denas, has quàm quindenas, purgationis ergò exhibere: quod vel paulò maior dosis in talibus nobis semper suspecta videatur, præsertim cum Dei beneficio mitiora tutioraque habeamus.

Cautio.

Tèperam.

Correctio.

Laureolam certè Dod. in Hist. Gall. calidam & siccam ad tertium gradum, accedentem ferè ad quartum tradit, subuertere admodum ventriculum, inflammare, lædere, & adurere partes internas. Folia eius corrigi & ad sumendum comodiore reddi eo modo quo Chamælea. Idem in Hist. Lat. temperic & facultate similè facit Chamæleæ Germanicæ ea vniuersa suâ substantiâ acré & feruidam esse. Vt non temerè sanè hanc præscripserimus, propter insignè eius acrimoniam.

LAUREOLA FOLIO DECIDVO, SIVE MEZEREON GERMANICVM.

CAP. XXXV.

Descriptio.


Radix.

Virga.

Cortex.

Lanugo.
Lignum.
Flores.

QVæ verò deciduo est folio Laureola, frutex est interdum ad trium cubitorum altitudinem excrefcens, radice in aliquot partes diuisa, minimi digiti crassitudine, vel etiam crassiore, longâ, atque se demittente, albâ; ex qua assurgunt plerumque virgule singulares, lentæ, teretes, tenues, obliquiolas, cortice duplici recte, exteriori cinereo, tenui, fragili, interiori exterius virente, interius albicante: valdè lentæ, & fractu cõtumaces, lanuginem quandam bombycinam, dum diuelluntur ostentantes, cui subest lignum candidum, solidum, medullâ pauca præditum. Flores ad ramulorum latera sine pediculo, nunc singulares, nunc plures simul iuncti, ex nodulo



ante folia prodeunt pulchelli, ex rubello purpurascetes, colore ad flores Perticæ accedentes, oblongi, in quatuor foliola mucronata reflexa diuisi, odore suauj: in medio staminula aliquot crocea. Folia ex tuberculis plerumque plura simul, colore herbaceo, Laureolæ folio perpetuo ac-

Folia.

Bacca
Nucleus.Oder & sa-
por.Chamælea.
Cilibraca.
Oleastellum.
Oleaga.
Oliuella.

Mezereon.

Ruell. re-
prehendens
reprehendi-
tur.
Mulipten
eius error.Brunfels.
Lomium.Brunfels.
Mentia.Cord. opinio
erronea.
Thymelæa.
Mezereon.
Coccognidium.

cedentia, molliori, nec vt illa, splendidantia. Baccæ cum maturitate rubentes, quæ reliccatæ, nigricant, (inquit Dod.) quarum interior nucleus Cannabis semini similis, medulla candida. Tota planta vt odore graui est, exceptis floribus, ita sapore acerrimo & vrenissimo. De hac Ruellius sic scribit: Chamæleam Romani Cilibracam, alij Oleaginem vel Oleastellum vocant. Olea Cilibraca vocatur autore Colum. sed Calabrica legendum puto. Recentiores Oliuellam appellat: Oñic. Mezereon, quasi lathalem & viduiferam. Oliuella furculosa fruticat ramis palmaribus, folijs Oleæ similibus, tenuibus, amaris, quæ gustata linguam acriter mordent, faucesque ac guttur vellicatu laceffunt. Lactè manat copioso, animalibus cunctis intacta. Baccas fert si bene memini virides, per maturitatem ex parte rubescentes. Ex hac granum Cocci plerique falsò nasci existimauere. Recentiores Chamæleam cū Thymelæa, & vtramque cum Daphnoide rursus confundunt. Hæc ille: qui dum alios reprehendit, seipsum accusare videtur: dubitamus an vllam harum plantarum nouerit. Fortè intelligit nostram hanc Laureolam folio deciduo. Non conuenit tamen, quod ait lactè manare copioso: nec etiam Chamæleæ est, multò minùs Olea Cilibraca Columellæ. Quando folijs Oleæ dicit, & postea baccarum rubrarum meminit, Chamæleam cum Laureola confundens, neutram sibi cognitam fuisse satis clarè prodit.

Brunfels. nescit quæ scribit Tom.: dum Laureolam Teut. Bellerophals dici ait, Græcis Daphnoiden, flores illi candidos radicem inutilem: passim per siluam. Et cap. sequ. Thymelæam vel Coccum Cnidium quoque Bellerophals vocat, floribusque esse candidis. Quis hanc incuriam ferat? Dioscoridis descriptiones sublegens cum Bellerophals Germanorum confundit, nec docet quæ ea sit: nec existimamus reperiri Laureolam flore albo in Hærcynia. Vbi quis fide dignus monuerit, aut miserit, credemus.

Cordi opinio non opus habet longa refutatione: ipsa per se satis ruit, quando apud Diosc. tradit Thymelæam quoque Mezereon & Coccognidium, & grana quoque Mezereon vocari: nimirum nostram Laureolam vult esse Thymelæam, & sequè cap. hanc fruticem esse dicit quem Germ. Zebast & Bellerophals appellant, ex quo Granum Cnidium colligatur, quod etiam Coccognidium vocitetur. Quasi verò.

An Cornæ. Thymelæa ex qua granum Caidiū, oñic.

offic. & notum & in usu sane videtur esse: nam addit. Barbara voce Mezereon, Germ. Bellerphals die, forte ab eo quod collum, id est, fauces offendit & vrit. Sed respicitur. Differunt enim multam Thymelæa & Mezereon, quo nomine a Scapione & Mesue vocatur.

Tragus horrenda nomina tribuit: Ex mesue dicitur, inhi, Rapiens vitam: faciens viduas: (sic & meliora sperantibus per accidens prodesse possit, si iocari liceat) Seidelbast autem testatur Germ. Baccas Ari baccis confert: sed non probatur nobis quando folia per omnia Ligustro aut Oleæ familia tradit: immo vix vltimū nilitudinem aduertimus, quæ dici mereatur. Neque etiam est Diosc. Chamelza, vris sibi persuadet. Cui verò apud eundem huius Laureolæ alia icō posita sit, sub titulo Thymelææ, Zelander & Bellerphals, nos latet: quam autem plantam suspicemur eum intelligere paulo post dicemus.

Neque concedimus Fuchsio huic, (quam & eundem vocat, Daphnoidem, offic. & Herbariorū Laureolam) omnes Diosc. notas præter floris colorem conuenire, vt ille scribit: quia Diosc. suæ tribuit folia & fructum, fractu contumacia: talia non sunt folia huius nostræ: nec habet fructum nigrum, sed rubrum, ac potius coccineum: folia quoque vix propriè Lauri folia dici posse putamus. In eodem censura dignum, quod, quam prius fruticem dixerat, postea in annot. herbam vociter facientem viduas. Dubitamus quoque an hæc fuerit Offic. Laureola. Probamus quod taxat, mirum in modum errare Officinas, quod folijs Daphnoidis pro Mezereon vrantur: & eius fructu pro Cocco Cnidio, qui Thymelææ fructus est Thymelææ verò non esse Laureolā hodiè appellatam herbā ex eo colligi potest, quod Diosc. autore Linum nonnullis nominata sit.

Matthioli, vt passim variis a seipso & fluctuantissimissimis, ita & in huius plantæ historia, sicur ex diuersis eius editionibus & historiis patet.

Videtur itaque Camer. nō accipere pro Daphnoidem Matth. nostram Laureolam folio deciduo, sed forte eam quæ est folio perpetuo, vel aliam aliquam. At C. Bauh. apud eundem ponit eam quæ est folio deciduo.

Quod ad nos attinet, satis colligimus ex ipsismet Matth. verbis, ei non bene cognitæ has plātas, ac ab eo confundi, quamuis eius icones & descriptiones melius cōueniant cum nostra Laureola folio deciduo. Reclamant tamen notæ quædam ne sit Daphnoides Diosc. quicquid dicitur Matthioli, sicuti antè dictum aduersus Fuchsiū. Cur verò folia in eius edit. Germ. dicantur viscosa, seu glutinosa, ne suspicari quidem licet: in neutra Laureola hoc obseruauimus. De Amari quoque sententia omnino falluntur, qui Daphnoidem Laureolam dictam Mezereon esse credunt. Esse enim, inquit, Laureolam herbam siue fruticem [differunt hæc duo] cui flores albi purpureascentes insunt, & eam pharmacopolas omnes satis cognitam habere. Sed an ipse etiam Amatus probe cognitam habuerit vtramque Laureolam & Chamelzæ est cur multum dubitemus. Scribit enim l. 4. χαμζαία, Lat. Oleastellum, Arab. Mezereon, vulgò Mezereon, Gall. Boys gentil: Non describit. Nomen Gallicum conuenit Laureolæ folio deciduo: figura quæ apposita, est alterius plantæ, de qua non videtur locutus Amatus, nempe Chamelzæ tricocce, de qua postea.

Lacuna Matthioli simia diuersam ab eo habet figuram pro Daphnoidem, quæ potius semperuirentem Laureolam exprimit, quam hanc: interea ta-

Tom. I.

men Marthi. imitatus, vel potius, more suo, ex eo transcribens ait, Daphnoidem nonnullos, vocare Laureolam feminā. Aliquos confundere cū Mezereon, quod non differat à Chamelzæ Diosc. Sed facile patet non oculatiorem fuisse magistro suo in istarum stirpium dignotione ac historia.

Piper montanum, inhi Angul. quod quidam exillimant Chamelzæ, sine dubio non est Chamelzæ, potius dixerim Coccum Cnidium Theoph. Nos de Cocco seu Grano Cnidio Theoph. postea trademus.

Dodo. vocat Chamelzæ Germanicā, ac videtur ei esse Cneorum album Theoph. nihil tamen affirmare posse dicit propter breuitatē. Ast quū Cneorum album Theophrasto candido dicatur folio, figura quodammodo Oleagineo simile, vix concesserimus nostram hanc Laureolam esse Cneorum, licet id sibi persuadere videatur Dod. dicens non multum dissimilem esse Oleæ. At nos multum dissimilem dicimus. Esti etiam similis esset, desiderantur & aliæ adhuc notæ. Et vt reliquas omittamus, quis, nisi luscus forte aut parum oculatus, Laureolæ folium candidum dicat?

Negat Gesnerus in hortis, Piper montanum Italis dictum, & Germ. Zyland rectè Laureolam vocari: cui sanè haud grauatim subscriberemus, nisi iamdudum apud omnes penè Herbarios istud nomen inoleuisset, & in quibusdam cum Laureola haberet similitudinē. Alioqui non semperuirentibus, quā in re differt à Laureola æquē ac Lauro semperuirentibus. Quapropter & ipse quoque Gesn. alibi non vno loco, latè vulgi incedens via, modò Daphnoides nostrum vulgare, modò Laureolam vulgarem, modò Daphnoidem Fuchsii vocitat, Thymelææ tamen speciem potius esse, iteratò diuersis locis inculcat.

Ah Apollin. Rad. 10. Chamædaphnæ, Laureola etiam medicamentariis dicta, eaque mas? nimirum ita irradiat nobis more suo ambitiosis suis radijs, vt non ausimus offerere, nec alius forte id facile ex eius verbis queat, num hanc intelligat vel aliam: non sine suspitione ipsummet id ne cuiuile.

An Altomari de med. c. 91. Mezereon seplasia- riorum communiter dicta, & propriè ea, quam Diosc. nuncupat Chamelzæ, vt ille vult, qui ex ea parat pilulas, quas su. n. n. laudat ad educationem aquarum. Si hanc nostram intelligit, fallitur quod Diosc. Chamelzæ putet.

Cronemb. l. 5. comp. ad Pillulas ex Mezereon Mesues: Mezereon, inquit, frutex omnibus officinis & quibusdam alijs Almezereon vocatus in magnam controuersiam agitur, dum quidam Chamelzæ Diosc. alii Thymelææ eam vocem tribuendam contendunt. Auic. c. can. 467. & Scap. simpl. c. 163. quos, vt præceptores suos, sequitur Mesue, Chamelzæ cum Thymelæa turpiter confundunt. Tragus Pandectario & Leonicensi subscribit eleganter vulgarem Mezereonem picturā sua ob oculos ponens, dum ait: In Ianuario plantam antè folia germinare, flores purpureos edere. In cap. præced. Thymelæam Germ. peculiariter Bellerphals referens & Diosc. sine dubio fidelitèr ea grana pingit, quæ nostri [Germanicæ] Pharmacopolæ ex Mezereon vulgari colligunt: nam rotunda esse dicit, maiora canabinis, linguam vrentia. Diosc. clariùs, fructum habere Myrti in modum rotundum &c. Hæc si uera sunt, vt omnino iudicari debent, non iam Mezereon Chamelzæ, sed Thymelææ, ex qua granum siue Coccum Cnidium colligi & Theoph. l. 9. cap. 12. & Diosc. autor est. Constat hinc Tragus hic pa-

rum attentum fuisse, dum floribus quidem Meze-
reone vltatum, seminibus aut fructibus Thy-
melzam repræsentat.

Sylvius Mezereon Mesue Thymelzam rectif-
simè decetnat.

*Pandell.
confusa.*

Laureola.

*Daphnoides
D. Florent.
error.*

*Arabum le-
bei deterf.*

*Lactariarum
maxima.
Lactarium
non quærit
Monachos
crepantur.*

Pandectarius Simonē Genuesē redarguens c. 124.
hanc malè Laureolam cōstituit: deinde c. 170. eos
improbat qui Coccognidiū [quod aliàs semē Me-
zereonis dixerat] semē Laureolæ putant. Amplius
c. 483. diserte Laureolam Laurum Alexandriæ &
Daphnoidem interpretatur: vnde manifestum sit
quantopere sibi dissideat. Simili quoque errore
D. Florentinus includitur c. 1. in Mes. commen-
tans: Vterque facile hinc arguitur, quod Diosc. di-
uersa capita omniū earū herbarū instituat, quodq;
Arabes omnes (Si Serap. excipiamus) Mezereonem
copioso lacte manare scribant, quod tamen
nec profert Laureola, nec etiam Mezereon vul-
gare. Et quamuis Mesue Lactarium maximam
dixerit, & Auic. Lacticinium magnum, id esse fal-
sum oculari fide monstratur. Nihilque moror
Monachos in Mes. vbi confidenter Lonicium &
Fuch. cauillantes, ac Serapioni iniquo iure patro-
cinantes, idem contendunt.

Non dubium quin Diosc. Chamælea sit Sera-
pionis Mezereon, quam Arabes & eorum discipu-
li non tantum multiplici verborum imperitiā
confuderunt, sed insuper cum Chamæleone al-
bo ac nigro lethali errore commiscuerunt. Arqui
illud horrendum quod Mesue initio sermonis
Mezereon *vapere vitam*, ac *viduas faciens* dixerit,
vnde seriō vltus eius ab agyrtis & circumforancis
formidari debet, qui integra grana (quia paucū-
lū ore comminuta, fauces accendunt & linguam
misere vellicant) transglutienda exhibent, extre-
mo hominis periculo. Noui (addit Cronemb.) im-
pudentissimam ostetricem Nouiomagii (quæ pri-
maria vrbs Geldriæ) Gretam nomine, quæ passim
quibusuis: & quod intolerabili scelere sit, etiam
gravidis ac pueris propinat: ô flagitiosam scē-
nam! Quare, prudenti etiam necessario consilio,
Mesuz aceto corrigantur folia. *Hæc ille.* Cæterum
Cronemburgium per Mezereonem vulgarem in-
telligere Laureolam nostram folio deciduo satis
clarum: Laureola autem eius fuerit fortè ea, quæ
folio perpetuo virente. Quæ autem sit Thyme-
læa vera, & Mezereon Mesue imponendum in
pilulis Mesuei, non indicat. Apud Theoph. vt
citatur à Cronemb. nospiam inuenimus in qua
planta colligatur Cocco enidium. Verum de
hoc re postea.

*Caci ac pe-
culasier.
vires Lodi-
ceri deter-
guntur.*

Nunc cæci ac periculosi terrores Lonicer. dete-
gendi. Is lib. 4. c. 4. 9. suæ historiæ sic scribit: Bels-
tershals, aut Zyland, aut Zebast/Diosc. Thyme-
læa, fructus Granum Cnidium aut Cocco cni-
dium: alii Daphnoides Diosc. volunt, quamuis
non respondeat descriptio huic Bellerphals.
Quo loco Lonic. posuit talem figuram Matthioli.
Thymelæz, cui appiitæ bæccæ triccocæ: quam
plantam intelligat nescimus, nec ipsum sciuisse
existimamus: nomina tamen Germanica conue-
niunt nostræ Laureolæ folio deciduo. Cap. seq.
quod so. sic tradit: Seidelpass/Leusfrant/Diosc.
Chamelæa, Barbaris Arabibus & Offic. Meze-
reon, *Rapens vitam, Faciens viduas.* Quidam con-
fundunt hunc fruticem cum Bellerphals cap.
præced. descripto, propter similem figuram & vi-
res. Ambas indiscriminatim vocant Mezereon.
Hoc cap. Lonic. ponit figuram Chamelæz Matth.
descriptio autem est Laureolæ folio deciduo ex
Trago, cui dicitur Chamelæa, vt antè annota-
tum. Sic ille, magis etiam cæteris, more suo omnia

confundit. Lib. 5. cap. 208. iconem Laureolæ folio
deciduo ex Matth. ponit pro Lorderstraut Daph-
noide: ascribit quoddam velle esse Bellerphals
Zylandt. Is præterea malè scribit, Coccum Cni-
dium tamen esse Thymelæz apud Myropolas in
vltu.

Rustius quoque apud Diosc. notat Chamelæam
G. dici Zyland/ Gallis *Bois gentil* & cap. sequenti
Thymelæam esse Mezereon Mesue & officina-
rum, cuius granum Gnidium Diosc. Officinis sit
Coccum gnidium Germ. *Bellerphals*.

Sed eadem ignorantiz nota inurendus est
Rustius, qui eandem plantam facit Chamelæam &
Thymelæam, cum tamen neutra sit.

Lectores perpendant in quanta pericula isti
ignari Herbarii coniciant non solum miseram
plebem, verum etiam Medicos stirpium ignaros,
quorum maiorem numerum scimus, quam vulgus
crederet.

Pen & Lob. Aduers. Chamædaphne siue pusilla
Laurus: an Germ. Mezereon granum vocitant Pi-
per rusticum, & Gnidium granum Pharmacaria
i. ascribit, quæ ponit iamdiu Senensis, decipitque de-
ceptus, sibi incognitas, *hæc sum prorsum*, confundit.
At ipsi interim Aduersarii dubii hærent, an sit
Chamædaphne. Corrigit tamen versionem, &
vires Diosc. exponunt, vt suæ opinioni accommo-
dent, vt apparebit infra inter vires. Nec illam
vidimus tãtam similitudinem, vt mereatur nomen
pusillæ Lauri.

Camer. annotat Chamæleam Germanicam (sic
enim vocat) flore quandoque reperiri albo. Sed
vbi? & si vidit, cur locum non indicat?

An Turner. Daphnoides, quibusdam dicta Lau-
reola? Angl. Lauriel vel lobyry quam in Germa-
nia se vidisse negat: in Anglia tamen ad sepes
propè Cantabrigiam & Barchway frequentem.
Videtur Turnerus intelligere Laureolam semper-
virentem: quamuis figura non respondeat, nec
quadraret ex Diosc. flos albus.

Chamelæa, inquit Cæsalp. quam vulgò in alpi-
bus Olinellam vocant, duplex est: vtraque paulo
minor Daphnoide obsequiosa, &c.

Qualem autem suspicemur Cæsalpini priorem
Chamelæam dicemus. Altera videtur nostra Lau-
reola folio deciduo.

Histor. Lugd. pro Laureola femina proponit
iconem Matth. præterea eodem cap. habet iconē
sub titulo, Laureola cum fructu, quam Dod. ex-
hibuerat pro Laureola siue Daphnoide quæ per-
petuo viret, diuersa ab ea de qua Hist. Lugd. eo
loco agit.

Schuenenhs. in Cat. Siles. Laureola, & c. *caudis*
Diosc. Chamædaphne Clus. At non videmus cur
hæc planta simpliciter Laureola dicenda sit, nulla
tanta similitudo. Chamædaphne Clus. non est,
vt prius dictum. De Diosc. Chamædaphne postea.

C. Bauh. apud Matth. Daphnoides: Laureola
folio teneriore & deciduo. Glycyrrhizam mon-
tanam nominare solemus, vt rei herbariæ ignaros
fallamus.

Castor. Daphnoides & Laureola maior. Fla-
raque linguarum nomina iam supra dicta spar-
sum Hisp. & Ital. Laureola. Gal. Laureolle. Germ.
etiam Scheiflorbeeren quasi cæcationis Lauri
bæccæ, quia sedem potenter moritur Siles. Zeta
lang/ Zieglig. Sequanis & Mompelgardensibus,
Bois gentil. Rustici circa Basileam, vt ex Cl. D.
Fel. Platero accepimus, nominant Samar. Belg.
quoque vt Germ. Bellerphals dicitur, his etiam
Leusfrant: pediculorum herba, fortè quod eos
abigat. Boh. Wleu Laybo Werff / ut Matth.
Eadem

*Multis me-
dicis pro
virescentia.*

*Piper rus-
ticum
Matth. su-
per illatur.
Camer. &
Lob. accu-
sat.*

*Chamelæa
duplex cu-
salpina.*

*Matth. Lugd.
et c.*

*Scheifl.
reprob.
Glycyrrh.
et c.*

Lact.

Eadem ferè loca cum precedenti amat, siluatica, montana. Plurima cum in Germania & Heluetia, tum in Allobrogum & Ligurum Delphinatusque montibus & collibus siluosis, opacis, in vallis Anoniz montibus Tridentini agri reperitur in monte Amano, teste Bellon. quam ille **Bellerfrax** Germ. dici ait, quanquam temerè herbam vocet. Circa Basileam in Moutero monte. Denique in plerisque pinguibus & opacis, asperis atque desertis Germaniz locis. In Italiae hortis quamplurimis cultam vidimus. Translata enim ad frugem peruenit ac diu durat, quales plures in hortum E. C. Montb. transferri curadi-
mus, quæ adhuc vigent, ubi & Ian. & Feb. Martio atque Aprili florentem obseruauimus, pro natura & clementia hiemis. Communiter tamen Martio fleret: Sed dorum gemmas seu germina statim post autumnum promere solet, qui mox hieme, si clemens sit, aliqui ineunte vere, panduntur. Folia post flores demum exeunt. Tandem æstate & bacce quæ Augusto magna ex parte rubræ factæ maturantur. Subinde folia amittit.

Sed.

Tempus.

V. et
vires.Hydrys.
Fores
cruet
Vires
cruet
Fores

Prodidit Tragus se Chamelæa [intelligit autem hanc de qua hic agimus] quosdam agyrras & impostores non paucos ad oreum mittere vidisse. Eiusdem iudicio Pilulæ quas è Chamelæa Mes. & Serapio conficiunt, ad hydropem maximi sunt momenti. Existimat decoctionem florum tutioris & minis noxijs vti esse. Nemini tamen autorem aut magistrum hac in parte se velle esse, proficetur. Folijs cum melle tritis sordida vlcera & crustosa repurgari. Mulieres quæ formæ student, hoc medicamento vti posse: nam faciei maculas intra paucos dies illius extirpare & purgare. Nostrum consilium est, ne quis temerè vtatur Pilulis de Mezereio dictis, præsertim si imponatur Chamelæa Tragi, quia non paratæ sunt vt decet. Qui sinagma Tragi vult usurpare in magnatibus, caueat nec inflammet faciem, & pustulas excitet ipsis maculis deteriores. Nam erodentis & admodum inflammantis est facultatis. Folium vñ siue recens siue siccum comestum pituitam viscidam per deiectiones vacuare, vomitum mouere & mentes Matth. tradit. Baccas quindecim potu assumptas efficaciter purgare. Folium in nares inditum sternutamentum excitare. Cum passulis folium vñum masticatum, à capite pituitam & saliuam ducere. Nimirum hæ ipsæ sunt vires quas suæ Daphnoidi tribuit Diosc. quas mutuatus Matth. suæ Laureolæ applicat. Vt iam aperte videant Studiosi, quantum ei sit fidendum. Dosis baccarum periculosa, & quam ipse non sumpsisset, nec sine noxa alijs propinasset.

Cruet.

Purgant.

Matth. non
fidendum
multa
ferunt.

Tiptum.

Dodonæo folia, cortex, radix, & fructus sunt calida & sicca ad tertium ferè gradum, eiusdemque ferè qualitatibus cum Thymelæa. Folia, inquit, purgant potenter & violenter per inferiores pituitam & humores biliosos ac aquosos, his vti officinas loco foliorum Chamelææ. Easdem vires habere baccas, easque commanfas tantum calorem ac feruorem in faucibus relinquere, vt vix potius copiâ restingui possit. Idem hanc plantam sine dubio nocuam esse hominibus, cum sit vsque adeo calida, vt vehementer violenterque operetur, ideoque lædat & noceat partibus internis. Huius folia preparari vt folia chamelææ; eademque ratione preparandos esse fructus & corticem, si sumendi exhibeantur in aliqua medicina. Idem in hist. lat. scribit, officinas Germaniz & Belgij huius folijs (si quando opus sit) vti pro chamelæa, quod citra errorem fieri potest, quod & Cam. repetit. Menses quoque ducit, vt perhibet Schvvenckf.

Cortex verò aduersus Quartanam, Hydropisim & venena pro se cū Saccharo, vel liquore aliquo bibitur, corrigitur Lacte, vel Aceto. Experiatur qui volat? Nos non facile periculum fecerimus, nisi deficientibus alijs medicamentis, aut in casu desperato eius usum susceperimus idque cum magna consideratione.

Suspectum porro nobis est & illud Ant. Roiet medicamentum, quod peste laborantibus exhiberi tradit. Foliorum, inquit, Laureolæ exliccatiorum pondus coronati, plus minùve pro ratione vitium ægroti, per biduum in aceto macerant, & bibendum præbent, quod sudorem mouet, vomitu & aluum: & hac ratione venenum expellit. Suspectum vt diximus, est nobis hoc medicamentum: li eo vtendum esset, velimus potius folia Laureolæ macerata per biduum in aceto cum alio liquore propinare.

Nam vel Pen. & Lob. testibus, ac ipso adeo sensu, fauces, œsophagumque [aliter quam Euphorbium Gesner.] adurit, diu multumque vexante impressione. Non minùs hæc per aluum deiecit crassum viscidumque Phlegma, & intestinorum ramenta abradit quàm Laureola, cui non dispar, sed vehementior facultas inest, eademque in aceto maceratio ad corrigendum debetur. Sic enim veniunt etiam Medicorum quorundam præcepta Pharmacopœæ. Quare [inquiunt iidem] facit hæc viriam expensio, vt minùs quis putet Chamedaphnen legitimam. Quippe quam Diosc. *ἡ χαμαὶ δάφνη*, id est, capitis doloribus & stomachi ardoribus mulcendis commendat, vt interpretes vertunt. At si vlla ratio iniri queat, quæ tam feruida planta pro Diosc. Chamedaphne agnosci queat, ea interpretatione commodiore & veriore videtur sita: namque *ἡ χαμαὶ δάφνη* & *ἡ χαμαὶ δάφνη*, id est, capitis doloribus & stomachi vitionibus accommodat, vti, non incommodo sensu intelliges folia talsa admotaque capitis dolori, puta à frigore, vel statu, mederie Stomachique vitionibus faciendis adiuuari, ad diurnas fluxiones sistendas aque stomacho auertendas: vt Paulus ex Antiquis docet faciendum, lib. 6. de stomachi vitione, ferro vel caustico non vrente actu, cuiusmodi sunt fungi, aut nigri Agarici frustula, aliæque inibi scripta, quibus non secus atque folijs huius vsi sunt Antiqui. Sic Diosc. magnam præsidium putat Arabicam vocatam vitionem à Grecis, quæ heri solita fuit spirillis caprinis, oleo feruenti immixtis, & pollicis cauo inustis. Sic illi.

Diosc. eadem
pro.Arabia
pro qualis.Vires ad
vires.

Nobis nondum verisimile videtur hanc esse Diosc. mentem, estque valde longè petita hæc interpretatio, nec consuevit aut opus habuit Diosc. ab Arabibus discere, quos nec vidit nec agnouit. Quæ nostra sit aliorumque hæc de re sententia cap. de Chamedaphne declarabimus. Non enim concedimus, hanc de qua hic agimus, esse Chamedaphnen Diosc. Nec tacendus tamè alius eius vsus quem Moibanus inuenit, in cuius Antidoto alia Saxonicam vocatam aduersus venena eius radix quoque in aceto macerata venit, quam antidotum alio commodiore loco referemus.

CHAMELÆ HIRSVTÆ NOMI-
NE DATA.

CAP. XXXVI.

CHAMELÆ nomine, & Gallicè Bois Gren-
et, id est, Ligni nobilis nobis datam (non



recordatur
quo] plantam in
siccis nostro
herbario inue-
nitur & etiam
num afferua-
mus. Fruticis
parui speciem
habet, uti præ-
cedens: Caudex
lignosus, rami
palmares, nigri-
cantes (in sic-
ca.) Folia similia
ferè cum præce-
denti Laureola
folio deciduo,
breuiora tamen,
& multò angu-
stiora, in acu-
men desinentia,
nonnihil hirsuta.

bium accendens. Aliqui non rectè Laureolam
vocant. Facile nascuntur: crassior enim radicis
& tenax est cortex. Item de Collect. simpl. Lau-
reola pitto species in monte prope Curiam, par-
us, angustis folijs, paulò maioribus, quàm Ros-
marini, floribus purpureis odoratis, ut in Zeland.
Cauliculus lignosus est, non ultra septem digitos
altus. Floret iunio. Considerent periti an Gesn.
de duabus plantis scribat, an de vna tantum.
Item an intelligat Thymelæam Cordi vel Cneo-
rum Matth. fruticosum, potissimum per eam Lau-
reolam, quæ prouenit Curiz: Leon à Gesn. addita
Thymelææ minori Cordi non quadrat cum Cneo-
ro Matth. Stirpium studiosi obseruabunt circa
Augustam Vindel. & Ratisbonam, Thymelæam
minorem, & conferent cum Cneoro fruticoso
Matth.

Tragus de sua Thymelæa sic scribit: Keller-
hals & Zelandt Germ. Latinis nonnullis Linum
sile. Olinella & Les terre: apud Diosc. buxum &
zauexia: Plin. Pyrsachne. Cnestron & Cneorum
vocari tradit. Syri Apelin: nuncupant: Hyginus
Castrum. Lipareus cuiusdam Acrius mentionem
facit, qui & Cnestron nominari tradit. Num ve-
rò ad hunc fruticem & pertinet appellatio, im-
minè constat. Fructus Thymelææ crassum Gnidium
vel Coccum Gnidium, ut loquuntur Offic. appella-
tur. Errant Recentiores, qui Cocconidium ex
Chameleæ nasci existimant. Multò maiori in
errore versantur, qui Chameleam cum Daphnoi-
de seu Laureola confundunt, ac si ad vnam &
eandem herbam veraque appellatio referenda sit.
Vid. Christoph. de honestis & lac. Mantium super
Confect. Mezereon. Frutex est, arbuticola instar
proficiens, virgis multis, tenuissimis, tripedaneis,
aut breuioribus, folijs exiguis & pinguibus, flore
candido, fructu rotundo, seminibus Cannabis
haud maiori, linguam si mandatur adurent, non
aliter atque Chameleæ de qua proximo capite.
Non vbiq; obuia est, sed incultis, altissimisque
montosis & siluis prouenit. Hac Tragus cui id eue-
nit quod reprehendit in alijs. Laureolam folio
deciduo bis pingit, pro Chameleæ & Thymelæa
vbi dictum, licet neutra possit esse: nec eius Thy-
melææ descriptio respondeat iconi, quæ fortè ex
Diosc. desumpta, ipsis plantis non probè ei co-
gnitis, vel sanè superficialitè consideratis. Consi-
derandum tamen an fortè intelligat Thymelæam
minorem Cordi modò dictam.

An Apollo de hac Rad. l. p. 96. Thymelæa ex
qua Granum Gnidium, Chameleæ similima: An
item Anguill. in epist. Thymelæa ex qua fructus
Coccon Gnidium dictum. Adeò superficialitè
vel intricatè de his tradunt, ut quid statuendum
nesciamus.

CNEORVM MATTH. SVFRVTEX.

CAP. XXXVIII.

PRO Cneoro, exhibet Matth. plantam Thymelææ
Monspessulana: aliquatenus similem, ex radice
crassa, nigra, plura lignosa virgula, dodrantem cir-
citer alta, ramola, cortice nonnihil rufescente te-
cta profertur: in quibus possit circa fastigiū folia
conferta, viridia: Thymelæa multò breuiora, obu-
siora, glabra, nervo vno secundum longitudinem
donata. Flores ramulorum extremis insident mul-
ti, simul congesti, purpurascens, ac interdum
albi, quorum singuli &lach Matthioli floribus
formā non absumiles, ex oblongo tubulo in qua-

THYMELÆA MINOR CORDI

CAP. XXXVII.

Descriptio.

Folia.



Thymelæa
minor Cor-
do, parvulus est
frutex, plures ab
vna radice inui-
rens virgas, lon-
gitudine peda-
les aut dodran-
tales, per terram
stratas, lentas,
flexiles, & dis-
tracta comu-
maces folijs nu-
merosis, vridi-
que vestitis, fi-
gura oblongis,
vtrinque acu-
minatis, cras-
sifusculis, supe-
rius viridibus,
inferius palli-
dioribus, Oleæ

Sapor.

Floris.

Radix

Sapor.

Locus.

Myrtique folijs multò minoribus, ac potius fruti-
cose Polio similibus, paulò tamen maioribus, gu-
sta glutinosi. Flores, Sole Taurum occupante, pro-
ducit in summis virgis oblongos, inferius angu-
stos, superius in quaternis folia parua se panden-
tes, è purpura in puniceum atque candicantem
colorem vergentes, densos: & ab vno principio sese
in Corimbos diffundentes, ita ut odoratos, &
mellis aliquem odorem redolentes. Floribus singu-
le succedunt bacce. Radice nititur longa, candicare,
neruosa, lenta, flexili, infragili & perenni: gustu ad
aliquot horas fauces & palatum Coccon Gnidii mo-
do excofaciente & scarificante. Nascitur fruteto-
sis & myricosis tam planis quàm editis locis: non-
nunquam etiam sub Iuniperis. Copiosa autem cir-
ca Vindeliciam Augustam, & Ratisbonam.

An de hac Gesn. de hor. Piper montanum in
Italia multis vocatum, quod nostri Zyland, Dod.
Chameleam falsam: eiusdem species alpina mi-
nor superiore autumnio hortulo meo comissa,
viret etiamnum. Vis vtriusque caustica, omnibus
partibus os & palatum non aliter quàm Euphor-

Chameleæ
falsa.



tor hinc
radiation
disposi-
tas facien-
tes. Placet &
diligentissimi &
peritissimi Her-
barii Clus. de-
scriptione sub-
iicere. Elegans,
inquit, suffru-
tex, cui multi
sunt rami gra-
ciles, flexibiles,
lenti, surculosi,
ab una protin-
us tellure e-
mergentes &
humi diffusi.
Folia nullo or-
dine disposita
ramulos am-

biunt, viridia, cutanea, Thymelaeae verae pro-
xina, ingrati prius, deinde amari saporis, nul-
la aut perexigua (quantum quidem gustanti de-
prehendere licuit) acrimonia praedita. Flores in
summis surculis, sex, septem, aut plures, conferti,
quatuor foliolis constantes, ex rubro purpura-
scentes, Centaurij minoris florum penè æmuli, in-
grati etiam & amari saporis, aspectus tamen pul-
cherimus, atque odorati, caput (si diutius naribus
admoveantur) tentantes: ijs succedit fructus exi-
guus, Thymelaeae fructui haud dissimilis, non ru-
ber quidem, sed candidus: oblongiusculus, semen
continens cinerea membrana tectum, rotundum,
Thymelaeae grano par. Radix longa, minimi di-
giti ut plurimum crassitudine, interdum nigri-
cans, maiore vero ex parte flavescentia, lenta, su-
perna parte nonnunquam gracilior, unde rami
flexibiles & humi dispersi emergunt, & subinde
secundum alarum caua, latis crassas fibras flaves-
centes agunt.

Marth. in com. cum magnis icon. Lat. & Ital.
iconem proponit huius plantae nomine cneori
Marth. ubi scribit: inuenisse se in Bohemia silvis
plantam, quae omnibus partibus suis cneorum can-
didam referat: flores in surculorum cacuminibus pur-
pureos, odorati Testiculi odore &c.: In epit. sua
iconem ponit diuersam à praecedenti, pro cneoro
candido: de quo agemus suo loco, nempe capit.
de Ocymoides vel saponaria minore. Hanc
non describit, sed tantum ait: cneori candidi, de
quo meminit Theoph. hic imaginem damus, ut
qui chamelaeam faciant, ad mentem redeant.
Profecto in ipsomet mens requiritur, qui sibi pa-
rum constans quod affirmavit zudacter in dubi-
um reuocans, aliam plantam pro Cneoro, nem-
pe herbam, à praedicta toto genere differentem
exhibeat, parum memor eorum quae prius tradi-
derat. Certè camer. in Epitome Matthioli figu-
ram omisit. C. Bauh. in auctis & illustratis Marth.
commentarijs l. i. c. 13. Cneorum prius fruticolum
posuit, addens: Cordum fortè nomine Thymelaeae
minoris exprimere voluissent nihilominus illu-
strans Matthiolum, l. 4. c. 167. cneori titulo her-
bae iconem ponit adiectis adèd his Marth. verbis:
Cneorum de quo meminit Theoph. nullis defici-
entibus notis misit ad me Romà vir quidam no-
bilitate clarus, cuius imaginem hic appingi cura-
uimus, ut qui chamelaeam & Thymelaeam cneo-
rum faciunt ad mentis sanitatem redeant. Est au-
tem ea icon reuera Ocymoidis minoris. Vtrum

iam verum erit cneorum Matthiolo? frutex ne
hic descriptus, au dicta iam herba? Ut merito de
stirpium historiis meritis Clusius in hac
verba proruperit. Marth. hunc fruticem pro cneo-
ro albo Theoph. proponit. Cùm verò quale sit
difficiliter indicari possit, cur hinc stirpi cneori
nomen accommodare voluerit, multi mirantur.

Postrema Com. editione l. 2. aliud nobis Theo-
phrastii Cneoron adfert, nullis, ut ipsius verbis v-
tan, deficientibus notis. Sed cùm nudam tantum
imaginem, addito, cneori nomine oculis subiiciat,
illiique historiam planè subiceat, si parum huius
ipsius assertioni adhibuerimus, nemo, ut opinor
vitio vertet. Ceterum, addit Clus. nisi in hac plan-
ta, (cuius & ipse satis elegantem figuram exhibet)
acrimonia, quae quidem sensu percipi possit, abes-
set, ad Thymelaeae genera aut ipsi co. generem suf-
fruticem referendam esse censeam. Nonnulli
rustici Steinoselin / hoc est, Petta. m. Rosul. m.
vocat. Nos autem antè monuimus cap. de Thy-
melaeae minore Cordi considerandum esse, an Gesne-
rus hanc fortè intellexerit nomine Laureolar par-
ae, cuius descriptionem ibi posuimus.

Est verò id notata dignum, quod obseruauit
Myconus, medicus Barcinonensis, rei herbariae
studiosissimus à nullis animantibus, fruticem
hunc attingi aut arrodì. Ex cùm mille huiusmodi
plantas folijs & floribus onustas viderit, nullam
vquam reperire potuisse asserit, in qua praecisum
aut arrosum aliquid fuisset.

Braun apud Tabern. ponit iconem hoc titulo:
De Bellerphale aut Zeuland (est. Marth. Chamelaeae
species: subiungit duas descriptiones, & po-
stea duas icones Thymelaeae, de quibus postea.
Casie, quam vocat, Matthioli, descriptionem o-
mittit, quam inuenisset apud Marth. sub Cneoro,
sic parè oculus vno capite diuersas plantas con-
funde ns se & alios fallit: qui leget caput eius quod
est l. a. vix intelligat an in descriptione priorì
intelligat Cassiam, ut vocant Thymelaeam.

Prouenit Cneorum Marth. ut tradit Clus. in
multis montibus Viennae vicinis tantà abundan-
tià, ut rusticae mulieres, dum floribus abundat,
multos eius manipulos in forum venales adfe-
rant, cum alijs varijs generis floribus, exornando-
rum tricliniorum gratià. Nascitur etiam in Pan-
noniae silvis editiore loco sitis ultra flumen Ra-
bum siue Arabonem. Frequens etiam crescit qui-
busdam siccioribus pratis Francusforti ad Mo-
num vicinis, praesertim silua quadam quercubus
constita, circiter miliare infra eam urbem ad sini-
stram fluminis, inter Ericas, ubi illam candidis e-
tiam floribus varianem conspexit Clus. cuius e-
tiam manipulos rusticae mulieres in foro venales
proponunt.

Aprilis plerumque florere solet, nonnunquam e-
tiam Maio. Fructus maturus est Iunio. Adèd
autem secundus est hic suffrutex, ut saepenumero
ter eodem anno floreat, nouis floribus semen se-
per consequentibus, quod probè maturum, bis co-
dem anno de vna eademque planta collegit idem
Viennae Austria.

Camer. testatur Cneorum Marth. sibi in horto
è semine natum: sed non docet an herbaceum in-
telligat, an fruticolum. Duo enim Cneora habet
Marth. eaque valde differentia, si probè meminist:
quae antea scripsimus. C. Bauh. suffruticem intelli-
git.

Toscanus Citolus pharmacopoeus Burgundus
in Campagniola, diligens stirpium indagator, flo-
re albo & purpureo ad nos misit nomine Balsami

[si credere fas est] quicquam ab illo autore mutasse, qui remedia, quæ civibus suis, inuitis etiam medicis profuisse iactat, promulgat. At saltem docuisset nos, aut didicisset ipse, si nesciuit egregius Herbarius, quæ in re differat à Victoriola sua, quam etiam Daphniten, chamædaphnem & Mustellaginem silu. cognominat. Quid si confundat chamædaphnem cum Daphnoide: quod ei non nouum. Dubium igitur relinquatur nobis, quæ sit chamædaphne Apulei purgans, & an eadem cum Diosc. Plin. & Pauli ut censet Humelbergius.

Hermod.
jugillatur.

Hermod. dum nimium Plinianè scribere studet, obscuriorem reddit Chamædaphnes historiam ac suo nomine pronunciat, quæ Plin. prodidit: Chamædaphne Diosc. & Plin. quæ sit, non demonstrat Hermod. fugit hos scopulos, quemad. & Ruell. qui suo more ex Hermod. eo non citato sua decerpit & suffurat.

Ruell. pl.
gaurus.

Chamædaphnem Marcellus humilem & terrestrem Lauri interpretatur, atque Latinis Vincam peruincam dici, ac eius meminisse quidem Theophrastum, sed tam breuiter, ut nihil possit ab eo intelligi, quàm ferre chamædaphnem fructum folijs adnatum [ubi autem id scribit Theophr. locum sanè nondum inuenimus apud eum, & vix credimus extare: neque enim adeo alieni aut peregrini sumus in lectione Theophrasti, ut si hæc diceret non alicubi id obseruasset: indagandum tamen etiam in posterum.]

Humilis
Laurus
Corroptus
Laurus.

Apertè & ingenuè Anguil. faterur, nondum sibi perspectum esse, quænam sit chamædaphne.

Amantur.

Amarus in Diosc. dicit, Chamædaphnem Hisp. Laureolam dictam, affinem esse Daphnoidei, non esse Vincamperuincam, ut multi falso sentur, sed aliam herbam cubitalis altitudinis, ut Plin. describit: interim quæ sit illa non docet, unde satis patet ei non cognitam fuisse, præsertim cum nec doceat in quo differat à Daphnoide. Cornar. & Chamædaphnem, & Daphnoidei, utramque, Plinii, Officinis & Herbariis Laureolam vocari tradit. Sed iam antea dictum nobis videri Laureolam Cornario ignotam fuisse. Præterea Chamædaphne videtur à Laureola non parum differre.

Laureola.

Corropt.
repreh.

Et, ut tandem & nostrum iudicium de Chamædaphne dicamus, placet nobis opinio Fab. Columnæ, qui vult Chamædaphnem Diosc. Plin. & Galen. esse *Bislinguam* siue *Victoriam*, de qua paulo post.

LAURVS ALEXANDRINA.

Huius Theoph. meminit l. c. 17. sic scribens: Illa quoque propria Idæ sunt, Laurus Alexandrina dicta, & Ficus quædam, Vicisque Lauri Alexandrina hoc proprium est, quod in folio fructum gerat [*ἐν τῷ φύλλῳ φέρει τὸν καρπὸν*] quemad. & Myrtus silu. seu Ruscus [*ὡς καὶ ῥύσκος*]. Vtrique enim fructus ex folijs ipsius dorso [*ἐκ τοῦ ὀπίσθεν τοῦ φύλλου*] nascitur. Hic obiter Theophrastum ridens Scal. Festiuium vocat *ἀφαιρῶν*: Nam (addit) Quomodo Idæ fuerit propria Laurus ea, quæ Alexandrina nominatur? Pro Theoph. & pro se responsum habes apud Plin. l. 9. c. 39. quem consules. Idem Theoph. eadem paulò aliter circumscribit, cuius verba Græca lubet ascribere, non ad ostentationem, ut quibusdam id solemne visum, sed quia vel ipsis Latinis sunt magis significantia, & nescio præ iis quam *indigenæ* habeant.

Theoph.
Ficus cum
tra Scal.

sic ait: *ἐν τῷ φύλλῳ φέρει τὸν καρπὸν ὡς καὶ ῥύσκος*. Quorum verborum sensum minus fideliter expleuit Gaza, sic inquit: fructiferaque nonnulla fructum folijs interceptum vel pediculo tenui tantum gerunt, quales sunt ea, quæ ad foliorum insertionem seu exortus angulum, fructum exerunt. Pleniùs ita: Quædam fructifera eo modo, ut fructum veluti sinu foliorum suorum comprehendant. Lenocinium addas cum Scal. molliusculè sic: Quorundam inuolucro, aut sinu fructus obducitur aded, ut ipsa (folia) fructifera dici mereantur, quemad. Alexandrina Laurus, in folijs vel super folijs fructum ferens.

Audiamus & Plin. Est inquit (& chamædaphne silu. frutex: est & Alexandrina, [Laurus] quam aliqui Idæam aliqui Hippoglotion, alii Daphniten, alii Carpophyllon, alii Hypelaten vocant. Ramos spargit à radice dodrantes, topiarj ac coronarij operis, folio acutiore quàm Myrti, molliore & candidiore ac maiore, semine inter folia rubro. Plurima in Ida, & circa Heracleam Ponti, nec nisi montosis. Id quoque quod Daphnoides &c. Dixerat autem iam priùs: accedit in topiario opere Taxa [Laurus] excrecente in medio folio paruo, veluti lamina folii. Item alibi. Laurus Alexandrina siue Idæa partus celeres facit, radice pota trium denariorum pondere in vim dulcis cyathis tribus: secundas etiam pellit, mensesque eodem modo pota.

Laurus A.
alexandrina
Plinio.
Laurus
Idæa.

Diosc. al.
fr.
Laurus
Taxa Plin.

Adeamus Dioscoridem: Laurum Alexandrinam, inquit, alij *ἰδαία* alij *δωρὸν*, alij, *τῆς ἰδαίας*, alij *ῥύσκος*, alij denique *καρποφύλλον* vocant. Folius est Myrti siluestris [*ὡς ῥύσκος*] seu Rusci similibus, maioribus tamen, mollioribus & candidioribus: fructu in medijs folijs [*ἐν τοῖς μέσσοις τοῦ φύλλου*] Ruell. inter folia: maluit cum Plinio loqui, quàm fidem præstare auctori] rubro, ciceris [*ὡς κικὴς*] magnitudine. Ramos verò per terram [*ἐν τῇ γῇ*] spargit (fortè rectius è terra emittit, aut suprà terram profert) dodrantes, interdum etiam maiores: radicem similem Rusco [*ὡς ῥύσκος*] maiorem tamen, odoratam & molliorem. Nascitur in montosis. Eius radix succurrit in difficili puerperio drachmarum sex [alij quinque] pondere in vino dulci pota. Succurrit & vrina stillicidio vexatis, & menses educit. Pro quibus postremis verbis habetur: *ἐξ ἧς καὶ διὰ τοῦτο* Sanguinem extrahit: Sarac. per quem nihil aliud quàm menstruum cum Plin. & Cornar. intelligimus. Illud non omitrendum: pro eo quod folijs quàm Rusci maioribus diximus, in Græco haberi *αὐτὴν*. Marcell. vertit minoribus quasi legisset *μικροτέρη* sed malè, ad stipulante etiam Cordo, immò Plin. quoque & Serapione, hoc speciatim, qui Lauri Alexandrinam & Gar Alexandrinam vocans nihil præter Diosc. & Gal. verba transcribit. Corrupti igitur codices putandi qui *μικροτέρη* habent. Galen. Daphnen herbam vocat *ἀφαιρῶν* sic inquit, quàm & Daphnen Alexandrinam appellant, temperatura euidenter est calida, & gustatibus acris simul & subamara, potaque cum vrinas tum menses prolicit.

Menses.

Danac.
Hippoglotion.
Zalaa.

Description.
Diosc.

Difficilis
partur.
Vrina stillicidium.
Menses.

Marcell.
mar.


Daphne
herba Gal.
Sapa et
temperam.
Apuleius
sana.

Apuleius cap. de Victoriola sua Laurum Alexandrinam cum Daphnoide confundit, ac etiam, uti suspicamus, Chamædaphnem, ut iam priùs latius ostensum.

Ceterum Laurum Alexandrinam & Laurum Taxam tandem plures esse cum Hyppoglotion & Bonifacia seu Bislingua statuunt: de qua re postea specialius trademus. Cornar. verò negat Laurum Alexandrinam esse Hyppoglotion, sed

diversas esse vult, illamque hodie ignoram.

LAVRVS ALEXANDRINA.



Litem dirimens de Lauri Alexandrinæ elegantissima planta ingenue profiteam [inquit Lob. Adu. part. 2.] quæ vidi opéra Ioannis Parkinsoni Pharmacopœi Londinensis, qui ramulum eius non dissimilem Bilinguæ mihi communicavit, delatum ex horto Medico Pisano. Hæc ramuli pars non excedebat longitudinem unciarum quinque, septenis foliis alterno situ,

non exadverso, ut habet effigies Matthioli & Lugdunensis, prædita; nervosis utrinque, rigidis ut Hippoglossi: inferioribus ternis, aut quaternis, uncias duas longis, & plus unâ latis, in mucronem Rusci modo, fastigiatis; medio averso folli crassiore nervo, specimine flosculi pallidi gemmato, sine pediculo, & ligulato, bilinguæ foliolo, [fructus enim mediis foliis amplectitur Theoph. auctore] ubi semen Bonifaciæ, siue Hippoglossi minus proferte dicitur, donatis; ternis verò superioribus unciam latis, & sesquiunciam longis, mucronatis, utrinque item nervosis sine flosculorum rudimentis.

HYPOGLOSSVM, SIVE HIPPOGLOSSVM.

Dioscoridi ἵππογλωσσὸν ἀγρίον ἐστὶν, exiguus frutex, foliis Myrto silvestri [μυρτὸν ἀγρίον ἔστιν] & tenui similis. Comam [ἀνθὺς] δὲ. Adu. putant leg. ex Plin. καμὰ, id est, concava] verò spinosam habet, & in summo ceu lingulas secundum folia. [ἔστιν ἵππος ἀγρὸς γλωσσὸν] δὲ. ἵππος γλωσσὸν sic habere quædam exemplaria: ἵππος ἀγρὸς, ἔστιν γλωσσὸν δὲ. ἵππος γλωσσὸν: sicque legendum putat. Lacun. ex vet. cod. sic. ἵππος ἀγρὸς ἔστιν ἵππος γλωσσὸν δὲ. ἵππος γλωσσὸν in foliis. Quidam al. γλωσσὸν δὲ. ἵππος γλωσσὸν. vet. addit ἵππος. Coma caput dolentibus vtile amuletum creditur. Malagmatis radix expressusque succus admiscetur.

Ceterum diversimodè scribitur ab Autoribus. Bas. cod. & Paris. ἵππος γλωσσὸν habent, & Marcell. Hippoglosson. Apud Gal. & Paul. ἵππος γλωσσὸν. quæ lectio nobis magis probaretur, maximè cum ei consentiat etymon a Gal. simpl. redditum, his verbis: ἵππος γλωσσὸν ὀνόματι ἔστιν ἵππος, ἔστιν γλωσσὸν ἵππος γλωσσὸν ὀνόματι ἔστιν ἵππος γλωσσὸν: Hippoglosson ex eo nomen traxit, quod summis illius Corymbis proximæ velut ligulæ innascuntur.

Plin. Hippoglossam vocat, quamvis quidam Hippoglosson in vet. cod. legi notent. Folia habet [inquit] silvestris Myrti, concava, spinosa, & in his ceu lingulas folio parvo exeunte de foliis. Hæc

malè à Plinio dici Dalech. annotat, quod id nunquam dicat Diosc. de Hippoglossi. Lauro taxæ folium paruum exire de foliis, quod in alio nullo genere Lauri videatur, Quasi verò Plinio nihil aliud scribere permittum sit quàm quæ Diosc. habet. At habet Hippoglossum, saltem quod hodie vulgò Herbariis ita dicitur, folium paruum ceu linguam maiorebus foliis exeuntem. Aut docere debuit Dalech. in suis annot. in quo differat Hippoglossa à Lauro Taxa Plinii, aut tacere. Næ facit interdum Dalech. intelligendo, ut nihil intelligere videatur. Qui si hunc accellat, quod linguam suæ Hippoglossæ tribuat, idem est, ac si negaret, nominis vim clarè id exprimere, quod miramur aliqui in tanto Græco & Herbario, qualem ipsum fuisse constat. Pergit Plin. Capitis dolorem ex his [foliis] imposta misuia. Item paulo post Idææ herbar folia sunt, quæ oxymyrthos &c. ubi sanè hanc eadem intelligere videtur. Iam dudum verò Alexandrinam Laurum ab aliquibus Hippoglosson vocari monuerat. Vide sub Lauro Alexandrina.

Marcell. in Diosc. sua versione retinet nomina quæ postea ab alijs reiecta fuere, nempe hæc. Sunt qui (Hippoglosson nēpe) Antirrhinō, qui Anarrhinō qui & hanc Lychnidem agrestem vocent. Romani pariter Græcis Hippoglossum appellat. Idem addit: Rusci, quæ silvestris Myrtus est, folia habere Hippoglossum omnes testantur. Ea non aded grandia sunt, & præter id in cuspidem acuminata desinant. Eam ob causam, siue magnitudinem, siue equorum linguæ figuram in ea voce [Hippoglosson] intelligas, nulla in folijs ratio eius erit. Nec si etiam, ut in Plin. adhuc legitur, Græcam præpositionem, in coniunctam linguæ à Græcis fuisse credideris, Dioscoridis historiæ respondebit: ἵππος enim, id est, in summo lingulas exire hic aut ἵππος γλωσσὸν, id est, secus & secundum folia quæ hic intelligit in caule superius. At caulis desinens non folia profert, sed confertur lanuginis potius quàm foliosæ cortice in latitudinem se aperiens involucrium: non alter quàm in spicatis aliquibus seminibus & floribus fit. Differt tamen à spica quod rotundè, quatuorve plerumque angulis spicæ surgunt: in hac quod vitimum in caule exit, in latitudinem se explicat. Et quoniam humanam linguam imitatur, ided Hippoglossum quasi grandis lingua dicta. Hæc Marcello origo nominis & causa est. Quæ licet Plinij historiæ aduersari videantur, (ait enim, & in ijs ceu lingulas folio parvo exeunte de folijs) meminerint tamen omnes, inquit Marcell. sequi nos Græcos Scriptores, præcipueque Dioscoridem, & in vertendis eius verbis, quam debemus illi fidem præstare, qui ἵππος γλωσσὸν δὲ. ἵππος γλωσσὸν, prodire linguas ex Hippoglossi dicit, quod est in summo & secundum folia: non ex folijs, sed ex summo caule, qua parte desinunt folia, exire ea dixit. Id enim ἵππος ἀγρὸς significat. Ceteræ appellationes, ut idem sentit Marcell. ex similitudine aliqua, verum importunè, illi acceperunt. Vult igitur Marcellus, Hippoglossum neque à foliorum quæ Rusci similia habet magnitudine, neque ab Equorum linguæ figura dici, neque Hippoglossum à Plin. rectè nominari, cum ἵππος γλωσσὸν, id est, in summo caule proferat, quæ humanarum linguam imitantur, unde Hippoglossum, id est, grandis lingua, nuncupandum.

Cordo autem quædam Diosc. exemplaria Hippoglossum habent, sed malè. Nam nomen suum ab Hippoglosside inuenit: propterea Marcellus malè Hippoglosson legi cenet, quæ nequaquam

etiam verum Hippoglosson in suo commentario indicat. Nescio enim quam spicatam lanuginem inducere conatur, cum tamen nullus unquam autor alicuius lanuginis, vel spicae, in hac herba mentionem faciat. Mihi profecto Hippoglosson, siue Hippoglossidion, siue Hippoglosson eadem esse videtur cum Lauro Alexandrina. Hec Cordus, cui partim obsecro, partim refragatur Hist. Lugd. scribens: Marcelli mentem non satis intellexisse videtur Cordus, quum scribit: Marcellum Hippoglossum male legi censere: sed Hippoglossum legi vult. Multo verius dicitur ille, Marcellum nequaquam verum Hippoglossum indicare: praeterquam cum eodem Cordo sentio, cum propositione Graeca in scribendum esse. Ita ab eodem dissentio dicente, Hippoglossum eandem esse plantam cum Lauro Alexandrina, cum nimirum, quam pro Lauro Taxa exhibuimus [videlicet Bistlinguam]. Hec Hist. Lugdunensis.

Nos comperimus apud Marcellum ei placere Hippoglossum dici, quasi grandem linguam, sed nescimus ubi velit Hypoglossum legi. Unde autem Marcellus opinionem desumpserit, lanuginem requiri in Hippoglossio Dioscoridis, nondum intelligimus. Hist. Lugd. exhibenti Polygonati genus pro Hypoglossio assentire non possumus, ut copiosius dicemus, suo loco.

Cornarius approbat Cordi lectionem, cum scribit Verus noster codex aperte Hippoglosson habet, & non Hippoglosson, velut fere vulgata Diosc. exemplaria. Anguil. hic rursus aperte profectur qualis planta sit Hippoglossum dicere se non posse: nullam plantam sibi visam quae respondeat descriptioni, nulloque modo respondere Bonifaciam. Pena & Lob. in Adu. Laurus Alexandrina Diosc. quae Theoph. Ruscifolia siue super folio baccifera, ab Hippoglossio differt, ut in promptu esse dicunt ex Theoph. & Diosc. noscere: quippe fructum siue baccam coccineam medijs in folijs herere, nullius ligulae facta mentione uterque asserit: foliaque molliora, maiora, & albidiora quam Rusci inesse Diosc. subdit, viresque diuersas reddere, & radicem maiorem, odoratam. At Hippoglossi radix minor &c. Vide postea de Bistlingua.

Fabius Columna in Hist. Lugd. inuenitur, quod existimet Hippoglossum ab Hippoglossio differre, inque doctiores insurgat, male illos Hippoglossi etymon intelligere asserens. Nullum quidem aliam inter illarum historias esse differentiam, nihilque ad plantae cognitionem facere, ut iam vel iam dicatur, cum sciamus Plin. Diosc. & Galenum eandem plantam designare voluisse. Quod verum quidem est: sed interest tamen Dioscoridi classico & probatissimo auctori genuinam & veram, non adulterinam lectionem restituere. Si vero & iam nihil facit ad plantae cognitionem, facit etymon, ad quod & Gal. respexit, exactam cognitionem, atque adeo ad ipsam adeo plantae formam. Nam quicquid ille dicat, aliud est si sciam iam, id est, infra folium linguam esse: aliud, si sciam iam, id est, quasi equi linguam esse. Quid enim aliud denotet, nostri magistri nos non docuerunt. Sed haec ad praedictas Grammaticos releganda.

Ut tandem concludamus, hoc Hippoglossum multis idem videtur cum Bistlingua, de qua paulo post specialius differemus: alij negant.

RADIX IDAEA VETERVM.

Idaea radix
Diosc.
Descriptio.

Thanc quoque distinctam facit Diosc. a praedictis, distinctoque capite de ea tradit. Idaea

radix, inquit, folia Oxymyrinen (Ruscum) referunt: iuxta ipsa vero exigui sunt veluti capreoli seu pampini [id est] ex quibus etiam flos emergit. Radix valde astringens est, ita proinde conueniens quae adstrictione indigent. Bibitur & aduersus alui profluvia, fluxumque muliebrem, & omnem sanguinis eruptionem. Sunt autem [id est] ut censet Fab. Columna, vtiliter parum seu petioli, ab Hist. Lugd. [id est] auctorem, [id est] xlv. Autorem plantarum passim vocat, quasi nemo ante eum de plantis scripsisset, perpetuam [id est] putati, verborum proprietatem [id est] opinionis improprietate extorquebat, [id est] planta ab ipsa depicta Hippoglosson videri potuisset.

Plin. non Idream radicem, ut Diosc. a parte posteriore, sed herbam Idream vocat, eandemque dicit: nempe Idream herbae folia esse quae Oxymyrines: adherere his veluti pampinos, in quibus flos. Ipsum autem alium, mentesque, [id est] hoc est, fluxum mulierum transcripsit] & omnem abundantiam sanguinis sistere. Spissandi cohibendique naturam habet.

Idaea radix, inquit Gal. gustu admodum acerba est: ac, si opere periculum facias, eandem vim praefert, nimirum sanguinis profluvia, alui fluxus, Dysenterias, profluvium mulierum, & quaecunque eius sunt generis, tum pota, tum toris imposita curant. Quibus sane verbis, ut annotat Columna, Gal. Idream radicem non cognouisse videtur, cum taceat vim calefaciendi & frigefaciendi, quarum aliqua praedita esse hanc plantam necesse est: nec quo ordine, siue excessu, scribat, ut in alijs solet, calefaciat, refrigeret, & an inmoderata sit, vel contrarijs constet facultatibus.

Conqueritur Clutius Idream radicis descriptionem apud Diosc. valde multam esse, ut difficile sit certi quippiam statuere. Quapropter non abs re alicubi maximorum ingeniorum & nulus Scaliger Dioscoridem aliquantulum negligentem fuisse prodidit.

Fab. Columna Bistlinguam, de qua paulo post, vult esse Radicem Idream. Sunt etiam qui velint esse plantam Viri Idream quibusdam dictam adinam, de qua antea egimus titulo Radicis Idream. cui vires melius conuenire videntur: nam item figura folij Rusci.

BONIFACIA SIVE
BISTLINGUA.

N Eotericis Descriptio
Bonifacia
siue Bistlingua
nuncupata sequicubitalibus,
lenticulis, hilari vi-
rore perfusis,
striatis vimini-
bus multis a ra-
dice adolescit,
per quos alter-
nata teret folia,
interdum plu-
ra veluti ex ge-
minulo radicata
visuntur, nunc
latiora, nunc
angustiora, pul-
chre virentia,
crassiuscula,
aeruosae, verba

foliolum non accrescat folio: hanc Hippoglossum feminam, illam, matrem dici: tamen unam tantum figuram habet. Idem in *synonymis*, Recentioribus Victoriam, & *synonymis* & *synonymis* ab Ida Troas monte, quæ & Alexandri Troas dicta est, eandem indicat. Nec referre ait, quod Diosc. de Hippoglossis vno loco, alio vero de Lauro Alexandrina scripserit. Nam de vna stirpe quandoque sub diuersis appellationibus separatimque locis agere Dioscoridem & alibi se ostensum, veluti cap. *luffilagine*. Nec etiam refert (addit) quod Ruell. verio habet femina inter folia exire, aut quod talem iconem Ruellianæ interpretationi respondentem Matth. exhiberit, fructu videlicet & longis pediculis. Ruellii autem conuersionem non esse fidelem & ipse Matth. postea agnouit. Mirum tamen tam falsam & imaginariam iconem in suis commentariis relictam fuisse. *Hæc illa*. Verum de hac Matth. iconem plura dicemus cap. de Polygonato ramoso.

Lonicet. in sua historia more suo duas icones Bilinguæ ponit pro diuersis plantis, nimirum prioris titulum faciens *Zapffenfraut*, quam dicit Laurum Alexandrinam & Victorialem: alteri capit. *seq. Zungenblat* / Hippoglossum. Idem in comment. l. 4. c. 11. in Diosc. euidenti repugnantia dicit Hippoglossum, id est, equinam linguam sibi incompetam: & c. 141. tradit Laurum Alexandrinam Germ. vocari *Zapffenfraut* & *Hochenzblatt*. Inane si lubet, & eiusmodi varianti Scriptori vel potius nugatori nescio, fidem adhibeto.

Ryffius quoque in Diosc. bis ponit eandem iconem, sed non pro diuersa planta: scribit se Laurum Alex. Diosc. eandem putare cum eius Hippoglossis. Verum nescimus quid sibi velit cum ait, Nec me fugit nullam in ea qua vix medeatur familiaritatem inueniri, à qua tamen ei inditum nomen, ut hinc etiam Germanis Vuulæ folium dicatur: immò ne aliquem quidem foliorum usum. Quid hoc est? quomodo conueniunt cum his quæ sequuntur? Sub lingua teneri solita sunt folia, vel hodie, non tantum apud Insulares ut Marcell. ait, aliaque alibi Gentes, sed etiam in Germaniæ nostra sit, quoties abundantem puorum saluam & distillantem in fauces humiditatem, unde vel prolixa columella, id est, vulua, vel fauces balbutie lingue impedimentum oritur, cohibere & liccare opus est. Sanè, ut ipsa locutio satis obscura, sic contradictio satis manifesta apparet.

Gelnero melius Hippoglossus, quam Hippoglossus scribitur, quam de Laurum Alex. vocat, & cum Rusco aliquid cognationis habere censet. Ceterum Laurum Alexandream Diosc. quæ Ruscifolia Theoph. (ut annotant Aduer.) aliam esse ab Hippoglossis, cuius in promptu est: De Theoph. & Diosc. nosce: Hippoglossi siue linguatæ radix minor, gracilior, breuior: foliū terne, paruum, cui medio quasi cauo aliud foliolum, lingula instar, insitum: aculeo rigido, infesto, mucronatum utrumque, inter quæ bacca etiam rubra Rusci videtur, suspiciendo nature, propter raritatem, opere. Quare versionem Plinij legenti, satis liquet, diuersas esse plantas, lectionemque Hippoglossi apud Diosc. luxatam fuisse: videturque Plin. legisse, non *ramosum*, sed *cauum*, id est, non comosa, sed caua folia, siue infesta, cuiusmodi planè sunt etiam nostratis Bilinguæ siue Bonifaciæ.

Senensis quæ ingenij est opulencia & liberalitate, ubi ceteri Scriptores putarant descriptio-

nem, nomenclaturamque gentiam esse, duntaxat vnius & eiusdem plantæ, non solum dedit, ut patet, *Bonifaciam* pro *Hippoglossis*, sed insuper duas commentus fuit. Alteri nempe affixis affabre lingulis, quam postea, prudentior factus, delendam curauit: Alteri dactis in petiolis longis baccis, quam Sigillum Salomonis meritis suspicantur, in illamque quasi impostorem ignarum debacchantur isti Critici, quod toties, totque annos, cum versarit aut versare debuit diligenti, ac fidei manu, oculis, ac ingenio hæc plantam, tandem non animaduertente Theophrasto & Diosc. Lauro medijs in folijs fructum, non in petiolis inesse: sed illam deimprimam, quasi foret à se hæc commentarijs penultimis, commodiorem multò fuisse: quippe cui similior est ea, quam quidam Herbariorum peritissimi in hortis colunt & veram affirmant Alex. Laurum.

Sed argumenta quibus negant Aduers. Bonifaciam seu Hippoglossum esse Laurum Alexandrinam, nobis videntur parui momenti: & quod aiunt, folia Hippoglossis esse spinosa, quod & Clus. dicit, id negant Cæsalp. Dod. & Fab. columna: Verum hi fortè describunt cultam, illi siluestrem & spontaneam, cuiusmodi fere cultis solent esse rigidiore aut hispidiore. Lectores videant, quæ antea de Lauro Alex. tradita.

Anguillaræ iudicio Laurum Alex. nihil aliud est quam Bonifacia: & alibi tradit Hippoglossum non conuenire vilo modo cum ea quæ dicitur Bonifacia & Bilingua: nullam ferre comam spinosam, nec ex corymbis prodire vllas linguas. Matth. in com. in Diosc. l. 4. c. 141. Bonifaciam seu Bilinguam scribit non esse Laurum Alex. aut Idæam, ut existimat Fuch. in suo com. de plant. historia. Quippe Laurum Alex. è foliotum umbilico nullam exerere linguam: sed tantum fructum rotundum, Tiliæ modis longiori pediculo appensum, proferte. Idem postea c. 142. Siquit, Laurum Alex. & Hippoglossum vnam & eandem plantam esse sentit: Diosc. ut quidam existimat, superuacuum erat de istis diuersis & proximis capitibus differere: diuersis quoque vtrique notat assignasse. In Lauro Alex. nec linguarum meminisse nec aculeorum è folijs prodeuntium: ferre fructum rubeum inter folia, non autem in medijs folijs. Ex his notis, tum ex viribus, quæ in hisce duabus plantis maxime pugnare deprehendantur, omnibus abundè constare arbitrat, hallucinari eos, qui putant vnam & eandem plantam esse. Se equidem illam, cuius dat figuram, legitinam Laurum Alex. censere. Huic alteram adiecit, quam & ipsam haud dubie Laurum Alex. fore: si huic fructum in medijs folijs inhæsci concedatur. In Epit. prius pro Hippoglossis ponit, & postea pro Lauro Alex. Sed sciat lector primam omnium iconem Matthioli pro Lauro Alex. positam esse Polygonatum ramosum, de quo alibi trademus. Secunda similis est Hippoglossis, sed in ea fructus appingitur sine foliis, quam in comment. cum magnis fig. Lat. & Ital. omisit, fortè quia contrariari videbat suis verbis, quibus dixit, Laurum Alex. non ferre fructum in medijs folijs, sed inter folia, contra manifestum textum Diosc. & Theoph. Plinium potius & Ruell. sequi maluit, ut ueretur suum Polygonatum ramosum, cui male in hist. Germ. tribuit nomina & vires Vuulæ, seu Bonifaciæ. Camer. in epit. eiusdem Matth. omisit quoque alteram Laurum Alex.

C. Bauh. in vltima Matth. editione tradit Hippoglossum duplex esse, alterum in quo fructus pediculo, alterum in quo folio insidet: quod etiam

Matth. im-
posita.

Præter
loc. optime
relicta

An folia
spinosa.

Bonifaciam
non esse
Laurum
Alex.
Fuch. not.

Matth.

Hippoglossi
sum dactila
C. Bauh.

Vires & vis.

Quæ Veteres de Lauri Alex. Hypoglossi, & Chamædaphnes virib. tradidère, licebit vidère in præcedentibus. Libuit enim ibi particulatim cuique suas, ut illi fecerunt, tribuere, ne in redubia & tam controuersa, ut patuit, temerè & præter mentem illorum Veterum scripta, quod plerique magna securitate facere solent, temerè dispendemus.

Sed quid Recentiores de Bonifacia viribus tradiderint, nunc videamus. Est ei, teste Marcello Virg. acrimonia & calefaciendi vis, ideòque Priscis ad siccandam linguæ nimiam humiditatem in pueris adhibebatur, unde Hypoglossi dictam putat. Insubres aliquæ Gentis aliquæ eodem autore, in balbutientibus pueris vtuntur eà: inbentque sub lingua habere mares duplex eius folium & fructum: simplex verò & sterile illud feminas: quod superstitione carere vix credimus. Germani, ut obseruat Tragus, in faniæ Viceribus & humectâ supra modum Columellâ & anginâ duntaxat hodiè vtuntur. Herba & radix in puluerem redacta, exsiccat manantia & fluentia vulnera ac vlcera, quemadmodum vulgaris Aristolochia. Cornu eius ad Columellam prolapsam leuandam prædicit. Constat, inquit Cordus, certissimis vulgi experimentis Vuulariæ radicem etiam siccâ bubones in peste maturare. Hinc est, quod malacicum vim Hippoglossi radici Autores tribuunt. Vuularia difficulter parientes epota adiuuat, menses citè, & calculos pellit, quæ licet omnia vulgi experimenta sint, tamen eadem etiam facultates Lauro Alexandrinæ Autores ascribunt. Tradit ex vino potam strangulatus vteri succurrere: herniis ab prolapsu interaneorum extuberantibus mira celeritate mederi: siquidem dissiliencia iungit protinus, sed infibulandus est æger, aut fasciandus primis diebus, ne rursus foras intestina prorumpant, suadente Ruellio. Ergo Recentiores, ut annotauit Matthiol, longè pluribus commendant viribus Hippoglossum, quam secerint antiqui Scriptores: nam ut illi tradunt, in vteri affectibus magno datur iuuamento. Quo fit ut strangulatu vulu laborantibus mulieribus radicis aut herbe puluis cochlearis mensurâ ex vino vel iure h. iustus præsentaneo remedio operam ferat. Est & ad puerorum enterocelas, si eidem & Cæsalpino credimus, præstantissimum medicamentum, si diutius diluculo hauriatur puluis idè sesquidrachmæ pondere ex maioris Symphyti decocto. Verùm id lumentibus euenire scribit, quòd primis tantum diebus ad eam ramicem pulsare percipiant, ut intestina foras prolabi velle videantur: quare subcungulis, fasciis & fibulis reprimentibus, roborantibusque primis diebus vtendum esse. Mira sanè eius vis, si his Autoribus habenda fides, ita protrudi intestina. Suspicamur bonos hos viros ex malè intellectis Ruell. verbis ita dixisse, cuius tamen nec is nec alius meminit, quod legerimus. Huius etiam tam rare facultatis non meminit Dod. qui ex Baptista Sardo recitat vires huius stirpis ad suffocationes ex vtero, & intestinorum ramices vehementer commendatas. Pen. & Lob. vires eius ad calculum dysuriæque eximias celebrant.

Nonnulli appendunt hanc herbam pueris, ut nimia illorum humiditas exsicce.



Tom. 2

RVSCVS.

CAP. XL.



R Viscus duorum drantum, nonnunquam etiâ duum cubitorum altitudine densis viminibus, lentis fractuq; contumacibus, & striatis fruticat, usque in multos ramulos ductis in quibus confertissima folia, Myrtinis paria, rigidula, neruosa, mucrone infesto pungentia, cullo pediculo ramis hærentia, parte

prona ad latus inflexa, ut non sursum & deorsum, sed dextrorsum sinistrorsumque spectare videantur, dura & robusta: sapore amara, & adstrictoria vi efficacique pollentia, ad quorum medium flos minimus, per breui pediculo hærens, enascitur, qui ubi primùm oritur, aciculæ nodulum figuræ suæ exprimit: expansus verò trina latiuscula foliola, inferiore quidem sui, auersaque parte, folium, cui quasi stragulo incumbunt, respicientia, linteis in modum excavata, sinuataque ostentat omnia, reliquis interim tribus, quæ trinorum instar radiorum sunt efformata, in angustum apicem desinentibus. Florem deinde fructus sequitur rotundus (non item folium) Asparagorum bacis maior, rubescens, subdulcis, sub cuius pellicula bina latent semina magna, sulcata, altera parte gibbosa, altera plana, insignis duritiei, ita ut si in pauimentum coniciantur resuscitent, & ut ait Lob. vix vili frangenti cedant. Succrescit quotannis noua Asparagorum simillima propaga, aromatica aliquantulum, amara, ut annotat Lob. Radices crassæ, obliquæ, implexæ, fibras demittunt crebras, Asparagorum fibris similes, albas, longas & amaras: Trago: Dod. verò gustu dulci quiddam respicientes.

Hanc ipsam plantam Dioscorid. *μυρτίνη ἀγρία*, Myrti sylvestris nomine describit: Quidam & *ξυμύρση* Oxymyrinen dicunt: solum inquit, fert Myrti, sed latus, ad formam lanceæ mucronatum: fructum rotundum, medio folio inhaerentem, qui per maturitatem rubet, nucleumque ossis instar durum complectitur. Ramuli ab vna eademque radice numerosi exeunt, vitilium modo leui, fractu contumaces, cubitales, foliosi. Radix Graminis similis, gustanti acerba, & subamara.

Ruellian sua Dioscor. versione minis appositè conuertit, bæcæ à medio folio pendentes, cum Græcè legatur, *ἡ μύρτη ἔχει μύρον τῶν πτερυγίων*, id est, habet in medio folia rotunda: neque enim ex foliis pendunt, sed ipsi adhærent, ut autem in te mend. docebit. Aut quid si cum doctissimo Saraceno legamus *ἡ μύρτη ἔχει μύρον*, alioqui ex his vocibus, alterutrum redundare necesse fuerit.

Scrapio verò, postquam fructum hunc iudem

Cec

Columella
in uicinis
Angina.Vulnere
ac vlcera
manantia
Bubo post
dent.
Radix ma
lactica.
Partes dis
ficles.
Menstr.
Calculu
Vteri str
gulario.
Hernia.Vulnere
modis in
vteri sus
fu. C. H.
ma.
Enterocelo
pueror.Dysuria.
Radix
penfa.

Descriptio

Folia

Fructus.
Semina.

Radix.

Ruell. re

prob.

Diosc. illu

Ar. ex e

et autem in te mend.

gustata linguam mordentibus & arteriam lancinantibus. Idem ait Thymelzam aliquibus Chamelzam dici: ex Thymelza esse granum Cnidii, fallique eos, qui id Chamelzæ fructum censcant: foliorum similitudine decepti.

Plin. quoque Chamzleam similitudinem foliorum Oleæ habere tradit: esse autem amarā, odoratā (quidam Codices legunt nigra, odoratā: alii amara & odorata Herm.) in petrosis, palmum altitudine non excedere: hæc lib. 24. capite 15. At alibi, nempe lib. 15. cap. 7. dixerat: Oleum fieri ex Oleastro, tenue id, multoq; amariū, quā Oleæ, tantū ad medicamentum vtile: cui similitudinē sit ex Chamelzæ fructu (samento Cornar.) non altiore palmo, foliis Oleastri, baccisq; Hic Dalechamp. scribit: Oleæ similitudinē, quæ Bacifera est, Plinium describi: baccas non gignere Chamelzā. Verū Dalechampi censuram nobis nullius ponderis videri, indicabitur capite de Chamelzæ tricocco. Plinius lib. 14. cap. 2. de Thymelzæ agens, eam aliis Chamelzā dici scribit. Vnde manifestum videtur, eum lib. 25. cap. 7. per Chamelzā herbam intelligere Thymelzā, de qua pōst. Multū, inquit, infra hunc succum [Euphorbi] est quā in Gallia sit ex herba Chamelzæ granum Cocci ferente. Fructus Hammoniaco similis est, etiā leui gustu os accensum diu detinens, & magis ex intervallo donec fauces quoque licet.

Placet & Dalechamp. iudicium: ex Chamelzæ foliis tuis succus exprimi potest: verū quod legimus, præter Plin. alius nullus autor id prodicit. Eum exillinat idem noluisse id vterere quod Dioscor. scribit: Thymelzā farinam vix acerbæ succo excipi & in pastillos dgeri.

Ex his Plini placitis suum illud signum prodidit Hermol. quando ait Chamelzā fruticem esse petrosum, simillimum ei Oleum inellē ut Oleastro, ob id à quibusdam Oleastellum & Oleam Cilibracā vocari, auctore Columellā, Sirapam (Oluarū conditurū antiquum genus) inde cōdi solitam scribente. Addens paulo pōst, nostri & hanc, & Thymelzā præcipuē Casiam videntur appellasse Theophrast. Cneoron, Higinio id apud nos Casiam interpretante, cuius duo genera feruntur &c. Hæc Hermol. Vt videat & advertat lector in quanta pericula se aliosque coniciant, qui tantā securitate aliorum scripta pro suis venditāt, nec illa tamen probē intellecta, aut suis interfusa, quod passim Hermol. facit. Quis ferat eum similitudinē Chamelzæ oleum facientem cum Oleastri Oleo. quanquam quid oleastrum vocant, eum nesciuisse facili deprehendimus. Sed longē periculosior eiusdem error, quando putat Chamelzā esse Oleam Cilibracā Colum. lib. 12. cap. 49. quamvis in nostro Basil. codice legatur Calabricā, quam scriptor ille propter similitudinē Oleastellum quibusdam vocari ait: quem Hermolai errorem, doctē sanē & solide refutat Marcellus.

Heracliam, (inquit idem Marcellus) id est, Herculeam vocari etiam Chamelzā ex Dioscoride dictum, credimusque nos factum id nomen ex antiqua fabula fuisse, quam ex Pindaro in Oleastro suo loco retulimus, quod scil. Hercules ex Scythia Coronatus Oleastro in Græciam redierit: & quoniam similis Chamelzæ Oleaster sit, & Oleastro Chamelzā: idē similitudine decepti aliqui non Oleastrum, sed Chamelzā Herculeam vocaverint hunc & Coronam.

Adieci quod in omittunt, & hoc nomen, Chamelzā nigra: error tamen is

Tom. I.

eorum est, qui Græcarum vocum similitudine decepti, chamelzonem cum chamelzā miscuerunt. Neque enim nigredo chamelzæ competit: qui colore nigro à candido discernitur, chameleon est. Et quoniam nihil in chamelzā id causæ haberet, inutiles eas voces & Marcell. & plerique interpretes expunxerunt.

Errasse autem in duabus his plantis non Græci tantū, sed & Arabes, & in quidem inter medicos probatissimi Serap. & Auic. videntur: qui Mezeron, quæ Chamelzā hæc Barbaris est, describentes, multa quæ Chameleoni debentur illi attribuerunt: & è diverso: Poteruntque volentes id ceruus in Chameleonis & Mezerei historis videre.

Sunt chamelzæ huius appellationes aliæ quoque adductæ, sed improprie, & ex aliis plantis importunē ad hanc relata, ut specialius quoque in Thymelzæ historia patebit.

Ruellii errorē, chamelzā cum Laureola folio deciduo confundentis, in huius historia deteximus, quem, licet grauiissimum, more suo ex Hermol. iuxerat: & ex Ruellio Tagaultius, doctus alioqui medicus. Tam lubrica solet esse securitas sui, & ositans confidentia in alios, ut quā plurimū data porta est, testis oculorum & rationis facibus, præcipites agant in huiusmodi erroris.

Sic autem hic ait: Mezeron Serap. indubie chamelzā est Dioscor. Melue verō, ut pletaque omnia chamelzā cum Thymelzā & veramque cum chameleone nigro pudendo errore commiscuit: in quo etiam grauius peccauit eius præceptor Auic. Itaque nihil certi de Mezeron ex eorum scriptis statui potest. Theophrast. verō chamelzā Cneoron & Cnestrum vocant: hæc à Cneoro, ut puto, deriuata est vox Mezeron, quam vocem factionis Arabicæ Scriptores & Barbaræ eorū officinæ quasi lethalem & viduicā interpretantur. Veneno enim proximum esse Mezeron scribit Mesue, quod tamen de chamelzā vel Thymelzā nusquam, quod sciam, legitur. Sed de chameleone nigra scribit Gal. quod radix eius habet quid venenosū. Falluntur qui Granum Cnidium vocatum ex hoc tuteuloso frutice, chamelzā inquam, nasci autumant, foliorum similitudine decepti. Thymelzæ namque fructus est, quæ folia habet chamelzæ angustiora tamen. Quo sit ut Mes. turpiter lapsus, si per Mezeron, ut quibusdam videtur, chamelzā intellexerit. Scribit enim folia eius similia esse foliis Oluæ, sed maiora. Hæc Tagaultius. Qui dum Mesuem erroris insinuat, ipse quoque parum oculatus reprehensionem meretur. Confundit quippe plantarum diuersarum nomina & descriptiones, quas ex aliis ut ex Ruell. transcribit, speciatim Chamelzæ, quam dicit cum illo lacte manare: ubi autem galeni lactis suam chamelzā viderit non demonstrant. Ruellii Chamelzæ descriptionem posuimus ante cap. de Laureola decidua. Aut potius ex ipsomet Mesue hunc errorem vterque hantile videtur, qui Mezeron Laureolarū maximam dixit, quod hi ad chamelzā, cui neuiquam ad competere Veterum historia retulerunt.

Monachi etiam Chamelzæ & Thymelzæ tribuunt lac, ut suo loco dicetur. Mesuem longē aliter interpretatur Celsus, ut annotatum cap. de Mezeron. Syluio Mezeron Serap. est chamelzā Dioscor. Mezeron autem Mes. est Thymelzā Dioscor. cum verō diuerentias eius describit Mesues, Mezerei nomine utamque & præterea chameleontem utramque comprehendere videtur cum Auic. Cordus quoque testis est chamelzā

Ccc 3

Chamelzæ
nigra
Quarundā
error refut.
Chamelzæ

Græcorum;
ex Arabū
error refut.

Nemina
recondit.

Ruellii
error.
Item Hermol.
& Tagaultius.

Mesue
error.

Cneoron
Theophr.
Cnestrum.

Granum
Cnidium.

Mesue
error.

Tagaultius
error.

Mesue
error.

Mezeron;
Chamelzæ.

Plin. lib. 24.
cap. 15.

Thymelzæ

Hermolai
signum.
Oleastellū
Oleam Cilibracā.

Casia.
Cneoron.
Hermol. lib. 14.
cap. 7.

Eiusdem
periculosus
error refut.

Chamelzæ
Herculeæ.

ab Arabibus & Pharmacopolis Mezereon appellati.

Clamitat Cornat. esse hodie qui cum Daphnoide Chamelcam confundant iudem Zeilandt appellantes: vulgi in eo morem secutus, quod publica delicta carpens ipsum tamen remedia adferre nescit. Nam nec ipsum eas plantas probe distinguere potuisse, sub Laureola decidua dictum.

Iactat se Brunfels. in Exegeli sua simplicium, Diosc. Chamelcam, id est, Mezereon herbam vidisse in Officina aucuparia, ne per latum quidem vnguem discedentem à Diosc. descriptione.

Nihil ei testabat, quam ut clamitaret, *supra*. Sed sibi vidit, nec cuiquam alteri, dum qualem & quantam viderit, propria descriptione non declaravit, quod optassemus sanè: alioqui suspecta nobis ab eo pro legitima Diosc. Chamelca habita, qualis erit, quæ ad amissum eius descriptioni in omnibus satisfaceret, nondum nobis hætenus innotuit.

Lonicero Chamelca etiam Pyros Ochne dicitur, si [inquit] *supra* scriberetur, esset Tritici palea. Bdeliya quoque dicitur, id est, *extirabilis*. Citocaulum at effectum laxandi. Hebraicè dici possit *Saltz scaphla* id est, humilis Olea.

Ceterum Chamelca vocem multis plantis attributam manifestum est. Alicubi enim pro Oleæ generica specie loci tantum differentia distincta, posita: ut Olea Calabrica Colum. ut dictum. Item de Olea Aethiopica & Ligno Rhodio, ut notatum lib. 3. Hæ autem plantæ nihil habent commune cum Chamelca de qua hæc capite. Sunt verò & aliæ, quæ in quibusdam accedunt, ut Laureola folio deciduo, quæ quibusdam Chamelca dicitur, ut ostensum.

Chamelca hirsuta nomine fruticem proposuimus à vera Chamelca tamen diuersum. Daphnoidelem confundi cum Chamelca per Arabes, existimant aliqui, ut antè declaratum.

Chamelcam dici de Thymelca, clarum fiet ex capite proprio. Est præterea Chamelca Monspeliaca tricoccos, de qua paulò pòst. Sequitur Chamelca subtus incana. Sesamoides minus Dalech. aliqui Chamelcam faciunt, de quo proximo capite. Nerium alpinum ab aliquibus Chamelca folia dicitur.

Fuchsius absurdissimè errore Chamelca substituit Polypodium, secutus authoritatem suppositi libri Galeni de succedaneis, quem errorem ante nos & Syllius reprobauit. Camerac. & ante eum Dod. substituunt Laureolam folio deciduo, ut dictum iam suo loco.

Vires & virtus. Vires Chamelcæ ex Veterum præscripto hæ sunt. Folia gustu linguam mordicant, & arteriam stridunt. Eadem per inferna pituitam bilisq. detrahunt, maximèque si in catapotio assumantur.

Purgans & pestifera. Vni siquidem Chamelcæ parti duplum Absinthii adicitur, ex hisque aqua aut melle excoctis catapotia finguntur: & ea quidem in ventre non liquecunt conficiunturve: sed prout deuorata fuerint, ita per aluum egeruntur.

Mira pilularum ratio. Eadem folia trita mellèque excepta sordida, & crustosa: vlcera repurgant. Hæc Dioscor. apud quem & vinum chamelaites fit, si, ubi floret, chamelcæ fruticem cum foliis contusum cribatrumque duodecim drach. pondere in multi congium mittas, & post duos menses vinum transfundas.

Hydropicis, hepaticis, delassatis auxiliatur: iræque sceminis, quæ à parui ægrè purgantur. Alius & ab isto discrepans chamelcæ vius est apud Plin. quando sit: aluum purgat, detrahit pituitam bilisq. foliis in duabus Absinthii partibus decoctis, succoque eo cum melle poto. Folus impositus & vlcera

purgantur. Auiunt, si quis ante Solis ortum eam capiat, dicatque ad albugines oculorum se cape- re, adalligatâ discuti id vitium. Quoquo modo collectam iumentorum pecorumque oculis salutarem esse. Sed superstitiosum & vanitatis plenum est remedium Plin. ad albuginem, ut mirum sit, tam grauissimum virum eiusmodi nugis fidem adhibuisse. Gal. chamelcæ amaram qualitatem prædominantem tribuit. Quare & sordida valde vlcera, & quæ maximas crustas habent, cum melle repurgare possit. Paulus drachm. quatuor chamelcæ in aqua multa cotylis duabus coctas, donec quarta pars superfit, dat: & catapotia ex duabus Absinthii partibus & vna chamelcæ dicit purgare, ut Elleborum.

CHAMELCA TRICOCOS.



Frutex est Chamelca tricoccos cubitalis ac bicubitalis, minor quam Thymelca Mœspeliaca, magis samentosus, rugosus, lignosus, intortus, in ramulos plures diuisus: foliis retusioribus, latoribus, viridioribus, & tenuifoliam Phyliteam referentibus: inter quæ flores parui, luteoli, foliis tribus constantes: quibus succedunt semina tri-

coccos, primum viridia, maturitate verò ruborem induentia, in frutice suo perennia, ut sunt Lathiridis, Tithymali, siue Heliotropii verrucosi, dura, dentibus fractu contumacia, medullam albam continentia. Dentibus frangenti apparet manifestæ amaritudo.

Lob. rubentes haeculas tricoccos dicit, officulis præduris, lignosis, gustati medull. in ferundam & præficam exhibentibus. Radix lignosa.

Clus. sic depingit: Surculosus est frutex, ramis palmaribus, interdum minoribus, præsertim calidis regionibus: foliis perpetuò virentibus, Oleæ similibus, minoribus tamen, nec incanis, sed viridibus, gustus inritò amari, deinde linguam vellicantis: flores habet exiguos, pallidulos aut flauos, tribus foliolis constantes, ex foliorum alijs prodeuntes: fructum tricoccos Tithymali modo, pellicula præpudm viridi, deinde per maturitatem rubra, amari & ferudi gustus, obductum, durum, & ubi exiccatus fuerit, fuscum.

Monachi in Mel. fortè hanc Chamelcam tradunt his verbis. Chamelca quæ etiam Mezereon est, & vulgò Oliuella & Olcastellum dicitur, & non remota ab vrbe [fortè Româ] versus mare plurimum prouenit. Folia Oliuis similissima, minor tamen & quasi decurtata habet. Rami eius multi, tenues, duri, non recti, sed per terram circumquaque ut plurimum deieci, foliis pleni sunt, omni tempore. Videntur è longinquo monticuli foliorum speciosi, quasi arce parati: hodie quamplurimis cognita est. Hæc illi. Mirum est eos

ryhit

Cornat. as-plod.

Brunfels. derisus.

Qua sit gen-
nina Cham-
melca
Diosc. ad-
huc dubi-
tatur.
Pyros O-
chne.
Bdeliya
Citocaulum.Humilis o-
lea.
Acquino.Olea Cala-
brica.
Lignum
Rhodium.Chamelca
hirsuta.

Thymelca.

Chamelca
tricoccos.Chamelca
incana.Sesamoide-
minus Na-
rium alpi-
num.Substitu-
turi ab-
surdus er-
ror.Vires & v-
lur.
Nona.Purgans &
pestifera.Mira pil-
ularum
ratio.Vlcera sor-
dida.Purificatio-
nem Cham-
melcæ.Vires & v-
lur.

Pota.

Albugi-
nes oculorum.

Plinij & Galeni.

Vlcera & v-
lur.

Diosc.

Vlcera & v-
lur.

Diosc.

Diosc.

Diosc.

Diosc.

Diosc.

Diosc.

Diosc.

Diosc.

Diosc.

Diosc.

Diosc.

Diosc.

Diosc.

Diosc.

Diosc.

Diosc.

Diosc.

Diosc.

Diosc.

Diosc.

Diosc.

Diosc.

Diosc.

Diosc.

Diosc.

Diosc.

Diosc.

Diosc.

Diosc.

Diosc.

Diosc.

Diosc.

Diosc.

Diosc.

Diosc.

Diosc.

Diosc.

Diosc.

Diosc.

Diosc.

Diosc.

Diosc.

Diosc.

Diosc.

Diosc.

nihil de fructu & floribus tradere, ac ne saporem quidem foliorum dicere. Nostra etiam non ita humideiecta procumbit, ut de sua tradunt. Quae difficultates cauent, quominus confidenter audeamus asserere, eandem esse cum hac nostra.

Matth. in suis com. in Dioscor. Chamelæz huius fructus tricocco appinxit Thymelæz, eundem fuso, sed sibi non insolenti. In post. com. & hist. Germ. reiecit totam figuram, vel nullam ponit, forte quia pœniteret figmenti.

Camer. in epit. Matth. & historiam eius Germ. ponit iconem Chamelæz tricocco ex Gesnerianis figuris depictam ad meam plantam missam Gesnero ante 40. annos, quod non placet, vbi nam de ea aliquid prodidit Matth.? Idem in horto Chamelæz veram alius tricocco & Mezereon dici ait. At aperte in hist. chamelæz lac denegar, quod tamen Arabes in suo Mezereon expetunt.

Nec probatur nobis Casp. Bauhin. in Matth. Comment. nouissime sub incudem reuocatis pro Matth. iconem Chamelæz supposuisse iconem Tabern. in qua fructus tricocco: (quæ fictitia nobis videtur, ut postea d. cetur) maxime cum idem nihilominus retinet Thymelæz iconem absurdam cum fructu tricocco. Item addit hæc verba: Inter Chamelæz & Thymelæz Dioscor. differentiam fecit: at Serapio utramque Chamelæz, sic Mel. Thymelæz, & Arabes Mezerei nomine expressere. Chamelæz latifolia alba Serapionis. Thymelæz foliis magnis & tenuibus Mesur: Chamelæz Matth. Lac. Cordo in Dioscor. Dod. Gal. & in fol. Lugdun. qui duas habet figuras: Chamelæz & Cistalpin. Itaque à quo in pluribus dissentimus, apud Serap. enim cap. 35. de Mezereone ex Dioscor. & Gal. referuntur quæ illi de Chamelæz tradiderunt, neutiquam verò quæ de Thymelæz. Mesures quidem de Mezereone scribit quæm vobem Syluius Thymelæz interpretatus est quod multi docti improbant: non enim de sola Thymelæz eo cap. scribit. Cordus Chamelæz tricocco nullam fecit mentionem apud Diosc. cap. de Chamelæz. Lacuna quoque hanc non habet, sed tantum iconem fictitiam ex Matthiol. & præterea male eiusdem iconem Thymelæz cum fructibus tricoccois. Vtrumque errorem & Lonic. commisit. Scimus error plures parit errores. Præterea Hist. Lugd. non habet duas icones Chamelæz tricocco: vna est Dod. altera autem Matthiol. quæ non vera icon tricoccois. Quare non admittenda Casp. Bauh. reprehensio in eius Animadu. quæ autumat duas figuras & totidem descriptiones vnius plantæ ab eadem positas. Matth. scribit, suam chamelæz fructum ferre Myrti bacis similem, longiorem quadantenus & Olivæ formam referre. Quod vel ex Plin. verbis forte extorsit, de Matth. verò Chamelæz pōst.

Apud Amatum quidem in Dioscor. suis apta huius Chamelæz tricocco figura quamvis hanc nō intelligat Amatus cum aperte Mezereon vocet, & quæ huic competunt tribuat illi.

Merito quidem Aduersa. increpant Matthiolū, quod hæc planta illi non fuerit cogitans ipsi interrum carpendi qui flores quinis solis fingunt & pingunt, cum sine tantum ternis.

Inquirendum an sit Chamelæz Bellon. quam in Cretæ monte Ida vulgò Psilori dicto cum Thymelæz vidit, cuius meminit Obs. lib. 1. cap. 16. Item an de hac Maranth. Meth. lib. 2. cap. 5. scribat. Idem lib. 1. cap. 8. vult Cneorum Theophrastesse. Necpro certo asserere ausimus Fuchium l. 1. c. 4. de comp. med. de hac scripsisse, cum ait Chamelæz

læa Sepalsus Mezereon nominatur. Paucis autem hodie vera chamelæz cognoscitur: Seminata quidem nobis est aliquoties, verum nunquam prodit.

Dalechamp. apud Plin. annotat eum decipi, neque enim chamelæz bacis ferre, ut ille ait, sed fructum triangulum: Bellam verò, mehercle, & oppidè festinam subulitatem: quasi verò non & tricocco queat esse bacca. Sed esto non esse baccam: quid scit hanc Plinium intellexisse? aut quo autore nos docebit chamelæz Plini quæ & Dioscor. est, baccas non gignere, sed fructum triangulum. Sed videtur nobis nimiam quadam confidentiā præsupponere hanc nostram esse Veterum chamelæz, de qua tamen est, quod dubitemus, quamvis Dod. omnia Veterum nomina, etiamque reiecta superius ex Dioscor. posita huic tribuat.

Idem ait in hist. Gal. folia valde similia Oleæ, sed minora. In hist. lat. scribit oleæ similia, minora & nigriora: fructus decerptos nigrescere, oleamque pinguetudinem contrahere Olivæ instar, fauces exurere veluti & folia ac cortex.

Avic. & Serap. Chamelæz Mezereon vocant, sub quo tamen nomine Chamelæz nomem virumque complexi quoque sunt: ita Chamelæz cum Chamelæconibus, atque vna etiam Thymelæz confundentes.

Mezereon Mesur Dod. Chamelæz, Syluius Thymelæz reddit, ut antehac annotatum. Ita vides & huius historiam satis confusam apud auctores. Tabern. sensibus nostris imponit, quando Chamelæz Arabum tricocco vocat, quamvis huius rei etiam Lobelium auctorem citet, addens Mezereon quoque esse Arabum in Aduers. Sed ubi loquor Arabes Chamelæz tricocco meminere? Aut vbi nam locorum vidit Tabern. Chamelæz qualem pingit, compositam ex frutice olim à Matthiol. picto pro Chamelæz, [nunc autem reiecto] & nescio quibus figmentis, granis tricoccois, floribus quinque partitis? Aut quæ fronte suæ quonque Thymelæz eadem mei grana tricocco, qualis Thymelæz nunquam in rerum natura existit, appingere est ausus. xapizax. siue ut alii scribunt, xaxizax. & Græcè non malè dicitur. Quidam Hispani Oliuellam vocant: Provincia Narbonensis Garoupe, teste Clus. Germ. Seidel past, si Tabern. credimus. sed addendum Stembd vel Welsch / id est peregrina.

Chamelæz tricoccois feruidi squalidæque soli, maritimæque amasia, vbiunque suæ spontæ est, saxosa amat. Proinde in collibus Narbonæ arenibus, saxosis, Monspelii & Frontignanæ vberè fruticat: in cultis etiam Oliuetis, potissimum ad margines, aut si ipse ager paulò laxior fuerit, inter alias stirpes. In Galloprovincia, vbi tamen nascitur, haud multò prodire proventus, Lob. observat. Nascitur etiam [inquit Clus.] Hispaniæ Valentini & Arragonum regno, totaque Catalonia: verum multò breuior & candidior, quàm in Gallia Narbonensi. Certè Monspeliano agro circa Miranæ, & vicinum illi collem, viæque ad Frontignanum oppidum, Setio monti, quod vulgò cap de Sete dicitur, in ipso mari sito, proximam, frequens est, vbi multò vegetior & viridior quàm in Hispaniis. Nunc etiam à rei herbariæ studiosis in Germania & Belgio colitur. Sed in locis frigidioribus difficultè seruat, idè subterraneis per hyemem habenda.

Geneuæ à nobis semine facta altero primū anno proventus, ac non recondita asperam hiemem pertulit. Basileæ ip. horti D. D. Plateri & Zuingeri

Plin. de
scod. con-
tra Dale-
champ.

Arabum
error.

Tabern.
& Lob. ad-
resantur.

Tabern.
icon ficti-
tia amplius.

Locus:

Cultus.
Sarr.

Prepara-
tio
Tempus

plures & pulchras plantas obseruauimus, sed
lytoreponunt. Ad fruge n peruenisse scimus
& Pasilex & Plortz. in, & utrobique semina pro-
be mixtura decerpimus me. de Nouembri. Pro-
pagatur etiam furculis teste Canner. Floret Apri-
li, Clul estate, & itaque summo, Lob. Nos utroque
tempore florentem, ac certe etiam Augusto par-
tium florentem, partim fructus ferentem uidimus.
Augusto fructus perfici solet, tubinde per totam
hyemem plantæ lux adhaerens: nam & Apri-
lensis semina præcedentis anni collegimus. In
Italia reperitur culta in hortis instructio. ibus.

Vires & v-
lus.
Purpur.
Hydrops.
Cautio de
mala cura

Culda est, iudice Dod: & sicca tertio gradu, ac-
cedens ad quartum. Folia purgant per inferiora
magna vi & violentia purgant & humores bilio-
sos, maxime serofos: Vilia sunt hydropicis, si
cum iudicio & ratione exhibeantur. Huius enim
exaltitas accedit ad vnu veneni, nocua & praua
homini multis modis: lædit ventriculum, hepatis,
partes omnes nobiles, eas calefaciendo, eroden-
do, & vlcera inducendo intestinis, tandem vacuat
aliam ad sanguinem usque. Hæc Dod. quæ vitia
hæc cum Thymelæa sunt communia: postea tra-
cit Chamelææ correctionem cum ait: Folia viri-
dia Chamelææ maceranda per 24 horas in aceto
generoso, deinde exsicca & in usum reponen-
da. Acetum autem melius esset ad hanc prepara-
tionem, si ante in eo macerata essent Cotonea
mala, aut Berberis semina. Folia autem preparata
exhibenda sunt in puluere cum semine Anisi &
Mallice, aut decoquenda in sero lactis putilli-
mum capiti, aut in iusculo capris, deinde pro-

Chamelææ
exalt.
Exhibenda
modis.

Catapotia
Miqua.

pinandum seru aut ius. Melius ex Mezereon,
id est, Chamelææ, ut vult Dod. Syluius vero, ut
decebamur Thymelææ reddit] foliis catapotio-
rum descriptionem habet, ex corticibus Myro-
balutatum & Cepularum, & Teremabin, id
est, melle aceto [Manna] & Palmulis acidis, quas
Tamarindus vocant, in illi luto liquore dilolu-
t & efformat: ipsaque folia prius in aceto acerrimo
temperata resicari præcipit. Commendantur
catapotia hæc ad hydropicorum purgationes: a-
quillos enim humores educunt. Sed violentiam
naturæ inferunt, idcirco ab his quantum licet ab-
stinendum. Bacculæ tricocæ medullam habent
seruidam & præciccam, inquit Lob. Radix ligno-
sa inutilis. Magnus tamen succi totius plan-
tæ usus, etiam hodie, præsertim Mospeli, vbi
Pharmacopæi pressum siccatumque habent,

Hydrops

Succus
siccatus.
Dosis.

Hand a-
maxim
se succum
densatum
Arthriti

monente primum Rondel. cuius imitatione &
nos soppis densati succi recentis dr. i. & dr. ii. dedi-
mus per se, & seruis alius Catharticiis hydragogis
mixtas, peribano sine euentu. Sed non admodum
multum excernit, nec vilo effreni motu, ut solent
Laureola, Mezereon Germanica, Gratiola, & alia.
Quin perparum aut nihil interdum mouet Cha-
melææ succus concretus, nisi remixtus quibus-
dam lenientibus, aut similibus catharticiis. Cui-
dam arthritico habitiori, toroso, procero homi-
ni, tres drachmæ nullum excrementum moue-
runt. Pueris etiam datus, nec tormina nec vo-
mitiones facit, sed aquas educit & serum. Admo-
tus pubi & abdomini hydropico, non vllum pre-
stantius ad vrinas proliciendas, quo modo luben-
tius utebatur Rondel.

Hydrops.
Exterius
impetum
Gravitas

CHAMELÆA INCANA ET LANV- GINOSA.

CAP. XLII.

Non 1754. Cl. D. D. Calp. Baun. frater ramum
pulchellum huius fructus ex Italia acceptum

nomine chamelææ speciei, Neapoli Mezereon di-
cti, ad nos misit. Folia sunt aliquatenus similia
Laureolæ, folio semper virenti, multo tamen mi-
nora, vncias duas ferè longa, alia multo minora,
ad Vitis Idææ semper virentis dictæ folia acceden-
tia latitudo maiorum vncie vel digiti, in acumen
non desinant: crassa sunt, ut in Laureola dicta,
superne viridia, inferne lanugine candicant.

Eandem quoque in horto D. Cortusi vidisse
suspiciamus, ante 40. annos, nam hæc inter nostra

annotata scripta

inuenimus. Cha-
melæa à Cortulo

vocatur frutex

cuius folia viri-
dia, ut in Laureo-
la semper virenti,
oblonga, multo
minora, quæ
summe acris di-
cit, ac baccas fer-
re. Differt à Cha-
melæa Mospel-
sulana tricocco.

Eandem Clul. Descriptio

diligenter descri-
psit, his verbis:

Aliud Chamelææ
genus nobis ex
Italia defertur, à
prædicta planè
diuersum. Id re-
cto stolone fru-
ticat, ramisque habet admodum flexibiles, tena-
ci coruæ, & qui difficile dirumpi potest, obdu-
ctos: folia admodum coriacea, carnosa, Daphnoi-
dis foliorum formam imitantia, multo tamen mi-
nora, & incana lanugine, inferne præsertim, pu-
bescentia: flores sin. ul congestos, quatuor folio-
lis constantes, dilutissime purpurascens, ex la-
nuginosis, colorisque argentei, calyculis prodeun-
tes. Fructum non tricoccum, ut superior, sed vni-
cum, oblongiusculum, tenui miniata membrana
tectum, succulenta carne, & seruidum nucleum
in se continente præditum. Eum fruticem dunta-
taxat apud nos videbam, in Belgio in hortis cul-
tum, bisque interdum eodem anno florentem.
Viennæ Austriæ aliquoties illius semen terræ cre-
didi, & natas plantulas diligenter summaque cu-
rà conseruare volui, sed subsequens hyems sem-
per corrupta. Pena & Lob. in Aduers. huius ico-
nem exhibent titulo chamelææ Alpinæ incana, ex
qua & nostra facta. Ceterum ignoramus ad-
huc quoniam sit ref. rendi Chamelæa incana Bo-
noniensium Lob. quam proponit in Obs. in eo-
rum agnis maritimis proueniens, facie & vultu
Dorycnii Mospel. cubitalibus virgulis, quam
reperit eruditiss. D. Hermes le Clerc M. Meruie-
sis, qui eidem plantam aridam impertuit.



Chamelæa
Cortusi.

Chamelæa
Cortusi.

Chamelæa
Cortusi.

Chamelæa
Cortusi.

Chamelæa
Cortusi.

Chamelæa
Cortusi.

Chamelæa
Cortusi.

Chamelæa
Cortusi.

Chamelæa
Cortusi.

Chamelæa
Cortusi.

Chamelæa
Cortusi.

Chamelæa
Cortusi.

Chamelæa
Cortusi.

Chamelæa
Cortusi.

Chamelæa
Cortusi.

Chamelæa
Cortusi.

Chamelæa
Cortusi.

Chamelæa
Cortusi.

Chamelæa
Cortusi.

Chamelæa
Cortusi.

Chamelæa
Cortusi.

Chamelæa
Cortusi.

Chamelæa
Cortusi.

Chamelæa
Cortusi.

Chamelæa
Cortusi.

Chamelæa
Cortusi.

Chamelæa
Cortusi.

Chamelæa
Cortusi.

Chamelæa
Cortusi.

Chamelæa
Cortusi.

Chamelæa
Cortusi.

Chamelæa
Cortusi.

Chamelæa
Cortusi.

Chamelæa
Cortusi.

Chamelæa
Cortusi.

Chamelæa
Cortusi.

Chamelæa
Cortusi.

Chamelæa
Cortusi.

Chamelæa
Cortusi.

Chamelæa
Cortusi.

Chamelæa
Cortusi.

Chamelæa
Cortusi.

Chamelæa
Cortusi.

Chamelæa
Cortusi.

Chamelæa
Cortusi.

Chamelæa
Cortusi.

Chamelæa
Cortusi.

Chamelæa
Cortusi.

Chamelæa
Cortusi.

Chamelæa
Cortusi.

Chamelæa
Cortusi.

Chamelæa
Cortusi.

Chamelæa
Cortusi.

Chamelæa
Cortusi.

Chamelæa
Cortusi.

Chamelæa
Cortusi.

Chamelæa
Cortusi.

Chamelæa
Cortusi.

Chamelæa
Cortusi.

Chamelæa
Cortusi.

Chamelæa
Cortusi.

Chamelæa
Cortusi.

Chamelæa
Cortusi.

Chamelæa
Cortusi.

Chamelæa
Cortusi.

Chamelæa
Cortusi.

Chamelæa
Cortusi.

Chamelæa
Cortusi.

Chamelæa
Cortusi.

Chamelæa
Cortusi.

Chamelæa
Cortusi.

Chamelæa
Cortusi.

Chamelæa
Cortusi.

Chamelæa
Cortusi.

Chamelæa
Cortusi.

Chamelæa
Cortusi.

Chamelæa
Cortusi.

Chamelæa
Cortusi.

[illegible]

Non placet Camer. in epit. Mathiol. & hist. Germ. planè diuersam ponere figuram, nèpe chamelæz tricocci [de qua præced. cap.] ibi tamen scribit chamelæz ibi uenit aliud à Tricocco genus, multè mollioribus foliis & cinereis, flore purpureo, semine simplici abundare in Sicilia & propterea vocari Siciliam chamelæzam: se quoque inuenisse propè Neapolim, non esse ita commodè vsus Tricoccos. Perquirant studiosi an Camer. eandem quam nos intelligat.

C. Bauh. Nec probatur nobis Cāsp. Bauhin. opinio existimantis Chamelēam Matthioli. eandem esse cum Tricocco, nec quod in suo adaucto Matthiolo exhibet iconem falsam Taber. vt specialius de eum cap. de chameleza tricocco.

Hist. Lugd. hanc nostram proponit titulo chamelæ. Alpinq; incanz Peng: habet etiam eodem capiconem priorem Charitæ Matthiol. quam & Lonic. posuit pro sua chamelæ, adiuncta descriptione Laurenti fol. deciduo, quam & ineptè confundit cum Thymelæa, ut suo loco copiosius demonstratur. Eodem errore implicatus exspicit Lacina, quamvis ubique notissimam dicat, sibi tamen incognitam fuisse satis patet, cum non doceat, quam intelligat plantam. Nam quod Pimper montanum dici ait, ex aliis habuit.

Denique & Portam Neapol. hanc nostram in-
selleuisse putamus. cum sit: Albiflorę plantę ad
pituitam valent, Chamae & Thymelaea cognata
sunt & figura: nam & Chamaeleon aliterius

Species pallent flores & lagenulis argenteis phleg-
matis viui decuendi recondit.

MEZERBON ARABYM.

Aliquoties Mezerei Arabum menuo incidit,
sed obiter tantum & per accidens: Nunc qui
huiusmodi Autores ex professo de eo tradant vi-
dendum.

Auicē. Mezerēon est *Lactucium magnum*, id-
que duūm generum. Vnum, magna folia habet
& subulta: [aut angusta, aut tenuia.] Alterum
foliis exiguis, sed spissis, quod posterius daterius
est priore: nigrum est & pernitiosum. Melius
Mezerēon est, in quo plerima folia exigua. Possi-
nz notz in quo crispa. Sed quando malitia Ab-
nezerēon frangitur cum resolutione. Calidum est
& siccum, ordine quarto. Mundificat, excoriat, &
potenter adurit &c: in viribus. Nigrum Mezerēon
fethale est.

Mezereon auctore Mesue, Persis *Viram variens* dicitur, alius *Paciens viduus*, multis *Leo terre*, planta est Lactariarum maxima, caule cubitali, foliis Oliue, sed maioribus, fructu nigro: Myrtarum magnitudine: eaque multiplex. Vna foliis magnis, tenuibus: Altera, foliis quidem parvis Oliue modo, sed multo spissioribus: Alia foliis crispis, asperis. Ex his item quędam foliis virentibus, alia nigricantibus, colorem pavonis referentibus. Præstantior quę foliis est magnis, tenuibus virentibus, in loco libero nata, prope alas, speciei eiusdem. Quę verò sola (fortè spontanea.) in magno agri ambitu occurrunt, parua sola est: vt etiam quę prope thermas, & quę foliis est parvis & spissis item quę nigricantibus. Calida est ac fœdissime in ordine quarto potius quàm tertio, vt finis Zedæ censuit. Vis enim inest valenter actis, ignea, lætans, mordens, inflammans.

Apud Serapata legimus? Mezereum, id est, chamelæa Dioscor. & Gal. Bedegoras ait proprietas eius esse, purgare melancholicam & aquam eternam, quemadmodum faciunt species Lactiæminum, (Tithymallorum.) Liber venenarium habet, pondus drach. minus occidere deficcando humorem hepatis. Paulo verò Mezereum nigrum purgare aquam & album similiter & educit acari- des: melius est nigro &c. Dixit Cuzenu siccum esse in quarto gradu & scire Hydropysin. Alii Melui quoque duas species dicunt: vnam folio grandi: aliam folio paruo sed crasso & rugoso, quam eandem deteriorem ait: eam verò cuius folia sunt grandia, meliorem, non intelligi vult vtrumque foliorum genus ex vnaquodamque arbore colligi, sed ex diuersis speciebus. Reliqua in viribus. *Hac ille.*

Ita habes tanē obscuritatem magnam, non sine barbarie, quam vepotuius, re inuiolata, nonnihil absterimus. Dicat nobis nunc egregius quidam & festivus Botanicus, quēnam sint hæc species Mezereii

Manardus in annotat. in Mef. Mezercōn, in-
quit, est absque dubio chamelza Dioscor. A Me-
luz autē describitur Thymelæa: quum Meluz scri-
bit, folia eius sunt similia foliis Olivæ sed maiora;
est error manifestus. De Thymelæa siquidem scri-
bit Dioscor. angustiora: licet Mef. voluisse visus
sit describere Thymelæam, tamen per verba, spe-
cies sunt plures, putat videtur Mezercō esse ge-
neratim Thymelæam & Chamelzā, quod mi-
rabilissimum, ad alium signum Chamelzā

Chromogenic
can be
used as
test.

LaTeX 2.09
 2000.7.24.0000

Tempera-
mentum.
Macered
nigrum.
Fit. no. 20
piens
Vodna: fa-
cien
Lactariu
ma. 1000.
Fret:
Nigricant.
Del. Qu.

Quelques

Figure 1

Chemistry
Dr. J. C.

At the top
page.

ATTORNEY
GENERAL.

*Chamelza
Thymelza
Laureola
vulgo Da-
phnoides
Mesuei, co-
fusae
Pandelzar.*

*Fuchf. ex
Leonice-
bes.*

*Chamelza
ex Thymel-
za
vulgo la-
ureola
vulgo la-
ureola
vulgo la-
ureola*

*Garrent
arguitur.*

*Mezereon
maius pla-
ta
vulgo la-
ureola
vulgo la-
ureola*

*Mezereon
Luminaris
maius
vulgo la-
ureola
vulgo la-
ureola
vulgo la-
ureola*

*Cocculus
vulgo la-
ureola
vulgo la-
ureola
vulgo la-
ureola
vulgo la-
ureola*

*Arabum
vulgo la-
ureola
vulgo la-
ureola
vulgo la-
ureola
vulgo la-
ureola*

ta : quem errorem & Auicenna commisit in 4. & 5. quatenus in 2. maxime .bi vires enumerat.

Monachi in Mes. Arabibus [aiunt] Mezereon modò videtur Chamelza, modò Thymelza, modò Laureola vulgò dicta, id est, Daphnoides, & aliud diuersum ab istis. Serap. per Mezereonem non intelligit Laureolam : quippe ea non lactescit, vt Arabum Mezereon. Et licet Mesue confuse Mezereonis plures describat species, nulla tamen ipsarum potest esse Laureola, vt Pandectarius & alii volunt: ea lacte caret. Arabes prædicti omnes cum ceteris Mezereon in numero Lactuciorum ponunt, quod quidem à Diosc. de Chamelza & Thymelza mispamè scribitur: licet Fuchf. Leoniceum secutus dixerit Serap. non scripsisse Mezereon lacte fluere. Dixit enim id ex auctoritate Bedigoras, & cap. de Thymalis, & breuiari cap. 16. & 24. Iidem folia maiora eius quàm Melastere præfert, longiora interpretantur: & addunt: pluries collegimus Chamelzam & Thymelzam, & obseruauimus non carere lacte, quamuis paucum habeant. Thymelza tamen lacte magis abundat, potissimum in ramulis: aliquando in folis non videtur.

Lacuna tradit Med eos Arabes Chamelzam & Thymelzam vocare Mezereon, hœque confuse diuidere in album & nigrum: hanc enim diuisionem nequaquam competere Chamelzæ & Thymelzæ, sed soli Chameleonti.

Gonius in Definit. Medicis xxi. Offic. Mezereon appellare scribit, verum non demonstrat, quam plantam intelligat: si vulgarem intelligit, nempe Laureolam folio deciduo, duplicet citat: quæ ppe hæc nec Chamelza est, neque Mezereon. Sed quid? Cælius Arabes [infit] Mezereon vocat omnes hæc plantas, scilicet Chamelzam, Thymelzam, & amplius ipsam Daphnoidem, & fortè Cneorum.

Ic. Manlius in Luminari maiori supra Hieram Henricis scribit: Mezereon s. f. semine plius, [apud Brunfels. T. 2. pag. 185. male legitur Semen Allii] quod appellatur Cocculus Gnidius. Diosc. Chamelza, non est semen Laureolæ, vt dicit circa instans, cap. de Laureola. Alexander cap. de Hydropy Chamelzæ dicit, ex qua colligitur Cocculus Gnidium, esse lactucinum folio Oliuæ, vt est: & propterea multus dicitur Oliuella. Item supra Confectio de Mezereon ex sua inuentione, scribit: Confectio apud nos in vfu est: Mesaliæ hæbet similitudinem: Almezereon vel Mezereon est Chamelza vel Cocculus Gnidius: Auic. c. 4. sen. 6. videtur distinguere: Mesue est planta vocata apud Perlas. Rapiens vitam &c. Christoph. de Honestis errauit, dicens, confectio de Almezereon esse de Laureola. Idem supra Oleum de Mezereon: Mezereon, inquit, est Chamelza Diosc. Quid multis? curam hanc & discordem barbariem inuexit profectò bene fundatæ medicinæ, & potissimum stirpium omnique materiæ medicæ ignorantissima schola Arabica, quæ vnam non & hoc nostro seculo adhuc duraret, cum magno vitæ hominum periculo. Nimirum hic Manlius existimans aut Pharmacopœicæ lucem se restituisse, namque [nam ided opus suum Luminare maius vocauit] eam ita perplexam & confusam suis ineptis coniecturis & scriptis reddidit, vt potius Barbaræ tenebræ, quàm Luminare magnum sit vocanda. Mezereonis folia & Oleum in sua confectioe imponi per os exhibenda, cui vel dictu exumescenda fastidiendaque ex Mesue nomina attribuit, & Lactuciniam plantam esse concedit, totum cœco & periculoso errore nihilominus

vult esse Chamelzæ Dioscor. quum apud hunc nulla lactis fiat mentio. Et quoniam alios carpit, qui volebant esse Laureolam, ipsum demonstrare par erat, quam intelligeret plantam per Mezereon, quo utebatur.

Ex Fr. Alexand. quoque radiato Apolline non possumus intelligere quam plantam existimet pro Mezereone imponendam in Hiera Hermetis & Pilulis, licet de Mezereone multa scripta tet, vt in præcedentibus dictum: nimirum noluit cum prædantis quàm scientis aut docentis munus subire, quando tam sollicitè, tam cautè & oppidè circumspicere, cœu Apollinis edicto, promulgar: ei qui omnis inficitæ & calumniæ occasione refugit, ac ægri salutem oportune uenit cogitat, maturo vtendum esse iudicio. Dictam puta. Id nos antea latebat.

Altomar. de Medend. morbis cap. 91. mirabiliter extollit ac prædicat suas Pilulas de Mezereon, quæ vt ait. serolos purgant humores citra aliquod nocumentum notatu dignum, seque iis intercuti laborantes perfectè curasse: confici autem ex foliis plantæ, quam communiter Seplesiarii Mezereon appellant, & propriè eius quam Diosc. chamelzæ nuncupat, &c. Verum insignis Medicus Altomarus nobis valdè imprudenter hic de Mezereon scribere videtur. Mezereon communis vltus Seplesiarius, quantum obseruare possumus ex plurimis Autoribus, & Herbariis doctissimis, est Laureola folio deciduo, hanc si per Mezereonem intelligit, grauitè errat, dum Chamelzæ putat: si intelligit aliam, decuisset sanè tantum virum in tam generoso medicamento graphicè designare quam plantam per Chamelzæ intelligat, quod nomen non inuis dubium est, & vagum apud Autores quàm Mezerei: variæ enim plantæ eo donantur. Qui Neapoli degunt Medici & Pharmacopœi rem gratam & nobis & posteris facient, si doceant, qualis herbæ Mezerei loco apud eos sit vltus. Sic & ab Antidot. sine Dispensario Italico à Clus. Latinitati donato non doctiores redimus, dum tantum dicit: Mezereon aut Diosc. Thymelza, quo nomine aliqui etiam chamelzæ completuntur, vtrique nota: cetera quæ addit, sunt ex Diosc.

Nec probamus Schvvenck. in suo Thesaur. Pharmacopœico scribentem Mezereonem esse Chamelzæ Diosc. & Oleastellum: nec iudicare possumus, quam plantam intelligat, atque adeo nec ipsum quidem scuisse facile patet ex eo, quod prius de Laureola folio perpetuo dicit: Laureolam, s. d. d. Dioscor. Chamelza Germ. Pharmacopœorum. Quam igitur plantam assumet imponendam Pilulis de Mezereon ex Mesue? cuius descriptionem ipse Schvvenckfeldius ponit lib. 1. cap. 10.

Thibaut. lib. 1. c. 19. de Comp. meminit Pilularum Mesuz ex Chamelza, quam Mezereon ipse vocat, in suo Gradadin: verum nec in docet, quam plantam intelligat. Nec Foesius, in sua Pharmacop. quicquam docet scribens: Rec. foliorum Mezerei aut Thymelzæ: quasi verò hæc duo sint vnum, aut earumdem prorsus virum.

Brassauol. in Exam. catapotiorum pro Mezereon censet sumendam Thymelzæ, minime verò Laureolam: in Exam. herbarum scripserat: Nonnullos Mezereon & Laureolam confundere, Laureolam lacte carere, Mezereon eo abundare, vt Arabes imponunt: eosdem vno cap. confundere Chamelzæ & Thymelzæ: iubet suum senem Pharmacopœum ex monte [fortè vbi Fertariensis prætorio] colligere Chamelzæ folia: Thymelzæ

Apolline

*Salutare
Apolline
confitemur*

*Medic.
Philo de
Medicis*

*Abundant
hæc*

*Mezereon
Neapoli
na quæ
Antidot. 1.
c. 10.*

*Mezereon
Pharmacopœico*

*Alia conf.
de Mezerei*

*Thibaut.
ex Foesio
accipit*

lex autem folia & semina condere: interea non docet quas plantas intelligat: quinimò nec quam Laureolam putet, declarat, quam ante scripserat malè à D. Florentino in Mes. commentanti esse Mezereon.

Cordus, diligentissimus alioqui Scriptor quæ planta Mezerei nomine intelligenda imponendaue sit, non monet.

Fuchf. de comp. med. Pilulas dictas vocat catapotia ex Thymelæa lo. Damasceni. Annotans, Arabes Mezereonis appellatione Thymelæam & Chamelæam confundere. Thymelæam paucis agnoscere, cuius semen esse Coccum Gnidium, pro eo tamen officinas fructu seu semine Daphnoidis uti, quod Sepalsariis Laureola nuncupetur, eam quæ fol. deciduo est intelligit, ac eius etiâ foliis Germ. officinas uti. Audi mus hæc quidem. At his non docemur quid iniciendum in pilulis pro Mezereone: nec etiam, ut prius monuimus, Daphnoide consuemus quam ille putat.

Et, siquidem Adblph. Oeconis institutum, ut ipse ait, fuit, docere, quomodo turè parari debeant compositiones medicamentorum, ecur non declaravit suis Augustanis quam plantam pro Mezereone sumere debeant?

Apud Cronenburg. de comp. med. multa dicuntur de Mezereone, ut ostensum cap. de Laureola fol. deciduo: inter alia dicit, eleganter depingi à Trago vulgarem Mezereonem, [quam alii Chamelæam, alii Thymelæam volunt] sed an ea ipsa, vel qualis imponenda sit, ne verbulo quidem insinuat. Weckerus pro Mezereone scribit Thymelæa: quod nomen cum æquè ambiguum sit apud Autores ac illud, quam velit nemo intelligat.

Ex dictis apparet incertus, temerarius, & periculosus usus Pilularum de Mezereone. Monemus igitur iuniores, & seniores Medicos, [quibus hominum vita in manu est,] eos præsertim quibus exacta stirpium, & potissimum eiusmodi periculorum cognitio non est, [ut sanè paucis est,] ut abstineant ab his Pilulis & similibus medicamentis compositionibusque, quæ recipiunt simplicia pharmaca, ipsis incognita, donec perspecta & probè cognita habeant ea, quæ Pharmacopœi iniiciunt, ne horum vel sua etiam graui ignorantia miseris ægris venena exhibeant pro medicina: & dum sperant ægros, adferant ægros: quod [chæu] nimis crebrò euenit, uti nos multoties sumus experti euenisse medicis, alioqui non indoctis, sed impensis botanicis, ut suâ negligentia & imprudentia, in præscribendis iis, quæ ne minimo quidem cognita habeant, cum ingenti infamia decepti, deceperint, ac etiam in funesta pericula coniacerint alios.

Speciatim, ut ingenuè fateamur, Pilulæ de Mezereone non placent, ob adstringentia admixta, quimòs est Arabum pro correctione actium, violentum & malignorum purgantiumque nostro iudicio contra rationem, atque adeò cæco & periculoso errore. Quod si cui tamen libeat his uti, præferimus potius lubricantibus quàm adstringentibus emendanda esse, probè gnari, quò citius & corpore exeant, eò minus nocitura, quò diutius hæreant [nam moram sanè adstringentia faciunt] eò periculosiorem futuram vacationem similis ac lationem. Aut si quis etiam Altomari experientia tantum tribuens iis uti velit: saltem prius certior fiat quo Mezereone vel Chamelæa is sit usus, sed eo modo curet præparandam, quo ille præparauit: vel utatur Chamelæa tricoeco Monspeliensi, consideratis iis quæ superiori cap. ex Lob. anno-

tauius, qualis eius succi inspissati usus sit apud Monspelienses. Caueant interim à Mesue Viram sapiente, viduas faciente, & Leone terra, quod nunc semel monuisse sit satis.

Cæterum Mezereonis nomine, uti dictum, plures plantæ obtruduntur: in primis Laureola sepetirens & folio deciduo, de quibus paulò antè. Chamelæa tricoeco, ac etiam alia plantæ pro Thymelæa vel Chamelæa. Quinetiam Lathyrus posset dici Mezereon, quum dicitur Lathyrus maximum. Talis enim illa est. Chamelæon niger & albus, ut dicebamus, confunduntur cum Thymelæa & chamelæa. Bene igitur nostro iudicio Camer. apud Matthiolum in lust Germ. ait: non facile licet colligere, quid Mezereon sit apud Mes. iuxta Græcos medicos, quia dicit habere lac, quod non reperitur nec in chamelæa, nec in Thymelæa, nec in Daphnoide nostrate.

THYMELÆA.

CAP. XLIII.

Veterum placita de Thymelæa & Cocco Gnidio, & quædam in genere præmittamus, antequam de Thymelæa Monspeliata specialius tradamus.

Thymelæam, autore Dioscor. alii Chamelæam, alii *πυρραχνη*, alii *αλνισ* [sic cod. Bas. habet: Hermol. fretus aut. Hipp. & Gal. & cod. ver. legit *αλνισ*] aut Cneoron vocant. Ex hoc granum Gnidium, quod semen ipsius est, colligitur. Hoc Eubœenses *Αιθιον* [sic cod. Bas. Corn. Apollinon vertit.] vocant, alii Linum, eò quòd satiuo Lino [*αυραχνη*] fructus natura similis sit. Virgæ edit speciosas, numerosas, [Vet. addit *αυραχνη*, tenues.] bicubitales: foliis chamelææ, sed angustioribus & pinguioribus quæ inter mandendū quadantenus viscosa & glutinosa percipiuntur: floribus candidis: ac inter ipsos fructus, ceu Myrti paruo, rotundo, inter initia quidem viridi, tandem verò rubente: cuius inuolutum durum ac nigrum est, medulla autem alba.

Et mox sub finem cap. addit: Nascitur in montosis & asperis. Fallitur qui Granum Gnidium fructum esse putent, per foliorum similitudinem decepti.

Gal. in gloss. *αυραχνη* exponit *αυραχνη*. Plin. quoque Cnestron legit: sic enim habet: in principio cap. 21. lib. 12. Et in quo nascitur granum Gnidium, quod aliqui Linum vocant. Fruticem verò Thymelæam, alii chamelæam, alii Pyros achnen, alii Cnestron, alii Cneoron. Est similis Oleastro, foliis angustioribus, gummosis si mordeantur, Myrti magnitudine, semine, colore, & specie factis, (foris. Vet.) ad medicinæ tantum usum.

Hermol. quoque Cnestron legi vult. & foris pro farris. Liparonis herbe meminit Aetius, ex Alexandria sic vocante, quam aliqui Cnestron, inquit, nominant, ad vlcera capitis manantia vehementer utilis. Nec indicat is autor, qualis ea sit, utrumque à Thymelæa siue Cneoro diderit an eandem putant.

Recentiores, ut pleraque omnia, chamelæam cum Thymelæa, & utramque cum Daphnoide turpiter confundunt. Theophrast. [inquit Marcell.] Cneoron Thymelæam vocauit, furculosi generis herbam & carnosæ foliis: quæ in Dioscor. conicienda magis quàm manifestè intelligenda, siquidem virgasineæ dixit, & Lino comparauit, & folia pinguis gummosaque descripsit: Quod totum

Acquiuoca
Laureola
foliis perpe-
tuo & de-
ciduo.

Quid Me-
zereon sit
adhuc no-
scitur.

Chamelæa
Diosc. cor-
rect.
Pyrosachne
Cnestron.
Cneoron.

Folia.

Flores.
Fructus.
seu granum
Gnidium.

Cnestron
& Cneoron
Gal.
Thymelæa
Plin.

Plin. emend.
& Hermol.

Liparonis
Herba.
Aetius.

Recentio-
rum error.
Cneoron
Marcell.
Thymelæa.

Terram
Gnidium.

Fuchf. ar-
guit.
Otero sagall.

Cronenb.
rephor.

Periculo-
sus usus
Pilularum
de Mezere-
one.

Autores
plantæ im-
probant
Pilulas de
Mezereone.
Arabum
causa ex
periculoso
errore.
Correctio
Mezerei
ex mali-
gnorum
medicamentis
secundum
autores.

*Cnidium
granum
Theoph.*

*Pyrosachne
Gale.
Diosc.*

*Thymelæa
Gale.*

*Pauli
opina.
Sel. parus
Marcell.*

*Plin. m. 27
corred.*

*Oliuella.
Lec. terra.
Lignu. filu.*

*Mezerion
Mef.*

*Vires & v.
fuit.
Purgat.*

Sudorifi. u.

*Cucuron
Diosc.*

*Præpara-
tio.*

*Pastilli.
Nona.*

Plin. ex Theoph. acceptum eodem loco retulit, si-
milem Oleastro Thymelæam faciens. Theoph. l. 9.
Cnidium granum vocauit, & hæc nominum di-
uerſitas in Theoph. Thymelæa est. Quibus addi-
derunt alii alia, vocaruntque Pyrosachne ab u-
rendi vi, quam habet: nec aliud Pyrosachne
compositum ex igne & tenui stipula nomen in-
dicat, quam quod egēgiē vrit. Chamelæa eadem
dicta fuit, quoniam vt Plin. ait, Oleastro similis
sit. Cnestron postremo eandem hanc Thyme-
læam vocarunt Hip. Gal. & plerique alii. Nobis
tamen ignota eius vocis origo & causa. Sed quan-
do Dioscor. Thymelæam *λίαν σπέρτω* comparat,
quæ eodem Linone satino simpliciter, an fuculo
scutici, quem Sparton omnes vocant Nobis
in hanc partem inclinat animus, etsi aliorum In-
terpretum modo & nos satium Linum verterim-
us: Genistæ enim similior, quam Lino, ex hi-
storia deſc. tioneque eius videri potest. Vniuer-
ſæ plantæ nomen factu n videtur ab Olea cui si-
milis est, & à Thymo herba, cuius habet flores.

Idem Marcell. addit: Præterea quæ in Dioscor.
leguntur, Paulus radicem eius contra sangui-
nis profluvium commendauit, sapore acer-
bo: eique multo prodesse potam & foris unpoſi-
tam. Sed ubi nam Paulus hoc ait: quod si fecit,
confundit sine cum Thymelæa aliam plantam a-
liqua n: quis rationis compos credat plantam
Dioscoridi vrentem, purgantem, stomacho in-
commodam; vel noxiam, vt vertit Marcell. uti-
lem contra sanguinis profluvia. Imò ipſemet
Paul. lib. 7. Cocco Cnidio fructui Thymelææ tri-
buit facultatem vrentem & purgantem: & eo-
dem libro puds de Thymelæa tradens, ei non tri-
buit eius nodi vim, imò dicit similem grano Cni-
dio, vt apparet ex verbis nobis citatis de Grano
Cnidio. Neq; iudiendus Plin. qui Cocco Cnidio
alium listendi vim tribuit, nisi fortè mendam
ſubiſit, legendumque ſit ex Vet. Cod. quod ſcit
Dalech. alium ciendi.

Herbarii, inquit Ruell. Thymelæam nunc O-
liuellam, vt Chamelæam, nunc Leonem terræ,
aut Linum ſilueſt. granum vocant Cnidium, vel
Coccoh. Sed docere debuit Ruell. quam plantam
per Oliuellam intelligat. Ruellum ſequitur Ta-
gautius. Syluio Mezerion Mef. Thymelæa est,
vt ante dictum e. de Chamelæa. Sed Mef. nomi-
ne Mezerion cum Anic. comprehendere videtur &
alias plantæ.

Thymelææ ſemen, Anthore Dioſcoride, bi-
lem, pituitam, aquasque detrahit, ſi viginti gra-
norum pars hæc interna bibatur: verum fauces
adurit: atque idèd cum farina polentæve, aut in
vux acino dari debet, aut cocto mellè obducta
deuorari. Quibus autem ægrè ſudores eliciun-
tur, eadem trita cum nitro & aceto inungitur. At
ſolæ, quæ peculiariter Cnestron appellantur, per
melles colligi debent, & ſiccata in vmbra recon-
di. Sed ſi cui exhibere placet, prius ea tundere, ac
ipſorum quoque ſibras eximere conuenit. Vino
diluto inperſa, acetabuli modo aquoſa detra-
hunt: ſed moderatius purgant, admiſta lenti co-
ctæ, & contritis oleribus. Eadem trita vux æterbæ
ſucco excipiuntur, & in paſtillos coacta reponi-
tur. Herba ſtomacho infeſta: partus ſubdita necat.

COCCOS SEV GRANVM GNIDIVM.

K *κόνιον κόκκον*, quod eſt granum Cnidium
Theoph. rotundum eſt, colore rubrum, ma-
nus Pipere, ſed multo validiore caliditate. Quare

in potu dantes, [exhibent verò ad alui ſolutio-
nem, *κόνιον κόκκον*: Gaza Plin. vulgati codici
periculoſum potiùs errorem ſecutus, quam Theo-
phr. lectionem, niſi fortè ea corrupta fuerit, con-
uerſit: dari enim contra alui ſolutionem ſolet.]
in pane aut farina ſubacta obductum exhibent:
nam alioqui ſucces adurit. Ex quo & Plin. tranſ-
ſcripſit: Cocco Cnidio color cocci, magnitudo
grano Piperis maior, vis ardens. Itaque in pane
deuoratur, ne adurat cum gulam tranſit. Hæc
vis præſentanea contra Cicutam. Siſtit [ciet. Vet.]
aluum. Dalech. ſcribit Plinium ſedè lapſum, quod
de ipſo Plinio dicere non poſſumus, quandoqui-
dem in Vet. Cod. Plinii legitur ciet, vt ipſemet
Dalech. annotat: id ſcribendum erat aduerſus Ga-
zam. Qui fieri poteſt, inquit Caſſalpin. vt quod
vehementer ſoluit, aluum liſtat?

Galeno quoque *κόνιον κόκκον* purgat, ſacul-
tatique eſt acris & cauſtica. Et Paulo, Thymelæa
ex qua granum cnidium eſt, ſimilem ipſi [grano]
vim habet. Et poſtea: coccus cnidius, fructus
eſt Thymelææ, non chamelææ, velut quidam pu-
tarunt: èkque acris ac vrentis facultatis. Potum
autem aquam deorſum purgat.

Euchar. Roſſlin more ſuo variarum plantarum
nomina confundens, hæc habet: *Fellere balſæ:
zeiland: Coccognidium: Coccum Gnidium:
Thymelæa: Daſynoides, Grana Gnidia: Mezerion:
Laureola.* Pingit tamen Laureolam flore deciduo,
iub titulo *Fellere balſæ*.

Geln. in ſuo libello de herbis Lunariis: Mi-
ror, inquit, quæ granum Gnidium gignit, igno-
raſſe Pnium. An ignorant Plin. vel non cogno-
uerit Plin. Thymelæam, iudicium ſuſpenſum te-
nemus. Illud ſcimus, ſatis manifeſtè apud eum
legi, fruticem, ex quo Granum Gnidium gigni-
tur, appellari Thymelæam, quam etiam ſub cha-
melæa tradit. Rob Conſt. apud Amatium: cocci
nomine, inquit, apud Græcos, res duæ admodum
diuerſæ ſignificantur. Nam vt Author Galen. in
Hipp. *κόνιον* ſine adiectione vocant Granum Gni-
dium, ſive Cnidium, & Granum infeſtorium.
Tamen & ſeparatis diſtinctisque nominibus eſſe-
runtur. Si quidem Gal. apud ipſum Hip. *κόνιον* ex
Dioſc. [apud quem tamen hanc vocem nondum
legimus] exponit Coccum Gnidium: Et per *κόνιον*
apud hunc ipſum Scriptorem, idem Gal. in-
telligit commune granum, hoc eſt, tinctorium. I-
dem in Lex. *κόνιον* apud Hip. Granum Cnidium,
κόνιον κόκκον Dioſc. & *κόνιον*, fructus Thyme-
lææ: Coccus Gnidius Plin. Item *κόνιον* apud Hipp.
Granum Gnidium.

Cæterum Cocci Cnidii nomine, variarum ſi-
pium fructus exhibentur, vt ab Antiquis fiebat,
qui fructum Chamelææ malè pro Thymelæa per-
hibebant, quod hoc & præced. cap. ex Dioſc. an-
notatum. Thymelææ autem fructum ita dici, pa-
tet etiam ex hoc & præced. capite: & capite cha-
melææ tricocco, & de Thymelæa ſubtus inſerua.
Quoſdam etiam exſtimare coccon Gnidium col-
ligendum eſſe ex frutice Laureola folio deciduo,
videre eſt ante cap. proprio. Trago & Dod. *κόνιον*
Theophr. eſt Tithymalus paralius, de quo alibi.
Anguillaræ verò eſt *Peplis*. Apuleio coccos cni-
dios eſt *Lathyrus*, aliis *Chamelæa*. Humelb. in
Annot. ad Apul. Lathyrus, inquit, videtur eſſe,
quæ nunc Cataputia minor. Coccus Gnidios ex
Thymelæa propriè eſt: huc adcreuit iſta appel-
latio, quæ cauſa fuit, vt Chamelæa diceretur.
Trag. & Dod. tribuit quoque chamelææ nigro
nomenclaturam cnidii cocci, de quo ſuo loco.

*Vulgari
codici
Plin. & Ga-
za pericu-
loſus error.*

*Plin. ciet
ſat. contra
Dalech.*

Temper.

*Euchar.
Roſſlin quæ
ſeruat.*

Plin. m. 27

*Cocci cum
bignoniæ.
Coccos ſim-
pliciter.
Granum
infeſtorium.
Coccos.*

Coccos:

*Aequivoca
Chamelææ*

*Laureola
folio deci-
duo.
Tithyma-
lus.
Peplis &
Lathyrus.*

*Chamelæa
nigra.*

THY.

rum fellerphale, & aliis suam opinionem de Daphnoide relinquere, cum eo non convenire. Sed facile imperitiam suam in re herbaria prodit, quando iconem Matthioli, quæ nihil habet cum fellerphale siue Laureola folio deciduo commune, etiam pari ineptiâ ponit sub nomine Seidelbacht assumpta Chamelææ Matthioli iconem.

Gesner, ut supra dicebamus, miratur Thymelæam suffruticem, qui granum Gnidium gignit, quâque in Gallia vidisse ait, & in Italia nasci, ignorasse Plinium.

Dodonæus Thymelææ fructum similem dicit spinoso albo, ubi maturuerit, rubro; & in eo granum album obductum pellicula nigra, serpidum & vrens linguam: hanc stirpem non amittere folia, sed semperverentem remanere: granâ eius xixix videtur Officinæ cognita esse. Hæc in Hist. Gallica. In Lit. addit, Theophrastus xixix a Thymelæa differre, nisi nigrum Cneoron Thymelæa sit.

Pena & Lob. cognatæ figuræ & naturæ dicunt Chamelæam & Thymelæam, quam dictam æstimant quasi Thymelæam, id est, Thymali & Oleæ mixtâ facie: Corticose describunt amictu, tenaci, cinereo, à summo ad imum deglubenti sequaci, instar Laureolæ corticis: granâ Antiquis Gnidia vocata, novena aut dena, primum viridis, deinde ex flavo rubentia, tenella cuticula, succo aqueo turgida, vnum gygartum amittente.

Perperam edoctus [addit idem] cum Pharmacopæorum plebe Commentator [Matth.] qui hanc non noverat. Mezerei Germanici granum serpidum multò & planè crustas intrens, tum foris, tum intus foliis, quâ solet fiducia, singulatâ tum Dioscori tum Recentiorum omnium Doctôrum sententiâ temerè obtulit. Nam non cocum ipsum rubrum dat, aut purgare asserit, cui vni [albam] nuncupat, vim deliciendi attribuit, & abundè explicat, ut ex eius verbis liquet. Vnde nec ipsas plantas, nisi superba animi inductione à Senensi insertas, & codicis Dioscoridei, nulla nisi triviali lectione, cuius tamen admodum accuratum vindicem se fore voluit videri initio, asseritas, magno multorum detrimento, qui illius freti commentis ad Hydropem sunt vsi, rati esse Dioscori veras Thymelæas, Chamelæas, Daphnoides, & Chamædaphnes, quarum nullam nec legendo quidem, nedum facie, vel viribus cognitam habuisse tantum hiatorem Senensem, cuilibet vel Pharmacopæo iam liquet.

Clus. huic omnia prisca nomina, quæ apud Veteres leguntur attribuit, eandem sine dubio cum Veterum Thymelæa faciens, quod vtemerè negare nolumus, ita etiam pro indubitato habere nondum ausimus. Casp. Bauh. existimat chamelæam Anguillær eandem esse cum ea de qua hoc loco agimus: quod nec ipsum adhuc pro certo asserere velimus: ait enim folia inferâ parte alba, quod non observatur in Thymelæa Monspeliâna: fortè melius responderet illius Thymelææ.

Irradiemur pârumpet Apollineis P. Alexandri radiis. Is inter alia hæc habet.

Quandoquidem Chamelæa Aphlis Græcisque cognita, suffruticem æmulatur, ramis tenaci viscidoque libro conuestiens, Oleaginis foliis exiguis, tenuibus, duriusculis, floribus candidis, in fusculorum cacumine aggestis, è quibus nigra bacculæ exteriùs, carne videlicet nudata semina Berberorum instar, Myrtorum figurâ, & rubentia continentes, radice inutili, foliis, floribus & fructu amaris, acriterque sauces vellicantibus. Thy-

melæa, è qua granum Gnidium, Chamelææ similima, hoc tantum differt quodd virgis bicubitalibus, rectis, ab vna radice multis, non fusculosis: nec fructu ab imo ad summum, ut Matth. fallitur. Folia angustioribus constat, pinguioribus, viscosisque, radice cubitali & crassa, Raphani magni instar, coruæ crasso vestita, & venenata. Granum verò Gnidium Theoph. lib. 9. cap. 22. Piper montanum appellari potest. Huc usque radiat Apoll. Verum nihilò clariùs videmus quid velit per Chamelææ duplicem plantam, quæ baccis est Thymelææ credita, [id est, nostro iudicio, Laureolæ folio deciduo] quæ montanum Piper vulgò dicitur: præterea non intelligimus, quantum ea Apollinis planta differat ab illa Thymelææ credita. Præterea si ipse veram Chamelæam tradidit, cur alterius meminit, nempe Apulorum & Græcorum, quam descripsit ex Anguill. sicut etiam Thymelæam Raphani radice, quæ fortè, ut antè dictum, eadem cum nostra Monspeliâna. Rogamus peramanter peritos Botanicos Italos, ut os ex his Labyrinthis extricent, quod erit illis facile.

Czislpin. Thymelæa folia mediâ quadam magnitudine dicit inter Oleam & Linum, & dicitur sauces exurentia. Baccas oblongas, tenuiores Myrto, flavescentes ex rubro, semine intus nigro, sed medulla candida & oleosa: radicem crassam. Dioscoridis & Plinii Thymelæam dicit, dubitatque an etiam sit Chamelæa granum Cocci ferens. Idem Coccum Gnidium vocat colore Croci. Hist. Lugd. Thymelæam [inquit] hic appropinquamus. Mezerei quidem ille [Matth.] Germanicum ponit, cuiusque semen Piper rusticum seu montanum appellatum, quàm Thymelæam veram cuiusque granum Gnidium nobis proposuit. Geminam Thymelæam descripsit Dod. & Clus. Hæc illa, quæ tres figuras habet: poterat sufficere vna.

Camer. Thymelæam folia Lini vocat.

Ceterùm præter Thymelæam Monspeliensem, Acquis de qua longa & satis cædiola hac narrationis serie agimus, aliæ sunt etiam plantæ, quæ id nomen obtinere: ut *Sanamunda glabra* exhibetur Thymelææ species, quæ sequetur. Quæ sit Thymelæa minor Cordi nondum nobis constat. Quapropter antea cap. peculiari de ea egimus, eidem capiti obscuram historiam Tragi de Thymelæa subiungentes, Chamelæam Anguillær quidam Thymelæam existimant, quod asserere non audent, ut antè dictum. Cneoron suffrutex Matth. à quibusdam Thymelææ species exhibetur ob foliorum quandam similitudinem: desinitur tamen ætimoniâ. De eâ priùs, *Tartaræ* siue *Sanamunda* prima Clus. Thymelææ congener existimatur. Item, *Sanamunda* eiusdem secunda, de quibus paulo post. Item *Sesamoides minor* Dalech. siue *Sanamunda* tertia Clus. Multi Laureolam folio deciduo malè existimant Thymelæam. Sunt qui Laureolam folio perpetuò virente eandem cum Thymelæa Tragi existimant, quod nobis non videtur.

Scribit Adolphus Ocoa supra Hieram Logad. non multum peccaturum, qui Lathyrus grana pro Thymelæa acceperit. Idem præterea dicit: pro semine Thymelææ se Laureolæ Germanicæ, quam zeiland vocant, accepturum: Thymelæam enim & Chamelæam Germanos carere.

Thymelæa non modò in Galloprovincia & toto Narbonensi littoreo tractu, sed etiam italicis montibus longiusculè à mari Tyrreno, diffunditur: videntur mons D. Iuliani, & Pisoni Lucensibus.

Lentius
femina
etiam.

Thymelæa
Dod. off.
semper
virens.

Cneoron.

Thymelæa
Gudo.

Matth. re-
preh.

Matth. de
fide inco-
gnita ser-
uit.

Chamelæa
Anguill.

Thymelæa
fere sp.
virens.

Thymelæa.

Matth. de.

Piper mon-
tanum.

Apoll. de
re repre-
sentat.

Thymelæa
Czislpin.

Chamelæa.

Matth. de.

Clus.

Clus.

Acquis.

Sanamunda.

de glabra.

Thymelæa.

minor.

Clus.

Cneoron.

suffrutex.

Tartaræ.

et.

Sanamunda.

de glabra.

Sesamoides.

minor.

Dalech.

Sanamunda.

tertia.

Clus.

Multi.

Laureola.

folio deciduo.

malè.

existimant.

Sunt qui.

Laureola.

folio perpetuò.

virente.

eandem.

cum.

Thymelæa.

Tragi.

existimant.

quod.

nobis.

non.

videtur.

Scribit.

Adolphus.

Ocoa.

supra.

Hieram.

Logad.

non.

multum.

peccaturum.

qui.

Lathyrus.

grana.

pro.

Thymelæa.

acceperit.

Idem.

præterea.

dicit:

pro.

semine.

Thymelææ.

se.

Laureolæ.

Germanicæ.

quam.

zeiland.

vocant.

accepturum.

Thymelæam.

enim.

&.

Chamelæam.

Germanos.

carere.

Thymelæa.

non.

modò.

in.

Galloprovincia.

&.

toto.

Narbonensi.

littoreo.

tractu.

sed.

etiam.

italicis.

montibus.

longiusculè.

à.

mare.

Tyrreno.

diffunditur.

videntur.

mons.

D. Iuliani.

&.

Pisoni.

Lucensibus.

diffunditur.

Tempus.

colle, ubi nunquam Chamelæam vidimus. Quin etiam in Occiduo Oceano Gallæ & Xantónica ad Rupellam insulam, *des Ratz* vocatam, id est, murium Lob. Clusper totam Hispaniam locis asperis nasci tradit. Floret Iulio, & toto nonnunquam Autumno, semineque subinde profert. Cæter. circa Neapolim ad vlnæ vnius & semis crescentem obseruauit. Talem & nos copiosè, circa Montepelium.

Vitis. & Vitis. Modus dicendi succum.

Thymelææ succus, inquit Aduers. diffunditur premittitur & elicitur quàm Chamelææ, propter glutinosum virus: nec nisi tepente affuso vino, aut consimili quopiam liquore, ut facilius dum succu Brassicæ marinz educunt, quo quilibet vti poterit, eo modo quo & de Chamelææ succo dictum est. Tunduntur tenella folia, flores, & diu, & vehementer, sepiusque tantillum tepentis vini affunditur inter tridendum: tunc prelo ligneo vehementius vrgentur, dum trans colum expiret: tunc igne lento aliquandiu bullit, dum Loch crassiciem assequatur. Demumque Soli seruido obiectum durefcit, ad luto Saccharo, ne mucescat, sicque coctum reconditur. Cortices Thymelææ ferunt pro ligandis scopis & fasciculis. Fructu maturo rubro Perdices & auculæ avidissimè vescuntur. Rustici Hispaniarum singulis annis propè infinitas auculas hoc semine curuatis virgis & quibusdam lineis dispositis venantur, testibus Amato & Clusio. Cauet Camer. ne quis radice vtatur, quia paucis horis perimat. Thymelææ vires ex Veteribus antea diximus.


Stimul. cium.

Radix. Semina.

SANAMVNDÆ GLABRA.

CAP. XLIV.

Descriptio.



Frutex quæ in tractu maritimo Narbonensi, prope Agdes oppidū collectum hoc nomine donare placuit, Lennis & obsequiosis est ramis, cortice testis flauescente, in fila Mezerei Germanici in morem ductiliber quos agminatim coniscunt folia crebra, Myrtis similia, vnciali plūs minūs longitudine, vix semunciam lata, in acumen desinentia, glabra: & quorum sinu, per integrum serè ramum flores oblongi, parui, ex luteo herbacei, quatuor foliolis decussatis constantes. Succedit granum rotundum singulare.

Flos.

Gemma.

Eadem postro iudicio videtur planta, quam inter siccas nostras inuenimus à Valerâdo Dourez: radice dodrantali, digitalis crassitudinis, foris fusca, intus candida, lenta, & Xyli instar quodammodo in fila ductili, quemadmodum cortex Mezerei Germanici, siue Laureolæ folio deciduo: infima parte in fibras crassas finditur. Superius dem in capita multa dividitur, & quorum vnoquo-

Tom. I.

que ramus exit palmatis circiter & breuior [tenellus, vt apparet, & primulum se reouant] foliis ornatus positu & formâ foliorum Sanamundæ, qualia appinguntur Alypo Matthioli, vel etiam Apia prandii prouenienti, vt à Dod. pingitur.

D: hac planta, ni multum fallimur scribit Hist. Lugd. hoc modo: Fruticem & iconem ex Hispania misit Myconus, quem Thymelææ speciem esse suspicatur: folia Myrtis: flos luteus: radix crassa: cortice à nigro rufescente, crassitudine pollicari, flexili gustu valde ingrato, cum acrimonia amaro, & fauces abradente. Totius fruticis odor grauis & sapor insuauis. In Hispaniæ Monteferrato & locis vicinis frequens, & Cataloniæ Arragoniæ finitimis. Hispani agricolæ vocant *Herba de Monteferrato*: Catalani *Brisalagiam* & *Ciegegar*.

Thymelæa specios.

Sap. Locut.

Casp. Bauhin. in Animadu. in Hist. Lugd. Thymelææ speciem dicit, & describi Myconi verbis: sed pponi aliam ex Clus. Sanamundæ primæ nomine. Nobis verò Thymelææ hæc species diuersa est à Sanamunda Clusii, idè prudenter Hist. Lugd. vtrâque posuit descriptionem & dixit, videtur: nihil temerè asserens.

Sanamundam igitur huiusmodi planè aliam plantam ab hac glabra censemus, de glabra & Matth. scripsisse suspicamur in hæc verba: Tithymalo Parasio similis planta, quæ in Hetruria vulgè appellatur *Herba mora*: cuius radicibus prius contusis, ac deinde fluminibus demetis pisces pretinus enecantur. Sed caret hæc lacteo succo: quapropter eam inter Tithymalium genera iam non esse annuerandam cognoscimus, nisi alias aliter senserimus, quod aliis notis neglectis, Lini folia viderentur & caules subrubres. Si hæc defuerit, Platyphylli radices sumant, quo vniuersa regio scatet.

C. Bauhin.

Herba mora.

Substitut.


Myconon autem, vis purgatoria ei vehemens, & quàm in Chamelæa valentior: nam drach. dimidiæ pondus potentissimè aleum soluit: ac aquas potentissimè vacuat, non sine torminibus & magno cruciatu. Datur in iure aut vino. Hoc remedio Hispani agricolæ vtuntur.

Purgandi vis Violenta.

Dosis.

TARTONRAIRE MASSIL. SANAMVNDÆ I. Clus.

CAP. XLV.



VOCANT Massilienses, apud quos vber eius prouentus, Tartonraire suffruticem quædam cubitalem, valde ramosam, radice nitentè altè actâ, crassâ quem cortex tegit, mirè obsequiosus & lētus: in minima stamina non sine floccis quos lanam dicas carptam, ductilibis, quæ etiam cortice vestiuntur rami, sed superstrato denso tomento albido, & quasi argen-

Descriptio.

Radix.

Ddd 2

Folia reo. Folia numerosissima, Myrti Tarentinae magnitudine, nisi quod per extremum sunt paulo latiora, in acumen tamen obtusius desinentia, undique lanuginosa, & tactu mollia. albida vel argentea, lucida: inter quae flores exsunt, Olez similes, ait Clus. oblongi, in quatuor foliola per extremum diuisi. colore luteo. Pili [quemadmodum ex relatu accepit] Thymelaeae ferè, sed nigricante colore.

Idem Clus. folia carnosia dicit, aliquantulum hirsuta, guinnosa, si mordeantur amara in initio, deinde actia & adurentia. Ramos cortice exteriori nigrescente obduti, alio interiori lento.

Tartoraire Lob. Quoniam verò Lob. Tartoraire separat à Sanamunda Clus. lobet eius descriptionem hic subnectere, quae eiusmodi est. Noua nollit atati iuxta aelegans aspectu fruticat: virgas edit rectas, crassiores, vicinas, tricenae, aut plures, cubito longiores, incana lanugine obsitas: foliis candidis, nitentibus. Stokulos in summo pusillos, & [si labat memoria] pallidulos ex albo, semine pullo, rotundo, Arthemisiae aut Ambrosiae. Radix prolixa pedem, simplex, cortice albicante foris, intus candida, linen aspectu & fibris dura, lignosa, gustu non admodum calida, nec amara, nec ingrata, nonnihil tamen caloris impressi postremo relinquentis, & quadantenus Turbith Alexandrinum siue vulgare referente, inodora, tota lactis expers.

Sesamoides Permulti, inquit, Hist. Lugd. opinantur Sesamoides maius esse eam herbam, quae in tota ora Massiliae & Liguria, Corsica ac Sardinia gignitur, illicque vernacula lingua *Tartoraire* appellatur. Eadem sic depingit: Fruticosa est, pede non altior, radiculis subflatis, gracilibus, tenuibus, si totam spectes plantam, superuacuis: ramis multis, rotundis, densa lanugine villosis, furculosis: foliis Ruta similibus, numerosis, hirsutis: candidis: flore in summis ramis copioso, exiguo, candido, densius congesto, intra lanuginem delitescente: semine paruo, nigro, gustu tam feruido, ut si quis herbam mandat, diuini ardere fauces videantur, tam pertinaci vredine, ut nulla oris collutione delecti possit. Minor sanè est in Chamaelea, Thymelea, Laureolaque generibus acrimonia, ac vrendi vis, quam in hac planta.

Porro quod pede non altiore dicit, pusillas tantum aut vidisse aut habuisse Hist. Lugd. Autorem oportet, nam & cubitales habemus, & eas quidem non integras. Sunt nobis & pede breuiiores, sed non tenuibus radiculis. Idem fallitur dum putat Sanamunda tertium genus Clus. de quo paulo post: nostro autem iudicio est Clusii Sanamunda prima differens à Thymelaeae specie Myconi, in quo à D.C. Bauh. dissentimus utramque plantam vnam eandemque putante.

Tartoraire Gnd. Pena & Lob. tradunt *Tartoraire* dici Galloprovinciae & Massiliensibus, ab exuperanti purgandi vi, ob eandemque causam *Miserata* Hispanici Clus. Autore est.

Sesamoides Sesamoides maius Scaligeri, ut vult Lob. de quo tamen apud Scalig. aliquid legisse non meminimus.

Nec placet icon Lob. qui non agnouit *Tartoraire* idem esse cum *Sanamunda* Clus. qui probam iconem habet, qualem & nos proponimus.


Chamaelea De hac planta aliquando scripsit Solerius haec verba: Chamaelea, Massilitanis & Betterensibus [qui Berro & Barfegne locum vocant, ubi prouenit] dicitur *Tartoraire*, id est, raris alium laticibus: Arelatensibus *Retumber*: Aquasextanis, *Herba-luarino*, Montanis *Bacchi*, haud procul à Ni-

ce & Remo Patom. Semina quoque ab insigni Medico Belgae D. Jac. Vtenhouio, cum esset in Gallia Narb. *Retumber* nomine nobis missa. Neapoli *Sporichina Gallina* dicitur. Jac. Ruinaudetus Pharmacop. nobis misit hunc fruticem in littore maris Massiliae natum, scribens *Tartoraire* ibidem vocari, quod alium mirifice soluat.

Circa Massiliam locis ad mare deuexis, praesertimque collem vulgò *Mnt-rond* vocatum, squalidum, induratum, glareosum, plurima fruticat, ut ante nos Lobelius annotauit. Nihil iucundius aspectu quam colliculi aut areolae argenteae huius herbae nitore vestitae. Neapoli quoque nobis missa. Frequens quoque, inquit Clus. regnis Granatensi & Valentino, in apricis & Sole illustratis locis. Verno tempore floret, hoc est, Martio & Aprili. Aestate fructum perficit.

Folia sunt adurentia, ut dictum: ob purgandi facultatem rusticis Hispanis magno in usu. Sed effrenis & exuperans eius purgandi vis, inquit Lobel. non raro Dysenterias fluxusque immoderatos accersit. Praesertim si quis minus peritus, huius folia in puluisculum reducta, vel quopiam liquore diluta, propinquit: ut scitabat ille necator Tmisio, qui nobis primam eam, eiusque vires, ut dicebat arcanas detexit. Hodie impostores, ac quidam ignari, notante Dalechamp. quanta sit huius plantae vis, & corporibus nostris noxia, ex vino albo, vel Cicerum decocto, vel elix carnis iusculo bibendam propinant drachm. vel ii. in validissimis naturis, tanta purgandi potestate, ut saepe ob hypercatharsim sanguis erumpat. Educit autem sic sumpta biliosa, pituitosa, aquosa, id quod & Diosc. restatur de suo Sesamoide: ut mirum non sit, eodem teste, in Anticyra dictum olim fuisse Elleborum, admiscerique solitum potionibus ex Veratro albo paratis, ut facilius & citius Veratrum, quod vomitiones magis ciet quam deiectiones, alium commodius detraheret. Hoc idem Dalechamp. Elleborum suspicatur, quod fructum Sesamo similem edere Theophr. scripsit, quo in Anticyra purgationes fiebant, Quamquam non solum fructu, sed etiam radice utile esse scribit: quod negat Diosc. qui radicem *ἀντικυρα*, id est, imbecillem & inefficacem, seu ignauam, suo Sesamoidi maiori tribuit, seminique purgandi vim, quam etiam foliis & ramulis inesse experientia docuit.

SANAMUNDA II. CLVS. CAP. XLV



Tartoraire Tassinem suam Sanamundam fecit Clus. quem & circa Calpen, vulgò Burhalaga appellat, altitudine cubitalem, ramis lentis, flexilibus, carnosus & denso cortice intestis, qui [sublatà exteriori cute] per totam plantam, praesertim circa radicem, Lini aut Cannabis modo in fila diduci potest: superiores ramusculi densi-

Sporichina Gallina.

Retumber.

Tempus.

Impostores.

Elleborum.

Descriptio.

Burhalaga.

Tela. ram, confessorum, lanuginosorum, & veluti to-
mento quodam oblitum foliorum comam pa-
riant, superiore minorum, & mucronatorum, sal-
si nonnihil gustus, sed deinde actis & calidi. Exor-
Sapor. natur hae coma flavescentium flosculorum Olea
similium numerosa sobole. Radix crassa & lignosa
Floris. superiori similis est. Eius fructum observare non
potuit: quandoquidem Febr. florentem inuenie-
Radix. bat petroso & salebroso loco, maritimis Bœtiæ
inter Calpen & Estepona, montibusque Granatæ
proximis.
Tempus
& Locu. Granatensibus Mauritanis Samundam vocari
ait, apud quos purgandorum corporum gratia
frequentius vsurpetur. Drachmæ enim pondere
cum decocto Cicerum sumptam, misicè purgare
per inferna. Circa Calpen verò nullus esse vius,
præterquam ad excalescendas fornaces.

SESAMOIDES PARVUM DALECH.

Sanamunda III. Clus.

CAP. XLVII.

Descriptio



Concinna
est planta,
ramis crebris, li-
gnosis, incon-
ditis, inque fi-
li tenuitatem
tandem abeun-
tibus donata,
quos. sæcūm
densa, candida,
cineracea lanu-
go obuoluit,
quæ in maiori-
bus virgis pau-
cior. Folia con-
fertiflora ra-
mulis sine pe-
diculis hærent,
Thymæ aut Vac-
cinæ palustris,
acuminata, in-
ferna parte ru-

gosa, virentia & in sicca nigricantia, glabra, super-
na verò [qua parte contrahuntur & velut aluco-
lum efficiunt] tomento albedo penitus obducta.

Sanamunda 3. Clus. Clus. sic describit: Sanamunda 3. duas priores
magnitudine exædit, candidioribus & multo læ-
tioribus virgis, quarum cortex supra modum len-
tus est, & frangi contumax. Extremi ramuli fre-
quentes, & ferè omnino tomentosi, procumben-
Cortex. tem comam habent, & frequentibus foliolis ob-
siti sunt, carnosiss, parvis, Semperuino minori
Dioscor. quod nonnulli *Illecebram* vocant, valde
similibus, vrentis etiam facultatis. Flores supe-
rioribus similes, interdum herbacei sunt, aliquā-
do pallentes, Sed neque istius fructum obserua-
re licuit. Floret autem cum superioribus. Quo
porro nomine vulgari appelletur, ignorare se ait.
Similem autem fruticem siccum ad se aliquando
misse C. V. Alfonso Pantium, Med. & Prof.
Floris. Ferrar. & Cortusum Patavinum, hic quidem E-
riæ Alexandrinæ nomine, ille verò Cneori. Ve-
rùm Cneorine, an alio nomine Veteribus descri-
ptæ sint hæc stirpes, aliis iudicandum relinquit.
Certum tamen esse dicit Thymelææ congeneres
esse, & iisdem facultatibus pollere. Nos Sesa-
moides minus Dalechamp. idem existimamus cū
Tom. I

Sanamunda 3. Clus. de quo scribit Hist. Lugd.
Sesamoides minus quidam nominant, non ad
Dioscor. quidem historiam referentes, sed ad Se-
samoides maius multorum Dalechamp. (siue *Par-*
ramire & *Sanamunda* 1. Clus.) cum quo cogni-
tionem habet originis, saporis, facultatis cathar-
ticæ. Quidam Phacoides volunt esse Onbasii, ob
foliorum cum Lente similitudinem. In maritimis,
ut & alterum provenit, sed Corfææ magis quàm
Gallæ, Liguriæ: caule pedali, in ramulos plu-
rimos & graciles diuiso, lanugine molli vestitos
superioris modo: foliis numerosissimis, minutis,
lævis virentibus, Lenticulæ similibus, circa ra-
mos densissimè coaceruatis, ut ramorum conspe-
ctum adimant, Aizoi acris specie: flore copioso,
tenui, candido, per totos ramos foliis intersparso,
suauissimi odoris, nec molcho dissimilis, & quasvis
acres plantas superantis. Purgat, & eosdem hu-
mores educit, quos Sesamoides maius: sed labo-
riosis, præsentiorque nimis vacationis disci-
mine. Eius tulæ ac cribratæ drachmam pituitæ im-
mixtam sorbendam dedit Dalechamp. eundem
neruorum distentionibus laboranti Lugduni in
valetudinario, cui non segnis alius deturbata
est, quàm si Colocynthidem iunxisset, restituta-
que sanitas. Aspiciamur eandem Hist. Lugd. hu-
ius aliâ habere descriptionem & iconem nymine
Cneori nigri Myconi, de qua scribit: Plantam, *Cneori*
Pala marina vulgò dictam à Barcinonensibus, ad
nos misit pro Cneoro nigro depictam & descrip-
tam, his ferè verbis: Frutex est duorum cubi-
torum altitudine cū multum adoleuit, caule
rotundo, flexili, aliquantum aspero, & ferè nodo-
so, qualis in Aizoo foliis detrahit cernitur, ramu-
lis multis similiter nodosis brachiato, in quibus
folia minuta, perpetuè virentia, quæ quod fruti-
cis summitati propiora, eò minora cōspiciuntur,
ut quæ in summitate sunt, Cupressi foliis similia
sunt, paulò tamen latiora: omnia nonnihil crassa
sunt, carnosa, incana, caulem complētentia. Flo-
res in viridi lutei: radices crassæ, digitales, ligno-
sæ, albo cortice vestitæ, satis in terram descendentes.
Totus frutex, & maxime cortex manu tritus,
gravis est odoris: sed vigente canicula folia, si
conficentur, Zibeti odorem quadantepus spi-
rant. Barcinonæ nascitur locis arenosis, & mari-
timis, aut non multum à mari distantibus. Flo-
ret Autumno, & floris proventum ad Maium vs-
que producit, foliis aliis decedentibus, aliis rena-
scentibus. Foliorum sapor cum lentore subastrin-
git. Fotu huius herbæ hæmorrhoidum inflam-
mationem sedari asserunt: quod & iustum præsta-
tur. Hanc plantam Cneori descriptioni à Theo-
phrast. tradita optime quadrare putat Myconus.
Ea esse videtur, quam lib. de Cathartics nomine
Sesamoidis minoris deplaximus. Clus. Sanamun-
dam 2. fecit. Hæc Hist. Lugd. At nos non secon-
dam, sed tertiam Clus. Sanamundam censemus.
Cæsalpin. quoque de hac eadem, ni fallimur
scribit: Cneorum Hispani milites *Miccia* vocant,
quia eius rami siccati ignem conseruant, idè ex
his funiculos parant ad tormenta bellica igne ex-
oneranda: appellant autem hos funiculos *Miccias*.
Frutex est in maritimis circa Plumbinum, multos
spargens ramos, valde obsequiosos: foliolis bre-
uissimis totos surculos conuestientibus, modo
Cupressi, crassis, supernè candicantibus, infernè
viridibus. Floret in autumno, & per totam hye-
mem? flosculi sunt Thymelææ, inter folia, exilio-
res, & in medio lutei: fructus quoque similis, te-
nuior, nigro semine. Radix ramosa & obsequio-
sa, sed gustam non mordet. Eadem in insulis,
Ddd 3

Phacoides
Onbasii
LocusVfus.
Purgat.
Diffr.
Nervorum
dilectio.Cneori
nigri
Pala mari-
na.

Radix.

Zibeti odor

Locus

Tempus
Sapor.Sanamun-
da 1. Clus.Sanamun-
da 2. Clus.Sanamun-
da 3. Clus.Cneori
Cæsalpin.Miccia.
Funiculi
belli seu
sclopary.Fructus
Radix.

odorata & candidior. Theoph. Cneoron appel-
lat: eius duo genera, candidum & nigrum &c.
Phil. Casiam à Latinis appellari testatur. Hæc Casia
Quamvis autem ex Clus. Myconio, Dalecham. &
Cæsalp. descriptæ plantæ vnam eandemque stir-
pem denotare videantur, nondum tamen illud
pro certo assecutus, cum hanc plantam integram
& in suo natali non viderimus. Malumus igitur
de non probè cognitis iudicium suspendere,
quam temerè aliquid, quod quidam faciunt in
suis Annaduerf. pronuntiare.

*Anteresi de
non scripsit
aut non
probe co-
gnitis non
temerè pro-
nuntiant.*
Sanè si diligenter consideremus descriptiones
illas, quædam illorum deprehendemus, & ma-
ximè in Myconio & Dalech. & potissimum quoad
vires & icones. Multi & peritissimi Botanici cir-
ca similitudinem decepti sunt, præstat ergo oc-
casionem præbere diligentius inquirendi, quam
posteritatem decipere non sine gravi periculo.

*Erica Ale-
xand. Lob.*
Ericam Alexandrinam vocant Itali, teste Lob.
namurum, ut ille ait, hoc specioso nomine mit-
tunt & obtrudunt Itali quidam peritiores pere-
grinitatis & notitatis titulo, cum tamen in Gil-
luprouincia & Hispania eius sit facilis prouen-
tus. At is inter varietates Vermiculatæ scitici a-
cris recentior in Obs. & Aduers. ut ipsemet testa-
tur. Verum non possumus nobis persuadere Lo-
belio bene notam fuisse Sanamundam tertiam
Clus. Si quis consideret eius icones, quanta di-
uersitas!

Locus.
Nos existimamus plantas depictas in Aduers.
pag. 161. & Obs. p. 207. diuersas à Sanamunda ter-
tia Clus. de qua hic agimus, quamvis pauca, quæ
tenet in Obs. pag. 203. nomine Vermiculatæ vi-
deantur posse Sanamundæ continere: scribit e-
nim folia alba densissimè conferta denticulis Ver-
miculatis acris, maioribus. Quas autem plantas
conferamus exhiberi per prædictas icones, dice-
mus sub huius operis finem, ubi trademus de
Vermiculatæ marinis.

*Vermicula-
tas frutes.*
Ceterum, inuenitur etiam hæc planta, inquit
Clus. in toto illo tractu maritimo Meridiei obic-
cto, qui ab Herentio frecto, ad Pyrenæos vsque
excurrit. Nos pulcherrimam cubitalem habemus
in Herbario nostro sicco, à Valerando Dou-
rez, insigni Pharmacopæo, adf. nostro, cuius ma-
nu adscriptum est: *Sesamoides frut. minus ex Syria.*
& ibidem manu Dalech. nobis hæc planta picta
aduersa à Corsica D. Cæsp. Bauh. attulit ramulum
nomine Cneori albi Guiland. collectum in horto
S. Pontificis Romæ. Nos & in horto Serenissimi
Magni Ducis Hetruriz legimus Florentiz, ex sa-
tis alto & eleganti frutice, cum hac annotatione à
non indocto hortulano accepta: *Aproxis Plin. aut
Fœcales.* Miskent cum puluerem bombaceum pa-
rant.

*Sesamoides
minus.*
Scribit autem Plin. à Pythagora Aproxin ap-
pellari herbam, cuius radix è longinquo conce-
pitæignes, ut Naphtha. Idem tradit: si qui mor-
bi humano corpori acciderint flore Aproxin
[Brassica. cu.] quamvis sanatos, admonitionem
eorum sentire, quoties florere eam contigerit
[flore eam tetigerint. M.] Sed mittamus Py-
thagoricas has nugas, quantum Author, vel ipso
Plinio teste, Magorum studiosissimus fuit. Sed
quantò portentosiora tradit Plin. eo loco: nempe
lib. 24. c. 17. Annotat Dalech. & Cæsp. didi, quod me-
tu & pœnore accedere propius non auderent: &c.
accidere est.

*Aproxis
vnde.*

CNEORVM.

CAP. XLVIII.

Quum certum sit tam Chameleam quam
Thymeleam à Veteribus Cneorum fuisse
appellatam, non insubidè hoc loco, opinamur, de
eo trademus. Verum quum non solum de modò
dictis plantis dicatur hoc nomen, sed & pluribus
aliis plantis à Neotericis attribuitur, [ut iam in
præcedentibus ex parte dictum] statuimus hoc
loco præferre quæcunque Veteres de eo prodi-
derunt, subinde demonstrare quales plantæ eo
nomine à diuersis donentur.

Theoph. inter succulosa quæ carnosio folio con-
stant refert Cneoron, & inter herbacea, Sedum,
quod *sedum* nuncupat. Cneori verò duo gene-
ra statuit: album & nigrum. Albi, inquit, folium
cutaceum est [*ἀσπιδίον*] oblongum, figura quo-
dammodo Oleagineo simile. Nigri verò qua-
le Tamarisci, carnosum. Album super ter-
ram minus se attollit, [*μᾶλλον ὑψιτέον*] &
exiguum quid olet: Nigrum autem valdè odora-
tum est. [*ἀσπιδίον* habent vulg. Cod. Gaza, Cornar.
& Guil. legunt *ἀσπιδίον*. Rob. Conf. *ἀσπιδίον*, om-
nes Plinium secuti.] Verique radix alta, magna.
Rami multi, crassi, lignosi, ferè statim è terra di-
uili: [Græcum addit *ἐκαστὸν τὸ ὑψιτέον*: melius
tamen legisse videtur Gaza cum omittit hanc vo-
cem, & *ὑψιτέον* tantum legit.] lenti admodum.
Quamobrem hisce vtuntur ad colligandum &
comprehendendum modo salicis & Vitilium.
[*ἀσπιδίον* τὸ *ἐξ*, *ὅσπερ* salix Amerina & Vitilis: Gal-
li sua lingua adhuc vocant *ὄσπιν*. Gaza, lynci modo
vertit.] Germinat florētque post æquinoctium
Autumni, & diu florent. Idem quoque prius alibi
Cneorum inter ea recenset; quæ aculeis carent.
Gaza utrobique more suo interpretis fidem exce-
dens, *ὑψιτέον* Casiam vocat, Plinium secutus qui-
dem: sed iudem malè fide. Nam & hic Cneoron
dixit, quamvis addat Casiam Hygino vocari. Re-
liqua paucissimis expedit, his: Cneori duo genera,
nigri atque candidi. Hoc & odoratum. Ramosa
ambo. Florent post æquinoctium Autumnum.
Dixerat autem prius: Fruticem Thymeleam, aliis
Chameleam, aliis Cneoron dici: similem esse O-
leastro &c.

Et Galen. lib. 9. cap. 3. de Compon. Med. sloc. Ex
Archigene, *ὑψιτέον* [inquit] *ἢ ἢ ὑψιτέον ἢ ἢ ὑψιτέον*.
Et Hermol. Nostri (ait) Chameleam & Thyme-
leam præcipuè Casiam videntur appellasse. Por-
rò quod Cneoro Theoph. carnosum folium velu-
t Myricæ attribuit, hoc, inquit Cornar. ad Cne-
oron Diosc. quod nomine peculiari Thymelæa ap-
pellatur, non pertinet, sicut neque ea, quæ de
duobus Cneori generibus scribit: sed referenda
sunt ad aliud Cneorum, quod foliis in corona-
menta venire & Casiam ab Hygino vocari Plin.
ait.

Vidimus doctos viros hac parte rerum confu-
sionem fecisse. Th. Gaultii in lib. de Purg. opinio
est, folia Thymelææ vsque ad Theophr. tempora
Cneorum vocata fuisse: ipsum verò Theophrast.
plantam Cneoron & Cnestron vocasse: ita à
Cneoro putat derivatam vocem Mezerei, Hygi-
niquæ. Casiam à Latinis Oliuellam dici. Sed lon-
gè petita Mezerei derivatio, quam vix emunctior
Grammaticus admittat. Interim non docet, quam
plantam intelligat, aut exhibeat.

Marantha in sua Meth. tradit Theophrast. per
Cne-

*Cneori duo
genera.*

*Verique
comparati.*

*Theoph. Sa-
tis illud.*

Tempus.

*Gaza in-
terpretis
fidem exce-
dit.*

*Thymelæa.
Chameleam.
Cneoron.*

Casia.

Cnestron.

Cornar.

Cneoron, Thymelæam & Chamelæam intelligere, quæ nomina Dioscoridi vltatiora dicunt, ut prius illud Theophrasto.

Matthiol. in Dioscor. Cassiam Virgili putat eandem cum Cneoro Plin. & Theophrast. Sed quænam plantæ orientur in Italia vel aliunde eò afferatur, quæ Cneoron referant, quid referat, se non habere ait. Guiland. in Theone, Cneorum vtrumque Chamelæam & Thymelæam esse ex Aretæi, Dioscor. Plin. Gal. & Aetii traditione ignorare demittitur. Matthiol. respondet in Epist. ad Cratonem: Cneorum, quoddam videat Guilandinus inter adulterinas Thymelææ nomenclaturas habere Diosc. quodq; habeat Gal. & Plin. quod me adnotasse ignorabat, non sine ingenti latratu barbarus ille Canis me adortus. Vtrum Theophrasti Cneoron à Dioscor. & Gal. Cneoro pluribus differt notis: Thymelæa Chamelææ ambæ graueolentes sunt: grandi atque radice haudquaquam nituntur, nec florent, nisi Vere inchoante, nec humi procumbunt. Adde quoddam Cneoro nigro folia Tamaricis reddidit Theophrast. Sed cuiusmodi folia nec Chamelææ nec Thymelææ insunt. De alba Cneori genere meminit Plin. inter odoratas plantas de altero vero Cneoro, de quo Diosc. & Gal. meminit is loco superius citato. Scribit de Gnidio grano Theophrast. statim simul ac de Piperis egit non autem ubi tam diligenter Cneori historiam describit, utpote, qui Gnidium granum non ignorabat Cneori non esse fructum. Idem in epist. ad Marantham similibus argumentis conatur refutare Maranthæ opinionem: addens, nullum esse inter Thymelæam & Chymelæam coloris discrimen, quo nigra altera appellari debeat, altera vero alba. Pro Guilandino rursus respondet Paul. Hæssus aduers. Matth. Probl. 8. in hunc modum: Multa sunt quæ sententiam Matthiol. de Cneoro infringunt, quod nullius rationibus evidentijs probari posse puto, quàm ipsiusmet Dioscor. & Theophr. autoritate, cui ille inniti quàm maximè videtur. Neque enim Cneorum inter adulterinas solum apud Dioscor. nomenclaturas legitur, quemadmodum Matthiol. commentari fuit ausus, neque etiam verba Theophrast. de vtroque Cneoro & Dioscor. de Chamelæa & Thymelæa adeò longè inter se dissident, quæ utrambos de iisdem locutos esse plantis docere queant. Pluribus rem prosequitur Hæssus, quem consulete poterit Lector, cum solum huius controuersie tractationem, ex illius scriptis integram huc transferre non permittat breuitatis studium. Nos sanè neuiquam legimus apud Veteres Thymelæam & Chamelæam grandi atque radice haudquaquam esse, & non florere nisi Vere inchoante, ut Matthiol. ait. Hoc quidem conuenit Laureolæ folio deciduo, quæ non floret nisi vere, quàm Matthiol. videtur confundere cum alijs plantis, ut antehac demonstratum.

Mirum etiam Matth. ita inconstantem suique immemorem, ut exhibeat pro Cneoris plantas cui folia nullo modo similia Tamaricis, quale eius Cneoron frutex, de quo nos antè: & Cneorum herba, de qua etiam ibi loco, titulo Ocymoides vel Saponaria minoris.

Dottissimorum quorumcunq; iudicio, inquit Clus. Cneorum Theophrast. à Thymelæa & Chamelæa Dioscor. non differt. Quin & Cæsalp. Plinius [inquit] Chamelæam petrosi nasci tradit, non ultra palmi altitudinem, folijs Oleæ amaris, odoratis: videtur autem intelligere Cneorum candidum Theophrast. quæ inter Coronarias Cassia à Latinis vocatur. Idem Cæsalp. eo cap. quo hæc

tradit nempe 7. lib. 4. duas plantas describit, quas ambas descriptiones posuimus cap. de Laureola decidua, ut qui dubii simus, quas plantas intelligat: quarum vna fortè Chamelæa folio subrus incano, altera Laureola folio deciduo. Idem tamen cap. 9. gradit, Cneorum Hisp. Micciari vocatum: [de quo prius actum, cap. de Sesamoide minore Dalechamp. siue Sanamunda. Clus.] ibidem Theophrastum dicit Cneorum appellare.

Rob. Const. in Lex. vniuers. vel vniuers. Cassia herba, differens à Cassia frutice aromatica, de qua Virg. De hac intelligit Plin. lib. 2. cap. 12. & lib. 12. c. 19. Vbi Cneorum quod Cassiam Hyginus vocat Cneorum Hipp. etiam, vtrius vocat, ut pluribus dictum in superioribus.

Ceterum Cneori nomine has inuenimus plantas exhiberi: Chamelæam tricocton: Chamelæam folio subrus albo: Thymelæam Monspeliensem: Laureolam folio deciduo, ac etiam folio perpetuo: Cneorum Martialis frutex: Tartemraire siue Sanamunda. Clus. Sesamoide minor Dalechamp. siue Sanamunda. Clus. Cassia Monspel. de quibus omnibus abundè actum distinctis locis & capitulis.

Dalechamp. Cneorum album facit plantam dicta Argenteam, de qua mox. Item Cneorum alpinum quorundam de quo 12. Rosmarinus coronarius lib. eodem. Laureola siue Pseudonardus lib. 28. Camphorata Monspel. lib. 29. Eodem etiam Ocymoides minor siue Saponaria. Dod. inter Synonyma Dyp-laci ponit Cneorum.

Ita vides in quantam confusionem Cneori historia ab Herbariis fuerit coniecta, singulis serè nouam quandam, ne nihil dixisse viderentur, pro Cneoro obtrudentibus. Nos ut speramus, adiut patefecimus posteritati hæc omnia diligentius examinandi ac diiudicandi.

CNEORVM ALBUM DALECHAMP. alijs Dorycnium.

Cneori albi Dalechamp. plantam in hortis Adonis alitquando alimus, cuius rami tomentosi, albi: folia quàm vel Chamelææ vel Thymelææ maiora nonnihil, ad magnitudinem foliorum Mezerei Germanici siue Laureolæ folio deciduo propius accedentia, argentea lanugine

utrinque nitentia, mollitie holosericea, per extremum obtusa.

Dalechamp. autore, in summo ramorum vertice velut in Corymbos æcervatus emicax: Semen nigrum, crassum, in folliculo tanquam glomæ recombunt. Radix grandis, in profundum subiens.

Imperatus scribit, folio esse simili Oleæ, & flore integro, D d d 4



Cneorum.
Cneorum.

Aequiuoca

Descriptio

Folia.

Flor.

Semen.

Radix.

Cassia.
Cassia.
Cassia.
Cassia.
Cassia.

Guilandino
descriptio.

Matth. in
gill.

Matth. in
constantis
sui capite.
mor.

Cneorum
album
Theophr.
Cassia
Cneorum.

Dorycnium Imperati.



instar Campanulæ, quem pulchre depictum exhibet, sicut & Clutius in Appendice Operis sui Botanici, qui plantam hanc ad duorum aut trium pedum altitudinem assurgere, & multos ramos lignosos spargere tradit, non valde dissimiles tenellis ramis Ziziphæ albae, & flores Convolvuli aut Stramonii, satis fugaces, quia vno marcescente alter sese expandere incipiat:

Semper-
rens.

fruticem esse semperverentem, & hyeme folia non abiciantem.

Catalpino quoque herba fruticosa est, multis ab eadem radice exilibus simplicibus, altitudine dimidi cubiti, numerosis foliis circumdati Oleæ figura, paulo angustioribus, molli lanugine, colore argenteo, in summis virgis coma prædens, in qua florescendi Calathi effigie, & fructus Convolvuli minoris.

Fructus.

Hist. Lugd. scribit esse Cneorum album Dalechampi, & quorundam Herbariorum sententia optime quadrare cum descriptione Theophrasti.

Dorichnia
Argentina.
Argentina
flore pur-
poro

Casp. & Dorichnium vocat, & ex Sicilia habet, scribit, vulgòque Argentinam vocari. Sed quæ sit altera eius Argentina nescimus: quam tradit orti in asperis collibus & maritimis, brevioribus ramulis humi sparsis, rarioribus, foliis pinguioribus brevioribusque: floribus purpurascens in plures ramos distributis. Dioscor. Dorycnium tradit Oleæ nuper nascenti similem &c. foliis Oleæ angustioribus, ubi nota legendum esse, idem vult Casp. Imperatus quoque Dorycnium Diosc. putat, & Iacobus Plateau, ut annotat Clus.


Locus.

Nascitur in locis lapidosis & saxosis maritimis teste Hist. Lugd. Nos pulchrum ramum interficcas nostras habemus. D. Casp. Bauhino quoque missa fuit utulo Dorycnii Diosc. Sæpe nobis ex semine aliquando provenit in horto E. C. Montb. De vitibus eius nihil adhuc cognitum nobis: si sit Dorycnium quod non negaverimus, sed iudicio Lectorum relinquitur, eius vires reperire Lectorum in nost. Hist. lib. II. cap. de Dorycnio Veteribus dicto, ubi quam competentem æquivocationes.

Ordinis
vini.

Externum de Cneoro non baccifero frutice vel suffrutice hoc loco egimus, propter historiam eius communem cum Chamelæa & Thymelæa, quæ & Cneorum plerisque Doctis putantur, & bacciferæ sunt. Non male quoque scituri videbimur, si sequentem fruticem, foliis non usque adeo diversum à prædictis, licet non bacciferum, sed facultate ad eisdem plurimum accedentem, ideòque terribilem herbam dictum, cum frutex, hoc quoque loco tradimus.

ALYPVM MONSPELIANVM,
SIVE FRUTEX TERRIBILIS.
CAP. XLIX.



Alypum Monspe-
lianibus pu-
tarum; frutex
est cubitum
aut sequicubi-
tum altus, in
multos diuisus
ramos ligno-
sos, satis te-
nues, ruben-
tes, vel ex fus-
co purpurascē-
te cortice re-
ctos; per quos
folia concolo-
ria ferè nasci-
tur, Myrto vul-
gari acceden-
tia, magnitudi-
ne sua non ite-
penitus formā.

Ex angustissimo enim principio ad extremum usque propemodum dilatantur, ubi interdum & unā aut altera crenā incisa, obtusum mucronem educunt, crassa, solida, amara. Flosculi extremis ramulorum plurimum, aliàs ad medios ramulos glomeratim congesti hærent, purpurei, ex tenuibus staminibus contexti. Radix crassa, dura, nigra lignosa. Cuncta planta, inquit Lob. amara & inameno Thymelææ aut Chamelææ gustu, aut vehementiore etiamnum à sexto anno.

Quoniam verò Clus. in Hispania natam describit, & quædam habet in sua descriptione, à nobis non annotata, lubet & illam subiungere. Suffrutex hic potius, quam herba, cubitali aut ampliore altitudine assurgit, multis ramis lignosis, duris, fragilibus tamen & nigricantibus præditus, circa quos ex tuberculis interdum multa confertim & simul iuncta folia nascuntur, in tenerioribus verd ramulis, qui plerumque rubescunt, rariora, Myrti ferè, longiuscula, ex cæruleo nigricantia, carnosa, nigricante pediculo, acuto mucrone, extremæ amaritudinis. Summis ramulis singulares inhaerent calyces squammatum compacti interioris orbis florum Scabiosæ aut Morfus Diaboli magnitudine, qui florem continent villosum & lanuginosum, ex cæruleo candicante in medutillio, at in ambitu omnino cæruleum. Semen se ignorare ait, & florentem tantum conspexisse.

Alypum Montis Ceri Narbonensium, Herba terribilis vulgò: si inquit Aduers. Juri nonnullis cruditis persuasum fuit, Arabes vocitarunt Turbith quodlibet Pheg-magogum, paulo vehementius pituitam educens, merito & istum fruticem possit quis Turbith vocare, nec enim minus male ominato nomine, quam Turbatorium Turbith vocat istam herbam Terribilem vulgus Narbonensium, ubi impostores vilitudinis cauponatores impij atque tribades mulierculæ terribiles, ut vocant, illic moliantur purgationes istius terribilis fruticuli folijs, floribus & semine.

Eam si Senensis profum siluisset, nec pingendo deprauasset, melius suo honori Lectorique consuluisset. Hanc enim cap. de Tripolio, sibi etiam ignoto, ubi multum ineptit, & Alypum plantam tenui.

tenuibus Ferulæ folijs esse dicit, non istam: Dioscoridi imponit, Brasauolz & alijs doctilimis conuiciatur & obrectat, argumentis ab illorum monumentis mutuo sumptis, etiamque veltigatore ingenuo indigna prorsum & vecordia plena verba illa miseruit: Non refert, cuius sit plantæ radix Turbith Alexandrinum, cum eius facultates Medicis optime sint perspectæ. Sic scāmidiscum vel aratorem, non commentatorem loqui decet. Nullam hodie nostra ætas nouit plantam, ut eadem Aduers. tradunt, cui Diosc. Alypum assimilari queat, neque vllam plantam habemus, quæ æque bene, imò vllō modo (præter Ferulas) Alypo congruat, siue lineamentis, siue edictis purgandi, atque hic frutex Maritimus.

Sanè hanc quominus asserimus genuinum Alypum, vna notula non tam obstreperit, quam deest, soliorum nimirum: quæ non fuerant expressa à Diosc. aut fortassis fuerunt labecula codicis peruersa: mutata nempe voce *radix* in *frutex*, ut sit non sububer, sed fœniculaceus frutex. Hincque Mesue suum Turbith ferulaceum fecerit, vel Tapfiam cum nonnullis.

Eadem Aduers. tradunt non esse Ptarmicam. Lob. in Obs. dicit esse Ptarmicam, & Conyzam tertiam quorundam. Querit etiam an sit Calcifraga Diosc. At si corrigeretur Diosc. lectio, & pro voce *radix* reponeretur, vel *impendens*, vel *caput pendens*, ita enim esset corrigendum, multò minus herba terribili responderet Diosc. descriptio. Nam quæ obsecro similitudo eius cum Fœniculo? nulla omnino. Nec etiam potest dici *radix* Betæ nec plena succo. Imò nec nobis propriè videtur dicenda *radix*, siue herba, cum reuera sit frutex lignosus, cuius & radix & virgulta lignosa.

Vix putamus Matth. hanc plantam voluisse exprimere, id tamen poterit suo loco diligentius considerari.

Bæticæ, teste Clus. *Corenilla de fraytes*, hoc est, coronulam Fratrum siue Monachorum vocant, quasi eorum orbicularem tonsuram flore referentem, & *semper exsura*, quia semper arida & exsueca videtur. Murciani verò & Valentini vulgari voce *Segullada*. Nonnulli Valentiniæ Academicæ Professores Hypoglossum esse censebant: sed nihil cum Hypoglossò à Diosc. descripto commune habet, nisi quis fortè ob foliorum eius eū Rusci folijs asinitatem ei hoc nomen donandum putet, quæ tamen in hoc frutice circa pediculum oblongiora & angustiora sunt: præterea dissimiles vtriusque facultates.

Hist. Lugd. *Empetrum phacoides* dicitur, & *Herba terribilis* Narbonensium. Scribit tamen: Diuinare potius quam certò statuere licet, quæ planta legitimè Veterum Empetrum asseri possit. Si tamen coniectura locus sit, Dalech. Empetrum esse opinatur plantam, quæ à vulgo Narbonensium *Herba terribilis* vocatur, cuius cap. de Alypo mentionem faciemus, ob violentam in corpore purgando facultatem. Ea nunc in ipso maris litore provenit, falsum humorem bibente eius radice ac tum salso gustu est, ut ceteræ plantæ, quarum radix marinæ aquam sugit: nunc in montibus mari vicinis, ut in monte Cestio, vulgò *Cap de Ceste*, propè Agatham, nullo maris succo imbuta, sed tantum obiecta eius afflatui, ac tum saluginis experta, gustanti perquam amara sentitur.

Eadem Hist. Lugd. sic depingit: Cubiti esse magnitudine, & eo maiorem, cortice purpurascēte ramosam, folio Lentis, sed Lentis modo

per æquales versus non disposito, per ramos & lutescos nullo ordine prodeunte, superne viridi, inferne candicante, capitulis in ramorum vertice purpureis & rotundis, Aphyllanthi non dissimilibus. Ast nobis sanè valdequàm affectatè, ne dicamus sic Lēntis folio dici videtur, propter vocem *radix*, attributam Empetro apud Diosc. cum alij *agrostis* vocari tradant, ut postea ostendetur. Profectò parum nobis videtur in folijs Herba terribilis esse similitudinis cum Lentis folijs. At non idèd prorsus reijcimus esse posse Empetrum Veterum. Considerentur quæ innox traduntur de Empetro.

Miramur quoque tur Hist. Lugd. capiti de Empetro non subiunxerit caput de Alypo, sed interposuerit vtriusque caput de Cucumere silu. & cap. de Colocynthide. His demum subdit iconē Alypi Matth. quam ex Penæ autoritate corruptit & deprauavit: nihilominus tamen denudè proponit suam Empetri iconem titulo Alypi Penæ & Herba terribilis Narbonensis. Præstitisset nostro iudicio, vno capite fuisse scripta & tradita, non quòd existimemus Alypum Matth. idem cū Herba terribili, licet hanc opinionem non reprobet C. Bauh. in sua Animadu. in Hist. Lugd.

Taberna quoque duas ponit figuras huius plantæ pro diuersis, & sub diuersis titulis, Alypi, & Hypoglossi Valent. Clus. Camerarii: Alypum autem apud Matth. vix putamus idem cum Herba terribili seu Alypo Lob.

Ceterum Alypum potissimam in monte Cestio Frontignano oppido verius Austrum opposito, & in mare sito frequentem obseruauimus & legimus. Quamvis & in alijs Narbonæ & Galloprouinciæ locis ad mare & Austrum deuexis, & præruptis maxime, ut annotat Lob. natales suos delegerit. Flores in prædicto monte vidimus mēse Aprili. Febr. mēse floribus onustum inuenit Clus. in Bæticæ solitudinibus circa Antequeram. Martio autem inter Velez, & Rubio, & Lorca, quæ Eliocrota Veteribus dicitur, Murciani regni vrbes, totoque Valentino regno.

In Italiæ quibusdam instructionibus hortis cultam, & proceritate foliorumque amplitudine speciosiore paulò obseruauimus. D. Calzolarius Veronæ nobis ostendit pro Ptarmica: quo nomine & doctiss. Medico Ranzio in horto Florentino lectam nobis attulit, & ex Prouincia misit Iac. Rainaudetus industrius Pharmacopæus. Vm citharticam violentam huius stirpis antè diximus. Circumforanei Bæticæ Medici, nōtante Clus. eius decoctum propinare dicuntur iis qui Gallica scabie siue Venerea Lu laborant, non sine magno, ut aiunt, successu. Hist. Lugd. quoque purgandi vim Selsamode utroque (intelligimus Sanamundam 1. & 3. Clus.) non imbecilliorē habere restatur. Purgare autem bilem, pituitam, & aquas, non aliter quàm Tithymalus. Quapropter eā non temerè vtendum censemus.

EMPETRVM PURGANS.

CAP. L.

Paulò antè dictum, quibusdam videri Alypum esse Empetrum. Videamus ergo quid Veteres de eo tradiderint, potissimum de purgante.

Empetron, inquit Diosc. aliqui Phacoides vocant. Nascitur in maritimis & montanis, falso gustu. Quod verò propius terræ fuerit, amarius sentitur. Trahit pituitam, bilem & aquam, da-

Hist. Lugd.
jug. Mar.
confut. que
multiplex
error.

Taberna

Locus.

Tempus.

Cultus.

Ptarmica.

Vires &

usus.

Purgat.

Veritas.

Vim.

M. S. C.

Diosc. lectio
mut.

Præterea
apud C. Bauh.
id est impro-
batum.

Coronula
Fratrum.

Professores
Academicæ
requirunt.

Empetrum
Dalech.

Locus.

tam in iure aliquo, aut in hydromelite. Obiter vero notandum caput hoc Empetri in quibusdam exemplaribus deesse. Empetron vero Gal. Paul. &

Calcifraga. Aetius non *calcifraga* sed *agrostis*, alio nomine vocari tradunt, ita ut non temere quidam suspicentur ita apud Dioscor. legendum esse. Porro ea verba quod propius terra, amarius sentitur, aliter reddidit Plin. sic scribens: Empetrum (Empetron. CH.) quam nostri Calcifragam vocant, nascitur in montibus maritimis, serè in saxo. Quod propius mari fuerit minus salsa est potaque bilem trahit ac pituitas: quod longius magisque terrena, amarius sentitur. [Sed quidam, ut Plinium cum Diosc. concordent, sic legendum censent: quod propius mari fuerit, magis salsa est &c. Vetusitate vires perdit. In his vero quæ proximè sequuntur] Recens urinas ciet decoctum in aqua vel tritum, calculosque frangit. Qui fidem huic promisso quædam affirmant lapillos qui subferuehant, una sumpi. In his, inquam, videtur Plin. Empetrum marinum cum Saxifraga confudisse deque hac illa inaudienda accipiendaque esse, ut ante nos & Matth. & Dal. obseruauerunt.

*Empetra
duo Herm.
Epipetron.*

Empetron ad solas purgationes commodum iudicat Gal. bilemque ac pituitam educere. Gustu salum esse: proinde ad alia quoque vtari licet, ad quæ pollere docuit substantiam salinam.

Eryma.

Paulus quoque Diosc. secutus, mentiones duas Empetri habet, quasi duorum generum. Gal. vnicū. Aetius etiam Epipetron vocari solitum affirmat.

*Saxifraga
Marc.*

Porro Empetron dictum videtur quod nascatur in petris, eademque origine Epipetron ab antiquioribus. Nec solum quia lentis figuram & speciem refert, Phacoides, sed quia Martubio simile Prasoides est, inquit Marcell. Plinius Saxifragam à Latinis vocari ait, miscetque eodem notante cum ea quæ priuatim & seorsim à Diosc. Saxifraga descripta est. Ex quo suspicatur, quod in Saxifraga dictum, non esse illud in Diosc. eo nomine recipiendum; aut si sit, quod tamen verisimile non sit, variantibus historia & medicina: his de eadem actum fuisse, ante sub titulo Saxifragæ, & iterum sub Empetri. Paulum quidem Empetri manifestè, Saxifragæ autem nusquam meminisse. An verò Empetron idem sit cum Saxiphago, vel diuersum, non facile quis indicabit, inquit Cordus. Vt cumque fuerit, nulla iam hoc nomine extat herba.

*Phacoides
Corn.*

Cornario Phacoides in Diosc. suspecta est: & caput quod de Altero Empetro Diosc. habebat, de Saxifraga inscriptum, à se inter supposititia relatum testatur, ac quod Græcam inscriptionem non præfertet, illegitimum iudicatum. Habere tamen & Paulum Saxiphages, idque urinam ciere & calculos atterere. Quare à Plinio confusa duo Empetra diligenter esse distinguenda. Quin & Herbarii nostri multas saxifragæ species ostendunt, quas omnes Streinbrech appellant, ut in ipsis diligenti distinctione sit opus.

*Epipetron.
Arist.*

Arist. l. 4. de part. anim. Epipetron ab aliquibus vocari meminit, quod ad præsent. Empetron pertinere auctor Cornar. & nos Cæliacam censemus, de qua suo loco.

Non desunt, inquit Matth. qui Oedipum se faciant, & Diosc. obicura quasi ænigmata de Empetro audeant soluere. Plinius fortasse similitudine deceptus, quod Empetrum Saxifragiam existimauit. Vires quas vtrique tribuit Diosc. pui vni impetro attribuit. Hæc ille. Sed si Matth. suæ opinionis auctores citasset, non in eum hæc scripsisset Rob. Const. in suo Lex. Plinius Empetron non confundit cum Saxifraga, ut criminatur

Matth. sed disertis verbis distinguit lib. 22. c. 25. inueniens Saxifragum Adianthi genus esse.

EMPETRVM SAXIPHAGVM.

Meminit & alterius Empetri Diosc. his verbis: *Σαφίρα* alius *Σαφίρα*, alius *Σαφίρα*, Romanis *Σαφίρα*: Frutex est furculosus, (Saxifraga) in petrosis & asperis locis nascens, similis *indivium*. Marcell.

*Detestatio.
et nomen.*

Vim habet in vino coctus & potus, ut febricitantibus [ut febricitantibus omittitur in verustiss. cod. Marcell.] opituletur: urina item stillicidia & singultui, & ut in vesica calculos atterat, & urinas ducat. Hermol. hoc caput retinet, sed vocem Epithymi non habet, nec etiam cod. Basil. nec Paris. Ruellius & Cornar. addunt quidem, Epithymo, sed ipsum caput, ut subreptitium & adulterinum reijciunt.

Saxifragum, inquit Hermol. & Saxifraga Lat. dicitur. Item Calcifraga; si modò hæc est, quam & Plin. & Diosc. alio loco Empetron appellant. Corrosi & ambusti sunt hæc parte Græci Diosc. codices, nec quale sit huius herbe folium, auimaduerti vilo modo potest, & in ipso verborum textu spatiolum inane vacat. Porro veterem in Diosc. picturam huius herbe vidisse se testatur Herm. non plūs folijs, quàm cirris minoris & c: Recentioribus de hac herba parum conuenire, alios Tritici foliorum figuram, alios marina Bati similem dixisse, alios Tormentillæ vulgò dictæ.

Marcellus peregrinam Græcis & alienam vocem esse rectè annotauit. Idem ait: si negaremus Diosc. esse hoc caput, contra Græcos Latinosque codices omnes & Posteriorum decreta id erit: inclinatur tamen animus non esse Diosc. legitimum illud caput, aut non Saxifragam Latinæ appellatione a Græco homine dicendam fuisse: sed quo in plerisque adhuc indicatur, Saxiphagon, à minuendis & erodendis caruib: celi appellationis huius nulla sit nobis causa aut ratio. Paulus, ut idem notat, qui totum in sextum suæ Medicinæ Dioscoridem multa breuitate exscripsisse videtur, Empetri manifestè meminit: Saxifragæ autem nusquam; quod non relinquendum ab eo fuerat, si tunc in Diosc. Saxifraga legeretur, aut ipse pro diuersa eam receperat. Crederemus nos etiam eandem Saxifragam & Empetron esse, nisi diuersa penitus vtriusque historia & medicina esset. Ruellius dicit Saxiphagon à Paulo Saxiphages nominari, sed id caput non esse legitimum Diosc. facile eo persuaderi posse, quod Latina appellatio contra Scriptoris morem Græcæ præferatur. Verum nullius id argumentum valoris esse, insit Cordus: & addit, hoc Saxiphagon esse, quod Gal. Cestron etiam dici testatur, quodque Paulus Pulegio simile esse dicit, sed minus. In Cestri, id est, Betonicæ capite cum Epithymo comparare: [non inuenimus in Diosc. capite de Betonica, sed in hoc cap. de Saxiphago.] Ille verò suspicatur non legendum esse Epithymum, quoniam nulla sit inter Pulegium & Epithymum similitudo. Quare Thymum pro Epithymo legendum esse, non sine ratione conijcit.

*Paulus
Dioscori-
dem bre-
uiss. trans-
scripsit.*

Cestron.

Lonic. cōiectura est nominum ratione eundem esse fruticem & hunc, & qui deinceps alio loco à Diosc. describitur, nisi diuersa vtriusque essent medicinæ. Rectè tamen esse diuersas.

Matth. in Diosc. retinet caput Saxiphagiæ, hys Empetri, dicti. At Const. apud Amat. aperte scribit,

bit, suppositum & spurium esse illud caput de Saxifraga, non enim in antiquis Diosc. exemplaribus legi. Quia haecque a falsario quodam interposita sunt de Saxifraga, ita depravate & corrupte accedendi, ut qui hanc interiecta & non legitur non possit agnoscere, nesciat planè quid dixerit de Lupinis. Plinium vocare Adiantum Saxifragum, quod calculos comminuit.

Ceterum plures plantae pro Veterum Empetro substitutae sunt, ut frutex ille, quem supra Alpi Montpel. nomine descripsimus. Anguil. p. 14. meminit Empetri in Graecia, dicti *Prossu*, hoc corrupta à Brasiliade folijs Alchah purgantibus alibi post *Gali*. Antea considerandum proposuimus an Salsmoides minus Dalech. siue *Salsmunda*. Clus. possit convenire cum Empetro Diosc. Antius ignaviam suam satis prodit, quando non ausus sit describere suum Empetrum, de quo in suo in Diosc. com. scribit, confundens diversarum plantarum nomina, quando sic tradit: Empetron, Calcifraga, Gal. *Periepterra*: Germ. *Schneffraut*: mox addens: Empetri historiam tam succinctè narrasse Diosc. ut quae illa sit herba, difficile sit addiuinare. Olim verò apud Antuerpienses agebat, apud quos magnà diligentia simplicia medicamenta inuestigasse ait, Cornelium Medicum Antuerpiensem sibi herbam caespitosam, sapore salum, prope mare nascentem, obtrulisse, quam Empetrum esse contenderit: Nam & pastorem, qui illam ad eum attulerat, iureiurando affirmasse, Oves quum malè haberent, ad illam tanquam ad certum salutis asylum confugere: eiusque esu munitas, morbum propulsa & immunes mansisse.

Considerent periti, an Crithmum: Matth. in com. cum magnis fig. siue Chrysanthemon marinum esse possit, de quo agemus suo loco. De ea autem scribit Matth. Non deesse qui Empetron faciant, sed se ijs haud subscribere aulum. Sylu. in Mes. annotat Sennam quosdam Empetron Diosc. putare. Crithmum siue Foeniculum marinum aliqui esse Empetrum: Verum esse nequit, cum non purget: de eo agemus in libro umbelliferarum. Ruell. Empetrum seu Calcifragam Lat. multis esse Cristam marinam: & retinet vitiosam Plin. lectionem de Empetro.

Matth. pro Saxiphago, alijs Empetro, exhibet herbam Foeniculi vel Anethi folio, de qua lib.

Umbelliferarum saxifragae nomine, quae non frutex est, sed herba. Is etiam in post. suis com. alias etiam nobis obtrudit plantas pro Empetro, & potissimè de saxifragijs.

Hallucinatur, inquit Ryff. apud Diosc. qui eam herbam, quam Otho. Saxitragam albam Weis & Hohensteinbrech appellant, Empetrum esse contendunt. Sed Ryffus, ut suo loco copiosius dicitur, dum alios reprehendit, nec male ipse tamen quoque hallucinatur, pro saxifraga alba, leone exhibens Polemonium petraeum, a quo non distinguit.

Ineptè quoque Thurnisius in suo Pisone Saxifragam albam vocat Empetrum Diosc. & Lonic. Empetrum Galenicum nihilo aptius Saxitragam & weisse Ennbrech Tragi dicit. At ipse met falsus est Empetrum esse fruticem: non igitur saxifraga alba fuerit, quae herba est. Cur Galenicum dicat nescimus. Praeterea non purgat: nec tamen in Empetro requiritur. Multò ineptius idem alibi ad Empetrum refert Germ. *Sarnstaut* / *reidertod*, *Jungfrauhar* / addens ex Gal. ad solas purgationes commodare. Quanta quæso confusio diversarum? Aut quid ingentis facultis vel is vel alius in his plantis observavit. Quis item minutissimas herbulas frutices dicit?

Tragus Polytrichum suum alterum ac etiam tertium ad Empetrum refert, item Polytrichum suum primum, siue Rosellam Cordi. Ruell. Parisiensibus salnam Vitæ dictam, nobis Rotam murariam Empetron suspicatur. Euchar. Rosellin Herniariam. Et Gein. ait, Herniaria Empetron Trago, nescio quàm rectè. Nos planè rejicimus ob antè dictas causas. Caip. Bauh. in Phytop. Polygonum 6. minus seu Millegranam maiore Tragi Empetrum dicit. Empetrum album Paracelsi, cuius Thurnisius meminit l. 6. c. 14. in Pisone, titulo de Saxifraga alba, fortè Mili-um Solis.

Multri hallucinari nihil videntur, inquit Ruell. quoddam huius herbae [videl. Calcifragae siue Empetri] fidunt picture, notis omnibus reclamantibus nempe cirris minutis &c. de quo suo loco, sub Saxifraga. Hæc autem sunt contra Hermol.

Cornarius Empetrum idem putat cum Epipetro Arist. quod nos, ut dicebamus, Cuscutam censemus.

Matth. re-
preh.
Saxifraga
tenet.

Ryffus not.


Polemonium
Petraeum.


Ros Solis.

Rota mur-
aria
Herniaria.

Mili-um
Cuscuta.

FINIS LIBRI QUINTI.





HISTORIAE

VNIVERSALIS

PLANTARVM

LIBER SEXTVS




BACCIFERAS SPIROSAS EXHIBENS, TAM
ARBORES, QUAM FRUTICES.

BACCIFERARVM nondum est finis. Nam & tallum haud parua vobis classis, sed quas natura spinis armavit, siue ut occursum importuni arceantur, siue ut in eas abeat alimentum terrestrium porcu. siue alio, quippiam in eam rem humana temeritas, vel potius fragilitas comminisci audeat, non contenta fuisse, quod sit sit, sed cur ita fecerit Deus patrisque rerum natura, sciscitari a se, ut tandem intelligat se nihil scire. Dignitas ordinisque prerogativa tribuatur omni eo, in quibus aut tribus decantatissime Olea: qua, ut sativa & culea, et si spinosa non sit, natura tamen salu esse videtur, cum steriles in Oleastrum abeat, qui spinosa est arbor.

DE OLEA. CAP. I.

OLEA SATIVA



DE Olea pro dignitate & argumenti fertilitate traditis iusto opus esset volumine, vel Galeni exemplo, qui de Oleo, quod ex Olea fructu exprimitur, integrum librum satique amplum conscripsit, & illi plus quam alijs omnibus simplicibus inhaerens. Quare & nos utibissimae



huius arboris naturam paulo diligentius tradere constituimus: sed ea lege ac omne, ut historiae amplitudinem, & multi-jugam varietatem, ordine atque compendio temperemus, incipientes ab Olea sativa, tanquam vulgarissima, descriptione. Olea mediocris, nec magna est arbor, haud valde patula, perennis quoniam, truncus semur

humanum plus minus crasso, magna ex parte nodoso, materiae aequaliter spissa, satis solida, alicubi & eripia & intorta, gustu amaricante, colore in-

ter flavum & spadiceum ferè medio, nonnunquam etiam maculis utriusque coloris invicem convolutis conspersa, praesertim cum ad iustam aetatis consistentiam pervenerit, teste Cordo: Cortex tam trunco quam ramis obducitur coloris cinerei, laevis, glaber. [Cordo in his flavus.] Folia oblonga & angusta, salignis ferè similia, acuminata, incisuris ac manifestis venis (excepto unico nervo insigni à pediculo ad acumen oppositum excurrente) carentia, crassa, rigida, supernè, ut nobis quidem videbatur, coloris atrovirentis, rotundè saturatius virentis, (aitamen Cordo, [Virg. fortè imitatus fronde qui flava dixit,] in viriditate ueltescentia, supernè quàm infernè pallidiora contra aliarum arborum naturam) inferius canescentes: nullis tamen pilis obsita, tam brevibus pediculis haerentia, ut surculis quasi inserta videantur: ex quorum alis proferuntur pediculi, quibus Flores racematim cohaerentes sustentur, albicantes, Sambucinis similes, è quatuor foliolis fructus rudimentum complectentibus contexti. Cordus aspectu muscosos dicit, & propinqua ammosos: qui non omnes ad frugem perveniunt in Europa. In his verò locis quibus propria est haec arbor, proveniunt, deoque congestae eius baccae confertas uvas emulantur. Flosculis succedunt Fructus, figurae ovales aut glandium ferè, magnitudinis variae: nam in Hispaniis nascuntur, quosque Olivas Hispanicas vocant, mediocriter Prunum aequant. Italicae pleraque & Narbonensis vix mediocrem glandem superant, quamvis ea sint habitiores rotundioresque, primùm virides, postea flavicantes, per maturitatem purpureascentes, tandem & nigricantes, quaedam etiam ex purpureo puritan-tes, sed rarius, (sunt & quae in Hispania albae sunt,

Cortex.
Folia.

Flores.

Fructus.

Fructus.

Fructus.

HISTORIAE PLANTARVM.

ut angorit Oleum) sapore valde acri & amaro & ne-
scio quid acerbioris ac nausico si mixtum habent-
te, etiā in maturis & iam mollioribus, carae primum
dura, maturitate molli & pingui, ossiculum ligno-
sum, oblongum utrinque acuminatum, & in hoc
proportionatum nucleum unicum habet. Qui v.
in his continetur succus pinguis, Oleum fit dulce,
aquosus qui amarus, Amurea. Foliorum quoque
sapor amarus est, non sine acrimonia tamen. Ra-
dicibus nititur, inquit Cordus, partim rectis, par-
tim obliquis in summo caespitibus obhzrentibus,
materia trunci modo solida.

Theroph. de Oleo. Theroph. variis in locis de Olea hac habet: Vixit
ex urbanis perperam: radicem habet: quae ex me-
dio tendit parvam, ceteras grandiores & canero-
rum modo velut flexuosas, inaequales, nodosas ac
fimbriatas, obliquis, quod non tantum loci ratio-
ne evenit, sed naturae quoque ipsius proprium est:
parvam incertamque habet medullam: quam obre-
quidam Olea, ut Butyrum, medulla omnino carere
existimant: materies ipsa, sed obliquitate atque du-
ritia fragilis folia angusta, pediculi non habent bre-
uiorem: vertuntur astitis foliis: nam peculiare
illud sanè quod Olea Tilia, Vluo, Populo, evenit-
te videntur: Vertunt enim partes supinas mox post
solstitium aestivum: eoque argumento rustici sol-
stitium transactum intelligunt.

Medulla. Omnia filia parte prona, supinaque inter se di-
stare, ac ceterorum pars supina pinguior (non a i-
ta. Gaze vidit: orem vertit, atque levior est. Prona
enim parte, seu ima, quae terram versus spectant,
habent nervos, ac venas sicut manus. Olea minorū
verò pars ea ipsa cadidior minūsq; levis: Eius fru-
ctū natura ligno operuit, seu lignosū putamine,
& hoc rursus mole quadā carnosa obduxit: Et tu-
nica praetenui inuestiuit: Florē verò circa fructum
ipsum producit integro principio, & in a rbitu di-
viso, ita ut prostrati flosculi perforati spectentur,
quo argumento intelligitur arborem propē de-
floruisse: nam si exaruerit, aut madefacti fuerint,
una cum fructibus defluent, atque ita nulli tenus
perforabuntur. Maior enim ferē pars fructum in
medio floris continet.

Observatio. Oleam Diosc. non describit, sed vires, tantum
eius recitat. At Plin. si quisquam alius, amplius &
copiosus in eius historia est: quippe, qui ex variis
priscorum monumentis & observationibus sua
concinnavit, quae suis quibusque locis referemus.
Speciatim Olea (ait) constanti nucleo, oleo, carne,
amurea. Saries hac est earum amara: fit ex aquis,
ideo siccitibus minū na, riguis copiosa. Suus qui-
dem Oliuz suc: ut Oleum nescit, idque praecipue ex
immaturis intelligimus, sicut de Omphacio do-
ctus. Auctur Oleum ab Aeturi exortu
xvi. Calendis Octobris: postea nuclei incre-
scunt, & caro. Huic a boni folia non decidunt, quae
supernē candidiora, & minūslavia, angusta, pedi-
culo brevi. Cariem vetustatemque non sentit eius
materies: nimiam fistulamque non capit spontē.
Nec alia maior in Baetica arbor. Ceterum in sum-
mo honore habita olim Olea, ita ut eam in sacris
accendi fas non fuerit: Vnde Plinius. In profanis
usibus peli Laurum & Oleam fas non est, ut ne
propitiandis quidem numinibus accendi ex his
altar a irare debeant. Olea Minervae sacra dicitur
que, cuius rei multae rationes aut coniecturae ab
autoribus adferuntur: Quod Olea venia pacis-
que index sit, & quod illa inventrix fuerit Mi-
nerva: Vnde Virg. l.

Ex quibus confectum Olea. Olea Minerva.
Inventrix.
Volunt enim Olivam maris virginea satam & ex-

*Olea Bati-
ca maxi-
ma.* *Olea digni-
tate.* *Olea non
accendi-
batur in
sacris.* *Olea in ven-
toris.* *Civ. Mili-
taria.*

*Olea Bati-
ca maxi-
ma.* *Olea digni-
tate.* *Olea non
accendi-
batur in
sacris.* *Olea in ven-
toris.* *Civ. Mili-
taria.*

*Olea in ven-
toris.* *Civ. Mili-
taria.*

culca p. uberioris fructus praebet. I habebatur ap-
tem Minerva puritatis a manu sua, labi quibus
scia, proinde Oleam ei dedicari voluit. Credo
ditque antiquitas non nisi a castis recte & feli-
ter feri. Ferunt eum in Anazarbo Cilicia pueros
castos Oleam colere, & propterea Oleum apud
iplos ferulissimam & fructuosissimam esse. Cicero
verò de natura Deorum. Arist. in Aegolius. Fi-
lius Olea inventorem scribit. At Diodorus. Ma-
curium eius autorem facit, non Minervam, ut
Graeci: quanquam alibi huic & Olea & Olei edu-
cendi exprimendique inventionem attribuit. At-
que ante Minervam, eam cum ceteris sytheti-
bus ignoram vilē, neque habitam fuisse, scribit.
Marianus quoque Capella, Minervae sacra dicit
quod artes & disciplinae, quarum illa Dea est, O-
leo, ac lucernarum lucubrationibus perhibentur.
Sic enim ait:

*Hic nam vernicome frondens tibi munera Oliva
Ars & cura vigil per te quod dicitur.*

Phurnutus praeterea scribit Oleum Minervae mu-
nus esse, idque ab ea mortalibus elargitum. Cete-
rum Olea venia & pacis supplicantium ac con-
tristantium index fuit olim atque symbolum: ut
qui veniam poscerent, Oleam manibus gestarent:
Athenienses enim contra Timocratem sortidati,
& Olivam gestantes, supplicare soliti fuerant, au-
tore Demosthene. Artaxerxe Ochus, ut in vita Phi-
lippi autor Siculus, Sidonem obsidente, quingenti
ciuitatis patres, Olea ramos ferentes. Artaxe-
xi obviarunt, pacem posulantes. Xerxes in Athe-
nienses expeditionem ducente, Timon & An-
drotulus, cum primum oraculum consulissent,
& insausum responsum ab eo accepissent, ra-
mos Oleagineos ferentes, pacem & salutem pe-
tunt. Deinde item Carthaginensibus, consulente
Annibale, ad Scipionem ad deprecandam pacem
& misericordiam, decem ciuitatis principibus il-
li seligunt, quos navis Olea rans velata, desere-
bat. Sic & Romanis cum Persa Macedoniz Rege
bellum gerentibus, Alexandri Legati sortidati,
barba & capillo promissis, & Olea ramos feren-
tes, in Curiam Romanam progressi ad miseratio-
nem procubuerunt, ut scribit Livius: quo item au-
tore, eodem etiam rege detincto, Rhodiorum Ora-
tores, habita prius oratione, veniam deprecantes
& ramos Olea gestantes, universi prociderunt.
Apud Apuleium mulieres propter homicidium
viduae, sui a iudicibus comisereri, cupientes, ramos
Oleagineos ferunt.

Quare autem pacis & misericordiae signum
sit Olea, apud neminem haecenus legimus. Cur-
tius lepide satis & ingeniose hanc excogitavit
causam, nempe quod haec arbor Minervae Deae,
muhri & virgini dicata sit, a quibus sacra ve-
nia impetratur. Sed iam ad Poetas duccamus, ut
ipsis fides (quam frequenter alioquin detrahunt
fictiones) propter ea quae modo, ex historiarum
schola, retulimus, maior habeatur. Vt autem a
principio Latinorum, videlicet ipsi Virgilio incipi-
mus utpote qui longioribus haec tempore fecerit.
Sic ille de Aenea tempestate obductante, cuiusque
leniendae satagente.

*— Et tempestatibus agnam
Cadere deinde rubei: solique ex ordine funes,
Ise caput ronsa fletu evinctus Oliva,
Stans praecul in proci pateram tenet: extorque
falsi.
Prægit in fluctibus, ac tina liquentia fundit.
Prosequitur surgens a puppi ventus eunti,
Certa animi sui ferunt mare, & aqua a vertunt.
Et idem Aeneas apud eundem.*

Centum

*Centum Oratores Augusta ad manum regis
Ire iubet ramis velatas Palladis omnes;
Denaque ferre viros, pacemque exposcere Tentari.*
Et idem Palladis eductis Arceas:

*Paciseraque manum praeclatis Olive
Rursus alibi: tamque Oratores ruderant ex urbe Latina
Velati ramis Olive, veniuntque rogantes.*

Vbi Servius, non coronatos incesisse ait, quod lugentes non decebat, sed in manibus tantum ramos detulisse, quod miserantibus erat. Statius in 12. Thebaidos.

Miscemus circa, cunctaque insigne verenda.

Missata Laurus, & superas arbor Olive.

Reliquum, ut hanc reminisci Davidis Regis testimonio finiamus. Aut enim Plakes ille regius. Ego autem sum sicut Olive fructifera in domo Dei. Speravi in misericordia Dei, in aeternum, & in seculum seculi. Aliud nobile elogium superest, ad modo dicta apprimè faciens. Columba enim, post comune omnium animantium naufragium, à Noe ex arce ergastulo tertio emissis, rostro Olive ramuli retulit: Geneti videlicet humano à Deo Opt. Max. pacem redditam significare volens. Isti & graecum

adagium Aristoph. *ἡ ὀλὴν ἡ πόλις*. Non est Oleum in lecytho id est, in urbe, & in urbe, ubi precibus iam non est locus. Hac & sequentia à nobis relata, à Curtio magna ex parte collecta sunt. Sed & victoriarum signum Oleam esse scribit Dionys. Halicarn. in preceps orationis panegyricæ. Epimenides sanè Paeclius, ab Atheniensibus accersitus, Solonis ad legum condendarum ratione adiutor fuit, in quibus nonnulla, prope illi tanquam summo & sapientissimo viro minime visa idonea, commutavit, multaque ad Deorum cultum, & religionem, statumque Reipub. instituit. Discedens vero ab Atheniensibus honores & opes largientibus, nihil aliud, quam ex sacra Olea ramum poposcit. M. Antonius, acceptæ de Ventidij in Parthos victoriæ nuntio, & Labieni ab eo interfecti, Athenis, Graecis epulum dedit, & ludos in urbe fecit quibus & ipse depositis insignibus cum iuvenibus praefuit, atque saltavit. Ab his vero contra Antiochum Comagenem proficiscens, sertum ex Olea sacra excerpit. Tanti omnis Graecia hanc arborem fecit, idque propter primatiz urb. Athenarum inquam, nominis impositionem, cuius historia vel potius fabula, referente Cels. Constantino, ita habet. Oleam habulantur, Athenis, terra a

quis adhuc obruta, primum emeruisse. Cumque de loci principatu, deque civitatis dicendo nomine certarent, Neptunus atque Minerva, loci illius amenitate illecti, Iupiter controversiam diutius, pronuntiavit eum potiturum dominio, qui de civitate melius mereretur, eamque pluribus ditaret opibus. Mox singuli certatum sua dona conferentes, Neptunus hanc portu & navalibus ornata Minerva autem in Acropoli, cum latam viuentem, tum fructiferam Olivam edit, qua se coronans, omnium calculo victrix salutata est, idoque civitatem suo nomine nuncupavit. Quippe, Minerva Adm dicitur. Hinc spectatores Oleastro, eos qui certaminibus vicissent, coronabant. Multa Areopagorum iudicio id factum arbitrantur.

Olea honorem [ut scribit Plin.] Romana maiestas magnum prebuit, turmas equitum Idibus Iulij ea coronado: item minoribus triumphis ovantes. Athenæ quoque victores Olea Coronant. Graeci vero Oleastro Olympici. H. Plin. Theocriti interpretes & Aristophanis Aristoteles in Pantheo Calliophani, Olea ramis, & Oleastro, coronatos fuisse tradunt. Atheniensium duces ad bellum profectu-

ros fronde ex Olea sacra sumpti coronati solitos, scribit Alex. ab Alex. & Fab. Rutilianus, Equites Romanos equis insidentes & Olea coronatos, Idibus Iulij, ab ade honoris in Capitolium transire, & transvehit illa, ut ordinis eius recognoscendi & probandi gratia. Porro, quod de Minerva & Neptuni certamine supra diximus, aliter ab Hygino refertur, aliter autem à Servio. Scribit enim ille, decertatum inter eosdem Deos fuisse, qui primus eorum in terra Attica oppidum conderet, secundumque Minervam à Iove, quod in ea terra Oleam sevisset, iudicatum. Hic autem, hoc modo: Post illorum longam contentuonem Deus placuit, ut eius nomine civitas appellaretur, qui munus mortalibus melius protulisset. Tunc litus percussit Neptunus, & tellus equum animal bellis aptum produxit: Minerva autem iacta hasta, Olivam procreavit, quæ res hoc comprobata, quod pacis insigne foret. At nonnulli Neptunum tridente arcem percussisse, & inde salis haustus aquarum scatebra: [vide postea fons qui in arce fuit, fons Neptuni dictus] profuississe: Minervam vero in eadem cuspidis, hasta & Oleam evocasse, quæ quia utilior omnibus visa est, ut ei Athenæ cederent, arbitrantur.

Alij aliter, nempe post longam altercationem, in id, à litem dirimentibus contentum fuisse, ut ambo simul Athenis praesiderent. M. autem Varro, hanc fabellam ad rem veram, hoc modo, traducit. Edificatis Athenis, & ibi imperante indigena Cecrope, in arce sponte enata Olea, & ibidem alio loco, aquarum scaturigo. His vero prodigijs perterritus Rex, atque timens, ne hæc portenta futurum calamitatum forent prænuntia, certos Apollinem Delphicum sciscitatum misit. Quibus tandem respondit, uti bono essent animo, neque osentum illud mortalium malo aliquo evenisse, sed binorum Deorum de nominis super urbe impositione decertantium contentione. Per Oleam enim Minervam, per undam vero Neptunum significari: liberumque nunc esse Atheniensibus, ex alterutro Dei appellatione civitatem suam denominare. His autem à Cecropis remunera, mares & feminas, ad conferenda suffragia convocat. Per id enim tempus, mulieres ad publicas consultationes advocabantur. Mares autem pro Neptuno, mulieres pro Minerva sententiam tulere: & quia numero plures, ut fere ubique est in sexu femineo, pro Minerva vicerunt. Quare Neptunus indignatus, marinis fludibus Atheniensium omnem terram inundavit, ut, visa sit in perisimilis quedam facies. Quem, ut triphci mulierum supplicio placarent, censerunt Athenienses. Primum, ne quis mulieres *ἄνδρες* vocaret. 2. Ne nascentium ullus materno censeretur nomine. 3. Ne posthac mulieres suffragia ferrent.

Horum vero nonnulla, D. August. dum Dei magnam pluribus doctrinarum variarum cernentis struit civitatem.

Fabulae autem locum, ex re ipsa Themistoclem dedisse, Plutarchus est autor in vita eius. Etenim summo labore effectus, ut cines omnia navigatione, & maris studio, arbores conferrent, & regionem illis adimplerent, fertilemque redderent, maxime vero Oleis, quarum ager Atticus apprimè ferax esset, & ex illarum fructu non minimum quantum facerent. Unde, lex postea apud eos lata, cuius Demosthenes, contra Macartatum meminit. Ne quis Athenis Oleam effoderet, nisi ad templorum Atheniensium structuram, vel ad municipalia munera, aut cum ad funus eundem esset. Ad suos vero, quocumque bina Olea tol-

*Olea Attica
non am de
notat.*

*Themistocle
est consilio.*

tern succu n Olivas, im maturitate acerbas. Dal.]
bibere, & alieno sapore infici. Purpureæ sunt &
in us, utavis in nigru n colorem transeuntibus,
Pausia. Sunt & Superbæ præter iam dicta genera.
Superba.
Produlces. Sunt & prædulces, per se tantum [nulla conditu-
ra] siccata, uvisque passis dulciores, admodum ra-
re in Africa, & circa Emeritam Lusitaniz. In Africa
verò (fides penes autores erit) Miliarias vocari
multas narrant à pondere Olei, quod ferant an-
nuo proventu. Ideo lxxv. pedes Mago intervallo
dedit undique: etiam in macro solo ac duro, at-
que ventoso, cum minimum xlv. Laudatur & A-
fricana. Aquilia, & Alexandrina, ut annotavit Cur-
tius.

Dicamus & Eryma. Grandis inquit Varro, Olea
vocatur Orchitis, à similitudine ut credo testium:
Orchitis ad-
de. antiquitus Archemora. Probus à magnitudine sic
dicta vult, quod testib. ferè par sit, Archemora verò
ididè, quia grandis est. Radius à longitudine dici-
tur, ut ait Servius, unde Varro Radium maiorem
dixit. Pausia à Catone Posia, ex literarum co-
gnatione, & à Probo Possia appellata. Apavien-
do, id est, tundendo dictam Servius autumavit,
aliter enim Oleum non reddituram. Alij tamen à
sapore dictam volunt, quod fiat, ut ait Curtius
mason. Sunt etenim bacez eius succi amarioris, ideo
incomestibiles. Sergiana Columellæ, Sergianam
vocat idem, & Colmineam quam ille Culminiam,
cui Plin. præcipuam gloriam tribuit, & quæ Lici-
nium Oleum in Venafrano Italiæ agro ferret. M.
tamen Varro eam, quæ in agro Cassinate, præfert,
etiam autore Virgilio.

*Non segnes laccant terra: iuvat Ismara Baccho
Conferere, atque Olea magnum vestire Tabu-
rum.*

In Sabinis etiam laudatissimæ. Bætica item Hispa-
niæ regio Olivis fertilis. Silius:

*Palladio Bæti ornatum cornu ramo. Et alibi.
Nulla Palladia sese magis arbore tollit.*

Licinix unguentum palmam dedere, accommodato
ipsis odore: dedit & palatum, delicatior senten-
tia. De cætero etiam Licinix baccas nulla avis ap-
petet.

Præter antè memorata Plin. & Albigerem &
Salentinam posuit, inquit Curtius, quamvis neu-
tram adhuc legerimus. Idem Radium ab aliis Ma-
jorinam dici putat à magnitudine. Græcis etiam,
autore Polluce *φάυλια*, quam hic Colnidam &
Trabellum vocat. Apud eundem, Pherecrates
Trabellos in Oleastro insitas Oleas vocabat. Est
& Echinus genus Oleæ, & Ichades, & Gergerimæ.
Apud Polluc. etiam reperiuntur Drypetes, & Ni-
étrides, quas Pherecrates Cotinidas vocavit. Erit
ergo ex Polluce eadem cum Phaulia. Hæc Curtius.
In Mari rubro, inquit, Hermol. vivit Olea, quæ vo-
catur Arabica, baccis ferè nostratibus, fungos cum
lægi ceciderunt imbres, educans, qui tacti sole in
pumicem durantur, ex qua manat lachryma inhi-
bendo vulnere sanguini expetita medicis, de
qua specialius postea. Celebratur & cognomi-
nata *σητόρι*, ab intorta specie: sed ea loci nomen
est circa Epidaurum, adiecta fabula, evenisse ita ei
circumactu manus, Hercule illac meante: Nam
severso ex Hyperboreis, volunt ex Oleastro,
Græcix prius ignoto, fuisse clavam, quæ mox
apud Troezenios, aut certè ad Alpheim amnem
refloruit: si Pausaniæ credendum est, homini qui-
dem satis docto, sed superstitione, qui divi A-
driani & Antonini temporibus floruit.

In Arcadia spectari solitam affirmat ille arbo-
rem, è cuius radice una llex & Olea nascetur in
quodam fano.

Tom. VI.

Syraculis, ut Diodorus autor est, in frondibus
Olearum, scriptis optimatum nominibus, disces-
sione facta, irrogabatur quinquennale civibus exi-
lium: de quo argumento genus id multa *μυρία* *ἀπὸ τῶν*
appellabatur, ut Athenis Ostracismus.

Nunc ad ea genera, quæ ex hominum artificio
sunt, provt à Curtio, & à nobis ex diversis auto-
ribus collecta fuerunt. Colymbades (perperam
nonnulli autores Columbares) conditæ erant,
ideo sic dictæ, quod oleo suo puræ, non ex-
quista commendatione innatent & quasi urina-
bunde fluitent: *καὶ γὰρ* enim urinare est, seu nata-
re. De quibus & Diosc. ut dicetur in viribus. Hæ &
Halmades vocantur ab Athen. quæ & *μυρία* à
Polluce, *ἀπὸ τοῦ ὀλκιδῆος* quod innatent Oleo, ut
annotat Const. Sunt & Netrides appellatæ, quia
natent, apud Pollucem. Idem autor Corinidas no-
minat, quas & Phaulias & Trambelos dici ait.

Halmades sic nuncupatæ videntur, quod sale
condiantur, cum *ἄλμη* muria sit: easque male cum
Colymbadibus confundi tradunt Hermol. &
Curtius: siquidem, ut inquit Paulus, Colymba-
des oleo suo puræ, hoc est, sine accersita com-
mendatione quasi urinabunde innatent: Hal-
mades verò cum sceniculo condiantur, ut scribit
Hermippus.

Pityridæ sive Pyrenæ, sunt genus Olivæ frætæ:
Herm. nucleos & fresas, & fursuraceas interpreta-
tur: Epityra falsò dixerunt quidam, cum sit Epity-
rum, ut Varro inquit, Siculum edulium, de quo
alibi plenissimè dictum. Oleas autem confusas
Comici *συνεῖλαι* vocarunt: de quibus in Nisis An-
stroph. Nunc Thlastas vocant. Sunt & Stemphyli-
des dictæ. Græci enim quæ pressis Olivis superest,
ἐλαιοφυλλὰ vocant: Latini fraces. Stemphyli-
des Athen. etiam Olivæ nigræ.

Posteritas hac cura & satagentia perquirenda-
rum Olivarum, vel etiam colendarum non tene-
tur. Cæterum tam Diosc. quàm Gal. etiam iuc re-
centioribus Herbariis Olea alia domestica, de cu-
ius differentiis nunc agitur: alia sylvestris, de qua
postea specialius tradetur.

Nobis verò, ut & aliis Olearum differentiæ
αὐτὰρ ὅτι observatæ, sunt. 1. Olea cômunis, pal-
sim in Italia, & Gallia obvia: in qua varietas quæ-
dam, ut in descriptione observatum. 2. Quæ fru-
ctus fert albos. Sed à fructus magnitudine & lo-
co hodie tam Olearum, quàm Olivarum potissima
differentia. Lusitanicæ Oleæ, testæ Clus. minores
Olivas producunt, sed multum Olei eiusque præ-
stantissimi præbentes. Sic etiam nonnullæ, quæ in
Narbonensi Gallia & Bætica nascuntur Oleæ, mi-
norem fructu ferunt, ex quo plus Olei exprimitur,
etiam illi quod è maioribus Olivis elicitur, longè
præferendi. Circa Hispalim, & crassior Oliva at-
que etiam minor, nonnunquam & alba: quam &
circa Vlyssiponem nasci, Cleques Damianus de
Goes, idemque vir doctissimus, in quodam suo
prædio asserbat. Olivis Comensibus, ad Lacum,
inquam, Comensem propè Mediolanum natis, iis-
que conditis nihil lapidius & suavius, quamvis &
macræ sint, & propemodum respectu maxima-
rum, quas Hispanicæ vocant, exuccæ videantur.
Eoque nomine & à delicatioribus Italix celebra-
tæ. At magnæ illæ, etsi succulentæ amaritudinem
insignem habent, dulcoris minus: acerbatis
amaræ, hoc est, amuræ, magis. Diversis magni-
tudinis Venetiis, & Genæ vidimus & gustavi-
mus, magnas, medioeres, parvas, quæ semper no-
bis sapore istis præferabantur, quippe minds a-
maræ.

Hetruria, teste Marib. plura non novit Olearum.

Tria genera rum genera, quod tria, praesertim Senensis ager. Primum genus eorum est, quod licet à minoribus

Oleum Oleum plantis proferantur, sunt tamen spectata forma & magnitudine, Bononiensibus quidem non inferiores. Histanti in muria asservatis utuntur in cibis, quandoquidem Oleo minus apte sunt, quod multo plus amurex quam Olei fundant Proximè tum colore, tum magnitudine praestantes, quamvis praedictis longè minores sint, sunt tamen omnium aptissimè ad Olei conficiendum, quippe quod Oleum ex eis expressum sit non modò flavum, dulce, pellucidum, ac ceteris praestans, sed etiam copiosum. Gignuntur hæ à procerissimis Oleis, prægrandibus, Juglandium Nucum instar, ramos in altum hincque amplissimè fundentibus. Eas rura Olivastræ vulgè vocant. Tertiij generis ex sunt, quæ passim in Italia nascuntur, & omnium vulgatissimæ habentur. Laudatissimæ Olivæ Bononiensibus & Hetruscis crafiores, muria asservatæ Romam, Venetias & ad alias complures Italici clarissimas urbes, ubi optatè & magnificè parantur mensæ, ex Hispania importantur.

Differentia Olearum differentia, inquit, CASALP. ex fructu magis, quam ad præ spectantur, scilicet pro magnitudine, pinguedine & probitate. Idem veterum & Plinij differentias quasdam illustrat, suis applicat, & legendi tempus addit. Pausias primò purpureas, deinde in nigrum transeuntes, plurimum carnis habentes, Autumno colligendas dicit, sicut & Orchites. Radios tenerissimas, unde citissimè eas occupat ætas, & amurex cogit decidere. Liciniam in agro Venafrano callosam in Martium mensem durare, probatissimum Oleum fundere: eius baccas aves non tangere. Cominiam similiter callosam. Regiam, quæ & Phaulia, & Maiorana grandissima, non nigrescere ante Februarium, eodemque tempore & Sergiam. Hodrè grandissimas ex Hispania Nucis magnitudine adferri solitas, merito Superbarum titulo decorandas. Italicas, quæ minores rotundioresque plurimum Olei habentes, Olivolas vocari: quæ majusculæ & oblongæ dulcissimum Oleum reddentes, sed parcius, Raggiarias & radiis nomine deflexo: Et Regias quæ majores adhuc pulposioresque ad condituras tantum quærit.

Sunt & quædam, quarum caro abscedit ab osse cum franguntur virides, quæ conditæ gratissimæ sunt, quas Colymbades putat idem.

Olivæ omnes Olivæ omnes, cum nigrescere incipiunt, & virides Græci, Drupas Latini vocant: quæ optima ætas ad decerpendum: nam maturiores pinguiori quidem succo constant, sed minus grato, immaturiores Oleum reddunt præstantissimum, quod Omphacinum vocant, sed exiguum.

Meminit Meminit Serapio Olivæ aquaticarum, sed quales illæ sint, incertum adhuc. Item Olivatum novæ ætatis, colore Smaragdino: hæc recentes videntur, & immaturæ & virides: dicit enim Smaragdinas, & subdit mox: Et Olivæ nigrae maturæ sunt paratæ corruptionis: & in viribus. Ita ut hic non species, si aquaticam eximas, sed maturitatis gradus, & per se ratio intelligenda sit. Scit ita enim Bellonius Græciæ monte Athos Monachos veteri Olivis nigris conditis, quas vocant Dematias: sed eas non percurrere quandam speciem, & à suprascriptis distinguam censemus, cum iam olim in usu fuerint, & eas condiendi modus tradatur à Columella: atque ex Pausanis & Orchitis, nonnullis etiam Nævius dicitur, parari. Ad nos rariùs importantur, aut certe vix, nisi solum magnatibus. Sed & in Italia insolentiores esse putamus.

In Galliam, notante BRUYERO comportatur Cappatum amplitudinem vix excedentes: in cibis autoritatis non obscuræ. Hispanicas illas grandissimas præ ceteris ideo expeti censet, quia ex longinquis terris quæritur. Medici magnitudinis esse Narbonenses. Italici tamen transmarinas præferri in cibis, Oleo abisdem vinci.

Illæ Olearum differentia à forma & sapore potissimum desumptæ sunt: reliquas præterimus: nam, quæ à locis & inventoribus petuntur explicare, infinitum esset laboris.

Nominis originem quod attinet: Olea à Græcis dicta, & Oleum à Lat. ut quidam volunt id est, misericordia. Nam supplicantium symbolum esse Oleam, supra dictum. & Gal. Olea sativa, live domestica. Dicitur & alicuius, quam nos sativam, ut ab Oleastro differat, quem vocant *ayestaiw*. Oliva Virg. Palladia arbor: à Platoni de Repub. fructus. Olea est: à verò arbor, à Herod. à Aristoph. Latini etiam quandoque Termitem, quamquam etiam Termes vocentur vermiculi qui carnibus & lignis ingenerantur. Vt Crata Fico, ita Thales tribuuntur huic arbori, utique apud nos Italos inquit Hermol. At Græci, ut scribit Pollux, Thalos non Oleagineos solum, sed vitigineos quoque ramos nominant interdum.

Ereosionem porro Athenis live Iresionem vocabant plantam Oleagineam, velleribus & corollis involutam: unde & nomen, contra pestilentiam foribus imponi solitum, ut est apud Aristoph. quam etiam Corythalion dicebant, & qua (ritu teste Hermol.) Romanis non incognito) in Lustrationibus utebantur.

Græci etiam Oleam, ut dicebamus, in Academia satam, Moriam vocabant. Alij notante Curcio, sic distinguunt, ut Oleas publicas, Morias vocitent. Ceteri Moriz stipitem *ovio* dici volunt.

Caper Grammaticus Olivam arborem esse dicit, Oleam verò fructum, Oleum liquorem. Sed ea differentia parum observationi in duobus primis apud classicos autores habet: quod Virg. testimonio demonstrare facile est. At enim, Georg.

Sed transiit Olea melius propagine viros

Respondens.

Vt & Varronis, apud quem Oleam conditaneam pro conditiva Oliva legas frequentior autem & usitatissimus modus est, ut Oleam pro arbore, Olivam pro fructu ponamus.

Arboris Arboris, dicta quod perpetuè nitescit. Hinc Ouid. — Ramis semper frondentis Olive. Poetæ Paciferam, Pacalem, Pacatam, Infonrem, Pacificam, Liciniam, Picram, Picenam, Atticam dicunt, & quamplurimis aliis Epithetis ornant. Arab *Zaiton*, vel *Castan*, vel *Zaiton* est Oliva, & *Cair*, vel *Cair*, Oleum, ut à quibusdā scriptū invenitur. Germ. *Delbaum*, *Olivenbaum*, *Olbeerbaum*, Belg. *Olij*, *uenboem*, Gal. *Olivier*, It. *Oliivo*, d. *medico*. Hisp. *Azayune*, Castil. *Oliva*: Catal. *Olivera*, Port. *Oliveira*, Angl. *Olive tree*. Bohem. *Oliva*, Hungar. *Olayfa*. Nucleum vocant veteres *Sansa*, vel *Sansa*, ut videre est ap. Colum. Quidam *Naucum*, unde proverbium *nauci facere*. Nodos Oleæ rusticis Itali *Ova* *Olearum* vocant, de quib. in morbis.

Olea, ut scribit Theophrastus, competit solum Campestre, ita ut meridiem præcipue spectet, atque etiam magis candidum, in quo fertiliores evadunt: id enim multum vaporis, & tūscque continet, quod natura Olearum desiderat. Nulla ex iis generibus, quæ ex Colum. diximus, ut ipsæmet prodidit, aut perservidum, aut gelidum statum Cæli patitur. Itaque æstuosis locis,

Septem

Nomina & Synonyma

Nomina & Synonyma

Terminum

Ereosionem

Moria

Oliiva

Epithetis

Zaiton

Sansa

Locus & natura

Septentrionali colle: frigidis, Meridiano gaudet. Sed neque depressa loca, neque ardua: magisque modicos olivos amat, quales in Italia Sabino:rum vel tota provincia Batica videmus.

Hanc arborem plerique existimant ultra miliarium sexagesimum [quadragesimum. Plin.] à mari, aut non vivere, aut non esse feracem. Sed in quibusdam locis rectè valet, ut abundè videre est in toto tractu maritimo Narbonensi, Liguriæ, & reliquis Italiæ.

Optimè [addit Colum.] vapores sustinet Pausia, frigus Sergia.

Aptissimum genus terræ est Oleis, cuius glareæ subest, si superposita creta sabulo admista est. Non minus probabile est solum, ubi pinguis sabulo est. Sed & densior terra, si vuida est & laxa, commodè recipit hanc arborem.

Creta ex toto repudianda est: magis etiam scaberrima, & in qua semper uligo consistit. Inimicus est etiam per sabulo macer, & nuda glareæ. Nam etsi non moritur in ejusmodi solo, nunquam tamen convascit. Potest tamen in agro frumentario feri, vel ubi Arbutus aut Ilex steterant.

Nam Quercus etiam excisa radices noxias Oliveo relinquit, quorum virus enecat Oleam. Hanc ita Quercum aversari Celsus quoque scribit, ut in scrobe posita, in qua Quercus crevit, non vivat. Et Plin. Olea ubi Quercus effossa sit, male ponitur: quoniam vermes qui Rauce [leg. Erucæ ex Theoph.] vocantur, in radice Quercus nascuntur & transeunt. Et si Olea confitum in confinio Quercetum habuerit, non solum non feret, sed etiam fugiet, introrsumque se in fundum abiiciet, si Hermol. credimus. Et rursus alibi Plin. Quercus & Olea tam pertinaci odio dissident, ut altera in alterius scrobe depasta moriantur.

Glaciosum Oleis solum aptissimum in Venetia, pinguisimum in Batica. Nec omittenda quæ Plinius Græcus scriptor Cædoporus de Oleæ loco natali prodidit. Aer inquit calidus & siccus Oleæ commodus est, quod ipsum in Libya & Cilicia videre est, & provenientibus in ipsis Oleis. Auxiliantur autem ad aeris commoditatem, etiam terræ figuræ acclives & altæ. In talibus enim propterea quoddam superexcellens solis ardor à ventis perfrigeratur, optimum Oleum provenit, & ejusmodi quale Omphacium & Omotibes appellatum præparatur. Quæ verò in Campesribus sunt Oleæ, & minus à ventis moventur, & vehementius à sole incumbente aduruntur, atque propterea crassum Oleum remittunt.

In universum autem observandum, quod venti non plantas modò, sed omnia vivificant, quemadmodum vehementes & impetuosus venti omnibus sunt contrarii. In totum verò plantis quidem maximè omnibus, præcipuè verò Oleæ conferunt. Virides igitur potissimum illas Olearum plantas reperies, ad quas venti status ingreditur, latis spatibus in medio plantarum relictis, per quæ ventus liberè inspirare potest. Ob id enim & ardua & acclivia loca Oleæ valdè commoda esse diximus, quoddam videlicet semper ventum tepidum suscipiunt, ut nihil præterspirare possit, sed æqualiter per singulas arbores penetrare, ipsiusque plantæ augmentum excitare ac eâ connutrire. Humidior sanè terra floridiores & pingviores Oleas producit, ob quam causam, hæc terra præferenda est. Secundum locum habet argilla alba. Tertium argilla dura. At verò profundam terram non laudamus, neque item rubram. Calida enim existens plantas comburit. Multò verò magis fugienda est defossa. Fru-

Tota. VI

um enim macrum fert, & germen equosum. Aptissima autem est Oleis terra tenuis, cui testimonium Attica præbet. In Cyrenensi agro, autore Theoph. Olea optimè prodit, Oleumque plurimum fit: Circa agrum Thebanum quoque Olea gignitur, non aquis fluvij rigua: (distat enim plusquam trecentis stadiis) sed manantibus spontè aquis: multi enim fontes in eo sunt tractu. Ipsum verò Oleum nihilo deterius nostratè, nisi quoddam deterius olet, quoniam naturà sale rardè utantur.

Oleam porò Theophrastus [ut refert Plin.] de celeberrimis Græcorum autoribus urbis Romæ anno circiter ccccxi. negavit nisi intra xl. [xl. Colum. & M.] passuum à mari nasci: Fenestella verò omnino non fuisse in Italia, Hispania atque Africa, Tarquinio Prisco regnante ab annis populæ Rom. c. lxxxiii. Quæ nunc pervenit trans Alpes quoque & in Gallias Hispaniæque medias. Verbis quidem anno dv. Appio Claudio Cæciliopote, l. Junio Cos. Olei libræ duodenæ [duodenis. Vet.] assib. veniêre. Et mox dc. lxxx. M. Scius [aliis Seruius] L. F. Edilis curulis Olei denas libras singulis assib. præstitit populo Rom. per totum annum.

Minus ea miretur, qui sciat post annos xx. Cn. Pompei iiii. Consulatu Oleum provinciis Italianæ misisse. Hesiodus quoque in primis cultum agrorum docendam arbitratus vitam, negavit Oleæ satorem fructum ex ea percepisse quengquam. Tam tarda tunc res erat. At nunc etiam in plantariis ferunt, translatarumque altero anno decerpuntur bacce.

Fabianus negat provenire in frigidissimis Oleam, neque in calidissimis. Hæc tamen etiam in solo & cælo Septentrionali, sed fronde flaccidiore, latiore & ferè saligna, ubi nihilosecius perennis vitonis est, sicut Londini in Cæcilij viroto operis & stirpium novitate visendo, ut annotarunt Adu. Stutgardie in horto, si quis alius in Germania, regio, plures & pulchras videas arbores, nec exiguas etiam Basil. in horto D. D. Plateri. Sed & nos aliquando aluimus Montbel. Verum hyeme reponenda in omnibus his dictis locis frigidioribus.

Alioqui eius lucos perennes densissimos & æternissimos alunt apricæ tepidiores convalles Hispaniæ, Gallici provinciæ & Narbonæ. In Italia nihil eâ frequentius. Bellonius in Lemno paucas Oleas reperiri scribit, in hortis verò Cretæ colit, atque in Syria lætas provenire, ut & in agro Hierosolymitano.

Mons ille altus, indytus & sanctus vocatus, & regione Hierusalem ad Orientem situs, in cuius vertice Rex David à facie filij sui Absalon fugiens, flens & nudis pedibus Deum adoravit. In quo filius ejus Salomon omnis pietatis oblitus, Astroth idolo Sidoniorum (è regione Hierosolymitani Templi ex quo omnis quæ ibi peragebatur idololatria prospici poterat) Fanum erexit: Et quem Christus orationis & quietis gratia sæpe frequentavit, atque è cuius summitate in cælum ascendit: palmis quidem, myrtis aliisque fructiferis arboribus abundabat: sed tamen ab ubertate frequentium in eo crescentium Olivarum, M. n. Oliveri & mons Olivarum, Latinis: Græcis verò ὄρος ἐλαιῶν dictus est.

Plurimæ circa Benacum nascuntur: multæ etiam circa Roboretum apud confederatos Helvetiorum Rhatos: prope sæ ultra alpes, Insu briam versus.

Olea florentibus iam Pupicis germinat. Concipit Vergiliarum exortu. Hoc tempus est. Floret autem paulò seriùs quàm Vitis, quæ Sol-

stitio floret. Desflorescunt omnia septenis diebus, non celerius: quædam tardius, sed nulla pluribus bis septenis. Omnia intra viii. Idus Iulij, Etetiarum præcurfu. Nec statim fructus sequitur in aliquibus. Hæc Plin.

Tempus.

Junio mense magna ex parte omnes Oleæ florent: sed in Germania & locis Septentrionalibus tardius, ubi quavis diligentissime colatur Olea, nihil præter florem, producit, idque in calidiori ejus parte. Baccæ decerpuntur Novembri ac Decembri. In Granatensi regno, teste Clus. primùm Februario colligitur Oliva, plerisque verò Hispaniæ locis Decembri, ut & in Gallia Narbonensi. Hi quidem perticis decutiunt, illi autem rarissime, sed potius ad motis scalis manu legunt, ne sequentis anni spem decussis germinibus præcipiant: Vehementer enim laborant Oleæ percussæ, & detrimentum capiunt.

Legendi modus.

Sequamus igitur M. Varronis consiliū sic præcipientis: De Oliveto, Oleam quam manu tangere possis è terra aut scalis legere oportet potius, quàm quatere, quoddæ, quæ vapulavit inarescit, nec dat tantum Olei quæ manu stricta. Melior ea, quæ digitis nudis legatur, quàm illa, quæ cum digitalibus durities. n. eorum non solum stringit baccam, sed etiam ramos glubit, ac relinquit ad gelicidium deductos. Quæ manu tangi non poterūt, ita quati debent, ut arundine potius, quàm pertica feriantur: gravior enim plaga medicum querit. Qui quatit, ne adversam cedat, sæpe enim ita percussa Olea secum defert de ramulo partem, quo factō, fructum amittunt posteri anni, ut hæc non minima causa, quoddæ, quæta dicantur alternis annis non ferre fructus, aut non æquè magnos. Hæc ille. Hinc Plin. Qui perticis, inquit, decutiunt Olivas, cum injuria arborum, sequentisque anni damno id faciunt. Quippe Olivanti bus lex antiquissima fuit: Oleam ne stringito, nè verberato. Qui cauissime agunt, arundine levi ictu, nec adversos percutiunt ramos. Sic quoque alternare fructus cogitur decussis germinibus. Nec minus, si expectetur ut cadat.

Lex Olivarum.

*Colligendi tempus: & quæ de-
bitur.*

Hærendo enim ultra suum tempus, absumunt venientibus alimentum, & detinent locum. Argumentum est, quoddæ, nisi ante Favonium collectæ, novas vires resumunt, & difficilius cadunt. Prima ergo ab autumnō colligitur, vitio operæ, non naturæ, Pausia, cui plurimum carnis: mox Orchites, cui Olei: post Radius. Has enim ocysissime occupas, quia sunt tenerissimæ, amurca cogit decidere. Differuntur verò etiam in Martium mentem Callosæ, contra humorem pugnaces, ob idque minime, Licinia, Cominia, Côtia, Sergia, quæ Sabini Regiam vocant, non ante Favonij afflatum nigrescentes, hoc est, ad vi. Idus Febr. Tunc arbitrantur eas maturefcere. Et quoniam probatissimum ex iis fiat Oleum, accedere etiam ratio pravitati [pravè judicantium hominum opinionioni n.] videtur. Feruntque frigore (exactè hiemis, qua memorata Olivarum genera non colliguntur n.) sterilitatem [suavitatem n. quæ lectio melius placet.] fieri, sicut copiam maturitate) cum sit illa bonitas non temporis, sed generis tardè [tarditate n.] putrescentium in amurcam.

*Quomodo
et quando
vindemiare
arque Oleas
legere oportet.*

Optima autem ætas ad decerpendum inter copiam bonitatemque, incipiente bacca nigrescere. Sed quando & quomodo vindemiare, atque Oleas legere oporteat, omnium familiarissime nobis videtur tradidisse apud Cels. Constant. Paxamus Geoponicus Græcus, sic tradens. Tempus ad Olei communis confectionem accommodatum est, quando major pars dimidij fructus apparuerit

nigrescens. Accelerare autem confectionem convenit, antequam glacies congelectur: facillius enim & copiosiores satus exhibebunt. Collectio ipsi fructus faciendæ est sereno tempore, & minime pluvioso. Nam humectum germen imbecillius fit & facile frangitur. Ob quam causam neque minutis imbrium guttis delabentibus, ramos movere oportet, neque fructum auferre, pnuquam omnis humiditas ab arboribus sit disculsa. Si verò lutosum sit solum, stramenta aut storias, aut tale quiddam subternito. Si verò nihil ejusmodi adsit, Olivas aqua calida lavare convenit: post purificationem enim, fructum amplius reperiemus. Quapropter, etiam si non inquinentur luto, si fieri id potest, lavandæ sunt ex calida aqua. Quidam rectè faciunt, qui solum manibus ramos quatunt, ut fructus excutiantur. Virgam autem Oleæ non admovent, quoniam in posterum minus fructuosa inde evadit. Sed & ipse fructus violenter delapsus lauiatur, lapides, aut duras glebas offendens: & terræ qualitas contracta, ipsum Oleum terreum faciet. Triangularia igitur scabellâ preparare oportet, & latam tabulam superne imponere, ut in ipsa stantes Olivas decerpant. Sed ad arboris historiam redeamus.

Oleam Theoph. diurnam dicit vitamque ci-
ducentos abnos longissimam esse tradidit. Quare
Virg. Georg. 2.

Difficiles primùm terra calidæque maligni

Tenui ubi argilla: & dum sis calculus arvis.

Palladia gaudet silva vivacis Oliva.

Et alibi: prolem tardè crescentis Olive, dixit. Nam lentè admodum crescit. Ideo difficilem auferre d-
xit Theoph. & Plin. firmissimas ad vivendum Oleas dixit, ut quas durare annis c. c. inter autores conveniat.

Hanc in crescendo cinere è calcariis fornacibus maximè advivari Costarus ait esse observatum.

Olea omnibus provenit modis, inquit Theopl. præterquam furculo. Defixa enim nequit germinare. Olive nucleū aliquoties sevimus, sed irrita spe. Tradit tamen Theoph. sylvestrem Oleam ex sativæ nucleo nasci. At quæ custodienda in Olearum cultura Cato judicaverit, ipsius verbis, si cui Plinium, optime præcipiemus. Taleas Oleagineas, quas in scrobe saturus eris, tripedaneas decido, diligenterque tractato, ne liber laboret, cum dolabis aut scabis. Quas in seminario saturus eris, pedales facito, easque sic inserito. Locus bipalio subactus sit, benèque terra tenera glutus. Cum taleam demittis, pede tantum opprimito: Si parum descendat, malleolo aut mateola adigito, ceteròque ne librum scindas. Cum adigis, palo prius locum feceris, quo taleam demittas: & ita si severis, utilis fiet talea, meliusque vivet. Et ubi trime sunt, tum denique curæ sint ubi liber se vertet. Si in scrobibus aut in sulcis seras, ternas taleas ponito, easque divaricato supra terram, ne plus quatuor digitos transversos emineant, vel oculos tentito. Seminarium ad hunc modum facito. Lo unquam optimum & aperitissimum & stercoretissimum poteris, & quantum illimum terræ ubi semina positurus eris: & ut ne longius semina ex seminario ferantur: cum locū bipalio vortito, delapidatoque & circumscripto, & in ordine serito, in h. quipedem quinquovorsum taleam demittito, opprimitoque pede. Et si parum deprimere poteris, malleo aut mateola adigito, digitum supra terram facito, semina emineant, humoque bubulo summam taleam oblinito, signumque apud taleam apponito, crebroque saturo. Diligenter
[addit

Tempus ferre. I addit Plin. exire Oleam oportet, & radices quamplurimas cum terra ferre. Vbi radices bene operueris, calcare bene, ne quid noceat. Si quis quærat, quod tempus Oleæ ferendæ sit, Agro sicco per Sementem, agro lato per Ver. Cato in Calido & pingui solo Radium majorem, Salentinam, Orchitem: Pauliam, Sergianam, Cominianam, Albiteram feri jubet. In frigido autem & macro Lici-
Plin. in colle & stercis, & argilla, inter autum-
nam & brumam feri iussit. In crasso, aut hu-
mido, aut subriguo, à mense ad brumam. Quod præcepisse eum Africæ intelligitur. Italia quidem nunc Vere maximè ferit. Sed si & autumno libeat, post æquinoctium x. diebus ad Virgiliarum oc-
casum. xiiii. soli dies sunt, quibus feri noceat. Græci Oleas plantandas præcipiunt à Secularum occasu usque ad solstitium hybernum, hoc est, à 15. Novembriis, usque ad 8. Decembriis. Plantandas tamen & in Vere suadent, quod se mutuo imitentur hæc tempora, humidum habentia & calidum. Autumnus enim calidam adhuc terram habet à sole, humiditatem à pluviis prægressis: assumit au-
tem caliditatem à solari accessione.

Oportet autem Olearum plantas à commodis locis, & arboribus novellis, quæ singulis annis fructum ferunt, desumptas esse, crassitudinem habentes rami, aut crassiores, leuissimæ ac re-
ctas esse.

Multis porro modis Olea plantantur. Quidam à scytalis plantant: acceptis enim ramis crassioribus, & his in magnitudinem cubitalem confectis, ita plantant. Quidam à taleis plantant hoc modo. Ramos crassiores in magnitudinē cubitorum duo-
rum conficiunt, & in fundum scrobis lapidem la-
torem immittunt, deinde plantam super ipso re-
ctam statuunt, ac terra adobruunt. Alij generosissimas propagines unā cum trunco plantant. Alij plantas, quas accepturi sunt in ipso adhuc trunco existentes falce circumpurgant, & circa Arcturi or-
tum in scrobe imponunt. Alij Tropea appellata plantant hoc modo. Rubrica notant situm ad O-
rientem & Meridiem, & de trunco resecant ad longitudinem cubitorum quatuor, sive quinque, & in scrobes immittunt, aliam omnem diligen-
tiam adhibentes. Hic modus plantationis citius vivificat, & citius fructum producit. Quidam à truncis plantant sic. Concidunt truncos ipsos in stipites majusculos, eosque scrobi imponunt, corticem sursum versus habentes, & aggregata terra stercore mixto ad palmi altitudinem sinunt. Qui-
dam ex partibus trunci in terra, segmenta quatuor palmorum magnitudine, unā cum cortice excin-
dunt, & lapidem in fundum scrobis permittunt, & circū hunc tres aut quatuor segmenta ponunt, & ad palmi altitudinem obruunt. Quocunque au-
tem plantationis modo ipsa plantatio fiat, cum terra quæ plantanda sunt, secantur, observandum est diligenter & cavendum, ne cortex dilanietur. Acuta etiā falce celsura leviter facta, cortice illaso & incoctum conservato, stercore quoque hubu-
lo admixto, cinere infernam rami partem illine-
mus. Et in primis vitandū est, ne secundum verti-
cem in verius ramus pangatur. Torquebimus e-
nim plantam, si secundū verticem plantaverimus.

Oportet autem & stercus in scrobes injicere. Omne autem stercus Oleæ aptum est, præter hu-
manum. Convenit autem nos ad radices injicere ipsum stercus, sed paulò longius à trunco. Ster-

coratio autem Oleæ quarto aut quinto quoque anno fiat.

Nunc de infusione. Africæ scribit Plinius pecu-
liare esse Oleastro inferere: senescentemque ad-
optivas virgas, quoties opus sit, proximè emitte-
re: quibus iterum juvenescat: ut avis eadem Oliveta consistat: sic enim intelligendus obscu-
rus ille Plinij locus, quem Dal. ipse non satis per-
spicuum reddidisse videtur. Pallad. de infusioni-
bus libellor, non tantum Oleastro, sed & Robori, inferi (quod mirum) docet hoc carmine.

*Robora Palladij decorant sylvestria rami,
Nobilis ac parvus, bacca superba feror.
Fecundas sterilis pingues Oleaster Olivas,
Et quæ lora novis munera ferre docet.*

Per Robora sylvestria stipitem Oleastri hic in-
telligi licentia poetica censemus, quasi stipitem
& sustinemus. Vix enim verisimile nobis sit, un-
quam Robur sive Quercum societatem inturam
aut, ut verius dicamus, colitatem cum Olea, præ-
sertim cum Quercus tam inimica sit Oleæ, ut antè
demonstratum. Adde quod hujus conjugij nul-
lus alius meminit, ac ne Palladius quidem ipse alio
loco.

Inferitur autem calamo & inoculatione. Idem
modum præscribit hunc. Mense Aprili iocis tem-
peratis, inferatur Oligia inter corticem more Po-
morum. Sed ut Oleastro inferas, contra illud,
quod ex Oliveto infuso, & casu incenso renascitur
Oleaster infelix, sic providendum est. Positis
prius Oleastri brachiis in scrobe, in qua dispo-
nemus inferere, scrobes ita replebimus, ut medix va-
cua fiat. Cum comprehenderit Oleaster infe-
remus in infuso, vel infusum ponemus, & infu-
sionem probè infra terram nutriemus. Deinde
sicut adolescit, terram subinde colligimus. Ita
commisura in profundo latente quisquis urit
aut cedit, Olivæ locum non aufert pullulan-
di, quæ & apertam redeundi felicitatem de Olea,
& occultam valendi feracitatem de Oleastri con-
nexionem reunebit.

Aliqui Oleas in radicibus inferunt, & ubi com-
prehenderit, cum aliqua parte radicis avelhant, &
transferunt more plantarum.

Græci Oleas ab VIII. Cal. Aprilium, usque ad
III. Non. Julij, inferi debere præcipiunt, ita
ut locis frigidis serius, calidis maturius inferantur.

Verum ex qua arbore inferere voles, & surculos
ad infusionem sumpturus es, videto ut sit tenera, &
ferax, nodisq; crebris. Et cum primum germina em-
bebunt de ramulis anniculis, qui solis ortum
spectabunt, & integri erunt, eos legitos, crassitudi-
ne digiti minimi. Surculi sint bifurci, vel trifurci.
Arborem, quam inferere voles, terra diligenter
exsecato ea parte, qua maximè nitida, & sine cic-
trice est, dabisque operam ne librum lædas. Cum
deinde truncum recidenis, acuto ferramento pla-
gam levato, deinde cuneum tenuem ferream,
vel nisseum inter corticem & materiam, ne nu-
mus digitos tres, sed consideratè demittito, ne læ-
das, aut rumpas corticem. Postea surculos quos
inferere voles, falce acuta ex una parte deradito
tantum, quantum cuneus demissus spatij dabit, ac-
que ita ne medullas, neve corucem aliamve par-
tem lædas. Vbi surculos paratos habueris, cu-
neum vellito, statimque surculos in ea foramina,
quæ cuneo adacto inter corticem & materiam fa-
ceris, demittito. Ea autem sine, qua adaleris, sur-
culos sic inferito, ut semi pede, nec amplius de ar-
bore extent. Supra deinde muscum imponito, &
ita ligato, ne pluvia dilabatur. Quosdam tamen
magis delectat in trunco arboris locum semantibus

Infusio.

*Plinius &
Dal. emend.*

*Inferendi
modus
tempus.*

*Ne infuso
ne nasci-
tur Olea-
ster.*

*Alii mo-
dos.*

*Surculi
Oleæ*

*Inferendi
modus in-
fuso, qui est
omnis, re-
liquos ar-
boribus ap-
tari potest.*

terra facere, in festā que partes tenui scalpello le-
uare, atque iā suuulos aptare: si puellam argente
inferere uoles, in unum abscondere, atque ita festo die
dā terra exte. Sed n̄ praescideris, ut iā diligenter
leuare, & mediū truncū acuto scalpello per n̄ sic
findito, ita ut fissura ligitorum trium sit in eunde
inde cuneum, quo d̄ ducatur, inferio, & sic uos
ex utroq; parte dextros demittito, sic ut librum se-
minis l bro arboris x qualem facias. Cū n̄ sur ul
diligenter aptaueris, cuneum exi uito, & arbo-
rem, ut n̄ x distum, alligato. Deinde terram cir-
ca arborem ad quater to usque ad ipsū n̄ inditum,
ea res ā vento & calore maxime tuchitur.

Hoc altissimum genus insitionis, cum sit subtilissimum, non minus generis arborum idoneum est, sed ferè nec parietalem insitionem, quæ humidum, succosum neque & validum corticem habent. Hæc Columella. Florentinus verd: Ex Oleis, aliz quidem tenui cortice prædiz sunt, alie verd crasso. Quæ igitur crassam libram & humidam habent, iuxta corticem insizantur: quæ verd tenuem & aridam non ipsam lignum. Tempus autem insitionis hujusmodi, à x. Cal. Jun. hoc est xxii. die mensis Maij, accesse, usque ad Iunias Calendas. Olez verd insiz multoties aqua rigandz sunt, quippe, quæ aridz existentes rigati desiderant.

Olea colla.
 nig. cum l'a
 non quod
 cunctis ex
 imperiam.

Ceterum exiguam admodum impensam ad sui cultum longèque minorem, quàm Vineæ, desiderat Olea, quæ primæ arborum est, ut prodidit Columel. Nam quamvis [eiusdem verba sunt omnia hæc de cultu] ~ō continuis annis, sed ferè altero quoque anno siu tum affrat, eximia tamen eius ratio est, quòd & levi cultu sustinetur; & cum se non inuit, vir ullam impensam poscit. Sed &, si quam recipit, sub nile succubus multiplicat, negle- & compluribus annis, non ut Vineæ deficit, sed eo ipsa tempore aliquid interim patrifamilias præstat, & eductiua cultura est, uno anno emendatur.

Cabana

Ergo facto & instituto Olearum seminario
biennio à potatione abstineri: tertio anno sin-
gulis seminibus binos ramulos relinqui, & fre-
quenter curari seminarium, curabitur. Quarto
anno ex duobus ramis inferior computandus est,
sic exul & quinquennio arbuscula habiles trans-
lationi sunt.

**Spande
transfere
da.**

Plantæ autem in Oliveto disponuntur optimè
ficcis, minimèque uliginosis agris per autumnum,
latis & humidis uerno tempore paulò antè quàm
germinant. Atque ipsi serotes quaternum pe-
dum præparantur anno antè: vel si tempus non
largitur, prius quàm deponantur arbores, stru-
mentis incenduntur serotes, ut eos ignis putres
faciat, quos sol & pruina scire debuerat. Spatium
inter ordines minimum esse debet pingui & fu-
mentario solo sexigenum pedum in alteram par-
tem atque in alteram quadragenum: macro, nec
idoneo segetibus, quaternum pedum. Sed in Fa-
lionum de gi ordines convenit, ut æstivo proflatu
refrigerentur.

And the
screams.

Ipſæ au em arbuſculæ hoc modo poſſunt trāſ-
ferri. Atrēquam explantes arbuſculam, rubrica
notato partem ejus que nendiem ſpectat, ut, en-
dem modo quo in ſeminario erat deponatur.
Dein ſc. ut arbuſculæ ipſæ ſimpliciter in circuitu
relinquantur, atque ita cum ſuo caſſite planta
exuatur. Qui caſſipes in eximendo ne reſoluatur,
modicos ſiniculos virgarum inier ſe cōnexus fa-
cere oportet, eoſque pilæ quæ eximitur applicare,
de viminibus ita innectere, ut cōſtricta terra ve-
lus incluſa teneatur.

Tum sinistra parte imale per pilam commo-
uere, & superius in angulis alligare, atque plantam
transfere. Quae antequam deponitur, oportet hic
in uisceribus in uim fodere uidentibus, deinde
etiam aratro subacta u (si ita non pinguior erit,
im nalu nus) in uicore, & ita hordei semina
ubsternere, & si conset in scrobibus aquae i om-
ni haurienda est, antequam demittantur arbores.
Inde ingerendi minuti lapides, vel glarea mista
pingui solo. depositisque seminibus latera scrobis
circuncidenda, & aliquid stercoreis interponen-
dam.

Quod si cum ea terra planta non convenit, tum
optimum est omni fronde privare truncum, atque
levatis plagis, sinuque & cinere obliis, in lero-
bem vel sulcum deponere.

Truncus autem apud translationem est, qui ber-
chij crassitudinem habet. Potest enim longè ma-
gis incrementi & robustioris trāsferrī: quæ res
convenit poni. ut, si periculum non à pecore ha-
beat, exigui admodum supererohem omnear-
zibus eum frundet. Si tamen incurtus pecoris
inter vitari non poterit, celsior truncus consti-
tuitur, ut sit innoxius ab injuria pecorum.

Arque etiam agendz sunt plantę in liscatis
necess. runt, nec nisi post biennium ferro tangen-
dz, ac primo furculari debent. ita ut simplex
stylus altitudinem maximi scrobis excedat, deinde
irando ne coxam botanięve partem corporis ef-
fendat.

Optimum est etiam constitutas plantas componere caucis, deinde constitutum iam & maturum Olivetum in duas partes dividere. quæ alteris annis fructu induuntur. Neque tamen Olea continuo biennio uberat.

Cum n. subjectus ager confectus non est, arbor col-
liculum agit. Cum n. leminibus repletur, fructum
affert. Ita sic di. isum Olivetum omnibus annis
equalem reditum adfert. Sed id minime his an-
no arari debet, & bibentibus alitè comfo-
dri.

Post Solstitium cūm terra aestibus hiat, curan-
dum est ne per rimas sol ad radices arborum pe-
netret. Post Aequinoctium autumnale ita sunt ar-
bores ablaqueandæ, ut à superiore parte, si Olca
inclivo sit, incilia exciterentur: quæ limosam a-
quam ad eandem deducant.

Omnis deinde soboles, quæ ex una stirpe natus
est, quotannis extirpanda est, ac tempore quoque, si-
mo pabulanda fuit Oleæ.

Sercus autumno debet injici, ut permittum
hyemi radices Olea calefaciat.

Amu. ca valentibus infundenda est: nam per
hyemem, si vermes, atque alia suberunt animalia,
hoc medicamentum necantur.

Plurimum enim locis siccis, & humidis arbo-
res multo inflorescunt, quæ nisi fermento re-
fecueris, nec fructus, nec frondem istam Olea in-
ducet.

Quin etiā compluribus aneis interpolitis Oli-
vetum putandum est: nam veteris proverbij au-
thenticitas convenit: Nam qui ait Olivetum, roga-
re fructum, qui stercore exorare, qui cedat coege-
re. Quod tamen si rescripto octavo anno fecisse, de
f. uctuarij rami tubinde: impetitur.

Solent et in quavis levi arbores interdum
fructum non afferre. Eas cerebrari convenit, ut
que in foramen viridem taleque Oleastri demitti
sic velut innata arbor, forcum de semine fertili
extat. Pauli aliter & trece alius Africanus, O
leam fertilem facere docet. Truncum inquit, ce
rebrat per totum crebrato, & acceptis ab alio
fructuoli

fructuosa Olea duobus ramulis, principia ramulorum ex utraque parte immitte, ac transfige, & apprehensis utroque ramulos fortiter attrahere.

Quum autem optimè fuerint adacti, & quasi incutuntur, sedondantia, ex utraque parte refeca, & lugeat, leito cavernas utrinque obline, & fiet Olea multum fructuosa, & quæ optimam producet Olivam, Oleumque præcellens.

Sed & sine ablaqueatione adjuvanda est, inquit Colum. Amurca insulsa cum suilla, vel nostra urina utere, cuius utriusque modus servatur. Nam maxime etiam arbori, ni tantundem aquæ miscetur, urina abunde erit.

fructuosa
fructuosa
fructuosa

Solent etiam vitio soli fructum Oleæ necare: cui rei sic molebitur. Alis gyris ablaqueamus eas, deinde calce pro magnitudine arboris plus minusve circumdabimus, sed minima arbor modicum postulat. Hoc remedium si nihil fuerit effectum, ad prædium insuoni confugiendum erit. Non defluet Olea, ut pollicetur Democritus, si sabam, quæ pedunculum habet acceptis cavernarumque cera occlusis, deinde accepta à radice gleba sabam in eam indideris, & sic eam operueris.

Tabo.

Naturæ
Naturæ
Naturæ

Nonnunquam etiam in Olea unus ramus ceteris aliquantò est lætior, quem nisi recideris, tota arbor contristabitur.

Parandi
Parandi
Parandi

Solent & fructus amittere Oleæ, si florentibus ingruat imber. Verum contra vim mortis non est medicamen.

Oleas putandi modum Cato hunc docet. Olivetum, inquit diebus xv. ante æquinoctium verum incipito putare. Ex eo dies xlv. rectè putabis. Id hoc modo putato. Quæ locus rectè ferax erit, quæ arida erunt. Et si quid ventus interfecerit, ea omnia eximit. Qui locus ferax non erit, eum plus confidit, id est, gentis sordidæ, subigito, aratro proscindito.] aratroque bene enocato, solumque leves facito. Circum Oleas autem non abluquato. [Hæc Plin. addit] & stercore addito. Qui Olivetum sapientissime & altissime miscabit, tenuissimas radices exarabit. Radices si sursum abibunt crassiores fient, & ed in radices vires Oleæ abibunt. Varro sanè Oleam post ablatum fructum putare suadet, neque putandum esse ait, ablatis manifestis & conspicuis magnitudinis ramis, pauciores fieri fructum. Multo enim copiosiores fructum ex recentium ramulorum ubertate producurum.

Vnde Palladius unoquoque anno sicca & fructuosa, & cum aliqua debilitate nascentia resecandi debere statuit.

Extrahere
Extrahere
Extrahere

Porrò Oleas in materiz multæ effusionem eluxuriantes & velut infantes, hoc est, folia quidem ferentes multa, fructum verò modicum, sic curabis. Paxillum Oleæ sylvæ autem, aut Quercus in radices arboris, aut etiam in radem impones.

Vi præ
Vi præ
Vi præ

Eis verò quæ multum fructum ferunt, non autem maturum faciunt, & florem malè perdunt, sic medeberis. Circumfodito truncum, & maioris Alge corbes duos, minoris, minus & runciice deinde amurcæ aqua potabili permixta quatuor congios singulis truncis affundere: quod si Alga haberi nequeat, sola amurca utere.

Contra be
Contra be
Contra be

At verò curam contra instantes bestias, & leones ex ambiente accedentes, in tractatu de Vitis universaliter docebitur.

Parandi
Parandi
Parandi

Quod si tamen arcentes radices & ærotantes animadvertes, vermiculos in fundo generatos causam iudicabis, quos multis quidem modis disperdere poteris, ut eo loco radetque.

Cilicis
Cilicis
Cilicis

Atque scille Oleæ peculiaris, & dictus, hoc est, quem alij Fungum & Patellam vo-

cant: Vnde lib. xvi. cap. 24. Plinius. Olea præter vermiculationem, quam æquè ac fœus, sentit, Clavum etiam patitur, sive Fungum placet dici, vel Patellam: hæc est solis quædam exustio, quamvis propter nimios imbres contrahi dicat Hermol. Videtur autem hoc ipsum esse, quod supra diximus ab Italis rusticis Ova vocari: sunt enim nodi.

Nulla post sicum arbor uredini magis obnoxia est.

Est & impetigo peculiaris ei morbus, ut scabitis Fico, & Vitis fluor. Remedium esse potest, cum nimia nutrimenti ubertas detrahatur.

Solet & mox post sationem Oleæ offidere frigus hyemis, corroscum enim detrahit: quapropter diligenter curanda.

Sed & ipse fructus Vermiculos sentit. Illi vel sub cute nascuntur, vel in ipso fructu augentur, nam caro non tangitur: cuius rei causas, & alia, vel his subtiliora excutiemus in opere de insectis.

Oleæ Arachnium eumque innascitur, hoc est, Aranea fructus absque vermis, tela ferulos, obvolvens: gignitur humiditate quadam æcis proximi.

Amicatur, & fructus, si germinetur ramis anniculis ingruentibus imbribus. Quoniam enim pabulum, eo fluit, antè quàm fructus vires conceperit, humore aggerato, mox germen profuit, & fructum proventus impeditur.

Atque in genere circa Vergilias (quæ octavo vel nono Maij oriri solent) quidem plueret, inimicissimum & Viti & Oleæ, teste Plin: quoniam, tunc coitus est earum. Hoc est illud quatuoriduum Oleis decretorium, hic articulus nubili spurca, quod diximus.

Olivam lambendo quoque sterili fieri, auctor est Varro: eaque de causa Minervæ non immolabantur, nec in arcem Athenis agebantur capra præterquam semel ad necessarium sacrificium: ne Oleam ibi primum editam, (de qua antea) violarent.

Et quæ quoque alia frondem, alia florem Olivarum (ut in Mileto) erodunt: ac depastam arborem turpi facie relinquunt.

Olea tamen, solis amissis fructificavit, inquit Theoph. sed interzara & ostrea refert. Nonnunquam [addit idem] ratione hyemis, aut alias ob causas quædam accidunt, quæ ordini naturæ, incongrua iudicantur, cum tamè non ita sit: Vt Olea penitus aliquando adusta, regerminavit tota. In Bæotia verò germinibus omnibus à locustis detosis, iterum germinavit. Sed hæc handquaquam pro absurdis haberi forsitan debent, quippe, quorum manifestæ causæ reddi possint.

Novellæ quoque Oleæ pereunt ex fertilitate, quod prius, quàm perficiantur, alientum incrementum sui ad sustentandum consumant.

Evenit etiam, ut cum Oleæ bonè germinant, malè fructificent: cumque bonè fructificant malè germinant: inquam natura utrique satisfacere non valeat: sed necesse habeat assumere alterum, ut alterum faciat.

Oleæ quoque Gongros à quibusdam vocatos habere, vel aliquid Gongris simile, propriissimum enim huic illud nomen, quod, hoc morbo magis quam ceteræ arbores, laborare videatur. Premnon etiam quidam vocant id vitium alij Crotonam, alij alio nomine. Id vitium rectis, & unica radice nitentibus, ab imo stolones non mittentibus, aut nullo pacto, aut minime, accidere solet.

Oleæ verò & Oleaster, has caudicum contavitates peculiariter habere videntur. Hæc Theophr.

Vnde colligimus *scilla*, seu *scilla*, seu *scilla*, apud eundem dici hiantes in arborum truncis & caudicibus, maxime Olearum. fissuras, quam rem sejunct admodum nostri grammatici intellexisse videntur. Has igitur plagas contegendas præcipit alibi, ne sol aut imber intro penetraret: Nam, inquit, si id acciderit, morbi contrahendi periculum imminet. Circumdant alij luto tantum: alij scilla subdita lutum superimponunt, & testam adijciunt. Scilla enim plantam viridem servat: lutum scillam: testa lutum tueatur.

scilla.

Idem denique

Idem denique diversis in locis inculcat: Oleas præfatas meliores reddi: easdem præcipue exigere ablaqueationem: & amare putationem, purgationemque.

Sed hætenus de situ, cultu, & vitis Oleæ. Plura qui volet consulat Geoponicos. Putamus tamen pleraque eorum in compendium redacta.

Mutatio Oleæ in Oleastrum.

Illæ affectio non omittenda qua Oleaster in Oleam, & hæc rursus in illum migrat. Vnde Theoph. Spontaneas quoque mutationes interdum fieri aiunt fructuum, & nonnunquam arborum integrarum: quas quidem Haruspices [*scilla*] ostenta [*scilla*] esse existimant, ut (quod detentus) fieri ex Olea Oleastrum: & invicem (quod raro evenit) ex Oleastro Oleam. Omnino autem neglectam Oleam in Oleastrum migrare observavit posteritas, ut specialius dicetur in Oleastro.

Olivæ flores.

Plinius sibi contradi-

Olivæ flores ab apibus non attingi scribit Plinius, lib. 21. cap. 12. Oleamque à favis procul esse vult: alibi vero id vanum statuit, atque aliquas Oleas quam proximè feri convenire dicit, quæ evolutum examina invitent, nec longius abire patiantur: ex quo constat, quam sibi parum constet. Olivarum autem proventu plurima examina gigni certum est. Verum, utra sententia verior sit, iudicabunt, qui Olivæ adhabitant.

Idem denique

Maximam esse inter Oleam & Quercum [*scilla*] diximus supra: at Oleam & Myrtum aded annas inter se tradit Theoph. ut eas mutuo complexu radicum gaudere, virgasque Myrti per brachia Oleæ, prorepere atque dispergi ex Andronio referat: nec aliud iuxta Oleam feri velit.

Oleæ faciem dicitur.

Nunc quomodo Oleum fieri debeat ex præstantissimum Geoponicorum doctrina tradendum. Tam magnam artem Oleum, quam multa temperandi esse dicit Plinius. Ex eadem quippe Oliva differunt succi. Primum omnium, à cruda atque nondum inchoata maturitate, Omphacinum vocant. Viride Cato.

Omphacinum.

Hoc præstantissimum. Quin & ex eo prima vnda præli laudatissima, ac deinde per diminutiones. Quantò maturior bacca, tantò pinguior succus, minusque gratus. Optimæ autem ætas ad decerpendum, inter copiam bonitatemque, incipiente bacca nigrescere. Amurca color est, qui Olivam cogit nigrescere. Ideoque, incipiente nigritia minimum amurca, ante eam nihil. Et [inquit Plin.] Error hominū fallus. 1. Existimantium maturitatis initium, quod est vini proximum. 2. Quod Oleum crescere Olive carne arbitrantur, cum succus omnis in corpus abeat, lignumque intus grandescat, ergo tum maxime rigantur. Quod, ubi cura multa sive in bribus accidis, Oleum absumitur: nisi consecuta serenitate, quæ corpus extenuet. Omnino enim ut Theophrasto placet] est Olei causa calor, quæ & in torcularibus, & in colli multo igne queritur. Tertia culpa est in parsimonia, quoniam propter impensum decerpenti, expectatur ut decidat. Similis, atque collectam servandi in tabulato: nec prius

Quædam plerumque error.

quam sudet premendi, cum omni mora Oleum decreseat: amurca appetatur. Itaque vulgò non amplius senas libras singulis modis exprimi dicunt. Amurca mensuram nemo agit, quanto copiosior reperitur in eodem genere, diebus adiectis.

Cæterum & Cato tradit, Oleum quam acerbissimum Oliuæ optimum fieri. Hoc Omphacinum Greci vocant. Verum, quamprimum ex terra colligendam: si inquinata sit lavandam, à foliis & stercore purgandam. Postidie aut post diuturnum, quam lecta sit, premendam. Si gelent frigora, die quarta. Hanc, si volet quis, & sale aspergi posse. Oleum in tabulato minui, deteriusque fieri. Idem & in amurca & fratribus. Hæc sunt carnes, & inde fæces. Quare sæpius die decapulandum: præterea in conchas & plumbeas cortinas: ære vitari. Ferventibus omnia ea fieri clausisque torcularibus, & quam minime ventilatis.

Omphacinum seu Omphacinum dicitur.

Inprimis præcipit, quam calidissimam etiam habere cellam. Quæ de causa è nucleis ipsarum ignem aptissimum. Et è cortinis in labra fundendum, ut fraces & amurca liquentur. Vasa crebrius mundanda, fiscinas spongia tergendas, ut quam maxime pura sinceritas constet. Postea inventum, ut lavarentur, utique ferventia aqua: protinus prælo subijcerentur solida (ita enim amurca exprimitur) mox trapetis fractæ premellentur. Premi plus quam centenos modios non probant. Factus vocatur. Factum enim appellabant Geoponici, quantum Olei unæ torculi expressione, exprimi poterat. Quod verò post molam primum, est Flos. Factus tergeminos ferè à quaternis hominibus nocte ac die premi iustum est.

Sic Cato & ex eo Plin. Quæ paulo familiarius exposuerunt Varro & Columella. Ex omnibus his Ruellius & Cuius, qui huic ævo adaptarunt. Res eò redit. Quamminimùm Olivas manibus ex arbore districas & diligenter repurgatas in terra & tabulato relinquendas. Celeriter enim concalescunt, prævia quadam ad putredinem alteratione. At Factores [Factores dicti, qui Oleum faciebant & torculum movebant, ut ipsa expressio fieret] desiderant, ut multum sint in tabulato, & fracidæ fiant, ut facilius liquecant. Quod sanè si ita fiat, & minus fiet Olei, & deterius. Omni quippe hora Oleum decrescit, augetur amurca, quæ Oleo maxime contraria. Quæ si in bacca remanserit, Olei saporem utique corrumpet.

Agricolarum autem plerique si diu bacca stent in tabulato sub tecto, Oleum crescere sibi persuaserunt: quod falsum, quam in arca crescere frumenta. Quod mendacium Cato refellit, tradens, in tabulato corrumpi Olivam, & minus fieri. Ideo cum Facti unius mensuram rusticus sub tecto reposuerit, & post multos dies eam premere desideraverit, oblitus prioris mensuræ, quam intulerat, ex alio acervo similiter seposito, quantum cuique mensuræ defuit, supplet. Eoque facto, videtur plus Olei quieti quam recens bacca reddere: cum longè plures modios acceperit. Attamen, si id maxime verum esset, nihilominus ex pretio viridis Olei plus mali, quam ex multitudine contraheretur, quod & Cato dicit. Et si quidem, quid ponderis, aut mensuræ Oleo accedit, si portionem velis in Factum adiecta bacca computare, non proventum, sed detrimentum senties. Quapropter dubitare non debemus, Olivam loqui, prius quoque tempore premens

dant

dam. Ergo ut primò in districti fuerit Oliva, substratis tegetibus, aut pannis, expandi aut eibrari debet, quò aquositas ex ipsis resiccet, & à solis ac virgultis repurgetur. Hæc enim commissa, Olei diuturnitati obsunt. Tum diligenter mundata protinus in torcular deferri, & integra in fideis novis includi, prælisque subici, ut quantum possit paulisper exprimatur. Postea resolutus corticulis enoliri debebunt, adiectis binis sextariis integri salis in singulos modios. Quod defluerit in labrum, protinus decapulator depleat, & in fistula labra, hinculsi præparata, defundat. Hoc enim suavisimum est, & tenuissimum. Nam æreis & plumbeis vitatur Oleum. Longè melioris saporis est Oleum, quod minore vi præli quasi lixivium defluerit. namque si nuclei confringantur, olei saporem vitiant. Cùm vero paululum consistet, subinde decapulandum est, quamvis Cato his tantum in die præcepit. Nam quò sæpius translatione illa ventilatur, tanto magis eliquescit & amurcæ liberatur, cui quò

Sal.

Cautio.

Olei cum amurca congelati resoluendi ratio.

Sal non miscetur Oleo.

Quomodo exasperata bacca oleum pro bacum reddant. Tres gradus olei.

Tortium oleum.

Olei in modo ut tollenda. Frigidum oleum ut emendandum. Sordens ut corrigend. Nam pino.

diutius hæret, eò deterius fit. Solet etiam cum amurca frigoribus congelari: tum inspersus sal coctus resolvit Oleum, & separat ab omni vitio. Si ne sic quidem resoluatur, præsertim cùm maiora frigora inceserint, nigrum torretur, & contritum inspergitur. Ea res eliquat amurcam, quæ inimicissima est Oleo, & si remanserit in eo, saporem eius corrumpit. Neque verendum est ne falsam fiat: nam quantumcunque salis adieceris, nunquam saporem eius recipiet Oleum. Debet itaque Oleum Cibarium fieri protinus usitata de olivæ bacca. Minus probatur oleum ex oliva quæ decidit, vel tempestatibus aut pluviis in lutum defluxit: nam immunditiarum saporem trahit. Quare ad præsidium aquæ calidæ decurritur, quæ immundæ bæccæ prius eluantur, quam molæ aut torculari credantur. Habes igitur veluti tres gradus Olei. Primum & nobilissimum, quod sponte vel minore pressuræ vi, quasi lixivium defluerit. Hoc scotini ad servator. Secundum, quod ex reliquis fraccibus premitur, sed paulò graviori pondere & mole fortiore quasiuntur. Hoc tortium non malè dixeris Oleum, quod, velut secundæ pressuræ, privatim in alia vasa transmittitur. Hac iteratione invalidius, sed tertiatione multò deterius oleum exit. sed utrobique decapulandum, & oleagineæ rude movendum, & ab amurca, seu aquosa sanie, repurgandum. Vbi oleum in labris paululum consistit, denud in alia vel vitrea vel vitreata transferendum, ut à sanie illa, aqua, quæ subidet, penitus repurgetur. Imò sæpius iteranda, ut dictum, hæc translatio, donec mundum admodum & sincerum evadat. Sed plurimum refert non miscere iterationem cum prima pressuræ, quæ longè melioris saporis est: tantòque minus tertiationem. Vitreata vasa omnium optima sunt ad hanc rem, vitrum enim Oleum maximè conservat, quippe, cùm frigore lætetur Olei natura. De olearia cella, torculari, & reliquo apparatu ad hanc rem necessario instituendo, consule superscriptos Geoponicos, maximè Columellam lib. 12. c. 50. & alibi passim.

Cæterum, multa incommoda oleo vel nuper factò, vel dum fit, vel deinceps ætate solent accidere. Quod gelatur, plerumque fracescit. Cui præscriptis præsidis, sale & nitro commodè obsteremus. Sordenti quoque frictos & adhuc calentes sales Tarentinus iniici suadet, & diligenter operiri: ita mundum, reddi brevi tempore promittit. Oleum quoque sordidum purgat Pineæ pux, quæ igni candens, oleo reslinguatur. Emun-

Tom. I.

dat & citri radix in Oleum demerita. Oleum quod suis fraccibus torridis fuerit inustum, limpidius eliquescit. Oleum rancidum idem pollicetur corrigi, si cera alba mundo & optimo Oleo resoluta, & adhuc coctura liquens, in oleum mittatur, & mox sales fricti calentes addantur: sic fieri, ut Oleum purgetur, sapore & odore murato, sunt qui & sole vel igni, aut etiam aqua fervente simul in vasculo mixta restitui posse asserunt.

Item. Non rancescere Oleum in quo prius anisum maduerit. Si graue oleat, præcipit idem virides Oleas sine ossibus tur di, & in vasa per solis calorem mitti: si bæccæ defuerint, tales tenuissimos Oleæ similiter esse tundendos. Nonnulli utraque permiscunt, adiecto etiam sale, sed omnia inter linteum clausa suspendunt, atque ita in vas Olei demittunt, postea tribus diebus exactis auferunt, & agientes, ubi conquiescit in alia vasa transferunt. Alij immittunt vetustum laterem torrefactum. Quidam panes hordeaceos breuiter friatos, & raro linteolo inuolutos, immergunt, & novos deinde permurant: Vbi hoc bis aut ter fecerunt, salis callos aut micæ iniiciunt, & in alia vasa translatum paucos dies subsidere permittunt. Quod si mus, aut aliud fortè animal deciderit, & Oleum putri nidore vitaverit, habet Democritus Coriandri manipulum in Oleum suspendere in aliquot dies. Si nihil remiserit nidor, denud nouo Coriandro iterandum, donec expellatur nidor. Quidam in umbra prius exsiccatum inficiunt. Alij Fœnumgræcum idem in sole siccatum in vasa mittunt. Præstat autem carbones ignitos ligni Oleaginei in Oleo exstinguere. Alij uvas passas demptis vinaceis tulas inmittunt, & post decem dies rursus exemptas exprimunt & Oleum in aliud vas transfundunt.

Si acerbus odor fuerit, uvæ recementa præcipiunt Græci tusa, & in massam redacta mersari. Si Oleum turbulentia vexet, Tarentinus vul in fidelia oris ampli coniectum oleum inservescere, tenuissimumque sale frictum inspergi, & ubi subtiliter, spureum Oleum elutriari. Oleum Istrico aut Liburnico simile fieri promittunt Græci, si in viridi Oleo, quod omphacinum vocant, aut alias optimo, Enulam siccam & Lauri folia, & Cyperum aridum omnia videli et tusa, & subtiliter creta permisceas cum salibus torrefactis ac tritis, & diu Oleo iniecta perturbas dein tribus aut pluribus decursis diebus, cùm quieverit, utaris. Hoc est oleum Liburnicum appellatum, & ipsum adeò Istrium. Damegeron Oleum Hispano simile faciebat, hoc modo. Oleo sincero & omni amurcæ spurcitiæ repurgato, ubi effervuisse, triplum aquæ quàm fervidissimæ, & salis modicum probe tritum commiscebat multa agitatione, dum concorporari & in unum coire perciperet: tum spatio quodam conquiescere patiebatur, donec iniecta aqua amurcæ in motem subsideret. Deinde existens Oleum concha deplebat, rursus, cum aqua tepente movebat, denudque subsidentem aquam ab Oleo sincero emergente separabat. Deinde succum foliorum Oleæ tenerorum contusorum admiscebat, quò acrimoniam quandam & amaritudinem inde contraheret Oleum, quod post triduum, ubi constitisset, ad usus deprimebat. Alij post diem utebantur. Alij etiam Omphacinum Oleum, aut alias bonum, in mortarium mitebant, ac in eodem succo terendo præli, ubi opus esset, ad usum vocabant.

Diophanes autem odorati Olei faciendi rationem ita docuit. Musti sextarios octo cum duobus Olei, & bonam Iridis tusa portionem, linteis convolutam misceant in vase, & exactis

Cari rancidum ut resatur.

oleum?

Fætor olei ut tollenda.

Si infectum sit animalis aliquo quod intederit.

Coriandri Fœnumgræcum.

Contra odorem.

Si turbetur.

Olei mactonia dicitur. Oleum Istria Liburnicum.

Oleum Hispanum.

Oleum odoratum.

decem diebus excolatum tecondant, hoc autem mulieribus potu gratissimum. Plures Oleorum factitios modos postea dicemus. Nunc baccas seu Olivas condiendi & conseruandi rationes tradamus.

Olivae condiendi modi varii.

Olivas condiendi solliciti fuerunt veteres, quam reuera nihil aliud sint quam palatus blandimenta. Tam ingeniosus fuit venter, ut & amara, nec ab ipsa natura percocta, suz quoque voluptati placere coegerit. Quid quæso gustu horridius Oliva, siue matura, siue immatura? At suavitatem inuexit ars, quam non potuit natura. Caro, Columel. & Palladin harum conditura præcipuam operam locant. Ex quib. eas seligemus, condituras, quæ unicuique generi communes esse possunt. Peculiares parum necessarias arbitrati, quod Oleorum hodie genera, neque omnia, neque forte multa, omnibus sint nota, ita ut & nomina esse desierint. Baccæ igitur etiamnum hodie, sicut olim, conviviorum epulis præparantur: quarum conditura diuersa: nam alia cædis, alia lectis, alia albis, alia nigris debetur, ut condiendi modus peculiare etiam tribuat nomen. Iam supra dictum Colymbades dici, quæ oleo suo puræ, & sine accerita commendatione innatant. Malma-

Colymbades.
Malma-

des verò, quæ muria propriè condiuntur, etiam si Græci harum sæpè nomina confundant. Plura nomina dicta superius. Caducis, quia spontè cadunt, nulla nec collectionis, nec temporis observatio debetur. Has iam rugosas [exsiccatas nempe iam in ijs excrementis illa sanie seu amurca] colliges, & sale trito asperfas, donec inarescant sole expandes. Tum strato cratibus Lauro, baccas dein ordinabis, & pluries in vertes, ut probè siccantur. Demum aquam, tribus aut duabus undis, cum defruto, & satoreiz manipulo servesctam, & rursus tepesctam, iniecto pauxillo salis cum origano superinfundes, & ad usum recondes.

Olivæ condita ut
condenda

Lectæ diverso tempore condiuntur. Prius enim albescent Olivæ quam nigrescant. Hoc autem summæ maturitatis, illud uirescentis, sed iam ad maturitatem mox inclinaturæ Olivæ signum, quod circa vindemiam esse solet, autore Catone. Hic lectam albam contundi prius præcipit (quod fieri censemus, ut amurca & austerus ille liquor evocetur) tum in aquam iniici [secundum quoddam calidam] Crebrò autem aqua mutari debet, & ubi satis macerata est, exprimi, atque in acetum immergi, oleumque addi, & salis selibra. In modium Oleorum Fœniculum & Lentiscum seorsim condes in acetum. Si unà admiscere voles, citò utitor. In orculam caleato manibus siccis. Cum uti voles, sumito. Oleam albam secundum vindemiam, qua uti voles, sic condito. Musti tantundem addito, quantum aceti. Cætera item ita condito, ut supra dictum. Resedè redit, ut probè maceratas in bideliam, cum Fœniculi & Lentisci ramusculis & cocto modicè sale permistas recondas, & mustum quàm recentissimum infundas cum mediâ parte aceti, ita ut ius superemineat. Quibus sic conditis tertia die uti poteris. Oleas albas, inquit Varro, quas condire vis, novas, celeriter condito, ut promas: nisi condieris, propter amaritudinem, illas respuit palatum. Item, nigras nisi prius sale maceraris, non libenter in os recipiuntur.

Majoris seu Regiæ conditura.

Regias quoque seu Maiorinas illas, quàm candidissimas eligunt, deinde substrato arido Fœniculo, in amphoram coniiciunt, atque Fœniculi & Lentisci ramusculos intermiscunt. Cum autem ad fauces usque amphora repleta fuerit, duram muriam adijciunt: ac spissamento de arundinum

foliis facto, ut infra ius mergatur, premunt: & iterum muriam duram, dum ad summum amphoræ labrum de venerit infundunt. Alij aqua marina ad dies sex macerant: deinde in vas mittunt, & recens mustum superfundunt, ita, ne omnino vas repleatur, ne videlicet in illius fervore effundatur. Quod ubi efferverit, oblinunt.

Alius modus.

Nonnulli non contundunt, sed acuta arundine [quod quidem operosius] infecant: nam, a ferro cavendum, ne sapor inde peruersus contrahatur.

Alius.

Quidam verò siue contuderint, siue infecerint, modico sale cocto, & prædictis seminibus immixtis, sapam deinde, vel passum infundunt.

Alius.

Olivam autem Pansiam cum iam decoloratur, & antequam mitescit, cum petiolo legunt, & in oleo quàm optimo servant. Hac enim ratione videntem, etiam post annum, Olivæ saporem representare promittunt. Plures etiam cum de oleo trito exemerunt, aspersam sale pro nova apposuerunt.

Alius.

Familiaris est hic modus Florentini. Olivas magnas & intactas, manu decerptas, acuta arundine circum circa incide, & in vas novum immixtis, sale tenuissimum insperge: quo colliquato, in alio vase mel vel sapam in promptu habe cum foliis citri, & in hanc condituram mitte, ita ut liquor ipsis innatet.

Alius.

Citri folia

Quidam etiam Fœniculi semen & Apij admiscunt, & condituram faciunt pergratam, admirabilem, vulgòque ignotam.

Familiarissimus iste Didymi. Vinacea recentia priusquam exprimantur unà cum olivis vicissim interpositis in vas condes, deinde oblines.

Alius.

Nunc de nigrarum conditura, quæ ubi iam nigruerint, nec tamen adhuc permaturuerint, legendæ sunt, & cribrandæ, exemptis impuris & maculosis. Tum in singulos Olivarum modios salis integri heminas ternas adijcies, atque in vimineos qualos confundes, copiosè superaddito sale, ut baccas contegat, atque sic 30. dies condascere permittes, ut omnem amurcam extillent. Postea in alveum diffundes. Tandem in vas recondes, & illud sapa ac defruto replebis, aridi fœniculi spissamento superposito, quod Olivas deprimat.

Nigrarum conditura.

Alij lectas, uti dictum & compositas, muria diluunt, atque in ollam deiciunt, & mellis partes duas, defruti dimidiam, vini unam. Quæ ubi semel omnia deferbuerint, abiciunt, & acetum admiscunt, ac permovent: & ubi refrixerint, origani surculos insternunt, sed, ita ut liquor superemineat.

Alius modus.

Origani

Alij cum pediculis & agnatis ramulis diligenter lectis, aquam triduo aspergunt, & per duodecim dies in muriam demittunt, & exemptas, in vas cum aceti & musti æquis partibus deiciunt, & repletum vas ita operiunt, ne aliquod spiraculum super sit.

Alius.

Alius.

Alij easdem lotas & sale maceratas aceto multo, modo prædicto, condiunt, affuso etiam Oleo, & asperso sale trito. Fœniculique ramulis iniectis in vas probè obturatum recondunt.

Alius.

Didymus Olivas antequam nigrescant lectas, & contractas in aquam calidam mittit, deinde in sportam transfert, & exprimit additque salem non tritum, cum cumino & Fœniculi ramulis. Deinde in mustum immergit & diligenter operit. Olivas contusas & fractas vocat.

Olivæ ramis & salem.

Idem Olivas Colymbades sic parare præcipit: has plenas & perfectas, quum in vigore fuerint, & prope maturitatem extiterint, unà cum exortu ex quo pendent accipito, & ne frangantur ac contendantur

Colymbades qualiter fiant.

tendantur in magnum vas coniecta quum de-
feruntur, diligenter prospicito: deinde frigida a-
qua lotas, paulatim in umbra per diem unam in
calathis ac cratibus vimineis assiccato, & quo æ-
qualiter siccantur, leniter convertito. Deind:
proximisso in fundum vasis salis triti pugno, &
postea mure congis quatuor cum aceti heminis
tribus infusus, Olivarum chernices viginti im-
mittito, & ubi expletum est vas, commoveto. Li-
quor autem supereminet, & obturatione per
Fœniculi fasciculum facta, vas obturetur. Cæ-
terum murea ea gratia præsufundi debet, ut Oli-
væ, dum immittuntur, non contendantur.

*Tabas mo-
dos omniū
simplicis.* Alij cum tenerimis ramulis docerptas Olivas
in vas marinam aquam habens immittunt, & ad
dies quinque vel sex relictas eximunt, & in vasa
conjectas, unā cum murea reponunt & oblinunt,
qui modus est omnium simplicissimus.

*Alia Col-
um.* Columella sic fieri docet. Maturam Olivam, in
statura, factam Colymbadem, de murea tollito,
spongia tergo: deinde canna viridi scindito
duobus vel tribus locis, & triduo in aceto habe-
to. Quarto die spongia extergito, in urceum aut
cacabum novum mittito, substrato Apio & modi-
ca Ruta. Concisus deinde pleno vase Olivis, im-
mitte defrutum usque ad os. Lauritiones in-
hoc usu mittito, ut Olivas deprimant: post dies
viginti utere.

*Oliva Co-
lymbades
quod Colum-
ell.* Ex hoc Colum. loco faciliè iudicabis quid pro-
priè sint Olivæ Colymbades, nempe, quæ iam se-
mel conditæ fuerint, sed proprio Oleo. Ideo di-
cit: Olivam in statura [id est repositam & suo-
met Oleo innatantem] factam Colymbadem:
quam tamen, uti vides, denuo condiendam do-
cet, modo iam præscripto.

*Modus Pal-
ladij.* Palladius sic docet: Olivas murea per 30. dies
macerabis, post universam fundes, & duas de-
fruti partes, aceti tinnam, cum Mentha minutè in-
cisa vasculo adicies, & ita replebis, ut iusta in-
fusione liquor supernatet.

*Epityrum
mod.* Epityrum quidem fraces & Olivatum magmata
vocat Hesych. At M. Cato. *Epityrum* Olivarum con-
ditura est, de qua sic tradit.

Epityrum album, nigrum, variūque sic faci-
to. Ex Oleis albis, nigris, variisque nucleos eiici-
to. Sic condito. Concidito ipsas, addito Oleum,
acetum, coriandrum, Cuminum, Fœniculum, Ru-
tam, Mentham, in Orculam condito: Oleum su-
pra fiet: ita utitor. Alium modum habet Co-
lum. l. 12. c. 47. Cuius usum maximè dicit esse in et-
vitatibus Græciæ. Alij eius usum olim frequen-
torem in Sicilia quàm Italia fuisse tradunt. Falli
verò videtur Varro, dum l. 3. de ling. Lat. *epityrum*,
ab epiti, ut vocat id est caseus, compositam putat nisi
fortè eadem vox & aliud edulij genus ex caseo
paratum olim significarit: sicut *epityrum* erat edu-
lij genus: quod, ut lib. 14. scribit Athen. fiebat melle
mucto lacti dum coagulatur: alioqui reclamaret
& modo citatorum Catonis & Colum. autoritas,
& ipsa componendi ratio præscripta. Quin potius
Epityrum à contracta Oliva, quæ Græcis *terruet*
est, dictum. De quo Plaut. Milit. 3.

— Ego me illi mancipio dabo,

Si [alijs legunt nisi] unum Epityrum edam apud
illam esuriens infane.

Tot itaque modis vides anxios fuisse veteres
Olivis ita concinnandi, ut diversimodè place-
rent palatui. Sunt verò & longè plures apud ci-
tatos autores, quos studio omisimus, quemad-
modum & Sampsam, Syrapam, & alijs id genus,
quorum parandi rationem abundè docet Colum.
Quæ omnia eodem modo hoc ævo parari vix pu-

Tom.

tamus. Nam & simplicissimo tantum modo con-
dita Olivæ, murea, vel [quod rursus] aceto &
Oleo, interjectis interdum Olivæ aut Lau-
ri folijs ad nos importantur ex Italia & Gallia
Narbonensi, itinere terrestri, sed plerumque mino-
res. Nam maiores ex Hispania per mare afferun-
tur, si insitoribus credimus, inde murea condi-
ta, & ut plurimum arboris sue frondibus aut
Thymi foliolis interstrata.

Deligantur firmiores ac solidæ, non flaccidæ, non
maculis affectæ, compressæ, aut ulla putredinis la-
be inquinatæ, succulentæ ac minime rugæ, sed
superficie probe tensæ, pediculis adhuc herenti-
bus, in quocunque genere.

Et si deliciarum potius causa Olivæ conditi vi-
deantur, tamen & usum habent in medicina, & vñs.
venditori non exiguo compendio sunt ad rem
augendam.

Nigras Olivas stomacho inutiliores putat Plin.
vñs. minus: præclarumque habere antiqua con-
diantur, vñs., recentes per se cibi modo devora-
tas. Mederi atenosq; urinq; item dentibus, aut attri-
tis, aut convulsis. Albam Olivam faciliorem sto-
macho, sed ventri magis alienam.

Fructus Olivæ inquit Gal. si quidem ad vnguem
maturuit, moderatè calidus est, sin immaturus est,
magis tùm astringit, tùm refrigerat.

Olivas albas priusquam insit Oleum, Hip. sicca-
ri & tandi iubet, ac embrari, & cum vino propi-
nari. Hoc autem & menses & secundas e-
licit.

Olivæ Colymbades tritz, autore Diosc. & am-
busus illitz, pustulas gigni prohibent, ac sordida
etiam ulcera purgant. Succus autem ipsarum ex
murea, collatione gingivas contrahit, emolliquo
dentes stabilis. Est porro Oliva subsulva ac re-
cens alvo incommoda, sed stomacho utilis. Ni-
gra verò & matura corruptioni opportuna stoma-
choque adversa est, ac tum oculis minime conve-
nit, tum capitis etiam dolores inducit. Torrefa-
cta ac illita nomas sistit & carbunculos emar-
ginat.

Olivæ, quæ maturæ sunt, ex sententia Sim. Se-
thi, temperatè calidæ sunt, non maturæ verò, a-
stringentes, & frigidæ & sicæ sunt, ventrem ro-
borant, alvumque sistunt: at pulmōni noxia. *Carbunc.*
Nigræ verò & maturæ faciliè corrumpuntur, ven-
triculōque ac oculis noxiæ & vesicæ. Calidæ tem-
peratæ sunt, & ad siccum magis inclinant. Co-
lymbades verò quæ dicuntur, frigidæ sunt & sicæ
quæ si cum garo ante cibum sumantur, alvum
proritant. Immaturæ autem adstringunt & refri-
gerant, sicæque sunt.

Diogenes cum vidisset iuvenem in diversorio
Olivas esitantem, si sic prædiles (inquit) non ita
cœnares. Idem etiam cum Platonem in lautissimo
convivio degustantem Olivas intuitus fuisset, il-
lum percunctatus est, quamobrem in Siciliam
huiusmodi mensarum gratia profectus, appositis
modò Olivis non fuere tur: Cui ille. At Hercu-
les, si Diogenes, illic & Olivis & reliquis huius-
cemodi vescerbar. Cur igitur, an ille, Syracusas
ad navigare te oportuit? An Attica tunc Olivam
non ferebat? Quibus verbis Platonis navigatio-
nem subarguere videtur.

Demost. in Orat. pro Ctesiphone contra Ael-
chinem. Solebas aliorum [inquit Adagialiter]
Olivas & uvas colligere.

Olivæ etiamnum hodie non solum in Italia &
Hispania, sed nostra etiam Germania ditiorum &
magnatum mensas opulentant, gulæ forum in-
vento, ad aviditatem excitandam. Quanquam

B 2

Tragus Germanis consulat ut Gallis & Italis hunc cibum relinquant, quod illis minus salubrem existimet.

Oleum ad collatum.
Nigra condita omnium levissime alunt: eas cum pane edendas præcipit Gal. Paulus tamen alienas stomacho, crassique succi esse testatur. At Colymbades astringente succo prædita sunt, proinde ventriculum roborant aviditatemque ciborum stimulant: prima mensa ex garo, sine pane, ad aluum deiciendam commendata mirè utiles sunt. Et tunc eas quæ aceto condiuntur, ad invitandum appetitum nobilissimas omnium affirmat, & minori negotio ventriculo perfici ea, quæ iucundiora suavioraque sunt. Paulus Oxymelle conditas laudat. In Gallia Narbonensi, ab incolis nullis non prandis cœnisque apponuntur, quemadmodum & caparis fructus. Sunt inter Arabes, qui inter prandendum iubeant mandi aviditatis gratia & concoctionis. Alij astringentiores secundis mensis adhiberi volunt, ut roborato ore ventriculi cætera deorsum pellantur cibaria. Vulgus eruditum prout atque inenutritum primo, & medio, & postremo cibo, carnis, piscibus atque ovis intermiscens, mandit eas, ubi frequentes sunt, ut iam dicto loco, & in Italia. Nostri magna ex parte cum carnibus assatis apponunt.

Ad scabrum oculum.
Sunt qui tradant baccarum decocto pulices interire, si eo domicilium conspergatur: hocque magis, si Cymini agrestis tritici nonnihil commistum fuerit. Oleæ verò ipsius folia Dioscor. iisdem prædita sunt viribus cum Sylvestri, sed aliquantulum minore efficacia: quare oculorum medicamentis, ob suam vim mitiorem, convenientiora sunt. Qui verò humor ex accenso virente ligno emanat, furfures, scabiem & lichenas illitu sanat. Quin & fructus eorum, furfuribus ac nomis seu depascentibus ulceribus medetur. Quod autem intra nucleum est, cum adipe & sanie scabros ungues excutit: Quod experientia ipsa probatum esse Cornar. scribit. Sed Hip. eius nuclei usum etiam ad ocularia medicamenta adhibuit: unde L. de morb. popul. sectione quinta sic tradit: *ὁφθαλμοῦ, πρὸς τὴν δὲ δ' ἰσχυρῶς, κρῖν, πικρὸν, τριφύλλον, φουφίον ἐν, σμύρνην ἐν.* Hoc est Oculorum [subintell. medicament.] spodij partem duodecimam, croci quintam, nuclei [Olivæ] unam, cerussæ unam, myrrhæ unam. (De Olivæ enim nucleo, nec de ullo alio, hic locus intelligendus, ut bene annotat Cornar.) Sed aquam frigidam quoque capiti infundendam præcipit, & allia cum maza præbenda. I nunc, & hodie nostros delictulos tali modo curato.

Foliorum Temperam & virtus.
Plin. de Oleæ viribus eadem ferè habet, at tamen illi multò plures tribuere videtur, quàm hic Oleastro. Sic enim scribit: Olearum [post uvas] proxima autoritas intelligitur.

Ulcera. Cap. dolor. Ambusia. Gingivæ. Inflamm. Paronychia. Hemorrhag. Pustula. Procidens pupilla. Lachryma. Gena cro. rosa. Pastilli.
Folia earum vehementissimè astringunt, purgant, sistunt. Itaque commendata imposita ulceribus medentur, & capitis doloribus illita cum Oleo. Decoctum eorum cum melle his quæ medicis ulserint, gingivarum inflammationibus, paronychiis, sordidisque ulceribus excrecentibus. Cum melle profluvium sanguinis è nervosis partibus cohibet. Succus eorum carbunculantibus circa oculos ulceribus & pustulis, prociðetiq. pupillæ efficac: quapropter in Collyria additur. Nam & veteres lachrymationes sanat, & genarum erosiones. Exprimitur autem succus tuis, affuso vino, & aqua cœlesti, siccatusque in pastillos digeritur. Sitis menses in lana admodum vulva. Vti-

lis & sanie manantibus. Item Condylomatis, ignibus sacris, ulceribus serpentibus, atque Epinydidi.

Condylo-mata. Ignis sacris. Serpentina ulcera. Spodij succed. Lichenas. Furfures. Ulcera manantia. Lachryma eius. Dentium dolor. Sanguinis & puris exitum. Oleæ Cist. fistula & tumores.
Eisdem & flos earum habet effectus. Vrinatur & cauliculi florescentes, ut spodij vicem cinis præstet: vinoque infuso iterum utitur. Suppurationes & panos illinunt cinere eo, vel solis tuis cum melle, oculos verò cum polenta. Succus fructus recentis acceali destillans sanat lichenas, furfures, manantia ulcera. Nam & lachryma, quæ ex arbore ipsa distillat, Æthiopiarum maximè Olæ, mirari satis non est, repertos, qui denuum dolores illinendos censerent, venenum tamen esse prædicantes, atque etiam in Oleastro querendam. E radice Olæ quàm tenerimæ cortex derasus, in melle crebro gustatu moderatur sanguinem reicientibus, & suppurata extulgentibus. Ipsius Olæ cinis cum axungia tumores sanat, extrahitque fistulas vitia, & ipsas sanat.

Oleæ germina, [Olivæ rami] inquit, Gal. lib. 6. simpl. medicam. quantum habent astringentis, tantæ & frigiditatis participes sunt. Fructus verò, si quidem ad unguem maturuit, moderatè calidus est: si immaturus est, magis tum adstringit, tum refrigerat.

Pascitur Olæ & Oleastri baccis turdus, ac inde pinguior, & præpingui pallidior, id est, magis cereus evadit. Hinc Martialius:

Si mihi Picena turdus palleret Olivæ.

Cervicium & lumborum remedium.
D. Ambrosius in Hexamero prodit ægotantem cervum sanum fieri, mansis Oleæ ramisculis: & locustas ab ægritudine liberari, arrosas Oleæ foliis.

Aquam etiam, in qua Olivæ salita fuerint, dentes vivare præditum est. Plurima Trallianus, & Curus superstitione de Oleæ viribus. Scribitque hic inter alia, radicis corticem drachmæ pondere cum vino aut aqua deglutitum, pituitam evacuat, quod nobis nondum compertum.

Purgans. Medicamentum.
Oleæ quoque materies præcipuè commendationis est apud operarios & statuarios, à quibus ad præstantes operas desideratur cum Ebena, propter densam & tractabilem ejus substantiam, & colorem subruffum ac varium, quem ductus & nervi iactati referunt, præsertim, si oblique [verberari dicunt artifices] in frusta vel assulas secetur.

Statua viri lea sudans per os.
Memorable quod Theoph. ait: Oleæ statuam sudare posse: Nam ex Olea olim statuas fieri solitas ait, quod minus sit ejus materies obnoxia corruptioni: quod & in cupressu & cedro fieri ait. Causam refert ad internam earum pinguedinem, & tenuem liquorem, qui, quoties ablanditur eis Austina tempestas, tepore suo, suæque humiditate, erumpat & excludet: quod alij prodigium & ostentum esse putent.

Ratis cui sudant statua.
Sanè & marmorea templorum signa, & zænes vidimus appendentibus guttis, sudantium præbere speciem: cum ea ligna vetustate succum penè omnem amisissent eum qui intus fuerat. E quidem cum Scaligero censemus, ærem tepidum illis adhærescentem, nactum superficiem frigus aliquod, cogi quasi in lachrymas & sudores. Nam illorum oculis tale quiddam stillans, pro lachrymis, se puero, quondam receptum, atque inter ostenta vulgò relatum fuisse, idem Scal. scriptum reliquit. Nemo sanè est, uti puramus, qui non, frigidiore mutato aëre in Austrinum, statuam aliquam in templis sudantem non deprehendit.

DE OLEO SPECIALIUS, EIVSQUE
differentiis & usu.

Olivarum liquor Oleum est, cui honorem Veterum majestas magnum præbuit, ob insignem ejus utilitatem. Hujus inventorem Plinius dicit Aristem Atheniensem.

*Olei simpli-
citer des-
criptum.*

- Olei simplicis & ex Oliva expressi tres differentias diximus. Primum omnium laudatissimum, *ἡλιότερον* Græcis, prima præli unda, & quasi spontanea, lixivium Oleum, non tortivum: Olei Flos, Glucinum, hoc est, mustum expressum, [mustum enim *μαστιχ* Græcis] antequam Olive calcantur, vulgò *Huile-vierge*. Secundum iterativum, quod est secundæ pressuræ. Tertium Tertiarium, quod est tertiæ. Hoc pessimum: Illud medio modo se habet. Ostum vel Hostum vocant Cato & Varro, quod ex utroque facto Olei reficitur.

Ostum.

Omuribus.

Fit autem & Oleum ex acerbissima & nondum matura bacca, quod Græcis *ἀκέραιον*, dicitur, Lat. acerbum, æstivum & viride, cuius meminit Theophrastus de Odoribusque fieri tradit ex Olivis Phaulis: non *ἡλιότερον*, ut habetur apud Athen. ita enim restituendus ille locus Athen. ex Theophrast. Græco codice, quem ipsemet citat.

Omphacium.

ὀμφάκιον quod ex immaturis bacis fit dicebatur Græcis [apud quos *ἡλιότερον* utam acerbam, nec dum maturam, atque etiam omnes omnium plantarum, acerbos, crudos & immaturos fructus *ἀπὸ τοῦ ἀκέραιου* significabat.] Illud autem valde commendant autores, tam Græci quam Latini.

Cibarium.
Samicum.

Acerbum autem Oleum facere, nisi hacce tempestatibus in terram deciderint, & necesse sit eas sublegere, patris familias rationibus non convenit, inquit, Columell. quia exiguum fluit. Cibarium utique Oleum faciendum modo præscripto. Samici Olei meminit Antiphanes apud Athen. quod reliquorum esset candidissimum.

Oleum.

Caricum.

Oleum.

Thurinum.

Caricum, ex Caria advectum, laudant alij. Alij, id quod Thuris [nobile est magnæ Græciæ oppidum] fit, ut excellens commendant.

Candidum
ut fiat.

Lubet hic Olei candidi parandi rationem ex Dioscor. adferre. Candidatur hunc in modum. Summo album colore, nec anniculo vetustius, & in fictile novum lati oris infundito, centum heminarum mensura. Mox in sole expositum quotidie circa meridiem concha refundito, ex altè deturbans, ut frequenti volutione ac verberatu agitatam alteretur & tumescat. Octava deinde die forningræcu in purgatum drach. 50. pondere, aquaque calida maceratum, atque adeo remollitum, aqua interim nevisquam expressa, in supradictum Oleum coniecit: tendam quoque Pineam præpinguem & in tenues assulas concisam pari pondere in super addito: atque ita dies octo alios elabi finito. His transactis concha Oleum denud confundito. Postremò si finem assecutum fuerit, in vas novum prius vetere vino elutum, substratis antea Meliloti strobilis ad drach. undecim, cum Iridis pari pondere: decapitato atque recondito. Sin autem candorem nondum contraxerit, Oleum rursus insolandum, & opus ipsum repetendum, dum candidum illud evaserit.

Lavandi & candefaciendi Olei longè simpliciorum.

Tom. I.

ciorem modum docet, Galen. lib. 2. simpl. capit. 15.

Reperitur, inquit Cordus, natura etiam candidum Oleum, sed Dioscor. de eo tractat, quod arte & industria humana candorem contraxerit. Dealbatur etiam pura tantum, crebroque, assusa & refusa aqua, idque duas ob causas. Primum ut acrimonia, amurce reliquias, & pinguedinis rancorem, si quis sit, in aquam deponat. Deinde etiam ut aspectu candoreque magis placeat, ne fusco aut profundiore colore candida vnguenta inficiat. Lavatur præterea & alij modis, habito diversarum affectionum respectu, a quibus odoratis, Rosarum, Lavendulæ, aut similibus.

Est & Sicyonium Oleum à loco ita nuncupatum:

Item Oleum quod paratur ex Oleæ surculis, de quibus pòst scorsim. Sabinum Oleum sic à Sabinis populis dictum, apud quos conficiebatur, cuius pluribus locis meminit Gal. & quod plurimum laudat, quodd inter alia tenuium sit partem, quodque utebatur adversus ea, quæ discutienda erant, propter redundantiam.

Ut autem cum Galeno rem paucis complectamur, illud quod propriè Oleum dicitur, de quo hoc loco agimus, differentias habet vel ab ætate, quod aut recens sit & velut mustum, aut etate vigente, aut vetus.

*Differentiæ
ab ætate.*

A præparandi modo, ut simplex, solum, & im-

A præparandi modo.

permistum, aut cum sale præparatum.

A diversitate fructus.

A diversitate fructus, cum is aut maturus aut immaturus extiterit.

A diversitate fructus.

Iam quot compositorum Oleorum formulas tradiderint autores, hoc loco recensere non permittit instituti nostri ratio.

Oleum cum aqua mistum *ὀσπλάγιον* vocant.

Oleum verò quo luctaturi perungebantur, *χρίσμα*, & *ἀρώμα*, & *ἀρωματισμός* dicebatur: verum hoc ultimum propter cerum, pulverem aut certum terræ genus, quod densandi atque roborandi corporis gratia luctaturis post Olei illitionem affricabatur *ἰσχυρὸν ἀρώμα*, Oleum insulsum vocatur apud Galen. *ἡλιότερον*, lib. 1.

Oleum, olivum vocat Horat. *ἔλαιον* Græci. Synon. Germ. Baumöl. Belg. Boomolie: Chémien d'Olive. Linguar. ve/Gal. Huile d'Olive. L. Olio d'Olive. Hisp. Aceyte de Azeytunas.

Olei vires nemo facit, quamvis disertus, quod facis sit explicabit. Plinius sanè paucissimis verbis Olei & vini usum prædicavit, quando ait: Duo sunt liquores corporibus humanis gratissimi, intus vini, foris Olei, arborum è genere ambo præcipui. Sed Olei necessarius.

*Olei vires
& usus.*

Videtur autem alludere ad Pollionis Romuli festivum responsum, cuius alibi meminimus: cum centesimum annum excedentem, cum D. Augustus hospes interrogaret, quam maxime ratione vigorem illum animi corporisque custodisset: respondisse: intus mulso, foris Oleo.

*Pollionis
Romuli
responsum.*

Eadem propemodum sententia, Democritus interrogatus, qua ratione homines inoffensa valetudine degerent, ac vigorem illum animi custodirent, respondisse fertur: Si corporis externa Oleo interna melle linirentur.

*Democriti
responsum.*

Plato in Menexeno Oleum *πρωτὸν ἀρωματισμὸν*, id est, laborum subsidium & adiumentum hominibus esse datum ait. Oleo enim natura tepefacere corpus, & contra algores munire: eidemque fervores capitis refrigerare.

*Oleum laborum
subsidium.*

Vsum eius, inquit Plin. ad luxuriè vertere Græci viciorum omnium genitores, in gymnasiis publicando. Ideo & Anacharsis infantiæ pharmacum dixit, quodd eo uncti Athletæ invicem serventur.

*Græci
viciorum
genitores.
Infantiæ
pharmacum.*

B 3

& ardentis atque furiosus insultarent.

*Infans a
pharmaco-
cum*

Oleum & aleam emere oportere Aristoteles au-
tu nait, utique quodd utrumque ad prorogan-
dam vitam quā maximē conducere:

*Oleum in
Aegypti
multum.*

Invenimus Aegyptum pendē universam Oleo
carere: esse verō quosdam hortos circa Alexan-
driam, in quibus Oleum sine, verūm Oleum non
red lere.

*Solum O-
leum hu-
midū Ho-
mero.*

Fons ille ingeniorum Homerus, inter tot li-
qtores, qui ex seculis quos terra parens nobis
proluat, solum Oleum solum, id est, humidum,
[Metaphoricē etiam molle, laxum remissum, lu-
bricum] dixit. Quare sic Plutarchus optimus
huius rei & grauis interpres in Sympol. rationem
reddit, Quod uidelicet in Oleo nihil asperum sit,
ut ne ad motum quidem percussum, quemadmo-
dum, ceteri liquores, stropat, ut, quod cum igne
minimē lūctetur, verūm illum tacite pascit. Nec
alius etiam liquor, qui tam late diffundatur, si
corpori inungatur, aut qui seride siccet.

Ratio.

In ignes speculorum nō more reddit.

*Tardē se-
catur.*

Tra quillitatis etiam nomine, eius natura in-
finitum propemodum commendata est, ut ma-
re etiam, omni vi n. re. um sevisissimam tranquillet.

*Spiritu vi-
ci praebe-
t. Tranquil-
lum.*

Atque ob id Vrinatores ore Oleum spargere aiūt,
quod lūmiget Elementi naturam, lucēque de-
porret. A qua quod n. natura tractu n. adagium,
Oleo tranquillior. Plautus in Pœnulo: ita hanc
ego canem faciam tibi Oleo tranquillior. O-
leum in auricula ferre dicit Martialis:

Adagia.

Narratur quidam bellē dixisse Marcellum,

Qui referre Oleum dixit in auricula.

Quod in affentatores quidam referunt.

*Humidū nō
permiscetur*

Humidis autem permisceri nullis Oleum pati-
tur quia lentum suique portinax est.

Spiritu nō.

In partes quoque dividuas secari se non finit,
reliquisque commisceri liquidis. Multum spiri-
tus habet, pingue enim est, ut propterea neque
terrenae, neque aquae substantiae, sed aëre per-
hibeatur: Ex quo fit ut per summa aquae fluitet,
& levitatis indicium praebeat, quamvis revera per
se non sit leve, sed copiosam etiam admixtam ha-
beat densam & terrestrem portionem.

Sed calor & spiritus eius substantia prohibet,
quominus congelescat. Crassescit tamen frigo-
re, ut hyeme, tum flavum tum citrinum conspici-
tur. Aestate, liquidum & subviride.

*Ferrum re-
molle.*

Qui autem ferrum remollire cupiunt. Oleo
tingunt,

Ceterum omnes Olei utilitates hic persequi,
nec volumus, nec possumus, maximē, cum sciamus.
Galenum in eo genere plurimum praestitisse, nec
tamen potuisse omnia.

Quod si quis tamen eius utilitatem aliud pen-
sare velit, vix ulla n. aliam rem maiorem, post a-
quae & panis usum, inveniri deprehendat, siue ad
rem familiarem spectet, siue ad rei medicae neces-
sitate, siue ad luxum & ornatum.

*Odore co-
ferat.*

Nam ipsum, cum per se propemodum inodo-
rum sit, omnium tamen rerum vim, odorem, & fa-
cultatem recipit, illas verō nulla ratione inficit,
quod Lucretius insinuasse videtur, cum ait:

Ac postea reperire insentis Olivi

Naturam, nullam qua mittat naribus auram. &c.

*Offus medi-
cum.*

Hinc Vnguentarij odores in Oleo reponunt.
Nam odorem servare omnium maximē potest.
Sed iam reddenda est medicinae eius ratio.

Oleum ad usum per sanitatem optimum, in-
quit Diosc., quod, quia ex crudis seu acerbis &
immaturois Olivis exprimitur, crudum, & ompha-
cinum dicitur. Excellit in hoc genere recens, mi-

nimē mordens atque odoratu n. Tale ad unguen-
torum compositionem utile. Quinetiam propter
astringendi vim stomacho accommodatum. Ore
si concutatur, gingivas contrahit, densēque fir-
mat: sudores denique cohibet. Quod uenitius
ac pinguius est, ad medica nentorum usum et ac-
commodatum.

*Stomachus
Dentes.*

Temperā.

In universum autem Oleum omne calefacien-
dum habet, carnem emollit, corpus contra al-
gores munit, ipsumque ad actiones obeundas
expeditius reddit. Bonam etiam aliam facit, est-
que molliendi vi praeditum. Exulcerantium me-
dicamentorum vires, permixtum, hebetat. Exhi-
betur quoque contra venena, sic ut subinde bi-
batur ac revomatur. Purgat hemina mensura,
cum pari ptisanæ succo, aut aqua, epotum. Tor-
minosis utiliter datur in potu cum ruta deco-
ctum, sex Cyathorum mensura, lumbricosque pel-
lit. Infunditur & id ipsum ad ileos maxime affe-
ctus. At vetus tum magis exalfacit, tum etiam ve-
hementius discutit, & ad exacuendam oculorum
aciem sublimitum prodest. Sin desit vetus, hac
praeparatione opus est. De eo cuius est copia,
quod praestantius erit in uas defundito, & ad
mellis crassitudinem decoquito, atque ita utitor.
Eandem enim cum praedicto uim afficit.

Laxat.

*Ad venena
Purgat.
Tumens.*

*Lumbrici.
Iliaca pas-
sa.*

*Oculorum
aciet.*

Plin. quoque testatur in Oleo odores maximē
conferuari. Et Oleum, liquor recreans membra,
eodem dicitur. Et alibi: Omni oleo mollior cor-
pus, vigorem & robur accipit. Stomacho contra-
rium, ubi omphacinum non comprehendisse ui-
detur, quod stomacho gratum esse Dioscor. dixit.
Sed quando Oleo, ut uino, palati gratiam nullam
dedit, sola comparatione detraxit Oleo, quod a-
lioi recens & dulce est, & oleosa lenitate gra-
tum. Alioqui, uini modo, insigni quodam sapore
palatum nec invitat nec tiuit. At Oleum recens
& dulce, panis segmentis tostis, cum sale infusum,
praecipuam suavitatis gratiam nobis habere uide-
tur. Velissimum, eodem teste, est Omphacinum:
proximē viride. Praeterea quā maximē recens,
nisi cum vetustissimum quiritur, tenue odora-
tum, quodque non mordeat, ē diverso quā in
cibis eligitur. Omphacinum si contineatur in co-
re, colorem dentium custodit magis quā aliud,
sudoresque cohibet.

*explicat
Plin.*

Olei noma.

Omne autem oleum auget ulcerum incremen-
ta: Fauces exasperat, & uenena omnia hebetat,
praecipue Psimythij [Cerullz], & Gypsi, in a-
qua mulla, aut Ficorum siccarum decocto potum,
contra Meconium ex aqua: contra Cantharides
Buprestin, Salamandras, Pytiocampas per se po-
tum, redditumque vomitionibus, contra omnia
supra dicta laudatissimum. Et lassitudinum per-
frictione refectio est. Vulnerariis emplastris utile.
Faciem purgat, & rebus omnibus nitorem & lu-
cem addit: Vnde tractum adagium: Oleo nitidius.

*Contra Me-
conia &c.
venena &c.
ria.*

Ad venena

*Nitorem
inducit.*

Vetus porro magis exalfacit corpora, magis-
que discutit sudores. Duritias magis diffundit. Le-
thargicis magis auxiliare, & inclinatio morbo. O-
culorum claritati confert olei quid, cum pari por-
tione mellis acapni. Capitis doloribus remedium
est. Item ardoribus in febris cum aqua. Et si vetusti
non sit occasio, decoquitur, ut vetustatem reprae-
sentet.

*Duritias.
Lethargia.
Oculi.*

Oleum uvas à uelpis tuerit: picem ē pannis
extrahit: eo apes & reliqua insecta exaniman-
tur.

*Contra
Scorpia.*

Oleum solum calci miscetur, quando utrum-
que aquas odit.

*Olei mixta
sunt.*

Eodem extinguuntur quaedam, quae aqua ac-
ceduntur, ut Thracius lapis, & Gagaces. Hic Plin.
Boues,

Pedum do-
lor bonum. Boves, inquit Arist. pedum dolores non sentiunt, si eorum cornua vel pice vel Oleo unuantur.

Contra
haustam
hirudinem. Item ubi bos aqua hircinam hauserit, & ea faucibus inhærens, manibus detrahi non possit, fistulam vel arundinem aut tubulum inserto, & ita calidum Oleum insundito. Nam eo contactu animal confestim decedit: quod remedium & hominibus simili casu accommodare possis. Buhus etiam insulum per nares, donec ructent, inflationem sedat. Oleo potio etiam Elephantis tela, quæ eorum corpori inhæserint, eiciunt.

Tela eiciunt.
Ut temper-
amentum
olei digno-
scatur. Olei temperamentum eleganter declarat Simeon Seibi, his verbis: Oleum mediocriter calidum est, magis humefaciens. Immaturum verò, quò magis astringit, eò magis frigescit: quod autem maturum est, minus mordicat. Vetustum quoque quò vetustius est, tantò calidius est, & magis durescit, eoque maxime, si à principio tenuium partium fuerit, quod cognoscitur, si purum est & per se cum melle, & si eius modica pars maximam corporis partem perungat, & facile ab eo imbibatur. Dignoscetur verò caliditas & frigiditas Olei gradu gustu: quod enim dulce est, mediocrem caliditatem habet: quod autem astringit, frigidum est. Tale autem stomacho bonum est. Quod autem calidum est, celestem inflammationem.

Olei su-
prema re-
gio melior. Olei suprema [ex Plutarch. sympos] regio melior est: nam unum ab amurca turbatur. Summum verò optimum, quod remotissimum à nociva parte, nec sua spissitate ab aëre laesum.

Cur ran-
culum fiat. Nouum præstantius, illi enim scidum inutile. Transpiratu carens ob lentitiam inueterascit, & tandem rancescit, quod ad vomitum ciendum, ob tetrum tum laporem, tum odorem ab aliquibus præfertur. Attamen illud nobis suspectum, quod vitiosa qualitate stomachum nimis vellicet, & molestat. Recens laxando, lubricando, atque ad eum leui suo motu & fluctuatione abundè id præstare posse censemus, maxime si præbeat cum aqua tepida.

Cur oleum
Gomium
bili me-
mor. Quærit Alex. Aphrod. cur epotum Oleum vomitum, potissimum à fluxu bilis moueat? Quod suapte natura semper ad superiorem locum tendat. Quotiens enim cuiquam humori permisceatur, ad superiorem sese recipit sedem, innatæque, & cibos ad stomachum i. uat, effertque: quibus aggrauatus & oppressus vim excernendi ad euomendum incitat: præsertim verò fluxam bilem, quæ cum leui, atque tenuis sit, uicere facilius superiora petit.

Olei, præter rem etiam ipsam medicam, plurimus usus, quod omnes ipso usu capiuntur, qui tantus, tamque in rebus multis, ut eius commoditates, multiplicæque utilitates enumerare perdifficile sit.

Et quoniam supra dictum Oleo corpora muni contra algores, lassitudinesque addendum nunc, & illud tueri corpus perfractionibus, lubricum illud reddendo, & ad motus habilis. Nam ubi corpus arefactum fuerit, vel à sole, vel à frigore, vel à re quadam erodente vel acris, vel extra vel intra corpus, aut si cutem prurigo infestet, Olei dulcis inunctione nihil præstantius, præsertim si in balneo, vel post, ad fiat, quod apud veteres Romanos tam consuetum fuit, ut exemplis illustrare pigeat, cum pleni sint, tam medicorum quam historicorum libri. Inde & excogitata medicamenta Latinis Acopa [ut & etiam Græcis Ἀκωπ] dicta ad tollendas lassitudines, & robur agilitatemque corpori inducendam. Hinc, lactatori quoque eo

porungebantur, ut eius vnguinis lubricitate diffusus foret inuicem brachiorum connexio. Hinc luctu succurrere Oleum dicit Philostatus, apud cuius icones, pictor apposuit tantum Oleagineum in Patrista Mæcuij filia & luctu inventricis nudo sine locauit. Lactorum verò Olympicorum, ut vinctio ad eodem, Herculem aut rem faciunt, cuius consilio factum erat, ut lactatores Oleo oblinerentur. Quod & Lucanus testatur lib. 4.

Ille Cleonæ præterit terga leuiss,

Antem Libyæ perfudit membra liquore.

Hæpe Olympica seruat more Palæstra.

Hæc in Antæ & Herculis pugna.

Propterea Anacharsis Scythæ, ut dicebamus, Oleum insanæ pharimacum esse dicebat, quoniam eo peruncti athletæ feruenter inuicem insanirent.

Contra Essæos è ludæorum genere, ungi oleo non pati ait Porphyrius in libris quos de abstinendo a carnibus scripsit, ut est apud Eusebium de præparatione Evangelicæ. Quod si verò quis Oleo tactus fuisset, diligenter tanquam à magna corporis macula, corpus abstergeretur, quod eis corpore aridos, non molles fore oporteret. Possidonus Stoicus, in suis historiis tradit ut refert Athen. Gallos quoque olim non fuisse vlos Oleo, propter raritatem: quin & quod infusa se sentirent, vlu eius non assueti. Hodie tamen in Gallia Narbonensi & Provincia Olei maximus est usus: quibullam enim in locis non quadragesimali duntaxat tempore, sed per totum annum cibos omnes cum oleo coquant: Vere tostus panis cum Oleo & Mentha gratus est cibus, nisi quis laboret Anapathia, hinc fuerunt mihi aliquando duo comensales, quorum vnus abhærebat à cibis coctis cum Oleo, alter à coctis cum Butyro.

Epaminondas quum impensarum rationem cum quum collegis reddere iussisset, & olei multum idinem moleste tulisset, admirantibus illis ait: Non impendi magnitudo me mouet, sed quod tantum Olei intra corpus receperint.

Velabrum, autore M. Varrone, Romæ locus fuit, in quo Olearii Oleum distrahabant. Mos autem huic hominum generi fuit, ut inter se de pretio conspirarent: quo pluris vendatent: unde tractum adagium: Vtin velabro Olearii. De his dictum, qui conspirant, remque ex composito gerunt. Plaut. in Captiuis.

Pergo ad alios, venio ad alios, deinde ad alios, una res,
Omnes cum pacto rem agunt, quasi in Velabro Olearii.

Non prætereandam etiam, quod usus Olei erga Deos ac illorum sacrificia non infrequens fuit. Vnde Lebaton poculum, quo in sacris Oleum libaretur, ex Gurtio.

Fuit etiam Romæ olim Saturni simulacrum Oleo plenum, teste Plin. fortè quod ex Eboro confectum erat: nam prius dixerat existimari ebori à carie vindicando vtile esse: & quasi pro ratione subdidiceret si simulacrum Saturni Romæ intus Oleo repletum est: in quam rem inquirant Antioquarij.

Et aberna etiam meretoria trans Tyberim, Augusti temporibus, Oleum è terra erupisse, ac tota die nulla intermissione fluxisse proditum est. Quo significatum voluit grauius autem IESU CHRISTI erga gentes gratiam & natiuitatem.

OLEVM SICYONIVM

Sicyonium Oleum dictum, in Sicyone Achaie Syrbæ præparabatur, unde nomen accepit. Illud

Lacta su-
currit om-
Emblema
Philostati:
Lacta in-
uentris.
Lactorum
Olympico-
rum inu-
tor.

Insania
pharimac-

Essæorum
mos.

Olei usus
maximus
hodie apud
Gallias.

Galli olim
abstinebant
ab oleo.
Epaminondas
respondit.

Velabrum
olei compe-
ritum.
Olearii
mos.

Lebaton
poculum.

Sicyonium

nocet. Rectè igitur Amurcam petiti agricolæ tam in ollis condunt, quam Oleum aut vinum.

Expressa Oliva, ejus quoddam effluxerit de ea, decoquantur duæ partes, ac reliquam refrigeratum conditur in vasa. Quidam expressi Oleo, per xv. dies amurcam custodiunt, eam, quod est levissimum ac summum, deplent & decupulant, ut traiciant in alia vasa, & hoc eisdem intervallis duodecies. In sex mensibus proximis id faciunt. Cum id novissimè faciunt, potissimum traiciunt cum senecit Luna: tunc decoquant in ahenis levi igne, & ad duas partes reverterunt. Tum demum ad usum rectè condunt.

Nunc medicæ quoque virtutes dicendæ. Ea, in ahenis cupreo ad crassitudinem mellis decocta, astringit, eosdemque quos Lycium præbet effectus, insuperque etiam facit ad dentium dolores & vulnera, cum aceto, vino aut multo illita. Additur & in oculorum medicamenta, eaque quoque spiracula cutis obstruendi vim habent. Inveterata melior evadit. Sedis, genitalium & vulvæ exulcerationi, utiliter infunditur. Dentes quoque corruptos exhalat, cum Omphacio ad mellis crassitudinem cocta & oblita. Scabiem iumentorum cum Lupinorum & Chamæleonis decocto illita sanat. Cruda verò & recens, podagricos & arthriticos calente fori juvat. Velleri inducta & hydropicis imposita tumoris molem repunit.

Eadem ferè & Plin. habet, & præterea hæc: Gingivis & oris ulceribus, dentiumque stabilitate efficacissimè subvenit. Item ignibus sacris infusa, & his quæ serpunt. Pernionibus nigrae Olivæ amurca utilior. Item infantibus fovendis. Albæ verò, mulierum vulvæ in lana admoveatur. Multò autem omnis amurca decocta efficacior: usus eius quoque in curatione aurium, ulcerum manantium, rhagadum. Vulneribus in linteolis imponitur: luxatis in lana. Ingens hic usus, utique inveterato medicamento. Tale enim fistulas sanat. Illinitur podagris incipientibus. Contra limaces & culices, ceterasque eius generis noxias bestiolas vim habere maximam passim apud Græcos legimus.

Colum. quoque tradit, ovium scabiei illitu valde prodesse, præsertim decoctam.

Amurca, Galeno, terrestris est substantia, & calidæ, non tamè tantum possidet caliditatis, ut palam mordicat. Cocta multò terrestrior fit, crassarum partium & sicca: & fuerit sanè ex secundo ordine excofacientium & siccantium, intenso quodammodo magis. Sic & ulcera corporum siccorum curat: quæ verò in aliis omnibus sunt, exasperat. Siquidem contrahit, perinde ut resina, & pix sicca, & bitumen.

Camer. quoque Amurcam ad multos morbos utilem prædicat, & non sine commodo sæpè usurpari ait, siquidem facillè comparari possit, faciliusque, quam Lycium vel Acacia, quæ ambo præterea adulterata ad nos importantur. Imprimis verò aliquibus locis utuntur cum Lithargyro, Cetrullâ & pulvere ex foliis Vlmis, ad ulcera antiqua.

OLEÆ VISCUM

Vix emersi ex Olivæ, nihilominus Viscum adhuc adhæremus. Hoc non procul Hispani, in Oleis copiosè nascens observavit CLVS. mense Ianuario, olivetorum dominos, magno damno afficiens. Integros enim Olearum ramos, crebro etiam maximam earum partem exde-

re coguntur, ne latius vitium serpat, alioqui totas arbores occupaturum & steriles redditurum. Habet verò id viscum baccas non albas, quales in aliis arboribus natum, sed ex rubro purpurascens, cuiusmodi nuppiam albi vidisse se idem testatur.

Has eùm in Belgium rediens columbis & aliis avibus devorandas daret, ut experiretur, an nasci vellent, arboribus imposito avium illarum fimo, operam lusit. BELLON. quoque Obs. l. 2. simile Viscum in Oleis, Hierosolymitano agro crescere scribit, sed eas Oleas differre putat à ceteris Oleis, quoddam Viscum terant, baccis rubra abundè refectum, magno incolarum damno, quippe, quod Oleas steriles reddat.

OLEASTER, SIVE OLEA SYLVESTRIS.

CAP. II.



AT verò quæ culturam non sentit, sive spontis Olea sylvestris tantum Oleaster, ut Sative magnitudine non cadat caudicis & ramorum, horum tamen frequentia superat: addè quod & spinas per ramos possidet. Folia minorâ, non dissimili interim figura. Ita quoque & flores racematim compæcti fructum præcedunt, Olivæ similis, sed minoris, strigiosiores, sicut

purpureo mordaci præditum.

Quoniam verò Clus. Lusitanicam Oleam sylvestrem describens, spinarum non meminit, neque picturâ suâ exprimit, eius quoque descriptionem ascripsimus.

Oleaster inquit, instar Olivæ adolescit, illi quoque per omnia ferè similis est, cortice tamen leviori, rarioribus ramis, minus frequentibus, & brevioribus angustioribusque foliis, licet eorum modo circa ramos dispositis. Flos, ut in Olivâ satius racematim coherens, fructus exiguis olivis similis, pauca tamen carne præditus, mucrone recurvo, è longis petiolis racematim dependens, primum viridis, deinde purpureus, postremò ubi maturus niger, signo prægnans purpureo, qui gustatus nonnihil linguam uellicat. Tota arbor insigniter amara est. Præter nos sanè etiam Matth. spinosum observavit & annotavit, & Dod. Hostidam aspectu dicunt Adu. & sentiosam. Hist. quoque Lugd. habet iconem Oleastri valde spinosi, ex Matthiolo.

Oleastro Theoph. [æternus vocat] longiorem vitam tribuit quam Olivæ: & Oleastrum Olympiæ æquè à famæ & fabularum, autibus celebratum dicit, ac Oleam Athenis: Vix autem diuturnitatem ex communi ratione sylvestrium deducit, quod robustiores sint, spissiores, fructuque infecundiores. Caudex quibusdam peculiatibus cavernulis dehiscit, quod & in Olivâ quoque deprehenditur. Eandem, cum Olivâ, neque teredinem

etiam ulcera fœdida tepurgant, panos & inflam-
mationes cum melle impoſita diſcutiunt, & cu-
tem à capite avulſam conglutinant. Oris etiam
ulceribus & aphthis comenducata medentur.

Sed & eorum succus, ac ipsum etiam decoctum eisdem habent effectus. Admotus enim succus sanguinis eruptionem, fluxum muliebrem, oculorum staphylomata, pustulasque inhibet: insuperque ulcera veteresque defluxiones sistit. Quapropter etiam in collyria additur, ad palpebrarum erosiones perquam utilis. Ad exprimendum vero succum folia tundere oportet, & affuso vino aut aqua exprimere, illumque h. l. siccatum in pastillos digerere. Est porro qui cum vino exprimitur tum valentior, tum ad recondendum aptior, eo qui cum aqua expressus fuerit. Facit & ad aures purulentas atque exulceratas: Folia cum hordeacea farina illita Cœliacis conveniunt. V-
runtur, autem, cum Floribus folia, ut spodij vice præstent, in olla cruda, cujus os luto sit oblitum, usque dum figlinum percoquatur: deinde vino restinguuntur, iterumque vino subacta, eodem modo cremantur: postremò cerassæ modo lavantur, & coguntur in pastillos. Ceterum creduntur ustionis ejusmodi ratione in medicamentis oculorum spodio minimè cedere. Quare & iisdem viribus pollere censendum est. Hæc Diosc.

Hinc patet aperte falli Amaturn, & immemorem verborum Diosc. fuisse, quando ait, Flores & folia Oleastri combusta, pro spodio usurpan, Arabum invento.

Elephas Chamæleonte concolori frondi devorato, occurrit Oleastro, huic veneno suo, inquit, Plinius, qui reliquas quoque Oleastri vires his complectitur. Foliorum eadem natura, [scil. cum Oleæ foliis.] Spodium è cauliculis vehementius inhibet rheumatismos. Sedat & inflammationes oculorum, purgat ulcera, alienata explet, excrecentia leniter erodit, siccatur, & ad cicatricem perducit. Cætera ut in Oleis. Peculiare autem, quòd folia decoquuntur ex melle, danturque cochlearibus contra sanguinis excretaiones. Oleum tamen acrius atque efficacius: Et os quoque colluitur illo ad dentium infirmitatem. Imponuntur folia & Paronychiis, & carbunculis, & contra omnem collectionem cum vino: ijs verò quæ purganda sunt, cum melle. Miscetur oculorum medicamentis, & decoctum foliorum & succus Oleastri. Utilliter etiam auribus instillatur cum melle, vel si pus effluat. Flore Oleastri condylomata villinuntur & epinyctides. Item cum farina hordeacea ventris in rheumatismo cum Oleo, & ad capitis dolores. Cutem in capite ab ossibus recedentem cauliculi decocti, & cum melle impositi, comprimunt. Ex Oleastro maturi [fructus] in cibo sumpti sistunt aluum. Tosti autem & cum melle triti, nomas repurgant, carbunculos rumpunt. Hactenus Plin.

Hipp. l. 2. morb. mulad fluxum rubrum inter reliqua medicamenta *ῥαῖς ὀξυράϊς*, id est, Olea agrestis scabiem habet. Sic enim Plin. l. 17. cap. 24. *ῥαῖς*, interpretatur, quam dicit morbum omnium arborum communem. Eandem, l. 23. c. 7. *Lichena* appellans. Quid si impetigo intelligenda, quam supra ex Theoph. diximus olea peculiarem, ut scabies in Fico?

Gratam etiam oleastri frondem Capris esse
Lucretius testatur, qua homini nihil ama-
sius;

Barbigeras Oleaster ed iuvenc usque capillat

- Effluar (Ambrasia) quasi veratrum rindum.

At nihil est homini fronde hac, quod amarum
exiter.

Oleæstri materiæ perpetuam naturam tribuit
Theoph. & propter amaritudinem, à nulla ne-
que teredine, neque tinea erodi.

Minora etiam simulachra, tam ex huius quam
Olez radicibus sculpi solita, quod rimas non ad-
mittant, & materiz æqualitate quodammodo
constare videantur. Ex Oleastro etiam brevior
marculi & cerebris vaginz sunt, quod in to-
tum Oleaginea nodosior sit ex sp. & spissa. Ac
etiamnum hodie ex Olastro delicatiora fieri ope-
rari in Germania. Cordus testatur.

Ceterum, quod ex fructu Oleastri exprimitur Olei Or
Oleum, pote itids estingit, inquit, Dose. quam leathiv
vel omphacinum, & ad usum sanorum secundum, tes.
sibi locum vendicat. Caput dolentibus, rosacet
vice, convenit. Sudores sistit, & defluos ca-
pillor inhibet. Quinetiam fursures & capitis ul-
cera manantia, Scabiem & lepras extergit: mo-
raturque canos, si quotidie illinatur. Oleum & ad-
gingivas uligine putri laborantes colluitur, den-
tesque labantes confirmat. Eiusdem calfacti &
excolati fots gingivis fluxione tentatis est ac-
commodatus. Lanam specillo circumdatam in
Oleum demergere oportet, ac gingivis tantisper
adhibere, dum albæ conspiciantur.

Plin. Oleastri Oleum tenue dicit, multoque a-
marius quàm olez, tantùmque ad medicamen-
tum utile. Gal. & eum secutus Paulus, non sim-
plicem ei temperaturam tribuunt, quippe, quodd
astringat simul & extergat, sed admodum squa-
lidum dicunt. Curtius calidissimum dicit, ex om-
ni Oleorum genere. Hoc in cibos non venit. Si
quis tamen eo quotidie barbam vel capitis capil-
los inunxerit, canitiem remorabitur, teste A-
mato.

ELÆOMELI

IN Palmyreno Syriæ tractu, ut scribit Diosc. Iquod Elæomeli vocant, ex quodam caudice manat, Oleum crassius melle, sapore dulci. Id cyathis duobus bibitum cum una aquæ hemina, crudum biliosumque humorem alvo detrahitis. Sed qui assumpserit torpescunt, viribusque destituuntur. Attamen eo minimè terreri oportet. Quin excitandi sunt, neque permittendum ut somno graviore consopiantur. Ejusdem meminit & Plin. his verbis: spontè nascitur in Syriæ maritimis [in Syriæ Palmyris vet. & Diosc.] quod Elæomeli vocant. Manat ex arboribus pingue, crassius melle, resina tenuius, sapore dulci, & hoc medicis. Item alibi: Elæomeli, quod in Syria ex ipsis Oleis manare diximus, sapore melleo, non sine nausea, alvum emollit. [solvit vet. & n.] Bilem præcipuè detrahitis: duobus cyathis in hemina aquæ datis: qui bibere, torpescunt, excitanturque crebro. Potiores [pugnatores, alij] certatim præsumunt ex eo cyathum unum.

Aurelian. Oleum Syriacum vocat, laudatque in
Paralyſi, ut mordicans, ac tendens et molliens.

Hermol. reprehendit Plin. quod in maritimis Syriæ nasci scribat, cum ea non Palmyra longe à mari absit: idem, non maritimis sed Palmyris, legendum coniecit: nisi quis, locum unde id excerpfit, non Palmyris, sed Almyris, legisse Plinium existimet: quod in tanto se viro dubitare nullo modo posse ait.

Ceterum Diosc. arborem ex qua manat Elixor

Capit. de
lar
Suder
Capit. de
juniorum.
Furiosos.
Vltima capit.
Scabies la-
pra.
Gongifa
parulenta.

Targeted

Locus.
 Substantia.
 Sapor.
 Vius.
 Purgatio.

Plus, c'est
noté.

Temp 8-
ran.

Pls. Call
Aug.

meli ignotum videtur, non enim nominat sed indefinitè tantum ex quodam caudice dicit: At Plin. aperte Oleas eius regionis esse testatur. Sed ad hoc cap. Diosc. Marcellus peculiarem opinionem habet: Nam [ait] Dioscoridem dicere, & sponte sua fluere, & opere humano ex summa arboris parte confici eundem docere. Imò sibi ipsi non convenire putat, quòd primùm dicat ex quodam trunco fluere: mox humano opere etiam confici, ὡς ἔσσεται: quasi Olearum furculos indicaret, quæ apud Athenienses τὸ βάμν significatio est. Atque aded difficile putat diversam Diosc. & Plin. historiam in hac re concordem facere. Quapropter τὸ βάμν voce corticem furculorum eiusdem arboris intelligit, quæcunque tandem ea sit: sed pro βάμν, legendum putat ἄλυσ, i. cortice, idq; hac ratione: nam, inquit, ubi ex trunco arboris humor per se fluit, expressis eiusdem corticibus fluere etiam poterit: persuasitque id præcipuè, quòd, conficere verbum, eam hominis operam indicat, quæ, quod nondum est efficiat. Unguen autem per se propius ad Olei naturam & habitum accedit. Nec ratione caret, ut, quod in ima arboris parte per se fluit, in summo lateat, nec nisi vi & humana opera extrahi & colligi possit: præsertimque ex corticibus, qui copiosiore, quàm interiores partes in pluribus humore abundant. Hæc Marcellus, qui se tamen non aded hoc decernere fateatur, ut illud penitus damnet. Ingeniosè sanè atque modestè, Nam & imperitis rerum ita rationabiliter videri posset, & rectè ab eo factum ut non pro indubitato decerneret. Certè nec etiam potuit. Posterior enim illa pars capituli apud Diosc. de Elzomeli, vel potiùs huius capituli appendix, quæ docet, ex furculis Olearum & Oleum fieri, non commiscenda neque confundenda est cum prioribus. Nam, ut dicebamus, in genere de Olea intelligendum quod de Oleo furculorum scripsit Diosc. non de peculiari illa arbore, siue Olea ea sit, ut e quidem censemus, & specialius mox explicabitur, siue de alia quadam hæcenus incognita.

Plin. iuxta Elzomeli non meminit eiusmodi Olei.

Hæc Manna [inquit Ruell. Elzomeli: de quo loquitur, intelligens] pertinaciter us, quibus se inserit, hæret: sic, ut non nisi cum fragminibus decerpatur. Optauerimus sanè declarasset, ubi viderit, unde profluxerit, quid denique de eius parente sentiat, siquidem specialem hanc adhesionis notam emulgare ausus sit.

Cordus Oleomel [ita vocat] quoddam in Syria, orbe alieno nascatur, nec authoribus constat è quam emanet arbore, atq; difficile sibi esse fatetur tē peregrinam indicare. Novisse tamen oportere duplex esse Oleomeli, alterum quod sponte sua ex caudice defluat, & alterum, quod ex eiusdem arboris furculis humana arte eliciatur. Oleomeli similem esse liquorem, qui apud nos veris tempore è Betullæ & Quercuum caudicibus sponte sua distillat humor liquido melle crassior: & alium ab hoc esse, qui sauciatis Betullæ & Ostryæ arborum caudicibus aquæ modo liquidus. Verùm, quod antè diximus, id repetimus, non videri nobis duo Elzomeli tradi à Diosc. statimùsque secundum Elzomeli Cordi non dicendum Elzomeli, sed Oleum.

Cornar. aperte fatetur Elzomeli hodiè penitus ignotum esse, quod & Lonic. & Ryffius aiunt, magno errore implicari eos asserentes, qui Mannam existimant.

Lonic. non necessariam dicit quod Marcell. apud Dioscor. ἄλυσ, id est pinguedinem in ἄλυσ

mutet. Cur enim [infæ] ex frondibus vel ramis arboris, cuius truncus Oleo fluat, non etiam Oleum expelleret humana opera? Quanquam, cum Oleomelle careamus, quid refert, siue ex cortice vel germinibus seu ramulis Oleum exprimitur?

Quanquam verò quotidie plura, varique mercimoniorum genera nobis ex Syria convellantur, Elzomeli tamen, inquit Matth. quod sciat, non modo non convehi, sed ne ullum quidem audivisse, qui ipsum viderit vel noverit. Idem ait & Diosc. & Plinium communie eorum sententia, quibuscum longam contraxerant consuetudinem, scribere, Elzomeli Oleum esse: & Diosc. addere non modo Elzomeli per se ex arbore manare, sed & factitium haberi tufis furculis. Quibus sanè verbis bis impingit Matth. Non enim scribit Plin. quod hæcenus quidem legerimus, Elzomeli esse Oleum: Nec etiam Diosc. dixit ex furculis fieri Elzomeli. Apud Diosc. suspicamur ἄλυσ vocem superfluum, quandoquidem à Plinio omissa.

Amatus quoque Elzomeli Europæ incognitum dicit, & quærit in India ex Nuce vel Palma Indica.

Sed huic historiz maximam lucem attulerunt Pena & Lob. cum scribunt. Oleæ Monspelij in vinetis duplicem perquam nobilem fundunt laticem: nimirum Oleum baccæ callo: & mel siue Elzomeli, quod mirum dictu, sed verissimum, caudice vulnerato. Atque ex Olea arbore vulgari perquam amara tota & ingrata, cortice, caudice, fructu nondum sale condito, emanare verè melleum, non solum colore, sapore, sed etiam duratione incorruptum experti sumus. Habemus namque, partim tam duodecim abhinc annis collectum à Rondeletio præceptore, partim à nobis quinque ab hinc annis, cum ed nos duxisset Stephanus Battalij, Monspelienis Dioscorides, vocatus, atque in tenellis ramis & stipitibus Olearum arborum, tam insolitas dimittas affatum nos latere monuisset. Tunc enim rimosis è corticibus, parum scalpello sauciatis, satis excepiimus, non modò ad explorandum, sed etiam ad amicis impartiendum. Verùm, non nisi propemodum penè matura Oliva ac nigricante vel purpurascante, quam Novembri & ingruente hyemis sævitia decerpunt, quisquam reperiet mel istud, ut nos plebecula monebat, quæ interdum tantam copiam ramis aggestam se vidisse una aut altera die ante vel post D. Catherine festum aiebat, ut, aviditati explendæ, pueri & mendici ed certatim confluerent. In proximis vinetis pone sanum fune cinctorum Franciscanorum, via ad Latreussem portam, etiam nonnihil emanabat, & plurimum ferebatur Lunellæ exillare, præsertim festis maioribus truncis, è quibus initio melle liquidior latex glutinosus effluebat, postea inibi relidens aliquandiu, frigore densior evadebat, atque, non tam mel quàm Mannam veram præ se ferebat, specie, gustu, sapore, contrectatione, omnium commilitonum iudicio qui degustant, inter quos Jac. Vrenhousius Gandauentis, generosus, & multarum literarum medicus doctissimus. Quin iam, dum hæc proderemus, cum multalij degustarunt & mirati sunt, tum Medici singularis eruditionis, vniuersæque materie medicæ consultissimi D. Parisiensis Drouetus, & D. Penius Anglus. Hæc illi.

Caterum, quidam, [ut Hermol.] suspicati sunt Aeromeli siue Mannam, esse Diosc. & Plin. Elzomeli siue Oleomeli: sed multi eam opinionem rejiciunt, nec sine ratione, ut ostendemus l. 8. c.

de

Marcell.
opinio pe-
culiari.

De arboribus
not.

Diosc. ex
plin. & il-
lustr.

Manna.

Oleomeli
Cordi.

Oleomeli
duplex.

Cordus re-
preh.

Marcell.
naturalis.

Marcell. ge-
nitus er-
ror.

Diosc. &
mend.

Elzomeli
ex Olea, &
quomodo.

Manna
Melleum.

Monspe-
liensis Dio-
scorides.

Tempus
colligendi.

Locus.

Descriptio.

de Manna. Eorum verò opinio, qui existimant Elemeli esse ex Palma Indica nucifera, reiecta est l. 3. ubi de illius Palmæ liquore traditur.

OLEA ÆTHIOPICA EIVSQVE Lachryma CAP. III.

STRABO Geograph. l. 16. scribit esse insulas in Arabia tres desertas, Oleis oblitas, non nostratibus, sed indigenis, quas Æthiopicas vocat, earumque lachrymam medicam vim habere: quæ, autore Dioscor. [qui λέγει τῆς Αἰθιοπικῆς ὀλεῖας: Æthiopica Oleæ lachrymam vocat] scammonio quodammodo similis est, sulua, stillis constans et ilibus, atque mordax. Quæ verò gummi & ammoniaci similitudinem refert, colore nigricans, nec gustu mordens, inutilis censetur. Nostrates Oleæ Oleastrique talem lachrymam fundunt. Facit porro illa ad visus hebetudines, & oculorum cicatrices albuginesque illita emendat, urinas menscitur. Erosorum dentium cavis indita, ad eorum dolores efficaci est auxilio. In medicamentum quoque exitiali vi prædita refertur, partusque etiam pellit: & impetiginibus ac lepræ medetur. Appellatur autem Æthiopica Olea etiam Olea sylvestris. Hæc Diosc.

Verum Paulus, l. 7. rei Med. Oleæ Æthiopicae lachrymam non Scammonio, sed Ammoniaco tenui, hoc est, gutta Ammoniacæ, quam vocant, assimilavit. ut αἰνι τῆς Σαμμωνίας [vel τῆς Σαμμωνίας] apud Diosc. non intemptivè Sarracenus, ἀμμονιακῆς λαρύας legendum suspicetur. Nec ob stare putat, quod paulò post subdit Dioscorid. lachrymam Ammoniaco similem inutilem & inefficacem esse. Nam de ea lachryma, quæ Ammoniaco vulgare, nimirum crassius, sordidius impuriusve referat, hoc accipiendum existimat.

Hermol. annotat Oleæ Æthiopicae lachrymam in pretio esse. Et tamen nescit quid sit. Subdit enim: Sit hæc Arabica quæ & ipsa dotatur lachryma, nondum constat mihi, quanquam puto eandem esse, quoniam in Arabici sinus desertis tribus insulis, ut inquit Strabo, nascitur: utcunque in Arabia stillat eam Olea, quæ medicamentum conficitur ἰσχυρὰ appellatum, singulari effectu contrahendis vulnerum cicatricibus.

Sunt qui hoc esse putent gummi genus illud, quod Neoterici Elemi quasi Enhæmi appellant: ad ossa etiam fracta calva conglutinanda cantatissimum. Oleas autem has in Arabia nasci ait idem, in maritimis & fluctibus, ætæque operiri Rubro mari: nec bacæ noceri, cum consistet & in solis sale relinqui.

Ex Æthiopia usque [ut ex Comico ait Marcel.] Æthiopicae oleæ lachryma quondam Græcis importabatur.

Non, ideo, parum certam eius in Græcis & Latinis demirabitur aliquis historiam, quam ab extremo orbe & incostis calore Solis gentibus didicisse oportebat. Neque à nobis desiderabit quisquam, quæ in tam longinquo & inaccessio orbe nascentia cognosci ætate nostra non possunt. Nescimus enim nos an ad mare hæc lachryma Oleæ sit in Arabia nascentis quæ in rubri maris, littoribus vivens, fluctibus & æstu aliquando operitur, saltemque in solis ostendit.

Plin. inter Æthiopiarum arbores eius non meminit: distantque tam longo intervallo inter Æthiopia & Arabia, ut non verisimile sit, quod

Tom. I.

in Arabia nascitur, Æthiopicae à Diosc. tributum fuisse. Nec mirum ignorari hoc tempore rem, cum Paulus ex aliorum fama potius, quam ex plantarum historia dicat, dicere quosdam Oleastrum esse Æthiopicam oleam, quod utique ex Diosc. hausit. Ruell. tamen oleam Æthiopicam omnino separata à sylvestri Olea.

Oleastrum in Æthiopia lachrymam hodie incognitam Cordus quoque fatetur: quosdam tamen esse dicit, qui existiment esse Gummi dictum Elemi, sed id neque negare, neque asserere.

Nos verò de Gummi Elemi egimus, l. 5. post arborem Molle, cujus lachrymam esse putamus.

Quod verò ipsam arborem oleæ Æthiopicae attinet, idem Cordus ait, considerantibus eam, eiusque materiem, nullam inventam esse, quæ æquæ eius habitum referret, ut lignum quod Rhodij aut Rhodisij cognomine circumfertur. Sæpius autem ignaris pro Agallocho, hoc est, Xyloa loc substituitur, de quibus suo loco.

Ex eadem aut simili coniectura Cæsalp. Ad simulastra, inquit, perpetua hodie Oleastrum Rhodium maxime expetitur, maculosa facie, prædensum, ut quodam modo Agallochum Indicum æmuletur, impostoribus adulterandi ansam præbentibus. Et addit: Oleaster, id est, sylv. Olea in Æthiopia lachrymam fundit. In mari rubro peculiarem de scribit Theoph. è cuius lachryma medici medicamentum componunt sistendo sanguini. Plin. Enhæmon appellari scribit Oleæ lachrymam in Arabia. Fortè fuerit gummi Elemi. Hæc ille.

Verum has coniecturas alibi explosimus, præsertim de Elemi resina, sicut & Apollinis. Quod de mari rubro peculiari addit ex Theoph. sciat, aliud esse marinum, sive in mari: aliud æta mare, sive maritimum, quod in littore vel tractu mari vicino nascitur. De Olea, autem marina Theoph. trademus ultimo hujus operis libro D. Vinter marinas plantas.

OLEA ΚΑΛΛΙΣΤΕΦΑΝΟΣ

ARISTOTELIS.

CAP. IV.

IN Pantheo inquit Arist. Olea est, quam Callistephanum vocant, omnia folia reliquis Oleis contraria forma producentis: Quippe, quæ supinam non pronam partem habeant viridiorum: ramos mittit quemadmodum Myrtus, unde & sumpta plantula Hercules in Olympiis Oleam plantavit, athletis coronas suppeditantem. Distat ab Ilisso fluviio stadiis LX. muro circumjecto munita. Ac ne quis tangat, grandi pœna cavetur. Hinc & Oleæ decerptum furculum, in Olympio campo plantarunt, ut victores inde coronis donarentur. Apud Pausaniam quoque legitur Oleastro Callistephano victores Olympios coronari solitos, sicq; solam eam Oleam quæ in Olympia nascebatur vocatam, quemadmodum in Academia satam, Moriam Græci dixerunt, ut Aristoph. & Pollux prodidere. At Theocriti interpres cum Aristoph. & Arist. Callistephani Oleæ, non Oleastri, ramis coronatos fuisse unanimi consensu scribunt. Mirum verò à solo Aristotele annotatum Oleam hanc à cæteris diversam, & à nullo alio, præter iam citatos autores, qui tamen differentiam hanc non tradunt, il-

C

Lachryma
descripta.
Farietate.
Vires &
usus.
Aibugo.
Vrina, menses.
Erosi dentium, oculorum
que dolor.
Venenum est.
Partum pellit.
Impetigo.
Lepra.
Olea sylvestris.

Arabica
lachryma.

Evacuatio
medicamentum ad
vulnera.

Gummi Elemi.

Hermol.
fugiat.

Lignum
Rhodium.

Oleastrum
Rhodium.

Cæsalp. &
Apollin.

Descriptio.

Hercules
Olea.

lud observat. Ea verò foliorum contraria forma peculiarem etiam hanc historiam postulat.

OLEA INDICA.

CAP. V.

MEMINIT quoque Theoph. Oleæ Indicæ, quam in montuosis nasci scribit, verum sterilem esse, ac medix naturæ inter Oleastrum atque Oleam. Sed & specie tota distare, & folia eius latiora quam Oleastri, angustiora quam Oleæ.

Descriptio. Aliter Plin. Oliva Indix, inquit, sterilis, præterquam Oleastri fructu. Sanè si sit sterilis, non erit Oleastri fructu: & vicissim, si Oleastri fructum ferat, non erit sterilis. Ideo non displicet Const. iudicium, qui sic emendat: Oliva Indix sterilis: cæteris, præterquam fructu, Oleastri. Debuissent sanè qui illas oras perlustrarunt, ad vivum arborem hanc describere, & in quibus ab Oleastro & Olea nostrate differat graphicè depingere.

ELÆOSTAPHYLOS.

CAP. VI.

CÆSAR Constantinus, vel quisquis alius sit operis Geoponici, quod eius nomine circumfertur, autor, (quem quidam Dionysium Vtiensem putant) huius historiam recenset ex Varrope quodam, ut ille ait, his verbis: Non est silentio prætereundum, quod de Oleæ cum vite naturali consensu tradit Florentinus undecimo Georgicon. Ait enim, si quis Oleam in vitem inserat, non solam uvas, sed olivas quoque parere. Talem arborem addit sibi visam apud Marium Maximum, qui cum fructum eius degustasset, negavit unquam se quippiam comisse, quod magis Oleam uvamque resiperet, tam exactè simul utriusque saporem linguæ representatum. Nasci autem tales arbores in Libya prodit, vocarique patria regionis voce Vholima. Perticas igitur subiiciendas, quibus ramorum onus sustinere queat. Si verò alio quovis modo inseratur, iisdem non esse opus. Ergo propter terram vitem terebrandam, & Oleæ ramum immittendum suadet, ut & à vite dulcedinem, & à terra naturale alliciat alimentum, ut tandem eius iucundiore cibo fruamur. Postea autem minori molestia fructum ex ea capi, ubi vitem non amplius onerat suo pondere, si videlicet acceptum ex ipsa ramum transplantemus. Servaturum enim misturam atque naturam progenitorum, si probè fuerit irradicata. Appellatur autem fructus à promiscua parentum conditione Elæostaphylos Græcis, quem Latine Vvoleam, vel Oleuvam dicere possis.

OLEA OLEASTRI ET OLIVELLÆ
æquivoca & succedanea.

CAP. VII.

CÆTERVM his nominibus, Olea, Oleaster, Olivella, varix donantur plantæ, præter Oleas antè dictas, ut Zimphus alba, mox dicen-

da, quæ Oleaster. Olea sylv. & Olea Bohemi. Oleaster Germ.

Oleaster Germanicus, qui aliis Rhamnus, paulò post sequetur. Coccygria malè existimatur à quibusdam Olea Calibrica.

De Coccygria autem, quæ Cotinos quibusdam dicitur egimus, l. 4.

De Olea Calibrica vel Calabrica Colum. quam Hermol. & alij malè putarunt Chamelcam, actum lib. 5.

Multis etiam Chamelca dicitur Olea humilis & Olivella, eaque nomina variis imponunt plantis.

Laureola folio perpetuo, & folio deciduo dicuntur Olivellæ & Oleastellæ, de quibus, lib. præced.

Olivellam suam habet Cæsalp. de qua sub titulo, Chamelca subtruncata.

Ligustrum quidam vocant Olivellam.

Phillyrea genus Oleaster dicitur Clus. autore.

Lycium Narbonensium oleæ species est Lob. de quo infra.

Habetur & Lignum Rhodium pro Oleastri genere.

Buxi item genus malè apud Plin. dici oleastrum, antè dictum.

Oleam maris rubri non benè suspicantur Apollo & Cæsalp. esse Oleam Aethiopicam & Elemi, ut ostensum paulò antè. Olea autem maris rubri Theoph. describetur inter marinas plantas.

Matth. tradit suam Præmiceam Olivellam multis vulgè dici.

Inter supposititia Diosc. scriptum Ebulum Dacis dici Olivam.

Oleastrifolia quibusdam est Nerium sive Ledum alpinum.

Nerium dicitur Oleander.

Et quibusdam Oleander Avicen. ut & à nobis cap. de Cneoro.

Quid sibi velit tractatus quid pro quo, substituens Olivæ Aegyptiacæ Adarces duplum nescimus.

Nec etiam placet pro Olivæ foliis præscribi folia Plantaginis.

Dod. annotat apud Diosc. depravatè, cap. de Orchi ἡ λεία μελανή, ἢ τοι σιλλή μελανή.

Elæagni seu Oleagni nomine plures quoque plantæ traduntur de quibus sub Elæagno.

SPINA OLEVUM PROFERENS

ET ALIÆ SPINÆ.

CAP. VIII.

CTESTAS, autor est apud Athen. in Carmania Oleum è spina (ἡ λεία ἀγρία) fieri, quod rex utitur: puta, vel ad ciborum condimentum, vel ad illitum corporis. Sed è qua spina id fieret non explicat. Καὶ ἡ ἰσχυρὰ Græci ἄγρια, spinam vocant è cuius fructu Acacia exprimitur. Quidam legunt Oenanthinum, ut notat Dalech. Theoph. Arianz spinæ meminit, è qua cum Sol oritur stillat Myrrhæ similis lachryma: verba eius sunt: In regione Aria dicta [quæ & ipsa Indicarum una] spina est, ἀγρία, ex qua lachryma gignitur Illyriæ aspectu odorèque similis. Hæc ubi Sol illuxerit profluat. In textu habetur, ὅταν τῇ ἡλίου. Dal. legit τῇ γὰρ αἰνῶν ἰσχυρῶν, id est, Gabyræ Myrrhæ. Sed vulgata Plinij lectio non consentit. Sic enim habet: Contermina Indis gens

Ariam

Oleaster Germ.

Chamelca

Laureola myrta.

Chamelca incana.

Ligustrum Phillyrea.

Lignum Rhodium Buxum.

Olea maris rubri.

Præmicea Matth.

Nerium alpinum.

Nerium.

Cneoro. Adarces.

Succedanea.

Plantago Scilla.

Elæagni.

Oleum spina.

Vitis.

Ariana spina.

Myrrhæ similis lachryma.

Theoph. & Dod.

Ariam



Ziziphum albam & Oleastri speciem quibusdam dictam notat.

Olea Bohemica.
Ziziphus
Theoph.

Matth. tradit arborem quandam nasci & vocari in Bohemia Oelbaum / sed non esse veram Oleam: se existimare esse Elzagnum Theoph. ac omnibus eius notis adstipulari. Esse enim fruticosam, folio Viticis simili, molli ac lanuginoso: flore albo gradatim virgis propè foliorum exortum prodeunte, odore non insuavi, è quo nullus proveniat fructus. Huic aliam per omnia similem haberi Viennæ Austriæ in viridario Sereniss. Cæs. Ferdin. quæ baccas proferat Oleæ figura, sed longè minores, apice in summitate aculeo simili. Ac addit hanc quoque sibi Elzagnum videri appellari posse, quòd folio ac virgis Agnum, fructu verò Oleam referre videatur: etsi sciat Theoph. Elzagnum non esse, quòd hæc sterilis sit, non fructum ferens, nisi fortasse deceptus sit Theoph. vel eius codex depravatus.

Alia.

Non esse Elzagnum.
Theoph.

In Histor. Germanic. eandem Bohemis Oleam dictam ait ramos habere similes salicis cum aliquibus spinis: Florem album esse, ferre fructus vel baccas, ubique similes veris Olivis, nisi essent minores, & superius acutæ. Oleam & Olivam Bohemicam vocat, Germ. Böhmisch Oelbaum. In Epitome, Matth. icon proponitur sine descriptione pro Elzagno Theoph. quasi Oraculum quoddam Apollinis. Sed neutiquam convenit descriptioni Theoph. Flos enim ei non est Populi albæ. Et distinctio illa quam putat, parvi est momenti. In Hist. Germ. non distinguit, & ait Oleam Bohemicam fructum ferre, quod prius negaverat. Adeò constans sibi est, uti passim.

Matth. error multus.

Solerius quoque volebat Elzagnum esse, & in Diosc. pro τῆ τῆς λευκῆς legendum esse, τῆ τῆς λευκῆς ἢ τοῦ τῆς λευκῆς ἢ τοῦ τῆς λευκῆς ἢ τοῦ τῆς λευκῆς.

Scisefum Aethiopibus.

Locus.

Scisefum Aethiopibus, ut tradit Rauwolf. in suo itiner. Arbuseula est, vel potius frutex spinosus, cuius folia Salsaf. [de quo suo loco] dicti solus utcumque similia. Locus gaudet udis, viarum item marginibus & arbutivis sepius. Ex unica radice plures erigit stipites, levi rufoque cortice textos, in varios brachiatos ramos, oblongos, firmos, spinis hinc inde munitos, quibus adhærent flosculi foris candidi, intus luteoli, tergemini, [drey vnde drey] è foliorum geniculis emicantes. Fructus sibi non visus. Non sine coniecturâ tamen putat Oleæ Bohemicæ fructum, affabrè à Matth. depictum, & mulari. Cæterum tam suavem primo Vere spirare odorem, ut prætereuntibus, licet ignota, facillimè innotescat, eosque ad se alliciat. Ideo à Turcis & Aethiopibus in ferta concinnari atque corollas, ut suis conclavibus parilem odoris suavitatem concilient. Scisefum dictum videtur atque desorto à Zizipha nomine.

Ziziphus alba.
Idem habet.

Oleaster in germen.
Vulgi.

Olea sylvestris.

Non desunt, inquit, Clus. qui Ziziphum albam Iovis barbam, Plin. l. 16. c. 18. esse existiment. [Anguil. tamen duas alias proponit] Nonnulli etiam Elzagnū Theoph. (quam tamen describit:) volūt, nihil aliud, quàm Salicis genus esse, & aliquando existimavi salicem latifoliam. Sed perlecto Rauwolfij Hodoeporico, animadverti ipsum aliam arborem observasse, Salsaf. appellatam, quæ ad Elzagnū magis accedere videtur. Vulgus plerisque in locis Oleastrum appellat, & legitimum esse putat. Castellani & Granatenses Arbol Parayso, hoc est, arborem Paradyfi. Galli, l'olivier blanc, & Olivastre Olea sylv. Septentrional. & Elzagnos Theophrast. foliis viticis, Lob. Ital. Zeingale. Ziziphus Cappadocia Dod. & Camer. qui & Zizipham albam esse Colum. consen-

tit. At Schnenck. aliorum nixus iudicio secti. Schenck. rē *idē*, Theoph. pronunciat, rique flores affinxit luteos.

Cæterum lubet huius plantæ historiam quondam à Doctis. DALECHAM. concinnatam, qualem ab eo accepimus, huic nostræ intertexere, quòd multa in ea tradantur ab aliis non observata, & ut is suo labore ac honore non defraudet: Illa autem sic habet.

Ziziphus Cappadocia Plin. in hortis quibusdam Lugduni visitur, ex Rhodo, [quod narrat] ab Equitum Rhodiorum procuratore & questore zatrij, olim advecta, priusquam Solimanus Turcarum imperator, in potestatem suā eam insulam rede-gisset. Arborem Paradisi vocant, ob suavissimum floris odorem. Quamquam & hoc nomen alijs etiam tribuatur, ut, Thuiæ odorata. Quidam Salicem peregrinam, ob foliorum cum Salice similitudinem.

Crescit ad magnitudinem Salicis, radicibus multis, crassis, huc illuc diffusis, & loci plurimum occupantibus per summam terram vagis, stolones multos mittentibus, qui nisi tollantur matrem emaciant, & absunt: avulsi verò & depacti vivunt & arborefcunt: cortex albicat, in stipite valde rugosus & crassus, in ramis tenuior, & molli quadam lanugine pubescens. In multos porro & longos ramos arbor finditur. Folia candida densa, oblonga, Oleæ sativæ similia, multa uni surculo adnexa, qui in longam validamque spinam desinit. Flos hians, aureus, in sex cuspides dissectus, priusquam se pandat, in alabastrum fastigiatus, ex viridi candicans, parvus, Rhamni 2. nostratis aut Mali Citrix figura, velut flosculis confectis, pendulus, ternis serè simul ad imam foliorum partem emicantibus, odoris iucundissimi, mea quidem sententia suavitatem floris Mali Citrix, quæ summa inter nos habetur, superantis. Pro fructu parva bacca est, Oleæ sylv. similis, sed minor, brevi pediculo alligata, viridis, & qua parte magis solem excipit, rubescens, lanuginoso quodam pulvisculo obsita, gustu subacido, sed carne valde sicca & exucca, qualis est caro Oxyacanthos, cum maturuit. Talex huius arboris excoctæ, & in terram defixæ, Salicis modo facillè comprehendunt & radiceantur. Bellunensis Avic. interpres Chales arborem describit, quam quidam hanc ipsam esse volunt. Ego equidem discrepare puto, quamvis in utriusque flore par sit odoris gratia, quòd editis iam foliis Ziziphus hæc floreant, Chales verò antequam folium exoriatur. Item, quòd baccis Ziziphus hæc gravari solet. Chales autem nullum fructum præbeat. Non tamen dubito quin ex huius Ziziphi floribus in operculata concha præstantissimi odoris aqua stillare possit, Oleumque ex iis cum Amygdalis tritis præparari, modo à Bellunensi recitato, odoris fragrantia excellens & pretiosum. Hæc ille.

Pro apum pastu probatissimos flores dicit Columella albæ & rutilæ Ziziphi.

Hist. Lugd. aliam habet titulo Ziziphi Cappadocicæ, in qua plures spinæ. Eadem & aliam iconem proponit nomine Olivæ Bohemicæ siue Elzagn. Matth. quæ eadem ab ipsomet autore huius historia existimatur cum Zizipho Cappadocica. Clus. quoque aliam habet.

Placet ramus apud Camer. in Matth. epitom. depictus, & in Histor. Germanic. licet desint spinæ.

Censor hist. Lugd. in suis Animad. scribit: duas in ea esse figuras unius plantæ illam novam, hanc Matthioli,

Dalech. de servata in hanc plantam.

Quando ex Rhodo Lugdunum venit. Arbor Paradyfi. Salix peregrina. Descriptio alia.

Radix. Cultus.

Folia. Flos.

Bacca.

Sapor.

Satis.

Chales.

Vitis.

Aqua. Oleum.

Apum pastus.

Matthioli, hancque sufficere potuisse, siquidem non ostendat differre. At sufficere non potuit nec plicuit Dalechampio, quod flores in ea non pingantur eo ordine ac numero, quo solent provenire. Dalech. equidem maluit spinosum pingere, quod ab eo factum antequam Matth. Oliva Bohemicae meminisset. Curigitur non exhibuisset utramque, siquidem fuerint ad manus.

Hoc est nodum in scirpo quætere, ut ne quid gravius excidat. Imò in renovata quoque Matth. editione nova appositâ icon cum spinis à priore diversa. Cortusius aliquando Pagavio ad nos misit pro Cypro quorundam.

Lutetiz & in aliis urbibus vicinis magna copia est non ferentium fructum, aut si ferant, non perfecte maturefcit. In Syria quoque nascitur. Apud Heracleam sepes ex ea fiunt, teste Bellon. Provenit etiam in Æthiopia, & in monte Libani, notante Rauvolff. Lugduni, in horto Cœnobij D. Eirenzo sacri, lætissimæ & nicidissimæ arbores hoc genus aliquot luxuriant. Spontè provenit in Bohemiz sylvis & hortis circa domos, Matth. Londini, Antuerpiæ & alibi in Belgio passim hortenlis est, sed fructus in Belgio non maturefcit. Lauannæ & Genevæ alibique in Sabaudia in hortis colunt, ut & Norimbergæ. Crescit spontè in sepibus cum Rhamno & Vitice iuxta urbem Guadix in regno Granatensi: & in omnibus ferè viridariis alitur non modò per Hispanias, sed etiam per Galliam & Germaniam.

Floret ætatis initio fructus autumnò matu-
rescit: sed rard admodum frigidis regionibus fru-
ctifera est. Clus. Apud D. Baronem à Schuendy
baccas plures Septembri maturas legimus in
Alsatia.

Plures surculos in horto E. C. Montb. pangi curavimus, ab Hugone Bauhino celebri Chirurgo Patruo nostro ex Matizfodinis missos, qui penè omnes feliciter proveniêre, & quidam etiam iam in arbores adolevêre, annuatim florentes, quamvis rariùs fructum perficiant. Hyemem ferunt, licet extrema interdum frigore adurantur, subinde tamen refutillat, vel caudex, vel radix.

Thephrasio Rhamnus dulci generum: niger *Rhamnus*
& candidus: diversusque eorum fructus. Vter- *duplex.*
que tamen spinosus. Hæc in historiis. At in r. *Theoph.*
de causis Rhamnum in genere sempervirentium,
collocat cum Hedera, in quo genere rara esse di-
cit quæ germinæ ac fructu præveniant, hoc est,
tempestivè germinant, fructumque profectant, ut
modò dixi. Quoniam verò Theoph. Rhamnis *Paliurus*
subiungit Paliuru n, quem Diosc. tertium Rham- *Theophr.*
num facit, dicenda quoque sunt quæ veteres *fr.*
de illo Paliuro scripsere: postea verò cap. de
Rhamno folio luteo demonstrabitur, an dis-
serant, nec ne.

Sic igitur scribit Theoph. de Paliuro istò: Paliurus fructum habet in siliqua quadam velut folio, vel foliacea: [sic enim legimus apud Theoph. ἐν ἀκτῇ τῇ τῷ ῥατῶν ἴχθυος, καὶ αὐτῷ εὐλίαν: non ut in vulg. legitur καὶ αὐτῇ τῷ φάλλει, ut sit ῥατῶν εὐλακώδης, ut dixit Diosc. de tertia Rhamni specie, quæ nihil aliud est, ut dicebamus, quàm Paliurus hæc Theoph.] in qua terna aut quaterna gignuntur semina, quibus contusis medici utuntur ad tussim; quæ ppe quæ lentorem quendam habeant cum pinguedine coniunctum, velut semen Lini. Nasitur locis humidis pariter atque siccis, sicuti Rubus: nec minùs etiam iuxta aquas provenit. foliis est deciduis, non perpetuis sicuti Rhamnus. Germinant ineunte Vere, & reddunt semen circa Vergiliarum occasum Paliurus. & Oxyacanthus.

Inter genera Ruborum, inquit, Plin. Rhamnus appellatur à Græcis candidior & fruticosior.

Is floret [has duas voces omittit Corn.] ramos
spargens rectis aculeis, non, ut ceteri, aduncis, fo-
liis maioribus. Alterum genus[eius, Corn.] syl-
vestre, nigrius & quadantenus rubens. Fert ve-
luti folliculos. Huius radice decocta in qua fit
medicamentum, quod vocatur Lycium. [Hoc
saltum & à nemine proditum, Dal.] Semen se-
cundas trahit. Alter ille candidior astringit ma-
gis, refrigerat, collectionibusque & vulneribus ac-
comodator. Folia utriusque & cruda & decocta
illinuntur cum Oleo.

Nicander in Theriacis ἀλεξίφάρμακον λέγειν vocat: ἢ γὰρ ἀλεξίφάρμακον inquit τοῦ τοῦ θοῦ ἀπαμείβετο φάρμακον: Tradit autem ieiunis datam, interitum à venenatis repellere. Interpr. ἀλεξίφάρμακον θεοὶν ἢ αἰώνιον ὅτι ἀγαθὸν ἐστὶν ἀπολλύεσθαι τὸς ὑπὲρ ἐκπίπτον πληγίτης τῷ πένθους, ἀλλ' ὅτι καὶ ἐν φαντάσματι βοηθεῖ: Alexiara dicta est, non modò quòd bona contra serpentum ac reptilium ictus, sed etiam quòd deest lit adversus spectra: nempe, quia nocturnos Incubos, Lemures,

Striges avertit efficaci amuleto: quo argumento in parentationibus antè fores suspendebatur.

Meminit & Lycophron & Euphron his ver-
bis: αλλ' ἔγωγε οὐκ ἴδμεν. Spinam lanalem hunc
esse volunt celebratam ab Ovid. in Fastis. Vbi
de Iano & Carna.

Nympha iubes queri de more remotius antrum
 Utque comes sequitur, desitque ducem :
 Sintra [vider] laurus qua post sua terga gorauntur]
 Nil agi & latebras respicit ille tuas.
 Nil agi en! dixit: nam se sub rupe latentem
 Occupat amplexu, & que poritus ait :
 Is pro concubitu nostro tibi Cardius esto :
 Hoc pretium posita virginis atri babe.
 Sic satis spinam, &c. Vid. pag. seq.

Endem hæc causa fecit, ut à Proserpina, inferno Numine, spina hæc Persephonios dicta ab aliquibus fuerit. Persephonem enim Græci Proserpinam dicunt.

A colore Leucocrosta, id est, alba Spina, & Cere

ZACCON HIERICYNTEA,
FOLIIS OLEAE.

Cap. X

Descriptio **C**AST. DV RANT. memoriz prodidit, quod
Zaccon de Hierico arbor sit magna, ut Auran-
tia Malus, spinosa, cum paucissimis foliis, Olez
similibus, angustioribus, acutioribus, virenti-
bus, ut Aurantia. Cui Flores albi: fructus verd
magnitudinis Prunorum, rotundi primò virides,
luteoli maturi: ossiculum, in quibus, ut in Pru-
no. Provenit in planitie Hiericuntea. Oleum
ex fructu utile affectibus frigidis.

DE RHAMNO.

CAP. XL

MVLT. Hodie Rhamni species inno-
tuere, quas omnes ad priscorum scripta
referre difficile est. Quapropter ut confusio evi-
tetur, libet primùm veterum tradita de Rham-
niæ, aliæque nonnulla generalia in medium pro-
ferre.

Cervina.
Diosc. di-
sc. 1. 1. 1.
et Rhamni
aria g. 1.
ra.

valis sive Cervina dicta est, notante Marcello: quæ voces ex supposititiis sunt Dioscoridis, apud quem *paliurus* frutex est, circa lepes nascens, (veterum *paliurus* sive *paliurus* sive *paliurus*: Sic Paul. quoque frutex acutus.) virgas gerens erectas, spinasque Oxyacanthæ modo aculeatas.

1. Folia sere parva, [sumpt. Marcel. legit *καρπία*.] ob-

2. longa, subpinguia ac mollia. Præter hanc altera

3. est, candidior: itémque tertia nigrioribus latiori-

Candidior.
Nigrior.
latior fol.

búsque folijs, & quadantenus rubentibus, virgul-
tis quinos serè cubitos longis: spinosioribus qui-
dem, at minùs firmos, rigidóse, minúsque acu-
tos aculeos habentibus. Fructus est latus, candidus,
tenuis, folliculi propè figura [*ὡς θυλακίδος*] verti-
collo similis [*ὡς θυλακίδος*, ut Ruell. & Cornar.
placet, vel ut alius (ipsiq. interdū Corn.) *ἀσπερίδα*.]

Diosc. di-
sc. 1. 1. 1.
et Rhamni
aria g. 1.
ra.

Vi. 1. 1. 1.
et Rhamni
aria g. 1.
ra.

Omnium folia Erysipelatis & herpetibus effica-
citer illinuntur. Feruntur & huius rami ianuis se-
nellrisve apposti veneficorum maleficia depelle-
re. Cæterum pro iis verbis: Præter hanc altera
est candidior, in Græco legitur: *ἐστὶ δὲ καὶ ἑτέρα
ἰσχυρὰ λευκότερα*: quæ verba, teste Goupiolo,
non inveniuntur in altero Codice, quem habuit,
manuscripto *καρπία* quoque vulg. ex. non ha-
bent. Inter reiectanea quorundam, quæ tamen
reponent Hermol. Marcell. & Ruellin. hist. sunt:
aliis *πικρὸς ὁμαλὸς λευκός*: Romanis Spina al-
ba: alius Spina Cervalis [*αφῆλεις*: Aphris Ata-
dum

Paliurus
Diosc.

De Paliuro verò, sic idem Diosc. Paliurus notus
est frutex, aculeatus, solidus, cuius semen pingue,
& Lini seminis æmulum reperitur, quod potum
russi opitulatur: Vesicæ calculos comminuit, &
serpentium moribus adversatur. Folia & radix
astringentiam vim habent: quorum decoctum po-
tum, alvum sistit, urinas trahit, & contra vena-
na, venenatorumque morsus auxiliatur: Radix
verò trita & imposita recentia quævis tubercula
& Oedemata discutit.

Vites & v.
fus.
Calculus
Serpentium
morsus.
Alvus flo-
nat.
Vena.

Sit sanè Rhamnus Phantasmatum veneficio-
rumque amuletum, quantum velint citati auto-
res, at in S. Scriptura exiguo honore habetur.
Nam ut D. Hieron. scribit in Aggæum, cap. 3. L. Iu-
dicum, c. 9. Infructuosa ligna veniunt ad dignum
sterilitatis suæ regem, id est, ad Rhamnum [ut
Hieron. interpretatur] spinosum fruticem, & ar-
buseulam sentibus uncinisque contextam, quæ
teneat quicquid attigerit, & retentum vulneret.
R. fermus autem, inquit idem, Rhamnum ad
Diabolum. Item in Sophoniam, c. 1. Rhamnus
plena sentibus, & Encio similis, qui habitat in
Babylone, & semper versatur in foveis, Esai. 14.
Apud Theocritum pastor comitem suum monet,
ne nudis pedibus per sylvam, in qua *ραμνὸς καὶ
ἀσπίλας ἰσχυρὸς*. Ex quibus utique verbis fru-
icem humilem esse colligitur, alioqui pedibus
minimè offendiculo esse posset.

Rhamnus
Diabolum
significat
in S. Scri-
ptura.

Athen. Loto Libyce folia tribuit Rhamni, pan-
lò tamen crassiora & latiora, ubi per Rhamnum
quis intelligere possit Rhamnum folio luvibino
nobis dictum, de quo postea. Photion, ut anno-
tat Hermol. Rhamnum à quibusdam Agnon à
virtutis similitudine vocatum scribit, quod vene-
rem coerceat, ut Vitex.

Hermol. de
Rhamno.
Agnes.
Veneris
panum.

Igniaria.

Rhamnum quoque igniariis utilem ferunt, præ-
fertim in conceptaculo & craticulæ: Idem Her-
mol.

Vires ex
Gal.
Téperam.

Galenus unius tantùm Rhamni meminit, l. 8.
simpl. Rhamnus, inquit, desiccat & digerit, gra-
du secundo: refrigerat in primo completo, aut
secundo incipiente: proinde Herpetes sanat, &
Erysipelata non magnopere calida. Cæterum, ad

hæc teneris utendum est folijs. Pliniam carpit Plin. 16.
Marcellus, quod amuletum contra Veneficia
Rhamno huic à Græcis assignatum, Aquifoliz,
spinose pariter arbori, assignavit: nisi fortè ea-
dem vñ Aquifoliz quondam inesse etiam credita
fuerit.

Antiquiores enim Græci, [inquit] Rhamnum:
posteriores alterius spinæ nomine, ob candoris si-
militudinem, Leucacantham.

Romani modò hac, modò illa appellatione in-
dicarunt: quæ alterius erant alteri etiam tribuen-
tes.

Naso cergè in Fastis suis Græcam fidem secu-
tus: Spinam albam Rhamnum dixit: ex re ipsa
& altera in Græcis Rubi huius appellatione rem
ostendens. Locus non longè à principio, l.
6. est.

*Sic facis, spinam, qua tristes pectore posses
A foribus noxas, hæc eras alba, dedit,*

Et paulò post.

*Proximus arborea posses ter in ordine magis
Fronde, ter arborea limina fronde notat.*

Item.

Virgæque lanali de spina sumitur alba.

Qua lumen thalamis parva fenestra dabat.

Rhamnus, inquit, Lonic. Hebræis Atad Iudi-
cum & multitudinis numero facit Atadim: un-
de proculdubio defluxit nomen in Diosc. Matth.
Ruellium aberrasse putat, quod Theophrasti testi-
monio, ea de Rhamni fructu tradiderit, quæ sta-
tim Theoph. absoluta Rhamni historia de Paliu-
ro disseruit. Sed in eo neutiquam nobis errasse
videtur Ruell. Nam, uti dictum, Paliurus Theoph.
est Rhamni 3. species Dioscorid. & Paliurus eius-
dem.

Amatus erroris insinuat Diosc. interpretes, qui
in eo addunt Rhamnum appellari Leucacantham,
vel Spinam cervalem. Sed paulò liberius
pronuntiat Amatus: interpretes enim non addi-
dere, sed ita in Græcis codicibus scriptum invene-
runt.

Idem Ruellium accusat eiusdem erroris, cuius
modò diximus Matthiolum eum accusare: Sed
error non est: & in sequentibus manifestè pate-
bit, non sine occasione id Puellium fecisse.

Anguillara tertium Rhamnum apud Diosc. al-
citur esse putat. Et sanè in his Clus. [cum Diosc.
eandem facultates suo Paliuro tribuat, quas
Theoph. suo Paliuro, verisimile est tertij Rham-
ni descriptionem, quæ apud Diosc. extat, ad Bo-
luri eius historiam revocandam, plerâque enim
notas habet cum Theoph. Paliuro communes,
At Dod. Verba, inquit, Diosc. de Rhamno 3. à non-
nullis doctis & quidè haud temerè, non ad Rham-
ni, sed ad Paliuri descriptionem facere, iudicantur
quæ mutila & imperfecta apud Diosc. est. Nam
Theoph. & ipse Plinius, non videntur inter se-
cundum & tertium, hoc est, inter album & ni-
grum, aliud, quàm coloris discrimen agnovisse.
Quod si ita est, Paliurus tertius Rhamni species es-
se non poterit, qui pro Rhamno 3. à multis ha-
bitus fuit.

Annotat Hist. Lugd. Plinium inconsideratè
duo Rhamnorum genera Ruborum generi ascri-
pisse.

Gal. uti dictum, & eum secuti Paulus atque Ae-
tius, velut de uno solùm genere, aut certè de uno
omnium facultate loquuti sunt.

Oribas. & Serapio Dioscoridem secuti, tria quo-
que genera memorant. Paliuri mentio à neutro
facta, ac si Rhamnorum historia involvatur, aut
eorum genere contineatur.



HISTORIAE PLANTARVM:

ma visum. Nos verò Rhamnum Germanicum longe diversum censemus à Lyce Ghino millio Rhamno, cuius effigiem exhibet Matth. Descrip-
tio quam idem insipit. sua habet, fictitia est, nec facta ad plantam à Ghino missam, cuius tamen iconem adhuc retinet. Cur non ex ipso ramo de-
scripsit, quem illi accepit? Sic & Rhamno suo secundo adpingit vel affingit baccas fortè nunquam à se visas, quemadmodum & Gallica nomina quæ sunt Rhamni cathartici.

Diligenter etiam perspicenti Matth. scripta, sci-
lè apparebit, ne eas quidem plantas de quib. scri-
bit, ei probè fuisse cognititas, & aliquot etiam inter se confedisse. Brachyolam taxat, quod supra syr-
pum de Eupat. dixerit Leucacantham arbuscu-
lam esse sepibus conficiendis idoneam. Camer.
apud Matth. in hist. Germ. ait diversas esse opi-
niones de Matth. Rhamnis: eius secundum, idem
videtur cum Oleastro Germanico Cordi: ex iconem
tamen non posse facillè colligi, propter spinas ni-
mis aduncas. Hæc Camer. qui iconem habet cum
aduncis spinis, quales non sunt in Matth. iconi-
bus. Nos igitur dicimus iconem Rhamni 2.
Matth. esse: x ramo Rhamni 1. eiusdem Matth. fa-
ctam. C. Bauh. apud Matth. ait Rhamnum 2.
Matth. multum similitudinis habere cum Rham-
no Germ. nisi sicidem. Nos contrarium sentimus.
Nec placet icon ab eo addita cum aduncis
spinis. Eiusdem sententia est, Rhamnum 1. Diosc.
Rhamnum nigrum Theoph. & Rhamni 2. genus,
sylvestre nigrum Plin. At Rhamnum 2. Diosc.
candidum Theoph. & candidiorem Plinio. An-
hic noster Rhamnus albus Amati, quando apud
Diosc. ait, Rhamnum tam album quàm nigrum,
& in Hispania, & Italia prosperè crescere anim-
adverto, qui sepium ornamentum sunt, præsertim
albus, cuius spinæ Oxycanthæ sunt similes, folia
verò crassa, pinguis, oblonga, Olivæ magnitudi-
ne. Quamquam, si Amato Rhamnus albus tam
benè notus fuit, cur non plures quàm unam, de-
scriptioni suæ inservit notas, repetens tantùm
Diosc. verba: cur etiam non differentiam inter
utrumque docet in titulo etiam diversarum plan-
tarum nomina confundens.

Imperitus Pierium Lacuna pro Rhamno 1. 2.
& 3. proponit icones ex Matth. & valde notas
ait, licet ipsi Matth. fuerint incognitæ, ut antè de-
monstratum. Gesn. Rhamnum 1. facit. Pena &
Lob. in adv. Rhamnum 2. Monspelien. cum i-
cone, in qua falsi Flores, addunt: Secunda spe-
cies Matthioli miris exquisitè respondere Diosc.
notis videbitur illis, qui Rhamni 2. speciem
Monspelij, sepibus muniendis apussimam, vide-
runt: nam tota planta alba & minoribus flori-
bus, foliis Oleæ, sed candidioribus Iesamini pu-
bet, at herbacei coloris: cortice ex viridipallè scē-
te. Monspelien-ses Rhamnum 2. vocant. In obs. an-
notat Lob. Rhamnum 2. Monspel. dictum, esse
Rhamnum 1. Diosc. Clusio. Verùm non animad-
vertit Lob. Matthioli Rhamnum 1. eundem esse
cum Monspelien-si, & Matth. 2. esse ramos primi,
quales planè observavimus & siccos habemus.
Ergo non magis convenit Rhamnus 1. Matth.
quàm Monspelien-sis, cum Diosc. 2. quem à primo
ipsemet Diosc. solo colore distinguit.

Hist. Lugd. ponit quatuor icones, quantum iu-
dicamus, unius huius plantæ sub his titulis:
1^o Rhamnus 1. Matth. 2^o Rhamnus 2. Matth.
3^o Rhamnus 3. Mōsp. 4^o Rhamnus 1. Clus. Rham-
num verò sive Oleastrum Germ. confundit cum
Rhamno 1. Matth. Nec placet opinio C. Bauh.
existimantis in suis animadv. in eandem. Histo-

ram, iconem Rhamni 1. Dod. & Rhamni 2.
Matth. duas icones esse unius plantæ: nos verò
censemus, ut antè dictum & post dicitur, Rham-
num 2. Matth. eundem esse cum primo Dodo-
nei.


CÆSAL. Rhamnum quem putat candidum
Theoph. & Diosc. 2. & Plin. 1. describit, Fruticem
virgas ferentem albas, foliis Oleæ pulpotis. Flo-
ribus specie Gelsemini ex purpura candicantibus,
baccis parvis Oleæ figura: videturque nihil aliud,
quàm hanc ipsam descripsisse.

Scribit RAVVOLF. in itin. circa Tripolim Syno. Linj
provenire satis copiosè Spinam cuius hinc mentio
lib. Iudicum, c. 9. & Psalm. Davidis 58. in calis di-
ctam Hausen: Arab. Hafflegi: Lat. Rhamnum.
Alii Nausig, sive Nausigi Maurie. dicitur tradunt. Ital.
Rhamno & Marraca: Rhamno 1. halesende Oli-
vari, disie & grassette, &c. Hisp. Castil. Cambrón,
Portug. Cambróns, Germ. Stœchdorn 1. Bohem.
Bodlak.

Natales plures diximus in historia deorsu. Locus;
Nascitur etiam, ut Clus. refert, multis Hispaniæ,
Lusitanæ & Galliarum Narbonensis locis. Monspe-
lij abundè observavimus circa urbem, nec non
in Aquis mortuis & circa Florentiam. Monspe-
lio allatus & in horto E. C. Month. confusus, e-
gregiè radices egit, & iam aliquot annis duravit:
sed hieme reponendus. Autumno nova succre-
scunt folia, interdum decidua. Floret Martio, pa-
ri et atque Autumno.

Huius Rhamni prioris folia Salmanticæ & alijs
quibusdā Castellæ locis, autore Clusio, cum turio-
nibus ex oleo & aceto edunt primis mensis: non-
nullamenim acrimoniam cum aciditate coniu-
ctam habent, quæ saponis gratiam conciliat. Vi-
res quas Rhamno veteres tribuunt antea propo-
suimus.

RHAMNI PRIMI SPECIES AL- tera Clus.



RHAMNI
prioris alte-
ram speciem ob-
servavit Clus. si-
mitem ferè pri-
mo, sed humiliore-
rem & frequen-
tioribus ramis fru-
ticantem, minori-
bus foliis, & ma-
gis carnosiss, salso-
que gustu, supe-
riore candidiore n,
Floribus, eiusdem
cum illo formæ;
sed purpureo pla-
nè colore.

An de hac Bel-
lon. l. 2. obs. 59.
Arbuseulam inve-
nimus Rhamno

alteri similem, secundum littus maris Rubri. foliis
admodum densis, salis, albicantibus: ramis spi-
nosis, sed spinis obtusis, ut in Rhamno Euro-
peo.

Vno tantùm loco invenisse tradit idem Clus.
iuxta Horivelam urbem, Orselim veteribus di-
ctam ad flumen Serabin, Segura vet. regni
Valentini extremis li-
mitibus.

RHAMN

HISTORIAE PLANTARVM:

nonnunquam ad hominis proceritatem
aspirans, cortice cinereo, ramis firmis, ex quibus
futeoli hinc illinc oriuntur, per intervalla profe-
rentes, & semper in rigidam spinam desinentes,
que nota stercoreis discrepat. Fructus est circu-
latus, scissilis, rotundus, cum maturuit plicem-
cent, folliculo aut vesicula similis, succo lento
pleno, acidi gustus, nec ingrati, cuius, omphacij
vice, ad ciborum condimentum usus esse possit.
Iste sane descriptio satis aperte declarat hunc no-
strum, quem tamen Historia male eundem putat
cum Rhamno 1. Matth.

Hist. Lugd.
1771

Eadem vero huius & aliam ponit descriptio-
nem e. Pena, & iconem, titulo Rhamni 2. Dod.
& p. 111. Pena.

Cassaro Bauhino in suis animadver. Rham-
nus 2. Monsp. & Rhamnus 2. Dodonai
videtur dux figurae unius plantae, posterior ta-
men melior: nos contra existimamus, Rhamnum
2. Matth. diversum à Dod. secundo, ut ante di-
ctum. Rhamnus Germanicus eidem C. Bauh. qui
annotat: semen esse ex rotunditate oblongatum,
splendens, tunica foris fusca, intus candida in-
volutum includi. In aquis ad Rhenum infra
Hunningen Basiliensium ludere: unam, latiori-
bus esse foliis & longioribus bacis singulis vel
binis stipiti annexis: aliam, foliis angustioribus &
brevioribus, bacis multis velut conglobatis, quae
& hieme fructu adharent: quae satis conspicua
varietas est.

Rham.

1771

Fructus
Lactifolia
Angustifolia

Camer. Rhamnum 2. Matth. videri quidem O-
leastrum Germ. Cordi scribit, verum non posse ex
figura Matth. cognoscitur, quod quod spina nimis
curva sunt, dubitat an Matth. hanc intellexerit.
Ideo meliorem figuram apponendam curavit. An
C. G. Rhamni 2. genus sine flore: quod dicit
esse Theophr. Rhamnum nigrum, & Plinij 2. ge-
nus sylv. nigrius, & Rhamni genus Diosc. sicque
describit: Rhamni 2. genus arborescens ramis re-
ctis, foliis modo, cortice minus candido, foliis
angustioribus longioribusque [quàm Rhamnus
Monsp.] non pulposis, veluti pulvisculo ferrugi-
neo, inferne oblitis: Iuxta folia folliculos quos-
dam tenues sine flore fert, Hordei figura & ma-
gnitudine, pulvisculo scintillante oblitos, colore
ferrugineo: ij in maturitate parvae Olivae spe-
ciem gerunt, rubentes: succo intus croceo, tenui
tunica incluso: maturantur hyeme: semen uni-
cum continetur nigrum, aculeos rariore habet
acutioresque, sed infirmiores. Peregrina haec in
Hetruria. Multa conveniunt cum nostra, quae-
dam etiam cunctationem iniiciunt, quominus
temere affirmare audeamus. Indagabunt dili-
gentiores.

Rhamni 2.
genus sine
flore C.
G.

Fructus
Flore co-
rare.

Hactenus quoque nos latet, quoniam sit refe-
rendum Rhamni genus illud, cuius meminit
Ruell. l. 1. c. 12. Lubet itaque huc referre, donec
melius innotescat. Haec sunt verba: Aliud
Rhamni genus in afflatu maris nascens, quod pu-
taverim Rhamni fastigij, an numerandum, fruti-
ce nonnunquam arborescente, praeter longis ramu-
lis, qui rigidis armantur spinis, aculeis mucrone
sevientibus, folijs, tam amula facie Ligustrum
exponentibus, ut pro illis fallant, bacca, follicu-

Rhamni
species 2.
Ruell.

Fructus
Lign.

lari specie, verticillata, primum candida, post
maturitatem rubescens, tota flaccida, intus ul-
ginosa, quam pastores pecorum pabulo decu-
tunt. Ausus est tamen Ruffus Ruellij hunc
Rhamnum suo nomine proponere, cum ait,
Rhamni fastigij genus 2. an numerandum in af-
flatu maris &c. quod morosior quis plagiarum
diceret. Ceterum, de quo hic agimus, Rhamnus
Germ. Sandthorn/ weydendorn: quasi spinam
arenariam, aut scilicet spinolam dicas: Batavis
Scrubescens id est, acini purgantes, teste Lobe-
lio, Galli Gratianopolitani vocant, des argous-
ses.

Bacca Ger-
m.

Ruffus
plagiarum

Nascitur circa fluvios & amnes, solo lapidoso, Locum
arenosumque, copiosissima autem in Germania ad
Lycum Vindelici amnem, & ad Danubium ab
eiusdem Lyci ostio, usque ad Petreas fauces, per
quas Danubius fluit, tribus nullibus passuum su-
pra Kelheim oppidum sitas: Cord. In Ho-
landia ac potissimum Flandriae maritimis littori-
bus. Repetitur vero & alibi in convallibus, ac
iuxta profluentes amnes. Dod. & Clus. Lob. ait
Italiae, Galliae & Hollandiae maritimis plurimis lo-
cis provenire: Zelandiae, Lemnius. Circa Rhe-
num multis tractibus copiose, potissimum circa
Basileam, Curiam: Genevae ad Arar & Rhoda-
num loco valde glareoso frequentissima. Provenit
etiam in monte Baldo. In Alpibus Rhaticis, in
valle Tellina prope Meyensfeld, & Drusara pro-
pe Fedkirch, Campus D. Petri dicta, & pluribus
alijs Helvetiae locis, tam montosis quam convalli-
bus. Scribit Io. Fabri. in convallibus circa Curiam Rhe-
torum fuisse Rhamnum mirae magnitudinis: spi-
nis arborescentem & magnitudine truncos ad-
equantem. In Cl. D. Plateri horto in arborē crevit
& fructus tulit, qui tamen à nobis satis non pro-
verit. Iamdudum etiam in horto Morb. cultus
egreg. è repit, nondum tamen fructum protulit.
Allatus fuit Lugduno ubi, in prato Aine dicto, ad
Rhodanum abundat. Hyemem fert. Floret lu-
nio: Post autumnum demum baccae maturan-
tur & subinde tota haerent hyeme.

Locum

Tempus

Adornantur in Belgio huius virgultis Coena-
cula ac triclinia ineunte autumno, quo baccae
luteo colore suffundi incipiunt, atque in multam
hyemem spectaculo sunt, oculosque reficiunt, at-
que acido sapore nauseant ac fastidioso palato
gratificantur. Assatim salivam eiciunt, ac febrici-
tantibus suum compescunt, teste Leninio, qui
hanc Rhamni speciem Zelandiae Duijn besjen, dici
ait.

Vires &
usus

Salivam
eiciunt

Cordus tradit frondes eius in cubiculum pro-
iectas, mures allicere, praesertim siccatas. Notat
Hist. Lugd. succi usum omphacij vice ad ciborum
condimenta esse posse: aliud tamen nomen Bel-
gicum superscriptum Lobelij insinuare videtur.
Scribit sane Camer. in epit. Matth. acinos purga-
tricem habere facultatem à quibusdam affirmari.
Addit tamen parari ex his, quod vehementer
acidum sit, & attenuans & incidens, ut Berberis
fere, commendarique ad Dysenteriam. Hunc
nodum solvant experti: si tamen purgant, ut scri-
bit ille, Tamarindorum fere in modum id praes-
tare quis coniectare possit.

Purgans
Roh.

Dysent.

RHAM.

RHAMNVS ILLCLVS

CAP. XIII

Descriptio

Cortex.

Folia.

Flores.

Fructus.

In Rham-
nus n. per
Theoph.Lycium His-
panicum.

Rhamnus 3.

Hist. Lugd.
mor.

Locus.

Vfus.



RHAMNVS tertius dictus Clusio fruticulus est frequē-
tibus ramis, Spini magnitudine, cor-
tice nigro rectis, & spinis longis
armatis. Folia ex quibusdam tu-
berculis, ut in priore, multa si-
mul enascuntur, oblonga & angu-
sta, carnosae, colore viridi, gustu
adstringente, & Rhabarbarisapo-
rem satis referen-
te, semper viren-
tia. Flos veris

initio parvus, iuxta folia plurimus, & confertim
nascens, colore herbaceo.

Aestate nigrum fructum fert, Pruno sylv. si-
milem, rotundum, acerbum. Hisp. Spino negro
dicitur. Hic fortē est, inquit Clus. quem Bellon.
in Creta inveniri ait, fructu nigro. Ad nos eius
fructus ex Hispaniis postea missus est Lycij no-
mine, & in fruticem excrevit. Fortitan ad Rham-
num nigrum Theoph. refertur posset. Hic Clus.
Bellon. verò, l. 2. obs. 76. dicit in itinere inter Cai-
rum & Hierosolimam Rhamni speciem se obser-
vasse semine rubro, differentē à Græco, cui niger.
Ingenuē fatemur, nos nec Clusium, nec Bell. hac in
parte intelligere. Lycium Hisp. inquit. Lob. Spine
Burgundicæ aut Phillyreæ angustifoliæ non ita
ab similem perelegantem fruticellum, foliis tamen
multo angustioribus & ramulis exilioribus stu-
diosè alunt in Belgio, &c. Extrema infesta spicu-
lis virgulta: folia Thymelææ Monspeliens. exi-
liora, atrovirentia, gustanti adstringentia. A-
pud Belgas nullum fructum edit. Et mox supra
figuram ex Clus. appositam. Rhamnus primæ
speciei tertius, & fortē Rhamnus niger Theoph.
apud Clus. Hisp. Spino negro. Non diversum opi-
nor à Lycio Hispanico Belgij nuper inquilino fa-
cto. In append. aliam figuram habet eiusdem Ly-
cij Hisp. nomine. In iconibus Plant. Lobelianis
duæ ponuntur figuræ: uni titulus Lycium Hisp.
alteri Rhamnus primæ speciei tertius. Fortē Lob.
duas descriptiones & figuras unius plantæ, licet
diversæ videantur figuræ, ponit. Clus. sanè unius
tantum plantæ ex suis Lycij nomine donatis, in
Belgio provenire tradit, non duas. Rhamnus 3.
Dod. Hist. Lugd. scribit pinxisse Lob. Lycium His-
panicum, quod Clus. descripsit his ferè verbis:
frutex est spinosus, folia Myrti Tarentinæ vel
Buxi. Figura quam Lugd. ponit priore loco est
Clusij: altera ex appendice Lob. pro Lycio Hisp.
quæ non habet folia Myrti, sed longa. Quin
ipso quoque Lobel. folia Thymelææ habere
scribit.

Frequentem Granatensē & Musciano regnis,
locis incultis inter alios frutices invenit Clus. cui
in Belgio sata provenit.


Fructus decocto, eodem teste, membra relaxa-

ta & dissoluta, atque etiam podagra dolores uti-
liter foveri incolæ referebant.

RHAMNVS SIVE PALIVRVS

folio Iujubino.

CAP. XIV.



NON semper humilis est, verum interdum
admodum excrevit, ut
arboris tueri no-
men possit, mate-
rie perquam du-
ra, virgas emittit
rectas, & ab his
ramos patulos,
deorsum inflo-
xos, subruben-
tes, quos tenues,
rigidæ & morda-
ces armant spinæ.

Folia Iujubinis
tam similia ut ni-
hil supra, quibus
tamen nonnihil
videntur minora,
nec ita profundè

per oras crenata, sed minimùm, ac interdum ferè
nihil: cæteræ qui Iujubini folij nervos tres se-
cundum longitudinem decurrentes possident.
Iuxta quæ flores emicant parvi, stellati: orbicu-
lati: Succrescunt Fructus, lati, per margines mem-
branei, compressi, prominente utrinque um-
bone lignoso, cuius medio pediculus inseritur,
qui distracti, in geminis vel ternis loculis toti-
dem ostendunt semina, lubrico lavore & colore
seminum Lini, sed rotundiora, torosiora, pulpa
dulci, coloris ferè porracei. Fructus, [ut describit
Cæsalp.] depressus ex tenui pediculo pendet,
pulpa quadam fungosa circumducta, ossiculo in-
tus duro, intra quem tria seminis conceptacula sin-
gulis seminibus donata, quæ in suis alveolis tin-
tinabuli modo sonant. Facile autem nobis per-
suademus Theophrasti Palivrum esse hanc plan-
tam de qua, l. 3. hist. cap. 17. & Palivrum nostratē
Græcum ab eodem vocari, l. 4. histor. c. 4. Denique
eamdem hanc à Dioscor. uno capite dici Rhamnum
3. alio verò Palivrum, quorum omnium verba
posuimus antè, in genere de Rhamno tradentes.
Dioscoridem [inquit Guiland.] de iisdem plan-
tis in diversis locis pertractasse sub diversis no-
minibus, apertissimum: ignorantemne, an abun-
dantè diligentem nescio, exemplo sit Rhamnus
3. Idem & Virgil. dictus Eclog. 5.

Carduus, & spinis, surgit Palivrus acutis.

Supra quem locum apparet Servij lapsus, qui Pa-
livrum ait herbam esse asperissimam & spinosam,
ut rectè quidem notat Thes. ling. Lat. ipse tamen,
in alium similem incurrit, cùm ait, Palivrum her-
bæ nomen esse Galeno, l. 8. c. 33. simpl. quod falsum.
Nam nec herbam ibi dicit, nec fruticem, et si, reve-
ra, frutex sit arboreescens. Eundem Palivrum intel-
ligit Columel. l. 11. c. 3. ubi docet rationem paran-
dæ vivæ sepi, ubi inter vastas spinas recenset cum
Rubo & Cynosbato. Et Palivrum acutis spinis
vocat, l. 10. & ab hortis cultis exterminat.

Nec manibus, nisi in Feras, nec cruribus aqua

Terga Rubi, spinisque ferat Palivrum acutis.

In S. Scriptura non magnus honor sit huic fructi;

Descriptio

Folia.

Flores.
Fructus.

Semina.

Palivrum

Theoph.

Palivrum

Græc.

Rhamnus 3.

Diosc.

Palivrum

Diosc. 3.

Gal.

Diosc. 11.

Servij

Lap-
sus.

Thes. ling.

Lat. error.

quandoquidem cum impiis conferatur, ut supra ex regio Pſalt. retulimus, atque etiam, ut notat D. Hier. in Micheam, c. 7. Qui optimus in eis est, quasi Paliur* & qui rectus quasi spina i n sepe, & quasi Paliurus pungens & recinens: vulnerans, appropinquante sibi ad unco dente cōprehendens, &c.

Cordus Paliurum ait vulgò non cognosci, nec quicquam pro eo exhibet. Rhamni autem duas species agnoscit, candidum & nigrum, utrunque Theophrasti, ut ille ait, à se aliquoties visum: qui tamen non in Germania nati sint, sed ex Italia & Gallia allati. Et addit: fructus candidæ candidus: nigræ niger: quemadmodum & folium, quod oblongum parvumque est: Fructui orbiculata est figura, isque in medio turget, in margine verò tenuior est & veluti foliaceus, in summo verò, verticillo, quo, cum pondere suis infixo, utuntur mulieres, similis est, non tamen perforatus. Dioscor. & tertium Rhamnum recenset, cuius semen in quibusdam Diosc. exempli spondylo, in quibusdam etiam Asphodelo comparatur diversis naturâ plantis nos spondylo, hoc est, verticillo, similem esse iam ostendimus: quare non Asphodelo, sed spondylo legendum censemus. Idem in sylva obs. Rhamni, inquit, nigri fructus niger est, verticilli figura, orbiculatus, in medio elatus: Rhamni candidi fructus prædicto similis est figura, sed colore candidus. Hæc Cordus. Ut autem verum fateamur, nondum bene cum percipimus: videtur enim Rhamnum 3. Diosc. non distinguere à primo & secundo eiusdem. Fructus alioqui ab eo descriptus optimè quadrat huic nostro. Nam quæ de folio dicit, parvi momenti sunt, nec quicquam certi inde colligas quod intelligat. Huius nostri sanè folium nec candidum nec nigrum rectè dixeris.

Peculiarem opinionem habet Anguil. nimirum suspicatur, alteram Rhamni speciem adiectam Dioscoridi, ut aliz multæ plantæ spuriz. Occasio suspitionis est, quòd sibi contradicat Diosc. in descriptione huius fructus, cum dicit: fructum edit latum, candidum, tenuem veluti folliculum, hastulæ regiz similem. Quippe fructus Rhamni 3. qui ostenditur, etsi latus sit, hoc est compressus, non ideo similis est fructui hastulæ regiz, [Asphodelo] qui rotundus est vel orbicularis, non compressus. Præterea spinæ eius non sunt debiles, ut vult Dioscor. Deinde Theoph. de duobus tantum Rhamnis loquitur folijs non deciduis: qualis Paliurus non est. Adde, duas primas Rhamni Diosc. species semper virentes etiam verò non item, quæ, ut ex Theoph. verbis colligo, nihil est aliud quàm eiusdem Paliurus, admodum vulgaris Italiz, sicut & Græciæ: Nascitur etiam hæc planta omnis generis locis, tam siccis quàm aquaticis, frutex valdè spinosus, cuius folia similia Iuiubis nostris sylvestribus, nisi quòd latiora & rociundiora, & circa petiolum colore magis fusco. Plures emitit ramos altitudine quatuor aut quinque cubitorum, in multa brachia diuisos: suntque cum ipsi rami, tum spinæ coloris Castaneæ. Spinæ semper geminæ, una recta, altera adunca, recta ut plurimum supra incurvam locata, ad figuram harpagonis. Fructus rotundi, compressi, in medio nonnihil extuberrantes, qui spondylo figura similes, conferti ramulis adhaerent, colore primò inter viridem & album medio: fuliginoso verò si resiccati fuerint: Horum quilibet tria aut quatuor semina continet, substantia pingui ut Lini. Ita ut appareat hunc fruticem nihil aliud esse quàm Paliurum Theoph. ac Diosc. Nostro tempore vocatur ad-

huc in multis Græciæ locis nomine aliquantulum corrupto Paliur. Paliurus Græcis, inquit, Bellonius vulgò nunc Apaliura dicitur, quem multi existimant Rhamnum 3. laminaudiendus Matth.

Rhamni genus, quod nigrum est (ut etiam Diosc. inquit) quindm ferme cubitorum altitudine attollitur, infirmioribus aculeis: fructu tenui, folliculari specie, rotundo, verticillo non ab simili. In epist. addit, in eius medio ossiculum concludi, in quo parvus nucle* ut & aculeus aliquis longos reosque, nonnullos verò, ut Rubi, incurvos: falli verò eos qui putant Rhamnū 3. esse Diosc. Paliurū, sed adhuc magis cæcutire, qui eundem esse Diosc. adulterinū cōtendunt. Præterea dicitur eundem Rhamnus 3. Ital. *Maruca vera*. In post. com. Flores & tribuit mucosus, subcroceos, fructum candidum, in eius medio nucleum durum ac rotundum, ciceris ferè magnitudine, & in eo semen lentis instar compressum, rubro cortice, alba intus medulla: asserit præterea legendum esse apud Diosc. iuxta antiquum Codicem & Orisbal. *Maruca vera*, additque Paliurum Theoph. semen profere in *Maruca vera* id est, in siliqua prælonga, Fabæ instar, ut ille reddit. Græcis *Maruca vera* longam vel oblongam siliquam in plantis designare Suida & Phavorino testibus: imò ipsum quoque Theoph. manifestum testem esse ait eius significationis, qui l. 3. c. 11. de Acere scribens inter alia dicit: Paliuri fructum si-ve folliculum oblongum esse, &c. Obstare præterea, ne tertium Rhamni genus, Paliurus esse possit, ipsi quoque semen, quòd non in *Maruca vera*, sed in duro ac rotundo concludatur ossiculo, in ipsius verticis centro latescente, fungosa quadam siliqua exterius obducto, triplici intus cavitare diviso, ubi semen ipsum se contineat ac latitet, Lentis instar compressum, rufa, ac levi cuticula contectum, alba dulcique intus medulla, non autem fuliginosum ac pingue, ut de Paliuri semine scribit Diosc.

Verum hæ rationes Matthioli non sufficiunt ad demonstrandum Rhamnum 3. non esse eundem cum Paliuro. Inaniter etiam se torquet, dum *Maruca vera* contendit non aliud significare, quàm oblongam siliquam. *Maruca vera* enim & pro Hepatis extrema parte, & pro aunis ima & carnosa parte, quam Gaza Fibram vocat, & pro phaselo à Galeno de facultatibus aliment. l. 1. c. 28. Et pro vasculo, in quo semina vel fructus reponunt agricolæ, & pro summis rebus omnibus ab Hesych. & Suida sumitur: quamvis frequentissimè de siliqua vel folliculo, quo semen veluti vagina clauditur, dicatur, ut sæpe apud Theophrastum. Quod autem adducit Theophrastum, id non bona fide facit: non enim simpliciter dicit Theoph. *Maruca vera* sed *Maruca vera* quasi insinuare velit peculiarem ille vasculi modum, nec quicquam addit quod longitudinè ostendat. Deinde, quomodo terna aut quaterna semina parva facient siliquam prælongam Fabæ instar? Locus etiam quem citat ex Theoph. de Acere, ita habet. *Τὸν δὲ καρπὸν ὁ λίαν μὲν σπυρίων* [legèdū videtur *σπυρίων*] *καρπὸν δὲ τὸ πάλιν, πάλιν σπυρίων*: qui planè nihil pro eo facit. Nam si Aceris fructus nō sit admod. longus & tamen oblongior quàm Paliuri, sequitur sanè non esse prælongam siliquam Paliuri, ut vult Matth. Sic ex, cur semen, alba dulcique medulla, *Maruca vera* esse neget, nullam rationem videmus: Sanè & eiusmodi seminibus etiam Oleum elici solet. Ecce etiam non dicatur *Maruca vera*, fuliginosum? ut vertunt viri extra controversiam doctissimi, Hermol. Marcel. Ruel. & Cornar. intelligentes, uti putamus, de colore, à quo non aded dissidet rufus, qualem Rhamni semen habere

HISTORIAE PLANTARVM.

Solera. Al-
bi sinu
Infusa cap-
pore.
Lunata.
Pin. idios.
In vino potz alvum sistunt. Radix decocta & illita, extrahit infixa corpori. Vtilissima est & luxatis, tumoribusque.

Videtur autem Plin. duas plantas confundere. Nam vires quas primo loco ponit pro Paluro, respondent viribus à Dioscor. etiam Paliuro adscriptis. Verum si Palurus Diosc. & Theoph. [quod existimamus,] idem sunt, baccæ non conveniunt Paliuro primo: à Theoph. enim ex attribuuntur Paliuro Libyco, ut ex precedentibus apparet.

Connarus
Athen.
Dod. intelligit p. Zuram Plin. Rhamnum vel Paliurum, a folio Iuiubino, de quo ante. De Connaro & Paliuro Athen. vid. lib. 14. c. 20. ubi diversæ autorum de his sententiæ. De Connaris, inquit, prius apud Alexandrinos vocatis verba facim, ac de Paliuris. Meminit de his Agathocles Cynicus, his verbis libro historiarum patriæ tertio: Cum in sepulchrum fulmen irruisset, arbuscula [alij legunt arbor] ex tumulo pullulavit quam illi Connarum nominant. Est autem planta Vl-

Arboresc.
mi Piceæque magnitudine, nihilque minor (nonnulli legunt, magnitudine quidem parva illa est, pino aut ulmo magnitudine parivnde, nec immerito sic super hunc locum exclamat Dalecham. Quid hoc est dicere? Pinus sanè & Vlmus proceræ sunt arbores, ita veteres interdum ludunt nostram d. gentiam. Et Clusius, se hunc locum non intelligere dixit) Truncos habet frequentes & oblongos, spinasque paulum prominentes: folium est tenerum ac viride Phycæque simillimum. Fructum bis quotannis producit, Vere Liliæ & Aurumino, qui dulcis est omnino, & olive oleastrique fructui similis, carnem, osque illi simile habet, & differt succi voluptate, cuius fructus etiam viridis comeditur. Vbi verò siccatu fuerit, farina conficiunt ex eo, quas calcant, ac non pintunt, neque aqua irrigant. Paliuri ramum dixit Euripides in Cyclope. Theopompus lib. Philippic. xi. mentione n. facit de his, & Di-

Palurus.
Pinus.
phylus Siphnius, medicus in libro de his, quæ ab ægrotantibus & sanis sunt comedenda. Confident igitur periti an de Iuiubis hoc loco scribat Athen. Labet & ex eodem propter magnam similitudinem proponere quæ de Loto Polybij tradit: Quæ [inquit] de Loto scripsit Herod. eadem refert Polybius Megalopolitani, oculatus testis l. 12. hist. his verbis: Est autem Lotus arbor minimè procera, aspera, aculeata, folio Rhamni [Illicis, Theoph.] paulò latiore & crassiore: fructu perinit colore & magnitudine simili perfectis bacis Myri, dum augessit, coloris phœnicei, [Faba, Theoph. de Loto à Dioscor. hæc inaudienda sunt. Secundæ Loti Theoph. quæ] id est, fructum habet incusum nucis putamine, Herod. l. 4. fructum verisimè & appositissimè tradit esse lentisco similem, Dal.] magnitudine, rotundo, nucleo admodum pusillo. Maturus is colligitur, & cum alica contusus ad servorum famulorumq. cibum in vasa concalcatus, ac stipatur: ingenuorum autem edulis, detracto nucleo eodem modo reponitur, ac pro cibo est, gustu carici & Palmulis non dissimilis odore tamen suaviori. Fit & ex eo vinum, in aqua macerato, & trito, saporis grati, & iucundi, qualis est optimi mulsi. Merum id, & sine aqua, bibunt, sed ultra decimum diem non perdurat. Quamobrem paulatim ad usum brevistemporis conficiunt. Fit & acensum. Hætenus Athen.

Lotus Liby-
ca Polyb.
Solera.
Ruell. & Matth. volunt Connarum Athen. esse Paliurum: id negat Solerius, & vult apud eundem pro Philycz legendum Philycz: Paliurum

Libycam Theoph. eandem esse censet cum Loto Libyca Polybij. Paliuri species incognitas, omnia eiusdem genera semen in siliquis ferre salsæ Matth. asserere ex Theoph.

Plutarchus autor est, in Coccycio monte Paliurum arborem haberi, cui si vel bestia vel avis, aut aliud animal volucre fidat, velut inviscatum calix erit, præter Cuculum. Huic enim soli parit: & ne scripto derogetur fides Ctesiphonta citat in testem, libro arboribus dicato.

Ichthyophagi, ut annotat Hermol. piscium carnes semine Paliuri conditas inveterant.

Troglodytæ succo Paliuri pro vino utuntur vulgò. Nam proceres florem quendam expimunt, cuius liquor nostrati musto similis aspicitur.

De Paliuro apud varias nationes, inquit Ruell. discrepant historiæ, quæ facie multum dissimili, ut apud se nascitur, ostendant. Inter omnes tamen convenit, eam vivis hortorum sepibus ditatam, quod suis minacibus aculeis noxium pecus abigat. At nos vix concedendum hoc putamus Ruellio. Præterea, quem putat Paliurum, non est Paliurus, ut dicitur in Spino alba. Sic & Matth. Ad eò inter se, inquit, in quibusdam historiis discrepant scriptores, ut per se eorum mentes maxime perturbent, qui rerum veritatem indagare student. Id autem discriminis nimirum evenit de Paliuro. Nam quæ huiusce stirpis à Diosc. traditur historia, omnino differt ab ea, quam diversis generibus proutit Theoph. Hæc autem non convenit cum ea, quam memoria prodidit Agathocles: neque huic illa correspondet, cuius Plutarch. est autor, & hæc à prædictis omnibus dissentire videtur. Paucis igitur historiam perstrixit Diosc. Quod nobis est impedimento, quominus verum Paliurum de qua ipse intellexit, cognoscere valeamus. Theoph. quoque plura Paliuri sunt genera. Quare cum de Paliuro tot ac diversæ ferantur sententiæ & habeantur historiæ, facile, inquit, Matth. crediderim, Paliurum esse nomen ad nationum placita variis ac diversis aculeatis stirpibus impositum: etsi Iosephus Salandius medicus apprime doctus, & in stirpium historia non impertus, dum Veneta classe in Græciam traiecit, Diosc. Paliurum se vidisse pro certo affirmaverit, semine fuliginoso & pingui: atque inibi proprium adhuc nomen retinere. Hæc ille.

Bellonius scribit Paliurum Agathoclis descriptum à Theoph. provenire circa Sues in planitie Arabiæ desertæ. Quæ verò sit hæc Paliurus non dum nobis constat: existimavimus Nabcam, de qua mox, nisi ipse Bellon. separasset. Cordas apud Diosc. scribit variam esse apud autores Paliuri historiam, & in tanta varietate quicquam indicare temerarium fore: autores duplicem tradere, alteram arborem, alteram humiliorem. Quidam nihilominus temerarius apud Cordum annotat esse Klein Stachel Vackel, l. 11. Virg. similibus. Nos intelligimus Tribulum terrestrem, exiguum herbulam, & mi repentem. I nunc & Paliurum dicito. Nos verò ex prædictis satis patere arbitramur, plantam quam antea vocavimus Rhamnum sive Paliurum Iuiubinum, non male ad Paliurum veterum reduci posse. Paliurum alios existimant Iuiubam sive sylvæstem postea demonstrabitur. Patatur etiam Nabca dicta folio Rhamni vel Iuiubæ, esse Paliurus Athenzi, de qua paulò post. Quidam existimant Paliurum Theoph. fructu Cedri Grossulariam spinosam, ut vocant, de qua Lycium Gallicum quidam vocant Paliurum.

Observatio.

Succus Paliuri pro vino.

Matth. de Paliuro.

Paliurus Diosc.

Paliurus Agathoclis.

Paliurus duplex Agathoclis.

Indicium autem.

Aquivoca Iuiuba sive ex sylvæstem.

Nabca.

Grossularia spinosa.

Lycium Gallicum.

Agrifolium
Cissampelos
ex Aeth.
Alephium
Aronia
Oleaster
Corn.
Acacia
Zamorinus

lium peregrinum 1. de quo postea. Agrifolium male aliquibus pro Paliuro habitum fuit. Spinus albus sive Oxyacantha Matth. non est Paliurus, ut quidam volunt. Mespilus Aronia dicitur Ruellio Paliurus Africana, de qua egimus, l. 1. Paliuri etiam nomen videtur attributum Rhamno sive Oleastro Germanico, de quo ante. Acaciam putat Ruell. Paliuri Theoph. quoddam genus. Inmarinus an sit Paliurus dubitat Ruell. de quo inter Genistellas sub Nepa.

NABCA FOLIO RHAMNI
vel Iujuba.

C A P. XVI.

Descriptio

Omnipha.
Folia.

Spina.
Flores.

Fructus.


Officium.

Arbor.

Descriptio.

Spina.

Paliurus.
Theoph. sive
Ziziphus
rampia.



E Creta ab insigni medico & Botanico Honor. Bello missi rami, nomine Oenoplia, quibus Cortex albus, folia qualia Iujubis vel Rhamno, qui alius Paliurus dicitur, trinerviata, nulli crenatis cum brevibus pediculis, & iuxta singulos spinas tenues, alba. Flosculi racemosis similes jujubinis.

Fructum vero Napeca & Nabca nomine ex Italia tulit L. Henr. Cherlerus. Is Prunum Cereum autumnale aequat, cortice rufo intectus, cui & caro subest concolor, saporis grati, aciduli: huic verò & ossiculum immergitur nucleatum.

Biferam arborem esse adnotat Alpinus, Loti magnitudine, Acaciae instar spinosam, foliis Iujubae proximis, latioribus: floribus quoque qui Iujubae floribus planè sunt similes, albis, parvis. Bello ait, Oenoplia seu Napeca arbores ad Pyri nostrae magnitudinem exsurgere: fructu, Pomo sylvestri adeò consimili, ut pro altero alterum quis sumpsit, dulci, cum acore grato & suavi, nucleo intus, qualis est Oliva.

Lubet & eiusdem Hon. Belli descriptionem excitatione Clus. adscribere. Arbor est, inquit, Pyri mediocris altitudine, cuius caudicem & ramosa git cortex exalbidus, ad cineraceum tendens: folia Paliuri Theoph. seu Ziziphi rutila foliorum sunt similia, binas uncias longa, unam, tribus nervis à petiolo secundum longitudinem excurrentibus praedita, superna parte saturata viriditate, inferna ad cineraceum aliquantulum

Tom. I.

tendentia, quae ramos alternis inordinata ambiunt: ad quorum exortum multi nascuntur flosculi albi, flosculorum Oleae instar peculiaribus longis petiolis singuli nitentes. Fructus succedit, parvo Malo valde similis, magnitudine ut plurimum Cerasi, interdum tamen, Nucem Inglandem etiam aequante, suavis gustus, ossiculum in se continens Olivae instar. Buera autem est: nam & novo Vere & Autumno singulis annis fructum profert. Vernalis tamen plerumque ad fructum non pervenit, ob imbrium copiam, & à vermibus corrumpitur.

Duo eius genera, eodem teste: Spinosum unum, alterum Spinis carens. Spinosum ab Alpino describitur, qui Connarum Athen. (& rectè) esse censet, licet icon ignis, arborem non rectè exprimat. Spinis carens, in Aegypto, Syriaque provenit: Nascitur & in Creta, in urbe Rhetimo, & Syria allatum, quod non noverat Alpinus, quemadmodum neque Hon. Bellus Spinosum.

Quare diu fuit in ea sententia, ut non Connarus Athen. esset hæc arbor, sed potius Polybij Lotus Lybica, ab ipso Athen. eod. lib. paulò post descripta, cuius verba antea citavimus, præsertim cum videret arborem Spinis carens, hancque suam sententiam Alpino significavit, à quo Oenoplia ramum spinosum acceperat, quem, demptis spinis, eundem fuisse cum Napeca à se descriptam Bellus testatur. Ramos nos pulchros vidimus apud C. L. D. C. Bauh. & Jac. Zuingerum inter alias plures exoticas. D. Rauvolff quoque aliquid ad nos misit fructus hoc titulo Iujuba-
Connarus Athen.
Lotus Lybica.
Iujuba.

nam alia species in Palestina frequens: sed hic fructus rotundus est, non longus, ut Iujuba vulgaris. Alpinus quoque testatur bis in anno florere ac fructum ferre, sed Vere non perfectè maturam, ac computrescere prius quam maturet. At Autumno perfectissimum ac opimum evadere. Provenit Oenoplia seu Nabca, inquit, Bellon. frequens in Aegypto, Syria & Armenia, qua Græcia totaque Europa caret. Secundum eundem, omni tempore viret, quod tamen Hon. Bellus tantum in Aegypto & Syria nascente, verum esse ait: in Cretam vero translata, falsum, teste experientia. Porro utriusque prædictarum arborum, tam spinosæ quam non spinosæ, historia est apud Serap. sub nomine Sadar, eodem censente, nec repugnante Alpino, sed more suo cum Loto Diosc. (à qua valde differt) confundit.

Is Sadar duas facit species, una est Afri, & alia est Ad hal: sed Afri non habet spinas acutas; utriusque autem speciei folia sunt lata & rotunda: sed Nabach & Ad hal fructus sunt parvi, præferuntur huius provinciae cæteris, & in regum mensas veniunt, quia dulcedine omnibus aliis præstant, sicut & odore, nam & aromaticam suavitatem in ore relinquunt, eandemque indumentis conciliant iuxta ea positis, sicut alia aromata. Reliqua quæ de Nabach [hoc est Loto] habet ex diversis autoribus, cap. de Loto recitata sunt.

An Lybica Paliurus Theoph. Item an Paliurus & Astorum Zura Plin. Item an Athen. Connarum Agathocli, qui & idem etiam Paliurum appellare videtur? Verba eorum, quod adhuc dubij sumus, ante adduximus, cum de Paliuro ex Veterum placitis traderemus. Interim certiora perquirent posteri.

Bellon. vult esse Oenopliam Græcorum, à qua Paliurum Agathocli aperte distinguit, lib. 1. obs. cap. 54. Considerandum an historia Loti Polybij apud Athen. quam antea sub Paliuro Connaro subiecit huc referri possit.

D 1

Nabecam, dicit Alpinus, olim Aegyptiis idem fuisse cum Paliuro & Connaro Athenis: tamen Connari fructum non videri omnino similem Nabecæ fructui ac ossi: seque etiam nusquam in Aegypto ex siccatis illis fructibus farinam fieri animadvertisse.

P. Martyr de rebus Oceani & noui orbis: Po-
ma inquit illa, ut Præcocia Pruna, quæ ossata
parua etiam & rubella, arbitror ego eius generis,
qualia ipso comedi Aprilis mense in Aegyp-
ti Alexandria: quorum arborem Iudæi indigenæ peri-
ti legis Molesæ, Cedrum Libani asseverant, ea
sunt esui apta: dulcedinem leni quadam acrimo-
nia mixtam habent, uti in Sorbis videmus. Loco
Persicorum & Cerasorum, atque huiusmodi a-
liarum arborum incolæ in hortis arborem hanc
plantant, & diligentem curam nutriunt, cum pere-
grina sit. Ea est Ziziphæ arbori & altitudine
& trunco etiam simillima. Et Rauvolf. Iu-
bam albam vocat, Weissenbrustberlinbaum /
quàm se vidisse ait inter Rama & Ioppæ: pri-
numque existimasse, esse Paliurum nostrum, tertium
genus Rhamni, ac tandem agnovisse errorem, si-
milem, tamen esse Paliuro 2. cuius Theoph. me-
minit, l. 4. cap. 4. In Syria teste Bello, Nep-
sen vocatur: ac in Creta proprio nomine caret.

Horum fructuum temperies, si Serapioni cre-
dimus id de Sadar suo ex diversis scribenti, est fri-
gida & sicca in primo gradu: perfectè maturi a-
liquam habent humiditatem: sunt omnes astrin-
gentes, ante maturationem, quorum usus fre-
quens est ad stomachi alique relaxationem fir-
mandam: ad quæ mala succum etiam ex ipsis im-
maturis expressum familiariter tum per os sum-
ptum, tum clysteribus injectum usurpant Aegyp-
tiji, teste Alpino. Ex hisdem quoque fructi-
bus siccis in aqua maratis sit infusio uti-
lis ad intestinorum relaxationem & ulcera. Sed
maturorum siccatum decoctum aut infusio fa-
miliarissima est ad omnes pestiferas febres. Aiunt
enim hos fructus miram agnoscere venenolas qua-
litates & putredinem, efficaciam habere, corque
strenuè roborare. Succus item perfectè maturo-
rum optimus est ad purgandam bilem & ventri-
culo, & primis venarum ductibus. In omnibus
etiam putridis febribus, infusione ex ipsis parata,
libenter ad sedandum calorem utuntur. Esui sum-
mè iucundi existunt hi fructus, præcipueque ma-
turi: tamen parum nutriunt, facileque, ut Cera-
sa, in stomacho corrumpuntur, si immoderate
ipsorum esui indulgeatur, stomachusque offendi-
tur. Apud primates tamen Aegyptios ac Turcas
in deliciis sunt, & magno in pretio habentur.

ZIZIPHA SATIVA ET SYLVEST.

C A P. XVII.

Descriptio **Q**UÆ in officinis notas Iujubas fert, arbor
est domestica, sed in fruticem spinosum fa-
cile degenerans, teste Cæsalp. alioqui satis ma-
gna, stipite recto, in ramos plures brachiato, qui-
bus in tenuibus surculis quasi pediculis adna-
suntur alternatim folia, unciam aut sesunciam
longa, semunciam aut unciam ferè lata, in obtu-
sum mucronem desinentia, splendido virore ni-
tida, tribus secundum longitudinem decurren-
tibus nervis, per ambitum serrata: ad quorum
ortum rami spinis horrent, aliis aduncis brevioribus,
aliis rectis longioribus: (sed cum senescit
aculeis caret, inquit, Cæsalp.) eodemque loci flo-
res, plures ferè simul emicant, pediculis brevissi-
mis, ut ferè sessiles videantur, Ribes floribus
persimiles, colore herbaceo, apiculis concolori-



bus. Hosce fructus
excipiunt forma
& magnitudine
Olivari, Coræo
crassiores & per
mauitatem ru-
bentes, vel ut ait
Cæsalp. ex pallido
nigrescentes, quasi
sumo infecti, pel-
licula crassiuscula
pulpani subalbi-
dam, mollem, fun-
gosam melles dul-
cedinis conteger-
te, cui immixti-
tur officinum ob-
longum, utrinque
acutum, rugosum,
in quo nucleus

maioris instar, rufa pellicula tectus, i. pore a nato.

Cordus quoque singulari diligentia, hos fru-
ctus sic describit: Iujubæ quæ Gæcis Zizipha no-
minatur ab Oriente in Europam inuenta, arboris
Pomaceæ hæc sunt. Corni hæcis sanguineo &
splendente foris colore, oblonga figura & singu-
lari intus ligneoque semine similes, aliquantu-
lum tamen maiores, & ad modum Pruni, aut
Olivæ magnitudinem, accedentes, levi, molli,
glutinosi gustuque dulci pulpa seu carne con-
stantes: in medio singulare, ut dictum est, semen
continentes, utrinque acutum, foris duro ligno
intus oblongo aliquantulum compresso & rufo nu-
cleo constans. Asseruntur ex Italia ad nos siccatæ,
ideoque rugosæ. Iujubæ minores, Plinio Tuber-
es appellantur, colore nitore, carne molli lentore,
sapore & nucleo maiores imitantur, his tamen mi-
nores, nec oblongæ, sed rotundæ, atque sum-
me flaccidæ. Eligantur maiores ponderosio-
res, minis flaccidæ, & plenior carnem ha-
bentes. Asseruntur hæc quoque ex Italia.

Iujuba sylvestris, teste Angul. similis est Palin-
ro primo, quem folio Iujubino diximus, non so-
lùm foliis, sed ramis & spinis. Frutex est altitudi-
nis quatuor aut quinque cubitorum: cuius ra-
mi se terram versus contorquent ad formam se-
micirculi, spinis abundantes crassioribus, & simi-
liter acutis, binis simul dispositis, modo prædicto.

Folia disposita sunt ut in Sorbo. Fructus simi-
les Iujubis domesticis, nisi quod multo minores,
& similiores Cedro ferenti fructus minores, aut
Lauri fructibus, qui, ubi maturuerint, tubent, &
esui apti: non autem nuclei, qui ossei, ideoque
reliuntur. Quibusdam in locis fructus hi in vi-
num immittuntur ut suavius reddatur. Reperiuntur
in agris Veronensibus.

Columella rutilam & albam Ziziphum inter
probatas arbores, & apum pabulationibus com-
modas refert: postea tamen Ziziphi flores aut mel
mediocriter gustus reddere.

Plin. Zizipha & Tuberæ retulit ad mala, quo-
rum plura genera dicit, & mox subdit: Aequè pe-
regina sunt Ziziphum & Tuberæ, quæ & ipsa non
pridem venere in Italiam, hæc ex Africa, illa ex
Syria. Sext. Papin. quem Consiliary vidimus,
primum utraque attulit, D. Augusti novissimis
temporibus, in castorum aggenibus lata, baccis
similibus, [de Ziziphis id audiendum, non de
Tuberibus Dal.] quàm Malis, sed aggenibus præ-
cipuè decora, quoniam & in recta iam sylva scan-
dunt. Quibus utique postremis verbis insinua-
re vult,

Cedrus
Libani.

Iujuba al-
ba.

Nep Nep
Syræ.
Vires &
ulsi.
Tempera.

Stomachi
ex alui re-
laxatio.

Ulceris in-
testinorum.

Febres pe-
stifera.

Cardiaci.
Purgati-
onem
Febres pe-
stifera.

Cibus.
Natura.

Iujuba ma-
iores.

Nuclei:
Iujuba ma-
iores.
Tuberæ
Plin.
Iujuba syl-
vestris.

Folia
Fructus

Pinum
suavius
reddit.

Ziziphus
rutila
&
alba.

Zizipha &
Tuberæ
Plin.
Quæ tem-
pere vixit
ut Plin.



Expositio
cum in
Quartana

Græci Poëtæ iudicium inaudiamus. Faterur is se
dum egregiam in iis invenisse: quippe qui, cum
Quartana laboraret, & Zizipha inspexisset, su-
bitò se convalescere asserat, & Croton factum: cuius
rei testimonium perpetuum hoc epigrammate
extare voluit:

ὁ κἀλὸς ἐν Ζίζυφῳ δὴ δαμνῶν τις
Ἰδίῳ χθὲς γὰρ Ζίζυφῳ ἐν χεῖρῳ
ἦτορ, ἀνέστη παρὰ τὴν πύλιναν
καὶ γέγονε πύλινος ἐν καὶ τῷ ἴσθμῳ

Miram sane verò ac verè Divinam Ziziphorum
vim, si his & hoc modo iis Quartanæ cura adscri-
benda. Non tacendum tamen, notante Cur-
cio, in quibusdam exempl. legi *Aspæ*, cuius
vocis explicationem ne ex tripodè quidem
petas.

BER INDICA FRUCTU LIVIBINO.

C. P. XVIII

Descriptio

Folia.

Flora.

Fructus.

Descriptio.

Lacca.

Arbor Be-
rifera.

Nomen.

Cibus.



BER Indis di-
cta, autore A-
osta magna est
arbor, multis fo-
liis & floribus
prædita & co-
voso fructu, fo-
lia minus rotun-
da sunt Mali fo-
liis, tamen ea
emulentur, su-
perne saturatè
virent, inferne
candicant & pu-
bescent uti Sal-
vix folia gustu
adstringente, Flo-
res exigui, can-
didi, quinque
foliolis constan-
tes, inodori:
Fructus livibis

seu Ziziphus similis, alij aliis maiores & suaviores,
nunquam verò tam probè maturescentes, ut con-
servari queant, & in alias regiones transferri, uti
Zizipha, & perpetuò nonnihil astringentis reti-
nentes: unde colligitur minimè pectori utilis
esse, quemadmodum Zizipha. Præferuntur fructus in
Malaca nati Malabaricos: sed in adhuc præstan-
tiores quos Balaguatè profert. Conspicitur hæc ar-
bor ætate alatis formicis perpetuò onusta, quæ in
ramis eius Laccam elaborant. Garcias præter ista
ait cum fructum, qui in Anafegua provenit, com-
modè exsiccari posse. Arborem verò nonnihil
spinosa esse. Allatumq; sibi ramulum ab arbore
Berifera revulsam, cui multa inhaerent Lacca.

Vocatur hic fructus in Canara *Ber*, in Decan
Ber, in Malayo *Vidara*.

Hist. Lugd. *Mala Indica* Acostæ vocat, Lusitani
Mancamas de la India, id est, *Mala Indica*. Cum aliis
esui aptis Malis careant in prædictis insulis ac
provinciis, commendantur hi fructus apud eos.

LACCA.

C. P. XIX.

Cum Lacca in arbore prædicta, tanquam loco
natali gignatur, vel sanè tanquam in horreo



à formicis conge-
ratur, merito ea
hic dicenda.

Lacæ gummi,
ut in officinis ha-
betur, concretio-
ne bacillis percu-
natis circumna-
ta adhærescit, su-
perficie inæquali,
rugosa & veluti
granulata, pellu-
cida, colore rufo,
flavo, aut ex ru-
bro nigricante,
intus cavernola,
nescio quid nigræ
friabilis substan-
tiæ in antris con-
tinens, sapore
nullo evidente,
spiritu colore ru-

Descriptio
Lacæ
Offic.

bro tingit, qui longè apparet floridior, si cum
aqua misceatur. Prunis imposita bullat primùm,
levem odorem resinofum spirans, tandemque
flammescit. Vi detracta bacillis, corticem ferè se-
cum rapit, & canaliculata qua adhæsit, appa-
ret. Bacilli duarum triumve unciarum aut lon-
giores cortice teguntur satis crasso, melino ferè:
materies ut coryli, sed medulla copiosiore far-
cta.

Reliqua historia tota incerta quodammodo
est, vel ipso Garcia teste, qui de ea in hunc mo-
dum scribit. Quidnam sit Lacca, quomodo para-
retur, & ubinam gigneretur diu dubitavi. Nam
affirmabant nonnulli in Pegu flumina exundare
atque alveum suum superare solere: aqua deinde
defluente, in lutum quod remaneret baculos ab
incolis iniici, in quibus præglandes formicæ na-
scentur alata; quæ multam Laccam accumula-
rent.

Verùm hi non oculati testes ex fama vulgari
narrarunt. Apprimè curiosus diligensque vir,
qui istuc fuerat, ubi Lacca colligitur eidem retu-
lit vastam arborem inventam in Pegu & Martaban,
foliis quodammodo Pruni, in cuius furculis &
minutionibus ramis magnæ formicæ in terra vi-
scentibus aliisque locis enata, hanc Laccam elabo-
rant (ut apes mel conficiunt) materiam ex ipsa
arbore exsurgentes. Hos deinde ramulos ab
arbore revelli atque umbra siccare, donec deci-
derent ramuli, Lacca autem ipsa velut in tu-
bulos concreta maneret: interdum tamen ligni
fragmenta inhaerere: at meliorem censer, quæ
sincera esset, lignique fragmentorum expers:
eam verò, cui inhaerent fragmenta, deteriorè.
Inveniri etiam sordidam & minimè sinceram,
quam postea colliquarent, & in pollinem redu-
cerent, eamque viliorè censer, quoniam mul-
tam terram admixtam haberet. Deinde negotium
dedit idem Garcias quibusdam qui in Pegu pro-
fecturi erant, ne, an ita se res haberet, diligenter
perquirerent: sed ij retulerunt verissima cum di-
xissent. Idem postea verum esse didicit in Balagua-
te profectus. Allatus quoque eidem ramulus ab
arbore Berifera revulsus, cui multa inhaerebat
Lacca. Sed quoniam exigua admodum quanti-
tate provenit, ibi negligi ait. Ibi tamen se vi-
dille in arboribus, affirmasse testatur. Formicas
autem hanc Laccam elaborare inde manifestum
putat Garcias, quod plerumque alæ formicarum
Lacæ permixta conspiciantur. Præmanam su-

Tindam.

Bacilli
quales.

De Lacca
generatim
diversa
narratio-
nes.

Formica
alata.

Paga ori-
bor
Præse-
la.

Descriptio.

Arbor Be-
rifera.

sem hanc Laccam pulcherrimo rubro colore inficere que sit deligendi ratio. Non esse autem eam arborem, in qua Lacca elaboratur, Myrto similem aut facie aut magnitudine, ut aliqui volunt, sed interdum in Nucis Juglandis magnitudinem ex-
Myrte non similem.

crefcere, interdum minorem esse.
Antonium quidam de Lacca generatio- ne.
 Porro, quod ex Formicarum alis coniecturam desumit Garcia, eas esse Laccæ opifices, id nobis manifestum, nisi diversorum relationi quantum par est tribueremus. Facile enim Lac-
Antonium quidam de Lacca generatio- ne.
 cæ primò ex arbore Berifera exsulant: adherere possunt formicæ multis arboribus infestæ. Cum succino sanè varia animalcula reperiuntur, ut mus-
Antonium quidam de Lacca generatio- ne.
 scæ, culices, &c. in cuius substantia aliquot eius-
Antonium quidam de Lacca generatio- ne.
 modi bestiolas non semel vidimus, ut miraculo insertas dixisses. Quid si modò exsulantis succi, & fortè aliquid dulcoris habentis (ut ex fructu eius Iujubino coniectamur) amasæ formicæ, ei-
Antonium quidam de Lacca generatio- ne.
 que inhiantes accurrant, & ita adhæreant? Nec bacillis aggerere liquorem fluidum & resinofum posse formicas, atque ob id ad hanc rem ineptio-
Antonium quidam de Lacca generatio- ne.
 res esse, fortè morosior aliquis investigator dixe-
Antonium quidam de Lacca generatio- ne.
 rit, ita ut citius credat, ex ipsamet arbore, vel eius ramis & furculis itatis temporibus exsudare illum liquorem, & demum Solis vi in eam for-
Antonium quidam de Lacca generatio- ne.
 mam, quam videmus, concretscere. Non tamen quicquam derogatum volumus, relationi supra-
Antonium quidam de Lacca generatio- ne.
 scriptorum: consideranda tamen hæc proponere volumus, donec peritus & doctissimus aliquis testis meam rei historiam declaret.

Sed quid Arabes dicant audiamus. Itē enim Bellunenſis apud Avic. habet. De Lacca, id est, Cancamo, Laccam quidam dixerunt, inter quos est Paulus, esse gummi herbe, simile Myr-
Cancamo.
 rhæ, boni odoris: sed cum cautione administran-
Rhæ.
 dum. Alij verò errantes dixerunt esse Karabe, quanquam in plerisque proprietatibus cum ea
Serapio.
 conveniat. Serapio itidem ex sententia Diosc. & Athabarie (quem quidam Paulum putant) scribit
Cancamo.
 esse gummi arboris in Arabia nascentis, Myrrham
Cancamo.
 quadantenus referens. Deinde ex sententia Rha-
Cancamo.
 sis, in ramo Sorbi, quam ipse Guberam vocat, è
Cancamo.
 cælo delabi tradit. Postremò, Lacca, inquit Isaac
Cancamo.
 apud eundem, res quædam est rubea quæ tenuib.
Cancamo.
 lignorum furculis inhæret. Coquitur hæc, & ex ea
Cancamo.
 panni rubeo colore inficiuntur, quam insecturam
Cancamo.
 Chermes appellant. Cæterum Lacca ex Armenia
Cancamo.
 defertur. Hactenus Serap. Ita ludūt Arabes nostrā
Cancamo.
 diligentia, & rarò doctiores sepiſſimè a. magis co-
Cancamo.
 fusi ac hesitabundi, ab iis redimus. Verum, quoniam
Cancamo.
 Diosc. Cancamum Laccam esse putavit Serapio, ex
Cancamo.
 ipso satis prodit, sibi Laccam incognitam fuisse.

Garcias, cur Lacca à Cancamo diverſa est: nec
Cancamo.
 Avicenna, nec Serapioni, imò nec ulli Græcorum
Cancamo.
 cognitam huius afferit. Laccam autem in Arabia
Cancamo.
 non nasci palam esse dicit, quoniam in Arabiam
Cancamo.
 ex India deportetur. Similiter nec in Sorbi ramos
Cancamo.
 delabi, neque etiam Mespili, ut nonnulli perpe-
Cancamo.
 ram verterunt, cum nulli sint per universam In-
Cancamo.
 diam Sorbi aut Mespili. Sed nec in Armenia na-
Cancamo.
 scitur, nec etiam est Chermes Arabum, cum id
Cancamo.
 nihil aliud sit, quam Coccum insectorium Græco-
Cancamo.
 rum. Sed neque Myrrhæ similis est Lacca, ut vo-
Cancamo.
 lunt Arabes, quoniam hæc in extimis ramis ela-
Cancamo.
 borata hæret: Myrrha verò ex ipso arboris trun-
Cancamo.
 co exstillat, neque item odorata veluti Myrrha est.
Cancamo.
 Quidam, inquit MATTIUS, pro Cancamo gummi
Cancamo.
 quoddam rufum ac pellucens ostendunt, quod
Cancamo.
 furculos incognitæ arboris undique circumue-
Cancamo.
 lit, Myrrhæ quadantenus simile. Veruntamen
Cancamo.
 quod nulli (ut Diosc. inquit) in eo inanso saporis
Cancamo.
 virositas deprehendatur, aliud potius mentiri,

quam esse legitimum Cancamum volunt. Quan-
 tum etiam hallucinantur Monachi, qui in Meliten
 scripserunt, sanguinem draconis vulgò vocatum
 Cancam loco substituentes, suo dicetur loco. A-
 MATVS scribit in errore versari eos, qui Cancam
 Laccam esse putant: Laccam enim non esse
 gummi aut plantæ alicuius guttam, ut huc vsque
 omnes ferè crediderint, sed potius formicarum
 alatarum sterces, sabagove, velut cera apum. Quod
 si ita sit, cur non simile aut aliud quid observa-
 tur in nostris: nam multas arbores vastant, etiam
 glutinosi succi, ex quibus pastæ tale quiddam ex-
 cernere possent. Ita in rebus nobis nec cogni-
 tis, propè nec visis, velicamur potius, quàm veri-
 tatis vadam teneamus. Cæterum, quam officinæ
 Laccam vocant, eam, teste Garcia, Arabes, Persæ
 & Turcæ Loc Sumatri, quasi dicas Laccam è Sama-
 tra nuncupant: non quòd Samatra sit provincie
 Pegu, ubi plurima Lacca nascitur, finitima: sed
 quòd Arabes & alij iam memorati in Samatra gi-
 gni putarent. Idem nomen etiam invaluit apud
 provinciarum Balaguate, Bengala, & Malanar in-
 colas, quoniam à Mauritanis sic edocti fuerunt.
 Legitimum tamen earum provinciarum nomen
 est Lac: in Pegu verò & Martaban, ubi præstan-
 tissima est, Treæ, atque istuc è Iamay adferri tra-
 dunt. Non vocatur Acc, aut Ancusfal, ut Pandectar,
 cui corrupto nomine appellavit: neque Sac, ut a-
 pud Serap. lib. simpl. c. 181. corruptè legitur. Cæte-
 rum cum ab ipsis incolis, apud quos plurima na-
 scitur, Treæ vocetur, mirabitur aliquis, cur nomen
 Loc, Lac, aut Lac invenierit. Sed hanc fuisse causam
 coniecit Garcia, quòd hoc medicamentum in
 Lac live Mellis crassitiem dissolveretur, cum ad in-
 ficiendum, tùm ut eius usus esset in medicina.
 Quodantem Bellunenſis Lac verterit, fieri potest
 cum ita in veteri exemplari invenisse. Arrianen
 nunc omnibus Arabibus Loc-Sumatri dicitur.

Vulgaris sermone quidam in Italia appellant
 Lacca: quidam diminutivè Laccetra. In Germ. non
 nullis officinis institorum Legnass vocari audi-
 vimus. Eius duo genera facit Matth. [quæ tantùm
 bonitate differre opinatur] præstantius, vulgò
 Lacca Sumatri: deterius eidem Lacca comberri dictū.

Acosta imitatus Garciam sic de ea scribit. Lacca,
 Arabicè, Persicè, Turcicè, Loc Sumatri, quasi di-
 cerent Lacca ex Sumatra, non quòd in Samatra
 inveniatur. Quidam enim existimant eam fieri in
 fluvij Pegu: verum res ita se habet: Quædam
 formicæ alatz eam præparant supra magnas arbo-
 res. Volunt in Hispaniam multi rami pleni Lac-
 cæ, ex qua fit Cera. Adhæretur Lacca cum Resina
 & Cera. Nomina, quæ posuit Pandectarius Acc &
 Ancusfal sunt corrupta. Avicennæ non videtur co-
 gnita Lacca, quandoquidem similem facit Myr-
 rhæ, similemque facultate Carabe. Carabe siqui-
 dem glutinat & adstringit: Lacca verò aperit. Er-
 ror eorum, qui vocant Lac Sumatri, provenit à
 Chinenſibus. Serapio vocat Sac, quod est Lacca:
 ac Diosc. allegans, dicit Guinmi Arabiz arboris
 sithilis Myrrhæ, citat Rhasim dicentem cadere de
 cælo supra Guberam: in omnibus errat. Diosc.
 non scripsit de Lacca, nec Serapio rixè cognovit,
 putavit esse Cancamum Diosc. Rami cum Lacca,
 non sunt arboris, quæ proferat Laccam, uti penè
 omnes hodie crediderunt. Est secunda Lacca ar-
 tificialis, quam confundit Serapio cum prima, de
 qua Amatus. Quum præterea dicit Serapio simi-
 lem Myrrhæ, clatum sit, non cognitam nec Se-
 rapioni, nec Paulo. Falsum est quod dicit Rhasis
 cadere supra Guberam, id est, Sorbum. Dicunt
 Monachi in Melitem nemine vidisse veram Lac-

*Antoni
Lacca mag
est gummi
Formica-
rū facit;*

Nomina:

*Loc Sumatri
Treæ.*

Lacil

*Treæ
Acc.
Sac.*

*Serap. c.
181.*

Lacca

*Genera
duo.*

*Loc Sumatri
Treæ.*

*Lacca quæ
modo fit.*

*Cera m
Lacca.*

*Acc, Ancus-
fal, corrup-
tis leguntur.
Avic. rap-
prob.
Serapionis
errati.*

*Non esse
Cancamum
Diosc.
Serapionis
confusio.*

*Rhasis ar-
bor de Sor-
bi.
Monachi
gummi*

cam in Europa, multos credere esse Cancamum, convenire quidem cum descriptione Pauli & Dioscori. Verum cancicum incognitum existimari. Erraverunt quandoquidem reperitur, & ea utuntur Arabes, Persae, Turcae. Clarum verum esse Laccam, qua in offic. utimur, & quae adfertur ex India Orientali: talem existimant omnes Asiae, Africaeque regiones, & maior pars Europae, ita etiam nominant ipsi Indiani, quamvis Monachi in Mesuem & alij existiment non inveniri. Vocatur Lacca, Lac aut Loc, vel Luc.

Dubitant etiamnum Pena & Lob. Arabum Lacca an sit Diosc. Cancicum. Et in Advers. Nullis, inquit, rationibus severiores veri exactores Laccam Arabum Diosc. Cancicum esse inficiantur. Et, mox, an verò sit Chermes, cuiusvis est sciscitari, at non nisi eruditè statuere. Dixerant autem prius Laccam arborem & nomenclaturam Arabicam esse, quod antea arbutum & pruno similem à multis refertur, cuius sint frustula & surculi, qui vulgari Lacca obducti in offic. habentur. Notandum verò in Plant. iconib. Lobelianis malè positum esse titulum Laccae cum bacillis: est enim figura ad Bdellium pertinens.

Anonymos ad Cosmogr. notat, veram Laccam esse Gummi arboris in Arabia suaviter olentis, & Myrrhae non usque adeò ab similis. A Malayvis Lacca dicitur *Canlacca*, testibus Bry fratribus. Ceterum, Scalig. libet de Lacca differentem audire. An est, inquit, Cancicum ea, qua utimur, Lacca? Est. Arabes enim sic sunt Cancicum interpretati. Est enim Lacca nomen Arabicum: nempe Lach ipsi etiamnum vocant. Corruptus enim est Serapionis codex. Quin communis Indiae quoque vox. Nam quae in Martabane Indiae oritur, cognomen habet à loco appositum nomini, *Laccamartabani*. Ibi enim optima. Eius arbor, simillima est Iuglandi nostrae. Est igitur Cancicum verum Lacca. Nam, qui negant odorem ullum ei inesse ignibus impositae, videntur suam sententiam aut non ab experimento sumpsisse, aut in adulterinam incidisse quae sit ex Gummi & Brasilio liquore.

Sed quid hoc est dicere, Cancicum est Lacca quia Arabes ita sunt interpretati? Non alioqui hic mos est huic viro tam securè credendi. At prius odoratum Cancicum dixerat, atque etiam suffitionibus expetitur, qualis sanè nostra Lacca nequaquam est, nec talem esse ab ullo Indiarum rerum Historiographo, quem quidem legerimus, annotatum: nisi ab Anonymo supradicto, Lob. & Pen. qui ex Scaligero suum illud iudicium ac censuram, quam paulo ante adduximus, desumpsisse videntur. Adhuc itaque stat sententia Cancicum & Laccam differre, donec aliquis prodeat qui vivis rationibus, vel ex re ipsa, nos doceat rem eandem esse.

Nascitur Lacca plurima in Pegu: nonnulla in Balaguate. In Arabia non nascitur, inquit Garcia. In regno Pegu dicto, ut refert Amatus apud Indos, quum terra vel pluvia, vel arte plus iusto irrigatur, formicæ ligna quaedam subtilia ab incolis disposita in altum ascendunt in quibus Lacca generant, quam hodie Luntani nostri ex India afferunt rubram, translucentem, in odorem & sine supposito tincturis præcipuè deservientem, ex qua Officina Dialaccam appellatam conficiunt.

Nunc, quod reliquum est de veræ Laccae succedaneis, artificisque Laccae. Veræ Laccae nomen, de qua iam diximus, Artificiali etiam, ex fœce Brasilij & Coccinillæ, à nonnullis attribuitur.

Inter alios etiam Serapio inepit hanc cum pri-

ma & genuina confudit Lacca, unde, auctore Amato in Diosc. multi Serapionis erroris seducti, eam in compos. Dialaccæ miscunt. Hanc porro Laccam alteram seu falsam Venetus ex granis tinctorum & Brasilij fœce fieri, testatur quoque Fuchs lib. 1. comp. med. cap. 11. Scaliger ex gummi aliquo & Brasilio liquore.

Resina verò & Cera Laccam veram interdum adulterari annotavit Acofta. Et nos ante in Icon. Plantini pag. pro Lacca cum suis bacillis Bdellium cum suo trunco & fuscule spinoso ponidimus. Cæcutiunt, inquit, Amatus, Monachi, qui Antidotarium Mesues exposuerunt, quum in comp. Dialaccæ dicunt: Si defuerit Lacca eius loco iniiciatur lachryma Sanguinis Draconis. Eundem insignem sanè errorem ante Monachos commisit Avicenna, non considerans Laccam aperire & provocare menstrua, Sanguinem verò Draconis constringere. In Dialacca maiore Mesue & aliis compositionibus, si vera Lacca requiratur, inquit Andernac. Myrrha utimur, sed minori pondere, ut pro Drach. I. ponantur Scrup. II. Lacca deficiente ponit Styracem Colleg. Flor. in Antiball. Nec est quod credamus, ut præcipit Acofta Ital. lib. 1. cap. 16. Laccam esse, quod Chermes, vel Chermes Arabibus dicitur, Chermes enim est Coccus tinctorius.

Lacca, inquit Avic. vehementem vim habet attenuantem: confert tremori cordis, & iocur roborat, & prodest contra icterum & hydropem ac hepatis dolores. Ceterum errat Avicenna, quod similes illi cum Carabe facultates tribuat. Nam glutinatoria non est & astringentis particeps ut Garcia scribit, dum Avic. eiusdè erroris accusat, quavis idem vim aperiendi obstructions Laccae tribuat, Caraben verò multas partes calidas ac tenues habere censemus adstringentes nullas.

Ceterum erroris ansam Avicennæ præbuisse putat idem, quod Laccam Cancicum Diosc. esse existimavit, eam tamen planè diversam sit à Lacca. Præterea ex eo manifestum eius errorem esse, quod duo diversa capita descripserunt, in altero ibidem Cancami descriptionem enarrant, in altero de Cheichem agens, quasi diversa essent simplicia. Serapio ex diversis autoribus Lacca tribuit vires Cancami, quas duas res eandemque facultates planè inter se confundit. Ad epilationes tamen tam hepatis quam splenis, ut & in hydropis & ictero, ad quæ vitia inter alia ille commendat, à plerisque medicis unanimi consensu præscribuntur Trochisci Dialaccæ dicti. Pulcherrimo quoque rubore inficit præmansa Lacca, non tamen ea tinctura karmes est, ut putavit idem Serapio. Ex ea etiam bacilli parantur ad oblongandas epistolas, ut notat Garcia. Ceram Hispanicam vocant. Iisdem & sabros lignarios lineas ducere ait. Lacca etiam implere cum aurifabros tum argenti fabros vasa maiora aurea & argentea. Quod an ita se habeat his iudicandum relinquimus qui ea tractant. Nobis enim nihil adhuc de ea re innotuit: miramur tamè, cum Lacca toto genere differat a metallis, & quod facile uratur. Scimus quidem cum Lacca in Ceram Hispanicam redacta, & Conchyliorum splendicantium minutissimis fragmentis & aliis ad splendorem & varietatem commendatis inervi stari ligna, tabulas, arcus, scilopea, cultellorum manubria, & similia elegantissimo aspectu, & læpideam elegantiam non æmulante modò sed etiam superante. Aliquot eiusmodi tabellæ inter rariora nostra adservamus. Clusius ex quorundam

Arbor Arabica
Pruno similem.

Plant. iconib.
Lob. error.

Arbor suaveolens.
Cancicum.

Cancicum
est Lacca
Scalig. error.
Lob.

Laccamartabani.
Arbor Iuglandi similem.

Scalig. error.
primo respicitur.

Lacca.

Amatus in
dico ne
generatur.

Acquisita.
Lacca.

Serapio
error.
Lacca.

Adulterium.
Substantia.
Bdellium
comp. p. 1.
Lacca.
Monachi
notantur.
Sanguis
Draconis.
Avicenna
error.

Myrrha.
Styracem.
Coccus.
Tinctorius.

Dialacca
Vires &
ultra.
Tremor
cordis.
Hydrops.
Avicenna
error.
Garcia
error.

Cheichem.
Non karmes
ut putat
Serapio.

Cera Hispanica.

Incrusta
elegans.


Yundam sententia tradit, Alutas & Cortis verveci-
na Lacca contrita, & urina veteri macerata, rubro
colore infici ex altera parte.

Ceterum modus abluendi & preparandi Lac-
cam, qui passim à scriptoribus traditur, admodum
absurdus est, inquit Cordus: & qui eum primus
invenit aut tradidit, Lacca naturam penitus igno-
ravit. Nam quicquid parum sincerum & efficax
est in Lacca, illud aqua miscetur, quam illi di-
cunt abluendam esse, & quod remanet in tro-
chiscos formandum, hoc est calculos, ligna & sor-
des. Ille verò hunc modum tradit. Aristolochie
longæ, Schœnanthi singul. uncias duas. Deco-
quantur in aqua lib. 4. aut quantum satis sit,
donec remaneant, lib. 3. Colaturæ insperge
Lacca integræ, lib. 1. unc. 4. Decoqu, Lacca
deinde lento igne, donec aqua fiat coloris sangui-
nei & quicquid in Lacca boni fuerit, dissolvatur:
tum per filtrum aut laneum pannum cola, & re-
manentes sordes abice. Excolatam verò & san-
guinei coloris aquam lentis prunis in duplici vase
usque ad mellis spissitudinem coquito, & tepidam
massam in Trochiscos figito.

VVA CRISPA SIVE GROS- SULARIA.

CAP. XX.

Descriptio



VT spinis ar-
mavit rerum
parens natura ar-
bores superius ex-
hibitas, Oleam sc.
Rhamnum, Iuiv-
bas, sic etiam quæ
sequuntur, ut sunt
Oxyacantha, Ber-
beris & uva Cri-
spa (quam recen-
tiores ita dixerunt)
& de qua iam. Fru-
tex est bicubitalis
& tricubitalis, ac
etiam maior nu-
merosa stolonum
segete luxurians,
variæque in ramu-
los subdivisus cor-
tice purpurante,
materiæ ferè bu-

reo colore, pallecente. Spinis longiusculis, acu-
tis & rigidis ad foliorum exortum passim arma-
tus, singularibus, binis aut ternis: folia unguem
lata, nonnunquam ampliora, nonnihil rotunda,
modicè divisa, superius saturo virore splen-
dentia, inferius dilutiora, utrinque hirsuta, sa-
pore acido, ex brevibus pediculis: flosculi pul-
chelli parvi, suavi sed nonnihil gravi odore, si-
mul multi ex eodem tuberculo, quo folia pro-
deunt, ex pediculo brevissimo purificante hirsuto
nutantes, quibus subsunt globuli hirsuti satura-
tum baccarum rudimēta, ex foliolis quinis utrin-
que rubentibus, extorsum reflexis, ut radiatam
stellam expriment, quæ totidem adnatas quasi
lingulas albicantes, intus hirsutas ferrugentia,
florem reliquum concavum efficiunt: inter sin-
gulas autem lingula singula stamina recta se tol-
lunt à rubris illis florum foliis similiter orta: ex
globulo autem stilus virens, alba lanugine cir-
ca infimam partem, aspergilli modo oblitus. Bac-
cæ succedunt, rotundæ, hirsutæ, striatæ, ante ma-

turitatem acidæ, maturæ dulces: in quibus grana
multa exigua.

Vnum genus sylvestre, alterum cultum in
hortis minus spinosum, baccas multò maiores
producent.

Sed iam mitam autorum varietatem circa hunc
fruticem intelliges.

Ruel. Grossulariam veterib. silentio præteritam
ait: alibi tamen ait non deesse qui Paliurum esse
arbitrentur, quorum opinione se non ausum acce-
dere, cum etsi nonnulla cōsentire delineationi pu-
tentur, plurima tamen reclamare etiam constet.
Hallucinari verò eos qui Rhamnum 1. esse arbi-
tratur: folia non respondere, quæ circinatæ rotun-
ditatis conspiciantur. Apij modo dissecta.

Ryflus eadem profert, Ruellio tamen non cita-
to, gaudens magis alienis ornari plumis, quam
creditori suo honorem ferre debiti.

Amatus Rhamni nomine uvam crispam ponit,
& more suo in titulo diversarum plantarum in no-
mina confundit. Sic enim habet Rhamnus: Vva cri-
spa Scambrohes, Hisp. & Lus. It. Marucha: Germ.
Stechdorn, Grafselbeerbaum: Gallicæ, Burgespine, a-
liis Groislier. Alibi uvam crispam, aliis uvam ma-
rinam, aliis uvam spinam dici, quæ nomina &
Matth. habet, ac uterque antiquis præteritam ac
incognitam putat.

Cornar. perperam Paliurum 2. Theoph. &
Plin. censet, nempe eum cuius fructus sit magni-
tudine baccarum Cedri, Closterbere German. qui
culinis quàm medicinz notior, ad Rhenum &
Menum frequens, non rubicundus, sed rotundus,
viridis & stris velut distinctus.

Spinam ferentem Crispinam uvam, inquit Cor-
dus, Rhamnis quidam annumerant, sed cum
foliis & fructu plurimum discrepent, sui generis
spinum esse credimus. Quidam Gergorebeer es-
se putant, sed folia dissimilia sunt: nos autem per
eam vocem uvam crispam intelligimus, alioqui
Dei baccas sonat.

Trago Grossularia verè Rhamnus est vete-
rum, videlicet genus 3. Diosc. Et addit aliis dici
Burgam spinam, aliis Neprum. Persophaniam, Leuca-
cantham, Albam spinam, Cernalem spinam. Agnon. A-
radim, Philereum aut Socialem: Setapioni dici Han-
sig aliis Ausis. Sed pleraque hæc nomina ad Rha-
minum Catharticum pertinent. Præterea uva
crispa non convenit cum Rhamno Diosc.

Favetur Fuch. nescire se fueritne cognita uva
crispa veteribus tam Græcis quàm Latinis, camq;
Latinus putat uvam inortam nuncupari posse.
Non esse Rhamni speciem primam, ut nonnulli
arbitrantur, posse tamen citra aliquod vitæ discrimen
Rhamni generibus annumerari, quod scilicet
vinibus admodum similis sit. At Cornar. Rha-
mnum 1. Diosc. facillè se credere ait. Vt iam videas
Cornarium duobus locis de uva crispa scribere,
quasi diversas traderet plantas: nempe Embl. 98.
ubi hæc ait: & Embl. 106. ubi Paliurum Theoph.
putat, ut dictum.

Hernol. & Lactina veteribus præteritam pu-
tant. Lonic. & Apollo Rhamni Diosc. speciem fa-
ciunt. Neg. Curmus. Hist. Lugd. Mos, vel ut
alii legunt Oelos Theoph. putat: nulla alia conie-
ctura, ut equidem censemus, quàm quodd inter al-
ios frutices spinosos nume. at. At habet ibi & non
spinosos. Certe difficile est iudicare in tanta bre-
vitate & obscuritate.

Gæsterus Ceanothum vocat. Hæc autem eius
sunt verba: Ceanothus spina Theoph. memorata,
hoc est, uva crispa vulgo dicta, (ut mihi quidem
videtur) passim apud nos obvia est, sepibus hon-

*Sepibus
vinnosa.*

*Rosella
Rocella.*

*Vitis Pro-
ria Plin.*

*Rosella
et spinosa.*

*Synonyma
linguae.*

Locus.

Tempus.

*Vitis et
spinosa cum
cortice, tum
nuda.*

Febris.

*Ventris
profluvium.*

*Spiri-
tum
sang.*

etocum imprimis commoda. Facillimè enim nascitur, densè si uticat & propagat seipsam, & spinis suis transitum prohibet: & acinis iucundi saporis placet. Ceanothum asperum nostrum Cardanus de varietate rerum l. 6. Rocellam (malim Roncellam, seu diminutivum à *Rosce* Gallico nomine Rubum significante) vocat. Rocella, inquit, humile arbutum est, folio angusto (angustum sane non videtur) ac tenui, quali vitis, spinosum, haccam ferens, quæ cum maturecat, viridis & subflava est, rotunda admodum, magnitudine Lupini: gustu ex dulci adstringente. Quidam volunt esse vitem pretiam Plinij, in qua sententia fuerunt Guilandinus, Pena & Lob. sed perperam nostro & Dalech iudicio: neque enim verisimile est Plinium lentem & fruticem spinosissimum inter mites & cultissimas vites retulisse.

Dicitur *uvacrispa*, *Grassula*, *Grossularia*, *Grossularia*: *uva marina*, *uva spina*, *uva crespina*, vel *crispina*, ab intortis ferè que in circulum versis foliis & acinis quos producit. *Grassula* verò à dura illa membrana seu cuticula, qua obducuntur acini isti: siquidem manducati crepant, instar membranz quæ d. frumpitur. Germ. *Kreuzbeer*, *Krausbeer*, *Grosselbeer*, *Klosterbeer*, *Creutzbeer*, *Vegdorn*, *Stechdorn*, Belg. *Steekebesen*, *Steekebeer*, *Steekebesen*, *Krebsen*, *Kreuzsen* Brabantis, *Truybesen*, quibusdam *Kreuzsen*. Gal. *Grassula*, *Grossularia*, *Grossula*, *Grossula*, *Grossula*. Angl. *Grossberry*. Italicè *uva spina* & *Crispina*. Hispan. *uvacrispa* live *espina*. Boh. *Chlupate vahodi*.

In sylvestribus provenit & sepibus multis Germaniæ locis, nò tamen passim. Vix alibi copiosius luxuriantem videas, quam circa Basileam, ubi circa omnes ferè sepes sese diffundit. In toto Ducatu V. Wirtembergico ferè obvia, maximè circa Tubingam. In Gallia calidiori non aded frequens, sed minus in Italia exterisque calidioribus locis. Arrat enim frigidus tractus, nec nilum frigus tolerat. Venetiis tamen etiam observavimus in Muran, in Cà Corneri, Patavij in hortis quibusdam. In vivarum sepium structuram venit passim ubi abundat, etiam in Scotia. Illud autem genus quod baccas maiores profert in hortis nonnullis infirmo sarmento ridicis sustentato observavit D. Cargillus. Cuius nos pulchras arbusculas à pluribus annis in horto E. C. Montbelg. colimus.

Veris statim initio pubet, ac virefcit Martio, sæpe etiam antè. Floret Aprili. Fructum fert Maio. Iunij fine ac Julio perficit, quo tempore dulcescit in cibum, qui tamen laucioribus mensis repudietur maturus: immaturus verò & acidus adhuc coquitur cum carnibus ac piscibus: nam succo suo subacido cibos commendat. Concinnatur & in placentas Cupediarum & scitamentorum vice. Vulgè *Tartu* vocant. Ipse verò maturus fructus pueris, pauperibus & gravidis mulieribus satis expeditus. Immaturæ haud quoque iuculis incoctæ febricitantibus non sine utilitate exhibentur. Frigide namque sunt & astringentis qualitatis. Quapropter diversimodè administrari possunt cholericis, calidis, & hile refertis corporibus tam sanis quam ægis: in fassimenta, vel effusamata. Potest & exprimi Omphacium. Valent contra gravidarum picam: appetentiam cibi excitant. Omne ventris profluvium, potissimum verò Diarrhoeam & Dysenteriam, & Coliacam passionem compescunt immaturæ, ut tradit Matth. nam frigide sunt & sicca astringentes, sitim sedant, & cruenta exspuentibus profunt. Haud dubitè, inquit Puchl. idem quod Caminus temperamentum obtinet. Ut enim hic adstringit & refrigerat,

si etiam illa. Refrigerat autem in primo completo, aut secundo incipiente: desiccatur verò secundo. Ex Diosc. verbis de Rhamno [addit idem] satis liquet, Viam intortam non hoc tantum nomine sepibus apponi, ut eadem muniat, atque aded alienorum ingressum prohibeat, verum etiam ut veneficia ab hortis propulset, ut hinc quoque colligere liceat eiusdem cum Rhamno esse facultatis. Quæ verba utinam non excidissent Fuchsi. Miseros verò nos Philosophos Christianos, si à paganis modum discere debeamus talem arcendi fascinationem. Doctis & potissimum Theologis iudicandum relinquimus de hac re, & an plantis possint impediri hæc ratione veneficiorum maleficia. Omnium optimum modum veneficia, hoc est animalia noxam hortis inferentia, ab eis arcendi, censemus, si Tragi consilio, ordine multos Grossulariz frutices ponas: ita enim septem efficies perpetuam & præstantissimam, quam nulla poterunt animalia, ac ne mures quidem commodè, penetrare, & sic horti ab illis tuti reddentur. Melius Dod. de viribus eius, quando tradit. Fructus antequam maturecat, frigidus & siccus est, ad secundum gradum ac astringens: eiusdem ferè naturæ cuius uva immatura. Sistit fluxum ventris, & omnem fluxum sanguinis, & maximè succus expressus & exiccatus. Utiliter applicatur inflammationibus calidis, Erysipelatibus & igni sacro. Idem præstant folia, sed imbecillius. Eadem novella crudaque comesta, urinam etiam ac profunt laborantibus arenulis & calculo. Fructus etiam saccharo condiuntur contra calores internos, potissimum febriles. Frequens eorum usus prodest Gonorrhæa & fluore albo laborantibus, teste Camer. Aviculæ quoque baccis gaudent. Idem circa ramosas & frondosas arbusculas, Diepæ Galliz civitate non ignobili, observavit Gesn. circumductum rete, atque ita aviculas in eis pulchro spectaculo nutritas.

GROSSULARIA SPINOSA, FRV. Quæ obscure purpurascens.

CAP. XXI.

CORALLARI loco huc etiam transferemus Descriptio. Cæterum Clus. in pl. rar. histor. tradit. Certè, inquit ille, anno 1594. Leyda conspiciebam Grossulariz genus amphionibus nigrioribusque foliis, spinas ad singulos foliorum exortus binas vel unicas habens (interdum etiam nullas) breviores & vulgari multò infirmiores, præter alias inertes & longè breviores, sparsim ramis cortice ex fusco, purpurascens tectis innascentes: fructum, dum immaturus est, vulgaris instar virentem, qui maturus purpurascit, plenè autem maturitate expurpura atrum colorem contrahit, perinde ac nonnulla pruna.

DE OXYACANTHA, PYXACANTHA & PYRACANTHA, tam veterum quam neotericorum placita in genere.

CAP. XXII.

INTRICATA & perplexa harum historia suadet cuique auctori de us placita seorsim relinqui, idque idem, ne veterum placita, multorum intertemporali imitatione, aut dubio conatu, quadrata miscemus rotundis: subinde eas plantas proposituri



montanis, quàm campestribus, siccis pariter, atque udis. In Burgundia ad Dubium amnem magnas & altas arbores videas. Vidimus etiam Monspelij & in pluribus Italiz locis. In Bronzessenburg pulcherrimas patulas & expansas vidimus, & aliam perelegantem in Schombach Ducatus Vviretembergici. Mense Maio florum amœnitatem, odorisque fragrantia spectabilis. Fructus maturescunt Septembri, quo mense, eius semina reperi in ventriculis tam merulae nigra, quàm montana & Octobri, & ad multam hyemem in sepibus ac hortis grato spectaculo videtur. Solet enim hæc, ad tonsiles sepes, quæ passim decussatim implexa extimas hortorum pometorumque oras ambit, præ alijs ferè omnibus expeti, etiam in hortis principum.

Vires & usus. Dos eius præcipua videtur in odoris suauitate florum, tametsi non defuerint, uti testatur Ruel. Qui tradiderint hanc stirpem instar Lauri fulmine non icti, nec unquam de celo tangi. Aiunt quoque pisces marinos: floris odore percussos, confectum corruptionis sentire contagia, quod gravi fragrantie acceptum quis referat. Huius rei piscatores gnati florem devitant. Mirum est, si fulminis ictum cuta respuat. Sed relatu se hoc habere Ruell. ait, non certò scriptore: Additque vulgus deturbandis calculis uti acino, singulari (ut se vidisse testatur) remedio ex vino, quod peculiari vocabulo Senellam nominat. Tragus falsò Cynosbaton existimans, tam fructui quàm folijs & floribus astringentè & constipatoriã vim tribuit.

Pleuritis. Pericardium. Scribitque flores vino maceratos per triduum, deinde in vitro destillatos, remedio esse præstatißimo pleuriticis, & his quos tormina exercent. Aquam etiam ex solis floribus extractam arte destillatoria alvi fluxus sistere, si aliquoties per diem bibatur. Eandem aquam non tantum refrigerandi vim habere, sed etiam aculeos curni inhaerentes refrigerare, si linteola in illa madefacta imponantur. adeò attractendi facultate pollere: Etsi que hoc si-gulare experimentum. Lignum Cynosbati si gelis iduenum est, quo remedio desidia & intolentia servulorum, & malè morigeræ familiar, quàm efficacissimè emendari potest. Dod. ei attribuit vires à

Experimentum. Blagella. veteribus Oxyacanthæ tributas; ac præterea dicit: fructum ex opinione quorundam Neotericorum conferre adversus arenulas & calculum. Et Cornar. audivisse quendam ait, qui siccati pulverem calculosis commodum assereret cum vino potum, cum suo illustri experimento. Et Camer. Saxonibus notissimum & usitatissimum è baccis Oxyacanthæ destillatum liquorem esse tradit ad calculos renum. Anguillara scribit, fructum ventrem lubricare, non astringere, & mulierum fluxus potius provocare quàm compescere. Nos verò non possumus nobis persuadere, fructus dulces Spinalbe astringere & constipare ut Tragus & Matthopinantur, nec etiam aquam ut vult Tragus, Anguillara etiam non assentimur fluxus provocare. Si enim astringeret, nihil faceremus ad Nephritim & calculos. Qui autem credunt esse Oxyacantham genuinam veterum, legant eius vires antea traditas.

Schwenckf. refutat. Ex posterioribus scriptoribus Schwenckfeldius est, qui alios secutus Oxyacantham veterum censet: nec parum mirantur illum, nullo citato auctore, nulloque experimento scripsisse fructum eius astringere, roborare, prohibere alvi, & seminarum profluvia: nucleos calculos commovere: radicem illam aculeos & spinas extrahere, aquam ex floribus pleuriticis utilem esse. Imò rationem ipsam respiciat, contraria planè

in his viribus deprehendet: Astringere ac prohibere certè contrariantur extractioni spinarum, ubi præstaret dilatare quàm astringere & repellere, quod sit astrictiore & frigiditate. In pleuritide, ubi expectorandum, si ea aqua frigida sit, ut vult Tragus, & astrictoria, quomodo utilis esse queat periti norunt medici. Ita nobis ipsis interdum somnis fingimus, ut aliquid novi & inauditi dicentes, & nobis placeamus & alijs. Atque utinam materia medica, vel potius eius immensa facultatum varietas, non magnam incrementi sui partem, non in vanis eiusmodi opinionibus nulla interdum ratione, nullo sensu fundatis corpissent. Sed mundus vult decipi, decipiatur ergo. Hoc tamen de aqua florum & fructuum non ita dictum volumus, ut eam prorsus reiciamus in pleuritide & calculo, quia nobis nondum constat nec existimamus astringentem, & refrigerantem esse. Quare amplius indagandum.

Rustici ex hac arbuscula vivas sepes passim faciunt & exstruunt, quod pecus hortis invisum minacibus aculeis valenter arceat. Matene eius nihil magis expetitur ad torum, propter duram & firmam atque tenacem eius æquabilitatem, quæ ad Buxum quodammodo accedit, ut in dies in tori exercitio experimur. Ad manubria & alia id genus præcipua post Buxum.

PYRACANTHA QVIBVSDAM.

CAP. XXII.



Pyra-can-tha futex est spinosus, cortice nigricante vestitus, cuius per ramos aculei, alij uncia longi, alij breviores, luthum ferè spectantes, rigidi: folia iuxta aculeos Arbuti folijs quodammodo similia, alia fescunciã longiora, alia unciam longa aut breviora, semunciam aut unciam lata, leviter acuminata, quædam rotunda, ulchrè per ambitum serrata, glabra, potissimum inferiora, siquidem superiora interdum nonnihil lanuginosa sunt, nitore illo, quem superna facie ostendant inferiora, destituta ferè. Eandem existimamus Dalech. Vuani urfi, cui flores attribuit acervatim congestos, ex luteo rubentes: fructum ex aureo colore ad coccineum vergentem, densius coadunatum, rotundum, acidi gustus. Addit C. Bauh. in his grana aliquot contineri: & Rosculos ex quatuor aut quinque foliolis còpositos, ex luteo subrubentes, in quorum medio aliquot brevissima stamina.

Pyracantha folio Pyrastris inquit Lobel. & Pena in Advers. aspectu squalida, eius baccæ rubrae estantur à pueris: semina oblonga habent, quasi Pyri aut Berberidis, in umbella flores racematim candidi, & fructus Oxyacanthæ pares. Ramus valde spinosus. Rhamnus 3. Diosc. Icon. Plant.

Descriptio

Aculei

Folia

Flos urfi.
Flos.
Fructus.
Grana.Pyra-can-tha folio
Pyrastris.
Cibus.Diosc.
Rhamnus 3.

fragamur, sed potius conquerimur, confundi apud autores hoc nomine duos frutices natura diversos.

Alia O.
Oxyacantha
Diosc. alia
Galen.

Oxyacantha
Diosc.
non est Berberis.

Quæ enim apud Diosc. extat Oxyacanthæ descriptio, nihil minus designat quam Berberim. Alia enim est Oxyacantha, cui Gal. adstringendi & pariter incidendi vires tribuit ab ea Spina, quæ à Dioscor. sub Oxyacanthæ nomine describitur, quod iam ostendimus, ab ipsa fruticis descriptione exoriri. Principiū Oxyacantham suam Diosc. Achradi, hoc est Sylvestri Pyro, similem dicit, minorem tamen & spinosiorē. Similitudo autem semper ad formam & figuram rei refertur. At diversissima est Berberi à Pyraastro figura, ut iam declarabimus. Pyraaster enim plerumque singulari caudice assurgit, non ita recto, in divaricatos & intortos ramos diviso. Berberis pluribus virgis fruticis modo se attollit, iisque minimè intortis, sed rectis. Pyraastro, antequam omnino senescat, cortex est lenis, glaber, in flavo spadiceus, in cæcis candicantibus maculis variegatus. Berberi verò longè diversus colore, & in ipsa adolescentia rimosis & rugis contractus. Quapropter, nemo facile, modò semel tantum utrumque viderit, Berberim Pyraastro similem dixerit. Iam in fructu tanta discrepantia, ut ne similitudini quidem ulli ullus relictus videatur locus. Berberis videm rubeus est fructus, sed Myrtæ hæc dissimilis. Hæc enim rotunda & globosa existit, ille verò oblongus & utrinque acuminatus. Oxyacanthæ deinde fructus *Myrtæ*, hoc est, friabilis describitur. Sed Berberis bacca quoviam lenta cute succulentam carnem continet, minimè friabilis esse potest. Friabile etiam non de re quapiam lenta, humida & succosa dicitur, sed de fragili, arida, quæ digitis facile velati in pulverem atteri queat. Talis autem fructus Berberi non est. Quare nemo ipsum friabilem dixerit. Censemus itaque aliam esse spinam quæ à Diosc. describitur, ab ea quam Gal. & Arabes Oxyacanthæ & Berberis nomine describunt. Itaque pronunciamus Oxyacantham à Diosc. descriptam esse Pyracantham: Veram autem Oxyacantham de qua Gal. scribit, Berberim esse. Nihil enim obstat quòd quædam ex Dioscor. Galenus in suæ Oxyacanthæ descriptionem transtulerit. Omnino eiusdem quoque sententiæ est Matth. aciusdem penè nixus rationibus: nempe Crispinum vulgò dictum, qui nihil aliud quam Berberis est, prorsus ab Oxyacantha seu Acuta spina Dioscor. differre. Immo Berberis virgæ pollicarem (addit) crassitudinem rarissimè excedunt, nisi ætate longa incrementum susceperint, quin & rari inveniuntur eius virgulta quæ hominis longitudinem æquant.

Collatio
fructus Berberis cum
fructu O.
oxyacanthæ.

Oxyacantha
Galen.

Ad hæc Pyraaster cortice constat aspero, squamato, inæquali, crasso, colore in nigro rufescente. Berberis verò cortice vestitur albo, levi & admodum tenui: quo fit ut non aded leviter ferro vel lapide tangi possit, quin statim cortex frangatur, & crocea ligni materies detegatur. Præterea Pyraaster Prunorum modo aculeata conspicitur, aculeis singulis ex eodem loco erumpentibus, licet rami frequentissimis horreant spinis, iisque nigris, validis, candidi Rhamni modo mucronatis. At Crispinus [Berberis] ternis per intervalla armatur aculeis, simul ex uno eodemque puncto prodeuntibus, adeò ut trifurcato ordine prodeant, duobus scilicet utrinque se pendentibus: tertio verò medium occupante, albis, planis, non quidem rotundis, fragilibus, & admodum pungentibus. Illud insuper discriminis addit: aculeis

tam Spinam fructum ferre Myrti magnitudine & Crispinum [Berberim] verò racematim in uvæ modum, cuius oblongi acini tritico paulò maiores, vividi ac rubenter elegantèrque racemis adnexi, puniceos acinos quadantenus representant: quinquam minores, oblongiores, acidiores, & colore etiam multò vivaciores habeantur.

Crispini [Berberis] deinde folia minimè Pyraastro referunt, sed potius puniceam malum, quamvis latiora, nec aded in mucronem desinentia, per ambitum spinis tenuissimis frequentissimisque horrida. Radices etiam quæ prosectæ & quæ flavæ sunt, ac si croco essent infectæ, etsi plures sint, atque exiles, nihilominus altè non descendunt, veluti acutæ spinæ, sed in latus summo cespite vagantur. Flos denique Pyraastro admodum refragatur: namque melius ex racemo Vvæ simili erumpit, sui fruticis interno colore à quo dum explicatur atque dehiscit, perquam suavem spirat odorem. Quibus evidentissimè colligi potest, & Oxyacantham Græcis & Berberim Arabibus, non esse hanc nostram Berberim, seu Crispinum vulgò dictum, cuius communis usus est apud Medicos & Soplariatos.

Sed præter hæc illud etiam certò credendum, quòd si Diosc. per acutam spinam hanc nostram intellexerit, nunquam silentio dissimulasset folia mirabili opere per ambitum aculeata: neque fructum, quem ramis pendulum gerit, acinis inter se racematim coherentibus, Myrti baccis assimilasset, nec scriptum reliquisset, radices in profundum agi: nec denique flavum earum colorem quo insigniter natura infectæ sunt, unquam reticisset. Non prætermisisset etiam spinarum historiam, utpote quæ ternæ suis virgis innascantur, à pede ad verticem: non corticis candorem, non tenuitatem: non item, quòd sæpius sine caudice variis veluti stolonibus fruticet: non denique ipsam Pyraastro prorsus similem reddidisset, à qua prosectò non minus dissidet, quam Quercus ab Olea, ut pudeat huic rei vel refutandæ, vel confirmandæ veritati manifestè diutius incumbere.

Non dissimulandum tamen eiusdem huius sententiæ præter Cordum & Matth. esse etiam Amatum, Dod. Dalech. Tabern. Hist. Lugd. Camer. Baechanel. Turner. & pleròsq; doctiores, qui ipsam rem non diligentius perpenderunt. Quid? Quòd ipse Galenus quoque quamvis hanc spinam *Myrtæ* vocet, ab *Myrtæ* tamen distinxit, in lib. de simpl. sed & manifestius in lib. de sec. alim. ut probè annotat Dod. Etenim, inquit, Diosc. huius Spinæ [Berberis] non meminit: nam quam ipse Oxyacantham form. gen. vocat, Galeni est masculini generis Oxyacanthus. Avic. utrumque fruticem sub Amyrberis nomine complexus videtur. Quin & Serapio Berberim descripturus, Diosc. nomen verbaque producit, quam tamen nunquam ei innotuisse clarum est. Cum vulgarem Italorum Crispinum, legitimam esse Mauritanorum Berberim totus Oriens clamat, teste P. Hesso, ubi in præsentem usq; diem Amyrberis nomen conservat, ut in Arabia: quo nihil est Damasci & Tripoli notius.

Est igitur Berberis Oxyacanthus Galeni. Sicque volunt & statuunt etiam Dod. Gesner. & Camer. ac ita statuent, quicumque rem diligentius examinabunt, quamvis Tabern. inter recentiores etiamnum Oxyacantham Galeni dicat.

Oxyacanthæ tamen vocem cum Oxyacantho plerique Herbarii confundere, inter quos & do-

Alia est
Oxyacantha
Græcorum
et Berberis
et Arabum
ab hac

Differunt
Oxyacantha
Berberis
et Oxyacantha

Amyrberis

Amyrberis

Assimus Cordus, vulgi opinionem secutus, & diligentissimus Sylvius, & alij plerique, sed parvi momenti est nomen confusio, si de re ipsa constet.

Spina Dalech. volebat aliquando Berberim esse. V. v. Galeni l. 7. comp. med. s. loc. de qua re suo loco. Frustra quoque Tragus huic nomina à Diosc. suæ Oxyacanthæ tributa ascribit. Apud Serap. legas Amyrberim etiam Arsam dici, & fructum Zairach. Hispanicum etiam & Italicum nomen quod Berberi tribuit Amatus, nequiquam ei convenit, sed Oxyacanthæ Matth. sive Spinae albi. Falluntur quicunque Oxyacanthæ Dioscor. loco Berberim sumunt. Sic Carolus Stephanus Syriacum parum peritus confundit in Horto Spinae album & Berberim. Berberis, Berberus, Crespinus, Oxyacanthæ, Spina acida, & Spina sancta, quorundam, ex qua Bugia officinarum, Germ. Erb-salz / Erbsalen / Versing. Sauverach / Passels-beer / Saar-Iorn / Io. Bokelius in lib. suo de peste satis barbarè vocat Berberis. Belg. Sauselboom / Suerboom / Gal. Espine-vineta, atque inde Latino nomine, Spina vineta, quoddam ex eius acinis vinum exprimitur: ou de Berberis. Ital. Crespinus, Hisp. Espino de Maiuelas. Vngar. Irem Borbala, hoc est, Vinum-Barbarum, Fay-safa. Boh. Drac, sive Drifal. Angl. Berberi tree, alias, Pirigde tree, & Berberis. Burgundi vocant, Rein de saint Martin. Et Montbelgardenses Baccas, Ioumarin.

Locus. Sponte nascitur multis in locis incultis, sylvis, frutetis campestribus, montanis, siccis & aquosis: & rivulorum ripis ac collibus etiam potissimum gaudet. Amat loca frigida, paulo calidiora tamen non respuit. Nam & circa Bononiam observavimus, & in Italiae hortis plurimis, sed cultam. In Delphinatu iuxta Valentiam, spontaneam. In agro Basiliensi, Alsatico & Burgundico passim ferè occurrunt, ut & Montbel. Stuckardæ in horto illo Ducis regio totas sepes ea contextas vidimus. In Brabantia reperitur in marginibus agrorum & sepibus. In universa Hispania fructum non emittere ait Fuchsius: forte ob regionis eximium calorem: secus verò in Germania, Gallia & universa Italia.

Tempus. Germinat ineunte Vere: Floret Aprili & Maio. Per Septembrem & Octobrem rutilo suo decore sepes exornant Baccæ, quibus mensibus maturæ carpuntur ad usus. Rubent verò etiam Augusto. Monspelij non vidimus.

Vires & u-
sub. Folia & fructus temperamentum sunt frigidi & siccis in secundo gradu, partemque etiam quasdam nonnihil subtiles habent. Vires Spinae Appendicis ex Plin. ante dictæ. Quidam ex Baccis vinum exprimunt eodem ferè usu, quo vinum ex Malo Punico, quod per totum annum asservari potest. Estque hic liquor alvi quibusdam fluxionibus, quæ à calore originem trahunt, cuiusmodi ferè estivis & canicularibus diebus aut sub Autumno quoque incidere solent, perutilis: non enim solum siccum immodicam restringit, sed & continuos ac diuturnos alvi fluxus cohibet. Idem abundantiam mulierum sistit, stomachum & hepar roborat, & appetitum conciliat. Conducuntur Baccæ pro delicatioribus melle vel saccharo ad eisdem usus, & ad depellendam febricitantium malaciam, quorum mororum nimis palatum cibum ferre quemcunque respuit, atque ita elanguescens eorum appetentia grato harumacore recreatur. Scimus Baccarum succum quemadmodum corticis decoctum, item & foliorum contusorum succum cum aceto plurimum profuisse in calidis doloribus, dentium à fluxione biliosa vel serosa odor-

Vires & u-
sub. Folia & fructus temperamentum sunt frigidi & siccis in secundo gradu, partemque etiam quasdam nonnihil subtiles habent. Vires Spinae Appendicis ex Plin. ante dictæ. Quidam ex Baccis vinum exprimunt eodem ferè usu, quo vinum ex Malo Punico, quod per totum annum asservari potest. Estque hic liquor alvi quibusdam fluxionibus, quæ à calore originem trahunt, cuiusmodi ferè estivis & canicularibus diebus aut sub Autumno quoque incidere solent, perutilis: non enim solum siccum immodicam restringit, sed & continuos ac diuturnos alvi fluxus cohibet. Idem abundantiam mulierum sistit, stomachum & hepar roborat, & appetitum conciliat. Conducuntur Baccæ pro delicatioribus melle vel saccharo ad eisdem usus, & ad depellendam febricitantium malaciam, quorum mororum nimis palatum cibum ferre quemcunque respuit, atque ita elanguescens eorum appetentia grato harumacore recreatur. Scimus Baccarum succum quemadmodum corticis decoctum, item & foliorum contusorum succum cum aceto plurimum profuisse in calidis doloribus, dentium à fluxione biliosa vel serosa odor-

Vires & u-
sub. Folia & fructus temperamentum sunt frigidi & siccis in secundo gradu, partemque etiam quasdam nonnihil subtiles habent. Vires Spinae Appendicis ex Plin. ante dictæ. Quidam ex Baccis vinum exprimunt eodem ferè usu, quo vinum ex Malo Punico, quod per totum annum asservari potest. Estque hic liquor alvi quibusdam fluxionibus, quæ à calore originem trahunt, cuiusmodi ferè estivis & canicularibus diebus aut sub Autumno quoque incidere solent, perutilis: non enim solum siccum immodicam restringit, sed & continuos ac diuturnos alvi fluxus cohibet. Idem abundantiam mulierum sistit, stomachum & hepar roborat, & appetitum conciliat. Conducuntur Baccæ pro delicatioribus melle vel saccharo ad eisdem usus, & ad depellendam febricitantium malaciam, quorum mororum nimis palatum cibum ferre quemcunque respuit, atque ita elanguescens eorum appetentia grato harumacore recreatur. Scimus Baccarum succum quemadmodum corticis decoctum, item & foliorum contusorum succum cum aceto plurimum profuisse in calidis doloribus, dentium à fluxione biliosa vel serosa odor-

Vires & u-
sub. Folia & fructus temperamentum sunt frigidi & siccis in secundo gradu, partemque etiam quasdam nonnihil subtiles habent. Vires Spinae Appendicis ex Plin. ante dictæ. Quidam ex Baccis vinum exprimunt eodem ferè usu, quo vinum ex Malo Punico, quod per totum annum asservari potest. Estque hic liquor alvi quibusdam fluxionibus, quæ à calore originem trahunt, cuiusmodi ferè estivis & canicularibus diebus aut sub Autumno quoque incidere solent, perutilis: non enim solum siccum immodicam restringit, sed & continuos ac diuturnos alvi fluxus cohibet. Idem abundantiam mulierum sistit, stomachum & hepar roborat, & appetitum conciliat. Conducuntur Baccæ pro delicatioribus melle vel saccharo ad eisdem usus, & ad depellendam febricitantium malaciam, quorum mororum nimis palatum cibum ferre quemcunque respuit, atque ita elanguescens eorum appetentia grato harumacore recreatur. Scimus Baccarum succum quemadmodum corticis decoctum, item & foliorum contusorum succum cum aceto plurimum profuisse in calidis doloribus, dentium à fluxione biliosa vel serosa odor-

Vires & u-
sub. Folia & fructus temperamentum sunt frigidi & siccis in secundo gradu, partemque etiam quasdam nonnihil subtiles habent. Vires Spinae Appendicis ex Plin. ante dictæ. Quidam ex Baccis vinum exprimunt eodem ferè usu, quo vinum ex Malo Punico, quod per totum annum asservari potest. Estque hic liquor alvi quibusdam fluxionibus, quæ à calore originem trahunt, cuiusmodi ferè estivis & canicularibus diebus aut sub Autumno quoque incidere solent, perutilis: non enim solum siccum immodicam restringit, sed & continuos ac diuturnos alvi fluxus cohibet. Idem abundantiam mulierum sistit, stomachum & hepar roborat, & appetitum conciliat. Conducuntur Baccæ pro delicatioribus melle vel saccharo ad eisdem usus, & ad depellendam febricitantium malaciam, quorum mororum nimis palatum cibum ferre quemcunque respuit, atque ita elanguescens eorum appetentia grato harumacore recreatur. Scimus Baccarum succum quemadmodum corticis decoctum, item & foliorum contusorum succum cum aceto plurimum profuisse in calidis doloribus, dentium à fluxione biliosa vel serosa odor-

Vires & u-
sub. Folia & fructus temperamentum sunt frigidi & siccis in secundo gradu, partemque etiam quasdam nonnihil subtiles habent. Vires Spinae Appendicis ex Plin. ante dictæ. Quidam ex Baccis vinum exprimunt eodem ferè usu, quo vinum ex Malo Punico, quod per totum annum asservari potest. Estque hic liquor alvi quibusdam fluxionibus, quæ à calore originem trahunt, cuiusmodi ferè estivis & canicularibus diebus aut sub Autumno quoque incidere solent, perutilis: non enim solum siccum immodicam restringit, sed & continuos ac diuturnos alvi fluxus cohibet. Idem abundantiam mulierum sistit, stomachum & hepar roborat, & appetitum conciliat. Conducuntur Baccæ pro delicatioribus melle vel saccharo ad eisdem usus, & ad depellendam febricitantium malaciam, quorum mororum nimis palatum cibum ferre quemcunque respuit, atque ita elanguescens eorum appetentia grato harumacore recreatur. Scimus Baccarum succum quemadmodum corticis decoctum, item & foliorum contusorum succum cum aceto plurimum profuisse in calidis doloribus, dentium à fluxione biliosa vel serosa odor-

Vires & u-
sub. Folia & fructus temperamentum sunt frigidi & siccis in secundo gradu, partemque etiam quasdam nonnihil subtiles habent. Vires Spinae Appendicis ex Plin. ante dictæ. Quidam ex Baccis vinum exprimunt eodem ferè usu, quo vinum ex Malo Punico, quod per totum annum asservari potest. Estque hic liquor alvi quibusdam fluxionibus, quæ à calore originem trahunt, cuiusmodi ferè estivis & canicularibus diebus aut sub Autumno quoque incidere solent, perutilis: non enim solum siccum immodicam restringit, sed & continuos ac diuturnos alvi fluxus cohibet. Idem abundantiam mulierum sistit, stomachum & hepar roborat, & appetitum conciliat. Conducuntur Baccæ pro delicatioribus melle vel saccharo ad eisdem usus, & ad depellendam febricitantium malaciam, quorum mororum nimis palatum cibum ferre quemcunque respuit, atque ita elanguescens eorum appetentia grato harumacore recreatur. Scimus Baccarum succum quemadmodum corticis decoctum, item & foliorum contusorum succum cum aceto plurimum profuisse in calidis doloribus, dentium à fluxione biliosa vel serosa odor-

Vires & u-
sub. Folia & fructus temperamentum sunt frigidi & siccis in secundo gradu, partemque etiam quasdam nonnihil subtiles habent. Vires Spinae Appendicis ex Plin. ante dictæ. Quidam ex Baccis vinum exprimunt eodem ferè usu, quo vinum ex Malo Punico, quod per totum annum asservari potest. Estque hic liquor alvi quibusdam fluxionibus, quæ à calore originem trahunt, cuiusmodi ferè estivis & canicularibus diebus aut sub Autumno quoque incidere solent, perutilis: non enim solum siccum immodicam restringit, sed & continuos ac diuturnos alvi fluxus cohibet. Idem abundantiam mulierum sistit, stomachum & hepar roborat, & appetitum conciliat. Conducuntur Baccæ pro delicatioribus melle vel saccharo ad eisdem usus, & ad depellendam febricitantium malaciam, quorum mororum nimis palatum cibum ferre quemcunque respuit, atque ita elanguescens eorum appetentia grato harumacore recreatur. Scimus Baccarum succum quemadmodum corticis decoctum, item & foliorum contusorum succum cum aceto plurimum profuisse in calidis doloribus, dentium à fluxione biliosa vel serosa odor-

zis: arcent enim suæ frigiditate & astringentia humorum subtili influxum, & gingivas contrahunt. In doloribus capitis à causa calida fronti applicata multum possumt. Possunt & maturi acini cum ramis decerpi, & vel per se in umbra siccare, vel in cella vinaria reponi, ut nostri solent, tunc quando opus, aqua tepide vel gelide immergi, (nam quasi reviviscunt,) & ad præscriptos usus accommodari. In omnibus penè calidis morbis in vomitionibus continuis, præsertim biliosis, Berberis Baccæ salutare sunt. Folia tenera Maio mense: acini Autumno intinctibus quam accommodatissimi sunt. Tradunt nonnulli, acinos maturos tulos, ac cataplasmatibus instar illitos, non solum abscessus calidos lenire, dolore mitigare: sed & illos rumpe-re, & ad sanationem promovere. Id annotat Tragus. Verum huic remedio non multum tribuimus, nec eo etiam uti vellemus. Ad maturandum enim astringentibus non opus. Obsunt repercutientia. Quid igitur prodesse queat Berberis?

Aqua ex foliis & floribus Maio mense destillari potest, & ad prædictos morbos plerisque præscribi.

Sed vino quod ex Berberis acinis exprimitur, nostro & Matth. iudicio, longè maior inest austeritas, aciditasque, quam malis Punici succo quamvis nonnulli aliter sentire videantur. Illud enim, ut egregie monet Matth. si in acutis perniciosisque febribus, uti Causus, & quæ pestilens, Iulapio Violaceo ac aqua commistum, ægotantibus exhibeatur, non modò sitim restringit, sed biliosas pestilentesque exhalationes supprimit. Datur utiliter Celiacis, cibum reiicientibus & Dysentericis, & ubi bilis à lecinore in Ventriculum regurgitans cholericos excitaverit affectus: Non tam sumptum quam inditum mensium profusum inhibet. Tineas ventris enecat, præsertim si bibatur ex aqua Graminis, vel Portulacæ, vel Abrotoni, addito sacchari tinctillo. Prodest cruentis excretionibus: firmat commotos dentes si eo sepius foveantur, quinetiam gingivas roborat, & gargarisato faucium uvæque inflammationes discutit, atque destillationes eò confluentes reprimit. Vulnera recentia in carnis superficie glutinat, & ulcera vetera desiccat. Noceat his, qui ex flatu, ac frigiditate laborant ventriculi doloribus, atque etiam ægrè spirantibus.

Huius verò succum mordacem nolimus oculis instillare, in Ophthalmia, etsi, ut suadet idem Matth. pompholyx addatur cum aqua rosarum. Actia enim non possunt non vellicando exquisitissimi sensus oculis dolorem causare, & ita fluxiones potius concitare quam prohibere. Quare hoc remedio uti volentibus suademus, ut extrinsecus palpebris circumcirca applicent, adhibita cura, ne intra oculos pertingat. Ex foliis eius viridibus teste Dod. sunt intinctus, haud secus atque ex oxalide, ad appetentiam excitandam ad refrigerandum, atque etiam utilissimi febricitantibus & temperamento calidis.

Flavus eius cortex, inquit, Camer. pulveratus, auxilio est aphthis, similibusque faucium ulceribus. In lixivio maceratus flavo colore tingit. Hunc corticem uerdam Officinæ Bugiam nominant. Assamenta & suppellectilem ligneam observavimus hæc ratione vernice incrustari, illustraque. Aquæ, quæ macerata colla mucaginosa fit reddita, illuminantur ligna explendis fibrarum & pectinum interstitiis: siccata insuper corticem Berberis croceo colore tingunt, & tepidissimo rore inductæ vernice liquida vulgata conciliant.

R H AM

Feminitas

Aqua

Causus
F. b. pestilens
Caliaca
Lecineria
Dysenteria
Cholera
Tineas
Spitium
Sanguis
Dentes molles
Faucium inflammationesVulnera
NomaNotatus
Matth
Ophthalmia

Cautum

Embolus

Aphthæ
Faucium
ulcera
Tinctura
BugiaVernice
palpebra
incrustata

RHAMNUS CATARTICUS.

CAP. XXV.

Descriptio

Cortex

Spina.
Folia.

Flores.

Bacca.

Grana.

Super.

Rhamnus.

Spina cer.

vina.

Culor pro

pallidior.

Non esse

Rhamnus

Ruell.

Ryff. tran-

scribitur.

suo nomine

Gendreau.



CELIBRA-
VIT Rham-
nus catharticu-
sus in purgan-
do multus & fe-
lix, arbusculam
sepibus alibi
familiarem, cor-
tice externo ni-
gro vestitam cui
duo alij subsunt,
alter viridis, al-
ter luteus, mate-
rie pallida dura,
ramis satis cre-
bris, iisque ferè
ex adverso sitis
brachiatam, du-
ris, rigidisque &
longis spinis fo-
liolis minacem,

aculeis præterea alijs minoribus horrentem. Fo-
lia ad Pruni folia accedunt, acuminata, atrovi-
scentia, crenata, nervosa, adstringenti sapore:
flores herbacei coloris parvos profert, qua-
tuor apicibus constantes, multos simul iunctos.
Succedunt bæccæ frequentes ad radicem spi-
narum ex longiusculis pediculis, frangulae pa-
res, per maturitatem nigrae, succo virente ple-
nae, in quibus grana terna, vel quaterna Py-
rorum granis penè similia figurà ferè triangu-
lari, cortice nigricante, medulla alba non
ingrati saporis, quæ faciliè ungue premèn-
te franguntur, sapor bæccarum amarus & sub-
astringens, & qui faciliè gustanti nauseam
moveat. Habet & succus earum nescio quem
sibi peculiarem odorem.

Rhamnus [inquit, Hermol.] Diosco-
rid. à nostris Spinam cervalem dicit appellari.
Quo argumento videri potest haud dissimile
huic genus esse quod & hodiè vulgò Spinum cer-
vinum vocamus, fructu Myrti, foris nigro, intus
viridi, ob id, vel ad colorem pingentibus idoneo.
Cortex arbori subniger & nitidus, quasi Ceraso,
interior virens, postea luteus, lignum extrà can-
didum, interior medulla rubet. Hermolai hanc
opinionem sugillans Marcel. Fuerunt, inquit,
qui Spinum Cervinum appellatum Rhamnum
crediderint, non animadvertentes fruticem à
Diosc. non arborem vocari, virgæque non ra-
mos illi tribuere, & Rubis, Hedera, Paliuroque,
et similibus plerisque alijs coniungere eam
Theophrastum quorum nullum arborefcit. Spi-
num verò Cervinum arborefcere, & humani se-
moris crassitudine truncum aliquando habere, &
omnem rubrum esse, quum Rhamnum nigram
& candidam Theoph. tradiderit. Nec posse
Rhamnum arborem intelligi Theophrastus osten-
dit, Nam si arbor fuisset, pedibus nocere non
potuisset. Hermolai opinioni adstipulantur,
Ruell. Gesnerus, & Fuchsius quondam etiam
Spinam cervalem cervinamve vocavit. At
Ruellius quidem & Ryff. ambo more suo Her-
molai verba ipsa adducunt, eo tamen non citato.
Quasi scilicet se falsè induere opinione, ut
aliquid dixisse videantur, quàm auctori suo ci-
tationis honorem referre. Quin & Trago

hæc planta pingitur & describitur sub hoc nomi-
ne: Rhamni 2. species: quo verò apud vete-
res habitus fuerit, sibi non satis constare fateatur.
Et nisi folia eius hyeme deciderentur, faciliè se
dicturum esse speciem Rhamni alteram apud
Theoph. Quamquam id ob stare neutiquam posse
conseat, quò minus Rhamnis accenseatur. S.
quidem nec Diosc. nec Plin. perpetuò virentium
Rhamni foliorum ullam fecerint mentionem. Qua-
propter præsentem fruticem Rhamni speciem es-
se statuit, quoad alij certiorum eius nomencla-
turam docuerint. Et in Hist. German. idem
tradit, & nec à Nicandro quidem scribi per-
petuò esse folio. Ac parvi id momenti esse
et si hyeme excidant folia, quominus Rhamnus
2. Theoph. esse possit, se itaque in ea mansu-
rum opinione, donec alius meliora tradat. No-
bis sanè verò maximi momenti esse videtur,
plantam esse vel sempervirentem, vel folio de-
ciduo, & hanc notam nusquam faciliè deleri con-
temnive debere aut posse statuimus. Præterea
non videmus quid in hac stirpe appareat, cuius
merito Rhamnus candidus, qui alter est Theoph.
dici possit. Mirum etiam, Tragum, alioqui sedu-
lum herbarum vestigatorem, facultatis purgatri-
cis huius fruticis non meminisse. Cordus quoque
Cervi spinam vocat: Et Cæsalp. Spinam cerva-
lem vulgi, quasi & ipse dubitaret esse veram &
legitimam Diosc. Dubitasse videtur & Apollonius,
nequicquam statuens. Sed revera Rhamnus non
est, ac tantò minus Spina cervina Dioscor. ut re-
tè nostro iudicio statuit Marcellus contra Her-
mol. cuius opinioni etiam refragatur Matthiol.
quamvis non nisi ex Marcello id hausisse videat-
ur.

Hallucinantur proculdubio, inquit Amatus,
qui Spinam cervalem vulgò dictam, Gallis Bur-
am vel Neprum, Rhamnum esse putant, quum
revera nulli Rhamni generi respondeat. Et Dod.
Rhamnum solutivum vocans, negat tamen esse
verum Rhamnum vel Theoph. vel Diosc. Nec
placent qui Rhamnum simpliciter & absolute di-
cunt, ut fecerunt Theoph. Golius in Onom. Er-
char. Roslin, & Hellicus, qui & Spina, &
Spinam albam vocat, nihilò rectius & alia quæ-
dam nomina tribuit, neutiquam huic arbori com-
petentia. Nihil tamen impedit, quominus cum
adiestione Rhamnus Catharticus vel solutivus
dici queat, quod Rhamnis quodammodo, spinis,
baccis, & alijs quibusdam accedat, ut à plerisque
recentioribus herbariis fuit nuncupatus.

Spina infectoria Matth. Clus. Penz. Lob. & alij.
Spina merula quorundam. Spinam cervalem, inquit
Amatus, Hispani Alvarum: Itali verò Merlam vel
Cervinam, Galli Burgam vel Neprum appellant.
German. VVegdorn, VVegdornbeer, Creutzbeer, VVeer-
senbeer, VVahenberne, Ferbkörner, Ferbbeer Dartwon
man das Saffigrun macht. Belg. Rhyndesien doren
Besienboom, Baccarum arbor: & fructus Rhyndesien,
id est, Rhenana bæccæ, quod magna copia iuxta
Rhenum reperitur. Italis Spina merla, Longobar-
dis Venetisque Spina Cervino: Foroiulensibus bæccæ.
Spin. quædam, cæteris spino da ringere. Bacchan. tra-
dit Hetrulcis Maracho dici: num rectè, ipse vide-
rit. Gal. Neprum, Bourgespine. Gallobelgiz Nertprugn.
Hung. Ebrovisk, i.e. canina spina.

Pulchram iconem habet Matth. ut & Camer.
quæ melius placent nostræ. Euchar. duas figu-
ras habet diversis locis, & diversis nominibus,
quasi de distinctis plantis tradidisset, cum tamen
utrobique posita illa nomina [nempe primo lo-
co Brutzbeer, Ferbkörner: alio Weegdorn/

Deersenebeer } omnia uni hanc fructu conve-
niant.

Locus. Nascentur multis Germaniæ locis fenticosis, & sepibus, agrorum limitibus, ac iuxta vias, in dumetis iuxta itinera & vias sicis, ut vix alibi copiosiores observetur: unde & Germ. *Wegdorn*, quasi *Viam baccæ*, vel *baccifera* dicta. Amat inculta loca, & riuulos ac seropes aquam habentes. Basileæ, Tiguri, inter Montbelgardum & Bessfordiam circa Barmen copiosè nascitur. In horto E. C. Montb. copiosè alitur inter sepes. Multis Pannoniæ locis vulgarissima est, ubi interdum arboream amplitudinem adipiscitur, teste Clus. quales & aliquot videas in horto prædicto. Floret Maio, Autumno baccæ maturescunt.

Tempus. Folia fugida & sicca sunt naturæ: idèd igni facto & serpentibus ulceribus efficaciter illinantur. Quidam mulierculæ vel folia vel interiorem corticem cum modico aluminis vino decoquant, adversus oris ulcera & putrefines, quibus hoc medicamento gargarizatu singulari experientia succurrunt. Baccæ huius fructus inestis tempore lectæ arefactæ & tussæ in aqua & alumine macerata, luteum seu croceum potius reddunt colorem, quo librarii olim libros pingere consueverunt. At hodie cum auripigmentum usu recipi cepit, repudiati sunt acini isti, quamquam locum adhuc habeant apud eos qui chartas depictas & luforias, nec non coria colore flavo inficere solent. Autumno cum baccæ istæ maturitatem suam assecerint nigra evaserint, leguntur, & tussæ in vase æreo asservantur, & pulchrè viridem exhibent colorem. Vnde nonnulli eum viridè colorem ex his parant, quem Ger. *Saffgrün* vocamus. Gal. verò, *verd de Vesie*. Belg. *Saggruen*: qui pictoribus accommodatissimus est, & in magno usu. Hi acini cum circa festum D. Martini in arboribus adhuc hærent, legi solent, & ad Puniceum colorem conficiendum ab iis qui coria inficiunt, & depictas chartas coloribus illustant. Ex his facillè liquet has baccas utilissimas esse, ut quæ tria colorum genera præbeant, croceum, viridem & puniceum, ut in scripta reperit Tragus. Baccæ autem, ut gustu amaritudinem cum adstrictione quadam referunt, ita & calidæ siccaque existimantur ordine secundo. Purgatrices verò sunt, atque crassam pituitam & biliosos quoque humores per alvum educunt. Nos peculiarem earum vim in sero & aquosis humoribus efficaciter educendis experti sumus, quapropter non tardè earum Syrupus ad uncias tres hydropicis præscriptus notabili cum succedat datur: atque etiam exhibetur aridarum pulvis a ʒj: ad ʒiſs. autore Dodon. Nonnulli baccas numerant, qui à XV. ad XX. exhibent, vel etiam plures duris hominibus. Præstat autem ipsas contractas in iusculo pinguis carnis absque sale incoquere, atque iusculum ebibere: sic etenim minori cum molestia, ac paucioribus ventris doloribus ac torsionibus evacuant. Incoquantur autem baccæ à XL. ad LX. pro robustissimis etiam plures. Idem Dod. tradit baccas potenter purgare per inferiora, evacuare pituitam viscidam ac humores biliosos magna vi & excessu, ita ut multum corpus perturbent eorum qui sumunt, ac sæpè vomitum movere. Itaque non convenire nisi iuvenibus robustis & rusticis, qui magis parantur pecuniis, quam vitæ suæ, Sed mollibus & debilibus has baccas valde nocere, immensa sua vi atque eò magis si non correctæ & castigatæ exhibeantur. Et sanè cum facillè parari possit ex iis Syrupus, aut ipsæ quoque prædicto modo administrari, ipsas baccas temerè, nisi robusto devorandas

dare nolumus. In Syrupo verò quo quotidie & frequenter utimur, etiam in delicatissimis naturis, nullam molestiam effatu dignam, unquam deprehendimus: & solvendo corpori accommodatissimum à multis iam annis cognovimus, etiam in nobis ipsis. Paratur Matur. hoc modo. Baccæ probè maturæ, ut Octobris principio, leguntur ad lib. ij. mundatæ, conquassantur parum, & in ollam vitream inditæ per tres quatuorve dies benè testæ, stare sinuntur loco tepido. Postmodum exemptæ in lacculum coniciuntur & prælo subiectæ exprimentur. Succus expressus cum lib. j. Sacchari lento igne coquitur ad Syrupi consistentiam. Postea colatur, addunturque Cinnamomi & Zinziberis benè pulverisati ana drach. ʒ. Caryophyll. drach. ij. & in usum reponitur. Huius unci. j. ad drach. x. placidè purgat pituitam omnèque crassos & viscosos humores. Quare podagricis optimum est medicamentum. Nos ita fieri iubemus. Succus baccarum maturarum extrah. & ritè depurat. lib. V. coquantur cum Mellis opt. & Sacch. ana lib. j. f. ad Syrupi consistentiam. Adde pro unaquaq. libra Syrupi, Cinam. & semin. Anisi conquassator. ana ʒ. ij. in pet. a ligatissimè mergatue. de hoc tutè dabis ab ʒj. ad ʒij: nec prædictas molestias metues, nisi fortè in exquisitissime delicatis homuncionibus aut impuris planè corporibus in quibus omnes ferè purgationes molestiores fieri scimus, quod plerique tales stomachici sint quorū Camerinam absq. singulari cautione mouere periculòsum, sit & ex baccis his Electuarium, nonnullis in locis usitatum, ut & Syrupus: quæ ambo parum amica stomacho Camer. censet, idèdque eò diligentius corrigenda. Medici Lutetiani, inquiunt, Pen. & Loh. certiores virium, quàm Math. ut qui non ad pituitam crassam & viscidam, sed potius tenuem educendam, prudentius utuntur. Sanè & nos præcipuum earum vim in extrahendis aquis deprehendimus: uti dictum.

RHAMNVS SOLVTIVVS PVMILVS PANNON. L. Clus.

EX ea plantæ portione, quam penes nos in sicco nostro herbario habemus, apparet fruticem esse ad Rhamnum Catharticum vulgarem accedentem, cortice testum nigricanti. Folia ex eodem tuberculo plura oriuntur, brevibus pediculis hærentia, acuminata, unciam plus minus longa, semunciam lata, circumcirca crenata, laxa. Baccæ sicca Terebinthi fructum referunt, tum magnitudine, tum forma turbinata, in acumen desinente pediculis semuncialibus appensæ: nec demonstrant commissuras quales Clus. habet in Rhamni sive spinæ insectoriæ Pannon. sua figura, cui tamen folia satis respondere videntur.

Considerandum an possit esse prima eiusdem, cuius nullam dat figuram, quamque sic describit: Spina insectoria prior bicubitalibus assurgit ramis, in multas alas divitis, cortice laxo, spinæque insectoriæ vulgari tum colore tum substantia simili, testis, qui membrana superiori deimpta: ex viridi pallescit, & sapore est amarissimo: ramuli paucis spinis horrent, sed ipsi in spinas plerumque desinere solent. Folia vulgari ferè similia, sed minora & angustiora, ad Rhamni sylv. folia plurimum accedentia, gustu linguam exiccant. Flos congelatus, ut in vulgari.

Syrupus

Alia mo-
dus.

Obferuatio

Electuarium

Math. m.

Descriptio

Folia.

Baccæ

Spina insectoria.
Cortex.

Flos.

gari, eiusdemque coloris & formæ, hoc est, ex pal-
lido herbaceus, & quatuor foliolis constans, mi-
nor tamen. Radix ut in aliis fruticibus ligno-
sa. Hanc si quis Lycij generibus annumeran-
dam censeat, non refragabor.

Frequens cum vulgari Rhamno exit in Ley-
tenberg. Floret Maio.

RHAMNVS SOLVT. PANNON. II.

Descriptio



S Pina infecto-
ria Pannonica
2. Clusio, cubita-
les habet ramos,
minimi interdum
digiti crassitudine
plerumque mi-
nores, nigro ru-
gosoque cortice
obductos, supe-
riore parte in ra-
mulus divisos,
qui tenuiore &
leviori cortice
recti plerumque
in acutam spinam
desinunt. Folia
Myrti aut sylv.
potius, breviora
tamen & minora,
viridia, per am-
bitum nonnihil ferrata, gustu, primam adstrin-
gente, deinde nonnihil amara. Flores in-
ter folia herbacei, quatuor foliis constantes, ut
in priore: Fructus deinde spinæ infestioris vul-
gari haud absimilis: binis, nonnunquam etiam
terais velut commissuris distinctus, initio viri-
dis deinde per maturitatem niger. Radix crassa,
lignosa, dura, raras fibras in latera spargens. Et
hanc quoque Lycij generibus accenseri æquo
fero animo. Tabern. Germ. *Ungerisch Beeg*
Dornbeer & *Creutzbeer* vocat. Botanici qui vi-
derunt, considerent quantum differat hic
Rhamnus a Lycio Gallico.

Nascitur copiose in monte Bodensi thermis
imminente & vicinis iugis, loco petroso & sale-
broso.

RHAMNVS BAVARICVS
DALECH.

Descriptio



P Rhamni
etiam genere
spinosam plantam
Germanus qui-
dam rei herbarie
studiosus ex Ingoi-
radio Dalecham-
pio attulit, quam
Rhamnum Ba-
varicum vocabat,
quod aliud aptius
nomen non inve-
niret. Hæc plan-
ta, ut ille narra-
bat, hominis al-
titudinem supe-
rat, cortice est
purpurascens, spi-
noso, foliis den-
sis pallidis, omni-
bus seminis, sed

aliis longioribus & angustioribus, prima scilicet
ramorum parte, nec luci dissimilibus, aliis
brevioribus & rotundioribus, circa ramorum
extrema Rhois folia utcumque æmulantibus,
spinis multis, tenuibus, sed acutissimis, fo-
liosis, ut in primo Rhamno Matthæi. Hiber.
Lugd.

LYCIVM VETERVM.

CAP. XXVI.

Lycium, quod ab aliquibus *πυλάγιον* vocant, autore
Diosc. arbor est spinosa, virgistrum cubito-
rum, aut etiam longioribus, circa quas folia sunt
Buxi similia [Plin. Radix Buxi coloris] densa.
[*πυλάγιον*: quidam frequentia vertunt] Fructum fert
Piperis instar nigrum, [Celsus: Celsus. non
probat, sed melinum substituit, id est, luteum]
amarum, densum, [τοκνίς, sive succi plenum,
aliter quam Matth. & Corn.] levem corticem ve-
ro pallidum, Lycio diluto similem, & radices
multas, obliquas, [pro *πυλάγιον* ut Oribas. habet
à Plin. legi potuit *πυλάγιον*, Serap. quoque legi
πυλάγιον] lignosas. Nascitur plurimum in Cappa-
docia, Lycia, pluribusque aliis locis. Aspera loca
amat.

Succus dicitur radicibus cum frutice ipso tu-
tis [Ruell. hic more suo maluit Plinij sensum ex-
primere, quam auctori fidem prestare, cum au-
t. Rami cum radicibus tuis, &c.] & per dies multos
maceratis, denique coctis, ac tum ligna qui-
dam abiciuntur, liquor vero iterum coquitur,
donec melis crassitudo fiat. Adulteratur amurca
inter coquendum admixta, aut Absynthij succo,
aut felle bubulo. Quod vero spumatum, anatat
inter coquendum, eximito, & ad oculorum me-
dicamenta reponito: reliquo ad alia utitur. Si-
mili modo & è fructu expresso & insolato succus
elicitur. Optimum est Lycium, quod igni accen-
ditur, quodque dum restinguitur, rubentem
spumam [Oribas. *πυλάγιον*, id est, tumum legit] edit,
extrinsecus nigrum, intus vero cum dissecueris
fulvum, minimè virosum, cum amaritudine a-
stringens, colore croceo: quale est Indicum, reli-
quo præstantius & efficacius. Vim habet astringen-
tiæ, & quæ pupillis caliginem offundunt exterius
palpebrarum scabiem, pruritus veteresque flu-
xiones sanat. Facit & illitum, ad aures purulen-
tas, tonsillas, gingivas exulceratas, labiorum fis-
suras, sedis rimas & attritus. Celiacis & Dylen-
tericis, tum potum, tum etiam infusum convenit.
Datur & sanguinem excreantibus atque tussien-
tibus ex aqua: itemque à rabioso cane demor-
sis, catapotij instar devoratum, aut ex aqua bibi-
tum: Flavos facit capillos. Reducit, herpeti-
bus, putrescentibusque ulceribus medetur: flu-
xum muliebrem appositum sistit, & à rabio-
sis animalibus demorsis, seu in lacte bibitum,
seu catapotij vice assumptum, auxiliatur. Fertur
& Lycium Indicum [hæc sequentia superflua
apud Dioscor. putat Cornar.] fieri ex frutice
Lonchitide vocato. Est is è spinarum genere,
virgas habens rectas tricubitales aut etiamnum
maiores à fundo numerosas & Rubo crassio-
res. Ruptus cortex rufescit: folia vero Oleæ
similia videntur. Cuius herba in aceto deco-
cta propinataque prodituri Lienis inflamma-
tionibus, Regioque morbo mederi, & scemina-
rum purgationes cieri. Cruda quoque trita in
potu eadem præstare traditur. Semina mysta

Descriptio
Diosc. Py-
lagicum.
Folia Buxi.

Locus
Lugdunensis
in Asia
minore.

Adulterat.

Succus è
fructu
delectus.

Indicum
Vires.
Caliga ocu-
larum.

Palpebrarum
Aprum
ulcera.

Gingivarum
ulcera
Rima la-
biorum.

Ex aqua
Calicaria
Dysenter.

Sanguis
tum.

Cane ra-
bioso mor-
sus.

Capillos
cingit.
Fleceæ ph-
trida.

Morsus su-
perflui
Lycium in-
dicum.

Lonchitidis
descriptio.
Vires.

Lienis in-
flammati-
lactis.
Morbus cieri.




Cordis figura, pro nucleorum numero: de cuius festigio pilus duplex subtilissimus eminet, gustu adstringens & valde amaro. Baccis ad tingendum cinereum aureo colore infectores utuntur, eaque vocant Tinctorium granum, *Graine à teindre*, aut Flavum granum, *Graine jaune*, aut Avinionense granum, *Graine d'Avignon*. Ex eo quod de Lycio Diosc. prodidit nimirum *ἑκδιέσκοντες τείχεα*, flavos reddere pilos, movit Dalechampium ut crederet, quod & multi asserunt, verum Lycium, quavis hac planta non sit, cuius succo in Offic. utimur, eisdem effectus tamen præstaturam, quos veteres suo Lycio tribuerunt. Eiusdem Dalech. figura ad plantam siccam facta, in qua contrahuntur folia. Baccæ etiam proculdubio erant siccæ, quæ ita angulosæ appiçæ. Solitum fuerat advehi Lycium ex Lycia, verum quid sit hodiè norunt perpauci, inquit Adver. Est in Provinciæ Narbonæ plerisque locis arbuscula (Lycium siue Pyracantham Narbonensem vocant) Oleæ sylv. similis, Arbuti magnitudine, foliis Oleæ, sed brevioribus, rigidioribus, rotundioribus, minoribus, candidis foliorumque viridi, obliquo, satiore, colore subfulvo, spinis crassis atq; rigidis, præduris. Baccæ sunt ut Phylireæ maiores, sed rosiore, quàm Oleæ, succo subrubro, Oleaginolo, uti Phylireæ: qui amarus, ingratiissimus, accensus cum strepitu quodam flagrat, exinctus rubet. Hanc, tametsi præ se undique referat Lycium, tamen non auderemus asserere eandem esse. Id tamen audemus dicere, vix maiori posse usurpatione Lycium, quàm istud nostrum: & posse longè propius, aptiusque subdili quàm Amurcam: habet namque vires digerendi quàm cum astrictione. Quod si non sit Lycium, fuerit sanè species Oleæ sylvest. cuius Amurca omnium præstantissima vice Lycij est. Valdè putamus Matthiolum hic iconibus abuti, sed & Anguillæ etiam & aliis doctioribus vera monentibus conviciari. Considerent itaque periti an hæc conveniat cum Lycio à nobis descripto & depicto: an verò illa quam eadem Advers. Paliuri alterius peregrinæ nomine describunt his verbis: Quædam spinis horrida, foliis Oleæ minoribus, baccis nigris, tricoctis, Smilacis, gravidis, succo fulvo, tincturæ apto, prægrandibus, Berberidis modo, granis ternis, sed minoribus, oblongis, gustu subacri, cuius hic picturam damus, non procul Monspeliò, qua itur ad scaturiginem Lani amnis, secus ripam & propè viam multa. In qua sanè descriptione multa sunt, hæc cum nostra conveniunt, excepta comparatione illa foliorum cum Olea. Figura sanè quam ponunt ad pro Paliuro 2. peregrino satis quadrat cum nostro Lycio, quavis foliorum serratura non adsit, granaque angulosa non appareant. Vix enim putamus virentia ita angulosa esse, ut sicca, quæ fallat memoria. In icon. Lob. p. 379. errore ut existimamus Typographi pro icone prædicta alia posita, nempe Pyracanthæ, quæ etiam posita p. 132. sub titulo Rhamni 3. Dioscor. Nec scimus cur ibi etiam ita vocetur, quum in Advers. Pyracantha dicatur, nisi & is sit error Typographicus.

LYCIUM ITALICUM

Descriptio
Bacca

Ante plures annos accepimus à D. Cornu baccas similes baccis Lycij Gallici, cum inscriptione Lycij ex monte Baido: colore tamen



differunt, sunt enim purpurascetes & ferè nigra: semina in baccis ad Berberim accedunt, breviora tamen lucida, polita, colore subfulco, aut ex spadiceo in nigri vergente, penè triangula, inter ea quædam sulcata: saporem amatum non deprehendimus, sed aliis ingratum: Quædam etiam baccæ apparent angulosæ: an verò virentes tales, ant nescimus: Postrema Matth. figura id non demonstrat. Fortè succo & carne humidior exsiccata, à granorum intus positorum situ & figura tales apparent, ut hinc dicat Anguil. ad Tithymali fructus accedere. Nil tamen asserimus. Qui viderint plantam virentem, explicent. C. Bauh. apud Matth. putat esse Lycium 1. Cæsalp. & Brassavolæ, cuius icon ex Matthioli. proposita falsa est, nec meretur nomen Lycij primi, tantum abest ut Brassavolæ sit & eundem: ac multò etiam minus Cæsalpini, cuius Lycium suspicamur esse Pyracantham Lob. de quo diximus 2. libi. Idem C. Bauh. & Lycium 2. apponit sub alia figura quod & italicum vocat.

Cæterum ut Galli suum, sic Itali suum quoque Lycium celebrant, atque aded melius censent. Sic enim tradit Matth. Lycium medicamentum Officinarum adulteris non vacat: hoc ævo ex Lycia ad nos non importatur: veruntamen & in Italia Lycij arbor nascitur: quandoquidem (ut Brassavolus testatur) in Liguria Alpibus frequens illa visitur. Eadem & in Dalmatia provenit, unde nuper eius ramuli baccis onusti mihi allati fuerunt: quippe (ut mihi retulerunt) via, qua ex Zara itur Nonam, ubique virefcit. In com. cum magnis fig. Lat. & Italicis Lycij plantam, cuius iconem dat, sibi nullam à Baptista Balisto Dalmato Mytopola: Sed revera plantam ipsam vivam à se nusquam vilam. Cæterum quamvis censet vitiligator quidam, eam fictitiam potius, quàm veram esse Lycij plantam, se tamen, cum Lycij historiam omnib. ferè notis illam representare videat, eam ex commet. suis eruendam consultum non duxisse, quòdque aliis compareat, qui ex Lycia, vel Cappadocia veriorè Lycij plantam ad nos asserat. Haberi quoque aliam quandam plantam, quæ non parum Lycium amuletur. Hanc primum Verona ad se missam à Fr. Calzolari, cuius & imaginem exhibet, ut de ea quoque aliorum sit indicium. Lycium Arab. *Haddadh*, *Hadad*, *Kilulem* siue *Felakarak* vocari. At pace Matthioli dixerimus, icon, quam fictitiam apponit[ut is non negat, merebatur quæ ex commentariis suis erueretur cum aliis quamplurimis fictitiis: res docenda, & vivis imaginibus representanda, quantum in nobis est, non figmenta, non excogitata larvæ, ut ipse non parum sæpè faciat. Lycium italicum verum sit an non, nihil refert, modò talis exhibeatur, qualis est, & pro Italica. Quæ Itali

Semina

C. Bauh. Lycium

Lycium

Lycium
LocusAlia Lycij
similisArab.
Matth. f. 132.
ut multum
differt.



Floris. habet parva, ad buxi foliorum formam accedentia, leniter serrata, flores copiosos, luteos, instar Paliuri, sed minores, quibus succedunt fructus aliquantulum longi, ut berberis fructus, coloris autem nigri, saporis inter acidum & dulcem medij, in quibus vel unum vel duo granula continentur. Cortex ligni non lavis ut Berberi, sed asper & pallidus est: materies ligni lutea, atq; radix ipsius elegantissimo luteo inficitur in altissimorum montium convallibus: differt autem à Berberi, cuius folia maiora sunt, & fructus racematim nascuntur. Legitimum verò Lycium non est, quia fructus neque rotundus ut piper, neque amarus est. Propterea potius vocanda erit Berberis alpina aut montana, quam Lycium, quemadmodum Sylverius Todechini censet, qui hunc fruticem frequentissimum in Libano monte etiam invenit.

Locus. Ceterum duo alia Lycij genera hic reperiuntur, quorum unum maxime historiae convenit, id etiam in Libano monte oritur, cuius cum ad manus neque semina, neque rami sint: ideo de ipso in praesentia verba non facio. Alterius verò ramosos simul cum eius fructu nondum maturo mitto: vocatur Petra Amygdala, dicitur cum amygdalis nihil commune habeat: frutex est ad duorum aut trium cubitorum altitudinem assurgens, densus, folia parva firmaque ferens, spinis totus plenus est, & fructum rotundum ferme parvum ut piper habet, cum ad maturitatem pervenit, nigricantem: radix lignosa est maxima, eaque firmissima. Hebraei ex huius fructu elegantem luteum colorem parant.

Lycij Rami. An Rauvolf. lib. 2. c. 12. itin. de plantis Libani, Lycium incolis Zarda. Item L. 12. Lycium peregrinus frutex inter Ramam & Ioppe, cuius succus interdum reperitur in nostris Officinis: & cuius meminit Propheta David Psal. 58. sub nomine Hadhath. Et sub finem lib. 4. figuram proponit sub titulo Lycij Dioscorid. & Hadhath Arabum, quam figuram & nos proponimus, non auderemus tamen pro certo asserere Rauvolf. Lycium esse Creticum. Non enim describit sup. Rauvolf. nec Cretici partes omnes vidimus: appropinquamus tantum Cretici folium & granum.

LYCIUM QVORVNDAM, FOLIO Myrti Tarentinae aut Buxi.

Descriptio. Frutex est spinosus, multas ab radice virgas proferens, cubitales, saepenumero ampliores, rectas, pulchras, tenues, rubentes, multis ramulis praeditas, qui in acutam spinam plerumque desinunt, tamen alios hinc inde sparsos & culeos habeant, breves interdum & infirmos: nonnulli quam verò oblongos, firmos, & multis foliis obditos, ut in Rhamno primo. Folia nullo ordine digesta, Spini, sed multò breviora, Myrti Tarentinae aut Buxi quodammodo aemula, gustu lenta & cum aliqua aciditate mordicantia. Eius nec florem nec fructum videre cōtigit: nam Novemb. & primo datat Vere, aliqua ex parte solis viduat hunc fruticem invenit inquit Clus. qui dubitat quoniam hic frutex referendus sit, atq; tradidisse tamen nonnullos qui ad Lyciū referri debere putet, Castellanis Tamiis sive Tamuxes vocari. Hist. Lugd. tradit pinxisse Lob. Lycium Hispanicum quod Clus. descripsit. At nos figuram Lycij Hisp. Lob. non referimus ad hanc plantam, sed ad Rhamnum. Clus.

Locus. Apud Complutum, aliisque Castellae veteris locis, & Batiae parte, quam vulgò Extremado-

rum vocant: circa fluentia & declivibus locis, quae hyeme abundant nascentem observavit Clusius.

Idem ait Castellanis scoparum usum praebere: componi etiam in fasciculos pittorum fornacibus vti: calcificandis idonea.

LYCIUM GARCIAE, SIVE CATE.

Descriptio. Arbor ex qua succus Cate extrahitur, autore Garcia, magnitudine est Fraxini, folio minuto: Ericae vel Tamarici simillimo, perpetuò virente: Florere aiunt, sed fructum ferre negant: multis spinis horret: materies ligni robusta, dura, densa, ponderosa, nec ut aiunt putredini obnoxia, sive solibus exponatur, sive aquis immergatur. Potrò succi extrahendi haec est ratio. Ramos huius arboris minutim concisos elixant, deinde contundunt, postmodum cum farina Nachani (semētis est nigra & minuta sapore, secalibus conficiendis panib. apta,) & eiusdem nigri ligni, quod istuc nascitur, scobe, interdum etiam sine eo) pastilli & tabellae formantur, quas in umbra siccant, ne Solis ardore earum facultas evaporet.


Cate in omnibus ferè locis Indiae, in Malacca Car. Car. Quod verò hoc nomen Cate aut paululum immutatum apud Arabes, Persas, reliquasque Asiae nationes obtinuerit: in causa esse puro, quod maxima pars illius in Malacca regno absumitur, ubi eadem nomen obtinet. Incolae eius arborem Hachia & Lignum Sempervivum nuncupant. Existimant autem eadem Garcias hoc Cate nihil aliud esse quam Graecorum & Latinorum Lycium. Propter vires. n. & extrahendi modum, Indicum Lycium praefertur à Diosc. Plin. & Gal. quorum verba antea protulimus. Vocatū a. est Lycium à Graecis, ut dicebamus, quoniam in Lycia primum inter Graecos eius usus repertus sit, optimūque istuc nasci eo tempore censerent. Praefertur etiam Indicum ab Avic. & Serap. qui id Hadhath appellant, uti dictum. Sed merito Garciae opinioni se opponit Clus. quod Diosc. Lyciū folia Buxi habeat, & pusilla sit arbor. Itaq; longè alia censenda est, quam ea quae à Garcia describitur. Tamen si non satis sibi constare videatur Diosc. in Lycij descriptione, si modò postrema capitis de Lycio pars, Dioscoridis sit.

Ceterum de quo his agitur Lycium plurimum nascitur in Cambaya, teste Garcia, praesertim Bagaim Manoja & Daman, urbibus Lusitaniae Regi parentibus. Provenit etiam in continenti Coz, aliisque plurimis locis, sed non tam abundanter ut supraenumeratis, è quibus mercimoniū grava exportatur magna quantitate in Chinatum regionem. In Arabiam verò, Persiam, & Cotafone, medicamenti causa, & pauca quantitate. Magna autem copia in Chinatum regionem & Malacam deportatur, quoniam in malicacioribus plurimus eius cum Betre est usus. Indi quippe ad gingivarum molli- Vires & us- ficationem & relaxationem medicamento ex Betre, Areca & Cate composito plurimum utuntur. fus. Dantur laxant. Neque tantum optimū est medicamentum ad confirmandas gingivas & desiccandum & constringendum: verum etiam ad alvi profluvia curanda, oculorumque dolores tollendos, in quibus plerumque optimo cum succulso usum se esse testatur idem. Ex ligno eius, propter duritiem & pondus, pistilla parantur deglumandae. Orizae idonea in mortariis ligneis, sex palmos in ambitu continentibus.

Recentiores quidam à Periclymeni succo succedaneum eius parant. Sed si Lusitani pharmacopolae ac institores in conquirendis legitimis medicamentis diligentiores essent & huius & alia-

rum desideratarum copia classe regia in Lusitania, & inde in alias nationes deferri possent.

LYCIUM INDICUM ALPINO PUTATIVUM.



Lycium indicum.
Locus.
V. 17.
Descriptio

Spina.
Folia.
Flores.
Fructus.
Sapor.

Lycium indicum.
descriptio

Non esse
Lycium
verum.

Vires & v.
luc.


HACTENUS post tot, non tantum, tot autorum, etiamque nostram sitigentiam, nondum constat, quodnam verum & legitimum veterum sit Lycium, singulare nunc, quod ad illud Lycij vires quodammodo accederet, pro eo obtrudentibus, tandem prodit Alpino, qui, ut ille quondam Philosophus cum suis discipulis, a legitimum Lycium inventum ratus, in hac prorumpit verba:

Verum Lycium Indicum tibi prodam: quem fruticem longe ab Alexandria civitate supra ripas rami Nili Calig vocati, decem millia passuum invenit: quem incolæ Peræ appellat. Est is frutex multis ramis rectissimis, ab radicibus multis, duris, lignosis, oblique descendens, longitudine trium cubitorum & plus observatis, sursum affurgens ramis: spinæ acutissimæ & longæ multæque insunt, quarum quædam foliis vestite spectantur. Folia verò huiusce fruticis sunt Olive similia, his tamen candidiora & angustiora vel minus lata. Flores Agihalid planè similes habet, quippe parvos albos, Hyacinthi orientalis forma & magnitudine æmulos, à quibus fructus nigri parvi producuntur, Ebuli fructibus prorsus similes, læves, gustu amari & astringentes.

Quamquam verò in Ægypto multa Lycij copia circumferatur, tamen nescire se fatetur, an ex hoc illud frutice constent, quando neque hanc plantam copiosè ibi provenire noverit, neque sciat illam esse notam. Siquidem Lycium ab illis usitatum falsum ac adulteratum esse arbitrat. Hinc autem succum, qui ex Arabia locis importatur, durum esse, exterius nigrum, & Acidæ succo valde similem. Fractum intus colorem Aloës præ se ferre, odore obscuro, non ingrato, sapore subdulci, astringente, nullius amaritudinis participare: viscosum esse, digitisque contrectatum adhærere, unde colligit, haud esse verum Lycium, præsertim cum neque amaritudinem habeat, neque igne succensum rubescere edat spumam, ut de verò Lycio traditur. Quapropter quod ante Categoricè affirmarat, nunc dubitat, an sit Lycium Indicum Dioscoridis, quod tamen & in titulo fecerat. Sed nec experiri se potuisse tradit succum, qui pro Lycio circumfertur. Ægyptios inter calidum & frigidum medium constitutere, sed supra primum gradum sicum, stipicum: proinde, inquit, in omnibus ulceribus

lato utuntur, præsertimque ad oris, aurium, narium, ani, intestinorumque ulcera. Vnus maximus est in Collyriis ad Ophthalmias accendas: mulieres enim paratum linimentum ex Lycio & antimonio habent, quo quotidie oculos liniunt, ut oculos defendant ab humorum fluxionibus. Eo etiam illi ad ventris fluxum utuntur, non minùque ad Dysenteriam. Ad spiritum sanguinis eo maxima spe utuntur, & ad uteri profluvium cohibendum, eo pessi modo intro misso, ad ulcera pulendorum præsertim ad cautes, ad gingivas coriosas & ulceratas, nec non ad dentium commotionem. In Lienentibus, dysenteris atque fluxu hepatico & Clysteribus miscient & in liquore aliquo convenienti solutum hauriunt. Nec dubium illis illud quamcumque partem ab influxu humorum efficaciter defendi, urticæ & podagricos dolores retardare compertum est.

AGIAHALID ÆGYPTIVM FOLIO BUXI: AB LYCIUM?



ET huius h. Descriptio
storia Alpino accepta ferenda. Arbore est, que in medio cuiusdam Eunuchi Turcæ viridario, quod parum ab æde Veneti Consulis distat ex Æthiopia asportata, magnitudine Pyri sylv. ramis raris non multis, in rectum æqualiter elatis, ordinatim acutissimis multis spinis obsita, folia ferens Buxi proxima, latiora tamen, pauciora,

angusta, bina æqualibus interstitiis adnata. Flores habet paucos albos, Hyacinthi Orientalis flonibus similes, sed minores, à quibus prodeunt fructus nigri Ebuli similes, gustu subamari & astringentes. Folia gustum acido sapore ferunt, cum aliqua astringente. Huius arboris foliorum usum ad pueros vermibus vexatos, in Æthiopia audit esse familiarissimum. Dubitat verò an hæc possit esse Lycium Diosc. Sed hæc obstare videntur, quod Lycium Diosc. frutex potius sit quam arbor: præterea foliis densis describitur, non raris: nisi forte error sit typographi, & legendum: bina singulis æqualibus interstitiis adnata, ut figura ostendit. Ita dubius abiecit nobiscum lector, nesciens adhuc, quodnam sit verum & legitimum Lycium veterum. Nos viam patefacimus inquirendi, conferendi, decernendi.

Certiora aliquando docebit posteritas.



novellis melior. Acervi confertis taleis recentibus luto caminantur, accensaque strue contispungitur durefcens Calyx, [Corium seu tegumentum lutoſa cruſta, Dalec. Hoc fieri Theoph. vult, ut excitata flamma omnia corripiat.] atque ita ſudorem emittit. Peſſima & Carboni & materiæ Haliphleus dicta, cui cræſſiſſimus cortex atque candex, & plerumque cavus fungoſuſque. Nec alia putreſcit ex hoc genere, etiam cū vivit. Quin & quamvis altitudine non excellat: ſulmuge ſapiffimè icitur, hinc Virgil. Eclog. i. cecinie:

De celo talia memini prædicere Quercus.

Ideoque ligno eius nec ad ſacrificia uti fas Eidē rard glans, & cū tulit, amara, quam præter ſues [de Cerri glande hoc Theoph.] nullum attingat animal, ac ne ex quidem, ſi aliud pabulum habeant. Hoc quoque inter reliqua neglectæ religionis eſt, quiddē mortuo capite ſacrificatur. Glans Fagea ſuam hilarem facit, carnem coctibilem ac levem & utilem ſtomacho. Iligna ſuam anguſtam, [compacta & minimè laxa carne] nitidam, ſtrigoſam, ponderoſam: Querna diffuſam & graviſſimam, & ipſa glandium aquē duleſſima [& ipſarum glandium quæ eſt duleſſima Dale. nempe Fagi Græcorum.] Proximam huic Cerream tradit Nigidius, [contra iudicium hoc Theophrasti,] nec ex alia ſordidiorem carnem, ſed duram. Iligna tentari ſues, niſi paulatim detur. Hanc noviffimam cadere, Fungoſam carnem fieri Eſculo. Robore, Subere. Quæ glandem ferunt, omnes & Gallam, alterniſque annis glandem. Hæc Plinius ſerè de Quercuum vel potiùs Glandiferarum arborum differentiis, qui ad præter Suber dixiſſe videtur, ubi Suber glandem ferre dixit.

Idem quoque & ante eum M. Varro, in Thurino agro, ubi Sybaris fuit, Quercum memorat, quæ ex ipſa urbe perſpiciebatur, nunquam ſolia dimittens, nec ante mediam ætatem germinans.

Idque mirum eſſe, addit Plin. Græcis autoribus proditum, apud nos poſtea ſilēti. Nos id apud nullum Græcum autorem præterquam apud Theoph. hætenus legimus. Sed & hodie obſervata ſunt quas poſtea dicemus. Meretur & illud relationem, quod de Quercubus mira magnitudinis idem refert Plin. his verbis. Aliud è ſylvis miraculum: totam reliquam [præter eam] quæ proximè Oceano adiacet, Germaniam replent, adduntque frigori umbras altiffimæ tamen hand procul Cauchis, circa duos præcipuè laeus. Littora ipſa obtinent Quercus, maxima aviditate naſcendi: ſuffoſæque ſubſiſſibus, aut propulſæ flatibus, vaſtas complexu radicum inſulas ſecum auferunt: atque ita librata ſtantes navigant ingentium ramorum armamentis, ſæpè terris claſſibus noſtris, cū velut induſtria ſubſiſſibus agentur in proras ſantium noctu, inopèſque remediis illæ, præliū navale adverſus arboris inirēt.

Quædam etiam Quercuum genera negavit Theophr. fructum ferre: nos tamen, addit Scal. aliquot pumila Roborilla ſterilia novimus, ſi glans exigatur. At Gallam ex iis legimus grandem oppidū.

Sed iam reliqua quæ naturam ſerè in genere declarant ex citatis autoribus colligamus. Theophrast. ergo, quæ folio conſtant deciduo, communī nomine ſerè [quod ſive Quercum ſive Robur veritas, per nos licet] vocat, cuius modò genera diximus. Reliquarum autem glandiferarum, quæ perpetuū vident, numerantur ab eodem Theophr. ſpecies quinque: ſcilicet Ilex, Smilax, Phellodrys apud Arcades vocata: Suber,

Tom. I.

Aquifolia, de quibus infra, ſuis locis prædetur.

Porro & de robuſtiſſima eſt, ac difficulter mo-

ritur: materies quoque eius ſpiſſa, dura, ideoque flexum nullum recipit, tam navibus quàm domibus commoda, nec non & in terra obruta

durat, Cortex quod Crallus, Scaber & rimofus,

ex humore carne & nervis conſtans in ſenecta

quoque rugoſior: Medulla quoque eius [ſpiſſa]

ſpiſſa, quam Melandriū vocant [atrum reddit

Gaza] Quidam ſerè florere exiſtimant: alij mini-

mè ſed ſerè deſerunt, Iulium Quercinum, [muſcum

Roboris. Gaza. Meliùs fortè dixerit Bryon

Quercinum reſervato nomine Græco, cū id

genus floris proprium ſit tūc ſerè autore ipſo.

Theophrast. l. i. hiſtor. cap. 3.] Proprium quoque

Galla: ac omnium copioſiſſimè præter fructum,

& alia gignit: ut gallam parvulam, & aliam re-

ſinoſam, & nigram: ſerunt & quid Moris ſpe-

cie ſimile [ſerè deſerunt], ſed durum & fractu con-

tumax. Hoc verò rarum eſt. Quidam etiam

initio colis aut pudendi virilis effigie, cū perſi-

citur durum parte protuberante & perforatum.

Fert & aliquid Tauri caput imitans, quod effra-

ctum, nucleum inſus ostendit Olivari ſimilem.

Nascitur in iis & quod tūc, vocant, hoc eſt,

pillulas lanatas, vel coactos lanæ flocculos, mol-

les, ſed nucleo duriore, quibus in lucerna-

rum luminibus utuntur. Etenim probè ſi-

grant, ſicut galla nigra. Item & aliz quædam

pillulæ cum capillo, ſed inutiles, verno tamen

tempore melleo ſucco inſicientes tam tactum

quàm guſtum. Aliz præterea interius ad alarum

pronos recessus enaſcuntur Pillulæ ſine pediculo,

intus cavæ, verſicoloreſ, eminentibus umbi-

licis candicantibus, aliquando maculoſis, in-

terdum nigris, quibus media cocci colore

ſplendicant: quibuſque apertis nigra & putris

inanitas conſpicitur. Gignunt & Quercus,

quanquam rarè, lapidoſum quid, ſed magna

ex parte pumicem referens. Et hiſ adhuc rariùs è

foliis convolutas compactatque, Pillulas oblongas.

Præterea in foliorum tergo Pillulas albicantes,

pellucidas, aquoſas dum molles ſunt, in quibus

& muſcæ [muscæ] naſcuntur: quæ aduſtiores

factæ in parvam ac levem veluti gallam in-

dureſcunt. Sed & fungi è radicibus & iuxta ra-

dices erumpunt, quos tamen communes ha-

bent cum cæteris arboribus quemadmodum & viſcum.

Viſcum, quod in aliis quoque provenit. Ita Mel &

videt muluſeram eſſe hanc arborem. Quod ſi

etiam, ut prodidit Heſiodus, mella apèſque

ferat, etiam magis illud confirmabitur. Naſci-

tur verò hic melleus liquor ex aëre deſcendens,

[ſerè deſerunt]: poſſit & dicere de celo cum Plinio

& Gaza.] & huic maxime incumbit. Quin & ex

cræſſa Quercu nitrum fieri aiunt: Hæc igitur

ſerè deſerunt propria ſunt: Dixerat autem iam

paulò inter cætera quoque in Quercu naſci, ſicut &

in aliis arboribus.

Cæterum eadem ſerè & Plin. ſed paulò aliter

addens quoque alia: Robur præter fructum;

plurima & alia gignit. Namque fert & gallæ u-

trumque genus [album & nigrum Theophr.] &

quædam veluti Mora, ni diſtarent aida duritie,

plerumque tauri caput imitantia, quibus fructus

ineſt nucleis Olivæ ſimilis. Naſcuntur in eo &

Pillulæ, Nucibus non abſimiles, intus habentes

floccos molles, lucernarum luminibus aptos.

Nam & ſine Oleo ſagrant, [Nam tamen in O-

leo, & Dal.] ſicut galla nigra. Fert & aliam

inutilem pillulam cum capillo, verno tamen tem-

pore melligeni ſucci, Gignunt & alia ramorum e-

Materies

Cortex

Melandriū

Fier.

Quam

ſerè

ſerè

ſerè

ſerè

ſerè

ſerè

ſerè

ſerè

ſerè

ſerè

ſerè

ſerè

ſerè

ſerè

ſerè

ſerè

ſerè

ſerè

ſerè

ſerè

ſerè

ſerè

ſerè

ſerè

ſerè

ſerè

ſerè

ſerè

ſerè

ſerè

ſerè

ſerè

ſerè

ſerè

ſerè

ſerè

ſerè

ſerè

ſerè

ſerè

ſerè

ſerè

ſerè

ſerè

ſerè

ſerè

ſerè

ſerè

ſerè

ſerè

ſerè

ſerè

ſerè

ſerè

ſerè

ſerè

ſerè

ſerè

ſerè

ſerè

ſerè

ſerè

ſerè

ſerè

ſerè

ſerè

ſerè

ſerè

ſerè

ſerè

ſerè

ſerè

ſerè

ſerè

ius pilulas, corpore, non pediculo adherentes, candicantes umbilicis. Cetera nigra varietate dispersa. Media cocci colorem habent. Apertis amara inanis est. Aliquando & pumices gignit: nec non è foliis convolutas pilulas: & in folio rubente aquosos nucleos candicantes & translucidos, quoadiu molles sint in quibus & culices nascuntur: maturefcunt in modum galli. Ferunt Robora & Cachryn: ita vocatur pilula in medicina urendi vim habens. Gignitur & in Abiete, Larice, Picea, Tilia, Nuce, Platano, postquam folia cecidere, hyeme durans [Cachrys foliorum conceptu, è medio germinis globo prominens, tanquam parturiente folium natura, qui in folia post explicatur: Convoluta è foliis pilula tulus, in luglande & in Avellana racematim compactus callus. floris vicarius: Cytarus in Coniferis gradatim, (quamvis nunc; nucamentum, rudimentum fructus, Bryo in Quercu, racemosi villi qui loco floris sunt. Hæc diligenter distinguenda & ex pro Libanotis semine quidam scribunt. Roboris verò & arborum citatarum Cachryn ineptè confundit Plin. cum Rosmarini pilula acris & urente, quæ etiam Cachrys dicitur, ut & medulla seminis Crethmi. Hæc Dalech.] Continet nucleum Pincis similem. Is crescit hyeme, aperitur vero pilula tota. Cadit, cum folia exierint creicere. [Hic rursus dormitasse videtur Plin. Nam de Iulis Avellana- rum hoc Theoph. esse nucis Pinæ similes, crescere hyeme, aperiri verè totos, &c.] Tam multifera sunt, & tot res præter glandem pariunt Robora. Sed & Boletos Suiolique, gulæ novissima irritamenta, quæ circa radices gignuntur: Quercus probatissimos: Robur autem & Cupressus & Pinus nomos. Robora ferunt & Viscum, & mella, ut autor est Hesiodus. Constatque ro- res mellens è celo cadentes, non aliis magis in- fidere frondibus. Cremati quoque Roboris ci- terem nitrosum esse certum est. Omnes tamen has eius dotes, Illex, solo provocat Cocco. Gal- liarum glandifera maxime arbores Agaricum fe- runt. [Immo potius in Laricibus nascitur, sub- quibus de eo trademus in libro Resiniferarum & Coniferarum.] E glandiferis sola quæ vocatur Pani. Aegi- Aegylops, fert Panos arentes, muscoso villo ca- nos, non in cortice modò, verum & è ramis de- pendentibus, [è cortice nascentes, non è furculo- rum cacumine, unde glans: nec è gemma, sed è latere superiorum nodorum. Theoph.] cubitali magnitudine, odoratos, ut diximus inter un- guenta. Suberi minima arbor [non minima. Dal.] glans pessima, rara, cortex tantum in fructu præ- crassus ac renascens, atque etiam in denos pedes undique explanatus est.

Hactenus Plin. de iis quæ Quercui seu Robori innascentur. Addamus & reliqua quæ ad eorum doctrinam generalem pertinere videbuntur. Omnes arbores, ut creditur, inquit Theoph. corti- ce detractis intereunt, sed aliquæ plus temporis perdurant, ut *Spur.* Idæi *Spur.* radices non tam profundè descendere volunt, ac Abietis, sed mul- to plures habere, & latius diffundi. Quercus, autem Plin. & Olea tam pertinaci odio dis- sent, ut altera in alterius scrobe depacta moriantur. Quercus verò & iuxta nucem luglandem. Robo- ri radices copiosæ, carnosæ, quas in profundum a- git. Si Virgilio credimus, Esculus, quantum corpore eminet, tantum radice descendit. Maxi- ma spatio atque plenitudine & Citri. [Cedri vet.] est. Ab ea Platani, Roboris & Glandiferarum. Fal- sum arbitror quod aliqui prodidère, radices arbo- rum vetustate minui, visa etenim est annosa

Quercus everla vi tempestatis; & iugerum soli amplexa. Robori materies ossæ, cariem vetusta- temque tardissimè sentit. Diuturnior materies Roboris defossi, & in aquis Quercus obrutz. Ea- dem supra terram rimosa, facit opera, torquendo sese. Robur marina aqua corrumpitur. Fagus & Cerrus defossæ celeriter marcescunt. Esculus quo- que humoris impatiens. Incurvatur & Robur, ceditque pondere. Idem insociabile glutino & secum & cum aliis. Securibus pertinacius resistit tam aridum quàm viride, ferrarumque dentes re- plet, sicut & Buxus, æqualitate inertis: qua de cau- sa alterna inclinatione egerunt scobem. Ex reli- quis siccissima Lotos, quæ Romæ ita appellatur, deinde Robur exalburnatū & huic nigricans col- lor, [Roboris exalburnati nigram medullam an- tea diximus ex Theoph. *μυαδρυν* vocat.] magis- que etiam Cytiso. De cætero plerisque eorum, sed utique Robori tanta duritia est, ut terebrari nisi madefactum non queat, donec sic quidem a- dauctus avelli clavus. Suberis materies mollis, in a- qua non fluitat si dematur cortex.

Sed, quod maxime honorificum sit Quercui, Plinius ipsam etiam Italiam, Provinciarum totius Mandi sine æmula nobilissimam & pulcherri- nam, & ut ille ait, omnium terrarum alumnæ, eandem & parentem, numine Deum electam, quæ cælum ipsum clarins faceret, sparsa congre- garet imperia, ritusque molliret, & tot populo- rum discordes feræque linguas, sermonis com- mercio contraheret ad colloquia, & humanitatem homini daret; breviterque una cunctarum gen- tium in toto orbe patria fieret &c. hanc inquam folio maxime Querno assimilare voluit, multò proceritate ampliorem, quàm latitudine. Sed idè & stillicidia Quercus ponderosissima dicit. An quia pondus ab ipsa Quercu acquirunt? & an à foliis, vel à ligno? Ab hoc possint aliquid: ab istis, vix putamus. Sed ita putamus: cum Quercus so- lia sint sinuosa, & interdum veluti carinata, idè plus aquæ sustinere: inde guttas, maiores, idè- que graviores. Quod si cui lubet aliam excogita- re rationem, possit.

Sed nunc paucis quid & Diosc. de Quercu, *μει- Δρυν*, in genere habeat, videamus. Is unica *Spur.* voce Diosc. (ne quis fortè eum existimet prædi- ctas species non novisse, ad vites potius quàm hi- storias respiciens.) & nostro & aliorum doctissi- morum iudicio, comprehendisse in unum o- mnes glandiferas arbores, non solum quod sci- ret, una voce omnia illa genera contineri posse, sed etiam, ut brevitati consideret. Idè dixit: *μει- Δρυν* *στύμμιον* *χρηδρυν*, &c. Similiterque tuni- ca quæ circum glandem est calyci subiecta. Sed illicinas glandes, Quernis. [Hic *Spur.* dicit, non *μει- Δρυν*: diversarum specierum intelligens.] At- tamen gallam idem non *μει- Δρυν*, sed *Spur.* fru- ctum dicit, nihilominus sub hac voce diversas spe- cies comprehendens, Mirum verò ab eo potius fructum dici Quercus, quod tamen de glandibus adèd expresse non dixerat. Nempe si non verè fructus est Galla, habet tamen fructus speciem, quamvis revera excrementum sit, ut & reliqua superscripta, quæ nullus flos præcodit, sicut fru- ctum præcedere solet, in iis quæ florent. Sed no- tandum quod idem Dioscorides ait Chamædryn folia habere parva forma & divisura similia Dryi: quod & Plin. dixit: Item Betoniam inquit Diosc. folia ferre longa, similia Dryi, in circuitu dissecta: denique Sydenidis primæ folia esse longiuscula ad formam *Spur.* Sed longè diligentiori obser- vatione dignum, quando idem cap. de Cocco ait,

M. M. M.

M. M. M.

Robur qui- modo tere- brandum. Suber.

Italia lant.

Assimila- tur folio Quercui. Car stillicidia Quercus ponderosissima.

Diosc. ad Spur. perno- quam bo- flora plantarum respiciunt.

Балашов
Норск.

Glandaria
hls Ca-
1907.

SOCIÉTÉ
DES QUATRE
DÉPARTS.

**Sacramental
Application.**

Carota
Quercus
Quercus
706: Jacea
706: figm
Hemeroc:

26th Apr.
1944

**Critica
Quercus.**

Critic
toma mil
tara fur-
taria in-
gus.

Alga
Alga
Alga
Alga

Civica autem dicitur quercus, quoniam antiquitus querna corona donabatur ei, qui civem servasset, de qua neminem melius differentem audias quàm ipsum Plinium: Glandiferi maximè generis homines apud Romanos perpetui. Hanc civicæ coronæ, militum virtutis insignie classimum iam pridem verò & clementiæ Imperatorum, postquàm civilium bellorum profano [profanatio M. profanatione. Vet.] meritum cœpit videri civem non occidere. Cedunt his Murales Vallaræque autem, [ita enim legimus ex Gellio,] quanquam pretio antecedentes. Cedunt & Rostre, quamvis in duobus maximè ad hoc avibus celebres: M. Varrone è piraticis bellis, dante Magno Pompeio: itémque M. Agrippa, tribuente Cæsare è Siculis, quæ & ipsa pirauca fuere. Civica ligna primò fuit, postea magis placuit ex Esculo, Iovi sacra. Variatùmque & cum quercu est, ac data ubique, quæ fuerat, custodito tantùm honore glandis. Additæ leges arctæ, & ideo [coronæ] superba, quæque conferre libeat cum illa Græco

Tom. L.

*Summa
maximaeque
privilegia
Querna co-
pula radi-
morum.
Qui tam
acceperint.*

ἤλπε διαποτε, ἡ τῆς ἡσ, ἡ
 Τῆς ἐνδύσεως ἐν τῇ φῶγι,
 τὸ δὲ ἐν τῇ πελὸν ἀεὶ εἰς
 ἡ γὰρ τῶν ἡσ, ἡ τῇ τῇ
 ἀποφασισμὸν δυνάμι, ἡ τῇ
 ἀποφασισμὸν δυνάμι.

Hic corpus tremulum complectens undique Quercus
Candida purpureis ramis induxerat ora.

Purpureis, *mis à l'ant.* Scalig. P. Decius Mus, tribuus militum in bello Samnitico ea donatus, testibus Corn. Nepote ac Plin. secundo de viris illustrib. M. Antonino Philosopho, & L. Aurelio Vero quoque fratribus oblata. Aurelianus Princeps his ea donatus. Probus in bello Sarmatico semel, & Valerianus. Cæsar autore Suetonio, à T. Thermo, in expugnatione Mitylenarum illa donatus. Coriolanus, ut narrat Plutarch. à Dictatore Civica donatus, propter civem in prælio, quod Latini post exactum Tarquinium cum Romanis fecere, servatum. Scipio Africanus, consulem patrem apud Ticinum amnem, adversis auspiciis cum Hannibale præliantem saucium, intercessu suo, servavit. Quamobrem duabus coronis donatus, scilicet ut duplici corona conspicuus foret, quod & patrem & consulem servasset. Lege Val. Max. Rufus Helvius, miles gregarius, ob servatum civem in bello, quod Tacfarina in Africa, contra Romanos gessit, à Cæsare Civica donatus. Ciceroni, propter servatam contra L. Catilinæ, & cæterorum coniurationem urbem, L. Gellius, vir præclarissimus à Repub. dandam Civicam coronam arbitratus, ut ille de seipso testatur. Habes exempla eorum: qui Querna, hoc est Civica corona redimiti fuere, ob servatum civem. Sed quid vetustis exemplis in hæremus? Hoc nostro seculo cum dirus ille Mars, & fatalis Orci filia feritas, in totam Galliam ac civem Genevensensem grassata, loc.

Id. Quercet. Medici. Quercetani Medici excellētis & Regij, ac opumē de patria & concivibus suis meriti, ob editum a se Sclopetarium, hoc est, librum de curandis vulneribus, quæ Sclopetorum & similium tormentorum ictibus acciderunt: Fr. Hotomanus, æternæ famæ Iurisc. Gallicus ille Cato, & Acad. Basil. lumen præclarum, eidem Quercetano nomine, felicis nomine, Coronam Quernam, OB DIVEIS SERVATOS, publico illo opere extare dicarēque voluit, hoc adiuncto argumento:

Ob conservatos insigni hoc munere civem

Quercetane tibi Querna corona datur.

*Consuetudo
de Servat.
Atheniensium.*

Fuit & consuetudo vetus scitu dignissima. Mos erat Atheniensibus, ut puer quispiam in nuptus indueretur undique spincis frondibus, & Quercus glandibus opertus coronatusque Cunas panibus impletas gestaret.

*Quercus
civilis.*

Virg. quoque Quercum civilem dixit: Aeneid. 7.

At qui umbra gerunt civili tempora Quercu.

Lalium Querna corona redimitum celebrat Lucanus.

Lalium emeriti gerens insignia doni.

Servati civis referentem premia Quercum.

Audi Valerium Max. Ceterum ad Quercum prona manus porrigantur, ubi ob cives servatos corona danda est. Argumenti sanè proportio hæc eximio Medico indies suos cives arte sua servanti, & ab orco revocanti competere, atque adeo verè tali conserti debere, iubet. Nec absolum fuerit dixisse, inter civicam & obsidionalem coronas hoc interesse, quod hæc singularis salutis sit, illa diversorum civium servatorum publicum quoddam præmium. Sed de hac re satis.

*Obsidionalis
differt
a civica.*

*Prienensis
Quercus.*

Iuxta Priensem Ioniz urbem Quercus fuit, apud quam Samij & Prienses bellum gerentes, mutuis se damnis afflixere, magnæque prælio inter eos commisso, Samios nulle Prienses occiderunt. At septimo post anno ibi cum Milesijs congressi, optimos quosque urbis cives ac primores uno prælio amiserunt, ut post eam calamitatem mos Priensibus mulieribus fuerit, ut cum de maximis rebus ageretur, cum miserabili precatatione iureiurando testarentur: Apud Quercum funebrem: quod eo in loco & patres & viros ac filios, amisissent. Hæc Plutarch. in Probl. Abalon Davidi patri rebellis & insidians (ut sacra nos docent paginæ, cum mulo insidens aufugeret, & sub Quercu densa pertranfret, obvoluit ramis illius crinibus, pependit, & à Ioabo tribus lanceis transfixus. Extat & Adagium, *in spei dñi exoritur*, id est, per tenebras quæ apud Quercum: De ingenti & fatali calamitate dicitur. Sed satis digressum.

*Quercus
funebris.*

*Abalon in
Quercu
pendens
transfixus.
Adag.*

Restaret ut ipsas Quercuum differentias proponeremus, ni diversorum autorum recentiorum diversæ sententiæ nos remorarentur, in assignandis suis, & reducendis explicandisque priscorum *theophrasti* differentijs, quos consuluisse & audivisse interest rei herbariæ studiosis antiquam singulas nobis observatas promamus. In ea verò re multum se torserunt.

*Recentiorum
sententia de
Quercus
differentijs.
Robur ge-
nera Hermol.*

Hermol. Robotis genera quaternæ tantum fecit, Quercum, Robur, Esculum, Cerrum, quæ eiusdem iudicio Græcis illis respondent, Hemeridi, Aegilopi, Haliphloe, Platyphyllo. Vt sit Quercus, Hemeris: Platyphyllos, Esculus: Aegilops, Cerrus. Sed nunquid Haliphloeos Robur significet, sibi incompertum ait Theophrast. certè [addit idem] Agnam *spici* appellat, quam nostri Robur interpretantur. quidam ut Diosc. quatuor supradictas duas addidit spe-

cies, Fagum & Illicem. Sed toto genere distant, ut cognatæ potius quàm congeneres habendæ sint, Verum non idè malè locutus Diosc. ad vires, potius respiciens, quas easdem cum cæteris habent. Hemeris sanè Homero non Quercum sed vitem significat, ut Photion testatum esse voluit.

*Fagum
Illicem
non sunt de
genere
Quercus
Hemeris.*

Sunt, inquit Ruell. qui Hemeris esse Quercum existiment, quam Mylion interpretantur: quibus facillè accedo fretus Theoph. testimonio, qui scriptum reliquit, eam quæ glandem ferat dulcissimam, quibusdam Quercum, aliis Hemerida, id est, placidam vocari. Ceterum utrique eadem ascribitur natura, præterquam à Plinio, qui parum diligenter glandiferarum arborum discrimina observasse à nonnullis accusatur. Hanc inter Quercum & Hemeridam invenit differentiam, ut in his arboribus, quæ maximam ferat glandem Hemeris vocetur brevior & in orbem comata, 2. lisque ramorum crebris cavata: fortius *Mylion* Quercus habeat & incorruptius, ramosa & ipsa: procerior tamen & crassior caudice. Theoph. certè *Mylion* appellat, quam nostri Robur interpretantur. Robur tamen, quæ Theophr. *Mylion* dicitur, licet pro communi glandiferarum genere usurpent, ea tamen Plin. esse videtur Quercus, quæ Gallicum nunc vulgus *Chestnam* vocat, ea passim in sylvis spectatur, folio latebrarum anfractibus sinuosissimo, glande exigua, materie durissima: Nam & hæc sola præter fructum Gallam utriusque generis & fungos, & plurima alia gignit. [Gallas singula ferre genera dixit Theoph.] Ceterum sunt qui Haliphloeï nomine Robur putent comprehendere, quod compertum non habeo, nec parva fuit difficultas prodere, quibus Græcis latina congruerent. Hæc Ruell.

*Quercus
Mylion.*

Plin. m.

Hemeris.

*Robur
Mylion.*

Chestna.

Haliphloe.

*Drys, d.
mar.*

Erymodrys.

*Quercus
communis.*

*Fagus
glandifera.*

*Anguil.
glandifera.*

*In Italia
omnes spe-
cies Theo-
ph. notat
esse.*

Quercus.

*Bis glandi-
feræ edulis.*

Aegilops.

Aspin.

Cerrus.

Vallania.

*Platyphyl-
lus.*

Esculus.

Larfolia.

Fagus.

*Hab.
phloeos.*

*Salsicortem
Radicortem.*

*Genera co-
gnata.*

Primus illex.

Drys, iudicio Amati, Quercus est, suaves & dulces glandes ferens, quam nonnulli Erymodryn appellant. Nam communis Quercus insulas & subibus grætas glandes producit, cuius Diosc. tanquam species, Fagum & Illicem numerat, quod intelligendum de viribus: secus autem figura, quum multum inter se differant. Nam Fagus arbore est, quæ licet fructum glandi figura & forma similem non habeat, glandiferis tamen arboribus annumeratur.

In Italia, si Anguil. credimus, omnes species arborum glandiferarum, quas recenset Theoph. sunt benè notæ. Nam, ut ille tradit, Prima species, quæ montanis dicitur Hemeris, Macedonibus Erymodrys, quam Gaza nunc Placidam nunc Veriquercum vocat: Itali vocant Querciam: In Abruzzo Gbianda Castagnola. Proferit hæc glandem magnam, crassam & longam, achæ glandes in quibusdam locis Hispaniæ comeduntur coctæ in igne instar castanearum. Secunda à Montanis dicitur Aegilops: Macedones vocant Aspin, Gaza vertit Cerrum, Itali adhuc vocant Cero, cupula autem in qua continetur glans vocatur Vallania. Tertia species quæ vocatur à Montanis *πλατύφυλλος*, eodem nomine à Macedonibus vocatur, Gaza vertit, nunc Esculum, nunc Latifoliam. Itali vocant Fargno, Fargni & Ischio. Quarta eodem nomine à Montanis & Macedonibus dicitur *φύλλος*. Gaza vocat Fagum. Itali, Faggi. Quinta species incognita erat Macedonibus: non autem Montanis, qui Haliphloeon vocarunt: Gaza vertit Salsicortem nec non Radicortem. Itali Rovere. Aliæ sunt quoque species figura inter se similes, sola magnitudine differentes. Prima Græcis dicitur *αἰξάνη*. Gazz Illex: Italus *Lozini* & Elicij. Secunda *αἰξάνη*, Gazz Suher. Tertia *αἰξάνη*, Gazz.

*phid. sup.
ber. Agria
Aquil. 3
Autum
induct. de
Fago an
ist. Theoph.
Dry. Gal.
er. Oling.
Oxya
Theoph. Fa-
gat. Plin.
Quercus
folio sinu-
ato. 1
11.*

Gaz Aquifolium. Hæ sunt species arborum glandescentes, in Italia cognita. Hæc Anguil. Qui cum Matth. & Amato existimat præ Theoph. & Dioscorandem esse cum Fago Plin. quod sanè consideratione dignum. Fagus enim Theoph. Diosc. & Gal. eadem videtur, & diversa Plinij Fago, quæ Oxya Theoph. Quæ vero Diosc. tradidit, intra referemus, capite Nix, inter vires, licet & quædam Plinij, de Fago habes cap. de Oxya sive Fago vulgari & Latinorum.

*Cerrus.
Farnia.
Folio mod.
sinuato.*

Cæsalp. aliter tradit Glandiferarum differentias, quàm Anguillara, dum scribit: Species quas novimus, folio sinuato, & deciduo tres notæ sunt, quàm una Quercus vocatur, frequens in collibus, caudis intorto, ramis in multam latitudinem sparsis, folio non valde sinuato, glande medioeri, licet quædam maiorem, quædam minorem ferat glandem, optimam ad ligandos fures, folium simile, sed latius illa angustum fert. Altera erecto, siliice in ingrem altitudinem folio maximè sinuato, glande in Echynato calyce insuavi, quæ Cerrus appellatur. Tertia erecto similiter caudice non adeo excelsa: folio latiore, modicè sinuato, glande maximà rotundiori: appellant in Etruria Farniam, trementibus fabricandis expetitam, materia enim flexilis & enodis: eadem in maritimis reperitur, sed operibus inutilis. Quæ autem folio constant non sinuato, dissimilia secundum ætatem filia ferunt, nam initio obrotunda sunt, modicè sinuata in angulos acutos, adulti autem pro oblonga redduntur & angustiora, quàm Oleæ similitudine, sed ampliora inferius candicantibus, quibdem ferunt tenuè in acutum deinentem, nucleum, perpetuè virent: Huius generis quinq; novimus species, scilicet Suberem, Saderellam, Illicem duplicem & Grænum undecim.

At Theophrastus. quæ folio constat deciduo, communi nomine dicitur, id est, Robur, sive Quercum vocat, cuius modè quatuor, modè quinque facit species, quarum prima Hemeris, sive Placida vocatur, quæ nostra Quercus, tenuiori glande & folio. Secunda Cerrus. Tertia Latifolia, cuius notæ in nostra Quercu latifolia reperiuntur. Quarto loco Fagum ponit, non quam nos ex Plinio Fagum vocamus, cuius verba conveniunt Farniæ in montibus altissimis ad naves quæritur. Quinto loco Haliphios, seu Saleicortex additur, quæ etiam Reducortex cognominata est: hanc putaverim apud nos illud genus Farniæ esse, quod in maritimis provent. Theophrasto teste, Macedones Roboris quædam genera faciunt, aliis nominibus, scilicet Erynodrym, seu Veriquercum, quæ glandem dulcem producit, hæc cum Placida eadem videtur esse. Secundo loco Esculum quæ glandem amarantem, Latifoliam videntem, intelligit. Tertio Fagum, quæ rotundam siliicem glandem, quæ Farnia est. Quarto Cerrum.

Apud Plinium Robur, Quercus, Hemeris, aut eandem Roborem significant, aut parum differentes: Agilops & Cerrus similiter conveniunt, sic Latifolia, & Esculus, Haliphios autem apud eundem cum Cerru Arcadum eadem putatur.

Lugdunenses Coloni, hoc pacto inter se contendunt, ut du Choul narrat. Quæ plene in loco aut convallibus Quercus creverit, illis rusticis Chesna vocatur. Si vero in altis montibus radices egit, qui iuga habitant agricolæ, Royle aut Roure, quasi Robur nominant. Royle folio Quercus est minore, & duriore materia. In Gallia Quercus, quam plebs Charme vocat, sine glande æquæ vivit, lignumque maximè expetitur, propterea quod

ceteris præferatur.

Fallatur nostro iudicio du Choul reponens arborem, Charme Gallis dictam, in numero quercus, omnino enim ab ea differt: de ea autem trademus sub Fago silium dicta. At præterea, Ornum & Roboris speciem, quæ sterilis sit, aliqui crediderunt: Et postea: Glandiferarum arborum penè incertus numerus, efficit ut omnes enumerari non possint. Hullos arbor est glandifera. Babalaustum Quercem glandem Avicenna dixit.

Pausanias in Arcadum sylvis diversas esse quercus tradidit, quarum alias *antiquior* vel *Latifolia* alias *oxya*, Fagos appellat. Tertium autem genus arborum esse, & utq; ad levem corticem præbere ait, ut in mari anchoris signa ex eo faciant. Huius quercus corticem Hermesianæ Poëta, *Charis* nominavit, & Suberem.

Vitruvius L. 7. de Farno meminuit, quod inter quercus genera ponitur, & nunc quoque Itali Fernum quercus genus vocant, teste Curcio. Est præterea Enzina Quercus in Hispania, genus minus, & non adeo rectum, cuius glandes ob suavitatem edantur. Hodie vulgus *Vellera* appellat. Repertæ in Olympo hæc nostra ætate, admodum humiles quercus, folio tenui, glande exigua: quæ veteribus fuisse incognitas serunt.

Nos ad Rhodani ripas [inquit du Choul] saxis hærentes quercus offendimus, contorto caudice, fruticis magnitudine, & natura steriles. Non desunt qui penitus contendunt in quercubus marem & feminam esse: discrimen sic faciunt, ut mas ad ultimam usque senectutem opacis locis folio non spoliatur, semina hyemis initio decidat. Galli Andegaveses quercus inserunt perpetua coma virentes, quod equidem sibi persuadere priusquam vidisset potuisse negat idem.

In Apennino & Andum agro [vulgò Angiers] Quercus perpetuè virens ex genere Latifoliarum notante Rob. Constantino. Antea diximus ex Theoph. Varrone & Plinio Sybariticam agri Thurini idem semper virentem.

In Græcia hodie hæc Quercuum genera faciunt, autore du Choul, Melanotymeni, Theilalia Drys Lesquymeri. Reperta hæc ætate, inquit idem, in nemore Trôsiæ propè Bituriges tanta proceritate atq; crassitudine quercus, ut referre quanta sit nemo in animum inducat. Iussu enim mandatorum Francisci Regis invictissimi ac doctissimi, aggere voluti facti, pedamentis quibusdam circummunita est, ut cum venaretur tantus Gallorum princeps propter admirationem & inauditam pulchritudinem (æpe sub hac posset oblectari).

Hæc fortè non minor, sed ob naturam in ea obsequentem arti mirabilior, quæ etiamnum hodie in spectatissimo illo Basiliensium viridario ac Sylva à D. Petro cognominata videtur, à Cardano Galis celebrata. Vulgatæ Quercus, quæ paucis post describemus species est, crassitudine, quantum vix tres homines comprehendant, trunco homine brevior, sed vastissimis ramis, senis aut septenis, quorum quilibet Quercus quales vulgò videntur facile crassitudine æquet, ita in orbem expandis brachiata, & triplici pedamentorum ordine in imensum propemodum ambitum suffulta, ut iam ante multos annos centum passus circumscripti non sufficerent. Sed crebrioribus ramis divaricatis prædicta brachia, & sensim elata patuli opacitate sua, & conniventibus circa media brachiis pateram pereleganter celerat, quæ de causa ob raram & insolentem huius pulchritudinem, & quod præterea fons perenni

Ornum

Hullos.
BabalaustumPausania
difficentia

1

2

3

Latifolia

Fagi

Curcio loq

Suber

Farnia

Enzina

Vellera

Quercus

humilis

Olympi

Quercus

sterilis

sensu

M. M.

Femina

Quercus

perpetua

folia

Græcia hodie

Quercus

causa

1

2

3

Melanotymeni

Theilalia

Drys Les-

quymeri.

Quercus

crassitudine

Gallis

Quercus

Basiliensis

amplissima



bus: observantur quoque glandium rudimenta, inquam globuli minimi purpurantes & hirsuti (qui mihi flosculus) privatis pediculis insidentia. Glandes in Calycibus suis seu cupulis sessiles, vel surculo proximè adhaerent: & longis tenuibusque pediculis appenduntur. Atque etsi magnitudine variant, unciam tamen communiter longæ sunt, corticosa membrana tectæ punicæ, nucleo calloso, acerbo & austero, quemadmodum & cupula exterius asperiuscula, interius levis prædicto cortice multo densior, vix tertiam glandis partem capiens.

Dryi unde dicitur. Quercus descriptio Loh.
Quercus vulgaris tres varietates à fructu potissimum postea trademus: hic id notandum nobis videtur, sæpius vilas Quercus maximas totas cavas corrupto ligno ac etiam interdum adusto penè toto ab opilionibus, ut homines in eis occultari potuerint, & nihilominus pluribus annis viventes & fructiferas durare. Vox *spus* inquit Lob. & Pena, à *spus*, erumpo, pullulo, qua designantur potiss. glandiferum genus & præsertim Quercum, cuius frequentiss. occursum, ipsaque celsior & ramosior arboris species frondis grandioribus anfractibus sinuata quavis notatione notiozem faciunt, tum frigidis, tum calidis plagis. Eam merito quis putet apud Theophrast. dictam *Salsicorticem* *salicem* quam hodie *Robur* vel *Roure* vulgus nostras vocitat, ut quæ sit perquam solido trunco, multam cineris utendo relincente. Qualem etiam è vulgari trunco nos parandum curavimus, aiunt Lob. & Pena, qui addunt: Quæ gallas dat quercus, duplex videtur. Earum vulgarissima nemorum & saltuum Pedemotium, Delphinatus, altatumque regionum temperatiorum est alumne, minore stipite, brachiis & fronde. Huius quædam varietas aut differentia videtur Fagus Theophrasto dicta, vocis argumento Latinis Esculus, cuius esculentà glans, & post quernam dulcissima celebrabatur, famemque explebat primis mortalibus: hodie *Fargus* & *Fargus* Italicè. *Hargus* Gallicè: Lignum istius firmiter proditur, quàm urbanæ quercus. Item in obl. quercus perpetua fronde vitens, Gallis *Chesnes verds*. Huius Quercetis in Gallofrancia oriri audio. Glandes nostratibus similes sunt, quales ferendas misit eruditiss. D. N. Rache apud Lutetianos Medicus. Nos verò quiddam concernit, cur totam quercus Lob. historiam hic proponamus, factum id à nobis, quod non in omnibus reque perfecta sit. Quercus etiam à nobis descripta, *Quercus Virgilij* est. Et fortè reliquorum quoque Poetarum, *Isti sacra*, *Chæonia*, *Fasidica*, *Dæmonia*, *Dædonia*, *Citruca*, *Marthonia*, *Alcicoma*, *Patula*, *Rigida*, *Dura*, *Grandifera*, *Grata*, *subus*, etc.

Platiphyllos Lob Robur.
Quercus gallica duplex, Lob.

Esculus Lob.
Quercus perpetua fronde vitens.

Quercus Virgilij.
Mante Hebr.

Calla Sc.
Quercus Mantre est apud Hebræos: nos in vulgata interpretatione Vallem Mantre habemus: & Gencl. c. 12. ubi Græca vulgata editio *scilicet* habet, Latinus interpret Vallem vertit. D. Hieronymus inter Quercum & Terebinthum pulchrum discrimen agnovisse videtur. *Gen. 1. cap. 17.* Latinus habet Terebinthum Græcus *scilicet*. Item *1. & Gen. 33.* Est Serap. Codex emendatissimus ubi *Calla* Latinis *hæc* scribitur: eum errorem in sua commentaria transulit. *Elon* citra controversiam quercus fuerit, Et quercus Osee cap. 4. Quercus etiam à Iosue filio Nun, *Ela* dicta. Sunt tamen quæ hæc vocabula generales arborum omnium apud Hebræos appellationes esse contendant, quæ sanè rerum magna est confusio in unica vo-

ce. Extat & Cicero's poemata de Arpinatum quercu. Quercus de qua Pompeius.

Hæc eadem à nobis descripta putatur, esse Platiphyllos Idæorum & Macedonum, & Latifolia Plin. Periti quidam Herbarij hanc marem esse aiunt, sceminam verò genus alterum in saxosis, glande pusilla. Robur quoque quæ Theophrast. Agria Drys dicitur, ea Plinio esse videtur quam Gallicum vulgus, *Chesne*, vocat, inquit Ruell. non sine errore, si hæc Chesne quercus sit.

Dalechampio, quercus genus 2. est Hemeris Idæorum, Macedonum *Erymidrys*, Latino-robur: Kalorum *Rovere*. Placidam interpretatur Gaza, audaciùs more suo. Plin. Græco nomine utitur. Idem Dalech. multa habet curiosius observata in sua quercus historia, quam Hist. Lugd. retulit his verbis: quercus in specie arbor est omnium maximè procera, si Aegilopem excipias, recto caudice, cortice inferna parte rimoso scabroque, superiore levi, cui subest Alburnum, quod cum animalis pingui comparari potest, plurimis in orbem brachiata ramis, magnam innoxiamque umbram loco inducentibus: folio grandi, Cerri & Haliphloei folio latiore, carnoso, laterum anfractibus sinuosissimo in arbore vetusta, minùs in ea quæ cæsa novam frondem mittit, sed tum maximè lato & spisso, summa parte obtuso, cum cadit nigrescente potius quàm flavescente: glande mediocri, subus grata, od camque causam iis saginandis apta, cum à Phagi & Hemeridis glande discesseris, dulci, non omnino quidem, sed si cum Haliphloei & Aegilopis glande conferas. Minùs enim acerba & amara gustui est, Calyce nullis aculeis horrido, sed pustulata tantùm scabritia asperato. In summo ramorum cacumine serè Glans nascitur, brevior, extrema parte veluti depressa ac retusa, aculeo, qui in summo fastigio glandis eminet, brevior & minùs pungente: sæpè ternæ glandes simul coherent, aut binæ, raro unica prodit: pediculus eas sustinens crassus & brevis, inde nascitur ubi ramo folium adhaeret. In unius surculi capite plerumque videas hinc tres coniunctas glandes, illinc duas, ac in proximo unam solam, prout succus, earum alimentum, huc illuc sese magis spargit: radice longè latèque evagante. Hanc uti dictum, Platiphylon quidam marem esse aiunt: sceminam verò genus alterum, in saxosis & asperis locis serè nascens: mare humiliorè, cortice in tenellis surculis rubescente, non ut in illo albescente: folio minore: breviorè, angustiorè, antrosum magis acuminate, tunc densis lacinis sinuoso lateribus, ut sceminus crispum videatur, latius & nitidius vivente, glande pusilla & rigosa. Talem profectò gignunt apici lapidosique colles Allobrogum, aspectu nonnihil variam, ob loci squalidi, ariditatem.

Ceterum & in his Quercetis scemina quoque proveniunt, folio quàm maris breviorè, antrosum latiorè, & magis obtuso, inferius pallido, cortice ramorum nigriorè: glandibus minimis, in ramorum & surculorum vertice prodeuntibus, interdum tenentur quinis. sæpè ternis aut quaternis, rardè bignis, rarsimè singulis, quasi digito retusis, aculeo minuto, parum e calyce prodeuntibus, sed ei firmiter adnexis. Platiphylorum quoque generi adscribenda, quam supra memoravimus in Thurino agro, in Apennino &

Platiphyllos
Idæorum
Macedonum
Latifolia
Plin.

Agria
Drys.

Ruell.

Hemeris.

Erymidrys.

Robur.

Gaza & not.

Quercus

speciosa

descriptio.

Cortice.

Alburnum.

Quercus

umbrata.

Folium.

varietas.

Glandis

collata

calyx.

Glandis

varietas.

Aculeus.

Pediculus.

Radix.

Descriptio

scemina.

Folia.

Glandis.

Locus.

Femina.

varietas.

Folia.

Glandis.

Perpetua

scilicet Platiphyllos

Andium Gallie gentis agro nascentes, ut, quod Plinio narum sit, iam nos mirari definamus.

Lapides
duriss.

Plin red-
gaur.
Theoph.
explicat.
Hemerid-
descriptus.

Materia.
Glans.

Id verò admiratione longè dignus, quod scribit Plin. lib. xvi. cap. vi. probari Latifolia glandem, cuius in balano utrinque ex longitudine extrema lapidescit duritia: meliorem cui in cortice quàm cui in corpore, utrumque non nisi mari. Nam cum locum Theophrasti exprimere voluisse videatur, ab eius sensu alienissimus est. Neque enim id melioris glandis signum esse vult Theoph. neque id de Platyphyllo scribit, sed de Phago & Haliphleo. Hemeris arbor est non laxa, sed aspera rimosoque cortice: humilis, non excelsa: non recta, sed contorta: aliisque ramorum crebris cavata: materia firma duraque, sed minùs quàm Phagi, glande post Phagum dulcissima, sed longiore maioreque, imò omnium maxima, è suo calyce brevior ac depressiore facili decidua, tenui longoque pediculo affixa, modò unica, modò gemina dependente, quod illi ex omnibus Quercus generibus peculiare est.

Cesalp. 14.
nat.

Hæ sunt igitur huius Quercus, quam hic proponimus differentiarum vel varietates, quas ceteri Herbarij præter Dalech. non distinxerunt.

Quercus
brevis pedi-
culo.
Quercus
longo pedi-
culo.

Cæsalpinus quoque, qui tamen multum circa Quercum sudasse videtur, non manifestum discrimen posuit harum Quercuum. Periti viderint an Theoph. Hemeris sive Placida, (ut ille cum Gaza vertit) & Macedonum Etymodrys seu Veruquercus, ipsi cum Gaza dicta, Plinij item Robur, Quercus, Hemeris eidem dicta, sit nostra Quercus pediculo brevi. Idem viderint an eadem Cæsalp. Drys, Robur vel Quercus; Theoph. Latifolia Plinij & Italica, Macedonum Esculus, possit esse nostra Quercus cum longis pediculis.

Hemeris
Quercus
vulgaris
est.

Drys.

Robur.

Cerrus
Agropy.

Esculus
Platyphyl-
los.

Phagos.

Fagus Lat.

Alias & Cordus Quercus facit differentias: est enim hæc illi vulgaris illa ramosa in latitudinem diffusa glandifera arbor, caudice neque aded procero, neque recto, crasso tamen, quam Latini propriè *Quercum* vocant, Germani *Eiche*, Theodorus nunc *Placidam* nunc *Quercum* vertit. Ad specialiter vocata Robur est (liquidem Theodoro credendum) nisi enim ita Robur Græci appellerent, non teneat aliud nomen esset reperire, quo ea gens eam arborē indicaret. Caudice assurgit Robur recto, procero, paucisque ramis brachiato. Italis adhuc *Rouer* vocatur, Germanis *Steineiche*, à soliditate quasi lapideam Quercum dicas. Frequenissima est hæc in Hælsia arbor. *Agilops* Cerrus est, Roboris figuram referens, sed hæc etiam è tum rectior, tum procerior existit, ramisque non nisi in summitate habens, Germanis *Taneiche* vocatur, quoniam Abietis modo recto proceroque constat caudice. *Platyphyllos*, est quam *Esculum* Latini, & *Gastleiche* Germani appellant, Saxonum sylvæ in plano familiaris, huic latissima folia, unde & apud Græcos nomen. Hæ sunt Glandiferae arbores quæ hoc capite à Dioscoridis nominantur, & propriè vocatas glandes ferunt. A Fago Latinorum dissimillima est, [Phegus Græcorum] qui ei tribuunt glandem non aliterum modo oblongam, sed rotundam. Fagus verò Latinis dicta, glandem propriè non fert, sed in echinatis pericarpis castanearum more pingues & oleasas nuceas, easque triquetras & acuminatas: quæ figura è diametro tam rotunda pugnatur. Qui vero Phegum novit voluerit, montanas insere sylvas, in quibus provenit hæc arbor. Figura illi non dissimilis Quercui, sed stigosior & tristior. Glandes fert omnibus agrestibus notas, figurâ rotun-

das: quæ nota tanquam præcipua ab aliis glandiferis distinguitur. Porro non licuit hactenus recte quo nomine nostri agrestes hanc Phegum appellent. Glandes verò, adiecto aptudarium cognomento, à reliquis distinguunt. Hæc Cordus. Miramur diligentis. Botanici non observasse differentias, quæ à pediculis sunt, & fructibus, licet abundant in Germania; ut verum fateamur, eius differentiarum nobis minus perspectæ sunt: Hemeridem Cordi existimamus nostram Quercum cum longis pediculis. Robur etiam eius fortè est Quercus, cui glandes parvæ cum breviss. pediculis. *Agilops* eius, quæ sit hæc, quæ si ea, quàm altissimam observavimus, de qua pauld post, quam non separamus ab ea, quæ pediculis longis caret: notum tamen verum & genuinum antiquorum *Agilops* indicare: nec scimus an vera *Agilops* in Germania proveniat. *Platyphyllos* Cordi, quæ sit, ignoramus, vellemus eius glandes describas. Quercus sanè vulgaris mirè ludit foliis. Phegon, Cordus cur dicat, figurâ rotundâ, notâ tanquam præcipuâ, ab aliis distinguens, nos latet: quandoquidem Theoph. Phegon tribuit fructum dulcissimum, inter alias glandem, qualem vix puto reperiri in Germania. Considerandum igitur an intelligat Cordus, nostram Quercum longos non habentem pediculos, glande maiori.

Cordus
nat.

Hemeris
Cordi.

Robur.

Agilops
Platyphyl-
los.

Hemeris
Cordi
dryi
nat.

Anguil. Hemerida Theoph. & Etymodryn Macedonum apud eundem veram Quercum dicit, quam Quercum in Abruzzo vocant: *Chlanda* Cæsalp. *stagna* in quibusdam Hisp. locis, ubi eius glandes coctas comedunt castanearum instar. Videat lector an eam intelligat quæ est cum longis pediculis: Item an *Fargus* & *Fargi* & *Isbio* eiusdem, quam *Platyphylon* Theoph. dicit, & à Gaza nunc *Esculum*, nunc *Latifoliam* vertit, sit nostra cum brevibus pediculis: an verò hæc intelligat Lob. cum scribit uti dictum, Quercus quæ Gallas dat, differentia quedam videtur, Fagus Theoph. Latine *Esculus*, *Fargi* & *Fargus* Italicè. *Hargus* Gallicè.

Fagus
Theoph.
Esculus.

Tragus genus durum Quercus Latine Robur, germ. *Maichen* & *Eysbolts* dicitur, ubi Quercum cum longo pediculo pingit, cui nihil distinguat.

Ad eundem modum *Lonicerus* distinguere conatur Quercum *Eichbaum* ab eius specie *Maichen* / *Robore*, *haliphleos* Græcis dicta. Qui tamen, quamvis ponat duas icones, non demonstrat differentiam inter Quercum & Robur: utraq; enim icones representant Quercum, cui glandes cum longis pediculis.

Lonicer.

Rybo quoque in Diosc. Quercus, sive appellatur & Hemeris, id est, Placida nostra vulgaris quercus cum longis pediculis, quantum demonstrat eius icon.


Dioscor.

Dodon. in hist. cap. propriam habet iconem quæ eandem videtur demonstrare, quæ simpliciter *Quercus* & Quercum vocat: in hist. autem Latine forte vocat Quercum sylvestrem & Robur. Non observavit discrimen in nostris Quercubus à glandibus & pediculis petum, pro eo exhibet iconem sine glandibus à Lob. & nobis positam, pro Quercus excremento fungoso gradie Hemeris, quercum, Robore, sive Agrestis Quercu sæpè humiliorem, glande maxima & dulci: quercum palam per Europæ provinciam obviari esse, præsertim Robur: Hemeris non ita vulgarem. An verò ipse noverit discrimen, dubitamus.

At Clusius nup. quod peculiari nomine Robur appel-

rum desideratarum copia classe regia in Lusitania, & inde in alias nationes deferri poterit.

LYCIUM INDICVM ALPINO PVATIVM.



Lycium indicum.
Locus.
V. reg.
Descriptio

Spine.
Folia.
Flores.

Fructus.
Sapor.

Lycium indicum.
descriptio

Non esse
Lycium indicum.

Vires & v.
vis.


HACTENUS post tot nationum, tot autorum, etiamque nostram fatigentiam, nondum constat, quodnam verum & legitimum veterum sit Lycium, singulatum, quod ad illorum Lycij vires quodammodo accederet, pro eo obtulerunt, tandem prodit Alpinus, qui, ut ille quondam Philosophus, cum suo iove, iove, à se legitimum Lycium inventum ratus, in hac protulit verba:

Verum Lycium Indicum tibi prodam: quem fruticem longè ab Alexandria civitate supra ripas rami Nili Calig vocati, decem milia passuum invenit: quem incolæ I'æg appellant. Est is frutex multus ramis rectissimis, ab radicibus multis, duris, lignosis, oblique descendens, longitudine cubitorum & plus observatis, sursum affurgens ramis: spinæ acutissimæ & longæ multæque insunt, quarum quædam foliis vestite spectantur. Folia verò huiusce fruticis sunt Olivæ similia, vis tamen candidiora & angustiora vel minora lata. Flores Agihalid planè similes habet, quippe parvos albos, Hyacinthi orientalis forma & magnitudine æmulus, à quibus fructus nigri parvi producantur, Ebuli fructibus prorsus similes, læves, gustu amari & astringentes.

Quamquam verò in Ægypto multa Lycij copia circumferatur, tamen nescire se fateretur, an ex hoc illud frutice conficiant, quando neque hanc plantam copiosè ibi provenire noverit, neque sciat illam esse notam. Siquidem Lycium ab illis usitatum falsum ac adulteratum esse arbitrat. Huc autem succum, qui ex Arabia locis exportatur, durum esse, exterius nigrum, & Acacia succo valde similem. Fractum intus colorem Aloës præ se ferre, odore obscuro, non ingrato, sapore subdulci, astringente, nullius amaritudinis participare: viscosum esse, digitisque contractum adhærere, unde colligit, haud esse verum Lycium, præsertim cum neque amaritudinem habeat, neque igne succentum rubescentem edat spumam, ut de verò Lycio traditur. Quapropter quod ante Categoriè affirmarat, nunc dubitat, an sit Lycium Indicum Dioscoridis, quod tamen & in titulo fecerat. Sed nec experiri se potuisse tradit succum, qui pro Lycio circumfertur. Ægyptios inter calidum & frigidum medium constituisse, sed supra primum gradum siccum, stipitum: proinde, inquit, in omnibus ulceribus

lato utuntur, præsertimque ad oris, aurium, narium, ani, intestinorumque ulcera. Vitis maxime est in Collyriis ad Ophthalmias arceas: mulieres enim paratum linimentum ex Lycio & antimonio habent, quo quotidie oculos liniunt, ut oculos defendant ab humorum fluxionibus. Eo etiam illi ad ventris fluxum utuntur, non inhiusque ad Dysenteriam. Ad spurum sanguinis eo maxima spe utuntur, & ad uteri profluvium cohibendum, eo pessimo modo intromisso, ad ulcera pudendorum præsertim ad caures, ad gingivas corrolas & ulceratas, nec non ad dentium commotionem. In Lienteris, dysenteris atque fluxu hepatico & Clysteribus iniiciunt & in liquore aliquo convenienti solutum hauriunt. Nec dubium illius illiciti quamcumque partem ab influxu humorum efficaciter defendi, unile & podagricos dolores retardare compertum est.

AGIAHALID ÆGYPTIVM FOLIO BUXI: AN LYCIUM?



ET huius historia Alpino accepta ferenda. Arbore est, que in medio cuiusdam Eunuchi Turcæ viridario, quod parum ab ade Veneti Consulis distat ex Æthiopia asportata, magnitudine Pyri sylv. ramis ratis non multis, in rectum æqualiter elatis, ordinariis acutissimis multis spinis obsita, folia ferens Buxi proxima, latiora tamen, paucis, ra-

ra, angula, bina æqualibus interstitiis adnata. Flores habet paucos albos, Hyacinthi Orientalis floribus similes, sed minores, à quibus prodeunt fructus nigri Ebuli similes, gustu subamari & astringentes. Folia gustum acido sapore ferunt, cum aliqua astringente. Huius arboris foliorum usum ad pueros vermibus vexatos, in Æthiopia audit esse familiarissimum. Dubitat verò an hæc possit esse Lycium Diosc. Sed hæc ob stare videntur, quod Lycium Diosc. frutex potius sit quam arbor: præterea foliis dentis describitur, non ratis: nisi tamen ad unius folij densitatem referre voles, quod possis. Nihilominus tamen adhuc dubitabitur. Nec intelligat quis facile illa Alpini verba, quando folia dicit singula, bina æqualibus interstitiis adnata: nisi sortè error sit typographi, & legendum: bina singulis æqualibus interstitiis adnata, ut figura ostendit. Ita dubius abie nobiscum lector, nesciens adhuc, quodnam sit verum & legitimum Lycium veterum. Nos viam patefacimus inquirendi, conferendi, decernendi.

Certiora aliquando docebit posteritas.

HISTOR.



ins pilulas, corpore, non pediculo adherentes, candicantes, umbilicis. Cetera nigra varietate dispersa. Media cocci colorem habent. Apertis amara inaritas est. Aliquando & pumices gignit: nec non & foliis convolutas pilulas: & in folio rubente aquosus melleos candicantes & translucidos, quatuor molles sint in quibus & culices nascuntur: maturefcunt in modum gallæ. Ferunt Robora & Cachrys ita vocatur pilula in medicina utendi vim habens. Gignitur & in Abiete, Larice, Picea, Tilia, Nuce, Platano, postquam folia cecidere, hyeme durans [Cachrys foliorum conceptu, & medio germinis globo prominens, tanquam parturiente folium natura, qui in folio post explicatur: Convoluta in foliis pilula tulus, in luglande & in Avellana racematim compactus callus, floris vicarius. Cytarus in Coniferis gradatim, squamulosusq; nucamentum, rudimentum fructus, Bryon in quercu, racemosi villi qui loco floris sunt. Hæc diligenter distinguenda. Kæper pro Libanotis semine quidam scribunt. Roboris verd & arborum citatarum Cachryn ineptè confundit Plin. cum Rosmarini pilula acris & urente, quæ etiam Cachrys dicitur, ut & Medulla seminis Crethmi. Hæc Delech.] Continet nucleum Pineis similem. Is crescit hyeme, aperitur vero pilula tota. Cadit, cum folia experint crescere. [Hic rursus dormitasse videtur Plin. Nam de Iulis Avellanarum hoc Theoph. esse nudi Pineæ similes, crescere hyeme, apertæ verè totos, &c.] Tam multifera sunt, & totæ præter glandem patiunt Robora. Sed & Boletos Sulisq; gulæ novissima irritamenta, quæ circa radices gignuntur: Quercus probatissimas: Robur autem & Cupressus & Pinus noxios. Robora ferunt & Viscum, & mella, ut autor est Hesiodus. Constatque rores melleos de celo cadentes, non aliis magis insidere frondibus. Cremati quoque Roboris cinerem nitrosum esse certum est. Omnes tamen has eius dotes, Ilex, solo provocat Cocco. Galliarum glandiferæ maxime arbores Agaricum ferunt. [Immo potius in Luribus nascitur, sub quibus de eotrademus in libro Resiniferarum & Coniferarum.] E glandiferis sola quæ vocatur Pani. Aegylops. Fert Panos arentes, muscoso villo canos, non in cortice modò, verum & in ramis dependentes, [de cortice nascentes, non de surculorum cacumine, unde glans: nec de gemma, sed de latere superiorum nodorum. Theoph.] cubitali magnitudine, odoratos, ut diximus inter unguenta. Suberi minima arbor [non minima. Dal.] glans pessima, rara, cortex tantulum in fructu præcrassus ac renascens, atque etiam in denos pedes undique explanatus est.

Hactenus Plin. de his quæ Quercui seu Robori innascuntur. Addamus & reliqua quæ ad eorum doctrinam generalem pertinere videbuntur. Omnes arbores, ut creditur, inquit Theoph. cortice detractis intereunt, sed aliquæ plus temporis perdurant, ut &c. Idæi & Syriæ radices non tam profundè descendere volunt, ac Abietis, sed multo plures habere, & latius diffundi. Quercus, autore Plin. & Olee tam pertinaci odio disident, ut altera in alterius scrobe depactæ moriantur. Quercus verò & iuxta nucem Inglandem. Robori radices copiosæ, carnosæ, quas in profundum agit. Si Virgilio credimus, Esculus, quantum corpore eminet, tantum radice descendit. Maxima spatio atque plenitudine & Cui. [Cedri vet.] est. Ab ea Platani, Roboris & Glandiferarum. Falsum arbitror quod aliqui prodidère, radices arborum vetustate nunui, visa etenim est annosa

Quercus eversa vi tempestatis; & iugerum soli amplexa. Robori materies ossæ, cariem vetustatemque tardissimè sentit. Diuturnior materies Roboris defossi, & in aquis Quercus obruta. Eadem supra terram rimosa, facit opera, torquendo sese. Robur marina aqua corrumpitur. Fagus & Cerrus defossa celeriter marcescunt. Esculus quoque humoris inipatiens. Incurvatur & Robur, ceditque ponderi. Idem infociabile glutino & secum & cum aliis. Securibus pertinaciùs resistit tam aridum quàm viride, ferrarumque dentes replet, sicut & Buxus, æqualitate inertis: qua de causa alterna inclinatione egerunt scobem. Ex reliquis sicissima Lotos, quæ Romæ ita appellatur, deinde Robur exalburnatū & huic nigricans color, [Roboris exalburnati nigram medullam antea diximus ex Theoph. maxime & vocat.] magisque etiam Cytiso. De cetero plerisque eorum, sed utique Robori tanta duritia, ut terebrari nisi madefactum non queat, donec sic quidem adductus avelli clavus. Suberis materies mollis, in aqua non fluitat si dematur cortex.

Sed, quod maximè honorificum sit Quercui, Plinius ipsam etiam Italiam, Provinciarum totius Mundi sine æmula nobilissimam & pulcherrimam, & ut ille ait, omnium terrarum alumnam, eandem & parentem, numine Deum electam, quæ cælum ipsum clarius faceret, sparsa congregaret imperia, ritusque molliret, & tot populorum discordes feratque linguas, sermonis commercio contraheret ad colloquia, & humanitatem homini daret; breviterque una cunctarum gentium in toto orbe patria fieret &c. hanc inquam folio maximè Querno assimilare voluit, multò proceritate ampliorè, quàm latitudine. Sed idè & stillicidia Quercus ponderosissima dicit. An quia pondus ab ipsa Quercu acquirunt? & an à foliis, vel à ligno? Ab hoc possint aliquid: ab istis, vix putamus. Sed ita putamus: cum Quercus folia sint sinuosa, & interdum veluti carinata, idè plus aquæ sustinere: inde guttas, maiores, idèoque graviores. Quod si cui lubeat aliam excogitare rationem, possit.

Sed nunc paucis quid & Diosc. de Quercu, mei & Syriæ, in genere habeat, videamus. Is unica & voce Diosc. (ne quis fortè eum existimet prædictas species non novisse, ad vires potius quàm historias respiciens.) & nostro & aliorum doctissimorum iudicio, comprehendisse in universum omnes glandiferas arbores, non solum quod sciret, una voce omnia illa genera contineri posse, sed etiam, ut brevitati consuleret. Idè dixit: *Quercus* *stictica* *in xyn dymon*, &c. Similiterque tunica quæ circum glandem est calyci subiecta. Sed lignæas glandes, Quernis. [Idè & Syriæ dicit, non *in xyn dymon*: diversarum specierum intelligens.] Attamen gallam idem non *in xyn dymon*, sed *in xyn dymon* fructum dicit, nihilominus sub hac voce diversas species comprehendens. Mirum verò ab eo potius fructum dici Quercus, quod tamen de glandibus adèd expressè non dixerat. Nempe si non verè fructus est Galla, habet tamen fructus speciem, quamvis revera excrementum sit, ut & reliqua superscripta, quæ nullus flos præcedit, sicut fructum præcedere solet, in iis quæ florent. Sed notandum quodd idem Dioscorides ait Chamædryn folia habere parva forma & divisura similia Dryi: quod & Plin. dixit: Item Betonicam inquit Diosc. folia ferre longa, similia Dryi, in circuitu dissecta: denique Syderitidis primæ folia esse longiuscula ad formam *in xyn dymon*. Sed longè diligentiori observatione dignum, quando idem cap. de Cocco ait,

Atavici

Melan-dryum

Robur quod modo terebrandum: Suber.

Isola lami

Assimilatur folio Quercus. Car. stillicidia Quercus ponderosissima.

Diosc. ad vires potius quàm historias plantarum respiciens.

Disse. locum ait, de tunc dicitur, in quercibus provenire Coc-
culus. cum, quamvis ibi Angul. *De tunc dicitur* legi velit
 ex Theoph. hoc est, in Illice. De qua re plura in Il-
 ce, ubi de Cotco traditur. Illud obiter notabis, &
 veluti superpondij loco: etiam veterem Dioscor.
 lectionem fere posse, sed ea lege ac omine, ut,
 sicut dicebatur, deus nomine glandifera arbo-
 res omnes comprehendantur, inter quas & Il-
 cem referri nemo negaverit. Interpretes tamen
 quercus nomen retinuerunt.

Salus
Hippoc.

Glandaria
flua Co-
rons.

Socrates
per Quercu
demerant.

Socratis
suppliciu.

Corona
Querna
Quercu
visi sacra.
Idem signu
flumini.

Idem ar-
bor.

Civica
Querna.

Civica co-
rons mili-
tariu
tatis infi-
gne.

Signa co-
rons.
Esula.
Querna.

Hipp. in lib. de affect. *Salus* voce, *de tunc dicitur* usus
 est, ubi ad inflammata *Salus* *de tunc dicitur* est, quercus
 folia imponere iubet. Quercum Plutarchus inter
 arbores sylvestres fructu bellissimam & ferti-
 lissimam ait. Eo enim & tera & alites pascuntur.
 Nempe etiam M. Cato inter ea, quæ ad bonum o-
 pumumque agrum spectant, sylvam glandariam
 annumeravit. Inter mitigatas validissima. Om-
 nium verò prima nata dicitur. Vnde Arcadum
 cum hanc, cognatio quedam, quod omnium pri-
 mi ex terra homines fuisse perhibeantur. Socra-
 tes autem in Deorum contumeliam, qui sua tem-
 pestate colerentur, per quercum, ut ait Tertul-
 lianus, deierabat, hac ratione, ut ipse arbitratur,
 quod Deum unum, qui Mundum cælumque re-
 geret, esse existimaret, qui ante foret, quam quer-
 cus crearetur & nasceretur. At qui Athenis & in
 Græcia colerentur, longè post quercum, & ferè à
 sua memoria natos, nec dignos ut pro Deo cole-
 rentur, quare ob violatas horum ceremonias ul-
 timo supplicio à suis condemnatus.

Heliodorus autem Deos dicebat, iustis hoc con-
 cedere, ut in illorum quercuum ramis altioribus
 glandes nascerentur, in medio verò apes habi-
 tarent. Idem Plutarchus in vita Martij Coriolani
 ait coronam quernam servati civis esse præmium,
 quod Iovi, in cuius tutela sunt civitates, sacra sit
 quercus. Quamvis alij, ut Plin. Esculum Iovi sa-
 cram dixerint. Iovis autem signum altissima
 quercus erat. Hinc quercum sacram ferunt, quod
 vitæ causa, in hac primùm arbore, mortalibus
 fuerit, qui primùm glandibus vescerentur. Ovi-
 dius.

Es qua deciderant parula Iovis arbore glandes.

Huius enim fructu suos populos primùm aluisse
 dicitur. quare Iovis arbor dicta. Vnde adagium:
πολλὴν παρθενίαν Διὸς φάει ἀνὰ τῷ κερῷ. Id est, multo-
 rum festorum Iovis glandes comedit, quamvis
 per *Διὸς βύλας* & Castaneam intelligant. Dicitur
 autem de sene multarum rerum usu docto & ex-
 pecto.

Civica autem dicitur quercus, quoniam anti-
 quitus querna corona donabatur ei, qui civem
 servasset, de qua neminem melius differenter
 audias quàm ipsum Plinium: Glandiferi maximè
 generis honos apud Romanos perpetuus. Hinc
 civica coronæ, militum virtutis insignis clarissi-
 mum iam pridem verò & clementis Imperato-
 rum, postquàm civilium bellorum profano [pro-
 fanatio M. profanatione. Vet.] meriti cæpit vi-
 deri civem non occidere. Cedunt his Murales
 Vailaræque autem, [ita enim legimus ex Gellio.]
 quanquam pretio antecedentes. Cedunt & Ro-
 titæ, quamvis in duobus maximè ad hoc avi
 celebres: M. Varrone è piraticis bellis, dante Ma-
 gno Pompeio: itémque M. Agrippa, tribuente
 Cæsare è Siculis, quæ & ipsa piratica fuere. Civica
 Iligna primò fuit, postea magis placuit ex Esculo,
 Iovi sacra. Variatùmque & cum quercu est, ac da-
 ta ubique, quæ fuerat, custodito tantùm honore
 glandis. Additæ leges arctæ, & ideo [coronæ]
 superba, quæque conferte libeat cum illa *Gæso*
 Tom. I.

rum, summa [ex Oleastro in Olympicis, ut suo di-
 ctum loco.] quæ sub ipso Iove datur, cuique mu-
 ros patra gaudens rumpit: Civem servare, ho-
 stem occidere: Utque cum locum, in quo sita-
 tum, hostis obtineat eo die: utque servatus fa-
 teatur: aliàs testes nil profunt: ut civis fuerit. Au-
 xilia, quamvis rege servato, decus id non dant:
 Nec crescit honos idem Imperatore conservato,
 quoniam conditores in quocunque cive [civem
 M. & GH] summum esse voluere. Accepta licet
 uti perpetuò. Ludos incunanti semper assurgi etiam
 ab Senatu, in more est. Sedendi ius in proximo
 Senatu. Vacatio munerum omnium ipsi patri-
 que & auro paterno. quatuordecim eas accepit
 Sicinius Dentatus: [qui propter fortitudinem A-
 chilles Romanus dictus.] sex Capitolinus. Is qui-
 dem & de duce Servilio. Africanus de patre acci-
 pete voluit apud Trebiam. O mores æternos qui
 tanta opera honore solo donaverint, & cum reli-
 quas coronas commendarent, salutem civis in
 pretio esse noluerint: [clare professi, ne ser-
 vari quidem hominem fas esse lucris causa] ser-
 vari quidem hominem, nefas esse lucris causa.
 Hæc Plin.

At Plutarchus ex quercu dari solitam Civicam
 narrat, quod in expeditionibus glandiferi generis
 hanc advenire facile sit, vel, quod Iovi & Iuno-
 ni sacra, qui urbibus præsidere dicuntur. Corona
 querna, & draconum voluminibus olim Triviz
 Dianæ *τῆς τριῶν*, sive *τῆς τριῶν*, quam eandem
 esse cum Hecate putabant imaginem, coronare
 mos fuit. Sophocles in Rhizotomis apud inter-
 pretem Apollonij.

*ἡ δὲ δὴς ποτὶ τὴν τῆς ἡρῆς
 τῆς τριῶν ἡ δὲ τῆς τριῶν
 τὸ δὴς ποτὶ τὴν τῆς τριῶν
 ἡ δὲ τῆς τριῶν ἡ δὲ τῆς τριῶν
 ἡ δὲ τῆς τριῶν ἡ δὲ τῆς τριῶν
 ἡ δὲ τῆς τριῶν ἡ δὲ τῆς τριῶν*

Hanc Coronam ut inferis diis, sic etiam Parcis im-
 ponebant. Catullus,

*Hu corpus tremulum comædentes undique Quercu
 Candida purpureis ramis induxerat ora.*

Purpureis, *τῆς ἀλαλῆς*. Scalig. P. Decius Mus, tri-
 bunus militum in bello Samnitico ea donatus, te-
 stibus Corn. Nepote ac Plin. secundo de viris il-
 lustris. M. Antonino Philosopho, & L. Aurelio
 Vero quoque fratribus oblata. Aurelianus Prin-
 ceptis bis ea donatus. Probus in bello Sarmatico
 semel, & Valerianus. Cæsar autem Suetonio, à T.
 Thermo in expugnatione Mitylenarum illa do-
 natus. Coriolanus, ut narrat Plutarch. à Dictato-
 re Civica donatus, propter civem in prælio, quod
 Latini post exactum Tarquinium cum Romanis
 fecere, servatum. Scipio Africanus, consulem
 patrem apud Ticinum annem, adversis auspiciis
 cum Hannibale præstantem saucium, intercessu
 suo, servavit. Quamobrem duabus coronis do-
 natus, scilicet ut duplici corona conspicuus foret,
 quod & patrem & consulem servasset. Lege Val.
 Max. Rufus Helvius, miles gregarius, ob serva-
 tum civem in bello, quod Tacfarina in Africa,
 contra Romanos gessit, à Cæsare Civica donatus.
 Cicero, propter servatam contra L. Caesarem, &
 cæterorum coniurationem urbem, L. Gellius, vir
 præclarissimus à Repub. dandam Civicam coro-
 nam arbitratus, ut ille de seipso testatur. Habes
 exempla eorum: qui Querna, hoc est Civica co-
 rona redimiti fuere, ob servatum civem. Sed quid
 vetustis exemplis inhaeremus? Hoc nostro seculo
 cum dirus ille Mars, & fatalis Orci filia feritas, in
 totam Galliam ac civem Genevensem grassata, sol-

*Summa
 maxima
 privilegia
 Querna co-
 rona redi-
 mitorum,
 Quæ tam
 acceptant.*

*Inf. Quercet. Medici-
cus sum-
mus Cuius
corona
donatus.*

Quercetani Medici excellēti & Regij, ac optimē de patria & concivibus suis meriti, ob editum à se Sclopetarium, hoc est, librum de curandis vulneribus, quæ Sclopetorum & similium tormentorum ictibus acciderunt: Fr. Hotomanus, æternæ famæ Iurise. Gallicus ille Cato, & Acad. Basil. lumen præclarum, eidem Quercetano nomine, felici nomine, Coronam Quernam, Ob diversis servatos, publico illo opere extare dicarēque voluit, hoc adiuncto argumento:

Ob conservatos insigni hoc munere civem

Quercetane tibi Querna corona datur.

*Consuetudo
de veteri
Athenien-
sum.*

Fuit & consuetudo vetus scitu dignissima. Mos erat Atheniensibus, ut puer quispiam in nuptus indueretur undique spincis frondibus, & quercus glandibus opertus coronatusque Cunas panibus impletas gestaret.

*Quercus
civilis.*

Virg. quoque Quercum civilem dixit: Aeneid. 7.

At qui umbrata gerunt civili tempora Quercu.

Lulium Querna corona redimitum celebrat Lucanus.

Lulium emeriti gerens insignia doni.

Servati civis referentem vramia Quercum.

Audi Valerium Max. Cætesum ad Quercum pronæ manus potrigantur, ubi ob cives servatos corona danda est. Argumenti sanè proportio hanc eximio Medico indies suos cives arte sua servant, & ab orco revocanti competere, atque adeo verè tali conferri debere, iubet. Nec absolum fuerit dixisse, inter civicam & obsidionalem coronas hoc interesse, quod hæc singularis salutis sit, illa diversorum civium servatorum publicum quoddam præmium. Sed de hac re satis.

*Obsidiona-
lis differt
a civica.*

*Prienensis
Quercus.*

Iuxta Priensem Ioniz urbem Quercus fuit, apud quam Samij & Prienenses bellum gerentes, mutuis se damnis afflixere, magnæque prælio inter eos commisso, Samios nulle Prienenses occiderunt. At septimo post anno ibi cum Milesiis congressi, optimos quosque urbis cives ac primores uno prælio amiserunt, ut post eam calamitatem mos Priensibus mulieribus fuerit, ut cum de maximis rebus ageretur, cum miserabili precatione iureiurando testarentur: Apud Quercum funebrem: quod eo in loco & patres & viros ac filios, amiserunt. Hæc Plutarch. in Probl. Absalon Davidi patri rebellis & insidians (ut sacre nos docent paginæ, cum mulo insidens aufugeret, & sub Quercu densa pertransiret, obvoluit ramis illius crinibus, pependit, & à Ioabo tribus lanceis transfixus. Extat & Adagium, *tu mi dux auxis*, id est, per tenebras quæ apud Quercum: De ingenti & fatali calamitate dicitur. Sed satis digressum.

*Quercus
funebria.*

*Abfalon in
Quercu
pendens
transfixus,
adag.*

Restaret ut ipsas Quereum differentias proponeremus, ni diversorum autorum recentiorum diversæ sententiæ nos remorarentur, in assignandis suis, & reducendis explicandisque præcorum *tu dux* differentiis, quos consuluisse & audivisse interest rei herbariæ studiosis antequam singulas nobis observatas promamus. In ea verò re multum se torserunt.

*Recentio-
rum sen-
tentia de
Quercus
differentiis.
Robur ge-
nera Her-
mol.*

Hermol. Roboris genera quaternæ tantum fecit, Quercum, Robur, Esculum, Cerrum, quæ eiusdem iudicio Græcis illis respondent, Hemeridi, Aegilopi, Haliphloeo, Platyphyllo. Vt sit quercus, Hemeris: Platyphyllos, Esculus: Aegilops, Cerrus. Sed nunquid Haliphloeos Robur significet, sibi incompertum ait Theophrast. certè [addit idem] Agriam *tu dux* appellat, quam nostri Robur interpretantur. Quidam ut Diosc. quatuor supradictas duas addidit spe-

cies, Fagum & Illicem. Sed toto genere distant, ut Fagum cognatæ potius quam congeneres habendæ sint, Verum non idè malè locutus Diosc. ad vires, potius respiciens, quas easdem cum cæteris habent. Hemeris sanè Homero non quercum sed vitem significat, ut Photion testatum esse voluit.

Sunt, inquit Ruell. qui Hemerid esse Quercum existiment, quam Mylion interpretantur: quibus facillè accedo fretus Theoph. testimonio, qui scriptum reliquit, eam quæ glandem ferat dulcissimam, quibusdam Quercum, aliis Hemerida, id est, placidam vocari. Cæterum utrique eadem ascribitur natura, præterquam à Plinio, qui parum diligenter glandiferarum arborum discrimina observasse à nonnullis accusatur. Hanc inter Quercum & Hemeridam invenit differentiam, ut in his arboribus, quæ maximam ferat glandem Hemeris vocetur brevior & in orbem comata, & lissimæ ramorum crebrè cavata: formæ lissimæ Quercus habeat & incorruptius, ramosa & ipsa: procerior tamen & crassior caudice. Theoph. certè *tu dux* appellat, quam nostri Robur interpretantur. Robur tamen, quæ Theoph. *tu dux* dicitur, licet pro communi glandiferarum genere usurpent, ea tamen Plin. esse videtur Quercus, quæ Gallicum nunc vulgus *Chestum* vocat, ea passim in sylvis spectatur, folio latebrarum anfractibus sinuosissimo, glande exigua, materie durissima. Nam & hæc sola præter fructum Gallam utriusque generis & fungos, & plurima alia gignit. [Gallas singula ferre genera dixit Theoph.] Cæterum sunt qui Haliphloei nomine Robur putent comprehendere, quod compertum non habeo, nec parva fuit difficultas prodere, quibus Græcis latina congruerent. Hæc Ruell.

Drys, iudicio Amati, Quercus est, suaves & dulces glandes ferens, quam nonnulli Etymodrym appellant. Nam communis Quercus insulas & subis græcas glandes producit, cuius Diosc. tanquam species, Fagum & Illicem numerat, quod intelligendum de viribus: secus autem figura, quum multum inter se differant. Nam Fagus arbore est, quæ licet fructum glandi figura & forma similem non habeat, glandiferis tamen arboribus annumeratur.

In Italia, si Anguil. credimus, omnes species arborum glandiferarum, quas recenset Theoph. sunt bene notæ. Nam, ut ille tradit, Prima species, quæ montanis dicitur Hemeris, Macedonibus Etymodrys, quam Gaza nunc Placidam nunc Veri-
quercum vocat: Itali vocant Querciam: In Abruzzo *Ghianda Castagnola*. Proferit hæc glandem magnam, crassam & longam, ac hæc glandes in quibusdam locis Hispaniæ comeduntur coctæ in igne instar castanearum. Secunda à Montanis dicitur Aegilops: Macedones vocant Aspin, Gaza vertit Cerrum, Itali adhuc vocant Cero, cupula autem in qua continetur glans vocatur Vallania. Tertia species quæ vocatur à Montanis *πλατυφυλλος*, eadem nomine à Macedonibus vocatur, Gaza vertit, nunc Esculum, nunc Latifoliam. Itali vocant Fagus, Fagui & Ischia. Quarta eodem nomine à Montanis & Macedonibus dicitur *φρυξ*. Gaza vocat Fagum. Itali, Faggi. Quinta species incognita erat Macedonibus: non autem Montanis, qui Haliphlocon vocant: Gaza vertit Sallicorticem nec non Redicorticem. Itali Rovere. Aliæ sunt quoque species figura inter se similes, sola magnitudine differentes. Prima Græcis dicitur *tu dux*. Gazz Illex: Italis *Logani* & Elici. Secunda *tu dux*, Gazz Suher. Tertia *tu dux*, Gazz.

*Fagum
Illex non
fuit de ge-
nere Quercus
cuius
Hemeris.*

*Quercus
Mylion.*

Plin. var.

Hemeris.

*Robur, quæ
græca dicitur.*

Chestum.

Haliphloeo.

*Drys, à
mace-
donibus
Etymodrys,
Quercus
communis.*

*Fagus
glandifera.*

*Anguil.
glandifera.*

*In Italia
omnes spe-
cies Theo-
ph. notæ
esse.*

*Quercia.
Bius glan-
des edules.*

*Aegilops,
Aspin.*

*Cerrus.
Vallania.*

*Platyphyl-
los.*

*Esculus.
Latifolia.*

Fagus.

Haliphloeo.

*Sallicorticem
Redicorticem.*

*Genera quæ
græca.*

Prima Illex.

Gazz.

phellus. Sar-
ben. Agria.
Aquifolium.
3
Asterum
indur. de
Fago: an
nae Theoph.
Drye Gal.
et Plinij.
1
Theroph. Fa-
gat Plin.
Quercus
folio sinuato
10 species
tres.

Cast. Aquifolium. Hæ sunt species arborum glandiferæ, in Italia cognitæ. Hæc Angul. Qui cum Matth. & Amato existimat *quercus* Theoph. & Dioscorandem esse cum Fago Plin. quod sanè consideratione dignum. Fagus enim Theoph. Diosc. & Gal. eadem videtur, & diversa Plinij; Fago, quæ Oxya Theoph. Quæ verò Diosc. tradidit *oxya*, infra referemus, eip. de Illice, inter vires, sicut & quædam Plinij, de Fago habes cap. de Oxya sive Fago vulgari & Latinorum.

Cerrus. Cæsalp. aliter tradit Glandiferarum differentias, quàm Anguillara, dum scribit: Species quas novimus, folio sinuato, & deciduo tres notæ sunt, quarum una *Quercus* vocatur, frequens in collibus, caudis intorto, ramis in multam latitudinem sparsis, folio non valdè sinuato, glande medio-cris, licet quædam maiorem, quædam minorem ferat glandem, optimè ad signandos furs, folium limbo *latius* illa angustum fert. Altera erecto caudice in ingrem latitudinem folio maximè sinuato, glande in Echynato calyce insuavi, quæ Cerrus appellatur. Tertia erecto similiter caudice non aded excelsa: folio latiore, modicè sinuato, glande maximè rotundiori: appellant in Etruria Farniam, trementibus fabricandis expetitam, materia enim flexilis & enodis: eadem in maritimis reperitur, sed operibus inutilis. Quæ autem folio constant non sinuato, dissimilia secundum ætatem folia ferunt, nam initio obtusiuscula sunt, modicè sinuata in angulos acutos, adultæ autem in arbores oblonga redduntur & angustiora, quasi *Glaucifolia* hinc, sed ampliora inferius caudicem, glandem ferunt tenuè in acutum definentem, inutilem, perpetuèq; virent: Hæc generis quæque novimus species, scilicet Subetern, Suberellam, Illicem duplicem & Græcum tinctorum.

Farnia. At Theophrastus, quæ folio constat deciduo, communè nomine *Quercus* id est, Robur, sive Quercum vocat, cuius modè quatuor, modè quinque facit species, quarum prima Hemeris, sive Placida vocatur, quæ nostra *Quercus*, tenuiori glande & folio. Secunda Cerrus. Tertia Latifolia, cuius notæ in nostra *Quercu* latifolia reperiuntur. Quarto loco Fagum ponit, non quam nos ex Plinio Fagum vocamus: cuius verba conveniunt Farniæ in montibus altissimis ad naves quæ sitæ. Quinto loco Haliphios, seu Saleicortex additur, quæ etiam *Reticortex* cognominata est: hanc putaverim apud nos illud genus Farniæ esse, quod in maritimis provenit. Theophrasto teste, Macedones Robur quæternæ genera faciunt, aliis nominibus, scilicet Etymodrym, seu Veriquercum, quæ glandem dulcem producit, hæc cum Placida eadem videtur esse. Secundo loco Esculum quæ glandem amarant ferre, Latifoliam videntur intelligere. Tertio Fagum, quæ rotundior glandem, quæ Farnia est. Quarto Cerrum.

Folio non sinuato. Apud Plinium Robur, Quercus, Hemeris, aut eandem arborum significant, aut parum differentes: Agilops & Cerrus similiter conveniunt, sic Latifolia, & Esculus, Haliphios autem apud eundem cum Cerru Ariadum eadem putatur.

Aradum. Lugdunenses Coloni, hoc pacto inter se contendunt, ut du Choul narrat. Quæ pleno in loco aut convallibus Quercus creverit, illis rusticis Chesna vocatur. Si verò in altis montibus rædies egit, quæ iuga habitant agricolæ, Royle aut Roure, quasi Robur nominant. Royle folio Quercus est minore, & duriore matetia. In Gallia Quercus, quam plebs *Charme* vocat, sine glande adest, lignumq; maximè expetit, præterea quod

ceteris præferatur.

Fallatur nostro iudicio du Choul reponens arborem, *Charme* Gallis dictam, in numero quercus, omnino enim ab ea differt: de ea autem trademus sub Fago species dicta. Aut præterea, Ornum & Roboris speciem, quæ sterilis sit, aliqui crediderunt: Et postea: Glandiferarum arborum penè incertus numerus, efficit ut omnes enumerari non possint. Hullos arbor est glandifera. Babalaustum Quercem glandem Avicenna dixit.

Paulanias in Arcadium sylvis diversas esse quercus tradidit, quatum alias *Quercus* vel L. ti-folias alias *Quercus*, Fagos appellat. Tertium autem genus statum esse, & utq; ad levem corticem præbere ait, ut in mari anchoris signa ex eo faciant. Huius quercus corticem Hermesianax Poëta, *Charme* nominavit, & Suberem.

Vitruvius l. 7. de Farno meminit, quod inter quercus genera ponitur, & nunc quoque Itali Farnum quercus genus vocant, teste Curtio. Est præterea Enzina quercus in Hispania, genus minus, & non aded rectum, cuius glandes ob suavitatem eduntur. Hodie vulgus *Vellera* appellat. Repertæ in Olympo hæc nostra ætate, admodum humiles quercus, folio tenui, glande exigua: quæ veteribus fuisse incognitas ferunt.

Nos ad Rhodani ripas [inquit du Choul] saxis hærentes quercus offendimus, contorto caudice, fruticis magnitudine, & natura steriles. Non desunt qui penitus contendunt in quercubus marem & feminam esse: discrimen sic faciunt, ut mas ad ultimam usque senectutem opacis locis folio non spoliatur, femina hinc initio decidat. Galli Ardegavenles quercus inserunt perpetua coma virentes, quod equidem sibi persuadere priusquam vidisset potuisse negat idem.

In Apennino & Andam agro [vulgò Angiers] Quercus perpetuè virens ex genere Latifoliarum notante Rob. Constantino. Antea diximus ex Theoph. Varrone & Plinio Sybariticam agri Thurini idem semper virentem.

In Græcia hodie hæc Quercum genera faciunt, autore du Choul, Melanotomeni, Thessalia Drys Lesquimeri. Reperta hæc ætate, inquit idè, in nemore Trôlac propè Bituriges tanta proceritate atq; crassitudine quercus, ut referre quanta sit nemo in animum inducat. Iussu enim mandatorum Francisci Regis invictissimi ac doctissimi, aggere voluit hæc, peramentis quibusdam circummunita est, ut cum venaretur tantus Gallorum princeps propter admirationem & inauditam pulchritudinem sæpe sub hac posset oblectari.

Hæc tunc non minor, sed ob naturam in ea obsequentem arti mirabilior, quæ etiamnum hodie in spectatissimo illo Basiliensium vindario ac sylva à D. Petro cognominata visitur. Cardano & aliis celebrata. Vulgarè Quercus, quam paulo post describimus species est, crassitudine, quantum vix tres homines comprehendant, truncus hominis brevior, sed vastissimis ramis, senis aut septenis, quorum quilibet Quercus quales vulgò videntur facile crassitudine æquet, ita in orbem expandis brachiata, & triplici pedamento rum ordine in immensum propemodum ambitum suffulta, ut iam ante multos annos centum passus circumscripti non sufficerent. Sed crebrioribus ramis divaricatis prædicta brachia, & sensim elata patuli opacitate sua, & conniventibus circa media brachiis pateram pereleganter deferat, qua de causa ob raram & insolentem huius pulchritudinem, & quod præterea fons perennis

Ornum

Hullos.
BabalaustumPaulanias
differentiasLatifolia?
Fagi.Cerrus lry
G.Thellus. Sar
ber.Farnus.
Enzina?

Vellera?

Quercus
humilesOlymp.
Quercus
steriles et
fruticosa.

Mas.

Femina?
Quercus
perpetua
folia.Græcia hodie
duæ Quercus
genera
sunt.Melanotomeni
Thessalia
Dry. Les-quimeri.
Quercus
Galliarum
Gallia.Quercus
Basiliensis
amplissima

ad ipsum ferè truncum perennes per tubos ex-
cavens Lymphas, D. Maximal. Cefari sub ea cum
Cefare sua aula discumbere ac cœnare libuerit.
Floret eadem & fructus fert, cœterarum more,
quotannis ferè. D. ceres in unica illa quercu, o-
mnes propemodum pulcherrimæ arboris dotes
Faunos atque Sylvanos certatim contulisse. Ut
iam nihil sit quod de Lycio Platano gloriatur Li-
cinius Mutianus, eius provincie legatus, comas
sapidis sub ea cum octodecim sociis, cum hæc
quercus Basil. multò plures supra trunci ambi-
tum brachiorumque, divisuram capiat, quàm Pla-
tane ista adumbravit. Sed, ut hæc altitudine præ-
celleret, erat enim 77. pedes alta, ita illa nostra
amplitude expansa.

Plin. vocat. Pinnatè multa Robori tribuit; quæ quercui
adferenda videntur, etiam iudicio du Choul.
Calyci Cetri tribuit idem, quæ calyci Halphloei
competunt, ut vult Const.

Hæc in genere de differentiis Quercum nunc
enim reliqua generalia de Tempore, Loco, Satu
& cultu dicenda, pluraque ex Theoph. Plu. Var-
rone, & Trago.

Nomina In genere verò & omnibus Roboris, speciebus
Roboris in competunt hæc nomina *generis.* *Sageidi* vel *Strineidi*
vel *Esseidi* & *Esseholz*: Belg. *Sageeste*: Gall.
Robre ou *Roure*: Ital. *Rovere*, Dunsimæ quercus
genus, *Agriady* Theoph. putata: *de agria*: *di-*
ady eiusdem, ut Had. Jun. & alij quidam pu-
tant, *Robur* dicitur & *Fober*. Marurè & verè cœptu-
ro germinat & glandes, fructu sensu reddunt,

Agriady. ut circa Vergiliatum occasum. Et reliquæ quidem
arbores, ut primum cœpere, continuant germi-
nationem. *Robur* & *Abies* & *Larix* intermittunt
tripartito, ac terha gemina edunt: idè & inter
cortices squamas spargunt. Folia quercus cuius-
cunque in principio tenebrima sunt, idè facili-
mè superveniente p̄sina marcescunt, & ipsam
fructuum spem amittunt, quod aliquando in istis
regionibus evenire solet: Eadem folia mox co-
mutantur oblonga & lutea *Cachryes*. Hæc verò

Hal-
phloei.
Robur.
Tempus in
genere. circa diem D. Georgio sacrum, quercus ostendit,
Porro folia Quercina quæ primum lutei sunt co-
loris [licet nonnulla etiam rubicunda appareant,
maximè ea quæ novellis Quercubus erumpunt]
subinde vindiora ac solidiora evadunt. Post *Ca-*
chryas, quas diximus, perexigui procumpunt &
rubri flosculi, qui in glandes tandem abeunt,

Cachryes. quarum non raro tres aut quatuor unice, eoque
tentissimo insident pediculo. An verò glandes

Glandes
flosculi.

ex ad frugem sint perventura, circa diem D. Ieno
ho sacrum, observari solet, tamen enim è calycibus
prorepere consueverunt.

Montes & valles diligit Robur: quercus &
in plana descendunt. Omnibus suprascriptis *Locus in*
differentiis veterum, si Matth. credimus, u- *genere.*
niversa abundat Hætrugia: quippe in mariti-
mis Senensibus & Salicorum agro, ac etiam
Romano tractu, omnia illa glandiferarum
genera adeo numerosa in vastissimis sylvis pro-
venire tradit, ut glandibus innumerabiles por-
corum greges incolæ ibi quotannis saginent.
Frigorum & calorum igniam passæ quercus
veluti Robora, tardius moriuntur. Quercus
cæsa anno tertio resurgit: & in aquis obruta
durat, Fitque Ebena similis & decorticatio-
nem facillè tolerat.

Circa Oleum & Juglandem feri verant Geo-
ponici quod natura quadam *Abies* ab
us dislideat, & fundi oram sterilem faciat. De
deus satu controversatur. Quidam enim ex
semine ac glande tantum eam progigni statuunt:
alii ex radice quoque sed lentè. Nonnulli e-
tiam ipso capdice detruncato: avulsione aut
radice, nullam earum quæ ab imis sobolem
non mittat [*ab imis*] exoriri pos-
se arbitrantur. Iuxta urbem Iliensium quercus
in Ili tumulo tunc satæ dicuntur, cum cœpit
Ilium vocari. In Ponto circa Heracleam ar-
bunt Iovis Stratij cognomine, ibique quercus
dux ab Hercule satæ. De insitione nihil effi-
ci dignum traditum: hosce tamen etiam fru-
ctus quercus protulerunt, si verum dicant *insitio*
Poëtæ: Virgil. Eclog. 8.

----- Aurea dura

Mala ferant Quercus: Narciss. *Aurea dura* *Aurea ma-*

Pingua corticibus sudent *Eschra myrica* *la*

Certent & *egnis ulula*:

Horat. Epit. 1.

----- Quid si rubicunda benignè

Cornu vepres & Pruna ferant: & Quercus & *Cornu* *Pruna*

Illex

Multa fruge pecus, multa Domum iuvet um-
bra:

Sed hæc vota poetica nobis potius esse viden-
tur, quàm veræ narrationes. Ruellius tamen *Pruna*
memorat, per insitionem Quercum bona Py-
ra ferre visam esse: Fides sit pendens autotera.
Nunc specialiore historiam aggrediamur, in-
cipientes à vulgatissima quercu nostrate.

QUERCUS VULGARIS


BREVIBUS AC LONGIS

pediculis.

Descriptio
Cortex.
Folia.
Vix ulli genti Europæ inco-
gnitam putamus Quercum
vulgarem recto, crassissimo, va-
sto, & valido caudice, & min-
ima melle, crasso, ruto, pido-
so, scabroq; cortice: brachiis lon-
ge lateq; luxuriantibus, foliis lon-
gis singulis. In hac nudamenta
aut luti observantur, in quada-
m tabulis tenuibus pediculis ex ege-
nis intervallis, muscoli, ex apiculis
fossilibus herbis eodem puncto
plumbis exortis, compositi, sic,
ut interdum verticillatam ligulam
cui adherent coronent, quos in-
fra pectus damus cum pilosis quere-
cus



Quercus
fauces.



tus: observantur quoque & glandium rudimenta, tanquam globuli minimi purpurantes & hirsuti (qui mihi sterculus) privatis pediculis insidentia. Glandes in Calycibus suis seu cupulis sessiles, vel furculo proximè adhaerent: & longis tenuibusque pediculis appenduntur. Atque etsi magnitudine variant, unciam tamen communiter longæ sunt, corticosa membrana testæ puniceæ, nucleo calloso, acerbis & austero, quemadmodum & cupula exterius asperiuscula, interius lævis prædicto cortice multò dentior, vix tertiam glandis partem capiens.

Dry: unde dicitur. Quercus descriptio 1. 1. 1.

Quercus vulgaris tres varietates à fructu potissimum postea trademus: hic id notandum nobis videtur, sæpius visas Quercus maximas totas cavas corrupto ligno ac etiam interdum adusto penè toto ab opilionibus, ut homines in eis occultari potuerint, & nihilominus pluribus annis viventes & fructiferas dare. Vox Spic. inquit Lob. & Pena, à Spis, erumpo, pullulo, qua designantur potiss. glandiferum genus & præsertim Quercum, cuius frequentis occurfus, ipsaque celsior & ramosior arboris species frondis grandioribus anfractibus sinuata quavis notatone notiorum faciunt, tum frigidis, tum calidis plagis. Eam meritis quæ putet apud Theophrast. & etiam Salsicorticem

Haliphloe Lob. Robur.

quam hodie Robur vel Roubis vulgus nostras vocitat, ut quæ sit perquam solido truncò, multum cineris urendo relincente. Qualem etiam è vulgari truncò nos parandum curavimus, aiunt Lob. & Pena, qui addunt: Quæ gallas dat Quercus, duplex videtur. Earum vulgarissima nemorum & saltuum Pedemotium, Delphinatus, aliarumque regionum temperatiorum est alumna, minore stipite, brachiis & fronde. Huius quædam varietas aut differentia videtur Fagus Theophrasto dicta, vecis argumento Latinis Esculus, cuius esculentà glans, & post quernam dulcissima celebrabatur, famemque explebat prunis mortilibus: hodie Fargui & Fargui Italicæ. Hargui Gallicæ: Lignum istius firmius prædicitur, quàm urbanæ Quercus. Item in obs. Quercus perpetua fronde virens, Gallis Chæfnes veris. Huius Quercetas in Gallofrancia ovis audio. Glandes nostratibus similes sunt, quales ferendas misit eruditiss. D. N. Rache apud Lutetianos Medicas. Nos verò quiddam concernit, cur totam Quercus Lob. historiam hic proponamus, factum id à nobis, quod non in omnibus reque perfecta sit. Quercus etiam à nobis descripta, Quercus Virgilij est, Et forte reliquorum quoque Poetarum, Iovi sacra, Chæonia, Fæstia, Dæmonia, Dædonæ, Ciræa, Mathonia, Aleicoma, Patula, Rigida, Dura, Grandifera, Græci suibus, &c.

Quercus galifera duplex, Lob.

Esculus Lob.

Quercus perpetua fronde virens.

Quercus Virgilij.

Manre Lob.

Quercus Manre est apud Hebræos: nos in vulgata interpretatione Vallem Manre habemus: & Genes. 12. ubi Græca vulgata editio Manre habet, Latinus interpret Vallem vertit. D. Hieronymus inter Quercum & Terebinthum pulchrum discrimen agnovisse videtur. Genes. 1. cap. 1. Latinus habet Terebinthum Græci Siquis. Item 1. 3. & Genes. 37. Est Serap. Codex emendandus ubi Cullor Latinis hæc tribuit: cum errorem in sua commentaria transulit. 1. Elon citra controversiam Quercus fuerit, Et Quercus Osee cap. 4. Quercus etiam à Iosue filio Nun, Ela dicta. Sunt tamen qui hæc vocabula generales arborum omnium apud Hebræos appellationes esse contendunt, quæ sanè rerum magna esset confusio in unica vo-

Cullor Scap.

Elon.

ce. Extat & Ciceronis poema de Arpinatum quercu. Quercus de qua Pompeius.

Hæc eadem à nobis descripta putatur, esse Platiphyllos Idæorum & Macedonum, & Latifolia Plin. Periti quidam Herbarij hanc marem esse aiunt, seminam verò genus alterum in saxosis, glande pusilla. Robur quoque quæ Theophrast. Agria Drys dicitur, ea Plinio esse videtur quam Gallicum vulgus, Chæfne, vocat, inquit Ruell. non sine errore, si hæc Chæfne Quercus sit.

Platiphyllos, Lob. Latifolia, Lob. Agria, Drys, Ruell. m. d.

Dalechampia, Quercus genus 2. est Hemeris Idæorum, Macedonum Erymdrys, Latino- rum Robur: Italorum Roubis. Placidius interpretatur Gaza, audacius more suo. Plin. Græco nomine utitur. Idem Dalech. multa habet curiosius observata in sua Quercus historia, quam Hist. Lugd. retulit his verbis: Quercus in specie arbor est omnium maximè procera, si Aegilopem excipias, recto caudice, cortice inferna parte rimoso scabroque, superiore lævi, cui subest Alburnum, quod cum animalis pingui comparari potest, plurimis in orbem brachiata ramis, magnam innoxiamque umbram loco inducentibus: folio grandi, Cerri & Haliphloe folio latiore, carnoso, laterum anfractibus sinuolissimo in arbore vetusta, minus in ea quæ cæsa novam frondem mittit, sed tum maximè lato & spisso, summa parte obtuso, cum cadit nigrescente potius quàm flavescente: glande mediocri, suibus grata, odoremque causam us saginandis apta, cum à Phagi & Hemeridis glande discesseris, dulci, non omnino quidem, sed si cum Haliphloe & Aegilopis glande conferas. Minus enim acerba & amara gustui est, Calyce nullis aculeis horrido, sed pustulata tantum scabritia asperato. In summo ramorum cacumine sæpe Glans nascitur, brevior, extrema parte veluti depressa ac retusa, aculeo, qui in summo fastigio glandis eminet, brevior & minus pungente: sæpe ternæ glandes simul coherent, aut binæ, raro unica prodit: pediculus eas susti-

Hemeris, Erymdrys, Robur, Gaza, Lob. Quercus, Placidius, Dalech., Alburnum, Quercus, Umbra, Folium, Quercus, Glandis, collatis, cæsa, Calyx.

Glandis, Varietas, Aculeus.

Pediculus.

Radix.

Descriptio, femina, Folia.

Glandis, Loca.

nens crassus & brevis, inde nascitur ubi ramo folium adhaeret. In unius furculi capite plerumque videas hinc tres coniunctas glandes, illinc duas, ac in proximo unam solam, prout succus, earum alimentum, huc illuc sese magis spargit, radice longè latèque evagante. Hanc uti dictum, Platiphyllos quidam marem esse aiunt: seminam verò genus alterum, in saxosis & asperis locis sæpe nascens: mare humiliore, cortice in tenellis furculis rubescens, te, non ut in illo albescens: folio minore: brevior, angustior, antrosum magis acuminate, tam densis laciniis sinuoso lateribus, ut minus crispum videatur, latius & nitidius virente, glande pusilla & rugosa. Talem prolecto gignunt aperti lapideique colles Allobrogum, aspectu nonnulli variant, ob loci squalliditatem.

Cæterum & in aliis Quercetis semina quoque proveniunt, folio quàm maris brevior, antrosum latius, & magis obtuso, inferne pallido, cortice ramorum nigriore: glandibus minimis, in ramorum & furculorum vertice prodeuntibus, interdum senis aut quinis, sæpe ternis aut quaternis, raro binis, rarissime singulis, quasi digito retusis, aculeo minuto, parum e calyce prodeuntibus, sed ei firmius adnexis. Platiphyllos quoque generi adscribenda, quam supra memoravimus in Thurino agro, in Apennino &

Femina, Varietas, Folia.

Glandis.

Perpetua, Folia, Platiphyllos.







Folia

Glans.

Sapor.



milis nomine ponit iconem Clusii, quercus humilis fruticis specie, si non de Ilcis molliore Lob. *Sachsen* s. *Tabern.* His omnibus Roboris differentia Clusii vires eas quas Dioscor. ad *spum* in genere refert, quas postea dicemus.

flexibiles vulgaris quercus virgulis simillima: folia ad proximè descriptas accedunt, sed aliquantulum maiora & molliora. Hoc fert glandem quernæ vulgari haud minorem, interdum etiam crassiorem, Calyce planiore, admodum amarat. In reliquis generibus nullas glandes observavit Clusius, præterquam in secundo. Dodon. in inst. Lat. quercus hu-

milis nomine ponit iconem

Roboris septimi

Clusii, quercus humilis fruticis specie, si non de Ilcis molliore Lob. *Sachsen* s. *Tabern.* His omnibus Roboris differentia Clusii vires eas quas Dioscor. ad *spum* in genere refert, quas postea dicemus.

spicula obvallat, præruptæ rupis fragmenti æmulum, non minus cernis vinctis in diametro habentem, internè hirsutum: habemus & minorem occlusam eo modo quo pingitur à du Choul & Lob. eiusdem magnitudinis quæ eorum figura. Sunt nobis etiam glandes nostris vulgaribus duplo aut triplo maiores. Cerrus, Gallis ignota arbor, cui eam ob causam nullum ab eis nomen positum est ac ne Italia quidem magna ex parte nota, ut ait Plin. In summam altitudinem crescit in Græciæ & Hætruriæ sylvis, incultis amica, rectissima, levissima, & materiâ per longitudinem robustissima, ad sustinenda suspēdendaque edificia firmissima. folio est crasso, amplis incisuris laciniato. Sterilis non est, ut quidam putaverunt, sed est glande tristi, horrida, rotunda, ac velut obtusa, amantissima adeoque insuavi, ut eam præter sues, nullum animal attingat, ac ne ex quidem, si aliud pabulum habeant, ut & Theophrast. prodidit, qui addit caput mandentium dolore afficere, quod tamen de Haliphloglande perperam scripsit Plin. Calyx glandis eam serè totam complexus, rigidis, latis, in cinereo candicantibus aculeis echinatus vallatusque est, non, ut Plin. ait, cœu Castanæ, sunt enim hi crassiores & rigidiores multò. Glandes cerreas Calycibus suis contentas ex Cypri, Chio, aliisque Cerrorum scilicet locis negotiatores interdum convehunt, Gallis alii vocant, alii *Valonia*, tota sicca supra coram super est, toto.

Glans mi-

nor

Glans mi-

nor

Glans mi-

nor

Glans mi-

nor

Glans mi-

nor

Glans mi-

nor

Glans mi-

nor

Glans mi-

nor

Glans mi-

nor

Glans mi-

nor

Glans mi-

nor

Glans mi-

nor

Glans mi-

nor

Glans mi-

nor

Glans mi-

nor

Glans mi-

nor

Glans mi-

nor

Glans mi-

nor

Glans mi-

nor

Glans mi-

nor

Glans mi-

nor

Glans mi-

nor

Glans mi-

nor

Glans mi-

nor

Glans mi-

nor

Glans mi-

nor

Glans mi-

nor

Glans mi-

nor

Glans mi-

nor

Glans mi-

nor

Glans mi-

nor

Glans mi-

nor

Glans mi-

nor

Glans mi-

nor

Glans mi-

nor

Glans mi-

nor

Glans mi-

nor

Glans mi-

nor

Glans mi-

nor


Glans mi-

nor

CERRI GLANS. AEGILOPS ASPRIS

THEOPHR. PYTATA

Descriptio



Folia.

Glans.

Calyx ma-

nor.

AD manum nobis cum sint illi ipsi Cerrici rami ex quibus Dalech. iconem suam (quam minus artificiosè pictor expressit) curavit delineandam, novam damus figuram & descriptionem, quam possumus ex ipsius ramis maxime fidelem. Folia habet vulgaris quercus, sed ut longiora, ita in tenuiores alioresque laciniâs divisa, licet sit, ubi & foliis

ludat, si rectè iudicamus ex ramis, quos munere Dalech. habemus, quibus subinde folia propriis ad quernæ vulgaris accedunt, superius lucida, subtus autem cineracea. Cæterum proximè ligno adhærent, calycibus hispidis & senticosis insidentes, vinctis latis, glande tamen nondum matura, similibus planè calycibus quercus Burgundicæ echynato Calyce. An verò sit eadem cum Cerris magno Calyce à Lobelio picta, ambigimus.

Equidem à Valerando Dourez Calycem glandis maximæ habemus, cuius magnitudinem non capiebat tabella nostra, quem maximam glandem è sinu suo protulisse ipsa cautas indicat, ut quæ fescunciam in diametro habeat, paulò minus altum, quem vndique crassa rigidaque creberrima

Quercus *Aegilops* inquit Lob. in *Aduers.* siue præcellæ, dictæ Cerris Plin., tristi prægrandi echinata glande: quæ itur P. s. i. Roman publica via visuntur cellissimæ, albi mundis peruiæ, nec valde notæ hodie: cuius glans les prægrandes capulum habent echinatum, imbric squamis præduris sibi mutuo incumbentibus, horridum, magnitudine serè Echini marini, valde crassum: Folia maiora multò, eadem alioquin Quercus. Et in obseru. Valerandus Dourez. In tunapoli Venetias rediens ramulos quercus duorum generum apportavit, quibus me donavit. Vterque inquit, quercui nostrati admodum assimilatur, folio & ligno, sed glandes ipsi ramo inhaerent: Vni qui minor Calyx hispidus & molliter echinatus, Ilcis subpar, alteri verò glandes prægrandes calycem habent echinatum, ambitu squamis præduris sibi mutuo incumbentibus horridum: valde crassus est. Folia maiora, eadem alioquin quercus huius speciei observasse memini publica via qua itur Pelaro Romam &c: alibi minus obuias nec valde notas: è cuius tamen prægrandi & duro Calyce glandes non exerebat, sed clauderat, sorte quia immaturæ erant. Huiusmodi folia & glandes liberalissimè communicavit Dalech. qui Cerrum Plinii me docuit.

Hæc Lob. quem non satis intelligimus. In *Aduers.* posuerat descriptionem Cerris viz in itinere Pelaro Romam: postea in *Obs.* repetit eandem nomine Valerandi, apud quem vident, ac eius quam vidit Romano itinere speciem facit: figuram apponit in *Obs.* sub hoc titulo, Cerris Plin. maiore glande *Adu.* 431. Hæc figura quæ diuersa à Dalech. Cerris figura: vix videtur differre ab altera, cui Lobel. titulum fecit Cerris Plin. minore glande, & Calyce mollius echinato, nisi sit lusus naturæ, de quo nostra suspicio in descriptione: Cerris glans immatura, quam & Hist. Lugd. & ante hanc Lobel. etiam proposuit. Theophrast. montanis *æpion*: Macedonibus *ævere*: Gazz. Cerrus & nobis adhuc Cerrus & Calyx Vallania, inquit Anguil. Hist. Lugd. cum

Glans mi-

nor

Glans mi-

nor

Glans mi-

nor

Glans mi-

nor

Glans mi-

nor

Glans mi-

nor

Glans mi-

nor

Glans mi-

nor

Glans mi-

nor

Glans mi-

nor

Glans mi-

nor

Glans mi-

nor

Glans mi-

nor

Glans mi-

nor

Glans mi-

nor

Glans mi-

nor

Glans mi-

nor

Glans mi-

nor

Glans mi-

nor

Glans mi-

nor

Glans mi-

nor

Glans mi-

nor

Glans mi-

nor

Glans mi-

nor

Glans mi-

nor

Glans mi-

nor

Glans mi-

nor

Glans mi-

nor

Glans mi-

nor

Glans mi-

nor

Glans mi-

nor

Glans mi-

nor

Glans mi-

nor

Glans mi-

nor

Glans mi-

nor

Glans mi-

nor

Glans mi-

nor

Glans mi-

nor

Glans mi-

nor

Glans mi-

nor

*Aegilops t.
daorum.*

*Vfus &
Vires.*


*Collectio-
nes & ab-
fessae.
Pannum
debilem.
Contra
scorpiones.*

Dalechamp. Quercus 4. genus facit, item Aegilopa Idæorum, Asprin Macedonum, Cerrum Latinoium. Cerrus Plin. maiore glande Lob. qui & aliam immaturam habet, ut dictum. Cerris Plin. 1. frembd Eichbaum, Taber.

Vfus Calycum ad inficiendos atro colore pannos, Gallarum vice. Sed ex illis tinctura dilutior, fugacior, viliorque est. Cerris folia & cortex, & glans, authore Plin. siccant collectiones, suppurationesque: fluxiones sistunt. Torpentes membrorum partes corroborat [post vsum calefacientium & siccantium] decoctum, eius sotu: cui & insidere expedit, siccandis adstringendisque partibus. Radix Cerris aduersatur scorpionibus.

GLANDIS MAGNVS CALYX.

Descript.



Inter fructus missos à Iacobo Gareto, [inquit Clus. Exor. lib. 2. cap. 16.] magnus erat glandis ille calyx, qui ab Anglis ex Windesore relatus, Londino ad me mittebatur, etenim sescuncie latitudinem, & vncie profunditatem habebat, durus admodum, & multis squamis hispidis semisq; oblitus, ex cinereo fuscis, internâ parte ad

glandis usque sedem breui, mollique & veluti terrea lanugine cineracei coloris fultus, cuius glans [quæ mihi non conspecta] ingens fuisse debuit. Schedæ quâ hic calyx inuolutus, adscriptum erat, hic calyx glandis ex Windesore allatus fuit: propterea cum esse suspicabar, quem Virginensis Historiæ scriptor Mangummenauus appellari tradit, cuiusque glandes ab incolis deccari, ut facilius conseruari possint, deinde aquâ macerari & decoqui, ut in cibum cedant cum piscibus vel carnibus, tam ministris quàm ipsis patribus familiâs, vel variandi cibi gratiâ, vel ob panis penuriam. Hæc Clusius. Nos nescimus in quibus hic calyx differat à nostro Valerandi, quem Icone expressum exhibemus, vel etiam ab eo, quem Lobelius exhibuit Obs. & Icon. Plant. cum inscriptione: Cerris glans immatura. Illius etiam glandis & calycis iconem, proposuerat Iodou Choul in suo libello de Quercu: Lectores historiam Cerris diligentius perpendant, quum arbores videbunt.

QUERCVS BVRGVNDICA, CALYCE HISPIDO.

*An Haliphlæos putata, & Cerrus femina
Dalechamp.*

*Descriptio
glandis.*

EX Burgundia glandes accepimus, non multò, vulgariibus maiores, aut certè pares, quamuis Calyx paulò maior, interim, echinatis spiculis



non rigidis tamen, satique longis horret, eo modo, quo Cerris nobis descriptæ, atque ternas & quaternas proximè iunctas, non tantum singulares, extremitati ramulorum adhaerentes: folia verò parum nobis à vulgaribus differre apparet, nisi quòd accedere videantur ad colorem foliorum Quercus pediculo breui vel sine pedicu-

lis: nec malè hæc nobis conuenire videntur cum Haliphlæo Cerris femina Dalech. & Clusii Cerris. Ne tamen fortè Lectores fallantur, addimus & Dalech. descriptionem.

Cerrus femina, inquit, caudice assurgit procerò & recto, cortice subcæruleo, ramosa quidem, sed ramis latius non porrectis, nec extentis, ut Quercus, imò breuibus, nec ita in multos furculos diuisis, ut tota arbor aspectu consp. & putata similis sit. Folia habet Cerris similia, longiora, angustiora, & multò nigriora, per latera incisuris minùs latis sinuosa, intervallo quod iacet inter margines laciniarum minùs patente, infernè superneque subaspera, tactu duriora, hyeme decidua. Glandes profert alius glandiferis minores, excepta Illice, non longas ac teretes, sed orbiculatas, & aliquantulum compressas, Cerris maris modo, ex Calycibus suis parum exsertas, qui spinis longis, flauis, gracilibus, densis, hispidi sunt, Castanearum instar, nec tamen ita rigidis, erectis, que, sed nec crassioribus spinarum mucronibus armati, ut in Cerris. Calyculi hi quibus continentur glandes bini plerumque ad singulos exortus, breuissimo pediculo ramis & surculis adhaerent. Radicibus nititur validis, non recta deorsum actis, sed vndique per transversum terram in obliquum comprehendentibus. Cortex ligno propior cum in ramis, tum in caudice & radice vehementer adstringit: folia remissius: Glandium calyces facultate cortici respondent. Glandes vehementius adstringunt & amaræ sunt: quare etiam à porcis negliguntur, nisi aliud delit pabulum. Materia arbori robusta & dura.

Considerandum nunc An non eadem Clusii Aegilops Cerris sit: quæ occasio ut hic iungamus historiam integram ex Clusio: Quercus, inquit, genus, non modò in Viennensi saltu, sed etiam in plerisque Pannoniæ sylvis frequens est, eadem altitudine quâ vulgaris Quercus, atque etiam celsiore assurgens, caudice erectiore, corticeque crassiore, & magis scabro: folia frequentioribus incisuris, sed minùs altis diuisa habet quàm Quercus, longioribus tenuioribusque pediculis inhaerentia, ramulos breuiore, frequentibusque nodis oblitos, gemmas minores, & aliquot gracilibus foliolis ceu staminibus aut villis septas: Calyces breui, crassoque pediculo annotinis ramulis adnatos, non in foliorum alis, omnino hispido, & molliter echinatos, in quibus glans est Quercus, paulò breuiori & ob-

Folia.

*Cerrus femina.
Descriptio
arboris.*

Folia.

Glandes.

Radix.

*Cortex:
Sapor &
qualitas.*

*Materia:
Aegilops
& Cerrus
Clusii.
Locus.*

Folia.

Calyx.

Glands.

Materia. tiori mictione prædita, quæ autumnæ maturitatem consequitur. Adhærent interdum inter folia, multis veluti squamis constantia capita. Rustici & materiz calores optimè eam à Quercu vulgari distinguere norant: illius materiem candidiorem laxioremque & ad opera minùs aptam censentes. Huius Cetri crassiorum atque etiam tenuiorum ramorum, ac libralia interdum fragmenta in lapides commutata, atque adeò matrice in nigrum silicem conuersa [superficie eam candida & friabili remanente] atque naturales ipsius ligni venas, orbis reliquæque formam etiamnum retinentia, non modò eruta conspexit Clus. & Ill. Herois Dom. Balth. de Bathyan munere habuit, sed seipsum etiam legisse meminit in môtis Eysenberg vulgò nūcupatæ & Pinkæ fluuii Pannoniæ imminentiæ acclui, quæ ad vallem Pinckathal ab eiusdem fluuii eam perluentis nomine nūcupatam, descensus est atque ad Austrum spectat. Obliuio olim is mons fuit [quemadmodum adhuc vicini] Quercus & Cetri arborum syluis, nunc verò vineis generosissimæ vini feracibus.

Synonyma. Cetri Plin. minore glande & Calyce mollius echinato Lob. & Quercus Iustinopoli allata à Valer. Doures, calyce minore hispido eidem Clus. iudicio. Theophr. est, Cetri Plin. Quercus genus cum calyce hispido. Quercus Pannonica lat. folia & redius Cetri. Cener. Quercus 5. genus Dalech. apud Hist. Lugd. Haliphæos Idæorum & Macedonum, Cetri sem. quorundam Italorum Farnia, Galis iniqua, Latino nomine caret: quare Plin. Græcum semper usurpauit: Gaza ineptè *Salsicortis* nomen finxit. An Cæsalp. Quercus, in Hetruria Farnia: Deyos 4. genus Theoph. Fagus, Farnia in montibus, Maced. Fagus Cetri Plin. altera Taber. Dodæconem habet Lobelii, nomine Agilopis, minore glande, verum nihil ultra. Caspar Bauh. præter Cetri magno calyce echinato, duas alias tradit his verbis: Quercus calyce echinato altera, Haliphæos Idæorum & Macedonum, Cetri Plinii minore glande Lobelii, cuius lignum sæpè lapideum: Huius etiam species in Burgundia reperitur minor, calyce valde hispido, quam apud fratrem Io. Bauhinum vidimus. Copiosè nascitur in Apennino, & in Burgundia quæ itur Vesuntio Dolam, vnde nobis Nobiliss. D. Frid. Cappler gubernator Insulæ oppidi, dicti *L'île* attulit glandes & ramos, quos tamen iam priùs in pileo cuiusdam videramus. Glandes in hortum E. C. V. Virt. Month. feri curauimus, spe bona nascituras. Proderunt quidem aliquæ, ast vna solummodò remanet quæ pluribus annis à nobis culta tandem glandes protulit: sed non quales sperabamus. Fuerunt enim cum longo pediculo, & calyce non echinato. Nec propterea imaginamur nobis metamorphosin aliquam veteribus & recentioribus consuetam, sed suspicamur cum illis glandibus alias fuisse admixtas.

Locus. Sed nunc vires Quercu in genere recitemus. Quercus omnis (poss. & dicere, omnibus suis partibus) autore Dioscor. astringentiam vim habet: *Asperæ ræta surnitibus exi sicut* maximè verò astringit membranacea tunica, quæ corticem & caudicem ipsum interioret: similiter & ea quæ circum glandem est sub putamine. Harum autem decoctum datur Cæliacis, dysentericis & sanguinem excreantibus. Eodem trita fluxione laborantibus scæminis in *trita* subduntur. Sed & glandes eisdem effectus habent: vrinam quoque cient, & si comedantur, capitis dolorem in-

Vires & Vfus. Quercus in genere. Calycis. Dysenteria sanguinis spurci. Menfes. Vrinam cient glandes. Næca.

ducunt & flatus efficiunt: efficacè verò virus calculantium scitibus resistunt. Earum quoque & corticis decoctum contra toxica prodest, ex lacte vaccino potum. Cruda autem ac intrita inflammationes illitu leniunt: cum axungia verò suilla salsa, ad malignas duritias & malefica vlcera conueniunt. Hipp. ad suffocationem matricis in suffitu vult foliis Quercus.

Eadem pendè & Gal. confirmat, qui sic habet: paucis immutatis & additis alius nouis. Quercus (*Spur*) partes omnes, astringentis qualitatis participes sunt. Sed plus tamen habet quæ in truncis cortice membrana subest, tunc quæ sub glandis ipsius calyculo, ea videlicet quæ fructus carnem conuegit. Quamobrem ad profluuium muliebri, & sanguinis exuptiones tum Dysenterias & diuturnos ventris fluxus commodè esse credunt. Maximè verò vtuntur eâ decoctâ. Valentius tamen astringunt Phagus & Ilex (*Spur & spur*) seu quis eas species *Spur* velit, seu toto genere diuersas. Quin & folia harum plantarum tenella illita strenuè desiccare valent, minùs autem quæ sunt alterius *Spur*, nimirum quando minùs sortita sunt astringentis. Siquidem ego quandoque glutinasse me vulnus memini, securi infictum, cum nullum adesset ad manum medicamen præter ipsius Quercus folia: Tetrahæm ea iam petra, & vulnus omnemque vicinum locum contaxi. Eandem cum foliis vim habet & fructus *Spur*, eoque medici nonnulli ad incipientes & crescentes vltur phlegmonas. Nam quæ tam vehementes sunt, astringentia respondent. Delicentigitur & astringit Quercus: exallesiendi autem paulò infra media, in genere solent curari, quæ [vt sic dicam] tepida sunt. Medus cortex Quercus inquit Matthiol. & tunica interior glandis, in aceto & aqua decoctus, & supra ignem factum impositus, calorem tollit. Mulieres quæ vrinam difficilius reddunt, carbonem Quercinum candentes aspergunt vino, & per infundibulum vaporem in vterum recipiunt. Ad ardorem ventriculi sume folium quercinum, supra linguam ponas, humiditatem quæ exprimitur ex eo, deglutias, iauabit. Folia Quercus imposita feruidis pustulis, calorem compescunt & sanant. Mulieres quibus menstrua redundant, folia Quercina decoquunt in aqua, ac inferiores partes fomentant. Eodem modo & glandes administratæ iuant.

Folia & cortex ac calyces glandium sicci, sunt ad tertium vique gradum adstringentes, vt vult Dod. eiusdem etiam temperamenti sunt glandes, nisi quod calidiores & minùs astringentes. Cortex Quercus in puluerem tritus, vtilis est puerulis aduersus vermes. Valet etiam ad gonorrhæam. Io. de Monte experimento glandes contulæ & potæ vrinam promouent: mirum quæ id vi, quæuisidem & Dioscor. dicat. Aqua è tenera ac recès prorumpente Quercus fronde, aut immaturis glandibus destillata, iisdem donata facultatibus, quibus decoctum, pueris maximè in commemoratis affectibus exhibenda. Locinoris defluxiones sistit, renum calculos comminuit si Matthiol. credimus & mulierum alba profluua cohibet.

Decoctum ligni Quercus inquit Lonic. mixtum cum vino & potum, vtile est sanguinem spuentibus: Aqua medio Maio ex iuuenis Quercus foliis destillata, & singulis vicibus ad drach. iij. pota medetur profluuiis albo laborantibus, pûsque excreantibus &c. Non probamus quod scribit propellere sanguinem concretum, nec etiam in punctationibus lateralibus, nec in calculosis.

Tenica.
Inflammationes.

Suffocatio
matricis.
lib. 6. simpl.
med.

Vulnus.

Experimentum
tam Gal.

Phlegmonæ
cura.

Temperata.

Ignis sacer.
Vrina difficilis.

Ardor Ventriculi.

Feruida
pustula.
si en trita
superflua.

Vermes.

Vrinam riu
Aqua stil-
lat. 612.

Hepatis
defluxio.
Menstrua
alba.

Dysenteria pestilens. Horstius ad Dysenteriam pestilentem præscribit aquam foliorum Quercus & decoctionem cupulacum glandium cum Amygdalis. His qui à venenatis animantibus aut serpentibus morfi, veliæ fuerint, quive venenum hauserunt, vel cantharidas biberunt, ita ut sanguinem mingant, glandes in puluerem redactas bibant, ac sentient opem, Tragi experimento.

Sanguinis fluxus. Quidam glandes andas aduersus calculum exhibent, quo successu, nescimus. Quidam & cereuissiam ex foliis Quercus parant, eaque vtuntur in Dysenteria pro singulari experimento, vt scriptum reliquit Placotomus de natura Cereuissiarum. Neque id ratione caret. Adstringendi enim facultate cum polleat, & aluum sistere, & omnis generis fluxiones suppressere potest, & prædictis pluriusque affectionibus accommodari. Eodem teste, corroborat ventriculum, iuuat retentionem, prouocat urinam, & quibusdam Dysuria laborantibus præsentem fert opem.

Sputum sanguinis. Quidam aduersus sputum sanguinis decoquunt folia Quercus in aqua plantaginis, & bibunt, teste VVitichio. Folia Quercus tenera & rubicunda vino decocta, colluta ac gargarisati, dentium dolorem sedant à fluxionibus obortum, sed sæpè hoc decocto calido uti solent, quo experimento nos sæpè fortissimè vti fuisse, etiam in inuestigatis dentium doloribus, testamur. Cupularum & corticum arboris decoctum, idem præstat.

Dysuria. Ex vicinis locis Monthelegardo & Bessfordia solent adferre cortices, ex iunioribus potissimum Quercibus vulgaribus detractos, & in scobem ferè tritos, quos plerique Canellam ironicè vocant Coriariorum: his enim sua coria præparant: Prontruentes, prout nobis indicatum, sua coria parant cum corticibus Abietis, verùm ea coria aliud non ita firma, sed molliora.

Canella coriariorum. Querna folia exhibet Bobus in pabulum Columelia. Quæ Cato non peranda animalibus dari iubet. Democritus verò apud Apfirtum, serpentes emori, iniecta fronde Querna dicebat. Radix etiam mingatim contrita, contra Hydri morsum prodest, cuius decoctum, cum vaccino lacte potum, contra toxica valet, & serpentis plagæ illinitur. Carbunculum autem, quernæus tritus carbo cum melle sanat. Ad eò in rebus quoque damnatis, vt eleganter Plin. ac iam nullis, vt in hoc carbone, aliqua sunt remedia. Ligni Quercum eiusque differentiarum usus diximus supra in differentis Veterum.

Carbunculus. Addantur & ista. Cyprii, inquit Theophr. carinam tricenis Quernam subiungunt, vt eum in terram attrahitur resistere possit. Nauibus oneratis Piceam atque Quernam [& Syon] subiungunt, cum extrahendas ædificant. Nec Piceæ nec Abietis Quercus conglutinari valet: altera enim spissa, altera rara, altera materie æquabili, [& quædam: similis Gaza ad verbum,] altera nequaquam. Roboris materiem pro iudicis commendat Cato. Carbores optimos, ex Syon, tanquam materie spississima fieri, author Theophr. solidissimos etiam esse ait, & efficaciores cæteris.

Ad tria. Cur à Matthiolo laudentur Carbores Quercini ligni pro mulieribus urinam difficulter redentibus, nescio, sunt carbores aliarum arborum, qui præferendi videntur: nos præterea contra toxica assumpta, non velimus exhibere decoctum corticis Quercus, licet præscribat Diosc. potissimum in principio, si tamen vomitus, vel fluxus alui multum vexent, reiecto toxico per vomitum, vel aluum prodesse tunc posse existimamus.

Carbores. Cur à Matthiolo laudentur Carbores Quercini ligni pro mulieribus urinam difficulter redentibus, nescio, sunt carbores aliarum arborum, qui præferendi videntur: nos præterea contra toxica assumpta, non velimus exhibere decoctum corticis Quercus, licet præscribat Diosc. potissimum in principio, si tamen vomitus, vel fluxus alui multum vexent, reiecto toxico per vomitum, vel aluum prodesse tunc posse existimamus.

Scandula, tradente Plinio, è Robore aptissima, mox è glandiferis aliis, Fagisque.

Goropius vir multa lectionis, & admirabilis antiquitatum vestigat ut tradit Crucem Christi fuisse ex Quercu, non ex variis lignis, vt quidam prodidere. Ideò & alibi, Quercus lignum, vitæ appellat. Xerandilæ, eodem teste, in pede montis Vaccæ faces parant ex bacculis Quercinis excorticatis & contulis.

Nec prætereundum Alexand. Macedonis inuentum seruandæ niuis in scrobes, vbi ea sit, coniectis à Quercu ramis. Roboris cunei vsu ad emendandam Amygdalæ arborem vinolam vide cap. de Amygdalo.

Sanè Quercini ligni vsu nemo facillè declarabit. Vix enim aliud habeas in hoc nostro orbe perennius, quòdque ad plures vsus necessarius accommodari possit ac soleat, vt ad ædificia, naues, & instrumenta tam ea quæ in terra quàm aquis vsui esse possunt. Fiunt & ex ea dolia vinaria cæteris omnibus præstantiora, immò vel sola ferè bona. Vetustate nigrescit. Si Querno cinere murium aditus obturentur, eos scabie confici ac deinde perire proditum est.

Sed glandium vsus quoque præcipuus, quarum appellatione Vlpianus & Caius I. C. ti censent omnes fructus contineri, vt iuglandes, Diuiglandes, & iugli, quoniam his homines quondam vivebant. Qui frugibus repertis vescuntur, glande obtutuisse, prouerbio antiquo iactatur. Primum tamen homini cibum inde fuisse, inter omnes penè conuenit: Virgilian Culier.

*Quercus ante data Cereis quàm semina vitæ
Ias Triptolemi inuit aut sulcus aristas.*

Et alibi:

*Heu magnum alterius frustra spectabam aceruum
Coniungatque saniem syluis salubere Quercu.*

Lucretius:

*Glandiferas inter curabant corpora Quercus
Et sedare sitim, fluminesque ducere.*

Bætiæ.

*Nam qui lingua uergantibus
Sulcis semina credidit
Et sus Cereis fide
Querna pergat ad arbores.*

Theocri. Schol.

Et terram calcans propriam ne desere Quercus.

Glandium cibus tam frequens olim Arcadibus fuit, referente Pausania, vt quo tempore monuit Apollo Lacedæmonios, ne Arcades bello lacesserent, hunc illis victum è glandibus attribuerit.

*Glande satur multa obijcet tibi plurimum Arcas,
Nostra tui non sunt contraria nutrima capiti.*

Pelagus cum regnare cepisset, primum quidem rudes homines docuit tuguria facere, ad frigoris imbrumque & æstus incommoda arcenda. Ille idem tunicas conficere à pullis coriis instituit. Ad hæc cum vulgò virente adhuc fronde herbisque ac radicibus, non modò non cibariis sed plerumque perniciosius vescerentur, salubriores multò glandes esse, neque omnes, sed quæ sola Phago legerentur persuasit. Hæc ciues in oppido Chio obsecillos vixisse tradit Cornelius Alexander, inquit Plinius. Quoniam verò glandium cibus tam vulgatus fuit Arcadibus, eos Plutarchus non ineptè Glandiphagos, βαλανόφας, vocauit: apud eos voracitas in summa gloria fuit. Alii verò glandium collectores mercede conductos balanistas appellabant.

Legimus apud Strabonem, in Lusitania montanas gentes glandibus vixisse. Quin & apud Plin. vt dicebamus, quosdam inopia frugum arc-

Scandula.

Goropius.

Cruz Christi.

stax Quercus.

ca.

Lignum co-

ra.

Faces Quercus.

ca.

Alexandro.

muertum.

seruanda.

nam.

Emendatio.

Amygd.

Contra.

males.

Glandium.

sfus.

Diuglan-

des.

ingli.

Adag.

Fagi glandi.

Arcades.

glandiphagos.

St.

Balanistas.







dentes foru. Omnes Capillos denigrant.

Menses. Gallarum vires memorix prodidit Galeus l. 7. simpl. med. sic iniquiens. Galla omphacitis admodum acerbum est medicamentum, pluraque sui parte essentia terrena & frigida: perquam desiccatur, & fluxiones repellit: ad hæc constringit, contrahitque partes laxas, & languidas, omniumque fluxionum affectibus strenuè resistit. Esto igitur tertii in desiccando, secundi autem in refrigerando ordinis. Altera autem galla, flaua illa, & magna laxaque, & ipsa desiccatur quidem, sed tantò minus, quantò minus acerba qualitas est particeps. Coctaque per se ac deinde trita, cataplasma est non instrenuissimum sedis phlegmonarum ac procidentiarum. Porro coquenda est, si modica opus sit attritione in aqua: si vehementiore in vino. Ac si augere insuper adstrictionem sit opus, vino vitæ austeriori. Denique Gallæ combustæ sanguinem reprimendi facultatem acquirunt, ac nimirum etiam calorem & acrimoniam ex vitione assumunt, suntque iis quæ ignem expertæ non fuerint, tum subtiliorum partium, tum maiore desiccandi potestate.

Galla Auicennæ est frigida in primo gradu, sicca in secundo: Dodonæo frigida & sicca ad tertium usque gradum.

Lucilius ut Fest. Pompeius attestatur, cum gallam fore bibendam pronuntiabat, parsimonia utendum esse, ventremque coarctandum, nec gulæ indulgendum esse insinuat.

Ex omphacide galla, calcantho, gummi & vino Matthiolus atramentum scriptorium parare docet hoc modo. Sumito gallarum crassissimæ contritarum, vnc. v. calcanthi Romani vnc. iij. Gummi Arab. vnc. ij. Salis drach. j. concutiantur hæc omnia in fictili vitreo circulo: superfundito vini albi potentissimæque lib. v. & vnc. iij. oclulo vasis ore, quindecim dies insolato, vel post vaporari fornacem lientem reponito, miscetque quotidie rudicula.

Restat tandem vitæ quæ de viribus & usu gallarum Lonicus annotauit, subiungamus: Gallæ ait, adstringunt, glutinant, tingunt. Vis & facultas eis qualis Quercui. Flor gallarum, aquæ sanguinæ immixtus, & naribus instillatus, sistit hæmorrhagiam. Medium in gallis contentum excauato denti applicatum, dolorem eius lenit. Gallæ in puluerem redactæ, sordidisque viceribus insperstæ, putredinem arcunt, vulneraque mundificant. Gallas si cum ouorum albuminibus commisceas ac emplastrum conficias, inferiorique ventri superponas, aluum sistit. Vehementer etiam pulvis cum aqua pluuiali bibitus fluxilem constipat ventem. Cui vomitus frequentem molestiam parit, is in aceto & pluuiali aqua gallas coquet, eoque decocto linteum aut pannum imbibere permittet, vultu autem imbibitum ventriculo linteum admovent. Quæ mulier nimios menses patitur, in aqua pluuiali gallas coquat, cui succum plantaginis addat, & cum bombace suppositorium fornet, vulvæque indat, sistit enim hæc menses, & mirè prodest. Hæmorrhagiæ laboranti gallæ miscentur cum succo plantaginis aut Butiræ Pastoris, imbuuntur in hisce succis pili leporini, & ita interdum, linteolum, naribusque imponuntur. Emplastrum etiam ex gallis cum albumine oui temporibus applicatum, inhibet fluxum narium. Pulvis gallarum vulneribus inditus, manantem adhuc sanguinem ita comprimit, ut non sit opus illa suere. Tu qui nigros efficias capillos, gallas recipito crassas, nigras,

Tom. L

non oculatas, quas in oleo coquito: facta coctione oleum colaturâ separato, gallasque soli exponito, donec siccate sint. quò facto hunc puluerem cum aqua pluuiali iterum coquito, crinesque decoctione lauto.

Et capillos denigrat.

GALLAE SIMILE EXCREMENTVM QUINQVANGVLVM BRASILIANVM.

Mittebant (inquit Clus. Erot. lib. 1. cap. 25.) pro fructu decimo, qui delatus à Brasilia dicebatur: sed arboris excrementum al. quod instar gallæ vetus nuncupandum censebam, quàm fructum: simili enim materia constare videbatur: & gallas similis penè formæ vidisse memini. Vicia autem minor erat, quinque angulis sicut alis constans, supernâ parte aliquantulum protuberans, & à centro ductas habebat quinque lineas ad externos usque angulos: infernâ longior erat, sensim gracilescens usque ad sedem, quâ rimo inhesisse videbatur.

PILVLAE FOLIORVM QVERCVS.



Quercus hic pilulas datus, parte tabellæ interiore: superior enim Quercus nilos ostendit, ad caput huius inuicem referendos. Hæc autem pilulæ magna ex parte auctis foliis, hoc est, parti terram spectanti adnascuntur, plures interdum unico haerentes folio proximè & immediate, laues, fungosæ, pallidæ, sapore subacido & astringente.

Gallæ non duram acquirunt sed molles & fungosæ manent: exquisitè rotundæ sunt magna ex parte, & exigua gallam raro æquant, verustatèque corrugantur. Et in his, si autumnus calidior fuerit, vermiculi nascuntur qui postmodum in cubellos transfiguntur. Nascuntur autem & ipsæ pilulæ magna ex parte autumno aduentante, ac post primos autumnii imbres. Aridæ & inueteratæ digius facili in puluerem attrahuntur, quibus notis faciliè à gallis distinguuntur, ne quis easdem cum iis putet. Videntur autem ex ipsa esse, quas Theophrast. in foliorum tergo candicantes, translucidas [Simplicius: aquosas,] quales & hæc nostræ in principio sunt [quandiam molles sunt, in quibus & culices nascuntur. Sed, quod ait, maturecentes in modum paræ & leuissimæ, indurari, id in nostris non obseruamus, fortè quia in his regionibus, ut alibi, non perfectè maturantur. An pilulæ Onocidis Galeni: Ita sanè Tragus iudicat. Gallis similes Pilulæ Cordo & Hist. Lugd. Galla in folio Quercus nascens. Quidam & Gallôpsel ut Mat-

An pilula aquosa Theophr.

Pilula Onocidis Gal.

H

Præcipi.

quante sinistro in latere rotundas & candidas ostendant (quamulas easque caducas. Cūque hi flosculi (sic enim à rusticis ex squamulæ nominantur) apparent spem omnes concipiunt, copiosi sequenti anno glandium prouentus.

EXCREMENTVM QVERCVS
TVBEROSVM.

Descriptio

Mains & Mimus.

Ligneæ penè duritiæ & veluti ex plurimis bacis & vuarum specie aggestum excrementum bis tantū in quercu offendimus, vtrumque canum & cauernolum, sed minus: maius minutissimis & rigidis spinulis hispidum, colore ex rubro in pullum ac fuscum tendente, plusculis foraminulis à vermiculis vtrumque pertusum. Sapor astringens. Nonnulli ad Theophrasti *συκωνιάς*, hoc est quiddam Mori seu Sycamini speciem gerens referunt.

GEMMÆ FORAMINVLATÆ FOLII
QVERCVS.

Descriptio



Non curiositas est hæc à nobis describi. Nihil aspectu pulchrius: minutissimæ ac innumera propemodum foliorum dorso adherent [studio agglutinatæ dicæ,] veluti minutissime sphaerulæ corollares compressæ, in medio pertusæ sed non ex toto, colore ex Dysfino in fuluum nitente, eleganter splendicante, ac si holoserico subtilissimo obductæ essent. Supra centum triginta in vno folio numerauimus. Autumno obseruatæ in vulgaribus Quercubus prope Bessordiam & alibi, ac etiā in eodem ramo capitula squammata antè dicta.

NODI SEV VERRVCAE QVERCVVM.

Intra quercuum corticem interdum inuenias, velut glandularum in homine *αδένες*, lignosos nodos atque verrucas materie prorsus Querna, crispa & eleganti, proprio cortice, præter Quercinum, coque rubro atque fungoso obductas, magnitudine & figura varias. Vidimus pugni magnitudine, item avellanæ, ac inter has medias. Aliquando etiam foras prominent, haud secus ac verrucæ in manibus, alimenti argumento luxuriantis.


QVERCVS ALBV MEN.

Scaliger in lib. de plant. falsè Aristoteli attribuit, vbi autor ille variè differit de analogia plantarum cum animalibus, illarumque partes cū
Tom. I.

horum comparat) ait: omisit albumen in quercu quod cū animalis pingui potuit comparare. Quale autem illud sit, fatemur nondum nobis innotuisse.

VVA QVERCINA.

Radicum Quercus fibris sub terra adnascitur & circumnascitur luglandis magnitudi-



ne, ex pluribus veluti acinis racematim coherentibus [vnde ei vva nomen] compacta, substantiā durā, intus rubentis seu ferruginei coloris, medullio nonnihil albo, sapore insigniter acerbo & astringente. Meminit Encelius per Ver, quo tempore vegeta est, colore foris esse purpureo, intus candido & quasi lactifero. *Descriptio*
Ergasterium
Locus & Tempus.

pore veris colligi debere, & sicari in umbra, & deinde pulueritari: in æstate perire, & fieri quasi ligneam: ita à se obseruatum testatur. Cl. D. Schenckius Medicus apud Friburgenses celebr. ad nos misit his verbis: Vva Quercinæ vobis mitto radicales: amanuensius meus ante triennium casu, dum aliis herbis eruendis intentus esset, sub Quercu ex eiusdem radicibus in monte proximo, Orientem spectante, & vrbi vicino, nobis vulgo Burthalden dicto, effossas. Vva Quercinæ puluere nihil [expertus loquor, inquit Encelius,] præsentius in Dysenteria & in omni fluxu sanguinis. Desperatos Dysentericos aliquot curauit illa vva quercina: meritò ergo digna est omni laude. Habet & alias virtutes, de quibus Medicis est cogitandum. Solenander testatur, succum vva quercinæ magno solatio illiniri Podagricis. *Vires & Vfus.*
Dysenteria Fluxus sanguinis.
Podagra.

FVNGVS VEL AGARICVS
QVERCVS.

Nascitur etiam in Quercuum caudicibus Agaricus, quem aliquando vidisse meminimus colore in fusco subcinereo, [si probè meminimus] annoso Quercui adnatum. Hunc inquit Camer. recentem sale condiunt nonnulli indeque loco calido reponunt: succum emanantem Podagricis illinunt. Sed ad id efficacior putatur Vva quercina, vt testatur Solenander. De Agarico quercuum copiosius agemus lib. 9. capit. de Larice. *Descriptio*
rfac.

Tradit du Choul quercus fungos producere, sed esse, qui parum probent.


De Polypodio in quercu proueniente, quod aliis præfertur, alio in loco agemus, vbi eorum sententiam reprobabimus, qui plaris faciunt.
H

quàm murale: Ibidem scribemus de Dryopteride
à Quercu dicta.

EXCREMENTVM QVERCVS
PYRGANS.

Antiqui, inquit Lobel. cuiusdam ē Quercu,
instar Ledi pullulantis, meminerunt excre-
menti, quod purgat & adstringit summopere.

MVSCVS QVERCVVM, ET ALIA-
RYM ARBORVM.

Descript.

Fert & Muscu
Quercus, ne
vel in minimo
suo officio de
fuisse videatur.
Hoc nonne si-
gnificantur cani-
cus, extetatum-
que arborum
villi, exterius ar-
boribus adhz-
rentes, aut ex iis
pendentes, ex iis
tamen enati, aut
adnati sine radi-
ce, sine flore, si-
ne semine. Nos
exhibemus icon-
nem, qualem
Lobul. exhibuit
hoc titulo :

ris cum glande & musco suo. Differunt capit. iii
d. nite, exilitate, figura & diuisione: Item odo-
re. Græci *σφαγνόν σφαγνός, σφαγνός, & σφαγνός* vo-
cant. Soranus *βόρ σφαγνός*, Sphagnos, siue
Spacus, siue Bryon & in Gallia nascitur, inquit
Plin. Sunt qui Splachnon & Hypnon appellant:
Arabes *فسفام*, quarquam Phauotinus *φάουτος* τὸ
ἐξ ὧν ἐστὶν *σφαγνός*, exponit. Diosc. *βόρ* à quibus-
dam *σφαγνός* vocari tradit. Idem & Gal. & Pau-
lus. Sed Plin. alibi, Sphagnon alius Bryon dici ait:
eisdemque hoc nomine Canos arborum villos, qua-
les in Quercu maximè videmus. Muscum aliqui
Officina, Arabes secuta, Viscam vocant. *Ανσκή*
etiam Arab. Bohemice *Wsch*: teste Matth. Germ.
Baumwag. De reliquis Musci differentiis, ut de
terrestri diuersarum specierum, & de Marino tra-
detur in fine operis.

Locus.

Musculus inuenitur in arboribus Cedro, Populo alba, aut Quercu.

Definition.

Præstat verò Cedrinus : proximus huic popul-
neus : quo in genere probatur , qui odoratio est
& candidus : nigricans autem deterior censetur :
Diosc. Sphagnos in Cyrenaica provincia teste
Plin. maximè probatur : secundum locum obtinet
Cyprius, tertium Phœnicus. Fertur & in Ægy-
pto nasci, quin & in Gallia, nec dubitauerim. In
Quercu maximè videmus odore præstantes. Hæc
Plin. Alii tamen Cedrinum. Lariceum & Piceum
primæ nobilitatis dicunt, quod odoratissimi sint,
Quernam omnium vilissimum pronunciant, præ-
ter eum qui saxi & vdis terræ glebis adnascitur,
quum à natâ atque parente suo muscus naturam
mutuetur. Du Choul in lib. de Quercu scribit : In
Quercu maximè annosa muscum gigni, in Gallia
nullo suavi odore esse.

Diosc. Muscus adstringendi vim habet in ca-
lidity ac frigiditate medius, facitque decoctus
in sellu ad vultus affectus. Miscetur & vnguentis
balaninis ac oleis seu illitibus, propter eam, quā
præditus est, spissandi vim. Est & ad sustitum &
acoporum medicamentorum præparationes vti-
le & accommodatum. Serapio epotum vinum re-
tulit, in quo diebus aliquot Vinea maduerit, al-
tum somnum inducere, ventriculum roborare
vomitiones compescere, & aluum sistere. Adhuc
Muscus, ut inquit Auic. vtiliter inter cordis medi-
camenta insensur, quodd odoris fragrantia animi
defectus iuuat. Ad Dysenteriam, inquit Matth. &
proflauium ventris coquatur muscus arboreus in
aqua aut vino rubro & detur in potu. Puluis mu-
sci Querni exsiccatu assumptus cum ouo impe-
dit ab abortu. In vino acerbo coctus, gargarisatus
facit ad dolorem dentium, & relaxatam vuulam.
Muscum cohibere sanguinem obseruatum est in
vris, qui cum primū vulnerati fuerint, sangui-
nem reprimunt musco. Quidam muscum Quer-
cūm eligunt, macerant in vino per noctem, &
bibunt contra Icterus: alii & in calculo pro-
bant.

Monspelienses ex Musco Quercino aut Illicis alteriusve arboris resinam non ferentis, parant cantatissimum & praestantissimum illum puluerem Cyprium appellatum: quem etsi pro magno secreto meritò habeant, à Clariss. tamen Illustriss. istius Acad. Professore & Medico quodam nobis communicatum, perlubenter ita communicabimus, ut faciliè à quovis industrio Pharmacopœo ad illorum imitationem parari possit. Ergo Muscum aëllatis initio lectum & probè mundatum sacculo linteo tenuique inditum limpido rivulo vel torrenti immergunt per triduum, sæpè pedibus conterunt, ut albescat: tum aqua fontana e-lotum & in umbra resiccatum aqua ros. & florum Citrangi per sex continuos dies irrorant, vel alternis vicibus, vel de singula triduo, incipientes ab aqua ros. his singulis diebus mouendo, ac rursus, ut prius siccat permittunt: Sed arcam habent seu capsam studio ad id factam, cratibus vel aliterbus pertulis interstinctam: his muscum imponunt, & in uno supposito styrae & Benioino perfumant ter in die probè clausa arca ne quid euaporet: sed singulis vicibus mouent & mutant, donec fiat siccissimus, quod biduo aut triduo fieri aiunt. Tum in amplo mortario tundunt & setaceo embrant, addendo ad quatuor huius pulueris libras, libram semis pollinis Santali muscatellini: quidam & albiſſimū sacchari vnc.ii. ad-
diciunt, ut albidior euadat. Hæc massa & veluti prima materia est pulueris Cyprii, odorata quidem sed longè præstantior futura si singulis libris addatur Cibeti & Moschi ana. drach. i. sem. ambræ griseæ scrup. i. ac probè in mortario agitentur & misceantur. Alii aliter parant, & præstantiorem additis ad singulas vnc.iii. prioris materiz, Cibeti drach. i. Ambræ & Moschi ana. drach. f. Hunc magnatibus vendunt magno pretio. Prioris, aureo nummo singulas vncias. Nos adhuc optimum habemus à pluribus annis. Scimus & alios parandi modos Italorum & Hispanorum. Sed quilibet sua industria faciliè addere ac minuere potest. Res est experimenti ut cæterarum ferè omnium mixtionum. Ad hæmorrhagiam narium Muscum, qui crant is hominum aëri expositis adnascitur, in subtilissimum pollinem redactum multo præstantiorem esse non rarè experiri se scribit Hildanus. At ego non video cur præferat querno, cum verisimile sit quercum magis ad-

foliis, consideratâ præsertim naturâ Quercus
& potissimum corticis.

MELLEVS LIQVOR QVERCVS.

Celebratur Quercus ob melleum rorem [apud Theophrast. & Plinium ex autoritate Hermolai, ut ante indicatum] qui in eam cadit: verum pluris facienda Quercus ob prodeuntem & erumpentem liquorem, de quo Cordus c. de Oleomelle in Dioscor. lib. 1. cap. 37. dum inquit: Apud nos veris tempore è Betulæ & Quercuum caudibus sponte sua distillare humorem liquido melle crassiorem, ad quem apes & id genus insecta conuolent, est enim gustu dulcis: sed nauseam gustantibus affert. Alliciuntur eius dulcedine agrestes pueri nonnunquam, sed postquam tantillum degustauerint, nausea & capitis dolore corripuntur, qui superueniente vomitu paulò post soluitur. Porro hunc liquorem Oleomel esse nequaquam affirmamus, sed similem aliquem in nostro orbe genitum. De hoc liquore sortè poterit non malè dici ex Virg. Eclog. 4.

Es dura Quercus sudabunt roseida mella.

DE VISCO QVERCVS ET CÆTERARVM ARBORVM.

Descript. **C**atillonem dicas Viscum, nutrimenti alieni præceptorem, ut quod non nisi arboribus innascitur, neque iis omnibus promiscue: quoniam verò optimum in Quercubus, omnium Medicorum testimonio prouenit, libuit post quercum eius historiam proponere. Multis autem stolonibus fruticat, cortice tectis coloris herbacei ac interdum flauescens, minimi digiti ferè crassitudine, nonnunquam crassior, quos intercipiunt genicula, è quibus rami frequentes propagantur nodosi & ipsi, simulèque sibi lobolem procreantes ramulorum bina opposita, Portulacæ foliorum forma, oblonga, per extremum rotunda ferè, coloris herbidi, crassa, nervis rectis, Plantaginis pentanetra modo secundum longitudinem donata, saporis subdulcis & subacris. Flores, tum ad genicula, tum extremis ramis hærent, parui, lutei, quadripartiti, qui in baccas abeunt confertim coaceruatas, vix crispæ suppare, eodèque modo striatas, albicantes, pellucido lento ac tenaci liquore plenas, odore quodam grato, vinoso, sapore iucundo: quibus immersa sunt grana nigra, singulis singula, lata, compressa, cordis effigie. *ixia* Viscum dicitur Aristoteli, unde Latinis Viscum manasse putant. *ixia* Theophrast. quod nomen ait esse commune, *ixia* verò Arcadibus, *ixia* Euboicis dici. *ixia* Hesych. Aliud est *ixia* siue *ixia* venenum: quod si Matthiol. considerasset non in eundem cum Plinio errorem impegisset, *ixia* venenum, viscum Chamæleonis albi exponens, quando ait in com. in Dioscor. *ixia* ut superius L. 3. retulimus, lenta & visci modo tenax est lachryma, quæ in chamæleonis albi radicibus agglutinata reperitur. Sed de hac re fusius suo loco. Arab. *Debach.* & *Dabach.* & *Hele*, Lat. *Viscus* & *Viscum*: *Viscum Quercinum* Offic. Germ. *Mistel* / *Eidenmistel*, *Diffelster*: Belg. *Marenzaden*: Gal. *Guy*: It. *Vischio*, *Pania*: Hisp. *Liga mordago*: *Muerdago de roble*: Boh. *Melj*. Vng. *Say gyongy*. Dicitur & *omnia sanans*: & Germ. *Seil allen schaden* teste Trago: Angl. *Mistletoe*. à Chaldaïs, ut legitur Tom. I.

tur apud Alb. Magnum, dicitur Luperax, à Græcis *Elisena*. *Sind lyme* quod ex acinis eius sit. Hoc est Viscum ut ait Plin. pennis autem tactu ligandis, iuglandis oleo [Glandis oleo. C.H.] subactum, cum libeat insidias moliri: de quo postea. Inde Adagialiter Plautus in Bacchidibus: Viscus merus vestra est blanditia: nempe ad me capiendum illecebra, & tendicula. Idem eadem comedia: Tactus sum vehementer visco: cor stimulo foditur. Sunt qui autem illum ramum, quem Æneas apud Virgil. ex Sybillæ præcepto ex Illice decerpit Viscum fuisse existiment: coniectura hec non mala: nam & auri colore flauescit viscum, & Illici non rarè innasci solet. Audiamus ipsa Virgil. verba: Aen. 6.

Accipe qua peragenda prius: Latet arbore opaca

*Aureus & foliis, & lento vimine ramus,
Iunoni inferna dictum sacer: hunc regit omnia
Lucus, & obscuri claudunt conuallibus umbræ.*

*Sed non ante datur telluris operta subire,
Auricomis quam quæ decerpseris arbore satæ.*

Et mox.

*Discolor unde auri per ramis astra resulsi,
Quale solet silvis brumali frigore Viscum
Frondè vitæ nana, quæ non sua sequitur
arbor*

*Et cræces facti teretes circumdare truncos
Talis erat species auri frondensis opaca*

Illice.

Non est omittenda in hoc frutice & Galliarum veteris illius xui admiratio, tradente Plinio lib. 16. capit. 44. Nihil, inquit, habent Druidæ (ita suos appellabant Magos) Visco, & arbore in qua gignatur [si modò sit Robur] sacratius. Iamper se Roborum eligunt lucos: nec vlla sacra sine ea fronde conficiunt, ut inde appellati quoque interpretatione Græca possint Druidæ videri. Enimvero quicquid adnascatur illis, è cælo missum putant: signum esse electæ ab ipso Deo arboris. Est autem id rarum admodum inuentu, & reperiunt magna religione petitur: & ante omnia sexta Luna, quæ principia mensium annorumque his facit, & seculi post tricesimum annu, quia iam virum abundè habeat, nec sit sui dimidia: (etiam si non sit dimidia Dal.) Omnia sanantem appellantes suo vocabulo. sacrificiis epulisque ritè sub arbore præparatis, duos admovent candidi coloris Tauros, quorum cornua tunc primum vincuntur. Sacerdos candida veste cultus arborem scandit. Falce aurea dement. Candido id excipitur Lago. Tum deinde victimas immolant, precantes ut suum donum Deus prosperum faciat his quibus dederit. Fecunditatem eo poto dari cuicunque animali sterili arbitrantur, contrique venena omnia esse remediū. Tanta Gentium in rebus friuolis plerunque religio est. Hæc Plin.

Theophrast. verò in Visci natura indaganda non parum se torfit. Dux potissimum circa id occurrunt difficultates: de differentiis, & de crescendi modo. Fatetur Theophrast. Viscum non solum in Quercu prouenire, sed in aliis quoque arboribus: quin & alibi ait: Illex præter glandem fert & puniceum quoddam granum & Viscum atque Hyphear. Itaque contingit ipsam quatuor simul fructus ferre, duos proprios, totidèque alienos, Visci nimirum & Hyphearis. Ac Viscum quidem fert à Septentrione: à meridie Hyphear.

Hic vides eum Viscum & Hyphear apertis verbis inter se distinguere. At lib. 2. Caus. cap. 23. Longè aliter canit: Viscum siue *ixia* nomen est.

*Aureus ramus
lente ducit*

*Viscum a
lim Gallia
sacratissimum
Robur.
Druidarum
m.
Quercus à
Deo electa
putata.*

Omnia sanant.

*Viscum magis
generat
ratione longior
Druides.
Fecunditatem
tamen medicam.
Cætera Viscum
nana.*

*Dux potissimum
trouanda.*

*Viscum.
Hyphear.*

*Theophrastus
illud.*

se commune: Hyphear ab Arcadibus: Stelidem ab Euboicis appellari. Vnam esse naturam: diuersas habitudines, quatenus oritur in diuersis. Sed hoc ex aliorum sententia narrat: & addit *Arcy.* videri, non esse. Subdit tamen, quasi suo nomine, Hyphear & Stelidem, in Abiete ac Pinu: Ixiam etiam in Quercu, Terebintho aliisque plurimis. Alii tamen [inquit] differre ista inter se volunt, non leui ratione: siquidem [si vera dicunt] non solum in congenitis vnumquodque praedictorum nascitur, exempli gratia, in Abiete ac Pino: verum etiam in eadem arbore plura diuersis partibus innasci, hinc Stelidem vel Viscum, inde Hyphear. Praeterea non solum formam differre, sed & fructus dissimiles proferre. Atque id quidem passim obseruari posse, etiam in agris ac regionibus, quae plurimum inter se distant. Item aliud Viscum folio esse perpetuo, aliud nequaquam, haud esse absurdum aut insolens: siquidem aliud semper uirentibus, aliud frondem amittentibus innascatur. Ita euenire, ut in his careat alimento, in illis habeat, quantum sit satis. Hanc enim causam esse perpetuam aut deciduam frondis. Sed haec utro se modo habeant, nihil facere ad eam quaestionem, qua quaeritur, Cur Viscum ex semine in terram consito nasci nequeat?

Plinius omissa hac uelitatione securè tradit, Visci tria esse genera: Nāque [inquit] in Abiete ac Larice [Pinu Theophr.] Stelin dicit Euboea nasci, Hyphear Arcadia: Viscum autem in Quercu, Robore, Illice, Pruno sylu. Terebintho, nec aliis arboribus adnasci, plerique. Copiosissimum in Quercu, quod Dryos Hyphear vocant. In omni arbore excepta Illice & Quercu, differentiam facit odor utriusque, & folium non iucundi odoris in utroque Visco amarum & lentum. Hyphear ad saginanda pecora [scilicet *ovium*] utilius. Adiciunt discrimen, Visco in his quae folia amittant, & ipsi decidere: contra inhaerere nato in aeterna fronde. Altitudo eius non excedit cubitalem, semper fruticosi ac viridis. Mas ferulis, femina sterilis. Aliquando non fert. [Dalech. legit: aliquando verò fert.]

Quod si igitur ita est, ut Plin. tradit, & sentire videtur Theophrastus. Iam non tria tantum erunt Visci genera, sed tot, in quot arborum generibus illud innascitur. At multos, immò longè pluribus arborum speciebus innasci quàm vel à Theophr. vel Plinio proditum sit, infra patebit. Neque enim idem Viscum specie, quod è Quercu, & Illice, & Pyro, & Malo, & aliis prodit: sed tamen ut omnes Visci differentiae ad duo summa genera reuocari possint, arborum suarum, quibus innascuntur naturam imitantia: dicemus aliud esse perpetui folium, aliud folio deciduo. Atque id, cui ab arboribus alimentum suppeditetur, perpetuam frondem agere: Adnatum verò arboribus quae amittant folia: in iis quoque sentire dispendium. Quanquam hoc posterius non sit perpetua veritatis. Nam in nostris Malis & Pyris (id quod & Scal. notauit) hyemis scintilla spoliatis, videmus ne vnum quidem amittere folium. Ratio est tenacitas ipsius succi, quae suo lentore sibi ipsa sufficit. Ut fortasse illa distinctio contingens tantum sit, non perpetua. Quam verò Plin. adfert Maris & feminae distinctionem, id quod à fructus ferendi aut non ferendi argumento, de eo nondum planè constet, nec quicquam de hac re Theophr. ipsa quoque Plin. verba dubia sunt, quando habet. Mas ferulis, femina sterilis: Aliquando non fert. Quid enim hoc est dicere: Sterilis est, & aliquando non fert? quod a-

liquando non fert, de eo praesupponitur & aliquando ferre: contingencia enim sic intelligitur. Quare non sterilis. Ergo nec illa quidem differentia pro vera ac perpetua stabit. Ac ne quidem si cum Dalecham. legamus: aliquando verò fert. Nam quod aliquando fert, is nemo facile sterile dicet. Nisi quis fortè imaginari velit sterilem nasci in sterilibus arboribus (si modo existeret illa in eorum natura) fructiferam verò in fructiferis. At quid arboris fructus toto genere dissidens, ad fructum Visci? Contrarium potius rationabilius videtur, ut sterilis Viscus in fructifera arbore: & fructifer in sterili nascatur, ex ratione alimenti huc aut illuc abrepti. Sed horum neutrum apparet.

Quapropter restat eam tantum solam veram distinctionem Visci esse, quae desumitur ab arboribus specie differentibus, quibus innascitur. Nam & differentes fructus ferre proditum est.

Scaliger sanè in Valconia baccae eius aut vitides, aut pallidas obseruatas sibi tradit. In Syria rubrae esse perhibentur, ubi etiam Oleas, in quibus nascitur, interficere creditur, ut dictum in Oleae historia. Et fortè ad hoc respexerit, qui apud Theophr. Viscum non solum formam sed & fructu differre tradunt.

Sed quid Hyphear, quid Stelis? nunquid res distinctae à Visco, an huius species & differentiae, ut Plin. voluisse videtur, ac ipse etiam Theophrastus, Nam quod de eorum differentia affert, ex aliorum potius sententia narrat, quàm ex sua. Aut si res distinctae sint, cur à tot seculis, à tot post Theophr. Authoribus non ab aliquo declaratur? Neotericorum sanè herbariorum, immò ne Grammaticorum ullus hactenus nobis visus, qui non Hyphear & Stelidem sub Visco tanquam genere complexi sint. Quin & Theophr. in tota illa sua disputatione de generatione Visci, hunc saltem nominat, huius aptat rationes, non frivola coniectura ipsum hunc pro genere ceterarum intellexisse. Imò aperte eandem omnibus naturam tribuisse videtur: quando de omnibus tribus dicitur: validum & nutrimento aptum, seu, ut ille ait, *ισχυρὸν καὶ τροφικόν, ἢ ἰσχυρὸν καὶ τροφικόν*. Nam his & boues, & iumenta hoc pabulo post mellem ali atque pinguescere. Aut si diuersa sunt, cur non de aliorum semine forma ac satum egit, sicut de Visci? Cur non alius aliquis post tot secula produxit, qui illud ostenderet? Quare tantisper credamus, genere convenire Viscum, Hyphear & Stelidem, aut specie, aut suae arboris ratione differre, donec doctus & expertus aliquis doceat, vel nos vel posteritatem, quid sit Hyphear, quid item Stelis, & in qua re differant à Visco: maxime cum sciamus doctissimos etiam viros ad hanc nostram sententiam accessisse.

Plinius, nescimus an oscitantia memoriae lapsus, an ignorantia, lib. 16. cap. 30. Buxo adscribit, quae de Illice scripserat Theophr. quando ait Buxum à Septentrione Viscum, à Meridie Hyphear ferre.

Diosc. de Visco tradens, neque Hyphearis meminit, neque Stelidis: sed simpliciter fruticem ait in Quercu [scilicet *ἐν Ἰσχυρί*] nascentem, folia habentem Buxo similis: Additque gigni etiam in Malo, Pyro & plerisque aliis arboribus: atque etiam apud fruticum quorundam radices inueniri, & se vidisse testatur Brasiliolos frequentes, sed detestatus esse, & vice trunci fungi.

Scribit Bellon. inter montem Athos & urbem Ceres & Tifcala nullam esse Quercum, in qua non proueniat Viscum, omnino diuersum ab eo, quod

Perpetui folium.
Folio deciduo.

Mas ferulis.
Femina.

Plin. ubi.

Baccarum differentia.

Viscus Oleae

Plin. lapsus

Viscum in radice.

Viscus Quercus
qui dicitur
à Ceres

quod nascitur in Pomis, Pyris & aliis arboribus; nec ullum esse rusticum, qui non norit nominare Oxos: ex semine enim eos tenacissimum parare gluten. Optassimus sanè, Bellonius indicasset tantum differentiam Visci quercini illius à Visco Pomorum nostratum. Qui. n. in nostris regionibus nascitur, facie non videtur differre à Pomorum aut Pirorum Visco. Præcipua differentia virum esse putatur, quæ præstantissimæ creduntur in Quercino.

In Pinu.
In Abiete.
Matthiol. id quod in Pinu & Abiete nascitur, quodque ut Plin. ait, Stelidem [Stelin] Euboea dicit, Hyphear Arcadia, frequentissimum in Tridentino agro nasci testatur: sed hoc ad aucupia prorsus esse inutile. Quæ sanè notabilis est differentia ratio. Idem tradit id quod in Pinu, Abiete, Amygdalo, Malo, Pirisque provenit, perpetua fronde vivere. Id verò contrà, quod Quercu, Robori & Castaneæ innascitur, ut pote cui appetente hyeme omnia folia decidant. Huius rei causam colligere conatur Theophrast. cuius tamen sententia non omni ex parte præbanda videtur. N. n. & Amygdali, & Pomi, & Pyri, quæ arbores frondem hyeme amittunt, in Italia perpetua fronde vivere testatur.

Tarabella
Serap.
Apud Serap. legimus in monte Nisea ex arbore quâlibet nascente, & ab eis Tarabella dicitur, n. n. Viscum. Eius ramos decorticatos macerant in aqua per duos menses, deinde ex fortiter contulis elici Viscum bonum. Hanc verò præparationem magis sibi placere ait Tragus quàm eam, quæ à Plinio traditur. Sed miramur quomodo probare & conficere potuerit rem sibi incognitam: nec Serapionis verba nobis convenire videntur cum nostro Visco. Cur non doceat Tragus quæ sit ea arbor, quæ à Serap. vocatur Tarabella? Viscum quoque non dicitur Orea, ut existimat Tragus male Ruellium intelligens. Præterea lectores considerent, an Viscum fiat ex ligno, & non potius ac melius ex bacis: quamquam non prorsus negaverimus ex Visci furculis quoque ea ratione, quæ ab Serap. præscribitur, Viscu conficere posse, sed minus acivius.

Alia Tr.
go error.
Posteris, ut Camer. Casp. Bauh. & nobis quoque Visci differentia observata: simplex, hoc est singularibus aut binis vel paucis bacis, & Viscum Polycocci. Vtrūque pingit Camer. Nos unica nostra Fuchiani contenti essemus, rati baccarum multitudinem, quam potius varietatem censemus, non novam mereri figuram. Equidem in eadem arbore, aliquando binis vel ternis, aliquando plurimis bacis racematim coaggestis Viscum observavimus.

Viscum
simplex.
V. s. um Polycocci.
Sed nona, nec sanè vulgaris velitatio ineunda de Visci crescenti modo. Theophrast. enim eumque secutus Plin. ac omnis aded antiquitas sine controuersia putavit Viscum nasci ex ipsius baccarum semine, per aluos turdorum, palumbarum, exterarumque id genus avium, postquam acinorum pulpa intra suos ventriculos concoxere: In qua sententia & Plautum fuisse certum est, quando ait:

Ipsa sibi avium morte creat:

Turdus exitum sibi cacat.

Et

Adagium.
Nempe propter glutinum, quod ex eo fit: quo aves postea capiuntur. Inde etiam veteri proverbio in eos dictum, qui sibi ipsi extremi exitii sui causam præbent, & perditæ suæ fortunæ infelices sūt fabri. Hos omnis ferè posteritas secuta, ut sit, secutæ crediderunt rem ita se habere. Ast huic opinioni vir summus & acutissimus Scaliger se opposuit, multis nixus rationibus.

Sed lubet prius Theophrast. rationes audire, ne indicta causa condemnatus videatur: idque summam tantum.

Mirandum, inquit, & absurdum atque *paradoxum* videtur, quasdam plantas in aliis oriri plantis, in terra non posse, ut Viscum, Stelis atque Hyphear. Namque arbor ex qua Viscum oritur terræ vicem gerit. Tanto igitur magis terre debuit, vera mater, ipsa scilicet terra, præterea cum tam multum ac validum fructum pariat. At omne Viscum in arbore nascitur: nullum in terra. Admirationis etiam causam auget Quercus durities: nempe rigiditas ligni, & succi vel copia vel lentitudo & fecunditas insignis sui Roboris dat significationem, non etià in terra prodire posse: supponit autem Viscum ex semine velle prodire: non, sicut animalcula quæ ex putredine gignuntur in aliis arboribus, sed sibi propriam habere materiam, & quidem propriam actu secum afferente formam: tale namque semen est, ut ipsemet Scal. explicat. Multa præterea adducit exempla eorum quæ in aliis nascuntur quæ tamen & ipsa in terra apta sint nasci, si semen terant. Secus in his si non terant, ut Cornua & similia. Voracem & validam esse plantam Viscum, necnon multum sibi deponere cibi. Quapropter si qua in arbore oritur, quæ minus comestus habeat suppedite: debile esse. Cur ergo, inquit, non oritur à terra? Valida enim queunt cogere terram in suas leges, vi sua eam diiungere. Cogere igitur debuit Viscum terram, ut pareret sibi. Idque & in ea nasci, sicut Lupini semine: Quod si quis fingi dum dicit semen, id non tollit generationem sed differet: ideòque fieri ut quædam anno sequenti demum enascantur, sicut Beta. Nec metu esse à putrefactione, à quo periculo & quæ longè ablit ac ipsa Beta.

Sicque vtrò citroque multis tactatis argumentis, quæ quilibet videre & legere potest lib. 2. cap. 23. tandem ostendit non esse acquiescendum. Tantum enim abesse ut solvantur questionem, ut etiam magis implicent. Sequi igitur capite ubi questionem solvere conatur, inde initium capiendum esse nos monet, unde nos ducit natura, id est, ex rei ipsius conditione. Has verò plantas esse eiusmodi, ut in aliis tantum sint, è quibus & solis & solæ enascuntur, sicut & animalia quædam non nisi in animalibus possint creari: quorum tamen origo lateat: harum verò plantarum generatio pateat. Cuius initium fiat à pastu avium, velut accidente ad generationem. Id etiam in aliis euenire. Picam nempe & alias aves quasdam, glandes reponere, obruere terra. Ita hic quoque, visci grano detracto confectoque in aluis, quidd frigidissimum sit, casu quodam externi ac deponi ab aibus supra arborem, in qua parum immutata stercoreis vi & natura, illud pullulet & emergat. Mox pabuli copia & naturæ fortè vi propria vires capere & incrementa. In Abiete autem & Pinu validissimum nasci. Naturam concludit ita comparasse multarum rerum societatem & mutua beneficia, tum generationis, tum conseruationis. Non tamen dicendum esse, hanc generationem non nisi avium opere confici potuisse.

Hæc ferè Theophrast. de generatione Visci. quod postremum tamen hic obiter refutandum. Nam cur aves non sint concausæ necessariæ, semen vorantes, coquentes succum, emittentes semen cum stercore? Aut quis illuc stercore illud transferat calidum nisi avis? Aut quomodo semen ab arbore suscipiatur, quod non suscipiebat, nisi vi stercoreis alterata? Illud enim frigidiss.

Theophr.
repreh.

HISTORIAE PLANTARVM

finem dixit : quasi sua natura ineptum ad hanc generationem, nisi preparatio & alteratio ventriculi auis tanquam Coqus & portitor interueniat.

Sed Plinium audiendus, qui paucissimis rem expedit. Quendam, inquit, in terra gigni non possunt, & in arboribus nascuntur. Namque cum suam sedem non habeant, in aliena viuunt, sicut Viscum. Omnino autem satum villo [nullo a. & c.] modo nascitur, nec nisi per aluum auium redditum, maximè palumbis ac turdi. Hæc est natura, ut nisi maturatum in ventre auium non proueniat. Hæc Plin.

Theoph. & Plin. opinionem magna subtilitate conuellit, in hunc modum. Veteres omnes sine controuersia sunt arbitrati, Visci acinis à Turdo comestis, quod ad pulpam pertinet, concoqui: quod seminis est, incoctum ab aluo deiici, exire, listique in arboribus iis, in quibus isti quiescere consueverunt. Pro nobis facit, quod ait Theophr.

Nunc Scalig. audiendus, qui ex professo hanc Theophr. & Plin. opinionem magna subtilitate conuellit, in hunc modum. Veteres omnes sine controuersia sunt arbitrati, Visci acinis à Turdo comestis, quod ad pulpam pertinet, concoqui: quod seminis est, incoctum ab aluo deiici, exire, listique in arboribus iis, in quibus isti quiescere consueverunt. Pro nobis facit, quod ait Theophr. semen esse propter generationem. Mihi tamen aliter videtur. Neque vlla in terra satum prouenit: neque in quavis arbore. Dices, arbores certas pro solo ei à Natura destinatas. Sic sanè fugies. Sed tum contrà, mirabor: quomodo in durissima ligna subeatita, ut sibi findat corticem, ac sine radice vnum cum illis fiat. Nam quamobrem non super iuglande, Olea, Lauro, Cupressu, Larice? quando super horum congeneribus, usque æquè duris, atque etiam durioribus nascitur: Pyro, Malo, Sorbo, Pruno, Cerro, Quercu, Terebintho, Abiete, Pinu, Illice. Etiam super Castaneam vidimus. At in illis nihilofecius auicularum stabulantur. At in Turdorum ventriculis, atque intestinis, quos Visci baccis hac de causa nutritos secimus, nullum vnquam granum inuentum est. Similis est hæc fabula, Qui à me rogati: quo seminio in parietibus herbæ nascerentur: vento auebant, in parietes seminibus delatis. At non ita est. Sed quasi cornua ex ossibus animalium: sic ex arboribus educi Viscum.

Quibus arboribus non nascatur Viscum.

Quibus non nascatur.

Viscum quasi cornua animalium.

Visci genus lignum cui Quercus.

Quamobrem Ion poëta Chiis in fabula Ceneo, Viscum dixit esse sudorem Quercus.

Quam ob causam vnicum est lignum vtriusque, non autem insertum, tanquam in terram. Quæ ratione etiam è Thymo prodit Epithymum, non è semine: haud sine Recentiorum nugis. Nullo modo fieri potuit, ut in Terebinthi corticem latissimum, durissimumque, vitam membræque sua infingere atque insinuare queat Viscum. Sed à calore potius interno informatæ Visci principia in succo sibi connaturali: ab externo adiuta, atque euocata concreuisse, atque in plantam hanc adoleuisse, quasi cornua quædam, sicut dicebamus. Vbi & illud tibi à Theophr. animaduertendum fuit, qui lib. 2. de causis scribit: perpetuari frondes Visci generibus iis, quæ in arboribus æternis foliis oriuntur. In perdis foliis quod proueniat, ipsum quoque amittere folia. Non enim verum est. In Malis nostrorum prædiorum, non solum ut senio dicam *Antigen*, sed etiam, ut iocemur, *Tentigen*. Quibus foliis ipsæ virent, suis ipoliatur. Non tamen illorum insectamur opinionem, tanquam vulgi vel sobolem, vel alumnam. Subest etiam ratio non inepta, neque imbecilla, quæ id illis potuit persuaderi. Quando in diuersis arboribus eandem viderent plantam: vnum, idemque principium, è diuersis originibus promanare posse minimè videbatur. Sed quemadmodum Quercus & Pini folia diuersa, sic diuersa esse quoque deuit vtriusque Visci folia: si ab illorum natura

profecta essent. Pulchram sanè pro illis excogitauimus defensionem. Quam tamen diluere licet hac inscita obiectione. Non enim necesse est, diuersorum excrementa diuersa esse facie: sed ratione sola differre satis est, ut lachrymas. Itaque pro nobis faciet potius. Quia longè aliis viribus Quercinum est Viscum, quàm Ilignum & alia. *Videbatur quibus differre.* Exempla quoque valida sunt. Alia Fagus à Quercu: ab vtraque Ilex: Galla tamen omnibus. An suo peculiari satum, seminibusque Galla orta est? Sic Ceruorum & Damarum cornua sunt vtraque; non ab externo compluta, aut inserta semine, sed ab internis primordiis excitata. Maximum verò ad sententiam nostræ confirmationem argumentum, quod è ramis quibusdam exit Viscum, quo in loco nullis modis vel sterco consistere, vel semen vnquam potuerit hætere. Nam quod ait Cardanus: semen ex auicularum aluo deiectum, quominus ab imbris deuolutum pereat, foliorum operimento in ramis custodiri, id in perpetua frondis arboribus fortasse verum fuerit: at in Sorbo qui potest? Visci namque fructus neque maturus neque edendo est, nisi arbore exfoliata. Quare intempestiuas hyberna scuitur iniurias ipsum perpetui ac perferre posse, non sit verisimile. Nihil enim commodius consistere, quàm in re procliu globum. Quippe in summis furculis etiam hodie ipsum conspicati sumus. Quæ in sede & ancipitis firmamenti, & quietis, ne tranquillo quidem celo stare quicquam valeat.

Ad Theophr. argumentum, quod aiebat: Omne semen esse propter generationem, neque respondere scio, neque animus suadet ut ei assentiar. Denique omnino si respondere nesciam, magis nesciam, quo modo semen, uti dicebamus, valeat durissimos cortices ita penetrare, ut coalescat. Nostrum sanè commentum parabiliore videtur firmum ratione. Theophr. accipit pro probatione, quod ipsam eget probatione. At enim è semine nasci. At negamus nos. Si enim è semine nasci posset, è terra quoque de semine nasceretur. Plin. ait, non nisi auium ventriculis domitum semen, esse genitale. Atqui ex earum aluo plus in terram deiicitur, quàm in ramos: neque tamen proficit. Quasi verò in palumbis & turdi ventriculo nequeat granum concoqui: cum tamen Labruscarum gigarta longè duriora & grandiora conficiantur. Hoc experti sumus nos. Primum Labruscæ uiam dedimus Turdo: in deiectionibus nihil præter ipsa excrementa. Deinde etiam Visci baccas dedimus: idem. Nec faciat Solus eductis suis, ut hyemales tempestates abstineant à iure suo deiiciendi ex ramis, complutis, agitis, semen illud quod necesse habet seruari sub ipsum vique Ver ut conformetur. Nam per hyemem qui possit? Interea sedeat in ramo summo, læui, tereti, securus de dilapsione deque gelu: tam sibi findat corticem valentissimum, quod vix acutissima subula facere queat. Arguatur & aliquis ita licet: si Viscum oritur tantum ex stercore auium comeditis Viscum, quomodo igitur primum ortum Viscum, ex quo aues nondum comederant?

Videbatur quibus differre.

Ratione Theophr. dissentit.

Plin. ait, non nisi auium ventriculis domitum semen, esse genitale.

His & multis alijs similibus rationibus, quas hinc breuitatis causa omittimus, confutatur opinio Veterum de generatione Visci. Plures rationes habet Scalig. ex ipso etiam Aristotele accersitas, quas inde petet, qui vult. Huius etiam sententia inter Veteres sine dubio fuit Virgil. cum ait:

Quod non sua seminat arbor.

Ridicula est sententia Monachorum existimantium Viscum nasci ex stercore auium, non quatenus sit Viscum, sed quatenus sit auium sterco.

Monachorum opinio ridicula.

Porro

*An in omni
arbore na-
sci queat
Viscum* **Pontus** Braſſauolus vult in omni arbore poſſe naſci Viſcum, ac etiam in Vite ſe vidiffe teſtatur. Cui ſententia ſe opponunt Monachi, id negantes, quod à ſe non in omnibus conſpectum ſit. Quorum ſane negatio non minus reſcienda videtur, quam affirmatio Braſſauoli, qui eam intèpèſtuo fundamento firmavit: nempe quod ſuper omnem arborem ſtercus emittere queat Turdus aut alia aliqua avis. Sed hæc quæſtio ex eorum numero eſt, quæ ab homine definiri nequeunt: adde quod de potentia agat, non de actu. Temerario iudicio incedunt, quicunque negant poſſibilitatem cum aliqua ratione coniunctam.

*Quibus ar-
boribus in-
naſcitur* Nimirum ſiſtribunt qui omnibus arboribus Viſcum innateſcere aſſerunt, quia non omnes videntur. Sed hoc patum reſert. Dicamus potiùs quibus arboribus innateſcit, hoc eſt quibus arboribus innatum videmus vel nos, vel alii. Vidimus in Quercu & habemus magnum & integrum fructum Quercus ligno adherentem. Habemus & fruſta pollicaris ſerè craſſitudinis, cortice nigro teſta, vetuſta, pro Quercinis data. Latifolia Quercus per multas Plin. in ſylvas viſci ſeraciffima eſt, teſte Cluſ. Nec alibi ſibi veri Viſci quercum conſpectam copiam ſcribit Turner, quàm apud Hugonem Morganum Londini acceperat autem ex Anglia Ellexia, quæ huius præ reliquis Angliæ ſeraciffima. Apud nos raris inuenitur in Quercu. At in Pomis & Pyriſtam domesticis quàm ſylveſtribus ſuis frequente, & multis locis in Spino alba ſeu Oxyacantha Matthiol. Vidimus etiam natum in Corylo, ſed raro. Semel tantum in Sorbo cornu alii. In Tili aliquoties, & quilibet videre poteſt, ſatis frequens Baſilegæ viridatio D. Petri ſupra Tiliſis naſci. In Pruno ſylv. non raro: in Salice altiffima his. In Maſpilo ſemel. In Sorbo alpina ſemel. In Abiete ter. In Amygdalo & Acere ſemel. Obſervauimus etiam aliquando Monpeli in Illice. In Populo Lybica ſemel. Cordus ſcribit repeniri, ſed raro in Vite in qua & Braſſauolus vidit. Quod Abiete innateſcit, Hyphear eſt ſecundum quosdam. Hoc antea diſputatum. Naſcitur & in Betula, Populo nigra, Terebintho, Robore, Tilia ſylveſtri. Cerro, Caſtanea, Cotonea, Olea. Thalius vidit in Inglande. Autumni initio cum ſuis acinis decerpitur, tota hyeme reſtant bacce.

Quercus. *Pom.* *Pyri.* *Spina* *albi* *Coryli.* *Sorbi* *cornu* *alii.* *Tilia.* *Pruni* *Pruni ſylv.* *Salici.* *Maſpili.* *Sorbi alpina* *Abietis.* *Amygdali.* *Cordi.* *Acera* *Populi* *Lybica* *Ficus.* *Cere.* **Tempus.** In quacunque verò naſcatur arbore, noxam ei aſſert, vt etiam interimere poſſit, teſte Theophrast. Hederà inquit Plin. necari arbores certum eſt. Simile quiddam & in Viſco, tamen ſi tardiorem eius noxam arbitrantur. Suprà verò dictum Oleas Paleſtinæ ob Viſcum cum illis innateſcens ſterileſcere. Nos à noſtrati Olea ſcimus, etiam vitem exhauriri, inquit Scal. Alex. Cornelius, tradente Plin. arborem Aconiâ, [id eſt, æternam: vulg. ex. Eonem habent] appellauit, ex qua facta eſſet Argo, ſimilem Robori Viſcum ſerenti, quæ nec aqua nec igni poſſet corrumpi, ſicuti nec Viſcum, [ſerentem: quæ nec aqua poſſet corrumpi, ſicuti nec Viſcum, nec igni Dal.] nulli alii cognitam, quod equidem ſciam.

Visci uita. Porro glutinis, quod Viſcum nuncupatur parandi ratio multiplex. Dioſcor. ex bacis Viſci Quercini conſiſ ac lotis, tandemque in aqua decoctis fieri tradit. Eſeque qui acinos commanducantes ipſum poſſe faciant. Optimum dicit recens, colore intus porraceo, extrà verò ſubſtano, quodque nihil habeat aſperi aut ſurfuracei. Optimum etiam traditur Quercinum: inualidum verò quod ex Mali & Pyri Viſco paratur. In Hetru-

*Visci pa-
randa mo-
di.* *1.* *2.* **Deſcriptio.** ria, teſte Matthiol. non modò in Quercu laudiffimum prouenit, ſed etiam in Cerro, Illice, & Caſtanea, præſertim in maritimis Senenſibus, ubi vaſtiſſima aſſurgunt ſylæ, quæ non paruo præuio ſis locantur, qui Viſcum efficiunt. Scandunt autem illi arbores immenſas, non ſine magno vitæ ſuæ periculo, ſæpiùſque ſunibus adalligati, id muneris in aère pendentibus obeunt. Grana quæ legerunt, in aqua decoquunt, donec diſrumpantur, poſtea cõtundunt, & tandem lauât in aqua quorūſque ſurfuracea excrementa eximât. Paratur optimū ex Caſtanæ viſco. Nam quod ex Pyri, ac Pomi Viſco paratur, inutile eſt. Quod in Pinu & Abiete naſcitur, ad aucupia proſus inutile eſt: decoctum enim, & deinde elotum omnem amittit lentorem. Non dubitauerimus ex Tili Viſco optimū parari poſſe, eam arboris eius ſuccus ſua naturalentus & glutinofus videatur. Viſcum autore Plinio, conſiſt ex acinis qui colliguntur meſſium tempore immutati: nam ſi acceſſere imbres amplitudine quidem augeantur, Viſco verò marceſcunt. Siccantur deinde, & aridi tunc dantur, ac conditi in aqua putreſcunt duodenis ſed diebus. Vnūque hoc rerum putreſcendo gratiam inuenit. Inde in profluente ruſſus mallo tuſi, amiſſis corticibus interiore carne lenteſcit. Hoc eſt illud Viſcum pennæ auium tactu ligandis, ligandis oleo ſubactam, eum libeat inſidias moliri. Fit etiam à nonnullis artificio Viſcum, ex variis rebus, vt ex Sebeſten in Damasco, & ex radicibus Maluaniſci, & ex fruſta Aquifolii, & ſimilibus ad capiendis auibus, etiamque aquatilis: quod tamen medicina minis eſt idoneum teſtibus Monachis. Viſcum enim Damascenum, [vt Heram. Alaiſius] à nos uſum ſoluitum, non ſit ex acinis Viſci dicti, ſed ex Myxis potius vel aliis rebus. Quod autem hoc verum ſit, apparet ex eo, quod in vulgare hoc Viſcum non acrimoniam, nec amaritudinem ullam habere videtur, quas Gal. & Dioſcor. ſuo in eſſe Viſco ſcribunt, ſed dulcedinem potiùs: unde oſq; humores ex intus corporis partibus attrahendi & digerendi vires non habebit. Apud recentiores hæc nomina leguntur: Viſcum Quercinum, Viſcum aque aptum, Viſcum Romanum, & Viſcum abſolutum. Viſcum Romanum non eſt Maſtiche, vt quidam putant, nec in vilo probato autore legitur, tantò peius faciunt, qui ita legunt apud Meſ. in compoſitione Catapotiorum de Colocynthide: nam in alio & antiquiſſimo cod. legitur Abſinthium Romanum, ſicque legendum eſſe & Monachi & Braſſauolus mentio conſent. Viſcum aque aptum, arte paratum eſt: aucupes eo vtuntur. Melle aliqui parant: alii oleo nucum, alii oliuatum: ita nuncupatur, quoniam etſi pluerit, nihilominus aues eo irretiuntur, & quod eius uſus etiam ſub aqua eſſe poſſit ad capiendos piſces. Fit hæc Viſcum ex Sebeſten in Syria, deinde Alexandriam, inde Venetias tranſuehitur, ſed raro bonum inuenitur. De quo ſuo loco. Fit tamen & Viſcum commune pro aqua & aquatilibus auibus. Viſcum verò ſoli aptum, quod & alii Damascenum dicunt, ſit ex Viſco, de quo hoc loco tradimus, quod & ſimpliciter Viſcum dicitur. Veteres autem Querno & Colurno.

Viſco eximias vires, maioremque quàm reliquis efficaciam adſcribere, inquit Turner. Nos non videmus quas vires veteres Colurno tribuerint, quamuis cum non repudiemus, ſed laudemus. Dioſcor. Vm habet diſcutiendi, molliendi, attrahendi, concoquendi, panos ſeu tubercula (pneuma) parotidas & abſceſſus, reſinæ, parique ceræ admi-

quando lo-
genda bac-
ca.
4.
Artificiale
Viſcum
Viſcum Se-
beſten.
Viſcum
Maluaniſ-
ci.
Viſcum de
quifolii.
Viſcum
Myxarum
Viſcum
Romanum.
Viſcum a-
que aptum
Viſcum ſo-
li aptum.
Viſcum
ſimplacatum
Viſcum
Vires. &
Viſus.
Tumores
et abſceſ-
ſus.

Viſco eximias vires, maioremque quàm reliquis efficaciam adſcribere, inquit Turner. Nos non videmus quas vires veteres Colurno tribuerint, quamuis cum non repudiemus, ſed laudemus. Dioſcor. Vm habet diſcutiendi, molliendi, attrahendi, concoquendi, panos ſeu tubercula (pneuma) parotidas & abſceſſus, reſinæ, parique ceræ admi-

Epiphyllides.
Vlcera.
Licetis tum.
Vngues.

rum: epiphyllides quoque in splenio sanat. Vlcera autem vlcera, maligna quoque; abscessus cum thure molli: lenemque absumit cum calce aut Gagate Asioue lapide coctum & impositum. Vngues quoque extrahit cum Arsenico aut Sandaracha illicum. Ceterum cum calce vini que facie mixtum, suam vim intendit. Viscum inquit Plin. e Robore praeipuum diximus haberi, & quo conficere tur modo. Quidam confusum in aqua decoquunt, donec innatet. Quidam commanducantes acinos, expuunt cortices. Optimum est, quod sine cortice est, quodque leuissimum (leuissimum) extra suluum, intus porraceum, quo nihil est glutinosius. Emollit, discutit tumores, siccit strumas. Cum resina & cera panos mitigat omnis generis. Quidam & Galbanum adiungunt, pari pondere singulorum: eoque modo & ad vulnera vtuntur. Vnguium scabritias expolit, si septenis diebus soluantur, nitroque colluantur. Quidam id religione efficacius fieri putant, prima Luna collectum e Robore sine ferro. Si terram non attigit Comitibus mederi. Conceptum foeminarum adiuuare, si omnino secum habeant. Vlcera commanducato impositoque efficacissime sanari. Hyphear ad laginanda pecora vtilius censet Plin. At Theophrast & Viscum, & Hyphear, & Stelidem multum nutrire tradit. Nam & boues & iumenta hoc pabulo post messem ali, atque pinguefcere. Vna modò purgat primo, addit Plin. dein pinguefcit, quae suffocet [superfuerit Dal.] purgationi. Quibus sit aliqua tabes intus, negant durare. Ea medendi ratio xliis quadragenis diebus. Galen. Viscum ex plurima aërea & aquea calida, paucissima terrena substantia constat: nam acrimonia in eo amaritudinem excellit. Itaque etiam effectus subtilitatis respondent. Siquidem valenter ex alto humores extrahit, nec eos tantum tenues, sed & crassiores, eosque diffundit ac digerit. Est autem ex eorum genere, quae non protinus post primam appositionem nexa efaciunt, sed quae tempus requirunt, velut Thapsia. Apud Plin. quoque legitur florem Visci ad Lichenas cum calce subactum conficere.

Lichenas.

Superstitiones circa Viscum.

Orbiculi ad Epilepsiam.

Turdorum aucupium.
Contra Viscum E.
visum.

Porro non apud Priscos tantum, sed etiam nam hodie apud Christianos superstitiones locum habent circa Viscum. Inuenias enim qui credant, Viscum Quercinum amuletum aduersus veneficia & ludibria Satanæ efficax esse, ideoque e collo puerorum & infantium suspendunt, quo à veneficiis tuti esse queant. Quidam Empirici existimant Viscum quod Quercu, Corylo aut Pyro adnascitur, si terram non tetigerit, in puluerem redactum ac e vino potum comitialibus mederi. Itaque ex eo orbiculos conficiunt, quos ad eundem morbum facere credunt. Alii argento includunt, & inter alia e collo puerorum & infantium suspendunt. Omnia Visci genera dum viridia adhuc & recentia sunt, rufa, succo extracto auribusque indito, discutunt collectiones earum, & emolliunt eas intra paucos dies, dolorumque finiant: ex Trago.

Visci, tradente Matth. Hetruscis maxima utilitas est: nam praeter eius vsum in aucupis, quibus mirum in modum delectantur, ob ingentem turdorum copiam, qui autumnii tempore in syluis quibusdam ex Iuniperis arte constructis, eo capiuntur: id etiam inprimis vtile est Viribus muniendis, ne prima germinatione ab Erucis, quibus omnia scatent, gemmae deuorentur. Siquidem agricolae Viscu vites omnes circundant, quo postea erodentes vermiculi, qui tam praestantissimo latere insidiantur, e terra sursum petentes me-

ritò implicantur. Quod cum perspexisset natura omnium rerum parens, Visci multum Hetruscia largita est, ne hanc ob pestem vino destitueretur. Sunt qui Querni Visci lignum in tenuissimum puluerem redigant, & comitialibus hauriendum praebant, quo tantum medicamento multos fuisse sanatos pro certo affirmant. Sed noui ego, inquit Matth. complures, morbi & medicamenti prorsus signatos, qui ligni loco Viscum ipsum in catapotis deuorandum dederunt.

Querni Visci.

Adnotandum tamen, Ligni Visci vsum in medendo praeclarum à doctissimis quibusque haberi, & à plerisque Medicis praescribi contra Epilepsiam & Apoplexiam, & Paralysem, multumque in his casibus praestare cum intus epotum, cum verò in collo appensam. Viscum Pyri sylu. contractione morborum laborantibus maximo auxilio esse sibi compertum ait Matth. Contunditur id vna cum foliis & ramis, & cum pinguedine capi recenti. Rami, nouit praesertim, commendantur in fluxu muliebri, & Nephritide. Quidam Viscum Quercinum, quod terram non tetigerit [hoc nobis superstitiosum videtur] in aqua Rutæ decoquunt, & 40. dierum spatio potandam praebent, prorsusque eo modo, quo vulgò Dixta dicta instituitur, sudare iubent, efficaci & probato, vt aiunt, remedio aduersus Epilepsiam, cui experimento etiam non parum tribuere videtur Camer. argumento, quod in magna estimatione fuerit apud Veteres, vt etiam omnia sanantem vocitarent. Gentilis & Jac. de partibus lignum S. Crucis vocant: de quo & supra quidam dicta. Scimus quosdam non inuulter eo in vino macerato vlos contra vertiginem. Quidam nostro suauis contusum in aquis conuenientibus macerant, vt de eo possint pueri contra vermes, egregio effectu. Cento Medicus V. Virtemb. ad Epilepsiam commendat.

Epilepsia.
Apoplexia.
Paralyse.

Fluxus mulieb.
Nephritis.

Experimentum ad Epilepsiam.

Lignum S. Crucis.

Vertigo.
Lumbri.

Viscus Querci, inquit Alb. Magn. cum quadam alia herba, quae dicitur Marlegon, id est Sylu. ut scribitur lingua Theuthonica, omnes seras aperit: & si praedictum compositum in ore alicuius ponatur, & cogitetur de aliquo, si debet accidere, corde insigunt, si autem non, corde resiliunt. Sed si praedictum ad arborem suspendatur cum ala hirundinis, ibi congregabuntur aues bene per quinque miliaria, & hoc vltimum tempore meo est expectum. Hæc ille, quæ homini Christiano tanquam superstitione, aut saltem fabulosa non tentanda.

Sera & a perenda.

Aues quæ congregantur.

Viscum Coryli mense Iunio collectum ante exortum Solis: concisum minuum exsicca, quod in puluerem redigi possit. Cuius pulueris accipe quanta est auellanae magnitudo, superfunde aquae florum aut herbae Verbasci, cochleare vnum aut alterum, tertiumve, vel q. suff. pulueri humectando, vt eo vi possis. Hoc omni septimana ter repetes: noctu horæ quadrantem antequam cubitum eas. Nihil autem superbibendum aut comedendum. Quod si æger iam paroxylmo correptus sit, prodeisset puluerem cum aqua exhibere, aut cum paroxysmum imminere praesentificat.

Viscum Coryli ad Epilepsiam.

Nicol. Metri in lib. Medico. ab Hen. Martio edito, mirabiliter commendat Viscum Auellanarum siue Coryli Platear. in Convulsione Visci Querni penuria Viscum Coryli sumi suadet. Eo Visci ligno quod in Aronia nascitur, arquatos prospectus curatos sibi compertum tradit Curtius. Paratur & emplastrum efficax ad suppurationes, & extrahendum pus, quod Scribonius Largus describit, Emplastrum de Viscu vocant. E quo pet-

Viscum Auellanarum ad Epilepsiam.
Emplastrum de Viscu.





Inter Halapum & Antiochiam & Ariz & Esculi & Elapini. Hæc Bellon.

Theophr.
dicitur com-
probat

Cæterum quod dicit Ariam vocari in Creta Acilacum, confirmat nostram opinionem in locis antea ex Theophrasto citatis legendum esse, Ariz, non Agria: & Ariam esse Phellodry. Theophr. enim, ut dicebamus, ait Phellodryos fructum vocari & xoxer, quæ vox sanè quamproximè ad Acilacum Belloni accedit. Posterum est Ariam Theophr. cum Acilacum Belloni diligenter conferre, & ista omnia diligentius explicare. Sufficiat nos tot rebus implicatis animum cogitandi vltiorem, & fortè etiam cognoscendi præbuisse. Non enim omnia possumus omnes, ut ait ille.

AGRIA SIVE AQUIFOLIA GLANDIFERA ANGVILLARÆ.

Descriptio

Opportunè hic de Anguilla Agria glandifera dicemus: quam Illicis aliquod genus putamus, nec idem esse cum Anacardio. Sic autem Agriam describit Anguill. Agria, quam Plinius Aquifolium vocat, folia fert similia Illici, nonnihil spinosa: glandem minimam. Lignum eius durum est. Prouenit in montibus saxosis Sclauoniae & Patavinis. Hæc ille.

Folia.
Gland.

Anguill.
arbor.

Quid autem sit hoc eius Aquifolium ingenue sitemur nos ignorare. Interim is quoque ut alibi monuimus, non bene Sorbum Alpinaum cauit & ar. plantam, hercle, admodum diuerfam ab Atria Theophr. & ab Agria sua modò descripta.

PHELLODRYS MATTHIOLI.

Descriptio

Phellodrys Matthioli arbor est glandifera, quam [quod folia ferat Suberis, corticem vero & ligni materiem Cerro non abimilem] trinita vulgè appellatur segara, quasi Cerri filia, reuocandas ad quod euascesse videtur Antiquitas. Quandoquidem Theophr. lib. 4. c. 16. ea Phellodrys dicitur.

Cerri filia.

Locus.

Copiosa hæc in agro Senensi, in omnibus, Archidossi, & Comitatus S. Floræ. Sed illuc vsque non peruenit Anguill. cum de hac arbore nihil tradiderit inter glandiferas, quæ in Italia proueniunt. Hæc ille in post. com. Lat. & Ital. cum magnis figuris. Idem in Icon. scribit Phellodryn Herulicis Cerrosugaro dictam, caudicem habere Suberi non abimilem, & folia & glandes Quercui siue Cerro similia. Nasci in agro Senensi in montanis syluis. Dicitur a Theophr. ut notat Camer. in Epit. Matth. ubi huius iconem retinet, sicut & Tabern. qui Phellodryn & Borcheych vocat.

Illex sem.
Theophr.

Verumtamen quæ sit hæc Phellodrys Match. qualisve planta, asserere non audent. Herbariæ Hierbariæ aut Medici diligenter aliquando id docebunt. Interim obseruandum non sibi constare Matth. dum modò scribit folia esse Suberis, modò Quercus siue Cerri similia, quæ sanè a se inuicem insigniter differunt. Quod si nesciunt ille, saltem in eo peccauit, quod imaginariam collationem instruxit, in planta rara, & ut ille carpit, Anguill. laræ non cognita. Quod si liceat suspicari ex icon. ea accedit ad Smilacem Dalech. paulò ante dictam, quam & du Choul videtur Phellodryn nuncupare. Hist. Lugd. Phellodryn Matthioli pictam sed non descriptam dicit. Vide plura infra de Phellodry nigra Paulò secuti. C. Bauh. in Hist. Lugd. animaduertisse videtur, cum scribit: Phel-

Match. sa-
natur.

An Smilax
Dalech.

C. Bauh.

lodyrs alba angustifolia, & Phellodrys Match. Cum vtraque figura vnam plantam exprimat, alterutra omitti poterat. Modestè in Hist. Lugd. scriptum, Phellodryn albam angustifoliam, videri esse Phellodryn Match. Idem C. Bauh. apud Matth. Phellodryn hanc Illicem sceminam Arcadium Theophr. putat, & Phellodryn Cast. Lugd. & Tabern.

Illex sem.
Arcadium.

Class. solertissimus, si quis alius, huius xui Bata-nicus, Matthioli Cerrosugaro nonnunquam conspectam fatetur. Certè nec nobis, etli Italiz diuitias Botanicas lustraerimus. Sit fides penes auctorem, donec aliquis certiora doceat. Dod. quidem fide implicita, ut videtur, meminit Phellodrys Theophr. & Cerrosugaro Matthioli, verum nihil definit aut docet.

Class. lat.

PHELLODRYS NIGRA ET ALIÆ DALECHAMP.



Phellodrys nigra vocata, id nominis à ramis nigricante cortice vestitis & glabris adepta est. Folia ab Illicis differunt, quod rotundiora multò & latiora: à Smilacis foliis, quod longè breuiora pro latitudine, minùsque candida inferius: à Suberis nobis traditi, quod duriora, spinis mordacioribus, magis horrida. Ita describimus

Descriptio
Etymon.
Folia.

ex ramis generis Illicis, quos habemus, quosque Dalecham. Phellodryn nigram latissimis foliis & valde spinis, calyce glandis larui vocabat.

Dedit nobis diligentissimus stirpium vestigator D. Agerius folia duo Illicis frutescentis ex monte Euganeo, vncias duas lata, tres longa, perdictorum ramorum foliis admodum similia.

Hist. Lugd. quæ Phellodryn hanc Dalech. proponit, ad eam sic annotat. Quum de Illice & Smilace dixisset Theophr. subiungit. Quod verò Phellodryn Arcades nuncupant, natura est inter Illicem & Quernam media. Hæc ille. Si tamen nomen ex Subere & Quercu factum spectes Phellodryn, id est, Suberiquercum, naturæ Suberis & Quercus participem pondus dixeris. Sed Suber Illicis aded simile est, ut nihil intersit, an ex Illicis, an ex Suberis & Quercus confusis principiis hanc dicas fuisse à Theophrasto nominatam. Quinque Phellodryos genera obseruauimus: duo candidibus foliis, tria obscurè virentibus. Vna igitur [describente Dalech.] est foliis altera parte albicantibus, angustis, longiusculis, crebris admodum & non profundis incisuris crenatis, leuiter asperis potius, quam spinosis: cortice cinereo: Glандe, cum matura est, ex fusco flauescente. Hæc videtur esse Match. Phellodrys picta, sed non descripta. Alteri, folia altera parte candicante, latiora sunt, raris laciniis, sinuosa, molliter aculeata: cortice, maturaque Glандe, ex atro ru-

Nominis
ratio.

Theophr. lib.
4. c. 16.

Quinque
Phellodryos
genera.

Phellodryn

Phellodrys. felle. Alia *Phellodrys* est, cui folia sunt mediocri amplitudinis, nigricantia, siue obscura viriditatis, non adeo multus, neque profundis laciniis sinuata, minutis pungentia: Calyce Glandis lœui: Glande ipsa ex fusco flauesciente: cortice cinereo. Alia est foliis latissimis, similiter nigricantibus, crassis, frequentibus incisuris, valde spinosis, glandis calyce lœui, cui maturæ, & cortici idem qui & superiori color est. Harum omnium Glans strigosa est, & tenuis: calyx non spinosus, sed vtriusque Quercu tuberculis verrucosus. Hanc & Ilicis Glandem olim *ἐλκεα* vocabat, autore Theophrast: cuius vocis uestigia hodie quoque Græci retinent, vniuersum hoc glandium genus *Αελάς* nominantes. Postremo *Phellodrys* genus folia superiore minora habet, pallida, multum laciniata, valde muricata, aquifolii modo: Calycem glandis echinatum: Glandem cæteris similem, corticem cinereum. Hæc genera in collibus Rhodano vicinis, aut non procul ab eo distans prout iunt. Hæc Dal.

Locus Vi verum fateamur icon *Phellodrys* alba angustifolia tol o serrato, quæ ille habet, videtur nobis accedere ad ea nos quos habemus, qui ferè similes Ilici Matthiol. *Smilacis* humilis angustifolia, folio non serrato icon, similis est ramis Ilicis nostræ Monsp. carentibus serraturis. *Phellodrys* alba latifolia fuit fortè variatio Ilicis Monspel. Plurimum certe callex ludat ramis etiã in eadem planta, v. l. præmonitum. Hæc candide monemus subinde neminem illius summi Philosophi edicti species non esse temerè multiplicandas. Qui incolunt regiones ubi Ilicis præueniunt, ista diligenter inuestigent, & considerent, an *Phellodrys* nigra Dalech. an Ilex nigra Virgilio, Horatio & Seneca, vel an *Pœuce* tantum nigra sit dicta, v. Cæsius videtur sentire: de qua re & supra dictum.

Suberella glandifera An Cæsalp. lib. 2 cap. 2. de hac: *Suberella* glandifera, arbor in cæteris Suberi similis, cortice tenui, foliolis minore, modicè sinuato: in maritimis tractibus oritur. Hæc videtur *Phellodrys* Theophrast. Suber à Plinio accipi videtur eadem cum *Phellodry* Theophrast. quoniam Suberi eam tribuat, quæ *Phellodry* Theophrast. Studiosi obseruent Cæsp. Bauh. cuius verba & Synonyma sub Ilic. posuimus, *Phellodryn* magnam eandem facere cum Ilice maiore Clus. & *Suberellam* Cæsalp. eandem cum Subere latifol. Clus.

SMILAX GLANDIFERA VETERVM.

Descript. *Smilacem* Arcades, vt scribit Theophrast. vocant arborem Ilici similem, folio tamen non aculeato, sed molliori profundiorique [*ἀκέραια*: sic & Gaza legit. Dal. vulgè legendum *ἀκέραια*, id est, rectiora: quoniam, inquit, neque si ruosa, neque in ambitu incisa,] differentias plures habens: nec materie, vt Ilex, folida spissaque, sed molli in opere. Perpetua folia habet.

Plin. postquam Ilicis duo genera dixisset, ex his in Italia [inquit] folio non multum ab Oleis distant *Smilaces* (quidam *Milaces* legunt) à quibusdam Græcis dictæ, in provincis Aquifolia. sed hinc confusio nascitur, inquit Hermol. quod *Smilacè* vocari legimus, quæ dicatur Ilex in Italia & in provincis Aquifolia: cum *Smilacem* Sestius eandem esse cum Taxo prodiderit. Verum Hermol. vt dicitur in Taxo, *Smilacem* Theophrast. cum *Smilacè* Dioscor. confundit, non animaduertit.

Tom. I.

tens apud Theophrast. aliud Milon aliud *Smilacem* esse.

Cosmar. in com. in Gal. lib. 6. cap. 3. de comp. med. s. l. ubi inter Columellæ remedia habet vitigula Ilicis & *Smilacis*, non bene interpretatur Taxum vt dicitur suo loco. Merito igitur reprehenditur à Matthiol. qui tamen non demonstrat quodnam Ilicis genus sit *Smilax* Theoph. quam Gal. præscribit ad Columellæ affectus & non Taxum.

Smilacis, glandiferae arboris Veterum, Dalechampi, vt mox dicitur, duo facit genera. Ilicem arboream Dodonæus eandem existimat cum *Smilace* Theophrasti & Plini, vtrum ostensum. *Phellodrys*, teste Hermolao, confunditur ab aliquibus cum *Smilace*. Taxus qui vocatur *Smilax*, traditur Hist. n. lib. 9. De *Smilace* etiam aspera agemus lib. 15. *Smilax* hortensis siue phaliolifera pertractabitur lib. 17. *Smilax* tandem lœuis discutietur lib. 15. Hist. n. sub Conuoluulo maiore alio.

SMILAX DALECH.



Inter glandiferas arborum species cuncta varia, ramos quosdam obliquo uallibus villosos, cinereos siue candicantes, pulchros illos quidem, & quibus folia Ilicis arboreæ foliis similia sunt, nisi quod multo existunt maiora, res vicias longa, duas ferè lacinias, subius cana, præviandæ tamen, quæ magnâ partem in ambitu aequalia sunt: in

aliis verò paruas muricatas spinas est conspicere, sed eas minus exsertas: ac si cetera similia videantur Suberi à nobis descriptæ, tamen plantas ipsas conferenti diuersitas facili apparerebit: nucamenta habent ligna. Glandes binæ aut ternæ, ex pediculis crassis hirsutis, calyce squamato, incano, mitiori quàm Suberis dicti. Quantum ab Ilice Monspelica differat, considerent, qui integras arbores videbunt. Certe sumus Dalechampium hanc distinxisse ab eâ, & *Smilacis* glandiferae genus fecisse. Camer. in Epit. hanc vocauit. Ilicem latifoliam, Græcè *πεννία* & *αβυρδία* cuius descriptio nem ante posuimus sub titulo, *Smilacis* glandiferae arboreæ Dalech. *Smilacem* duo obseruauit esse genera. Vnum *Smilacem* Arcadium Theophrast. dictum: arbor mediocriter procera [vt ille describit,] cortice cinereo, in summis ramis cano & lanuginoso: folio Lauri, nec serrato, nec, ligni modo, in ambitu spinoso, superiore parte viridi, inferiore candicante, lanugineque obducto, quæ mollis tangentibus sentitur: flore Oleæ Roborive simili, luteo, in longis paniculis denso, quo Ilex caret, glande admodum parua. Græci vocant *Milaci* & *Anilaci* vocibus corruptis. Materia non est vt Ilex solida densaque, sed molli, vt tradit

Descriptio

Folia

Flos

Nucamenta.
Glandes.

Ilex latifolia.

Dalecham-
pi Smilacis.
Arcadium.
Correa.
Folia.

Flos.

Smilacis.
Anilaci.
Materia.

Theoph. quæ ratione Matth. eorum improbat sententiam, qui Smilacem Arcadum, Ilicem non spinosam esse autumant.

*Smilax hinc
milo.
Folia.*

*Theoph. ex-
plic.*

Locus.

Robur.

Smilax.

*Phellodry.
Cerrofugaro
ra*

*Error Nec-
teturum.*

Alterum Smilacis glandiferæ genus humile est, fruticolum, in arborem se non attollens: folio Oleæ, candido, neque infecto neque spinoso: fructu floræque superiori simili, à quo folio tantum angustiore discrepat. Rectè ergo Theophr. scribit Smilacis glandiferæ folium non esse aculeatum, cum Smilacis asperæ reptatricis folium pungat. Item rectius esse quàm Ilicis [iudicent enim, non ut Gaza & D. Negri legi vult Dalech. ut antè monuimus] quoniam neque sinuosum, neque in ambitu incisum: molle, quia vna parte lanuginosum: differentiusque pluribus variis.

Smilacis primum genus, eodem teste, frequens in agro Montpel. prouenit, vbi non rectè ab herbis Robur appellatur. Alterum in collibus Rhodanum respicientibus, totòque eo tractu, qui à Vienna Allobrogum ad Arclatem vsque porrigitur. Hæc Dalech.

An du Choul in hist. Quercus hanc intelligit: cum ait: Smilacem Arcades vocant arborem Ilicis similem, folio tamen non aculeato: idem Arcades Phellodrym nuncupant, quasi Suberiquerum cum dixeris. Cerrofugaro Hetruria, si quibusdam creditur, nominat. In Prouincijs Yeose, si docti Medici velint consentire. Hæc ille: qui figuram à nostris ramis descriptis non differentem habet, titulo Glandis Smilacis Pilatinæ.

Hermol. annotat esse quosdam ex Recentioribus, qui Smilacem cum Phellodry eandem faciunt, errorem autem hunc non esse ferendum, quæ censura cadit, & quidem iustè in du Choul, qui non bene considerauit verba Theophrasti. De Cerrofugaro Hetruriz sub titulo Phellodryos Matth. quæ fortè ab hac non differt, nec à Smilace Dalech. Id tamen meretur diligentem inquisitionem. Nec enim asserimus Dalech. Smilacem Veterum veram. Clusio Ilicis primum genus Plinii aliud nihil esse videtur, quàm Smilax, Arcadum Theophrast. quam Ilicis similem facit: quare considerandum quam arborem intelligat Clusius.

PHELLODRYS FOLII MYRICATIS, CALYCE GLANDIS ECHINATO, Dalech.

Titulo hoc proponit hanc Hist. Lugd. descriptionem antea posuimus sub Phellodry nigra Dalech. vbi pro quinta specie posita.

Est & nobis ramus similis huic iconi ex Hist. Lugd. desumptæ, sed sine glandibus. Vnde accepimus, non occurrit. Misit & Doct. Caspar. Bauh. ramum hoc titulo: Ilex alia in syluula Perrou, iuxta Monspelium, hæreo an eadem cum muricata Dalechamp. Magnam quoque similitudinem habet cum illis, ramus datus à D. Rentrzio Medico, collectus in Parauinis montibus, vtille narrabat: sed nec hic glandes habet.

Locus.

*Ilex media
coccifera.*

*Arboris ex
fructu de-
scriptio.*

De hac fortè scribunt Pena & Lob. in Aduers. Ilex media coccifera, Ilicis planè suppar, folio Aquifoliz: Cocco hæc similis est, ut non sit discernere illicò facile: huius tamen glandosus echinatus fructus oblongior est, Dactylum æquans, nusquam coccum ferens, etiam vbi inter cocciferas Ilices frutescit, proceriore maioreque trunco, ramis & frondibus perennibus.

PHILYCA SIVE ALATERNVS GLANDIFERA BELLON.

A Peritissimo Botanico Clusio dissentientes, qui Philycam & Alaternum Bellonii tradit & reponit inter bacciferas, ut monuimus lib. 5. sub Spina Burgi, nos eam huc referimus, quia ipsemet Bellon. Glandiferam ait: eamque separamus ab Alaterno Clusii baccifera. Nec tamen eam dicimus Philycam Theoph. & Alaternum Plinii, quorum verba & Macrobius loco citato à nobis proposita. Quæ verò Bellonius de sua Philycæ & Alaterno scripsit, placet huc in vnum locum coacta referre.

In vallibus montis Athos arbores Ariz, Philycæ siue Alaterni & Ilicum semper vident. Inter rupes maiores, in itinere Siderocapla Bucephalam, arbores erant Ariz & Philycæ, quibus eum destituerunt, nomen Gallicum non habent. In Creta sua nomina retinuerunt Acylaca & Philycæ insigni magnitudine arbores, glandem ferentes. In monte Athos nullus est incola, qui arborem dictam Plinio Alaternum non nōt denominare vero suo & antiquo nomine, quo vsus est Theophr. nempe Philycæ. Verum in Corphu & Creta dicitur Elaprinus, quia ei folium inter Ilicem & Oleam, ut scripsit Plinius. Inter Hierosolymam & Damascum reperimus arbores Elaprinæ siue Alinternæ. In monte Cretæ Psiloni proueniunt Elaprinæ, id est, Philycæ, Lat. Alaterni. Inter Halicarnassum & Antiochiam inuenimus arbores Ariz, Esculi, & Elaprinæ. Lat. dicti Alaterni, Itali qui habitant in Terni & Narni Alinterno vocant.

Plinius, ut annotat Scal. in Theoph. omisit Philycam Olympo monti peculiarem: vbi commemoret, non meminit. Nam qui putarunt esse Tiliam, falsi sunt. Neque enim Olympo peculiaris Tilia: & Philycam cum Philycæ miscuere, quorum errorem sine iudicio Ruell. quoque est secutus. Nam eodem loco apud Theoph. & Philycam legimus & Philycam.

Sunt qui Philycam Theophrast. eandem faciunt cum Phillyrea de qua lib. 5. Gazam non bene conuertisse Philycam in Aquifolium, postea dicitur.

Ergo expositis Ilicis differentiis, & his confinibus Phellodryos & Smilacis speciebus, quatum omnium eadem cum Ilice natura videtur, tandem & vites subiiciamus.

Ilicem Diosc. Quercus speciem facit, similemque efficaciam tribuit. At radicis Ilicis cortex coctus cum aqua, donec flaccidus fiat, & per totam noctem impositus, capillos denigrat prius cineribus terra conficatos. Folia tusa & trita tumoribus profunt, & imbecillas membrorum partes corroborant.

Hippoc. lib. de vlcerebus, radices Ilicis in vino dulci albo coquere iubet, & de vino duas partes sumere, & amurcæ olei siccissimæ vnam partem addere, atque ita agitando coquere, ut ne torrefiant, ad lentum ignem, donec ad bonam crassitudinem deueniant. Idem hipp. lib. de Dietæ: ἀνάλωσιν, inquit, ἐν σαλάρι, ἐν ὀνόμῳ, σαπυρῇ, ἢ ἐν ὀνόμῳ, ἢ ἐν ὀνόμῳ, &c. Et Gal. de cibis boni & mali succi, de iisdem tradens Acylis: τὸν δ' inquit, ἐν σαλάρι, ἐν ὀνόμῳ, ἐν σαπυρῇ, ἐν ὀνόμῳ, &c. Et Gal. de cibis boni & mali succi, de iisdem tradens Acylis: τὸν δ' inquit, ἐν σαλάρι, ἐν ὀνόμῳ, ἐν σαπυρῇ, ἐν ὀνόμῳ, &c. Au-steræ, inquit, ac duræ sunt, idèoque insuauis & vitandæ ut concoctioni aduersantes, ac crassi succi etiam si quis elixasumat, & in 6. simpl. Ilicem ipsa etiam Quercu vehementius adstringere ait: cuiusque folia imposita non ingenerosè siccare, sed

*Philycæ
Alaterni
Clusianæ*

Glandifera

*Philycæ
Theoph.
Elaprinæ
Alinternæ*

*Tilia.
Ruell.
proh.*

*Phillyrea
Gaza
error.*

*Ilicis vites
& vsus.*

*Capillos
denigrat.*

*Tumores
Vlcera*

Temperat.



1. eo sunt etiam alucaria. Secundus crepidas nu-
rit, & hybernium calceatum. Ex tertio subtili
atque admodum delicato, fiunt patetia, & quibus
quidquid hestis propinatur, magna utilitate
hauritur. Eo melior hæc arbor, quò vetustior.
2. De trahendis corticib^{us} hæc est ratio. Quia stipites tel-
luri committitur, circumquiditur ad lignosam usq^{ue} ma-
teriem, pariterq^{ue} in luminis humeris, antequàm in bra-
chia diuidat sese: mox à summo ad imum findi-
tur, detrahiturque simplex cortex. Non expla-
nantur aqua, sed igni, nec demuntur nisi tertio
mox antea. Quod si paucis diebus à confura lar-
gimbræ interuenierint, arbor interit, quod raro
accidit, nimirum regione calida & sicca, & tempo-
rum obseruatione raro fallente. Hæc ille.

Verum, addit Clul. in Hispaniis primum illum præcassum corticem duntaxat detrabere solent: quo non modò ad cadorum obturamenta, alucaria, & nonnulla etiam vasa rustici vtuntur, sed etiam ad tuguriorum, parietum & murorum prætexta, præsertim in ea Bœtiæ parte, quam Estremaduram vocant: vbi interdum totis pagis ædes magnis Suberis fragmentis imbricum loco tectas conspiciere licet. Idem cortex exteriore illa scabritie derata muniendis crepidis & hiberno calceatui idoneus. Itaque videtur Quinquern^o præter veterum autorum sententiam ex præcasso illo externoque cortice binos fecisse: nam scabritia illa exterior ad nullam rem utilis.

Est porro nobis ex Suberis cortice illo extimo, quo calcementa suffulciuntur, scutella profunda, spithameâ diametro, quasi tornauli opere facta. Theophrasto lib. 3. cap. 4. inter αἰσυλλὰ & perpetuò virentia syluestria recensentur, & αἰσυλλὰ, & αἰσυλλὰ, & αἰσυλλὰ. Quo loco tamen, pro αἰσυλλὰ, suspicamur legendum, αἰσυλλὰ, vno vocabulo: tam enim lib. 1. cap. 15. etiam recensuit inter perpetuifolia. Contrà lib. 3. capit. 16. dicit αἰσυλλὰ, αἰσυλλὰ, αἰσυλλὰ. Item inter αἰσυλλὰ & quæ tardissimo omnium sunt germine numerat lib. 3. cap. 6. vbi αἰσυλλὰ vocatur. Gaza & Const. in Lex. Suber conuertunt. Palma, eodem tradente, leuis est, tractu facilis ac mollis, sicut Suber: (αἰσυλλὰ) sed melior Subere, quia obsequiola. Suber enim fragile. Quapropter simulachra ex Palmis faciebant olim, spreta Suberis materie, vt in commoda. Est verò Suber eadem Theophrast. arbor mediocriter procera, [αἰσυλλὰ, αἰσυλλὰ: Gaza & cum secuti plerique vertunt, admodum procera.] caudicosa, parùmque ramigera, & augetescens: [αἰσυλλὰ habent vulg. Hist. Lugd. legit αἰσυλλὰ, quæ lectro & nobis probatur] materie robusta, cortice præcrasso, qui disrumpi, vt in Picca, soleat, verum fragmentis prægrandioribus: folio Fraxini [αἰσυλλὰ, αἰσυλλὰ: quidam volunt legendum, αἰσυλλὰ, Oleæ: Quid si legamus αἰσυλλὰ, αἰσυλλὰ?] crasso, oblongiori, non perpetuo, sed deciduo: [Plin. contrà: quem & Hermol. secutus: vulgata habent, αἰσυλλὰ, αἰσυλλὰ.] Quidam docti contrà: in αἰσυλλὰ, αἰσυλλὰ legendum censent.] Fructum perpetuò fert glandiformem, similem Ariz. [Nam αἰσυλλὰ legendum censemus, pro αἰσυλλὰ, vt in vulg. habetur: quoniam Gaza Aquifolium venerit, Aria autem est Phellodrys.] Detrahunt corticem, vniuersumque diuidendum censent: alioqui arborem deteriorem fieri. Rursum verò intra triennium repletur.

Suber, inquit Plin. minima arbor, [non minima
D.] glâs pessima, rari cortex tantum tantum non
D.] in fœtu præcilius ac renascens, atque etiam
in denos pedes undique explanatus. Vñs tñi ad

alia infra dicenda, tūm in hyberno foeminatū
calceatū. Quamobrem non infacētē Græci corti-
cis arborem appellant. Sunt & qui foeminam Il-
licem vocent: [Hæmalē Plinius, De Phellodry id
Theoph. non de Subere D.] atque vbi non nasci-
tur Illex, pro ea Subere vtiuntur, in carpentariis
præcipuē fabricis, vt circa Elim & Lacedæmo-
nem.

Quod Plin. ait corticis arborem Græcis dici, hi
A. Scg. & dicunt, quasi arborem corticosam.

Ex eodem Plinio, Suber tardissimè germinat
est ex propriè glandem ferentibus : materie est
mollis : in aquis non fluitat, si dematur cortex:
veritatem cariemque tardissimè sentit : ei è syl-
vestrum genere non decidunt folia: omnes arbo-
res cortice in orbem detracto necantur, excepto
Subere, quod sic etiam iunatur, crassescens enim
perstringit & strangulat.

Mement & Colum. Suberis: nam, inquit, est
præcipua cuneis lilla Olea, Quercus & Suber. Et
Persius Satyr.

Fr ramale vetus vegrandi Suberq. collum.

Quod verò Plin. ait, in aquis non fluitare, si dematur cortex, id utique materiei densitatem & pondus arguit. Corticis verò leuitas lignum non solum non mergi sinis aquis, sed aliis quoque rebus alligatus facit ne mergantur.

Qui arborem per hispanias viderunt, hac sibi
facie representasse tradit Ruellius. humilem pa-
rūmque ramigeram esse, folio llicis aculeato, tristi
glande, cortice præcrasso & multis inanitatibus
tituloso, quem ad vsus detrahunt. Sed forsitan
Pyrenæicis insignior auctu, proceriorque saeuente
cæli statu consurgit.

Matth. sic depingit : Suber arbor est Illicis folio
perpetua similiter coma virens, quanquam id ne-
get Theoph. sed crassissimo cortice vestitur, atque
Illici magnitudine cedit, ut ii quidem attestari
possunt, qui Baccano Romam profecti sunt. Eo-
chim itinere innumera Suberum plantæ visun-
tur. Is pingit Angustifoliam. Postea in post. com-
ment. cum magnis icon. mutata sententia, duo Su-
beris facit genera : alterum folio prolixiore acu-
minatioreque : alterum breviori, rotundiore-
que, & per ambitum serrato, acuminatisque qui-
busdam in locis incisuris. hoc in Romano, illud in
Pisano agro proveniens. Matth. ut ex prædictis
patet, relegat Suber suum angustifolium ex Ro-
mano itinere Pisas. An utrobique viderit, no-
runt incolæ. In epitome eius transpositæ sunt ico-
nes.

Accepimus folia quædam Ilicis nomine à D.
Renzio Medico VVurtembergico, collecta præ-
pè S. Petrum in montibus Euganeis, quæ sanè si-
mila sunt picturæ Suberis angustifoliz Matthiöl.
Non tamen dixerimus temerè, eandem, nec etiam
diuersam plantam ab Ilice, Lectotibus id totum
committentes diligentius inquirendum.

Nonnulli Licem, Suber maius esse crediderunt, sed falsò, inquit Amatus, quum maius Suber marginæ proceritatis sit, & ex eo cortices virides & sicci ad varios vsus detrahantur, illa verò glandifera admodum sit: verum errat & ipse dum medium corticem viridem appellat, quem tamen ipsemet colore rubrum fatetur.

Lacuna, cui propria icon, diuersa admodum ab
icone Matth. angustifolii olim exhibuit, speciem
Quercus [Roble] dicens, fructu & foliis similem
Illici, sed ipsam arborem minus ramosam & pro-
portione breuiorem crassiorémque.

Lob. tum in Adult. tum in icon. propriam icon.

Palera.
ad Hede-
cum.
Et Carri-
ces depra-
bentur.

Craspedomys
coriacea V.
fulva.

Дно: ефе-
галин
супрес.

Scutellaria
subrep.

Theory and
method.

Description
Tecophil.

Theoph. G.
die corr. C.
H. 17.

Plus grand

Cartão nº _____

Phos. In.
p/100.

*Descriptio
Ruell. Sabo-
ra Hufm.
Pyrenaea.*

Saber para
permiso.
Nada.

Dasgupta
March,

Suber ma
gna proce-
ssum.



certioraque perquirendi: nec tam planè, ut is ait, coniciendi, Cocci diuersa esse genera: in qua quidem re Aduersaria, quorum censuram & verba antea produximus, haud immerito titubantem hunc commentatorem ridet.

Camer. in epit. Matthiol. nouam iconem proponit, nomine Cocci infectorii: & tamen aliam alio titulo, nēpe Cocciferæ Illicis appictæ glandibus, excrementis atque Iulis, addita adscriptio- ne & observationibus iisdem planè, quas (ego Bauh.) iam olim iuuenis cum plantis incis & obseruationibus D. Gesnero tanquam fido Præceptoris candidus discipulus transmiseram, quem ut industrium & diligentem philosophum scio multum adiutum, magnam lucem inde studio Botanico attulisse, & attulisse maiorem, si vir ille, communi bono natus, diutius vixisset. Epistolæ eius ante paucos annos à Cl. D. Casp. Bauh. editæ, fidem abundè faciunt eorum quæ hîc testamur. Interim thesauro eius naturali aliud distracto, minus candidè nobiscum actum scemur, quando nostras labores & conceptus suppositio partu parentem mutasse, nullo honore vel nostri, vel Gesneri, nulla gratitudinis compensatione, non sine cachinnis contemplanur. Non ita fecisset Gesnerus, vir modestia, gratitudine, & æquanimi- tate, præter singularem eruditionem, toti Mundo notissimus. Sic vos non nobis &c. Fruatur is tantisper bonum publicum, dum interim maturiora meli amur.

Itin. Extant & herbarum imagines, nulli autore nominato, vbi Cocci baphicæ nomine ficticia icon habetur. Non enim ex pediculis pender Coccum, vbi pingitur. Nec putamus Gesnerum in Catal. cum ait. Aquifolia vel Aquifolium, *hæc aut apia*, Coccum fert, istud Coccum de quo hic agimus, & quod tam à Grecis quam Latinis, præcis ac neotericis Herbariis *χέρμη* & Coccum *χέρμη* dicitur, intellexisse. Monendi tamen incauti, ne fortè decipiantur. Quia multum differt bacca Aquifoli, à Cocco baphica nostra.

Tab. re- preh. C. Bauh. Tabern. geminas quoque icones huius vnius plantæ habet: vnam titulo Illicis cocciferæ: aliam vitiosam, & uti videtur, ad libitum factam, nomine Coccitinctoriæ seu infectoriæ: quam sanè nolumus in renouato Matthiolo adiectam.

Hist. Lugd. reprob. Hist. Lugd. quoque frustra duas posuit icones. Scire debuit aut monere eius confarinator, cum calyx complectitur glandem, immaturam esse. & principium eius. Priorem tradit his Synonymis: *Ilex aquifolia* Plin. *Ilex parua aquifolia*: *Phellodrys Coccifera* quibusdam Theophrast. lib. 3. hist. cap. 16. communi nomine *χέρμη*: *χέρμη* Dioscor. *Chermes* Serap. Huic, inquit, Glans, rotunda, Calyce aculeis rigente, totamque ferè, ut Cerro, complectente. Nimirum immaturam glandem & imperfectam ac inchoatam tantum, nesciuit à completa distinguere. Posteriorem simpliciter cocci infectorii arbusculam nominat. Ut sub quo cælo versatus fuerit, ipsemet nescisse videatur.

Amari opi- no reprob. Nec placeat Amari iudicium iniquum. Grani tinctori Plinio duas esse partes: exteriorem corticosam, quam *Castellan* Lusitanos & Plinium *Quisquilium* vocare. Non enim Plinium intellexisse videtur, qui non grani exteriorem partem corticosam Quisquilium dicit ac intelligit, sed totum granum ipsum indifferenter, quod etiam coccum Illicis alibi vocat idem Plinius.

Ilex Aquifolia coccifera. Ilex Aquifolia coccifera du Choul in hist. Quercus.

Cornar. post tot Authores qui ante eum scripserunt, incertum se fatetur de cocci tinctorii ortu: & qui integrum eius Emblemata ad Diosc. legit, competet eum non nouisse discrimen inter coccum Illicis, & coccum radicem, quem ait vocari Zschirbitz in Podolia.

Lacuna scribit Diosc. confundere coccum [*la grana*] cum planta quæ eam profert, nempe Illicis specie parua. [*Enzianella*] Quali verò hoc nouum sit, fructus nomen pro planta sumi, & vice versa. Maioris momenti, quod ait, corticem tantum plantæ adherere: non etiam in foliis obseruamus. Notatu dignum, si verum quod idem ait, vermiculos cocci ipsissimi puri sanguinis colore esse & in extremo gradu aromaticos: qui aliquantum aucti prodeant ex semine in terram deciduo, & innu. nera multitudine vicinos arreperere parietes. Idem & odoratos dicit: quod incolis examinandum relinquimus, potissimum an aded sint aromatici hi vermiculi, ut hic ait, quod à nemine alio hætenus proditum nouimus. Idem vult, coccum si simpliciter ponatur aut legatur apud authores, intelligendum esse istud, quod & nos statuimus.

Singularis & planè *χέρμη* nobis videtur Anguill. quando de cocco & plantis cocciferis scribens ait: *Italis la Grana* dicta, vel coccos baphica nascitur in duabus plantis distinctis: Illice, & in planta propria Coccus Illicis adhuc hodie reperitur in Prouincia & Sclauonia, vbi *Cernach* vocatur, quod tincturam significet. Prouenit etiam in Macedonia, vbi similiter *Chernach* vocatur, sed cum aspiratione in prima syllaba. Hæc ipsa planta profert eum liquorem, quem Theophr. *χέρμη* vocat, colore rubrum, substantia mellis: quo mulierculæ illius loci suci vice vuntur, nam rubello decore eum commendat. Prouinciales *Chermes* nuncupant. Ast planta propria quæ coccum fert, prouenit in agro Valentino Hispaniæ: vbi radice propagatur, stolones emittens lignosos cubitales, foliis vestitos Agrifolii, sed paruis admodum, in ambitu spinosis: & intra foliorum pediculos grana progignit multo pulchriora melioraque lignis. Hæc eadem nascitur in Creta, vbi *χέρμη* vocatur: ibique grana colliguntur circa Festum S. Crucis, quod aliis temporibus colligi nequeant, sicuti grana Pimpinelle. *Chermes* & coccus Arabum & Græcorum ead. m. res est, ut patet confectis vtriusque scriptis. Hæc Anguill. Quem ut sagacissimum alioqui Botanicum miramur non aduertisse coccum in Prouincia in propria arbore Illicis specie, ut à nobis descripta est, & ab Illice, tamen diuersa, nasci, non minus quam in Hispania: quam & eodem modo propagant. Mirari item subit, eundem inter glandiferas arbores non reposuisse. Sanè videtur ei Ilex coccifera non bene cognita fuisse, quicquid tandem de ea tradat. Clusius profectò, qui diligenter Hispanicas plantas perquisiuit, vnicam tantum obseruauit cocciferam Illicem. In Illice maiore seu arbore, de qua antea egimus, in Hispania nullos coccos obseruauit, sed tantum granum nigritatis sicut & nos in Gallia Narbonensi. Planta igitur quam Anguill. propriè cocciferam appellat ac describit eadem nobis est cum Illice coccifera Prouinciæ & Hispaniæ.

Nec minor admiratio nos habet, vbi Anguill. apud Theophr. *χέρμη* scripserit succum esse. Nec nos, nec ullus alius, quicquam tale apud Theophr. legimus, aut ab aliis proditum legimus. Aut si maxime etiam succum talem obseruauit, qualem de-

Cornar. not.

Vermiculi aromatici.

Cernach.

Chernach.

Hyphear Theophr. quid Anguill.

Gazopri- mus Creta.

Anguill. opi- no reprob.

Ilex coccifera propriè Anguill.

Anguill. cf. situm Hy- phear ex- pium.

scribit, nihilominus reprehensione non carebit, quod ei nomen *spica*, rem longè diuersam, ut sub Vitco ostendimus, ausus sit affingere.

Dodon. iudicio vnus tantummodò *spica* meminisse Theoph. Duo tamen genera posteritati obseruata, nempe glandiferum tantum, quod vocat, [nobis Ilex arborea] & alterum Coccum ferens, à Diosc. sententia aliena esse. Ilicem siquidem lib. 1. inter *spica* refert: alterum verò lib. 4. sub titulo *spica* describit. Sed hoc peculiare idem Dod. annotat: Coccum ferentem Ilicem quandoque vnico caudice arborentem attolli: sæpe tamen fruticantem esse: Glandem [si quando proferat] pusillam gignere [nos magnam satis obseruauimus, ut dictum.] Hallucinari eos, qui Chermes ab insectorio Cocco differens esse opinantur, & circa radices alicuius herbe veluti Pimpinellæ reperiri ac colligi. Hæc Dodon. qui suam iconem ex Clus. habet, suamque descriptionem, partim ex eo, partim ex Theoph. cuius videtur. Nondum etiam ei concedimus simpliciter. Theoph. vtramque Ilicem non agnouisse: rationes suprà diximus. Rarum etiam esse videtur id, quod Coccum baphicam, vnico tantum caudice arborentem vidisse tradit. Nic. Reusnerus, vir Cl. nec ignobilis Poëta Germanus, vtramque Ilicem ex Theoph. eandem putasse videtur, etiam in suis Emblem. eleganti Tetrasticho sic celebrans:

Fortis umbrosa nihil, aut fecundus usquam

Ilice, qua Viscum nobile fronde parit.

Et præter glandem fert Coccum lara rubentem

Et folius semper frondet amana suis.

Synonyma
ling.

Præst.
Coccum
Hipp.

Coccum
Pharmac.

Scarlacina
Carmesina
deffert
Coca.

Locus &
delocatus.

Diosc. il.
Infr. &
corvalli.

Plinius de
mori.

Ilex coccifera, *spica* & *spica* Græcis: *ύζο* Pausaniz: Lat. *Coccus Baphica*, (sed *Grani tinctorii*) aut insecti *spica* vel *Kermes* nomine potissimum Septasii cognita. *spica* Theoph. ut vult Rob. Const. Hipp. *zanzaba*: Plin. *Coccum* vocat. Arab. *Chermes* vel *Kermes*, vel *Charmes* vel *Chermu*, *Quermes*, & *Alkermes*: Tot enim modis scriptum inuenimus. Nec dubium, esse *Chermes* Serap. quoniam vniuersum caput Diosc. exscripsit. Myrepsus *sericum ex Grano Ilici* dixit. Grana Theoph. *spica* quoniam videtur nuncupasse. Cætera prius dicta. German. *Scharlachbeere*, & *Scharlachgrün*. Gal. *Graine d'Escarlata*, *Vermillon*: Item simpliciter, *Graine*. Ital. *Grana de tinctori*. Hisp. *Grana para tennir*: & *Grana en Grana*. Castell. *Cascia*, *arbor* & *grana*: quæ vox à Cusculio Plinii detorta videtur. *Grana de tinctori*. Catal. *Cofel* & *Quasque*. Portug. *Gran de Carasco*. Tinctura *scarlatum* dicitur: quibusdam *Carmesinum*. Non tamen est genuinum illud de quo mox trademus sub Pimpinella. Coccum verò hoc Græcorum, vel *Chermes* Arabum à *Chermesino* vulgè dicto diuersum est, vel tinctorum iudicio, qui *Granam* vocant, *Graine*: *Chermesinum* verò quod ex herbe radicibus colligitur, *Carmesini*.

Optimum Coccum Diosc. gigni tradit in Galatia, & Armenia, deinde in Asia & Cilicia: locum postremum obtinere quod in Hispania prouenit. Sed ea vox Asia [*Asia*] mendii suspitione minime vacare, visa est doctis: quoniam & Galatiam & Armeniam Asiæ regiones esse constat. Iddè quidam eam vocem planè expungendam censent. Alii Asiam pro Lydiæ ciuitate, Asiæ, vnius ex mundi quatuor partibus accipiendam censent. Sed interim sciendum, an ibi etiam Coccum proueniat. Nos nihil decernimus de regionibus nobis incognitis, hoc est, non lustratis. Probabilior tamen nobis videtur doctiss. Sarraceni coniectura, qui *Asia* vel *Lydia* reponendum censet: quam *Asia* ex Plin. hausit: qui ait: Gigni & in Galatia,

Africa, Pisidia, Cilicia. Pessimum in Sardinia. Et alibi etiam Lusitaniz grana celebrat. Dixerat autem prius: Coccum Galatiz rubens granum, aut circa Emeritam Lusitaniz, ut dicemus in terrestribus in maxima laude est. Verùm ut simul peragantur nobilia pigmenta, anniculo grano linguidus succus: idem à quadrimo euarius. Ita nec recentis vires nec senescenri. Item alibi: Est genus *Cocci Ilici*, in Artica serè & Asia nascens, celerissime in vermiculum se mutans, quod idè Scolecion vocant, improbantque. Principalia eius genera diximus. Cæterum quod Diosc. vilissimum omnium Hispaniz Coccum dicit, neuiquam ei subscribit Lacuna Hispanus, qui longè excellentissimum in multis Hispaniz partibus colligi testatur, ac tale quidem, quod facillè cum Galatico & Armeniaco possit comparari. Magni etiam fieri quod in Scythia, parte Lusitaniz crescat: immò illud reliquis omnibus præferri. Quod verò ex Africæ Barbaria aduehitur multò minoris esse virtutis ac valoris. Cui sanè fidem neuiquam derogamus, maximè cùm ipsemet etiam Plinius Lusitanicum (quæ Prouincia Hispaniz contemina est) in maxima laude potuerit, quippe imperatoris dicatum paludamentis. Crescit, inquit Clus. multis Hispaniz locis, in Narbonensi etiam Gallia & Prouincia. (ubi & ipsi multoties vidimus & legimus) Nec dubium quin & plurimis aliis, sed non ubique Coccum gerit. Nam iis solum regionibus, quæ Mediterraneo mari vicinæ sunt, & magno Solis ardore torrentur, nasci animaduertebam. Sed neque istuc perpetuè fert. Cùm enim frutex adèd adoleuit, ut glandem alente incipiat, Coccum non gignit: idèdque solent incolæ quadriennes aut adulescentes frutices vrere, ut proximo anno nouelli resurgant, qui deinde singulis annis aliquot subsequentibus Coccum ramulis inhzrentem, instar exiguum Pisorum coloris cinerei gignunt. Hunc pueri & mulierculæ colligere solent, & mercatoribus vendunt, qui magna eius copia coacta, deinde præparata, in Emporia mittunt. Nascuntur etiam inter Hierosolymam & Damascum Ilices cocciferæ, ex quibus incolæ, teste Bellon. colligunt Coccum [*Graines d'Escarlata*] & mercatoribus Venetis vendunt, qui emunt in omnibus Mundi partibus. Arbutulæ Ilicis cocciferæ circa Monspelum euellit & in hortos Stuckardianum & Montbelgardensem E. Cell. transplantatæ, hyemæque repositæ plures annos durarunt. Sed nec flores, nec Glandes, nec Coccus protulerunt.

Colligendi modos suprà ex diuersorum observationibus ostendimus. Illud addendum in Gallia Narbon. ac fortè etiam alibi, non legi Coccum annuatim, sed cùm anni temperies tulerit. Nam si Ver pluuium fuerit, omnino deperit. Ad hanc verò messem, ingens hominum turba vndique tam ex locis vicinis quam remotioribus concurrunt. Ordinatum omnes procedunt, ut nemini ordinem aut præueterem, aut antequætere liceat, magistratibus etiam prohibentibus, ad quam rem leguli, si Bened. Curtio credendum, in campo decubant, à quibus tunc mercatores Coccum ipsum emunt.

At vnus aut alter scrupulus restat eximendus in Diosc. Is tradit nasci Cilicium Coccum in Quercubus, exilis cochleæ similitudine, quod illius regionis mulieres ore legant & coccum vocitent. Ut de posteriori prius dicamus, fatemur cum Marcello, non intelligere nos in quem vsu ab incolis mulieribus ore auelli aut excipi opus fuerit, & pro, *non* aliter quondam legi potuisse.

Anno,

Dalech.
et alii.

Non ubique
coccum
fert nec
omni plura.

Quæ non
ferat.
Eadem.

Sarrac.

Non quæ
tam legi
Coccum.

Ordo poliorum
aut in legendo
Cocci.

Duo diffi-
cultates in
Diosc. impo-
sita.

Annotat Saraceni in Vet. legi, *et quoniam non* sed Scholion esse, al. *et quoniam*. Sed neutra lectio placet. Nam ad quid ferro opus ad tantulas bacculas legendas? Et *et quoniam* seu luxatio, quid hic doceat? Marcellus putat aliquid substituendum quod tempus designet, quo legendus sit Coccus. Idem Cornar. pro *et quoniam*, substituit *et non dicitur*: et tunc. Quae lectio fieri quidem potest, si cum Dioscoride consentiat. Sed quis id nouit? Plin. de hac re nihil. Theophr. Aut quid si relicta vulgata lectio ne dicamus mulieres ex ramis aulicis ore decerpum dentibus contriuisse. & in Pululas redegit se, ne inde nascerentur vermiculi? Aut quid si cocci genus aliquod magnum illud fuerit, quod & ore & manibus decerpi mereretur? Sed meræ hæc sunt coniecturæ. Retineamus tanquam Cornarii lectionem, donec certiora aliquando inuestigetur posteritas.

Altera def. sententia. de Cocco Ciliensis seu Quercus.

Sed quid in Quercubus [*et tunc dicitur*] etiam nasci Coccum? Infelicem verò Germaniam aliasque nobilissimas Prouincias, quæ tot alant Quercus quas nec vireæ vireo, quod quidem obseruatum sit, hærit Cocco. Quapropter merito diligentiissimus Anguill. hæc lectionem Diosc. digere nequirit, sed *et tunc dicitur* seu *et tunc dicitur* reponi voluit. Hic suspicio nobis oritur, ne fortè Dioscor. hæc generica voce *et tunc*, qua omnes glandiferas arbores intelligi in principio huius l. diximus, complexus sit, aut fortè hæc arboræa. (si modò ea sit alicubi Coccifera, quod ex Theophrast. aliqui suspicari possunt, hæc tunc verò nescitur) sed propterea magis ardeat, nisi prius *et tunc dicitur* ad id diuideret. Et quid opus fuit denud obtrudere *et tunc* vocem? Et si *et tunc dicitur* legendum sit, Cur de Cilio pondus id dicat Diosc. quàm de Galaticis & Armeniis? Quæ rationes nos mouent, ut nondum certam & indubitam Anguillæ lectionem agnoscamus. Atque ex hac quidem velitatione nos retraheret in assentionis portum Matthioli, si ei viro, fingere consuevit, fidem auderemus adhibere. Aut enim Coccum inuenisse se in quibusdam Quercubus Boh. Et rursus in post. com. quod in Quercubus insit, nescit: Coccum (ut Dioscor. in Cilia nasci scribit) copiosum quoque in Bohemia prouenit. Primum quod à me visum est, truncum ferè totum occupabat non infima Quercus, non longè Pogonibron in Leporatio, quod Parcum ferarum vocat Carolus Ferdinad. deinde aliis etiam in locis: sed tunc ab incolis non cognoscatur, quotannis perlitur. Atqui in Polonia ubi etiam copiosè prouenit, nō desunt, qui illud diligenter legant. Hæc ille.

Etiā in Bohemia nasci.

Infelices verò nos denuò & omnes externos Medicos aut Herbarios, qui tot Querceta per tot nobilissimas prouincias minus sanè septentriales quàm Bohemia ac Polonia, rarissimarum tamen harum diuinarum participes nunquam facti, in hæc usque diem, pace sanè Matthioli, dubitauerunt, an ipsam locorum vnquam in Quercu natum sit Coccum tinctorium: de hoc enim agitur, & intelligit Matthiol. Optastemus sanè tantum naturæ scrutatorem graphicè docuisse formam, magnitudinem, coarctationis modum, colorem, saporem, tempus, ceteraque quæ ad illorum naturam intelligendam facerent. Item an placè conueniant, atque adeò nihil aliud sint, quàm veluti Cocci Ilcis. Quod quia non fecit, nec testem, vel vnum, vel plures produxit, qui cum ipso Cocco in Quercu viderint: quia item Medici & Herbarii illorum locorum nihil hæcenus, quod equidem nobis constet, istarum raritatum [fortè sibi [solis] seruantes] communicarunt,

Tom. I.

aut aperuerunt, tanquam bona Math. venia dubitabimus, num verum Coccum tinctorium viderit in Quercu, donec Medici aut Sepiasiani illorum Regnorum nos doceant certiora. Interim, tamis, quàm ceteris rei herbaræ studiosis considerandum relinquimus, an non fortè viderit Matth. illud excrementum rubellum quod Lob. & nos quoque non semel obseruauimus tam extrinsecus quàm è mediis folijs enatum, sed Cocco tinctorio maius: similia ferè & passim videas in folijs fagi. Si sic? Cum Cocco Cilio Dioscoridis conferre non debuit, minus verò idem dicere. Mirum etiam nobis videtur, ad quid Poloni istud tam diligenter legant?

Ceterum Coccus Baphica, teste Dioscor. vim habet adstringentem: cuius ratione vulneribus nervisque sauciatis trita ex aceto conuenienter imponitur. Et Plin. Coccum Ilcis, inquit, Vulneribus ex aceto recentibus imponitur: Epiphoris ex aqua & oculis suffusis sanguine instillatur. Galeno. Granum tinctorium adstringentem similitudine amaram qualitatem possidet. Vtraque sine morbo deficiat. Proinde ad ingentia vulnera congruit, & ad neruorum vulnerationes. Sed tunc ipsum quidam cum aceto terunt: alii cum oxymelite. Eximie conferre hoc granum mulieribus abortientibus cum pari thuris pondere in potu sumptum: id quod & Fuch. & Matthiol. testantur, qui ait, mulieres Italicas puluerem Cocci infectorii non infelicitè sumere ex ovo sorbili, pauco addito thure vel mastiche ad prohibendum abortum. Idem affirmant mulieres Lugdunenses & Gallæ pleræque: atque adeò Amatus se cum mulieribus ab abortum prouocans magno iuvamento exhibere solitum testatur. Nostro tempore mulierculas Monspelientes & Nemausenses in

Vires & Vitis.

Vulnera.

Nervulasti.

Epiphora.

Oculi suff.

fusi.

Preparatio.

Abortus.

Difficilis partus.

partus.

Confectio.

alchemia.

Vires com.

fest.

alchemia.

Confectio.

alchemia.

Vires com.

fest.

alchemia.

Confectio.

alchemia.

Vires com.

fest.

alchemia.

Confectio.

alchemia.

Vires com.

fest.

alchemia.

Confectio.

alchemia.

Vires com.

fest.

alchemia.

difficili partu & collapsis viribus eius pulueris scrobem ex vino, aut ipsam etiam Confectionem Alhermes non sine fructu hausisse scimus, quod & Clus. obseruauit. Quadam etiam ea vel ante partum, tanquam sacra anchora se muniunt, ad quam necessitatis tempore confugiant. Roborat enim partes, siue prædictis qualitatibus manifestis, siue etiam [ut quibusdam placet] totius substantiæ familiaritate, quam dicunt habere cum corde præcipuam. Medicis certè Monspelienti-bus nihil præsentius in quouis casu præcipiti, & morbis acutissimis, Apoplexia, Paralyti, & similibus esse scimus. Melius eam ad cordis palpitacionem, syncope, mentis alienationem seu desipientiam, & mentorem sine causa manifesta celebrat: facultates enim nostrum corpus dispensantes munificè roborare testatur. Efficacissima, inquit Sylius, multorum etiam Regum in Gallia testimonio est probata, maxime in quibus vel longo morbo fessis, vel iam moribundis, vel ab eo reualefcentibus, natura languet: etiam si quibusdam maxime improbari audiam, dicentibus Coccum baphicam solum astringere, & suo colore robro sanguinem & spiritum similitudinis ratione magis ad se distrahere & dissipare, quàm cogendo firmare. Præterea lapidem Cyaneum [qui eam quoque ingreditur] vomitu & deiectione purgatorium, naturam turbare tantum, & humores melancholicos exagitare, ob quantitatem tam exiguam non vacuare. Ac prior obiectio non maioris momenti nobis videtur, quàm si quis de vino rubro & astringente idem diceret, quod tamen vel magis illud præstare posset. De lapide Cyaneo: etsi Sylius illam probabilis fatis ratione diluere conatus sit, aliud considerandum putamus. Nam ad quid vomitoria atque purgan-

K 2

miscobimus cardiacis & ad robur viscerum destinatus, ut in eadem compositione, quod ille pretendit, denuo ea castigemus: Omitte, & recte castigaueris. Non idem minoris momenti, nobis sane iudicio, fuerit confectio Alkermes: immo vel multo nobilior, quippe quae pacatis generosis, & nullo impedimento turbata, munere suo cardiaco strenue sit functura. Et nouimus viros praestantissimos, etiamque Medicos quosdam apud Monspelienses celeberrimos, aliquando ciuilem fuisse sententiam.

Quaestio de
campo com-
fr. Ager-
mus.

Iouberis
sericinus.

In eius vero compositionis fabrica potissimum dubitatur, utrum sit melius, Grani tinctorij succum, qui sericum nondum infecerit usurpare: an ex serico eo tinctorio resumere ac mutuari. Sagacissimus Medicus Iouberis sericum à Mesueo non frustra requiri existimat, cui succi copia esse potuit: sed utriusque copiam & qualitatem expeti, quem etiam crudum sericum & in substantia [ut vocant] ipse Mesues permixtis aliis immisceat cardiacis. Eiusmodi autem Serico, ut verum fateamur, paulo magis quam nihil virium. Illique sane vires cardiacas tribuere videtur tota ferè Medicorum schola, fide potius implicita, quam ratione bona & aperta. Malimus igitur ipsummet succum accipi, si haberi possit: [potest autem ab iis qui incolunt eas regiones ubi nascitur,] aut ex succo granorum recenti & saccharo Syrupus parari potest, ut & cum aliis succis sit, cui succus pomorum & aqua rosarum addi potest [absque serico crudo] ex quo deinde & ceteris addi solitis confectio praestantissima, quando lubet concinnari queat. Aurum quid in ea possit aut praestet, notant Sapientes. Haec res non est huius instituti.

Manardus
reperit.

Non tamen probatur nobis Manardus in censura Mes. scribens ad eam confectioem se nunquam prostiturum suas pecunias, quod neque in serico vocato, neque in cocco, vel Baphica vel chermes, agnoscat vim nisi constringentem: Idere cor potius, quam iuuare, &c. ei dubio, inquit Apollo, mentem adhibuit Syluius, at difficultate perterritus, insolutum reliquit, nos soluere tentabimus, Sed Deus bone, quam elumbi conatu: ad adstrictionem recurrit, ad rosarum succum aut liquoris stillatium [de quo non quiritur,] ad colorem succi, qui sanguineam dirigat massam atque deservet coloris familiaritate. Miserabilis creatio, ac Medico Philosopho indigna, quaecumque à colore sumitur ratio. Sufficiat scilicet adstrictionem quam Dioscor. & Gal. nos docuerunt, & sensus ipse, ut de substantiae familiaritate nihil tradamus. Sufficiat item scilicet, Ambra, Lignum Aloës, Cinnamomum optimum, Moschum & cetera quae hanc confectioem ingrediuntur, partim & ipsa cardiaca atque adeo etiam cephalica esse, partim succo Cocci baphicæ, quæ basis est eius compositionis, pro vehiculo esse ad partes principes, quas roborat, munit, atque sua adstrictione à vaporum & humorum ingluvie tueretur, aut ipsos etiam spiritus dissolutos cohibeat, & retineat in officio. Tota autem confectio odoris iucunditate non modò oblectat, sed & corroborat, & corporis spiritus vehementer reficit, animumque exhilarat. Sed de his disputent otiose alii, dum nos hic dissertationes fugientes, recensendis & enarrandis viribus immoramur.

Valeria
reperit.

Dracunculæ
et Cocco.

Fallop. Expos. in lib. Hipp. de Vuln. c. Solemus inquit, in vulneribus capitis linamentis uti ex serico grano infecto, ne sit autem chermesinum, quod tingitur vermiculis illis: at si è cocco aut Grano fiat, praestantissimum est, non ex Vermiculo nato in cocco, sed ex cocco ipso, quoniam

linamentum illud vim habet adstringendi. At quia ex navigationibus Indicis adueniunt vermes, quibus purpuram illam mentiuntur, idem semper obseruavi fugere, cum non possim scire, an ex vero cocco, vel ex vermiculis sit tinctura illa.

Iam verò nihil pretiosius, & in maiore fortuna honestius hodie habetur quam coccum, & eo tinctus pannus Scarlatinus dictus, quo Reges quondam à priuatis, nunc nobilitas à plebe vix discernitur. In pretio & honore merito habendum, nisi corrupta morum disciplina, calcatisque sumptuarius legibus, ceu araneorum telis, promiscuum plebi eum colorem nostra tempora fecissent. Vestes scimus eo infici admirabili furo. Atque ut sciamus, Galatiz, Africæ, Lusitaniz granum cocci imperatoris, ut Plin. ait, dicatum paludamentis. Coccina autem, ut habet Martialis, aut ut Lampridius, indumenta coccea, quæ scilicet cocci colorem imbiberunt, olim plurimi fecit Antiquitas, vel hoc unico argumento, quod coccum Imperatoris paludamentis dicatum prodiderit Plin. Huius puluisculo & hodie lanæ inficiunt vivido illo colore, qui in rosis micat, quo aspectu nihil gratius, & in purpuras Tyrias, Diaphanasque aut Laconicas. Etenim Tyrio primum tinctas, mox ex cocco tingere mos erat, aut contra, notante Dalecham. Nam & tertio, quarto & quinto saturabantur, unde nomina illa vestium, Monocoros, Tricoros, Tetracoros, Pentacoros in vitis Principum.

Nunc etiam, ut tradit Confl. ex cocci & Bersilii face pigmentariorum Lacha patatur ad rubrum saturum. Non autem illam Lacham intelligimus Arabum, quod cencamum est Græcorum, hodie ignoratum, ut putatur: sed illam pistorum. De qua etiam doctiss. Fuch. lib. de comp. med. qui aliam Lacham tradit ex Arabum secta, gummi scilicet Kermes, siue Alkermes, ex quo carmesinus color paratur.

COCCVS RADICVM.

DIctum vulgò CHERMESINVM, quod ex herbæ radicibus colligitur, Cramoisique dicitur, iamiam tractandum venit. Ex sanguisorba igitur [attestante Hermol. in Diosc.] radice, quibusdam locis, ut ferunt, vermiculus eruitur, qui curatus, sericis præcipue tingendis purpuram facit incomparabilem. Inuentus casu, excrementis gallinaceis ita coloratis, nam & usus purpuræ, ut est apud Iulium Pollucem ab Hercule videtur institutus, conspecto canis rostro, qui purpuram deuorasset, infecto. Igitur Purpurissimum ex hoc vermiculo Carbasinum à præstanti amphitheatralium velorum [ut arbitratu idem] colore dicitur. Quidam carmasinum appellant colorem: quoniam vermiculus hic Punica lingua carmes appelletur, quemadmodum & coccus. Potest & ab urbe charmi, quæ Sardibus est, nomen accepisse coloris, quod lanæ inficere Sardibus ceptum sit. ut inquit Plinius. De hoc vermiculo nihil apud Veteres inuenias. Hermolao subscribunt cardanus, Amat. Corn. Lacun. Monach. Matth. & Apollo, quamvis & ex alia quoque nasci credant. Sericum [inquit Card.] tingebatur apophyse quadam Bibinellæ, sed nunc maior copia grani, quod è Ficu Indica prodit. Karbisinum parit, quo floribus ille ruber color efficitur, à Kermes Arabum longè alia res est. Hoc siquidem ex illic colligitur, illud autem [ut Amatus quoque testatur

Vermes
serici

Coccina
Coccea
indumenta

Color
gallinæ

Lacha
pistorum

Gummi
Kermes

Sanguisorba

Vermiculus
Purpuræ
Quomodo
inueniatur

Purpurissimum
Carbasinum
Carmasinum
Carmesinum
Coccus

Bibinella
Karbisinum
Nomen est
Kermes
Arabum







ne eum discernere non statuisse inter Fagum Latinorum & Phagum Græcorum, nec demonstrasse Fagum eandem esse cum Oxya Theophr. præsertim cum ex eius descriptione quædam excerptisse videatur. Nec scimus quo nomine donet præter Theophrasti, nisi ei sit Esculus.

Fagi lomen.
Iupiter fagutalis.

Fagus olim Troie magno in honore habitus fuit. Et Latini Fagum suam perinde atque Græci suam Ioui consecrarunt, auctore Goropio. Vnde Iupiter Fagutalis à loco Fageo dictus. Virgil. eam passim celebrat: Eclog. 1.

Fagina pocula.

---Dua tibi pocula ponam

Fagina, cularum divini opus Alcimedontæ.

Fagi signi-
ficatio ab
legenda.
Virg. con-
vult.

Eidem patula dicitur, alta, frondosa, ardua, rotans, ruda, teres. &c. Per tegmen autem patulæ Fagi nihil aliud intelligit, quam Augusti patrociniū. Lusi idem Virgil. Grammaticos, dum, Fagineus axis dixit: quod illud Homeri φάγος ἄξον interpretari voluisse videretur, eo quod sciret ex Oxya etiam axes fieri. Celebrata & olim hactenus egiēgiz ex ea fieri solita. Idem fortè Theophrast. dixit æqualem semine Abieti & ad similem quoque usum comparati. ἔχοντα ἴσους δὲ ab Homero prodit Porphyrius. Locum querant otiosi.

Myfæ.

Xanthus Lydus & Menecrates Elaita auctores sunt Fagum arborem apud Lydos Mylon dici, & Olympum: montem Fagorum sylvis abundare: Vnde Myli populi, ut Strabo inquit & Eustachius.

Pandectar.
q. error.

Hallucinantur qui Oxyam Græcorum, omnium existimant, ut Pandectarius. Vetus interpres, ut notat Goropius, pro Oxya reddidit Fagoscissimam: nescimus unde mutuatus sit scissimæ adiectionem, nec ille se scire fatetur. Tanto magis miramur Hermolaum, Ruellium & alios, alioquin doctissimos viros, etiamque bonos Latinos tam implicita fide falsos, nostris, [id est, Latinis] scissimam appellari: Immo & Scaligerum emundissimæ naris Philologum, ea voce usum, quæ nullus unquam probatus auctor, quod quidem sciamus, usus sit. Non consuetam suam diligentiam adhibuit Tragus in Fago, cum ait: Latine Fagus, Græcè Phegos: aliud genus vocatur Scissima, Oxya, quod non provenit apud nos: docti vocant etiam Myson. Hic triplex error. Fagus Latinorum non est Phegos Græcorum ut ille putat, sed Oxya: quod non aliud distinctum genus à Phago. Et nascitur apud nos Oxya.

Tragi pri-
us error.

Confusio.
not.

Nec placet à Const. in suo Lexico præter Theophrast. misceri cum Fago Plinii, quam tamen ipsemet alibi distinctam agnoscit. Fallitur igitur cum ait: φάγος ὄξυον, Fagea glans Plinio, φάγος ὄξυον Theophrast. lib. 3. cap. 9. Haud enim Fagea Glans est φάγος ὄξυον Theophr. ut ille citat. Immo ne φάγος quidem simpliciter. Quem eundem errorem committunt Ruell. Castor. Dur. Latun. Curtius. Cornar. Russ. Dod. Matthiol. Anguil. du Choul. Had. Jun. & postremus ille historiae Germanicæ, Tabernamontani titulo editæ, Compilator. Adde his omnibus Lonicæ, qui nec ipse Phagum Græcorum & Latinorum distinguere novit, ita namque scribit: Theophrasti duo genera, parum & feminam, alii dividunt in albam & nigram. Fagus nigra provenit in agris, nec ita frequens: cortex eius crassus & hirsutus (Sax. vixit) In medio folii solet provenire bacca viridis acuta: fructus dulcis est, & triangularis: Oblectantur agrorum planicie. Fagus nigram, vocant aliqui scissimam, quia lignum eius facile in assulas scinditur, Græci vocant Oxyam. Hæc Lonic. qui

Plurimum
cum Her-
barum
error.

non animadvertit Phagon Græcorum diversam à Latinorum Fago, in qua nobis nondum cognita differentia à nigredine & albedine, ignota etiam nobis corticis hirsuties: nec nota Fagus, quæ oblectetur planicie agrorum. Ita vides paucos in re herbaria, quid scriberent, aut posteritatem docerent, securos suæ famæ, animadvertisse. Mirandum, hercle, in re tam clara, tam manifesta, addimus etiam tam facili, quam vel sola collatio descriptionum Theophrast. & Plinii adductarum luce meridiana clariorem faciat: quam etiam claram fecerunt, Cordus, Péna, Lob. (qui tamen alibi eundem errorem committit, ut dicetur postea) Goropius, Girardus Anglus, Cæsalp. & Dalechamp.

Videtur tamen doctissimus Hermolaus aliquid subolfecisse, cum ita scribit: Fagus ea, ut quidam scripserunt, quæ in tenuissimas secatur laminas, glandifera non est: Ideoque duo genera siue nomina Fagi sunt: glandem ferentis, materie scabra, quam Græci φάγος appellant, ut fructum quoque Hippocrates: & alterius, quam Græci Oxyam. Sed fallitur in eo quod Fagum, ut dictum, ab hac Oxya distinguit. φάγος verò, ut dicebamus nobis videtur Esculus. Et Ruell. ait: Fagus Græcis Phegos, glandiferis arboribus annumeratur: tamen fructus nihil simile glandi habet. Cætera transcribit ex Hermol. eo non citato, & satis indistinctè. At Phegi fructus similis est glandi: immo ipsemet glans est: quanquam interim etiam nolimus dicere, Fagi fructum planè nihil simile habere cum Glande: nec glandiferis arboribus simpliciter annumerari: nam à Plinio veluti excludi iam antè dictum. Ne quisquam igitur post hac arbitretur præter Græcorum & Fagum Latinorum eandem esse arborem.

Dod. quoque in post. suis scriptis aliquid subolfecit, quando inquit: Ad Fagi genus à nonnullis refertur quæ in Theophrast. dicitur. Sed fallitur tamen idem Dod. quando addit: Plinium & huius arboris meminisse, sed sub ostrya nomine: si modò non per ostrya legendum sit Oxya lib. 12. cap. 21. Nec sub Ostrya, sed Fagi nomine aptissime descripsit Plin. Et si Dod. sedulo caput Theophrast. ubi Oxyan describit perlegisset ac considerasset, deprehendisset, hanc & Ostryam siue Ostryam etiam Plinio dictam, ab eodem, ipsemet capite, satis clarè describi: interposita tantum historia Taxi.] nec suspicio eum incesisset, Plinii Ostryam mutandam in Oxyam, quum arbores reuera sint distinctæ. Tanto magis hallucinatur Girardus Anglus, qui Oxyam Theophrast. putavit esse Ostryam Plinii, quem suam opinionem torpisse ex Dodon. suspicatur. Itaque nullius momenti illa correctio Dodonæi apud Plinium, quæ in Ostryæ descriptione, pro semine hordeo simili, putat legendum, semine Castaneæ simili. Nos Ostryam Plin. eandem cum Ostrya Theophr. censemus, de qua lib. seq. sub Fago sepium, diversâ ab Oxya Theophrast.

Nescit quid velit Io. Ferus, dum in Genesin cap. 1. Fagum nullum fructum ferre ait, sed semen. quæ hæc subtilitas? Siue Fagum hanc nostram intelligat, siue Fagum sepium, siue etiam multorum imitatione præter Græcorum, & fructum ferre & semen, si rectè nouerit, intelliget. Quid discriminis facit inter fructum & semen nescimus: nisi fortè maiores fructus, fructus: minores, semina cum vulgo dicere velit. At ne nesciat ille, & semine fructus est, quamvis non totus vel totum fructus, semen sit. Hæc ad Phycam pertinent, cuius nos non partem tantum, sed totam profitemur. Su-

Glandifera
non
esse.

Phagos
Hipp.

Ruell.
non
proh.

Dod. lapsus

Girardus
error.

Dod. semine
hordeo
simili.
Ostrya Plini
et Theo-
phrast. con-
dem.

Io. Ferus
caute

spicatur ei fortè visam aut cognitam Fagum sepium, quæ parua fert semina, loco fructus, idemque in ea suam subtilitatem exercere voluisse.

Lob. taceat.

Quamvis autem Lob. in Adu. Fagum agnoveritelle *ὄξυς* Theophrast. tamen in suis observationibus hallucinatur, cum scribit, Fagum Dioscor. quereus generi assignare, & consimile munus obire: nam in omnibus openbus ferè à Quereu differt Fagus Latinorum: igitur per *ὄξυς* Dioscor. hanc non intelligit, ut Lob. sui immemore tradidit.

Fagus fructus Quereus Paulonia.

Du Choul. annotat: Paulaniam in Arcadum sylvis, diuersas esse Quereus prodidisse, quarum alias *μαυροδαν* alias Fagos appellat. Non est nobis ad manus Paulaniæ Codex, hæc commentantibus: fortè *μαυροδαν* habet. Idem du Choul Fagum, glandifera arborem agnoscit, sed glande intus trigula. Et tamen paulò post, parum sui memor, subdit: *ὄξυς*, quam Scissina nunc dicunt, non possumus confirmare an glandiferarum in numero rectè possit collocari: fructus in cilyce molli, castaneæ similis dulcedine atque succo. Sed hanc eius habitationem variatione neque peperit error ille communis, quod nescierit Fagum Latinorum esse *ὄξυς* siue Scissina nunc, differentem à Phlego Græcorum: quod toties inculcare pigeret, ne errorum varietas id fieri postularer.

Matth. ex Hist. Lugd. lapide.

Matth. in priorebus com. vitiosam figuram habet, potius Fagum sepium exprimentem. In posteriore meliore n. ubi tamen nullum *ὄξυς* mentionem fuit. Hist. Lugd. more suo duas icones ponit: priorem cum serrato folio, quæ f. illa ad Galiam Matth. iconem facta: alteram ex Dodon. bonam.

Synonyma Lug.

Dicitur itaque *ὄξυς* & *ὄξυς* Græcis, etiamque *ὄξυς*. Theophrast. nisi mendosus sit codex, & *ὄξυς* Hesychio. Goropius passim *Oxeam* vocat, qui sciuit tamen *ὄξυς* Theoph. dici, quem toties citat. Et quid prodest Græcum amplius retinuisse nomen in schola Latina, si Latinum suppetat. Idem *Battarum* à Ballaro Baccho nuncupatam fuisse credit. Quid vocis sit *Battarum* nescimus. Eidem in Hieroglyph. Boek arbor, Græcis *Oxea*, Latin. Fagus. Fructus *ὄξυς* [non *ὄξυς*, ut Const.] *ὄξυς* Theoph. Possis & dicere *ὄξυς* *ὄξυς*. Nunc Fagi. Lydi Myson vocant arborem. Bellon. annotat etiamnum hodie in monte Athos vocari, *Oxya*, & in Macedonia, *Oxyas*. Arab. *Chinass*, aut *Chinam*, Germ. *Buechbaum* / *Bude*. Fructum *Buchnüsslin* / *Bucheychel* / & *Buchäckerle*. Gal. *Fau*, *Fouteau*, *Fayane*, *Hejtre*: fructum, *Fayne*. Mont. belgardi vocant arborem, *des Ase*, & *des Fa*. Belg. *Bueckenboom* / *Boeckboom*: Fr. *Buecken noot* / *reno*. Angl. *The Beech* / & *Beech tree*. Ital. *Faggio*, & *Fagia*, & *Faggi*. Matth. in post. com. Ital. ait, fructum in Hetruria dici *Faggiuola*. Hisp. Castil. *Haya*. Catal. *Fax*: Portug. *Fata*. Hung. *bütsfa*. Frustra Curtius duo eius genera nobis conatur obtrudere, non animaduertens *ὄξυς* quam malè *ὄξυς* vocat, eandem esse cum Fago eius priore seu Latino-rum, à Phlego distinctam.

Locus.

ὄξυς Theophr. tam planis quam Montibus provenire ait, quanquam d. *ὄξυς* etiam quandam inter utramque faciat, ut dictum. In Biquilibis olim, ut prodidit Varro l. b. de ling. Lat. *lucus* Fagutalis, & Viratum Quercuæ plantam facellum: & *lucus* Me f. *lucus*. Viras bestias dictas vult Nymphas, quæ præsent Querceto virenti, *ὄξυς* *ὄξυς* *ὄξυς*, notante Dal. Ex eo loco Plin. Sylvarum distinguebantur [Scandulæ] insignibus, Fagutalis leui [Fagutalis leui Dal.] etiam nunc, ubi *lucus* Fageus fuit, porta Quercueta-

Lucus Fagutalis.

Plin. illustr. Lucus Fageus.

na. vet.] colle in quem vimina petebantur, totque lucis, quibusdam & geminis. Dixerat autem & paulò antè Scandulas è Fago aptissimas. Hæc obiter. Iul. Cesar. lib. de Bell. Gall. tradit in Britannia materiam cuiuscunque generis esse, ut in Gallia, præter Fagum & Abietem. An idem hodie verum, viderint incolæ. Per totam Germaniam familiaris est: amat & montosa sed humentia, & plana. Nam & Plin. teste, descendit in plana. In monte Athos abundat, & in Macedonia montibus: Bellon. In Carinthia Sciria & Carniola sylvis Matth. Nostra cura passim in sepibus topiariis inserta in horto Montb. Vbi & in horto D. Viroti vexilliferi. E. C. perelegans & amplum umbraculum olim mandato Illustr. D. Georgii Patris Illustr. Principis Frid. Ducis V. Virt. & plantatum, quod nec Solis radios circa meridiem, nec pluvias, ac vix guttulas aliquas imbrium admitterebat.

Scandula: Fago.

Calceus.

Floret & frondem protrudit communiter Martio. Fructus Septembri cum castanea maturatur. Arborum fertilitas omnium ferè alternat, inquit Plin. sed maxime Fagi. Excrementa verrucosa in foliis observamus Linnæ: Maio & Iulio proveniunt iuli. Porci fructu saginantur Novembri.

Tempus.

Constanter, inquit Goropius, Sonii saltus incolæ affirmant, Fago cæsa, subnasci ex eodem trunco Betulam, se tamen ut credat, vix adduci posse. Et merito non credendum. Sed potius, si quando Fago Betula succrescit existimandum Betula semen obtenuitatem à ventis facile transferri. Ergo nactum solum & terram commodam facile apprehendit. Talis solet esse, ubi Fagi proveniunt, quarum trunci & radices, excisa arbore, facile putrescunt, ac terræ levem efficiunt, quam facile subeat Betula semen, & geminet. Betula namque terra pingui & crassa aut saxosa semine non bene proveniat: leui facillime.

Seniorum error de Meramorphosi Fagi in Betulam.

Fagineæ glans, tradente Trago, non nihil calide obtinet qualitatibus, potius mucibus & turdis hyberno cibo gratissima. Rarus in medicina usus est. Fagi folia, auctore Plin. manducantur in gingivarum labiorumque vitis. Calculis [Oculis M. Gallis. Guill.] glandis Fagineæ cinis illinitur: item cum melle Alopecis. Folia recentia tusa & imposita, calidis tumonibus profunt, eosque discutunt. Aqua quæ in caulis Fagis & annosis Quercibus quandoque reperitur, singulari remedio ad omnis generis scabiem & impetigines Lichenisque facit, quod seipsum in pecoribus & hominibus expertum scribit idem Tragus. Vipera, teste Ruell. Fagineæ ramuli iactu vel oblato cohibetur. Hæc verò ante Ruellum à Plutarcho quoque prodita. Sed vehementer dubitamus an hæc insit nostræ Fago. Cohiberi posset vel alterius alicuius arboris ramulo, ne videlicet vicerius properet. Verum non ita intelligit Plutarchus. Experiundum possunt Pharmacopœi Patavini, qui Verno tempore ad montes Euganeos proficiscuntur, viperas venatum pro theriaca. Quidam dicunt, inquit Tragus, Faginas glandes vllas & rixtas cum axungia porcina applicatas calide lumbis, conferre calculosis, quod & Matthiol. confirmat. Glires Fagina glande maxime delectantur ac pinguescunt. Quamobrem cum eius aduenit maturitas, teste Matth. innumeri capiuntur Glires in Carniola, Sura & Carinthia sylvis: quippe his in locis incolæ manè videas, qui saccos Gliribus plenos ferant, una tantum nocte captos. Delectantur Fagi fructu etiam mures: siquidem è longinquis regionibus natura ducti gregatim sylvas ingrediuntur. Item & Sciurus graffissimus est ci-

vires & v. sus.

Tumores calidi.

Aqua Fagi ad Scabiem. Impetigo Lichen.

Contra Vipera.

Glirium fagina.

Murium cibum. Sciuri & Glir.

bus,

bus, ac etiam turdis, merulis, aliisque compluribus volatilibus. Glans Fagea suum hilarem facit, carnem coquibilem, ac leuem & vtilem & quoniam. Et sanè in Germaniæ multis locis, præsertim in Saxonia suæ iis saginari nobis relatum. Fagi folia esitata, labiorum gingivarumque vitis mirificè opitulari: tusa item torpentia membra corroborare Marth. asserit. Dod. eadem folia refrigerant, vtiliterq; applicantur pustulis & vlcenibus. Nucleus nonnihil humidus & calidus, cuius licet rictu multus vsus sit in hominibus, dulcis tamen est & esui gratus, vtilis ferè ad omnia, ad quæ Pinei nuclei: videntur vult. At nobis sanè observatum, Fagineam glandem, potissimum virentem & nondum exiccatam, si paulò copiosius comedatur, Lohi instar, caput turbare, ac ipsos etiam sues asserunt, eius elu turbulentos reddi, & tandem obdormiscere: id quod etiam Schvvenckf. testatur: qui ait, caput tentare, & inebriare eos, qui nimium comederint. Fertur pinguedo suum eiusmodi Fagineis glandibus saginatorum mollior, quæque dum coquitur, magis liquecat. Nolumus itaque has nobilissimas ac innocuis Pineis nucleis ferè pares dicere cum Dod. qui & ipse in post. suis scriptis merito omisit illa verba: sed addit: Feruntur renum ex calculo dolores, si edantur, mitigare, & ad Calculorum ac arenularum faciliorem exitum prodelle. Delectantur iidem Columbæ. Est & esca vtilis quæ sita, inquit Lob. & pauperculæ plebi, regionibus calidis & frigidis: sed quas Calidas intelligat, notare debuit. Oleo ex ea expresso paupercula plebs tempore quadragesimali loco butyri vitur, teste Schvvek. Sed præcipua nobilitas, vtilitasque merito quoque habeatur illa quæ Poetarum maximus Virgil. celebrat: Eclog. 5.

Cortice Fagi olim inscriptum. — In viridi nuper quæ Cortice Fagi Carmina descripsi: & mad glans alterna notant. Et Plinius lib. 16 cap. 9. Scribit in recenti cortice ad duces explorator, incidens literas à succo. [incis. literas tegere succo Dil.] Literis ob succi madorem non conspicuis, & cum siccat fuerit cortex apparentibus. Nec non in quidam vsu sacrorum religiosus est Fagi cortex. Sed non durat arbor ipsa. [subaudi, cortice spoliata.] P. Crecentius scribit Canerem Fagi posse allumi ad conficienda vitra.

Modus scribendi. Theophrast. humidissimam oxyam dicit: lectulosque ex ea cedentes & obsequiosos conficere: eadem minoribus navibus commodam: atque in totum ex hac testudinem (Xilodrom: lignum carinis affigi solitum, ne dum subducuntur, lacerentur vel offendantur) condi solitam. Præstare item ad plaustrorum vehiculorumque vilem fabricam. Denique hanc in aqua permanere incorruptam posse, madefactamque reddi meliorem. Cortex Fagi, inquit Plin. Tilix, Abieti, piceæ, in magno vsu agrestium. Vasa corbæque ac patentiora quædam mellibus conuehendis vindemiisq; faciunt, atque prætexta tuguriorum.

Nota. Facilis & in opere Fagus, quanquam fragilis & tenera. Eadem & scutulis laminis in tenuia flexilis, capulisque ac scriniis sola vtilis. Fagis pectines transuersi in pulpa. Apud antiquos & inde vasis honos. Pocula Fagina Alcimedontis, czlato opere facta supra dicta ex Virg. Miramur sanè oxyan Theophrast. & Fagum Plinii olim in tam nobiles vsus vocatam, maximè eius materiem, quam scimus facile putrescere, nisi sit perpetuè tecta aut in aqua sepe merfa, quod sepe nobis observatum in lignis ad vrendum lectis. Si enim sub dio maneant non tecta & ma-

Toma. I.

descant, facile corumpuntur, & ad ignem inutilia redduntur: alioqui inter nobis nota ligna ad focum & carbonem vtilissima & præ aliis optima. Iam si ad formam spectemus, quæ quæso in hoc ligno elegantia, inter tot alia, & tam nobilissima ligna, ut ad czlata opera sit adhibitum? Non facile dixerimus aliam oxyam Theophrastum, aliam Fagum Plinium à nostra Fago intellexisse: hoc enim vetat vtriusque descriptio tam eximie & aperte huic nostræ quadrans. Sed multum potuit Veterum superstitio in rem aliquam, alioqui per se nec valde pulchram.


Plin. nov. Scandulis Fagineis quas Plin. post Roboreas aptissimas dicit, hodiè longè præferuntur Quercinæ. Immo inutiles habentur Faginæ, ob modò dictam causam. Nos concedimus Plinio capsis ac scriniis solam Fagum vtilem. Multa alia hodiè præferuntur. Et ipsemet Plin. fragilem & teneram latetur. Quanquam ad crassiora firmioraque opera nobis satis firma videatur, ut ad plaustra, & similia. Multa quoque utensilia ex ligno Fagi confici solent, & plerumque instrumenta agriculturæ. Annotat Tragus, Fagum in aquis durare incorruptam, madefactamque firmiorem reddi, ædificiis aquaticis accommodatissimam. Theophrast. idem dixerat prius.

Ad 90. Sed non postremus vsus eius, quod in tenuissimas laminas flexiles dissecta, ensium vaginis firmandis interseritur, ad id cultrarius hodiè sola vtilitata.

Lucundum saltem auditu est, quod Io. Coleus tradit, quomodo scilicet in Festo omnium Sanctorum experiri liceat qualis hyems ventura sit: Illo ipso die, inquit, in syluam abito] ut resciat (cas num hyems calida aut frigida futura sit) ad Fagum, ex ipsa assulam recidito, & si quidem fuerit sicca: hyemem expectabis calidam assuturam. sin verò fuerit humida, hyemem sperabis frigidam aduenturam.

CASTANEA.

CAP. V.



Descriptio Dicitur de Quercu, Illice, Agrifolia, Fago Lajunorum. Venit nunc recedenda Castanea inter glandiferas, licet ipsa glandem non ferat, sed Castaneam. Verum ut Glans includitur cupula seti calyce, sic & Castanea si addas echinatum. Primum omnium exent virgas Phœniceas Castaneas, quæ temporis progressu in magnam altam & crassam arborescunt.

Quercuumque annosarum crassitudinem adipiscitur. Cortice vestitur leui, maculoso, subnigro. Est vbi & in cinereum vergat, sed potissimum in ramorum extremis & iunioribus arbutculis. Materies robusta, non sentiens putre-

Corten.

Materies.

Cortex. diem, in igne multum crepitat : cuius carbones itatim extinguuntur, proinde fabris ferrariis expetit. Folia gorit ampla & magna, vncias duas plus minus lata, quatuor aut quinque longa, tenuia, ferrz instar incisa, non nihil rugosa, transversis multis venis in dorso eminentibus à media insigni costa extensa, fructum præcedunt nucamenta dependentia, insignis longitudinis, luteolis apicibus constantia. Fert calyces echinatos, pungentes, erinaceis similes, qui intus, villosi ferici instar, tactu molles sunt. In quo continentur binæ aut ternæ nuges, aliàs vnica, ex lata basi in acumen definentes, compressæ, altitudine vnciali, plus minus, interdum & vna parte in ventrem extuberantes, cordis for nam quodammodò, vt vulgò pingi solet, æmulantes: cortice exterius obductæ, non crasso sed veluti coriaceo, duro ac lento, exterius spadiceo ac læui, excepta basi scabriore & subcinerea, (qua parte adhæsit) internè incana lanugine molli pubescente, cui subiacet alius tenuior cortex siue membrana rufi, crispa & sturis glandis sese insinuans, fragilis, amariçans & adstringens, nucleum siue glandem continens albam, callosam, solidam ac duram satis, qualis glandium ferè Quercus, sed dulcem & gratam palati, potissimum si costa fuerit. Curechino à natura munite videantur Lacunæ, dicetur in viribus.

Differentia et varietas. Castaneæ plures obseruatæ species, Vulgata quæ modò descripta: humilis seu racemosa: Equina dicta & deinde quæ iam alie exoritur infra describendæ. Sed ipsi quoque vulgata suas differentias & varietates habet, potissimum in fructu, vt à vulgò differuntur: Magni, mediocres & parui. Magnæ castaneæ reuera à mediocribus non differunt, sed post vindemias quasas causs, aut gastræ muneris, maiores à minoribus seliguntur: Minores, vulgus Gallorum *Marrons*, *Marrons* Ruell. *Marrons* Curtius vocat: cuius nominis ratio adhuc incomperata nobis est, amplitudine & sporis summe co mundaussimæ. Hæ lautiores diuturnius claudunt. Reliquæ communiter castaneæ dicuntur, & præcipuum saturant ieiunia, quamvis & præmiliæ vulgi mentes adstantur. Illas cineribus obentas prius torrent igni: has & torrent quoque & frequentius in aqua decoquunt ad satiam pleberam aviditatem: vnde Populares Plin. dictæ videntur. Tales Lugduni & passim apud Allobroges videas venales adhuc ab elixatione calidas haberi, & à mulierculis per plateas & compita circumferri, clamando patrio idiomate, *Chattagny chodi*, *tutti chodi*. Adhuc calere, vociferantur. Sed habentur & minime ac veluti ferræ, vix vngues digitorum, ac raro pollicis æquant aut superant, quarum vix decem aut duodecim vnâ magnam pendeant. Videntur & callo esse solutione, gustuq; prædictis longè inferiores. An id cultus faciat, vel locus, vel speciei quædam sit varietas, considerandum. Ruell. sanè duo agnouit genera: maiora, & minora, veluti sunt ferræ. Nullo autem nominis alio discrimine hodiè separantur, tamen si figura, magnitudine, doræque haud parum inter se differant. At Cordus tria facit genera: vnum sylvestre: & duo satiuarum, minores & maiores. Sed in his ita serres habet vt dictum. Matth. satiuas & sylvestres tantum in Hecuria agnoscit, & duo genera dicit.

Differentia Petierum Tarentina. Balanitis. Salaziana. Olim plura habebantur genera, vt legitur apud Plin. Tarentinæ faciles, nec operoso sunt cibo, planz figura. Rotundior, quæ Balanitis vocatur, purgabilis maxime & spontè proficiens.

Pura & plana est ex eis & Salaziana: Tarentina minus tractabilis. Laudatior Corelliana, & ex ea facta, quo docemus in inficis modo. Meterana, quam rubens cortex præfert triangulis, [rubenti cortice, quam vulgus præfert.] & popularibus nigris, quæ codiur vocantur. Patria laudatissima Tarentum, & in Campania Neapolis. Ceteræ suum pabulo gignuntur, scrupulosa corticis, intra nucleos quoque ruminatione. Vel, vt Dal. legit, & clariùs: scrupulosa corticis interioris circa nucleos quoque ferruminatione. Nimirum, tanto adhæsu, & tam arcto, vt interior cortex glutinatus cum nucleo, solidatus ferruminatq; videatur, ideòq; ab eo separari & diuelli nequeat, quod vitium est. Has poltreas Lonie. Plinii differentias adducens, ac si sibi vel hodie cognitæ essent, lapideas porcorum ineptè appellauit. Videtur autem Plin. octo genera fecisse. Nec dubium, inquit Bruer. quin hodie multò plura inueniantur ingenio hominis nihil intentatum relincente.

Varia porro est authorum de castanea historia, videnturque sibi in ipsa nominum varietate placuisse, vnde historia dubia magis ac anceps non rite aduertentibus appareat.

Potendum non conuenit, an Nuges dicendæ, an Glandes, Pomorumque generi accensendæ. Hipp. sanè lib. 2. de Diet. *καρύα* & *κάρυα* dicit, hoc est, Nuges latic: quo loco Cornar. vt dicitur in viribus, *καρύα* conuerta maturas, cum potius nostro iudicio coctas ventere debu. Itaque Virg. molles dixit *Ελογ.*

--- *San. nobis mirta P. ma.*

Castanea in lles & præcipua laltia.

Quamquam Seruius exponat quoque castaneas molles, maturas, castaneas nullas nouimus, aut ab authoribus descriptas legimus, quæ maturitate molles euadunt, satuliores quidem redduntur, gelu molles euadunt, sed tunc esu inutiles. Coctione verò in aqua, aut sub prunis tales redduntur. Ex Turner. tamen sententia non ab resuerit, eatum certum genus intelligere, quum interpret Nicandri castanearum quoddam genus *μαλακὰν*, id est molle appellet. Sic enim scribit. *τὸ μὲν καὶ δαμν, τὸ δὲ καὶ πικρὸν, τὸ δὲ καὶ αὐτὸν, τὸ δὲ καὶ πικρὸν.* Nec ideo ab errore vindicabitur Seruius & Frisius & quicumque eos secuti sunt, qui non speciem aliquam peculiarem, sed in genere bene matuam intellexerunt. Idem Virg. *Ελογ.* Nuges dixit:

Castanea sive nuges, sive quas Iunonia nubar.

Nuges inquit Plin. vocamus & castaneas, quam accommodatioris glandium generi. Castanea, nostro iudicio, Theophrast. est *ἀπὸ κάρυος*, quod scilicet probauerimus vñ ex illo loco, quæ habetur lib. 3. c. 10. vbi ait, *Ὀξύς* scilicet *καρύα* [quam Fagum esse Plin. & Latinorum, antea declaratum.] luxum esse & glandosum in echino, sed non spinoso, verum miti, nec vt *δὲ κάρυος* seu castanea [ita & Gaza vicit] spinoso. Quomodo clariùs potuisset insinuare castaneæ fructum, quum *Ὀξύς* cum illo conferendo fateri quidem habere echinum, sed non, vt *δὲ κάρυος*, *καρύα* dicit: Similem tamen illi esse dulcedine atque succo? Sic & cap. 6. eiusdem lib. castaneam intelligimus, vbi ait: Quidam Quercum, Nucem Apellanam & *δὲ κάρυος* florere exultimant: alii non. Vbi iterum Gaza castaneam conuertit, & rectè. Vbi pro Nucæ auellana, *καρύα* legitur. Sed quando idem Gaza eodem cap. pro *καρύα* simpliciter, reponit Nux Iuglans, fallitur: nos Auellanam intelligimus: quæ [quod ille ait] sicut & *δὲ κάρυος*, castanea, [etiam Gaza] maturè germinat. Et rursum: fructum reddit *καρύα* [Nux Iuglans, Gaza, nobis

Corelliana.
Meterana.
Triangula.
Popularis.
Nigra seu
Codiur.
Differentia
à lonie.

Lonie.
Lapideas
porcorum.

Caria seu
N. latic.
Hipp.
C. m. m. m.
pich.

Castanea
molles.

Seruius
laltia.

Virgilien.
p.

Differentia
Interp. Nuc.

Dios Balanitis seu Tarentina.
Theophr.

Theophrast.
laltia.

his *Auellana*) autumno : *ἡ δὲ βάλανος* seu Castanea, ferilis : nam circa Vergiliarum occasum. Et cap. 7. *ἡ γὰρ* (Amentum Gaza : nos ierua voce Graeca malimus Cachryn reponere.) habet *καρύνα* (Nux Juglans Gaza) & *ἡ δὲ βάλανος* (Castanea. Idem ait : Sylvestris *καρύνα* (Nux glans Gaza) atque *ἡ δὲ βάλανος* (Castanea Gaza) frigoris cupidæ montanæque sunt. Ast nobis Juglans minimè videtur frigoris cupida : gelu enim faciliè perditur. Considerandum an non intelligat *καρύνα* ἡρακλειοτικὴν, quæ etiam lib. 3. cap. 15. simpliciter dicitur *καρύνα*, folio Betulæ, ut subtile explicatum sub *Auellana*. De Castanea facile id concedimus, experientia nò reclamante, & ipso etiam Theophrast. lib. 3. cap. 4. dicente, *ἡ δὲ βάλανος* montium esse propriam, quod an simpliciter verum, in loco patebit. Hæc itaque Theophrast. de Castanea, quam *ἡ δὲ βάλανος* vocat, habet.

Doscor. *ἡ δὲ βάλανος*, quas aliqui *καρύνα*, aut *Αντίμα*, aut *Μότι*, aut *ἡ δὲ βάλανος* appellant. Quidam pro *καρύνα*, legendum putant *καρύνα*, ut apud Athen.

Eleganter, ut omnia, Plinius. Armatum in echinato calyce vallum, quod inchoarum glandibus. Mirumque, viliissima esse, quæ tanta occultauerit cetera natura. Tnni quibullum partus ex vno calyce, cortexque lentus. Proxima verò corpori membrana, & in his & in nucibus sapor in, ni detestatur, infestat. Sardibus ex prouenire primam. Idem apud Græcos Sardinianos (Sardinianos Turni) *βάλανος* appellant. Nam D. Tiberius postea *Balanum* nomen imposuit, (Nam *ἡ δὲ βάλανος* postea nomen i. posuerit,) excellentioribus satum factis. Item alibi: Quorundam extragmina gemmantur vitia, ut in Castaneis. Parum ne clauduntur nucs, corio Castaneæ.

Ceterum Dalech. apud Theophrast. lib. 4. cap. 6. Euboicas nucs, quarum multæ in Eubœa habentur vult esse Castaneas, quas (inquit) posterior ætas glandes Euboicas & Sardinianas vocauit, ut est apud Athen. l. 6. 2. Sed si Euboicæ Theophrast. sunt Castaneæ, ut vult Dalech. amp. ex Athen. Diosbalanoseiutdem Theophrast. non potest esse, quia manifestè superat Euboicas nucs à Diosbalano, qui paulò ante dixerat *ἡ δὲ βάλανος* (Castaneam, Gaza.) plurimam nasci in Timolo & Olympo. Athen. sanè Diosbalanon eandem nobis videtur facere cum Juglande: ita etiam interpretatus est ipse Dalech. Verùm Diosbalanon Theoph. dicere non possumus esse Juglandem: quandoquidem ait: Caryan & Diosbalanon frigoris cupidæ montanæque, quod planè repugnat naturæ Juglandis: quæ occasione improbauimus Gazæ versionem *καρύνα* Nucem Juglandem interpretantis: nos verò, uti dicebamus, eo loco per *καρύνα* intelligimus eā, quæ dicitur ἡρακλειοτικὴ id est, Auellanam. Quæ apud Theophrast. traduntur de Diosbalano à nobis paulò antè citata, respondent castaneæ. Adde quod etiam Diosc. uti dictum est vocat *ἡ δὲ βάλανος*. Hermol. Ruell. Cæsalp. & alii idem faciunt.

Athenæum verò per Diosbalanon intelligere Juglandem, videtur manifestum ex sequentibus eius verbis, ipso sic vertente Dalecampio. Heracleon Ephesus, inquit Athen. Nucs (*καρύνα*) nominarunt & Amygdalas quas nunc Castaneas. (*καρύνα*) Arbor *καρύνα* est apud Sophocl. *καρύνα* *καρύνα* *καρύνα*: Caryæ, Fraxiniquæ. Ebulus. Phægos, Nucs, (*καρύνα*) Carystia. Nucum Ponticarum quas *καρύνα* quidam nominat, Nicander. meminuit. Hermonax verò & Timachidas in glossis tradunt vocari *ἡ δὲ βάλανος* (Id est, Juglandem: Dal.

qui addit: absurdum hoc videri, Castanearum potius illam nomenclaturam esse, quas & *καρύνα* *καρύνα*, & *καρύνα* *καρύνα* appellant, & Castana siue Castania, & Euboicas nucs. Item mox: Heracleoticæ nucs (Auellane: hic fallitur Athenæus, Dal.) quæ etiam *ἡ δὲ βάλανος* [Juglandes Dal.] dicuntur, non tantum alunt, quantum Amygdalæ, & aliquid habent, quod innatet, & quod iterorem ac raucedinem vocis (*καρύνα* Dal. annotat: magis conuenire putauit *καρύνα* & *καρύνα*) efficiat: largiùs sumptæ caput grauant, & minùs offendunt recentes quàm sicæ. Persicæ nucs [Regiæ siue Juglandes, Dal.] capiti non minùs graues sunt quàm *ἡ δὲ βάλανος*, Heracleoticæ, Dal. (quæ licentia? quo autore?) magis nutriunt, os & fauces exasperant: alix minùs ledunt, & ex omnibus nucibus, si edantur cum melle, egeruntur promptissimè. Latæ nucs, (*καρύνα* Castaneæ, Dalech.) magis inflant: minùs noxia sunt elixæ, quàm vel crudæ vel fixæ, & fixæ minùs, quàm crudæ. Philonimus libris de alim. scribit: Nucem latam & Sardiniam vocari: *καρύνα* [sub. *καρύνα*] & *καρύνα* *καρύνα*. Et mox: Mochtheus Atheniensis l. de eduliiis, Nucum Euboicarum siue Castanearum, *καρύνα* *καρύνα* *καρύνα* (*καρύνα* *καρύνα* *καρύνα*) [duobus enim his nominibus appellant] coctionem tradit esse laboriosam vetriculo, & cum multo statu perfici: si quis cunctis superaret, habitorem fieri: Amygdalas autem, Nucisquæ Persicæ & Heracleoticæ [Juglandes & Auellanas, Dal.] & alix omnes, illis (*καρύνα*: Castaneis Dal.) esse deteriores. Ex his tamen cunctis generibus in vniuersum edendum nihil esse quod non sit igne coctum, præter vitides Amygdalas: sed elixari quædam ex his oportere: [ut Castaneas, Dal.] quædam frigi [ut Amygdalas, Juglandes, Auellanas.] Quoniam horum alia sunt naturæ pinguis, ut exiccat Amygdalæ & *ἡ δὲ βάλανος* [Juglandes Dal.] alia sicca & acerbæ, ueluti *καρύνα* (Fagi, Dal.) & quicquid est eius generis. Earum [Nucum, Dal.] quæ vnguinozæ sunt, ignis absorbit pinguedinem. Quæ verò duræ & acerbæ sunt, igni matureseunt, lento

ac exiguo. Diphilus Castaneas (*καρύνα*) vocat Sardinianas glandes: *καρύνα* *καρύνα* *καρύνα* Euboicæ: at *καρύνα*, id est, glandem: alii, ut Nicander Colophonius scribit in Georgicis. Agelochus Amotas appellat Castaneas (*καρύνα* *καρύνα* *καρύνα*). Vbi Sinopice nucs nascuntur, has arbores Amotas dixerunt. Sic dictas annotat Dal. quod sit prouentus illius fructus messis, gentibus nonnullis, quæ Castaneis tantum videntur: *καρύνα* enim metere est: *καρύνα*, messis. Hactenus Athenæi placita ex Athen. satis confusè, ut apparet, de Castanea tradente: cui tamen multum lucis afferat, si, uti iudicamus, apud eum per *ἡ δὲ βάλανος*, intelligas Juglandem, quem ad apud Theophrast. Castaneam.

Talysara inquit Gal. quidam etiam *καρύνα* nominat. Idem earum hispidum Corticem in vsum assumptum lib. 1. de comp. med. part. vocatque *καρύνα* *καρύνα*, id est, Barbam Castaneæ: id quod Plin. echinatum calycem dixit: quem Aëtius *καρύνα* *καρύνα* *καρύνα* appellat, qui & ipse scribit Castaneas etiam Lopima appellari. Virg. Castaneas hirsutas dixit: nimirum adhuc intra luos echinos locatas, ut notat etiam Seruius. Ecl. 7.

Sunt & Iuniperi & Castaneæ hirsutæ
Strata iacent passim, sua quaque sub arbore
poma.

Castaneæ inquit Hermol. Græcè *ἡ δὲ βάλανος*, hoc est, Iouis glans: Nucs vocamus & Castaneas, quanquā propioras Glandium generi. Idem

Castanea
Castanea

Dalech.
nucs.

Latæ nucs

Nux Sardi-
diana.

Sardinian
glans.
Balanus.
Amota.
Sinopice
nucs.

Amota
Sard.
de.

Lopima.

Barba Cai-
staneæ
Echinatus
Calix
Castanea
hirsuta.

Iouis glans

Sardinian
Balanus.
Dalech.

Sardinian
Balanus
Plin. &
Gale.
Dios Balan-
nos.

Euboica
Theophr.
Giant Eubœa.
Glans Sardiniana.
Dalech.
opinio re-
fuit.

Theoph. il-
lustr.

Athen. &
no illustr.

Castanea.
Nucs P-
tica.
Appima.

voluntur, nisi septimo quoque die aut solenni festo, tradente Bruyerino, qui se illac transeuntem ita ab incolis accepisse testatur.

Italicis laudatissimis patria Tarentum, ut dicebamus, & in Campania Neapolis, de quibus Marcial. Epigr. l. 3. ad Toranium.

*Et quæ dactyla Neapolim creauit
Leno Castanea vapore tussa.*

Delectus Vidimus in montibus Euganeis, Rheticiis, ad lacum Verbanum Italix, & Lemani Sabaudix. Integrarum probat est, ut in frigidum mittantur: siquidem bonæ & incorruptæ merguntur, vitiosæ supernatant. In genere recentes & bonæ à putredinis labe infectis, vel non decoratæ secerantur diutius ac pondere.

Tempus. Incunte Vere germinant nec multò post florent, seriusque Vergiliarum occasu fruticant, nepe circa finem Septembris ac per totam ferè hyemem durant. maturo fructu echinati calyces rumpuntur ac hiant. Tum maturæ decidunt Castaneæ. Quidam morè impatientes prælongis virgis sicut nuces Iuglandes arboribus decutunt. Alcernis ferè annis agricola non vberè neesse exultant. Gaudent in Genere montibus & accliuibus: Campestribus interdum degaudent, quas oderunt.

Cultus. Castanea, inquit Colum. roburibus proxima est, & ideo stabilendis vineis hautil: Nux eius in repastinato posita celeriter emicat, & post quinquennium cæsa, more salicti recreatur, atque in palum formata ferè vsque in aleram cæssionem perennat. Putan [Basil. Cod. Palan] terram & resolutam desiderat. Sabulonem humidum vel resolutum totum non respuit, opaco & Septentrionali clui latatur: spissum solum & rubricosum reformidat.

Seris. Seritur à Nouembri mense per totam hyemem sicca terra, & repastinata in altitudinem dupondii & semissi, nuxes in ordineq; semper salibus, ordines autem quinque pedum spatii dirimuntur, in altitudinem dodrantis Castanea depressis sulcis committitur: qui ubi nuxibus confici priusquam complanentur, breues arundines ab lateribus Castanearum panguntur, ut per hos sationis indices cautius fodi & roncari possint. Bina item semina transferri queunt: sed vacuitas binum pedum relinquatur, ne densitas plantulas emaciet. Spissius autem semen propter varios casus deponitur: nam interdum prius quam enascatur, aut siccitibus nux inarescit, aut aquarum abundantia putrescit: interdum subterraneis animalibus, sicut muribus & talpis infestatur, propter quæ nouella Castaneta caluescunt. Atque ubi frequentanda sunt, melius ex vicino, si competit (mergi more) peritica declinata propagatur, quam exempta refertur. Hæc enim velut immota sua sede vehementer germinat. Atque radicibus exempta & deposita est, biennio reformidat: propter quod cōpertum est, commodius Nucibus, quam vitiradicibus eiusmodi sylvas institui. Cultus eiusdem est fossionis positionisque, qui vineæ. Supputar debet bima, quinetiam trima nam bis ferro repetenda est veris principio, ut incitetur eius proceritas. Idem Colum. alibi ante Calendas Martias, vel etiam inter Non. & Idus Martii Castaneas ferere præcipit.

Sumus et cultus et Pallad. Digna obseruatu quæ Palladius in hanc rem prodidit. Castanea feritur & plantis quæ spontè nascuntur & semine. Sed quæ plantis feritur, ita ægra est, ut biennio de eius vita sæpè dubitetur. Serenda ergo ipsis Castaneis, hoc est, seminibus suis, mense Nouembri & Decembri: item Fe-

Tom. I.

bruario. Eligendæ sunt Castaneæ ad ponendum recentes, grandes, maturæ: quas si Nouembri mense seramus, facilem se præsentia fructus ipsius præstat, si verò Febr. ponamus, ut ad id tempus durent, ita faciendum. In vmbra Castaneæ liccentur expansæ, tunc in angustum & siccum locum translatæ Cumulum faciunt. & eas omnes fluuialis arena diligenter operiat. Post dies 30. eas remotà arenâ in aquam frigidam mittis. Quæ sanæ sunt, merguntur, supernatæ quæcunque vexatæ est. Item quas probasti, similiter obrues, & post 30. dies æquè probas. Hoc cum tertio feceris vsque ad Veris initium, facere debebis, quæ mæserint illibatæ. Aliqui in vasculis seruant, arena pariter missa. Amant solum molle & solutum, non tamen arenosum. In sabuloso proueniunt, sed humecto. Nigra terra illis apta est, & Carbunculus, & tofus diligenter infractus. In spisso agro & rubrica vix prouenit. In argilla & glareâ non potest nasci. Diligit cæli statum frigidum sed & tepidum non recusat, si humor assenserit. Delectatur clui & opacis regionibus, ac maximè in Septentrionem versis, ut dictum. Pastinari ergo locus debet, qui huic desinatur arbusculo, altitudine pedis vnus & semis, vel duorū: vel totus aut sulcis in ordinem destinatis, aut certè aratris resolutis hinc inde findentibus. Qui hinc satus ac redactus in puluerem, Castanearum semen accipiat, non amplius pedis dodrante demersum. Vnicuique semini propter notam, furculus debet affigi. Ipsa semina singulis locis simul ternæ vel quina ponantur, inter se quatuor pedum spatio separantur. Quibus transferre placuerit, bimas Plantas transferre debebunt. Locus tamen deductioria liquoris accipiat, ne humor insidens limo, germinem extinguat. Cui placet, potest Castaneæ in propaginem ducere ima virgulta, quæ in radice nascuntur. Nouum Castanetum circumfodi debet assiduè. Mense Martio & Septembri incrementum maius acquirit si putationibus adiungetur.

Breuius paulò aliter Plinius: Castanea pedamentis omnibus præfertur facilitate tractatus, perdurandi pericacia, regerminatione cædua vel salice leuor. Querit solum facile, nec non arenosum, maximèque sabulum humidum aut carbunculum, vel tophetiam farinam, quamlibet opaco Septentrionalique & præfrigido situ vel etiam declui. Recusat eadem Gallicam [glaream D. Calcem, Vet.] rubricam, cretam, omnemque terræ fecunditatem. Seri nux diximus, sed nisi ex maximis non prouenit, nec nisi quinis acervatum satis. Perfringi solum debet supra (supremū Vet.) ex Nouembri mense in Februarium: quo solutæ, spontè cadunt ex arbore, atque subnascuntur. Interualla sunt pedalia (semipedalia, Col. sequipedalia Dal.) vndique sulco dodrantali. Ex hoc seminario transferuntur in aliud, bipedali interuallo, plus biennio. Sunt & propagines, nulli quidem faciliores. Nudata enim radice, tota in sulco prosternitur. Tunc ex cacumine super terram relicto renascitur, & alia ab radice. Sed translata nescit hospitari, pauetque nouitatem. Biennio ferè postea profilit. Idem nucibus potius: quam vitiradicibus plantaria cædua implentur.

Cultura non alia quam supra dictis fodiendis supputandisque biennium sequens: de cætero ipsa se colit, vmbra stolones superuacuos enecante. Cæditur intra septimum annum. Sufficiunt pedamenta iugeri vnus vicenis vinearum iugeribus, quando etiam ea bifida stirpe fiunt, durantque vtrā alteram syluæ suæ casuram. Damege-

L 3

Delectus ad satum

ut Castanea adferenda ad satum.

Terra delectat

Terra proparatio.

Serendi modus

Quando transferenda Cultus post sationem.

Quando propaganda.

Quando prouanda.

Satio et cultus in rām.

Non transferatur Plinius.

Ipsa se colit

- ronti Castanea plantatur & ex virgadicibus, & ex semine. Securius est, eodem tradente, modus ex plantis: post duos enim annos fructum producit. Plantatur ab æquinoctio non solum à seytalis & ramis, sed etiam a uulsiionibus ac virgadicibus, quemadmodum Olea. Seminantur porro Castaneæ non similiter ut Amygdalæ & Noces, sed acuminata parte sursum spectante. Mense Martio vel Aprili castanea inseritur sub cortice, teste Palladio, qui utroque genere sibi probatum ait. Potest etiam inoculari. Inseritur in se & in salice, sed ex salice tardius maturat, & sit asperior in sapore.
- Sermis rati. Diferim.* *Salici.* *Fagi.* *Virgil. ex-pantur.* *Platanus.* *Englandi. Robur.* *Repositio.* *Vires. & vsus.* *Contra Ephemorum.* *Fluxiones stomachi. Sanguinis sputum.* *Temperat.* *Fugis.* *Celaca. Dysenteria.* *Alui flu-zum.* *Ad Hyper-cataractum.* *Elect. con-tra infum sputum sang.* *Cur oculis armata castanea. Camu rob. morum.*
- Fulmineam Salicem fecundant ardua membra Castanea, & multo postea liquore vigant.*
- Idem inquit Virg. l. Georg.
- Et steriles Platani malos gessere valentes, Castaneæ Fagus etc.*
- Dicit quid in quam arborem debeamus inserere, Fago castaneam, non enim in castanea fertili longè ignobiliore fructu Fagum faciliè inseruerit, Vnde aut Hypallage est, ut castaneæ Fagos sit, pro Fagi castaneas gessere, aut mutanda distinctio, ut sit:
- Et steriles Platani malos gessere valentes Castaneæ, Fagos.*
- Hoc est: Infecundæ arbores Platani sortes ramos castaneæ portauerunt. Seruius.
- Castanea, teste Ruellio, Iuglandi, Fago, & Robori infixa comprehendit.
- Annotat Bruyerius: Inferi quidem castaneas: verum non ita feliciter: nam longè plures deperire, quàm quæ incolumes euadant: operosissimamque esse infusionem.
- Castaneæ seruantur vel in cratibus dispositæ, vel intra sabulonem, ne inuicem tangantur, vel in vasculis fictilibus nouis conditæ, & loco sicciorē defossæ, vel inclusæ virgeis ex Fago receptaculis, & lutatæ, ut spuracula non relinquant, vel hordei paleis minutissimis obrutæ, vel palustri vluu densioribus sportis recluditæ. Pallad.
- Castaneæ glandes, quum & ipsæ adstringant, similes etiam præbent effectus cum cæteris glandibus: maximè verò membranz quæ sunt inter carnem atque putamen. At caro illi qui Ephemerum biberint conueniens est. Diosc. Castaneæ vehementer sistunt stomachi & ventris fluxiones, sanguinem excreantibus prosunt, carnes alunt. Torrefactas in cibis gratiss. Moluntur etiam & præstant ieiunio sceminarum quandam imaginem panis. Simeon Sethi & Fuchsi calidas & siccas dicunt, ordine primo. De calore adhuc dubitamus, Coddæ in carbonibus, vel in fictili vase sicco assatæ, & cum melle ieiunis datæ, tussientibus prosunt. Aqua in qua cum suo cortice decoquuntur, cæliacis, dysentericis, sanguinemque excreantibus bibenda haud inutiliter propinatur. Interior membrana quæ corticem fructumque discernit, ad tertiam partem decocta in aqua, & potui oblata, mirè aluum fluentem refrenat, addè ut Dioscor. putet, etiam cathartico dato per hanc portionem iri obuiam posse, si plius, quàm necesse sit, purget. Plin. Valer. Ex farina castanearum cum melle fit Electuarium vtile aduersus tussim & sanguinis sputum. Dod. Monet tamen Lacuna virides damnosæ esse pulmonibus, ac ob hanc causam putat præter tunicam propriam etiam echinato illo cortice armatas esse, ne ab villo animalium attingantur, antequam sint maturæ, in quam rem amplius inquirendum. Castaneæ tritæ cum sale mellæque subactæ rhabdopræparatum moribus vtiliter imponuntur, eodem & Matth. teste, & cum hordeacea polenta, & aceto illitæ mammarum duritias discutere hic ait cum Fuchsi: nos hientem impedire potius, quàm sciam discutere censemur, ob adstringentem illarum vim & aceti repercuentem. Idem ventrem excitare, eò quodd statum gignant, vult. Nos, quia stomacho graues, per se ad eam rem inutiles putamus. Interior membrana rubens, quæ albicans pulpa circumuestitur ex vino austero pota, duarum drach. pondere, sistit valenter immodicos omnes alui fluores, & sanguinis reiectiones: quinetiam cum pari pondere tamentorum Eboris, alba sceminarum profluuiā cohibet ex aqua albæ Nymphææ hausta, inquit idem. Possunt & cum farina subactæ pelli forma subdi, ad suppressendos menses, monente Fuchsi: sed prius in aceto macerare suadet. Emulsio castanearum cum decocto Glycyrrhizæ extracta, addito pauxillo seminum Papaueris, confert iis qui ardore vrinæ laborant, quod remedium sibi communicasse Cratoneum Med. Cæli. testatur Camer. Castanini olei meminit Siphontinus. Indi quoque, ut Plinius ait, & castaneis vinum conficiunt. Porro de castaneis, quantum ad cibum & nutrimentum, variant inter se auctores. Galienus inter crassi succi cibos castaneas cibo laues recenset, atque adeo inter reliquas glandes, quanquam has suisbus magis quàm hominibus accommodatas dicat. Et alibi castaneas, siue elixentur, siue assentur, siue denique fruantur, semper prauas dicit, & multò magis, si crudæ mandantur.
- At Aëtius ex omni glandium genere optimas dicit castaneas, & solas ex sylu. fructuum genere memorabile alimentum sufficere. Esse tamen etiam ipsas capiti graues, vtpote dolorem eius inducentes: sed multò magis his Quercinas. Philo-trimus in lib. de nutrimentis. vbi citat Athen. tradit difficillimè omnes crudas digerere, atque peragrè solui, eum à Phlegmate in ventre retentæ fuerint, propter substantiæ firmitudinem. At Diphilus apud eundem castaneas bonum dicit habere succum, & multum nutrire: at duræ esse digestionis, multumque in stomacho commorari: tostas minus quidem nutrire, sed faciliè digerere: elixatas minus his esse ventosas, & magis nutrire. Sic & Simeon Sethi copiosum corpori alimentum præbere affirmat, sed difficulter concoqui, tardè transire, crassum humorem & capitis dolorem facere, flatuosas esse & ventrem sistere: sed si torrefiant: vel delicescentur, multum nocimenti deponere.
- Cœna Bapt. Fieræ.*
- Qua tibi gratia licet postremo mollescat echino, Sicca est, & nullo Castanea igne calor.*
- In caput & venter inflat a asperissima sanis, Ni spolia apposset mellis arundine.*
- Nimirum ad roxas eius vitandas cum Saccharo comedendas suadet. Non infestius tamen easdem ab hac iniuria vnicò hoc disticho vindicauit Antonius Campanus quondam Episcopus Iteranien-sis perdoctus. Castanea loquitur.
- Ventusam qui me censet, venterique timendam, Falluntur: ventos pello ego, non facio.*
- Lob. Hæffus:*
- Si quem sacra sui vultus Dodona innubatur, Sæuigeri, Stomachum velle habere suu.*
- Castaneas molles parula sub regimine Fagi Ipse ego pro duris Glandibus esse volui.*
- Sunt & ad panificium aptissimæ castaneæ, qualis sanè sit ab incolis illorum tractuum, vbi abundant, præsertim in montibus, vbi quotannis aliam
- Non esse Ventosam.* *Præparatio ad panificium. Quæ non durat.*

rum frugum annona deficit. Primum ut ætatem longissimè prorogent [alternant enim Castaneæ, ut dictum.] castrantur lento illo suo cortice, qui sub echinato calyce primò subest: deinde proxima corpori tunica, quæ infestat saporem, detrahatur: mox ut siccantur exactè, curant sedulò. Nam cratibus sic delibratas imponunt, quas postea in caininis suspendunt: siccitas in usus servat: moluntque in facinam, ac tandem cogunt in panem, quo per hyemem victitant. Integras etiam plerunque cum salla coquunt in capaci cacabo: vicèque pulmentarii ac panis iucundissimè vescuntur. Suprà dictum ex Plinio, molitaram præstare ieiunio seminarum quandam imaginem panis. Coquunt & solas ex aqua, atque ita bellatorum ceterorumque suorum loci comedunt.

*Castanea
refugium.*

Fuere sanè refugium non semel Castaneæ miseræ plebeculæ in maxima annonæ caritate, ut Romæ compertum anno M.D.I. teste Lacuna.

Nostri homines torren eas non modò gratiis, sed & in deliciis habent, præsertim amplissimas illas Marrones dictas, quas cum ceteris promiscue diurnis ac nocturnis commestationibus apponunt: Galli & Itali etiam ex liquore rosaceo saccharato. Alii cum pipere & sale comestis, innocentiores putant, suntque reuera sic paratæ, illicia Bacchi ac Veneris: & de noxa sua plurimum remittunt.

*Bacchi ac
Veneris il-
licia cum
pipere &
sale.
Torrendi
modi
Alia præ-
paratio-
nes.*

Torrentur duobus modis, vel in perforata patella ad ignis flammam, vel sub prunis & cineribus candentibus. Prius tamen quàm igni aut cineribus credantur, cultello obiter vulnerari debent, ut plagæ hiatu, flatus igne citatus euadat: alioqui ubi flagrantem incaluerint concepto intus spiritu, magno cum crepitu prosilient, non sine adstantium periculo. Consumuntur etiam melius stæto: salla humiditas, quæ iis inesse putatur, & æqualiter torrentur. Præsertim posterior torrendi modus: nam in sartagine tostæ vel patella ferrea, ut in cauponis fieri consuevit, partim comburantur, aut certè aliquid fuliginosi Emphyreumatis contrahunt.

Diuturnum culinæ porcellos, intersculos, gallinas & artocreatas insarciunt, sicque assant. Et quid non ingenioso excogitatum ventri. Portentosa gula hyeme ad focum luculentum tostas castaneas ex vino dulci, hoc est, musteo & nouissimè expresso mandi suavit. Ita vides qua ratione à summa necessitate, in qua iis victitabant homines, ad extremam voluptatem sit deventum. Sed sibi solis ista habeant ventres. Nam in totum quomodocunque paratæ, operosæ sunt in cibo, & paulò tantum Glandibus præstant.

Nata.

Viscerum infarctibus oportuna: Colico dolori obnoxii inimicæ, & iis qui ad Calculum proclives noxiæ, si modus absit in edendo. Citra igitur facietatem edendas suademus.

Ligni usus.


Materies arboris ædificiis atque aliis domesticis utensilibus admodum apta est: siquidem non modò ex ea fiunt trabes, tigna, asseres & pedamentæ, sed & cadorum costæ, & eorum claustræ, verum ignari incepta, testibus Matthioli & Lacuna.

Fabris tamen ferrariis carbonem expetitos, quod citò extinguantur, ut antè dictum, suppeditat.

Castaneæ.

CASTANEA HUMILIS RACEMOSA.

CAP. VI.



Humilem Castaneam lo. *Descriptio & Locus*
du Choul nemini adhuc notam ut arbitrat, non longè à Pulatino monte contemplatam, depinxit. Matura nuciæ Attellanæ est magnitudine, echinato calyculo, corio, membranaq; tegitur. Sola nunquam suo calyculo includitur. Multæ simul racematim coherant. Gustu est insuavi. Sequentes ad hanc non referendæ,

Sapor.


nec huius sunt fructus: ob mox dicendam rationem quamvis fortè aliquam similitudinem habeant.

CASTANELLA PEREGRINA: AN-

GORA ARBOR, CASTANEA FRV-

. An amaro.

CAP. VII.



Apod Cl. C. *Descriptio*
Bauh. hunc fructum primò vidimus & deinde à D. Robino Botanico Regio dono missum accepimus. Figura & facie Castaneam non malè repræsentat, nisi quæ ea parte quæ scissilis est Castanea, hæc in gibbum elata sit & concolor, consimili corio universam contegente. Magnitudinem ostendit icon: cortice integitur spadiceo, quali Castanea,

nisi quòd paulò saturatiore, & plusculis striis inæquali. A cuius summo ad imum mucronem hyli facie linea latiuscula, cinerea, striatum itidem eminentius asperata protenditur, ut in altera iconum videre est. Superna partè, (sive infernam dicere lubeat) linea coronali cingitur, intra quam pars clausa nigrior, nullisque striis donata. Impressio arguit alteri cuidam adhesisse. Sapor pulpæ ex albo in fuscum inclinantis (fortè ob vetustatem) ao firmæ, amaricans ac ingratus: Ceterum oleaginosa, ut impressa aciculæ acies

prodidit: iuxta enim oleaginosum quid exfudabat, haud secus ac Nuci muscata, adacta puncturâ. Icon gemina utramque faciem ostendit. An Scalig. de hac scribit ex. 181. parte 10. cum ait: Ad fluvium Nigri arbor, cuius fructus Castaneæ similis, sed amarus: Gor vocant incolæ. Hi sunt Æthiopes sub Libyæ solitudinibus. Io. Leo lib. 1. descript. Africæ tradit has arbores mirandæ vili proceritatis, satis procul à mari in continente. Cæterum si nostra Castanella sit Gor, non potest esse fructus Castaneæ humilis. Repugnat enim iumentis illa proceritas, & locus ubi provenit.

cinereum, sub quo lateat alius succulentus, viridis, lignum ambiens, ut in Sambuco, vel Acere latifolia.

Math. Castanearum aliud genus, in Orientalibus regionibus, de quo tam apud Antiquos, quam Recētiore neminem meminisse putat. Arbor est, inquit, spectata proceritatis, folio Pentaphylli: Echinos fert in cacumine, magnitudine nostratibus æquales, subrufo colore, verum duriore & crassiore putamine, aculeis raris, sed robustis ac firmis, & colore flavescentibus. Singuli singulam continent castaneam, nostratibus ferè similem, crassiore tamen, cortice subnigricante, præterquam anteriori parte: ea enim albicat, maculâ cordis effigiem præ se ferente. Totus idem robustus est, simplex tamen, nullam intra se aliam tuniculam habens, quæ carnem ambiat, illi similem, quæ nostrates castaneæ conteguntur. Sapor pulpæ vulgaribus ferè similis habetur, sed dulcior paulò, nec adeò mandentibus gratus, si tamen ex sicco fructu id quidem rectè percipi potest. Clusius quoque Veteribus ignotam censet. Lob. mixtæ quasi naturæ ex Fago & Castanea dicit, frondibus digitalis Ellebori, Castaneæ alioquin fimbriis donatam, in qua Echinus octennium aut decennium, eiusque nucleum claudit & tætur saporis perboni, seque nonnullas incorruptas prædulces gustasse in Museo Rondeletii.

Casalp. novam opinionem habet: putat Castaneam equinam esse, quam Plinius Myrobalanum appellat folio Heliotropii herbæ simili: fructu Nucis Avellanæ, quæ Glans appellatur, &c. At quæ obsecro folii Heliotropii similitudo cum foliis castaneæ equinæ? Nos Myrobalanum illud Plinii relinquimus sub Nuce Myrtefica.

Equinam castaneam appellant Constantinopolitani, testibus Matth. Casalp. & Clus. qui ait Turcis patrio nomine *Ac ce stanefi*, vel *Ad castanefi*, eadem significatione ob mox dicendam causam. German. *Rose kessen*: Gal. *Chastaigne de cheval*: It. *Castagna di cavallo*, & *Castagne cavalline*: Hispan. *Castanna de cavallo*. Anglic. *Horse Chestnut tree*.

Concedimus quidem Penz & Lob. Matthiolum affabre expressisse in sua figura, ad quam & nostra facta [excepto fructu] si modò florem, quem primus pingit, descripsisset. Ut dubii sumus an verus sit flos, vel fictus. Clusius sane etiam in sua icone, quam habet in post. hist. omisit florem.

Nascitur Constantinopoli, & in Creta, unde de folia accepimus à Cl. Medico Hon. Bello. Ramus etiam cum fructibus incipientibus à Clariss. Zuingero communicatus, qui ait sibi observatam inter Patavium & Veronam. Nobis arbor visa Florentiæ in horto Ducis. Tam Matth. quam Clus. scribit sibi ramum missum Constantinopoli per Qualebenum medicum. Hic speciatim sibi etiam egregiè adolevisse testatur, Viennæ, & intra duodecimum annum, in humanæ coxæ crassitudinem, duarumque Orgyiarum aut amplius altitudinem adolevisse, latamque comam sparsisse. Frigoris patientissimam esse, umbræque & aqua, ut Platanum, delectari.

Adstringunt fructus, & flatu devorati pariunt, si Matthiolo credendum: qui tamen paulò ante saporem tantum dulcem dixerat, nullius adstrictionis mentionem faciens. Idem & tussientibus & anhelosis equis plurimum auxilii afferre devoratas affirmat: darique etiam sanguinem reiicientibus. Id de equis & Clus. affirmat, indeque somen apud Turcas traxisse.

CASTA.

CASTANEA EQUINA FOLIO MULTIFIDO.

CAP. VIII.

Descriptio



Folia.

Castanea equina, quæ Florentiæ vidimus in horto Magni Ducis Hetruriæ, & ex qua fructu cū echyno decriptū habemus, magna satis est arbor, quanta Morus, & valde patula: folia palmata sunt, ex segmentis plurimum septem composita, quorū singula pinnae marinae quodammodo emula, ex angusto admodum prin-

cipio sensim dilatantur, tandem in obtusum mucronem desinentia, per ambitum serrata, quamvis serraturas plerasque veteratoriē sculptor omiserit, longitudine dodrantali: qua parte latissima sunt, palmum circiter lata, à costa media obliquis ordine nervis in ambitum directis, coloris supernè atrovirentis, infernè hilationis, sapore amaricante. Porro coeunt hæc omnia in vnum longum pediculum, estque pediculorum situs oppositus. Fructus ipse non ita in conum desinit, ut vulgatæ nostræ castaneæ, globosior, altera parte spadiceus: quæ verò echino adhæret, impressionem cineraceam ostendit, cui cortici, nulla intercedente lanugine pulpa nostratibus castaneis similis subiaceret. Echinus ipse multò crassior ac firmior, quàm didæ, exterius rufus, prout siccus ostendit, internè albus, durus, sed rarioribus, brevioribusque spinis obsitus, firmis tamen & infestis, colorèq; flauicantibus, qui per maturitatem in tres partes dehiscens, Nucem ostendit, ipsius lateri infima parte inhzrentem, non à pediculo, ut reliquæ. Hanc scribit Clus.

Fructus.

Echinos.

Amentum.

Salices.

Cortem.

Autumno cū folia amisit, proinus amentaceum quiddam extremis ramulis gignere, & turgidum, quasi parturiret, pingui ac lento humore conspersum, in quo culices & huiusmodi insecta hæreant, totaque hyeme ita perdurare, donec ineunte Vere, & præmaturè admodum, gemmæ in folia sese explicent. Corticem ramis tribuit, novellis quidem virentem, adultis autem

Castanea Orientalis

Sapor:

Diu arbori hæret.

Myrobalanum.

Casalp. opinio rarior.

Nomina ling.

Matth. nov.

Locus.

Sarini.

Coloni.

Vfus & viret.

Tussis & quorundam

asthma

Sanguinis

CASTANEA PERUVIANA.

CAP. IX.

Locus Scribit Clusius Hist. post. Castaneæ hoc genus sibi ab Abrahamo Ortelio Cosmographo Clonatum, quod is ex Peruviana provincia delatum à Celeb. viro D. Aris Montano acceperat. Sphæricæ inquit, penè est figuræ hæc Castanea, nisi latera haberet paullo depressiora: præsertim ubi

Cortex exterior.



Spina.



Putamen interius.

pediculo inheret, cortice satis crasso, fragilitamen, & veluti fungoso obdusa, coloris ex fusco aliquantulum flavescentis. Huic subsunt innumere, tenues quidem sed firmæ spinæ, putamini, quonucleum includit, tenaciter hærentes: ipsa putamen fuscum est, non densum sed lentum & fractu contumax, in tempore parte læve & splendidum, quo

Nucleus continetur nucleus Amygdalæ [putamine suoliberæ] magnitudinis & colore, forma autem leporino reni similis, intus albus, sapore dulcis ferè ut Amygdalæ aut Castaneæ vulgaris.

Spina.

CASTANÆ PURGATRICES.

CAP. X.

Descriptio Fructus est arboris eiusdem vultus, Castaneis similis, sed calyce lævi, non, ut illarum, echinato: calyce fructus continetur. Castaneis non idmodum ab similibus, sed sine cortice, & ferè quadratus, in duas partes divisus, medum intercurrente, & totum deinde ambiente pellicula. Ex maritimis Nicaragua & Nata (quæ sunt in novæ Orbis Cōtinenti) invehitur in hispaniam. Editur hic fructus viridis, aut coctus vino exceptus: si siccus, eius pulvis ex vino aut Gallinæ iusculo sumitur: datur etiam tostus, ut minus purget. Quocunque tandem modo sumptus, sine molestia purgat, observatis ut quæ à purgatione observari solent, & præparatis prius, ut decet, humoribus. Illud verò minime silentio prætereundum, pelliculam illam exteriorē & internam abieciendam esse, alioqui gravia Symptomata excitantur veluti ingentes vomitus, animi deliquia, & periculosa alui profluvia. Calidus est in primo gradu. Ex Costa: qui fructum Cholagogum vocat: It. Castagno purgative. Castanea purgante Castor. Dur. Possis Germ. Purgierende Castanien. Gal. Chastaignes qui purgent, appellare.

Locus.

Vires & Vfus.

Purgans.

Cautio.

Noxa pellicula.


Fructus Cholagogus.

CASTANÆ SPECIE FRUCTVS

PIREGRINVS.

CAP. XI.

Descriptio Mediocre Castaneam non tantum magnitudine, sed & tota forma refert, ut pro ea primo obtutu possit fallere: Color tamen paulo



dilutior ad flauū inclinat: nitore & læuitas eximia, excepta basis porriuncula oblonga, quæ videtur aut arbori aut echino adhæsisse. Cortex extimus admodum tenuis fragilisque, cui fungosa substantia adnata lubest. ipsa verò carnis vacua sit: quo fit ut si signis & mus fœdus. Læuitas. Huic illi. nostris Principi. mite D. - Pludatus nunc Fructus peregrini Indici.

Descriptio

Cortex.

LEUCOMA FRUCTV CASTANÆ.

CAP. XII.

Descriptio Fructus quem ex India accepi, inquit Monar. Leucoma eis dictum, similis est nostrati Castaneæ: cum colore, cum magnitudine, cum etiam sessili illa & albicante parte, quam Castaneæ obtinet, quæ prægans videtur. Arboris est vultus magnitudinis, materiq; firmæ & robustæ, qui folia Arbuti. Fructum edulem gratique saporis esse aiunt, & alui profluvia sistere, quoniam adstringit. Temperatum afferunt.

Descriptio

Arbor. Folia. Vires & Vfus. alui profluvia.

GLANS INDIAE DV CHOVL.

CAP. XIII.

DV Choul in fine libelli sui de Quercu scribit: superesse Indiæ Glandes, Latinis suo iudicio & Græcis incognitas, de quibus se non posse aliquid viris optimis tradere, neque describere, quoniam arborem non viderit. Egregiam sanè verò excusationem: quasi verò interim non ipsam Glandem sine arbore describere potuisset. Ex icone [si quando viderint] occasionem sument studiosi, inquirendi, an non aliquid commune habeat cum Castaneis purgantibus antea descriptis. Nobis sanè videtur, quoad figuram accedere ad Ahouai, de quo inter Nuces exoticas lib. 4.



nequit. *Femina* candidior & flexibilis, ex quo citius [sic: *gaza*, *cunast* alij, *Canistros*.] la-
ciunt. Item odoratio. [Plin. mari tribuit odo-
rem] Præterea mas sterilis est, & sine flore: *fe-*
mina & florem & fructum gignit. Flos calyci si-
milis [sic: *gaza* Calyculo intectus: nec ad
verbum, nec ad rem.] iuxta folij pediculum, &
anni sequentis *Cachrya*, suo petiolo innixus e-
mergit, viridis, dum in calyculo est: detectus ve-
rò subflavus. Floret cum domesticis arboribus.
Fructus rotundus, oblongus, Fabæ magnitudi-
ne, *Hederæ* acino similis, masculus quidem
quintifidus, angulis, veluti *Albis* emittenti-
bus, & in acutum se contrahentibus: Minor verò
minus divisus. Gravidior exsculptis, minuta quæ-
dam tenuisque emittit semina, quanta *Atriplicis*.
Folium & cortex suavia, dulciaque. Folium figu-
ra *Hederæ* simile, verum in ambitu sensim ma-
gis rotundatur, & iuxta pediculum id, quod velut
in gibbum prominet, a folij medio, longiore tra-
ctu in acutum magis cogitur: suntque folia per
ambitum crispa atque serrata. Lignum paucam
medullam habet, ac eam quidem haud multò mol-
liorem materie, quæ scripta mollior est.

Hæc Theoph. ex quo Plin. pleraque suade ead-
em transcripsit in hunc modum. In *Tilia* mas &
femina differunt omni modo. Namque & mate-
ries maris dura, rufiorque ac nodosa, & odora-
tio. [de femina id Theoph.] Cortex quoque
crassior, ac detrahitur inflexibilis. Nec semen
fert aut florem, ut femina, quæ crassior arbore,
materie candida, præcellensque est. Mirum in
hac arbore fructum à nullo animalium attingi:
foliorum corticisque succum esse dulcem. Inter cor-
ticem & lignum tenues tunicæ mul-
tiplici membrana, & quibus vincula *Tiliz* vo-
cantur: tenuissima earum [tenuissimum corium.
Vet.] *Philyræ*, coronarum lemniscis celebres, an-
tiquorumque honore. Materies teredinem non
sentit, proceritate perquam modica [hoc ad *Phil-*
lyream pertinet] verum utilis. Mollissima *Tilia*,
eadem videtur & calidissima: argumentum affe-
runt, quod citissime a scias retundat. Et mox: Fri-
gidissima quæcunque aquatica: lentissima autem
& idem scitis faciendis aptissima, quorum plaga
contrahit se protinus, cluditque suum vulnus,
& ob id contumaciis transmittit ferrum: in quo
sunt genere *Fici*, *Salix*, *Tilia* *Betula* &c. [Hic Plin.
sibi contradicere videtur, magna oblivione, qui
paulò ante *Tiliam* calidissimam ex Theoph. dixe-
rat, nunc frigidissimam dicit. Nec verum, frigidis-
sima quæcunque aquatica: *Salix* amara neuti-
quam talis nobis videtur.] Sol ad Aquilonem
scandens, vertit *Tiliz* folia ad mille usus peten-
da. Quod postremum ante ipsum dixerat
Theoph. cap. 16. l. 2. caus. ubi, postquam de folio-
rum circumactu à Sole locutus fuisset, addit: hoc
latius in *Tilia* [sic: *gaza*] patere, quod hæc amplio-
ra candidioraque folia gerat. *Tilias molles* dixit O-
vid. Dicitur & apud Poetas *sequax*, *laxa*, *pinguis*,
clumba.

Mirum Hermol. in re tam manifesta hallucina-
tum, ut *Tiliam* Græc. *Phelyream* [sic enim ille
habet.] nostris quoque *Phelyram* & *Philyram* di-
ci tradiderit. Certè tantum differt *Philyrea* à *Phi-*
lyra seu *Tilia*, quantum *Myrtus* à *Quercu*. Non
igitur rectè *gaza* *Tiliam* vertit, eandemque
cum *gaza* Diosc. confundit, & præterea cum
Philyca. Sic enim quoque à Theoph. vocari ait.
Eandem censuram meretur Ruell. dum *Tiliam*
Græcis *Philyram* dici scribit: & Diosc. esse arbo-
rem magnitudine quæ *Cyprus*.

Marcellus more suo Hermolam capiti in
versione Theophrast. quod *gaza* dicitur in
convertat, quam, quid sit, scire Græcum litera-
tum imperiti non sūt. Ipse tamen & geminum in-
currit errorē: Primo quod *Phillyream* Diosc. con-
vertat *Tiliam*: Deinde quod demonstret eam
plantam esse *Philyram* sive *Phyllam* eundem
Dioscor. quam nos *Tiliam* diximus. Sed quod pu-
tat *gaza* melius in temperaturam converti, per
nos licet: Optassemus tamen declarasse, quam
vim aut qualitatem agentem per illam tempera-
turam intellerit. Vult autem *Tiliam* marem
esse sutoriam *Tiliam*, in omni opere tractabilem,
quæ pectinum sutorum sequaci facilitate no-
men aliis omnibus arborum pectinibus dederit.
Passim enim *Tiliam* nunc in arboribus Italos di-
cere lineas, ductus, intersectionesque & circun-
ductiones illas, quibus confecta omnis earum
materia & in seipsam stipata convolutave vide-
tur: quod natura tam diversum opus Græci
non sūt. Plin. eos imitatus *pestines* dixit: & in quibus
variarent pectinum illorum lineæ & intervalla,
semper adiecit aliquid, quo varietas illa indicaretur,
obliquos, crispas, nodososve dicens. Etsi
verò idem Marcellus sibi ab Hermol. ostendi op-
portet, sitne nostrati *Tiliz* antiqua illa eadem: (di-
cit autem nostratem, quæ in Hæturia nunc ab om-
nibus *Tilia* nominatur, ex qua secandis coris
sutores paratam ubique tabulam habent, in stil-
lam partem rectis pectinibus, sed quæcunque
serramentum agatur sequacem & cedentem,) ip-
se tamen quoque nihil certi adstruit, neque sa-
ne adstruere potuit, quippe qui apud Diosc. *Phil-*
lyream, *Tiliam* converterat, & *Ligustro* magni-
tudine æqualem hanc arborem secerat: atq; qui
ligni pectinibus adhaerens, (quos Græcis *κτάνιστρα*
vocari diximus) seu per longitudinem rectis pe-
ctinum modo lineis, nullam earum esse in ea su-
torum tabula & arbore caussatur, sed in omnes
partes sequacem pariter & facilem sectionem: an-
tiquiores tradit Græcos ex agresti pro sutoria illa
tabula usos: expertos namque in duriori materia
acui ferrum, in molli verò in secando ductum re-
tundi, atque aciem amittere. At si Marcellus
Theoph. *gaza*, ex quo eius marem & feminam
agnoscit, cum *Phillyrea* Diosc. contulisset, & rur-
sus hanc cum *Tilia* sua Italica, facile agnovisset,
hanc ad *Philyram* tam propè accedere, quam à
Phillyrea, & arboris magnitudine, & tota aded
forma distat, nec ex nuda tabulæ sutoriæ (quam
tamen *Tiliaceam* fuisse agnoscamus) pectinum
carentia, & accersita illa etymii ratione, dubita-
set, an *Tilia* nostras sit *Philyra* Theophr. & *Phil-*
lyra Dioscorid. diversissima à *Phillyrea* eiusdem.

Nihil doctiorem se Botanicum præbet Cor-
dus, quando ad caput Diosc. de *Phillyrea* scribit,
ab eo describi *Tiliam* omnino eandem cum *Li-*
gustro, si invicem utriusque descriptionem con-
ferat. Galeni & Aeginetæ ætate talem *Tiliz* histo-
riam in Diosc. lectam. Atque siue *Tilia* à Diosc.
ita descripta sit, siue ab alio hæc descriptio adie-
cta, falsam esse pronunciat, ob id quod nullus,
neque ex prisca neque ex recentioribus hinc
notis eam depinxerit. Omnes [addit ille] mani-
festè describunt *Tiliz* appellatione eam arborem
quæ German. ob ligni lenitatem & molliem cin-
dendè vocatur. Ac miratur hoc nullum ante se a-
nimadvertisse: quod omnes qui post Dioscor. de
rebus scripserunt, aut alios interpretati sunt, ut
que ad nostram ætatem, eam controversiam de
Tilia inter Diosc. & Theophr. silentio præterve-
rint. Et tandem supervacuum concludit esse hi-
storiam.

Gaza a-
lium error.

Medulla.

Tilia histo-
ria ex Pl.

Vincula
Tilia.

Philyra.

Plin. sibi
contradi-
cere vide-
tur.

Tilia mol-
lis.
Epinura.

Hermol.
lupus.

Ruell. ra.
xat. *Philo-*
ra.

Tilia Ger-
man. nudo
dicitur *Lam-*
da.

aut iuglandis nucamentis. Ut suspicio sit, eos Quercum, quæ nondum protrulerat omnino sua folia, & iam ista nucamenta ostentabat, sumptisse oscitanter satis pro Tilia.

*Tilia Cordi
lulifera.
qual*

Cordus quidem in sua obs. Sylva scribit sibi visam Tiliam grandem Veris medio aut paulò antè lulos ferentem longos, colore flavos, propè Nuringam oppidum in pago. Sed quam is Tiliam intelligat, dolemus nos non recordatos testitati, quando ipsi adfuimus apud Illustr. Palatinam viduam Illustr. Ducis Lud. VVirttembergici. Nemo præter ipsum, quod equidem sciamus, Iulorum istorum in Tilia meminit, nec facile fortè animadvertentur in vulgatis Tiliis, quas sanè plus satis diversis anni temporibus contemplati sumus. Theoph. tamen, vi dictum etiam Cachryn Tiliæ tribuit.

Consideratione digna descriptio Cæsalp. Tilia [inquit] arbor in Alpibus tantum provenit, Alno similis, fructus minor quàm Alni, striatus, semina inter squamas continens depressa, materia alba aut flavescens. Etsi autem hic videatur Cæsalp. hanc nostram Tiliam intelligere: tamen nec in Alpibus tantum provenire, dicimus, nec Alno valdè similem, quamcunque tandem intelligat. In materie quoque nullam flavedinem hæcenus observavimus.

*Tilia fœmi-
na.
Schubertf.
canat.*

Cæterùm Tiliam hanc, de qua hic agimus plerique fœminam statuunt, ut Fuchl. Dod. Pen. Lob. Cæsalp. Hist. Lugd. & Schuvenckf. quibus non gravatè subscribimus. Non placet verò eam à Schuvenckfeldio Tiliam fœminam sive fœcundam dici, cum incerta sint ea epitheta: quia altera folio minore, de qua postea, multis in locis est fœtiva, & passim fœcunda quoque. Præterea fœmina hæc nostra, etiam spontè in montibus provenit, & viscum fert. Proinde nec à Trago quidem rectè simpliciter fœtiva dicta. Quid nobis videatur de Tilia mare Dod. Penæ & Lob. dicetur postea cap. de Fago sepium sive Ostryæ. Quamquam Cæsalpinus difficilè putet coniectari posse, quamnam sit Mas, cum folia non describantur: suspiceturque intelligi posse Lignum putidum vulgò dictum, de quo nos l. 5. de Spina Burgi, ubi hanc Cæsalp. opinionem reiecit. Idem paulò ante scripserat, suspicionem esse, ne Plin. cum Vlmi genere comprehendat carpinum utramque, aut Alnum, Tiliamque quasi mixta dictam.

*Trago
mar.*

*Cæsalp. opi-
nio repreh.*

Pistia.

*Car. Steph.
error.*

*Nomina
Linguar.*

Elymn.

*Philyra
cortex.
Philyra ho-
monyma.*

Apud Amatum Lugdunè excusum, icon Tiliæ, incuria typographica malè posita pro Cisto mare.

Fallitur Car. Stephan. dicendo Philuram interdum Philycam appellari. Dissert enim Phyllica à Phylira quicquid dicat Stephanus.

Tilia, *עלי*: Hebr. ut placet Eliz in nomencl. Ascherach: Germ. Linden / & Lindendbaum / à ligni mollitie, uti volunt. At Gorop. in Indoscyth. Tiliam gemina ratione Linde dici scribit: & quia pulchra sit, & quia fasciæ & funiculi ex ea fiant. Belg. Linde / Lindenboom. Gall. Tiller, Teil, Tilleu, Tiller: It. Tiglia, Tilia: Hisp. Teia. Angl. Lind tree. Boh. Lpa. Hung. hac fœ. Cortex eius quoque Philyra dicitur & Tilia. Sed & aliarum arborum cortices interiores eo nomine donantur. Sic Plin. l. 24. de Vlmo: Corticis utique inquit, interior Tilia lepras sedat. Et paulò post: Idem præstant & Tiliæ corticis &c: Et hoc ipsum etiam lib. 16. his verbis idem Plin. declarat: inter corticem & lignum tenues tunicas multiplici membrana, è quibus vincula Tiliæ vocantur, tenuissimæ earum Philyræ Coronarum lemniscis celebres, antiquiorumque honore.

Philyram Theoph. ibidem nasci scribit, ubi Cæsalp. Locustæ. In locis servidis difficillimè prodit. Et Plinio autore, montes & valles diligit Tilia: item aquis gaudet montibus. Pingue latiusque folium desiderat, in stercoreato optimè proficit: in arido ac saxoso rigè adolescit. Tiliam Asia inquit Theoph. difficulter recipit: & in hac alenda cultores hororum vehementer laborant. In toto Germaniæ tractat, in urbium & meenium arcibus delitiis habent, ob opacitatem quam vel per se, in vel atregias disposita, de ambulantiis reobantiis huiusque tempore æstivo præbet. Et finè vix videas aliam arborem in Germania, aut fortè in tota etiam Europa, quæ cum Tilia opere topiatio, & ampla ac patulailz vastitate ceteris.

In primis nobis Basilea inter alia nobilissima naturæ dona, quæ habet, & huius stipatu ac ornata triumphat, ubi plureis arboribus ac sylvas hac unica arbore confitas videat, præcipuum illius ætatis urbis decus, quod totus sæcè Iunius cum Maij parte media ingeminat suavissimo florum per totam urbem afflatu, non sine incolarum ac transeuntium salubritatis iuvamento. Sed præ cæteris sacra & topiaria amœnitate conspicua, quæ iuxta summum templum in regio illo viridario ad Rheni aluentis ripam, vasto illo propugnaculo cœu humeris Colosseis elato, ex quo Rheni tractus utramque urbem alluentis & circumiacentis provinciæ præclarus & cuius promiscuus patet prospectus: vulgò die Phalez vocant, quasi Palatinam dicas. Item extra urbem passim præcipue etiam in amœnissimo illo scolopetariorum campo.

Tiguri quoque Helvetiorum, ut ipsi vidimus, & in scripta retulit Gesnerus, magnæ proceræque collem Palatinum, quem vulgò Aulam (den Hof) nominant, quam plurimæ decorant, pulcherrimo Tiliæto: & extra urbem passim in fossis circa mœnia, egregiè spectantur, ut passim sub eis sedula in umbra non desint senibus & aliis animi gratia obambulantibus. Harum maxima truncum habet inferius ea crassitie, ut si viri duo mediocres amplectantur, dodrantes quinque adhuc superint. Sed præcipue spectabiles sunt duæ illæ huius generis arbores, quæ infra urbem statim ad Limagam visuntur, media inter eas domo, cui planxæ utrinque iunguntur, in qua conveniunt, qui scolopetis exercentur, ita digestæ, ut mensis aliquot in utraque collocatis, maximus conviviarum numerus, tanquam in cœnaculis & tricliniis capiat, infra, supra & circumquaque brachiis, & frondibus Tiliarum ambiens, &c. Similes aut etiam elegantiores Scaphusæ Helvet. ad Rhenum visuntur. Insignis quoque visitur Moguntij in S. Albani cœnobio 20. crassis columnis lapideis suffulta, quæ nihilominus quotannis excinditur, teste Lonicer. Est & in Silesiæ cœmeteriis, artis hortis & sylvis notissima, ut notat Schuvenckf. quamquam Dod. scribat rard in sylvis nasci. Calceolarius annotat Tiliam provenire in Baldo. Considerandum an sit ea amplissimo folio, quam postea describemus. Copiosè etiam provenit in Essexiæ Angliæ, in nemore, duobus tiliaribus Clocestræ, teste Turnero. In Italia provenit asperis tantum montibus, inquit March. quibus maximè gaudet.

Omnes quidem sic formandæ arbores, ne trunco cubitos quatuor excedant, ut quicquid ab ea altitudine superest, arborum in tabula a li-
ye her.

*Basilea Tig-
lioni fuit
triumphat.*

*Tiguri
quæque.*

Calceol.

ve brachia & ramos effundatur, sicut & de quercu Basiliensi supra dictum est, impietatis illo genere, à quo & Impiam herbam denominavit antiquitas, quod filij incendunt patrem, minores ramuli brachiis, è quibus oriuntur, superemineant. Tilia utraque, quod in hortis Lutetiae nunc spectatur, industria Bellonij fecit.

Tempus. Paulò ante æquinoctium germinat Tilia: floret Maio & Iunio: fructum maturat Augusto, qui mox septembri adaperitus satiscit ac sua sponte decidit. Aestivis solstitiis folia sua vertit, ut prodidit Theoph. In multam ætatem vivit hæc arbor crediturque supra centesimum vivere, quales multæ videntur Basileæ, quarum satum ne avi quidem nostri viderunt.

Cadendi tempus. Theophr. Tiliam post vindemiam & Arcturum cadendam suadet.

TILIA FOLIO MINORE.

Descriptio

Folia

Flora



TILIA folio minore nobis dicta, non minùs patula est arbor quàm prædicta. Folia tamen multò sunt minora, ad Betulæ accedentia, colore ferè Populi Libycæ non hirsuta ut Tiliæ præcedentis, folio maiore dictæ, sed firmiora rigidioraque. Flores tamen similes, nisi minores essent, coloris eiusdem, pallidi odorati, formâ accedentes ad Ber-

berim, umbellam ferè efficientes, sex septem, octo, novem, aut etiam undecim, ex luteo foliolo seu amento prodeuntes, ut in alia Tilia, sapore acido cum lentore: quibus succedunt fructus parvi, hirsuti, angulosi, ut in alia. Matèries similiter alba, lenis, sed cortice magis scabro obducta. Hanc facillè crediderimus prædictâ firmiorem & duriorè: tota enim arbor torosior. Fert & hæc viscum.

Tilia syl. Sap. De hac sic Tragus: Tilia sylvestris sativæ per omnia respondet, nisi quòd folia & flores gerit magis exiguos: præterea & frondem nigriorem. Florem edit tardius sativa Tilia, qui nullo post se relicto fructu aut semine decedit.

Theoph. in hunc ferè modum suam quoque Tiliam delæavit.

Tilia fl. omni r. a. Visa nobis in VVirtembergico monte, ubi nobilis & antiqua illa arx Teckhana Hl. Ducum VVirtemb. Tilia (de qua & in Bollenfium fonte Admirabili, fontiumque historia salubrium Vni-versali) quæ fulmine tacta fuit noctu, mense Septembri, & sub ea novem vaccæ exanimatæ ex peculio E. C. sub castabulantes. Ista Tilia non erat eius speciei quam antea descripsimus folio maiore, sed ad hanc accedebat, quam vocamus folio minore: nihilominus tamen ei folia erant maiora, quamvis glabra, nec hirsuta: ipsa quoque arbor maxima, neque in hac specie glabra illa maiorem ob-

Tom. I.

servavimus. Dubij hæremus, an sit species quædam particularis, vel varietas tantùm foliorum: quæ tamen si constans & perpetua, & ipsa speciem efficiet, quòd nobis facillè persuaserimus.


Etsi verò, ut dicebamus, Tragus hic depictam atque descriptam, sylvestrem vocitet, & fructum non ferè dicat, quemadmodum & Gesn. qui & Tiliam sylvestrem & sterilem dicit, nobis tamen & Basileæ & Montbelgardi & alibi locorum fructifera observata.

Cûr Schuvenckf. dicatur quædam erigere, nescimus, id est Tilia montana minore folio: Steins linde / Walblinde Tilia mas & saxatilis Matth. At nobis Tilia mas sive saxatilis Matth. videtur Vlmus, nobisque consentit C. Bauh. ut dicitur sub Vlmò. Marem Theoph. dicere vix quisquam rectè ausit, cùm eius folia non speciatim describat. In tabella ad latus prima exortus folia picta habes.

Gaudet hæc eisdem cum præcedenti locis: Speciatum Basileæ inter ceteras visitur, sed rariss, quia ob foliorum parvitatem paulò minùs patula. Exiit & pulchra Montbelgardi in fori angulo, supra quam quondam tugurium pulchrum & amplum, cum mensis erat exadificatum, comestantium refugium haud insolens. Nasctur & in tenebrosis ac latissimis VVaisgovæ sylvis: item Silex tam sylvis quàm montibus: atque in placi-bus Ducatus VVirtemb. pagis.

Florentem observavimus in fine Iunij, quum aliud genus iam deflorisset. Tardius etiam fructum perficit.

TILIA MAXIMO FOLIO.



Vix horæ spatio distat ab urbe Basilea mons à pago vicino Mutetis vocatus: proli Apollinæ quotannis aliquoties à Celebratissimo Medico ac Botanico D. D. Calp. Bauhino, fratre & adf. nostro eò stirpium varietatis causa, tanquam ab altero quodam Apolline, produci solitæ, notissimus. In eo, inter cetera haud passim obvia, provenit arbor quædam ad

Tiliam folio maiore accedens, cui solum speciatum, amplissimum, dodrante interdum laius, hirsutum, in appendicem angustum fastigiatum: quodq; hirsutum etiam apparet in dorso quòd nec vorum eminentia decorat. Sed præstat ipsius descriptionem adicere.

Tilia mas nova arbor, crasso caudice, ramosa, matèria uti Tiliarum robusta, [cæteratam alioqui matèries mollis, etiam præcis & neotericeis Herbariis testibus] cortice lanuginoso, subrufo: foliis magnis, quæ vix rotundantur, ut in femina fit, monente Theoph. l. 3. hist. c. 10. sed in acutum angulum desinunt, Mori sativæ foliis quoad formam simillima, eo excepto, quòd profundè sunt serrata, ex virore nigricantia, prona verò parte

M. 3

splendens, Tiliæ feminæ vulgaris, foliis triplo & quadruplo maiora: in qua hætenus nec florem nec fructum videre licuit. Quam tamen ab annis septendecim nunc observavi, cum in monte nostro Muteto (quo studiosos singulis annis deducere solemus) ob plantarum copiam, verè Apollineo, plures sint arbores. Tiliæ femina non est, nec etiam Tilia sylv. Tragi, cui folia multò minora. Fortè Tilia mas Theoph. 3. hist. cap. 11. quam sterilem & nullo flore esse scribit.

Ceterum Tiliæ æquivocationes non paucæ. Dicitur sunt species tres, & fortè etiam adiungenda quarta illa Techsiana. Est & Tilia lulifera Cordi iudem dicta. Du Choul autor, Sorbum torminalem dici à nonnullis Tiliam feminam, de qua suo loco. Dicitur & Tilia de Fago sepium. Quidam & Vlmum pro Tilia exhibent, cuius & interiores tunicæ dicuntur Tiliæ. Item Aceris genus maius (de quo postea) à Corn. Tilia putatur, minus benè. Phillyrea Diosc. à multis confunditur cum Philyra Theoph. De illa lib. 5. Cæsalp. Lignum putidum existimat esse Philyram marem, quam opinionem refutavimus l. 5. c. de spina Burgi. Quidam sibi persuadent Ligustrum esse Tiliam & Phillyream Diosc. non distinguentes Philyram à Phillyrea: de quare supra plus satis. De Ligustro actum lib. 5. Quidam Philicam Theoph. confundunt cum Tilia, Philyra & Phillyrea. Et Hermol. redarguit meritò Vallam, quod Itcam, quæ salix est, interpretatus sit Tiliam.

Tiliam calidissimam esse supra ex Theoph. dictum: addita ratione cur ita sentiat, nempe quod tincturam ferri secantis emolliat. Ast nobis sanè atque expertis aliter videtur. Nam & Cerdones qui tabulas ex ea expetunt oppositum experiuntur, in coriis incidendis: nam ob molliem suam cedit ferro, ideò non retundit, quia non secatur. Nec ea qualitas cultri aciem corrumpens hætenus à nostris observata. Sed apertioribus rationibus, nescimus an item experimentis, ripatus incedit Fuchf. Cùm sic inest: Calidam esse Tiliam, vel ex eo liquet, quod frigidis cerebri malis, Epilepsiæ, & id genus aliis mirificè conferat. Amaritudo etiam cum glutinositate quadam in ea reliquis qualitatibus prævalere videtur, si hanc degustes. Quare abstergendi planè facultatem, cum modica adstrictoria, perinde atque Vlmus (cuius facultates illi Plin. tribuit) habere evidentissimum est. Si quispiam vires quæ à recentioribus Tiliæ tribuuntur, probè expendat, nihil ab iis quæ ex Plin. & Gal. sententia de Vlmò dicuntur differre comperiet. Nam maculas faciei abstergere scribunt Tiliam, si illa eius succo lavetur.

Mederi etiam morbo Comitiali bibitum eius liquorem stillatitium, oculis claritatem inducere, calculum sanare, tumores discutere. Quid multa? omnes facultates Vlmì obtinet Tilia, ideòque vulneribus etiam recentibus succurrit, & alia quæ à Diosc. & Galeno in Vlmì historia commemorantur, potest. Hæc Fuchf. Nobis consideratione & inquisitione dignum videtur, annon scribat Tiliam amaram ex imaginatione. Is alioqui, cùmque sequenti Matth. Dod. & Curtius Vlmì vires tribuunt Tiliæ, decepti verbis Plin. qui, uti dicebamus, interiorem corticem Tiliæ vocat. Fuchf. præterea & Dod. non observant Plinium tribuere Tiliæ, quod attribuitur Phillyreæ, longè diversæ plantæ, ut rectè etiam monuere Cornar. & Matth. Lonicetus verò, licet agnoverit Phillyream diversam à Philyra: nihilominus tamen vires Phillyreæ obliuiose tribuit Tiliæ. Quas vires Plin. Tiliæ

tribuit, omittimus, ob dictam modo causam. Plin. met. fam. Competunt enim Phillyreæ, non Tiliæ, quæ Philyreæ.

Cortex & folia Tiliæ, inquit Dod. calore temperata sunt, nonnihil siccantia & adstringentia, temperamento penè similia Vlmò. Tiliæ cortex commanfus, ac inde illitus, vulneribus secentibus agglutinandis efficax est. Folia verò trita & aqua conspersa, pedum tumores discutunt. Humor à medulla castræ arboris defluens, capiti illitus, capillos reddit, defluentisque continet, teste Matth.

Baccæ seu fructus Tiliæ tempore oportuno collectæ, & in pulverem redactæ, in Dysenteria, aliisque alvi profluvii summopere laudantur, nam & ea ratione in expeditione quadam multos milites conservatos Camer. prodidit. Eadem cum aceto trita, in nares datæ potenter Hamorrhagiam sistunt. Baccæ aliquoties (imparem numerum superstitionis præcipiunt, quod nec Camer. magni facit, nec ab ullo docto & sapiente probatur) deglutitæ, validè sanguinis è naribus profluvium compeſcunt, ut in primaria quadam persona experientia comprobatur. Ex recentibus Tiliæ foliis expressus succus, cum vino mistus & calidus artubus infusus, spasmo flatulento benè facit. Quidam eadem trita & aqua conspersa, atque emplastri modo imposita, singulare contra eundem spasmus in gravidis remedium iactant.

Tiliarum è floribus (quorum perquam suavis odor, & cum vitium floris odore similis suavitatis) aqua destillatur in frequenti usu tam apud Germanas quàm Gallas mulierculas. Existimatur autem à doctis modicè calida, sicca & emplastica. Pota utilis ad Epilepsiam, cordis tremorem, uteri dolores, calculum renum & sanguinem in corpore, ob casum aut ictum aliquem, concretum, ad quod remedium aliqui etiam tritos Tiliæ carbonem admiscunt. Dosis est unica uncia aut sesqui. Oculorum dolores mitigat, & locos igne aut quavis materia fervente adustos sanat, idque efficacius, si interior cortex albus Tiliæ in hac aqua maceratur, aut eius loco Cydonij grana, aut Psyllium, & nata inde mucilagine loci illinantur. Aliqui liquore vi ignis extracto ex sanguine Melis seu Taxi adversus pestem utuntur, tradente Evonymo. Quidam inquit Tragus, aquam Tiliæ florum destillatam, adversus ventris tormina exhibent, & non sine ratione: nam intestinis à Dysenteria erosio illa convenit. Alij adversus morbum Comitialem usurpant. Tilia usta, aceto carbonibus restinctis, cum oculis cancerum tritis sumpta, concretos sanguinis grumos exigit, his qui ex alto delapsi fuere, ita ut sanguinem excreant. Tunicæ seu libri medij, qui cortici & ligno intercedit, aqua macerati, lentus viscosusque humor ambustis singulari remedio prodest, quod experientia multos docuit. Scimus etiam aqua florum Tiliarum plerisque mulierculas uti ad faciei sucum. Ex carbonibus Tiliæ, qui pulveri bombardarum parando abhibentur, præsentissima mors multis creatur, ita ut Tilia & salubria præbere & necom asferre possit. Suntque qui existiment Tiliæ carbonem pulverem pyrium veneni suspicionem liberare, argumento, quod idem lapsis ex alto, ex liquore aliquo utiliter propinari soleant. Ceterum mirari subit, cur Theophrast. Tiliæ seu Philyreæ fructum à nullo, mandari posse scribat, { o tñt qñd qñt qñt

An Tilia
mas Theoph.
æquivoca
Tilia.

Sorbus tormi-
nalis.
Fagus se-
pium.
Vlmus.
Acer maior.

Phillyrea.

Lignum
putidum
Spina Burgi.
Ligustrum.

Philyra.

Salix.
Valla er-
ror.
Tiliæ vires
& usus.

Epilepsia.

Macula
faciei.

Comitialis
morbus.
Virus.
Calculus.
Tumores.
Vulnera.

Fuchf.
Matth.
Dodon.
Curtius er-
ror.

Lonicus
lappus.

Vulnera
Tumores
pedum.

Dysenteria.
Alvi pro-
fluvium.

Hamor-
rhagia no-
ritum.

Experientia
tam.

Spasmus.

Aqua fo-
rum.

Epilepsia.
Cor. 4. tra-
mor.
Viresden-
ter.
Calcium
renum.
Sanguis
concretus.
Oculorum
dolor.
Ambustia.

Pestis.

Tormina.

Sanguis
grumosus
à casu.

Fucus sa-
lvis
Pulsis
pyrium.

Theoph. ibi
fugit.

Idem Theophrastus, inquit:] cum alibi tradat folia Tiliæ dulcia esse, & à multis animalibus comedi: Vltimum enim hoc verum. Nam & Basilæ pauperulam plebem folia pro vaccis & capris adventante hyeme recondere solere scimus. Fructum quidem negligunt, & ipsa quoque respuunt animalia: & eundem Tragus ab omnibus animalibus tutum esse scribit. Gustavimus tamen non semel, & dulcem comperimus, atque innoxium. Quare illud, *ἡ δὲ ἄσπις*, non ita intelligimus, ac si omnino mandi nequeat, sed quoddam nulli animalium cibo ac nutrimento idoneum sit. Folia etiam non solum sua natura dulcia, (qui tamen dulcor exiguus & viscidus) ac propemodum insipida nobis visa sed & per accidens, ex roris cælestis incubitu, à quo multa ita oblinuntur, & glutinosa evadunt ac si melle madefacta fuissent: ut iam olim pueri didicimus.

De Tiliæ
flores com-
dantur a
piscibus.

Porro num Tiliæ flores apibus competant, nondum apertum videtur. Columella sanè Tiliæ & Taxi, ex omnibus, flores apibus nocere dicit, repudiandosque esse. Ego, quod ad me attingit, inquit etiam Tragus, crediderim flores Tiliæ apibus, licet maximè ab illis expectatur, minimè conducere. Sed quare non conducant, aut conducere possint, nullam adfert rationem: & horum neuter ostendit, in qua re noceant. Virgilius sanè commendare videtur pro apibus Georg. 4.

*Ergo apibus feris idem: atque examine multo
Primum abundare, et spumantia cogere pressu
Mella favæ: illi Tiliæ, atque uberrima Pinus: etc.*

Pinus sanè apud autores pro apibus commendatissima. De Tiliâ diligentius inquirendum.

Corticis
sum.
Ad scripturam.

Libri ex
Corticis Tiliæ.

Nobilissimus & corticis usus, in quo olim scriptitatum, sed recenti opus, in quo ad duces scribat explorator, monente Plinio. Modus expositus in Vlmō. Et Gal. 6. Epid. scribit, quosdam valdè antiqua Hippocratis exemplaria, ante trecentos annos exarata, habuisse, alia *ἡ δὲ ἄσπις*, alia, qualia apud se [sua ætate] in Pergamo. Langius quoque in epist. librorum meminit in delicatioribus ex Tiliâ corticibus conscriptorum. Sed hic usus iam dudum inolevit, suppetente pergamento & charta factitia ad eam rem longè aptissima. Crassiores Tiliæ cortices vidimus Nurtinæ pedali latitudine, longitudine competente in circumplexos, quos cinis imponebant, in quibus lintea lixivio perfundebantur, ut eo corticose circulo supereminente cineres cum lixivio supereminentes continerentur. Plin. lib. 16. c. 9: ex Tiliæ cortice vasa, corbæque, ac patentiora quædam, messibus, vindemiisque convolvendis, atque prætexta tuguriorum fieri scribit.

Ligni usus.

Sed materiei utilitas non postrema. Theoph. in opere facillimam dicit, [*Τὸ ἴσος ἔχει*] ob suam molliem. Foris navium longarum & arcuum, mensurarumque fabrica expetendam. Habere & corticem ad cistas (seu cunas ut Gaza vertit) faciendas idoneum. Ex iis namque fabricari solere. Verba sunt: *ἵχνη δὲ καὶ τὸν πάλιν χρῆται, ὡς ἐν τῇ* *τῇ ἱστῇ. καὶ τὸν γὰρ ἐξ αὐτῆς.* [non ita autem ut exemplaria habent. Nam antea, *ἡ δὲ ἄσπις* *τῇ ἱστῇ* dixerat. Sed hic etiam alterum membrum deesse, non malè suspicatur Corn. ante *τῇ ἱστῇ* *τῇ ἱστῇ*. Gaza vertit: Habet etiam corticem sanibus cunisque percommodum: ubi, sanibus de suo addit, quod in eius sit situm fide, nisi ita in quodam exemplari vetusto legerit. Materiei Tiliæ usum non satis laudare hodie possunt sculptores simulachrorum, ex ea quippe omnia penè simulachra parantur. Levis est, ac levis sit magis arte, tenax, facillè secatur. Diu durat. Ab us aliquando sciscitantibus

Theoph.
Corrigitur
illud.

nobis, dum ex Tiliæ ligno imaginem Christi salvatoris exsculperent, cur non uterentur Acere, responderunt, cariei obnoxium esse, Tiliæ nequaquam. Atque in primis etiam ex Tiliâ Lapidarij sculptores suas Ideas (*Ἰδέαι* vocant) parant. Ex eodem ligno optimi sunt carbonēs pro delineationibus pictoribus expetiti.

Carbonēs
pictorum.

Et ut nihil, quantum in nobis erit, utilitatis Tiliæ omittatur, & aliud memoratu dignum: Cinesiam Poëtam Græcum flagitiosissimum, tam gracilem fuisse, uti perhibetur, ut Tiliaceis asseribus corpori circumdatis imbecillitatem suam fulciret, uti Philetas alter poëta, plumbeis orbiculis circum pedes adalligatis, ne vento subverti posset. Cinesiam verò Aristoph. ob illam causam Philyreum vocitabat. Vltus etiam his Antoninus pius, ut testatur Capitolinus. Quum (inquit) & longus esset, incurvareturque, tiliaceis tabulis in pectore fasciabatur.

Cinesia
Poëta ful-
cra Tiliæ
cum.

Cinesia
Philyreus.

Antoninus
pius.

Solent & Germani, ramos Tiliæ ordine quodam in amplexitudinem distribuere, ac palis suffulcire, ut sub umbra eius, quæ omnium arborum maximè innoxia putatur, ætatis tempore, parulaque ramorum opacitate recubantes, sese recreare commensationisque instituere queant. Hinc fortè tritus ille verus.


Recubantes
sub parula
in gurgule.

Tiliæ sub Tiliâ ducit subtilia fila.
Viscum Tiliaceum quidam caduco morbo obnoxius salutarem prædicant.

Viscū usum.
Morbus
Caducus.

V L M V S.

CAP. II.



PLURIMIS ramis brachiata Vlmus arbor procera, interdum infra instam altitudinem subsistens, cortice cinereo, nunc lævi, nunc profundissimis sulcis, eminentissimisque porcis secundum rami longitudinem exarato, interiori albo flexibili: materie item alba, firma. Ante omnia flores promit, ex ramulorum extremorum tuberculis, in

Descriptio.

Cortex.

Materia
Flores.

muscarum congestos, ex ramulis plurimis atropurpureis, quorum terni aut quaterni includuntur receptaculo oblongiusculo in viridi purpurante. Floribus succedunt foliacei utriculi compressi, seminibus triplidis similes, multi, ex oblongo rotundati, magni tenues, & in extremo parum fissi: in quorum medio semen parvum, tenerum, planum, candidum, sapore dulci: masticatum glutinosum reddit succum, ut & cortex. Tandem post semina, ex ramulorum, qui semina sustinent, fastigiis folia se proferunt, lætius primum virentia, post obscurius, oblonga, crispata, in ambitu serrata, aspera, quinque aut sex, & interdum septem digitorum longitudine, latitudine duorum, trium, aut quatuor, utrinque ex rotundo fastigiata per

Utriculi foliacei.

Semen.

Folia.

mediam longitudinem rectus & à tergo magis conspicuus transit nervus, à quo alij minores ceu costae, recti & veluti paralleli exeunt, in unotamen latere plures, quos fit ut altera foliorum pars alteram longitudine vincat, ut ingeniosè observavit Cordus, & quodammodo in nostra iconè apparet, minùs tamè aperte quàm optatemus. Foliis quotannis ferè adnascuntur folliculi cavi, tuberosi, subrotundi ac diversarum figurarum, in quibus primum glutinosus quidam liquor, ex quo vermiculi exigui gignuntur, qui in minutos culicellos transfiguntur. D. Casp. Bauhinus Basileà ad nos misit ramum Vlmi, cui folia ampla, palmum longa, & uncias quatuor vel quinque lata, aspera, in quibus præter serraturas sunt etiam laciniae quaedam: cui icon Lobeliana Vlmi latifoliae respondet.

In Alsatia propè Polvillam arcem in sepibus observavimus Vlmi speciem cui folia valde crebra, parva, nec multò maiora articulo postremo pollicis, plurima etiam minora, minùs rugosa, supernà parte nonnihil lucida, non aspera, nervi-fabrè, eleganti ac exquisito ordine disposita. Talis ferè ramus etiam Monspelij à nobis collectus, nisi folia essent maiora, minùs lucida, & nervi non ita argutè dispositi: in quibus etiam mense Septembri erant folliculi prædicti. In omnibus his Vlmi varietatibus apparet nota prædicta, à Cordo observata.

Tragus diligens Botanicus Germaniae duo Vlmi genera sic describit. In Germania, maximè ea quae Rheno contermina, Vlmi duo genera reperiuntur: quorum alterum latius se diffundit, alterum procerius evadit, utrumque agro VVormatiensi persimiliare: nam is in locis nullæ ferè aliæ arbores plantantur, quàm Vlmus, Populus alba, & Salices. Ex his Vlmis una perquam procerà evadit, nullo fructu prægnans, in humidis ut plurimum pratis, ad ripas fluminum, & in circuitu pagorum proveniens, ædificiis construendis expetita. Alterius verò generis Vlmus & ipsa in altum attollitur, sed plurimis ramis in latitudinem magis diffunditur. Gaudet agnis edito loco sitis. Florem suam hæc arbor profert, qui & fructus eius est, antequam folia producat. Hic Attriplicis maioris seu hortensis foliarum refert semen: nam singuli flosculi per se spectati oboli latitudinem obtinent, & à maturitate in auras volant.

Theoph. l. de hist. plant. c. 8. Vlmum vuas & folliculos quosdam ferè scribit. Id genus Vlmi, inquit Tragus, mihi ignotum est. Folia utriusque Vlmi à nobis descripti complicata quodammodo apparent, crispaeque, ac Orni foliis longiora, quæ cùm Aprilis & Maio mense pluvii, subitoque calore solis insequente infestata fuerint, corrugantur protinus, ac tum ex illo humore in corrugatis foliis vermiculi exigui culicem formam gerentes nascuntur, qui progressu temporis evolvant. Pari ratione & Chamæssili tenella folia vitiantur.

Nec abs re fuerit & Italicas Vlmus à doctiss. ac insigni Philosopho & Botanico Casalp. descriptas produci. Vlmus, inquit, arbor ingens, in latitudinem magis, quàm in altitudinem funditur, provenit in collibus & planis: quaritur ad vites sustinendas: cortice valde aspero, rimoso & crasso, aded ut ramuli novelli striati appareant extremis furculis tenuissimis, folio Carpinis, breviori, magis rugoso, minùs serrato. Floret primo Vere ante foliorum exortum racematim circa

ramulos: flos Persico similis, rubens, ex flammibus tantum constans, transit in foliaceum quiddam, unguis magnitudine subrotundum, medio quodam dorso, in quo semen parvum continetur, deprellum & oblongum, quod mense Martio perficitur, antequam folia omninò exeant. Vescas præterea fert in æstate, in quibus humor continetur, qui cōcrescit in gummi in iisdemq; animalia culicibus similia reperiuntur. Alterum genus habetur cortice lævi, rufo, vel cinereo & maculoso, quod in altitudinem ingentem adolescit. In utroque genere quaedam steriles omninò reperiuntur.

Theoph. Vlmum *πυλιν* vocat, cuius genera duo tradit: prior *πυλιν* hoc est, montana dicta: Montivlmum verut Gaza: novè: altera Prelea seu Vlmus simpliciter [quam Plinius campestem verut] Differunt quodd Vlmus fruticosa magis sit: Montana maior & amplior. Foliis gerit minime fissum [excidit] leviter in ambitu serratum, oblongius quàm Pyri, scabrum non læve. Ipsa arbor magna est, & altitudine & magnitudine. Non abundat circa Idam, sed rara est. Amara rigua. Materia flava, dura, nervosa, deformis: quippe tota cor est, qua utuntur ad fores lautiores. Cùm viret casu facilis: ubi exaruit, difficilis. Putatur autem sterilis esse. Fert & gummi in folliculis vel loculis. *πυλιν* in vulg. ex. habetur *πυλιν*: Gaza male transulit, petiolis: nec scilicet Plin. ad Corycum montem] & animalcula quaedam Culicibus similia: [*πυλιν* *πυλιν*]. Cachryn etiam edit peculiarem autumnò, multam, minutam, nigram. Cæteris verò temporibus [*πυλιν*: Ald. habet *πυλιν*] quid ferat, non animadvertum. Dixerat tamen idem Theoph. prius, in Vlmi folliculis genus quoddam bestiarum innasce, quod Cnipes vocetur [*πυλιν* *πυλιν*]. Quid verò differant inter se *πυλιν* & *πυλιν*, dicitur [[à me Cherleto] in opere de Insectis. Idem Vlmo, humorem in lachrymæ modum densari scripsit, sicut Abieti, Piceæ, & Terebintho: per quem humorem, qui *πυλιν* ab eo dicitur, nisi illud glutinosum in folliculo intelligit, ulterius inquirendum quid velit: præsertim cùm resiniferis annumeret, sicut & Gummi ferentibus, Amygdalo, Pruno, Ceraso, Junipero, &c. Expressè autem etiam alio loco ait: quibusdam à natura datum esse, ut plura producant: Vlmum enim & uvam genere & folliculos: *πυλιν* *πυλιν*. Quæ autem sit ea, quæ uvas fert, nobis nondum innotuit.

Vlmo & Plin. gummi tribuit ad nihil utile: ex quo & Culices nascuntur. Sed quando addat: in Coryco monte Cilicæ, deceptus fuit Græcæ vocis apud Theoph. similitudine. *Κορυκ* enim folliculus ille dicitur, quem supra descripsimus. Plin. non benè in montem convertit. Ostendemus etiam in vinibus, haud profusus inutile esse illud Gummi, ut ille putabat. Idem & alibi lentitiam Vlmo tribuit, sicut & Fraxino, Moro, Ceraso, sed licciorem ponderosiorèmq; quàm Platano & Alno. Qui in nostratis Vlmi folliculis gummosus conspicitur liquor, magna ex parte madidus est, non siccus. Considerandum an fortè & is cum Theophrast. alium intelligat, aut an talis sit in regionibus calidioribus. Neque verum quod idem scribit, Vlmum Atiniam fructum nullum ferre, hoc est, ut ille ait, ne semen quidem, nisi ea planè diversa ac distincta sit à nostra Vlmo: sed lubet eundem de Vlmi differen-

Folliculi.

Foliorum
Serraturæ.

Lacinia.

Minuta.

Folia
Serraturæ.Germania
Vlmi gene-
ra duo.Vlmus pro-
cera.Vlmus la-
ca.Folia in
folliculis
abunt.

Vermiculi.

Vlmus ha-
lca.

1.

Plin. Pers.

Serraturæ.

Gummi.

Steriles
humini.Prelea
Theoph.Amples.
Mon. a. a.Campes-
træ.

Asteris.

Gaza
Plin. a. a.

Cachry.

Vlmus
fer.

Plin. error.

Alnus
error.Tertius
Plin. error.

tilis tradentem audire. Sic autem ait.

Vlmi diff-
erent. Plin.
Montana.
Campe-
stre.
Atinia.
Siccan.
Gallica.
Italica.
Sylvestris.
Marita.
Inter has atque frugiferas, materie Vitiumq; amicitia, accipitur Vlmus. Graeci duo eius genera novere: Montosam, quae sit amplior: Campestem, quae fruticosa. [ramis plurimis opaca, sed exiguis & brevibus.] Italia Atinias vocat excellissimas, & in iis Siccanas praefert, quae non sint riguae. Alterum genus Gallicas. Tertianas nostrates, densiore folio, & ab eodem pediculo [furculo Vet.] numerosiores. Quartum silvestre. Atiniae non ferunt Samaram: [Colum. ferunt quidem, sed rariorem.] ita vocatur Vlmi semen: omnesque radicum plantis [radicibus plantarum. D.] proveniunt, reliquae semine. Idem & alibi Maritae Vlmi meminit: & Vlmus in genere ramulosa folia tribuit. Marita autem Vlmus est, cum qua Vitis maritatur, ut specialius dicitur in situ & cultu.

Albina.
Czsalp. praedictas differentias ex Plinio citans, quatuor in Italia ab eo numerari scribit: sed pro Atinias, legit Albineas. Et ut ne quis putet esse typographicum errorem, sciat, eius vocis nullam extare correctionem inter errata in fine posita, cum tamen minoris momenti eiusdem paginae exaggeret, unius tantum literae mutatae, Samorae, pro Samarae. Quae autem Amentum ferat, & Vvas, nondum vidimus, [addit Czsalp.] ut suspicari liceat, ne Plin. cum Vlmi genere genere comprehendat Carpinum Vtramque, aut Alnum, Tiliamque appellatam, quasi pteleam. Plin. tamen etiam alibi Atiniae meminit, eamque propter nimiam frondem, Vitibus ineptam dicit.

Plin. 16. 20.
Theoph. & Plin. ex- ph.
Plin. duo genera Co-
lum.
Gallicum seu Atinia.
Vernaculum.
Tremula & Platanus.
Samara.
Plinium taxat Solerius, quod Vlmum male dividat in quatuor species, aliter atque Theoph. atq; Colum. Gallicam Vlmum & Atiniam esse Montanam Theoph. Vernaculam, Italicam, Nostratem, & Campestem, & Theoph. Pteleam seu Vlmum simpliciter esse utrum & idem. Cui sane non gravate subscribimus, praesertim Columellae, diligentissimi Geoponici verba considerantes, qui ita habet. Vlmi duo genera, Gallicum & Vernaculum. Illud Atinia, hoc nostras dicitur. Atiniam Vlmum Tremellus Scrofe non ferre sameram (quod est semen eius arboris) falsè est opinatus: nam rariorem sine dubio creat, & ideoque plerisque & sterilibus videtur, seminibus inter frondem, quam prima germinatione odia, latentibus. Itaque nemo iam ferit ex samera, sed ex sobolibus. Est autem Vlmus longè latior & procerior, quàm nostras, frondemque incandorem bubus praebet. Virgil.

Cord. 100.
Praeterea genus haud unum, nec fortibus Vlmi. Cordus scribit: quid discriminis sit inter Vlmum montanam, & Pteleam seu Vlmum simpliciter, fabris lignariis notum esse, & à se quoque ex historia arborum differentias indicatas. Sed memoria lapsus hoc dicit. Nam l. 1. c. 1. suarum hist. describit Vlmum unicam, nullam differentiam demonstrans. In Com. in Diosc. Vlmum folia Tiliae & Corylo non dissimilia habere scribit: quod de maxima & latifolia superius descripta intelligendum putamus: Nam vulgata parum similitudinis cum iis habere videtur.

Tragus Vlmum proceram nullo fructu praegnantem dicit: Campestem fructum ferre, quod in eius fide situm sit. Plin. Atiniam, semen nullum proferre prodidit: attamen Columellam contrarium scribentem produximus.

Matthiol. falsè ait Theophrastum dicere, Vlmum sterilem esse, quamvis multa in eam rem ex Plin. quiveretur. Idem in Com. cum magnis fig. Lat. & Ital. proponit Vlmi iconem, sine ulla descriptione, titulo Tiliae maris: Et in Hist. Germ. Greinlinden / Tiliae laxatilis: ait ferre folia Vlmi [sanè verò: nam ipsamet Vlmus est.] aut Carpinum: quosdam vocare nigram Carpinum. Profectò quivis vel vulgariter in stirpebus versatus agnoscat ibi pictam Vlmum, quod nescivit tantus commentator, ut aperte constat ex eius descriptione, quam in sua Epitome dat, his verbis: Tilia mas: Graecis τῆς μαρῆς ὄνυχα: It. Tilia masibus & Carpinus: Arbor est magna, patentibus ramis, materie robusta spissaque, ac etiam sterilibus: folia fert lata, oblonga tamen, in quibus ferè omnibus numerosè extuberant bullae, in quibus muscae gignantur, quae tamen arescentibus receptaculis, inde gregatim evolvant. Quis hic non videat Vlmum à Matth. descriptam? Rectè igitur à C. Bauh. nobiscum sentiente annotatum. Tilia mas quae proponitur à Matth. Lob. Lugd. & Tab. Carpinus nigra dicitur Castori, & nobis Vlmus, aut certe eius aliqua species esse videtur.

Lepidè Pena & Lob. Vlmum pro Tilia mare proponentes, à semina non perinde totam atque folio differre scribunt, tamen exiguum sit discrimen: folia tamen Vlmi scabra rugosaque esse: flosculos, [suam Tiliam marem] non baceas uti semina, proferre, sed semen & flores in folliculis Carpinum modo. Mox subiiciunt: Vlmus multò vulgarissima, notatūque facillima est: folio non adeò illi dissimili, [certè non, quia idem] aut Alni. Folliculis vermiū volucellorum & fuliginis refertis, Habent & Vlmū alteram latifoliam. Sed mirum industrios alioqui Herbarios in Tilia sua mare non eosdem folliculos observasse, in Vlmis, quae eadem cum illa observasse: inter se non distinxisse, ex una planta duas fecisse, denique neque Tiliam suam marem neque Vlmum rectè inspexisse probeque cognovisse. Praeterea quae obsecro descriptio Tiliae maris: partium delineatio ac designatio quomodo quadrat? Neque nobis exiguum, ut illi putant, discrimen esse videtur, inter folia Tiliae & Vlmi. Figura à Lob. posita pro Tilia mare in obs. Teut. & icon. satis demonstrat, eam ex Vlmis facere Tiliam: id satis indicant etiam cortex sulcatus & rugosus, ac folliculi in foliis: similitudo item non parva cum Vlmi iconè Dodonaei. Camer. ad hist. Matth. praeter Vlmi iconem, quam cap. 38. habet, posuit & aliam cap. 46. nempe Matthioli, sub titulo Tiliae laxatilis, annotans, Matthiolum in Lat. exemplari facere Tiliam marem, quamvis Dod. Vlmis similiorem dicat. Ipse verò in re tam aperta, quod sentiat, non docet: forte nec scribit.

Matth. in prioribus Com. iconem Vlmi satis bonam habebat, nisi quod folliculis nimium artificium ad rotunditatem affictum videbatur, quos in post. edit. Ital. mutavit. Pro Tilia mare, uti dictum, figuram Vlmi proposuit, iudem cum folliculis. Hist. Lugd. secuta Matth. more suo easdem duas icones proponit.

Dod. praeter Vlmum, quam Theoph. simpliciter vocat, Atiniam Colum. & Gallicam Vlmum vocat, & aliam tradit, de qua agemus postea sub titulo Fagi sepium sive Ostreae.

Sed verò Ryfhus in Corn. in Diosc. scribat,

Matth. rei
prae.

Tilia maris
Tilia laxatilis
Carpinus nigra

Matth. non
agnovit l. 1. q.
mum.

Errat. Lob.
Lugd. &
Tab.

Pen &
Lob. multis
plac. lapsum.

Camer. su-
ad.

Dod. not.

Ryfhus l. 1.
not.

Vlmum esse folio individuo, nihilominus tamen iconem habet arboris cum folio in partes & laciniis diviso, quæ fortè ad Aceris aliquod genus facta.

Lonc. re. pro.

Lonc. duas tradit Vlmos, totidemque figuras: prior ei dicitur Rüstholz; posterior Vlmersbaum, cuius icon eadem cum modo dicta Rüstholz: quam ait in magnam altitudinem excrecere instar Rüstbaum: ei autem esse folia fissa siue angulosa. Non dubitamus bonum hunc Herbarium, & Diis placet, suam descriptionem ad iconem, non ad ipsam plantam, effinxisse.

Tabern. argut.

Tabernamontani satrago, *Ulm*, immò quatuor habet Vlmī figuras. Prima quæ folliculos habet, titulo Rüstbaum / Vlmus 1. Altera, Effenbaum / Vlmus 2. Tertia, Yffenbaum / Vlmus 3. Et alio loco Vlmum pingit cum folliculo proq. Tilia, mare & Sietin linden, id est, Tilia saxatili: Sed, nulla istarum figurarum exprimit semina: neque docet in quo differant tres eius Vlmī, quæ cum pueris ipsi res fuisset, qui picturis & signentis delectantur, icon Tragi & flores & Samaram ostendit, sed in una arbore iuncta. Nostra melius & flores & foliaceos utriculos cum semine: & folliculos in foliis, sed ramis distinctis. Palmam dactyliferam pro Vlmō nobis ostentat Petr. Crescencius.

Synonyma linguar.

Potro & apud Diosc. Vlmus *πρωία* est, qui & folliculorum, & humoris in iis exiccatione in *δυσία κορυμβή*, hoc est, animalcula cylindrica similia, abeuntis meminit, & corticem fluxilem dicit internum, externum crassum.

Thidehar. Hebr.

πρωία & ceteri Græci meminere, pro eadem arbore. Hebræis Thidehar, Esaiæ 41. Sed apud Arabes variis nominibus insignitur, secundum

Arbor C. mi. um. Didar.

autores. Apud Serap. dicitur *Arbor Cimicum*, sicut & apud Avic. Can. 2. l. 2. c. 73. Vbi interpret Vlmum exponit. Item c. 116. Didar, id est, *Arbor Cimicum*, ex qua egrediuntur capita inflata, in quibus humiditas, ex qua fiunt Cimices. [Culices. alij.] Vt mirum nobis videatur eue Avic. duobus distinctis locis scribat de eadem arbore. Sed hoc ei non insolens. Apud Bellon. legimus, *Albahud* est *Aldidar*, quæ *Arbor Cimicum*. Item: *Duaden Alderhar*, id est fructus seu flos: *Alderhar*, quod est *Arbor Cimicum* ut patet 2. Can. Sed Scal. apud Serap. *Arborem Culicum* legi vult, non *Cimicum*, sic itaque & apud ceteros Arabes legendum fuerit. Matth. notat *Atab. Didar, Dirdar*, seu *Luzach* dicit, Germ.

Alc. saps. recantat. Albahud. Alderhar. Alderhar. Alderhar. Dirdar seu Luzach.

Ylmen / Rüstbaum / Rüstholz / Lindbast / Yffenholz / Vlmersbaum / Röstern / Rüstern / Effenbaum pro diversis provinciis. Sed speciatim Montanani *Wildrusterbaum* & *Bergrüster* hoc est, *Sylvestrem*, & *montanum Vlmum* vocitant. Belg. *Olmē / Olmenboom / Deperboom*, Gal. *Orme*, It. *Olmo*, Hsp. *Cattil*, *Olmo*: Catal. *Olma*, Portug. *lmo*, Angl. *Elmtrēr*, Boh. *Gilim*, Hung. *Silfa*. Theoph. Vlmī folliculos *κωκκί* vocat, & alibi *κωκκί* [κωκκί]. Gal. *δυσία* Lat. verd. folliculum, utriculum, capsulam, Vlmī nuncupant.

Follicul. Cypripis. Tylusum

Semen Vlmī *Samara*, quibusdam *Samera*, ac etiam *Amara*, vi ex suo Columel. habet Hermol. vocatur.

Epistola.

Ceterum cū Virgil. quā reliqui poëtæ Vlmū variis epithetis celebrant: *Aersa* frondosa, *alta*, *præcra*, *speciosa*, *fortis*, *opaca*, *densa*, *patula*, *ramulosa*, *umbrosa*, *virans*, *mollis*, *dura* frondens, *montosa*, *exesa*, *amicta* viribus, *hospita* viribus, *pampinea*, *villanica*, *textilis*, *salerna*. Cui au-

tem à vitibus tantopere commendata, dicuntur in cultura.

Nec potuit quin & Vlmō suam superstitionem proderet antiquitas. Sic enim legitur apud Plin. Est in exemplis, & sine tempestate, ul-
læve causa alia, quā prodigij, cecidisse mul-
tas, ac sua sponte surrexisse. Factum hoc po-
puli Rom. Quiribus ostentum Cambricis bellis:
Nactus in lupo Ianonis, Vlmō postquam e-
tiam oculum amputatum [amputamentum] erat, quoniam in ipsam aram procumbebat, restituta sponte ita, ut protinus flo-
ret: a quo deinde tempore maiestas populi Rom. surrexit, quæ ante vastata cladibus fue-
rat. Sed hoc parum, nisi & Vlmum aliquando loquutam atque apud Gynosophistas cum ho-
minibus fabulari credidisset eadem.

In Chersoneso atque in loco editissimo Proteilai tumulus fuit: [Græcorum sunt hæc figmenta] in cuius gratiam Nymphæ Vlmōs plantarunt, ne quidem lege, ut si aliqui tumulum spectarent & contemplerentur, illarum unius partis rami protinus florent, & statim foliorum profluviū paterentur, altera parte vire-
scens, ut Proteilai immaturum casum indica-
rent. Cū enim Græcorum primus in Troia-
num litus desilisset, à viro Dardanio interfectus est, ut in 2. Iliad. describit Homerus. Ha-
bes Vlmæas virgas apud Plaut. in Afin. & Epid. 13. Quem Apelles Zeuxisque duo pingent pigmentis Vlmæis: virga utique nemini ingrator, quā Vlmæis, hoc est, ei, qui vir-
gis Vlmæis caditur.

Theoph. autor, Vlmum lucos, aquasque desiderare. In sylvis Germaniæ hauri infrequens, etiam inter Quercetæ, aut ad marginem: Vnde Loca fortè illud Virgilij,

Glandemque suæ fregere sub Vlmis.

Tam montanam quā campestem Anguil. in Italia notam dicit. Provenit, inquit Matth. in sylvis & montibus, saxosis locis. Nascitur & pinguibus lutosisque campis. Ptelion vrbs Thessalix nomen habuit ab Vlmorum frequentia. Planæ, Campes: montosa, Montana dicta amat: Facilis apud aquas incrementi. Circa Basileam, non paucis locis obvia, præsertim in sylvis, earūque marginibus. Colinus & in horto E.G. Vbi quotannis floret Martio & samaram fert. Observe licet & aliis multis Burgundiæ & Galliæ locis, Genevæ propè aream *la Treille* dictam etiam Maio florentem conspeximus, Germinat inter primas: mox Sole in Arctem transeunte florere consuevit: semen Maio maturescit: Quo mense & folliculi erumpunt. Auctu facilis est. Folia mox post solstitium æstivum convertit: quo argumento rustici solstitium transactum sciunt.

Docet Columella quomodo Vlmariæ sint faciendæ. Nam & ad vites sustinendas desiderantur Vlmī, & ad pecudum cibaria: nam capræ & oves libentissimè hanc frondem appetunt: itēque boves: sed magis Attinæ. Itaque agrum genere uno Atunæ Vlmī conferendum probat: sin minus fieri poterit, dabitur opera, ut in ordinibus disponendis pari numero vernacula & Atunæ alternentur. Ita semper multis frondibus erit utendum, ut quæsi hoc condimento ille æ pecudes fortius iusta cibiorum conficiant. Vlmus quidem longè lætior est & præcior, quā nostras, frondemque succundiorē bubus præbet, quæ tamen cū affluē pecus aleris, & postea generis alienius frondem dare institeris, fastidium

Prodigiū Vlmæ. Casa sp. verna.

Vlmæ in quæ.

De tumulo Proteilai Vlmis c. s. s. m. m. c. s. s.

Vlmæ s. s. s.

Tempus.

Poltrus confectio. Vlmæ factum. Pecudum cibum.

*Verendi va-
rio.* **Idium bobus** afferet. Sic itaque seminarium Vlni facies. Sameram, quæ tam rubicundi coloris sit, & compluribus in solis diebus iacuerit, ut aliquem tamen succum & lentorem habeat, iniicies areis pinguibus, & modicè humido bipalio pastinatis, occatis, ac resolutis veris initio, & eas totas seminibus spissè conteges: mox cribro putrem terram duos altè digitos incernes, & modicè rigabis, stramentisque areas cooperies, ne prodeuntia cacumina seminum ab avibus prarodantur. Vbi deinde proreperint plantæ, stramenta colliges, & manibus herbas carpes: idque leniter & curiosè faciendum, ne adhuc teneræ brevèsque radiculae Vlmorum convellantur, atque ipsas quidem areas ita angustè compositas habebis, ut qui runcatæ sunt, medias partes earum facile manu contingant: nam si lætiores fuerint ipsis seminibus, quæ proculcata erunt, noxam capient. Æstate deinde prius quàm sol orietur, aut ad vesperam, seminaria conspergi potius, quàm rigari debent, & cum ternum pedum plantæ fuerint, in aliud seminarium transferri.

*Transplan-
tatio.* Ac ne radices aliud agant, (quæ res postmodum in eximendo magnum laborem affert, cum plantas in aliud seminarium transferre volumus) oportebit non maximos scrobiculos sesquipede inter se distantes fodere. Deinde radices, in nodum, si breves: vel in orbem coronæ similem, si longiores erunt, inflecti, & oblitæ fimo bubulo scrobiculis deponi, ac diligenter circunculcari. Possunt etiam collectæ cum stirpibus plantæ eadem ratione disponi: Quod in Attinia Vlmus fieri necesse est, quæ non fertur à samera. Sed hæc Vlmus autumnii tempore melius, quàm vere disponitur, paulatimque ramuli eius manu detorquentur, quoniam primo biennio, ferri reformidat ictum. Tertio demum anno acuta falce abraditur. Atque ubi translationi iam idonea est, ex eo tempore autumnii, quo terra imbribus permaduerit, usque in vernal tempus, antè, quàm radix Vlni in eximendo delibretur, rectè fertur. Igitur in resoluta terra ternum pedum quoquo-versus faciendi scrobes: at in densa, sulci eiusdem altitudinis, qui arbores recipiant, præparandi.

*Quasi fœ-
mæ appa-
rent.* Sed deinde in solo rosido & nebuloso conferendæ sunt Vlni, ut earum rami ad Orientem, & in Occidentem dirigantur, quod plius solis mediæ arbores, quibus vitis applicata & religata innitur, accipiant. Quod si etiam frumentis consulemus, uberi solo intra quadraginta pedes, exili ubi nihil fertur intra, viginu, arbores disponantur.

Præparatio. Cum deinde adolefcere incipient, falce formandæ, & tabulata instituenda sunt: Hoc enim nom ine usurpant agricolæ ramos truncosque prominentes, eosque vel propius ferro compescunt, vel longius promittunt, ut vitæ laxius diffundantur: Hoc in solo pingui, melius illud in gracili. Tabulata inter se ne minus ternis pedibus absint, atque ita formentur, ne superior ramus in eadem linea sit, qua inferior: nam demissum ex eo palmitem germinantem inferior atteret, & fructum decutiet. Sed quancunque arborem serueris, eam biennio proximo putare non oportet.

*De decum-
patione.* Post deinde si Vlmus exiguum incrementum recipit, verno tempore antè quàm librum demittat, decacuminanda est iuxta ramulum, qui videbitur esse nitidissimus, ita tamen uti supra cum trunco stirpem dodrantalem relinquant, ad quam ductus & applicatus ramus alligetur, & correptus cacumen arbori præbeat. Deinde

stirpem post annum præcidi, & allevari oportet. Quod si nullum ramulum arbor idoneum habuerit, sit erit novem pedes à terra relinqui, & superiorem partem detruncari, ut novæ virgæ, quas emiserit, ab iniuria pecoris tutæ sint. Sed si fieri poterit, uno ictu arborem præcidi, sin minus, serâ defecari, & plagam falce allevari oportebit, eamque plagam luto paleato contegi, ne sole, aut pluviis infestetur. Post annum, aut biennium, cum enati ramuli rectè convalverint, supervacuos deputari, & idoneos in ordinem submitti conveniet. Quæ Vlmus à positione benè provenierit, eius summa virgæ falce debent enodari. At si robusti ramuli erunt, ita ferro amputentur, ut exiguum stirpem prominentem trunco relinquant. Cum deinde arbor convalverit, quicquid falce contingi poterit, exputandum est, illevandumque catenus, ne plaga corpori matris applicetur. Vlmum autem novellam sic formare conveniet: loco pingui octo pedes à terra sine ramo relinquendi, vel in arvo gracili septem pedes: supra quod spatium deinde per circuitum in tres partes arbor dividenda est, ac tribus lateribus singuli ramuli submittendi, primo tabulato assignetur. Mox de ternis pedibus superpositis, alij rami submittendi sunt, ita ne nisdem lineis, quibus in superiore positi sint, in eademque ratione usque in cacumen ordinanda erit arbor: atque in frondatione cavendum, ne aut prolixiores pollices fiant, qui ex amputatis virgis relinquuntur, aut rursus ita alleventur, ne ipse truncus lædatur, aut delibretur. Nam parum gaudet Vlmus, quæ in corpus nudatur, vitandumque ne de duabus plagis una fiat, cum talem cicatricem non facile cortex comprehendat.

Arboris autem perpetua cultura est, non solum antè diligenter eam disponere, sed etiam truncum circumfodere, & quicquid frondis enatum fuerit, alternis annis aut ferro amputare, aut adstringere, ne æmula umbra Viti noceat. Cum deinde arbor vetustatem fuerit adepta, propter ramum vulnerabitur ita, ut excavetur usque in medullam, quæ sit exitus humori, quem ex superiore parte conceperit. Vitem quoque antequam ex toto arbor prævaleat, conferere conveniet. At si teneram Vlmum maritaveris, novam sufferet: si vetustam vitem applicueris, coniugem necabit. Ita sibi pares esse ætate, & viribus arbores vitæque conveniet. Sed arboris maritandæ causa scrobs vivradici fieri debet, latus pedum duorum, altus levi terra toudem pedum, gravi, dupondio & dodrante longus pedum sex, aut minimū quinque. Absit autem hic ab arbore ne minus sesquipedali spatio. Nam si radicibus Vlni iunxeris, malè vitis comprehendet, & cum tenuerit, incremento arboris opprimetur. Hunc scrobem, si res permittit, autumnio facito, ut pluviis & gelicidus maceretur. Circa vernal deinde æquinoctium binæ Vites, quæ celerius Vlmum vestiant, pedem inter se distantes deponendæ, cavendumque ne aut Septentrionalibus ventis, aut torulentæ, sed sicæ serantur. Hanc observationem non solum in Vitium positione, sed & in Vlmorum, cæterarumque arborum præcipit Columella. Ex uti cum de seminario eximuntur, rubrica notetur una pars, quæ admo- neat, ne aliter arbores constituamus, quàm quemadmodum in seminario steterint. Plurimum enim refert, ut eam partem cali spectent, cui ab tæ-

*Ut ad Viti
sistematio-
nem aptan-
da Vlmus.*

*Quando Vi-
ti adferen-
da.*

*Quamvis
adferenda.*



Pilorum defluum. decocto supernatans pinguedo colligatur, eaque illinatur sæpe locus, à quo pili defluerint, ij brevi renascuntur. Eiusdem cortex contusus & muria usq; aded subactus, ut malagmati similis sit, illitus podagricos dolores mulcet, inquit Matt.

Podagra. Fallopius scribit se liquore folliculorum Vlmi, (quem & colore & substantia melleum videri ait) nihil reperisse opportunius in agglutinatione, & vidisse mirabilia in villicis de hoc liquore. Sed vidisse etiam maiora. Quendam ex

Experim. a Fallopi ob. scitatum. erronibus perforasse mammillam, femora, brachia &c: pugione, & solum huiusmodi liquore mixto melle spatio hor. sanasse. Posse servari. Et à se quoque colligi solere, ut eo utatur in podagricis articulis cum fluxiones sunt. Mense Maio colligebat, quoniam tardius nascantur vermiculi conferentes: explebat phialam vitream, & cera & linteis obturabat: postea faciebat foveam in terra pedis altitudine, & in fundo fovee ponebat salem communem, supra quem ampullam collocabat: deinde foveam explebat terra, ita ut ampulla operata esset terra, & relinquebat per 20. vel 25. dies, tandem dividebat faeces à substantia clara.

Liquoris preparatio. Hæc ex eius placitis transcripta. 1. Eiusdem liquoris colligendi præparandique rationem aliam tradit Camer. nempe hæc. Vesiculæ collectæ, antequam generent vermiculos, imponuntur vitæ alicui angustioris oris, quod inversum aptatur alteri vitro paulò minori, & sic liquor ille commodè exstillat. Ex hoc, quoniam

utilis. non diu durat, Oleum paratur, teste Sylvio præstantissimum in vulneribus. Nobis verò hæcenus observatum olea quibuscunque invulnere simplici munda profuisse: nam & eis ferè tordescit vulnus, & glutinatio, quæ imprimis desideratur, impeditur.

Oleum. Nec omittendum illud Timot. Ross. se retum: qui liquorem folliculorum Vlmi duobus phialis sibi mutud impositus, ad solis radios destillatum optimum & mirabilem prædicat ad curandos affectus tibiæ & vulnera.

Objectum autem. Cæterum apes, ubi se post hibernam faciem Samera impleverint, profluvio alvi, nisi succurratur, intereunt. Nam propne hoc Vlmius habet, ut apum ventrem solvat: Eaque causa est, cur in regionibus Italix, quæ sunt eius generis arboribus consistit, raro frequentes durent apes, uti Colum prodidit.




Affectus tibiæ & vulnera. Vlmi materiem, reliquas post Cornum, firmitate facile vincere, Theoph. autor: quia de causa cardines ulmeos foribus addi, quod rigorem servet. Nam si ipsi firmi permanent, valvæ quoque stare rigide atque intortæ possunt. Vitis Vlmius quonque ad fores, præla & torcularia. [apic. xaxaxos, fiduculas, quibus torqueri solent nocentes] Quin & ad carpentorum opus, sed ad id mediocriter bona. Plin. quoque Vlmius, quod rigorem fortissimè servet, cardinibus assamentisque portarum utilissimam prædicat, quoniam minimè torqueatur: permittenda tantum esse, ut cacumen ab inferiore sit cardine, radix superior. Observavimus etiam excindi arbores ex horto E. C. VVirtemb. ad thedas magnarum bombardarum, idque ob ligni firmitatem, uti narrabant artifices.

Ligni usus. Vlmi materiem, reliquas post Cornum, firmitate facile vincere, Theoph. autor: quia de causa cardines ulmeos foribus addi, quod rigorem servet. Nam si ipsi firmi permanent, valvæ quoque stare rigide atque intortæ possunt. Vitis Vlmius quonque ad fores, præla & torcularia. [apic. xaxaxos, fiduculas, quibus torqueri solent nocentes] Quin & ad carpentorum opus, sed ad id mediocriter bona. Plin. quoque Vlmius, quod rigorem fortissimè servet, cardinibus assamentisque portarum utilissimam prædicat, quoniam minimè torqueatur: permittenda tantum esse, ut cacumen ab inferiore sit cardine, radix superior. Observavimus etiam excindi arbores ex horto E. C. VVirtemb. ad thedas magnarum bombardarum, idque ob ligni firmitatem, uti narrabant artifices.

habent, qualis est & Vlmius, humentia vicerit purgat & replet, idèd mox post Vlmi tractationem, de arborum carie, quæ ex veteribus lignis & caudicibus colligitur, hæc ex Diosc. subiungimus. Caries lignorum, quæ est velut farina, imposita repurgat & ad cicatricem perducit ulcera. Quæ vero serpunt, cohibet, cum pari Aniso & vino subacta, linteolis induta & imposita. Germani hanc Worminzel / Vermium farinam vocant.

VLMI EXCREMENTO AC- CEDENS SÆUCTVS Peregrinus

CAP. III



A Nonymone scriptum. Aqueindam fructum in naturalium nostro thesauro adseruamus: Castaneæ magnitudine, vel ferè duplo maiorem, qui utriculos seu excrementa Vlmi refert quodammodo, modòque compressus, modò inqualiter tuberosus, rugosus, striatus, coloris fulvi, basi sessili latiori, cui pediculus annexus fuisse videtur.

Inter huius geminos cortices concreta melligo, quemad. in Anacardio & Caious, splenscens, nigricans coëretur, cuius in effertis nostris fructibus odor & sapor omnis exolevit. Cavitas totius fructus inanis est. Datus iam olim dono anno 1563, à Clariss. & celeberr. naturalium vestigatore D. Gesnero, qui inter Nuces moschatas repererat. Idem postea & nobis repertus Lugduni cum Pipere.

Clus. de peregr. surp. huic pingit in quadam tabella sub N° 7. de quo ait: Forma plana est, rugosa, & nonnullis Caious fructibus: per medium sectus, nulla grana, sed splendens quendam nigrumque succum iam concretum & induratum duntaxat continere deprehenditur. Itaque inter fructus potius vitia, quàm inter fructus numerandum censet. Repertum sibi ait inter Acaciz veræ siliquas & semina.

Clus. in Exot. ipse non amplius inter vitia fructus numerat, omisit enim ea verba: verum addit: interdum nudum observasse rugosum, quem ambiebat inter binos cortices succus concretus, splendens, ut nux Caious immatura censeretur indubiè possit. Nos propter similitudinem aliquam cum Vlmi excremento hunc fructum hic post ulmum reposuimus, posset tamen transferri in lib. sextum hist. nostræ & Caios subiungi.

Hist. Lugd. & Tab. proponunt nomine fructus peregrini 7. Clus. Vlmi arboris similem Indicam, cuius cortex ad rheumata commendatur, ut ex Monarde tradidimus l. 4. post Seite-
Vlmi similis ad rheumatis.

LIGNORVM CARIES.

Quandoquidem caries lignorum, maximè eorum, quæ adstringendi, & extergendi vim
Tom. I.

FAGVS SEPIVM VVLGO
OSTRYS THEOPH.

CAP. IV.

Descriptio.

Cortex.
Materies.

Folia.


Nucamentum.

Fructus.

Carpinus.

Lupulus
arborescens.Carpinus
gemma.
Casalp.Carpinus
Plinij alia
ab hac.

Pinus.



PROCIOR
magna ex
parte, quam ut ad
vulgatam sepi-
um humilitatem
cogi possit, atque
adeo in insignem
altitudinem sepe
exerescit, caudi-
ce crasso, cortice
subalbido, mate-
rie durissima &
solidissima, albi-
cante. Folia per
ramos Vinca, ser-
rata, sed longiora,
minus crispula. Ex
ramis primo Ve-
re nucamenta quæ-
dam ac luli de-
pendent foliati,

oblongi, foliorum agnibus dense stipati ac-
cutum, membranaceorum, ruforum, aut ex-
viridi fuscorum. Fructus uero in longo pedi-
culo spicæ instat, foliorum angustorum ligulis
alatis obvallatus, pyramidalis corculi effigie, stri-
atus, compressus, lignosus. Qui proveniens
duo foliola Pomorum foliolis ferè similia pro-
ducit. Collectus nobis Maio mense in horto
Patavino ramus, (Carpinum vocitabat Cor-
tus) cui similem alium dedit D. Agerius
ibidem decerptum nomine Lupuli arborescen-
centis: cuius sanè luli ampli ex foliolis compa-
cti, Lupuli illis foliaceis ac squammatis nua-
mentis non ita multum dispares, sed membra-
nea foliola articulum postremum pollicis faciliè
æquant: eiusmodi in nostra Fago sepium non-
dum observavimus. Simile nucamentum ac ve-
luti lulum, si ita liceat appellare, in sua icone
exhibuit Camer. quale & à nobis in adiecta
tabella exhibetur ad latus.

Tam hanc quam precedentem tradidisse videtur
Casalp. his ferè verbis: Sunt in montibus He-
truriz dux arbores Fago similes, sed materie can-
dida, folio rugoso, & circum minutissime serrato,
longiore quam in Fago, & frequentioribus ner-
vis, quæ uix medio, costarum modo, recti produ-
cuntur: fructus utrique valde exiguus. Nam al-
tera in cacuminibus racemulum densum fert fla-
vescentem, ex folliculis quibusdam membrana-
ceis oblongis constantem: in singulis autem folli-
culis, tanquam, uticulis singula semina parva, car-
tilagineo & candido cortice obducta continen-
tur. Altera autem non in folliculis, sed in umbilicis
foliaceis, singula, aut bina semina fert maiuscula,
& striata: utramque vulgè Carpinum vocant.
Videat Theoph. Ostryon seu Ostryam appellasse
marem, & feminam similem Fraxino fecisse. Plin.
etiam similem Fraxino facit, cortice & ramis: Cæ-
tera autem Theoph. Sed Carpinus apud Plin. alia
ab his est. Dicit autem paulò post idem Casalp.
Quæ autem Amentum ferat Vlnus & Vvas, non-
dum vidimus, ut suspicari liceat ne Plin. cum Vlni
genere comprehendat Carpinum utranque.
Sanè ingeniosè, ut rem propius inspicienti non

temerè ita esse videatur. Reçtè & in costant; quiddam Ostryon Theophr. statuit, de qua hic sic tradit; Ostryon, quam quidam Ostryam vocant, unica est species, Oxya cūmilita, tūm cortice similis, foliis Pyri similibus, nec multò longiori-
bus, in acutum cōtractis & maioribus fibris mul-
tis & crassis à medio dorſi, tenui per ambitum scissurā, reliquis fibris à media, costarum in mo-
dum, iuxta magnam porrectis: materie dura, de-
colori, exalbida: fructu parvo, oblongo Hor-
deo [æed] simili, flavo. Radices sublimis ha-
bet.

Hunc Theoph. locum angustius contractum & nonnihil mutatum sic habet Plin. In Syria & in Aegypto copiosa hæc Tamarix est, cuius infelicia ligna appellamus, quæ tamen infeliciora sunt Græciæ. Gignit enim arborem Ostryon, quam & Ostryam vocant, solitariam circa saxa aquosa, similem Fraxino cortice, & ramis: folio Pyri, paulò tamen longioribus, crassioribusque ac rugosis incisuris, quæ per totum discurrent: semine hordeo simili. Materies est dura atque firma: quæ in domum illata, difficiles partus fieri produunt, mortelisque miseræ. Hæc ille. Quod verò de arborum infelicitate ait, id ex Catone & Tarquinio aliisve similibus haurisse potuit: Illi quippe felix arbor, quæ fructum fert: infelix, quæ nullum: huic apud Macrobiū infelices, quæ fructum nigrum ferunt: quanquam & alias rationes eiusdem rei dixerimus alibi, & ne hic quidem citatas sufficere ad constituendas infelices dixerimus in prologio huius libri.

Dictum quoque lib. præced. cap. de Fago sive Oxya, non probari nobis Dodonzi sententiam, quæ Ostryam Plinij eandem facit cum Oxya Theoph. nec, quod ille putat, pro Ostrya, legendum esse Oxya, denique, nec pro Hordeo, ut idem autumat, Castaneam substituendam.

Tanta est porro tanque confusa autorum, & modernorum potissimum Herbariorum in huius arboris designatione confusio errabunda, ut ex eorum historiis studiosi involvantur potius, quam definitam & certam cognitionem ad-
fascant. Quorum opiniones serie quadam proponemus, & unicuique more nostro sententiam & censuram nostram adicemus.

Ac primum quidem Ruellius insigniter fallitur, dum arborem hanc Orneoglossum dicit, & Vlni speciem, Linguam avis Othic. dictam. Hæc enim Fraxinus est. Considerandum tamen an nostram hanc Fagum sepium intellexerit, cum ait: Gallis extrita priore litera, aut in aspiratione conversa Herrum & Hedrum pro Cerro appellari. Nam Herrus, vel Hedrus glandifera cernitur. Abdicatur quoque apud nos ædificiorum fabricis, ut quæ flexa & fructu infelix habeatur, infernis tamen & lavioribus non improbatur. Si præterea Gallis quibusdam credimus, Fagus nostra sepium Hestæ dicitur. Verum si Ruellius & Car. Steph. eam intelligunt, maxime errant, non glandifera est. Unde liquidò constat ambos ignorasse quid scriberent: Hestæ enim describunt cum verbis ab antiquis attributis Cerro: quæ fortè in Gallia non provenit, aut si proveniat locus fuit ignotus illis ac ipsamet planta. De Fago quoque sepium, videntur & sequentia dici à Car. Stephano: Tertium Aceris genus Græci Zygiam vocant, quam nonnulli Carpinum esse autumant. Et post: Carpinus, vulgè Charne, inter Aceris genera numeratur, atque id est genus, quod Græci ζῳν, quasi jugalem vocant,

Ostrya
Theoph.
Ostrya.Ostrya
Plin.Arbores
qua infeli-
ci.Dod. Tr.
plex oxya.Ruell. bo-
nus gemi-
um.
Orneoglos-
sum.
Vlni spe-
cies.
Hedrus.
Hedrus.
Cerro.Hestæ.
Cerro.
Ruell. cy-
Car. Steph.
nucamentum.
Aceris ge-
nus.
Carpinus.

Zygia.

Charne.
Car. Steph.
um.



Non est Cereus. Ostrya non est Syringa.
Miratur idem quosdam viros doctos in eum errorem incidisse, ut existimant Gallorum vulgi *Haisire* esse Latiorum *Cerrum*: quoniam *Haisire* glandem non ferat, & *Ostrya* bene descripta sit à Theoph. sunt tamen, uti notat Clus. qui fruticem coronarium *Syringa* dictum à Theoph. esse censent: sed cum illius *æquus* aded luculenter sit ab ipso descripta, non videmus, quibus rationibus suam opinionem stabilire possint. Eam *æquus* sive *Fago*, non *Fraxino*, ut vult Plin. similis. Herbarijs quibuldam *Fagulus* dicitur, nescio quo auctore, nisi fortè à *Fagi* similitudine nominis occasionem sumpserint.

Carpinus Italorum.
Cæsalp. ut & alibi dictum, suspicatur ne Plin. cum *Vlmi* genere comprehenderet *Carpinum*: sic autem vocat *Italorum Fagum* hanc nostram *sepium*. Sic & Matth. nominat, Gesn. Tab. & alij. *Carpinum album* Castor Durantes. Sed Matth. *Carpinum* & *Carpinum Theoph.* veram Theoph. in hist. sua Germ. tradit & *lugalem* quam *Carpinum* in Com. Læ. & Ital. cum magnis figuris facit. Nescit idem in Commentar. à se pictam arborem esse Theoph. & Plin. *Carpinum*, cum tamen in historijs veram *Carpinum* dicat. Figura etiam, quam olim posuerat pro *Fago*, quoad folia, huic plantæ conveniebat.

Gesn. *Fagum sepium* vocitat, *Vlmo*que magis quam *Fago* cognatam putat *Italorum Carpinum* eandem dictam: Nam Plinij *Carpinus* species est *Aceris*.

Ostrya.
Camer. fatetur *Ostryam* satis repræsentare, quam pro *Carpino* Matth. ponit.

Vlmius Atiniam.
Vlmius Atiniam sive montosam, inquit Hist. Lugdun. Orni nomine depinxit Tragus: Galli *Charme* vocant, & *Charpene*. Quamobrem nominum similitudine quidam falsi *Carpinum* esse putarunt, cum *Aceris* genus *Carpinus* sit, non autem *Vlmi*. Sed videtur Hist. Lugd. putare *Haisire* & *Ostryam* Bellon. à *Charme* differre, quia eius tantum obiter ex Bellon. meminit Læ. 10. nulla facta eius mentione sub *Vlmo* sua *Atiniam*.

Pena & Lobel.
Pena & Lobel. hanc nostram *Fagum* *Tiliam* marem faciunt. Et mox interposita *Vlmi* historia, scribunt: velle recentiores hanc esse *Carpinum* Theophr. Polilis quoque iisdem, sed folliculosa sobole seminis cuiusmodi favagine in caudatis floribus *Lupuli*, tametsi *Vlmo* congener sit. Idem Lob. *Carpinum* dicit in Obs. *Car-me* Gallobelgis: Ital. *Carpino*. At in Teuton. hist. ex ea *Betulum* facit. Sed & Dodonæum nobis videntur imitari in eo, quod bis eandem arborem describant: primò *Tiliz* maris nomine: (nam descriptio, quam ponunt, egregiè huic nostræ convenit) secundò sub *Carpino*: cum tamen idem Lob. Obs. p. 606. *Vlmi* iconem ponat pro *Tilia* mare: cui similem pro *Vlmo* posuit Dod. Ecquid verò huic etiam cum *Betulla*: Ita vides quàm miserè fluctuent Herbarij in vulgarissima huius arboris Historia.

Taber.
Sed nondum est finis. Taber. vel sanè eius compilator, *Carpinum Spindelbaum* vocat Germ. & *Græce* *Carpinus*: sed neutrum nomen competit. Nullam etiam habet descriptionem.

Schubertfeldij.
Schubertfeldius in suis manipulis Silesiacis securè pronuntiat esse *Fraxinum latifolium* Cordi, nec differentem hanc putat à nostra *Fago sepium*. Vocat & *Ornum Tragi*, & *æquus* & *Axyris* *æquus* quæ nomina non placent. Falsò quoque *Fraxinum* sterilem vocat. Neque animadvertit eandem apud Diosc. de *Fraxino* nihil habere quod respondeat cum *Orno*

Tragi. *Fraxinus Cordi Latifolia* est nostra vul-garis *Fraxinus*: quam Silesiaci rustici eandem esse cum nostra *Fago sepium* nunquam concedent.

An *Thalio* in sua *Hercynia*, *Fraxinus Fago* similis, quàm & *Buchaschen* vocat. Planè dicere quæ *Thalium* intelligere *Fagum*, propter nomen German. nisi postea peculiariter distinctam traderet *Ostryam Cordi*, *Ornum Tragi*, *Bainbuchen* vocitans.

C. Bauh. scribit *Fagum sepium Ostryam* seu *Ostryam* Theophr. aliquantum repræsentare, *Fraxino* similem dici à Plinio: alios ad *Vlmi*um: alios ad *Fagum* referre, atque & esse, qui *Carpinum* Plinij velint, quæ *Aceris* species. Sed si *Fraxino* similis Plinij est *Fagus sepium*, cur dicit *Ostryam* Theophr. aliquantum repræsentare? Immo tam repræsentat, ut sit planè eadem. Non peculiaris plantæ Synonymum faciendum, illud, *Fraxino* similis. Plin. apertè *Ostryam* posuit. Scripsit quidem Cæsalp. *Plinium* similem *Fraxino* fecisse *Ostryam* cortice & ramis: cetera autem ut Theophr. Verba illa. *Fraxino* similis, ex Cæsalp. textu excerpta. Apertius agemus si ex ipso Plin. l. 13. c. 21. ipsam vocem *Ostryam* sumamus, & advertamus eum pro voce *æquus* apud Theophr. l. 3. cap. 10. posuisse, *Fraxini*, quasi legisset *æquus*. In *Fago sepium* profectò non videmus tantam similitudinem, ut meretur dici *Fraxino* similis, ut vel utramque rectè insipienti patebit, vel utriusque à nobis positam descriptionem consideranti.

Montbelgardenses *Fagum sepium* *Charme* vocant. Atrebatenses ad Græcam vocem alludentes, *Haisire* vocant Germ. *Babenbüch*. Reliqua nomina sparsim dicta.

Amat aquosa loca & prærupta *Ostryas*: Theophrast. Nasitur in monte *Athos* frequens, & *Macedoniæ* montibus, teste Bellon. Passim in sylvis & sepibus Germaniæ occurrit. Item *Galliz*, *Pannoniæ*, & multarum aliarum provinciarum. Vidimus & *Montpelij* & *Lugduni*. Imperitos salit, ut pro *Vlmo* iurant, cum quæ magnam similitudinem habet. In *Alsatia*, *Helvetia*, & *Burgundia* nihil ferè frequentius: ubi & in magnas arbores excrestat.

Nucamenta primo Vere profusa: *ligna* in amento foliato, æstate.


Vix durius invenias lignum, candidum est, cum multa soliditate ac firmitudine, nec facile se findi patitur: Vnde ad rotas molares cochleasque ac trochleas aliæque instrumenta, quæ magnum pondus sustinere requiruntur, maximè expetitur. Ex crassioribus etiam virgis eius *Cratæ* extexuntur.

Non magni facimus, quod Theophr. & ex eo Plin. tradit *Ostryam* domos illatam inausam putari: *Acerbas* enim inferre mortes, & partus ubicunque fuerit difficiles reddere, quod de materia Plin. ait.

B E T V L A.

C A P. V.

BETULA arbor satis procera, sæpè etiam *Descriptio* *Bruticantis*, ramos spargit tenues, flexiles, magna ex parte deorsum pendentes (quamvis pictoris incuria icon nostra id non exprimat. Multiplici libro dicitur: in tenera ætate rufum aut fulvum ostendit corticem: qui, cum illa adoleve-



adoleverit, subinde candidior apparet, in tenui phyllyras ductilis, laevissimis: in adulta arbore candidus, rimosus: qui hunc subest interior, tenuis admodum, laevis, ac instar membranae pellucidus. Crassiorum ramulorum cortices etiam in albicant, sed minorum puniceus aut spadiceus est, qui à siccatibus & ariditate tenuis pelliculae specie avelli &

unguè separari potest, quethad. & incanus ille in ramis maioribus, laevore inoffenso. Folia quæ primo exortuplicata ac crispaproturgunt, viridi pulchrèque herbaceo tinguntur colore, singula singulis, hisque tenuibus dependentia pediculis, ubi excreverunt, Populi nigrae ferè, sed minora, minus laevia, per ambitum serrata, saturatius virentia, paulò angustiora, subpinguia, odorata, sapore amara.

Ruell. foliis Fagiaris dicit, paulò angustiora: quæ collatio minus placet.

Folium parietum. Cæsalp. internè subhirsuta ait, punctis albis distincta, quod posterius diligentius observandum. Goropius verò scribit, quasdam Betulas crispas.

Stem. Fertulos seu núcamenta longa, Piperi longo vel Alniulis similia, quæ, si credendum Trago, Betulae sunt loco seminis, ex quibus novæ progignantur Betulae. Sane si siccati, in seminum quoddam parvum, compressum ac leve satiscunt.

Matth. reprob. Matth. negat ferre ullum fructum: ac nobis constat, semen ferre, & ex eo facto prognasci arbores, quod utique fructus eius fuerit, nisi ille aliter fructum acceperit.

Arbor. Locis quibusdam ad septentrionem, tibi hæc arbor copiosa crescit, vulnerato cortice succus effluit, qui à rusticis appendis vasculis exceptus cum ipso musto dulcore certat.

Radices viminalis ligni. Maioribus radicibus minora quædam fila crassitudinis culmi triticeæ adnascuntur, quæ sub arenis ad quadraginta & amplius pedes prorepunt, ut notavit Goropius in suo Niloscopio: in quibus laus vimineæ textilisque materæ.

Semyda Theop. Apud Theoph. *Semyda* [sic enim vocat] id est, Betula, solum fert Caryæ simile, sed paulò angustius. Cortice vestitur verticolore, sub quo materia laevis, nec nisi ad baculos utilis.

Semyda. Curtius Græcis Semydæ dicitur: Sed ubi Matth. sapetur se non compertum habere quid hic Theoph. per Caryan intelligat. Miramur etiam acutissimum Scaligerum non exposuisse quid hic sit *Semyda*, nec insignem Botanicum Cæsalpinum. Nos Nucis Avellanæ folium intelligimus, quamvis fortè minus propria videatur similitudo. Robert. Constant. negat Betulae folium Nucis avellanæ habere, aut Iuglandis [alterutram enim per *Semyda* intelligendam esse & ipse subolsceit] sed accedere ad solum Tiliæ obferrent studiosi, utri similis sit, Avellanæ

seu Coryli, an Tiliæ folio. Apud Diosc. nihil invenimus hætenus de Betula.

Plinius etsi paucis, sed tamen aperte nostram Betulam expressit, quando inquit: Betulla *Betulla* Gallica arbor, mirabili candore atque tenuitate, terribilis magistratu virgis. Eadem circulis flexilis: item Corbium sportis. Materies eius contumaciùs transmutat ferrum. *Plin.*

Tragus licet multos quidem doctorum existimare Betulam Græcè Semyda Theoph. esse: sed verò nihil istorum sententia detrahens, quod ad se attinet, Papyri illam speciem mavult dicere. Ut verò sic sentiat, & formam arboris universam & facultates id admonere ait. *Papyri.*

Neque tamen intelligere Papyrum illam, cuius Theoph. meminit l. 1. hist. c. 9. quæ longitudine super dena cubita non venit. Apud Germanos aliis quoque arboribus, ut Quercubus &c: non unam esse faciem: hanc enim proceram & in magnam simul amplitudinem diffusam, illam breviusculam, ac in fruticem potius, quam arborem evadere, etiam centum annos natam. Quod in Quercu fieri videmus, quid obstitet, inquit, quo minus idem in reliquis contingat? Sed ut hæc ita sint, quod non inficiamur, neutiquam tamen Trago assentiri possumus Betulam esse Papyrum, ut facile apparebit legentibus historiam de Papyro. *Betula parva.*

Nolimus equidem à Svenckf. tam securè pronunciari, *Svenckf.* *Svenckf.* Theoph. de Betula. Nam *Semyda* (sic enim legitur apud Theoph. in casu recto non *Semyda*) & *Semyda* distinctæ sunt plantæ apud ipsam etiam Theoph. & cur ille Betulam Papyrum pronuntiaret, rationem non habuit meliorem, quam auctoritatem Tragi & Euch. Rösslin. At ipse etiam vidisset, si rectè inspexisset, etiam à Trago negari esse Papyrum illam Theoph. de qua modò diximus, quamvis Papyrum idem Tragus nihilominus putavit. Nec ideo dicere potuit esse Papyrum Theoph. quod apud quosdam fortè legerit, olim in huius cortice scripturatum, & in hanc usque diem quosdam eius extare libros. Nam & aliis corticibus ac Phyllyis olim inscriptum fuit, quos tamen nemo prudens ideo Papyrum simpliciter aut Papyrum Theoph. dixerit.

Decullet etiam Euch. Rösslinum docere, *Euch. Rösslin.* cur Betulam vocaret Vibicem. Sed in promptu suspicio: effectus Virgarum Betulae id sum docuit, quod iis casâ tergora sapiculè vibicibus picturata vidisset.

Betulam plerisque Herbariis dictam legas à nonnullis, inquit Dod. & ex eo Taber. *Synon. Linguar.* ab aliis *Semyda*. Sed à quibus? Doctissimi quique pro Semyda Theoph. agnoscunt. Gerin. Birden / Birdenbaum: Cimbr. Berrich: Slavon. Brizina: Belg. Berckenboom: Gal. Bonleau Boute, & Bes. Galli. inquit Ruell. *Betula* extitit & litera nominant: rura Bonleum. Ita *Betula*, *Betula*, *Betula*: *Betula* Tridentinis. Angl. *Birch* tree. Bohem. Briza. Vagat. Turca.

Betulam à batuendo dictam vult Constant. *Erym.* quod eius viminibus exdantur pueri: non à Batumpe, (licet Plin. auctor ex ea bitumen excoquatur.) quasi Batulam. Nomine Betulae venit & Pyrola de qua suo loco, ut videre est in indice: Invenimus etiam Fagum sepium sive Olyam à quibusdam dici Betulum, de qua ante.

Gaudet frigidis maxime Betula & aqueis, re-

ve Plin. Eiusmodi & arenosis maximè hodie Germaniæ non infrequens. Tragus ait in umbrosis & altis montibus reperiri, & felicius adulescere. In Germaniæ ac Bohemiæ montibus ac sylvis, teste Dod. gignitur, tum & alibi: & quandoque in arenosis & aridissimis, veluti in Brabantia Campaniæ quibusdam locis aded sterilibus, ut ne herbarum quidem producant, in quibus tamen viget ac crescit. Calceol. notat in monte Baldo provenire. Observavimus etiam in multis Gallia sylvis, potissimum in agro Aureliaco non longè à Gergeto oppido, si benè recordamur: ut & Helvetiæ & circa Basileam potissimum in Sundcoviæ arbores magnas vidimus, non frutices quales suas tradit Tragus. Thalius tamen in Hercynia, Saxothuringia, atq; in Brockenburgo, Betula pumilè nasci scribit: alià. v. in Hercynia passiva.

Montbelgardi in horto E. C. à me [Bauh.] olim plantata, in maximam tam excrevit altitudinem. Optimè crevit in illo vivario circa Montbelgardum, ubi densum Betuletum videas. Ill. nostri principis manu ex semine constitum. Sonij saltus accolæ Fago cæsa subnati ex eodem trunco Betulam constanter affirmant. Quid verò de hac re nobis videatur, in Fago dictum. Goropius scribit visas sibi duas aut tres Fagos ita connexas cum Betula, ut ex eodem trunco viderentur pullulasse. Meminimus & alias diversas arbores eadem ratione coalitas, non uno loco observatas.

Iulii ineunte verè prodeunt: Folia deinde Aprilis aut paulò tardius, pro natura loci. Tragus Iulos non decidere ait antè autumnum. Notat tamen Schwenckfeldius semen paleaceum in Iulis Iulio à vento dispergi.

Plinius frigidissima dicit, quæcunque aquatica: lentissima autem, & idè scutis faciendis aptissima; quorum plaga contrahit se protinus, cluditque suum vulnus, & ob id contumaciis transmittunt ferrum: in quo genere & Betulam collocat. Idem & Galliam ex ea Bitumen excoquere tradit. Qui mos hodiè, uti putamus inolevit. Cortex quidem ignem facillimè concipit: idè rura lucernarum vice succendunt: reddit flagrans pingue quiddam & oleosum, ut & Ruell. observavit.

Columel. ad vinculorum usum eam quoque inter cæteras commendat. Fasces, quorum inventio Veruloniæ Silius adscribit, capiebantur ex Betula, teste Goropio.

Betula, inquit Tragus, prisca temporibus magno in honore habita fuit propterea quod veteres, antequam Papyri usus esset inventus, libro Betula, hoc est, cortici candido opera sua inscribere soliti fuerint: is testatur se vidisse Curia, oppido Rhetia superioris nonnulla carmina incortice Betula orarata. Lonic. quoque albis corticibus usos antiquos loco chartæ testatur, & ex ijs adhuc nostro seculo reperiri libros scriptos. C. Bauh. in interiori candido veteres antè repertam chartam, scribere solitos annotat, eumque tenuem dicit, & chartæ instar candidum: confitent qui libros inscriptos viderunt, & confitent an talis interior cortex reperitur.

Inter omnes verò arbores vix aliam quamcunque reperias, quæ Vere tam citò, tantæque copia humorem & succum è terra hauriat atq; Betula. Nam in initijs Veris, anteq; folia prodire, iam dulcem suum succum cumquædè largum recipit, ut si arbor vulneretur, limpidissimus liquor copiosus effluat, quem sibi pressi pastores, in sylvis sæpè numero potare solent: quemad. & nos (in-

quit Tragus) non semel eo liquore recreati sumus, cum herbarum gratia vastas peragraremus sylvas. Vidimus & terebello perforato infensa caudice velut per tubulum profiliisse. Hic succus, autore Trago, in Vere collectus, adersus calculum & morbum regium potu auxiliari dicitur. Succus hic dulcis, præsertim si destillatus (ut vulgè dicunt) fuerit, exulcerationes oris papulasque sanat, & maculas exterit, collutu. Eadem efficit & aqua, è viridibus folijs destillata.

Ex eodem illo succo è caudicis vulnere exstillate, Ios. Simlerus refert in sua Valesii descriptione, Solere ibi plerumque Matzain confici.

Quin & Camer. Succus Betula, ait, colligitur principio Maij, Soli exponitur, effervescit instar musti: atque ita repositus per totum serè annum bonus conservatur.

Quidam destillant. Crebet eius potus cum aqua sambuci & similibus laudatur, in hydrope: Aqua præcipuè commendatur ad absterisionem & curationem vulnorum. Quidam plebei ex folijs eius corticis in aqua parant sibi balnea ad scabiem.

Cortex Betula in cineres redactus, si ex ijs lixivium paratur, ad oris ulcera & maculas abstergendas efficacius facere perhibet Tragus. Hic quia bituminosus est, inquit Matth. excalfacit & emollit, humectat & resolvit. Folia excalfaciunt & siccant, resolvunt, attenuant, abstergunt, amara sunt. Hæc eadem habent vires, quas Populi nigra. Iisdem cum alumine ex aqua decoctis quidam luteum colorem parari tradunt pro piætoribus. Succo pingui, quem virentes Betula ramuli, vel etiam è scopis betulaceis aridi super pelvim accensi remittunt, instillato, scabie, oculorum rubores discutiuntur. Eodem linteolum imbutum, umbilico impositum, ad lumbricos facit enecandos. Schwenckfeldius quoque cremati ligni emanantè liquorem oculorum albugines & cicatrices delere scribit, vel potius ex Lobelio, eo non citato, transcribit. At nos iis, qui hoc remedio uti volent, suasores sumus, ut cum liquorem degustent prius, & caveant ne eius usu ex parvo morbo magnum faciant. Curtius ex corticis cinere factum lixivium, Cascos à vermibus innoxios magis servare scribit, quàm aquam stillatitiâ recentium foliorum. Idem, qui Gallus erat, Bitumen ex Betula Galliam excoquere tradit, cuius in medicina nullus, quod legerit, apud antiquos sit usus, nisi quod recentiores quidam, eo pastores aridas fauces inungere dicant. Quæ valdè veremur à Curtio aut efficta, aut certè ab alijs, male intellecta prodidisse. Quis enim bituminoso liquore & utique iustissime redolente ac sapiente, idèque calidissimo, aridas inungat fauces? aut quis inde resultare queat fructus, quod solatium? quæ humectatio, remollitio aut quod refrigerium, quod in eo casu vel maximè desiderari solet, & ex artis præscripto, debet? Suspiciamus itaque Curtium id de liquore, qui è caudice vulnerato exstillat intellexisse, oscitanter & obliuiose, aut verius imaginariè, quippe præter rationem, ad bituminosum ustione paratum liquamen transulisse.

Ventriculi pecorum, quibus coagulum lactis nostri parant succo Betula conditi, seu macerati, cascicos omnes, inquit Tragus, qui eo coagulo coeunt, à vermibus asserrunt, certò id attestante experimento.

Miramur verò Dodonæum in sua histor. Lat. Anno 1582. conscripta, de medico usu Betula partimque ejus nihil vel apud veteres vel recentiores

Calculus: idem.

Oris: scabie.

Maculas.

Matzain.

Succi pro-

parati.

Hydrope.

Vulnora.

Scabie.

Aqua folijs.

ram.

Temperant.

Calor: len-

tem.

Oculorum.

rubor.

Lumbrici.

Libro.

Cicatrice.

oculorum.

Cascos.

Casca.

Casca.

conferat.

Arida: fau-

ces.

Curia.

canid.

Experimento.

Succi pro-

parati.

Casca.

Casca.

Casca.

Casca.

Casca.

Casca.

Casca.

Casca.

Casca.

Casca.

Casca.

Casca.

Casca.

Casca.

Casca.

Casca.

Casca.

certiores extare, tam securè scribere ausum:
quandoquidem Tragus & Matt. quos citavimus,
& qui multò ante dictum tempus scripserant,
plures tradidère eius vires medicas. Fortè id fecit,
quia more suo Scopas facturus, apud Ruell.
legerat, Betulæ in medicina nullum usum esse,
quod ipse quidem legerit, sed baculis tantùm
& scopis nasci. Certum quidem, nihil ea fre-

quæritur esse apud nos ad usum scoparum. Ab
equitibus etiam expetuntur eius virgæ pro do-
mandis equis. Eadem ut olim magistratuum
virgis terribilis fuit, ita & hodie, & à longo
tempore ad scholas triviales relegata præ-
dagogis virgas præbet ad coercendos & casti-
pandos pueros: ut qui amore virtutis sapere
nec discere nolunt; sapere discant formidine per-
tar: iuxta illud, *ut dicitur in proverbiis.*

Quæstio. Ipsa porro materies tam obsequiosa est, ut
ob id in quibusdam locis ad quassillos plecten-
dos expectetur, maximè in Anglia, scilicet Tur-

Formula. Laniones ex Betula & verucula consi-
ciunt; gravior quippe est, quàm Populus. Au-
cupes visco illitis Betulae virgis ad aucupia u-
tuntur: idem usus ad muscas. Piscatores Nor-
tumbri corticem delibratum fisso bacillo inter-
positum accensumque usurpant ad piscationes
nocturnas; tridentemque adnatantes pisces conso-

Circuli et stringenda circuli probatissimi habentur. Item
Wolse. in Aegyptia Allobrogibus, Sclavianis, agro

*Tasites ad
Vellera adas
Tunges.*

Abfides. illi axes & abfides conficiunt) relinquuntur, te-
axes. ste Trago. Parantur & ephippia, equis impo-
Ephippia. nenda ex Berula. Ananij teſte Matth. & ſuis
Caſtroes.

Faces. cum succidunt inethana, sed e denotato confort-
tòque cortice faces ad nocturna lumina parant,
quibus in tedæ vicem utuntur, quod bitumi-
nosa & oleosa pinguitudine, uti dictum, re-
dundent. Schvvenckfeld. semen siccantis na-
turæ esse scribit. Idem observavit, ex trunci
medij substantiâ aliquando nasci Fungos fla-
vos, Rhabbarbaro similes: eosq; astrictoria vi polle-
te, & ad sanguinis fluxus còpescendos utiles esse.

Ioan. Coler, verò hæc refert. Mense Martio ex Betula multa fluit aqua si truncus vulneretur crescente luna coaservanda est, pellit calculum ex vesica & renibus: si quid depravati est in visceribus, pulmone, hepate, aut splene tollit: si abluatur facies, adimit omnes maculas, & faciem pulchram & gratiosam reddit. Fertur Tartaros circiter mensem Martium, hanc tantum aquam potare, nec eo potu unquā egrotare. Per totum annum potest ad multa usufuari.

ALNVS VVLGARIS.

Cap. VI.

Descriptio.
Cortex. **A** L. N. v. vulgaris arbor iustæ magnitudinis, ramosa, cortice scabro, sulco: li-



gno molli, ruf-
fescence. Rami
valdè fragiles
sunt, ut vel digi-
tales levi inflexu
frangas, ob id
Frangula hæc ar-
bor dici posset, *Frangula*
unde.
cortice ex fusco
subcinereo, mac-
culato, internè
luteolo, amaro
cum adstrictione
& ingrato: ligno
intus albo & me-
dulloso: foliis
vellicantur laus
Avellane vulga-
ris, rotundiori-
bus, nervosis, cre-
natis, viridibus,
splendentib⁹, len-

to & viscido humore oblitus. Oculi triangulares, Oculi
ex cinereo rufi interdum & virides, aut in pur-
puram quodammodo vergentes. In ramulo- Iuli.
rum fastigiis nucamenta seu Iuli dependent,
simul multi, virentes vel rubentes, unciam cir-
citer longi & fragiles, antequam commissuræ
conferruminatarum particularum dehiscant: quæ
ubi se explicuerint, duas etiam uncias longi-
tudine superant, sapore adstringente, cum ali- sapor.
qua amaritudine. Cæterum portunculæ dictas ad
mediam tanquam costam alligatas ambiunt fla-
minula multa, ut in Corylis. Mense Septem-
bri apparent etiam minimorum rudimenta. Eo- Cum vete-
res.
dem mense veteres conos videas privatis ramu-
lis pendentes, binos ternos, quaternos, plus
minus, pulchrè hiantes & apertos. Item paulò an- Coni nove-
li.
tè, aut eodem tempore novos, magnitudine
parvæ avellanæ, primò virentes, ubi mature-
scunt rubentes, & mox hiantes, ex imbricata
squamarum compage coaggestos: è quibus
& ante seminis maturitatem stamina purpurea
prominula quædam observata, quæ fortasse flo-
rum loco haberi possunt. Horum Conorum gu-
stus valdè astringentes cum aliqua amaritudine.
In quibus semina, ubi matura fuerint (quod
prædicto item mense observari solet) parva ad-
modum, compressa, inæqualia, rubentia: atq; in
iis medulla alba parca, sapore manifesto de- Sapor.
stituta. Observatur & in Conis, ubi mature-
scunt pulvis arenosus. Nic. Perot. in cornucopia Fœmina
Tuber.
notat in Alno, arbore nota, reperiri Tuber.

Theoph. l. 3. hist. cap. 14. καρύδας [sic enim *Clusia* vocat Alnum] ἑκατον, id est sterilem dicit: ita *Theoph.* enim habet Cod. Bas. sic & Plin. legit, & Dal. & Gaza more suo Plinium secutus. Ac Aldin. noster codex ἑκατον habet: Rob. Constant. legi- *Theoph. con-*
vult ἑκατον δὲ καὶ μονογυῖς, pro eo, quod in utriq; *red. ex ali-*
di. his codd. habetur post ἑκατον & ἀγρον, δὲ *lustr.* *monog.*
μονογυῖς. Nec displicet ea lectio. Immo & ipse quo-
que Theoph. eiusdem lib. c. 6. καρύδας mani-
festè circa autumnum fructum ferre dixit.

Ergo Theophrasto Alnus fecunda est & r-
 tius generis. Arbor natura recta, ligno molli, *Descriptio*
 medulla tenera, ita ut virgæ graciliores to- *Theophr.*
 tæ excaventur: folio Pyri [*æne*: at psullò
 pùst Coryli folio meliùs simile dicit.] sed am-
 pliøre nervosiorèque: coruce scabro, intus
 rubente, quo coria tinguntur: Radice per sum- *Radice*
 ma exspitum sparfa, nec maiore quàm Laurus,
 sed tenui.

pliny et
ru. Fallitur itaque Plin. quando Alnum inter eas arbores recenset, quæ solæ nullum ferant fructum, hoc est, ut ille explicat, ne semen quidem. Videtur autem & is apud Theophrast. legisse *ἀλαν*. Idem eidem folia crassissima tribuit, umbram pinguem: sed pascere satam.

Druckl. la
ffus. Fallitur & Ruell. qui ex Theoph. meminit fructiferæ & sterilis, prava deceptus Theophrast. codicis lectione.

A Diote. quod equidem sciamus non descripta. Nec à Galeno cæterisque Græcis: aut certe nomen eorum nondum innotuit, quod & Tragus fatetur: Sed difficultatem iniicit, quod Aristoteles inter naturæ miracula (ut citant Ruell. & Tragus: locum enim ipsi nondum invenimus) refert, Alnos in sola Creta non esse steriles. Existimat autem Tragus, eum fusca & rotunda illa capitula, in quæ flos Alni desinit, intellexisse. Ergo ex hoc loco quis non malè concludat, Alnum alicubi & extra Cretam sterilem esse. Sed non magni hoc loco tacemus eum locum, quem scimus non esse Aristotelis, quemad. nec libellus ille de Mirabilibus auscult. quod vel ex eo patet, quod Venetiarum in eo meminerit, quas certum est ex historiis fide dignis Aristotelis sculo nondum extitisse. Putamus autem autorem eius opusculi apud Theoph. legisse *ἀλαν*, & apud Plin. fructum non ferre: Cum verò ipse fortè Alnum novisset & in Creta fructum illam ferentem conspexisset, tantis autoribus derogare fidem noluisse, sed pro raro & admirabili in scripta refert. Sed in hanc rem diligentius inquirendum.

Scribit Car. Steph. Alnum apud vulgus Gallicum, latinum scilicet nomen retineri *Alnus*, indeque pumilas *Alnus-aux* vocari. Materiem eius ad aquatilia commendari, hocque probari Virgilii testimonio, Georg. 1.

Tunc Alnus primum siccij sensere cavatas.

Brunsellus Alnum, de qua scribit, non novit, quando ait nec semen, nec ullum fructum ferre.

Brunsell.
repreh.
Gesn. et
Trag. not. Gesn. quoque cum Trago minimè separat Iulos à Conis. Nam hic per florem Iulos intelligit, quos putat in nigra & rotunda illa capitula, uti vocat, nobis Conos dicta, desinere ut paulò antè dictum. Ille verò ait: Alnus suis Iulis, qui ei non decidunt, floret in Vere: sed autumno semen maturat. Et alibi Alno Iuli sunt loco seminis. Perperam uterque: Nam nec Iuli in fructus dictos migrant: nec Iuli semen sunt aut loco seminis. Sed Iuli à capitulis illis, seu Conis seu fructu semen continente, res distincta, exortu distincto, uno eodemque tempore in hac arbore observari solita.

C. Bauh.
Alnus rotunda folia glutinosa.
Sed nec C. Bauhinus, sagacissimus alioqui Botanicus discrimen aliud inter Iulos & fructum agnovit, quàm temporis, quod illi hunc præcedant, & in hos transformantur & abeant. Sic enim scribit apud Matth. Alnus quàm rotundifolia glutinosam appellamus, Iulos logos pro flore emittit, qui non decidunt, sed coguntur in formam olivarem: (huc fructus Alni est) in quibus semen, licet Plin. neque fructum neque semen ferre, & Theoph. sterilem dixerit: fortè Aristot. moti sententia, de qua, ut & de illorum, antè. Quis verò obsecro credat Iulos Alni ætate proveciores duas uncias æquant, contrahi rursus ac cogi in formam olivæ & capitulum vix se nuncia longius? Præterea quæ latitudinis, quæ substantiæ, quæ situs differentia? Omnino diversa sunt, ut adver-

tentibus apparebit.

Neque etiam concedimus Iulos esse flores: quamvis ita plurimi, alter post alterum, uti sit, secunda credulitate sentiant, ut Tragus, Gesn. Dod. & alij. Nec quicquam ad rem facit quod ad suam sententiam defendendam ex Cæsalp. adducit idem C. Bauh. Theoph. aliquando steriles vocare eas plantas, quæ fructum non conspicuum aut inutilem ferunt: nam & Alnum hanc nostram fructum conspicuum ferre scimus, neque illum inutilem: scimus & Theoph. non temerè sterilem dicere plantam, quæ fructum ferre manifestum constet, saltem sibi: & eundem Theoph. Alnum alio loco ex professo fructiferam, statuisse, & quo tempore fructum ferat indicasse.

Sed nec quicquam huc facit Cæsalpini illa subtilitas, qua Ruellium imitatus apud Theoph. Alnum quandam statuit sterilem, quandam fructiferam: adducta modò dicta explicatione, qua ratione Theoph. aliquando steriles arbores vocitet, quàm tamen nullam esse ostendimus. Sed miramur perdoctum & solertem alioqui Botanicum Cæsalpinum, postquam Alnum aliam sterilem, aliam fructiferam, ex Theoph. ut (illo sibi persuasit) dixerat, addere ausum: unigenam esse naturam: Hoc enim vel ex Theoph. vel certè ex sua mente eum dixisse certum est. Atqui ad Theoph. mentem non potuit: non enim hic illud ita habet: sed de Alno simpliciter, loco ro, quæ diversimodè in diversis exemplaribus *ἀλαν* & *ἀλαν*, seu ut ipsi cum Const. legendum censuimus, *ἀλαν* habere diximus. Posteriori autem modò legendum esse ostendimus: quod qui impugnaverit, aut Theoph. sibi ipsi crasso errore contradicere, sateri cogetur, vel duas Alnos tradidisse, quàm tamen natura unigenam dicit: atque etiam hoc modò sibi contraria protulisse. Quis enim fructiferum & sterile natura unigenum dicat. Vel denique doceat nos quæ sint illæ duæ Alni species apud Theophrast. quarum alteram *ἀλαν* & secundam, alteram *ἀλαν* ac sterilem dixerit.

Sed nec debuit ad Theoph. mentem dicere Cæsalpinus, Alnum utramque (hoc est, tam sterilem, quàm fructiferam: quas tamen nos non concedimus, donec nobis quis utramque ostendat) unius esse naturæ: quem, ut summi (post Arist. præceptorem eius acroamaticum) Philosophum, nemo temerè credat sterilem & secundam arborem homogeneam dixisse. Sed tota hæc difficultas, ex prava Theoph. codicis lectione orta, facile tollitur, si ad veriorem & antiquiorem codicem, ut ostendimus, legatur *ἀλαν*, vel *ἀλαν*, ut ipse sibi Theoph. concilietur, & rei natura, quæ quidem nobis cognita, talis ad veritatem & celebratissimi illius scriptoris mentem declaratur, quæ res vera est, & esse à quovis deprehendi potest.

Observabis interim ne Cæsalpinum quidem videri nobis agnovisse, Alnum Iulos, & Conos, uti res distinctas, terre.

Ineptit Lonic. cum ait Alnum fructum non ferre, quamvis floreat: ex Trago enim suo quem alius sequi solet discere poterat fructum ferre præsertim verò, si arborem ipsam, cuius Linæ ineptam exhibet figuram considerasset.

Tabern. in sua iconæ & Iulos & Conos exprimit quidem, sed descriptione non distinguit, cum tamen inter postremos sit, qui stirpium historiam compilarit.

Errat & Claudius Poëta, eumque secutus Guido de Fontenayo, dum in suis Epith. Alnum Ele-

C. Bauh.

Cæsalp. ali.
quæ error.
ret.

Theoph. la
itio habili
est.

Alnus Cæ
salp. error.

Lonic. imp
pro.

Tabern.
not.

Claudij
Poeta &
Fontenay
lapis.

Vasa Culinaria. vasis culinariis, futorumque formis, nec non totum, quibus mellores utuntur, receptaculis conficiendis utile est.

Falluntur igitur is, qui, uti Ruell. scribit, Alnum duntaxat scopis nascentem, nullum ferre fructum prodiderunt: Nam & hoc falsum esse supra docuimus. Et ad scopas inutiles esse ipsa docet fragilitas: nam ne minimum quidem flecti potest. Hinc illud solemne apud Germanos de Alno proverbium.

Nor haer / Vnndt Erlen bogen:

Thustu gurt / man soll dich loben.

Proverb. de Alno.

Ad proutum sepes.

Hoc est rufi, & qui capillatio sunt rufi, & arcus ex Alni ligno confectus si probe se gesserint, laudem sanè meritorios: quod experientia doceat contrarium. Alni quoque apud Plin. sepes muniunt, contraque erumpentium agnium impetus, riparum muro, in tutela ruris exubant in aqua sacra, caeteraque densius innumero hærede profunt.

Ad adificiorum fundamenta.

Sed non postrema Alni utilitas ac dignitas est ad ædificiorum fundamenta: Nam ut scribit Vitruvius, Alnus, quia non nimis habet in corpore humoris, in palustribus locis infra fundamenta ædificiorum palationibus crebrè fixa, recipiens in se quod minus habet in corpore liquoris, permanet immortalis ad æternitatem, & sustinet immania pondera structurarum: sic enim in vulgatis Vitruvii codicibus mendosa legi debere non malè doctis. censuit Budzus. Vitruvium secutus Ruell. eadem citat, additque, & sine vitis conservari, quod aëre sit & igni plurimo temperata, non multum terreno, humore paucio. Itaque non posse extra terram paulum tempus edurare, sed in humore obrutam, permanere ad diuturnitatem. Multaque ædificia sub fundamentis eius generis habere palos. Sed cur Alnus sub aquis duret nec putrescat, aliam à Vitruvii & à Ruellii profert rationem acutissimus Scal. nempe quod humidum habeat communis naturæ, cum humore adventitio: non enim aquam sub aqua putreficit, quod nihil invehatur peregrini: quæ subtilitas plane contraria est rationi Vitruvii, qui ad humoris inopiam, uti dictum, causam retulit: Ruell. verò & ad hanc, & ad aëris & ignis plurimi, terrenæque substantiæ paucæ temperationem.

Cur Alnus sub aquis non putrescat.

Sed enimvero magis aridet Scaligeri ratio: quem optasse certè eodem tenore lapidescentis Alni causam exaggerasse. Sed circa hos scopulos nobis alio loco, alioque tempore velandum. Illud tantum dicamus si non multum terreni habet Alnus, cur tam facile lapidescit. Lapide sanè verò, nihil ferè magis terrenum. Aut si ignis cum aëre temperatus in causa sit, cuius hercle patietur ab aqua, ob qualitates contrarias: A contrariis quippe omnis passio & alteratio. Sed nec Vitruvius temerè concesserimus humoris in Alno inopiam, quam non frustra potueram & fluviale dixerunt poëtæ, & quam non nisi aquarum alumnæ scimus. Immo in humidi exuperantiam & siccæ seu terrestris substantiæ defectum eius fragilitatem referimus. Sed de his aliàs. Hic enim potissimum spectandum: alibi si dicitur Illud certum & indubitatum, palos eiusmodi sub aquis infixos, temporis progressu lapidescere, ut multi nobiscum testantur, vidit Tragus, & nos Alni scusta lapidea plurimis locis: apud incomparabilem illum naturæ scrutatorem Vlysem Aldroandum Bonon. & magna vidimus frustra: apud Calceolarium Veronæ, & Venetis mulus in locis, in

qua nobilissima & verè regia civitate nobis pro certo à fide dignis relatum magnis etiam sumptibus accersiri solitam Alnum ad faciendâ palationum & ædificiorum sub aquis fundamenta, non modò quod crebrè fixa ad æternitatem maneat immortalis, uti Vitruvius dixit, sed quod ingentes admodum ferat etiam moles, ut annotavit Matth. Et ut ille ait, in Mulzo Calceolarii:

---Videat lapidescere Sarni

Caruleo sub fonte Alnum, Filicisque maniplos,

Et palea intortos lenes cum vimine culmos.

Nec contenta ingeniosa hominum solertia istud scisse, nisi & ipsa ad imitationem naturæ, artificio quodam, sed & naturæ obstetricantis beneficio, ex Alno lapidem generare, vel illam in hunc transmutare posset.

Imponitur lignum, quantæ velis magnitudinis, in labra illa ampla ænea, in quibus Lupulus coquitur ad faciendam Cerevisiam: cumque percoctus abundè Lupulus est, eximitur idem lignum, & arena vel glareæ in ipsis cellariis obruitur per triennium: inde cum exemptum fuerit, duratum in lapidem apparet, & quo potissimum Cotes fiunt, quibus ad ferramenta acuenda mensarii utuntur. Recitat Gesnerus ex D. Kentmanno.

Alnus que arte mutatur in lapidem.

ALNUS INCANA ET HIRSVTA.



ALNUS incana & hirsuta nobis dictæ folia vulgari similia, minus tamen rotunda: desinunt enim in acumen, magis serrata & penè laciniata, subtus hirsuta & incana, non virentia, nec etià viscosa. Color quoque ramulorum diversus, non ita virens, sed candidior. Iulos & Nuculas, ut vulgari, fert.

Descriptio

Folia,

Iuli, Nucula.

Cæterum neque hic assentimur C. Bauhino, dicenti. Iulos hanc obtinere, quam vulgari Alni breviores, qui conglobati fructum non ita rotundum, sed oblongum constituent. Nam & in hac dicimus Iulos à fructu distinctos, ut antea traditum.

Alnus 1. in Austria & Styria vociferlen, id est, alba Alnus, Clus. Alnus hirsuta, C. Bauh.

Iam olim hæc nobis observata Genevæ & circa Montbelgardum variis in locis, sed humidis potissimum, uti præcedens, ut ad Dubis ripas in pago Adincurtio propè domum D. Docutus Consil. M. E. C. V. Virtemb. ubi licet utramque Alnum videre & pulchrè à se invicem discernere. Item in Burgundia ultra pontem rigidum, vulgè dictum, *Pont de roide*, versus Villars, cum Iulis & Nuculis mense Septembri. Inter Grandivillam oppidum, & pagum Fesche ad Comitatum Montbelg. pertinentem. Observavimus etiam trans

Locum.

Tempus.

trans Rhenum inter Brisacum & Burckenheimium. Inter Montbel. & Porentruum itidem Septembri cum lulis & nuculis distinctis. Nascitur & locis aquosis circa Basileam inter Mutetum & Munchensteinium, & infra pagum Hünningen ad Rhenum. Alunt & Austria & Styria montana circa flumina & udis locis: etiam in Danubij insulis circa Viennam frequens est, priori commixta, teste Clusio: cui huius Alni cortex magis refrigerantem cum siccitate facultatem obtinere videtur, quam vulgaris.

Vitis:

ALNO SIMILIS ARBOR.

CAP. VII.

A Nnotant Pena & Lob. in Adversariis suis, post historiam Visci Indici, coniecisse Nucleos in eisdem spontulas, furculos effractus arboris. Alno quidem similis, fronde & ligno: sed tamen diversos, racemoso & muscoso flore, glomerulos conflate. Fortè [addunt idem] duntaxat caelo & agro variat. At nobis floris hanc diversitatem vix caelum aut agrum variare in eadem specie videtur. Posterius indagabunt.

DE POPVLIS IN GENERE, ET IN SPECIE.

CAP. VIII.

POPVLVS NIGRA SIVE ΑΙΓΕΙΡΟΞ.

Descriptio

Cortex.

Materia.

Quali.

Folia.



POPVLVS nigra in altum se attollens, cortice laevi exalbido ac incano obducta: sed ramuli potissimum albicant: materie dura, pallente, ac minus alta minusque sessili, quam Populi alba: quidam volunt andam & laxissimam. Radices profundiores quam in alba. Antequam folia erumpant, oculos protrudunt mucronatos, odorato, luteo &

pingui atque tenaci succo praegnantibus. Hinc folia Hederaceis similia, ex rotundo mucronata, serrata, Hederaceis minus crassa, atque virore splendentia, longis pediculis appensa. Producit & quasi lulos in longo racemo coacervatos, lanugine, ubi deliscent, alba plenos.

Infl.

Varietas duplex. Flus.

Quidam, notante C. Bauh. ante exortum foliorum floret: ac fructum non fert. Flos instar amenti colore rubente aut candicante. Quidam fructum fert, seu lulos, racematim com-

positos, multis rotundis & viridibus granis constantibus: (uva Populi aliquibus) in quibus lanugo candida in pappos avolans, cui pauca semina valde minuta adpensa sunt.

Hæc αἰγείρ est apud Diosc. cuius nihil aliud quam vires tradit, & quod ex ea δάκτυλον seu lachryma exstillans concreseat in Electrum seu succinum: de qua re postea. Idem & Populum albam agnoscit, quæ ei λεύκη dicta.

Apud Theoph. verò satis ampla Populi utriusque, hoc est, tam nigra, quam & ipse αἰγείρ vocat: quam albæ, quæ & ipsi λεύκη dicitur: itemque Libycæ descriptio: Aegiron autem in Creta nuncupari dicit, de nigra intelligens. Populus alba nigraque, inquit [λευκήν ἢ αἰγείρ] utrius sunt formæ: ambæ rectæ: sed excelsior laxiorque nigra: figura foliorum similis, & lignum cum ceditur albedine simile est: utramque ne florem quidem habere putant. αἰγείρ [hæc Populus est Libycæ, de qua postea.] Populo albæ similis est. Quidam Populum nigram solam sterilem esse putant, ut Arcades: cæteras autem omnes, quæ in montibus proveniunt, fructum parere. At verò in Creta Populi nigra multæ sunt fructuosæ. Ac paulò antè dixit: Fructum reliqua quidem omnia ferunt: de Salice verò, & Populo nigra [αἰγείρ] & Ulmo, ut dictum, varia sententia est. De Populo, annotat Scaliger, non est dubitandum: in Aquitania enim fert fructum. Sanè circa Basileam alibique locorum sepius fructus prædixi nos ferentem vidimus, ut de hac re hodiè amplius non sit dubium.

Sed & alia difficultas oritur in foliis diversarum Populi specierum, quas nos dissimiles describimus, uti reuera sunt: cum tamen Theoph. ex modò citato loco patet, utriusque Populi foliorum similem figuram dixerit. Respondendum ex ipsomet Theoph. l. i. hist. c. 16. Aliarum quidem arborum folia ipsa sibiipsis similia esse: Populi verò albæ [τῆς λεύκης] & Hederæ, & Ricini dissimilia. Recentia enim seu novella, rotunda esse: [τὰ νεὰ γὰρ ρόδια, & ῥικινία. Hist. L. vertit: Recentia enim Populi utriusque & Ricini folia rotunda esse: de quibus intelligere ait, cum dicit Theoph. utraque foliorum figuram similem habere.] Vetusiora verò angulosa fieri. [τὰ παλαιότερα γωνιώδη: quæ non bene expressit Gaza, cum ait in angulum exire, sed nimirum Plin. potius quam suum autorem sequi voluit: qui tamen melius, quam Gaza dixit, Nigra Populo, ut Crotoni, folia in iuventa circumata rotunditatis esse: vetustiora in angulos, exire. In angulos, inquit, non in angulum. Sed fallitur uterque, & neuter vocis vim apud Theoph. exprimit. Fallitur & Plin. in eo quod quæ Theophr. de alba dixit [μετὰ τῆς λεύκης], ille ad nigram transfert: cum tamen hunc locum ex Theophr. transcripsisse videatur.

Sed Gaza etiam fallit, dum ex eo Plinii loco, ne non Plinianus videatur, ad versionem Theophrasti. de Populo alba accommodat, verba quæ Plinius dixerat de nigra. Ut, vel hinc pateat, quam fidus Theophr. interpret fuerit Gaza, qui multos in erroris barathrum cum sua versione præcipitavit. Hist. Ludg. ut dictum, ad utramque, retulit. Vox est γωνιώδη. Sive igitur in angulos exire dicas, siue angulosa, utrumque rectè Populo albæ conveniet: non item Nigra, quæ folia non habet angulosa. Errantque qui Populi albæ folia in suis Herbariis non angulosa pingunt. Res eò redit, ut Theophrasto sua mens, sua sententia relinquatur. Alio-

Vitis populi.

Aegir.

Nigra ut alba Theophrasti.

Item Libycæ.

Cretæ.

Theophr. al. Scythr.

Dubium de foliis.

Salicis.

Gaza vult.

Plin. ut Gaza vult.

Gaza non fidus Theophrasti interpret.

qui haud vanè quis dicat, curiosam & haud magni momenti esse hancce satagentiam.

Idem ferè repetit Theoph. l. 2. Caus. c. 22. nisi quòd Crotonis tantùm ibi mentionem faciat: non item Populi.

An alba
mutetur
in nigram.

Theoph. re-
probat.

Porrò quod idem Theoph. tradit, & pluribus in locis inculcat, spontanea Metamorphosi Populum albam mutari in Nigram: id nemo mortalium nobis persuaserit. Quis enim credat arbores specie & forma diuersas, distinctas foliis, fructu, odore &c: in se invicem transmutari: si modò easdem Theoph. per albam & Nigram intelligat, quas & nos intelligimus, uti sanè non dubitamus. Nam etsi in §. de caus. idem scribat eiusmodi mutationes ideo evenire intelligendum esse, ut quæ transmutantur aliquid similitudinis habeant. Fatetur tamen idem, *ἀνὰ τὴν πρὸς τὴν φύσιν τὴν αἰσθητήν, καὶ ἀνεκλήσθησαν, καὶ τὸ ἄλλο μεταβάλλεται εἰς αὐτό*: hoc est, foliis esse latioribus albam Populum, quàm Nigram, cortice laxiori, & in totum succo laxiore. Sed eandem in senecta ob alimentii inopiam, frondem angustiorē corticemque scabriorem acquirere, haud præter rationem putat. Sanè & nos idem putamus.

Scal. not.

At Albam in Nigram transfigurari, sua sponte, sine arte, hoc est initione, aut alia cura, id verò nobis non modò præter rationem, sed & præter naturam esse videtur, quippe qui longè maiores pluresque differentias inter eas agnoscamus, quàm à Theoph. posita sunt, atq; aded tot & tales, ut pro distinctis speciebus agnoscamus, & nobiscum agnoscat Scaliger: quem proinde ut acutissimum, & natuissimum atq; aded etiam interdum regidum ac severum Theoph. interpretem atque censorem miramur hos scopulos non adnavigasse, ut aliquid subtilitatis inde ferret, sed secuta credulitate præternavigasse: & nihilominus hanc mutationem passim in suis commentariis inculcasse. Consideret bene utramque qui novit arborem, & à nobis utriusque positas descriptiones, & nostræ sententiæ facillè plausum dabit. Theoph. verò eo loco, ubi de plantarum transmutatione tradit, more suo (Aristot. præceptorem imitatus, & ut securitati suæ consulere, neque obnoxius fieret reprehensioni) non ex sua sententia eam metamorphosin tradit, sed aliorum: Quædam, inquit, totius arboris plantæve mutationes sua sponte [*αὐτὴν φύσιν*] fieri videntur: quemad. Populum albam in Nigram quodammodo facillè aiunt, tùm foliis, tùm tota facie. *Ἐξ ἀγορῆς δὲ φαίνεται, καὶ φύλλων, καὶ τῆς ὅλης τοῦ σώματος.* Nota: *ἔξ ἀγορῆς δὲ*, mirabilem vocem, & de qua nihil Grammatici nostri. Nota & τὸ φαίνεται. Et ait: *αὐτὴν φύσιν*, aspectu: non τῇ ὅλῃ μορφῇ. Non feliciter itaque Gaza τὴν αὐτὴν φύσιν in totam speciem convertit. Putamus autem eiusmodi popularem persuasionem Theoph. fuisse relaxam, quâ viro Philosopho, & in universum generi humano nihil est peccilentius: quippe quæ & constantes animos interdum labefaciet, & curiosos ac discendi cupidos inhibeat, simpliciores verò irretitos occupet secuta & vana spe credulitatis, qua nunquam ad genuinam & solidam rerum cognitionem pertingere queant. Eiusmodi multa sunt etiamnum hodiè, in nobilissima nostra arte Medica, licet una, falsa & præter rationem etiam à doctis nihilominus pro variis agnita ac etiam usurpata: quorum tamen non minimam

partem explodit Doctissimus Joubertus in erro-

ribus popularibus, & nos non minorem fortè palam in hoc nostro opere.

Sed ad institutum revertamur: nimis enim digressum.

Plin. cum Theoph. etiam agnoscat Populi genera: albam, nigram, & quam peculiari novoque nomine Libycam vocat, quæ *ἀπὸ τῆς Λιβύης* est Theoph. uti dictum. Nigræ Populo materiam tribuit crispam, quod notandum. Idem Plin. Populis in genere tremula tribuit folia, & iisdem foliis inter se crepitantia dicit esse, quod de Libyca potissimum intelligendum. Item Populo nullam esse umbram, ludentibus foliis, quod iudem de Libyca inandimus. Quando verò Populum Herculi dicatam scribit, id de alba intelligendum esse, postea docebimus. Nec audiendus Plinius, quando & Populum inter eas arbores recenset, quas solas nullos fructus parere falsò credidit.

Diosc. sanè aperte Populo nigræ tribuit, cum ait: *τὸ δὲ σπέρμα* &c:

Quin ipse quoque Plin. l. 24. c. 8. De Nigræ Populi viribus tradens, eius semen ex aceto comitialibus utile prædicat. Falsum autem est quod idem lib. 16. c. 21. Plin. ait: Populorum foliis grandissimam esse lanuginem. Nam nec Nigræ nec Libycæ ulla est. Et populo albæ non grandissima, sed candidissima, (uti forte legendum) superficie tenus averfa partæ aspersa quasi farina quadam essent obducta folia. Et tamen non benè Plinium reprehendit Matth. quasi, ut ille ait, Candidam efflorescentem lanuginem in nigra Populo videri scripsisset l. 16. c. 21. Nam & hoc expressè non dicit, eo saltem loco, sed Albæ, solum bicolor, tribuit peculiariter. Nigræ nequaquam, cuius tamen folia mox subdit ex Theoph. ut Crotoni, in iuventa circinatæ rotunditatis esse: vetustiora in angulos exire, quod de alba dicere Theoph. supra monuimus.

In sacris literis quoque Populi sit mentio ut Genes. 30. Sed quia ibi Populum albam intelligendam putamus, id postea sub eius historia dicemus. Hermol. annotat Populum nigram Aristoteli vocari Acheroin. Est & Populus nigra memorabilis Homeri celebratione, & loco, quod inter arbores hortorum Alcinoi commemoretur.

Auicenna Populum Nigram vocat Haurum Romanum cap. 344. Et 510. Nucem Romanam: Et cap. 311. sub nomine Hauri, confundit ea quæ de alba & nigra Populo à Diosc. & Gal. diversis capitibus scribuntur.

Ruell. de Populo nigra scribens nugatur: nam quæ dicit de ea, nec albæ nec nigræ Populo competunt, quævis ea ex historia aliqua albæ malè intellecta, ignoranter transulisse videatur. Sic enim habet: Populus nigra, *αἰχμηδὲς* Græcis, fronde angustiore: folia vetustiora in angulos exeunt, infernè herbacea, supernè candicant. [quæ contrariomodo apparent in alba] Et mox: Nigra, folio bicolor. Fallitur: nam talis alba, non nigra. Idem ad caput Populi nigræ refert quæ de Electro ex Hermolao transcripsit. Planè a. nobis persuademus, Populi genus neutrum Ruellio cognitum fuisse. Rectius Curtius ex hac Populo Populneum unguentum fieri scribit, quàm Ruell. ex alba, de qua re postea.

Falsò legitur apud Plin. l. 14. c. 1. Rumbotinum vocari & alio nomine Populum arborem Italia Padum transgressis. Nam eo loco, non Populus

Populus, sed Opulus legendum. Falliturque

Thes. ling. Lat. quando ad eam scribit, *Opulus* Viciola Plin. lectio eum decept.

Thes. ling. Lat. Veteres Latini, uti notat Cordus, utramque Populum, Farfarum appellant. Est etiam herba Farfarus & Farfarella dicta, à similitudine, quam cum Populi foliis habet.

Thes. ling. Lat. Cur verò Tragus nobis & aliis nigram Populum, dixerit albam, nescimus: Nam ea quam proponit, nigra est. Eius opinionem imitatus est Solerius.

Thes. ling. Lat. Lonic. quoque ponit iconem Populi nigræ, pro alba, confundens cum alba & Libyca ut postea diceretur. Sed & Harchius inscitè Nigram, *Albam* dicit.

Populus simpliciter. Petro de Crescentiis, Populus nigra simpliciter dicitur Populus: Similiter & Gesnerus Populum nigram vocat. Anguil. Populi secundam speciem facit. Schvuenckfeldius & Camerarius annotant Populum nigram Albarum dici P. de crescentiis: sive verò hoc ita sit, sive nò sit, (Nam Crescentii codex nobis nunc non est ad manus) non rectè ita dicitur id nomen de nigra. Nam *Albam* seu albam à colore in Italia Albarum vocari Scal. testis est, cui hac in parte plus tribuimus, maxime cum & vocis vis id præclare insinuet. Populum verò simpliciter & is vocat hanc nostram. Tragus & nigram Albarum Ital. dici ait.

Albarum. Hebræis *Lifnach*, Gen. 30. si modò hæc Populus intelligenda, ut idem putat Tragus. Germ. *Dappelbaum* / *Sarbaum* / *Bollen* / *poppeln* / *poppelweiden* / *schwarze poppeln* / *Aspen* / *Alterbaum* / *schwarze pappelweiden* / *Sarbauchbaum*: idque, ut sit, pro diversitate Provinciarum. Belg. *Dopeliet* / *Popelact* / *Populartre*. Angl. *Poplier* / *Ispe* or *Aspe* tree. Non tamen quilibet hoc nomine Anglis appellata est Populus nigra. Montana enim & Libyca eodem illis appellatur nomine, teste Turnero. Quapropter distinctius dicitur, *Black Poplier tree* vel *Black aspe* vel *Watte aspe*. Gall. *Peuplier*, & *Tremble*, uti notant Had. lun. & Matth. At nobis posterior appellatio melius competere videtur Libyæ. Soler. annotat Delphinatibus dici *Pinom*, & Provincialibus *Piboulo*. Vasconibus *Pibol*, teste Scal. Ital. *Propa*, eadem: aliis *Populo negro*. Hisp. *Alamo nigro*. Bohem. *Topel*. Slavon. *Kopel* / *Topel*. Mauris. *Haur romi*. Vngar. *sefete igonie* / *fibol lerónar*. Primum illud erumpens germen, cuius in medicina usus, Officinæ *Oculus Populi* vocant: alii *Gemma Populi*: Græcorum quidam *ovina* vocant: unde erroris occasionem acceperunt, qui non prima illa germina resinosa, sed racematim coherentia granula, in compositione unguenti ex Populo assumenda temerè existimant, in quibus nihil resinosum. Græci certè non aliud quàm quod resinosum est, accipi volunt, licet fortassis hoc ipsum haud proprio nomine expriment, uti Dod. putat. *μύκη δὲ τῆς οὐρίης ἐστὶν ἰνὸν*: id est, multa circa semen resina existit, inquit Paul. Aegin. l. 7. Sed de hac re plura in v. 1. Schvuenckf. tamen eadem gemma *μάλα* Græcè dicitur: ubi hanc vocem sublegit, nescimus. Germ. *Sarbollen* vocant: & *Dappelsknospen*. Quæ de Populo simpliciter Epitheta habent Poetz, potiss. ad albam pertinent.

Synonyma Ling. Lat. Hebr. *Lifnach*. Gen. 30. si modò hæc Populus intelligenda, ut idem putat Tragus. Germ. *Dappelbaum* / *Sarbaum* / *Bollen* / *poppeln* / *poppelweiden* / *schwarze poppeln* / *Aspen* / *Alterbaum* / *schwarze pappelweiden* / *Sarbauchbaum*: idque, ut sit, pro diversitate Provinciarum. Belg. *Dopeliet* / *Popelact* / *Populartre*. Angl. *Poplier* / *Ispe* or *Aspe* tree. Non tamen quilibet hoc nomine Anglis appellata est Populus nigra. Montana enim & Libyca eodem illis appellatur nomine, teste Turnero. Quapropter distinctius dicitur, *Black Poplier tree* vel *Black aspe* vel *Watte aspe*. Gall. *Peuplier*, & *Tremble*, uti notant Had. lun. & Matth. At nobis posterior appellatio melius competere videtur Libyæ. Soler. annotat Delphinatibus dici *Pinom*, & Provincialibus *Piboulo*. Vasconibus *Pibol*, teste Scal. Ital. *Propa*, eadem: aliis *Populo negro*. Hisp. *Alamo nigro*. Bohem. *Topel*. Slavon. *Kopel* / *Topel*. Mauris. *Haur romi*. Vngar. *sefete igonie* / *fibol lerónar*. Primum illud erumpens germen, cuius in medicina usus, Officinæ *Oculus Populi* vocant: alii *Gemma Populi*: Græcorum quidam *ovina* vocant: unde erroris occasionem acceperunt, qui non prima illa germina resinosa, sed racematim coherentia granula, in compositione unguenti ex Populo assumenda temerè existimant, in quibus nihil resinosum. Græci certè non aliud quàm quod resinosum est, accipi volunt, licet fortassis hoc ipsum haud proprio nomine expriment, uti Dod. putat. *μύκη δὲ τῆς οὐρίης ἐστὶν ἰνὸν*: id est, multa circa semen resina existit, inquit Paul. Aegin. l. 7. Sed de hac re plura in v. 1. Schvuenckf. tamen eadem gemma *μάλα* Græcè dicitur: ubi hanc vocem sublegit, nescimus. Germ. *Sarbollen* vocant: & *Dappelsknospen*. Quæ de Populo simpliciter Epitheta habent Poetz, potiss. ad albam pertinent.

Oculus Populi. Hebræis *Lifnach*, Gen. 30. si modò hæc Populus intelligenda, ut idem putat Tragus. Germ. *Dappelbaum* / *Sarbaum* / *Bollen* / *poppeln* / *poppelweiden* / *schwarze poppeln* / *Aspen* / *Alterbaum* / *schwarze pappelweiden* / *Sarbauchbaum*: idque, ut sit, pro diversitate Provinciarum. Belg. *Dopeliet* / *Popelact* / *Populartre*. Angl. *Poplier* / *Ispe* or *Aspe* tree. Non tamen quilibet hoc nomine Anglis appellata est Populus nigra. Montana enim & Libyca eodem illis appellatur nomine, teste Turnero. Quapropter distinctius dicitur, *Black Poplier tree* vel *Black aspe* vel *Watte aspe*. Gall. *Peuplier*, & *Tremble*, uti notant Had. lun. & Matth. At nobis posterior appellatio melius competere videtur Libyæ. Soler. annotat Delphinatibus dici *Pinom*, & Provincialibus *Piboulo*. Vasconibus *Pibol*, teste Scal. Ital. *Propa*, eadem: aliis *Populo negro*. Hisp. *Alamo nigro*. Bohem. *Topel*. Slavon. *Kopel* / *Topel*. Mauris. *Haur romi*. Vngar. *sefete igonie* / *fibol lerónar*. Primum illud erumpens germen, cuius in medicina usus, Officinæ *Oculus Populi* vocant: alii *Gemma Populi*: Græcorum quidam *ovina* vocant: unde erroris occasionem acceperunt, qui non prima illa germina resinosa, sed racematim coherentia granula, in compositione unguenti ex Populo assumenda temerè existimant, in quibus nihil resinosum. Græci certè non aliud quàm quod resinosum est, accipi volunt, licet fortassis hoc ipsum haud proprio nomine expriment, uti Dod. putat. *μύκη δὲ τῆς οὐρίης ἐστὶν ἰνὸν*: id est, multa circa semen resina existit, inquit Paul. Aegin. l. 7. Sed de hac re plura in v. 1. Schvuenckf. tamen eadem gemma *μάλα* Græcè dicitur: ubi hanc vocem sublegit, nescimus. Germ. *Sarbollen* vocant: & *Dappelsknospen*. Quæ de Populo simpliciter Epitheta habent Poetz, potiss. ad albam pertinent.

Quid verò sit Populi nigræ succinum diligentiùs inquiremus lib. seq. inter Resiniferas, post Vernicem sive Sandaracam Arabum, Mithridatis ducti autoritate, qui Succinum ex Ge-

Succinum à Cedri genere esse. Tom. I.

dri genere defluere dixit.

Populum nigram in variis locis observavimus, *Locus.*

sed potissimum aquaticis: circa Basileam extra Portam lapideam & alibi passim ad elices aquarum, quibus prata & pomaria irrigantur, ordine plantatæ copiosè visuntur. Nullibi tamen observavimus cum suis Vvis seu racematis tegminibus, quàm circa Basileam, potiss. propè Binningam pagum. Montbelgardi, quod in eo tractu rara sit, in hortum plantandam curavimus. Observavimus etiam Monspelii, Patavii, Genævæ, Lugduni, in Alsatia, potiss. ad tractum Rheini & propè Lauterburg, in ducatu VVirtemb. Anguil. in Italia vulgarem dicit. Provenit etiam in monte Baldo, teste Calceolario. Turner. in Anglia minùs frequentem scribit, quàm vel in Italia vel Germania superiore. Ad Padi seu Eridani Ferratiam perlagentis ripas Populos nigras nasci Lacunæ testimonio diximus. Annotat & Rivis. Textor frequentem esse hanc arborem iuxta Sperchium & Padum fluvios, qui propterea vocentur Populiferi à Poëtis. Matthi quoque utramque Populum inibi nasci testatur.

Theoph. auctu facilem dixit, quod ad aquas nascatur: quod verum esse cum Trago observavimus: nam brevi in altum se attollit, maxime si secundum amnes in pratis & uliginosis campis consita fuerit.

Aprilis mense, aut etiam priùs, odoratæ gemmæ prorumpunt: Maio racemuli seu Vvæ quæ lunio decidunt, aut certè paulò post, ut circa Basileam observatum.

Si propagare velis, ex præscripto Theoph. & *Savio*. Tragi, rami deputandi sunt, ac Verno tempore uliginosæ ac humidæ terræ mandandi. Avulsione, salicæ modo, facile provenire observavimus. An bene ex semine proveniat, nondum compertum nobis. Quomodo verò Fungi nascantur à Populo nigra docet Tarentinus in Geoponicis: ut si caudici Populi nigræ concito, & per terram strato, fermentum aqua resolutum infundatur, forte ut illico proficiant *Agintæ* fungi, quod Diosc. etiam de alba tradit. Theoph. scribit *Agerion* seu Populum nigram ex Creta translata sterilem, quod vix credimus: ut tamen hoc verum sit, non tamen verum, extra Cretam esse sterilem. Fertur quoque Populum nigram efficacissimam in eadem insula nasci.

Scribit Diosc. Populi nigræ folia ex aceto imposita, podagricis doloribus auxiliari. [quod de incipientibus potissimum intelligimus] Resinam verò quæ ex ea profluit, in aligmatis admisceri. Semen seu fructum ex aceto porum, comitialibus utile esse. Quæ verò de Populorum lachrymæ viribus tradit, & paulò ante dicta sunt, & ad succinum propriè pertinent.

De Populi nigræ temperie varii varia sentiunt. Aliis calida est in tertio: aliis in primo tantum gradu. Galeno *Agiri* flores calidi facultate quidem sunt, in primo recessu à temperatis: at in differentia quæ habetur in siccano & humectando, paulum quiddam ad siccus deflexerunt, sed & subtiliorum potius, quàm crassiorum sunt partium. Et folia quoque ipsius quodammodo floribus similia sunt, nisi quod ad omnia imbecilliora, minùsque efficacia. Sed & resina eius floribus similem facultatem obtinet, atque etiam calidiorem. Porro semen tum resina, tum floribus & subtiliorum est partium, & exiccantius, non tamen admodum calfacit. Solerius apud Gal. pro *opuntia*, vult legi *opuntia*, existimans

Vires & usus.
Podagra.
Epilepsia.

Temperamentum.
populi nigra distet.
plano.

Populum albam quam perperam nigram vocat, uti dictum, calidam esse in tertio gradu: Scque lectum fuisse aliquando ait. Mavardus quoque, Oribasius atque Avic. variis in locis calefacere etiam scribunt in tertio ordine: Sed hic nulla in re tam pariter tamque parum sibi confisus fuisse videtur.

Serap. multos Arabes citat, quorum unus temperate caliditatis cum paucā frigiditate dicit: alii frigidam, sicut & Halabas. Verum cum de succino loqui videantur, quod ipsi Crabe vel Carabe vocant, & quod falso Gummi Populi rentur, fabuloso errore parum dignos se monstrant, quibus credatur.

Consulendus itaque naturæ Codex, hoc est, Populus ipsa, qui ostendit ad tantum caliditatis gradum hanc arborem non extolli, ut inter medicinas tertii ordinis debeat collocari. Nam quis quæso sapor, quis odor, quæ demum qualitas tam præcellentes monstrat calores? Neque enim multum odorata, neque eximio aliquo sapore prædita: sed dum gustatur, primò quidem modicè adstringit: postea amaritudinem quandam subobscuram invehit: Olfacienti non insuave quid, sed exiguum id omnino repræsentat. Si quis vero via regia, quam Gal. monstravit, incedens, experiri eam in corporibus temperatis ægrisque voluerit, calefacientem non valde inveniet. [Non tamen frigidam idè dicimus cum Amato, quem mox refutabimus.] Paulus præterea calefacere eam scribit in primo ordine: cui Constant. quoque Monachus consentit.

Actius, interprete Cornar. taxat ad tertium caloris gradum, sicut & Gal. in quibusdam exemplaribus. Optimi tamen Codices tam Græci quam Latini, calidam faciunt duntaxat in primo. Oculos tamen ut odoratos, cum resina reliquis Populi partibus calidiores statuimus, uti plenius mox declarabitur.

Cum igitur omnes calidam faciant, alii in hoc, alii in illo gradu, si quid valet veterum auctoritas, satis confutabitur Amatus, qui Populum nigram frigidam statuit. Verba eius sunt: Tenellos cauliculos, pro conficiendo Myracopo, id est, Vnguento Populeo colligunt: quo medici pro extinguendo capitis & renum ardore frequentissimè, illitis fronte & temporibus, renibusque ipsi, ardentissimis in febribus utuntur: An verò benè, in dubium vocamus, quum vetus Galeni translatio, ἀρμεν calidam in 3. gradu esse constituat: Cui opinioni Serap. & Avic. favent, eam in 3. caloris gradu collocantes, à quibus nec Oribas. dissentit. Quæ si vera sunt, procul dubio unguentum Populeum potius calidum quam frigidum censendum est. At revera res ipsa, inquit, non ita se habet, quum unguentum Populeum prope 3. gradum frigiditatis à doctissimis iudicetur, & quotidiana experientia ita esse attestetur. Proinde Populum frigidam esse, vel saltem non calidam necessarium est.

At nehercle bonus Dialecticus, si Diis placet, Amatus, ab unguenti Populnei temperamento, de ipsius Populi qualitate concludit, præter omnem rationem, non considerans, illud unguentum & Mandragoram, & Hyosciamum, & Lactucarn, &c: res frigidissimas ingredi. Nec ullius ponderis est argumentum ab autoritate sine ratione. Siquidem exigua rei calidæ portio in frigidam compositionem potest recipi, ad frigida medicamenta ad locos affectos deducenda, aut vehementiam insalubrium frigidorum simplicium

infringendam; ut in dicto Vnguento sic: non tamen necesse est, ut ob id calidum medicamentum propter eius commissionem existat. Quod si inisset ratiocinatus: Doctissimū Populū propter tertium frigiditatis gradum esse iudicant. Errant itaque qui calidam censent, rectè fuisset argumentatus. At sic antecedens negatur, productus Galeno, Actio, Paulo, Orib. Serap. & Avic. Fallit enim à parte ad totum argumentatio. Non enim si Vnguenti pars aliqua calida est, totum Vnguentum idè calidum esse necesse est. Alioquin & sic concludere liceret: si calida esset Populus, esset quoque Populeum unguentum calidum: atqui frigidum est: ergo Populus frigida est, sed hæc ad Scholas. Cum in unguentum Populeum ingrediantur duntaxat uncie xviii. oculorum Populi, frigidissimorum recipiuntur uncie xxxiii. debilem oculorum Populi vim superantium: atque ita frigidum semper remanet, præsertim cum Populus in primo tantum gradu sit calida, frigiditas verò reliquorum ferè omnium 2. aut 3. gradum attingat, nonnulla etiam ad quartum ferè sint frigida. Erroris autem cardo in eo versatur, quod non animadverteret auctores in acopa includere nonnulla calida, non ad totam compositionem calidam reddendam, sed frigidorum vim deducendam, aut certè tandem retundendam. Id quod Gal. l. 9. 17. rursus docet, his verbis: Ex Opii & Hyoscyami &c:

Alterum Amati argumentum ita procedit: Gal. Paul & Constant. scribunt Populum calidam esse tantum in primo: Ergo frigida est, aut saltem non calida. Indoctum sanè argumentum, & quod confutatione parum egeat. Debat ergo concludere. Ergo Populus calida est, nullo modo frigida. Calidam namque esse in primo, est uno gradu à temperatis aut frigidis recessisse.

Tertio argumentatur: Nullum habet Populus insignem odorem saporève, quo calida posset indicari. Ergo nullo modo est calida. Negatur antecedens, & ad eos omnes qui teneros oculos Populi nigre degustarunt, olfeceruntve provocamus. Esti verò tanta vehementia non sit vel sapor vel odor, ut in tertio ordine constitueri velimus, talis tamen est, qui ius suum ordinis primi faciliè tuetur, ut fortè etiam accedat ad secundum, in quo sanè ordine doctissimus Turnerus, qui ingeniosissimè eadem Amati argumenta in Herbario suo Anglico refutat, collocare non dubitavit cum resina sua. Cornar. cum videret Populum nigram adèd esse calidam, inquit idem Turn. consultissimum putavit accipere Populi albæ oculos. Verum autem rectè, an secus consulat, iudicabunt qui Nic. Alexandrinum consulunt, moxque speciatim dicetur.

Nobis sanè hac in parte neutiquam reiciendum videtur iudicium Tragi, qui utramque Populum albam [nam sic & nigram nostram vocat, uti dictū] medium putat obtinere temperamētum humidæ & terreæ substantiæ, ad refrigerandi potius, quam excelsiendi accedens: nisi quod oculi odoratissimo illo gummi prægnantes, aliquantum calfactoriæ facultatis habent. Ergo dicendum distinctius, oculos Populi in prædicto ordine calidos, ipsamque etiam resinam. Reliquas verò partes inclinare ad frigiditatem.

Schwenckfeldii edicto, folia & flores digerunt, resolvunt, attenuant: Oculi calfaciunt, humectant, siccant cum partium tenuitate: molliunt, digerunt, resolvunt. Oppidè hercle festivus qualitatū dispensator. Quo experimento, qua ratione, quo sensu folia resolvendi attenuandique

In Populi temperam. exactè inquiruntur.

Amati opinio refut. qui vult frigidam esse.

In ungu. Populeum cal. vel frig.

Amati argumentum exploditur.

ad 2.

Cur calida frigida aut medicamentum

Refutatio 2. ratiōis Amati.

ad 3.

Calidum ord.

In iudicium Tragi de Populi ratiōe per.

Schwenckfeldii edicto, folia & flores digerunt, resolvunt, attenuant.

vim

vim tribuit? Et quis ipsi credat oculos simul humectare & exicare.

Alia A-
mae error. Sed & illud addendum, falli etiam in eo Arnem, dum ait, tepellos cuniculos pro unguento Populeo sumi, quod non verum: aut si alicubi fit: non bene fit: sed oculi accipiendi.

Plin. ex
Ruel. la-
stus. Plin. quidem dum Populum & uvas & semen forte facitur, illas unguentis, hoc vero comitibus praeferit: sed optimè monet Matth. ne ob id Myropolæ communis usus unguentum Populneum vocatum, ex Populi uvis conficiant, ut Ruell. credit à Plin. deceptus. Quandoquidem Nic. Myreps. qui illud unguentum describit, non Vvas, sed germina seu gemmas admiscet. Odorata enim sunt & ceraginosa: Cum tamen nullus prorsus sit uvis odor, nulla insignis qualitas. Anigitur antiquitas Populi Vvas inodoras admiscuerit dubitandum sanè est.

Plinio Po-
pulo uva
quid. Sed Plin. & in eo hallucinatus est, dum Muscum in Populo nascentem, nihil ab eiusdem uvis differre existimavit. Eius verba sunt. Eodem & Bryon pertinet, Vva Populi albæ Optima circa Gnidium aut Cariam, in sitientibus aut siccis asperisque: secunda in Lyciæ Cedro. Hæc Plin. At Cedrus nullas fert Vvas, sed Muscum odoratum. Apud Diosc. legimus, post Cedrinum, optimum esse Muscum Populneum: sed hæc ad Populum albam pertinent.

Plin. ali-
erraret.
Muscus
Populi. Plin. quoque secuti sunt Hermol. & Ruell. qui aiunt Vnguentum ex uva Populi fieri, quæ Bryon sit. Verum falluntur, nec hodiè ex Vva fit: neque sanè ea etiam oculis præferenda.

Lacuna la-
stus. Lacuna scribit flores Populi albæ vulgè assumi in unguentum Populeon, quum videantur accipiendi flores nigri Populi secundum sententiam Gal. & Pauli. Verum considerandum esse autores per flores intelligere gemmas quas oculos vocant, quandoquidem neutra florem ferat, ut bene ab Hermol. annotatum ait. Ast nescimus ubi Lacuna observavit Vnguentum fieri à floribus Populi, id nec in Italia, nec in Gallia, nec in Germania vidimus. Oculos pro floribus accipi non displicet, quanquam non destituantur suis floribus vel Iulis, ab uvis distinctis ambæ Populi, ut is cum suo Hermol. autumat.

Vnguenti
usus. Neque ijs accedendum, qui Nigri Populi oculos neutiquam assumendos putant, sed albæ, quæd huius oculos frigidiores putent ijs, quos tamen nos cum Manardo calidos potius, quàm frigidos censemus. Legimus etiam apud Gal. Aer. & Paulum, acopon *σταγόνη*, hoc est, è Populo nigra: nullibi *σταγόνη*, hoc est, ex alba, legisse meminimus.

Oleum A-
eginetæ. Cordus in suo Dispensatio oculos Populi simpliciter sumendos tradit, non addens, cuius. At Matth. nigri accipere iubet. Et Cronemburgius eorum improbat opinionem, qui volunt parari hoc unguentum ex oculis Populi albæ. Vallet istud unguentum in omnibus calidis affectibus illitum: naribus inditum, & temporibus ac pulsinibus arteriis illitum somnum conciliat. Eius quoque usus ad calidos dolentesque tumores. Quidam & feliciter podagris calidis illinunt. Sed ne inveterescat cautio est: alioqui vires eas perdit.

Actius & Paulus Aeginetæ ex oculis populi nigri Oleum Aeginetæ dictum conficiunt. Verò tempore id confici debet, cum plurimum gravis est, prægnansque resina, potissimum in geminis. Falso legitur in Histor. Lugd. cum nulla est circa illam Resina, Nam & Paulus Vere fieri

præcipit, licet Actius æstate petari iubeat, ac uterque, quum multa circa sperma [sic baccas vocat] est Resina. Sumunt eius grana modicèque constringunt, & ad pondeto expensum inde trientem, Olei dulcis sextarium immittunt, & ad dies 40. insolant, atque ita excolatum reponunt. Est hoc Oleum calfactorium, tenuium partium, attenuat, remollit, & est odoris iucundi. Cutis densitatem sanat autore Paulo. Ad cap. dolorem valet, & illitum membris dolentibus, podagris, arthriticis & nephriticis. Alii Olei uncias 76. recipiunt: vini verò lib. 4. oculorum Populi nigri resinosorum Vere lib. 3. quos diutissime terunt: post in oleo ac vino infundunt. Septem verò sequentibus diebus quotidie eos agitare oportet. Octavo levibus prunis subiiciunt, incoquantque ad vini consumptionem. Post fortiter exprimunt & in vase ad usus reponunt. Sic Curtius describit. Atque hoc propter coctionem admixtionemque vini calidius existimaverimus, & frigidioribus affectibus quoque adhiberi posse. Mirum verò hoc Oleum hodiè in Officinis nec parari neque haberi, quum tamen commodissime parari posset, & in multos usus aptari.

Oculis Populi nigri odoratis & viscosi formi-
Capillari
sucus. næ pulchros capillos hoc modo comparant tradente Matth. Oculos cum butyro contusos olæ induunt, quàm probè operculatam postquam per septem dies stare permiserint, igni tantisper admovent, quoad butyrum liqueat: butyrum hoc per linteum excolatum mundo vase reponunt, eoque capillos lotos & exiccatos illinunt: unde non tantum pulchriores sed & prolixiores redduntur.

Humor qui è Populi nigri cavis effluit, verrucas & papulas corporisque attrita tollit, teste Plin.

Nugæ sunt quod scribit Curtius ex quorundam relatione vermes hominis animalisve vulnerum decidere, si horum vel pili, vel lana in apertum corticem Populi nigri ante Solis ortum recondantur. Hoc autem Betulæ quidam ascribunt.

Simile illud Plinii: virgam Populi in manu tenentibus intertrigo non metuatur.

Populi ferunt in foliis guttam, ex qua apes propolin faciant. Rami ab agricolis Octobri decerpti exiccantur cum foliis, ad pabulum hyemale capris & ovibus.

Theoph. & Populum nigram deligit ad sustentandas vites nobilium vinorum, quod minime densa patulaque sit folia.

Populi vitibus placent, inquit Plin. nulla illarum umbra, ludentibus foliis.

Huic materia lenta, idèdque scutis faciendis apta eodem autore.


Est sanè annosa Populi lignum pulcrè crispante undarum discursu peramœnum: idèdque artifices Germani ex eo varia utensilia, mensas, abacos, lectorum spondas, capsellas, ostia, etiamque cohlearia & alia plurima parant. Attentiores ad rem eam in tenues asseres secant, & alia ligna ijs investunt. Alba est, sed vernice croceato tineta undulatam crispitudinem longè elegantius ostendit. Stupidos verò esse eos oportet, qui incoctas atramento Populneas assulas ad speculorum captulas ab impostoribus emunt, quale ab ijs divendi scribit Scaliger. Nam Ebeni lignum nec undarum Crispum est sicut hoc: aut si Populneum adolescentius fortè tale non sit, ac reliqua facie, & pondere præsertim, & lavore etiam politum, Ebena longè cedit.

POPVLVS ALBA: ΑΒΤΚΗ.

Descriptio.

Folia.

Tomentum.



POPVLVS ALBA FOLIO MINORE.


Catali.

Lignum.

Cortex.

Gemmae Popul. folio minore.

Leuce germ.



PLVRIMVM differunt Populi albae folia à Nigrae foliis, totaque vultu albam arborem docent. Sunt ea enim omnium maxima, Aceris maioris potius, in acuminatas circumscissas lacinas diuisa, superne cum atro virore fortuita lanugine donata: at inferiore parte denso tomento incano ceu Tussilaginis folia, sed magis niveo pubescunt, quo etiam obfita sunt cum pediculis longisrami. Folia observavimus manus expansae amplitudinem facile aequantia. Quales ferat flores vel fructus nondum observavimus. Icon nostra est Gesnerina vel Cameriana: posterior lobeliana. Hic scribit Catulos ferre ante foliorum exortum, & latifolii salicis modo edere. Taber. scribit, villosos esse, & ex purpureo fuscis. Ligno est albo, quod facile finditur, cortice albo laevi. Et hanc

ut prior, gemmas in primo foliorum germinatu fert. Illa verò quae minore est folio, non aliter ferè à praedicta differt. Hanc *λευκή* est Diosc. & Theoph. *ἡ λευκή* [inquit hic] *καὶ ἡ κίαν*, καὶ ἡ *καυκία* καὶ *καυκία* *καὶ ἡ καυκία*, καὶ ἡ *καυκία* *καὶ ἡ καυκία*. Variat aut folia, ut ex rotundis adolescentioribus, si veterascant, fiant angulosa: id quod Plin. nigrae quoque accidere vult, quod in nostris non reperiri ait Celsus. Eandem idem Theoph. fronde latiore, cortice leviori, atque omnino succulentiore [*ὑπερβολικώτερη*] dicit, quàm nigram: [*ἡ αἰγία*] sed eandem in senecta ob alimentum defectum, in frondem angustiore corticemque scabriorem abire, haud absolum putat, id quod ei facile concesserimus, quod idem fieri videamus in ceteris quoque arboribus, ut vetulae strigosiores evadant. At si eam in nigram hac ratione transformari putet, ut ex aliorum relatione citat, & aliquas rationes, quare id

fiat, producere conetur, eis sanè antiquum assentiamur, ut clarius exposuimus in historia Nigrae.

Ceterum videtur Theoph. sibi ipsi contrarius: nam modò citato loco, qui est l. 5. caul. c. 8. *τὴν λευκὴν λευκωτέραν καὶ τὴν ἰσχυρότερην ἢ αἰγίαν* hoc est, Populum albam cortice leviori, & in totum leviores dicit quàm Nigram; qui tamen l. 3. c. 14. hist. *τὴν αἰγίαν* seu nigram *μακρότερον καὶ λευκότερον* dicit: foliorum verò figuram similem, simile & lignum candore esse cum exditur. Videri autem utramque florere carere. Hic Populum nigram *λευκότερον* dicit: ibi albam: quod miramur nasutissimum non observasse Scaligerum. Nec est, quod nobis quis obtrudat, in causis eum de cortice loqui [ut sanè facit] in historiis verò folia conferre. Nam simpliciter leviores dicit, nullam foliorum faciens mentionem. Imò hac non intellexisse aperte patet ex statim sequentibus: *τὸ δὲ σκληρὸν ἢ ὀξύλον* &c: prius ipsas arbores contulerat: nunc demum de foliis transigit. Et videtur nobis *τὸ λευκότερον* non longè aliud esse, quàm *μακρότερον*, saltè in harum arborum collatione. At illud epitheton in causis albae, hoc in historiis, nigrae tribuit. Vtrobique verò ambas inter se confert: ut quia ratione excusamus Theophrastum, nunc non habeamus. Cogitabimus autem in posterum.

Gaza *λευκὴ* non rectè vertit simpliciter Populum, apud Theop. l. 1. Hist. cap. 16. Magna sanè differentia in foliis est, non tantum, quòd folium albae subtus candidum sit, sed etiam quòd laciniatum. Si quis autem obijciat, Theoph. l. 3. hist. cap. 14. dicere, *τὸ δὲ σκληρὸν ἢ ὀξύλον παρόμοιον*. Resp. similitudinem esse foliorum primùm erumpentium, non autem adultorum: alioqui & hic sibi ipsi contrarius foret Theoph. Sed hanc obiectionem & ipse Theoph. sustulit, paullo post descriptionem ex eo à nobis adductis verbis. Nugantur qui in suis Herbariis Populum albam folio non anguloso pingunt, vel potius pro alba, nigram ostendunt, quae folia non habet laciniata.

Plin. non benè inspexit Populum albam, quam rectè quidem folio biclorem dicit, *ἡ λευκή* supernè candicante, inferiore parte viridi. Nam contrarium apparet: supernè viret, internè albet. Minus excusandus Lonic. qui eandem errorem commisit: qui quàm ignarus fuerit stirpium, ex eo patet, quòd in hac tam vulgari planta tam turpiter caespitat. Pro ea iconem exhibet Populi nigrae: cui in descriptione, quam ponit, nihil respondet: confunditque inter se utramque Populum, ac etiam Libycam. Nam folia albae tremere dicit: ideoque Gallis *Tremulam*, quasi Tremulam vocari: quod verius Libycæ competit: folia primò rotunda, postremò angulosa dicit, cum tamen nigram pingat, atque id tantum albae competat: addens eius folia esse supernè alba, subtus viridia, cum contrario modo se res habeat: ut tandem nesciamus, an credendum ei sit, & de qua intelligat, cum ait: ferre lulos cinereos, qui sine fructu decidant.

De hac intelligendum quod Plinius simpliciter de Populo tradit, cum ait: Populorum foliis grandissima lanugo. Evolat candida (tradita folio numerosiore candida) ut Iulus. Quamquam equidem quæ sit illa grandissima lanugo, nondum videamus. Nam foliis parte inferna quod aspersum est iacanthum tomentum, cum grande

grande non est, ut grandissima dici mereatur. Vnde suspicio nobis non vano, fortè legendum esse, candidissimum. Cetera quoque non satis clara videntur, & parum abest, quin totum illum locum corruptum dicamus. Quid enim sibi vis vult verbis: Evolat candida ut Iulus. Si Iulum intelligit: sitita. At & reliquæ Populi Iulos habent. Non ergo de candida sola id dicendum. In M. S. ita legitur: grandissima lanugo euolat. Candida &c: est ut Iulus. Alii sic legunt. Euolat &c: candida, & ut villi. Daclech. sic. Evolat candida & ut villi. Idem & alibi huic folia circumagi post solstitium ait: eoque argumento certius intelligi fidus confectum.

Ceterum quicquid antiquitas de Populo prodidit, ad hanc potissimum pertinere videtur. Genes. 30. Populi sit mentio: ubi scribitur Iacobum virgas eius cum aliis incuntibus proposuisse pecudibus, ut ostendimus in historia Castaneæ. Nec tamen pro certo asserimus hanc intelligi oportere, vel aliam. Vetus interpres & posteriores, ut Castalon, ita verterunt. In Græcis scriptum *αἰνιστὰν ἄδης* &c: Quid si legas *αἰνιστὰν*, & intelligas Populum albam. Lonicærus annotat Populum dici Hebr. eo loco Libne: Tigurini interpretatur Weyden / id est Salicem: an bene indicent alii.

Hermol. uvas tribuit Populo albx, Plinium secutus: an bene nescimus. Inquiratur. Eadem Populus & Herculi dicata consecrataque fuit, teste Plinio: Vnde Virgil.

Populus Alceda gratissima:
de qua etiam intelligit, dum dixit:

---Herculeæque arbor umbrosa Corona.

Idem in ludis iuventutem fronde Populea velatam fingit: quod *ἡβή*, id est, Hebe, sive iuventus, Herculis uxoris, cui Populus dicata est. Hoc autem Phisici, ut Probus ait, ad naturalem causam *αἰνιστὰν* referentes, Herculem tempus significare volunt, ac ei Populum devotent, propter colorem album, quo dies accipitur, & nigrum, quo nox. Vnde Sali Herculi ad aram maximam in foro Boario sacra facientes, Populi fronde coronabantur: Vnde etiam Virgil. *Æneid.* 8.

*Dixerat Hercules bicolor cum Populus umbra
Velaretque camas, solisque inplexa pependit.*

Ex non longè post:

*Tum Sali ad castrum, incensa altaria circum
Populem adsunt, evincti tempora ramis.*

Docent autem alii, Coronam Lauream his præfici. Ceteri verò ad fribulis referunt, & ad albam tantum Populum. Vnde Pausanias, albam Populum Acheroidem vocat: contra Aristoteles nigram. Quod primus, iuxta Acherontem Thesprotidos annem genitam ad Græcos transtulerit. *Ἀχαιοί* Homero quoque dicta, quod redux ab inferis Hercules, Populi in Acherontis ripa nascentis ramo coronatus, emerferit, Harpocrati teste. Lepida est fabula. Nam quum ad inferos Hercules descenderet, & labore defatigaretur, corona ex hac arbore completa, caput, propter sudorem velasse dicitur: Vnde foliorum partem alteram, quæ temporibus adhærebat, exaluisse aiunt: partem verò exteriorem, propter inferiorum calorem nigram permanisse: eosque colores sic in ea permanisse, ut bicolor postea fuerit. Alii autem eum ab inferis redeuntem, primum arborem istam contemplatum se inde coronasse, conveniente plantæ colore albo huic eventui, quum è tenebris

in lucem commicaret. Eandem causam & Pausanias refert: proindeque [addit] non alioligno cremari victimas in Elide Iovi Olympio. Alii denique dictam ita tradunt, quod Hercules devicto Cerbero, Populum arborem ex Acheronte detulit frondibus eiusdem coronatus.

Aristoteles dicit solū sylvestrum arborosumque, Acherusion dici prodidit: ad quod fortè aliudens Poëta festivissimus, Vlmorum Acherontem dixerit in Amphigone. Horat.

Tempora Populea ferunt unxisse Corona.
Theocrit. *ιδ. β. ἡλικὸς ἱερὰ καὶ ἱερὰ ἱερὰ*: quod loco interpretes scribit Populum sacrum esse Herculi.

Pausanias in Eliacis scribit Populum etiam ab Homero appellatam.

Lambinus suspicatur bicolorem dictam Populum, quod & alba & nigra in hoc genere sit, quæ Populus dicitur. Sed potior est illa ratio, quod frons Populi etiam alba revera bicolor est. Apud Horat. Carm. 1. 2. od. 3. legimus.

*Quæ Pinus ingens, albæque Populus
Vmbra hospitalem consociare amant
Rami, quæ obliquo laboras
Lympha fugax trepidare rivo.*

Item Epod. lib. od. 1.

*Ergo aut adulta vitum propagine
Alas maritas Populos.*

Contra Od. 5. l. 4. Populum, Vlmum & similes arbores viduas appellat, quæ vitibus carent. Quid si legendum cum Lambino dicamus, albas maritas: nulli & superius quoque legendum sit: atque Populus. Vtraque lectio ferri potest. Terebant (ait Parrhasius in Claud.) ubi Bacche coronas ex alba Populo, & ut ait Harpocrati, iuxta ripas Acherontis enata.

Populum albam Plautus Farfaram appellat, à foliorum multitudine, ut quidam volunt. Quid si dicamus à foliorum similitudine cum herba Farfara, cuius folia itidem inferna parte albicant: Prosternebam eos [inquit in Pœn.] ut folia Farfari, quæ levi impulsu venti alicuius Autumno universa aliquando cadunt.

Potè ut ad historiam redeamus, pluraque quæ Ruell. de Populo alba tradit, Libycæ potius competunt, quàm nos Cercida Theoph. censem, multum ab hac diversam, atque adeo tota specie. Huic alz voces, *Tremula*, *Trambula*, non albz competunt, & quam à vulgo tribuuntur. Idem cum Hermolao Plinium titubantem potius, quàm naturæ indicem inspicit, ut diceret, Populum albam foliis esse infernè herbaceis: nec ex nostra alba hodie parantur unguentum ut ille ait, nec ex sua Tremula: nec scopis tantum natæ Populi: nec in scilices damnatæque religione, quod neque semen ullum, neque fructum ferant, ut ositantur cum Plinio asserit. Denique nec Bryon est uia Populi: ut quid veri in ea historia, habeat præ erroribus vix appareat.

Eosdem plexosque errores & Curtius habet. Alciatus in suis Emblem. Populum nigram pingit, & albam vocat.

Tragus Populi albz alteram speciem hanc facit: nam priorem albam dixit, quæ nobis nigra est.

Ryffus iconem proponit Populi nigre: nec tamen declarat aut scribit, quam intelligat.

Albarius, Pet. de Crescentiis.
Ἀλβαί, speciem Populi inquit Scal. à colore quoque in Italia Albara. Nihil igitur fuerit

Populi Gira-
ga lacer pe-
culum
proposuit.

Libne
Hebr.

Yba.

Herculi Al-
ceda.

Acheron
Pausania
& Homero.

Figmenta
Pœtæ
quando Po-
pulus bico-
lor evase-
rit.

Acheron
quid Ar-
bor.

Ἀλβαί
Homor.

Bicolor ab-
de.

Populus
maritima
Populus vi-
dua.

Baccha-
rum coro-
ne.

Farfara
Plauti.

Ruell. id.
namque
natura
errori-
res.

Hermol.
not.

Curtius
gillat.
Alciatus
not.

Albarius.

Albara.

impedimento quominus apud Theoph. Albaram Latinè vocaret Gaza, qui & alibi alia fingit, & multis locis, ubi est utrumque *Alnus* & *Alnus* al-
 terum omittit, ut l. 3. c. 6. ubi *Alnus* simpliciter
 populum vertit, & *Alnus* omittit, pro ea repo-
 nens *Alnus*, cum tamen paulò antè *Alnus* *Al-*
 num reddidisset. Tanta est huius interpretis fides
 se & alios fallentis. Nec tamen verum quod
 Theoph. *Alnus* seu steriles dicit *Alnus*, & *Alnus*,
 hoc est, *Alnus* albam quàm nigram Populum. Ex
 quo loco Plinius eandem infelices damnatasque
 religione digere ausus fuit, eandemque arbores
 citat, quas hic *Alnus* Theoph. dicit. Sed de hac
 re iam prius dictum.

Epitheta. Dicitur & Virgilio *Candida Populus*: *Populus Al-*
cide gratissima: *Populus in fluitis pulcherrima*, & a-
 licubi, *Populus solida*. Huic & aliis Poëtis, bi-
 color, nutrita, nuda, alba, atra, phæthontias, glau-
 ca, frondens, ardua, &c. *Populus Heraclea*, cana, um-
 brosa, frondosa, Guidoni de Fournays. Miram quo
 consilio Solerius hanc *Populum nigram* dicere au-
 sus sit. Minus placet eandem Castori Dur. & Po-
 pulum nigram, Germ. *Aspen* & Gall. *Tremble* di-
 ci: nam nec nigra est: & vox *Aspen* sicut *Trem-*
ble, Libycæ competit. Lob. priorem, *Populum*
albam latifoliam: posteriorem *minoribus foliis*, pin-
 gens utramque dicit. *Arbor admirans* vulgò, in-
 quit Scruenckfeldius, ob folium bicolor, super-
 nè candicans, inferiore parte viride. Hæc ille.

Eoque res nunc rediit, ut & arbores iudicio
 prædite mirari audeant, quid miremur in illis.
 Miretur sanè *Populus*, cur se non propius inspe-
 xerit bonus ille vir, sed ex aliorum ore suæ fron-
 dis colores invertere sit ausus. Contrarium si di-
 xisset, non *Arbor admirans*, sed *Admiranda nobis*:
 seu *Admirabilis*, ut ille dicere voluit aut debuit,
 restitisset. Sed hæc ad scholas. Leuce etiam Lat.
 dicitur. Arab. *Haw*. Hebr. *Libna* teste Lonicero,
Lisnach, Trago. Germani autem luxuriant in huius
 arboris nomenclatura, idque pro regionum varie-
 tate.

Nomina linguar. Iis enim dicitur, *weiß Alherbaum* / *weiß Po-*
pel / *weiß Papelbaum* / *weiß Papelweiden*: *Pa-*
pelbaum & *Papelweiden* etiam simpliciter,
Sarbaum / *Abelen* / *Bollen* / *Poppelbaum* / *A-*
bielbaum / *Papierbaum*: quæ duo postrema no-
 mina Schruenckfeldius adiecit, quorum alter-
 rum Papyri arborem denotat: alterum admira-
 tionis arborem. Belg. *Abelboom* / *Dopelens-*
boom. Angl. *Whyt aspe* ou *Poplier tree*. Gall.
Obeau, *Aubel*, vel *Obel*: Provincialibus *Aulbers*:
 Vascon. *Viole*. Ital. *Popolo bianco*, *la pioha*, *Albero*.
 Hisp. Castil. *Alamo blanco*: Catal. *Alber*. Portug.
Ameyro & *Alamo branco*. Bohem. *Topel*. Sclavon.
Topel, *Topel*, teste Hort. Lusatæ. Vngar. *Zeg-*
nye fa.

Locum. Plinio autore, *Populus* montes amat: ac confi-
 derandum an hanc intelligat, an potius Liby-
 cam. Nam paulò post hæc: *Populos in aqueosis*
 provenire: quod & Theoph. dixerat. Nam in
 partibus ad Rhenum sitis, locis humidis, & uligi-
 nosistractibus præstique nasci gaudet. Frequen-
 tissima nascitur utraque *Populus* in agro Man-
 tuano ac Ferrariensi, non modò in Padilittori-
 bus, sed & per agros & prata in fossarum aggeri-
 bus, ut testatur Matth. Provenit & in monte
 Baldo teste Calceoli. Scribit Turner. non me-
 minisse se in Anglia vidisse, sed in Italia iuxta
 Padum frequentem observasse: ut Lucianus con-
 spicibis eguisse videatur, quando ad Padum nul-
 las *Populos* se vidisse scribit. Neque verisimile
 est post eius ætatem demùm ibi consitas, cum

longè ante eius tempora ibi natæ *Populi* celebra-
 re fuerint à scriptoribus, aded ut & *Populifer*,
 ut dicebamus, à Poëtis nuncupatus fuerit. Pul-
 chra atque præcerea videtur propè Basileam ver-
 sus arcem Binningen. Nostra cura Argentuaris,
 vulgò Horburg, in arce E. C. V. Viterb. è vicinis
 locis accersita & in horto Montb. plantata. In
 Lotharingæ sylvis etiam observavimus. Illa ve-
 rò quæ minore est folio, frequentissima est in
 Brabantia, teste Lob. Nascitur etiam circa Basi-
 leam, qua itur ad novam domum.

Leuce aquarum prævida, non modò avul-
 sione, sed & summis ramulis facillè pullulat, au-
 tore Theophr. Auctu facilis est. Sed celerrimè
 pulcherrimèque germinat ex avulsione, ut fili-
 ces. Eam etiam si quis prægrandem, & cum ar-
 bore se exquantem transkulexit, optimè perdu-
 rare posse idem tradit. Defixam feri nunquam re-
 culari: Proinde non solum semine, radicèque
 germinationem, sed & hanc assignari posse. In
 agrorum circuitu potius plantanda, quia umbra
 eius nocua, & radices magnas & copiosas fundit.
 Quamquam & hoc commodi habeat *Populus*,
 quòd loco vinoso & sterili benè proveniat, ut
 observavit Aug. Gallus. Superstitiosum utique
 quod Theoph. inter alia arborum quarundam n-
 stepta prodidit, *Populum albam* Stagiris in
 Musco proci dui in sua sponte resurrexisse. Credat
 qui volet. Vitium causa, hoc est, pericarum vites
 sustinentium. *Populus alba* scribitur bipedaneo pa-
 stinam, talea sesquipedali, biduo siccata, palmipe-
 dali intervallo, terra superinicta, duorum cubito-
 rum crassitudine, ut docet Plin. Sed qua ratione
 Vlmæ instituas, & ad eius imitationem & Po-
 puleta [nam & hanc desiderat Vitis] ad vitium
 sustentationem, seu, ut prisca loquuntur, ad ma-
 ritantas vites, ampliter traditum in Vlmæ histo-
 ria.

Populus vitibus placet, inquit Plin. Idem Po-
 pulum inter frigidissimas recenset, quòd sit aqua-
 tica: lentissimaque dicit & scutis faciendis aptis-
 simas, quarum plaga contrahit se protinus, clau-
 ditque suum vulnus, & ob id contumacijs trans-
 mittit ferrum. Sed cum ad materiem potissimum
 respexisse certum est, quæ ad eisdem viis cum
 nigra accommodari potest & solet. Ignibus di-
 catum *Populi* lignum multum eructat fumum in-
 quit Ruell. Diosc. *Populo alba* vires has tri-
 buit: eius cortex uncia unius [alij, denarij, & re-
 ctius inquit Dod. in Græco habetur *καρύδης* *uncie*
καρύδης: nec prior dosis superflua nobis videtur
 corticis nulla vehementi qualitate præditi.] pon-
 dere potus Ischiadicis & Stranguriæ seu urinæ
 stillicidio prodest. Traditur & conceptum pro-
 hibere seu adimere [dicitur & h] si cum mulino
 rene bibatur. Sed & solia post purgationes cum
 vino pota idem præstare dicuntur. Tepidus quo-
 que foliorum succus aurium doloribus utiliter
 instillatur. Pillule verò quæ primo foliorum ger-
 minatu erumpunt, [opacita vocat: intelligere vi-
 detur gemmas] vitæ & cum melle illitæ oculo-
 rum hebetudini [dicitur & h] Al. *αἰγία* *meden-*
 tur. Nec desunt qui memoriz prodiderint, cum
 albæ tàm etiam nigre *Populi* corticem in tenuia
 frusta concisum, ac stercoratis areolis sparsum &
 quasi satum, quavis anni tempestate fungos edu-
 les proferre. Plin. *Populi alba* foliorum succum
 calidum aurium dolori conferre ait: & simpliciter
 dicit, corticem potum Ischiadicis & Stranguriæ
 prodesse. Hoc & Serenus testatur.

Sapida occultis nila coxendice morbum

Perfurit, & gressu diro languore moratur,

Populus

Padus Po-
pulifer.

Sentio.

Vitis ferula.

Obscurum
de Populo.

*De pro-
prietate*

Vires & v-
ita.

Ischiad.
Stranguri-
ria.

Contra
conceptum.

Oculorum
hebetudo.

Fungi cu
Populo.
Aurium
dolor.

Populus alba L. *Arb. medicus de cortice populi.*

*Schunnenck
repreh.* Galabsterforis facultatis Populum albam dicit, & temperaturæ mistæ, ex aqua tepida & terrena extenuata essentia. Hinc fortè Schunnenckfeldius occasionem sumpsit Populum albam habere vim humectandi & siccandi. At aliud est ex contrariis qualitatibus mistum esse: aliud contraria præstare, hoc est, simul humectare & siccare posse. Eadem ratione quis dicat vinum calefaciendi & refrigerandi vi pollere. Sed hic non disputandi locus. Ipse viderit, quo experimento hoc dixerit.

Cautius Dod. in hist Gal. Folia, inquit, & cortex Populi temperata sunt in calore & frigiditate, nonnihil tamen sicca & abstergentia. Porta albam quàm nigram humidiores dicit: Lacuna tam albam quàm nigram calidas dicit in primo gradu, & paulò sicciores, quàm temperatas: & habere partes tenues. Præterea efficaciores esse flores ramis. Resinam eodem temperamento esse, nisi quòd nonnihil calidior sit quàm flores. Folia decocta potu torminibus mederi Schuuenchfeld. tradit: & ambusta sanare imposita.

Nic. Goddinus in Chirurgia militari Populi lan-
guinem commendat ad fluxum sanguinis, quod
& Holler. facit in istis Chirurgiis : sed molliter
evellenda vel abradenda.

*Qua mixta
generi hu-
mano. non
in vulgus
spargenda.*

pufilli, albidī. Oculi acuti, nidi, 'Spadiceī. E
femīne ſuo, inquit Tragus, quod Salicis quart-
generis ſimilo cernitur, reviviſcit. Contra Mat-
th. fructum nullum, ne flores ſerre ſcribere au-
ſus eſt, cū tamen ipſemet paulo poſt ſibi mani-
feſtè contradicens ſenbat; Semen legi antequam
rumpatur, & ſiccari in umbra. Mendacem oportet
eſſe memorem.

Kακίς hæc apud Theophr. cuius nominis rationem nullam adhuc videmus. Fieri potest, ut *κίμυς* intrepferit, pro *κίμυ* aut *κίμυς*, vel *κίμυς*, à *κίμυς*, crepitu & tremulo concussorum foliorum motu, id quod Plin. sæpenumero Populo in genere tribuit, & nos potissimum in hac observamus. Theophr. *κίμυς* Gaza Populum Alpinam vertit. Est quidem hæc magis alpina quàm cæteræ Populi species : ac non ideo decuit Gazam interpretis fidem excedere, & novum Theophr. assignere nomen, præsertim tale, quod nihil minus quàm *κίμυς* exprimit. Si fingere voluit, cur non Tremulam dixit.

Ruell. Græcum nomen, quasi Græcè nescisset, omisit. Alpinam ex versione Gazz, Libycam ex Plinio appellavit. Hermol. Alpinæ nomen non posuit: non posuit Cercidos, & dixit, Nostros facere tria genera: quasi verò non & Theoph. eundem faciat. Nemo enim est, inquit Scal. qui Cercida Populi speciebus non annumeret, si earum communes differèntias contempletur. Ruell. hoc amplius erravit addit idem, qui Alpinam cum Libyca coniunxit: utramque confundens. Quippe si Alpina est, Libyca non erit. Nam & cœli segmenta alia, & natura loci longè diversissima. Scaliger putat non convenire Plinianam Libycam cum Cercide Theoph. quòd Plinius folio minimè ac nigerrimam dicit. At Theophr. *ἐν τῇ χερσονήσῳ τοῦ Ἰνδοῦ, τὸ ὕψος, καὶ τὸ σπέρμα*. Hic nihil nigroris intelligas, tantò minùs illius maxime nigri. Sic Scal.

At nobis Libyca Plinii & Cercis Theophr. eadem videtur. Nam quod Plin. Libycam suam folio minimam dixit, ac nigerrimam, sine dubio, id cum respectu ad albam dixit: quanquam & sic nigerrimam licentiosius dixit. Nigrior est, quam alba. Illud verum, huic folia esse minima inter ceteras Populos. Quod verò eandem idem, fungis enascentibus laudatissimam dixit, id de alba Diof. Profectò non displicet lectio codicis m. f. quæ, ut annotat Dalechamp, ita habet: Quæ Libyca appellatur, minima folio, ac nigerrima evanescentibus fungis. Laudatissima alba, &c. Quæ lectio si bona & genuina, iam nihil ampliùs habet Scal. quod quiritur. Est enim vera. Nam autumnis sine cessantibus fungis, hoc est, non ampliùs erumpentibus, arbores totas penè nigra fronde vestitas videas, antequam folia decidunt.

Sed & Theophr. descriptionem producamus. Cercis, inquit, Populo alba similis est, cum magnitudine, tūm quod ramos albicantes quoque habeat : [*Παλαιοι* : & verum hoc, ut diximus in descriptione : præsertim in iunioribus.] folia fert Hedera, sed partim angulosa, partim oblonga & in acutum fastigiata : colore parte supina pronaque ferè simili, pediculo longo & gracili pendentia, ideòque non recto sed reflexo & nutante. Cortice vestitur asperiore, quàm Populus alba, scabrioreque, Pyri sylvestris in modum. Hæc Theophr. de Cercide sua, quam utrique Populo subiicit. Quæ sanè appositè in Libycam nostram quadrant : nec alia hæcenus inventa, quæ Cercidi melius respondeat. Nobiscum quoque continuat Anguil Solerius, Martii. Hist. Lugd.

POPVLVS LIBYCA. KEPKIZ
THEOPH.

Description

Abstract

Gerrit

False.

Folium
Gargaria.

No.

PORVLYS Libycafacile & brevi tempore in magnam excrefcit altitudinem, radicibusque reptantibus latè fe propagat : Cortex partim nigricat, partim albicat. Folio eft contumud tremente, breviorẽ, rotundiorẽ quàm nigra, per ambitum crenato, fuperna parte virente, inferna ex cinereo candicante, ac propemodum glauco, [Matth.

punctis quibusdam albis conspersum esse notat]
longissimis pediculis donato. Folia in extremo
ramo interdum magis angulosa, & subtus incana,
ad populi albae quadrantenus accedentia; qualia
juniora. Fert & nucamenta uncias quinque cir-
citer longa, lanuginosa, cinericei & fusci coloris,
arundinaceae luteae portiunculis similia: quibus
subiunguntur verticillatim quodammodo apices per-

Scullin.
Semen.
March for
bribe case
tradition.

**Concise
Thought.**

*Populus
alpinus.
Gut. nov.*

**Real-time
IAP.**

Hermsdorf,
gold,

At an Acad.
error.

Scalp. spi.
1918 741013-
1917.

Definition Group.





*fructus pro-
tera.* co habet: deinde acere maiorem minoremque; con-
fundit, ac seq. cap. etiam Platanum: ubi figura,
quam ponit, potius competere videtur Aceri
minori, quam vocat *Massholder*: rursusque Pla-
tanum & Chamæplatanum variè miscet.

*Exiguo Ge-
fueri.
Carpinus.
Aceris spe-
cies minor.
Opulus.
Rumpotini-
um.* Geln. scribit Aceris species tres apud se [Tigu-
ri in Helvet.] inveniri in sylvis ac montibus: in-
ter eas etiam Zygiam à Theoph. nominatam; ne-
scire se quàm rectè Gaza Carpinum vertat. Ace-
ris speciem minorem Opulum & Rumpotinum
appellat. Et alibi: Opulum Aceris speciem mini-
mam, alio nomine Rumpoti num dici ait.

Hic tamen notandum Colum. distinguere Car-
pinum ab Opulo, licet Rob. Const. ut antè di-
ctum pro iisdem ponat.

*Alia spe-
cies lutea
Angul.* An Anguil. Aceris 2. species *Zygia*, quam in
Lombardia *Oppio* dici scribit, addens lignum ei-
us luteum, folia minora esse [quàm in dicta
Asari sive Acere maiore nobis] fructum etiam mi-
norem. Ambas tamen figura similes? Acer te-
nuifolia Thallio. Acer communis, Theophr.

*Acer tenui-
folia.
Acer 2. ge-
nus.
Sycamore.* Sphendamos Pen. & Lobel. *Xiphaea* m-
Jen, id est, Acer Campestris Dod. Aceris 2.
genus minore folio, firmiore materia, crassiore
cortice Clus. quod ab imperitis in Gallia *Syc-
morum* nuncupari tradit.

*Platan.
Opulus mo-
ntana,
Alia
Fornina.* Hist. Lugd. tria Aceris genera Gallis nota pro-
ponit: Acerem montanam: cuius duo genera
facit, unum Cindidum, quod Alpini, Averni-
que *Plane* appellant: alterum flavum seu crispum,
quod Opulum montanum dicit. *Erable madre* &
Erable isulne. Traditque hodiè quoque ligna-
tores Sequanos Acerem montanam mare scæ-
minique distinguere, colore magis flavo in ma-
re, pallidiorè in scæmina, &c. Verùm non pla-
cet ab eadem H. Lugd. Acer seu *Erable* Gallorum

*Hist. Lugd.
interpret.* Italice *Pied'ucca* & *Platano aquatico* dici: immò
hæc nomina Italica nulli Aceri nec maiori neque
minori continere putamus. Figuræ etiam in ea-
dem transpice. Supra eam quæ habet titulum
Acer Campestre ponendus utulus Aceris monta-
ni, & vice versa.

*Alia rami-
pifera.* De hoc nostro intelligenda eadem cum inquit:
secundum Aceris genus est Acer campestre, sive
in planis nascens: veteribus Opulus campestris:
hodiè Infubres Opulo vocant, & ea ad maritan-
das vites utuntur, quas coniugatas *Hautains* vo-
cant: nos *Erable mal* & *Erable madre*. Sed figura
quæ pro Acere montano apud eandem posita est,
uti dictum, ad hæc nomina pertinet.

*Nam Lin-
guar. Geln.* Taber. Acerem minorem non distinguit à
maiore, & miscet nomina cum Platano. Germ.
Teutsch *Ahorn* vocat: Schuvenckf. *Leinbaum*:
Milchbaum & *antiquorum*. Vulgo
massholder baum / & *Ahorn*: uti dictum: Belg.
maeshoutenboom / *maeshout*: Gal. *Erable*, *Opier*:
Ital. *Acero*, *Arefe*. Hisp. *El-Azre*, *Elafre*. Angl. *Ople*:
tree vocari posse ait Turn. licet in Anglia non vi-
derit, Vngar. *Tharfa* teste Clus.

*Locu.
Humilis.* Cordus notat, nasci iisdem locis, quibus Vl-
mus. Et sanè apud nos passim sepes tam hac
quàm Vlmo stipatas videas: gaudet præruptis &
sylvosis. Humili statu contenta, vix supra homi-
nis altitudinem attollitur caudex: reliquum non
nisi virgæ & exigui rami, aut certè brachia hand
magna, nec alta, nec multum sparsa: nò tam fru-
tex est potius, quàm arbor, ut *Tragus* putat, fruti-
cis nomine abutens. Aliquibus tamen locis etiam
in proceram arborem grandescit, ut in quibus-
dam tenebrosis VValsoiz sylvis ac in comitatu
Bidiscensi tantæ magnitudinis reperitur, ut adi-
ficiis vel maximè intervire queat, teste *Trago*. In

Helvetiæ & Silesiæ etiam; Lotharingiæ ac Bur-
gundiæ edicis collibus ac montosis locis passim
occurrit: in planis verò ut plurimum inter sepes
& fruteta. Circa Verbanum lacum & aliis Lom-
bardiz quibusdam locis, ut & in Sabaudia, potiss.
circa Genevam maritatur vitibus, in locis cam-
pestribus, arvis, pratis: Eiusmodi vites vocant
Vin Vnde *Vina-d'Vin*, quæ ibi celebrantur.

Floret Aprili & Maio: fructum fert mellis tem-
pore: et maturum Septemb.

In Burgundia & circa Montbelgardum Vi-
scum ferens non semel vidimus.

Oculi melius cacuminibus, in arbusculo protu-
sus deponitur. Colum. Nam serè [inquit idem]
ita constitutum Rumpotinetum animadverti, ut
ad octo pedes locis siccis & clivosis, ad duode-
cim, locis planis & uliginosis, tabulata disponan-
tur. Plerumque autem ea arbor in tres ramos di-
viditur, quibus singulis ab utraque parte com-
plura brachia submituntur: tum omnes penè vir-
gæ, ne umbrent eo tempore, quo vitis putatur,
abraduntur. Arboribus rumpotinis si frumen-
tum non inseritur, in utramque partem viginti
pedum spacia interveniunt. Cui rei maximè
videtur idonea Opulus. Verùm quia raram, ne-
que idoneam frondem pecori præbet, à plarissi-
que repudiata est. Quod mirum. Nam ut idem
Colum. scribit, ad arbusculum Gallicum, quod vo-
catur Rumpotinum, desideratur humilis, nec
frondosa, qualem Opulum esse idem testatur. Cæ-
terum qua ratione arbuscula ad sustentationem Vi-
tium feri ac coli debeant, ad longum descriptum
habet in Vlmo.

Aceris radix. Plinio prodente contusa [è vino
c. n.] iocinoris doloribus utilissimè imponitur.
Serenus idem testatur hoc carmine, nisi quoddam hic
in potu det:

*Si latus immeritum morbo tentatur acuto
Accensum ringes lapidem stridentibus undu.
Hinc bibis: aut Aceris radicem rundu & nuda
Cum vino capis, hoc præsens medicamen habetur.*

Tragus, Dod. Curtius huic Aceri eadem has vi-
res ascribit quos & nos secuti sumus. Habent
semina & Cortex Vlmo similes qualitates, si Cor-
do credimus.

Geln. lignum perennis durationis dicit: quod
cum maximè annosum fuerit, undat in crispatur.
Platanumque apud nos laucioribus dicitur supelle-
tilibus, utpote orbibus, mensisque, ut annotat
Tragus, qui præterea addit. Qui venationi stu-
dent, ij accipieres, quos ad prædam institu-
runt, ad baculum seu vectem ex Acere assueface-
re solent; ut illi insideant. Quæ verò hoc fa-
ciant ratione, ipsi norunt proculdubid.

ACER MONSPESSVLANVM.

ACER Monspelienfe, arbor est mediocri-
ter procera, ramis satis explicatis, cortice
quodammodo purpurascens, folio Aceri vul-
gari simili, in tres tantum cuspides sive angulos
diviso; crasso, venoso, ex longo pediculo pen-
dente, paribus intervallis utrinque sito: fructu
gemino, membranulis duabus coherentibus, a-
lis muscarum similibus. Aceris 3. genus, inquit
Hist. Lugd. nominavimus, quod in sylva Mon-
speliensi, urbi vicina, Valena nuncupata prove-
nit, Aceris vulgaris penè figura. Hoc Aceris
genus quidam esse aiunt, quod Plin. in Istria,
Rhodique præcipuum esse tradidit, crispo macu-

Vitis.

Tempus.

Visum.

Satis.

Rumpotini-
um.Culm. ad
Vitis sub
BautianumVitis & di-
fusa
satur
lar.

Lignis suis.

Vitis & di-
fusa
satur
lar.Descriptio
Cortice.

Folia.

Fructus.

Aceris 3.
genus.Locus.
Istria
& Rhod-
cum.



fuisse, & doctos viros. Idem paulò post: Speciem Aceris [d'Erable] plurimi communi consensu dixerunt Sycomoron, quum tamen Sycomorus sit admodum rara.

Ostenditur apud nos, inquit Ruellius arbor Sycomori (ut arunt) nomine, frondosa, Moro non dissimilis, conspectu, folio, magnitudine: sed neque germinibus, neque ramis quicquam provenire deprehendimus: nisi quippiam ineunte vere, cum parturit, veluti nucamentum praelongum. Fructum foliacea siliqua, inflexu ferè falcato, gerit. Sed scalpri vulnerata, nihil remittit lactis, cum vera Sycomorus ætate multa lactea scatet saliva.

Sycomorus
Parisi.

Car. Steph. verò in suo seminario sic ait: Vifa est nobis Sycomorus Parisiis in horto Gotofredi cuiusdam Pharmacopolæ diligentissimi herbarum & arborum, quæ apud nos rariores sunt, indagatoris & cultoris. Item in arbust. Platanus apud Græcos & Latinos nomen retinet à foliorum & umbræ latitudine: propria appellatione apud nos caret, quanquam etiam in Gallia conspiciatur, omnibus incisam arboris speciem demerantibus, & nomen eius ac naturam ignorantibus.

Zygia
montana.

Vidimus & ipsi Lutetiz, quæ non alia est, quam Aceris genus maius. Hæc est fortè apud Geln. Zygia montana, quæ Bellonio Lutetiz crevit, & Acer maius. Geln. quoque tradit Ruellium Acer montanum pro Sycomoro descripsisse: illudq; Allobrogibus Platanus dici: Helvetiis vulgò Lynbaum: cuius truncum semoris ferè crassitudine, quatuor pedes & amplius longum, superna parte abscisum, proximo vere plantavit prato medio: erit humido, quem mox ætate pulchrè geminasse scribit: ita ut perfecit eam crescere & durare appareat. In epist. ad L. Caimm Britannum notat, folium quod hic rimisit pro Platano, omnino Aceris esse, vulgò Gallis Plaine dicti, nomine ad Platanum alludente, eaque voce quosdam deceptos Platanum credidisse. Olim Geln. etiam vocabat *zygia* Theoph.

Satio.

Climus.

Error Cornarj.

Tertius error est Cornarij, qui dum sibi persuadet Tiliam esse Platanum, vult Acer maius esse Tiliam, quam sibi persuadet citò putrescere: sed præstat eius proferre verba, ne indicta causa, condemnatus videatur. Tilia & Philyra inquit, nisi penitus fallor, est ea arbor, quæ nostris *Ähorn* appellatur, permutatis omnino nominibus, contra quam hordè fieri solet. Theoph. ad fabricandas naves deterri nam esse dicit Platanum, eò quòd citò putrescit. Quibus verbis confirmatur id, quòd dixi, Platanum esse quam Germani *Linde* vocant. Nam lib. 5. Philyram ad tabulata longarum navium probat. Platanum autem akbi ad eadem improbat. In summa itaque, quicquid Theophr. de Philyra, quicquid Plin. de Tilia dixit, id omne ad arborem *Ähorn* nostris dictam, pertinere mihi videtur. Quicquid verò de Platano uterque dixit, id ad eam, quæ nostris *Linde* vocatur. Plin. tamen non satis sibi constat, sed Philyram Theophr. cum Phillyrea Diosc. confundit. Hæc Cornarj. Qui ut non male in principio ominatur, penitus fallitur, estque penitus erronea hæc eius opinio. Sciscitati sumus à peritis sculptoribus, quo ligno uterentur ad simulachra: responderant, Tilia, & non Acer: terebini obnoxio. Sanè Melocomi Alsatiz in splendido & claro seminarum cornobio Anno 1604. quo hæc commentamur, totam passionem Salvatoris nostri industriè sculperunt ex Tiliæ ligno, non ex Acere, quod tamen ibi abundat.

Tom. I.

Reliqua quæ Corni. adducit, verba sunt, non rationes.

An Anguil. *oxydipus* propriè, id est, Acer, *Splendens* vulgò *Asari*, ex quo parantur orbes & vasa & similia ob lignicandorem. Rob. Const. ab hac *Asari* separat *Plane* Gallicè dictum & suam *Plane* idem facit cum *Pied'oca* Anguil. uti iam diximus, quæ nobis videtur *Sambucus aquatica*.

Pena & Lob. hanc Aceris speciem illam dicunt, quam *xyloxyper* antiqui vocarunt. At Lob. in Obl. *xyloxyper* Anguil. dici ait, quasi penituerit eum in Adv. *xyloxyper* cum Pena fecisse. Adit Ital. *Pied'oca*, & *Platano aquatico* dici: duasq; habet figuras unius huius plantæ. Non. a. putamus Anguil. hanc intellexisse arborem, sed *Sambucum aquaticam*.

Lonicernus *Ähorn* & Acer hoc maius cum minore confundit.

Dodon. in hist. Gal. putat esse *zygia* & Lat. Carpinum. Aceris 1. speciem, & maiorem vocat. Et in Lat. propriè *oxydipus* dictam censet: ita & Celsus. & Camer. qui hanc vulgatissimam dicit.

Acer lati.
folium.

Acer latifolium ab imperio Platani nomine donatum Clusio. An Acer maius, Camer. in hort. cuius turiones etiam lacte scatere ait. Is in epit. Math. de secundo à nobis tradito, quod non distinguit à priore, scribit: Acer maius, nonnullis Platanus Germanica, aliis Carpinus Plinij, Græci, *xyloxyper*, Gallis, *Plaine*, Teutsch *Ähorn* & *Waldefschern* Germanis: Alijs. verò *Ähorn* simpliciter.

Tabern. manifestè Acer hoc cum Platano confundit: præterea non distinguit Acer maius à minori: nec ponit descriptionem nec figuram maioris. Bohem. *Bect*: Vngar. *Javorfa*. Slavon. *Bleb*. Reliqua linguar. nomina & huic convenire possunt si ad differentiam addas, maius.

Tabern. la.
p. 100.

Tres Aceris species nobiscum agnoscunt Geln. Hist. Legd & Camer. qui in maiorem, mediam & minimam distinguunt: ac maiorem hanc vulgatissimam dicit. Sed quæ eius inedia?

Differetia.

Schunckenk. ita distinguit: Acer maius *Ähorn* Theoph. Dod. Acer montanum. *Ähorn*, *Äin Orle* / *Orlenbaum* Sil. Arbor alta montibus propra. Opulus Geln. 2. Acer crispum, Acer Brusum, intortius crispum: *oxydipus* Theoph. Bellonio: *Orlener*, *Flader syl.* in montibus cælis nascitur: non adeò frequens. 3. Acer simpliciter: Acer molliusculum simplicius sparsum Plin. *Schlechter*, *Flader*. At non docet Schunckenk. an tres distinctæ species & in quo differant, vel an tantum varietas in ligno. Tragus sanè Acer crispum facit varietatem tantum ligni Aceris vulgaris: nos verò vidimus Aceris maioris lignum valdè crispum & fissum crispitudine asperum.

1
Acer ma-
ius.
2
Crispa.

3
Acer mol-
liusculum
Schunckenk.
not.

Humectis & altissimis montibus gaudet, interque Fraxinos provenit, solo pingui & spisso, in Burgundia, & iuxta Blamontium Ill. Ducis VVirtemb. arcem, ubi abundat & aliis montibus vicinis. Basileæ propè Campum Sclopetariorum: sed in monte prope *Leurech* & in *Wasserfall* Aquæcida monte copiosè: prope *Biechen* pagum ditionis Basil. Genevæ in monte *Salève*: in ditionis VVirtembergicæ multis montibus: in saltu Viennensi & aliis vicinis sylvis: Lutetiz & in Anglia atque Scotia alibique locorum, umbræ causa, quam facit magnam, ad æstivos Soles excludendos, in hortis & viridariis colitur. In horto Montb. etiam nostra curâ plantata. Dodon. in alpibus & Brabantiz quibusdam locis nasci scribit.

Locus.

Acer cere.
dimidua.
num.

P

nim eadem omnia in eodem agro rectè possunt. Ast Bellon. postquam de Cortina Cretæ locutus fuisset, addit: in Valle ad fontem nascentes Platanos omnes esse deciduis foliis. Sententiam ferent, qui ista loca inhabitant.

Neque sterilis est Platanus, ut Virgilius ait Georg. 2.

Es steriles Platani Malos gessere valentes.

Putamus autem sterilem dici à Virg. quia fructum non ferat, qui homini sit edendo. Nam (ne quis fortè putet, antiquos aliam intellexisse Platanum) Theoph. Platanum manifestum semen habere scribit, & ex eo nasci. Hæc ob solam umbram, potatoribus præsertim, olim erat in deliciis, unde Virg.

Idemque ministrantem Platanum potantibus umbram.

Et Horat. Od. 11. l. 2.

Cur non sub alta vel platano, vel hæc Pinniscentes, &c.

Potamus undit

Tantus autem huic arbori olim habebatur honor, ut meto infuso enutiretur.

Confidet sub Platano disputaturus Socrates cum Phædro apud Platonem: & apud Cic. 1. de orat. Crassus cum Scævola, Antonio, Cotta, Sulpitio. Umbriferam dixit idem ex Homero. Et Genialem, quod sub ea convivari veteribus mos esset. Vnde Genium Deum eius foliis coronatum tradunt.

In Lydia Xerxem Herodotus scribit Platanum comperisse, quam ob pulchritudinem monili aureo donaverit, & custodiendam mandaverit uni ex immortalibus. Idem & Ælianus. Diè integram sub ea consumpsisse tradunt nulla postulante necessitate, castraque sua circa Platanum in solitudine posuisse: tuendamque viro delegasse immortalis. Immortalis autem, uti notat Cæl. Rhodig. non hic intelligitur, quia plane nunquam moreretur, sed unus ex iis, decem millibus ex Persis in militia delectis. Hi dicebantur immortales: quoniam si quis eorum aut nece aut morbo numerum minvisset, confestim substituebatur alius, nec unquam plures erant paucioresve decem millibus. Erant item præcipuo inter omnes cultu decori, & eodem omnium præstantissimi.

Sed & proditum invenimus eundem Xerxem auream sibi Platanum fundi iussisse, quæ antimimos foret, id est, amatam effingeret, leniretque æstivationem mentis ex illius absentia.

Memorabilis etiam fuit aurea illa Platanus.

Dario donata: ut scribit Herodotus, quam Cyrus devicta Asia, ut refert Plin. invenit. Hæc *αυρεα*.

Θυμια χα πλατανω Nicander vocat, quod æstate, τῶς κατὰ τοὺς αἰῶνες lectum ac cubile umbra frondis suæ præbeat. Verba in Theriacis hæc sunt. *Σφαῖρα τῆς θυμιαχῆς πλατάνου*: id est, Sphæra quoque thorum præbens æstate Platani. Interpres locum eum enarrans, illud *θυμιαχῆς* pro umbrosa posse accipi, tradit: quoniam latissima sint eius arboris folia, ut opacissimè contegant æstivo tempore: vel (inquit) quia thorus ex numerosis foliis confici abundè possit eodem tempore.

Sed quis [inquit Plin.] non iure miretur, arborem umbræ gratia tantum ex alieno petitam Orbe? Platanus hæc est, per Mare Ionium in Diomedis insulam eiusdem tumuli gratia primum inducta: inde in Siciliam transgressa, atque inter primas donata Italiæ: & iam ad Morinos

Tom. I.

usque pervecta, ad tribunatium etiam pertinens solum, ut gentes vectigal & pro umbra pendant. Dionysius prior, Sicilia tyrannus, Rhegium in urbem transtulit eas, domus suæ miraculum, ubi postea factum Gymnasium: [idem & Theoph.] nec potuisse in amplitudinem adulescere, & alias fuisse in Italia, ac nominatim Hispania, apud autores invenitur. Hoc actum circa caput (Caput M.) urbis ætatem: tantumque postea honoris increvit, ut meto infuso nutrantur: Compertum id maximè prodelle radicibus: docuimusque etiam arbores vina potare. Celebratæ sunt primum in ambulatione Academia Athenis cubitorum xxxvi. unius radice ramos antecedente. Nunc est clara in Lycia gelidi fontis sociæ amœnitate, itineri appositæ, domicilii modo cava lxxx atque unius pedum specu, nemoroso vertice, & se vastis protegens ramis, arborum instar, agros longis obtinens umbris. Ac ne quid desit speluncæ imagini, Saxeæ intus crepidinis corona muscosos complexa pumices: tam digna miraculo, ut Lucinius Mutianus ter Cos. & nuper provinciæ eius legatus, prodendum etiam posteris putarit, epulatum intra eam se cum duodecimesimo comite, largè ipsa toros præbente fronde, ab omni afflatu securum, optantem imbrum per folia crepitus, latiore, quàm marmorum nitore, picturæ varietate, laquearium auro, cubuisse in eadem. Aliud exemplum Cæii principis, in Veliterno rure mirati unius tabulatæ laxisque ramorum trabibus scamnæ patula, & in ea epulati, cum ipse pars esset umbræ, (circumsparsa ipsius umbra) xv convivarum ac ministerii capace triclinio, quam cœnam appellavit ille nidum.

Est Cortinæ [addit idem Plin.] in insula Cretæ iuxta fontem Platanus una, insignis utriusque linguæ monumentis, nunquam folia dimittens: statimque ei Græciæ fabulositas superfuit, Iovem sub ea cum Europa concubuisse: Ceu verò non alia eius generis esset in Cypro: sed ex ea primum in ipsa Creta (ut est natura hominum novitatis avida) Platani satè regeneraverunt: quandoquidem commendatio arboris eius non alia maior est, quàm Solem æstate arce-re, hyeme admittere. Inde in Italiam quoque ac suburbana sua, Claudio Principe Marcelli Eterni libertus, sed qui se potentis causa Cæsaris libertis adoptasset, spado Thessalicus, prædives, & merè dici possetis quoque Dionysius, [fortassis ob vineta multa & ampla, quæ possidebat. D.] transtulit id genus. Nanque & Chama-platani vocantur coactæ brevitatis: quo arborum etiam abortus invenimus. Hoc quoque ergo in genere pumilionum infelicitas dicta erit. Fit autem & ferendi genere & recidendi. Hætenus Plin. de Platano, qui ei latissima folia cum Fico & Vite tribuit, & Platani quoque speciatim angulosa dicit: eiusque umbram iucundam, quanquam crassam & Paulinus: Nam Platanus ramos expandit in umbras. Est & illud Elogium eius apud Ovid. Metam. 13.

Nobilior pomis, Platano conspectior alta.

Horat. in Odis:

Cur non sub alta, vel Platano?

Iuxta Amymonæ fontem, & propè Lernam paludem, Platanus enata, Græcorum fabulis etiam memorabilis, qui sub ea Hydram serpentem educatum ferunt, autore Pausania. Quo etiam scribente apud Messenios, à fluvio Biantel longius stadiis viginti *Platanistomus* fons, sic dictus, quod ex patula Platano intrinsecus cava, aqua

*Umbra Gey-
Bugal.*

*Olim meto
nutritum.*

*Asiaticus
epulatus
sub Platan-
no cum 18
convivibus.*

*Aliud ex-
emplum.*

*Chama-pla-
tani.*

*Umbra
crassa.*

*Platanistomus
non fons.*

suasque potui sit.

Idem de Platanorum vastitate lib. 7. histor. veteris Græciæ scribit his verbis. Præterfluit Pharensum agrum fluvius Pierus, in cuius ripis Platanorum locus est, tanta arborum magnitudine, ex ipsa vetustate, ut intra cavernas [multæ enim concavæ sunt] qui velint, & epulari, & recumbere possint. Fori area magna, & latè patenti ambitu est, quo scilicet spatio esse consueverunt prisca fora.

At quæ in Italiam invecitæ fuerunt, climatis inclementia, inquit Marth. in magnam proceritatem non adolefcunt.

Meminit & Homer. Iliad. 2. Platani his verbis: καλὴ ἰσὺς πλατάνισσιν. Intelligit autem Platanum, uti annotant Cæll. Rhod. & Curtius. Aliàs Platanistos loca spaciola amplaque denotat, à foliorum Platani similitudine. Et Aristoph. ὅτ' αἱ πλατάνισσιν ἰσὺς ἴδουσι. Apoll. 2. ἀμφιπερὶς πλατάνισσιν. Arist. de Mundo: πλατάνισσιν ἰσὺς.

Themistoclem Athenarum principem, cuius operam ingeniumque ac prudentiam summam non parvis in rebus, nec rarè, experta Græcia est, produnt autores gravissimi, ut citat Cæll. Rhod. posteaquam amplissimè de patria esset promeritus, solitum tamen sæpiùs convitio à civibus incesse. Vnde illius præclara circumfertur sententia: ἢ καὶ πᾶσι τοῖς ἄνθρωποις ἀχρεΐστα.

Quid eis negotium facessitis, qui vobis fuisse beneficii? Se quoque subinde Platano consimilem prædicabat, ad quam decurrerent, quos infestaret imber: mox verò serenitate reddita velleretur ab eisdem, interimque convitiis prolcinderetur. Hinc tractum adagium: Platano adsimilis: in eoque, qui cùm alicuius necessaria opera usi fuerint, eum postea derisui & vilipendio habent.

Socrates autem non ob aliam causam à Mileto reprehensus, autore Maximo Tyrio, quàm quòd per Platanum iuraret, quasi nefas sit per tam nobilem arborem iurare.

Volunt & Platonem divinum Philosophum, à Platano ita cognominatum, quòd is prælatis humeris præditus esset. Platanistos enim Græcis, ut dicebamus, amplius & spaciosus locus est.

Sed ut ad Platani historiam naturalem redeamus, errant tam in Germania quàm Anglia multi, ut in præcedentibus fusiùs ostensum, qui Aceris speciem maiorem Platanum putant, quam Germ. *Ähorn* vocant: fatentur in summis montibus, non nihil humidis, inter Fraxinos nasci. At Theophrasto Platanus in palustribus inter Salices, & ad fontes rivulòsque provenit, idemque non uno loco de eius natalibus scribit. Adde quòd cùm Theoph. tùm Plin. scribunt, Platanum spontè in Italia non provenire, Plin. etiam ex peregrino Orbe umbræ duntaxat causâ translata. Sanè, si Acer ille maior fuisset Platanus, ac Itali tam vicina regione, qualis est Germania, nasci cognovissent, (ut certè nosse potuisse verisimile est) nunquam ex peregrino Orbe accersivissent. Denique qui Acerem *Ähorn* describunt, non tam umbrosos ei ramos tribuant, ac Plin. & Theoph. Platano: ut de reliquis notis valdè dissimilibus, ex utriusque descriptione satis patentibus, nihil dicamus.

Sed minùs adhuc ferendus eorum error qui Tiliam seu Linden Platanum esse putarunt: nam, vel ex Diosc. didicissent Platani folia esse Ricini similia, nisi quòd huius sint maiora, leviora, nigriora: quam similitudinem nunquam susti-

nebunt folia Tiliæ. Plin. quoque ait, Fictum Platanum & Vitem omnium amplissima habere folia. Tilia autem harum aliarumque multarum respectu parva habet. Ergo Tilia non est Platanus: ut & hic cæteras notas longè discrepantes, ex descriptionibus petendas omitteremus.

Tabern. quoque confundit Acerem cum Platano, dicens: *Ähorn* Græcis *εὐροδωρον*, Lat. Platanus &c. Scilicet qui postremus de Plantis scribens, quod alios docere debuit, nondum didicit ipse.

Icon verò Platani, quam Camer. exhibet, iam olim ex nostra planta depicta fuit.

Platanus Arab. *Dalb*. Germ. incognita, ali- quibus tamen *Frömbd Ähorn* id est, Acer exoticum dicta: It. *Placano*: Hisp. *Itidem*. Gal. *Plane* Angl. *Playnestree*.

Dicta Platanos, à *πλάτος*, à latitudine foliorum: vel à *πλάτης*, quoniam est patulis diffusis ramis. Vnde *ἀμφιπερὶς* à Græcis. Dicitur & Platanistus, quòd sit *πλατύνω*. Platanistum tamen sunt qui à Platano per diminutionem proferri putent: quum paronymon si- ve denominativum sit verius, nihil primitivo amplius, minùsve significans. Si enim diminutivum foret, exire debuerat in *ισ*, ut annotat Cæll. Rhod.

Est & Platanon, locus Platanis confusus. Vnde Plin. iunior epist. 3. l. 1. Quid agit Comutuum meæ delicie? Quid *πλατάνος* opacissimus?

Equivoca circa Platanum hæc invenimus. Cardanus & alii malè putarunt Acerem maioribus foliis esse Platanum, uti dictum. Lonicerus, ut priùs monitum, confundit Acerem minorem cum Platano. Cornar. Tiliam ineptè censuit Platanum, quem & in Tilia & paul- lò antè explosimus. Sambucus aquatica quibudam dicitur Platanus aquatica, de quo suo loco. Platani nomen quoque in hist. Indicis obtinuit Musa. Sparganium quoque dicitur Platanaria à fructus similitudine: de quo inter Gramina palustria. Platanus ab Horatio celebs dicitur, quòd non quemad. Vlmus ad susten- tandas Vites adhiberetur.

De natalibus multa scribunt, cùm prisca, tùm neotenci. Conveniunt in eo, quòd gaudeat riguis & palustribus, aquarumque ripis. Platanum, inquit Theophr. in Adria esse negant, præterquam circa Diomedis delubrum: inque Univerſa Italia raram esse affirmant, quanquam multi magnique fluvii utrobique eam perfluant. [Vides eum distinguere Adriam ab Italia, ad quod tunc, inquit Scal. fieri decuit, ut intelligat Adriam, Galliam cis Alpes.] Dionysius Tyrannus maior ambitiosius contendens in Rhegio in hortis consevit eas, quæ nunc in Gymnasio stant, nec ullam insignem magnitudinem capere possunt. At in aliis locis plurima nascitur. In Nilo Platanus provenit, non tamen multa. Hæc Theophr. Hodie Platanum multam in Hetruria sponte nasci Victorius scribit. Videndum annon & is Acerem maiorem pro Platano acceperit. Nam istud à nullo alio prodi- tum invenimus. Videtur quidem speciosa & an- nosa Flotentis propè pomeria, & in subur- bio quodam non procul mœnibus urbis, ut ob- servarunt Pen. & Lob. qui ex iis ramos & fur- culos distractos Augusto cum penè echini ma- turvissent depingi curarunt. Coluntur & Romæ in vitidariis quibudam, sed minùs proceræ sunt, nec foliis ita crebris, ut radios Solis impendant, videnturque petire, inquit Lacuna, non irri- gantur.

Præterfluit
Pharensum
agrum sub
Pierum.

Platanistos
Homeri.

Themisto-
cles de Pla-
tano.

Eius præ-
clara sen-
tentia.

Themisto-
cles de Pla-
tano sum-
mam dixit.
Adagium.

Socrates
per Platanum
iuravit.

Plato à
Platano co-
gnomina-
tus.

Multorum
error.

Alius er-
ror.

Tabern.

Synon.
Linguae.

Ähorn.

Platanus.

Equivoca.
Acer ma-
ior.
Acer mi-
nor.

Tilia.
Sambucus
aquatica.

Musa.

Platanus
celebs.

Locus.

Theophr. &
Lob.

gantur vino, ut olim Romæ fiebat. Alioqui si commodum nata fuerit cœlum & solum ad 80 pedes excrefcit. Anguil. sanè testatur Platanum non nasci spontè in Italia: sed in Creta locis vicinis fluviis abundare. At in Italia in agro Veronensi, in *S. Maria in Stella*, in domo Dominorum *Giusti* conspici pulcherrimas: in agro Bononiensi *ella Cronara* vulgò illèta in prædio Faenza maximam, sicut & Patavij in horto *Torquati Rembi*. Visà & in agro Veneto *Bassano* dicto, in viculo cui *Fogis* nomen. Neapoli visa *Matthiolo*. In Creta ad montem *Ida* iuxta torrentis fontem in valle abundant Platanus, foliis omnibus deciduis, teste *Bellon*. Provenit etiam in Lemno insula. Item in monte *Athos*, ubi altitudine comparari possunt Cedris montis *Libani*. In monte *Castagna* in Macedonia. Antiochiæ habentur altissimæ. Sed altiores in monte *Tauro*, cuiusque naturæ sunt, ut cortices exuant hyeme, hac in re *Andrachnis* contrariæ, quæ id æstate agunt. In Sicilia frequentissima, etiamque spontè nascitur ad *Ætnæ* montis radices. Apud Hispanos, Siculos & Constantinopolitanos, inquit *Cordus*, in divitum hortis excoli scimus. Clus. scribit Constantinopoli allata, ad aliquot *Orgyas* sibi *Viennæ Austriæ* crevisse. *Turner* duas etiam plantas teneras in Anglia vidit, sed aliunde advectas. Foliatum ramum cum *Pilulis* nobis dono dedit *Patavinus Pharmacopœus* ad *Aquilam*.

Theophr. tradit ex semine nasci, argumento, quod aliquando in Tripode *Aeneo* nata. At [addit *Scal.*] multa *avripant*. Verùm non probatur nobis eius opinio, qui vix ullam plantam *avripant* nasci censemus. Parva semina [qualia & Platanus] levique facili de loco in locum transferuntur, à ventis, avibus &c. ex quibus nascantur. Quanquam ex semine quod ex Italia accepimus, à nobis sato, nihil unquam prodierit. Celerimè, inquit *Theophr.* pulcherrimæque germinat ex avulsiōne. Quæ etiam si quis iam proceram & aibori æqualem transtulerit, perdurare optimè potest. Idem prodidit & *Delpicam* Platanum *Agamemnonis* manu satam, & alteram in *Caphyis* *Arcadiæ* luo. In regione *Aulocrene*, per quam ab *Apamia* in *Phrygiam* itur, Platanus ostenditur, ex qua pependit *Marlyas* victus ab *Apolline*, quæ iam tum magnitudine electa est, autore *Plin.*

Sed maximè mirum, quod *Theophr.* refert, & miratur etiam *Plin.* *Antandri* Platanum etiam circumdolis lateribus restibilem spontè factam, vitæque redditam longitudine decem (quindecim *Plin.*) cubitorum, crassitudine, ut quatuor viri non facili amplecterentur. *Plin.* ait, crassitudine quatuor vinarum. Immo & secutim tam stantes quam prociduas ita ferre tradit *Theophr.* ut & resurgant, vivant, germinantque. Nam cum *Antandri* Platanus procidisset, ramos amputatis, truncòque securi luxato, resurrexit noctu levata onere, atque reuixit, & cortex rursus circumcrevit. Quæ incredibilia non temerè quis iudicaret, nisi idem *Theophr.* & alio loco idem traderet, & modum quo id factum, adderet. Nempe causam hanc esse putat, quod arbor prostrata parte altera plurimum terræ evulserit: mox status noctu ingens adversusque secutus eam propulerit, ramisque occurrens, ac impressionem faciens, creverit. Fides sit penes autorem.

Inter primas germinat Platanus, teste *Plin.* *Echini* autumno maturescunt.

De insitione nihil specialius proditum. Apud *Plutarch.* *Sympos.* 2. quæst. 6. legimus: fuisse Platanum.

tanos Malorum surculos ferentes. Et *Palladius* libello de insitione, ubi de *Pomi* insitione tradit, inter alia sic canit:

Robora rhyfigero Platani concordia Baccho.

Paribim insititur plena rubore novis.

Platanus autore *Theophr.* lentore non caret, estque natura humida sicut & *Vlinus*: indicium, quod post cæsuram erecta materies multum humoris emittit. Tenerrima Platanus folia, ut scribit *Diosc.* in vino decocta, mox illita, oculorum fluxiones sistunt, ac tum eodemata tum phlegmonas levant. Cortex in aceto coctus ad dentium dolores colluitur. *Pilulæ* verò vinde, in vino potæ serpentum moribus auxiliantur: exceptæ autem adipq. igni ambusta sanant. Foliorum *pilularumque* lanugo (in aures & oculos) illapsa, auditum visumque labefactat. Addit *Galen.* lib. 8. *Simpl.* eiusmodi Platanus lanugine, spiritu attracta, inspiratæ, arteriam quoque offendi, quippe cum ea vehementius exaceret & exasperet: quo fit ut vox non obscure vitetur. Ideoque vitandam suadet.

Platanus eodem tradente, humidioris frigidioreque essentia est, non tamen multo plus quam *Symmetra*. Proinde folia viridia tria & illita, non obscure *Phlegmonas* nascentes adjuvant. Cortex autem & *Pilulæ* magis desiccantem vim obtinent, ut ille quidem in aceto coctus ad dentium adhibeatur dolores: *Pilulæ* verò cum adipe ad ulcera ambusta. Sunt autem qui cortice combusto medicamen desiccatorium & absterforum efficiunt, ut cum aqua lepras sanet: per se autem illitum ob humorem nimium ulcera vetera & sordida. Platanus, inquit *Plin.* adversantur vesperilionibus. *Pilulæ* earum in vino potæ quatuor pondere omnibus serpentum & scorpionum veneris medentur. Tusa autem cum aceto acri, magisque scyllite, sanguinem omnem sistunt. Et lentiginem & *Carcinomata*, melanias quoque [melaniasque] jueteres, addito melle emendant. Folia & cortex illinuntur collectionibus & suppurationibus, & decoctum earum. Corticis autem in aceto dentium remedium est.

Folia eorum tenerrima in vino albo decocta, oculorum. Lanugo foliorum & auribus & oculis mutis. Cinis *pilularum* sanat ambusta igni vel frigore. Cortex è vino scorpionum ichus restinguit. Inopia cogit aliquando luminum causa è Platanus baccis [miramur Platanus baccas *Plin.* dicere] fieri oleum, aqua & sale maceratis. Folia mansa ieiunis impetigini auxilio esse & *Curtius* testatur, illudque *Serenus* expressisse hoc carmine

Seu folia Platanus, quod mansa manè vrayabit.

Vesperiliones, scribente *Aliano*, *Ciconiatum* ovivis ingenta natura adeò infestæ sunt, ut ea solo tactu sterilia reddant. Verùm ad illarum maleficium, naturalis etiam ingenta scientia remedium edocuit. Platanus enim folia suis nidis ingerunt, ut advolantes vesperiliones, perniciem adferre nequeant. Quæ de noctuis autè tradit *Cæli Rhod.* fabulosa putat. Scribunt & alij hoc genus animalis à stabulis abigi, si in eis folia appendantur. Videtur autem *Avic.* foliis Platanus venenatis resistendi aliquam qualitatem tribuisse: Nam *Can.* 4. sen. 6. tract. 3. legitur, Fumus *Adulb.* id est, Platanus & propriè foliorum eius, [uti vertit quoque cum *Bellunensi* *Santes Ardoinus* in suo opere de Venenis] serpentibus resistit.

In monte *Athos*, ut observavit *Bellon.* *Cymbas* parant ex magnis truncis Platanus, & sine magno labore & sumptu; unamquamque *Cymbam* ex

Vires & u
sus.

Oculorum
fluxiones.
Oedema.
Phlegmonæ.
Dentium
dolor.
Serpentum
morbus.
Ambusta.
Nata.

Temper.

Lepra

Contra
vesperilionem
serpentem
scorp.
Sanguis
Lentigo.
Carcinoma
Collectio-
nes.

Ambusta
a frigore.

Ad lumen.

Ciconiatum
astutia
contra
vesperilionem
noxam.

Contra
serpentes.
Cymba.

Bumelia ram. *Bumelia*, id est, maiorem Fraxinum [Bubulam Fraxinum Gaza: latinus Væfraxinum dixisset, Scalig.] vocant, uti Macedones. Bumelia maior est & excelsior (*μακροτέρα*: Gaza & Dalech. habent, rarior corpore) ob id minus crispa. Hæc .n. Fraxini natura, ut Bumelia campestris sit lævis: montana verò scabra, quæ in genere campestrium & montanarum natura est. Quæ in montibus nascitur, benè colorata est, lævis, spissalentaque: at quæ in planis, malè colorata, rara & scabra. (*ἡ τραχὴν*. Hic sibi contradicit Theophrast. nam prius contrarium dixit.) Sic itaque utramque Fraxinum describit Theophrastus: qui & alibi tradit, Fraxino radicem esse numerosam, densam, altamque.

Plinius, more suo, pleraque ex Theophr. transcribens, ita habet brevissimè. Materie causæ reliquas arbores natura genuit, copiosissimamque Fraxinum, Proceram hæc ac teres, pennata & ipsa folio: multumque Homeri præconio & Achilles hasta nobilitata. Materies est ad plurima utilis. Ea quidem, quæ sit in Ida Troadis, tantum Citro similis, ut ementes fallat cortice ablato. [De Taxo hoc Theophr. l. 3. hist. c. 10. Erroris causâ, quod Plin. Fraxinum, Milum esse putavit, idèque etiam pinnatum dixit. Nimirum apud Theophr. *ἀπὸ τῆς αἰτίας*, legit *τῆς αἰτίας*. Illius non huius folia, inquit Theophr. Abietis in morem *τῆς αἰτίας* *ἔχει*.] Pergit Plin. Græci duo genera eius fecere: longam, enodem: alteram brevem, duriores fustoresque [flavioresque, Theophr.] Laureis folius. Bumeliam vocant in Macedonia, amplissimam, lentissimamque [latissimamque Dalecham.] Alij ita divisere. Campestem enim esse cuspidatam, montanam, spissam. Hæc Plinius qui dum folia, Theophrastæ lectionis imitatione, Laureis comparat, de particulari id intelligendum, non de tota & alata illa foliorum congerie, quam totam folium dicit Herbarij.

Colum. Fraxini non semel ineminit, ubi de Vlmariis faciendis tradit. Speciatim post Opulum atque Vlmum, Vitem maxime alere Fraxinum scribit: sed neque Opulum neque Vlmum tam idoneas esse, quam Ornos. Eas sylvestres Fraxinos esse, paulò latioribus tamen foliis, quam ceteras Fraxinos, nec deteriores frondes, quàm Vlni præstare. Tam Ornus quam Fraxinus Virgilio quoque carmine celebrata Ecl. 6.

Cantando rivas deducere montibus Ornos.

& Ecl. 7. *Fraxinus in silvis palcerrima Pinus in hortis.*

Populus in fluitibus: abies in montibus altis:

Sapinus at si me Lycida formosere visas.

Fraxinus in silvis cedat tibi. &c.

Et alius multis locis. Et Iuven. Satyr. 1.

Quantas iaculetur Manibus Ornos.

Cum itaque dicat Colum. Ornum esse Fraxinum sylvaticam seu montanam, ac Theophr. referat rutilum Fraxinum colore esse luteo, & Germanorum Walschæ montana sit colore luteo, ut experientia sibi compertum esse scribit Turnerus, rectè nobis videntur statuere, qui Fraxinum montanam & sylv. Germanorum, esse Ornum Latunorum, & Fraxinum sylvest. Theophr. statuunt. Nam Sorbus aucuparia in præcellis montibus non oritur, sed in depressis & aquosis. Quod sit ut Ornus esse non possit, aut Fraxini 2. genus apud Theophr. In Plinio verò miramur, quod Ornum post prædictos scriptores non Fraxini speciem faciat. Imò eius non tantum in loco, quod quidem legerimus, mentionem faciens, interponat inter Ornum & Fraxinum Acerem valde dissimilem arborem idque l. 16. c. 18.

Hermolyn Diosc. Fraxinum *Mileam* & *Meliam* *Mila* & quoque Græci vocant, *Trinodumque* cognominant, hoc est, Triozon, quia ramos habeat prægrandes, ordinatos, parèque numero: quod genus arborum Græci *Ἀβυλόν*, hoc est, ut quidam interpretantur, egregias appellant. Duo genera. Excelsum & alterum humilius. Sed folio Lauri latifolia acutiore, læviterque per ambitum serrato: & ut Theodor. inquit, subsidenti, quia legisset, *Ἀμυγδαλῶν*. Nos *ἑμυγδαλῶν*, hoc est, non sine quodam marginis, vel cacuminis aculeo. Fructum fert minutum in siliquis, qualem *Αμυγδαλῶν*, gustu subasum. Fert & Lauri modo Fraxinus muscum: & alia quedam adstrictiora gustu, circinataque ut Pilulæ Platani: hæc partim cum fructu emergunt: parum multò possunt nascuntur ei & quæ plecta, hoc est, phlegmata sive involucria dicuntur, &c. Id & Cæsalp. observavit: dicens, Plinium non subiungere loco citato Ornum Fraxino: quasi multum differant & non sint eiusdem generis. Eius opinionis videntur fuisse, qui diversam multum à Fraxino plantam, Ornum putarunt eam quæ sorbus aucuparia dicitur, contra mentem Columellæ. Quæ autem ex Fraxini genere certò sit Ornus, nondum asserere ausimus. Scribit quidem Anguil. Inveniri Fraxini duas species, unam altissimam, ex quibus hæc: alteram Latinis dictam Ornum, cuius semen dicatur Orneoglossum & Offic. Lingua avis, ac utramque speciem notam esse in Italia: At alij, linguam avis Fraxini dicunt: alij utriusque, diligentius autem hæc perpendant Itali.

Cordus utramque sic describit. Fraxinus simpliciter ita dicta, & *αἰκία* Græcis, minoribus est & angustioribus foliis, & semine seu fructu graciliore. Altera verò latioribus maioribusque tuta foliis tum fructibus conspicitur. Eius frondes ad bellum pabula quidam adhuc non minus quàm olium reponunt. Vnde Bubulæ cognomentum apud Græcos invenit, quamvis à magnitudine ita nominari potuerit. Eiusdem iudicio Fraxinus sylv. seu Ornus nihil aliud est, quàm magna illa latifolia Fraxinus monibus famillaris. Idem Fraxini aliam speciem eandem censet, quæ Orni nomen circa Romanam servat adhuc hodie, in Germania non proliens. Fructum vulgò Linguam avis vocant. At Fragus Linguam avis ad Fagum septimum manifesto errore refert, cum huc potius sit reducenda.

Avic. Linguam avis reponit inter medullas: & alio loco plantam censet. Nam foliorum eius & corticis medicinas scribit.

Serapio arborem esse dicit similem arbori Didarid, id est, Vlmo. Verum in Fraxino, non in Vlmo invenitur res quæ Lingua avis nunc dicitur, de qua & mentio non semel apud antiquos, cum & ad Venerem facere proditum sit.

Gal. in confect. Hepaticis ab Asclepiade conscriptis cuiusdam meminit, quæ semen Fraxini recipit. Aetius verò l. 10. idem medicamentum ex Philagrio citat, & Oribasium Fraxini semen non admittere scribit: additque, Fraxini semen, seu fructum esse arboris, ex qua Fraxinea ligna quocunque in opere apta ac obedientia, caduntur, hoc est, *ἡ ἵνα ἑμυγδαλῶν* *ἡ ἵνα ἑμυγδαλῶν*. Gal. alioquin lib. simplicium Fraxini nō meminit, ut neque Aetius. Paulus Diosc. verba transcripsit, nihil amplius addens. Patet itaque Manardum perperam dixisse de semine Fraxini ab antiquis nullam fieri mentionem. Fraxini, inquit Matth. species sunt, Ornus, itemq; Orneoglossum dictum, quod ferat semen illud, quod Linguam

avis appellant, quod & fraxinus quoque fert.

*Sterilis
ex fru-
stifera*

1. Thalys in Hircynia Fraxinum iterilem facit & fructiferam. Addit Camer. hanc Linguā avis gignere. Illam sterculosos solos nigros racematum proferre, uti supra dictum. Idem Fraxinum Fago similem habet, quam & Buchasche Germ. vocat.
2. Est & tertia aut quarta apud eundem hoc nomine: Fraxinus dura seu *ad dū* (ut dixerit quidpiam) Steinasche. Verum non intelligimus quid velit Thalys per Fraxinum Fago similem.
3. Nomen Germ. tribuitur longè diversæ plantæ à Fraxino, quæ dicitur Fagus lepium, de qua supra.

Thalys.

Schuyvenckfeldius, Fraxinum ita distinguit: 1. Fraxinus frugifera: Fraxinus angustioribus foliis Cordo: Orneoglossum: Lingua avis Offic. semen Fraxini: *Eschenamen* / *Eschenmispel* vulgò [id est, Fraxineum Viscum] sed falsò.

Fraxinus iterilis. Ornus Tragi, Fraxinus latifolia Cordi *Pagenbuch*. 3. Fraxinus dura, *ad dū* Thalio, Fraxinus Petrea: *Steinasche*: Petrosus & præruptis Locis saltem nota. 4. Fraxinus crispa *Fladersche*: Eius materies undulata, ab arculariis ad mensas, tabulas & alia colligitur. Hactenus ille. Quibus haud parvos errores committit, dum Ornum Tragi, Fraxinum iterilem facit, quæ nec Fraxinus est, nec sterilis arbor: nec Fraxinus latifolia Cordi. Malè etiam ponit secundo loco. Illud quoque considerandum, an Fraxinus crispa sit species particularis, vel varietas tantum Fraxini durioris.

*Schuyvenckfeldius
error.*

*Errores
multorum*

Euchar. Rôslin, Lonic. & Ryffius malè Sorbi aucupariæ iconem ponunt pro Fraxino.

*Nomina
Linguar.*

Græci *φραξιν* & *φραξιν*, & *φραξιν*: *Τριξιν* etiam cognominantur, id est, trinodem: quod ramos prægrandes, ordinatos & numero pares habeat, uti indicatum ex Hermolao cuius verba de Triozo transcripserunt (eo tamen non nominato) Ruellius, Brunfelsius in Onomastico, Gortius in definit. med. Carol. Steph. in Sylv. Curtius, Rob. Constant, scribunt tantum in Lex. *Τριξιν*, trenis constans nodis, & Trinodis arboris nomen etiam habet Theoph. lib. 1. hist. cap. 1. ibi apud Theophrast. legitur etiam *τριξιν* de diversis arboribus, non de particulari. Turner. etiam *φραξιν* scribit, pro eadem. *φραξιν* plerisque cum Theoph. quam vocem etiam Latine retinuit Plin. pro maiore et proceriore, uti dictum, quemadmodum Ornum pro minore cum Columella. Tragus fraxinum et *Bumelia* & *Polymelia* vocat. fraxinum Grammatici dictam volunt à fragolis locis, in quibus nascitur. forsiter in Lexico Hebraico, *Berosch* in sacris literis putat esse Fraxinum Latinis, mutuato ab Hebræis nomine: pluraliter *Berachim*: Chaldaicè *Berosim*, & Gentibus dictam *Erem*. Plural. *Berachin*, Fraxini, pro *Berachin*, Cant. 1. quanquam aliqui velint esse Cupressum. Verum lib. seq. c. de Abiete plura scribemus de *Berosch*, quæ plerisque putatur Abies. Nec animadvertimus adhuc, cur potius fraxinus existimetur, quam Abies. Nachumi secundo alii fraxineas, alii Abiegnas lanceas intelligi volunt: cum tamen eo loco nulla fiat lancearum mentio. Germ. *Asch* & *Esch* / *Espen* / *Eschern* / & *Aschbaum*. Apud Cordum, alia dicitur *Eichasch* quasi Quercina fraxinus: alia *Estinasch* / quasi Petrea. talitur Lob. dum fraxinum *Mälbaum* German. dici scribit. Sed & Hiericus in nomencl. varia nomina confundit, Ornum, *Pagenbuch* *Bumelia* & *Fresne* pro eadem ponens planta, *Has*

*Polymelia.
Erym.*

*Berachim.
Berosim.
Erem.*

Lob. error.

genbuch enim Fago sepiumconvenit, & Columellæ iudicio Ornus non erit *Bumelia*, quæ, uti dictum ex Theoph. & Plin. maior & procerior est Fraxinus. Belg. *Eschen* & *Eschenboom*. Gal. *Fresne*. Provincial. *Frayse*. It. *Fraxino*. Hisp. *Castil. Fresno*. Catal. *Fraxino*. Portug. *Freixa*. Angl. *Asche* rec. Sclavon. *Hasrenowe* syromo. Bohem. *Ges sen*. Polon. *Zesion*. Vngar. *Bóris fa*. Fructus seu semen aliquibus *φραξιν*: aliis *φραξιν* *φραξιν*: & rectius autore C. Bauh. Lat. *manna*. Lingua avis: Lingua passerina Dod. Angl. *Asches feye*, quod clavibus colligatis similia sint eius semina, quæ in utraque specie nascuntur. Fraxinum Poetæ sylvestrem, umbrosam, *altam*, *frigidam*, odiosam *Colubris*, & *neilem* *hastis* *dixere*. Et *manis* quoque apud Poetas hastam significat: unde *μανισ* *δέν*, apud eundem. Ornum verò, *rigidam*, *sterilem*, *Peliam*, *excelsam*, *aëream*, *proceram*, *annosam*, *viridem*, *duram*, *solidam*, *frondosam*, *montanam*, *cumanem*, &c. Dicebamus Mannam in Fraxino nasci, quod mirum est veteres non observasse, qui de Fraxino scripsere. Illud verò testantur Costrus, Altomarus, Quiqueranus & alii. Equè etiam in Orno. Sic enim Altomarus c. de Manna. Manna colligitur ex Fraxino & Orno, altera Fraxini specie. Et Pamphilus Herilacus de aquarum natura: Manna, inquit, colligitur Romam circum, ex arboris cortice, quam incolæ nominant *Ornosfraxino*. Calabri tùm ex orno Mannam decerpunt, tùm ex fraxino. Mannam ex frondibus vocant eam, quæ ex fraxino est: alteram Mannam ex corpore &c: Sed de Manna eiusque differentiis postea ex professo trademus. Nascitur Fraxinus æquè montosis, (sed humidis,) ac planis. Nam & in Nilo Fraxinus, & quæ *Bumelia* cognominatur, plurima est, teste Theoph. Descendunt etiam in plana: & Olympi incolæ sunt, eidem. Eadem & Plin. ait. In altis, tenebrosis & humidis proveniunt sylvis: nonnunquam & in lapidosis quibusdam agrorum limitibus. Est & ubi ripas frequens veliat. Observavimus Monspelii, Genevæ, in Burgundia, Alstia, Basileæ extra portam S. Albani iuxta Birsam & alibi: In sylva & monte Horn, prope admirabile Balneum ducatus VVirtemb. clata & multæ Fraxini, de quibus Ill. ducem Christophorum f. m. ad pacandas sanissimas multas accersendas curasse nobis relatum. In Birschen eiusdem ducatus oppido, una est ante portam. Cæmeterium Abredonensium in Scotia annosis Fraxinis, proceris, crassiss, frequenibus confutum est, teste Iac. Cargillo D. Medico. Nec raræ occurrunt in Helvetiæ montibus concavis potissimum & madidis. Circa Tigurum frequentes sunt: in sylvis & montibus frequentiores. Non omnes necubique fructificant. In montibus circa VValkelladium plurimæ sunt fructifera: Item passim in Silesiæ montibus. Ut pateat, tam frigidis quam calidioribus gaudere locis. Auctus facilis est, & festinantiùs germinat: messibus tamen reddit. Theoph. inter eas recenset, quæ perfectè pariunt atque excoquant. Plin. ligna eius post vindemiam & Arcturum cadenda præcipit. Transplantata facillè provenit, quales iam proceræ, nostra cura satæ, visuntur in horto Montbelg. Ergo quia festinantiùs germinat, disponi quoque maturiùs convenit, hoc est, ab Idib. Feb. plantas & ipsas nascentes. Altiùs demittenda, quia summa tellure gaudet, [*φραξιν*] Theoph.

genbuch enim Fago sepiumconvenit, & Columellæ iudicio Ornus non erit *Bumelia*, quæ, uti dictum ex Theoph. & Plin. maior & procerior est Fraxinus. Belg. *Eschen* & *Eschenboom*. Gal. *Fresne*. Provincial. *Frayse*. It. *Fraxino*. Hisp. *Castil. Fresno*. Catal. *Fraxino*. Portug. *Freixa*. Angl. *Asche* rec. Sclavon. *Hasrenowe* syromo. Bohem. *Ges sen*. Polon. *Zesion*. Vngar. *Bóris fa*.

Fructus seu semen aliquibus *φραξιν*: aliis *φραξιν* *φραξιν*: & rectius autore C. Bauh. Lat. *manna*. Lingua avis: Lingua passerina Dod. Angl. *Asches feye*, quod clavibus colligatis similia sint eius semina, quæ in utraque specie nascuntur.

Fraxinum Poetæ sylvestrem, umbrosam, *altam*, *frigidam*, odiosam *Colubris*, & *neilem* *hastis* *dixere*. Et *manis* quoque apud Poetas hastam significat: unde *μανισ* *δέν*, apud eundem. Ornum verò, *rigidam*, *sterilem*, *Peliam*, *excelsam*, *aëream*, *proceram*, *annosam*, *viridem*, *duram*, *solidam*, *frondosam*, *montanam*, *cumanem*, &c.

Dicebamus Mannam in Fraxino nasci, quod mirum est veteres non observasse, qui de Fraxino scripsere. Illud verò testantur Costrus, Altomarus, Quiqueranus & alii. Equè etiam in Orno. Sic enim Altomarus c. de Manna. Manna colligitur ex Fraxino & Orno, altera Fraxini specie. Et Pamphilus Herilacus de aquarum natura: Manna, inquit, colligitur Romam circum, ex arboris cortice, quam incolæ nominant *Ornosfraxino*. Calabri tùm ex orno Mannam decerpunt, tùm ex fraxino. Mannam ex frondibus vocant eam, quæ ex fraxino est: alteram Mannam ex corpore &c: Sed de Manna eiusque differentiis postea ex professo trademus.

Nascitur Fraxinus æquè montosis, (sed humidis,) ac planis. Nam & in Nilo Fraxinus, & quæ *Bumelia* cognominatur, plurima est, teste Theoph. Descendunt etiam in plana: & Olympi incolæ sunt, eidem. Eadem & Plin. ait. In altis, tenebrosis & humidis proveniunt sylvis: nonnunquam & in lapidosis quibusdam agrorum limitibus. Est & ubi ripas frequens veliat. Observavimus Monspelii, Genevæ, in Burgundia, Alstia, Basileæ extra portam S. Albani iuxta Birsam & alibi: In sylva & monte Horn, prope admirabile Balneum ducatus VVirtemb. clata & multæ Fraxini, de quibus Ill. ducem Christophorum f. m. ad pacandas sanissimas multas accersendas curasse nobis relatum. In Birschen eiusdem ducatus oppido, una est ante portam. Cæmeterium Abredonensium in Scotia annosis Fraxinis, proceris, crassiss, frequenibus confutum est, teste Iac. Cargillo D. Medico. Nec raræ occurrunt in Helvetiæ montibus concavis potissimum & madidis. Circa Tigurum frequentes sunt: in sylvis & montibus frequentiores. Non omnes necubique fructificant. In montibus circa VValkelladium plurimæ sunt fructifera: Item passim in Silesiæ montibus. Ut pateat, tam frigidis quam calidioribus gaudere locis.

Auctus facilis est, & festinantiùs germinat: messibus tamen reddit. Theoph. inter eas recenset, quæ perfectè pariunt atque excoquant. Plin. ligna eius post vindemiam & Arcturum cadenda præcipit.

Transplantata facillè provenit, quales iam proceræ, nostra cura satæ, visuntur in horto Montbelg. Ergo quia festinantiùs germinat, disponi quoque maturiùs convenit, hoc est, ab Idib. Feb. plantas & ipsas nascentes. Altiùs demittenda, quia summa tellure gaudet, [*φραξιν*] Theoph.

Epitheta

*Manna in
Fraxino
Orni.*

Ornosfraxinus.

Locus.

Tempus.

*Satio
Cultus.*

Theoph. vocat] ad quaternos pedes, monente Plinio: qui ante tricesimum sextum mensem attingi falce vetat: & alterna servari brachia, alternis putari annis, suadet. Sexto anno maritaneur cum vitibus, quas maximè alere Colum. prodidit: ac in eum finem locis asperis vel montosis rectè feri monet, quod iis minùs lætantur. Nimirum ne plus iusto excrecant. Quomodo autem disponenda Fraxinus habes apud Colum. lib. de Arboribus, cap. 16. Sed hanc rem abundè docuimus in historia Vlmi.

Descriptio. De insitione Fraxini nihil adhuc legimus: nisi quis fortè suspicari volet Pyrum inferendam Orno ex illo Virgiliano Carmine Georg. 2.


Ornusque incannit albo

Flos Pyri. *Flore Pyri.*

FRAXINUS TENVIORI ET MINORI FOLIO.

Descriptio.

Folia



EST & fraxini varietas alia: cuius folia pinnata segmentis dividuntur tenuioribus, strictioribus, acutioribus, serratis tamen perinde ut Fraxini vulgaris. Rami, pluribus & crebrioribus tuberculis foliorum pediculis sedem daturis, inæquales. Iconem nostram benè pictam, minùs affabre expressit sculptor, ex ea q; expressa in hist. Lugd. quam ex

nostro ramo iam olim pingi curavimus. Ramum ex Lugduno vicinis montibus collectum adhuc hoc anno 1605 quo hæc commentamur, adseruamus.

An hæc sit Ornus Columellæ? Cuius folia singula dicit oblongiora, angustiora, obscurius viridia &c: Vix videtur. Non enim sunt oblongiora.

An hanc intelligit Turner. cum in Herbario suo Anglico ita scribit. Theophrasti Fraxinus altera, seu Petrea, montes amat: eadem cum fraxino sylvatica seu Petrea Germanorum, hoc est, Waldeſcher: & Orno Latinorum, de cuius natalibus Virg. 2. Georg.


Nascuntur steriles saxosis montibus Orni. & Aeneid. 6.

Ingentes advolvunt montibus Ornos.

Non ausimus tamen hac de re quid certi asserere.

FRAXINUS ROTVNDIORE FOLIO.

Descriptio. Sed & tertia Fraxini à nobis observata varietas, cui coniugatum quoque disposita folia, sed quæ Pistaciorum folia referunt, subrotunda, minora quàm fraxini vulgaris, in ambitu serrata, in quibus medietas interior ad nervi imum, brevior quàm exterior sæpè conspicitur, id quod



in Terebintho & Pistacis usu venire subinde observamus. Hoc fraxini genus attulit nobis D. Caspar. Bauhinus ex Italia cum hac inscriptione: Ornus 3. Galli Brixiani de re rustica.

Præter Fraxini genera à nobis enumerata alia plantæ quoque id nomen aut simile acquisivere, quæ vitandæ æquivocationis ergo hic consignandæ. Inprimis Sorbus aucuparia, quæ ab aliquibus dicitur Fraxinea arbor: aliis Fraxini sylvestris species, & Fraxinus bubula, & Ornus, de quibus paulò ante. Cæsalp. scribit: Ex Fraxini genere fortè fuerit lignum in nova Hispania repertum, cuius ramenta cæruleum elegantissimum reddunt. De hoc ligno in superioribus libris egimus. Oxyan Plinius Fraxinum interpretatur, ut Scal. quoque annotavit. De Oxya seu Fago vide lib. præcedentem ubi apparebit, quibusdam etiam Ornum dici. Considerandum an Thalia & Horto Lusitaniæ Fraxinus, Fago similis, Buchesche sit nostra Fagus sepium, quam malè Tragus quoque Orneoglossum putavit. Non placet Lobelium in Obs. scribere de Lantana, Bleiner Mälbaun Tragi. Fraxinus minor. Dictamnium album quorundam, nonnullis dicitur Fraxinus pumila & fraxinella. Polygonatum quoque dicitur Fraxinella sive Frassinella. Apud Gesnerum videre est Lilium Convallium dici Frassinellam, ut alibi ostenditur. Tractatus Quid pro quo, deficiente Fraxino substituitur, quod non probamus.

Fraxini lignum auctore Hippoc. numero decem trita, & in vino pota, urinam ducunt, & vulvarum doloribus auxilio sunt. Foliorum succus, teste Diosc. & ea ipsa quoque, cum in vino pota, tum etiam imposita, viperarum moribus opitulantur: [Quidam addunt, ut xpi morbus, sicut & cortex Spleneticiis.] Cortex ustus & cum aqua illitus, lepras removet. Ligni ramenta [περίματα] pota lethalia perhibentur. Hæc ille. Nos suspicamur Dioscoridem apud veterem quendam malè legisse, μάλιν pro μύλιν, ut fecit Plin. qui eius cortex putatur. Nam apud Gal. de med. facilè parab. cap. 40. legimus, Fraxinei ligni ramentorum Cyathus tri-duum potui datus, sanitatem restituit: quod utique non scripsisset, si lethalia agnovisset. Et in lib. de Dynamid: eidem Galeno adscripto: Ad Splenem: Cortices Fraxini excoque in Vino, & bibat quotidie donec sanetur. Si vis probare da porcello per triduum ut bibat, & in quarto occide ipsum, & non invenes splenem. Nos vix verisimile putamus. Res est experimenti. Idem lib. ad Hæmorrhoidas: Oleum Fraxini injectum mirè prodest.

Columella Fraxinum & capris & ovibus gratissimam dicit, nec inutilem bubus. Et alibi: Orni frondes, inquit, Capræ & oves libentiùs appetunt. Experimentum. Hæmorrhoidas. Armentorum de summo pectore. Armentorum de summo pectore.

Armentorum de summo pectore. Armentorum de summo pectore.

Folia alicu-
bi mortife-
ra.
Contra ser-
pentes.
Plerum.

petūt, quā Fraxini aut Ulmi. At longē secus Plinius: Folia Fraxinorum, infit, iumentis mortifera, ceteris ruminantium innocua, Græci prodidēre. In Italia nec iumentis nocent. Contra serpentes verō succo exprello ad potum, & imposita ulceribus, opifera, ac nihil zquē, repēriuntur. Tantāque est vis, ut ne matutinas quidem occidentēsve umbras, quā sunt longissimæ, serpens arboris eius attingat, adē ipsam procul fugit. Experti prodimus: si fronde ea gyro claudatur ignis & serpens, in ignem potius, quā in Fraxinum fugere serpentem. Mira naturæ benignitas, prius quā hæ prodeant, florere Fraxinum, nec ante conditas folia dimittere. Idem alibi: Fraxinus quā vim adversus serpentes haberet, indicavimus. Semen foliis eius inest [rectius legas siliquis aut folliculis: non enim in foliis semen, sed ex arboris ut Theoph. ait, & docet experientia] quō medentur iocinoris & lateris doloribus in vino. Aquam quæ subit cutem, extrahunt. Corpus obesum levāt onere, sensim ad maciem reducentes, iisdem foliis cum vino tritis ad virium proportionem, ita ut puero quinque folia tribus Cyathis dilvantur, robustioribus, septem folia quinque Cyathis vini. Non omittendum, ramenta eius & scellum quibusdam cavenda prædici. Hæc Plin.

Exper-
imenta con-
traria.

Caner. quoque scribit, se expertum serpentes Germanicos non fugere Fraxinum. At longē aliter Ambr. Paræus in sua Chirurgia: Expertus inquit retero, si fronde Fraxineæ gyro claudatur ignis & serpens, in ignem potius, quā in Fraxinum fugere serpentem. Vtri nunc credendum? Experiendum. Scribit tamen Colum. lib. 6. cap. 16. Vbi bos à vipera iactus fuerit, præsens remedium esse, si conteras Fraxini tenera cacumina quinque librarum, & totidem vini, & duobus sextariis Olei, expressumque succum faucibus infundas. Itēque cacumina eiusdem arboris cum sale trita lætæ parti superponas.

Hepaticum
med.

Gal. l. 8. c. 21. πικρὸν, ex Asclepiade sub finem libri, hepaticum medicamentum describit hoc titulo. ὁμοῖα δὲ πικρῶν ὀνίτων. πικρὸν γὰρ οὗτο τοῦ ἀλλοῦ ὅτι τὸν δαδίστην χυμὸν βλάπτει. In cuius compositionem quoque ingreditur Fraxini semen.

Naxa.

Idem semen & tussim infuso in faucibus exasperare, Curtius prodidit, in quo devoratum prodesse, & denubus committum, ut ait Serenus: quo etiam autore, hydropicis potum confert. Aurium etiam doloribus infusus succus, cum torretur, prodest, ut idem testatur hoc carmine:

Quum sevis tenera dolor alit' sauciat aures,
Fraxinea in flammis fundit quem calca succum
Instillet.

Aqua cor-
ticum.

Aqua è corticibus Fraxini destillata, unicè & singulari remedio ad calculum & morbum regium facit, inquit Tragus: Folia vino decocta & pota hepaticis & spleneticis conducunt. Eadem præstat oleum è ligno Fraxini confectum, ac potum, tradente Manardo super Mesuem. Succus hydropicis, meo iudicio: non inutile fuerit remedium. Pocula quidam ex ligno Fraxini parant, pollicentes, si quis ex eiusmodi poculis assidue bibat, eum lienem extenuare hæc pacto posse. Idem & Hollerius commendat, & alii quidam.

Cantio an-
terum de
oleo.

Si oleum Fraxini fuerit paratum per descensum, ut loquuntur: nullo modo suademus per os exhibendum: sin alia ratione, magna cum prudentia exhibendum. Duobus namque modis oleum è Fraxino paratur. 1. E viridi Fraxini

ligno tessellatim conciso per descensum, uti loquuntur Chymici, tam aqua quā oleum elici potest, sicut ex ligno Juniperi vulgus elicit. 2. Eisdem tessellis, sed minutius concisis, in aqua propria, addito altero tanto spiritus vini, aut media parte, maceratis, & postmodum destillatis: exibit aqua cum oleo, quod ab ea postea separatur. Theophr. Fraxinum humidissimum dicit, ex eo quod lecti cedentes & obsequiosi ex ea fiant.

Folia, cortexque Fraxini moderatè calida sunt, auctore Dod. & tenuium partium. Semen calefacit & exiccat tertio excessu. Foliorum & corticis decoctum ex vino potum hepar splenemque ab obstructionibus expedit, roboratque, & lateris doloribus medetur. Idem folia præstant in oleo servata, & lateri imposita. Folia, cortex, turionēsque eodem modo sumpti valent ad hydropem, quia vacuant aquas. Ad idem facit semen in vino decoctum, Sereno teste:

Fraxineum semen cum Bacchi rore bibendum est.

Lingua avis, tradente Matth. in recentiorum Medicorum usu est ad stimulandam Venerem, qua in re primū celebrata ab Arabibus. Clara experientia, in Italia, infit idem, folia non lethalia iumentis, ut voluit Plinius [imponit Plinio Matth. nam contrarium dicit Plin. nempe in Italia non lethalia esse] & malè eum tuctur Rob. Const. quin imò si ea exhibeantur, ubi assumserunt Taxum, liberantur à morte.

Videamus autem quid Rob. Const. quem Matth. notat, de ea re scribat. Carpitur, inquit, Plinius à Matthiolo (cuius etiam asseda in hac parte Amatus Lusit. & in multis imitator atque reprehensor) quod lib. 13. c. 16. dixerit Fraxineæ folia iumentis mortifera, ceteris ruminantibus innocua, ex Græcorum autoritate: quum hoc ipsum Theophr. Taxo adscripserit. Sed profectò ab hac calumnia exonerandus est Plinius noster: Primū quod hoc pro vero non astruat: imò liquidò testetur, id non verum in Italia deprehendi. Secundo loco, quod absurdum non sit, eandem facultatem differentibus plantis genere, à diversis autoribus attributam, & tantum à Plinio recitatam. Neutèrque mihi probat, Plinium, qui omnium optimè luculenter Græcè sciret, tam facile vicinitate nominum aberrasse, ut ipsi causantur, aut potius criminantur. Adhæc, quæso, quæ nominum affinitas in his vocibus Græcis *μύλα* & *μυλία*, id est, Taxus & Fraxinus: de quibus, vicinis capitibus egit ipse Plin. nominatimque perscripsit lib. 16. c. 10. Taxum ipsam à Sestio Smylacem appellatam esse. Sed ambo dum ambiciosè Græci student, & videri volunt in his doctrinæ literis tantum profecisse, ut utriusque linguæ peritissimum Plinium, inscitæ coarguant, profectò vel in Grammaticis, suam produnt imperitiā, quod utriusque causa doleo. Siquidem *μύλα* per tota, & *μυλία* Græcè dicitur. Sed pro Hedera specie & frutice, quem describit Diosc. l. 2. *μύλα* verò per ypsilon est Taxus, da qua Diosc. l. 4. & l. 6. & Plin. l. 16. c. 10. non autem *μύλα*, ut legit Amatus Lusit. apud Theoph. *μύλα* enim ea scriptura idem est quod *μυλία*, sive *μυλία* *λιδος*, Lapis molaris. Atque ita semper distinctum invenies in emendatis codicibus. Verū isti scripturæ confusione sese implicant & alios credulos pertrahunt in errorem.

Sic itaque Rob. Const. quituratur contra Matthiolum & Amatū pro Plinio. Cui Matth. respondet in post. com. in Diosc. Ac utique hallucinari scribit Constantinum dum contra suam sententiam Plinium defendere nititur. Rei fidei

dem esse Plinium lapsum fuisse, claram in Italia experientiam: siquidem Taxi foliis, non Fraxini, iumenta non ruminantia necentur. Quinimò hanc salutare præstare remedium lethalius serpentium venenis: quibus adeò inimica sit Fraxinus, ut ne matutinas quidem occidentesve umbras, quamlibet spatiosas, serpentes arboris huius attingant. Miraque naturæ benignitate, priusquam illæ prodeant, florere Fraxinum. Quo argumento fretus, errorem Constantini facile à quovis materix medicæ studioso, detectum iri concludit. Aut si (inquit) suam ipsius ignorantiam & Plinij errorem cognoscere cupit, alacrum equum aut asinum Fraxineis frondibus: id si fecerit, sui erroris atque Plinij palinodiam recantabit. Quod si plura à nobis doceri non dedignabitur, sciat devoratis à quadrupedibus Fraxini foliis ea certò sanari, quæ Taxum fuerint depasta. Hæc Matth. ad Rob. Constantinum. Et sanè qui diligenter Plinij verba perpenderit, & cum Theoph. verbis, quæ de Taxo edidit, contulerit, facile indicabit Plinium, quod ei non usque adeò est insolens, vocum *μαλία*, & *μαλία* seu *μαλία* similitudine deceptum, ut de Matth. experimentis aliorumque nihil amplius dicamus. Probandum fuit Constantino, *μαλία* non esse Fraxinum. Et, si non agnoscit affinitatem inter has voces *μαλία* & *μαλία*: at agnoscat, inter *μαλία*, & *μαλία*, cuius vocis ne meminit quidem. Accedat quoddam Hermol. Ruell. alique doctissimi viri, Plinij lapsum agnoverint. Parum itaque attentè Plinium de Fraxino scribentem perpendisse videtur Rob. Const. dum eius errorem non agnoscens, novo errore pro defensione cunulavit. Sed de his plus satis.

Pergit Matth. in viribus. Humor qui residat urendo Fraxini lignum, mixtus cum pari pondere succi Cydamini Scyllæ & Rutæ, ac nōnnulli simul decoctus, valet ad surditatem, si eundo cubitum ponatur in aurem sanam, ita ut æger dormiat supra sanam. Si sit in utraque aure surditas, ponatur in aure minus affecta. Aqua extracta ex lignis per descensum, ablato oleo, mixta cum aqua Violarum, tollit ruborem & pustulas faciei. Decoctio corticis ramorum sumpta per aliquot dies, imminuit humidum splenem. Lingua avis utilis est in potu pleuritidis & ad provocandam urinam. Est cum Pistaciis, nucleis Pineis & saccharo iuvat coitum. Si colligatur principio Novembris, exsicceetur in furno, & eius pulvis detur cum vino, plurimum confert adversus renum calculos. Singulare experimentum contra calculum. In minutas taleolas concisæ Fraxini sumuntur M. ij. quibus affunduntur vini albi lib. iij. ad tertias coquuntur: per linteum colati iuris Cyathus in quo tenuissimæ serraturæ Fraxini drachma infusa fuerit, bibitur manè calidus octo diebus continuis: Præservat à calculo diu: quod in multis experientia verum comprobavit. Cinis Fraxini cum aqua mistus, scabiem illitu profligat. Recens cortex vulnere recenti superligatus, ita constringit, ut futura non sit opus. Coquitur eius cortex in aceto, quod ex spongia calidum ventriculo adhibetur, vomitus compescit. Idem in vino rubro coquitur, quo utiliter soventur dysentericorum ventres.

Quamvis autem Diosc. ligni scobem potius lethalem credi tradat, esse tamen scribit Celsus: qui eius decocto utantur vice ligni Guaiaci, felici successu. Eius cortex internus aquam, in qua maduerit, cæruleam reddit, quam apponunt Gallinis, cum morbis vexantur, eodem teste.

Loquelà deficiente corticem Fraxini linguæ supponi iubet medicamentarius liber V Virtembergicus, & restitutam iri promittit. Magnum sanè remedium, si verum & probatum. Fraxino Spleneticos, Nephriticos, & Lue Venerea affectos scio curatos, inquit Lob. Qui igitur sint ramenta venenum? siquidem ipsa adversatur venenis. An quia corpori non venenato imprimit illam qualitatem, quam in venenum exertura fuit. Siquidem Cantharidibus hæc perquam grata est: ut pote in quâ nascuntur, victitant & moriuntur. Id verò, ut de Lunipero dicitur, ramorum alperitate posse interimere quosdam, qui noxam non sentiunt ex decocto. Corticis radicis cinis nodulo exceptus cauterij potentialis supplet vicem madefactus & impositus: indeque foraminulum contractum reseratum, immisso Hederæ folio, sovetur. Corticis, seminis & foliorum decoctum surditati suffitu modetur, occulta proprietate. Sal Fraxini sudores movet uretici mixtus: medicamentis autem purgantibus, scrofa evacuat, stimulosque agit. In immani illa peste Lugdunensi, ubi ego Bauh. medicus ordinarius urbis stipendio detinebat, observavi quosdam usos Fraxini cortice ad potiones sudorificas pro peste correptis. Ad reddendos capillos pulchros Cento medicamentorum V Virtembergicus iubet accipere mense Aprili Fraxini gemmas & folia, eademque siccata & pulverisata, quantitate medij ovi, linteis involuta macerare in lixivio, quo pili abluantur. Vltum Fraxini ad stipandas vites diximus in cultu ex Colum. Virgil. & sudes commendavit:

Fraxineas aptare sudes furcæ sine bisornes:

Nempe Vitibus. Nec minùs hodiè in usus venit serenda inter vites, quamvis facile à gelu laxatur, & minùs doret Acere. Verùm quia facilius provenit Acere, & quia serpentes eius umbram refugiunt, ut etiam Aug. Gallus non ignobilis Geoponicus Italus testatur, & in Italix locis quibusdam Vitis adferuntur, vel potius Vites adferuntur huic, ut ea sustineantur, quod & Celsus testatur.

Sed & folia ac frondes hodiè in quibusdam locis in usu sunt ad sustentandas oves & capras: speciatim propè Aculas Vimentium, Fraxini passim coluntur in eundem usum. Proutquàm decidant folia, frondem decerpunt & præsecant, fasciculosque conficientes in hyemem siccatos reponunt. Quo tempore iis rodendos & devorandos suspendunt, id potissimum tertio quoque anno facientes, sicut & de Coryli ramis, uti nos observavimus.

Potè tantus est materiei usus, ut Fraxinum præ aliis copiosissimæ materix causæ naturam generasse, scribere non dubitavit Plinius: quippe quæ obediensissima sit in quocunque opere, tandemque pro hastis Corylo melior, Corno levior, Sorbo lentior. Est sanè Fraxini lignum tenacissimum ac durissimum, ob quas doctes & ad hastas expetitur, huicque longitudine, rectitudine non aliud lignum præferri, nedum confecti potest. Ad ephippia & sarissas conficiendas passim expetitur, maximè in Anglia, Hybernia & Scotia. Abacis, mensis, cochlearibus, poculis conficiendis conmodissimum. Denique quicquid ex ligno fieri debet, ita ut subtile, fabre factum etiamque forte esse debeat, ut magnam vim sustinere queat, non melius ex alio, quàm ex isto parabitur. Utuntur & ad Rhedas & similia iumenta. Ex radice pugionum manubria fiunt, præsertim sylvestris, quæ materiz elegan-

Loquela deficiente.

Spleneticos, Nephriticos, Lue Venerea.

Cantharides.

Cauterij.

Surditas.

Sal Fraxini ad sudores, Purgans.

Pess. Capillorum eructus.

Sudes pro vitibus.

Visu ligni.

Matth. experim.

Contra Taxi venenam. Anterioris indicium de prædicta agere versum.

Surditas.

Ruber & pustula faciei. Pleuritidis.

Vomitus.

Renum calculi. Experim. contra calculum.

Calculi præservatio. Scabies. Vulnus.

Vomitus.

Dysenteria. Diosc. not.

Ligni Guaiaci substitutum. Aqua coagulata.

elegantia predicta longè præfertur, atque adeò undulata striarum varietate, nec Aceri quidem cedit: qualem in Poloniæ sylvis crescere audimus: immò vix pulchrius lignum in tota adeò Europa crescere tradunt. Nobile vocant: Germ. Edelstein: quale apud nos non crescere artifices testantur.

Quæcunque vires primæ seu vulgari Fraxino tribuuntur, iisdem prædita est & alia, sed efficacioribus, vel Turneri iudicio, nisi ubi maior humiditas requiritur. Tum verò accommodatior est vulgaris.

Sed nec illud prætereundum quod Oribas. ex Heliodoro monet: Bases, crura, latera, transversaria, Cubitos, testudines, adiunctaque crura, cæteraque quæ in organis Chirurgicis ampliora expetuntur ex ligna vel fraxinea materie, quæ secundas obtineat, conficienda.

Organa
Chirurgi-
ca.

DE MELLE AEREO, MANNA, TERENIABIN ET SACCHARO Alhuzar in genere.

CAP. XL

Infirmitas
rario.

Diu multumque cogitavimus, quonam loco esset collocanda Manna: quam nostram dubitationem iniecerunt potissimum ii, qui Mel æreum existimant. Sed Experientia tandem Clarissimorum Medicorum cedentes, atque potissimum insignis illius Altomari, statuentis ac docentis Mannam esse liquorem seu Lachrymam Fraxini & Orni, libuit hoc loco de ea in genere & specie tradere.

Arist. de
melle æ-
reo.

Incipiemus à verbis summi Philosophi Aristotelis sic scribentis de apibus: Construunt favos è floribus, ceram ex lachryma arborum fingunt: Mella ex rore aeris, syderum ortu potissimum, & arcus cælestis incubitu contrahunt. Omnino ante Vergiliarum exortum mel non fit. Favos itaque, ut dictum est, ex floribus faciunt. Mel ipsas non facere apes, sed rorem candentem deferre, argumento est, quod uno aut altero die cellas cera repletas inveniunt Apiarum.

Theop.

Adhuc clariùs Theoph. lib. 3. hist. cap. 9. de melle aëreo scribit, his verbis. Quercus ferax arbor est plurimarum rerum. Sin autem, autore Heliodo, Mella quoque apesque ferat, magis illud quoque confirmatur. Ergo nascitur & mel: hic liquor ex aëre, nec aliis magis infidet frondibus.

Plin.

Ex quibus & Plin. sua mutuatus, tamen fusiùs eadem declarat. lib. 16. cap. 8. Robora ferunt & Viscum & mella, ut autor est Hesiodus: constatque rores mellons è cælo cadentes non aliis magis insidere frondibus. Et lib. 11. cap. 11. & 12. Nihil horum [apes] statò tempore, sed rapiunt diebus serenis munia: & melle uno, alteròve ad summum, die cellas replent.

Ex aëre &
ore.

Venit hoc ex aëre, & maximè siderum exortu, præcipueque ipso Sirio exsplendescente fit: nec omnino prius Vergiliarum exortu sublecanis temporibus. Itaque tum prima aurora folia arborum melle rosida inveniuntur: ac, si matutino sub dio fuere, unctas liquore vestes, capillumque concretum sentiunt: sive ille est Cæli sudor, sive quædam siderum saliva, sive purgantis se aeris succus: utinamque esset purus ac liquidus, & suæ naturæ, qualis est, ut primò. Nunc verò è tanta cadens altitudine, multumque

Cæli sudor.
Siderum
saliva.
Aëris suc-
cus.

Tom. I.

dum venit, sordescens, & obvio terræ halitu infectus: præterea è fronde & pabulis potus, & in utriculos congestus apum (ore enim vomunt) ad hæc succo florum corruptis, & alveis maceratus, rotiesque mutatus, magnam tamen celestis naturæ voluptatem affert.

Altomarus iungit ex Plinio, ea, quæ scripsit cap. 14. eiusdem libri, de altero genere mellis, quod vocatur Horæum: Verum quoniam ea, quæ ibi dicuntur, nobis videantur intelligenda de Melle propriè & simpliciter dicto, hæc omittimus. Videtur & Virgil. de Melle propriè dicto scribere: Georg. 4.

Protinus aërei Mellis calestia dona

Exequar.

An verò Ecl. 4. intellexerit Melleū rorem de cælo cadentem ut quidam existimant, aliis considerandum relinquimus. Eius hæc sunt verba:

Et dura Quercus sudabat rosida Mella.

In Quercuū sanè foliis non semel observavimus Rorem melleum, quemadmod. & in foliis Tiliæ, quem nostro iudicio, nec Quercus neque Tilia sudabat: censemus Virgilium potius Poëtice loqui, quàm verè. Curtius tanquam miraculum extollit, quod ex Quercubus mel destillet, & de hoc Hesiodum ac Virgilium loco posterius citato loqui censet. Cordus præter iam dictum Melleum liquorem rosicidum vel aëreum, etiam alium agnovit humorem melleum, dulcem spontè destillantem ex truncis Quercuum, Quem Oleo-melitis ipse comparat, de quo nos lib. 6. & lib. 7.

Galenus lib. 3. alim. cap. 39. sic distinguit: Mel à plantis & ab animalibus est secretum. Oritur enim in plantarum foliis. Est autem neque succus earum, neque fructus, neque pars, sed eiusdem est cum rore generis: non tamen assidue, nec copiose, ut ille provenit. Meruni, aliquando, cum æstate super arborum ac fruticum herbarumque folia mel quàm plurimum fuisset repletum, agricolas velut ludentes cecinisse, Iupiter melle pluit. Præcesserat autem nox, ut per æstatem, benè frigida (nam tum tempus anni æstivum erat) pridieque calida & sicca fuerat aeris temperies. Peritis quidem naturæ interpretibus videbatur halitus è terra & aquis à solis calore sublatus, ac deindè exactè tenuatos accitos, à frigore secutz noctis concretos coaluisse. Apud nos verò rarè id accidit. In monte autem Libano quotannis per sæpe. Itaque coria super terram extendentes, & arbores excutientes, quod ab eis distillat, excipiunt, & ollas ac fictilia melle implent: vocantq; id mel rosicidum & aëreum. Proinde constat materiam, ex qua mel generatur, rori esse congenerem. Videtur autem & ex plantis, in quarum foliis colligitur, boni malive quid ipsi accedere. Hactenus Galenus.

Quæ verò nostra sit opinio de Melle aëreo Galeni, postea apparebit sub titulo Mellis Cedrini.

Amyntas lib. 1. de Asiæ mansionibus, cum tractat de Aëreo melle, referente Athenæo, inscribit: Simul cum foliis id decerpentes componunt & fingunt ad instar Syriacæ massæ. [Carricarum pinguium, quæ à Syria convehuntur] Quidam glebas ex eo faciunt: & ubi fumere collibitum est, diffractas ex eis micæ in ligneis pocculis, quæ Tabætas nominant, dilutas antè & collatas bibunt, gustu simili, ac si quis mel dilutum bibat, sed multò iucundior. Hæc Athenæi verba optimè respondent nostræ Mannæ Buanfonæ, sive Laricæ, de qua postea. Quid si Cedrinam intelligat?

Arabes sub rore aëreo comprehendunt Tereniabin

Artem
mel. Cælo-
ria dona.
Mellum
ros.

Quercus
mel.

Mellis di-
stinctus Gal-
leno.

Mel pluit

Manna
concreta.

Mel Libani

Manna de
Libano.

Mel rosicidum
ex plantis.

Mel Asiæ
referent
Athenæo.

Anabum
planta de
Manna
obscura.
Arabum
Manna ab
Europas
differt.
Terreniabin
niabin, Mannam & Saccharum Alhuzar: quorum varias species tradunt, tanta obscuritate, ut nihil supra. Quum tamen differant à nostris Europæis Mannis, nec inter ipsos bene constet, lubet omnia huc referre, quæ de ipsis scripserunt incipientes à Serapione.

Mel roris.
Arbor spinosa.
Palma.
Virens.
Terreniabin, insit ille, est Mel roris. Itac: Terreniabin est ros cadens de celo, similis mellis granuloso concreto. Vocatur Mel roris. Plurimum cadit super arbores in Orientis regione, Coraseni dicta, quibus folia familia spinis viridibus, & flores rubri: & quæ fructum non ferunt. In Castella cadit supra summitates Palmarum. Vis ei emolliendi alvum & humectandi pectus. Confert natura calidis, potissimum si dissolvatur in aqua Iuiubarum & Prunorum. Aben Mesuai: Emollit ventrem & pectus. Præstat quæ alba & recens. Dosis à 10 ad 20 aureos. Ita tradunt Mesua, Albusari, Aben Guefid, Attabari & Rhafis.

Delectus.
Dofis.
Verum Abix scribit: Terreniabin præstare Zucharo, sedare inflammationes febrium calidarum, auferre sitim, & ventrem mediocriter emollire. Esse Mannam quæ cadat ex aëre, sicut Manna, lenire pectus: plerumque cadere supra spinas prædictas. Hæc Serapio cap. 11.

Manna.
Mel Serap.
At cap. 45. Men inquit, est Manna. Mescha scribit, Mannam esse calidam, abstergere & emundare: virtutem eius intentionem aut remissionem esse pro diversitate arborum supra quas cadat. Mesurugie tradit Calidum primo gradu, temperatum in humiditate & siccitate, conferre pectori & pulmone: Eam quæ cadit supra Tamariscum bonam esse tussi & asperitati pectoris.

Tamaris.
scus
Mel Serap.
Rus.
In Collect. Rhafis manna traditur, cadere supra arborem Malvaviscum, veluti Mel: moram trahentem in ea albescente: at citò collectam viridem esse.

Temperata.
Delectus.
Habere autem, calida est in fine secundi gradus, sicca ferè eodem gradu. Melior cui color clarus, accedens ad albedinem, & non nihil rufescens, & è ligno purè collecta. Roborat ventriculum, adstringit ventrem, confert aquæ citrinæ pota ventrique imposita. Venit & in medicinas apostematum. Exicat catharrum usus drach. 1. in caput-purgio: mundat cerebrum, crassos vapores dissipat & corroborat. Mixta in potionibus & caput-purgiis, tollit tumores pituitosos. Miscetur & confectionibus magnis, quod maximè sit salutaris.

Terreniabin Rhafis.
Manna.
Rhaze autore l. 3. ca. 20. Terreniabin calidum est, ventremque solvit, atque guttur lenit. Et l. 9. ca. 14. Mannam, quam antiquis Mel aëreum dici ait, ad rancidinem commendat. Et c. 15. & 54. In evacuantibus medicamentis addit.

Manna
quid Avic.
Terreniabin
Siracost.
Mel Serap.
Casseram.
Avic. iudicio, Manna est omnis ros cadens super lapidem aut arborem, dulcis: coagulatus sicut mel: exiccatur sicut gummi, quemadmodum Terreniabin & Siracost, [Est Manna, quæ apud Italos in usu: Bellun.] & mel quod adfertur ex Casseram, in Reb: [Altom. Antiquus codex habet hæc Eracost, & Mel asportatum de terra Cusara sylvestri.] de singulis suo quoque capite diximus. Assumit præter suam levitatem & dulcedinem aliquid de natura & virtute eius rei, supra quam cadit. Hæc Avic. l. 1. tract. 2. c. 489. In margine annotatum Men esse commune nomen ad omnes species Mannæ. Idem cap. 496. Mel [Hassel] est liquor cadens super flores & reliqua, quod apes colligunt: estque vapor qui elevatur & maturatur in aëre, convertitur & incrasatur noctu: & mel factus decidit. Et quandoque

cadit mel sicut est in monte Chaseram. Variat secundum ea, super quæ cadit. Quod manifestum est, colligunt homines: quod verò occultum, apes. Et cap. 704. Terreniabin [Bellu. Trugibin, species Mannæ, quæ in Oriente valde in usu] est ros plurimum cadens in Coraseni [idem Serap.] in locis, quæ sunt ultra fluvium: & in nostra regione [Bochara, in Persia: Bellun.] ut plurimum cadit super Ahaagi. [Spinas, Serap.] Melus est recens, album. Est in caliditate temperatum, leniens, abstergens, confert tussi, & lenit pectus: sedat sitim & Choleram. Facile evacuat particulari proprietate. Dosis à 10 aureis ad 20. Et c. 758. Zuccarum Albusar [Sachar Alhasser.] est Manna cadens super Alhuzar veluti frusta salis. Habet cum absterfione paucam acerbicatem & amaritudinem. Vnum est iamentum album: aliud est Albagiezi ad nigredinem declinans. Est absterfivum cum acerbitate. Zuccarum Alhazar acuit visum: confert pulmone & hydropisi cum lacte Camelæ noviter fortæ: [Rhaf. cum lacte Camelino & Serap. cum lacte Mandragoræ] non facit sitim sicut reliquæ species Zuccari: quoniam eius dulcedo est parva: bonum est ventriculo & Hepati confert, renibus & vesicæ.

Serap. de dicto Zucharo: Abusar hæc scribit c. 30. Et Zuchatum Haolceri Andacani confert stomacho propter suam stipticitatem & acerbicatem: confert in doloribus renum & Vesicæ, abstergit visum Collyrio: exicat & resoluit pannum oculi [suffusionem fortè.] Haustum non sitim creat, quia pauca absterfione præditum, propter quam & hydropicis confert, potum cum lacte Mandragoræ, id est, Lafaha. [Camelæ. Avic.] Recens calidum est & humidum: Vetus calidum & siccum: Confert ventositatibus ventris, eumque lenit. Haustum cum Oleo Amygd. dulcium confert Colicæ: Vetus ex eodem phlegma stomachi abstergit, sed sitim inducit, & sanguinem crassum generat. At quod affertur ab Alienien, quod Mastici simile est vocaturque Zuchatum haolcer, prodest stomacho & hepati propter paucam amaritudinem, quæ præditum est: & à proprietate quadam confert in doloribus vesicæ ac renum, hæcque partes mundificat.

Isaac Bensulaimen, Zuchatum ex regionibus Heigen, quod est nominatum Zuchatum haolcer minus dulce est quam reliquæ species, & magis exicat. Quare non aufert sitim sicut aliæ species Zuchari: sed laudatas operationes præstat in doloribus renum: & quando bibitur cum lacte Mandragoræ idem præstat, sed efficacius & manifestius operatur, & suspectum, atque periculosum in naturis calidis.

Aabrianisa: Haolcer habet lata folia, & nascitur uno tempore anni: & habet Zuchatum quod egreditur ex oculis ramorum eius, & ab exortu foliorum eius, & homines colligunt de eo rem convenientem, in cuius zuccaro est amaritudo: & egrediuntur ab eo Mala [intelligimus nasci in ea arbore Mala] similia testiculis Camellorum: & egreditur ab illis pomis res quædam adurens, quæ non est aliud præstantius cauterium. Eadem & culicæ & pulvina implentur. Arbor eius vocatur Cbercha: cuius folia incisa emittunt lac, quod Maio collectum coriæ depilat in eo macerata. Lignum eius levè est, grossum, rectum, pulchrum, ita ut etiam Musci illud in ludicris suis canticulis brachiis & cunibus seminarum comparant. Aliud Haolcer est species Tithymalli.

Avic.
serap.

Terreniabin
bellu.
trugibin.

Delectus.
Pures.

Saccharum
Alhuzar.

Iamentum
album.

Pures.

Zuchatum
haolcer.

Zuchatum
haolcer
Mastici
simile.

Zuchatum

Haolcer
quid.

Mala
similia
testiculis
Camellorum.

Causicum.
Arbor
Cbercha.

Lignum
quid.
Haolcer
Tithymalli
species.

*Antorum
inductum
de supra
scriptum A-
rabum pla-
citum.* Haftenus Serapio & ceteri Arabes de Melle
aëreo live roris, & de Manna, satis quidem bar-
barè: quorum obiter, atque absque sensus im-
itatione (vix speramus) placita proposuimus
à nobis dedolata: quæ tamen ita obscura nobis
videntur, ut pauca certa ex iis colligi & concludi
in hac rerum obscuritate possint. Qui certa er-
vet, erit nobis magnus Apollo.

*Manna
Averroes
Terregebin* Nec prætermittendus Averroes qui lib. 5. col-
le& de Manna scribēs granulofam intelligere vi-
detur, aut certè liquidam. Aut enim: Terrege-
bin, id est, Manna, est ex speciebus antiquæ
Mannæ, quæ provenit à paribus superioribus
Synæ vel Indiz: estque similis Saccharo, in suis
virtutibus, calida & humida in primo gradu: &
eius proprietas est purgare suaviter choleram,
quamvis debilius sit aliis purgantibus: idèd da-
tur in passionibus calidis, etiam antequam ap-
pareant signa digestionis.

Audiamus quid Neoterici de iis tradant.

*Neoterico-
rum placu-
ta.* Hermolai quidem & Marcelli opiniones de
Melle aëreo, Manna & Elzomelite postea tra-
demus sub titulo Man siue Manna sacrarum lite-
rarum. Nam Hermolaus propemodum in ea est
opinione, ut credat idem esse Elzomeli & Aëro-
meli, quod tanquam à veritate alienum impro-
bat Cordus. Matth. autem scribit Hermolaum
vicinitate Elzomelitis & Aetomelitis decep-
tum, dubitasse utrum Elzomeli sit Manna.

Mannam Elzomeli esse negant Lacuna, Ruell.
Ryffius, Brassavolus, rationes autem cur non
sit, infra dicentur.

*Manna
mel ac-
utum.* Ruellius Mannam roridum vel aëreum mel es-
se ex eius dulcedine sufficienter vult constare:
mellissimumque hunc sudorem veteribus, præfer-
tim verò Galeno, Plinio & Dioscoridi, non in-
cognitum fuisse scribit: eosque magno implicari
errore qui Mannam putant Elzomeli veteribus
fuisse.

*Veteribus
non inco-
gnitum.
Error.* Crinitus lib. de honesta voluptate improbos
& ignaros vocat, qui Mannam, cuius nunc com-
munis usus, ante Galeni tempora ignotam Italiz
affirmant, addens. Tiberio imperante, Mannæ
usum à Medicis probatum, licet alio nomine ap-
pellarint: Celsum suæ sententiæ adstipulati &
Rorem Syriacum apud eum oportere intelligi,
quem Hebræorum monumenta & recentiores
Medici Mannam vocant. Dioscoridem nominare
Mannam *αἰθέρη*: & Orpheum inter thymiamata
referre. Ea autem ipsa verba Manardus citans,
in Epistolis, Criniti sententiæ adstipulari non pos-
se ait. Ac Rorè Syriacum Celsi esse vulgi Sumach:
scribendum fuisse, Rhos, voce Græca. Dios-
coridi Mannam *αἰθέρη*, eiusdem Manardi iudi-
cio, esse *αἰθέρη* Galeno apud Or-
pheum: atque exsiccationem & pulvisculum
quendam Thuris ad suffimenta idonei. Neque
igitur Celsum, neque Diosc. neque Orpheum,
quorum testimonio nititur Crinitus, id probare,
quod contendit: Tiberio scilicet Cæsare impe-
rante, Mannam hanc, quam nunc passim ad
alvum nobilium (pretiosa enim res est) lenien-
dam exhibemus, in agnitione & usu fuisse Medi-
corum. Nisi tandem fortiores rationes produ-
cat, non se ab Averroë recessurum, (ait Manar-
dus) sed Mannam hanc inter ea repositurum,
quæ post Galenum in usum venerunt Medico-
rum. Nisi fortè quispiam antiquitati favens, Mel
sylvestre, ut Svidas, vel Mel roris aut aeris, ut
Galenus, vocatum ab antiquis contendat: cui
nec nos magnopere repugnabimus.

*Mel syl-
vestre.* Idem Manardus scribit: Zuccharum Alhusar

Alhusar. est Manna cadens supra plantam Alhusar, cui
easdem vires Avic. tribuit, quas Græci suo sac-
charo. Ergo idem est cum Zuccharo Alhusar
Græcorum saccharum. Ex quibus adhuc colligit
Saccharum melleum esse rorem. Quem sic ratio-
cinantem reprehendens Cordus, vehementer se
mirari ait, ipsum suffragia ab Avic. petere, quem
utque adeò detestatur, & cuius nullam facit
autoritatem, ut pote qui se non admissurum pro-
testetur, nisi id in gratiam amici faciat. Nos verò,
insit Cordus, haud temerè Avicennam hoc di-
centem reicimus, etiam si contra nostram senten-
tiam scribere videri possit. Ideo autem hoc Ma-
nardi argumentum reicimus, quoniam per Ha-
boscer, quod idem est cum Alhusar Avic. non
eandem omnes plantam intelligunt, aliis rectam
& proceram quandam plantam, aliis certam Ti-
thymali speciem sic vocantibus. Præterea non
conveniunt inter se in definiendo zuccharo Al-
husar autores. Avic. enim dicit id Mannam esse,
quæ cadat supra plantam Alhusar. Serapio con-
tra autoritatem Abriionisæ, scribit zuccharum
Hahoscer egredi ex oculis ramorum suæ plan-
tæ, & à locis foliorum eius, hoc est, quæ folia à
planta sua & oculis nascuntur. Quare cum il-
le Mannam esse dicat, hic verò lachrymam ex
Hahoscer emanantem, nondum composita con-
troversia nullum suggerit Manardo argumentum.
Nos tamen credimus Hahoscer plantam esse,
Cannæ Sacchari non dissimilem: quæ perinde ut
Sacchari canna Saccharum ab oculis emittat: sed
sui generis & minus dulce, quam verum Saccha-
rum, atque adstrictione & amaritudine etiam
ab eo differens. Si autem contingit etiam Man-
nam supra Hahoscer cadere, poterit hæc Manna
Alhusar vocari, ut etiam Avicennæ salva maneat
fides & autoritas. Quod verò eadem sit materia
Mellis apum, Mannæ & Sacchari antiquorum,
haudquaquam concedendum putamus. Diversa
enim à Manna esse Saccharum antiquorum mate-
riam, suo loco ostendetur. Neque verò Mellis ac
Sacchari materiam rorem veteres esse credide-
runt, alioqui nequaquam *Δροσικον*, id est, Mel
roscidum vocallent. Nam dum Mannam vocant
roscidum Mel, ad differentiam Mellis apum, præsu-
munt apum Mel rore non constare ut Mannam.
Quod autem diversa sit Mellis apum materia à
rore, multæ mellis & apum proprietates palam
ostendunt. Mel enim semper quocunque veris
& æstatis tempore in floribus reperitur: Mellei
autè rores non semper, sed rarissimè apud nos de-
cidunt. Mel tam noctu, quam interdiu in flori-
bus reperitur: Melleus ros tempore tantum ma-
tutino. Mellis circa Meridiem plurimum in flo-
ribus deprehenditur: Melleus ros incalescente
Sole statim perit. Mel dum in floribus contine-
tur, semper est liquidum: Ros Melleus concre-
tus est. Mel apum in floribus continetur: Ros
melleus supra folia plantarum decedit. Mel ve-
tustatem non tantum per se ferre longam potest,
verum etiam omnia alia, quæ hoc excipiuntur in
multos annos conservare, quod Theriaca, Mi-
thridatium & alia huiusmodi confectiones clarè
ostendunt: Ros verò Melleus, hoc est Manna,
non solus quidem incorruptus unum atque alte-
rum annum durare potest, nedum alias res à cor-
ruptione tueri. Itaque in favis etiam, aut favis ex-
pressum mel, brevi corrumpetur, si melleus
ros apum mellis materiam præberet. Præterea in
Septentrionalibus regionibus maxima mellis est
copia, ut in Lithuania, Livonia & vicinis regioni-
bus, in quibus tamen rarissimi mellei rores con-
spiciuntur.

spiciuntur. Poterit si ros est mellis materia, quæ-
rimus, qui fiat quoddam hic in flores tantum deci-
dat. Cælo enim delatus in ea potius se demit-
teret, quæ lata & expansa sunt, veluti folia plan-
tarum, & minime in tantillos flores? Quoniam
verò mel non in solis plantarum, sed floribus
reperitur, atque iis non totus, sed absconditis eo-
rum anfractibus, & posteriori tantum parte at-
que recessu, haud verisimile est, mellis materiam
tote constare. Quomodo enim his præteritis
luculentis etiam foliis, in florum ultima penetra-
lia tanquam furtim irrepens atque ex industria
in latebris se abscondit recipere potest? Po-
stremo constat omnibus, qui usque ad extremam
senectutem apum naturam scrutati sunt rusticis,
apum ipsas mellificaturas, tantum è floribus col-
lectum liquorem in favis reponere. Rores verò
melleos cum decidunt, haudquaquam ad favos
convehunt: quod ipsi quoque verum esse depre-
hendimus. Præterea mellito rore delapso ad
hunc frequentes quidem convolant apes, mini-
me ut cum in alvearia revehant, sed tanquam
ad cibum & pastum: quo aded se replent, ut pror-
sus inertes & ignava reddantur, multaq; emor-
iantur. Itaque rustici dicere solent, mellitos
rores bonum quidem pastum apibus præbere, sed
ad mellificationem minime conducere. Interim
enim dum rores suavitatem allestæ cibi avidæ deti-
nentur, nihil ad alvearia convehunt. Quapropter,
nemo nobis persuadebit rorem mellis apum ma-
teriam esse. Hactenus Cordus: cuius quidem
rationes non minus manifestas quam veras cui-
quam videri facile censemus, ut plura super us
addere haud videatur necesse.

Manna Orientalis
Monacho. Non dubium est, inquiunt Monachi, quod
quantò recentior est Manna, tantò melior. Ob
id Manna Orientalis parvi sit in Italia, quia non
potest haberi ita recens ut Calabrica. Ea autem
duplex est, scilicet aërea, quæ cadit velut ros su-
per universas arbores & plantas & lapides, quam
quidem vocamus Mannam cælestem sive aë-
ream, & propriè est Mel rosis. Alia Manna est,
quæ peculiariter ex Fraxino & Orno colligitur.
Colligunt etiam Calabri quandoque Mel aë-
reum, id est, Mannam cælestem super varias
plantas & super lapides, sicut & alie gentes: sed
hoc fit rard, nec ita densatur. Manna autem aë-
rea secundum Arabes habet plures differentias,
teste etiam Mesue. Censent communiter Docto-
res, apud Arabes Terenabim & Siracost esse spe-
cies Mannæ. Siracost autem sive Xiracost, sive
Alfirecost, ut iidem Monachi tradunt, idem est:
verum de his copiose scribemus capitè proprio
de Siracost.

Ros com-
densatus
Brassavola. Brassavolus in suo examine scribit. Mannam
rorem condensatum nemo dubitare audeat. Su-
perioribus annis Februario in horto Excel. medici
Sigism. Nigrifoli cecidit: is copiam collegit, at-
que probavit. Est statutus locus in Oenotria, in
quem singulis æstatibus descendit, & ab omni-
bus passim colligitur. Neapolitani reges occlu-
dere locum, ne quis sine vefligali colligeret. Dum
locus oclusus fuit, non descendit, eo recluso &
vefligali remoto, iterum descendere cepit. Sed
& iterum clauso loco & tertio recluso & clauso
cessavit: ut necessarium fuerit, reges quibusque
permittere, ut colligere possint. Hoc mihi retulit
Illustriss. Federici regis Neapol. dignissima uxor.

Sunt autem tria Mannæ genera in Calabro so-
lo collecta. [& dictum antè quomodo Hebræorum
Manna vera sit de generibus Calabrinæ, de qui-
bus mox.

Tom. I:

Hermol. Mannam sub Elæromeli comprehen-
dit, cui consentire non possumus. Manna è cælo
descendit: Elæromeli ex arboribus spontè manat,
&c.

Bellon. libello de arbor. conf. Mellis Cedrini
duas præcipuas differentias facit: liquidum scilicet
& durum. Frequentissimam Gallis aridam
Mannam dicit quæ ex vicinis & variis montibus
petitur, aded ut huius discrimen publicè à nego-
tioribus sit cognitum. Siquidem Mannam istam
seu Rorem Cedrinum, quem in officinis asser-
vant, suis nominibus distinguunt: & alià Calabri-
nam, alià Granatam, alià Beianonam, alià
Ambrunensem dicunt: quæ inter se dissimiles
sunt. Dicit præterea variū esse durationis tempus:
aliam enim itatim post annum exolescere, li-
cūque redolere: aliā tardius corrumpi, ut ad
quinquennium adservari possit. Omnes tamen
siciori loco gaudere. Sed liquidam Mannam, no-
bis alioqui infrequentem, temperato loco non
humido nimis, nec aded calente reponi debere.
Omnium ortum in media aëris constitutione ex
rore in Vere circa principium æstatis esse consue-
visse. Mannam in Libani Cedris potiùs quam a-
liis arboribus adhærescere: sic etiam in Europa
Laricibus malle copulari. Indigenas ad Larices
summo mane festinare. Nam quam sol illuxe-
rit liquidam evadere. Hinc duas eius species
constituit: Liquidam, quam proprio nomine A-
rabico Terenabim dicit aut: hancque esse de qua
Hip. & Gal. meminerint: quàmque diversis capi-
tibus Serap. & Avic. à Manna sicci distinxerint.
Mannam itaque liquidam sive Mel Cedrinum,
cū nobis nunc nullo in pretio habeatur, am-
plius servari desistit. Mannam etiam, quia mox
friatur, magno varere solere.

Mannam, eodem tradente, Veneti aliter
quàm Galli negotiatores distinguunt, & variis
nominibus appellant. Siquidem quum merces
undecunque ad nos deferantur, varia Mannarum
genera agnoscunt: præcipuam tamen granulatam,
quam vulgè Mastichinam nominant. Alteram
Bombycinam,

Fuchsi iudicio, Mel aëreum & Ros Libani
Galappellatum non est nisi Manna Arabibus, no-
mine ab Hebræis mutato: quibusdam Ros Sy-
riacus dicitur. Duū est generum: alterum liqui-
dū, quod Arabibus Terenabim, & Hipp. Mel ce-
drinum dicitur: atque servari desistit. Alterum ari-
dum, quod hodiè asservatur in arcubus ligneis aut
vitteis, & superscriptis distinguitur nomi-
bus.

Matth. Mannam quandam liquorem sive ro-
rem suavem vocat ex aëre venientem, sublucanis
temporibus, arborum ramis & frondibus, her-
bis, lapidibus & solo interdum hærentem, qui
brevis temporis curriculo coalescens, grumolus in
Gummi morem efficitur. Huius duo tantum
genera in Italia vidisse fatetur: quorum alterum
ab orientali plaga, alterum à Calabria deferatur.
Orientalis duplicem esse speciem: præstantissi-
mam Mastichinam: vilem & adulteratam, Bom-
bycinam.

Duo quidem genera à Mauritanis diversis ca-
pitibus prodita agnoscit: Mannam nempe, & Te-
renabim: sed non aliam inter ea specierum diffe-
rentiam facit, quàm quod alia liquefcens, melli si-
milis, alia in grumos concreta videatur, quam as-
serit esse illam quæ ad nos advehitur. Quam antea
ex Brassavolæ testimonio à quodam coemptam
Melli similem diximus, Matth. censet ex eo gene-
re fuisse, quod Mauritanii Terenabim nominant.

Q 2

Hermol.

*Manna li-
quida &
dura Bellon.*

*Manna
varia.*

*Ambru-
nensis.
Duratio-
nis varia.
Id.*

*Manna li-
quida.*

Ortus.

*Manna Li-
bani.
Manna
Larice
duplex.*

*Mel cedri-
num.*

*Manna di-
stinctio Ve-
netorum.*

*Mel aëreū
& Ros Li-
bani.
Ros Syri-
acus.
Terenabim*

*Manna
descriptio
Matth.*

*Orientalis.
Calabrica.
Mastichin-
a.
Bombyci-
na.*

etiam continentur ipse Brasiliolus sententia, qui vult Mauritaniarum Terenabim esse eam Mannam, qua communiter utimur.

Mannam veteribus non innotuit. Credidit Avert. & post eum alii plures, Mannam veteribus, praesertim Galeno incognitam fuisse. Quibus illud reclamatur quod ipse Gal. l. 1. de Alim. fac. scripsit. Huius etiam meminere Arist. Theophr. Plin. & alii, ut in praecedentibus liquet. Censetque Matth. & alii multi, illam hanc ipsam intellexisse, qua hodie utimur, sed loco differentem. Idem testatur se Mannam utriusque consistentiae e coelo demissam vidisse in Comitatu Goritienli, universoque Ferratensi agro, ac circumvicinis locis, Anno à Christo nato 1546. Maio & Junio mensibus, fuisseque ipsi ambarum colligendarum amplissimam facultatem. Siquidem ea, quae Fici, Fraxini & Ornoglossi frondibus adhæserat, gummi modo concrevisset, colore candida. Atque super Amygdali, Persici ac Quercus folia deciderat, mellis modo liquefens, ab arbore defluxisset flavo colore. Quo factum esse ut facile crediderit, non sui ipsius facultate gummi modo Mannam concrecere, sed foliorum, in quibus delapsa recumbit. Quare ab Arabibus diligentissime perspectam, utriusque Mannæ historiam diversis per capitibus suis monumentis prodidisse. Cecidit quoque, eodem notante, e coelo Manna admodum copiosa, Mastiches grumis similis, agro Tridentino, in Ananienlibus montibus, & praesertim super Larices arbores: quo fit, inquit, ut hinc & ex cæteris manifestè deprehendatur, non parum Altomaram aberrare, qui contendat, Mannam quæ in Apulia & Calabria legitur, e coelo haudquaquam cadere, sed ex planta exfudasse. Cæterum ex his, qui Thuris Mannam crediderunt esse Coelestem, unum Crinitum Florentinum notat, in cuius censuram Manardus epistolam conscripsit, de qua re supra. Veruntamen veniam illi dandam putat Matth. cum & Serapio Thuris Mannam cum coelesti ineptè confunderit.

Manna Lacuna. Lacunæ in com. in Dioscor. Manna est vapor valde crassus & suavis, qui interdum elevatur vi Solis, & noctu concrefens, condensatus descendit supra herbas, supra folia & ramos mukarum arborum, & tandem supra petras: Congelaturque, instar gummi. Praesertur quæ in folia arborum cadit, quæ tota est granulosa, alba, dulcis, gustui grata, similis minimis granis Mastiches: hinc dicta Manna Mastichina, licet dicatur etiam Manna foliorum. Secunda est, quæ desidet in ramis. Detrior quæ cadit supra petras: grana sunt valde crassa, coloris obscuri, nec saporis ita grati.

Optima Manna deservit communiter Venetias ex Oriente. Advenit etiam ex Calabria Romam, tantæ bonitatis, ut possit conferri cum Orientali. Terenabim Arabum eiusdem Lacunæ iudicio est species Mannæ liquidæ, qualis in monte Libano. Melior in foliis Fraxini & Populi, quam in aliis arboribus. In Persiciis & Amygdalis non cogitur in grana.

Sive liquida sit sive arida, eligendam fædet Fuchs. albam, recentem, dulcem, puram & excrementorum expervem, ex stirpibus odoratis & salubribus collectam. Est quæ statim post annum exolefcit & firmam redoleat. Alia tardius corrumpitur, ut ad quinquennium adservari possit. Omnes fictioni loco gaudent. Mala cineritia: pessima fæca, cænosa, antiqua. Hæc tempore exolefcit, dolūque prodit. Amato quoque Manna est ros melleus condensatus: qui tria genera fa-

cit: Calabricam, de qua postea: Orientalem; quam aliquando granulofam esse dicit, & absolutè Arabibus Mannam dictam: aliquando liquidam, iisdem Terenabim Manna, inquit idem, multis in locis hodie super arboribus cadit, ut apud Rhagufum: ubi quoque colligitur, & Venetias & Anconam adfertur.

Suidas sylvestre Mel e coelo cadens appellat, de quo & Pomponius videtur scripsisse in sua Cosmog. præcipuè in Indiarum descriptione, quum ait: India tam pinguis alicubi, & tam feracis soli, ut in ea Mella frondibus defluant.

Manuel Ciriuius nobilis Belga & Lusit. Regi à negotiis, eodem referente narravit, Portugalenses rusticos invenire solitos super arborum foliis rorem melleum, qui mox in speciem sacchari condensaretur: qui quidem ros, quoties [non enim quotannis defluebat] e coelo descenderet felicitatem illius anni insignem prælagiebat.

Manna, inquit Aconsta, de qua tot docti viri scripsere, invenitur in Vzbeche maiore trium generum: vnde ferunt Ormuz & in totam Indiam. Sunt & aliz duæ species præter Calabrinam. Manna autem non est medicamentum novum aut incognitum antiquis, quamvis minori in usu, quam apud Arabes. Serapio eam confundit cum Manna Græcorum. Fuchsius verò eius usus tollere vult, sed pauca cum ratione: cum sanè in usu medico multi sit facienda.

Sed placet & Altomari diligentis scriptoris placita de Manna notabilia producere. Nam peculiararem opinionem habet de eius generatione. Rationi consentaneum, inquit ille, ut quibusdam etiam particularibus aëris constitutionibus, serenitamen semper, ac tranquillis existentibus, liquor quidam suavis, melleæ consistentiæ, rorique similis, nec non res quædam sacchari, seu gummi similitudinem præ se ferens, pruinae instar, generetur, crassiusculis quibusdam, interire etiam & lentis e terra vaporibus, atque aqua diurno tempore à solis calore sublatis, exacteque tenuatis ac coctis: Et deinde supervenientis noctis frigore concretis seu congelatis, ac deorsum decidentibus. Qua ratione liquidam incertim Mannam generari rori similem, quam roscidum seu roridum mel, aut saltem eidem simile, appellare licebit: interdum concretam atque congelatam, sacchato, seu gummi similem, pruinae instar, quam roridum saccharum iure appellare poterimus: seu mauiis pruinosum, cum pruinae magis quam rori similis sit, eidemque in eius generatione respondeat.

Hanc suam opinionem non modò ponit ita Altomarus, sed insuper quæstiones quasdam, eam illustrantes proponit ac soluit. Cum ros, inquit, in temperie, ac temperatis locis magis generetur, pruina verò in frigidioribus: & liquida manna seu mel roscidum, rori: concretum verò, & quæ coagulata est, pruinae correspondeat, haud temerè quis quæret, num eodem anni tempore, eodemque loco ambo generari valeant? Respondet, ita: quòd, quamvis uterque halitus seu vapor, ex quo tam liquida, quam concreta manna generatur, à Solis & diurno calore, ut dictum, subleventur, atque à supervenientis noctis frigore prope terram infrigidatus ac concretus tandem decendat, quemadmodum de rore & pruina dictum est: Dissilient tamen inter se maioris rariorisve ratione. Nam, sicut, cum exiguum fuerit noctis supervenientis frigus, quemadmodum magis generatur, perinde etiam & liquidum, roscidum, aëreumque mel, potissimum gignitur

Locus:

Aristot.
Suida, &
Pompon.Manna
Portugal.

Praefigium

Manna d-
costa tria
genera in-
dica.Serapio
not.
Fuchs. rei
proh.Altomarus
de manna
generatio-
ne.

Melosidum

Roridum
saccharum:Pruinosum
saccharum.An in-
tra
quæ Manna
eodem tem-
pore, locis
generetur.

gignitur: si verò maius fuerit superuenientis noctis frigus, congelatus idem vapor à maiori frigore, priusquam in liquidam & melleam substantiam convertatur, concreta Manna, pruina seu etiam nivi similis procreatur. Etenim maioris frigiditatis est congelascere, teste Aristotele. Quapropter in temperatis etiam natura locis, ac etiam calidis & æstate nihil impedit, quominus quandoque pruina generari possit, particulari cœli statu (superueniente nocte) frigidiori existente, & ob eandem etiam causam coagulata Manna seu congelata similiter eodem in loco, eodemque anni tempore, diversis tamen noctibus, sicut & liquida generari poterit: quamvis ros in temperie atque temperatis locis: pruina verò hyeme & hyemalibus locis magis fieri videatur. Nam idem operari poterit particularis aeris constitutio frigida, quod regio seu anni tempus frigidum. At si fixeris, ex Solis calore, æstate præsertim, extenuatos & coctos adeò fuisse prius, ob calidam & siccam aeris intemperiem, sublatis vaporibus, ut concrelescere amplius, seu congelascere pruina instar, à sequentis noctis frigiditate, etiam valida existente, haudquaquam valeant adeò ut concreta manna fieri possit: Respondet ille, non modò non impedire, sed conferre admodum ad promptiorem, celeriore, maioremque coagulationem seu præcalesctos vapores seu halitus. Etenim citius ob eorum tenuitatem ac impenitus à sequentis noctis frigore infrigidantur, & propterea congelantur: Quemadmodum si qui voluerint, citius aquam refrigerare, Soli primò exponunt, & qui circa Pontum habitant, cum in glacie habitacula faciunt ad piscium venationes, (venantur enim intercidentes glaciem) aquam calamis calidam circumfundunt, propterea quòd citius coagulatur: ita ex præcalesctis à Solis & diurno calore vaporibus, & deinde à seq. noctis frigore congelatis, nihil impedit, quominus concreta Manna æstatis tempore generari possit, quæ admodum ex ipsis concretis à paucò frigore mel toridum sit eadem in regione, eodemque anni tempore, modò frigidior superveniat cœli status in seq. nocte. Quinimò & æstate magis, ubi eandem, quam diximus, servauerit constitutionem. Ex dictis colligit, quod, veluti materia ex qua roscidum seu aereum mel generatur, eiusdem est cum rore generis, [ex Gal. lib. 3. de alim.] ita etiam ea, ex qua Manna concreta, quam toridam vocant, eiusdem est cum pruina generis, [etiam ex Arist. autoritate: qui lib. de Mundo ait, pruina nihil aliud esse quàm rorem concretum:] Et licet Mannæ congelatio à lapidibus seu plantis, in quibus reperitur quodammodo possit invari: eius tamen præcipuam coalescentiam ab aeris ambientis frigiditate causari: esse enim eius generationem nivi seu pruina similem, uti dictum, quamvis non tantam exigit frigiditatem, quòd eius materia lenta sit, quippe quæ à Solis calore prius sublata extenuata ac demum cocta sit: proinde citius coagulationem admittit à subsequente noctis frigore minus immodico. Mox addit: Cū è cœlo ambo hi liquores proveniāt, tam liquidus videlicet, quàm concretus, necessariò sequitur, quòd non in quibusdam eiusdem generis plantis, sed indifferēter in omnibus, tum arboribus, tum fruticibus ac reliquis plantis, simulque lapidibus ac terra eiusdem loci decidat, quamvis boni malive quiddam ex plantis, in quibus colligitur, ipsi accidere possit, & in quibusdam magis, in quibusdam verò minus servari valeat. At si obiciat aliquis: si à frigore utraque

prædicta manna generetur, quā fieri possit ut dulcis sit, temperatèque calida, ac alvum solvat, ut omnes Medici uno ore fatentur? Respond. quòd, quamvis à frigore concrelescant sublatis halitus seu vapores, ex quibus utraque Manna generatur: à Solis tamen calore prius fuere attenuati & concocti, aliàs elevari haudquaquam potuissent: idè et si concretio à frigore eis accidat, earum tamen materia calida est & humida, cuius etiam temperaturæ manet utraque Manna ex eis genita. Similem etenim habet generationem ac pinguedo, quæ & ipsa dulcis ac moderatè calida est, quamvis à frigore concrelescat, uti Gal. voluit. Quòd verò in calidis regionibus, temporeque anni calidiore aer frigidior esse possit in nocte, quàm terra in sua superficie, & terrena omnia corpora, particulari potissimum constitutione frigida existente, hac ratione confirmat. Quemadmodum ex præcedentis diei calore impenitus ob eius tenuitatem ac citius fuit calefactus aer, pari ratione à sequentis noctis frigore impenitus ac citius refrigerabitur, quod tamen terræ ac terrenis corporibus non contingit. Sed & radiorum Solis reflexio die facta efficacius imprimitur terræ, tanquam corpori solido, quàm aeri: ita ut diutius illi quàm huic inhaereat, adeò etiam ut vix tota etiam nocte evanescat. Ad quod respexisse videtur Plin. quando ait Mannam liquidam ac toridam sublucanis maximè temporibus primæque aurora decidere, quo tempore præcipue frigus intenditur: quod nos etiam de concreto & torido intelligimus. Est enim eo tempore aer frigidior, cū ob Solis diuturniorem absentiam, tum quòd eodem iterum appropinquante è terra sublatis frigidi vapores uniantur ac desentur magis. Quamobrem Mannam, quam vocant aeream, concretam & coagulata è cœlo delapsam proculdubio in aere, & nō in locis in quibus reperitur, concrelescere ac coagulati concludit. Conferre tamen locos in quibus colligitur aliquid saltem ad eius conservationem, ita ut in quibusdam plantis, terris, seu lapidibus melius quàm in aliis quibusdam conservetur, licet, uti dictum, & ex Mesve ostensum, indifferenter in universis tum arboribus, tum lapidibus in ea regione decidat, in qua generatur, & non in quibusdam speciebus duntaxat, aut certis eiusdem speciei arboribus, ut quidam falsè imaginantur.

Cæterum eiusdem Altomari iudicio de coagulata Manna inter Græcos, quos ille legerit, nemo est qui meminerit, quicquid alij sentiant: nisi quispiam velit Actuarium de hac Manna intelligere voluisse, cū ait: perquàm moderatè purgant Cassia nigra & Manna: Cassia quidem tribus aut quatuor drachmis sumpta, vix moueret alvum: Manna verò etiam maiore modo quàm Cassia sumenda est, & flavam bilem simplici ratione pellit.

Videntur autem Arist. Theoph. & eum sequutus Plin. in suprâ citatis verbis liquidam Mannam seu roscidum mel intellexisse, vel eiusdem Altomari sententia. De coagulato verò solos Arabes scripsisse censet. Ex Galeni verò verbis ex 3. de alim. citatis, quilibet, ut idem annotat, vel parum in eius doctrina exercitatus percipere poterit, de liquido ac aereo melle, non simili eundem verba facere, & non de ea liquida Manna quam Terenibin Serapio & Avic. appellant: neque de coagulato melle, quod Manna appellatur, & saccharo seu granulis simile est.

In regno Neapolitano, inquit Altomarus, pluribus in locis sæpe liquidam & melleæ consisten-

Congelata seu coagulata Manna.

Obiectio.

Solutio.

Observatio de aqua congelatione.

Solutio.

Manna in aere con-
crelescere.

Quorundam error.

Manna coagulata Altomari confer veteres res non memisse.

Theoph. & Plin. Manna.

Arabes Manna.

Terenibin.

Manna cadere su-
pra res multo magis
provenire.

Accipere a-
liquam mæn-
nam ab eo
quod co-
dit.

HISTORIAE PLANTARVM.

sic Mannam instar rosis decidere supra folia ac ramos nonnullarum arborum : nec non super herbas & lapides , à quamplurimis rusticis nec paucis nobilibus intelleximus : verum adeo noxiam esse retulerunt plantis super quas decidit , ut protinus earum folia marcescant. Hanc vno ore fatentur oēs super universas indifferenter arbores , plantas seu herbas ac lapides cadere , iis in regionibus , in quibus decidit : quam tanquam nullius usus , parvis facientes , minimè colligunt.

Tereniabin antiquorum quod de cælo cadat minimè habere videmur. Altomarus sanè neutrum Tereniabin , hoc est , nec coagulatum nec liquidum in Regno Neapol. cadere putat , aut valde exiguum , idque rarissimè , & non quotannis , potissimum concretum & coagulatum. Liquidum verò aut non omnino reperiri , aut , si quod reperitur , quod non concrecat , ut dictum , id non esse eiusdem speciei ac facultatis , cuius Arabes Tereniabin esse fatentur , neque eiusdem notas habere. Traditque prætereos qui coagulatum Mannam colligunt , tanquam inutilem eam derelinquere , eamque segetes , in quotquot incidit , protinus tæbe quadam , veluti rubigine perimere , quod sanè nequaquam de Tereniabin Arabes scripsere.

Rob. Const. in Lexico duo Mannæ genera agnoscit : *Granulosam* , ut vocant , vel potius granulosam cum Plinio , cui purgatrix vis inest , ut Celsus : quamq ; quod Mastichæ similis , in offic. Mannam Mastichinam dixere. Alteram *Liquidam* , nunc etiam voce tamen prisca Tereniabin in Arabia nuncupatam. Vtramque ex arboribus legi ait , sed concretam tantum afferri : Et liquidam præcipue illud esse *αἰθέριον μέλι* Hippoc. quod Quercubus insidere ex auctoritate Hesiodi Theophrastus dixit , & quod *εἰς ὅλην τὴν αἰθῆρα* & *χυλὸν τὴν αἰθῆρα* vocatur. Apoll. rad. i. supra triphoram Persicam : Ad nos , inquit , tria Mannæ genera asportantur. Vna ex Orientalibus locis : altera ex Calabro solo : tertia ex Brigantio. Orientalis duplex videtur : altera Mastichina : altera Bambacina. Calabrica triplex : de quibus postea. Eiusdem iudicio absolute nullo pacto dici potest , aut Manna , aut Tereniabin , hoc liquidum ut mel concretum , illud grumosum , aut è contra , ut Brasauolus rusch. & Matth. diversimodè sentiunt.

Garcias quinque videtur statuere Mannæ genere. 1. ex Vsbeque provincia. 2. Quæ in Carduis. 3. Calabrinæ similem. 4. Calabrinam. 5. Meli similem. Ex quibus colligitur , eum Mannam Calabrinam à Calabrinæ simili diversam agnoscere : Simile namque non est idem , & in omni similitudine aliqua diversitas.

Cæsalpinus apud Indos plura Mannæ genera esse tradit , quæ nequaquam ferantur ad nos. Quendam tradunt ex arboribus destillantem rosis modo , vtrius collectam , sapore faui Mellis , quam *Siracost* vocant. Alteram granulis Coriandri similibus addensatam , colore ruffo , quam ex capitibus Cardui cuiusdam decutiunt : & *Tereniabin* vocant. Tertiã grandioribus glebis , ut plurimum foliis admixtam , similem Calabriensi , quam *magni faciunt*. Quartam Mellis albi purgati similitudine , quæ citò corrumpitur , nisi vasis vitreis condatur , quibus ea gens caret.

Colligitur , eodem notante , & apud Italos in Apennino diebus canicularibus & serenis promissè in pluribus arboribus , sed præcipue in Quercu , & Salice : nunc concreta , similis Cal-

briensi : nunc liquidior melli similis , quod **Grecis** Aeromeli vocatur , Mel aerium , Mel roscidum : de quo Gal. Theoph. Plin. Verùm , ut Gal. Elzomelitis non meminit , sic Diosc. Aeromelitis , quamvis vtrique tribuatur vis purgandi bilem & cruditates. Sed de Elzomelite alio loco à nobis traditum. Idem Cæsalp. statuit Mesuem & Avic. nomine Mannæ quodcunque genus intelligere , quod Mannæ eadem tribuant , quæ Serapio Tereniabin : apud quem hæ voces differre videntur , cum diversis locis agat de Manna & Tereniabin : Mannamque eam dicat , quæ in grumos concreta : Tereniabin verò illam , quæ similis Melli. Sed hæc parvi sunt momenti. Illud potius disquirendum , an Manna quæ vimur sit inter genera Mellis ærei , an proprius succus fraxini & Orni ? Id contendere nituntur quidam ex recentioribus. 1. Quoniam Ros promiscuè super omnes plantas , lapides & terram decidit. At Manna Calabriensis solum in Orni & Fraxinis reperitur , idque nō in omnibus , sed in quibusdam. Præterea , quia Manna ea ex vulnere arboris emanat : Ros autem exterius ex Aëre adhæret : Sicut & experimento liquet : linteo enim arbori superextenso , quod rorem cadentem excipiat , reperitur nihilominus Manna ex arbore emanans , nulla autem in linteo. Tandem quoniam multum differt à Manna prædicta , rosis concretio in mellis substantiam : ros enim frigore noctis concrecit : ac Sole aut alia caliditate aduentante , solvitur , ut putant : Manna autem nostra , ut succus , concrecit à calido & succo : meridie enim colligunt magis densatam.

Hæc & alia huiusmodi sunt , quibus Manna nostra à genere Mellis ærei , & Manna Arabum explodunt , ac Fraxini & Orni propriam quandam lachrymam censent. Sed de Manna nostra & aliis differentiis postea specialius. Nunc enim generalia tantum persequimur. Pamphilus Hecylacus de aquarum natura l. i. c. 7. Ros inquit , in aliqua regione condensatur in Mannam , vel in mel rosis. Item cap. 15. Circa procreationem Mannæ & Mellis rosis diuersæ sunt opiniones Philosophorum : Hanc veritatem puto , vñ cum vaporibus commisceri terrestris siccum , pro materiali eorum causa , non vno modo : vnde diversa composita producantur : in melle verò crassioris , commistio hæc , non est congelatio , sed coagulatio. Non ignorare autem decet Mannam , quæ talis in usu est , ut plurimum non esse rosè de cælo cadentem : sed facticiam , vel gummi quod colligitur in Orno & Fraxino circa Romam & in Calabria.

Cæterum Adversaria de Mannæ origine sic statuunt. Eximium sanè nature opus , ac mirabilitatis plenum : nec valde ut idem tradunt , antiquis notum. Indicium est quod paucis & vacillatibus verbis illius meminerint , nec quantum esset ad purgandam salubritatis monuerint. Theophrast. siquidem ex Hesiodo & Aristotele succum mellitum ex æthere Quercubus sive Robori illapsum putat : qualem Galenus proventu portentoso è Libani arboribus excussis memorat , & Celsus Syriacum Mel vocat : qui omnes (præterquam experientissimus senex Hippocr. qui non æereum sed Cedrinam mel vocat) persuasi fuisse videntur aliud esse Manna istud , quàm roridum ex humo in æthera subiectum interdu , vi & calore siderum , vapidum spiritum , qui reduci nocte occurrentis frigori liquor resiliens & quasi stillantiis factus , arbores , telluremque rursus , horis antelucanis præsertim ardet.

Quam

*Manna
liquida
plantis no-
xia.*

*Terenia-
bin æque-
rum non
habere.*

*Manna
granulosa
Manna
Mastich-
ina.*

*Cedrinum
Mel Hip-
poc.*

Orientalis

*Calabrica
Briganti-
na.*

*Orientalis
duplex.
Calabrica
triplex.*

*Quinque
genera.*

*Manna ge-
nera apud
Indos. 1.*

*Siracost. 2.
Carduina
feu Tere-
niabin.*

*Melli ad-
mixta.
Melli sa-
cis.*

*Manna in
promissi da-
gila.*

Aeromeli.

*An Manna
qua Græci
sit inter ge-
nera Mellis
ærei.*

Experimentum.

*Generatio
Mannæ &
Mellis ro-
ris.*

*Manna i-
talica sa-
cis.
Gummi
Fraxini.*

*Manna
mundi pro-
bè cognitam
fuisse pra-
ter.*

*Succus
Mellis
Hesiod. l.
v. c. 7.*

*Syriacum
mel Celsi.*

*Cedrinum
Mel Hipp.*

*Manna
generatio
secundum
Græcos.*

Advers. Quam opinionem, ut improbare nolumus: ita etiam sequi, nescio quo modo, renuit animus. Quisnam enim tenuitatis tantæ, partim æreæ,

(cuiusmodi ros esse videtur) destillatius liquor illic vel imbecillis Auroræ radiis diffusi in auras solitus, possit in grumos masticheos, gummosos, farinaceos, emplasticos, solidos & densos abire? Quin Manna etiam calidiuscula est, gravis ac pinguis, & soluta non aded facilis. Imò soluta, liquori calido, non uti mel, aut saccharum, mixta, perstat, sed plurima, quasi aqueum respuens liquorem, resinae gummi & Caphuræ factiæ modo rursum coit, & collecta vasis lateribus adheret. At imbrum celestium proles nix, grando, pruina, gelu, ros, omnia frigida, neuiquam pinguis, sed facillimè vel calore, vel humore solvuntur, nec quicquam pinguis vestigijs relinquunt. Quare suspicio magna est,

Manna non æreum esse rorem, quem refrigerando temperandoque diurnum æstum natura comparat: sed succum, vaporèque vivificum cuiuslibet tum arbori tum herbæ insitum iam per soles tempestivæ & genitabiles maturitatem assequuntur: qui extillans, expiransque interdum trans latentes corticis superficieique meatus, in auras à sole fervido dissipatur, noctu vero cum rose consueto illabente permiscetur, qui parum obstat ne dissipetur, partim seipsum unà fermentat, ita, ut in amicam naturam unà coeant, ac demùm quippiam consent medix inter mel & Saccharum naturæ: quod quispiam

MELIS ACOCHARI vocare possit. Istud paradoxum confirmat eorum diligentia Pharmacopœorum, qui in ramis magnis præcis Laricis & Fraxini, inque vinariam cellam, quo æstatis tempore Manna colligi solitum est, asportatis, Manna postero die, tametsi non pennde nitidum, conspectum sibi affirmarunt. Quod etiam minùs mirum videatur illis, qui sciunt Rori communi deciduo purgatoriam vim inesse, non à se, sed à foliis herbarum, quæ abluuntur & absterguntur ab illo. Sicut Brassicæ foliis & Rosarum rorem exceptum, detergente, nitroso & laxante succo, magis lubricare certum. Eapropterque consultè huic infundunt Rosas nonnulli ad Syrupum Rosarum ex infusionibus. Quare cum quilibet observare possit post ramos & truncos avulsosve furculos, vel etiam radices Laricis, Pinæ, Juniperi, & aliarum gummosarum aut tederarum arborum, gummi, lacrymas & micæ etiamnum in superficie congeri atque concrecere, quas idè propter similitudinem Manna Tbari Græci: Rustici autem Narbonenses Metaphoricè in Junipero & Teda glaciem, Galli Vernicem vocant, poterit secum perpendere idem Larici, Ornoglossi, Amygladæ, Prunis ac aliis quam plurimis, usu venire posse. Ab eo etiam

[habent præterea Advers.] quod de æleomele Narbonensi dictum in Olea Æthiopica magis sulcitur hæc persvasio: alioqui & rara observatio est, neque à quoquam recentiorum literis prodita: quin potius à nonnullis quasi fabula fore excepta, nec ipsimet assentiri recensitioni nisi essemus, nisi oculis manibusque id compellissemus in Provincia Narbonensi maritima, non procul Monspelio, urbe tam lauta quam nobili. In paulò post subdunt. Istud nostrate porro nos

quæ utriusque naturæ Cinnum & particeps plurimarborum genitabili saliva savi, atque ex madore qui cuiuslibet inest pro sua natura plantæ varius, constare putamus. Cui dum occurrit noctis

periodus ætheris frigidiuscula, quemadmodum tunc coacto in Æthere, vel aere, vapore, aqueum facit Rorem vocatum: sic in arboris superficie cogendo & addensando expirantem per latentes poros mellitam exhalationem, sistit inibi Manna. Quæ eadem causa efficit, ut Ficus suos fructus noctu maturare verè dicatur, non autem lunæ calor, ut quosdam statuisse scribit Plutarchus, siquidem illi noctu silente æquè benè maturitatem assequuntur fructus, ut in Ficus historia abundè declaratum. Ac hanc quidem sententiã, insunt eadem Advers. de generatione Mannæ, cæteris probabiliorem ob rationes adductas putabimus, dum prodeat aliquis qui his certiora vel manifestiora declarare possit.

Nunc reliquas Mannæ & aerei Mellis vires ex veteribus persequamur. Ac ex cæteris quidem Arabibus pleræque traditæ suprâ, ob naturæ & historiarum diversitatem ad differentias & descriptiones facientes: nunc verò & Messem audiamus: & post Actuarium, & Neotericos quosdam.

Mel [inquit, cap de Manna] est Ros frigore noctis æstivæ concretus, ex halitibus à terra & aquis Solis calore sublatis æstate, id est, die calido sicco, ac deinde exactè tenuatis & coctis. Manna eidem est ros ex vapore elato, & cocto in aere temperato, secundo, lætis aspectibus cadens super quasdam plantas & lapides, à quibus duz ipsius differentie statuuntur. Quæ enim lapidibus incidit, guttarum aut seminis modo coagulatur: quæ si recens, dulcis, alba aut saltem subcitrina, est melior. Mala verò antiqua, fusca, cænoza. Quæ plantis, harum tum facultatem aliquam assumit, tum foliis & floribus est permista, neque id nimis: quæ si præterea recens est, & subalbida, est melior. Temperata est, aut paulò calidior: [calida humida primo gradu Averrois] guttur, thoracem, ventriculum lenit, terget: bilem clementer purgat, siim sedat. Adulteratur saccharo, & folliculis fennæ: sed hæc tempore maturari eget: dumque mollescit & liquefit, dolum prodit. Quoniam uerò imbecilliter vacuat, præsertim cruda (cocta enim citius agit) thymo & hyssopo, vel alio, vis eius, ut Cassia, intenditur. Valentibus autem medicamentis mista, eorum actionem reddit meliorem, cum suo dulci sapore illa naturæ magis familiaria reddat. Ob id eam Galenus Scammonio miscuit, [Mel, rem Mannæ congenetem miscuit Gal. Vbi autem manna, non legimus, nisi in libris falsò illi adscriptis: Sylv.] quod à posterioribus est laudatum: alii Turbith, alii aliis. Datur à drach. sex ad drach. quindecim. Annum servatur.

Perquam moderatè purgant Cassia nigra & Manna, prodente Actuário, præbentur utramque quibus potentiùs medicamen aliud dari non potest: nimirum pueris & foeminis utero gerentibus commoditate quadam & necessitate urgente representamus, & iis: in quibus exuperans febris reliquorum medicaminum alus respuit.

Datur, monente fuchio, iisdem quibus Cassia nigra, sed maiori pondere quam Cassia. Datur enim ab uncia una ad uncias tres, quamvis Mesue infra sescunciam consistat. Idem porro Fuchius levem aut ferè nullam solvendi aliumque subducendi vim tribuit: quod iis compertum esse ait, qui iuxta Libanum fuerunt. Reserte namque indigenas eius montis, quæ abundè ea uentur, nihil tamen laci, aut alvumlibi quoquo pacto subduci sentire, sed ea tanquam obsonio nutiri. Quapropter cum melli

Q. 4

Q. 4

Q. 4

Q. 4

Q. 4

Q. 4

Q. 4

Q. 4

Q. 4

Q. 4

Q. 4

Q. 4

Q. 4

modo similem facultatem habere con-
 sideret ea nos carituros oenset, modò peregrini
 admiratione non ita duceremur, neque
 contemptis nostratibus è longinquis alla-
 uti potius, quàm iis quæ nostris in hortis pro-
 unt, mallems. Atque stultitiz nostræ, te-
 merè sumptus immodicos facientes, condignas
 nos dare pœnas concludit. Pater itaque Fu-
 chsium Mannæ vsum prorsus è medio tollere.
 Sed rationes quas affert, non sunt eius momenti,
 quibus persuaderi debeamus: quapropter cum
 Matth. cogimur in hac eius sententiæ refragari.
 Nam quòd Manna alvum subducatur, & eam qui-
 dem innocuè, non solum conuenit inter auto-
 res, qui hæcenus de ea scripserunt, sed ita etiam
 quotidiana experientia docet. Siquidem dua-
 rum & semis vnciarum pondere data alvum per-
 bellè deiecit, & privatim bilem educit. Quod
 verò de indigenis Libani montis scribit, quis
 tam facile illi credet, cum nos quotidie contra-
 rium experiamur? Aut, si maximè etiam verum
 sit, quod narrat, (nolimus enim cuiusquam fidei
 temerè derogare) illud consuetudini tribuen-
 dum censemus. Ab assuetis enim non fit passio,
 ut tradunt philosophi. Et Medicis haud inso-
 lens est, medicamenta benigniora longa con-
 suetudine alimentorum vices subire. Deinde
 non est de medicamento benigni natura, lædere,
 sed iuvare: quod Manna utique præstat blandè
 alvum subducendo. Quid si suspicemur Man-
 nam Libani esse peculiarem quandam speciem:
 quæ si non purget, non idè sequitur, alia
 Mannæ genera (quæ diuersa esse ex superiori-
 bus liquet) non purgare. Quapropter secu-
 riùs & generalius, quàm par erat, de omni Man-
 na id pronunciauit Fuchsius: quod Arabum o-
 dio, more suo, eum fecisse, non temerè fortè
 quis suspicetur.

Sylvius putat nos idè transcendere Mannæ
 dosim à Mesue præscriptam, quòd nostra Manna
 fortè imbecillior sit, aut etiam adulterata. Quod
 quamvis de imbecillitate concedi potest: de adul-
 terio tamen non debet. Nam qua tandem re a-
 adulterari queat ut mitior evadat, & faciem non
 mutet? Adulterium virium acuendarum potius
 causa accedit, ut de Calabrica tradit, eam scam-
 monii diluto commisceri. Putamus tamen Syl-
 vium intelligere Mannam Larignam, in Gallia
 vulgarem, quæ proculdubio diuersa à Mesuei
 Manna.

Cassius.

Lud. Duretus in notis ad Holler. de morb. in-
 ter. ubi Holerius Mannam in Colica biliosa præ-
 scribit, annotat: Mannam tutò exhiberi non
 posse, quòd eiusmodi Colici ferè sint *πυρετικοί*.
Duretus & Alomer. Ac sanè idem sentire videtur Alomerus. At no-
 bis: aliud videtur exhibere medicamentum pur-
 gans dulce, aliud cibos dulces. Si Manna edu-
 cit bilem Colicam excitantem, non generabit.
 Ergo etiam non nocebit etiam si sint *πυρετικοί*
 qui assumunt. Verùm hic opus est diligentiori
 consideratione.

MAN SIVE MANNA SACRARVM LITERARVM, SIVE ISRAELITARVM.

HACTENUS de Manna, Melle aëreo & Tere-
 niabin in genere: nunc de differentiis spe-
 cialiùs tradamus, exors à Manna sacris literis ce-
 lebrata. Exodi 16. legimus, Ab Elimo profectam
 omnia Israëlitarum multitudinem in Sinem so-
 litudinem, positam inter Elimum & Sinam, per-

venisse quintodecimo die secundi mensis, à
 quo Ægypto excesserant. Ibi vulgò Israëlitas
 in Mosem & Aharonem fremuisse: optare se, si
 fieri posset, ut in Ægypto à Iehova essent occisi,
 cum ollis carniū assiderent, cum panem ad sa-
 tietatem comessent: nunc in eam esse solitudi-
 nem ab illis adductos, ubi tota illa multitudo
 fame conficeretur. At Iehovam Mosi denuncia-
 se, sese illis panem platurum esse de celo, cuius
 singulis diebus certum modum egressi collige-
 rent, ut eorum periculum faceret, utrum ex sua
 lege victuri essent, nec ne. Sexto autem die cu-
 rarent, ut quod ad se importarent, id duplo am-
 plius esset, quàm quantum reliquis diebus con-
 suessent. Et Mosem atque Aharonem ad omnes
 Israëlitas verba fecisse, eos & vespere se à Iehova
 ex Ægypto eductos esse cognituros, & manè
 etiam eius claritatem spectaturos, postquam illo-
 rum in se fremitus audivisset. Nam se quidem ta-
 les non esse, ut de se exposulare debeant. Ad
 Iehovam hanc querimoniam, non ad se spectare.
 Tum verò Mosem mandasse Aharoni, ut univer-
 sam Israelitarum multitudinem iuberet in Ie-
 hovæ conspectum accedere, qui eorum queri-
 monias audiverit. Atque Aharonem ad univer-
 sam multitudinem verba faciente, eam ip-
 sam, Iehovæ splendorem in nube conspe-
 xisse, cum Mose colloquentis in hunc mo-
 dum. Audi vi fremitus Israëlitarum: renuntiato
 eis, sub vespere comeduros carnem, & ma-
 nè satiandos esse pane, cogniturosque quan-
 tus eorum Deus Iehova sit. Igitur vespere
 exortas cothurnices, ut castra obtegerent.
 Manè autem circum castra, solum conistratum
 fuisse rore: qui ubi ros evanuit, conspectum
 fuisse quiddam in superficie ipsius deserti minu-
 tum, rotundum, tenue, perinde ac si pruinâ esset
 conspersa humus. Eo viso, Israëlitas sic inter sese
 dixisse. Manhu? quid hoc? neque enim
 sciuisse quid esset. His Mosem respondisse: Hic
 panis est, quem vobis Iehova dat ad victum, de
 quo ita præcepit, ut colligatis ex eo, quantum
 cuique opus erit ad victum, videlicet gomitem
 in singula capita, in ratione numeri eorum,
 qui sunt in cuiusque contubernio. Id quod illi
 fecerunt, collegeruntque partim largius, par-
 tim parcius. Sed cum gomere metirentur, he-
 que *■*, qui plus collegerat, supererat, neque ei
 qui minus, deerat: tantumque quisque college-
 rat, quantum ei ad victum opus erat. Interdi-
 xerat autem Moyses, ne quis ex eo reliquum fa-
 ceret in crastinum. Cuius præcepto neglecto,
 nonnulli reservarunt. Sed id enatis vermibus
 fœtebat. His cum Moyses succensusset, collige-
 bant deinceps singulis matutinis, quod cuiusque
 victui satis esset: postea calescente sole lique-
 bat. At sexto die duplicem victum collegerunt,
 videlicet duos gomeres in singulos. Id cum om-
 nes civitatis magistratus ad Mosem retulis-
 sent: respondit illud ipsum denunciatum esse à
 Iehova. Postridie enim Sabbati ferias Iehovæ sa-
 cras fore: coquerent & elizarent quod opus es-
 set, reliquum omne sibi in posterum diem repo-
 nerent, ac reservarent. Idque cum ab illis esset
 administratum ad præscriptum Moysi, postridie
 quod repositum fuerat, id neque fœtebat, neque
 in eo vermes erant. Eo Moyses iussit ut illo die
 vescerentur, quod Sabbatum Iehovæ esset,
 ruri non inventuri. Sex diebus enim colli-
 gi debere: septimo autem die, quod Sabbatum
 esset, non fore. Quidam tamen de populo etiam
 septimo die exierunt ad colligendum, sed nihil
 inve-

*Iehova Mā.
 nam pro-
 mittit.
 Panis de
 celo.*

*Cothurni-
 ces.*

*Descriptio
 Mannæ
 ex S. Scri-
 ptura.*

*Man-hu.
 Panis Isra-
 elitarum.*

*Manna bi-
 stria se-
 ra.*

pellant. Aerehm enim mel non ex trunco manat, ut Oleum mel, sed in auborum foliis invenitur.

Lonc. non solum stultum, sed impium quoque dicit, miraculum celestem, quo Deus Manna pluebat Israelitis in deserto, in naturæ operationem vertere.

Munsterus in Exod. habet quardam notatu digna, sic scribens: Habuit autem Manna illud rorem supra & infra, ut Hebraei dicunt &c. Onkelos sic vertit hunc locum: Et cum auferretur descensus roris, ecce super facie deserti tenuitas quædam denudata in modum Calcis, quæ quasi gelu iacebat in superficie terræ. Id cum viderent

Man-hu. Israelitæ, dicebant: Man-hu, id est, hoc Man.

Man. Interpretantur autem Hebraei Man, ut sit idem quod donum seu pars. Aben Ezra de Manna loquens, dicit Man esse nomen Arabicum, asserisque se vidisse speciem rei conformem Mannæ, sed quæ solum in mensibus Nisum & Itar descendat, & expositam soli non defluere, nec per noctem reſervatam putrefcere, nec esse tam duram ut conteratur in mortario, sed super linguam positam liqueſcere, ut ulus eius magis sit pro medicina, quam pro cibo. Assimilatur Man Coriandro, *Gar*, non colore sed figura. Videtur autem his verbis planè Manna nostrum Gallicum insinuare voluisse, cui sanè ex notæ haud malè competunt, de quo particularis postea. Sunt etiam, addit idem, qui *Gar* exponunt Sinapi. Aben Ezra verò fatetur se ignorare quid sit, aut quid significet.

Forſperi error. Fortiter summe hallucinatur in Diction. suo Hebraico confundens semen herbæ graminæ, Germanis dictæ *Schwaden* cum *Man Hebraeorum*, Arabum & officinarum, cum quibus nihil commune habet, præter solum nomen. De ea Manna herbacea agemus inter frumentacea & graminea. Idem *Man destinatum* vertit: sic enim (ait) rorem illum celestem, tanquam singulare donum à Deo ipsis destinatum Israelitas vocitasse, Chaldæus vertit Mana: quem Hieronymus sequutus Manna tranſtulit Exod. 16. Ios. 5. Psalm. 78. Nchem. 9.

Manna herbacea. Man destinatum. Rob. Const. in Lex. *man* Chaldæis, vel *man* Hebrais, *man* Nonno poetæ, id est, Manna, cibus ille quo Deus XL. annis Israelitas pavit in deserto, quique nocte roris instar celo demittebatur, & post solis exortum liqueſcebat.

Melleum. Brassavolæ iudicio Hebræorum vera Manna in granula concreta ut Calabria videtur, sed miraculum in quantitate fuit, & in eo quod singulis diebus pluebat, & ob mandatum pluebat, & ob mandatum putrefcebat. Mannæ nomine vulgò, ut vult Cordus, quod nunc æreum seu ruscidum Mel, Manhu ab Israelitis olim appellatum, ostenditur: Idem lib. 2. cap. 104. apud Diosc. apertis verbis scribit, Mannam sacram literarum, idem esse cum melleo rose: an rectè ipse viderit & docti.

Pinguedo æneæ. Sanè & Monachis apud Melsen Manna sive Manhu est mel roris, sive pinguedo æneæ, sive Melæreum.

Manna mastichina. Clandamus sacram Mannæ historiam pulchra Adversariorum obseruatione. Hebræum Germanicum notum, inquit, & Rabinum admodum callentem Philosophiæ habuimus, qui Manna istud purum & Mastichinum vocatum, asſimabat esse idem cum suo Israelitico, Bdelli specie, Coriandri granis simile, melleo sapore, quale etiamnum est in Palaſtina, Syria & Arabia. Porro, nobis obiectantibus illius supercelestes vires, portenta, & putredinem: Respondebat

Ichovam cunctipotentem, pro eo ac ferebat sua voluntas: usum & fruitionem Mannæ illis largitum fuisse, qualem, quantum & quamdiu illi vitum fuit: rēque ab se condita uti solum ad suam ostendendam sive gloriam sive munificentiam, præter, & super naturæ leges ratas. Sic quoque *Marach* perquam amaram & salsum edulcuit in iecto ligno: & Arabicus sinus quasi medius factus, vadum fecit proli Ichovæ, hostes verò obruit: Solis orbita cursum inhibuit, & æquor montibus supernavit.

MEL CEDRINVM.

Ad ulcera. Hippoc. lib. de Vlceribus ait: Medicamentum aliud ad ulcera vinum accipit, Mellis Cedrini paululum: ex aridis, florem aris.

Mel illud scquit Galenus mercatores sui temporis è Monte Libano petiit venale portenſe: idque roris modo deſtillare: atque in eo copiosum. Locu. me ex foliis arborum colligi: propterea quod Cedrus inibi frequentissima sit, ex hac potissimum accipi verisimile esse scripsit, lib. 3. de alim. *Ror Libani Gal.* *Manna Gal.* *Manna Gal.* Rorem *montis Libani* nominans quod Hippocrates Mel Cedrinum appellavit.

Itaque cum mel istud vulgò Mannæ nomine cognoscatur, & durior sit compaginis, quam ab autoribus descriptum sit, merito dubitabit quispiam an eadem res sit ac ea, quæ ab antiquis sub eo nomine intellecta est. Siquidem neque Hip. neque etiam Gal. unquam durum intellexerunt, sed liquidum, aded ut Gal. scripserit suæ regionis indigenas reſerre solitos, Iovem aliquando melle plueret.

Ego verò, inquit Bellon. de arb. conif. aliquando dubitavi an olim Cedrinum mellis genus hoc edi ab hominibus loco medicamenti soleret, quo alvus solveretur. Sed ex antiquissimis Hebræorum monumentis habeo Cedrinum hoc mellis genus edule fuisse, neque ita tamen liquidum, ut manibus facile teneri posset: duasque

Differetia. eius præcipuas differentias fuisse, liquidi scilicet & duri, mihi ex negociatoribus apud Memphim planè innotuit: alterum liquidum in *Liquidum.* *Aridum.* siculis, alterum aridum in arculis ligneis asſervari. Vim verò nullam, aut saltem exiguam inesse ei alvum solvendi asſirmare ausim. Nam si quispiam periculum fecerit, & utrumque paulò liberalius ederet, nunquam alvum subduci sentiet, etiamsi libram mediam absorpserit. Verum quidem mihi hoc fatendum est, vim quandam ei inesse abstergendi, quemadmodum & in melle: sed solvendi, ut mihi videtur, nullam aut paucam habere, quod indigenis montis Libani & Sinay,

[vbi Cedri] nostratibus etiam, qui Senesium & Juniperorum (Gallicè *Senys* & *Geneure*) [vbi Lariis] montes incolunt, satis planum est: qui, cum abundè eo satientur, nihil tamen ab eo laudantur, aut alvum sibi quoquo pacto subduci sentiunt, sed eo tanquam obſonio nutriuntur. Sed minimum quoddam ea certam sibi statuerit sedem, ut in altiori montis fastigio, neque paulò infra verſus radicem montis ullam eiusmodi videas. Nam in Libano Cedris potius, quam aliis arboribus adhaereſcit. In Europa Lariis mavult copulari, neque etiam alibi, quam extremis arborum ramis insidet. At si fortè Salices adſint (ut sæpè fit) rarè tamen earum foliis adhaerere conſuevit. *Mel Cedri.* *Manna nulla in præter.* Manna verò liquida sive mel Cedrinum, cum nobis nullo nunc in pretio habeatur, amplius ſervari deſiit.

Monachi

Terreniabin Monachi sive Caloiere montis Sinai (ut idem Bellon. annotat in suis Obs.) habebant Mannam liquidam collectam in suis montibus, quam vocant *Terreniabin*, ad differentiam duræ Mannæ. Quod enim Arabes vocarunt Terreniabin conservatur in ollis terreis mellis modo: venaleque ferunt Cairum. Hoc Hip. vocavit Mel Cedrinum: alij Græci Rorem Libani. Differt à Manna alba sicca. Gallica quæ ex Briançon defertur, sicca est. Cairi venalis in Officiis promitur Manna duplex. Una quæ dura vocatur Manna: altera quæ liquida Terreniabin. Hæc Bellon. Ceterum, considerandum an Manna Cedri non sit potius liquor exudans ex Cedris, & concretiscens, quàm Ros. Nam si Ros esset, cur potius Cedris Libani, quàm aliis arboribus adherescit, cum eis sint tenuia admodum folia, cæteris planisque lata, & excipiendo rori commodiora: uti videmus apud nos Europæos Rorem foliis Quercus potissimum adherere.

Laricea Scribit Bellon. Mannam Lariceam, si Sol illuxerit, liquidam evadere, & esse Terreniabin. Inquirendum autem annon idem eveniat Cedri-
*Sole liques-
cit.* næ Mannæ. Si ita sit, censemus liquidam Cedri-
*Terreniabin
liquida* nam Mannam diversam à Rore aëreo. Fortè Galenus Manneum liquorem in Libano proprium Cedris non distinguit à Rore aëreo in diversas arbores cadente. De Melle Cedrino Hippoc. pauca quædam antè quoque dicta sunt.
*Autorem
conjectura
de melle
Cedri.*
Vires. De viribus etiam Mannæ Libani considerentur quæ antè tradita sunt ex Bellonij, Fuchsij, ac Matth. opinionibus diversis. Et Lectores considerent quæ postea traduntur de Manna Orientali mastichina: multa enim ad hoc caput referri possunt.

MANNA LARICEA SIVE BRIANSONA.

*Manna
offinar.
differentia.* MANNA quæ passim in Officiis laucioribus habentur suis distinguuntur nominibus à loco petitis. Aliâ enim *Briançonensi*, aliâ *Ambrosiensi*, aliâ *Calabrinam*, aliâ *Granatam* vocat. Quæ cum inter se sint dissimiles non tantum facie, sed & efficaciâ, aliâ aliis præponunt, Nam (ut pulchrè etiam annotavit Bellon.) aliâ compactili grano pingui, dulci, flavoque, aut albicante prædita est, ut Briançon. Aliâ grano constat grandiori, floccosiorque referens, intus concavo, candidiori, cuiusmodi est Calabrina. Aliâ pellucida est exiguo grano, cuiusmodi mastichina. Nunc de Briançonâ speciatim dicemus. Grummi itaque Mannæ Briançonæ seu Laricæ, alij Coriandro pares, rotundi, alij oblongi maioreque, colore albicante, & cum inveterascit, flavescente, consistentia cerea, sed in ore liquecente, dulcedine saccharina, valdè grata. Admixta multa foliola Larigna sunt. Carbonibus imposita, tota ferè consumitur bulliendo.

Scribit Bellon. se aliquando certum montis latus Laricibus constum eo modo albere compexisse, quo cum pruina in hyeme arbores convesterint. Nam, ut paulò antè dictum, hæc in Libano monte Cedris, in Europa verò Laricibus mavult copulari, ac eius tantum extremis ramis. Cuius rei causam subtilitatem professoribus indagandam relinquimus. Vide quæ paulò antè etiam dicta de liquefactione Mannæ Laricæ ex Bellonio, nempe quomodo à Sole lique-

*Colligendi
tempus.* scatur. Est autem legenda, eodem autore, antequam

Sol arboribus suis igniculis vim intulerit: nam roris illius materia noctu supersidet, non autem interdiu. Quocirca indigenæ ad Larices summo mane festinant, ut Mannam legant, priusquam Sol illuxerit: nam, ut dictum, quum Sol ei illuxit, deterior esse solet, & liquida evadit. Hinc dux species. Sicca Serap. & Avic. manna, quæ in mediterraneis magni venire solet. In urbibus autem quæ ad radices montium sitæ sunt, adè vilis est pretij, ut non pluris in vere libra, quàm quatuor assibus divendatur. Ros enim, qui arboribus insidet, tantus est, ut operarij quantum volunt reperiant: sed in legendo operariis tanto tædio esse solet, ut ab uno viro vix tres libræ uno die colligantur.

Rustici porro ad Larices mane appulsi, brevi Solis radios imminere sentientes, fasces arborum secantibus in terram decutiunt, multos ramorum acervos sub arboribus in umbra asservantes, ut quicquid roris illius cælestis cacuminibus adhererat, per otium in umbra sub arbore legant. Illi verò quum multam exceperint, & ad vicinas urbes detulerint, hanc negotiatores quidem emunt, sed quòd ea intra annum unum aut alterum deterior evadat & corrumpatur, necesse habent, ut ex multis libris paucas divendant, illas quidem carius distrahere, quibus reliquarum iacturam, si quam adesse contingat, resarciantur. Hinc fit, quòd magno vaneat. Hæc est illa Manna per totam Galliam celebris, quæ Briançonâ testaturque Bellon. non aliunde, quàm ex Laricibus in summitatibus altissimorum montium colligi: duram esse: atque differre à Manna montis Sinai quæ liquida sit.

Fuchsij Mannam Briançonam flavam dicere, utique vetustiore inspiciens: Nam vetustate flavescit. Quapropter etiam Bellon. flavam dixit. Designanda tamen res unaquæque ut est in propria propriæque sua natura.

Cecidit à cælo Manna, tradente Matth. admodum copiosa, mastichisque granis similis, agro Tridentino, in Ananientibus montibus, & præsertim supra Larices arbores, testibus Cl. med. Iulio Alexandrino, & Petro Spezzalencio pharmacopœo Ananienti: quippe qui huius Mannæ, quam ipsemet legerat, selibram ferè ipsi misere. Nunquam autem se concessurum ait Matth. Mannam, quam à Lariceis folijs legerunt Ananientes, à Larice ipsa exsudasse, cum nihil prorsus resinosi reliquerit. Quinetiam quòd non solum in arborum folijs spectetur, sed etiam in pratis, adèd ut scenset præ Manna à Sole dissoluta, fasces ab herbis nequiverint explicare. Asseritque hanc cælestem fuisse Mannam, perinde ac illa, quam se propriis manibus in agro Gori-tienti legisse testatur. Sed par fuisset Matthiolam rationes quoque reddere, cur supra Laricea potius concresecat, quàm supra alias plantas. Quid si non lecta supra folia, sed supra ramulos? Matth. non erat præsens cum colligeretur. Lariceam Mannam non resipere resinam, non sufficit ad ostendendum non exsudare, ut videre est de eo Elzomelite Lobelij. Fieri potest, ut præter exsudantem Mannam in Larice, ros melleus interdum cadat aut coadservetur supra omnes plantas eius loci, ubi Larices Manniferæ copiosæ sunt, qui nihilominus diversus sit à Manna Laricea. Sed de hac re postea specialius sub Manna Calabrina.

An Apollini manna Brigantina? à Brigantio Cænomanorum oppido, nundinis illustri, vel candida, quæ quidem selecta nec viriata, dulcis &

*A folijs
quæcit, quæ
deterior fit,
Dux spe-
cies.*

*Legendi
modus.*

*Manna
annu de
terris Fran-
ciæ.
Cur magis
vaneat.*

*Matth.
opinio non
à Larice
exsudare
Mannam.*

*Matth. opi-
nio impro-
batur.*

*distinctione
concordata.*

*Manna
Briganti-
na candida.*

Laricea. gustu iucundissima, minuta, melleam dulcedinem representans: vel livefcens, aenuior, Pincois festucis: furculis herbulisque & foliolis etiam aduoluta, subductione aliis ignavior: ad alius usus, ut etiam ad lenitionis opera, vix subduple efficacissima: quum præsertim Orientalis Calabrensisque interdum rancidæ amarescant, & imposturis imbutæ nuntius valeant. Si autem Apollo eandem intelligit mannam, quam nos, mutatur non observasse foliola Laricis esse admixta.

Observatio. Lob. & Pena tradunt, ut antè monitum, Laricis ramos in vinariam cellam asportatos, mannam postera die demonstrare. Idem etiam conantur demonstrare, mannam potius succum plantæ quàm aëreum rorem esse. Adduntque non spernendam Briansonensem ad Galloprovinciæ & Allobrogum Alpes provenire solitam, qua universa serè utatur Gallia, modò delectus purioris, candidioris & recentioris grani habeatur, qualem illic efficitur è Larice furculis copiosam se habuisse scribunt: quæ nec dosi, nec gustu, nec purgandi effectu quicquam cedere illi videretur exoticæ. Eamque multò minoris emi, minorique [quàm mastichina, vel Granata] mangoni suspitione. Blandè autem educit biliosa è primis venis & iccore, èque pulmonibus pituitosa veluti Lariceus liquor, Terebinthina Veneta vocata.

Dosi. Hæc Syriacæ puræ copia desit, aut Calabrensis, utendum ab uncia semis ad uncias tres. Sylvius verò, ut antèa monuimus, huius dosin tradere videtur ab uncia, ad unciam.

Ceterum miramur Altomatum, qui tam curiosè de manna scripsit, nihil tradere de manna Laricea, qua tamen, ut dictum, in multis Galliarum & Germaniarum partibus utuntur, cui semper admixta folia Laricis.

Manna Terebinthina. Rauvolff. manna nostræ Laricæ formæ & sapore similem dicit mannam Trunchibit.

MANNA CALABRINA FRAXINI ET ORNI.

Descriptio. PRO Calabrina nobis demonstrata manna purior est, quàm Briansona. Gummi multò maiores, figura varij, colore flavescences, sapore dulci, sed minùs grato, quàm prædictæ, cum quadam acrimonia. Necita facillè liquefcit. Vsta etiam minùs consumitur. Loco humido posita, minùs videtur liquefcere quàm Briansona. Conservanda, ut illa, loco sicco. Hæc hodiernis temporibus notissima est, ut in Italia, auctoribus monachis, pluribus colligitur locis: sed copiosior in Calabria, quæ & Calabrensis ubique vocatur: & particulariter in Fraxino & Orno colligitur, quam certè specialiter ipsæ arbores ex se producant, sicut Gummi cæteræ arbores: achuiusmodi est Calabrensis. Ratio est, quia in caudicibus & truncis live ramis arborum copiosior, quàm in foliis repetitur. Nam quæ de aëre, sicut ros, descendit, abundantius recipitur in foliis, quàm in trunco. Hoc ratio, hoc experientia docuit plurimos. Nam quis audeat dicere pluviam aut rorem, dum cadit, priùs insidere truncis, quàm madescat folia? Et quemadmodum aqua æqualiter pluit super arbores & plantas, ita & manna descendit rorando universaliter & arbores & plantas, & petras, & ipsam adeò purum putum solum.

Iam quare in una potius arbore, quàm in alia

non maledè distante reperitur? Notne quia illa arbor ex se producit, & illa non? Item si sicut ros descendit semper, quare in extremitatibus & foliis superioribus, quæ cælum spectant, ipsarum arborum non invenitur, sed in ramis & foliis inferioribus? Sed revera, nos (inquiunt idem monachi) curiosè ac studiosè hoc observare iussimus: & ita invenerunt, nempe ex se illas arbores producere illam rem, quam mannam vocamus: quæ liquida fuit ex trunco, & ramis superioribus in folia inferiora, postea congelatur. Et ad maiorem certitudinem plures observatores propriis oculis pluries viderunt fluentem mannam scaturire ex quibusdam tuberculis ipsius arboris: quia non undiq; per totam arborem fuit, sed in quibusdam specialibus locis generatur: ex quibus cum profluit est dulcissima. Si autem quis locum illum (unde videt exire mannam, incidit, exit abundantius, sed sit amara propter percussionem & corticis incisionem, ut ipsi observatores experti sunt. Etiam præcisus ramus, & domum virens portatus, produxit mannam.

Quare concludendum est, arbores, ut Fraxinus & Ornus, hisque similes, ex se generare, mannam, sive maui, Gummi dulcissimum, quod manna dicitur. Nam & Gal. etiam quandoque utitur succo Fraxini: pro quo forsitan intelligenda ista manna, quæ scaturit è Fraxino & similibus arboribus. Eadem arbores & mannam cælestem suscipiunt (cum cadit) sicut & aliarum plantarum. Et quid mirum arbores gummi illud dulcissimum producere, quod mannam arboream vocamus? Nonne & arbores & plantæ generant, ita scilicet, myrrham, storacem, Balsamum, mastichen, Picem, Resinam, & similia plura? Nonne & apes similiter ex floribus quarundam arborum & herbarum mel & ceram colligunt. Ergo &c. Colligunt etiam & ipsi Calabri quandoque mel aëreum, id est, mannam cælestem super varias plantas & super lapides, sicut & aliarum gentes. Sed hoc sit rarò, & non ita densatur.

Arboream mannam autem singulis annis, circa caniculares dies ante sextiles pluvias colligunt. Cum autem pluit, cessat fluere. Sed & genus hoc mannae arboreæ dupliciter colligitur: scilicet una in caudicibus & ramis, quam vocant mannam grossam, & mannam de corpore: alia verò super folia, quam mannam finam, seu mannam subtilem, & mannam foliorum nominant. Medici autem nostri temporis, laudant potius eam, quæ colligitur super folia. Sed revera viribus non differunt, & unum eundemque ortum habent. Nam quæ colligitur in foliis, non ibi generatur, sed è truncis & ramis fluens, cadit super folia illa, quæ ex directò habentur subter. Non enim in cunctis (ut diximus) foliis ipsius arboribus reperitur, sed in illis duntaxat, quæ ex trunco vel ramis susceperunt. *Hæc enim Monachi.*

Eiusdem sententiæ est & Altomatus, qui concretam & granulofam Mannam, semini aut Gummi similem, (ut ille inquit) cuius frequens est usus, quotannis colligi solitam scribit tam à Calabris quàm à Samnitibus & Vestris, qui Garganum incolunt montem, & plerasque Apuliarum partes, ut Castellanetam: aliisque etiam in locis ipsam colligi solere. Eam tamen non nisi ex Fraxino & Orno colligi, uno ore fateri omnes. Hancq; eam ipsam esse Mannam, qua communiter ad molliendam alvum Medici omnes utantur, ac usi sint quotquot per Centum annos & ultra, medici antè se fuerint.

Inqui:

Non esse ro-
rem ac-
te.

2. ante

Inquisiturus autem an sit velut ros quidam de
cælo cadens, sicut ea, de qua Arabes mēnne-
runt, vel dictarum arborum succus humor seu la-
chryma, sic ratiocinatur. Quæcunque ex aëre de-
cidunt, in quacunque regione ac quovis loco,
non speciatim supra unam rem determinatam il-
lius regionis seu loci, sed indifferenter supra om-
nes ibi existentes rationabiliter cadere debet.
Sed Manna hæc non nisi in Fraxino & Orno re-
peritur, in cæteris verò arboribus, herbis & la-
pidibus eiusdem loci nequaquam, ut collecto-
res testantur. Igitur non generatur in aere, ne-
que de cælo cadit. Et per consequens non est
eiusdem speciei cum ea, quæ de cælo decidit.
Deinde: Eadem Manna, quotannis ex iisdem
colligitur particularibus arboribus iam supra 40
annos, ut colligentes eā fatentur, ita ut non de-
sint, qui easdem arbores emant, tanquam singu-
lis annis hoc producentes vestigal. Sūntque eo-
dem in loco & eiusdem etiam speciei arbores
nonnullæ, super quas Manna hæc non reperitur.
Igitur de cælo non cadit, nam, quæ maior ratio
reddi posset de una quàm de altera, præsertim
eiusdem speciei arbore, eodem in loco existente,
ac per plures continuos annos eam producente,
si de cælo caderet: nulla sanè: quamvis in uno
plantarum genere magis quàm reliquo quædam
afferri possit apprens ratio. Præterea si Man-
na cælestis seu aërea pro sua generatione, pe-
culiarem quandam, uti dictum, cæli constitutio-
nem requirit: ita ut calida & sicca præcedat diur-
na aëris temperies, nox verò sequatur per æsta-
tem benè frigida, (etenim æstivo tempore po-
tissimum generatur) rationi consonum est, non
qualibet die, singulisve noctibus etiam æstivo
tempore generari posse, sed raro admodum, que-
madmodum & liquida, præsertim in Calabria. Ad
hæc, Manna quæ utimur, quæ quidem in Fraxino
& Orno colligitur singulis diebus, Canis præser-
tim tempore, aut paulò antè, in iisdem repe-
ritur, modò pluvix, præsertim magnæ, aut ven-
torū vehementia non adsit. Igitur aërea non est.
Amplius, si aërea Manna de genere est mellis
rosæidi seu aërei, à frigore, uti dictum, concreti:
cū mel solvatur à calore, ac coaguletur à frigore:
sequitur quòd eadem Manna, à frigido, tanquam
contrario causis liquefactionis coagulari debeat,
solvi verò à calido. Cū verò in ea, quæ in Orno
& Fraxino reperitur, contrarium eveniat, nam à
calido durior fit atque coagulatur, ab aqua
verò solvitur: necessariò sequitur eandem
de natura aëreæ & mellis rosæidi non esse.

Quod si quis dicat: non modò à Solis ca-
lore Mannam in his arboribus repertam concre-
scere & duriorē reddi, verū etiam à frigore,
ut eam colligentes diū observant: aiunt ete-
nim non solum à Sole, verū etiam à frigore,
Aquilone videlicet modicè flante in nocte, eam
condensari siccioremque reddi: Dicimus nos, &
hac etiam ratione probari, eam non esse ro-
rem de cælo cadentem. Nam hic cū sit aqueæ na-
turæ, à frigido duntaxat coagulatur. Quæcun-
que enim sunt aquæ (inquit Arist. lib. 4. Meteo.)
non coagulantur ab igne: solvantur enim ab
igne: Quæ verò communia sunt terræ & aquæ,
& ab igne coagulantur, & à frigido, ut ipse ait:
quoniam ab utrisque incrassantur, recedente vi-
delicet & evaporante humido, diversa tamen ra-
tione. Cū itaque coaguletur, & à Solis calore,
& ab aquilonis frigore, hæc quæ in Fraxino & Or-
no reperitur Manna, necessariò sequitur, eam
nec vaporem nec rorem esse, aut ex eisdem ge-

Tom. I.

nitam: proinde neque eam aquæ solius, sed
aquæ & terræ esse. Item si à Solis calore, &
ab Aquilonis frigore, hæc, quæ in Fraxino & Or-
no reperitur Manna non solvitur, nec liquefit,
sed potius concrefcit, duriorque efficitur: sicut
eam colligentes asserunt, meridie Solēque ma-
gis ardente, aridiorē, candidiorē, magisque
concretam & coagulatam esse: & collectam iam,
ubi humidior fuerit, ac liquefit cœperit, Soli ex-
positam, albidiorē duriorēque reddi: quis
vñquam asserere audeat eam à cælo fuisse delap-
sam, atque ex concreto rore genitam? Cū præ-
sertim quæcunque à frigore concrefcunt seu coa-
gulantur, à frigore liquefcant, ut idem tradit Arist.
Quinimò Manna hæc ab aqua solvitur atque li-
quefcit, ut in dies observamus, & eam colligen-
tes testantur: pluvia enim superveniente, con-
festim solvitur & evanescit, ut primis Augusti
imbribus ingruentibus observatum est: sequitur
itaque à calido & sicco, hoc est, ab igne aut igni
simili fuisse coagulatam. Ergo non erit aërea. Nam
quæcunque sunt aquæ, inquit Arist. non coagu-
lantur ab igne: solvantur enim ab igne. At vapor
aquæ signum est, eodem teste: eo enim consi-
stente, est aqua, ut in ollarū operculis videmus.
Cū itaque non ab igne, neque à Sole, sed ab
aqua solvatur atque liquefcit Manna hæc in Fra-
xino & Orno duntaxat reperta, coaguleturque ac
durior reddatur à calido, demonstrativè conclu-
ditur, eam non esse de genere roris, nec ex con-
cretis à frigore vaporibus genitam, neque de cælo
cadivam si saltem prædictis Arist. rationibus ac
fundamentis fides adhibenda. Adde quòd, ut
huius Mannæ copia maior generetur, contraria
requiratur particularis aëris constitutio ab aë-
rea: nam si eo tempore, quo emanare consue-
vit, dies pluviosus præcesserit, & frigida quodam-
modo, sequaturque admodum calida & sicca al-
tera aut tertia, maior, ut aiunt, iisdem arbori-
bus quantitas colligitur. Quàntidem ratione aë-
rea seu rosæida esse non poterit.

Quod si quis rationibus destitutus, ad cæcas
& occultas causas confugerit, inquiens, causam
ob quam Manna hæc in Fraxinis & Ornis dunta-
taxat reperitur, esse earundem arborum proprie-
tatem quandam, ob quam ad seipsas magis alli-
ciant, trahantque hunc suavem liquorem de cælo
cadentem, quàm cæteræ arbores, quemadmo-
dum magnes ferrum, & succinum paleam: Di-
cemus: cur hæc proprietas non cuilibet particu-
lari eiusdem speciei arbore conveniat? Nam ut
cuilibet magneti ac succino datum est, ferrum &
paleam trahere, ita sanè & cuius Fraxino & Or-
no hæc facultas tribui debet. Atqui per multos an-
nos, eoque continuos observatum est, in una re-
gione eodēque loco quotannis determinatas
quasdam Fraxinos & Ornos talem in se conti-
nuisse dulcem liquorem: quasdam verò alias eo-
dem in loco existentes, eiusdem magnitudinis,
eiusdemque ætatis nequaquam. Observatū præ-
terea diversæ magnitudinis ac ætatis quasdam parti-
culares arbores iam dictarum, eodēque in loco
consistentes, non tantum quotannis eiusmodi
dulcem in se continere liquorem, sed etiam cer-
tis temporibus: ut puta sub cane, vel paulò antè:
quasdam verò nunquam. Quibus de causis ne-
quaquam concedere aut fateri possumus, pecu-
liari quadam illud fieri Fraxini & Orni proprie-
tate: quoniam singulis hæc inesset proprietas,
etiam si non æqualiter in omnibus. Non itaque à
tota substantia seu specifica forma Fraxini & Or-
ni talem sibi liquorem alligunt de cælo vel aëre

R

eadentem: nam omnibus talis esset trahendi facultas, quia omnibus una eademque forma & species. Nunc verd in paucis id observatur.

Vera Manna generatur in Fraxino.

Sanè iam Maio & Iunio mensibus Caniculam antegressis liquor ille dulcis intra cortices earum continetur, quo paulatim cocto, adventante ardentis Sij calore, cortex arefit, eoque scisso aut fisso, liquor foras trahitur, atque ab eodem calore iterum concrecit & condensatur in grumos, aut gu nmi specie granula. Imò etiam non incisis corticibus, ante caniculam hæc Manna sæpè emanare visa est, præsertim in Ornīs: sive iam dicas tanquam superfluum quiddam nec alimento commodum à natura arboris foras protrudi, sive à Solis vi & calore foras ehei, sive utraque causâ concurrente, quod nobis verisimilius videtur. Neque tamen sufficiebat expulsio illa arboris & attractio Solis, ni huius quoque calor cōcoctior & cōdensator accederet. Ex quib. perspicue intelligi potest Mannæ generatio in Fraxino & Orno, vel à mediocriter in naturæ contemplatione versatis.

Obiectio diluitur.

At si dixerit forte aliquis, toridam hanc Mannam non esse velut superfluum quiddam arboris, aut alienum, sed simile & familiare, ac velut alimentum quoddam, & propterea ab eis attrahi: tum quæremus ex eo, quæ causa sit, quod iam continuè & diu tamque copiosè ab iisdem excernatur & non potius detineatur? Item quæ possit esse eius diversitatis causa, Solem opitulari, ut eadem Manna imbibatur prius, sicceretur & arefiat cortex, rarefiat & scindatur idem: deinde Canis fervidus calor eundem humorem rursus evocet, condenset ac coagulet, quo tempore corticem multò etiam magis exsiccare deberet, quàm præteritis mensibus, Maio & Iunio, potissimùm cum absque incisione aliqua sæpius spontè ex iisdem arboribus prodeat Canis tempore, & antè, ut de Ornīs dictum. Aut quid impedivit, quominus eadem Manna prædictis mensibus non fuerit à Solis calore concreta & coagulata instar gummi circa cortices dictarum arborum, potius quàm in iisdem imbibita & intra attracta? præsertim cum ab eodem calore Canis tempore iterum condensata, & gummi instar granulosa reddatur.

Quidam decepti.

Hoc loco notandum doctissimos quosdam viros à villicis & pastoribus Calabris deceptos, falsò asserentibus, Mannam hanc, quæ in Fraxinis & Ornīs reperitur, manè antequam Solis calor invaleseat, colligi, cum communiter contrarium & hodiè observetur, semperque observatum sit. Non enim manè, priusquam Sol valdè perurat, ut ipsi falsò retulerunt, sed meridie, Solè que fervidissimo eam colligunt: neque tamen à Solis calore rarefcit, solvitur aut evanescit, sed potius concrefcit, & durior ac candidior redditur. Quapropter eam, quæ Ornīs innascitur, tertiâ vel quarta à Solis ortu hora colligunt, quod vel à remissiore calore condensetur, cum terrestrioris naturæ sit eius succus, quàm Fraxini. Imò eandem quandòque, ut aiunt, etiam antè Solis ortum colligunt, sed non nisi ubi pridie inclinante iam Sole profluxerit, & ab eodem concreta fuerit, aut certè noctu flante Aquilone fuerit coagulata. Idque ob eandem causam, ne Sole superveniente siccior aridiorque reddatur, præsertim ubi non spontè, sed vi, adhibitis cæsuris, prosilierit.

Manna arborea non colligitur.

Ex dictis liquet, Mannam hanc arboream, non æream aut cælestem dicendam, quod iisdem semper colligatur arboribus, atque adeo earum sit propria. Recensendæque hæc arbores inter eas quæ copiosum succum & humorem habent, quod, & spontè, & incisurâ, ut dictum, non

tantum è candice & brachiis, sed furculis etiam, iuxtaque foliorum pediculos, immò ex ipsis etiam foliis, eum liquorem exspunt. Id tamen non quolibet tempore, sed sub cane & antè etiam: quo tempore hæc arbores à germinatione & fructificatione cessant. Quare cum eo tempore succus earum validissimus sit, ob dictam causam, maximè etiam suam ostendit naturam.

E quibus arboribus partibus profluat. Quo tempore colligitur.

Cur non in omnibus Fraxinis aut Ornis Manna generatur.

Sed alia non levis dubitatio discutienda. Dictum enim non omnibus eiusdem generis Fraxinis & Ornīs talem produci liquorem, ex quo fiat Manna: hinc quis inferat, non esse earum proprium humorem seu succum proprium. Huic ita responsum volumus. Proprium utique earum succum esse hinc certè cognosci, quod ex quibusdam earum etiam spontè profluat (nam cæsuris illatis modo & tempore convenienti, plures emittunt, uti dictum.) Quod verd non omnes, sed aliquæ tantum hanc Mannam procreant, censendum id fieri ob aliquod impedimentum, ut puta ob defectum aut vitium aliquod, vel ob soli aut regionis diversitatem: quemadmodum & Amygdalarum, Prunorum, Cerasorum, Juniperorum, & reliquarum quarundam arborum generi contingit, licet eandem habeant naturam.

Est igitur proprius dictarum arborum succus seu humor Manna, quæ quotannis, sub Cane potissimùm, in Fraxinis & Ornīs duntaxat, pluribus continuis diebus colligitur, (quæ & se longo tempore Neapoli usum testatur Alomarum, & quotquot ante se per plures annos medici fuerint, ad alvum solvendam usos esse) non ros, Mel æreum, aut Manna, quod sequentibus etiam observationibus confirmatur ab eodem. Nam, inquit, superiniecto linteo, per plures noctes ac dies, supra easdem arbores, ita ut ros iis incumbere non potuerit, inventa nihilominus in eis, iisdemque diebus, ac collecta Manna fuit, arboribus etiam non incisis: id quod fieri haudquaquam potuisset, si spontè ex iisdem arboribus non emanasset, maximè cum supra idem linteum, ne vestigium quidem eiusdem generis rosis, vel liquidæ vel coagulæ Mannæ fuerit repertum.

Experientia confirmatur. Manna Fraxinis.

Sed quid opus diu hac in re sermonem protellare, cum plures fide digni, quibus hanc rem penitus investigare decreveram, uno ore confessi sint, mihi que retulerint, se propriis cōspexisse oculis, post collectam in dictis arboribus Mannâ, ex eisdem locis reliquam resudasse, emanasse, ac sensim effluxisse, & deinde Solis calore superveniente coagulata fuisse: idque non semel duntaxat, sed sæpius ac sæpius vidisse testati sint.

Eandem confirmatur. Manna Fraxinis.

Aiunt insuper in Fraxini Ornique caudicibus, iuxta corticem sæpius adnatas veluti vesiculas quasdam se invenisse seu tubercula, quas disrumpentes, primum liquorem quendam album, dulcem, concretum & crassum in optimam Mannam conversum: deinde minus album, tenuiorem, liquidiorémque, sed dulcem quoque manifestissimè emanantem sæpius cōspexisse: qui etiam à superveniente Solis calore coagulatus, concretus, albidiorque redditus, effectus est Mannæ primæ assimilis: & ubi diu permanisset superflus à Solis calore exsiccatus, inutilis redditus est. Ergo si incisis arboribus, in eisdem incisuris talem reperiunt concretum & coagulatum succum, eiusdem ferè coloris, saporis & consistentiæ, cum ea, quam ex non incisis colligunt, Mannâ, quis unquam hæsitare audeat eam esse earundem arborum succum proprium, spontè ad eosdè ramos, candicè ac furculos detrusum, potius quàm rosè quendam è cælo aut aère delapsum? Nemo sanè nisi pertinax valdè.

Alia. Tubercula cum Vesicula in Fraxinis & Ornis. Manna cōspiciuntur.

Ad

Experi-
mentum de
Orni & Fraxi-
nis.

Addunt & illud: nempe cicadas & alia quædam animalcula se inspexisse, quæ ex dictis arboribus, Orni præsertim, cortice perforato, hanc lachrymam exugebant: quibus deinde fugatis, ex iisdem foraminulis seu fissuris, liquorem hunc dulcem profluxisse, huncque se postmodum à Solis calore concretum legisse, tanquam in optimâ Mannâ convertum.

Idi-
oth.

Observatum præterea relatumque à fide dignis, se plures levisse Ornos, ut ex eis pro vini dolis circulos pararent: quos cum fidsent, solique exposuissent, non parvâ in eis huius Mannæ copiâ invenerunt: eamque non in cortice, sed ex lignosa ac veluti eiusdem Orni medullosa substantia interiori emanantem.

Idi-
oth.

Testatus item quidam Faber ferrarius, vis probus, cuius nomen Cæsar de Ruodi, se, cum in quadam sylva structo igne carbones pararet, vidisse ex orno vicina Mannam resudasse, & ab eodem igne paullo post coagulatam fuisse.

Alia diffi-
cultas ex-
plicatur.

Cæterum & difficultas hic excutienda. Nam cum dictarum arborum cortex & folia amaro sint sapore, non abs te quæret quispiam, qui fieri possit ut tam dulcis liquor ex iisdem arboribus, si earum succus sit proprius, exsudare possit? Dicendum, hunc humorem non ex cortice, sed ipsa ligni interioris substantia, quæ sapore dulcis ferè est, aut saltem non amara, oriri, & per corticis fissuras promanare.

Idi-
oth.

Sed, cur corticis amaror contactu continuo eandem non inficit suo amarore? nimirum eiusdem corticis humor, exiguus cum sit, à Solis calore coctus, tandem & ipse dulcis redditur. Et quia maior succi ligni quam succi corticis copia, illius sapor, non huius prævalet. Adde quod cum per tennes ac angustos corticis mestus idem excernatur ac transudet humor, quod eius crassum est, in substantiam corticis impingitur, ita ut per eos expelli nequeat, nisi quod dulce & tenue existit. Id quod contingit etiam in separatione aquæ dulcis à salsa & amara per vas cereum ac tenue, per quod tennes dulcesque aquæ partes reludant: reliquæ, transudare ineptæ, obhzrent.

Ab aqua
separat.
ne.

Certum autem eiusmodi Mannam quam in Fraxino admodum copiosam provenire diximus, in Orni foliis nunquam vel colligi vel reperiri: imò nec in ramis aut surculis, nisi perquam rarissime: & sortè quæ neutiquam in iis sit genita: Sed quæ ex caudice aut ramis ipsi proximis defluerit. Eam verò in caudicibus seu truncis, aut crassioribus ramis duntaxat colligunt. Causa autem esse potest, quod cum in faxis magis montosisque ac siccis locis proveniat Ornus, siccioris etiam naturæ, h. e. minus humidæ sit quam Fraxinus, quæ, ut dictum, locis humidioribus, concavisque magis gaudet, vel Theoph. & Plin. auctoribus. Quapropter Ornus tantam in se non continet humiditatem superfluum, nec adeo dilutam ac tenuem ut ad folia usque exiguosque ramulos perveniat. Est item scabrosa arbor, ita ut faciliè priusquam ad folia usque aut surculos promanet, in caudicis crassiorumque ramorum corticem absumatur. Quod vel ex eo probatur: quod qui eam colligunt, aiunt huius arboris Mannam perfectiorem esse, si manè & vespere legatur, quam meridie sub ardente Sole. Quia ex immodico Solis calore aridior sicciorque redditur, & propterea imperfectior. Contrà quam in Fraxini foliis fiat: in quibus non manè nec vespere, sed meridie, ac calidissimis diei horis, ut dictum; colligitur Manna. Manè enim humidior cum sit, colligi nequit.

Minima
folia.

Satis autem exigua est ea, quam in foliis reperiunt, & velut in hum parva eius grana: ita ut faciliè conici possit ex eiusdem arboris ramis super

folia decidisse potius, quam in eisdem genitam esse: aut saltem propterea, quod magna ex parte ut collectores referunt, in Fraxinis Manna emanat ex ramis, ea potissimum parte, quæ foliorum pediculi eisdem annectuntur, atque in eisdem met pediculis & ramis coalescentem intueniunt. Poterit ob id, quæ in foliis reperitur per eosdem pediculos ad folia effluxisse, cum tam minuta sit, ut vix semunciam vna alterave die ex foliis colligat.

Nec alienum à ratione cuiuspiam videri debet, quod in Fraxini foliis & iuxta pediculos eorum reperitur, cum id eveniat propter Fraxini humiditatem superfluum, quæ non tantum per caudicem & ramos diffundi, spargi atque transmitti queat, sed & ad foliorum exortum atque ipsa adeo folia, per quorum poros transudet, & à Solis calore concreseat. Aiunt etià minuta illa grana, quæ manè supra folia reperiunt, eodè etiam die Sole superveniente, augeri maioraque reddi, quæ postea vespere colligunt. Quod fieri haudquaquam posset, si ex aère fuisset delapsa: nam à Solis calore potius liquefacta ac absorpta fuisset quam concreta & adhaerere.

Quapropter valeant, qui Mannâ in Fraxinis & Orni foliis repertâ, aëream seu roridam, ac è cælo delapsam esse contendunt. Dictum autem non abs te, folis: Nam contingere potest, ut eadè arbores in quibusdam locis, in quibus aërea Manna decidit, reperiantur: & ita supra easdem etiam decidere poterit. At non supra eas solas, & quotidie per multos dies, sed supra ceteras quoque oēs, ut & herbas, & frutices, & lapides eiusdè loci. At quæ in Fraxinis & Orni foliis generatur & reperitur, non tantum spontè certis temporibus ex iis profluit, sed & incisione facta copiosius.

Verum non vnus est duntaxat earum incisionis modus: nam quidam factis nonnullis incisuris in toto caudice, sequenti demum die eam colligunt. Quidam verò aliquot diebus ante easdè arbores incidunt inferioribus tantum partibus, & deinde eadem collecta, quæ primò effluit, demum & aliam effluere sinunt, ac denuò colligunt. Alij verò, prætermittit omnino ea, quæ per primas effluit incisuras, post paucos dies aliis in locis superioribus easdem arbores incidentes colligunt: quæ quidè præ cæteris dulcior, ac non parum saavior existit, purgata, ut aiunt, per primas incisiones arboris, h. e. excreto eo humore, qui impurius, & propterea amarior & crudior erat. Id verò in Orni potius quam Fraxinis non abs te machinati sunt: nam Fraxini humidiores cum sint, ut dictum, spontè magis, non tantum è caudicibus & ramis, verum etià è foliis eorumque pediculis, & qui iuxta eos sunt oculis, talem emittunt lachrymam. At Orni, ut quæ sicciores natura sint, h. e. minus quam Fraxini humide, corticisque duriores & scabriores, locisque saxosis, montosis ac siccis degant, tantam in se humiditatis copiâ non continet: nec adeo dilutus & tenuis est eorum humor, ut ad ramos & folia eum spontè emittere valeant: sed in caudicem solum, & rarissime in ramos. Quapropter ut copiosius effluat ex eis humor, eisdè vulnera iniiciunt: ita. n. & promptius effluit, & à Solis etià calore, non parum arbores incisæ ad expulsionem iuvantur, eundem scilicet humorem ad corticem trabente.

Validissimis itaque rationibus atque experientia probatum est, eam Mannâ qua hoc tempore in Italia videtur, quaque etiam prædecessores eorum videri suere per plures annos, ad alvum molliendâ, non esse eam, quæ eiusdè generis cū rore existit, & de qua Arabes scripsere, sed Fraxini ac Orni succum proprium atque concretum, quæ ex eisdè duntaxat in regno Neapol. plarisque in locis, præsertim Calabriz colligunt, & per plures annos se collegisse fatentur, hunc colligendi modum à maioribus habentes.

R 2

Cur in Fra-
xini foliis
potius quàm
Orni com-
creseat.

Incisionis
modi.

1.
2.
3.

Fraxini
plus emittit
Mannâ
quam
Orni: quia
cur?

Hæc de Mannæ arboreæ generatione, generationisque modo, quantâ potuimus diligentia ex Altomari doctissimis scriptis collecta approbat etiam doctrina insignis Medicus & Philosophus Goropius: qui in suo Niloscopio ita scribit. In regno Neapolitano, in collib. plurimis & clivis montium Ornus multa luxurat, quæ vulnerata, Mannam nostram, quam Calabram vocamus, exsudat, quæ Mellis ærei & Mannæ veræ loco vti ferè solemus, eo quod huius incerta, illius certa copia, & arbores quotannis, æc non quotannis idem reddat. Huic tamen Altomari Goropii & nostro sanè iudicio probabili ac verisimili sese obiciunt Matth. Celsalp. & alij quidam.

Contra-
ria opinio
Matth. &
Celsalp.

Foliorum
Mannæ.

Sic enim Matth. insit. Mannæ alterum genus à Calabris defertur, plurimi penditur quæ stirpium frondibus incidens colligitur: proinde foliorum Mannæ cognominata, minutis granulis constans, translucida, gravis, Mastiches granulis similis, candida, gustu dulcis atque suavis. Secundas partes sibi adsciscit, quæ ramis insidet. Tercias vera, quæ lapidibus in solo inhaeret. Hæc granulis constat crassioribus, & calore longè minus sincero. Ex ea, quæ nocte peracta è cælo deciderat Consensit, quæ est Calabria civitas, mihi facta fuit copia super Fraxineis frondibus, quæ iulapu perfectè cocti guttas procius referebat. Accepi ibi ab incolis, quod hæc manè legitur, priusquam Sol exortus admodum excalfaciat. Namque postea Sole liquefacta absorbtique facillè evanescit. [Hoc planè negat Altomarus & ait, Fraxineam & Orneam Mannam solam à calore concrefcere & indurari.] Quapropter plerique (ut à nonnullis audiui) ubi in magna deciderit copia, summo mæne arborum ramos præscindunt, & in opacis collocant, ubi concretam maiori commodo legunt. Non parum aberrat Altomarus, cum contendit Mannam quæ in Apulia & Calabria è Fraxineis legitur foliis, è cælo haudquaquam decidere sed ex ipsa planta exsulare. Explodenda autem omnino videtur sententia Monachorum, cum pro certo asserant, Sirio ardente Mannam non solum rosis modo super arborum & herbarum folia reperiri ætis & cæli clementia, sed etiam arboribus, Fraxino scilicet & Orno absque aliquo cæli rore, gummiu modo, inciso earum cortice, in lachrymas concrefcere. Siquidem ea Mannæ, quæ inciso harum arborum cortice collachrymare cœpit, nullus quidem plantæ liquor est, sed ipsa eadem Mannæ, quæ diebus superioribus easdem in arbores ab ære deciderat. Nam cum illis regionibus usu veniat, quæ præ cæteris prædictæ arbores eo mellifluo flore affatim abundeque madescant, sitq; cortex Solis ardore nimio sitiens ac rimosus, magnam liquoris quantitatem intra se absorbet. Quo fit, ut postmodum exurente canicula, inciso eodem cortice idem liquor exiliat, & in grumos concrefcit: qui tamen cum leves fungosique sunt ob arboris succi missionem, infelicitè operantur, nec alterius Mannæ viribus correspondent. Quod autem id tantum Fraxino Orneoglossoque eveniat, cum melleus ille ros in universum omnes occupet plantas, in causa est harum arborum nobis occulta potestas, ut magnetis ad ferrum, & succini ad paleas. Quippe omnibus clarum est, apud Calabros & Apulos solam Fraxinum & congenerem Orneoglossum Mannam in se contrahere, retinere, densare ac cohibere: ex aliis verò arboribus eandem statim defluere, & in subiectas herbas, petras, solumque diffundi. Quare ab his duntaxat arboribus inciso cortice, non sanè pri-

Altomari
not.

Monachi
reprob.

Fraxinum
& Orneum
nullam
Mannam
exsulare.

mò, secundum naturam, sed ex accidenti defluit Manna. Verum optimi illi patres [Monachi] contenti (ut fallor) cortice, internas illarum arborum partes penetrare neglexerunt. At incolæ qui ex maiore huius liquoris proventu plus anni referunt, rei naturam diligentius investigarunt. Monachorum sententiæ adstipulatur Altomarus, cum ipse sibi persuadeat, communis usus Mannam, nihil roscidi celestisve liquoris continere, sed tantum [ex arbore esse:] quod etiam multis conatur ipse comprobare, cum tamen plura sint quæ non consentiunt, id ego examinandum sapientioribus relinquo. Hæc Matth. contra Monachos & Altomarum.

Ex arbore.

Cui adstipulari videtur Celsalp. sic scribens: Disquirendum utrum Manna, qua utimur sit inter genera mellis ærei, an prorsus succus Fraxini & Orni, ut contendere nituntur quidam ex recentioribus, & Mannam nostram, à genere Mellis & Manna Arabum explodunt. At eo modo [quo illi de Fraxino & Orno] cavillari etiam de Quercu licebit, cuius foliis maxime insidet mel acreum. Si enim ros non magis super unam plantam quam aliam decidit, cur maxime hoc genus reperitur in Quercu? Quod si id tribuatur naturæ Quercus, ut liquorem illum celestem conservet, alia autem plantæ magis & minus absumant, cur eadem non liceat & Fraxinis & Orni assignare? Quum enim intemè hauriant hunc rorem, totum autem non absumant in nutrimentum, aut ob multitudinem, aut ob aliam causam, necesse est, ut reliquum tanquam excrementum expuant, alteratum tamen & magis addensatum, quam in Quercu, ob aliquam eius concoctionem, ob id non in foliis solum reperitur, ut in multis aliis arboribus, sed undique ex intimis corporis exit. In foliis autem Quercus maxime reperiri melleum liquorem dicemus, quia ea arbor minimè omnium bibat eius hominem: idcirco defluit mellea substantia ex iis, non multum addensata, & Sole adventante facillè evanescit, ut contingit substantiæ æreæ facillè in spiritum resolubili. In quibus autem paucissima, aut nulla reperitur huiusmodi concretio, cum tamen locus eo humore scateat, ut quibusdam Fraxinis & Orni contingere aiunt, absumitur avidus eiusmodi humor in earum nutrimentum, ideo nec ros liquidus permanet in foliis, nec expuitur addensatus. Neque illud omninò verum à frigore noctis addensari rorem in melleam substantiam, ut modò concrefcit ad similitudinem pruinae ob vehementiorem frigiditatem, modò in liquidiorum substantiam ad rosis similitudinem à minori frigiditate. Non enim hæc corpora aquea tantum sunt, ut ros & pruina, sed terram habent æri mixtam, ut tradit Arist. 4. Meteo. c. 7. de melle. Nam & mel quod apes cõdunt in suis alveolis, ex huiusmodi rore cõstat: quodque super diversas plantas colligitur, non succus earum, neque fructus, neque pars, sed eiusdem est cum rore generis, ut testatur Gal. 3. de Alim. fac. c. 39. non tamen omninò ros, simplex scilicet aqua, sed ob æstivam caliditatem terræ in halitum digestæ commixta, & incrassata magis & minus in melleam substantiam. Eget tamen halitus aqueus frigiditate noctis, ut constet, simplex quidem in rorem & pruina, commixtus autem in melleam substantiam, quæ non amplius à solo calido liquatur, sed ab humido, ut sales. Aliqua tamen ex parte à calido sicco liquari huiusmodi corpora, quatenus à frigore condensata sunt, non est absurdum, ut contingit Nitro, Alumini, Calcantho, Saccharo: In igne enim prius liquo-

liquefcunt, deinde ficcantur: humido autem frigido, id est, aqueo, omnia hæc corpora folvuntur, non calido, quale est Oleum. Hæcenus Cæfalp.

Cæfalp. ex Matth. ap. in rumen- tur.
Sed quæ tunc ipse, tunc Matth. protulit adversus sententiam Monachorum & Altomari, minime nobis videntur evertere eius rationes, & experimenta quanquam iisdem etiam Amatus subscribat.

Apoll. re. prehend.
Hæc, inquit Apollonius [de saccharo scribens adversus Matth.] naturæ sunt arcana, Philosophis ipsis incomperta: nec verisimile est tantam mellis rosis copiam intrudi posse, quanta per tot dies exhauritur, &c. Sed ipse etiam Apollonius, in re sibi incognita, uti patet, fluctuans, Monachos temere carpit: mox ad naturæ arcana, ignorantium asyllum confugit, Philosophis dicens incomperat, cuius tamen postea causam & modum harrolari verius quam studiosa inquisitione vestigare videtur.

Observatio.
Peoa & Lob. tradunt, ramos quagnos Laricis & Fraxini præcisos, atque in vinariam cellam quæstaus tempore Manna colligi solitum est asportatos, Mannam postero die, quanquam non perinde nitidam ostentare: quæ omnia, ut ipsorum reliqua: nec non etiam ea quæ Pamphilus Herilacus de Manna ex Ornifraxino tradit, cum Altomari sententia optime consentiunt. Considerentur etiam alia quæ antea ex iisdem tradita de generatione Mannæ, & de Elæomelite: quæ itidem omnia facere videntur pro Altomari.

Nam est Sacchar. Gal.
Mirum autem Galeni temporibus neminem istud, ac ne ipsum quidem Galenum tale quiddam observasse, vitam quoque Romæ agentem. Nemo enim asserere audebit Mannam hanc id esse, quod à Gal. 7. simpl. sacchar nominatur. Nam id quoque ut de Melle saccharo dicebat Dioscorid. ex India & scilicet Arabia convehitur, ut Gal. inquit, & in calamis, ut aiunt, concrefcit, non in Fraxinis & Ornis, ut à prædictis autoribus constanter asseritur. Ideoque idem esse cum Altomari putamus Mel saccharum Dioscoridi: & sacchar Gal. de quo plenius suo loco.

Elæomela indidum veteribus.
Nec quicquam etiam referre ait idem Altomarus, si Theophrastus, cæterique veteres autores, qui de plantis scripserunt, inter eas arbores, è quibus humor emanat, coagulatur atque conficit, non connumerant: nam neque Oleam tam domesticam quam silvestrem, inquit, quæ sponte, & vi etiam similem procreat lachrymam, ut diu à quibusdam observatum est meminissent.

Crimini er. tur.
Cæterum ex his, qui Thuris Mannam cœlestem hanc [sic vocat Matth. hanc Fraxini & Orni Mannam, cuius hæc sunt verba] esse crediderunt, Crinitus Florentinus quoque fuit in cuius censuram Manardus Ferrariensis lib. 1. suarum epistol. peculiarem epistolam conscripsit. Veruntamen venia illi danda est, cum & Serapio, qui Mauritanis omnibus in simpl. medic. historia præstitit, Thuris Mannam cum cœlesti inepte confundat.

Serap. lap. ju.
Brassavolus, Apollonius & alii quidem prædictorum autorum Mannam Calabrienfem triplicem faciunt: primam & præstantissimam, vulgò Mannam de foliis dictam. Quippe rustici folia aptant, & veluti tegete extendunt: plantæque latiorum foliorum arbores, ut aptius colligatur, & parum supra aliam rem cadat. Eadem & frondacea dicitur, quod stirpium frondibus insidens colligatur: atque oblongis constat granulis. translucens, gravis, mastiches in morem lenta primum, mox facile liquefcens, alba & suavis. Secundas sibi vendicat, quæ trunco, ligno & arborum ramis effluit ac in-

Ligni vel hareret. Ideo & ligni vel trunci Mannam, alii Man-

nam è corpore vocat. Tertia cæteris deterior, in terram defluens aut petras, arenulis permixta, colore livente, minus sincera. Hæc Manna terra dicitur. Eadem igitur res supra diversa cadens, aut è diversis promanans, varia nomina, diversaque species (si modò verè differentia specierum dici possit) vel varietates sortitur.

Verum aliter Amatus de Calabriz differentis statuit, dum putat eam ex aëre defluam esse. Sic enim ait: Manna est ros qui præcipue cadit in Calabria, unum supra folia, quod perfectissimum est, vulgò dictum Manna de folio. Aliud supra ramos & caudices arborum, primum deterius, sed crassius & corpulentius. Tertium verò supra terram, cæteris deterius. Quæ verò super lapides cadit, mea sententia, inquit, cæteris generibus nobilior censenda est: dicitur verò Calabrensis Manna hæc Mastichina, quæ tanquam præcipua celebratur & in pretio hodiè habetur.

Altomarus amariorem dicit eam quæ incis arboribus profuerit, Calabria Ideo Mannæ forata dictam. Hæc ex Orno est.

Ita vides quanta sit autorum varietas in Mannæ historia & generatione. Nunc Calabrenfem Amatus Mastichinam vocat, qualem plerique alii Orientalem dicunt: & nobiliorem æstimat quæ supra petras cadit, quàm alii deterrimam putant.

Pamphil. Heril. Mannam ex frondibus facillime liquari ait à Sole, idque Manna ex corpore non contingere.

Adhuc aliter distinguit Cæfalp. sic tradens Fraxinum & Orni solas Mannam ferre testatur (Sylvaticus) in Calabria, circa canis ortum, cuius est vici in tota Italia ad alvum leniendam dissolutè itere, aut sero, pondere duarum vnciarum aut trium: minutissimum. n. est medicamentum, solum tenues humores educens. Sunt aut micæ quædā candidæ, aut flavescentes, pingues, sapore mellis. Eius differentie sunt: Nam quædam minutionibus micis constat, quæ Mannam foliorum vocat, quia ex foliis colligatur, quæ magis probatur: altera crassioribus, quam Mannam corporis appellant, quia ex ramis, tanquàm ex corpore arboris habeant: & hæc aut sponte, aut vulnerato cortice: [hæc tanè contrariantur opinioni Cæfalpini, qui negat Mannam ex arbore promanare, de qua re antè] Nā ex vulnere primo exit liquor turbidus, nauseosus cum quodam amaritudine: postea emanat purior, quamvis glebis grandioribus.

Probatum pinguis, & quadantenus translucida, Mastiches quàm similima. Improbatur arida, & cinerei coloris. Item sapor optimæ suavis cum dulcedine modicè linguam mordens, quæ. n. morfu caret, evanida est, & quæ nauseosa, est impura, aut adulterata, aut senæ infusione, aut addito Scammonio.

Si desit Syriaca Manna aut Calabrienfis, vtridum monet Lob. Briançonensi ab vnc. j. & s. ad vnc. iij. Et asserit quosdā inuitores, qui illinc veniebant, hodie illic perpaucam aut nullam inveniri, planèque conquestos defuisse: quod in verum de Calabria, viderint incolæ.

Matth. ait Mannā Italicam, præsertim Calabricā pluribus annis incorruptam perdurare. Id negat Altomarus: & bonitatem eius perfectā non supra annum extendit. Herilacus cauet ne in compositionibus Arabum veatur Manna dicta ex corpore, & addit eiusmodi gumis nos falsè uti pro Manna.

Lacuna Mannam ex Calabria tantæ bonitatis dicit, ut conferri possit cum Orientali.

Garcias Mannam Calabrinam confert cum ea quæ ex Persiæ Becora urbe aduehitur, magnis glebis admixtis plerumque folijs.

*fraxini
Manna. 2
3.
Manna terra
ra.*

Amatus ap. in de differentis Calabrica.

*Mastichina
na.
Amariol
Orm.*

*Cæfalp.
ap. in de
syl. dam.*

*Dos. m.
du. q. ex
habendi.*

*Cæfalp.
m.
Turbida:
Purior.*

Delosm.

*Adal.
rium.*

Doratio.

*Similis
Persica.*

Et Acosta ei similem dicit adulterinam quandam in Ormuz, & tertiam Indicam, de qua & alii Indici mox. Idem etiam testatur vulgariorem Mannam in Hispania esse Calabrinam, verum meliorem quæ ex Oriente Venetias adfertur.

Manna Halepi.

Rauwolf. quoque Mannam quandam Halepi haberi scribit, similem Calabrinæ. De Manna tridentis consule etiam Coliseum & quinquernum, quorum neuter nunc nobis hæc commentantibus est ad manus.

An omnis

Manna

Medici lo-

cat vnt

Tardè ut ad vires transeamus, placent iucunda & utilem Medici hoc loco quæstionem præmittere. Nam cū non constet, saltim ex probatissimorum autorum plerisque duplicem esse Mannæ originem: alteram ex ære seu rariore alteram ex Fraxino & Orno: harumque varias esse differentias: quæritur an Medicis indifferenter atque innoxie eisdem Mannæ speciebus, alteramque pro altera uti liceat: & num una eiusdem speciei sit altera perfectior: & quæ imperfectior quodammodo eorum est, nunquid omnino vitanda & explodenda?

Altomari diligentissimi de Manna scriptoris iudicio, *Aerea Manna*, ex rore genita, ab Arabibusque descripta, purissimum concietia, & quam Mesues commendat, ad eos usus quos ipse ac Scrap. & Avic. probarunt, est utilissima. Eius vires antè posuimus post generalem Mannæ historiâ. At eius delectu, num *arbuta* seu *Fraxinea* & *Calabrina* dicta liceat uti: Cū, ut ostensum, ex Fraxino, & Orno quæ Fraxinus sylvestris est, profluat, utique earum vires quodammodo imitabitur. Nā si mel roscidum æthereque Manna cadens suscipit aliquid de virtute plantarum supra quas cadit, ut Gal. & Mes. volunt, quanto magis proprius earundem plantarum succus, eisdem conturbabit facultates, quæ ipsis arboribus propriæ sunt?

Vires

temperam.

Manna

Calabr.

Cū itaque *Manna Calabrica* Fraxinea, seu lachryma Fraxini, quam Mannā vocant, dulcis sit cū obsecuto quodam amaro, nec multo crasso lētoque humore plena, consequens est moderatè calidam esse, gratam & naturæ nostræ amicam. Et ob dictas facultates, ut diximus ex 4. simpl. vim habebit concoquendi, laxandi & rarefaciendi, quemadmodum reliqua dulcia: nec non fundendi, levigandi ac molliendi, ex 4. & 5. de simpl. Gal. Et ut summatim dicamus, cunctas etiam præstabit utilitates, quas Arabes *aerea Manna* tribuerunt, quatenus dulcis est, quavis non tantæ humiditatis sit particeps, neque ad eam temperatè calida existat. Amaritudo. n. vix sensu perceptibilis, talis non est, quæ dulcedinis vim obfuscare aut impedire possit. Eius tamen ratione etiam magis abstergendi vim habebit, extenuabit, humores crassos incidet, ac infarctus liberabit. Quapropter & menses movebit, pituitam & pus ex pectore exterminabit, tantò efficacius quanto magis à dulcedine ad amarorem inclinabit. Quapropter non solum probandus Fraxinea, & Orni Mannæ usus, sed propter hunc vel maximè præ aliis diligenda. Sed quid opus multis rationibus, ubi sensus & experientia in aperto sunt? Nam rationes querere earum rerum, quæ patent sensui, infirmitas quadam intellectus est, ut merito Arist. dixit in 8. phys. contra Zenonem omnia quiescere dicentem.

Arist. de

contra Zenonem.

monem.

Blondè

purgat.

Neque. n. ipse solus, inquit idem Altomarus, sed oēs ante me & iuxta me in hac regione medici hac Manna bono ac felici successu, citra ullam noxam eorum, qui sumpserunt, usi sunt, præsertim ad alvum molliendam. Nam nec inquietudines & fastidia, neque tormina, colliquationem, superpurgationem aut eiusmodi malum

symptoma assumpta excitat, aut excitavit vlla, sive ex foliis, ramis aut caudice fuerit collecta. Omnino enim se prædictos usus omnes felicissimè expertum esse Deum immortalem testem advocat idem Altomarus, omnesque medicos posteror ad eius usum inuitat & hortatur. Ab ea verò quæ incisione prolicitur, cauet abstinendum in ardentibus febribus, alvi fluoribus, dysentericiis, aliisque calidioribus morbis, similisque naturæ corporibus: ac etiam ætate, regionibus, annique constitutionibus valdè calidis: non tamen ad eam, ut cetera phasmata alvum solventia, quæ calidiora sunt, dictis temporibus, locis atque personis prohibendam censet. Eius tamen usum, quæ ex foliis & ramisque pediculis ac oculis profuit, quolibet anni tempore, quavis corporis constitutione ac morbo exhiberi tutius posse. Denique ubi Arabum Manna haberi nequeat, eam utendum suadet, quæ spontè ex dictis arboribus emanat: nam eosdem ferè præstare usus, quos Arabes sæ Mannæ tribuerunt, & longè plures, præsertim eam, quæ ex foliis & pediculis eorum colligitur: quod sincerior, dilutior ac tenuior sit ceteris, quippe magis concocta, ideoque dulcior: ac de foliorum viribus non nihil participet, quorum succus, uti suo loco dictum, serpentum ictibus valdè opitulatur, Diosc. & Plin. autoribus. Hæcque non solum serpentum ictibus, sed & eadem ratione malignis pestilentibusque febribus auxiliari. Huic proximam esse, quæ ex ramis & caudice spontè profuit. Terciam in bonitate esse eam, quæ non ex primis illatis cæsuris colligitur, videl. quæ ex eisdem primò profuit, sed ex aliis vulneribus post aliquot dies factis. Nam quod primò effluit, impium, inconfectum, ac excrementosum valdè esse: & proinde puriorem, perfectiorem dulciorémque ex secundis cæsuris. Neque tamen penitus & illam respiciendam scribit quæ primò primis illis incisuris profuit. Nam & hæc quoque, licet amaritudinis cuiusdam sit particeps, dulcedinem tamen magis præ se ferre, quæ perpetuè in ea prævaleat: nec aliter differre à prioribus, nisi quod calidior sit, quapropter etiam valentius operetur, sibi que ita longa experientia confirmatum esse. Ac si noxa quædam ex eius uso, ut tormina, calores, &c. supervenerint, id medici culpa, minus rectè ac intempestivè ea ventis, aut morbis vel corporibus, quibus non competeat, exhibentis, factum esse: aut quod plus æquo dederit, vel Mannam æream putant: aut certè quod pro hac ipsa aliam vitiosam aut adulteratam præbuerit, constanter asseverat.

Carm.

Serpentum ictus.

Febres malignæ. Bonitatis earum gradus.

Delectum.

Suadet tamen semper recentissimam, quantum fieri possit, deligendam, humidiorémque: vetustam & aridam omninò vitandam.

Quæ si ita se habeant, quis Mannæ Calabrinæ, quæ ex Fraxino & Orno est, usum deinceps ausit repudiare. Sed iam & ceteras Mannæ differentias persequamur.

MANNA ORIENTALIS MASTICHINA.

MANNA etiam ex partibus Orientalibus ad nos deferitur, & præsertim ex monte Libano. Venetis magna copia habetur. Brasavolus scribit ex Orientalibus & Meridionalibus

Granatim.

bus partibus & alterum genus Mannæ importari, sicut mel liquidum, præter illud albicans granulosum, hoc est, ut ille ait, Manna Arabum. Et addit: Nicol. Nicolucium à Mauro quodam huius liquidæ Mannæ pyxidem emisse, & ea mirros eff. cūs fecisse.

Amatus quoque tradit Mannam Orientalem ex monte Libano & aliis locis Venetias illatam aliquando granulosam, aliquando liquidam, mel referentem. Primamque Arabes Mannam absolute, secundam Tereniabin vocare.

Mastichina. Bellon. priorem Mastichinam vocat, pellucidamque esse ait, exiguo grano: atque hanc præcipuam agnoscere Venetos, granulatam dictam: Gallis Granatam: vulgò Mastichinam dici, quod Mastiche sit adsimilis.

Granulata. Orientalem Mannam parvi fieri in Italia Monachi tradunt, quod non possit haberi ita recens, ut Calabriensis.

Bombycina. Matth. sanè scribit, eam quæ ex Alexandria Egypti adfertur, Mastichinam dictam, uno duntaxat anno in suis vinibus perlitere. Aliqui eam præstantissimam dicunt: alteram verdè infirmam ac vilem, Bombycinam nuncupatam. Lacuna quoque Orientalem perfectissimam dicitur. Hanc eandem Lob. Mastichinam, Granatam & Syriacā vocat, pro qua substituit, ut antè dictum, Brianfensem.

Apollo quoque Orientalem primam & præstantissimam facit eam quæ Mastichina dicta, in quosdam quasi grandinis callos niveolique globulos densatam.

Syriaca di. Serfita. Fertur (inquit Cæsalp.) aliquando & ex Syria longè candidior Italica, Mastichina vocatur, quæ translucida: Mastiche similis, parvis granulis, effacior Italica. Bombycina autem minimè translucida, crassioribus micis Gossipii. Putant hanc

Adulterata. Saccharo adulteratam esse. Sed dentibus deprehenderetur: Saccharum enim sub dentibus crepitat. Manna autem mollis est.

Bombycina nuda. Veneti, notante Bellonio, aliter quàm Galli negotiatores distinguunt, in Mastichinam seu granulatam, & Bombycinam. Hæc ideo sic vocat, quod floccorum bombycis referat effigiem, quæ quidem vilioris est pretii quàm illa, neque tantæ dulcedinis particeps: cuius etiam si libram edas, alvum tamen nunquam subducet, ideoque Mannam istam ex rore aëreo venire, mellis modo, nemo dubitet.

Bombycina non purgat. Alcomarus Bombycinam adulteratam putat: Sed hanc rem Venetorum doctissimos Medicos posteritatem docere par est.

SIRACOST ET MANNA XIRQVEST INDICA EX ARBORE QVEST.

Pro interpretatione vocabuli Siracost hic referemus & contrahemus quæ Monachi copiose scripsere in Mef. supra compos. Diasiracost.

Siracost sive Xiracost sive Asiracost &c: idem est: secundum Simonem lanuentem, & nonnullos aliquos ex iunioribus, est quædam species Mannæ. Et in testimonium citant Avic. cap. de de manna. Bellon. in interpret. ait Siracost esse Mannam, quæ apud Italos in usu est. Pandectario Alsiracost, & Xiracost Arabicè, est Manna. At Siracost eidem est Manna vel succus fructuum. Avic. autem licet capit. de Manna dicat, Mannam coagulari & exiccare sicut gummi & sicut Tereniabin & Alsiracost, & mel de terra Cusuram &c: non tamen per hoc declarat nobis Siracost esse speciem Mannæ. Nam ad instituendam aliquam similitudinem [quod ille facit inter Mannam, gummi, Tereniabin, Alsiracost

& mel &c:] non semper est necesse adducere species eiusdem generis illius rei, de qua quæritur similitudo ipsa. Non omnia verdè illic posita, esse species Mannæ probatur: quia sicut gummi & mel non sunt species Mannæ, ita fieri potest, ut nec Siracost sit eiusdem species. Sira enim sive Xira Arabicè succum significat. Quoniam igitur, ut dicebamus, Pandectarius ait Siracost non tantum significare Mannam sed etiam succum fructuum, ideo fieri potest, ut sit succus alicuius fructus coagulatus ad Mannæ similitudinem, & non species Mannæ. Et quamvis Avic. de unoquoque præparatorum loquutus sit in proprio cap. tamen proprium cap. de Siracost, neque sub hoc, neque sub alio quovis vocabulo reperitur in eius 2. can. qui est de simplicibus. At est apud eundem Caput de Tereniabin. Potest tamen esse, ut communis opinio est, Syriacost esse veræ speciem Mannæ: quia in sequentem Tripheram Persicam, quæ in multis cum ista collectione concordat, ingrediuntur Manna, & Tamarindi & Cassia pulpa, & saccharum Violatum, & alia multa sicut & in istam. Christoph. de Honestis autem in suis notatis, post Hierz infusiones ponit absolute Siracost esse Mannæ speciem: additque eiusmodi Mannam non amplius in nostras partes importari. Igitur si Siracost est species Mannæ, potest hæc compositio vocari Confectio Mannæ. Sed quia infra alia descriptio, cui titulus, Confectio de Manna: ad differentiam illius forte vocata & præsentem Diasiracost, quasi declarantes particularem ipsius Mannæ speciem: ut est etiam alio loco Syrupus Altereniabin, quod idem significat quædam Mannæ speciem. Igitur quando de Siracost non potest haberi melior certitudo, loco eius si ponitur Manna aërea sive arborea, nostro iudicio rectè fiet. Idque eo maxime, quia in exordio eius descriptionis ait Mef. esse medicinam benedictam in febribus acutis &c: Et Manna similiter ab ipso autore inter medicinas benedictas connumeratur. Ego si (ut diximus) ponitur Manna in ipsa compositione, non agitur contra autoris intentionem. Ipsa autem Manna debet esse recondita & perfecta: quia legitur ibi: Alsiracost boni & recentis &c:

Scribit Garcias: In India Mannæ primum generis utribus conservatum, sapore savi mellis, Xirquest aut Xirast vocari, id est, Latex arbore quest nuncupata: nam Xir lingua Persica lac sonare: inde nobis corrupto nomine Siracost nuncupari. Esse autem rorem quendam in eas arbores delabentem, aut gummi ex eis, destillans.

Idem etiam confirmat Acofta, nisi quod pro Xiracost, Xiracost habeat: & gummi eiusdem arboris dicit, Lectoremque ad Avic. relegat.

MANNA INDICA TIRIAMIA-BIN AUT TRUNGIBIM.

Manna in India alterum genus dictum Tiriamia bin aut Trungibim, ut vertit Bellonensis, in Carduis nasci ferunt, granis quàm Coriandrum maioribus: colore inter rufum & rubentem medio, quæ ex tribulis decutuntur. Vulgus plantæ fructum esse putavit, sed gummi aut resinam esse restitutum est.

Huius usus præfertur à Persis ei quæ utitur: quoniam quæ in usu est, pueris exhibere non audent, nisi 14. annum exceßerint. Ego tamen ab eo tempore quo in India sum, illa uti non stiti, & sine molestia purgare semper depre-

Sira.

An Siracost sit Manna.

Confectio Mannæ.

Altereniabin.

De Siracost.

Mef. cognoscit.

Manna.

utribus conservatum.

Xirquest.

Xiracost.

Arbor.

Quest.

Manna.

Carduus.

Descriptio.

bendi. Hæc Garcias. Eadēmq; ferè & Acoſta habet.

Trunſchib.
bil.
Fructus ſpi-
noſus Agul
et Alhagi.

Halepum, tradente Rauvolffio, copioſè adferunt Perſæ in utriusq; mannam ſub nomine *Trunſchibil* quæ colligitur ſupra fruticem ſpinoſam *Agul* & *Alhagi*. Hæc Manna conſtat granis paulò maioribus *Coriandri* ſeminibus, formâ & ſapore admodum ſimilis noſtræ *Mannæ Laticæ*. Poſſet exiſtimari *Iſraëitarum* manna, de qua Moſes ſcribit fuiſſe ſimilem ſemini *Coriandri* & colore *Bdellii*. Eam Mannam cadere in frutices ſpinoſos teſtantur *Serap.* & *Avic.* eū de Manna ſcribunt, quam vocant *Terentabin* & *Trunſgibin*, & *Cluſius* in epit. Indicarum plantarum.

Ait autem *Avic.* eam Mannam cadere in regione *Coraſceni*. At *Rauvolff.* poſiſſ. in *Perſia* ſupra *Agul*. Nos *Agul* ſive *Alhagi* plantæ hiſtoriam & iconem poſuimus lib. 10. cap. poſt Genitum ſpinoſam, & alias ei ſimiles.

MANNA INDICA CALABRINA PERSIMILIS.

Deſcriptio. **M**anna in *Indiam* 3. genus, inquit *Garcias*, magnis glebis advehitur, admixtis plerumque foliis. *Calabrinæ* perſimilis eſt, pluſque aſſumatur. Deſertur ex *Bacora* urbe *Perſica* admodum celebri. Eadem & *Acoſta*. Et *Rauvolff.* Halepi præter Mannam *Trunſchibil* & aliam *Calabrinæ* ſimilem haberi notat.

MANNA INDICA MELLICANDIDO SIMILIS.

Advehitur interdum *Goam* in utriusq; aliud genus *Mannæ* ex *Ormuz* emporio melli candido depurato perſimile. Sed facile corrumpitur in ea regione: propterea quod vitreis lagenis non aſſervatur. *Garcias.* Idem *Acoſta*, qui liquidam eſſe ait.

MANNAE ADULTERINÆ.

Deſcriptio. **M**anna ex Oriente altera ſpecies infirma & vilis, quæ *Bombycina* nuncupatur quippe quæ nil aliud eſt, quam aut evanida & ſenio exhausta *Maffichina*, aut ſaccharo aliſque impoſturis adulterata, notante *Matth.* Hanc ſolam ex Orientalibus vidiffe ſe ingenuè fateatur *Altomarus*, Venetiis tranſmiſſam, licet in cæteris inveſtigandis maximam adhibuerit diligentiam. Hanc verò ferro ac lateri ignito unâ cum *Calabrinæ* granis quibuſdam inieciſſe, tam eius quæ ex foliis, quam quæ ex ramis & caudice colligitur: illam autem protinus ſolutam & liquefactam: hanc verò ariorem duriorēque redditam. Soli quoque expoſitam *Bombycinam* non quidem ita repente ſed ſenſim liquefactam. *Calabrinam* verò duriorē redditam & albidiorē. Neque ſecus cenſendum putat de *Maffichina*, & de qualibet alia Manna è cælo cadente, quocunque in loco, ac quovis tempore, modo adulterata non ſit. Nam eū humidior & recentior ſit quam *bombacina*, conſentaneum eſſe ut citius ad Solem & ad ignem liqueſcat.

Maffichina
recentior
quam *Bombycina*.
Alia differe-
ntia.

Catalp. hanc inter utrāque differentiam notat, quod *Maffichina* ſit tranſlucida ſimilis *Maffiches* parvis granulis: *Bombycina* verò minimè, ſed ſimilis craſſioribus micis *Goffipij*. Quod ſi ita eſt, *Bombycina* ſane non erit verò *Maffichina*. Vetus enim quantitatem non augeſcit. Illius parva granula: huius micæ craſſiores. De qua ſe certiora docebunt *Veneri* ac *Neapolitani* medici ac inſtitores.

Bombycina
et.

Ait tamen *Apoſto* Mannam alteram Orientalem *Bombacinam* vocatam aut *Maffichinam* evanidam & ſenio exhaustam, multo ſaccharo, farina miliacea aut hordeacea, aliſque miſcellis viciatam, vilem, detestabilem, nulliusque momenti, floccorum lanæ & *Goffipij* effigiem candore præ ſe ferentem. Quod in *Saccharo* adulterata ſit, dentibus deprehendetur, inquit *Catalp.* *Saccharum* enim ſub dentibus crepitat. Manna autem mollis eſt.

Manna
adulterata
publi-
cè cre-
matur.

Teſtatur *Altomarus* iure ac prudenter à iuſtiſſimo ſuo præſide *Neapolitano* atque conſulibus de quadam manna ſancitum eſſe, ut igne cremaretur. Neque in eo ſuam ſententiam ſequutos, ſed pharmacopolarum & quorundam medicorum teſtificationem id decreviſſe, qui eam Mannam aiebant eſſe rem peſſimam, & humano generi omnino adverſiſſimam: quæ tamen verane an falſa ſint eorum conſcientiis ſe relinquere ſcribit: in eo ipſo ſuam prodens oſcitantiam, cum priùs dixerit iure ac prudenter crematam. *Mannæ* genus valenter purgans & magis ſolutivum reliquis *Mannæ* generibus medicus quidam *Brachmanes* in civitate *Cochin* in præſidio & familiari uſu habuit, ut reſert a *Coſta*, ex doctiſſ. ab *Orta*: *Faciſium* tamen erat & ſic parabat. *Amylum* candidum & puriſſimum, Mannam cuiuſcunque generis, ſed præſertim quæ *Calabrinam* amulatur, *Scaramoneam* & ſeminiſ genus *Viſa* dictum, quod ex *Bengala* advehitur, quodque *Lathyridis* grano ſimile eſt (iniecito interdum polline radicis cuiuſdam candidæ haſticinæ, cui nomen *Dante*) cum *Saccharo*, pauxillaque aliqua odoratæ aquæ permixcebat, ſolique exponebat.

Lapidu
Bezar ad-
ulterium.

Mannam autem adulterari nihil mirum, quandoquidem & lapides *Bezahares* tanto artificio in *Ormuz* & in urbe *Cochin* provincie *malabar*, ubi rex degit, adulterantur: ut legitimi appareant, fallantque etiam maximè expertos in iis dignoſcendis prima ſuperficie, qui niſi fragantur, vix à legitimis diſcerni queant.

Alia cum
ſenna.

Ita non inutiliter monet *Cordus* adulteratam & minimè probam eſſe Mannam, quæ grumis ſuis foliorum ſenæ partes aliquas complectitur, cuius nulla ad nos ex *Arabia* & *Agypto* Manna adferatur, quemadmodum *Sena*.

Alia

Et *Pamphilus Herilacus* tradit Mannam noſtram *Italici* conſuetam, ut plurimum non eſſe rorem de cælo cadentem, ſed vel concretam ex ſenæ infuſione vel aliis, & *Saccharo*, vel gummi hinc inde collecto.

MANNARVM ÆQVIVOCA.

Manna graminea longè diverſa eſt à *Manna* *torra*, arborea, ac etiam *Thur*, ut ſpecialius tradetur inter frumenta. Eſt & *Manna Thur* vocata extra harum Mannarum genus: de qua *Manardo* ſaccharum antiquorum ſub roſcendo, ſeu (quod idem eſt) aëreo melle, tanquam genere continetur. In hoc tamen differt Manna à *Saccharo*, quod Manna ſuper alias plantas & poſtas: ſaccharum verò ſuper harundines in *India* & felici *Arabia* proveniat. Sed *Manardus* *Alphroditi* opinione deceptus eſt, conſuſidentis *Saccharum* cum Manna, ut notat *Cordus*. Nos autem *Manardi* opinionem particulatim reſutabimus in hiſtoria *Sacchari*.

Manardi
error.

Nunc reliquos arbores ſylveſtres perſequamur.

DE

DE EVONYMO VETERVM

CAP. XIV.

Locus. EVONYMVS dicta arbor, autore Theoph. nascitur cum alibi, tum in Lesbo insula, in Ordymno monte. [ἐν τῷ ὄρει τῷ ὀρδύμνῳ: non ut vulg. habent: ἐν τῷ ἔρει τῷ ὀρδύμνῳ καὶ ὀρδύμνῳ. Nam & Dal. ita legit, & Const. vocem ὀρδύμνῳ ē margine irrepsisse suspicatur.] Est autem magnitudine Punice, & folio eiusdem sed maiore quam Chamædaphnes. Circa Septembrem germinare incipit. Floret verè: floris color, qualis in Leucoto, odore gravi, odorem trucidati animantis, aut in tabum putrescentis [ὁσπύ φόνου.] referente. Fructu cum suo putamine aut conceptaculo Sefami siliquis non abimili, intus solido, sed in quatuor versus distincto. Esu lethalis est arbor, tam fructu quam foliis pecori & ovium gregibus, sed maxime capris, nisi forte purgentur. Purgantur autem alvi profluvio. [ἀνοχῶ: Dal. legit ἀνοχῶ, inedia cibique abstinencia. Quid sit ἀνοχῶ, haud facile invenias, quanquam aliqui vomitionem & per supernam purgationem vertant, ἀπὸ τοῦ ἀνο. Hæc Plin. bona ex parte ita transcripfit. Nec aspiciatior in Lesbo insula arbor, quæ vocatur Evonymus, non abimilis Punice arbori, inter eam & Laurum folij magnitudinæ, figura verò & mollitia Punice, flore candidiore, statim pestem denuntians [sic ineptè πόνου transfert.] Fert siliquas Sefami similes, intus granum quadrangula figura, lethale animantibus, nec non & in folio eadem vis. Succurrit aliquando præceps alvi exinanitio.

Dod. de nostra Evonymo dicit, eius foliorum esu capras interire, nisi supernè & infernè purgentur. An hoc observatione habeat: an ex voce ἀνοχῶ, & Plinij lectione extorserit, ipse videt.

EVONYMVS MULTIS: ALIIS
TETRAGONIA:

Descriptio RAMOSA est arbuscula, Evonymus multis putata, aut certè frutex arboreus, altitudinis quatuor aut quinque cubitorum, cuius stiones læto virore perfusi, & nuper nati ramuli, propter corticem in quatuor angulos excurrentem, quadrangulares apparent, non secus ac si dolabræ ars perpolivisset, ipso altoqui ligno interno tereti, albo aut flavescente. Cortex vires

Rami crebro intervallo, in oppositos ramulos dividuntur. Folia oblonga acuta, crenata, ē Periclymeni genere Chamæcerasi dictæ foliis similia & æqualia, paulò post veris initium flores profert pallidos aut herbaceo quodammodo colore cōstantes, ex quatuor foliolis congestos, quibus totidem alternatim posita calyculi foliola subii-



ciuntur, pari numero spicibus luteis umbilicum curvofum viridatē cum stilo concolore occupantibus. Singulis flosculis singuli succedunt fructus, seu singulæ siliquæ quadrangulæ rubentes, aut puniceæ, [aliquando albæ, notante C. Bauh.] totidem distinctis loculis semina parva solida continent, cuticula crocea intacta, medulla alba, figura semini cannabis similia, hoc est, ex rotundo oblonga, sed maiora, sapore amaro, cum obscuro quadam dulcedine nauseabundo. Ipsa etiam arbuscula tota gravem & incundum habet odore in Materies eius sic satis solida, fissilis tamen & æqualis est: ea, cum adhuc succo turget, caesa, diluto croceo pallore etiam Buxum provocat.

Hanc expressè Theophr. faciunt Dod. Rob. Const. Pena, Lob. Matth. Anguil. Thallus. Cæsalp. nihil certi statuit: suspicatur tamen hanc ipsam esse Evonymum Theophrast. Ruell. dubitat. Curtius Evonymum Plinij vocat: At Evonymus Plin. & Theophr. eadem est planta.

Evonymos, i. boni nominis, per ἀνώνυμον: unde quædam exemplaria Plin. habent Anonymos, uti notat C. Bauh. At Cæsalp. suspicatur Plinium ex Theophr. depravatè Anonymon legere. Evonymo & Anonymon vocat Cordus. Evonymum sanè Theophr. esse idē volunt plerique, quod multæ notæ eius historię respondent.

Hist. verò Lugd. quam Dalech. primò incepisse constat, Evonymum falsè creditam ait ab omnibus: ferè Herbariis. Idem alibi: Herbarij, inquit, quam Matth. Evonymum esse putat, Evonymum esse negant, sed Tetragoniam Theophr. esse volunt. Gaza Quadratoriam interpretatur. Sic dictam hæc censet Dal. quòd rami ob linearum quatuor ruffarum serratarum, dorso modo exantium, recta per viridem corticem porrectarum, discursum, quadranguli appareant, quod huic arbori peculiare est: & quòd in fructu quadrangula siliqua sit.

Evonymus Græcorum inquit Clus. Evonymus Latinorum censetur potiori doctorum virorum parti, tametsi quidam aliter sentiant, & tetragoniam, cuius solum nomen apud Theophr. inter serò germinantes reperitur, esse velint.

Nos sanè hanc Evonymum pro certo nondum asserere audent: tantisper tamē ita appellare lubet, dum aptius nomen reperitur.

Quod si verò vulgaris hæc nostra Evonymus est Tetragonia Theophr. ut volebat Dalech. (quod ut non negamus, ita non temerè in tanta eius brevitate asserere ausimus) & Evonymus etiam eiusdē sit eadem, ut ex diversorum Herbariorum sententia colligi potest, inconsideratè sanè Theophrastus eandem plantam diversis nominibus tradidisset.

Tragus (ζύγις & Carpinum, alii tugalem dicunt. Sed salitur Tragus, quod facile animadvertet, qui descriptionem diligenter perpenderit: quam eundem eius errorem, more suo Lonic. & Frischlinus in suo nomencl. sequantur. Eiusdē etiam Tragi opinionem merito reiciunt Dodon. Matth. Hist. Lugd. & doctiores plerique.

Petro Crescentio, Fusanus nostro & aliorum iudicio dicitur. Fusaria vel Fusanum rubus, teste Ruell. Fusaria & Fusago Herbar. Curtius quibusdā regionibus Fusariam dici notat. Si quis cum Silvio Italico conferat, faciliè coniciet esse, inquit Matth. At in post. com. categoricè asserit Hetruscis Silio dici, aliis Fusaria.

Germ. Spindelbaum; id est, Fusaria: & Hanc Nominis födlin; id est, Galli testiculum: Spilbaum Cordo: Silesiis Tzmerchholz; & Pfaffenröslin: In Than Alsatia nobis Wesschelholz appellatam inter

Fruct. albi

Semina

Sapor.

Odor.

Materies.

Evonymus

Theophr.

Non esse

Evonymum

Theophr.

Tetragonia

Theophr.

Evonymus

Evonymus

Lacmornus

Fusaria

Theophr. sed

Carpinus

Tragus

Lonic. ex

Frischl. rati

xantur.

Fusanus.

Fusaria.

Fusanum.

Fusago.

Silvio Italico

notata invenimus. Apud Lonic. per Leodegizianam annotatum Helveticè dici *Schbimpfen-schlegelin* & ex ea fieri *fliegensadel* & *wiewadel*, id est, *Flabella*. Aliis *Eyerbretschelen*. *Schimpfen-schlegelin*holz etiam Gesn. vocat, Gallic. *De Fusatre*, *Fusin*, *Bumet de prestre*, *Beu à faire des lardiers*. Montbelg. *Fusillon* & *du Fusin*. Belg. *Papenhout*. Ital. *Fusano*, *Fusaro*, *Silio*. Angl. *Spindelree* Vngar. *Becheragosa*, id est, à capris rosa arbor dicitur. Quæ verò Lonicerus nomina gallica, græca, & latina Evonymo adscribit tam conveniunt, quàm ignarus harum linguarum ille fuit. Ea autem sunt, *Carpier*, *Carme*, *Soria*, *Ingalb*, *Carpinus*, & *species Aceris*. Siliquæ vulgò *serota sacerdotum*. Ruell. *Malimus Pileos sacerdotum* vocare.

Serota sacerdotum.

Species quatuor.

(*Forrè leg. Theoph.*)

Locus.

Tempus.

Vires & usus.

Contra Mith.

Purgans & Vomitorium.

Purpurei. Pediculi.

Capillorum fucus. Fusi.

Gesnerus duas eius species notat: 1. Evonymum quæ passim in sepibus circa Tigurum. Et aliam propè Genevam nasci, ad Dioscorid. descriptionem accedentem. Bellonium sibi retulisse ait. An fortè ea sit varietas, quæ fructum exalbidum fert? Sed & latifolia observata, & alia flore phœniceo, de quibus mox.

Porro hæc, si Loh. credimus, nulli regioni calidæ aut frigidæ iuxta sepes & margines deest. In Gallie montibus & vivis interdum sepibus nascitur, Ruell. Inter spinosas stirpes iuxta vias plerumque reperitur, Trag. In Italiæ sepibus, dumetis & sylvis, Matth. In sylvis tam planis quàm editis, Cord. Nascitur & in Anglia, maximè inter *Evare* & *Parckenaye*. In Alsatia, Helvetia, Ducatus VVirtimb. & Burgundia sepibus, etiamque in Allobrogibus, & in Italia Longobardica passim observavimus. Colitur etiam in horto Montb. transplantata nostra cura.

Monspeli Aprili ut & Patavij florentem vidimus. In frigidioribus locis ut Germania, Maio floret. Autumno appetente, siliquæ quadrangulæ purpureo tinguntur colore, donec penitus rubescant: postea sua sponte decussatim quadripartitæ rumpuntur, ac hiantes ita pendent, in hyemem usque croceas bacculas vel semina ostentantes non iniucundo aspectu.

Cæterum inter recentiores non convenit, an hæc nostra Evonymus, quod de sua Theophrast. prædicat, pecori sit noxia. Id asserit Matth. & se hoc scire ait. Et Ruell. Hanc, inquit, neque pecus neque capra novellorum etiam germinum avida prorsus attingit. At Clus. Vulgarem hanc Evonymum scribit à capris maximè appeti, easque eius foliis avidè sine noxa vesci, quod se in Pannonia observasse testatur: ac ob id Vngaris *Becheragosa*, id est, à capris rosam dici, licet id Theoph. opinionioni repugnet.

Et sanè nos Clusio potius credimus, quamvis Schuvenckf. audacter pronuntiet, fructus oves enecare. Veritatem prima quaque occasione discemus. Fertur fructus homini exhibitos per inferna ac per superna purgationem moliri, si terni aut quaterni dentur vorandi. Emolliunt etiam & resolvunt exterius appositæ. Idem fructus in lixivio cocti capillos flavo colore tingere, fursures abstergere, lendes & pediculos necare traduntur. Italice mulieres ex eodem unguentum parant, quo ad pulchros & flavos reddendos capillos utuntur.

Tornarij ex ligno varia vasa & instrumenta detornant. Ex eadem & fusos muliebri netu celebres apud Germanos conficiuntur, æquè ac apud Gallos. In Helvetia pulchra ex bacculis minutim ac tantatim concisis parantur muscaria vel lardaria [sic vocat Had. Junius.] quibus culina transfigendis lardo carnibus pro acubus com-

modè ac frequenter utuntur.

Triplicem proditum est parari ex huius fructu colorem. Flavum, viridem, & fulvum. Flavum conficiunt ita. Fructum legunt post festum D. Io. Baptistæ cum adhuc viridis est, eumque cum tantillo Aluminis parum bullire sinunt.

EVONYMVS LATIFOLIA.



EVONYMVS Descriptio
Latifolia virgas habet cubitales, virides, fructu contumaces, rotundas, quas magna ambiunt folia, bina semper ex adverso nascentia, leviter per oras serrata, Evonymi vulgaris foliis forma haud ablimilia, sed longè ampliora, Citriæ Mali foliis magnitudine non cedentia, minus tamen longa, vitidia, gustu ingrato & amaro. Radix

digitalis crassitudinis summa tellure in bicubitalem longitudinem excurrit, multisque flavescens fibris donata est, summo capite, interdum etiam à media sui parte virgas singulis annis proferens, quas hyeme corrumpi & interire existimabamus, cum non nisi novellas virgas Maio mense deprehendissemus: postea tamen compertæ eas virgas hyeme non interire, sed exiguum admodum incrementum capessere, folia sub finem autumnum cum reliquis eius generis abicientes, & oblongam gemmam extrema cuspidè (spem proximæ novo Vere germinationis) proferentes. Inter infima folia oblongos tenuisque pediculos profert, à quibus aliquot dependent flosculi, quatuor albicantibus & ad carneum quodammodo colorem tendentibus foliolis præditi, forma vulgaris Evonymi floribus perlimiles. Clus.

Idem in post. hist. addit: Floribus successit fructus, ut in vulgari quadrangulus, interdum etiam quinque angulis constans, maior tamen & quasi alatus, maturitate delibescens, & alba grana circa pulpa inclusa nonnunquam Augusto, sed potissimum Septembri mense continens. Evonymus Pannonicus prior seu latifolius eidem Evonymus latifolius, Breis Spindelbaum.

Maior mense 1579. novellas virgas deprehendimus in sylva illa, quæ ex Greben Ill. D. Balchazis de Bathyan arce, descensus est versus VVarasdinum in ea Pannonia parte, quæ olim Interamnis appellabatur, nunc autem Slavonia nomen obtinet, Germani Windischland vocant, ultra Dravum flumen, quo solum loco observavimus. Duas postea indidem mecum attuli, quas adhuc alit in cultissimo suo horto C. V. D. Ioh. Archolzius Viennensis Medicus, notante eodem Clusio. Camer. in suo horto Norinbergæ coluit. Item Hortus Lusaticus. Chariss. frater G. Baub: ramum attulit nobis collectum in horto D. Trevisani cum floribus viridibus, Evonymi latifolii Cortassa

Folia.

Radix.

Floris.

Fructus.

Synonyma.

Locus.

Tempus.

89m.

nomine. Gener etiam Chertelus collegit in horto Patavino, nobisque communicavit.


EVONYMVS FLORE PHOE-

NICEA.

Descriptio

Folia.

Flores.



ARBUSCV-
LA est aut
frutex homine
altior, cuius cau-
dex & rami tu-
berculis asperis, ac
veluti punctis
notati: rami
sunt pulverulen-
ti. Folia serrata,
Pruno sylv. limi-
lia: floresculi ali-
quot simul ex
longis petiolis,
qualifolia, simi-
les. Evonymo
vulgaris vel Epi-
medio quorun-
dam, phœnicei
coloris. Clus. in-
sula sic describit:

Asurgit bicus-
talibus aut maioribus ramis, digitali vel etiam
pellicari crassitie, lentis & obsequiosis, denso
coriace obductis, viridi primum, deinde multis
nigricantibus tuberculis asperis, qui in summo di-
viduntur in plures ramulos ordine & serie qua-
dam inter se oppositos. Myrti latifoliae paribus,
sed teretioribus, leviterque in ambitu crenatis
gustu primum exsiccante, deinde acutiusculo &
calido: ex quorum sinu in oblongis gracilibus-
que pedunculis flosculus unus, bina, aut ad sum-
mam terni dependent splendentes, & purpura-
scentes, quatuor foliolis constantes, umbilico
quadrato, & staminulis luteis quatuor angulos
occupantibus. Cotini vulgò crediti flori haud
multum forma ab similes, licet maiores. Fructus
succedit in siliquis quadrangulis, alterius Evony-
mi similibus, spongiosus, aurei coloris, his dehi-
scentibus tenui filo propendens, in quo grana
non crebra, uti in alio, sed nigra, Fraxinellæ gra-
norum æmula & splendentia, bina interdum &
terna, eodem loculo & pulpa comprehensa.

Sapor.

Fructus.

Grana.

Synonyma.

Locus & tempus.

Æquivoca.

Nerium

alpinum.

Evonymus alba eiusdem Clus. *Evonymus Pannonicus*, *Ungerisch Spindelbaum* Taber.

Hanc nobis insignis vir D. D. Schuvartzius Me-
dicus Illust. C. V. Vitemb. & præfectus horti Me-
dici Illustrii. Celsi. Sturgardiani nobis ostendit
Anno 1595. Maij 25. prius non visam, quæ in pul-
chellam arbusculam excreverat: ex iconis imagi-
natione, quam apud Clus. videramus, statim de-
prehendimus esse Evonymi hanc speciem raram.
Copiosè nascitur, teste Clus. in sylvis utriusque
Pannoniæ montibus: sed qui Alpes attingunt,
eandem alere desinunt. Invenitur & in Moravia:
nusquam verò abundantius, quam in sylva arci
Greytzenstein, Illustrii. Comitis Nicolai de Sal-
mis vicina, secundo à Vienna milliari, ad lævam
Danubij ripam. Floret Maio: Fructus Augu-
sto plerumque maturefcit, matris quàm vul-
garis & latifolia. Camer. se etiam in suo hor-
to Norinbergæ coluisse scribit. Porro Dalech.
suam particularem Evonymum exhibuit, de qua
nos sub Nerio Alpino sive Chamænerio. Tra-

dunt Advers. Quosdam apprimè doctos Cha-
mæmepilum sibi persuasisse, alios Evonymum
Alpinam fecisse arbusculam alpinam, folio Mali,
&c. Nos existimamus eos intelligere *Cotonea-
strum*, de quo alibi.

SYRINGA FLORE ALBO.

CAP. XV.



QUVM Sy-
ringa alba
vulgò dicta sit
fructu inutili,
vltum est eam
hoc loco ponere.
Ea infirmis
ramis adolescit
fruticosa admo-
dam, fungosa
medulla refer-
tis. Folia per
coniugia cre-
unt tanquam è
geniculis, Sta-
chylodendri le-
vius in ambitu
crenata, hirsutie
modica prædita,
sapore subdulci
& acro. Flores in
extremis surcu-
lorum multi simul iuncti, odorati, candidi, dul-
ces. Arantiorum, quaternis foliis constantes, api-
cibus in medio luteis.

Hanc Gulandinus Philadelphum florem A-
pollodori apud Athenarum dipnosoph. l. 15. cap. 12.
dicebat, uti nobis retulit D. Casp. Bauh. Quæ se-
nè opinio nobis non displicet.

Verba Athenæ hæc sunt: Apoll. l. 4. Rerum Par-
thearum scribit florem Philadelphum vocatum
nati in Parthia regione de quo hæc tradit. Myrti
varia genera, *Milax*, [*Smilax*] vocatûque Phi-
ladelphus, qui flos nature aptum nomen accep-
pit, quia ramos illi per intervalla esse accidit sua
sponte, complexionem ubi nascuntur animato-
rum, veluti ex una eademque radice operantur:
reliquum verò discurrunt, ac vivas plantas gi-
gnunt, [cum ex intercapedine spontè rami coi-
verint, animato complexu coherescunt] & in
unitatem iunguntur, deinde procurentes vivos
sirculos pariunt] Hinc effectum ut domesticos
Philadelphos in custodiam convertèrunt: nam te-
niores subtilioresque ramos adimentes, ac in
retis more componentes in circulum plantare so-
lent circa hortos: qui ita coniuncti securitatem
parant, difficilèque aditum operantur ubi fue-
runt positi.

At Rob. Const. iudicio *Ostrya*, Hetruscorum
est *Syringa* arbor appellata, quam ait videri in
horto Ducis Florentiæ cum iis notis, quas assi-
gnat Theophrast. nec deesse illam fructus insi-
gnem notam, quæ Hordei grano similis. Florem
(quod ipse tacuit) candidum & suaviter olen-
tem. De eadem & Plin. l. 15. cap. 21. Inter infelices
arbores, quam & *Ostryam* vocari tradit. Hinc
Hist. Lugd. Quæ vulgò *Syringa*, multi, inquit,
Ostrya Theophr. esse volunt. At hæc opinio
Camerario non placet: certè neque nobis. Ne-
scimus verò quo errore in eadem Hist. Lugd. post
Syringæ rubræ descriptionem indistinè iterum

Descriptio

Folia.

Sapor.

Flores.

Philadelphus

flos

N. 1. 1. 1.

raro.

v. 1. 1. 1.

sepe.

Ostrya

ruscardi.

Ostrya

Ostrya

Ostrya

Ostrya

Ostrya

Ostrya

Livida. gustu inenodissima, minuta, melleam dulcedinem representans: vel livescens, tenuior, Pinis festucis: surculis herbulisque & foliis eam admodum, subductione aliis ignavior: ad alios usus, ut etiam ad lenitionis opera, vix subduplo efficacissima: quum praesertim Orientalis Calabrensisque interdum rancida amarescant, & imposturis imbunt minus valeant. Si autem Apolloneandem intelligit Mannam, quam nos, miramur non observasse foliola Larici esse admixta.

Observatio. Lob. & Pena tradunt, ut antè monitum, Laricis ramos in vinariam cellam asportatos, Mannam postera die demonstrare. Idem etiam conantur demonstrare, Mannam potius succum plantæ quàm aëreum torem esse. Adduntque non spernendam Brianzonensem ad Galloprovinciæ & Allobrogum Alpes provenire solitam, qua universa serè utatur Gallia, modò delectus purioris, candidioris & recentioris grani habeatur, qualem illic effractus è Larice surculis copiosam se habuisse scribunt: quæ nec dosi, nec gustu, nec purgandi effectui quicquam cedere illi videretur exoticæ. Eamque multò minoris emi, minorique [quàm Mastichina, vel Granata] mangoni suspitione. Blandè autem educit biliosa è primis venis & iccore, èque pulmonibus pituitosa veluti Lariceus liquor, Terebinthina Veneta vocata.

Dosis. Hac si Syriacæ puræ copia desit, aut Calabrien-sis, utendum ab uncia semis ad unc. tres. Sylvius verò, ut antè monuimus, huius dosin tradere videtur ab unc. ij. ad unc. iij.

Ceterum miramur Altomarum, qui tam curiosè de manna scripsit, nihil tradere de manna Laricea, quæ tamen, ut dictum, in multis Gallie & Germaniæ partibus utuntur, cui semper admixta folia Laricis.

Manna Trunchibul. Rauvolff. manna nostræ Laricæ formæ & sapore similem dicit Mannam Trunchibul.

MANNA CALABRINA FRAXINI ET ORNI.

Descriptio. PRO Calabrina nobis demonstrata manna purior est, quàm Brianzona. Gummi multò majores, figura varij, colore flavescentes, sapore dulci, sed minùs grato, quàm prædictæ, cum quadam acrimonia. Nec ita facillè liquefcit. Vsta etiam minus consumitur. Loco humido posita, minus videtur liquefcere quàm Brianzona. Conservanda, ut illa, loco sicco. Hæc hodiernis temporibus notissima est, ut in Italia, autem Brianzonis, pluribus colligitur locis: sed copiosior in Calabria, quæ & Calabrensis ubique vocatur: & particulariter in Fraxino & Orno colligitur, quam certè specialiter ipsæ arbores ex se produ-cunt, sicut Gummi cæteræ arbores: ac huiusmodi est Calabrensis. Ratio est, quia in caudicibus & truncis sive ramis arborum copiosior, quàm in foliis reperitur. Nam quæ de aëre, sicut ros, descendit, abundantius recipitur in foliis, quàm in trunco. Hoc ratio, hoc experientia docuit plurimos. Nam quis audeat dicere pluviam aut rorem, dum cadit, prius insidere truncis, quàm madefaciat folia? Ex quemadmodum aqua æqualiter pluit super arbores & plantas, ita, & manna descendit rotando universaliter & arbores & plantas, & petras, & ipsam aded purum putum solum.

Item quare in una petra arbor, quàm in alia

non multum distante reperitur? Nonne quia illa arbor ex se producit, & illa non? Item si sicut ros descendit semper, quare in extremitatibus & foliis superioribus, quæ cælum spectant, ipsarum arborum non invenitur, sed in ramis & foliis inferioribus? Sed revera, nos (inquiunt idem Monachi) curiosè ac studiosè hoc observare iussimus: & ita invenerunt, nempe ex se illas arbores producere illam rem, quam Mannam vocamus: quæ liquida fluit ex trunco, & ramis superioribus in folia inferiora, postea congelatur. Et ad maiorem certitudinem plures observatores propriis oculis pluries viderunt fluentem Mannam scaturire ex quibusdam tuberculis ipsius arboris: quia non undiq; per totam arborem fluit, sed in quibusdam specialibus locis generatur: ex quibus cum profluit est dulcissima. Si autem quis locum illum (unde videt exire Mannam, incidit, exit abundantius, sed sit amara propter percussione & corticis iacionem, ut ipsi observatores experti sunt. Etiam præcisus ramus, & domum virens portatus, produxit Mannam.

Quare concludendum est, arbores, ut Fraxinus & Ornus, hisque similes, ex se generare, Mannam, sive maius, Gummi dulcissimum, quod manna dicitur. Nam & Gal. etiam quandoque utitur succo Fraxini: pro quo forsitan intelligenda ista manna, quæ scaturit è Fraxino & similibus arboribus. Eadem arbores & Mannam cælestem suscipiunt (cum cadit) sicut & aliæ plantæ. Et quid mirum arbores gummi illud dulcissimum producere, quod Mannam arboream vocamus? Nonne & arbores & plantæ generant, flacten, Myrrham, storacem, Balsamum, mastichen, Picem, Resinam, & similia plura? Nonne & apes similiter ex floribus quarundam arborum & herbarum mel & ceram colligunt. Ergo &c. Colligunt etiam & ipsi Calabri quandoque mel aëreum, id est, Mannam cælestem super varias plantas & super lapides, sicut & aliæ gentes. Sed hoc sit rarè, & non ita densatur.

Arboream Mannam autem singulis annis, circa caniculares dies ante sexiles pluvias colligunt. Cum autem pluit, cessat fluere. Sed & genus hoc manna arboræ dupliciter colligitur: scilicet una in candicibus & ramis, quam vocant Mannam grossam, & Mannam de corpore: alia verò super folia, quam Mannam finam, seu Mannam subtilem, & Mannam foliorum nominant. Medici autem nostri temporis, laudant potius eam, quæ colligitur super folia. Sed revera viribus non differunt, & unum eundemque ortum habent. Nam quæ colligitur in foliis, non ibi generatur, sed è truncis & ramis fluens, cadit super folia illa, quæ ex directò habentur subter. Non enim in cunctis (ut diximus) foliis ipsius arboribus reperitur, sed in illis duntaxat, quæ ex trunco vel ramis susceperunt. *Hactenus Monachi.*

Eiusdem sententiæ est & Altomarus, qui concretam & granulofam Mannam, semini aut Gummi similem, (ut ille inquit) cuius frequens est usus, quotannis colligi solitam scribit tam à Calabria quàm à Samnitibus & Vestris, qui Garganum incolunt montem, & plerasque Apuliæ partes, ut Castellanetam: aliisque etiam in locis ipsam colligi solere. Eam tamen non nisi ex Fraxino & Orno colligi, uno ore fateri omnes. Hancq; eam ipsam esse Mannam, qua communiter ad molliendam alvum Medici omnes utantur, acusi sint quotquot per Centum annos & ultra, medici antè se fuerint.

Inqui-

Vi generat.

Observatio.

Gummi dulce.

Succus Fraxini.

Manna arborea.

Mel aëreum etiam in Calabria.

Tempus colligendi. Modus colligendi duplex.

Manna grossa.

Manna subtilis.

Manna foliorum.

Lenius.

Inquiritur autem an sit velut ros quidam ē
cælo cadens, sicut ea, de qua Arabes memine-
runt, vel dictarum arborum succus humor seu la-
chryma, sic ratiocinatur. Quæcunque ex aëre de-
cidunt, in quacunque regione ac quovis loco,
non speciatim supra unam rem determinatam il-
lius regionis seu loci, sed indifferenter supra om-
nes ibi existentes rationabiliter cadere debet.
Sed Manna hæc non nisi in Fraxino & Orno re-
peritur, in cæteris verò arboribus, herbis & la-
pidibus eiusdem loci nequaquam, ut collecto-
res testantur. Igitur non generatur in aere, ne-
que ē cælo cadit. Et per consequens non est
eiusdem speciei cum ea, quæ à cælo decidit.
Deinde: Eadem Manna, quotannis ex iisdem
colligitur particularibus arboribus iam supra 40
annos, ut colligentes eā fatentur, ita ut non de-
sint, qui easdem arbores emant, tanquam singu-
lis annis hoc producentes vestigal. Suntque eo-
dem in loco & eiusdem etiam speciei arbores
nonnullæ, super quas Manna hæc non reperitur.
Igitur ē cælo non cadit, nam, quæ maior ratio
reddi posset de una quàm de altera, præsertim
eiusdem speciei arbore, eodem in loco existente,
ac per plures continuos annos eam producente,
si cælo caderet? nulla sanè: quamvis in uno
plantarum genere magis quàm reliquo quædam
afferri possit apparens ratio. Præterea si Man-
na cælestis seu aërea pro sua generatione, pe-
culiarem quandam, uti dictum, cæli constitutio-
nem requirit: ita ut calida & sicca præcedat diu-
na aëris temperies, nox verò sequatur per æsta-
tem benè frigida, (etenim æstivo tempore po-
tissimum generatur) rationi consonum est, non
qualibet die, singulisve noctibus etiam æstivo
tempore generari posse, sed rardè admodum, que-
madmodum & liquida, præsertim in Calabria. Ad
hæc, Manna quæ utimur, quæ quidem in Fraxino
& Orno colligitur singulis diebus, Canis præser-
tim tempore, aut paulò antè, in iisdem repe-
ritur, modò pluvix, præsertim magnæ, aut ven-
torū vehementia non adsit. Igitur aërea non est.
Amplius, si aërea Manna de genere est mellis
rosædi seu aërei, à frigore, uti dictum, concreti:
cū mel solvatur à calore, ac coaguletur à frigore:
sequitur quòd eadem Manna, à frigido, tanquam
contrario causis liquefactionis coagulari debeat,
solvi verò à calido. Cū verò in ea, quæ in Orno
& Fraxino reperitur, contrarium eveniat, nam à
calido durior fit atque coagulatur, ab aqua
verò solvitur: necessariò sequitur eandem
de natura aërez & mellis rosædi non esse.

Quod si quis dicat: non modò à Solis ca-
lore Mannam in his arboribus repertam concre-
scere & duriorē reddi, verū etiam à frigore,
ut eam colligentes diū observarunt: aiunt ete-
nim non solum à Sole, verū etiam à frigore,
Aquilone videlicet modicè flante in nocte, eam
condensari siccioremque reddi: Dicimus nos, &
hac etiam ratione probari, eam non esse ro-
rem ē cælo cadentem. Nam hic cū sit aqueæ na-
ture, à frigido duntaxat coagulatur. Quæcun-
que enim sunt aquæ (inquit Arist. lib. 4. Meteor.)
non coagulantur ab igne: solvuntur enim ab
igne: Quæ verò communia sunt terræ & aquæ,
& ab igne coagulantur, & à frigido, ut ipse ait:
quoniam ab utrisque incrassantur, recedente vi-
delicet & evaporante humido, diversa tamen ra-
tione. Cū itaque coaguletur, & à Solis calore,
& ab aquilonis frigore, hæc quæ in Fraxino & Or-
no reperitur Manna, necessariò sequitur, eam
nec vaporem nec rorem esse, aut ex eisdem ge-

nitam: proinde neque etiam aquæ solius, &
aquæ & terræ esse. Item si à Solis calore, &
ab Aquilonis frigore, hæc, quæ in Fraxino & Or-
no reperitur Manna non solvitur, nec liquefit,
sed potius concrefcit, duriorque efficitur: sicut
eam colligentes asserunt, meridie Solēque ma-
gis ardente, aridiorem, candidiorem, magisque
concretam & coagulata esse: & collectam iam,
ubi humidior fuerit, ac liquefieri cœperit, Soli ex-
positam, albidiorē duriorēque reddi: quis
vnumquam asserere audeat eam à cælo fuisse delap-
sam, atque ex concreto rore genitam? Cū præ-
sertim quæcunque à frigore concrefcunt seu coa-
gulantur, à frigore liquefcant, ut idem tradit Arist.
Quinimò Manna hæc ab aqua solvitur atque li-
quefcit, ut in dies observamus, & eam colligen-
tes testantur: pluvia enim superveniente, con-
festim solvitur & evanescit, ut primis Augusti
imbris ingruentibus observatum est: sequitur
itaque à calido & sicco, hoc est, ab igne aut igni
simili fuisse coagulata. Ergo non erit aërea. Nam
quæcunque sunt aquæ, inquit Arist. non coagu-
lantur ab igne solvuntur enim ab igne. At vapor
aquæ signum est, eodem teste: eo enim consi-
stente, est aqua, ut in ollarū operculis videmus.
Cū itaque non ab igne, neque à Sole, sed ab
aqua solvatur atque liquefcit Manna hæc in Fra-
xino & Orno duntaxat reperta, coaguleturque ac
durior reddatur à calido, demonstrativè conclu-
ditur, eam non esse de genere roris, nec ex con-
cretis à frigore vaporibus genitam, neque ē cælo
cadivam si saltem prædictis Arist. rationibus ac
fundamentis fides adhibenda. Adde quòd, ut
huius Mannæ copia maior generetur, contraria
requiratur particularis aëris constitutio ab aë-
rea: nam si eo tempore, quo emanare consue-
vit, dies pluviosus præcesserit, & frigida quodam-
modo, sequaturque admodum calida & sicca al-
tera aut tertia, maior, ut aiunt, iisdem arbori-
bus quantitas colligitur. Quæ itidem ratione aë-
rea seu rosæda esse non poterit.

Quod si quis rationibus destitutus, ad cæcas
& occultas causas confugerit, inquiens, causam
ob quam Manna hæc in Fraxinis & Ornis dunta-
xat reperitur, esse earundem arborum proprie-
tatem quandam, ob quam ad seipsas magis alli-
ciant, trahantque hunc suavem liquorem ē cælo
cadentem, quàm cæteræ arbores, quemadmo-
dum magnes ferrum, & succinum paleam: Di-
cemus: cur hæc proprietas non cuilibet particu-
lari eiusdem speciei arbori conveniat? Nam ut
cuilibet magneti ac succino datum est, ferrum &
paleam trahere, ita sanè & cuivis Fraxino & Or-
no hæc facultas tribui debet. Atqui per multos an-
nos, eoque continuus observatum est, in una re-
gione eodemque loco quotannis determinatas
quasdam Fraxinos & Ornos talem in se conti-
nuisse dulcem liquorem: quasdam verò alias eo-
dem in loco existentes, eiusdem magnitudinis,
eiusdemque ætatis nequaquam. Observatū præ-
terea diversæ magnitudinis ac ætatis quasdam parti-
culares arbores iam dictarum, eodemque in loco
consistentes, non tantum quotannis eiusmodi
dulcem in se continere liquorem, sed etiam cer-
tis temporibus: ut puta sub cane, vel paulò antè:
quasdam verò nunquam. Quibus de causis ne-
quaquam concedere aut fateri possumus, pecu-
liari quadam illud fieri Fraxini & Orni propieta-
te: quoniam singulis hæc inesset proprietas,
etiam si non æqualiter in omnibus. Non itaque à
cota substantia seu specifica forma Fraxini & Or-
ni talem sibi liquorem alligunt ē cælo vel aere

eadentem: nam omnibus talis esset trahendi facultas, quia omnibus una eademque forma & species. Nunc verò in paucis id observatur.

*Vera Man-
na generat-
io in Fra-
xino.*

Sanè iam Maio & Iunio mensibus Caniculam antegressis liquor ille dulcis intra cortices earum continetur, quo paulatim cocto, adventante ardentis Sirej calore, cortex arefit, eoque scisso aut fisso, liquor foras trahitur, atque ab eodem calore iterum concrevit & condensatur in grumos, aut gu nmi specie granula. Imò etiam non incisis corticibus, ante caniculam hæc Manna sæpè emanare visa est, præsertim in Ornīs: sive iam dicas tanquam superfluum quiddam nec alimento commodum à natura arboris foras protrudi, sive à Solis vi & calore foras elici, sive utraque causâ concurrente, quod nobis veritissimè videtur. Neque tamen sufficiebat expulsio illa arboris & attractio Solis, ni huius quoque calor coactor & condensator accederet. Ex quib. perspicuè intelligi potest Mannæ generatio in Fraxino & Orno, vel à mediocriter in naturæ contemplatione verlati.

*Obiectum di-
stinctum.*

At si dixerit fortè aliquis, roridam hanc Mannam non esse velut superfluum quiddam arboris, aut alienum, sed simile & familiare, ac velut alimentum quoddam, & propterea ab eis attrahi: tum quærenus ex eo, quæ causa sit, quod tam continuè & diu tamque copiosè ab iisdem excernatur & non potius detineatur? Item quæ possit esse eius diversitatis causa, Solem opitulari, ut eadem Manna imbibatur prius, siccetur & arefiat cortex, rarefiat & scindatur idem: deinde Canis fervidus calor eundem humorem rursus evocet, condenset ac coagulet, quo tempore corticem multò etiam magis exficcare deberet, quam præteritis mensibus, Maio & Iunio, potissimum cum absque incisione aliqua sæpius spontè ex iisdem arboribus prodeat Canis tempore, & antè, ut de Ornīs dictum. Aut quid impedivit, quominus eadem Manna prædictis mensibus non fuerit à Solis calore concreta & coagulata instar gummi circa cortices dictarum arborum, potius quam in iisdem imbibita & intro attracta? præsertim cum ab eodem calore Canis tempore iterum condensata, & gummi instar granulosa reddatur.

*Quidam
descripti.*

Hoc loco notandum doctissimos quosdam viros à villicis & pastoribus Calabris deceptos, falsò afferentibus, Mannam hanc, quæ in Fraxinis & Ornīs reperitur, manè antequam Solis calor invaleret, colligi, cum communiter contrarium & hodiè observetur, semperque observatum sit. Non enim manè, priusquam Sol valdè perurat, ut ipsi falsò retulerunt, sed meridie, Soleque fervidissimo eam colligunt: neque tamen à Solis calore rarefcit, solvitur aut evanescit, sed potius concrevit, & durior ac candidior redditur. Quapropter eam, quæ Ornīs innascitur, tertia vel quarta à Solis ortu hora colligunt, quod vel à remissiore calore condensetur, cum terrestrioris naturæ sit eius succus, quam Fraxini. Imò eandem quandòque, ut aiunt, etiam antè Solis ortum colligunt, sed non nisi ubi pridie inclinante iam Sole profluxerit, & ab eodem concreta fuerit, aut certè noctu stante Aquilone fuerit coagulata. Idque ob eandem causam, ne Sole superveniente siccior aridiorque reddatur, præsertim ubi non spontè, sed vi, adhibitis cæsuris, profuerit.

*Manna
arboræa non
calescit.*

Ex dictis liquet, Mannam hanc arboream, non æream aut cœlestem dicendam, quod iisdem semper colligatur arboribus, atque adeo earum sit propria. Recensendæque hæc arbores inter eas quæ copiosum succum & humorem habent, quod, & spontè, & incisurâ, uti dictum, non

tantum à caudice & brachiis, sed furculis etiam, iuxtaque foliorum pediculos, immò ex ipsis etiam foliis, eum liquorem exspunt. Id tamen non quolibet tempore, sed sub cane & antè etiam: quo tempore hæc arbores à germinatione & fructificatione cessant. Quare cum eo tempore succus earum validissimus sit, ob dictam causam, maximè etiam suam ostendit naturam.

Sed alia non levis dubitatio discutienda. Dictum enim non omnibus eiusdem generis Fraxinis & Ornīs talem produci liquorem, ex quo fiat Manna: hinc quis inferat, non esse earum proprium humorem seu succum proprium. Huic ita responsum volumus. Proprium unque earum succum esse hinc certè cognosci, quod ex quibusdam earum etiam spontè profluat (nam cæsuris illatis modo & tempore convenienti, plures emittunt, uti dictum.) Quod verò non omnes, sed aliquæ tantum hanc Mannam procreent, censendum id fieri ob aliquod impedimentum, ut puta ob defectum aut vitium aliquod, vel ob soli aut regionis diversitatem: quemadmodum & Amygdalarum, Prunorum, Cerasorum, Juniperorum, & reliquarum quarundam arborum generi contingit, licet eandem habeant naturam.

Est igitur proprius dictarum arborum succus seu humor Manna, quæ quotannis, sub Cane potissimum, in Fraxinis & Ornīs duntaxat, pluribus continuis diebus colligitur, quæ & se longo tempore Neapoli usum testatur Alcomarus, & quotquot ante se per plures annos medici fuerint, ad alvum solvendam usos esse non ros, Mel æereum, aut Manna, quod sequentibus etiam observationibus confirmatur ab eodem. Nam, inquit, superiniectione linteis, per plures noctes ac dies, supra easdem arbores, ita ut ros iis incumbere non potuerit, inventa nihilominus in eis, iisdemque diebus, ac collecta manna fuit, arboribus etiam non incisis: id quod fieri haudquaquam potuisset, si spontè ex iisdem arboribus non emanasset, maximè cum supra idem linteum, ne vestigium quidem eiusdem generis rosis, vel liquidæ vel coagulatae Mannæ fuerit repertum.

Sed quid opus diu hac in re sermonem protegere, cum plures fide digni, quibus hanc rem penitus investigate decreveram, uno ore confessi sint, mihi que retulerint, se propriis cõspexisse oculis, post collectam in dictis arboribus Mannâ, ex eisdemmet locis reliquam reludasse, emanasse, ac sensim effluxisse, & deinde Solis calore superveniente coagulata fuisse: idque non semel duntaxat, sed sæpius ac sæpius vidisse testati sint.

Alii insuper in Fraxini Ornique caudicibus, iuxta corticem sæpius adnatas veluti vesiculas quasdam se invenisse seu tubercula, quas disrumpentes, primum liquorem quendam album, dulcem, concretum & crassum in optimam Mannam conversum: deinde minus album, tenuiorem, liquidiorémque, sed dulcem quoque manifestissimè emanantem sæpius conspexisse: qui etiam à superveniente Solis calore coagulatus, concretus, albidiorque redditus, effectus est Mannæ primæ assimilis: & ubi diu permansisset superflus à Solis calore exsiccat, inutilis redditus est. Ergo si incisis arboribus, in eisdem incisuris talem reperire concretum & coagulatum succum, eiusdem ferè coloris, saporis & consistentiæ, cum ea, quam ex non incisis colligunt, Mannâ, quis unquam hæsitare audeat eam esse earundem arborum succum proprium, spontè ad eosdè ramos, caudicè ac furculos detrusum, potius quam rorè quendam à cœlo aut aère delapsum? Nemo sanè nisi pernix valdè.

Ad

*Ex quibus
arboribus
partibus
profluat.
Quo tempore
re colligitur.*

*Cur non in
omnibus
Fraxinīs
aut Ornīs
Manna pro-
fluat.*

*Experimen-
tis confir-
matur
Manna
Fraxinis.*

*Eandem
confirmat
et varia
observatio-
nes.*

*Alia
Tubercula
con Vesicu-
la in Fra-
xino &
Orno,
Mannam
exsiccant.*

Experi-
mentum
ad
Orni.

Addunt & illud nempe cicadas & alia quedam animalcula se infpexisse, quæ ex dictis arboribus, Ornis præsertim, cortice perforato, hanc lachrymam exugebant: quibus deinde fugatis, ex iisdem foraminulis seu fissuris, liquorem hunc dulcem profluxisse, huncq; se postmodum à Solis calore cōcretū legisse, tanquā in optimā Mannā cōversum.

Aliud.

Observatum præterea relatumq; à fide dignis, se plures secuisse Ornos, ut ex eis pro vini doliis circulos pararent: quos cum fidissent, soliq; exposuissent, non parvā in eis huius Mannæ copiā invenērūt: eamque non in cortice, sed ex lignosa ac veluti eiusdem Orni medullosa substantia interiori emanantem.

Aliud.

Testatus item quidam Faber ferrarius, vis probus, cuius nomen Cæsar de Ruodi, se, cum in quadam sylva structo igne carbones pararet, vidisse ex orno vicina Mannam resudasse, & ab eodem igne paullo post coagulatam fuisse.

Alia diffi-
cultas ex-
plicatur.

Cæterum & difficultas hic excutienda. Nam cum dictarum arborum cortex & folia amaro sint sapore, non abs re quæret quispiam, qui fieri possit ut tam dulcis liquor ex iisdem arboribus, si earum succus sit proprius, exsudare possit? Dicendum, hunc humorem non ex cortice, sed ipsa ligni interioris substantia, quæ sapore dulcis ferè est, aut saltem non amara, oriri, & per corticis fissuras promanare.

Alia.

Sed, cum corticis amaror contactu continuo eandem non inficit suo amarore: nimirum eiusdem corticis humor, exiguus cum sit, à Solis calore cōcoctus, tandem & ipse dulcis redditur. Et quia maior succi ligni quàm succi corticis copia, illius sapor, non huius prævalet. Adde quod cum per tenues ac angustos corticis meatus idem excernatur ac transudet humor, quod eius crassum est, in substantiam corticis impingitur, ita ut per eos expelli nequeat, nisi quod dulce & tenue existit. Id quod contingit etiam in separatione aquæ dulcis à salia & amara per vas ceræ ac tenue, per quod tenues dulcesque aquæ partes resudant: reliquæ, transudare ineptæ, obhærent.

Ab aqua
separat, o
mo.

Certum autem eiusmodi Mannam quam in Fraxino admodum copiosam provenire diximus, in Orni foliis nunquam vel colligi vel reperiri: imò nec in ramis aut surculis, nisi perquam rarissimè: & sortè quæ neutiquam in iis sit genita: Sed quæ ex caudice aut ramis ipsi proximis defluerit. Eam verò in caudicibus seu truncis, aut crassioribus ramis duntaxat colligunt. Causa autem esse potest, quod cum in saxis magis montosisq; ac siccis locis proveniat Ornus, siccioris etiam naturæ, h. e. minùs humidæ sit quàm Fraxinus, quæ, ut dictum, locis humidioribus, concavisq; magis gaudet, vel Theoph. & Plin. auctoribus. Quapropter Ornus tantam in se non continet humiditatem superfluam, nec adeò dilutam ac tenuem ut ad folia usque exiguosque ramulos perveniat. Est item scabrosa arbor, ita ut faciliè priusquàm ad folia usque aut surculos promanet, in caudicis crassiorumque ramorum corticem absumatur. Quod vel ex eo probatur: quod qui eam colligunt, aiunt huius arboris Mannam perfectiorem esse, si manè & vespèri legatur, quàm meridie sub ardente Sole. Quia ex immodico Solis calore aridior sicciorque redditur, & propterea imperfectior. Contrà quàm in Fraxini foliis fiat: in quibus non manè nec vespèri, sed meridie, ac calidissimi diei horis, ut dictum, colligitur Manna. Manè enim humidior cum sit, colligi nequit.

Minima
folia.

Satis autem exigua est ea, quam in foliis reperiunt, & veluti milium parva eius grana: ita ut faciliè conuici possit ex eiusdem arboris ramis super

folia decidisse potius, quàm in eisdem genitam esse: aut saltem propterea, quod magna ex parte ut collectores referunt, in Fraxinis Manna emanat ex ramis, ea potissimum parte, quâ foliorum pediculi eisdem annectuntur, atque in eisdem met pediculis & ramis coalescentem inveniunt. Poterit ob id, quæ in foliis reperitur per eosdem pediculos ad folia effluxisse, cum tam minuta sit, ut vix semunciam vna alterave die ex foliis colligat.

Nec alienum à ratione cuiuspiam videri debet, quod in Fraxini foliis & iuxta pediculos eorum reperitur, cum id eveniat propter Fraxini humiditatem superfluam, quæ non tantum per caudicem & ramos diffundi, spargi atque transmitti queat, sed & ad foliorum exortum atq; ipsa adeò folia, per quorum poros transudet, & à Solis calore concrecat. Aiunt etiā minuta illa grana, quæ manè supra folia reperiunt, eodè etiam die Sole superveniente, augeri maioraque reddi, quæ postea vespèri colligunt. Quod fieri haudquaquam posset, si ex aère fuisset delapsa: nā à Solis calore potius liquefacta ac absumpta fuisset quàm concreta & adhaerere.

Quapropter valeant, qui Mannā in Fraxinis & Orni foliis repertā, aëream seu rotidam, ac è cælo delapsam esse contendunt. Dictum autem non abs re, folis: Nam contingere potest, ut eadè arbores in quibusdam locis, in quibus aërea Manna decidit, reperiantur: & ita supra easdem etiam decidere poterit. At nō supra eas solas, & quovis die p multos dies, sed supra ceteras quoque oēs, ut & herbas, & frutices, & lapides eiusdè loci. At quæ in Fraxinis & Orni foliis generatur & reperitur, non tantum spontè certis temporibus, ex iis profluit, sed & incisione facta copiosius.

Verum non vnus est duntaxat earū incisionis modus: nā quidā factis nonnullis incisuris in toto caudice, sequenti demum die eā colligunt. Quidā verò aliquot dieb. ante eadè arbores incidunt inferioribus tantum partibus, & deinde eadem collecta, quæ primò effluit, demum & aliam effluere sinunt, ac denuò colligunt. Alij verò, prætermittā omnino ea, quæ per primas effluit incisuras, post paucos dies aliis in locis superioribus, easdem arbores incidentes colligunt: quæ quidè præ cæteris dulcior, ac non parū suavior existit, purgata, ut aiunt, per primas incisiones arbore, h. e. excreto eo humore, qui impurius, & propterea amarior & crudior erat.

Id verò in Orni potius quàm Fraxinis nō abs re machinati sunt: nā Fraxini humidiores cum sint, ut dictum, spontè magis, nō tantum è caudicibus & ramis, verum etiā è foliis eorūque pediculis, & qui iuxta eos sunt oculis, talem emittunt lachrymam. At Orni, ut quæ sicciores natura sint, h. e. minùs quàm Fraxini humide, corticèq; duriores & scabriores, locisq; saxosis, montosis ac siccis degant, tantam in se humiditatis copiā non continet: nec adeò dilutus & tenuis est eorū humor, ut ad ramos & folia eū spontè emittere valeant: sed in caudicem solum, & rarissimè in ramos. Quapropter ut copiosius effluat ex eis humor, eisdè vulnera iniiciunt: ita. n. & promptius effluit, & à Solis etiā calore, nō parū arbores incisæ ad expulsionem iuvantur, eundem scil. humorem ad corticem trahente.

Validissimis itaq; rationibus atq; experientia probatū est, eā Mannā qua hoc tempore in Italia utitur, quaque otiā prædecessores eorū vsi fuere p plures annos, ad alvū molliendā, nō esse eam, quæ eiusdè generis cū rore existit, & de qua Arabes scripsere, sed Fraxini ac Orni succū propriū atque cōcretum, quæ ex eisdè duntaxat in regno Neapol. plarisque in locis, præsertim Calabria colligunt, & per plures annos se collegisse fatentur, hunc colligendi modum à maioribus habentes.

R 2

Cur in Fra-
xini foliis
potius quàm
Orni con-
crecat.

Incisionis
modi.

1.
2.
3.

Fraxini
plus emittit
Mannā
quàm
Orni: quæ
cur?

Hæc de Mannæ arboreæ generatione, generationisque modo, quantâ potuimus diligentia ex Altoniani doctissimis scriptis collecta approbat etiam doctrina insignis Medicus & Philosophus Goropius: qui in suo Niloscopio ita scribit: In regno Neapolitano, in collib. plurimis & clivis montium Ornus multa luxuriant, quæ vulnerata, Mannam nostram, quam Calabram vocamus, exsudent, quâ Mellis æreæ & Mannæ verè loco vti ferè solemus, eo quod huius incerta, illius certa copia, & arbores quotannis, æt non quotannis idem reddat. Huic tamen Altomari Goropii & nostro sanè iudicio probabili ac veritabili sese obiciunt Matth. Cæsalp. & alij quidam.

Cambræ
via opino
Matth. Cæsalp.

Foliorum
Manna:

Sic enim Matth. in sic. Mannæ alterum genus à Calabris defertur, plurimum penditur quæ stirpium frondibus incidens colligitur: proinde foliorum Manna cognominata, minutis granulis constans, translucida, gravis, Mastiches granulis similis, candida, gustu dulcis atque suavis. Secundas partes sibi adsciscit, quæ ramis insidet. 3. Tercias vera, quæ lapidibus in solo inhaeret. Hæc granulis constat crassioribus, & calore longè minus sincero. Ex ea, quæ nocte peracta è cælo deciderat Cossenuz, quæ est Calabria civitas, mihi facta fuit copia super Fraxineis frondibus, quæ nulpis perfectè cocti guttas prorsus referebat. Accepi ibi ab incolis, quod hæc manè legitur, priusquam Sol exortus admodum exaltat. Namque postea Sole liquefacta absorbtæque facillè evanescit. [Hoc planè negat Altomarus & ait, Fraxineam & Orneam Mannam solam à calore concrefcere & indurari.] Quapropter plerique (ut à nonnullis audivi) ubi in magna deciderit copia, summo mane arborum ramos præscindunt, & in opacis collocant, ubi concretam maiori commodo legunt. Non parum aberrat Altomarus, cum contendit Mannam quæ in Apulia & Calabria è Fraxineis legitur foliis, à cælo haudquaquam decidere sed ex ipsa planta exsudere. Explodenda autem omnino videtur sententia Monachorum, cum pro certo allerant, Siro ardente Mannam non solum roris modo super arborum & herbarum folia reperiri æreæ & cæli clementia, sed etiam arboribus, Fraxino scilicet & Orno absque aliquo cæli rore, gummi modo, inciso earum cortice, in lachrymas concrefcere. Siquidem ea Manna, quæ inciso harum arborum cortice collachrymare cæpit, nullus quidem plantæ liquor est, sed ipsa eadem Manna, quæ diebus superioribus eisdem in arbores ab ære deciderat. Nam cum illis regionib. usu veniat, quæ præ cæteris prædictæ arbores eo mellisuo flore affatim abundeque madescant, sitq; cortex Solis ardore nimio sitiens ac rimosus, magnam liquoris quantitatem intra se absorbet. Quo fit, ut postmodum exurente canicula, inciso eodem cortice idem liquor exiliat, & in grumos concrefcit: qui tamen cum leves fungosique sunt ob arboris succi missionem, infelicitè operantur, nec alterius Mannæ vinibus correspondent. Quod autem id tantum Fraxino Orneoglossoque eveniat, cum melleus ille ros in universum omnes occupet plantas, in causa est harum arborum nobis occulta potestas, ut magnetis ad ferrum, & succini ad paleas. Quippe omnibus clarum est, apud Calabros & Apulos solam Fraxinum & congenerem Orneoglossum Mannam in se contrahere, retinere, densare ac cohibere: ex aliis verò arboribus eandem statim defluere, & in subiectas herbas, petras, solumque diffundi. Quare ab his duntaxat arboribus inciso cortice, non sanè pri-

Altomarus
met.

Monachi
reprob.

Fraxinum
& Orneum
mellam
Mannam
exsudere.

mo, secundum naturam, sed ex accidenti defluit Manna. Verum optimi illi patres [Monachi] contenti (ut fallor) cortice, internas illarum arborum partes penetrare neglexerunt. At incolæ qui ex maiore huius liquoris preventu plus auri referunt, rei naturam diligentius investigarunt. Monachorum sententiæ adstipulatur Altomarus, cum ipse sibi persuadeat, communis usus Mannam, nihil rore cælestisve liquoris continere, sed tantum [ex arbore esse:] quod etiam multis conatur ipse comprobare, cum tamen plura sint quæ non consentiunt, id ego examinandum sapientioribus relinquo. Hæc Matth. contra Monachos & Altomarum.

Ex arbore.

Cui adstipulari videtur Cæsalp. sic scribens: Disquirendum utrum Manna, qua utimur sit inter genera mellis æreæ, an prius succus Fraxini & Orni, ut contendere nituntur quidam ex recentioribus, & Mannam nostram, à genere Mellis & Manna Arabum explodunt. At eo modo [quo illi de Fraxino & Orno] cavillari etiam de Quercu licebit, cuius foliis maxime insidet mel acreum. Si enim ros non magis super unam plantam quam aliam decidit, cur maxime hoc genus reperitur in Quercu? Quod si id tribuatur naturæ Quercus, ut liquorem illum cælestem conservet, alia autem plantæ magis & minus absument, cur eadem non liceat & Fraxinis & Orni assignaret? Quam enim intimè hauriant hunc rorem, totum autem non absument in nutrimentum, aut ob multitudinem, aut ob aliam causam, necesse est, ut reliquum tanquam excrementum expuant, alteratum tamen & magis addensatum, quam in Quercu, ob aliquam eius concoctionem, ob id non in foliis solum reperitur, ut in multis aliis arboribus, sed undique ex intimis corporis exit. In foliis autem Quercus maxime reperiri melleum liquorem dicemus, quia ea arbor minime omnium bibat eius hominem: idcirco defluit mellea substantia ex iis, non multum addensata, & Sole adventante facillè evanescit, ut contingit substantiæ æreæ facillè in spiritum resolvable. In quibus autem paucissima, aut nulla reperitur huiusmodi concretio, cum tamen locus eo humore scateat, ut quibusdam Fraxinis & Orni contingere aiunt, absumentur avidius eiusmodi humor in earum nutrimentum, ideo nec ros liquidus permanet in foliis, nec expuitur addensatus. Neque illud omnino verum à frigore noctis addensatæ rorem in melleam substantiam, ut modò concrefcit ad similitudinem pruinæ ob vehementiorem frigiditatem, modò in liquidiorē substantiam ad roris similitudinem à minori frigiditate. Non enim hæc corpora aquea tantum sunt, ut ros & pruina, sed terram habent æri mixtam, ut tradit Arist. 4. Meteo. c. 7. de melle. Nam & mel quod apes cōdunt in suis alveolis, ex huiusmodi rore cōstat: quodque super diversas plantas colligitur, non succus earum, neque fructus, neque pars, sed eiusdem est cum rore generis, ut testatur Gal. 3. de Alim. fac. c. 39. non tamen omnino ros, simplex scilicet aqua, sed ob æstivam caliditatem terræ in halitum digestæ commixta, & increfcata magis & minus in melleam substantiam. Eger tamen halitus aqueus frigiditate noctis, ut constet, simplex quidem in rorem & pruina, commixtus autem in melleam substantiam, quæ non amplius à solo calido liquatur, sed ab humido, ut sales. Aliqua tamen ex parte à calido sicco liquari huiusmodi corpora, quatenus à frigore condensata sunt, non est absurdum, ut contingit Nitro, Alumini, Calcantho, Saccharo: In igne enim prius lique-

liquefcent, deinde siccantur: humido autem frigidius est, aquen, omnia hæc corpora solvuntur, non calido, quale est Oleum. Hactenus Celsus.

*Celsus. et
Matth. opi-
nia rati-
tur.* Sed quæ tunc ipse, tunc Matth. protulit adver-
sus sententiam Monachorum & Altomari, mini-
mè nobis videntur evertere eius rationes, & ex-
perimenta quanquam iisdem etiam Amatus sub-
scribat.

*Apoll. re-
prehend.* Hæc, inquit Apollo [de saccharo scribens ad-
versus Matth.] naturæ sunt arcana, Philosophus
ipsis incomperta: nec verisimile est tantam mel-
lei rosis copiam intrudi posse, quanta per tot dies
exhauritur, &c. Sed ipse etiam Apollo, in re
sibi incognita, uti patet, fluctuans, Monachos
temerè carpit: mox ad naturæ arcana, ignotan-
tium asylum confugit, Philosophis dicens in-
compertâ, cuius tamen postea causam & modum
hæmolari verius quam studiosa inquisitione ve-
ligare videtur.

Observatio. Pena & Lob. tradunt, ramos magnos Laricis
& Fraxini præcisos, atque in vinariam cellam quo
æstatis tempore Manna colligi solitum est aspor-
tatos, Mannam postero die, quanquam non
perinde nitidam ostentare: quæ omnia, ut ipsorum
reliqua: nec non etiam ea quæ Pamphilus He-
rilacus de Manna ex Ornistaxino tradit, cum Al-
tomari sententia optimè consentiunt. Conside-
rentur etiam alia quæ antea ex iisdem tradita de
generatione Mannæ, & de Elzomelite: quæ iti-
dem omnia facere videntur pro Altomari.

*Nam est
Sacchar.
Gal.* Mirum autem Galeni temporibus neminem
istud, ac ne ipsum quidem Galenum tale quiddam
observasse, vitam quoque Romæ agentem. Ne-
mo enim asserere audebit Mannam hanc id esse,
quod à Gal. 7. simpl. sacchar nominatur. Nam id
quoque ut de Melle saccharo dicebat Diosc. ex In-
dia & felici Arabia vehitur, ut Gal. inquit, &
in calamis, ut aiunt, concrevit, non in Fraxinis
& Ormis, ut à prædictis autoribus constanter as-
seritur. Ideoque idem esse cum Altomari puta-
mus Mel saccharum Diosc. & sacchar Gal. de quo
plenius suo loco.

*Elzomela
indistinctum
Veteribus.* Nec quicquam etiam referte ait idem Altoma-
rus, si Theoph. cæterique veteres autores, qui de
plantis scripserunt, inter eas arbores, à quibus
humor emanat, coagulatur atque conficit, non
connumerarint: nam neque Oleam tam domesti-
cam quam silvestrem, inquit, quæ spontè, & vi
etiam similem procreat lachrymam, ut diu à qui-
busdam observatum est meminere.

*Crimini er-
ror.* Cæterum ex his, qui Thuris Mannam cœlestem
hanc [sic vocat Matth. hanc Fraxini & Orni Man-
nam, cuius hæc sunt verba] esse crediderunt, Cri-
nitus Florentinus quoque fuit in cuius censuram
Manardus Ferrariensis lib. 1. suarum epist. pecu-
liarem epistolam conscripsit. Veruntamen venia
illi danda est, cum & Serapio, qui Mauritanis om-
nibus in simpl. medic. historia præstitit, Thuris
Mannam cum cœlesti ineptè confundat.

*Serap. lap-
sum.* Brassavolus, Apollo & alii quidem prædictorū
autorum Mannam Calabriensem triplicem faciunt:
primam & præstantissimam, vulgò Mannam de fo-
lio dictam. Quippe rustici folia aptant, & ve-
luti tegete extendunt: plantatque latiorum folio-
rum arbores, ut aptius colligatur, & parum supra
alias rem cadat. Eadem & frondacea dicitur, quod
stirpium frondibus insidens colligatur: atque ob-
longis constat granulis. translucens, gravis, ma-
stiches in morem lenta primum, mox facillè lique-
scens, alba & suavis. Secundas sibi vendicat,
quæ trunco, ligno & arborum ramis effluit ac in-
Ligni vel hæret. Ideo & ligni vel trunci Mannam; alii Man-

nam de corpore vocat. Tertia cæteris deterius, in ter-
ram defluens aut petras, arenulis permixta, co-
lore livente, minus sincera. Hæc Manna terra di-
citur. Eadem igitur res supra diversâ cadens,
aut à diversis promanans, varia nomina, diversâ-
que species (si modò verè differentia specierum
dici possit) vel varietates sortitur.

Verum aliter Amatus de Calabriz differentis
statuit, dum putat eam ex aëre defluam esse. Sic
enim ait: Manna est ros qui præcipue cadit in
Calabria, unum supra folia, quod perfectissimum
est, vulgò dictum Mannam de folio. Aliud supra
ramos & caudices arborum, primò deterius, sed
crassius & corpulentius. Tertium verò supra
terram, cæteris deterius. Quæ verò super lapi-
des cadit, mea sententia, inquit, cæteris generi-
bus nobilior censenda est: dicitur verò Calabren-
sis Manna hæc Mastichina, quæ tanquam præcipua
celebratur & in pretio hodiè habetur.

Altomarus amariorem dicit eam quæ incisis ar-
boribus profuerit, Calabris Ideo Mannam forata
dictam. Hæc ex Orno est.

Ita vides quanta sit autorum varietas in Man-
næ historia & generatione. Nunc Calabrensem
Amatus Mastichinam vocat, qualem plerique alii
Orientalem dicunt: & nobiliorem æstimat quæ su-
pra petras cadit, quam alii deterrimam putant.

Pamph. Heril. Mannam ex frondibus facillimè li-
quari ait à Sole, idque Manna ex corpore non contingere.
Adhuc aliter distinguit Celsus, sic tradens Fra-
xinum & Orni solas Mannam ferre testatur [Syl-
vaticus] in Calabria, circa canis ortum, cuius est v-
sus in tota Italia ad alvum leniendam dissolutè iu-
te, aut fero, pondere duarum vnciarum aut trium:
mitissimum. n. est medicamentum, solum tenues
humores educens. Sunt aut mica quædam candi-
dæ, aut flavescentes, pingues, sapore mellis. Eius
differentiæ sunt: Nam quædam minucioribus
micis constat, quæ Mannam foliorum vocat, quia ex
foliis colligatur, quæ magis probatur: altera cal-
sioribus, quam Mannam corporis appellant, quia ex
ramis, tanquæ ex corpore arboris habeant: & hæc
aut spontè, aut vulnerato cortice: [hæc sanè con-
trariantur opinioni Celsi, qui negat Mannam
ex arbore promanare, de qua re antè] Næ ex vul-
nere primò exit liquor turbidus, nauseosus cum
quadam amaritudine: postea emanat purior,
quamvis glebis grandioribus.

Probatur pinguis, & quadantenus translucida,
Mastiches quàm simillima. Improbatur arida, &
cinerei coloris. Item sapor optimæ suavis cum
dulcedine modicè linguam mordens, quæ n. mor-
su caret, euanida est, & quæ nauseosa, est impura,
aut adukerata, aut senæ infusione, aut addito
Scammonio.

Si desit Syriaca Manna aut Calabrienfis, vtdum
monet Lob. Briansonensi ab vnc. j. & cad vnc. ij.
Et asserit quosdā institores, qui illinc veniebant,
hodie illic perpaucam aut nullam inveniri, planè-
que conquestos defuisse: quod an verum de Cala-
brina, viderint incolæ.

Matth. ait Mannam Italicam, præsertim Calabri-
câ pluribus annis incorruptam perdurare. Id negat
Altomarus: & bonitatem eius perfectâ non supra
annum extendit. Herilacus cauet ne in compo-
sitionibus Arabum utamur Mannam dicta ex corpore
& addit eiusmodi gūmis nos falsò uti pro Manna.
Lacuna Mannam ex Calabria tantæ bonitatis di-
cit, ut conferri possit cum Orientali.

Garcias Mannam Calabrinam confert cum ea
quæ ex Persiâ Becora vrbē aduehitur, magnis
glebis, admixtis plerumque foliis.

*crumci
Manna, 2
3.
Manna terra
ra.*

*Amari opi-
nia de diff-
rentis Cal-
abriz.*

*Mastichina
na.*

*Amari-
Orni.*

*Celsus
opinio de
isdem.*

*Dosa m-
dusque cu-
habenda.*

*Celsus
ur.
Turbida:
Purior.*

*Delecta-
rium.*

*Adal-
rium.*

Doratio.

*Similis
Persica.*

Et Acosta ei similem dicit adulterinam quandam in Ormuz, & terram Indicam, de qua & alii Ind eis mox. Idem etiam testatur vulgariorem Mannam in Hispania esse Calabrinam, verulam meliorem quæ ex Oriente Venetias adfertur.

Manna Halepi.

Rauwolf. quoque Mannam quandam Halepi haberi scribit, similem Calabrinæ. De Manna tridentis consule etiam Cullenam & Quinquenanum, quorum neuter nunc nobis hæc commentantibus est ad manus.

*An omni
Manna
Medici
eas vit*

Tandem ut ad vires transeamus, placent iucunda & utilem Medicis hoc loco quæstionem præmittere. Nam cum non constet, saltem ex probatissimorum autorum phœnomenis duplicem esse Mannæ originem: alteram ex aëre seu rore alteram ex Fraxino & Orno: harumque varias esse differentias: quæritur an Medicis indifferenter atque innoxie eisdem Mannæ speciebus, alteramque pro altera uti liceat: & num una eiusdem speciei sit altera perfectior: & quæ imperfectior quodammodo eorum est, nunquid omnino vitanda & explodenda?

Altomari diligentissimi de Manna scriptoris iudicio, *Aërea Manna*, ex rore genita, ab Arabibusque descripta, ponsissimum conciet, & quam Mesues commendat, ad eos usus quos ipse ac Serap. & Avic. probant, est utilissima. Eius vires antè posuimus post generalem Mannæ historiā. At eius defectu, num *arbutrea* seu *Fraxinea* & *Calabrina* dicenda liceat uti? Cum, ut ostensum, ex Fraxino, & Orno quæ Fraxinus sylvestris est, profluat, utique earum vires quodammodo imitabitur. Nam si mel rosicidum aëreque Manna cadens suscipit aliquid de virtute plantarum supra quas cadit, ut Gal. & Mes. volunt, quantum magis proprius earundem plantarum succus, eandem continebit facultates, quæ ipsis arboribus propriæ sunt?

*Vires
temperam.
Manna
Calabr.*

Cum itaque *Manna Calabrica* Fraxinea, seu lachryma Fraxini, quam Mannā vocant, dulcis sit cum oblectamento quodam amaro, nec multo crasso lētoque humore plena, consequens est moderate calidam esse, gratam & naturæ nostræ amicam. Et ob dictas facultates, ut discimus ex 4. simpl. vim habebit concoquendi, laxandi & rarefaciendi, quemadmodum reliqua dulcia: nec non sandendi, levigandi ac molliendi, ex 1. & 5. de simpl. Gal. Et ut summatim dicamus, cunctas etiam præstabit utilitates, quas Arabes *aërea Manna* tribuerunt, quatenus dulcis est, quavis non tantæ humiditatis sit particeps, neque adeo temperate calida existat. Amaritudo. n. vix sensu perceptibilis, talis non est, quæ dulcedinis vim obscurare aut impedire possit. Eius tamen ratione etiam magis abstergendi vim habebit, extenuabit, humores crassos incidet, ac infarctus liberabit. Quapropter & menses movebit, pituitam & pus ex pectore exterminabit, tantum efficacius quanto magis à dulcedine ad amarorem inclinabit. Quapropter non solum probandus fraxineæ, & Orni Mannæ usus, sed propter hunc vel maxime præ aliis deligenda. Sed quid opus multis rationibus, ubi sensus & experientia in aperto sunt? Nam rationes quarere earum rerum, quæ patent sensui, infirmitas quadam intellectus est, ut merito Arist. dixit in 8. phys. contra Zenonem omnia quiescere dicentem.

*Arist. de
contra Zenonem.*

Neque. n. ipse solus, inquit idem Altomarus, sed oēs ante me & iuxta me in hac regione medici hac Manna bono ac felici successu, citra ullam noxam eorum, qui sumperunt, uti sunt, præsertim ad alvum molliendam. Nam nec inquietudines & fastidia, neque tormina, colliquationem, superpurgationem aut eiusmodi malum

*Blandè
purgat.*

symptoma assumpta excitat, aut excitavit vlla, siue ex foliis, ramis aut caudice fuerit collecta. Omnino enim se prædictos usus omnes felicissimè expertum esse Deum immortalem testem advocat idem Altomarus, omnesque medicos posteros ad eius usum inuitat & hortatur. Ab ea verò quæ incisione prolicitur, cauet abstinendum in ardentibus febribus, alvi fluxibus, dysentericiis, aliisque calidioribus morbis, similisque naturæ corporibus: ac etiam ætate, regionibus, annique constitutionibus valde calidis: non tamen aded, ut cætera phazmaca alvum solventia, quæ calidiora sunt, dictis temporibus, locis atque personis prohibendam censeret. Eius tamen usum, quæ ex foliis & ramisque pediculis ac oculis profluit, quolibet anni tempore, quavis corporis constitutione ac morbo exhiberi tutius posse. Denique ubi *Arabum Manna* haberi nequeat, eam utendum suadet, quæ spontè ex dictis arboribus emanat: nam eisdem ferè præstare usus, quos Arabes saxe Mannæ tribuerunt, & longè plures, præsertim eam, quæ ex foliis & pediculis eorum colligitur: quod sincerior, dilutior ac tenuior sit cæteris, quippe magis concocta, ideoque dulcior: ac de foliorum viribus non nihil participet, quorum succus, uti suo loco dictum, serpentum ictibus valde opitulatur, Diosc. & Plin. auctoribus. Hæc eque non solum serpentum ictibus, sed & eadem ratione malignis pestilentibusque febribus auxiliari. Huic proximam esse, quæ ex ramis & caudice spontè profluit. Tertiā in bonitate esse eam, quæ non ex primis illatis castris colligitur, videlicet quæ ex eisdem primò profluit, sed ex aliis vulneribus post aliquot dies factis. Nam quod primò effluit, impurum, infectum, ac excrementosum valde esse: & proinde puriorem, perfectiorem dulciorēque ex secundis castris. Neque tamen penitus & illam respuendam scribit quæ primò primis illis incisionibus profluit. Nam & hanc quoque, licet amaritudinis cuiusdam sit particeps, dulcedinem tamen magis præ se ferat, quæ perpetuò in ea prævaleat: nec aliter differre à prioribus, nisi quod calidior sit, quapropter etiam valentius operetur, sibi que ita longa experientia confirmatum esse. Ac si noxa quædam ex eius usu, ut tormina, calores, &c. superuenerint, id medici culpa, minus rectè ac intempestivè ea utentis, aut morbis vel corporibus, quibus non competeat, exhibentis, factum esse: aut quod plus æquo dederit, vel Mannam aëream putarit: aut certè quod pro hac ipsa aliam vitiosam aut adulteratam præbuerit, constanter asseverat.

Carm.

*Serpentum
ictus.*

*Febris ma-
ligna.
Sanitatis
earum gra-
dus.*

Delebitur.

Suadet tamen semper recentissimam, quantum fieri possit, deligendam, humidiorēque: vetustam & aridam omnino vitandam.

Quæ si ita se habeant, quis Mannæ Calabrinæ, quæ ex Fraxino & Orno est, usum deinceps ausit repudiare. Sed iam & cæteras Mannæ differentias persequamur.

MANNA ORIENTALIS MASTICHINA.

MANNA etiam ex partibus Orientalibus ad nos deferitur, & præsertim ex monte Libano. Venetis magna copia habetur. Brassavolus scribit ex Orientalibus & Meridionali-
bus

Gravissim.

bus partibus & alterum genus Mannæ importari, sicut mel liquidum, præter illud albicans granulosum, hoc est utile ait, Manna Arabum. Et addit: Nicol. Nicolucium à Mauro quodam huius liquidæ Mannæ pyxidem emisse, & ea mirros eff. etus fecisse.

Amatus quoque tradit Mannam Orientalem ex monte Libano & aliis locis Venetias illatam aliquando granulosam, aliquando liquidam, mel referentem. Primamque Arabes Mannam absolute, secundam Tereniabin vocare.

Mastichina. Bellon. priorem Mastichinam vocat, pellucidamque esse ait, exiguo grano atque hanc præcipuam agnoscere Venetos, granulatam dictam: Gallis Granatam: vulgò Mastichinam dici, quod Mastiche sit ad similes.

Granulata. Orientalem Mannam parvi fieri in Italia Monachi tradunt, quod non possit haberi ita recens, ut Calabrienfis.

Bombycina. Matth. sanè scribit, eam quæ ex Alexandria Ægypti adfertur, Mastichinam dictam, uno duntaxat anno in suis vinibus perstare. Alioqui eam præstantissimam dicit: alteram verò infirmam ac vilem, Bombycinam nuncupatam. Lacuna quoque Orientalem perfectissimam dicitur. Hanc eandem Lob. Mastichinam, Granatam & Syriacā vocat, pro qua substituit, ut antè dictum, Brianfensensem.

Apollo quoque Orientalem primam & præstantissimam facit eam quæ Mastichina dicta, in quosdam quasi grandinis callos niveosque globulos densatam.

Syriacadi. Fertur (inquit Cæsalp.) aliquando & ex Syria longè candidior Italica, Mastichina vocatur, quæ translucida, Mastiche similis, parvis granulis, efficacior Italica. Bombycina autem minimè translucida, crassioribus nictis Gossipii. Putant hanc Saccharo adulteratam esse. Sed dentibus deprehenderetur: Saccharum enim sub dentibus crepitat. Manna autem mollis est.

Adulterata. Veneti, notante Bellonio, aliter quàm Galli negotiatores distinguunt, in Mastichinam seu granulatam, & Bombycinam. Hæc ideo sic vocant, quod floccorum bombycis referat effigiem, quæ quidem vilioris est pretii quàm illa, neque tantæ dulcedinis particeps: cuius etiam si libram edas, alvum tamen nunquam subducat, ideoque Mannam istam ex rore aëreo venire, mellis modo, nemo dubitet.

Bombycina. Altomarus Bombycinam adulteratam putat. Sed hanc tem Venetorum doctissimos Medicos potentatem docere par est.

SIRACOST ET MANNA XIRQVEST INDICA EX ARBORE QVEST.

PRO interpretatione vocabuli Siracost hic referemus & contrahemus quæ Monachi copiosè scribere in Mel. supra compos. Diasiracost.

Siracost sive Xiracost sive Asiracost &c: idem est: secundum Simonem lanuensem, & nonnullos aliquos ex iunioribus, est quædam species Mannæ. Et in testimonium citant Avic. cap. de de manna. Bellon. in interpret. ait Siracost esse Mannam, quæ apud Italos in usu est. Pandectario Alsiracost, & Xiracost Arabicè, est Manna. Ac Siracost eidem est Manna vel succus fructuum. Avic. autem licet capit. de Manna dicat, Mannam coagulari & exicari sicut gummi & sicut Tereniabin & Alsiracost, & mel de terra Cusuram &c: non tamen per hoc declarat nobis Siracost esse speciem Mannæ. Nam ad instituendam aliquam similitudinem [quod ille facit inter Mannam, gummi, Tereniabin, Alsiracost

& mel &c:] non semper est necesse adducere species eiusdem generis illius rei, de qua quæritur similitudo ipsa. Non omnia verò illic polita, esse species Mannæ probatur: quia sicut gummi & mel non sunt species Mannæ, ita fieri potest, ut nec Siracost sit eiusdem species. Sira enim sive Xira Arabicè succum significat. Quoniam igitur, ut dicebamus, Pandectarius ait Siracost non tantum significare Mannam sed etiam succum fructuum, ideo fieri potest, ut sit succus alicuius fructus coagulatus ad Mannæ similitudinem, & non species Mannæ. Et quamvis Avic. de unoquoque præfactorum loquutus sit in proprio cap. tamen proprium cap. de Siracost, neque sub hoc, neque sub alio quovis vocabulo reperitur in eius 2. can. qui est de simplicibus. At est apud eundem Caput de Tereniabin. Potest tamen esse, ut communis opinio est, Syriacost esse veram speciem Mannæ: quia in sequentem Tripheram Persicam, quæ in multis cum ista confectione concordat, ingrediuntur Manna, & Tamarindi & Cassiæ pulpa, & saccharum Violatum, & alia multa sicut & in istam. Christoph. de Honestis autem in suis notatis, post Hieræ infusiones ponit absolute Siracost esse Mannæ speciem: additque eiusmodi Mannam non amplius in nostras partes importari. Igitur si Siracost est species Mannæ, potest hæc compositio vocari Confectio Mannæ. Sed quia infra alia descriptio, cui titulus, Confectio de Manna: ad differentiam illius fortè vocatur præsentem Diasiracost, quasi declarantes particularem ipsius Mannæ speciem: ut est etiam alio loco Syriacus Altereniabin, quod idem significat quandam Mannæ speciem. Igitur quando de Siracost non potest haberi melior certitudo, loco eius si ponitur Manna aërea sive arborea, nostro iudicio rectè fiet. Idque eò maxime, quia in exordio eius descriptionis ait Mel. esse medicinam benedictam in febribus acutis &c: Et Manna similiter ab ipso autore inter medicinas benedictas connumeratur. Ego si (ut diximus) ponitur Mannam in ipsa compositione, non agitur contra autoris intentionem. Ipsa autem Manna debet esse recondita & perfecta: quia legitur ibi: Alsiracost boni & recentis &c.

Scribit Garcias: In India Mannæ primum genus utribus conservatum, sapore savi mellis, Xirquest aut Xiracost vocari, id est, Latex arbore Quest nuncupata: nam Xir lingua Persica lac sonare: inde nobis corrupto nomine Siracost arbore nuncupari. Esse autem rorem quendam in eas arbores delabentem, aut gummi ex eis, destillans.

Idem etiam confirmat Acoſta, nisi quod pro Xiracost, Xiracost habeat: & gummi eiusdem arboris dicit, Lectoremque ad Avic. relegendum.

MANNA INDICA TIRIAMIA-BIN AVT TRUNGIBIM.

Manna in India alterum genus dictum Tiriamia bin aut Trungibim, ut vertit Bellunensis, in Carduis nasci ferunt, granis quàm Coriandrum maioribus: colore inter rufum & rubentem medio, quæ ex tribulis decutuntur. Vulgus plantæ fructum esse putavit, sed gummi aut resinam esse restitutum est.

Huius usus præfertur à Persis ei quæ utitur: quoniam quæ in usu est, pueris exhibere non audent, nisi 14. annum exceſſerint. Ego tamen ab eo tempore quo in India sum, illa uti non stiti, & sine molestia purgare semper depre-

Sira.

An Siracost sit Manna.

Confectio Mannæ.

Altereniabin Syriacus.

De Siracost adhibet cognoscere.

Manna utribus conservata, Xirquest, Xiracost, Quest.

Manna Cardui.

Descriptio.

bendi. Hæc Garcias. Eadēq; serē & Acoſta habet.

Trunſchibilis.
Fructus ſpinoſus Agul et Alhagi.

Halepum, tradente Rauvolffo, copioſe adferunt Perſæ in utriusq; mannam ſub nomine *Trunſchibil* quæ colligitur ſupra fruticem ſpinofum *Agul* & *Alhagi*. Hæc Manna conſtat granis paullo maioribus Coriandri ſeminibus, formâ & ſapore admodum ſimilis noſtræ Mannæ Laricæ. Poſſet exiſtimari Iſraëliſtarum manna, de qua Moſes ſcribit fuiſſe ſimilem ſemini Coriandri & colore Bdellii. Eam Mannam cadere in frutices ſpinofos teſtantur Serap. & Avic. cū de Manna ſcribunt, quam vocant *Teretiabin* & *Trangibin*, & Cluſius in epit. Indicarum plantarum.

Ait autem Avic. eam mannam cadere in regione Coraſceni. At Rauvolff. poſſ. in Perſia ſupra Agul. Nos Agul ſive Alhagi plantæ hiftoriam & iconem poſuimus lib. 10. cap. poſt Genſtam ſpinofam, & alias ei ſimiles.

MANNA INDICA CALABRINÆ PERſIMILIS.

Deſcriptio. **M**annæ in Indiam 3. genus, inquit Garcias, magnis glebis advehitur, admixtis plerumque foliis. Calabrinæ perſimilis eſt, pluſque aſſumatur. Deſertur ex Bacora urbe Perſica admodum celebri. Eadem & Acoſta. Et Rauvolff. Halepi præter mannam *Trunſchibil* & aliam Calabrinæ ſimilem haberi notat.

MANNA INDICA MELLICANDIDO SIMILIS.

Advehitur interdum Goam in utriusq; aliud genus Mannæ ex Ormuz emporio melli candido deſpurato perſimile. Sed facile corrumpitur in ea regione: propterea quod vitreis lagenis non aſſervatur. Garcias. Idem Acoſta, qui liquidam eſſe ait.

MANNÆ ADULTERINÆ.

Deſcriptio. **M**annæ ex Oriente altera ſpecies infirma & vilis, quæ *Bombycina* nuncupatur quippe quæ nil aliud eſt, quàm aut evanida & ſiſio exhausta *Maſſichina*, aut ſaccharo aliſque impoſturis adulterata, notante Matth. Hanc ſolam ex Orientalibus vidiffe ſe ingenuè fateatur Altomarus, Venetiis tranſmiſſam, licet in cæteris inveſtigandis maximam adhibuerit diligentiam. Hanc verò ferro ac lateri ignito unâ cum Calabrinæ granis quibuſdam inieciſſe, tam diu quæ ex foliis, quàm quæ ex ramis & caudice tolligitur: illam autem protinus ſolutam & liquefactam: hanc verò ariorem duriorēque redditam. Soli quoque expoſitam *Bombycinam* non quidem ita repente ſed ſenſim liquefactam. *Calabrinam* verò duriorē redditam & albidiorē. Neque ſecus cenſendum putat de *Maſſichina*, & de qualibet alia Manna è cælo cadente, quocunq; in loco, ac quovis tempore, modò adulterata non ſit. Nam cū humidior & recentior ſit quàm *bombacina*, conſentaneum eſſe ut citius ad Solem & ad ignem liqueſcat.

Maſſichina recentior quàm Bombacina. Alia differentia.

Cæſalp. hanc inter utrūque differentiam notat, quod *Maſſichina* ſit tranſlucida ſimilis *Maſſiches* parvis granulis: *Bombycina* verò minimè, ſed ſimilis craſſioribus micis Goſſipi. Quod ſi ita eſt, *Bombycina* ſanè non erit vetus *Maſſichina*. Veruſtas enim quantitatem non augeſcit. Illius parva granula: huius micæ craſſiores. De qua te certiora docebunt Veneti ac Neapolitani medici ac inſtitores.

Bombycina.

Ait tamen Apoſto mannam alteram Orientalem *Bombacinam* vocatam aut *Maſſichinam* evanidam & ſenio exhaustam, multo ſaccharo, farina miliacea aut hordeacea, aliſque miſcellis vitiatam, vilem, deteſtabilem, nulliusque momenti, floccorum lanæ & Goſſipii effigiem candore præ ſe ferentem. Quod ſi Saccharo adulterata ſit, dentibus deprehendetur, inquit Cæſalp. Saccharum enim ſub dentibus crepitat. manna autem mollis eſt.

Adulterata.

Teſtatur Altomarus iure ac prudenter à iſtiſſimo ſuo præſide Neapolitano atque conſulibus de quadam manna ſancitum eſſe, ut igne cremaretur. Neque in eo ſuam ſententiam ſequutos, ſed pharmacopolarum & quorundam medicorum teſtificationem id decreviſſe, qui eam mannam aiebant eſſe rem peſſimam, & humano generi omnino adverſiſſimam: quæ tamen verane an falſa ſint eorum conſcientiis ſe relinquere ſcribit: in eo ipſo ſuam prodens oſcitantiam, cū prius dixerit iure ac prudenter crematam. Mannæ genus valenter purgans & magis ſolutivum reliquis Mannæ generibus medicis quidam Brachmanes in civitate Cochini præſidio & familiari uſu habuit, ut reſert a Coſta, ex doctiſſ. ab Orta: Factitium tamen erat & ſic parabatur. Amylum candidum & puriſſimum, Mannam cuiuſcunq; generis, ſed præſertim quæ Calabrinam æmulatur, Scaramoneam & ſeminiſ genus Viſa dictum, quod ex Bengala advehitur, quodque Lathyridis grano ſimile eſt (iniecito interdum polline radicis cucurbitæ candidæ lacticinæ, cui nomen Dante) cum Saccharo, pauxillaque aliqua odorata aqua permixcebat, ſolique expoſebat.

Manna adulterata publicè in igne cremata.

Viſa ſimile.

Viſa ſimile.

Viſa ſimile.

Mannam autem adulterari nihil mirum, quandoquidem & lapides Bezahares tanto artificio in Ormuz & in urbe Cochini provincie Malabar, ubi rex degit, adulterantur: ut legitimi appareant, fallantque etiam maximè expertos in iis dignoſcendis prima ſuperficie, qui niſi fragantur, vix à legitimis diſcerni queant.

Lapidibus Bezahar adulterium.

Ita non inutiliter monet Cordus adulteratam & minimè probam eſſe mannam, quæ grumis ſuis foliorum ſenæ partes aliquas complectitur, cū nulla ad nos ex Arabia & Egypto Manna adferatur, quemadmodum Sena.

Alia cum ſenæ.

Et Pamphilus Herilacus tradit Mannam noſtram Italici conſuetam, ut plurimum non eſſe rorem de cælo cadentem, ſed vel concretam ex ſenæ infuſione vel aliis, & Saccharo, vel gummi hinc inde collecto.

Alia.

MANNARVM ÆQUIVOCA.

Manna graminæ longè diverſa eſt à Manna *Maſſichina*, arborea, acetiam *Thurū*, et ſpecialiùs tradetur inter frumenta. Eſt & Manna *Thurū* vocata extra harum Mannarum genus: de qua alibi. Manardo ſaccharum antiquorum ſub roſcodo, ſeu (quod idem eſt) aëreo melle, tanquam genere continetur. In hoc tamen diſfert Manna à Saccharo, quod Manna ſuper alias plantas & petras: ſaccharum verò ſuper harundines in India & felici Arabia proveniat. Sed Manardo Alexandri Aphrodiſei opinione deceptus eſt, confundentis Saccharum cum Manna, ut notat Cordus. Nos autem Manardi opinionem particulatim reſutabimus in hiftoria Sacchari.

Manna graminæ.

Manna Thurū.

Manna Thurū.

Manardo.

Manardo.

Manardo.

Manardo.

Manardo.

Nunc reliquis arbores ſylveſtros perſequamur.

DE EVONYMO VETERVM.

CAP. XIV.

Locus.

Theoph.
mund.

Tempus.

Flor.
Fructus.Lethalis
arbor.Evonymus.
Plin.

Plin. error.

Descriptio

Stylus.

Materia.

Cortex.

Folia.

EVONYMVS dicta arbor, autore Theoph. nascitur cum alibi, tum in Lesbo insula, in Ordymno monte. [ἐν τῇ ἰσθμῷ τῇ ἐξ ὅλης: non ut vulg. habent: ἐν τῇ ἰσθμῷ τῇ ἐξ ὅλης. Nam & Dal. ita legit, & Conit vocem ἐκκινῶν ἐξ ὅλης irrepsisse suspicatur.] Est autem magnitudine Punice, & folio eiusdem sed maiore quam Chamædaphnes. Circa Septembrem germinare incipit. Floret verè: floris color, qualis in Leucoto: odore gravi, odorem trucidari animantis, aut in tabum putrescentis [ἐν τῇ ὁσμῇ] referente. Fructu cum suo putamine aut conceptaculo Sesami siliquis non absimili, intus solido, sed in quatuor versus distincto. Est lethalis est arbor, tam fructu quam foliis pecori & ovium gregibus, sed maxime capris, nisi forte purgentur. Purgantur autem alvi profluvio. [ἐκκινῶν: Dal. legit ἐκκινῶν, inedia cibique abstinentia. Quid sit ἐκκινῶν, haud facile invenias, quanquam aliqui vomitionem & per supernam purgationem vertant, ἐκκινῶν δὲ αὐτῶν. Hæc Plin. bona ex parte ita transcripsit. Nec aspiciat in Lesbo insula arbor, quæ vocatur Evonymus, non absimilis Punice arbori, inter eam & Laurum folij magnitudinis, figura verò & mollitia Punice, flore candidiore, statim pestem denuntians [sic ineptè πῶν transfert.] Fert siliquis Sesami similes, intus granum quadrangula figura, lethale animantibus, nec non & in folio eadem vis. Succurrit aliquando præceps alvi exinanitio.

Dod. de nostra Evonymo dicit, eius foliorum esu capras interire, nisi supernè & infernè purgentur. An hoc observatione habeat: an ex voce ἐκκινῶν, & Plinij lectione extorsent, ipse videtur.

EVONYMVS MULTIS: ALIIS
TETRAGONIA:

RAMOS A est arbuscula, Evonymus multis putata, aut certe frutex arboreus, altitudinis quatuor aut quinque cubitorum, cuius stiones lato virore perfusi, & nuper nati ramuli, propter corticem in quatuor angulos excurrentem, quadrangulares apparent, non secus ac si dolabrâ ars perpolvisset, ipso alioqui ligno interno tereti, albo aut flavescente. Cortex viret



Rami crebro intervallo, in oppositos ramulos dividuntur. Folia oblonga acuta, crenata, è Periclymeni genere Chamæcerasi di-
sta foliis similia & æqualia, paulò post veris initium flores profert pallidos aut herbaceo quodammodo colore constantes, ex quatuor foliolis congestos, quibus totidem alternatim posita calyculi foliola subii-

ciuntur, pari numero apicibus luteis umbilicum curvofum viridatè cum stilo concolore occupantibus. Singulis flosculis singuli succedunt fructus, seu singulæ siliquæ quadrangulæ rubentes, aut puniceæ, (aliquando albæ, notante C. Bauh.) totidem distinctis loculis semina parva solida continent, cuticula crocea intacta, medulla alba, figura semini cannabino similia, hoc est, ex rotundo oblonga, sed maiora, sapore amaro, cum obfusa quadam dulcedine nauseabundo. Ipsa etiam arbuscula tota gravem & iucundum habet odore in Materies eius sic satis solida, fissilis tamen & æqualis est: ea, cum adhuc succo turget, cæsa, diluto croceo pallore etiam Buxum provocat.

Hanc expressè Theophr. faciunt Dod. Rob. Conit. Pena, Lob. Matth. Anguil. Thallus. Cæsalp. nihil certi statuit: suspicatur tamen hanc ipsam esse Evonymum Theophrast. Ruell. dubitat. Curtius Evonymum Plinij vocat: At Evonymus Plin. & Theophr. eadem est planta.

Evonymos, i. boni nominis, per ἀνώνυμος: unde quædam exemplaria Plin. habent Anonymos, uti notat C. Bauh. At Cæsalp. suspicatur Plinium ex Theophr. depravatè Anonymon legere. Evonymos & Anonymon vocat Cordus. Evonymum sanè Theophr. esse idem volunt plerique, quod multæ notæ eius historię respondent.

Hist. verò Lugd. quam Dalech. primò incepisse constat, Evonymum falsè creditam ait ab omnib. ferè Herbariis. Idem alibi: Herbarij, inquit, quam Matth. Evonymum esse putat, Evonymum esse negant, sed Tetragoniam Theophr. esse volunt. Gaza Quadratoriam interpretatur. Sic dictam hæc censet Dal. quòd rami ob linearum quatuor ruffarum ferratarum, dorsum modo extantium, rectè per vicidè corticem porrectarum, discursum, quadranguli appareant, quod huic arbori peculiare est: & quòd in fructu quadrangula siliqua sit.

Evonymus Græcorum inquit Clus. Evonymus Latinorum censetur potiori doctorum virorum parti, tametsi quidam aliter sentiant, & τῷ τετραγωνίῳ. cuius solum nomen apud Theophr. inter serò germinantes reperitur, esse velit.

Nos sanè hanc Evonymum pro certo nondum asserere audent, ut sper tamè ita appellare lubet, dum aptius nomen reperatur.

Quod si verò vulgaris hæc nostra Evonymus est Tetragonia Theophr. ut volebat Dalech. (quod ut non negamus, ita non temerè in tanta eius brevitate asserere ausimus) & Evonymus etiam eiusdè sit eadem, ut ex diversorum Herbariorum sententia colligi potest, inconsideratè sanè Theophrastus eandem plantam diversis nominibus tradidisset.

Tragus & Carpinum, alii lugalem dicunt. Sed fallitur Tragus, quod facile animadvertet, qui descriptionem diligenter perpenderit: quam eundem eius errorem, more suo Lonic. & Frischlinus in suo nomencl. sequantur. Eiusdem etiam Tragi opinionem merito reiciunt Dodon. Matth. Hist. Lugd. & doctiores plerique.

Petro Crescentio, Fusanus nostro & aliorum iudicio dicitur. Fusaria vel Fusanum rufibus, teste Ruell. Fusaria & Fusago Herbar. Curtius quibusdā regionibus Fusarium dici notat. Si quis cum Silio Italico conferat, facile coniciet esse, inquit Matth. At in post. com. Categoricè asserit Hetruscis Silio dici, aliis Fusaria.

Germ. Spindelbaum, id est, Fusaria: & Bane fœdlin, id est, Galls testicular: Spilbaum Cordo: Silesius Tzwerckholz, & Pfaffenrößlin: In Than Allatiz nobis Weschelholz appellatam inter

Fructus.

Semina.

Sapor.

Odor.

Materia.

Evonymus.

Theophr.

Non esse.

Evonymus.

Theophr.

Tetragonia.

Theophr.

Evonymus.

Evonymus.

Latinorum.

Fusaria.

Theophr. fœd.

Carpinus.

Tragus.

Lonic. &

Frischlin. ruf.

hantur.

Fusanus.

Fusaria.

Fusanum.

Fusago.

Silio Italico.

Nomen.

Lugum.


nomine. Gener etiam Cherlerus collegit in horto Patavino, nobisque communicavit.

EVONYMVS FLORE PHOE- NICEO.

Descriptio

Folia.

Flora.



ARBVSCV-
LA est aut
frutex homine
altior, cuius cru-
dex & rami tu-
berculis asperis, ac
veluti punctis
notati: rami
sunt pulverulen-
ti. Folia serrata,
Pruno sylv. simi-
lia: flosculi ali-
quot simul ex
longis petiolis,
quadrifolij, simi-
les. Evonymo
vulgari vel Epi-
medio quorun-
dam, phœnicei
coloris. Clus. fu-
sus sic describit:

Assurgit bicubi-
talibus aut maioribus ramis, digitali vel etiam
pollicari crassitie, lentis & obsequiosis, denso
cortice obductis, viridi primùm, deinde multis
nigricantibus tuberculis asperis, qui in summo di-
viduntur in plures ramulos ordine & serie qua-
dam inter se oppositos, Myrti latifoliae paribus,
sed tenerioribus, leviterque in ambitu crenatis
gusto primùm exsiccante, deinde amariuscule &
calido: ex quorum sinu in oblongis gracilibus-
que pedunculis flosculus unus, bini, aut ad sum-
mum terni dependent splendentes, & purpura-
scentes, quatuor foliolis constantes, umbilico
quadrato, & staminulis luteis quatuor angulos
occupantibus. Cotini vulgò crediti flori haud
multùm forma ab similes, licet maiores. Fructus
succedit in siliquis quadrangulis, alterius Evony-
mi similibus, spongiosus, aurei coloris, iis dehi-
scentibus tenui filo propendens, in quo grana
non crebra, uti in alio, sed nigra, Fraxinellæ gta-
norum æmula & splendentia, bina interdum &
terna, eodem loculo & pulpa comprehensa.

Sapor.

Fructus.

Grana.

Synonyma.

Locus &
tempus.

Æquivoca.

Nerium
alpinum.

Evonymus alter eiusdem Clus. *Evonymus Pannoni-
cus*, *Ungerisch Spindelbaum* Taber.
Hanc nobis insignis vir D. D. Schuvartzius Me-
dicus Illust. C. V. Virtemb. & præfectus horti Me-
dici Illust. Celsi. Sturgardiani nobis ostendit
Anno 1595. Maij 25. prius non visam, quæ in pul-
chellam arbusculam excreverat: ex iconis imagi-
natione, quam apud Clus. videramus, statim de-
prehendimus esse Evonymi hanc speciem raram.
Copiosè nascitur, teste Clus. in sylvis utriusque
Pannoniæ montibus: sed qui Alpes attingunt,
eandem alere desinunt. Invenitur & in Moravia:
nusquam verò abundantius, quàm in sylva arcis
Greitzenstein, Illust. Comit. Nicolai de Sal-
mis vicina, secundo à Vienna milliari, ad Ixvam
Danubij ripam. Floret Maio: Fructus Augu-
sto plerumque maturascit, maturius quàm vul-
garis & latifolia. Camer. se etiam in suo hor-
to Norinbergæ coluisse scribit. Porro Dalech.
suam particularem Evonymum exhibuit, de qua
nos sub Nerio Alpino sive Chamænerio. Tra-

dunt Advers. Quosdam apprimè doctos Cha-
mænespilum sibi persuasisse, alios Evonymum
Alpinum fecisse arbusculam alpinam, folio Mali,
&c. Nos existimamus eos intelligere Cotonea-
strum, de quo alibi.

SYRINGA FLORE ALBO.

CAP. XV.



QUAM Sy-
ringa alba
vulgò dicta sit
fructu inutuli,
visum est eam
hoc loco pone-
re. Ea infirmis
ramis adolescit
fruticosa admo-
dam, fungosa
medulla refra-
tis. Folia per
coniugia exe-
unt tanquam è
geniculis, Sta-
chylodendryle-
vis in ambitu
crenata, hirtutis
modica prædita,
sapore subduli
& acuti. Flores in
extremis surcu-
lorum multi simul iuncti, odorati, candidi, dul-
ces, Arantiorum, quaternis foliis constantes, api-
cibus in medio luteis.

Hanc Gulandinus Philadelphum florem A-
pollodori apud Athenarum dipnosoph. l. 15. cap. 12.
dicebat, uti nobis retulit D. Casp. Bauh. Quæ sa-
pè opinio nobis non displicet.

Verba Athenarum hæc sunt: Apoll. l. 4. Rerum Par-
thicarum scribit florem Philadelphum vocatum
nasci in Parthia regione de quo hæc tradit. Myrti
varia genera, Milax, [Smilax] vocatūque Phi-
ladelphus, qui flos naturæ aptum nomen acce-
pit, quia ramos illi per intervalla esse accidit sua
sponte, complexionem ubi nascuntur animato-
rum, veluti ex una eademque radice operantur:
reliquum verò discurrunt, ac vivas plantas gi-
gnunt, [cùm ex intercapedine sponte rami coi-
verint, animato complexu coherescunt] & in
unitatem iunguntur, deinde procurentes vivos
surculos pariant. Hinc effectum ut domesticos
Philadelphos in custodiam converterent: nam te-
nenotes subtilioresque ramos adimentes, ac in
retis more componentes in circulum plantare so-
lent circa hortos: qui ita coniuncti securitatem
parant, difficilèque aditum operantur ubi fue-
runt positi.

At Rob. Const. iudicio Ostrya, Hetruscorum
est Syringa arbor appellata, quam ait videri in
horto Ducis Florentiæ cum iis notis, quas assi-
gnat Theophrast. nec deesse illam fructus insi-
gnem notam, quæ Hordei grano similis. Florem
(quod ipse tacuit) candidum & suaviter olen-
tem. De eadem & Plin. l. 14. cap. 21. Inter infelices
arbores, quam & Ostryam vocari tradit. Hinc
Hist. Lugd. Quæ vulgò Syringa, multi, inquit,
Ostrya Theophr. esse volunt. At hæc opinio
Camerario non placet: certè neque nobis. Ne-
scimus verò quo errore in eadem Hist. Lugd. post
Syringæ rubræ descriptionem indistinctè iterum

Descriptio

Folia.

Sapor:
Flora.

Philadel-
phus fl.

Ita in
raro.

Ita ad
seper.

Ostrya. Hæc
ruscorum.

Ostrya.
Ostrya non
Ostrya. Rob.
Const.
Hist. Lugd.
geminus
error.

albæ descriptio posita sit nullacius nominis facta mentione.

Syringa *Syringa vulgaris*, *Syringa flore albo* Clus. *Syringa Italica* Lob. *Syringa alba* Siringbaum, Tab. *Syringa vulg.* Celsalp. & Hist. Lug. Burgundi ut aiunt, *Sasse* vocant, præsertim Veluntij, ubi aliquot in hortis egregiè cultam vidimus, undèque accersitam in hortum Montheig. transplantavimus. Habetur etiam in horto Sturgardiano. Et in Italiae hortis multis Patavij, Bononiæ, Ferrariæ, aliisque observavimus. Floret Aprili & Maio.

Tempus.
Satio.
Vjar.

Facile furculis propagatur. Hætenus nihil nobis de eius usu innotuit. Posset tamen ex floribus aqua odorata destillari. Folia quia subdulcia & acia sunt, eas habebunt vires, quas Galen, istis qualitatibus assignat, quem consulas licet.

SYRINGA, ALBÆ SIMILIS CAPITULO, OCTO STRIIS NOTATA.

CAP. XVI.

Descriptio **A**RBORIS-NE, an fruticis (inquit Clus. Exot. l. 2. c. 25.) ramulus, quemve florem tulisset, ex siccatō difficile erat iudicare: aliquam tamen affinitatem habere videbatur cum illis ramulis, qui in coronario frutice, live *Syringa* à vulgo Herbariorum appellata, odoratos albos flores, racemi instar compositos, quinos aut septenos ferente, nam eiusmodi ferè capitula habebat, octo exilibus striis notata, quæ in binas partes reselli avicolæ in modum dividebantur, contrà quàm in coronario frutice, cuius capitula in plures partes divisa: nullum autem semen continebant, sed inania erant.

SYRINGA FLORE COERVLEO SIVE LILAC.

CAP. XVII.

Descriptio



Rex.

Cortex du-
plex.

Lignum.

Gemma.

COMMUNE nomen & fructus inutilis faciunt ut *Syringam* coeruleam hic collocemus. Arboris magnitudinem acquirit, plerumque ramum & fruticosa: radice multum reptante & pululante, seque plurimum multiplicante, stolonibus robustis: cortice exteriori in cinereo virescente detracto librum ostentans viridem, sub quo lignum solidum,

firmum. In extremitate ramulorum sunt crassæ & turgentes gemmæ. Folia bina ad versa, contrariòq; ortu serie quadà cruciformi disposita, Asclepiadis foliis quodammodo similia, sed latiora, vel Apocyni rotundioris aut Populi nigre, subrotunda, in acumen tamen definentia, mollia primum cum floret, postea duriora & firmitiora, utraque parte

glabra, pediculis uncialibus aut anplioribus appendita, subamara & nonnihil acia. Flores ex privato furculo imbricato foliorum stipatu obvallato suaveolentes oriuntur in subæ formam dispositi, numerosi, sine foliis: quorum singuli ad flores Laureolæ folio deciduo accidere videntur, oblongi, rubentes, aut ex rubore coerulei, quinque partiti, quatuor apicibus croceis altè reconditis fæcti. Subsequuntur voluti siliqua rubentes compressæ, vix unguem longæ, ex brevibus pediculis, quæ maturæ in duas partes separantur & pulchrè hiant, in quarum interstitiis secundam longitudinem porrectis latitant semina longa, angusta, foliacea, compressa, tenuia.

Hanc plantam, inquit Matth. Constantinopoli secum attulit Cl. vir Augerius de Busbeke, qui continuis septem annis Cæsaris Ferdinandi primi apud Solimanum Turcarum Imperatorem Orotorem egit, sub hoc nomine *Lilac*. Eam quum inspexissem, & fructus eius agnoscerem Pistaciorum faciem perquam bellè referre, illic in suspicionem veni, an hæc fortasse *Gland unguentaria* dici posset. Quapropter, ut aliorum quoque sit iudicium, eam hic excudi voluimus. Vivam plantam videre non licuit, sed assabrè & diligentissimè pictam. Hæc Matthiol. qui nimis audacter ex pictura suæ plantæ pronuntiat. Necesse est sanè fructus non benè fuisse pictos, quippe qui nulla ratione Pistacia referant: quod si ille observasset, nullam profectò occasionem reliquam habuisset suspicandi esse Glandem unguentariam. Melius depinxere Lob. & Dod.

Glandem unguentariam esse non posse statuunt & Clus. & Pena & Lob. & Hist. Lugd. & ob id Matthiolum taxarunt: Et Tab. monet, ne utquam *Ben* esse existimandam.

Idem Matth. scribit Patavio huius plantæ recentissimum ramusculum, floribus copiosissimis refertum, & alterum deinde cum fructibus ad se misisse Cortusum, literisque sibi significasse, hanc se credere esse plantam, quæ Theoph. l. 3. c. 10. hist. *Ostryx* appellatur. Hanc ex Africa, ubi frequentissima proveniat, sibi missam fuisse, ubi vernaculo idiomate *Syringa* nuncupetur. Quinetiam se plures in suo horto huiusce arboris alere plantas, ob florum suaveolentiam. Hæc ex scripto Cortusi.

Addit idem Matth. Unguentarij ac Sepiasarij Mauritanorum nomina secuti eam *Ben* appellant. Forma hæc Pistacia maximè refert, albo cortice triquetro, fractu facili, nucleo intus conferto, & admodum pingui, &c. Sed nescit quid misset Matth. Nam si huius ramum cum fructibus à Cortuso accepit, mirum quæ fiducia etiamnum Glandem Unguentariam credere sit ausus, nisi fortè ipsam Glandem unguentariam cognitam non habuerit. Apud Theoph. *Ostryx* nulla: sed *Ostry* sive *Ostrya*, quam ne utquam esse censemus. Consule caput præcedens. Sed eam *Ostry* dicat Theophr. habere fructum pusillum, oblongum, Hordeo similem, colore flavum, &c. mirum rursus, quæ oscitantia Matth. præterierit hanc Cortusi ineptam suspensionem, & diversitatem non ostenderit. Tanta nimirum eius naturæ herbariæ vestigatoris fuit diligentia. Ac hoc quidem errores in ultima Matth. editione ostendi par fuisset. Falsum ubique detegi, veritas puspiam celari, aut neglecta præteriri debet, etiam in rebus naturalibus.

Celsalp. *Ligustrum Orientale*: fortè *Isenheim caruleum Arabum* eadem, l. 3. c. 43. Idem l. 4. c. 10. Arabes, inquit, *Sambach* vocant, eorum interpretes

Sapor.
Floru.

Fructus.

Ex Co-
ramispa-
li.

Lilac.

Gland un-
guentaria.

Matth.
repreh.

Gland un-
guentaria
non off.

Non off
Een.

Ostryx
Throph
Locus.
Syringa.

Matth. ab-
ter erat.

Cortusi li-
pus.
I. cortu
Matth. or-
ror.

Ligustrum
orientale.
Isenheim
caruleum.
Sambach.





doctz, calore suo inflationes solvere Vitiem:
(nisi quis antipathia quadam aut proprietate natu-
rali id prestare sentire malit) ideoque Veneris
impetus omnes facile retundere ac inhibere.
Contra so- Qua potestate in abundantia seminis & contra
minis in- nocturnas Veneris per somnum imaginationes,
continent- & seminis incontinentiam, sanitati hominis non
iam. parum contulit.
Tempera. Hinc porro excalfactoriam adstringentemque
vim Diosc. tribuit: quod autore fructus eius epo-
tus demorsis à serpente, sed & lienosis ac hydro-
piciis opitulatur. Lactis abundantiam facit, men-
sesque ciet drachmaz pondere in vino potus: ge-
nituram quoque exsolvit. Caput verò tentat,
soporēque infert. Herba ac seminis decoctum
ad infellus, vulvæ affectibus & inflammationi-
bus opitulatur. Semen cum Pulegio potum,
suffitu etiam & appositu, purgationes movet:
dolorem quoque capitis dissolvit illitum. Cum
aceto & oleo Lethargicorum Phreneticorumque
capitibus instillatur. Quin & folia tū suffitu,
tū etiā substratu venenata fugant: ac contra ve-
nenatorum morsus adhibita auxiliantur. Te-
stium duritias cum butyro vitiumque foliis emol-
liunt. Rimas sedis semen cum aqua illitum miti-
gat: cum foliis verò, luxatis vulneribusque me-
detur. Creditur & viticis virga intertrigines ar-
cere, si eam viator dum iter facit, manu teneat.
Hæc Diosc.
Tempera. Gal. Vitiis naturam atque temperamentum
paulò diligentius inquirat, his verbis: Agnos aut
Lygos, hoc est Vitex, planta illa fruticosa, cali-
dus quidem est & siccus tertio ordine, verū
multū tenuis substantiæ, tū gustu acris simul
& adstringens. Ipsas tamen virgas [λύγες] ad
medicinam habet inutiles. Ceterū folia se-
menque calida siccaque facultate sunt, substan-
tia verò tenui. Nam & utentibus ita apparet, &
gustantibus acris simul & subadstringens perci-
pitur, tū folium, tū flos, tū semen. Edendo
tamen etiam semen [σπέρμα] est: verū tam
perspicue calfacit, ut capiti hoc nomine dolo-
rem pariat. At si frigatur, (nam & sic editur cum
tragematis) minis caput tentat. Porro flatus
ventris discatit, & cum non frictus, & multo ma-
gis cum frictus fuerit. Cohibet etiam impetus in
Venerem, tum frictionis expertus, tum etiam i-
psam expertus (fructus.) Folia item florēque
ipsius fructus id ipsum prestare possunt. Itaque
non tantū esā potaque ad caliditatem conferre
creduntur, verū etiam substrata. Hinc est quod
Athenis in Thesmophoriis, hoc est, Sacris Cereris,
mulieres totum sibi fruticem substernunt. Hinc
illi quoque nomen inditum ἄγρι, id est, casti, uti
dictum. Ex quibus omnibus manifestum est, A-
gnum calfacere, simulque exiccare, tū omnium
maximè flatus discentere. Porro quod exactè te-
nuium sit partium, facultas eius πικρὸς est at-
que indicio. Nam, quod caput tentat, non magis
à multitudine vaporum ab eo prognatorum,
quàm à caliditate eius ac subtilitate partium fieri
rationi consonum est. Si enim flatusosum spiritum
procreate posset, sanè & venetem inflaret, & Ve-
nerem stimulatet, perinde ut Eruca. Verū,
cū non tantū non excitare, imò etiam reprimere
queat, fuerit sanè secundum Rutz maximè
facultatem, tū in excalfaciendo, (Quod l. 1. a-
lim. item 2. comp. med. part. refrigerare dicatur, id
errore factum hinc dices) tum in resiccando,
non tamen illi par est. Nam utroque paulò est
inferior: siquidem Ruta tū magis est excalfac-
toria, tū magis desiccatoria. Differt etiam

qualitatis simul ac facultatis missione. Nam A-
gni semen ac germina modicam ferunt admissio-
nem: At Ruta ubi aruerit, exactè amara est & a-
cris: ubi verò humida, subamara. Non tamen
austeritas aut acerbitas illi inest: aut si cui videat-
ur inesse, ea utique omnino obscura videbitur,
nec par ei quæ est in Agno. Quocirca & ad ie-
cur & lienem indurata & obstructa Agni semen
potius quàm Ruta competit. Sed hæc ad curan-
di iam Methodum pertinent. In præsens id so-
lū novisse sufficit, quod Agnus calidus est &
siccus facultate, idque non mediocriter, sed ter-
tio excessu, tū admodum tenuium partium.
Hæc qui norit, ac postea methodum curandi di-
dicerit, ipsemet inveniet, quo pacto menses hic
ciet, partes induratas digerat, lassitudines sol-
vat, & ex eo acopum excalfactoriumque un-
guentum præparetur.

Idem Gal. l. 1. alim. fac. Cannabim cum Vitice
comparat, eiusque semen huius seminis viribus
quodammodo simile dicit, sed multū ab ipso
distare, ut, quod egrè concoquatur, stomacho
incommodum sit, capitis dolorem inducat, &
pravum succum habeat. Edi tamen fruxum cum
aliis bellariis, quæ post cenam voluptatis ad bi-
bendum gratia comeduntur. Sed & Vitiis se-
men fruxum edi, & impetus venereos cohibere,
modicum verò dare alimentum, & hoc siccans
ac refrigerans. Ex quo loco apertè liquet vel
Galenum sibi ipsi contrarium esse, vel hoc loco
mendum irrepsisse, legendūque calfaciens, ut
paulò antè monitum: quanquam idem simili er-
rore repetatur l. 2. alim. c. 35. ubi etiam refrigerare
scribit, & fruxum mansum iis accommodum esse,
qui à Venere pure se servare volunt: nec ita ca-
put ferire, ut Cannabis. At ibid. c. 39. Vitiis ta-
riones sicut & Terebinthi in muriam acetūve
iniectiones per totum annum asservari tradit, ut
vim quandam provocandæ appetentiæ acqui-
rant, si quis ipsis moderatè utatur.

Porro eandem modò dictam in Galen. contra-
rietatem Aetius 1. Tetrab. ser. 1. velut emendans,
legit pro λόγους voce, διακρίσεις, ut alimentum
siccans ac calfaciens corpori dari accipiamus. Ni-
si quis fortè cum Saraceno Vitiis semen eatenus
refrigerare dicere velit, quatenus Veneris impe-
tus, qui à calore sunt, inhibere potest.

At quod l. 2. ἡμίμας, c. 1. Vitiis moderatè, refri-
gerare, atque aded, ex Archigene, nonnullis aliis per-
missum dolori capitis à causa calida oborto cove-
nire innuit: idem rectius de virentibus Viti-
cis foliis accipi censet: quippe cū prædomi-
nantis humiditatis ratione non usq; aded calefa-
ciant: maximè verò si cum Lauri foliis, natura
calidissimis conferantur. Adde quod, quoniam
longè tenuissimarum sunt partium, æquè ac alia,
quotquot sunt κατὰ φύσιν, facile eorum, quibus-
cum permiscuntur, sive calfaciant, sive refrigerent,
vim exaquant & adaugent.

Notabis & aliam contrarietatem in citatis Gal.
locis. Nam in 6. simpl. ἄγρι καὶ τὸν κισσὸν ἀλλὰ καὶ τὸν
asserit: Ad quod respicit & illud Dioscoridis, ἡ
πικρὸς ὅς ἐστι κατὰ φύσιν ὁ ἄγριος. At contra Idem
Gal. alim. 1. κισσὸς ὅς ἐστι ἄγριος, (inquit) καὶ τὸν
ἡ κατὰ φύσιν. Sed pugnantia hæc loca facile fuerit
conciliare, si fateamur tentare quidem caput Vi-
ticis semen, uti re ipsa facit, testante eodem quo-
que Sarac. non tamen quantum Cannabis. Illic
enim simpliciter agitur de Vitiis semine: hic ve-
rò cum Cannabis semine comparatione facta.

Ceterū quod Vitex contra Venerem insiste-
re iam aliquoties dicta sit, & mulieribus in Thef-

toris be-
mque lu-
vires &
obstru-
tis.

Menses ut
dicitur.
Lassitudi-
nē
acopum.

Conferunt
cum semine
Cannabis.

Calor.

Gal. sibi
contrarium.

Vitiis ut
vires cum
dicit.

Gal. locum
corrigens.

Quomodo
Gal. locum
corrigens.

Alia Gal.
contraria.
Idem.

Per com-
paranda.

Difficilis
explicatio.

cas, *Alia* virgas sequacis ad vinculas lentitiz. *Alia* pretenues viminibus texendis spectabili sublimitate. Rursus *alia* firmiores corbibus, ac plurimæ agricolarum suppellectili: candidiores ablato cortice, leves tractatu, vilioribus [melioribus, aut mollioribus Ruel. & Ch.] valisatque etiam supinis in delicias cathedris [in quibus ignauæ sedent totos dies mulierculæ, & cum iis molles & effeminati viri: vnde Cathedralisj Martiali] aptissimæ. Cædunt Salici fertilitas densior confusa: nullus quippe tutior est reditus, minorisve impendij, aut tempestatum securior. Tertium locum ei in æstimatione reris Cato attribuit, priorumque quam Olivæ, quamque frumento aut pratis. Nec tamen quia desunt alia vincula: siquidem & Genistæ, & Populi, & Ulmi, & Sanguinei frutices, & Betulæ, & arundo fissa, & arundinum folia, ut in Liguria, & Vitis ipsa, recisique aculeis Rubi alligant, & intorta Corylus. Mirumque confuso ligno alicui maiores ad vincula esse vires. Salici tamen præcipua dos. Finditur Græca rubens, candidiorque Amerina, sed paulò fragilior: idè solidò ligat nexu. In Asia tria genera observant. Nigram utiliore viminibus: Candidam agricolarum usibus: tertiam, quæ brevissima est, quæque Helicem vocant. (Hanc distinctionem ex Theoph. transcripsit Plin.) Apud nos quoque multi eòdem generibus nomina imponunt: Viminæam vocant, eandemque purpuream. Alteram Nitellinam (Nitellinam Ruel.) à calore, quæ sit tenuior. Tertiam Gallicam, quæ tenuissima. Columella Viminæam Salicem tria genera: Græcam, flavi coloris: Gallicam, obsoletam, purpuream & tenuissimam viminem: Sabinam, quam plurimi Amerinam vocant, gracili & rutila virga.

Salicem a-
firmatam
apud Vete-
res.
Planta ad
Gmcula.

Græca-
boni.
Amerina.

Nigra.
Candida.

Viminæa.
Nitellina.
Gallica.
Differentia
Colum.
Græca.
Gallica.
Sabinæ.
Accommo-
dantur
prædictæ
inter se &
ad nostras.

Plin. Gari-
dus.

Quæ tanè singula pulchrè cum iis, quæ Theophrast. tradit, convenire videntur. Nam primam Salicis speciem, quam Theoph. nigram aut puniceam vocat, Plin. viminalem, Colum. verò Sabinam & Amerinam: Germani Rott Weiden, rubras Salices, Lugdunenses etiamnum hodiè Amerinæ & Ambres, Patiensenses Oster vocant, teste Dalech. Quod verò Plinius ait: Finditur Græca rubens, de Amerina quoque intelligendum, eiusdem Dalech. iudicio, quoddam sola findatur. Nam Amerinarum Quædam rubet, quam Græcam vocant, Plin. etiam nigram, l. 24. c. 9. Quædam candida est: idè ait Plin. Finditur Græca rubens, candidiorque Amerina, ita ut vox, Amerina, æquè ad rubentem & candidiorem referenda sit. Secundam speciem, quam Theoph. Candidam, Plin. Nitellinam, Colum. autem Græcam vocant: Germani Geel Weiden, Salices flavae nuncupare videntur, Tertiam quæ Theophr. Helix dicitur, Plin. & Colum. Gallicam appellant: Germani verò à tenuitate & exiguitate Klein Weiden, Salices parvas seu humiles nuncupant.

Dalech. illa Plin. verba: *alia virgas sequacis ad vinculas lentitiz*: de Amerina, ruffa, & vitellina intelligit. Et illa. *Alia pretenues viminibus texendis spectabili sublimitate*, de nigris & purpureis. Fortè reliquis de Gallica seu Helice, quam & tenuissimam idem Plin. dixit.

Helix unde

Videtur autem Helix dicta à similitudine Hedere sic vocatæ, quæ ad iustum Hedere modum non excrevit: vel *inula*, ut apud Theophr. legitur, dictam putat Dalech. quoddam maxime flexilis sit ac plicatilis: nimirum propter tenuitatem.

Dab. in
Plin.

Illud considerandum an non subit aliquis in Plinio error, dum Amerinam l. 16. cap. 37. rubentem (ut exposuimus) & expresse candidam facit: eandemque lib. 24. cap. 8. nigram. Nisi lega-

tur, uti corrigit Curtius: Columella autem vitellinam. Quæ si quis non admittat, videat annon Plin. & Columellam in divisione Salicum discordent.

Diosc. de Salice tradit ac si una tantum species esset. Nam arborem dicit vulgò notam. Fructum tamen ferre non ignoravit.

Cordus Salices sic distinguit: *Salix Viminalis* ^{Salix Vi-} in Francia nostra copiosè propter Vites feritur ^{minalis.} *Perticulis* in Saxonia, ad Lupuli pedamenta. *Perticulis* est, quæ longiori talea sive pertica pangitur, ea non singulis annis putatur, ut Viminalis, sed quarto demum anno. Longiorem enim ætatem Perticæ quam Vimina requirunt. Atque hæc generum sunt nomina. Specierum verò quæ cordis demonstrari vetustis nominibus possunt, *Vitellina* & *Gallica*. *Vitellina* est, quæ German. *Geel Weiden* flava, & *Torret Weiden* vocatur. Frequens in Francia nostra, cum Perticulis tum viminea. *Gallica* verò est, quæ in obsoleto purpurea profert, & omnium tenuissima vimina: Germ. *Harweyde*, hoc est, *capillares Salices* à gracilitate vocant. Porro (addit idem Cordus) qui Salicum figuras ignoraverint, consulant Herbarium Fuchsi, qui plurimum specierum imagines ^{Fuch.} delineari curavit. Pingit autem Fuch. duas ^{Cordus.} Salices hirsutas, & unam sine pilis, sed absque descriptionibus additis, quod non placet. Ipse quoque Cordus minis diligenter Salices investigasse videtur, qui tam paucas differentias agnovit.

Gesnerus quoque postquam dixisset in Helvetia multa Salicum genera nasci, sativa & sylvestria, addit sylvestrium minimam Siler appellari: & aliam quæ lato est folio *Salweiden*. ^{Salica.} ^{Sylvestris.}

Marth. Salicum quatuor sunt genera. Nam quadam in tantam proceritatem assurgunt, ut ex eis in Liguria fiant perticæ & pali maximi usus ad vitium pedamenta. *Alia* non tam proceræ, colore rufescentes, sequacis lentitiz, quæ ligandis cadorum vinariorum circulis commodè finduntur: Hæc Salices Græcas vocat Cato. *Alia* firmiores, corbibus, & rusticæ suppellectili admodum expetitæ. *Alia* minores ac mira tenuitate texendis canistris, cistellis, & calathis aptissimæ. Ut videas Marthiolum veterum differentias contentum, differentias nostratum inquirendis parum insudasse, ac usum tantum nostratum illis accommodasse.

Tragus quatuor quoque Salicum genera constituit Fuchsius tria. Dodon. duos tantum. Unam quæ ceterarum arborum modo in proceritatem magnam assurgit: alteram quæ semper humilis est, & vimina profert, cuiusque cortex interdum rubescit, aliquando candicat, nonnunquam verò flavescit. Turnerus Anglus tres tantum agnovit species: Græcam, colore flavo, plurimam in Frisia Orientali circa Anicum: Gallicam, vimine rubro, in multis locis Angliæ & Germaniæ: Sabinam, quæ & Amerina, quamque in Italia tantum & Frisia Orientali inveniri scribit. Totidem habet figuras.

Angul. in Epist. scribit: Salicis species [veterum intelligi] omnes notas. Helicem, de qua scribit Theophrast. Bononiensibus nunc Viticem vocari, ex cuius virgis fiant pulcherrimæ cistellæ. ^{Helica.} ^{Vitis.}

Scimus (inquit Aloisius in exam. Musæ Bras. favolæ) Hermolaum dicere se non planè compertum habere, an Salix Amerina idem quod Agnos sive Vitex sit: Verum, quia nullis quod suspicatur, coniecturis aut rationibus probat, propterea in Diosc. tecumque sentimus.

De r. l. cū aliis multis bonis ac doctis viris far-

Salix Vi-

Salix Vi-

Vitellina

Gallica

Fuch.

Cordus.

Salica.

Sylvestris.

Differentia

Græca.

Gallica.

Sabinæ

Amerinæ

Græca.

Gallica.

Sabinæ

Amerinæ

Græca.

Gallica.

Sabinæ

Amerinæ

Græca.

Gallica.

Sabinæ

Amerinæ

Græca.

Gallica.

Sabinæ

Amerinæ

Græca.

farragine nomenclaturarum, quæ spuria in Diosc. irrepleverunt, deceptus, tradit Viticem autore Diosc. Salicem Amerinam à Latinis appellari, cum inter has duas stirpes multum interlit, doctissimorum Herbariorum quoque calculo, ut in historia Viticis ostensum. Enimvero sanè si Salix sit frugiperda, uti Hom. cecinit: Amerina, si Vitex sit, non omnis Salix erit frugiperda.

Amerinam non esse Viticem

Arist. com- tradit sibi de sterilitate Salicis.

Amerina non sit in Salicem censu.

Homeri error.

Arist. not.

Tragus repreh.

Salix sine medulla.

Cronemb. carpitur.

Unde differentia Salicem constituantur.

Differentia C. Bauh.

Perticulis.

Viminalis.

Sterilis.

Fructifera.

Gallica.

Phœnicea.

Theophr.

Purpurea.

Plin.

Græca, Virgiliana.

Scaliger sanè ad lib. Arist. de plantis annotavit, cum [si modò is libere est, quod Scal. negat, plausibilibus sanè argumentis.] contradicere sibi de sterilitate Salicis. Suprà namque [inquit] Salicis brevioribus ramis flores attribuebat: nunc amovet à toto genere fructum. At Amerina, si ex multorum sententia sit in Salicem censu: suis baccis sive granis infirmet hanc sententiam. Quibus Scal. verbis facillè intelligi potest, eum per Amerinam, Viticem, quæ grana fert, intelligere.

Nos & alias Salices fructiferas, mox dicendas, observavimus ita ut saltem in his edictum Homeri contruat: nec omnes sint frugiperdæ.

Eodem errore & Arist. quoque lapsus est, qui lib. 1. cap. 18. de gen. animal. scribit nec Salicem, nec Populum semen aut fructum proficere. Verùm in utroque semina observamus, quanquam non in omnibus Salicis speciebus. Ex ex semine Salices natas infra dicetur.

Remittit Tragus lectorem ad Arist. lib. de invent. ite & senectute eade Salice tradentem, quo tamen loco ne verbulo eius meminit. Alio quidè loco monet florem Salicis apibus gratum esse.

Scalig. annotat, se Salicem sine ullo medulla motu vidisse.

Cronenburg. lib. 3. de comp. med. scribit Plinium lib. 16. cap. 38. octo Salicis genera proponere: Quæ tamen omnia ex Plin. verbis, nostra diligentia extorquere nondum potuit. Herbam portigenam ei, qui id præstiterit.

Caterùm in constituendis Salicem differentiis, respicias licet, vel ad locum, in quo nascuntur: vel ad usum: vel ad corticis colorem, ex quibus fontibus suas potissimum desumpsit differentias Dalech. in Hist. Lugd. Nam, inquit, Salices alia sunt *repens*, id est, aquatica: alia sicca loca non dedignantur, ut Amerina, quæ in vineis, quantumvis aridis & siccantibus passim profilit. Aquaticarum alia pigris & stagnantibus aquis gaudent, & ad rivorum fluviorumque margines, leni lapsu fluentium, vel pingue crassumque solum rigantium proveniunt. Alia glareosis, lapidosis, arenosisque torrentium & rapidorum amnium ripis. Ex corticis colore, candido, nigro, phœniceo, luteo, differentia alia sumuntur. Quæ ut ingeniosè quidem à perdocto viro tradita sint, tamen non omnes Salicem differentias exactè designare possunt. Sunt enim & alia à magnitudine seu proceritate, à panniculi seu floris specie, à figura foliorum, à fragilitate & lentitia virgarum &c: Immo & ab ipso quoque fructu: Vt nihil dicamus de exoticis Salicem speciebus infra tradendis.

Quas C. Bauh. diligentia consignavit, ita habent. Salix alia *perticulis*, alia *viminalis*. *Perticulis*, quæ vulgaris & prima, vel est *sterilis*, flores serens amentaceos ante folia, vel est *fructifera* serens racemulos, Populi instar oblongis granulis. *Viminalis* variat colore, cortice magnitudine & fructu. Colore est cortex albo seu pallido, Galina dicta: nigro, Phœnicea Theophr. Purpurea Plin. Luteo, Græca dicta, Virgiliana Plinio: Cinereo quæ latifolia seu aquatica Magnitu-

dine alia *viminalis* magna, alia parva. Magna, Latifolia? quæ secunda est Salix, purpurea nigra Viminalis, Magna. cui peculiare, quoddam ad cuiusque *folii* petiolum *phlois* Theophr. gemina semper sint foliola, *phlois* Theophr. Tertia: Salix, phœnicophloia, sive phœnicea. Phœnicea. Quarta: Salix lutea. Quinta Salix Latifolia, quam *phlois*. aliqui Elzagnon Theophr. censent, quæ duplex, *lutea*. alia folio oblongo, quæ Salix Caprea latifolia *Elzagnon* Theophr. Tab. alia folio rotundo, Salix 4. Trago. 6. Salix Caprea. Salix angustifolia. 7. Salix longissimis foliis, Elzagnon Hist. Lugd. Parva variat foliis latis & angustis: Latis, Salix humilis repens, quæ duplex apud Clus. in Hist. Pan. hæc octava est & Humilis repens. 10. Rotundifolia infra describenda. Angustifolia duplex Clus. undecima & duodecima. 13. Salix Helice Hist. Lugd. quæ baccas fert rubentes & caput squaminis compactum. 14. Salix maritima, quæ tellis ostrearum & saxi in man adhaerescit. Fructu variat quoddam alia sterilis, alia fructifera, ut suprà dictum. Quas omnes differentias mox ita proponemus, ut vel ex titulis quovis obiter industrio Herbarie studio dignosci à se invicem queant, ubi prius nomenclaturas generales dixerimus, & alia quædam generalia.

Græci vocant. Lat. Salicem, quod ea celebritate crescat, ut Salice videtur, uti Festus & Maurus Servius volunt. Arab. Bulef, Shules, Sasaf, aut Chafif dicitur, & ut alii volunt, Sasas quoque apud Avic: Iudaicè Aras. Germ. Weiden/Weidenbaum, Selbinger, Selber. Belg. Wilghe/Wilghenboom. Gal. Saulx. & Saule & Saulge. It. Salice, Saliceo. Hsp. Saure, Salgueiro. Angl. Willow-tree aut Salloer-tree 2. Borealisbus, Saughe-tree. Bohem. Durba. Lugduni Salices viminalis dicuntur Ambres, quum Burgundis & Montbelgardensibus Fructus Rubi Idæi, ita dicantur. Ramus Salignus Græcis *πῆλ*, aut vimen flexile *ἀπλω*, quoddam ob lentitudinem flexitur. Trunci summum rusticis Caput vocant.

Salicem Poëta, variis epithetis ornant: unde Virgil. Ecl.

—Salicem carpentis armatus

Animalibus tamen, maxime Capris dulcis est: Valde enim appetunt eas. Lenta Salix eidem. Vnde etiam Ovid. Metam 4.

Lentior & Salicis virgæ.

Et Idem Virg. Georg. 2.

Et glauca canentia frondè Salicæ.

Item eodem lib.

Inultique exerceat cura Salicis.

Amnicola & curva Ovid. Fecunda viminalibus Virg: Tenera Lucret. Dicta & cana, viminalis, perticulis, sylvatica, fluminea, amnicola, umbrosa, erratica, resonans, opaca &c: Malè verò frugiperdæ dictam Homero dicas, si omnem intelligat: benè, si aliquas tantum. Nam aliquas semen ferre mox patebit, & ex semine quoque nasci à Trago & nobis observatum.

Salix munda apud Iurisconsultos, ea dicitur quæ omni spurcia & frondibus liberata & purgata est, aptaque & ad viendum & alligandum: ut quum ex arundine iuga fiunt, aut pedamenta adminiculaque vitum. Verba Iuris Consulti sunt: Et Salicis mundæ annua librarum viginti nulla. Turneb.

Qui Salicis spumam albicantem adnotatam reliquerit, inquit Matth. inveni neminem: quæ de lapsis statim floribus, è ramisculis ut modo dependet, donec ventis arcepta huc & illuc, plumæ modo, impellitur. Sed parum attentè Matth. legisse videtur Plinium de Salicibus tradentem, qui apertis verbis scribit, Salicis Fructum ante



medio obliquis in margines nervulis exportectis, in ambitu crispa magna ex parte, quod pictor non exprimeret neglexit.

Excremen-
tum.

Elagnum.
Dal.

Locus.

Ufus.

In hoc genere excrementum Gallæ simile foliis adnatum observavimus. An Hist. Ldgd. Salicis 6. genus: quod Dalech. Elagnum arbitrat, in sabulosis nascentis propè rapidos amnes duntaxat, ut ad Rhodani ripas? An Clus. Pan. Vulgaris Salix, quæ foliis alioqui argutis, prona parte incanis? An verò Amerina ex qua corbes hant. Et hæc riguis gaudet locis & pratis, cuiusmodi in locis circa Monthelg. & in Ducatu VVirtemb. inter Bol, ubi admirabile balneum, & Wpffenburg observavimus, aliisque non paucis. Ex hac potissimum, quodd vimina proferat longissima, sine adnatis, & lenta, plectuntur quasi, sportulæ, rami, cathedræ & anachinteria.

Cæteroque notandum, quodd in exteriori parte excrementi huius flosculorum lutei apices toto se proferant ambitu, exertique suis finibus conspiciantur, suis tamen longioribus petiolis excrementitæ substantiæ toti involvantur, obteganturque. Observavimus quoque excrementum producere in ramulorum fastigio, Rosæ æmulum, foliis confertim stipatis compactile, partim hirsutis, partim glabris. Icon prior quam iam sculptam eminus minis placet. De hac sic Hist. Lugd. Dalech. Salicis quintum genus omnium brevissima, Helice fructifera, à nigra certè & alba diversa, quamvis pumilam in eo utroque genere, ut diximus, Theoph. esse tradit: virgas tenuissimas, maximèque exiles profert, cortice subluteo vestitas. Huic folia paribus semper intervallis gemina, cùm in aliis generibus temerè, nulloque ordine disposita sint, candicantia sed non lanuginosa, brevissima, conferta, in ambitu minimè crenata, protuberante semper ad foliorum radicem velut novo aliorum conceptu, quod huic proprium est.

Excrementum
tam roseæ
modum.

Pessca.

Rosa Salicea.

Salix Helice Theoph.

Vitis.

Salix Angustifolia Pan.
non Clus.

Folia.

Flores.
Seminaque.

Tubercula.

Salix rosea.

Locus.

Descriptio.

SALIX TENVIOR, FOLIO MINORE, UTRINQUE GLABRO, fragilis.

Descriptio.

Folia.

Nucamentum.

Lanugo.

Flosculi.




UTRINQUE parte glabra sunt huius folia, aliàs uncia non longiora, aliàs tres uncias longa per ambitum ut plurimum crenata, ex adverso ferè posita. Nucamenta producit hoc genus longa, racemosa, è plurimis vasculis ceu acinulis, qui in duas carinulas debiscetes, lanuginem ostentant, præcedunt tamen muscoli flosculi, quibus

SALICIS RACEMI SEV MICAMINTA, ROSÆ ET CAPITULA squamata.

Bombycinum
excrementum.

Infestum.



iam iam defluente incipientibus ad nucamentum fastigium adnascitur excrementum quoddam bombycinum, uncia longius, candidum, lanugine substantiâ fungosâ, tum etiam colore per omnia referens, teres, atque oblongum, quodd si quis aperit, in eius meditullio infestum quoddam genus minimum reperit albicans, pediculus capitulis æquans, in eo tamen differens, quodd teres sit, atque oblongiusculum, depes, nullamque progrediendi vim in se habens.

SALIX PUMILA ANGVSTIFOLIA, PRONA PARTE CINEREA.

Huic generi, notante Clus. graciliores sunt virgæ, ut plurimum pedales, nonnunquam











Dysenteria stercor iniectionem, sanguinis excretionem cohibere: auribus infusum, tergere saniem: glutinare ulcera magna, atque potentiùs si bibatur cum vino styptico nigro: & quando ex folio eius recenti fit emplastrum, confert fluxui sanguinis undecunque exeat.

Dolor cap. Cinis Salicis, eradicat verrucas illius cum aceto, autore Avic. Eiusdem, summitates cum aqua propria sedant dolorem capitis: [Sodam] eiusque succo nihil præstans in sanie aurium. Percussis oculis luli ex aqua decocti bene faciunt. Eiusdem aqua confert obstructioni hepatis atque ictero.

Oculorum percussio. Obstructio hepatis. Icterus. Serenus Salicis usum non reticuit, præsertim ad fufures faciei hoc carmine.

Furfuræ faciei. Aeris refrigerium. *Frons Salicis cum flore suo contrita medetur.* Eadem folia cum ramis in cubiculis strata, ærem refrigerant, & infirmantium ardores mitigant. In quem usum huius infeliciter etiamnum in Italia & Gallia quibusdam locis adhiberi observavimus. Cortex radicis Salicis barbam conservat, & nigram facit cum oleo dissolutus. Scissura capillorum curantur cum mucilage Psylli, Altheæ, & foliorum Salicis, tradente Rayro. Salicis folia cum aliis refrigerantibus aqua incocta ad lotiones pedum febricitantibus conducunt. Ex eiusdem ligno & bacillis rasorii parantur ad abradendam & emundandam linguam Cauli & febribus ardentibus laborantium, notante Camer. Vulgus Barbitonorum indifferenter Breune vocat, & in ea lingue abrasione præcipuam curam ineptè collocat, magno profectò ægrotantiù periculo, si interioribus non prospiciant. Breune namque Germ. dicta seu nigredo & scabrities lingue, Symptoma tantum est febrium ardentium, maximè Cauli & febris Hungaricæ.

Barba conservatio capillorum. Scissura capilli. Febres. Salicis luli ac fructus, pabulo necdum admixti, ipsa pinguescunt, autore Democrito. Potrò tam Theoph. quàm Plin. frigidissima dicunt quæcunque aquatica, lentissimaque [potissimum Salicem, & idem scutis faciendis aptissimam] quorum plaga contrahit se protinus, clauditque suum vulnus, & ob id contumaciùs transmittit ferrum: & quod levissimum sit Sal. lignum, utilitatem eandem ingeminat. Habet etiam candorem rigoremque, & in sculpturis facilitatem. Nihilominus tamen lentitia sua comodissimè inservit ad cistas, corbes, cunas & eiusmodi reliqua, quæ flexili crate constant: hæcque nullam aquaticam utilitatem dixit Plin. Caterùm usus tamen quotidianos, tamen villicos nihil attinet hic recensere, cum multi sint qui texendis & cortice etiamque virgis corbis & piscatorum nalis victum suum quarerent: quæ omnia abundè cantilena illa Germanica de concertatione Ruxi & Salicis consistit, uti notat Tragus, docere potest.

Pecorum (a) gna. Scuta. Castor animal amphibion, dum in aquis degit, Salicibus gaudet: in his enim, vel potiùs sub harum radicibus habitationem sibi ædificat in fluminum ripis.

Vitæ filia varia. Theoph. Paracels. notat nonnullos foliorum Salicum succum cum Mercurio in cineribus tenuisse, [ad exoptatam illam metamorphosin metallorum in aurum] sed nullo fructu. Restat & id explicandum, cur *ἀλμυρσπ* Homero dicatur Salix: An quia fructum proprium, perdit ante maturitatem, ut Theoph. Plin. Democritus, Porphyrius, referente Stobæo, & Const. statuunt? An verd quia Veneri resistit, ac sterilitatem inferunt folia, conceptumque impediunt, ut Diosc. tradit? Quod & Plin. ait, his verbis: Folia contrita & pota intempe-

Cantilena de concertatione Ruxi & Salicis. Castor animal amphibion, dum in aquis degit, Salicibus gaudet: in his enim, vel potiùs sub harum radicibus habitationem sibi ædificat in fluminum ripis.

Salicis succus nihil confert ad metallorum metamorphosin. Theoph. Paracels. notat nonnullos foliorum Salicum succum cum Mercurio in cineribus tenuisse, [ad exoptatam illam metamorphosin metallorum in aurum] sed nullo fructu.

Cur frugiperda dicta Salix plerumque explatur. Restat & id explicandum, cur *ἀλμυρσπ* Homero dicatur Salix: An quia fructum proprium, perdit ante maturitatem, ut Theoph. Plin. Democritus, Porphyrius, referente Stobæo, & Const. statuunt? An verd quia Veneri resistit, ac sterilitatem inferunt folia, conceptumque impediunt, ut Diosc. tradit? Quod & Plin. ait, his verbis: Folia contrita & pota intempe-

rantiam libidinis coercent: atque in totum aufert ipsam læpiùs sumpta. At alio loco idipsum semini tribuit, cum ait: Salicis semen mulieri sterilitatis medicamentum esse. Quare, fieri potest ut *ἀλμυρσπ* & frugiperda dicta sit Homero, non tantum quod ocysimè semen amittat, antequam omnino maturitatem sentiat, uti voluit Theophrast. (quod tamen non in omnibus verum, uti dictum) sed & quod viri semen ita infecundum reddat, ut à semina non concipiatur. Nam & *ἀνδροσπέρμα* semen humanum dici potest, haud secus ac mulierem gravidam *ἐμπερμα*, & Venerem fecundam *ἐμπερμα* dixere, notante Saraceno. Galienus quoque eumque sequenti Paul. & Aëtius hoc Salicis semen *ἀνδροσπέρμα* Theophrast. & Diosc. dictum, florem solum appellare videntur, quasi seminis nomen minime increatur, quanquam revera pleræque semina quoque ferant, quod boni illi viri cum plerisque priscis ralle videntur.

SAFSAF SYRORVM, SALICIS SPECIES, ET Elæagnus.



Salicis per- Descriptio
Scutis quæ-
dam species Ha-
lepti proveniens,
Salsaf incolis di-
cta autore Rau-
volffio, magni-
tudine variat.
Beculæ similis
tranco, ramis,
frondibusque.
Virgæ longæ,
graciles, molles
& expallido fla-
vescentes. Sur-
culis mollicellis
folia hærent Vi-
ticis. E' ramis
germina spicha-
mea hinc inde
prodeunt, haud
licus ferè, ac in-

ficu Cypriota: E' quibus primo vere flosculi mollicelli ac lanuginosi pendunt, pallidi, Populneorum æmuli, natura sicciore iucundi odoris. Hos legunt incolæ, ed quod nullum ferant fructum, & ex iis aquam Cardiacam pretiosissimam eliciunt.

Rauvolff. Elæagnon Theoph. non modò Salsaf Syrorum similem dicit, sed eam etiam censeri posse. At lib. 4. aperte Elæagnon Theophrast. facit. Et Clus. *ἐλαγιον* Theophrast. inquit, quando existimavi Salicem latifoliam: sed, Rauvolff. Salsaf ad Elæagni historiam magis accedere videtur. Elæagni autem descriptionem ex Theophrasto posuimus cap. de Agno sive Vitice.

Idem Rauvolff. ait esse *Arnaba* *Æginetæ*. Eiusdem iudicio Salsaf est *Zarneh* & *Zarnabum* Arabum, ut Rhazi cap. 353. & Avic. cap. 749. Serapioni verd cap. 26. communi nomine *Zurumbesh*: cui & nos subscribimus. In nostro Cod. Serap. de simpl. cap. 261. sic legitur: *Zurumbesh*: *Serap.*

Galenus in translatione Arabica, *Zarich* adhibet: est *Zurumbesh*, è numero specierum odoratarum: ideoque admiscetur confectionibus aromaticis: estque calidum & siccum propè tertium

Calidonium
Comm.

Descriptio
apud Sc.
149.

Temper.

1 iter.
Dolr. cap.
Stomach.
Hepar.

Zurumbet

Avic.

Flatus.

Impinguit.

Malum

commu-

das.

Cardiac.

Ventrem

calidat.

Menstr.

Vermes

venas.

Zarnab.

Rhas.

Arnabo

Paul.

Salix latifolia.

Vitis
Gale.

Zizipha
alba.

Sassa.

gradum, virtute sua similis Cassia lignea & Caribebis. Calidonium pro Cinnamomo substituit Zurumbet. Isaaco tradente, arbor est magna, nascens in montibus Lubnen, id est, in Oriente, nullum ferens fructum: foliis longis, colore inter viridem & citrinum, Salicis similibus, eisdemque coloris sunt rami: odore Citri: estque calida & sicca, styptica, resolvit & stringit ventrem [quid hoc est dicere? nisi forte ut Rhabarbarum, diversarum sit partium: solvat, hoc est, abstergat: & adstringat: nam ut mox sequitur] Moschah ei stypticam tribuit & simul cum ea etiam subtilitatem & caliditatem, & vim adstringendi ventrem. Mesarugea eius virtutem similem dicit Nucis moschatz, sed esse subtiliorem ea. Sternutatorium ex ea & oleo violaceo, conferre dolori capitis frigido & humido. Prodesse eandem stomacho & hepati propter vim suam aromaticam.

At apud Avic. Zurumbet est lignum simile Cypero, sed maius, & minus odoratum: calidum & siccum ordine tertio: resolvit flatum, impinguit, aufert odorem vini, aliorum & ceparum: Cor exhilarat & confortat: compescit vomitum: adstringit muliebria, & matricis ventositates carminat: resistit moribus vermium venenatorum, qua vi accedit ad Zedoariam.

In Rhasi nostro, non praedicto loco, sed c. 34 de re Medica, Zarnab calidum esse & siccum legitur, stomacho & hepati frigidis conferre, ventremque adstringere.

Quia Serapio primo loco dicit ex Galeno conveniunt, cum Arnabone Pauli Aeg. l. 7. c. 1. ubi ait: Arnabo ex aromaticis est, unde maxime in unguenta miscetur, ut qui calidus ac siccus sit facultatis in tertio ordine, Cassia ac Carpesium similis. Unde etiam Posidonius Cinnamomo non praesente, hoc usum se esse dicit.

Elagnus aquivoca.

PRATER Sassa & alia plantae putantur esse Elagnos: ut Salix latifolia, de qua sententia cap. de Salice. Marcellus scribit: Viticem notam omnibus & ubique plantam esse Elagnon Theoph. Verum qui verba Theoph. diligenter consideraverit, competet multa non convenire cum Agno seu Vitice. Lob. & Penz vitex est Elagnus Theoph. Quidam Gale fruticem Septentrionalium Elagnon faciunt, de quo post. Nos vero capite de Zizipha alba docuimus eam non esse Elagnon, ut quidam putant.

Ceterum notent incauti, Sassa non eandem esse arborem cum Sassa.

DE ZARNABO SPECIALIVS.

ET ARNABO.

QUANDOQVIDEM variae plantae exhibentur pro Zarnabo, lubet earum hoc loco mentionem facere.

Gesn. in Epist. ad Guil. Matthiolus, inquit, in Serapione duo capita de diversis Zurumbet confundit: posterius sane videtur Carpesium & Zarnabo ab Avic. dicitur. Ac sic e contra.

Matth. in epist. ad Fallop. Si Pauli Arnabonem & Avic. Zarnabum recte expendamus, nil aliud verius representabunt quam postremum Serapionis Zurumbetum. Quamobrem manifeste hallucinatur Gesnerus, dum falsè in Zurumbet me accusat: quippe qui existimat posterius Serapionis Zurumbetum esse Carpesium, &c.

Idem etiam Matthiolus comm. in Diosc. de Arnabone sic tradit. Non desunt, inquit, qui crediderunt, [inter alios Cordus] quod Arnabo, de quo scribit Paulus, & Mauritanorum Zedoaria, vnu & idem referant medicamentum: Verum Serapionis testimonio cap. 271. Arnabo apud Graecos nihil aliud designat quam Zurumbet apud Arabes: quippe quod hoc loco de zurumbet eadem scribat Serapio, quae de Arnabone ante ipsum adnotavit Paulus. Hallucinatur autem Brunfelsius in suo Onomastico scribens Arnabonem esse unguentum odoratum: verum eius lapsus causam fuisse arbitror, quod oscitanter Paulum legerit: nam Paulus apertissime asserit, Arnabonem unguentis expeti: quod suaviter oleat, non autem unguentum esse, ut Brunfelsius somniasse videtur.

Guiland. in Theone: Zurumbet &c. Gesnerus Carpesium male. Avicennae Zarnabum dicitur. Actuarius Carnabum seu Carnabadium, vel Zarnabum, & Zarnabadium: ut obiter Rhizomastigas istos rideam, Carnabadium apud Cassianum Bassum, & Myrsinum, Cuminum Aethiopicum esse nescientes. Rhasi Zarnab.

Gronemb. l. 1. comp. med. super El. de Gem. Venus, inquit, Actuarius, [ex Graecis] quod equidem memini, Doronicum, id est, Carnabadium & Zarnabi habet. Gesn. in catal. plant. Zarnabum, siue Parnabadium: vide Doronicum, & apud Rhaz. Quidam existimant Doronicum Romanum apothecariorum: mihi non placet. De Doronico vero suo proprio loco, & capite. Rauwolf. parte 4. Itiner. ad figuram No. 112. Peregrina Salicis species, incolis Sassa: Arab. Zarnab, Zarnabum, Zurumbet. Theoph. Oleagnus: Aeginetæ Arnabo. Cetera inquirant posterius. Nunc aditum patefecisse satis esto: Pauli verba de Arnabone ante posita sunt. Scribit Iul. Scalig. in Exerc. Arnabonem Pauli, Zedoariam nonnullos, alios Zurumbet Arabum esse arbitrari, parvi vero utriusque referre. Neutrum tamen esse patere ex Avic. qui tria facit capita separata. De Zedoaria pluribus Arnabo putata egimus lib. 19. Pandectarius Arnabonem esse arbor magnam fruticans, quae est Vlmus, ut Hortus satis testatur, ubi pro iconis signum nullo modo referens Vlmum, habet.

CALAF, SEU BAN ALPINI.

CAP. XXI.



ARBUSCULA fruticosa est Alpino Calaf seu Ban, quae quidem, inquit, mea sententia Salicis genus existit, foliis aliquatenus Salicis similis, sed multo maioribus, quippe longioribus ac latioribus. Flores eius sunt quidam globuli oblongi, albi, lanuginosi, caudici penes foliorum radices adnascens quot-

Cordus
av.

Brunfelsius
repreh.

Gesn. lapsus

Cuminum
Autrop.

Doronicum

Sassa.

Oleagnus.

Descriptio

Salix
gemma.
Folia.

Florus

quotque in arbore folia existunt, tot flores emittit. Crescit ad Viticis magnitudinem ramis multis, sive stolonibus, rectis. In Aegypto reperitur locisque humidis nascitur. Hæc ille.

Chalef. Scribit Bellun. in interpret. Arabicorum nomen, *Chalef* esse speciem Salicis in humidis nascentem: folia ei esse Cerasis similia, sed fructus non ferre. Flores ineunte vere valde esse odoriferos, ante folia prodire, ex quibus eliciatur aqua suaviter olens, cuius frequens sit usus in affectibus cardiacis calidis. Atque ex insidem infusis, admixtis amygdalis, fieri Oleum *Chalef*, sicut Violaceum.

**Aqua car-
diaca**
Oleum
Chalef.
**Aqua Ma-
cabalef**
rescitur
**Contra pu-
tredinem.**
**Febres po-
stul.**
Cap. dolor.
Alpinus quoque tradit ex floribus destillari aquam *Macabalef* vocatam, cuius insignes vires deprædicat ad arcendam putredinem & ad siccandum, ad Venena, & ad cor rececandum. Eamque in febrib. pestilentibus secreti loco haberi ad capitis dolores, ac ad virium recreationem, quin & ipsam putredini ac venenis obistere: Et sequæ eorum florum decoctum, ac ex aqua dilutum in quibusvis febribus maximo apud ipsos in usu.

GARB MAVRORVM, SALI- CIS GENVS.

Descriptio.



Cortex.
Folia.

Arbor Garb Mauris dicta, autore Rauwolfio, patula est, haud tamen multum assurgens: Cuius surculi extremi teneriores fragiliorisque quam ut Salicum nostratum instar Vimineo operi interservire queat. Cortex ex pallido flavescit, sicut & folia, quæ oblonga Palmi circiter, duos digitos lata, per ambitum velut

Attriplicis folia sinuata, modicè siccante & adstringente facultate. Fructum & florem se vidisse negat. Salicis genus idem facit, & incolis iuxta antiquum nomen Garb dici tradit: Persiani Fer. Aethiopi- bus verò quoque hiderno seculo sub antiquo Arabico vocabulo Garb dici de quo Plin. 137. Ein frömbd Weiden geschlecht Germ. eidem. Interpretes verò convertunt *Salicem*.

Garab
Avic.
Apud Avic. scribitur *Garab*, id est, *Salix*. Annotat autem in marg. Bellū. Garab esse arborem magnam nascentem iuxta Euphratem fluvium. In explicatione tamen vocum Arabicarum nihil habet de ea voce.

**Aphroni-
trum ad**
ignis
pulverem.
At Rauwolf. scribit, ex ea Aphronitrum, Salem Petre vocant, optimum fieri igniario pulveri parando quo in bellicis tormentis, pilis excutiendis utuntur. Surculos scilicet extremos cum foliis in cinerem comburi, affusæque aqua macerari, separari & multa ebullitione coagulari. Sed pulverem illum nostrati haud æquivalere. Simile quiddam Plin. l. 31. cap. 10. de Quercubus [has fortè arbores intelligens, quippe Quercubus

Tom. I.

quodammodo similes, eodem coniectante] tradit, ex quibus nitrum parari solitum: cum tempore autem exolevisse scribit. Caterum Avic. suo *Garab* easdem penè vires tribuit quas *Salici*. Corticem eius quoque in usum venire scribit & gumi quod incisione effluit. Florem & folia, ac utriusque succum exiccare sine mordicatione, habere tamen adstrictionem quandam. Eiusdem, que naturæ esse corticem, sed siccioris. Cinerem ligni cum aceto verrucas & clavos omnis generis tollere. Cortice radice tingi capillos. Eundem cum foliis contusum commodè imponi vulneribus recentibus, ac ulceribus, totumque mingare podagram. Succum foliorum cum oleo tot. in cortice Granati ebullitum & auri instillatum conferre dolori eius: corticis decocto abstergi sursum. Gummi & florem obscuritatem visus tollere. Aquæ etiam succum eiusdem extrahere sanguisugæ: Quæ omnia & *Salici* competere ex ante dictis patet.

Vires Vicia
Gummi
Temper.

Verrucas

Capill. im-
Bura.
Vulnera
Flora
Podagra.

SPODIUM ARABVM, ET TABAXIR.

CAP. XXII

Tabaxir, videtur aliquid commune habere cum Salicibus: unde fit ut hoc loco collocandum censeamus, prius tamen dictum de Spodio Arabum.

Rhazis lib. 3. cap. 36. Spodium [Tabaxir Garc.] frigidum est & siccum. Febribus acutis, siti, ac nimio ventris fluxu & vomitui confert: pustulis quoque quæ in ore & lingua nascuntur, atque tremori cordis auxiliatur.

Avic. lib. 2. tr. c. 617. Spodium [Tabaxir Bellun.] Radices Alcanaz [vide paulo post] adustæ. Dicuntur aduri siccatione extremitatum, cum eas perflat ventus. Frigidum est in 2. & siccum in 3. gradu. Adstringit, parum resolvit, sed plurimum refrigerat. Resolvit autem ob amarorem exiguum, quem habet. Quæ resolutio cum adstrictione efficiunt, ut valde siccet: estque mixta virtutis, sicut Rosa. Confert Alcolæ & Melancholiz provenienti ex sollicitudine: Item apostematibus oculorum calidis: roborat cor, & bene facit ei in tremore à causa calida, & syncopi factæ ab effusione bilis in stomachum, tam haustum quam illitum: timori præteritorum & terrori futurorum obviat: compefcit sitim & inflammationem stomachi, debilemque erigit: prohibet effusionem bilis in eum, turbatum sedat. Effusiones cholicas refrænat, febresque acutæ. Est autem Alcanna, [ut explicat Bellun. interp. Arab, nomen apud Avic.] seu Alcona arbor gracilis, longa, habens internodia sicut Canna: sed differt ab ea, quod Alcanna non sit cava: eaque utuntur Arabes loco lancearum. Repertiuntur & arbores crassæ, ex quibus conficiuntur vasa magna utilia. Fit igitur Spodium maximè ex radicibus arborum prædictarum gracilium combustis.

Serap. c. 332. Sataiscir [Tabaxir Garc. leg. putat.] vel Rescius, id est, Spodium. Confert caliditati cholerae. In Spodio est resolutio & prohibitio, & percussio, & in frigidatio: sed in frigidatio eius præstat: estque in sapore eius amaritudo & stypticitas, ideoque defecit. Non tamen tantum adstringit sicut Rosa. Diosc. Spodium confert apostematibus calidis oculorum. Secundum Meschab, frigidum est in 3. & siccum in 2. gradu &c. Vbi autem Gal. de Spodio

Spodium

Spodium
Vicia
Febres

Alcolæ
Melancholiz
apostematibus
oculorum
calidis
roborat cor
syncopi
factæ
ab effusione
bilis in stomachum
timori præteritorum
terrori futurorum
obviat
compefcit sitim
inflammationem
stomachi
debilemque erigit
prohibet effusionem
bilis in eum
turbatum sedat
Effusiones cholicas
refrænat
febresque acutæ
Est autem Alcanna
seu Alcona arbor gracilis
longa
habens internodia sicut Canna
sed differt ab ea
quod Alcanna non sit cava
eaque utuntur Arabes loco lancearum
Repertiuntur & arbores crassæ
ex quibus conficiuntur vasa magna utilia
Fit igitur Spodium maximè ex radicibus arborum prædictarum gracilium combustis

Melancholiz
apostematibus
oculorum
calidis
roborat cor
syncopi
factæ
ab effusione
bilis in stomachum
timori præteritorum
terrori futurorum
obviat
compefcit sitim
inflammationem
stomachi
debilemque erigit
prohibet effusionem
bilis in eum
turbatum sedat
Effusiones cholicas
refrænat
febresque acutæ
Est autem Alcanna
seu Alcona arbor gracilis
longa
habens internodia sicut Canna
sed differt ab ea
quod Alcanna non sit cava
eaque utuntur Arabes loco lancearum
Repertiuntur & arbores crassæ
ex quibus conficiuntur vasa magna utilia
Fit igitur Spodium maximè ex radicibus arborum prædictarum gracilium combustis

Spodium
arborum
prædictarum
gracilium
combustis

Sataiscir
Tabaxir
Garc. leg. putat.
Rescius
id est, Spodium
Confert caliditati
cholerae
In Spodio est resolutio & prohibitio
& percussio
& in frigidatio
sed in frigidatio eius præstat
estque in sapore eius amaritudo & stypticitas
ideoque defecit
Non tamen tantum adstringit sicut Rosa
Diosc. Spodium confert apostematibus calidis oculorum
Secundum Meschab, frigidum est in 3. & siccum in 2. gradu &c.
Vbi autem Gal. de Spodio

Spodium
arborum
prædictarum
gracilium
combustis

T 3

*Serap. er-
ror.*

*Spodium
Græcorum
non est i-
dem cum
Spodio Ara-
bum.*

*Spodium
Aethiopi.*

scripserit ea quæ citantur a Serap. nos latet. Præ-
terea Spodium Dioscor. confundit cum Spodio
Arabum: nec facile ex Arabum scriptis affirmari
posse videtur quid sit *Tabaxir*: nam ex prædictis
patet, quàm varè de eo scribant.

Notandum verò Spodium Græcorum non es-
se idem cum Spodio Arabum. Græcorum enim
petradunt Monachi, per os non sumitur. Solus
Aethiopi & quidam Græcorum fere novissimus
in medicinis ex Arabum scriptis desumptis Spo-
dium præscribit. At Spodium Arabum ut plu-
rimùm exhibetur per os in Confect. & Elect. cor-
dialibus.

Avert. tradit Spodium esse carbonem nodo-
rum arundinum Indiarum adflatum, &c. Atq; et-

iam hodie multi Spodium de *Canna* vocant.


Alcanna seu *Alcanna* Bellunenſis est arbor ex qua
Spodium, diversa ab Avic. & Serap. Alcanna quæ
Cyprus, autoribus iisdem Monachis, qui come-
dantur Avic. sumpsit ex Serap. quæ de Spodio
scripsit. In compositionibus autem Arabum, &
præcipue in iis, quæ per os sumuntur, per Spo-
dium non est intelligendum Spodium Græcorum,
ut nonnulli ex iunioribus declararunt.

Manardus existimat Spodium factum ex radi-
cibus Cannarum adustis esse unum ex Antispo-
diis Dioscorid. Vnde nec immeritò inferunt præ-
dicti Monachi. Ergo si est Antispodium, quare
præcipit, ut non admittatur in composi-
tionibus

*Cyprii
iuniorum
error.*

*Spodium
Cannarum.
Manard.
non.*

TABAXIR SIVE MAMBU ARBOR. TABAXIR FOLIO OLEÆ.



ARBOR in qua gignitur Ta-
baxir, autore Garcia, inter-
dum magna est & instar Populi
proceræ interdum minor, ramos
ut plurimum erectos (nisi quod
pulcherrimos quosque interdum
incurvant ad pergulas & decambu-
lata, apud Indos frequentia, con-
ficienda) frequentibus nodis di-
stinctos, palmi tamen longitudine
ab invicem distitos habens. Fo-
lium Oleæ longius. Inter singula
internodia liquor quidam dulcis
generatur, crassus, veluti Amy-
lum congestum & simili candore,
interdum multus, nonnunquam
verò perpaucus. Sed non omnes
arundines sive rami cum humo-
rem continent: at iisdem taxat quos
Bisnager, *Barecala*, & pars provin-
ciæ *Malabar* profert. Hic autem li-
quor concretus interdum nigri-

Descriptio

Folia.

*Liquor
candidus.*

*Liquor ni-
ger & ci-*

*Avicenna
non.*

*Tabaxir
non est
Spodium
Græcorum.*

*Spodium
Avicennæ.*

*Gerard. en-
satur.
Avicenna
non.*

Arbor.

*Inde em-
gendo.
Quorundam
error.*

*Tabaxir
non est
Spodium.*

*Tabaxir
quid.*

*Sacer
Mambu.*

Præpar.

Marap.

cans & cinereus invenitur, sed non idè impro-
batur, quoniam aut ob nimiam humiditatem, aut
quod diutius ligno inclusus permanſerit, hunc
sibi colorem conciliat: non autem ob arborum
incendium hanc nigredinem acquirit, veluti non-
nulli putarunt. Nam etiam in multis ramis, quos
non contigit ignis, niger invenitur. Gerardus
Cremonensis in Rhafin ad Alm. lib. 3. cap. 36. Ta-
baxir Arabum interpretatus est Spodium. Eius
errorem omnes Arabum interpretes Latini se-
quuti sunt, Tabaxir Spodium vertentes, ut idem
notat Garcia.

Ceterum eodem teste *Tabaxir* vocabulum est
Persicum, ab Avic. lib. 2. c. 617. & aliis Arabibus è
lingua Persica desumptum, nihilque aliud sonat,
quàm lacteus humor, aut succus liquorque ali-
cubi concretus: quo nomine etiam Arabibus &
Turcis hoc medicamentum cognitum est. Voca-
tur ab indigenis *Sacer Mambu*, quasi dicas *Sacha-
rum de Mambu*, quoniam Indi arundines sive ra-
mos arboris illud proferentes *Mambu* vocant.
Attamen nunc etiam *Tabaxir* vocare cœperunt,
quoniam eo nomine petitur ab Arabibus, Persis
& Turcis, qui id mercimonij causa ex India in
suas regiones exportant.

Magnò emittit hoc medicamentum pro pro-
ventus eius ratione. Eius tamen commune præ-
tium in Arabia est, ut pari argenti pondere ema-
tur. Meminit eius Rhafes: sed omiſsa genera-
tione, solas vires recenset. Serapionis exem-
plar temporis vitio corruptum esse verisimile est,

cum *Serapion* pro *Tabaxir* legat.

Ex dictis patet Avic. opinionem falsam esse exi-
stimentis ex arundinum radicibus crematis fieri.
Acosta verò Avicennam excusat, culpæque inter-
pretibus imputat. Incognitum est Græcis Tabaxir,
quibus aliud est *amidi*, nempe Tutia Ara-
bum. Rectè autem corrigat Garcia Gerardum
Cremonensem, siquidem Clus. sit audiendus, qui
Tabaxir putavit esse *amidi* Græcorum. Sed ta-
men in eodem errore versabatur doctiss. Bellu-
nenſis, qui ad Tabaxir notam apposuit Spo-
dium. Itaque videndum num ille sit Bellunen-
sis error, non Gerardi. Nam Gerardus reliquit
nomen Persicum. Sed si ve Bellunenſis culpa
illa est, si ve Gerardi, quid alteruter, aut ambo
peccarent, si Spodium esse putarunt, quum Avi-
cenna ipse dicat esse cinerem cannarum, vi vendi
inter se conficatarum, & ignem ex eo conci-
piendum, & proinde ex illo igne exustarum
Nam Thucydides & Lucretius scribunt, ventis
flantibus ramos arborum ex collisū mutuo ignem
concupere, & ex eo sanè magnas sylvas confla-
grare. Certè quod Avicenna habebat in animo
& scripto expressit, id nihil aliud est quàm *amidi*
aut *amoni* id. Idè iniquè Garcia Davum Comi-
cum vocavit Gerardum, quem ait omnia turbare,
quum potius in autorem erroris culpæ Avicen-
nam derivanda esset, quàm in Gerardum opti-
mum interpretem. Arbores sive Arundines
Mambu, in quibus nascitur Tabaxir Acoſta, Ex-
tat huius arboris figura apud Bey fratres Icon.

Bambus part. 4. Indiarum Orient. sub his nominibus. *Bambus*
arundinis *species.* Item *Bambus cum pipere circum-*
volvunt. Prior icon ex figuris æneis delumpta est,
Arundo ad quam Bapt. à Doert hæc annotat. *Arundo*
Indica, Indiens Rist. Arundines fert regio Cha-
Bambus. randel fœtioris crassitudine, quas Lusitani *Bam-*
ba vocant. Est interior Arundinum materia al-
ba: *Tabaxir* vocant. Formantur autem Arun-
dines & incurvantur ad usum Pallanquinorum,
nam ex iis conficiuntur veluti stipites. Naves
quoque Indi conficiunt, quibus in flumine Cra-
ganor utuntur, Posterior figura est *Acostæ*, non
parum à priore differens, qui & Iulos oblongos
adpingit. Cùm nesciamus utra sit melior, utram-
que proponimus.

Vires & Ex Medicorum tùm Indorum, tùm Arabum,
usus. *Perfarum & Turcorum* testimonio, referente Gar-
Ardores. *cia, Tabaxir* internis & externis convenit ardori-
Febres bi- bus, eoque etiam in biliosis febribus & dysen-
lusa. teris, præsertim autem in biliosis fluxionibus
Dysenteria. utuntur. Nostri verò trochiscos ex eo conficiunt
Trochisci. addito semine oxalidis. Et truncis Cymbas faciunt
Gymba. Indi, quæ binos viros capere possint: non qui-
dem illos excavantes, sed relictis solum duobus
utrinque inter nodos per medium secantes. Con-
scendere verò solent similes Cymbas bini Indi,
iij; nodi (nam nudos incedere illis in regioni-
bus moris est) sederèque singuli in eius extre-
mitatibus, iunctis cruribus, tenentesque singulis
manibus remos trium aut quatuor palmerum
longitudinis, quibus eas Cymbas impellunt tan-
ta dextertate, ut etiam adverso rapidoque flumi-
ne summâ celeritate navigare possint, quemad-
modum suis oculis conspexisse testatur *Acosta*
in flumine Cranganor, in quo plurimus est usus
Cymbarum ex hac arundine confectarum: quo-
niam qui eis vehuntur, securiores sese existimant
à Crocodilis, quos illi *Caymanes* vocant, magno
numero in hoc flumine versari solitis. Nam cùm
ferocissimi sint, sæpenumero in naves manusculas
& minusculas impetum facere solent, ut eos, qui
illis vehuntur, apprehendant: & homines & qua-
vis animalia quæ comprehendere possunt, illic
devorant. Indigenæ autem asserunt, nunquam
compertum esse, ut eos qui Cymbis ex *Mambu*
confectis vehuntur, appetant, sed sæpenumero
conspectos esse natantes prope illas, & tantum
præterire sine noxa.

Summa *Tabaxir* materia alba teste Bapt. à Doert, ad
eius aspi- usum medicinæ aptissima ab Arabibus & Persis
motio. summo studio quæsitâ, auro & argento pondera-
Vulnera tur. Indi ad vulnera testiculorum & virgæ utun-
puccin- tur. Valet etiam contra cholericas passionem &
rum. Dysenteriam.

DE ANTISPODIIS.

Goan. DE Goan arbore Persiæ ex qua Tutiam para-
tri scribit Garcias, quamque pro antispodio
tradit, egimus lib. 3. inter nucleatos fructus.

Tucia. Si autem eam arborem Avic. intelligit lib. 2 Tr.
2. cap. 705. per Tuciam: & Serap. cap. 412. per
Tutiam: turpiter ambo eam confundunt eam
Pompholige & Spodio Græcorum, ut Diosc. quæ
mineralia sunt. Scribit autem Avic. Originem
Tuciarum esse fumum qui elevatur, ubi purificatur
res &c: Inda quidem est, quod abluendo Tuciam
remanet in fundo, & illud est Deschudiun. Dif-
ferentia autem inter Succudum & Tuciam est
quod Tucia sublimatur, illud verò minime, sed re-
manet inferius in canalibus, per quos currit æs.
Serap. dicit Tuciam quandam inveniri in mineris,

Tucia India
Arbo.
Deschudiun.
Succudum.
Tucia India
per Serap.

aliam fieri in fornacibus &c: Et mineras Tutiarum In-
diæ esse in litonibus maris, prope regionem In-
diæ, & meliorem omnium esse albam, quæ supra
veluti salem habeat: secundum locum obtinere
citram: viridem esse asperam & perforatam,
hancque ex maritimis Syriæ differri. Apud
Diosc. duæ sunt species &c: inquit Serapio. At
Garcias conceptis verbis testatur, nullam per
Universam Indiam, sibi saltem cognitam: Tutiam
inveniri præter eam quæ conficitur è cineribus
modò dictæ arboris.

Differentia
ex des-
crip-

Nulla Tu-
tiam in In-
dia esse quæ
è cineribus
dictæ arboris
est.

Gulielm. Qualecbonus Curtacen. Physicus
Hæc Constantinopoli scribit Matthiolo: Bello-
nium in suis Com. Cassaboussere vulgò illic
Pharmacopolarum Calamum aromaticum esse
opinari sed suo quidem iudicio absurdissimè.
Magisq; placere Avic. potius Spodium esse, quod
arundines vi ventorum & partium ad se invicem
confricatione adustas esse, videatur indicare: ac
tale quidpiam huic arundini accidisse, quemvis
non ineptè dicere posse. Qualecbono verò
sic respondet Matth. Errare toto cœlo Bellonium
nunc procul dubio animadverto, quod tam faci-
lè crediderit lapideos calamos illos Aromaticum
esse calamum. Nec ob id tecum sentire possum,
ut ii Spodium sint Avic. quia nova lectio Bellu-
nensis, quæ hætenus probatur ab omnibus, lo-
co Cannarum habet Alcanna, quæ nobis Ligu-
strum designat. Præterea si diligentius hos can-
narum trunculos expendamus, quis non potius
illos lapideos effectos iudicabit, quàm fricatione
vel igne aliquo combustos? Mihi facillè persuadeo
hoc calami genus in littore alicuius lacus scaten-
tis petrisco succo provenire, atque subinde vel
ventorum impulsu, vel alio quo vis calu in lacum
demersum, in lapidem verti. Hæc Matth.

Cassabouf-
serre.
Calamus.
Spodium.

Belloni-um
repreh.
Calami la-
pides.

Alcanna est
Ligustrum
Matth.

Nos tanè Bellonii sententiæ adherentes exi-
stimemus *Cassaboussere* Belloni. esse Calamum
Arom. verum, si Matth. non diceret esse lapideos
Calamos. Qui videntur Constantinopoli *Cassa-*
boussere, doceant nos & posteros, quis melius
de eo scripserit. Non possumus nobis persuade-
re Bellonium sagacissimum & doctissimum natu-
ræ scrutatorem existimasse lapideos calamos esse
calamum aromaticum.

Belloni-um
ex-
confatur.

Ex radicibus Hennæ, inquit Rauvolff. quæ
Cyprus, Arabes urunt suum Spodium, ut me-
minit Avic. At hic & radicem Cannarum cinerem
Spodium esse dicit. Salvo verò meliori iudicio;
quia Spodium Cannarum Indiarum non habetur, mi-
nus malum Monachi putant, si pro eo utamur ra-
dicibus Cannarum nostrarum artificiosè adustis.
Id autem improbat *Acosta*. At Fuchsi. Spo-
dium Arabum quod Cannarum seu Arundinum
radicum exustarum cinerem, & Spodium de
câna vocari, cum, eo quod Græci *αἰνῶν* nunc-
cupant, non nihil convenire tradit. Idem etiam
neque Spodium neq; Antispodium Græcorum
intra corpus assumendum fuisse. Sed neque Ara-
bum Spodium Cannarum per os ingerendum putat,
utrunque Avic. & alii Arabes eius usum commen-
dent. Nam & Galenum testari radicem arundinum
per se non levem abstergendi facultatem obtine-
re: Viam verò & calidiorem & magis tenuium
partium adeoque acrem effici. Hinc fieri ut lib.
1. de com. loc. c. 1. inter medicamenta quæ Alo-
pecias sanare possunt, recensent. Ob acrem igitur
qualitatem suam radicem arundinis usam in-
tra corpus tueri exhiberi non posse putat Fuchsi.
Qui tamen sui oblitus in troch. de Eupatorio scri-
bit pro Spodio, Arabum Spodium accipiendum.
Idem etiam in Michetæ Nicolai ait, Spodium Ara-

Spodii Can-
narum suc-
cedat.
4.
Fuchsi
requi-
rit in troch.
is Spodii
Cannarum.

Fuchsi. *sibi*
ipsi contra-
rius.

bum Cannarum, in illis quæ per os ingeruntur, non usurpandum, atque in vnguento Santalino Meluz dicit accipiendum Spodium Arabum, siquidem Græcorum calidum admodum sit: cum tamen ipsemet dampnaverit Spodium Arabum ob acrimoniam.

Ebur.

Canis ossa.

Marmor.

Ebur usum.

Ossa bovis.

Spodium.

Antispodium.

Offic. idem.

Placotomus.

mar.

Officinar.

abusus.

Spodium.

Offic.

Spodium.

receptorum.

Græcorum.

Fuch. fugit.

Ebur usum.

reprobatum.

Antispodium.

Græcorum.

Spodium non.

esse Offici-

nar. nihil.

griseum.

Cordum sa-

uat.

Antorum.

inducimus.

de subst.

Spodio.

Cornu Cer-

uinum.

Apollo non probat Brassavoli opinionem sibi persuadentis Antispodium parandum ex nostris arundinibus. Luminare maius Spodij loco sumit os Elephantis combustum, quod adulteratur radice Cannæ, ossibus canis, Marmore combusto. Placotomus pro Spodio sumit ebur usum. Collegium Colon. officinarum Spodium reicit, ut ex boum similibusque ossibus factum. Apollo reicit prædicta ossa, & Ebur assumendum suadet, si habeatur. Sylvius scribit se nescire cur Barbari Spodium vocent. Cornarij opinio est, quod hodie Spodium Offic. vocant, & in usu habent, etiam Antispodium esse, vulgòque credi, Ebur usum esse. Nescimus, inquit Monachi, quâ autoritate Platearius dixerit Spodium optimum fieri ex ossibus Elephantis combustis, addens eius ossa, solida, qualia dentium: quod falsum cum dentes careant medulla. Hodie Aromatarij eum sequuntur, ubique utentes pro Spodio, tam Græcorum quam Arabum, ossibus combustis. Deus scit, an sint Elephantis: & si sint Elephantis quæ pro Spodio venduntur, an possint vel debeant admitti in cordialibus: non approbamus nec reprobamus. Id tamen aliquo modo sciendum censet Fuch. quum Ebur usum adstringendi polleat facultate, si non ex bovis & canum maxime ossibus suum conficerent Spodium. Idem in Micteta Nic. Myrepsi scribit id non esse intelligendum de Spodio Græcorum veterum neque Arabum, quod illi Spodium Cannarum vocant & locutum: sed accipiendum per Spodium in ea corruptum quod Offic. hodie ita de sententia Platearij appellant, quod non aliud sit nisi Ebur usum, & adstringendi facultate pollere. Non solum verò Nicolaum, sed & Actuarius aliosque recentiores Græcos per Spodium intelligere id quod hodie usitatum est. Hæc illi.

Ac posset quidem etiam hic aliquo modo ferri sententia Fuchij, si certum esset Spodium Offic. esse Ebur usum. Nunc quando doctissimorum iudicio ex quibuscumque aliis ossibus combustis sit, quæ ille reicit, quomodo eius opinio stabiat. Quanquam nondum planè cognitum habeamus quid nobiliorum virium nobis præstare queat Ebur usum, quàm os equi aut bovis usum, aut cornu Cervi usum.

Audiamus Garciam. Spodij penuriâ Antispodium fieri censent ex ossibus Elephantis: sed quàm id falsum sit, ego, inquit ille, iudicare possum, quippe qui Elephantorum ossa nullius esse usus, sed ea ab incolis abiici, sciam.

Acosta quoque reprobatur Spodium factum ex Ebone usito: præterea annotat non fieri ex ossibus Elephantum ustis. Quod bene, inquit Cornar. Spodium Officinæ vocant & in usu habent, etiam ipsum Antispodium est, vulgòque Ebur usum esse creditur, qui verò Græcorum Spodio uti volent, Officinarum Spodium non assument, sed rectè nihil griseum Officinis appellatum usurpabunt. Quapropter non placet Cordum passim tam securè scribere, Spodij, id est, Eboris usi: melius sanè, si aliqua vis Cardiaca in Ebone: existimamus potius pro Spodio Arabum substituendam rasuram Eboris supra cotem tenuissimè tritam, aspergendo aquam rosaceam: vel cornu Cervini, quod indubie præferimus. Fuchius sta-

tuens Spodium recentiorum Græcorum esse Ebur verum, nihil certi demonstrat: non improbamus tamen in Micteta Ebur usum ac lotum poni: præterimus tamen Cornu Cervi usum & rosacea lotum, vel etiam non usum. Quapropter & Apollo nobis probatur, qui Spodio substituit Cornu Cervinum. Diosc. Spodio suo Metallico substituit folia Myrti, ut quæ æqualem vim habeant, cum floribus & baccis immaturis. Eiusdem etiam succedanea Spodij sunt, Olex sylv. virgulta, modo iam dicto præparata. Item lativæ cum floribus: Mala Cydonia [rudera] concisa & officulis exemptis [Hæc autem miramur tribui ossa cotoneis] Gallz: Panniculi linei: Mora immatura alba in Sole prius siccata: Lentiscus: Terebinthus: Oenanthe: Rubi folia tenera: Pseudocyperus cum flore. Quidam etiam, eodem autore, Fici frondes in Sole prius siccatas similiter [ut Myrti folia] præparant pro succedaneo. Alij Glutinum taurinum: Alii lanas succidas asperas, pice aut melle imbutas similiter præparant loco Spodij. Nuclei Palmarum usi Spodij vice in medicamenta palpebris ornandis parata commodi sunt. Acosta Spodium ex Corallo factum reicit. Pompholix, autore Diosc. specie differt à Spodio, genere non evariat, Spodos enim subnigra est, Pompholix autem alba. Fiunt ex ætis coctura, ac etiam ex Cadmia, testibus Cornario & passim doctis viris. Vera Pompholix est Nil album: sicut griseum aut nigrum dictum, verum Spodium metallicum à Dioscor. Plin. & Gal. descriptum: & ab Arabibus ut Serap. & Avicenn. sub Tutia aut Tutia tradita, nullo modo confundenda aut substituenda pro Tabaxir Arabum, quod malè interpretes conyertunt Spodium.

Prænotati authores non præscribunt Spodium in internis affectibus, sed tantum in externis. Nec temerè mirantur Monachi, Manardum, Brassavolum & alios præcipere indifferenter sumendam Pompholigem vel Antispodia Græcorum, ubicunque Spodium desideratur, non excipientes compositiones Arabum quæ ore sumuntur. Vnde rectè etiâ Gæcias ait, Spodium Græcorum sive Pompholigem esse Tutiam Arabum, internè nequitiam sumendam.

Acosta in compositionibus Græcorum pro Spodio, metallum fumendum iubet. Sylvius verò pro Spodio Græcorum cinerem, qui super fornacem aurariam invenitur. Item pro Spodio Pompholigem, Olaus Sudenus in versione pharmacopoeæ Br. Bauderon. in Confect. Triantali pessimè & periculoso sanitatis errore pro Spodio ponit.

GALE FRUTEX ODORATUS SEPTENTRIONALIVM, ELÆAGNVS COR-
do: Chamæleagnus Dod.

C A P. XXIII.

LEGNVS est frutex, sarmentosus, Dod. cubiti lalitudinem raro attingens, in ramos multiplices devaricatus, cortice rufo ad spadiceum vergente, lævique: foliis quodammodo accedunt ad Vitim Ideam fruticosam, vel ad parvam Salicem, glabra, sed quodammodo incana: atque in quibusdam illorum serraturæ apparent. Ramorum extremis insident capitula veluti Iuli, multò minores quàm in Betula squammati perelegantes, quippe qui diluto spadiceo

Folia Myr-

ti.

Succeda-

nea Spodij.

apud Diosc.

Olex sylv.

Olea sary-

va.

Cydonia.

Galla.

Panniculi

linei.

Mora im-

matura

egy.

Fici frondes

Glutinum

taurinum.

Lana suc-

cida.

Nuclei

Palmar.

Corallum.

Spodium

Pompholix

Græcorum.

Nil album

et griseum.

Spodium

metallicum.

Manardus.

Brassavolus.

aliorumque

error.

Substima

Spodij Gra-

corum.

Olaus Sud-

enus error.


Capitula

Sapor cor-
rumpit.

Lignum.

Flosculi.

Semina.



Radix.

Semina al-
pera & pu-
gentia.
Succus Ole-
osus.

Pimen.

Descriptio

Folia.
Semen.Annuli.
Pigmen.Ambrosia.
Ruell.

Rhus.

Melisso-
phyll.
vulgare.
Elaeagnus
Cordi.Saxifolia.
Gagel.
Myrtus.

diceo splendi-
cent, ad octa-
vam figuram ali-
quatenus acce-
dentes, Cor-
tex amarecat,
non sine adstri-
ctione. Mate-
ries candida.
Lob. Floscu-
li sunt ex luteo
pallidi, quibus
succedunt se-
minum crebri
racemuli, con-
serti & con-
flati quasi spi-
cis, in quibus
semen pingue,
odore Stœchi-
dis citrinæ, sed
vehementiore, &

Trifolii quodammodo. Radix teste Dod. subet-
lenta & dura: folia latiuscula oblonga, Myrti
foliis haud multum dissimilia, sed duriora, &
subinde longiora: e quorum sinu prodeunt flo-
res spicati exigui luteoli: quib. semina succedunt
aspera cacumine pungentia, in racemi exigui & ob-
longi formâ coarctata, oleoso succo per maturitatem
redudantia. Totumq. fruticem cum gravitate qua-
dam odoratum esse, eiusque pinguedinem ac
oleosam substantiam. Ramulos, quales descri-
bit Lob. accepit gener Cherlerus anno 1605. à
Machliniensi Pharmacopœo, quos nos anno 1606
degustavimus & compertimus amaros acres & in-
gratos quasi Oleam aut unguentum aliquod re-
suspicientes, odor tamen non ita ingratus.

Gale autem fruticem tradere videtur Ruell.
dam dicit: Botrys Parisiensibus matronis, melius
quam officinis aut Herbariis noscitur. Hanc odo-
ris gratia vestimentis, pannis, & linteis curiose
nimirum interponunt ut odoris suavitatem con-
trahant. Deser. ut Augusto & Septembri mense
venalis per urbem: Pimen magno clamore denun-
tiant portentante scorbis rustici, unde nomen
hoc Pimen manavit in vulgus: nam hac facie con-
spicitur, fruticosa herba, luteis ramulis, ex inter-
vallo brachiatis, foliis cichorii, odoratis, erumpen-
te passim semine in racemulos collecto, quod per
maturitatem gummoso lentore pellucet, coeun-
tibus fulgore auri simul annulis, unde nomen
Græcis dictum. Pimen vel potius Pigmen vulgò
putaverim nominari, quod ex se Pigmentarii in-
stitoris vice faceret unguentum: nam si præ-
gnans suo ignore premeretur, in gummi lente-
sceret, hoc cappadoces Ambrosiam vocant. In
vino medetur Orthopnoicis. Hæc ille. Sed in-
dicent Lectores an Belgarum Gagel, quod Ruell.
tradit pro Botryde sit foliis Cichorii, ut ait: eam
plantam oportebat describere & demonstrare di-
scrimen inter hunc fruticem & herbam vulgò
Botrym dictam, de qua nos lib. 23.

Histor. Lugd. Rhus sylv. Dod. & Plin.
Rhus altera: Rhotomagensibus Piment Royal,
quasi Melissophyllum regium.

Huius fruticis icon exhibita fuit per Gesnerum
in fin. hist. Cordi, titulo Eleagni Cordi, sine de-
scriptione, nos in nostra tabella portionem po-
suimus. Dodon. hist. gall. iconem nostræ ferè si-
mitem habet, ei tribuens folia magni Buxi, lon-
giora tamen, ait Brabantis dici Gagel & qui-
busdam Pharmacopœis Myrtum, & semina Myr-

tillos, quamvis non sit Myrtus, hinc a Neotagi-
cis dici Pseudomyrsinem, Myrtum Brabanti-
cam: videri Rhus Plinii. Iconi titulus est: Rhus
sylv. Plinii, Samac Sauvage de Plin. Icon apud
Dod. hist. lat. diversa admodum est, quæ non pla-
cet, caret enim foliis: ea est sub titulo Chamæ-
leagni, ait autem, Cordus Eleagnum appellat:
nobis Chamæleagni, vox placuit. Eleagnus si-
quidem Theophrast. describitur folio molli, ac
lanuginoso flore Populi: qualis haud est à nobis
descripta: Nomen apud veteres, quod sciamus,
non convenit, nisi sit Rhus sylv. Plinii, de quo
lib. 24. cap. 11.

Nos Theophrast. descriptionem antè cap. de
Agno, sive Vitice tradidimus. De Eleagni au-
tem æquivocationibus & diversis opinionibus
nosegimus paulò antè. Rhois vero Plinii di-
scriptio reperietur cap. de Rhoë ubi etiam sunt
æquivocationes.

Lob. & Pen. Advers. propriâ habent iconem cum
hæc inscriptione Gagel Germanorum: vel Gold
Anglorum, Myrtus Brabantia quibusdam. Sub eo-
dem nomine in Obs. & Icon. Plant. Eleagni Cor-
di proponitur etiam ea, quam habet Dodon. de
quâ antè.

Potro iam ante 30. annos insignis medicus Pet.
Turnerus nos donavit Herbario sicco plantarum
Anglicanarum, & inter alias & hæc appicta erat,
adscripto nomine Gale. Folium hoc ipso an-
no 1605. quo hæc commentamur, degustatum
adhuc & aromaticum. Eandem Plantam quo-
que haud ita prius donò accepimus à fratre
Catp. Bauhino. Ceterum, fruticis huius ramulos
Amoni nomine Constantinopoli missos Clusius
in Exor. apud Garol. 1. cap. 31. Viennæ Austriz
accipiebat, quum Amomum, quo isthic utuntur,
inde expetisset, licet nullam similitudinem ha-
beret cum Dioscoridis, vel Plinii Amomo, que-
madmodum nec ea planta quam R. P. Quatra-
mus in examine Theriacæ scribit sibi donatam
pro Amomo in pratis uliginosis agro Parisiensi
erexam, quam Galli Piment appellant, & inter ve-
stes recondunt ad eas à tineis præservandum,
Brabantis verò & Flandris Gagel dicitur, & in co-
quenda Cervisia utuntur ad robur & acrimoniam
conciliandam.

In ericetis umbrosis, teste Lob. nemorosisq.
saltibus fruticat. Iunio & Anglæ mulierculæ vz-
num adferunt ramos florentes. Dod. autore, gau-
det locis incultis & Encastris, aliquatulum aquo-
sis & palustribus. In Britannia plerisque locis
& apud Brabantos ac Flandros non rarè occur-
rit. Maio ac Iunio flores apparent: Iulio & Au-
gusto semen perficitur. Tunc collectus fruticu-
lus ad forum vnâ cum fructu infertur. In Rho-
tomagensium agro quoque plurimus hic frutex na-
scitur per saltus herbidos & uligine madentes. Est
& in Scotia vdis locis frequens nomine Gale: vbi
conclavia per æstatem ornat, teste Iac. Cargillo
medico Scoto perdocto.

Lob. quoque scribit: Anglæ mulierculas uz-
num adferre ramos florentes ad concinnanda
ædium conclavia, & trichinæ suavi odore, quem
halant flores, imbuenda. Addi etiam flores
portionibus consuetis Septentrionalium peno-
riam Lupulorum interdum refarturos. Interdum
ad hilaritatem benè potis, conciliandam. Ferio
namque caput latiore temulencia. Ad everru-
canda animalcula, quæ eius odore fugantur, sus-
suntur quædam loca, & suffulcuntur summita-
tibus vestes. Sapor egregiè amarus insignem ha-
bere vim scæpadi & discutiendi monstrat, sed

Myrtill.

Rhus Plin.

Chamæle-
agni.Aurhorum
indicium.

Gold.

Piment
fruticis
odor &
sapor.

Amomum.

Amomum
Quattram.
Piment.

Gagel.

Locus &
TempusVires &
usus.Odor.
Inebriat.Citra ani-
malcula.
Vestes con-
servat.

Lumbrici. praesertim valere tam sumptum quam admodum
Temperat. ad lumbricos necandos & pellendos Dal. prodit.
 Dodon. semina impensè calida ac sicca
 sunt, ac ad tertium utriusq; gradum accedunt. Fo-
Nata. lia quoque calida & facultate sicca sunt, sed mul-
 to minus. Fructus cerebro molestus, Cerevisia
 intercoquendum additus (quod à plerisque fit)
Contra ti- admodum caput tentantem & citò ebrietatem
mon. adferentem eam reddit. Totus frutex cum fru-
 ctu aridus, vestimentis interpositus, à tinea &
 vermibus ca tuetur.

HALIMON SEV HALIMOS.

CAP. XXIV.

Halimus
Theoph. **H**VIUS Theoph. non aliter meminit, quam
 licet Lupi Aesopus in Fabulis, ut proverbio
 dicitur. Nimirum ut nocentem alius herbam ci-
 tat potius quam defendit: Aut enim ἀλμον [Gaza
 Auro vertit] vicinas plantas enecare, valens
 quam Hedera aut Cytisus: nam & Cytisum i-
 psam interimere, coque perniciosius, quò plùs
 habeat falsuginis. Nam in 4. Caulingenita falsu-
 gine, nimioque pabuli desiderio id facere tradit.
 Quo loco ἀλμον *Aurigenam* vertit. Hic autem duo
 notanda. 1. Si Halimus ut falsus, id facit cur non &
 aliae plantae idem faciunt? Deinde, si plus habet
 falsuginis, ergo & Hedera subfalsam intelligit. Sed
Halimus
Diosc. quia πύρεσθαι est prae aliis, prae iis etiam hoc
 magis praestat. Diosc. clariùs de eo tradit: de-
 scribit enim sic: Halimus frutex est, circa spi-
 nientia nascens, seu leparius [φραγγίτης] similis
 Rhamno, subalbidus [καλαμίνης: vulg. exempl.
 non habent] spinas non habens, sed folia Oleae
 similia, laeviora tamen [Plin. molliora, ut fortasse
 ἀμαλύνει vel καλαμίνης legerit, non καλύνει:
 Corn. illam lect. meliorem putat: utramque ser-
 vat Sarac. et si priorem vulg. exemplaria non ha-
 beant.] Nasceitur in maritimis locis praeruptis
 ac sepibus. Eius folia ciborum gratia olerum
 modo decoquuntur. Radix verò drachmae pon-
 dere in aqua multa pota, convulsa, rupta, tormi-
 naeque mitigat, & lactis ubertatem praestat [ἐν γά-
 λα κρημνίζει: quae verba quaedam exempl. non ha-
 bent.]

Nomina
suppositiva Idem inter supposititia habet: ἄλμον, Alimos,
 aliis Damassonium, aliis Erymos, aliis Rabadion,
 quasi virgula dicitur. Sunt qui Basilion, qua-
 si Regium vocent: alii, Mercurij basin, similiter
 Saplin: alij Osiridis diadema: alij Heliostepha-
 non, quasi Solis coronam: alij Sacrum caulem:
 Pythagoras Anthenoron, Aegyptii Afontiri: alii
 Asphe, alii Asealuri: alii Alanphen: Latini Albu-
 cum aut Ampeluciam.

Ex amen
gradistorii. Quisquis autem ille fuit, qui Diosc. magna di-
 ligentia varias illas appellationes adiecit, dece-
 ptus est Halimi & Alimi similitudine. Halimus. n.
Alind Ha-
limus, aliud
alimus. simplex, est ab Hale derivatus, fruticem signifi-
 cans, sapore subfalso, quem se in Hetruria pluri-
 mum vidisse notat Goropius. Non igitur tan-
 tum quia in maritimis nascitur hic frutex, ut vo-
 luere quidam, nempe ἀπὸ τῆς ἀλῆς, ἀλμον seu ἀλ-
Halimus
unde. μον aspiratè dicitur, sed etiam quia testibus Gal.
 & Paulo gustu sit ἀλμνός, hoc est, sapore falso, unde
 & ab Aetio ἀλμνός vocatur. Plin. utrumque ety-
Halimyn. mon eleganter complexus est, cum ait: Halimon
 ahi olus maritimum esse dixere falsum, & inde
 nomen, &c. Ipse tamen Plin: non distinxit inter
 Halimum & Alimum. Non bene factum est, in-
 quit Gorop. lib. 3. Amazonum, ut apud Diosc. è

Spartanica fieret Halimus cum Alimus prisca in-
 terpretatione diceretur: quod igitur adiectum est
 in nomen apud Diosc. diversitate, Halimum
 à quibusdam Britannicam dici, id procul corrup-
 tum est. Bis itaque impingunt Diosc. exempla-
 ria: semel Halimum cum Alimo confundendo:
 atque iterum pro Spartanica Britannicam suppo-
 nendo. Quare manifestè falluntur, qui Alimon
 circa aspirationem scribendum putant, atque
 hunc fruticem dictum credunt, quòd famem de-
 pellat, aut gustantes esurire non patiantur. Cuius
 tamen sententiae fuit Solinus, qui cap. 16. in Poly-
 histore herbam in Creta esse commemorat ἀλμον
 dictam, quae ad morsu diurnam famem prohibeat.
 Diceret nomen tractum à Latinorum alimonia.
 Suspiciatur tamen Sarac. num Solini ἀλμον à Dio-
 scor. Halimo diversa fuerit planta. Non tamen vi-
 detur. Nam & Gal. Alimon dixit: & Corn. Halim-
 on Diosc. Solinum intellexisse putat. Immo do-
 ctiss. Hermol. illum Solini locum citans, non Ali-
 mon dicit: sed sic. Solinus Alimon in Creta na-
 sci tradit mirabili si credamus effectu, quòd ad-
 morsu eos famem diu nulla sentiantur: ut nomen ei
 inde impositum sit, qui famem arceat: propterea-
 que neque aspirationem prima litera recipiat. Ni-
 si dicere velis & ipsum Alimon cum Halimo con-
 fusisse. Dixerat tamen paulò antè Herm. sibi pla-
 cere aspirationem, quoniam maritimum olus
 credatur, ideòque & ἀλμνός dictum ab Aetio.
 Alioqui Alimus est Asphodelus: Halimus verò
 hic frutex maritimus, ut annotatur apud Cor-
 dum in Com. ad Diosc. At cum idem Hermol.
 ait: Halimon nostri, ut Plin. ait, Aureonem vo-
 cant: Convolvut se ut Hedera: locis falsis nasci-
 tur, falsilaginemque praestat: bis peccat. Nam u-
 binam Plin. scripsit de Aureone? Quis dixit Ha-
 limum convolvut? Fortè hic error ei natus ex ma-
 le considerato, aut intellecto Theoph. l. 5. caus.
 supra citato. Aut quidem Plin. lib. 17. cap. 24. Nec
 Viscum prodest, nec Cytisus, nec Auro, quod A-
 limon vocant Graeci. Ut videas etiam Plin. Ali-
 mon cum Halimo confundere. Aureonem legit
 Hermol. apud Gazam, qui tamen ut monuimus,
 priore Theophr. loco Aurum ex Plin. posteriore
 Aurionem ex suo capite vertit, ut mirum sit cur
 & Marcellus Aureonem à Plinio dici asserere au-
 deat. Quam vocem Dalech. diligentissimus va-
 riarum Plin. lectionum perquisitor ne tubolsecit
 quidem.

Crataeas tertium quoque genus tradidit lon-
 gioribus foliis & hirsutionibus, odore Cupressi.
 Nasci sub Hedera maximè. Prodesse Opisthodon-
 cis, contractionibus nervorum, tribus obolis in
 sextario aquae. Annotat Dal. ad Plin. Sativam Ha-
 limum Tholosa in quibusdam hortis haberi, eamq;
 vocari, herbe du Machlon, id est Herbam Colicam,
 quòd doloribus Colicis valdè prodest. Sylvestris
 haud procul Tholosa in quibusdam sepibus na-
 scitur.

Ceterum quod inter Dioscor. supposititia di-
 ctum, Halimon quibusdam Albucum dici: inde
 fortè natus ille error, ut Asphodelon (qui Latinis
 Albucus seu Albucum dicitur) ab Heliodo qui-
 dam Alimon dici putarint, quod non temerè fal-
 sum dicit Plin. Eius verò erroris aliam causam
 suspiciatur Marcellus. Quod deinde inter supposi-
 titia Diosc. legitur, Ampeluciam etiam dictam
 Halimon: ab alba Vite, quam Graeci in sepibus
 nascentem ita vocant, factum fuisse, ingeniosè sa-
 nè suspiciatur Marcellus. Sed hae coniecturae sunt,
 non decreta.

Alimum apud Galen. (nam & ille ἀλμον habet)
 frutex

Spartanica

Britannica

Alimon

Alimon So-

Alind Ali-
mus, aliud
Halimus.
Hermol. ge-
minus er-
ror.

Auro.]

Auro Plin

Crataeas
Opistho-
nis.
Contracta-
ra.
Plin. illustr.Herba Co-
lica.Albucus
Diosc.
Cur Aspho-
delus po-
natur.Ampelucia
unde.





Folia.

Sapor.


Flor.

Radix.

rarids erecta, albicantia, tenuia, lenta: in quibus folia quodammodo ad Oleæ aut Rhamni 2. Matth. folia accedunt, nisi breviora essent, pinguias ferè & Portulacæ Sativæ, exalbida sive cinerea, lævia, interdum ferè quadrangularia, saporis salis, quem culturâ in hortos translato frutice exuunt. In ramulorum extremis semen copiosum racematim congestum fert, minutum, præcedentibus floribus, qui ex viridante in purpurescens quoddam vergunt, Blici aut Atriplicis ferè similes. Illi radix lignosa, vivax, velut & ipsa stirps, quæ decidentibus paucis foliis hyemem sustinet.

Putat Adamus Lonicerus, Halimū eam esse plantam vvas ferentem quam vulgò Ribem vocant: Sed cum huius folia non correspondeant oleagineis, sed potius virgineis, cum planè hallucinatus esse constat. Halimi meminit etiam Galenus lib. 6. simpl. med. ubi dicit: Illius plurimum in Cilicia præcipuè esse proveniunt, ibique recentia eius germina esitari, ac in posterum futura vsum etiam reponi, &c.

Halimus, quæ à Diosc. describitur, etsi alicubi fortassis proveniat in Italia: tamen qui illam Matthiolo ostenderet, adhuc reperit neminem. Halimus Mauritanis *Molochia* & Atriplex marinus appellatur. Cuius historiam referens Serapio narrat, quod eam venalè circūferentes in manuales fasciculos cōponunt, & per Babiloniā clamitant *Molochia*, *Molochia*: quod manifestè indicat Halimū apud Mauritanos herbā potius esse, quam fruticem vel arborem, eamque fortasse, quam Plinius ma-



nitimam ac salisam prodidit. quo fit, ut salisam quandam herbam (incolæ Bidonæ vulgò appellant) quæ frequentissima in littoribus Venetis provenit, hanc esse putarent: quippe quod ea instar oleris in ciborum usum recipiatur. Folia fert Olivæ similia, crassiora tamen, ac perinde ferè pingua ut Portulacæ, subalbida, lævia, sapore

falso. Caules emittit albicantes, tenues & lentos, in quorum summitate profert semen minutum, racematim cohzrens. Nascitur frequens prope Tergesi mœnia circa salinas, ubi etiam separatim, nec minùs copiosa visitur Atriplex marina, quæ sylvestrem maximè æmulatur. Quanquam apud Mauritanos Atriplex marina idem esse videtur cum Halimo. Sed inter se differunt: *ἡλίμη* Græc. Lat. halimus, Arab. *Molochia*. Hæc Matth. cuius icon benè repræsentat hanc nostram Portulacam marinam. Halimi alia species conspicitur, diversa à præcedenti [halimo latifolio Clusi] locis maritimis proveniens, planta valdè similis ei, quam Diosc. tradit pro halimo, quā comedunt in Creta, & vocant *Sandalida*, ex qua, provt intellexit Anguillara, in Sicilia sunt sepes. Portulaca marina videtur. Dodon. Gallico Græcorum *ἡλίμη*, & nominatim halimi secundi species de-

Tora. 1.

scripta à Plinio. hanc vocat Gallicè *Pourpier marin*, *Pourpier sauvage*, & *Pourcelaine de mer*. Eam porro describit Latin. in folio. Portulaca marina dicta exiguus est frutex, cuius ramuli duri ac lignosi: folia pingua, carnosæ, formâ Portulacæ æmula, sed albiora & duriora: flosculi cauliculos parte superiore ambiunt, quales Blicto aut Atriplici, nec dissimile semen, latum ac planum, radix lignosa, veluti ipsa stirps, quæ defluentibus paucis foliis hyemem sustinet. Huius verò & aliarum reperiuntur species foliis candidioribus longioribus & Olivæ ferè similibus, non rarò quoque altiores, aut ramulis teneriores, quales in Lusitania & Valentino Hispaniæ regno se vidisse Clus. scribit. *ἡλίμη* autem cum aspiratione, differt ab *ἡλίμη* sine aspiratione. Dodonæus in fol. eandem proponit iconem, quam olim habebat, ac præterea alia addit, cui titulus Portulacæ marinarum ramulus: quæ icon est in Ic. Plant. pag. 391.

Clusius sic describit. Halimi genus aliud supra cubitalè aut sesquicubitalè non assurgit altitudine, flagellis potius quàm ramis, aded infirmis, ut plerumque procumbant & humi fundantur, candidis quidem illis, sed minùs superioris ramis: huius folia oblonga, angusta, pingua & carnosæ, cinerei & albicantis coloris: flos summis flagellis racematim cohzrens innascitur herbacei ferè purpurascens coloris: deinde semen superiori penè simile, paulò tamen minus. Floret quoque superior [halimus latifolius] tempore. In maritimis regni Valentini nascitur: vidisse & legisse etiam memini, ait Clusius, in aggeribus illius insulæ, quam duo Rhodani cornua faciunt inter Fanum D. Egidii & Arelatum, cum Monspelio Arelatum, & inde Massiliam proficeret. Alitur etiam à nostratibus in hortis. Alebat etiam Vienne Jo. Aicholtzius insignis Medicus, aded prolifica semine, ut plurimè illi plantulæ singulis annis spontè nascerentur. Ad halimi etiam generâ referri potest alia planta, non modò in maritimis mediterranei maris, sed etiam ad Oceanum sitis, ut in aggeribus Flandriæ, Zelandiæ, & Hollandiæ nascens. Flos etiam extremos ramulos ambit racematim, ex herbaceo purpurascens: deinde semen secundo simile. Cuius turiones & folia Flandros, Oceani accolæ, sale condire solè re tradit, & in usum servare, non secus ac Tyrreni maris maritimis vicinos, sceniculum marinum. Alter halimus, sylvestre genus Plinii videtur, cui tenuiora folia tribuit: illius vulgare nomen mihi ignotum, tertius vulgò Portulaca marina dicitur. Omnes autem perpetuè sunt fronde, & aliquid affine cum Atriplice sylvestri habere videntur, & fortè etiam facultates non dissimiles.

Matthiolum sequitur Lacuna, & Alimum Solini putat, quasi hæc tantopere famem arceat: & tamen ipse halimum scribit, cum Solinus Alimum scripserit. Sed profectò non tam in hoc, quàm in eo decipitur Lacuna, quod utique intelligens Portulacam hanc marinam, is interim suâ icone nobis obtrudat Ligustrum, errore nimis crasso. Hist. Lugd. tradit tertium halimi genus Clus. Crithmum esse Diosc. Ital. *Bidone*.

De ea Pena & Lob. in Advers. hæc inter alia habent. Marina planta Portulacæ foliis & facie, quàm Crithmum Diosc. putarunt: nam nihil videtur obesse aut deesse, quod minùs Portulaca sit.

C. Bauh. in Phyt. halimum 3. seu Portulacam marinam, halimum vulg. Matth. halimum sylvest. Plin. unam eandemque hanc censet, licet aliqui halimum esse negent.

V.


Locus. Nasctur Portulaca nostra marina copiose in agro Narbonensi inter Lacum salum & mare. In maritimis Zelândiæ, Flandriæ, Hollandiæ aggeribus & tumulis arenosis Portulacam marinam etiam gigni scribit Dodonæus, & alibi similibus locis, ac Iulio mense cum flore potissimum vigere.

Vires & semper. Cæterum, cum Dodonæus ita validam dicat: non temetè dixerim, sapor id non demonstrat, cum is sit tantum salus, & cultus saluginem deponat. Ipsemet præterea Dodon. quasi sententiam mutans in post. hist. in folio ex Galeno dicit tantum maiorem eius partem calidam esse temperatè, cum humiditate non concocta, & flatuosa. Enascuntur apud nos [Zelandos] inquit Lemnius, passim aliquot herbæ saluginoso succo imbutæ, ex quibus sal, si aliàs denegatum sit, facile elici potest, atque in domesti-

cum usum depromi: qualis est Portulaca marina halimo affinis, ut etiam adnotavit Matthioli in eruendis herbis acer & industrius. Hanc nostrates æstate desinente condiunt, ac inuria asservatam, aut rudi sale obrutam in hibernos usus reponunt, ut Hispani Olivas, Cappares, Crithmon, Empetron. Excitat enim appetentiam ac fastidia nauicamque discutit, si quando ventriculus pituitosis humoribus oppressus, vel etiam biliosis, cibum respuit. Tota autem herba, usque ad seminis quod minutum est ac racematim dependet, maturitatem, portulacam prægrandem hortensem ac sativam refert: quam Patricii etiam sale rudi ac scabroso obrunt ad excitandam cibi aviditatem: An autem hæc Portulaca marina Halimi nomine sit designanda nondum statui, quum illa famem excitet, istæ verò arceat.

FINIS LIBRI VIII.

HISTORIA





potissimum cyathis Bectorum appareat: densum aded est, ut nec nivem, nec imbrem transmittat.

Distant verò inter se multifariam Pinus & Abies. Hæc enim magnitudine excelsa, longèque Pino procerior. Differunt etiam ligno non paulum. Nam Abieti nervosum, molle, levèque. Pino autem tedaceum, ponderosum, atque carnosius. Nodi [idein alibi dicitur de ramis] plures Pino, sed duriore Abieti. Quin & reliquis ferè omnibus duriore, quanquam mollius lignum est. Habet, ut Pinus *Aegidem*, ita Abies *Album*, dictum Lullon, velut ægidi respondens, nisi quoddid album. *Ægis* verò græciùs colorata est, quoniam tedam gerit. Spissum hoc & candidum, pulchrumque ex arboribus iam verustioribus gignitur: Arcades ambo *ægidem* vocitant, tam Abietis quàm Pini, & copiosiorẽ esse Abietis volunt, sed meliorem Pini: Abietis enim totam commodam [candidam] levem, spissamque: Pini vero exiguam, & crispiorẽ & leviorẽ, in totumque meliorem. Abies verò etiam *circumæctione*, sive *aguatione*, quam superius diximus, à Pino distinguitur. Præterea tunicâ multiplici Abies constat, modo *Cepæ*: assidue namque tunicæ conspectæ subditam aliam gerit, atque ex his tota constat. Pinus adhæc plûs quàm Abies corroditur à teredine: hæc enim amara est, Pinus verò dulcedinis nonnihil habet, eoque magis quò fuerit tedâ refectior. Omnes enim [arbores] teredinem sentire affirmant, præterquam *Oleastrum* & *Oleam*, quas amaritudinis causa, neque teredo, neque tinea rodit. Quod autem hic in Theophrast. *Gaza* *ἐμπύη* non legit, sed *τίκηδν*, dubitat Scaliger, an veram lectionem retinuerit, cùm Abies amara non sit, sed sicior, quàm Pinus. Is autem *ἐμπύη* legit. Tradunt etiam Abietis, cùm germinat, decoratam materiam aquis inoffensam, durare posse. Patuitque id apud Pheneum Arcadiæ, cùm obrutis sancibus campus in lacum redundavit: tum enim ductis pontibus ex Abiete, cùm amplius extumesceret aqua, aliis super aliis fabricatis, postea extrusis obturamentis, unda erupit, discessitque, ac universa materies, incorrupta comperta fuit. Rarissima est medulla, pergit Theophrastus, Abietis, quæ pondus sustinet validè, ut Pinus, quamvis utramque reniti affirmant. Medullam (ut fabricant) omnis habet materies, sed conspecta potissimum in Abiete. Nunc humor ipse quibusdam in lachrymæ modum gignitur, ut Abieti, in quâ, ut & *Picea*, cum lignis degustatis vulnus intulerint, fit *Resina*, de quâ postea sub *Peuce*. Sed hæc fortè prolixius ex Theoph. dicta sufficiat.

Audiamus Plinium. Peregrina, inquit, videbatur, quoniam non erat suburbana, Abies. Abieti expetita navigis rami, ut *Piceæ*, penè statim ab radice modici, velut brachia, lateribus inhaerent. Situs in excelsis montium, cœn maria fugit: nec forma alia [quàm *Piceæ*]. Materies verò præcipua trabibus, & plurimis vitæ operibus. Abies, ut omnia alia genera quæ resinam ferunt, accensa, fuligine immodicâ, carbonem repente expuit, cum eruptionis crepitu, eiacularumque longè. Abies perpetuò viret, nec facillè discernitur in fronde, etiam à peritis: tanta quippe natalium mistura est. Abies è cunctis amplissima est, & formina etiâ prolixior, materie mollior, uti hórque, arbor rotundior, folio pinnato densa, ut imbres non transmittat, atque hilarior [intuitu] in totum. E ramis generum horum panicularum modo nycamenta squammatum compacta dependent [salutur Plinius: Sui enim sunt & *La-*

Tom. I.

rici coni, veluti Pino, sed minores, & *Cupressinis* similes] Laricis. Hæc Abietis masculæ, primori parte nucleos habent, non item formine. Gignitur & in Abiete *Cachrys*, postquâ folia cecidère, hieme durans. Montes & valles diligit Abies, cui folia non decidunt: sunt hæc insecta pectinû modo & *Piceæ* & Abieti. Abies tripartitò intermittit ac terna germina edit: idè & inter squammas corticem spargit: quod omnibus arboribus in germinatione evenit, quoniam prægnantium rumpitur cortex. Est autem primum eorum [germinum] incipiente Vere, circiter quindecim diebus. Iterum germinat transiente *Geminis* Sole. Sic fit, ut [prima M. summa CH.] quima cacumina impelli secutis appareat, geniculato incremento. Tercium est eiusdem ad solstitium brevissimum, nec diutius septenis diebus. Clarèque & tunc cernitur excrecentium cacuminum articulatio. Abies floret coccino [croceo] colore circa Solstitium, semèn verò reddit post *Vergiliarum* occasum [alius legit circa diem nonum Decembris.] Est ordo ramorum Abieti, *Piceæ*: Et Abieti quidem subrecta divisura, ramique in cœlum tendentes, non in latera proni. Mirum, cacuminibus eorum decisis moritur: totis verò detruncatis, durat. Et si infra [intra M. & CH.] quàm rami fuère, præcidatur, quod superest, vivit: si verò cacumen tantum auferatur tota moritur: Abieti succisæ humor diu effluit. Hæc inter arbores altissimas rectissima. Navatum malis antennisq; propter levitatem præfertur Abies. Abies admirationis præcipue visa est in navi, quæ ex *Ægypto* Cæi principis iussu, Obeliscum in Vaticano circo statutum, quatuorq; trancos lapidis eiusdem ad sustinendum eum adduxit: quâ nave nihil admirabilius visum in mari certum est. cxx. velut alius, cxxx. modicum Lentis pro saburrâ ei fuère. Longitudo spatium obtinuit magna ex parte *Ostiensis* portus latere lævo. Ibi namque demersa est à Claudio principe, cum tribus molibus, turrium altitudine in ea exedificatis obiter *Puteolano* pulvere, advectisque. Arboris eius crassitudo quatuor hominum ulnas complectentium implebat. Vulgòque auditur octoginta nummorum & pluris malos venditari ad eos usus, rates verò connecti quadraginta sestertis plerasque. Pondus sustinet valde Abies etiam in transversum posita. Firmissima ad rectum Abies. Eadem valvarum tepagulis, & ad quæcunque libeat intestina opera aptissima, sive *Græco*, sive *campano*, sive *Siculo* fabricæ artis genere spectabilis, ramentorum crinibus, pampinato semper orbe sese volvens ad incitatos functionum raptos. Eadem & curribus maximè sociabilis glutinosa, in tantum, ut findatur antè, quâ solida est. Non fastidienda hæc quoque scientia, atque non in ultimis ponenda, quando quibusque satis umbra, aut nutritrix, aut noverca est. Abietis quidem quemcunque attingent, non dubiè venenum est. Et hæc sunt, quæ passim Plinius in suis libris memoriz mandavit.

Disconides arboris huius expressè non meminit, licet nihilominus eius resinæ vocem annotarit, de quâ infra agemus.

Meminit Homerus malum in navi ex Abiete fuisse, quâ *Telemachus* *Pylum* navigavit.

Ἰὼν δ' αἰετῶν κούρης ὄρνος δι' ἡμετέρας
ἐτήσιν ἀνέστη.

Apollon. Rhod. ἀρροαυμένη. celebrat Filium Iovis [Herculem] in silva oberrantem

Ut remum sibi ipsi pararet ad manum aptum.

Invenit dein Abietem hinc inde digressus, nequa

Abies mascula.

Cachrys.

Folia.

Germen triplex.

1.

2.

3.

Flor.

Semen.

Ramorum dispositio.

Abies pro digressa magnitudine.

lib. 16. c. 30.

Inter altissimas rectissima.

Abies prodigiosa magnitudine.

Abies ponderosa sustinendo idem.

Ad opera intestina.

Abies umbra generata.

Abies umbra generata.

Abies umbra generata.

Abies umbra generata.

Abies umbra generata.

Abies umbra generata.

Abies umbra generata.

Abies umbra generata.

Abies umbra generata.

Abies umbra generata.

Abies umbra generata.

Abies umbra generata.

Abies umbra generata.

Abies umbra generata.

Abies umbra generata.

Abies umbra generata.

Abies umbra generata.

Abies umbra generata.

Abies umbra generata.

Abies umbra generata.

Abies umbra generata.

Abies umbra generata.

Abies umbra generata.

Abies umbra generata.

Abies umbra generata.

Abies umbra generata.

plurimis gravatum ramis, neque multum virentem.

Ennius eam navem quâ Iason cum Græciæ Heroibus in Colchidem vectus est, ex Abiete structam fuisse memorat.

*Abiegna
crabi.*

*Venam ne in nemore Pelio senioribus
Cæsa cecidisset abiegna ad terram trabs:
Næve inde navis inchoanda exordium
Cepisset, quæ nunc nominatur navine
Argo.*

Virg. Georg. 2.

—Et casus Abies visura marinos.

Claud.

Apra fretis Abies, bellis æ commoda Cornus.
Sed & hastas ad præliandum ex Abiete fabricatas esse, notat Virg.

—cuius apertum

Adversus longa transverberat Abiete pectus.

*Elate.
Sapinum
Abietum
Mare & fo-
mina.
Ignem facili-
ter concipit.
Pars inferi-
or Sapini
nec dicitur.
Superior
Euphorbia.*

Abietem materiam vulgo notam dicit Heruolac ideo eius historiam omisit.

Quæ Græcis *ἐλάτη* arbore est, ait Ruell. Gallis & Sapinus & Avetum dicitur, Latinis Abies. Hæc Pino non dissimilis. Eius alia mas est, alia femina. Procreat & alit termitem, ab eoque vitatur. Ignem facile concipit, vehementemque flammam eraculatur, quod raritati atris, qui ei insidet, refertur acceptum. Pars arboris interior enodis, erecto torulo ad intestina opera comparatur & Sapinea, si Vitruvius credimus, vocatur. Superior nodosa duriorque Futurna dicitur. Plinius videtur Abietem cum Palma confudisse, quæ Medicinæ confert germina, folia & corticem. Nec Diosc. nec Galen. usquam in arborum censu Abietis meminerunt. Quam Græci vocant Elaten, non est quam Plinius asserit Abietem. Sed idem potius est Elate, quod Spathe. Abies resinam fundit celebratam, quam Gallicum vulgus Avetum vocat. Et hæc de Ruelli opinione, qui nec Abietem Latinorum [*ἐλάτη* Theophrast.] nec eorundem Piceam [*ῥαῖνα* Theophrast.] ite describit. Præterea non distinguit nisi quatenus in genere quædam ex veteribus, & potissimum ex Plinio (quem tamen non nominat) recenset: cur ad hoc caput non refert Piceam Latinorum, quæ Elate mas Theophrasti. Cum Pino etiam non video tantam similitudinem, ut Pino non dissimilis sit: unde si Piceæ Latinorum non dissimilem dixisset, melius authoritati suæ consulisset: nulla enim arbor ei similis, habet tamen manifesta discrimina. Præterea nimis generaliter scribit, quam Græci Elaten vocant, non est quam Plinius asserit Abietem: hoc enim fallum, quia quamvis aliis quidem quibusdam Græcis Elate non sit Abies, sed Palmæ pars, ut Diosc. Galeno, Paulo & Hesychio, quos citat Ruellius: Attamen Elate Theophrasti est Abies & Picea Plinio: Et Dioscorides ipse *ῥαῖνα* resinam, *ἐλάτην* Abietinam nuncupavit.

*Sapinum.
Avetum.*

Car. Steph. Græcis Elate dicta, Gall. *Sapinum* & *Avetum*, ea est arbor, quâ in Galliâ Lugdunensi & superiori Germaniâ, non solum in ædificiis, sed etiam in domestica suppellectile lignea utuntur. Abietis trunco ad radicem, vel interdum altius, ubi arbor & lignum carie tentatur, fungus, vel adnatum, simile fungo grandiori, nascitur, cui nomen *de l'Agaric*. Idem in Delphinatâ frequenter reperitur. At Car. Steph. imitatus Ruellium, non novit discrimen inter Abietem & Piceam Latinorum: Agaricus in Delphinatu non est fungus Abietis, sed Laricis longè diversa arboris: & Fungus in Abiete non potest, nec debet sumi pro Agarico. Porro in vill. sapite

*Fungus.
Agaricus.
Carol. Ste-
phan. l'Agaric
Fungus dicitur non
est Agaricus.*

*Porro igne-
tur.*

de Abiete, Piceâ, & Sapino, satis demonstrat, se non nosse discrimen inter Abietem & Piceam Latinorum. Tradit autem inibi *ῥαῖνα* dictam ab *ῥαῖναι* i. e. impello & prolongo: quod in præcelsum proceritatem assurgat: atque etiam hac ratione Abietem dictam esse quod in cælum abeat. Quod autem idem ait Macrobius Abietem inter felices arbores annumerare, nondum in eo invenimus.

Petr. Berch. quoque non videtur distinguere Abietem, (cui folia tribuit acuta, parva sicut Pini) à Picea, cui folia acuta.

Nec etiam quæ & qualis sit Abies satis declarat Cord. in Diosc. Abies, inquit, quæ Græcis *ἐλάτη*, ea est sine dubio, quæ à Germ. *Wien* Tanne, appellatur, similes Piceæ silvestri conos ferens, sed torosiores. *Weiß Thannen*, ut tradit Io. Stumpf. lignum asperius, durius & durabilius est, ininulque resina fert, quàm *Rott Thannen*, sed pulchriorem & ad usum medicum meliorem, quibusdam dicitur *Traubäch*, ab aliis *Bulbäch*. Ego autem tale lignum non Abietis esse dixerim, sed potius Piceæ tribuerim: Considerent diligentiores.

Duo Abietis genera, nigrum seu rubrum, & candidum Tragus agnoscit, ac utriusque folia latiora, sed breviora, piceis foliis esse dicit, Rosmarini penè similia: atq. ramulis crucis formam obtinere: Vtrumque, etiam Resinam puram ac odoratissimam, Thuris serè instar, quod ad odorem & formam attinet, sudare: Candidam insuper Abietem, rubræ per omnia similem existere, nisi quod folia habeat ex una parte cineracei proflus coloris, & corticem candidiorem & teneriorem: Hoc Abietis genus in Valesiæ Helvetiorum montibus gigni: Hancque Abietem simpliciter nuncupari, & Germ. *Weiß Thannen* dici. Sed Tragus resinam abiegnam & piceam non distinguit, quod minus convenit. Quod autem ad hoc attinet, resinam Abietis observavi liquidam. Eius verò icon non in omnibus placet.

Placet Bellonio, Abietem Gallorum *Sapinum*, Græcorum *ἐλάτην*, Marem vocare. Ac demiratur ille Plinium decoctam Abietem Sapinum vocare: Nec non duriusculum ipsi videtur, quod Plinius Abieti folia pungentia esse dicit: ut pote, quod in Abiete nunquam deprehendunt: Ac etiam quod Theophrastus multis in locis croceum ei colorem tribuit: tradens se in Abieti nullum unquam florem vidisse: Ego autem Bellonium non demiror solum, sed turpis ignorantia cum arguo, utique qui non observavit, Plinium ex Theophrast. Abieti mari tribuere folia pungentia, licet ipsemet verba Theophrasti recitari. Si quis etiam ingeniosè consideret, quæ Theophrastus scribit, nostram vulgarem Abietem potius feminam dicet, quàm marem, quamvis aliter censeat Bellon. cuius figura, uti & Marthioli parùm commendanda videtur.

Rectè Solerius affirmat Sapinum partem Abietis, ab Abiete non distinctam arborem.

Rectè etiam Du Choul. in descr. montis Pilati, Abietum, quas Sapinos vocant, folia pungentia dici non posse, sed apice modicè inæsa, dicit. Rob. Constant. in Lex. *abietis*, Abietem aut Piceam reddit. Idem & *abietis*, ut apud Latinos inveniri auctor est. Quæ verò auctoritate, nobis nondum constat. Et licet Abietem Theophrastus cultu deteriore reddi scribat, sicut & Pinastrum, tamen plantatas crescere Germ. obicit. Quæ oblatione sententiam Theophrasti exequere velle nobis

Elate modo dicta.

Abies modo dicta.

Folia arboris.

Petr. Berch. notat.

Cord. notat.

Cord. notat.

*Abietis duo genera.
Resinam folio
Ramulis
Resina odorata
Thuris.
Abies candida.*

*Locus.
Abies simpliciter.
Tragus.*

Sapinum.

Plinius sapinum.

Theophrastus.

*Abietis.
Abietis.
Rob. Constant.
notat.*

Ufus. ta-
natur. nobis videtur. Sed velle videtur. Aliud siquidem est crescere & aliud à naturali statu defletere, ac in deterius vergi. Cultu enim nunquam deterius redderetur, si plantata non cresceret.

Abies in-
fructifera.
plus sugu-
latur.
Capinus.
Abies in la-
gudem con-
versa.
March. ta-
natur.
Plus. exen-
sat. Inter se similes arbores esse, placet Matthiolo, Picea & Abietem, ut ut sepe etiam lignarios fabros fallant: Picea folia esse celotis Abiegnis longè nigriore, quin & paululum latiora, molliora, lauiora, nuntisque pungentia: In Tridentinis montibus Abietem omnem infructiferam esse, etsi Plinius Abietem fructiferam fecerit: Sapinum, teste Plinio, licet etiam Vitruvio, partem tantum esse in Abiete. Annotatque idem Abietem in centro saxi montis in lapidem esse conversam. Sed quis non miretur Matthiolum, tribuere Piceae foliis, quae Abietis sunt, quasi neutram norit. Iramento etiam videtur Plinium notare. Fructifera enim sanè Abies est, ut saepius observavimus.

Lacuna.
Abies in-
fructifera. Lacuna Abietis picturam ex Bellonio habet, dicens: tantam similitudinem esse cum Picea, ut quidam decipiantur, unam pro altera assumentes. At Lacuna ipsemet deceptus est, qui non novit plantas dictas Piceas siquidem has non distinxit, vulgari Abietis tribuens, quae sunt Piceae. Mihi etiam apud illum contrarietas videtur, cum uno loco dicit: *Abies in tempore de Galeno se infirmitate la Resina del Abeto*; & altero loco, cum de resina Piceae locutus est, ait: *Il abeto, produce aquel excellente liquor inognito a los antiguos*.

Elate, Pal-
ma.
Plus nota-
tur.
Sapinum.
Abies. Bened. Curt. de hort. ait Plinium cuiusdam arboris meminisse, quae Elate, aliis Palma dicatur, ubi Abietem, vel Maranthia teste, cum Palma confudisse videtur. Plures unam & eandem arbores Sapinum & Abietem existimaver. Plinius verò aliter, qui Sapinum nihil aliud esse, quam Piceam, feritate paulum mitigatam, cuius imas partes tedas vocat. Servius autem Honoratus Sapinum Abietis speciem dicit. Vitruvius Sapinum ab Abiete scijunxit. Ahi inferiorem Abietis enodem partem Sapineam vocavere.

Sapinum
differt ab
Abiete
Abies ex
Picea ar-
bor similes. Abies & Picea arbor, multum inter se similes, adeo ut nisi quis multum in eis exercitus fuerit, Amato subscribente, discrimen ponere nesciat. Vtraque enim longitudine, crassitie, figura & frondibus, idem habent, nam rami tanquam brachia à duobus lateribus in trunco oriuntur, ut in crucem nasci merito quis dixerit: ita quoque & folia in ramisculis ad illum modum enascuntur oblonga & dura. Sed in hoc inter se differunt, quod folia Piceae obscuriora multo sunt, quam Abietis: item cortex Piceae ad nigredinem quoque vergit, qui tanquam cornigia facile complicatur, ac illico disrumpitur: his addamus, quod rami Piceae terram versus curvantur, id quod Abietis ramis non accidit, imò & quod lignum Piceae pulchrius est, & utilius, venas directiores habens, & nodos pauciores. Sola praeterea femina Picea fructum parit: verum utriusque sexus Abietem fructum producere tradit Plinius. Et è contrà, in multis regionibus sterilem utramque Amatus conspexit.

Abies ex
Picea dif-
ferunt. Caltor Durant figuram habet, quae non placet. Apollo verò ex duabus plantis tres facit, nec novit discrimen inter Piceam, quae Elate mas: & Abietem, quae Elate femina: Matthiolumque imitatus tribuit Piceae, quae sunt Abietis. Picea, inquit, frondibus est abiegnis multo atrioribus, ut quae latiusculae, molliores, laeviores, atque minus pungunt.

Cast. Dur.
Apollinus
Carinus ex
Pop. Cedrum pro Abiete pingit Petr. Cresc. am-

certè Cedrum melius exprimentem.

Frustra Dodonaeus Abietem distinguit à Sapino, cum una & eadem sit arbor, quam melius meo iudicio describit in Hist. gall. quam latina, non tamen probanda figura, quam posuit Hist. gall. ex Bellonio, nomine Abietis & in lat. Abietis alterius. Casalp. Abietem nostram hanc tradit, cuius descriptio attidet, quamvis nec ipse, nec authores Hist. Lugdunensis demonstrent, Abietem feminam esse, multoque minus doceant marem esse Piceam, de qua paulò post, & quam nullo modo estimarim à Theoph. dictam *trivium*, aut *trivium*, qualem facit eam Casalpinus.

Lulli nominis vestigia etiam hodie supersunt. Nam lura nientis lignatores Abietum, Picearumque candidissimos tuncos, non nodis interceptos, sed recto venarum procursu fluviatos, & ad opera interna faciles, nunc *Ouchon* ut in Hist. Lugd. perhibetur, nunc *Louchon* vocant. Quid autem Lullum sit, constat antè ex Theophrasto.

Taberna. non ritè discernit Abietem feminam à mare, *Picea Latinarum*: praeterea figura eius falsa.

Clus. Abies Plinii, *Larix Sinaia*, Abies femina Theophrasti. Lob. & Penn. *Abies*, Sapin Gallorum, Phitropios Theophrasti, mulcinate dans.

Abies, quam plerique vocant, arbor Prophetis scriptis in concionibus ad populum erudendum adhibetur. Ezech. 27. Abiegnia è Serine adhibebat ubi omnia tabulata, Cedru acciebant ad parandum alii navis in te. Osee 14. Diriga eum ut Abietem virentem. Zachar. 4. Eula Abies quia cecidit Cedrus. Samuel 1. 2. 6. David 1. 2. & omnis Israël, iudebant coram DOMINO in omnibus lignis fabricatis Abiegnis & Cuthans, & Lys, & tympanis, & liliis, & cymbalis.

Nunc nomina prosequamur. Abies, graecè *Abies*, Hebraicè ut apud Trag. in margine scriptum legitur *herosib* dicitur, secundum alios *Aeres*. Germ. *Thannen* / *Thannenbaum*. Belg. *Sannenboom*, Gall. *Azer*. Ital. *Abies*, *Abete* & *Abeto*, *Andezza*, *Avedia*, *Crocat* Hisp. *abeto*. Scorsim autem hae nostra Abies, *Abies femina*, *indam Sinaia* Germ. *Weisse Thannen*, quasi candidam diceret, Belg. *Witte Sannen*, Gall. *Sapin*, *Sap*. Ital. *Abete*, *Abeto*, Angl. *Maestro* & *Deoleung*. *Luch senyo sa* / *Melynd a lereley egy setel ab* Boh. *Gedle*.

Epicheta hae Abieti conveniunt. *Longa*, *recta*, *enoda*, *audax*, *apta fretis*, *redolens*, *umbrosa*, *crispa*, *procera*, *crinita*, *excelsa*: electa ut in laetis habetur. Adhuc *perpetuo virens*, *resinosa*, *annosa*. Considerandum autem an *mucilaginosus* sit dicenda, ut vult Querc. def. herm. dicens. Abietes resinosa, sunt & mucilaginosae, ac idcirco fixioris & constantioris vitae arbores, adversus temporum injuriam munitae.

Abietis, nomine aliae etiam denominantur plantae, ut potissimum arbor vulgò dicta Picea, quae Elate sive Abies mas Theophrasti, de qua mox. Suspicamur Petrum de Cresc. Abietis & Piceae nomine intelligere Pinum sylvestrem. Tragus quoque quandam *Tallau*, sive *redam* Abietis quartum genus facit, de quo paulò post. Abietem dici de Cedro videre est ex D. Hieron. cap. de Cedro. Trago *Larix* est Abies tertia. Abietem usurpan pro *Impero*, & vice versa, licet ex D. Hier. cap. de Junipeto videre. Gulandinus scribit Abietes in Arabia thure manere, & Cardanus thur-

Thurifera arbor. *referam arborem*, Abietem pusillam vocat: ut dicitur cap. de Thure, quæ opinio non placet Scalligero. Non placet etiam Abietem *nam unguentariam* dici Hermolao. Immerito quoque scripsit Ruellius, Plinium videri Abietem cum *Palma* confudisse, ut demonstratum. Inter marinas plantas sunt etiam *Abietes* dictæ *marina*, de quibus agitur lib. 39. Libro tandem 8. cap. de *Populo alba* demonstratum est, eam à quibusdam ignatis dici Abietem. Non omittendum hîc velle quosdam *Sapinum* nihil aliud esse, quàm caudicis Abiogni partem inferiorem ac enodem, & non ut aliqui falsò opinantur, arborem peculiarem, & ab aliis specie divisam. Non igitur est, ut Porta in villa docet, *Piceæ* species, aut *Picea domestica*. Quid enim est quæso *Picea domestica*? *Piceam* Latinorum siue Abietem marem esse credimus.

Locus. In Valentia frequentes Abietes esse perhibet Simlerius, Sabaudia fert proceras Abietes & *Piceas*, navali materiæ aptas: In nostris Alpibus Abietes nonnunquam inveniuntur 130. pedum longitudine. Firmitate materiæ præstant Abietibus *Harcinæ* sylvæ, nec alioqui proceræ. *Rheticæ* & *Helveticæ* in mare Adriaticum deportare curant. Miror *Tragum* Abietem non observasse in Germania, ut in *Harcinia* sylva, & passim proveniente. Scitent passim plerique omnes *Helvetiorum* montes & sylvæ Abiete. Abundat in insula *Fermentaria*. In monte *Ida* provenit. Anglia, autore *Iulio Cæsare*, præter *Fagum* & Abietem profert cuiuscunque generis materiam. *Alustinas*, ait *Thom. Harriot* insula *Virginea* alit. In *Viennensi* saltu, ut & in vicinis aliis aliquot montibus, Abietis esse maximam copiam testatur *Clusius*. In montibus *Burgundiæ* prope *Meche* antiquum castellum dirutum luxuriant Abietes ubi colligunt eius resinam, quam vocant *du Benchill. n.* Inibi etiam mense *Iunio* sub Abiete *fungi* proveniunt, pincis nucibus, vel favis similes, nigri, quos *Maronles* vocant. *Genevæ* *Allobrogum* habent Abietem in proximis montibus: ut & *Basileæ*, similiter circa *Massmünster*, inter *Bichenwir* in *Alsacia*, Ill. Ducis *VVirt.* urbem & *S. Mariam*, ubi *sodina*. Inter *Montbelgardum* & *Porenturum* non rarè apparent Abietes, unde transtuli in hortum Ill. E. C. quæ minùs feliciter proveniunt, nisi sint admodum tenellæ. Curavit Ill. E. C. seminâdas in suo ferarum orto, quarum quædam excreverunt. Nec destituuntur Abiete montes *Reverend. Episcopi Basiliensis*, circa *S. Vrsinum*, circa fontem novum. Apud *Zoringam*, [legitur annotatum per *Leodeg.* apud *Lonicerum*,] *Helvetiæ* oppidum, in ditione *Bernensi*, sylva est *Thannwald* dicta, ubi arbores, potissimum Abietes, tam elegantes & proceræ evadunt, ut vix similes in tota Europa reperire liceat. Nam quædam assequuntur longitudinem 130. pedum, ita ut usui adaptentur longitudine 110 pedum. Hinc à *Genuensibus* emptæ *adminiculo Arolæ* deducuntur in *Rhenum*, & inde in mare Anglicum ac Hispanum, tandemque in mare Mediterraneum *Genuam* usque, ex quibus malos navium facere consueverunt. Inveniuntur quidem tam proceræ Abietes & in nigra sylva, sed pinguiore, atque ob id non tam durabiles. Dictæ longitudinis Abietem *Kilchburgi* ante hospitium (interiacet autem *Bernam* & *Basileam*) solo implantatam offendes, quo peregrinus è lóginquo diversoriû dignoscere valeas.

Tempus. Coni, teste *Clusio*, virent *Autumni* initio, & multam resinam fundunt: sub *Autumni* verò si-

nem, & *Hyemis* initium maturitatem consequi ferunt. In hac arbore viscum, quod *stelin* *Plin.* ex *Theophr.* appellat, observavi anno *Redemptionis* humanæ 1583. sed longè maiore deinde copiâ 1585. in vivario *Illustr. D. Hyneck à VValdstein* *Promarchionis Moraviæ*, non procul à *Pier-niz* ipsius urbe (cuius arcem incolebat *Albis*) perinde atque vulgare *Viscum* baccis præditum.

Viscus Abietis anno 1587. cum essem in *Richenvvier* allatus mihi ex proximo monte *Val-lon*: reperi etiam anno 1591. ipsemet ibidem in summis ramis deiectæ arboris.

In desperata fame posse & solère homines ex integris conis seu fructibus Abietis farinam suam adaugere, quod largiùs cibentur, autor est *Strup-pius*. *Cortex* & resina Abietis arida, qualitibus ac viribus cortici, & aridæ *Pini* resinæ valdè sunt similes, nisi quodd paulò actiores magis detergent. *Vini Abiogni* vires, cuiusque præparandi modum, vide cap. de *Cedro*. *Abies*, ut ex *hætenus* dictis constat, navibus apertissima est: triremes enim & longa navigia ex eâ levitatis gratiâ fiunt. *Adificiis* optima quæ vetustissima, modò cariola non sit. Quin & ad tabulas pictorias, auctore *Theophr.* & ad quamplurima alia utilis est. *Pondus* sustinent valdè *Abies* & *Pinus*: renituntur enim nec temerè rumpuntur, ac priùs cane, quàm viribus deficiunt. Antiquis *Hedera* *vini* venalis indicium erat, ast nunc quibusdam in locis *Abies*. *Viennenses Austriaci* dum venale vinum habent, Abietis ramos ante ædes suspensos proponunt, quibus si ex stramine citrus unus apponitur vinum præcedentis anni denotant. Sin duo citri vinum trium annorum indicant. Si nullus, eiusdem anni vinum esse significant. *Vincorum* pedamenta & pali *Viennensi* agro ex Abiete fiunt. Fertur vulgus *Tigurinum* offendi, si quis gesserit in pileo ramum Abietis transiens per urbem. *Situla* novæ & tubuli fontium novi ex Abiete & similibus lignis dum sunt recentes, odiosum saporem aquæ imprimunt: idem faciunt pyxides abiognæ, cum condita, tabella, trochisci & similia imponuntur, præsertim si calor accedat, ita fastidiosum, & ingratum odorem, non tamen ullius pernecabilis malignitatis participem, contrahunt, ut ab eo contenta vindicari non possint, ut aliquando monuit egregius *Medicus & Botanicus* *Iac. Gargillus Scotus* in thesibus, quodd equidem observandum *Pharmacopœis*. *Digitis* vulneratis solum *lixivii* facti ex cineribus Abietis, additâ radicis *Altheæ* parva quantitate, *Felix VVirtz.* conferte scribit. Ait *Columella*, quodd quidam abiogna scobe mala custodiant. *Semini-bus* Abietis valdè oblectari ait *Gesn.* aves montanas, quas Latine *Loxias*, Germ. *Breuz* *Vos-gel* ob rostrum longum decussatum vocari tradit.

ABIETINA RESINA LIQUIDA ET ARIDA.

NON solum ex caudice, ut vult *Amatus*, nam etiam & vesicis affectis, intra quas resinam ipsam siue oleum abiognum contentum esse dicit, extrahitur. Est autem ut eam describit *Apollo*, liquor ille limpidus, clarus, transparent, valdè fragrans, atque amarus, globulis quibusdam inter corticem & corticem prætumidis, humorem ed loci subesse indicantibus, rarus sanè, videlicet impermixtus. Ex Abiete tam mare, quàm *formina*, eximus hic liquor perfluit, vulgo nostro

Viscum
Stelo *Plin.*
no.

Trag. mar.
lar.

Benchill.
Fungi *Ma-*
ronles.

Vinum *Ab-*
biognum.

Vfus.
Fames.
Vires.

Apia *ad-*
ficium.
Adificia.

Vini *Genu-*
is indicium.

Pali *Genu-*
rum.

Abies *ad-*
ficium
Adificia.

Situla *For-*
bul.
Digni *Ges-*
nerati.

Malorum
adificia.

Loxia *Avi-*
semine *de-*
lectatur.

Abietis
resina *li-*
quida.

Descriptio







- Folia.** quin eodem vergentia ferè coincidunt : iam verò si singularia spectes Taxi folia, sunt ea abiegnis acutiore mucrone donata, supernè atro virore splendentia, infernè nitore destituta, unicoloria tamen & viridantia, nervo secundum longitudinem decurrente, cum abiegnis elatiorem aversâ parte habeant costam, coloreque glauci sint prædita, gustu amaricante : porro autem in extremis ramulis circumquaque inter folia oriuntur, perpusilla sed copiosa capitella, sublonga squammata ex quibus veluti flosculi emicant Juniperinis ferè similes, & virore pallescentes, qui deinde in meros & musculos apices satiscunt : circa mensem Augustum, uti observavimus, fert baccas ex calyce ita emergentes, ut simile quid habere videantur cum glande : postquam verò maturuerit, quod fit mense Novembri, nihil planè simile habent cum glande, sed figura quodammodo referunt florem Vitis Idææ, quippe parvo, virente, atque squammato calyculo, brevi pediculo adnato fructus inhæret, grano Juniperino maior, supernè apertus atque lians, velut ex carnosâ cute constans, colore pulcherrimo & splendente coccineo conspicuus, intus cavus, succo præditus viscido, ac dulci, in quo granum latitat, pipere minus, nec exactè rotundum, sed leviter compressum, colore inter pullum & spadiceum medio, cortice duriusculo, medullam continens saporis non ingrati. Hoc granum fructus capacitatem non adimplet, sed undique ferè intactum à fructus pellicula in medio situm est, baccæ imò adhærens, haud secus ac ipsa ex pediculo enatum. Suspicionem baccas tum cum longiusculæ sunt, & glandis formam, aliquo modo demonstrant, nondum maturas esse. Iam verò maturiores aperiri, & propter hiatum figuram acquirere rotundiores. Materies bicolor partim rubet, partim ex albo flavescit.
- Medulla.** Theophrastus Taxum Græcè *μίλος* [quidam *μίλον* apud eundem corruptè legunt] vocat, montibus propriam quæ in planis nasci nequeat, vehementerque umbrosis gaudeat. Hanc porro genere simplicem esse scribit, proceram, auctu insignem, similèmq; Abieti, non pariter excelsam, magisque aliis sinuatam : folio quoque Abieti similem, sed pinguiorem, mollioremque ligno : eam quidem quam in Arcadia nasci tradit, nigro aut puniceo, quam autem in Ida, flavo & Cedro simili, ut pro ea vendant, nam totum eor esse videtur detractò cortice, quem scabritiâ, & colore Cedro similem habet : fructum fert Fabâ paulò minorem, rufum & mollem, qui ab aliquibus hominibus innoxie manditur, suavisque : folia autem iumentis lethalia, ruminantibus nequaquam : perpetuò viret, germinat tardissimè : floret, & fructum reddit cum Abiete.
- Materies.** Plinius Taxum facit Abieti similem, minùs virentem, gracilem & tristem, ac duram [an duram] nullo succo, ex omnibus solam hacciferam. Mas inquit, noxio fructu, Lethale quippe baccis, in Hispania præcipuè, venenū inest : vala etiam viatostia vinis facta in Gallia mortifera fuisse compertum est. Hanc Sestius Smilacem à Græcis vocari dixit, & in Arcadia tam pestilens veneni esse, ut qui obdormiât sub ea, cibumve assument, moriantur.
- Abieti simile.** Sunt qui toxica venena, quondam taxica ab hac arbore appellata scribant, quibus sagittæ tingantur. Repertum verò innoxiam fieri si in ipsam arborem clavus æreus adigatur. Fumus mures decat.
- Taxica.** Dioscorides Smilacem vocat Abieti similem in

Italia & Narbonensi Gallia Hispaniæ contermina : baccis noxiam, in Italia, umbrâ in Narbonensi. Hanc aliqui *πιδύμαλον*, Romani verò Naxion aut Taxon vocant.

Nicand. in Alexipharm. Taxum inter venenatas stirpes quoque retulit, adscripto simul remedio : & quidem his verbis. Non quidem Taxum [quidam] tu malam Abietinam [*ἐλατνίδα*] decerpas Oetæam : Mortis multum lachrymabilis datricem. Quia hominis Isthmia, & laryngis angustiam obstruit viam, quam implens meracissima potio vini curat, &c. Quæ Nicandri verba Gorgæus ita refert.

Parce venenata Taxo, qua surgit in

Oetâ

Abietibus similis, lethoque absomis

acerbo,

Ni præter morem pleno crasere meraca

Fundere vina pares, cum primum sentiet

ager

Arctari obstruitur fauces, anima que

canalem.

Virgilius quoque inter alia hoc versu Taxumeminat.

Sic tunc Cynnae fugiant examina Taxos.

Dicitur autem Cynna Taxus, quod in Insulâ Cynne Græcis dicta abundet.

Iam excutiamus Neotericorum opiniones de Taxo, & inprimis Hermolai, qui miscet Smilacem arborem glandiferam è genere Quercus cum Taxo non animadvertens aliud esse Smilacem apud Theophrastum, & aliud apud Dioscoridem, unde non sine magno errore dixit : Smilax sive Taxus est, ubi à Theoph. & Diosc. *μίλος* appellata sit folio æterno, extremitatibus & lateribus sinuato, ut Quercus, & Paliuri, & omnino Ilicis, molliore tantum profundiorèque. Folium quoque ut scribit Plin. Abietis : Nec Taxus vulgo, sed literæ prioris immutatione Naxus & Naxius se cognitum video, qui ubi venenalis. 6. numerat, eodem loco non Taxum, sed Toxum à Romanis dici credidit.

In eodem errore versatur Cornarius, & ipse non cognoscens Smilacem Theophrasto differre ab arbore Milos, quæ Smilax Dioscoridis est, sive Taxus. Dicit enim is, eum citante Matth. cap. de Smilace. Habet Gal. lib. 6. cap. 4. secundum loc. Virgultorum Ilicis, Arbuti Smilacis ac Phagi decoctum. Quo loco ego non de alia Smilace in Com. med. accipiendum censui, & adhuc sentio, quàm de ea, quæ Taxus appellatur. Apud Plinium pro Arcadia legendum puto Narbonia : Galeni exemplaria *ἡ Ἰλντία* habent falsò pro *ἡ πύλα* : corruptè legitur *σμίλαξ ἢ ἰντία πιδύμαλον, ἡμίμαλον δὲ γὰρ ἢ τῆς καλῆς*. Non enim Smilax vocatur Tithymalus : nec Romani Naxium vocant. Recta itaque lectio est. *σμίλαξ ἢ ἰντία πιδύμαλον, ἡμίμαλον γὰρ ἢ δὲ τῆς καλῆς*. Vocari autem Smilacem etiam Thymalon, Diosc. de mat. med. habet, & Thymion quoque dici inter suppositicia legitur : quanquam Paulus non *πιδύμαλον*, ut Diosc. sed *δομιν* habeat. Sed perversè Corn. Smilacem apud Galenum de comp. med. Taxum interpretatur, nec absque periculo valetudinis humanæ venenatam Taxum pro non venenata arbore Smilace glandifera è genere Quercus accipiendam censet. Quid enim obsecro commune habet Taxus cum Ilice ? Vbi deinde Plinius Taxum dixerit Ilici, Arbuti ac Phagi similem non occurrit : Abieti verò quidem & Picæ similem facit. Ac cur in Plinio legendum sit Narbonia non vide-

Smilax
Diosc.

Tithymalus
Naxus
Taxus
Taxus Narbonensis

Elatium
Remedium

Cynnae Taxus

Hermolai
Quercus

Smilax
Milos

Naxus
Naxius

Taxus

Cornarius

Cornarius

Plin. corrig.

Galien. ver.

Diosc. emend.

Tithymalus

non est

Smilax
Quercus
Ros. r.
admir.

ferè per quadraginta annos : fructificare rarè. Ego verò contrà Taxum aliquoties plantavi Montbelg. in horto Ill. C. VV. sed frustra. Thalius Harciniz incolam facit. Olim ego & primò observavi circa Tigurum in sylvis. Repentur ut semel dicam, in Italia, Gallia, Hispania, & Germania. Umbrosus gaudet. Tardissimè germinat, fructum verò maturat Septembri.

Quæ Theophr. & Plin. de Taxi natura & viribus memoriz prodiderunt, iam suprà à nobis tradita sunt. Taxi, inquit Diosc. quæ in Italia nascitur, fructum edentes aviculæ nigrescunt, [*μαλακίαν* vet. codex, Lacun. legit *πικρίαν*] Homines autem, qui ederunt baccas, in alvi profluvium incidunt. Quæ verò in Narbonia nascitur, tantam vim habet, ut etiam ex umbra eius, hi qui sub eâ sederunt, aut dormierunt, lædantur, sæpèq; etiam moriantur. Hæc de ipsa referuntur ea gratia, ut periculum evitemus. Idem de lethali. Pota frigiditate totius corporis inducit, suffocationemque ac celerem mortem. Auxiliantur his omnia, in Cicuta relata. Plutarchus eo tantum tempore Taxum noxiam esse tradit, quo florere incipit, quòd tùm succo sit maximè prægnans. Virgilius Taxum, ut apibus noxiam, ab apiario semoveret.

Ne propius testis Taxum ferè.

Galenus hæc pauca de Taxo. Smilax sive Taxus arbor est, venenosa facultatis, ubi exemplaria falsò habent à *χάριτος* pro à *καρπώ*. Cat. Eburnorum Rex Taxo [Taxi succo epoto & fortè per nares sumo attracto] cuius magna in Gallia Germaniæque copia est, se exanimavit. Cornarius arbitratur Galenum in columellæ remedii Taxi arboris ramulos probare, ut quorum decoctum vehementi adstrictoria vi præditum evadat: Non esse verò eam ubique lethalem & venenosam ex eo patère, quod Diosc. præcipuè de Italica & in Norbonia Hispaniæ tradat nascente. Nos verò nullum fide dignum autorem legimus, qui scripserit Taxum vim adstrictoriam vehementem habere. Cavebimus etiam à venenata Taxo, & per Smilacem apud Galenum, ut antè dictum, interpretabimur arborem glandiferam. Esse Ruellius perhibet, qui tradant Taxi baccis alvum resolvi, & altilis, & cohortales gallinas saginari. Marcellus credit Maronem monuisse fugiendâ esse Taxum apibus, ne citâ alvo, cui malo obnoxie sunt, perirent. Curtius dicit Claudium Cæsarem, Tranquillo scribente, edicto proposuisse, nihil æquè ad viperæ mortem facere, quàm Taxi succum. Testatur Matthiolus in Tridentinis montibus, non veterina solum, sed ruminantia etiam animalia devorata Taxo interire, ipsiusque baccas iisdem in locis perniciosas esse, seque curasse affirmat, pastores ac lignatores, qui saporis dulcedine allecti, cum has edissent, in febres ardentes inciderunt, & alvi profluvia, non sine magno vitæ discrimine. Contra Pena, eius baccas innoxie puerulos evitare in Anglia affirmat, seque gultasse sub Hyemem non ingrato sapore, sed satuo, vel subamaro, ibique porcos passim eas tanquam glandes comesse. Nulli sanè Angliæ angulo deesse hanc, ubi semper virente, umbrosâ, densâque ramorum fronde & latissimâ, similiter Abieti, pènatiss & longis quasi pectinum radiis, ex atro-virentibus comosa, ac in sepulcretis & areis pro templorum foribus pangi, ad arcendos Solis æstus à concione, plebe sub tegmine Taxi conventus agere solita, nullo percepto inde vel tantillo incommodo.

Quæstio de temperamento.

Sed hæc existit quæstio, inquit Matthiolus, an

frigidi, an verò calidi sit Taxus temperamenti. Dioscorides eiusque sectatores frigidi esse temperamenti, existimarunt, quòd iisdem remediis Taxi veneno quibus & Cicutz occurrendum esse ille scripserit. At his opponit Matth. amarorem, qui cortici ac frondibus inest, comam perpetuè virentem, Pinorum, Abietum, Picearumque modo, quibus fronde similis est, baccarum tum dulcedinem, tum acrimoniam quandam, & quòd aviculæ eas depastæ nigrescant: quæ omnia insignem temperamenti caliditatem arguunt. Quare & febribus, & alvi profluvio tentantur, qui eas baccas edierint, inflammatis scilicet spiritibus, & sanguine. Quod si quis dixerit accendi febres, fierique alvi fluxiones ex humorum putredine, quemadmodum æstate ex frigidorum fructuum esu, nigrum verò colorem in aviculis contrahi posse tam à frigido, quàm à calido, quid tandem ad frondium corticisque amarorem, baccarum dulcedinem & acrimoniam, perpetuèque virentem comam respondebit? Nam hæc a calore fieri nemo negaverit. Febres verò & alvi profluxia ex calore immodico potius, ut devoratis anacardiis accidit, quàm ex humorum putredine oriuntur, & nigredo illa pennatum à calido potius, quàm à frigido avicularum pabulo. Frigus enim nigredinem non inducit, nisi sit immodicum, & tantum ut interimat. Quare nigredo exustis humoribus gignitur, ut in Æthiopibus. Matthiolo de temperamento Taxi ad stipulatur Lacuna, dicens eius folia muribus esse valde lethalia: temperamenti què potius calidum, quàm frigidum. Sed & Camer. Taxum innoxiam esse tradit: acinos eius rubros avidè expeti ab avibus, sed inde attonitas reddi, quæ faciliè postea capiantur: scobem autem, ut quidam asserunt, illius esse venenatam. Ego verò testari possum à fide dignis hominibus mihi affirmatum in montibus Burgundiæ, foliorum ut etiam corticum eam mortuos boves & vaccas: cum enim persuasum fuisset, cuidam rustico cortices Taxi valere ad excitandas vaccas ad venerem & quærendum taurum, eo dato cortice, una mortua, altera gravissimè ægrotavit. Io. Lutzius insignis pharmacopœus, in suis ædibus Kirchenheimiæ ducatus VVirt. asseruit mihi turturæ album cum torque nigra baccarum esu peruisse, & in pago Obertenzingen Asiæ degustata Taxo subitò mortuum.

Hæc paulò copiosius prosequi par erat propter eos, qui tradunt in Europa Taxum innoxiam, quique eam per os exhibent, aut eius ligno utuntur, inter quos annumerantur Pena & Lob. Camer. ac VVierus.

Qui morbos simulant pulvere Taxi adedò cutim ulcerant, ut miserabiles ac ferè deplorati homines appareant.

Ligni materies quòd rufescat quamplurimis intercurantibus venis, incorruptaque sit, lignariis fabris maximè expetitur, & plurimi sit, præsertim concinnandis mensis & hastis, telisque conficiendis. Quamobrem Germani huius arboris aliter ad sua construenda hypocausta non exigua sibi comparant pecuniâ. In Episcopatibus Saltzburgeris urbe quadam torno parare solent pulchros scyphos, cucurbitulas, epistomia, aliæque subtilia, elegantia & egregia utensilia, quæ per totam Germaniam distribuuntur, & Viennam usque deferuntur, ac etiam Montbelgardū perveniunt. Scyphorum autem, cucurbitularum & epistomiorum tutum usum dicere nò velim, tutiorè tamen existimarim præmissâ maceratione, in vino vel aceto calido aliquoties repetita.

PEUCE

Obiit.

Responso.

Frigus quando in gradum inducit. Tempera.

Acini.

Scobr. Autorem indicium.

Effectus in.

Turturæ mortuæ. Affert.

Imperfora.

Ligni materies. Incorrupta. Mensa. Hasta. Tela. Affert.

Scyphi. Cucurbitula. Epistomia. Viennæ. Viennæ.









fuerit ratio, Plinius *strobilum facit per se arboris speciem, ergo est arbor*, quàm hæc, Plinius Tedam particularem facit arborē, ergo tēda per se est arbor. Magis autem movent, quæ scribit Dioscorides, inquit enim, *πινίς ἢ τὰ αὐτὰ ἔχει τὴν στροβίλου φαιάνην*, τὰ φύλλα πινίτη hoc est, præstant verò eadem & strobili cortex & folia pota. Iam verò nux pinea eiusdē generis est cum pino. Sed hoc repugnare videtur, quod ab initio capitis habetur, cum de quibus esset acturus indicans, inueniunt pini duntaxat & piceæ, non autem strobili. Sed utrum hic strobiles nucem pineam significet, folia verò eiusdē sint pini, cuius paulò ante meminit Diosc. parum refert, quoniam omnes illic simul memoratæ arbores iisdem viribus sunt præditæ. Rob. Constant. in Lex. *πινίς* propriè Pinus, impropriè que Piceæ arboris nuce in conis (quas Poma Cybeles dixit Martialis, Nuce verò pineas, *πινίτην καὶ πικρὰν ἔχει*, ut & *καὶ πικρὰν* Dioscor. & Theoph.) contentæ. Græci etiam *καρύων* ἢ *πινύς* nomine appellant, ut nucis & nuclei voce Plinius.

Pitydis.

Poma Cybeles.

Lonic. reprob.

Petr. Cresc. figmentum.

Lobcl. mutat.

C. Bauh.

Therm. mod.

Poma.

Synonyma linguar.

Epitheta Pini.

Cybele sacra.

Locus.

Gesn. natus.

Lonicero Pinus dicitur Pitys. Isque conum tantum pingit, temerè adiungens conum Cedrinum, non agnoscens differentiam inter utrumque. Eum autem Pinum non agnovisse, indicio sunt, vel nomina Germanica *Fichtenbaum* / *Barnbaum* / *Bynholz* / *Bisfferholz* / *Scüren* quæ diversarum sunt plantarum.

Pro Pino absurdum figmentum habet Petrus Crescentius, Sedum arborecens referens quodammodo.

Dicitur hæc Lob. Pinus vulgarissima, quod mirum videtur, nec enim adeò vulgaris est. Tabern. Pinus domestica. C. Bauh. phyt. de Pino obscurior est, Pinumque sylv. fortè intelligit cum dicit: Peucedanon à *πύκη*, quæ Latinis Pinus vocatur, quòd folia eius cum Pini foliis similitudinem quandam habeant, unde & *Pinastellum* quidam dicunt.

Præter verò quotidianam experientiam communis authorum consensus, Feri in Genesim falsam opinionem meritò ridet. Pinus, inquit, nullum fructum fert, sed solum semen. Gortopium consulere debuisset dicentem: Plinius glandes è pomorum numero exclusit, nescio quæ de causa: cum mihi æquè atque Nuce pineæ, de quibus non dubitatur, hanc nomenclaturam videantur mereri.

Pinus, Græcè plurimis *πύκη*, aliis *πίνι* malè, Germ. *Zirbelbaum* / *Fichtenbaum*, Belg. *Pinapelpbaum*, Gall. *Pin*, Ital. & Hisp. *Pino*, Angl. *Pine tree*, Bohem. *Borowico*, Polon. *sofski*. Pinus quidem ut Matthiolo placet à pinnato foliorum acumine. Castell. & Catal. *Pino negro*, Portug. *Pinheyro negro*. Fructus eius Græcè *στροβίλος*, Lat. *Strobili*, Nuce pineæ, Germ. *Zirbelnusslin*, Gall. *Pignons*.

Pino à poetis apud Ravisium hæc epitheta attribuantur. *Nautica*, *pontica*, *amans litora*, *virens*, *florida*, *procera*, *alta*, *ardua*, *conifera*, *picea*, *odora*, *pinguis*, *cornigera*, *acuta*, *multifida*, *capitata*, *nutans*, *sylvestris*, *hirsuta*, *cava*, *garrula*, *Berecynthia*, *Cibeleia*, cui sacra fecerunt, quanquam & *Pani* sacram legerimus. His adde ex Theoph. *nodosa*, *ter squamosa*, *resinosa*, *ingens*, *recta surgens*, ex Guidone *flammissera*, *prunaba*, *humida*, ex Virg. pinus in hortis pulcherrima.

Frequens est, ut Ravisius prodit, in Atlante, Idæ, Lycæo, Simoënte, Mœnalo, & Othry. In Germania, quod equidem sciam, spontè non provenit. Genevæ non vidi, quamvis Gesnerus

se audisse scribat, pinum inibi in loco quodam publico spectari. Lutetiæ quidem in horto Reginz vidi. Eam in Belgio, Angliâ, & Italiâ colit testatur Lobelius. Scribit Bellonius pinum locis permultis sylvescere etiam in planis, ut in Gallia Narbonensi (ubi ad aquas maritimas spontaneam perhibet quoque Lob.) & circa Massiliam, ac in multis Italiz tractibus, ut circa Ravennam, quo loco sylvas ex se faciat amplissimas: ac sylvestria semina si in cultum demandentur solum, easdem proferre arbores, eisdemque fructus.

Seremus autem pinum, authore Palladio, nucleis suis (semine enim teste Theophrast. tantum provenit) calidis & siccis regionibus, mense Octobri, vel Novembri: frigidis & humectis, Febuario, vel Martio. Amat locum gracilem, sæpè maritimum, inter montes, & saxa vastior, & procerior invenitur: ventosis & humidis arborum sunt incrementa latiora. Sed si montes velis conferere, seu spatia quæcunque, hæc huic generi deputabis, quæ alteri utilia esse non possunt. Ex arabis ergo ea loca diligenter, atque purgabis, & frumenti more semen asperges, ac levi furculo curabis operire, nec enim plusquam palmo debet abscondi. Defendenda est tenera arbor à pecore, ne calcetur invalida. proficiet, si nucleos aquâ ante triduum macerabis. Aliqui dicunt fructum pineum translatione mitescere: sed plantas hoc modo procurant, ut prius multa semina in caliculis terrâ & fimo repletis obruant, quæ ubi processerint, relicto eo, quod solidius est, auferant alia: ubi iustum coeperit incrementum, trimam plantam cum ipsis caliculis transferunt, quibus fractis in scrobe indulgent radicibus largitatem. Terra tamen equæ sterco admiscet, facientes straturam alterno ordine subinde crescentem. Servandum est tamen, ut eius, quæ radix una & directa est, usque ad summitatem suam possit integra & illæsa transferri. Putatio novellas Pini arbores tantum promovet (quod autor se expertum ait) ut quæ speraveras incrementa, duplicentur.

Nuce pineæ usque in Novembrem esse posse Maturitas sunt, & maturiores legentur.

Nuclei verò ipsi purgati durare non possunt: Asservatio] tamen aliqui in vasis fictilibus novis, & terrâ repletis cum testis suis missos asservunt custodiri. Ex nucleis Pini missis Lugduno per honestum virum Sebast. Hiebertin & alios, Pinus in horto E.C. sæpius mihi provenit, sed facile perit. Eadem causa fortè fuerit, quam Camer. in horto assignat. Pinus, inquit, Italica ex semine enata prodit, sed Hyemis frigore intensiore facile, nisi in fictili recondatur, perire solet. Dum recens è terra emergit, nuclei putamen non incommodè adimitur, sed nucleus protrusus si auferatur priusquam sua sponte decidat, plerumque germen enascens, cui tanquam munimentum à natura datum est, & foliis coniunctis oblongioribus adhæret, perire solet.

Proprium autem est huic arbori, ut falso solo latissime fructificet, quemadmodum apparet ex æmœnissimo pineto prope Ravennam. Dignum etiam est observatione, excisam nullam remittere ex virgis radicum sobolem, sed prorsus emoti. propterea Cræsus (ut est apud Herod.) minabatur se extirpaturum Lampascenos Pini in morem. Dignum quoque & illud notatu, quod D. Basil. memoria prodidit, pinus incensas ac exustas flammis in querceta mutari.

Pini vires secundum antiquos videre est ante scriptum

Satio:

Tempus:

Caketa:

Maturitas

Asservatio]

Observatio] rames pini dicitur. Proferuntur

Pini in morem.

Pini Vires & usus,





Teda Dio-
scor. &
Plin.

Teda (si modò fiat) *Teda* nomine vocari posset. Verùm ex eo quoddam *Dioscorides* nō minus & nō *Teda* particulatim *lectam*, si in aceto co-
quatur, & decocto dens colluatur dolores levare
scribit: Atque cap. de Ol. Candido ubi *tadam* fu-
sida describit: *teda* præpinguis pinus assulatim
concisa cum aliis pondus aliquod præscribit. Ex
eoque quod *Plinius* Laricis morbum esse scribit si
teda fiat &c. Nec non etiā *Theophrasti* autoritate
fretus, concludit *Bellonius* planè perspicuum esse,
Teda non esse arborem sui generis, ac nullam
esse arborem quæ peculiari nomine *Teda* voce-
tur.

Nulla ar-
bor est, quæ
Teda voca-
tur.

Pinastr.

Pinastr, ut vult *Tragus*, in Germania vulga-
ris est notior, & facile provenit, quocunque lo-
co plantetur. VVasgoviz admodum familiaris
est, præsertim oppido *Cæsareo Luchæ*: folia ge-
rit muld quàm *Pinus* crassiora, duriora, & no-
centioribus aculeis armata: conos quoque ac-
quirat breviores & duriores, exiguis prægnantes
nuculis: multam hæc arbor resinam destillat vul-
nerata, Germani *Ein wilden Binbaum* / *Byffer-
baum*, & in superiori Germ. *Forenbaum* / aut
Holz nominant. Hæc ille. Si verò eandem
quam nos, intelligit arborem, non in omnibus
placet descriptio, potissimum quod ait folia cra-
ssiora, quàm *Pini*. Seminibus etiā in vulgari
nostra sylv. *Pinu*, nucularum nomen haud con-
venit: Sed *Pino Cembro* potius congruit. Con-
siderandum præterea *Tragum* scribere cap. se-
quenti quasi de arbore à modò dicta diversa, quæ
sequuntur. *Pinguis* illa arbor, quæ hybernæ in
quibusdam locis facies præbet, ad *Abietem* quo-
que tanquam species eius refertur. Quartum hoc
Abietis genus Germani *Ellen* nominant. *Teda*
quibusdam appellatur, à quibus in præsentia non
discedo. Difficile autem assertu quid *Tragus* ve-
lit, quia non demonstrat quæ in re differat sua
Teda à suo *Pinastro*, quem describit præcedenti
capite. It ut tegeret suam ignorantiam se otio-
sis diligentiorē & exactiorē nominum in-
quisitionem relinquere ait: quos monet ut in
hanc rem *Vallesiz Alpes*, maximèque eas, in
quibus *S. Bernhardus* habitet, perlustrent. At
non fuisset sanè otiosi hominis, sed boni Botanici
arborem describere. De qua si, vel liquidam sen-
tentiam suam protulisset, vel planè tacuisset:
nullam nobis occasionem vellicandi ipsius igno-
rantiam præbisset.

Willd.

Picea.
Picea.
Picea

Theoph. Gollius in *Onom. Pinastrum Wilden*
Stechbaum à *Teda Bienenbaum* ut à diversa arbo-
re separat, demonstrat se nescivisse quid scriberet.
An *Petro de Crete*. *Abies* & *Piella*?
Bellon. conif. *Pinus*, *Picea*, vulgi *Græcorum*
Pinus, & circa *Lugdunum* *Pinus* aggregatis, *Pin*
sausage, sed falsò: figura etiā quam habet non
placet. Eadem de negl. cult. *Picea montium*, ut
Tarax, omnium qui *Lotetia* *Lugdunum* profici-
ciscuntur, oculis subiecta. An verò eidem *Obs.*
& conif. *Picea Dictæ* montis, ex qua *Teda* in
Creta, & de qua sub titulo, *Pini sylvestres*.¹

An Picea
Dictæ
montis?

Pin. sylv.

Matth. in *Diosc.* *Pinus sylv.* numerosa virens in
Ananiis, reliquisque *Tridentinis* montibus, fru-
ctu parvo, brevi, quamprimum arescente, assa-
tim dehiscente, & ex arbore decidente. Is figuram
habet, eamque in prioribus comm. & *Hist. Germ.*
Pinum sylvestrem inscribit, atque ex ea in *Bohe-*
mia & *Germania* *picem* fieri ait. In post. verò
comm. *Pinum montanum* vocat.

Error.
Cass. Dur.

Cass. Durant. non describit suam *Pinum syl-*
vestrem, cuiusque figuram secundò proponit sub
hac inscriptione *Pignoli purgari*, vietrore aliquo.

Pinus, ut apud *Stumpf. Hist. Helv.* legitur, consi-
tis dicitur de *Forchenbaum* aut *Stechern*, licet sit
particulare genus: quod a *Plinio* *Pinastr* voca-
tur.

Lonic. sub titulo *Stechbaum* malam *Pinastr*
figuram ex *Trago* depinxit. Vocat autem cap. se-
quenti *Seuren* / oder *Ellen* / auch *Stlicher Bina-*
baum & *Byfferu*, Lat. *Teda*, Græcè *Ala*.

Anguill. *Picea*, *Pinus*, *Plinio* dicta. *Phico-*
phorum & *Picea* sitiva, & *Teda*. Habet is figu-
ram *Matthioli* postremam, quæ convenit no-
stræ *Pino sylv.* *Taser* live *Teda* dictæ: conveniunt
& ea quæ dicit.

An *Lob.* & *Penz Adv.* *Pinus* altera nuce mino-
re, refert *Laricina*?

An *Dodon.* Germ. *Pinus sylv.* *Pini sylv.* *Pin-*
stri prima species, & *Pinus Tarentina* *Plinii*. *Gall.*
Aleve & *Eleve* *Bellonii*? Fallitur *Dodon.* existimans
esse *Pinum Tarentinam*, *Aleve* & *Eleve* *Bellonii*,
est enim *Eleve Cembro* *Matthioli*: descriptio
etiā consula videtur: ac præterea confundite-
tiam *Theophrasti* *Pinus*, arborem peculiarem, cum
Pinus.

Ryff. in *Diosc.* cum dicit, *Piceam* aliis dici *Pin-*
stich *Donne* intelligit *Pinum sylvestrem*. Con-
fundit autem, ut & *Lacuna*, *Picea* n. *Bellonii* cum
Picea *Matthioli*.

An *Cæsalp.* *Pinastr* in cæteris (cum *Pinu*) simi-
lis, sed graciliori caudice: nuce pyramidali: nu-
cleisque ob parvitatem inutilibus, præterquam
ad columbarum cibum?

Apollo contra *Matthioli* sententiam existimat
Bellonii *Piceam* non alludere ad *Pinastr* aliquod
genus à *Matthiolo* depictum. Ego verò potius
huic quàm illi assentior, quoniam sit cuius
Matthiolum redarguam, quod videlicet *Theo-*
phrastum *Pinus*, *Pinus* scribentem male intelligat:
nam has duas voces coniungit non coniungen-
das, ac *Pinum sylvestrem* interpretatur, quum
Pinus sit *Aquifolium*, non autem adiectivum, ut i-
pse putat, *Pinus*.

Piceastrum, inquit *Gesnerus* de hortis, in altissi-
mis montium nostrorum sylvis nasci aiunt, mate-
rià longè puriore & politiore quod nondum satis
consideravi. *Piceastrum* esse puto, cui maxima
(ni fallor) rigidissimaque in coniferarum genere
folia sunt. In *Catalogo* verò dicit *Teda* vel *Tz-*
dam *Pinci* generis arborem esse, cuius assulis pro
candelis uti possumus, *Pinus* Græcis: Germanis ve-
rò *Brenholz* dictam. An autem *Piceastr* eius
altissimorum montium huc refertur, debeat, dubito.

Camer. ad *hist. Matth. Germ.* & *Epit. Pinus sylv.*
Tabern. *Teda*. *Thal. Pinastr.* *Horto.* *Lutit.*
Pinastr *Pinus sylvestris*: *Pinastr* *Pinus* ex montibus *Bo-*
hemis.

Pinus sylv. vulgaris, *Teda* cognominata multis, *Namio*
Pinus sylv. Græcè, & *Sic* *Cordo*, Belg. *Wilde*, *linguam*,
Pinboom, Gall. *Pin sauvage*, Ital. *Pin salvaria*,
Hisp. *Pinus sylvestre*, Vng. *Vad fenyó* / *Bos fenyó*.

Hæc arbor abundat locis vicinis in *Burgundia*
circa *Poreatrum*, in *Sundgovia* variis locis, ut
circa *Beffordiam* ac *Basileam* in itinere *Montbel-*
gardum versus, unde aliquot vicibus transla-
tarum, ac in *horto* *Montbelgardensi* plantata-
rum, unica superstes mansit arbuscula à pluribus
annis lentè crescens. Verum ex seminibus ex *Har-*
cinia sylva per *E.C.* *Wilsis* aggregatæ arbores adole-
verunt in eius *Theriotrophio*.

Ad tubulos pro fontibus expetitur. Cum ossam
in *Palatinatu* cum *E.C.* observavi celebrem virum
D. Beuterichium in sylvis iuxta arcem suam *Pin-*
denfelo curasse *picem* excoqui ex *Pinis sylvest.*
vulg.







*Resina fa-
cunda: mo-
di. Theoph.
Gaza &
Hermol.
error.*

*Plinius la-
sus.*

*Plinius locum
restituens.
Resina gra-
vis.
Gaza error
alius.*

*Plinius repro-
batus.*

non annua, sed post plus temporis administrari solita est. Fit resina in hunc modum. Vbi iam vulnerata arbore, detractus tantum cortex est [non detracta teda, ut scribit Herm. secutus Gazam] resinam hauriunt, sic enim in vulnus invecum, humor copiosior confluit: ex Abiete vero & Picea non cortice tantum spoliatis, sed ipso etiam corpore, id est ligno vulnerato: haud enim quamque secretionem modo eodem agi mos est. Et hinc Plinius lapsus perspicitur, & Picea detracta tantum cortice resinam fluere dicentis: quod de Pino scripsit Theophr. Deinde eiusdem depravata hæc lectio manifestatur: Nec corpori ipsi paritur in ceteris, vel, ut in ceteris: sic a. restituendus Plinius, corpori ipsi paritur, non ut in ceteris. Est hæc porro Resina, non ita levis, quam quæ ex Abiete & Larice & Picea [id est in *πικρῇ* insignis, v. error Gaza in sua versione, qui tres hic tradit plantas, ac alias *πικρῇ* modò interpretatur Laricem, modò Piceam] teda enim Pinus referta est. Sed vel ex hac Theophrasti sententia sequitur: & Pino non detracta teda, sed cortice tantum, Resinam colligi. Pinus siquidem non spoliata, sed referta teda est, ob quam gravior ceteris eius resina sit. Quam ob rem præclare Hermol. & Pinu Resinam copiosissimam, ponderosissimam, picinamque proximam manare scribit. Plinius contra minimum resinæ de Pinu colligi tradit, sed errat, Larici enim omnia ei tribuit, quæ de Pinu Theophrast. dixit. Et sic Plinius Archetypum suum imitatur!

*Resina do-
plex.*

Liquida.

*Colophonia
cur de Ba-
Syria.*

Ceterum, Resinæ succi pinguis, summæ, ut antea quoque diximus, species duæ sunt, liquida & sicca. Liquida, ait Theophr. portatur utribus, dein spontè spissatur. Resinæ liquidæ, ut comprobatur Diolc. & Pinu & Picea manant. Hæc ex Gallia & Hetruria convehuntur. Quin & olim & Colophonia asportabatur, quæ inde Colophoniz cognomen sibi vindicavit. Ex siccis autem Resinis, alia est strobilina, alia abiegna, de qua dictum, seu de alia picina, & alia denique pinea.

*Cornu confu-
sum.*

Confundit certè Corn. si non decipit studiosum, dum ait: Quarum arborum sint singulæ relatæ Resinæ, ipsæ appellationes indicant. Falsum siquidem hoc est. Nam strobilina resinæ nomen, non strobilum, arborem particularem, designat [ut ipse sibi imaginariè persuadet,] sed eandem planè cum pineæ resinæ vocabulo quod Pinum denotat, significationem habet. Strobilus enim (uti fusiùs declaratum) unde vox strobilina derivata est, nihil aliud est, quam nux pinea. Strobilina igitur resina & pinea eiusdem arboris resina fuerit. Illa quidem partitis arboris [fructus,] hæc verò totius.

Impostura.

*Resina ori-
do.*

Gariopotum.

*Pinus in
ferendis re-
gionibus
nulla.*

Nostre tempestate, inquit Bellon. eadem impostura utimur, quæ antiquissimi solèrent, in adulteratione Thuris. Si quidem resinam Pini miscemus Thuri. Sed fraus deprehenditur odore, vulgusque nostrum resinam illam Gariopotum nominat. Subolscebat fraudem istam suo tempore Dioscorides, qui in cap. de Thure scribit Thus in itinere, inquit, adulteratur Pini resina: quæ res mihi absurda videretur, nisi in itinere dixisset: utpote, quoddam illarum regiones eternæ, quæ admodum calidæ sunt, Pinum non generent. Idèd, ut nobis Thus peregrinum est, ita & illis resina Pini. Prisca ætas ea omnia adinvenit, quæ nunc à nobis perficiuntur, aut saltem his simillima. Ex quo liquet nihil à nobis

nunc scribi posse quod non antè ab alio excogitatum sit.

Inferenda duo ex Plinio: Vnum, Resinæ florem crudum ab eo dici, tenuem resinæ crudæ & sicca partem quæ in ea veluti bullat, & efflorescit: Alterum permixtum id videri quod scribit: Resina omnis dissolvitur oleo: quidam & creta figlinarum hoc fieri arbitrantur. Resinam enim creta liquari aut dissolui posse verum non est, atque aded si quis resinæ liquatæ cretam, vel ali-quod aliud terræ pinguis genus admisceat, massa sit durissima, & quo vis cæmento solidior: quare locum sic corrigendum esse quidam arbitrantur: Resina omnis dissolvitur oleo: Pudet confiteri maximum iam honorem esse in evellendis pilis: Quidam creta figlinarum hoc fieri arbitrantur.

Est porro de resinæ coctura dicendum. Li-quida resina in ossas cogitur duras, & solidas, ducentorum fere pondo singulas, in aquæ duplo tam diu cocta, quousque odorem amittat, friabilisque & tam arida reddatur, ut digitis iam non cedat, nec eorum vestigium recipiat, ut sit cum eius lentor nondum prorsus consumptus est. Est autem liquanda & colo defæcanda, ut fæculentæ sordes secerantur, priusquam in ferventem aquam coniciatur. Hoc coquendi artificium resina candidissima evadit, ac ferè nivea, et amfi-antea, vel oleosa, aut mellei coloris, ut Larigna, fuerit. Ex quibus perspicere licet Ruelium Dioscoridi, hæc de re verba rectè non expressisse: Donec, inquit, friabilis, ac retorrida reddatur, & digitis cedat, cum legendum sit, *ἡ ῥηνὴν ὡς μὴ τὴν δακτύλῳ ἔλκεται*, id est, andæ ut digitis non cedat: deinde: resina sit etiam eximi candoris, si omnis eliquata percolatur, &c. Vertendum erat, sit autem (hoc subaudi, coquendi supra dicto modo) eximie candida. Omnem autem resinam liquare, & colo defæcare antea oportet. Sed & Dioscoridem ipsum mirantur plerique ac iure quidem, cum declarat modum spissandæ in aqua fervente resinæ liquidæ, cum eam uti [*ῥηνὴν*] dixisse, & non potius elixari [*ἐλίσσασθαι*]. Spissatur etiam resina cocta sine aqua in cortinis æneis subiecto primùm igne lento: deinde ubi coire cœpit, carbonibus liberaliùs aggestis, & aucto igne, ut quicquid ferocius est exhalet. Si liquidam durare & in ossas redigere hac ratione libet, coquenda ea est sine intermissione diebus ac noctibus tribus, quoad odoris ex pers, friabilis, arida, nec sub digitis lentescens existat. Sin iam siccam in ossas ducere placet, uno die coxisse sufficit.

Haud absimilis est coquendi modus hodie Chymistis usitatus, oleum è Terebinthina elicientibus. Phialam ingentem vitream, luto oblitam & resinâ, ad dimidium usque, impletam fureno imponunt, alterius vacuæ, & quod stillat excepturæ collum in eius fauces inserentes. Dein eâ cautione, quæ dictum est, ignem accendunt: Fluit primùm liquidus sudor Resinæ, aquam Chymistæ vocant, *Πισέλας*que veterum is respondet: abiicitur verò tanquam inutilis, tamethi ad ea valeat, ad quæ Pisselæon commendatur. Sequitur oleosus liquor, qui cum totus exstillaverit, arida & friabilis in phialæ fundo resina superest: Colophoniam hodie nominant, magni, ut & olim, in medicina usus. Scire tamen licet nominis Colophoniz multiplicem significationem fuisse. Sic enim dicta quondam fuit Resina autore Galieno, & resina cruda; ex Picea, Pinove sicca,

*Resina flor-
cruda & li-
qua.*

*Resina def-
fectiva o-
leo.*

*Crete non
dissolvitur.*

*Locus Plin-
ius corio-
dus.*

*Resina re-
cta in
genera.*

*Ruelius tana-
tur.*

*Ruelius, chert-
gunt.*

*Diosc. in
propria li-
cencia.
Resina spiss-
anda vid-
etur.*

*Legimus
modum Chy-
mistarum.*

*Aquæ res-
ta.*

Vere.

*Colophoniz
olophoniz
Garia signi-
ficatio
Resina crudi-
da.*



	fuerit ratio, <i>Plinius strobilum facit per se arboris speciem, ergo est arbor</i> , quàm hæc, <i>Plinius</i> Tedam particularem facit arborē, ergo tēda per se est arbor. Magis autem movent, quæ scribit <i>Dioscorides</i> , inquit enim, <i>πικρὸν τὸ αὐτὸ καὶ τὸ πικρὸν ὁλοῦς καὶ τὸ φύλλον πικρὸν</i> hoc est, præstant verò eadem & strobili cortex & folia pota. Iam verò nux pinea eiusdē generis est cum pino. Sed hoc repugnare videtur, quod ab initio capitis habetur, cum de quibus esset acturus indicans, meminit pini duntaxat & piceæ, non autem strobili. Sed utrum hic strobilos nucem pineam significet; folia verò eiusdē sint pini, cuius paulò ante meminit <i>Diosc.</i> parum refert, quoniam omnes illi simul memoratæ arbores iisdem viribus sunt præditæ. <i>Rob. Constant. in Lex. πικρὸν</i> propriè Pinus, impropriè que Piceæ arboris nuces in conis (quas <i>Poma Cybeles</i> dixit <i>Martialis</i> , Nuces verò pineas, <i>πικρὰ ῥαῖνα</i> & <i>πικρὰ ὁλοῦς</i> <i>Dioscor.</i> & <i>Theoph.</i>) contentæ. Græci etiam <i>πικρὸν καὶ πικρὸν</i> nomine appellant, ut nucis & nuclei voce <i>Plinius</i> .	se audisse scribat, pinum inibi in loco quodam publico spectari. Lutetia quidem in horto <i>Reginæ</i> vidi. Eam in Belgio, Angliâ, & Italiâ colit testatur <i>Lobelius</i> . Scribit <i>Beillonius</i> pinum locis permixtis sylvescere etiam in planis, ut in Gallia Narbonensi (ubi ad aquas maritimas spontaneam perhibet quoque <i>Lob.</i>) & circa Massiliam, ac in multis Italiciæ tractibus, ut circa <i>Ravennam</i> , quo loco sylvas ex se faciat amplissimas: ac sylvestria semina si in cultum demandentur solum, easdem proferre arbores, eisdemque fructus.	Satio: Tempus:
<i>Pitydes.</i>	<i>Lonicero</i> Pinus dicitur <i>Pitys</i> . Isque conum tantum pingit, temerè adiungens conum Cedrinum, non agnoscens differentiam inter utrumque. Eum autem Pinum non agnovisse, indicio sunt, vel nomina Germanica <i>Fichtenbaum</i> / <i>Bergbaum</i> / <i>Byhnholz</i> / <i>Bihfferholz</i> / <i>Sciuren</i> quæ diversarum sunt plantarum.	Seremus autem pinum, auctore <i>Valledio</i> , nucleis suis (semine enim teste <i>Theophrast.</i> tantum provenit) calidis & siccis regionibus, mense Octobri, vel Novembri: frigidis & humidis, Februario, vel Martio. Amat locum gracilem, sæpè maritimum, inter montes, & saxa vastior, & procerior invenitur: ventosis & humidis arborum sunt incrementa latiora. Sed si montes velis conferere, seu spatia quæcunque, hæc hunc generi deputabis, quæ alteri utilia esse non possunt. Exarabis ergo ea loca diligenter, atque purgabis, & frumenti more semen asperges, ac levi furculo curabis operire, nec enim plusquam palmo debet abscondi. Defendenda est tenera arbor à pecore, ne calcetur invalida. proficiet, si nucleos aqua ante triduum macerabis. Aliqui dicunt fructum pineum translatione miscere: sed plantas hoc modo procurant, ut prius multa semina in caliculis terrâ & fimo repletis obruant, quæ ubi processerint, relicto eo, quod solidius est, auferant alia: ubi iustum cœperit incrementum, trimam plantam cum ipsis caliculis transferunt, quibus fractis in scrobe indulgent radicibus largitatem. Terra tamen equæ & sterco admiscet, facientes straturam alterno ordine subinde crescentem. Servandum est tamen, ut eius, quæ radix una & directa est, usque ad summitatem suam possit integra & illæsa transferri. Putatio novellas Pini arbores tantum promovet (quod auctor se expertum ait) ut quæ speraveras incrementa, duplicentur.	Cultura:
<i>Petr. Crise. figmentum.</i>	Pro Pino absurdum figmentum habet <i>Petrus Crescentius</i> , Sedum arborelescens referens quodammodo.		
<i>Lobel. natura.</i>	Dicitur hæc <i>Lob. Pinus vulgarissima</i> , quod mirum videtur, nec enim aded vulgaris est. <i>Tabern. Pinus domestica</i> . <i>C. Bauh. phyt. de Pino</i> obscurior est, Pinumque sylv. fortè intelligit cum dicit: <i>Peucedanon à πικρὸν</i> , quæ Latinis Pinus vocatur, quod folia eius cum Pini foliis similitudinem quandam habeant, unde & <i>Pinastellum</i> quidam dicunt.		
<i>C. Bauh.</i>	Præter verò quotidianam experientiam communis auctorum consensus, Feri in <i>Genesim</i> falsam opinionem meritò ridet. Pinus, inquit, nullum fructum fert, sed solum semen. <i>Goropium</i> consulere debuisset dicentem: <i>Plinius</i> glandes è pomorum numero exclusit, nescio quæ de causa: cum mihi æquè atque Nuces pineæ, de quibus non dubitatur, hanc nomenclaturam videantur mereri.	Manus:	
<i>Poma.</i>	Pinus, græcè plurimis <i>πικρὸν</i> , aliis <i>πικρὸν</i> malè, germ. <i>Zirbelbaum</i> / <i>Fichtenbaum</i> , Belg. <i>Pinapselbaum</i> , gall. <i>Pin</i> , Ital. & Hisp. <i>Pino</i> , Angl. <i>Pine tree</i> , Bohem. <i>Borowico</i> , polon. <i>Soski</i> . pinus quidem ut <i>Matthiolo</i> placet à pinnato foliorum acumine. <i>Castel. & Catal. Pino negro</i> , portug. <i>Pinheyro negro</i> . Fructus eius græcè <i>πικρὸν</i> , Lat. <i>Strobili</i> , Nuces pineæ, germ. <i>Zirbelnüsslin</i> , gall. <i>Pignons</i> .	Nuclei verò ipsi purgati durare non possunt: tamen aliqui in vasis fictilibus novis, & terrâ repletis cum testis suis missos asservunt custodiri. Et nucleis Pini missis <i>Lugduno</i> per honestum virum <i>Sebast.</i> <i>Hiebertin</i> & alios, Pinus in horto <i>E.C. Cæpili</i> mihi provenit, sed faciliè perit. Eadem causa fortè fuerit, quam <i>Camer.</i> in horto assignat. Pinus, inquit, Italica ex semine enata prodit, sed Hyemis frigore intensiore faciliè, nisi in fictili recondatur, perire solet. Dum recens è terrâ emergit, nuclei putamen non incommodè admittitur, sed nucleus proptus si auferatur priusquam sua sponte decidat, plerumque germen enascens, cui tanquam munimentum à natura datum est, & foliis coniunctis oblongioribus adhæret, perire solet.	Asservatio:
<i>Synonyma linguar.</i>	pino à poetis apud <i>Ravissium</i> hæc epitheta attribuantur. <i>Nautica</i> , <i>pontica</i> , <i>amans litorea</i> , <i>virens</i> , <i>florida</i> , <i>procera</i> , <i>alta</i> , <i>ardua</i> , <i>conifera</i> , <i>picea</i> , <i>odora</i> , <i>pinguis</i> , <i>cornigera</i> , <i>acuta</i> , <i>multifida</i> , <i>capitata</i> , <i>nutans</i> , <i>sylvestris</i> , <i>hirsuta</i> , <i>cava</i> , <i>garrula</i> , <i>Berecynthia</i> , <i>Cibeleia</i> , cui sacram fecerunt, quanquam & <i>Pani</i> sacram legerimus. His adde ex <i>Theoph. nodosa</i> , <i>ser squammosa</i> , <i>refusa</i> , <i>ingens</i> , <i>rotta surgens</i> , ex <i>Guidone flammifera</i> , <i>pronuba</i> , <i>tumida</i> , ex <i>Virg. pinus</i> in hortis pulcherrima.	Nuclei verò ipsi purgati durare non possunt: tamen aliqui in vasis fictilibus novis, & terrâ repletis cum testis suis missos asservunt custodiri. Et nucleis Pini missis <i>Lugduno</i> per honestum virum <i>Sebast.</i> <i>Hiebertin</i> & alios, Pinus in horto <i>E.C. Cæpili</i> mihi provenit, sed faciliè perit. Eadem causa fortè fuerit, quam <i>Camer.</i> in horto assignat. Pinus, inquit, Italica ex semine enata prodit, sed Hyemis frigore intensiore faciliè, nisi in fictili recondatur, perire solet. Dum recens è terrâ emergit, nuclei putamen non incommodè admittitur, sed nucleus proptus si auferatur priusquam sua sponte decidat, plerumque germen enascens, cui tanquam munimentum à natura datum est, & foliis coniunctis oblongioribus adhæret, perire solet.	Asservatio:
<i>Epitheta Pini.</i>	Proprium autem est huic arbori, ut falso solo latissime fructificet, quemadmodum apparet ex æmœnissimo pineto prope <i>Ravennam</i> . Dignum etiam est observatione, excisam nullam remittere ex virgibus radicum sobolem, sed prorsus emitti propterea <i>Cræsus</i> (ut est apud <i>Herod.</i>) minabatur se extirpaturum <i>Lamplacenos Pini in morem</i> . Dignum quoque & illud notatu, quod <i>D. Basil.</i> memoriz prodidit, pinus in cœnâs ac exustas flammis in quercera mutari.	Pini in morem.	
<i>Cybele sacra.</i>	Pini vires secundum antiquos videre est ante scriptas	Pini in morem.	
<i>Locus.</i>			
<i>Gesta notantur.</i>			



erubuisse, lignumque hoc fungosum, leve, suo adhuc cortice obductum, quod non modò nulli unquam prodesse potuit, sed etiam valde obfuit. Cuius incommoda cum multi magno suo malo sensissent, illud à suo usu abdicandum omnium calculo censuerunt.

*Pinus similis
et
Gefn. cum
suff.*

A loria Simlero & Gesner. confunditur Pinus propriè dicta, cum ea, quam Cembro dicunt. Ut id sit manifestum ex lib. hort. ipsiusmet Gesneri, dicentis: Pinus in Germania ferè nulla, &c. Pinaster, Pinus sylvestris in alius montibus Rhætorum & Valesiorum, nec ulla arborum (opinor inquit) aliùs nascitur. *Ein wilder Zierenbaum*. Nuclei quidem eius ut minores, ita etiam geatiores sunt, quàm Pini.

Pinus Zimbræ.

Anguill. Pinus montana apud Grifones proveniens *Zimbræ* vocata.

*Pinus Cembro, Cembri
et Cirmoli.*

Matth. Pinus sylvest. *Cembro, Cembri & Cirmoli* vulgò vocata, nucleis domesticis similibus, fractu facilibus. Facile adducor, inquit is, ut credam hoc nucum pinearum esse illud genus, quod Plin. lib. 15. cap. 10. *Tarentinum* vocat. Bellon. loco iam citato hoc Pini genus Pinastrum esse censet, sed non rectè. In post. autem com. It. eadem dicit, ac addit errare Anguillaram, qui velit Pinum Tarentinam, vulgò dictam Cembro, esse Pinum montanum sylv. Theophrasti.

*Pinus Tarentina.
Anguill. err.*

Bellon. excusatur.

Apollo rad. 9. non sine ratione videtur Bellonium excusare à censura Matthioli, ut qui non asseruerit hanc arborem esse Pinastrum Plinii, quamvis Pinastrum nominet, & in fine Plinii verba adducat: putatque Apollo hanc arborem esse Bellonio illegitimum Plinianum Pinastrum: & ex Bellonio vocat Pinum Tarentinam.

Pinus Belloniae n. off.

Dodonæo assentiri non possum, existimanti in Hist. Gall. *Zembro* esse Bellonii *suiffe*, quod non repetit in Hist. Lat. ubi Pinum sylv. alteram facit, & à Macedonum sermone sylvestri nihil differre ait, nam tractabilem & ad multa opera materiam habere idoneam.

*Pinus sylvestris
montana.
Theophr.*

Lob. Adv. Pinus à quibusdam *Cembro* vocata. Ic. Plant. Pinaster, Germ. *Wild. Fuchtenbaum*. Gall. *Pin sauvage*: Pinus sylv. montana Theophrasti. Alpigena in Pini arboris præcellæ emulationem, caudice recto & lævi accrescens: foliis Pini oblongis gemino ordine sitis: cono, strabulo & nucleo Pini minore, putamine minimè duro, sed cortice molliore.

Cembro.

Audivit Cæsalp. in Tridentinis montibus differentiationem quandam esse in genere sylvest. Pini, aspectu Picæ, foliis Pini, nucleis fragilibus, ut facile dentibus comminui possint, *Cembro* vocatam. Fuit autem huius fructus quem Tarentinum Plinius dixit, digitis fragili putamine, aviumque expositum furto in arbore.

*Non off. re-
da.*

Dalech. apud Plin. notat malè legi, Sextum genus [cognatarum arborum, cognitarum vet.] tedam esse propriè dictam. Etenim tedæ nomen *πλάτυνα* esse, ac nunc Pini resinolum & pingue lignum [πλάτυνα] significare, quod lucernæ candelæve loco utatur: nunc arborem sui generis, Theophrasto ignotam, quam *Cembro* vocent Tridentini, Allobroges *Anvia*.

Locus.

Tabern. Pinus sylv. *Cembro*. Pini *Cembro* folia & Conum habeo ab Illust. Principe, allatum Oenoponto, cuius nuclei plantati in horto Excell. Comitatus provenièrè visu grato, verum citò perièrè. Pinastrum maiorem (sic enim is vocat) crescere scribit Clus. in montibus Pyrenæis, & plenisque aliis Hispaniæ locis.

PINUS SYLVESTRIS, SIVE PINASTER.

CAP. V.

PINASTRUM in bina Theophrastus partitur genera. Alia enim *Idæa* est, alia *Mariuma*, & tertia *Sterilis*, de quibus plura cap. de Peuce vet.

*Pinasteri
genera
Theophr.*

Meminerunt Pinastri plurimi, sed titulo tenus duntaxat, non demonstrantes quam arborem intelligant. Alii quidem Pinum sylvestrem rectè statuunt: sed hanc non distinguunt. Hist. Lugd. de Pinastro meliora docet. Sylvestrem enim Pinum sive Pinastrum (Pinaster enim ut scribit Plin. nihil aliud est quàm Pinus sylv.) in fructiferam partitur & sterilem, Fructiferam in *Idæam* sive montanam & *maritimam*. Montanamque sativæ similem dicit, ac nuces edere similes, solidas, ex simili squammarum congerie compactas, resinolas, odoratas. Huiusmodi verò montanas Pinus in multis Hispaniæ & Lusitaniæ montibus crescere, adeò fructuosas, ut inde maxima nucum pinearum copia per totam Galliam distrahatur. *Sterilem* autem vocat, non quòd nullum edat fructum (conos enim fert) sed quia nuclei edules non sint, nec cibis utiles. Sterilibus [addit præterea] Pinastri Arvennorum, Vellaumorum & Allobrogum montes abundant, ex quibus resinam colligunt, & picem optimam conficiunt, vocantque *Pinus sauvages* & *Pinustreans*.

Pinus sylv.

*Pinus sylv.
fructifera
et sterile.
Fructifera
duplex.*

*Sterilis
autem
dicitur.*

Pinastrum scribit Plinius mira esse altitudine quod minimè verum esse videtur. Nam in hoc arborum genere Abies, Picæque nostrates altitudine mediocri, tamen Bellonius prodiderit & Dictæos Pinastros in vastitatem diffusos, ad insignem altitudinem assurgere, & eos qui in Olympi Phrygiæ montis aut aliorum gelidissimorum montium summis, culminibusque proveniunt, Abietis esse rectitudine. Sed is Pinum *Cembro* pro Pinastro describit, depingitque absurdè. Iustior est Matthioli reprehensio, quam fugere non potest Bellonius, dum Pinastri vocem ex versione Latina frequenter se legisse scribit apud Theophrastum, eum tamen Theophr. fuisse incognitum, quod in Græciæ Asiæque montibus non nascatur, itaque nullum esse ex Græcis authoribus, qui Pinus sylvestris, Pinasterve meminerit. Quid? nonne Theophr. *πινύλη* aliam cultam, incultam aliam prodidit? Nos equidem nihil aliud esse *πινύλη*, quàm Pinum probavimus, & *πινύλη* Theophr. Pinum sylv. sive Pinastrum esse statuimus.

Pinus sylv.

*Pinus sylv.
et Pinaster
Belloniae
montana.*

Bellon. excusatur.

Pinastrum appellat Clus. Pinum sylvestrem sequutus Plinium, qui quæ Theophr. *πινύλη* dicit, ad Pinum sylv. transtulit. Eius autem in suis peregrinat. varia observavit genera: terna in Hispaniis, quaterna in Austriacis Pannonicisque montibus, & sylvis.

*Pinasteri
genera
notata.*

Pinasteri.

Pinastri ergo nomen seu Pini sylvestris pluribus attribuitur plantis. Pinastrum Plinii & *πινύλη* dicitur, quidam eam Pinum existimant, quæ culta non est, alioqui similis sativæ, formâ non differens ab ea, ut cæteræ, quæ proponuntur. Pinastri vocabulum assumpsit quoque Pinum *Cembro* dicta. Pinaster dicitur de Pinu sylv. vulgari *Genevensi*. Item de Pinu sylv. *Hispanica maiore* Clus. De Pinastro maiore Austriaco albo & nigro, De Pinastro Austriaco tenuifolio, De Pinu sylv. sive ut vult Bellonius de *Picea sylvestri* Ida *Troadis*, cuius coni facile decidunt, De Pinu sylvestri *Mughe*, sive

*Pinus sylv.
et Pinaster
Belloniae
montana.*



Teda Di-
fcor. &
Plan.

Teda (si modò fiat) *Teda* nomine vocari posset. Verùm ex eo quòd Dioscorides *τὴν τέδα* & *τὴν τέδα* particulatim *τέδα*, si in aceto co-
quatur, & decocto dens colluatur dolores levare
scribit: Atque cap. de Ol. Candido ubi *τέδα* su-
fida describit: *τέδα* præpinguis pinus assulatim
concisa cum aliis pondus aliquod præscribit. Et
eoque quod Plinius Laricis morbum esse scribit si
τέδα fiat &c. Nec non etiā Theophrasti autoritate
fretus, concludit Bellonius planè perspicuum esse,
Teda non esse arborem sui generis, ac nullam
esse arborem quæ peculiari nomine *Teda* vocetur.

Nulla ar-
bor est, qua
Teda vocetur.

Pinaster.

Pinaster, ut vult Tragus, in Germania vulga-
ris est notitia, & facilè provenit, quocunque lo-
co plantetur. VVasgoviz admodum familiaris
est, præsertim oppido Cæsareo Luthræ: folia ge-
rit multò quàm *Pinus* crassiora, duriora, & no-
centioribus aculeis armata: conos quoque ac-
quirit breviores & duriores, exiguis prægnantes
nuculis: multam hæc arbor resinam destillat vul-
nerata, Germani *Ein wilden Binbaum* / *Byffer-
baum*, & in superiori Germ. *Forenbaum* / aut
Holz nominant. Hæc ille. Si verò eandem
quam nos, intelligit arborem, non in omnibus
placet descriptio, potissimum quòd ait folia cras-
siora, quàm *Pini*. Seminibus etiam in vulgari
nostra sylv. *Pinu*, nucularum nomen haud con-
venit: Sed *Pino Cembro* potius congruit. Con-
siderandum præterea Tragum scribere cap. se-
quenti quasi de arbore à modò dicta diversa, quæ
sequuntur. *Pinguis* illa arbor, quæ hybernæ in
quibusdam locis facies præbet, ad *Abietem* quo-
que tanquam species eius refertur. Quartum hoc
Abietis genus Germani *Ellen* nominant. *Teda*
quibusdam appellatur, à quibus in præsentia non
discedo. Difficile autem assertu quid Tragus ve-
lit, quia non demonstrat quā in re differat sua
Teda à suo *Pinastro*, quem describit præcedenti
capite. Is ut regeret suam ignorantiam se otio-
sis diligentiorē & exactiorē nominum in-
quisitionem relinquere ait: quos monet ut in
hanc rem Vallis Alpes, maximèque eas, in
quibus S. Bernhardus habitat, perlustrent. At
non fuisset sanè otiosi hominis, sed boni Botanici
arborem describere. De qua si, vel liquidam sen-
tentiam suam protulisset, vel planè tacuisset:
nullam nobis occasionem vellicandi ipsius igno-
rantiam præbisset.

*Quilp-
gularum.*

*Picula.
Picea.
Picea
montana.*

Theoph. Gollus in Onom. *Pinastrium Wilden
Fiechtbaum* à *Teda* *Binbaum* / ut à diversa arbo-
re separat, demonstrat se nescivisse quid scriberet.

An Petro de Crete. *Abies* & *Picula*?

Bellon. conif. *τὴν τέδα*, *Picea*, vulgi Græcorum
τὴν τέδα, & circa Lugdunum *Pinus* aggregatis, *Pin
sauvage*, sed falsò: figura etiam quam habet non
placet. Eadem de negl. cult. *Picea* montium, ut
Tarantz, omnium qui Luteriā Lugdunum profi-
ciscuntur, oculis subiecta. An verò eidem Obs.
& conif. *Picea* Dictæ montis, ex qua *Teda* in
Creta, & de qua sub titulo, *Pini sylvestres*?

An *Picea
Ditæ
montis?*

Pini sylv.

Matth. in Diosc. *Pinus sylv.* numerosa virens in
Ananiis, reliquisque Tridentinis montibus, fru-
ctu parvo, brevi, quamprimum arescente, affa-
tim dehiscente, & ex arbore decidente. Is figuram
habet, eamque in prioribus comm. & Hist. Germ.
Pinum sylvestrem inscribit, atque ex ea in Bohe-
mia & Germania *picem* fieri ait. In post. verò
comm. *Pinum montanum* vocat.

Error.
Cass. Dur.

Cass. Durant. non describit suam *Pinum syl-
vestrem*, cuiusque figuram secundò proponit sub
hac inscripione *Pignoli pargari*, viettore aliquo.

Pinus, ut apud Sturm. Hist. Helv. legitur, mul-
tis dicitur de *Forchenbaum* / aut *Fiedern*, licet sit
particulare genus: quod à Plinio *Pinaster* voca-
tur.

Lonic. sub titulo *Festebaum* malam *Pinasti*
figuram ex Trago depinxit. Vocat autem cap. se-
quenti *Feuren* / oder *Ellen* / auch *Elischer Bin-
baum* & *Byfferu*, Lat. *Teda*, Græcè *τέδα*.

Anguill. *Picea*, *τὴν τέδα*, Plinio dicta. *Phico-
phorum* & *Picea sativa*, & *Teda*. Habet is figu-
ram Matthioli postremam, quæ convenit no-
stræ *Pini sylv.* *Tater* sive *Teda* dictæ: conveniunt
& ea quæ dicit.

An Lob. & Penz Adv. *Pinus* altera nuce mino-
re, ferè *Laricina*?

An Dodon. Germ. *τὴν τέδα*, *Pini sylv.* seu *Pin-
stri* prima species, & *Pinus Tarentina* Plinii. Gall.
Aleve & *Eleve* Bellonii? Fallitur Dod. existimans
esse *Pinum Tarentinam*, *Aleve* & *Eleve* Bellonii,
est enim *Eleve Cembro* Matthioli: descriptio
etiam confusa videtur: ac præterea confundit et-
iam Theophrasti *τὴν τέδα*, arborem peculiarem, cum
τὴν τέδα.

Ryff. in Diosc. cū dicit, *Piceam* aliis dici *Pin-
Fiedr* *Donne* intelligit *Pinum sylvestrem*. Con-
fundit autem, ut & Lacuna, *Picea* n. Bellonii cum
Picea Matthioli.

An Celsus. *Pinaster* in cæteris [cum *Pinu*] simi-
lis, sed graciliori caudice: nuce pyramidalis: nu-
cleisque ob parvitatem inutilibus, præterquam
ad columbarum cibum?

Apollo contra Matthioli sententiam existimat
Bellonii *Piceam* non alludere ad *Pinastri* aliquod
genus à Matthiolo depictum. Ego verò potius
huic quàm illi assentior, quoniam sit cuius
Matthiolum redarguam, quòd videlicet Theo-
phrastum *τὴν τέδα* scribentem malè intelligat:
nam has duas voces coniungit non coniungen-
das, ac *Pinum sylvestrem* interpretatur, quum
τέδα sit *Aquifolium*, non autem adiectivum, ut i-
pse putat, *τὴν τέδα*.

Piceastrum, inquit Gesnerus de hortis, in altissi-
mis montium nostrorum sylvis nasci aiunt, mate-
riā longè puriore & poliorē quod nondum satis
consideravi. *Piceastrum* esse puto, cui maxima
(ni fallor) rigidissimæque in coniferarum genere
folia sunt. In Catalogo verò dicit *Teda* vel *Tz-
dam* *Pinei* generis arborem esse, cuius assulis præ-
candelis uti possumus, *τὴν τέδα* Græcis: Germanis ve-
rò *Brenholz* dictam. An autem *Piceaster* eius
altissimorum montium huc refertur debeat, dubito.

Camer. ad hist. Matth. Germ. & Epit. *Pinus sylv.*
str. Tabern. *Teda*. Thal. *Pinaster*. Horto. Latit. *Teda*.
Pinaster *τὴν τέδα*: *Pinaster* *τὴν τέδα* ex montibus Bo-
hemis.

Pinus sylv. vulgaris, *Teda* cognominata multis, Nomina
τὴν τέδα Græcè, & *τὴν τέδα* Cordo, Belg. *Wilde*, *linguam*,
Pineboom, Gall. *Pin sauvage*, Ital. *Pino salvatica*.
Hisp. *Pino sylvestre*, Vng. *Vad senyo* / *Bos senyo*.

Hæc arbor abundat locis vicinis in Burgundia
circa Porentruum, in Sundgovia variis locis, ut
circa Bessfordiam ac Basileam in itinere Montbel-
gardum versus, unde aliquot vicibus transla-
tarum, ac in horto Montbelgardensi plantata-
rum, unica superstes mansit arbuscula à pluribus
annis lentè crescens. Verùm ex seminibus ex Har-
cinia sylva per E.C. missis egregie arbores adole-
verunt in huius Theriotrophio.

Ad tubulos pro fontibus expetitur. Cū essent
in Palatinatu cum E.C. observavi celebrem virum
D. Beuterichum in sylvis iuxta arcem suam *Pin-
Fiedr* *Donne* *Pinaster* *τὴν τέδα* ex *Pinis sylvest.*
vulg.





*Resina fa-
citur: mo-
do Theoph.
Gaza & Hermol.
error.*

*Plinii la-
psus.*

*Plinii item
restituitur.
Resina gra-
vis
Gaza error
alius.*

Plin. reproh.

*Resina du-
plex.*

Liquida.

*Colophonia
cur dicitur
Succa.*

*Cura confu-
sa.*

Impostura.

*Resina ori-
da.*

Guripotum.

*Pinus in
ferendis re-
gionibus
nulla.*

non annua, sed post plus temporis administrari solita est. Fit resina in hunc modum. Vbi iam vulnerata arbore, detractus tantum cortex est [non detracta teda, ut scribit Herm. secutus Gazam] resinam hauriunt, sic enim in vulnus invecum, humor copiosior confluit: ex Abiete vero & Picea non cortice tantum spoliatis, sed ipso etiam corpore, id est ligno vulnerato: haud enim quamque secretionem modo eodem agi mos est. Et hinc Plinius lapsus perspicitur, & Picea detracta tantum cortice resinam fluere dicentis: quod de Pino scripsit Theophr. Deinde eiusdem depravata hanc lectio manifestatur: Nec corpori ipsi paratur in ceteris, velut in ceteris: sic restituendus Plinius, corpori ipsi paratur, non ut in ceteris. Est huc porro Resina, non ita levis, quam quae ex Abiete & Lance & Picea [Gaza] & picea lignis, v. error Gaza in sua versione, qui tres hic tradit plantas, ac alias in modo interpretatur Lantem, modo Piceam] teda enim Pinus referta est. Sed vel ex hac Theophrasti sententia sequitur: & Pino non detracta teda, sed cortice tantum, Resinam colligi. Pinus siquidem non spoliata, sed referta teda est, ob quam gravior ceteris eius resina sit. Quam ob rem praeclare Hermol. & Pinu Resinam copiosissimam, ponderosissimam, picique proximam manare scribit. Plinius contra minimum resinam de Pinu colligi tradit, sed errat, Larici enim omnia ei tribuit, quae de Pinu Theophrast. dixit. Et sic Plinius Archetypum suum imitatur!

Ceterum, Resinae succi pinguis, summa, ut antea quoque diximus, species duae sunt, liquida & sicca. Liquida, ait Theophr. portatur utribus, dein sponte spissatur. Resinae liquidae, ut comprobatur Dioc. & Pinu & Picea manant. Haec in Gallia & Hetruria convehuntur. Quin & olim & Colophonia asportabatur, quae inde Colophoniz cognomen sibi vindicavit. Ex siccis autem Resinis, alia est strobilina, alia abiogna, de qua dictum, seu de alia picina, & alia denique picca.

Confundit certe Corn. si non decipit studiosum, dum ait: Quarum arborum sint singulae resinae, ipsae appellationes indicant. Falsum siquidem hoc est. Nam strobilinae resinae nomen, non strobilum, arborem particularem, designat [ut ipse sibi imaginariè persuadet,] sed eandem planè cum pineae resinae vocabulo quod Pinum denotat, significationem habet. Strobilus enim (ut iussus declaratum) unde vox strobilina derivata est, nihil aliud est, quam nux pinea. Strobilina igitur resina & pinea eiusdem arboris resina fuerit. Illa quidem parvis arboris [fructus,] haec vero totius.

Nostra tempestate, inquit Bellon. eadem impostura utimur, quae antiquissimi solerent, in adulteratione Thuris. Si quidem resinam Pini miscemus Thuri. Sed fraus deprehenditur odore, vulgusque nostrum resinam illam Guripotum nominat. Subolscebat fraudem istam suo tempore Dioscorides, qui in cap. de Thure scribit Thus in itinere, inquit, adulteratur Pini resina: quae res mihi absurda videretur, nisi in itinere dixisset: utpote, quod illae regiones externae, quae admodum calidae sunt, Pinum non generent. Idèd, ut nobis Thus peregrinum est, ita & illis resina Pini. Prisca aetas ea omnia adinvenit, quae nunc à nobis perficiuntur, aut saltem his simillima. Ex quo liquet nihil à nobis

nunc scribi posse quod non antè ab alio excogitatum sit.

Inferenda duo ex Plinio: Vnum, Resinae florem crudum ab eo dici, tenuem resinam crudam & sicca partem quae in ea veluti bullat, & efflorescit: Alterum permutum id videri quod scribit: Resina omnis dissolvitur oleo: quidam & creta figlinarum hoc fieri arbitrantur. Resinam enim creta liquari aut dissolui posse verum non est, atque adèd si quis resinam liquatam cretam, vel aliud aliud terrae pinguis genus admiscet, masla fit durissima, & quovis cemento solidior: quare locum sic corrigendum esse quidam arbitrantur: Resina omnis dissolvitur oleo: Pudet confiteri maximum iam honorem esse in evellendis pilis: Quidam creta figlinarum hoc fieri arbitrantur.

Est porro de resinæ coctura dicendum. Liquida resina in offas cogitur duras, & solidas, ducentorum fere pondo singulas, in aquae duplo tandem cocta, quousque odorem amittat, friabilisque & tam arida reddatur, ut digitis iam non cedat, nec eorum vestigium recipiat, ut sit eum eius lentor nondum prorsus consumptus est. Est autem liquanda & colo defaecanda, ut saeculentae sordes secernantur, priusquam in ferventem aquam coniciatur. Hoc coquendi artificium resina candidissima evadit, ac fere nivea, et amfi antea, vel oleosa, aut mellei coloris, ut Larigna, fuerit. Ex quibus perspicere licet Ruellium Dioscoridis, hac de re verba rectè non expressisse: Donec, inquit, friabilis, ac retortidareddatur, & digitis cedat, cum legendum sit, *ἡ ῥηὴν ὅτε μὴ τῶν δακτύλων ἔχῃ*, id est, anda ut digitis non cedat: deinde: resina sit etiam eximi candoris, si omnis eliquata percoleatur, &c. Verendum erat, sit autem (hoc subaudi, coquendi supra dicto modo) eximie candida. Omnem autem resinam liquare, & colo defaecare antea oportet. Sed & Dioscoridem ipsum mirantur plerique ac iure quidem, cum declarat modum spissandae in aqua fervente resinæ liquidæ, cum eam uti [ῥηίδαν] dixisse, & non potius elixari [ἑλίσσαν:] Spissatur etiam resina cocta sine aqua in cortinis aeneis subiecto primum igne lento: deinde ubi coire coepit, carbonibus liberalius aggestis, & aucto igne, ut quicquid feroci est exhalet. Si liquidam durare & in offas redigere hac ratione libet, coquenda ea est sine intermissione diebus ac noctibus tribus, quoad odoris exers, friabilis, arida, nec sub digitis lentescens existat. Sin iam siccam in offas ducere placeat, uno die coxisse sufficere.

Haud absimilis est coquendi modus hodie Chymistis usitatus, oleum & Terebinthinae elicientibus. Phialam ingentem vitream, luto oblitam & resinam, ad dimidium usque impletam furno imponunt, alterius vacuae, & quod stillat excepturae collum in eius fauces inferentem. Dein ea cautione, quae dictum est, ignem accendunt: Fluit primum liquidus sudor Resinae, aquam Chymistae vocant, Pissellaeque veterum is respondet: abiicitur vero tanquam inutiles, tamen ad ea valeat, ad quae Pissellae commendatur. Sequitur oleosus liquor, qui cum totus exstillaverit, arida & friabilis in phialae fundo resina superest: Colophoniam hodie nominant, magni, ut & olim, in medicina usus. Scire tamen licet nominis Colophoniz multiplicem significationem fuisse. Sic enim dicta quondam fuit Resina autore Galieno, & resina cruda; ex Picea, Pinove sicca,

*Resina flor
cruda l. l. m.*

*Resina dissol-
vitur a-
leo.
Creta non
dissolvitur.*

*Lacus Plin.
ut corre-
dat.*

*Resina co-
ctura in
genera.*

Ruell. taceat.

*Ruell. corrigi-
tur.*

*Diosc. im-
propria l-
lectio.
Resina sp-
sanda re-
tro.*

*Loquuntur
modis Chy-
mistarum.*

*Aqua res-
ina.*

Pissellae.

*Colophoniam
Colophonia
varia signi-
ficatio.
Resina cruda.*

Error quodam. titu in hoc Dioscoridis contextu resinam piccam pro pinea [*πικρία*] falso interpretari. Si enim Strobili pinci fructus sunt, ut abundè docuimus, vinumque è Strobilis eisdem effectus cum resinato præbet, ut autor est Dioscorides, qui vis sanè facili conjecturà assequitur; non piccam, sed pineam resinam esse interpretandam.

PIX IN GENERE.

Pix è quib. arborib. elicatur.

Plinij error.

Hermol. & Bellon. taxantur. Picem faciend. modum Theoph.

Cautio in cognoscendo picem.

Tempus coctum.

Teda delat. Idæ.

E Pinguissimis, maximèque resinosis, & in tedam conversis, Pini præsertim, Picæq; lignis, vi ignis Pix elicatur. Quibusdam tamen in locis propter Pini Picæq; penuriam, è Cedro, Terebintho, cæterisque similibus colligitur. Qui Macedoniam colunt, autore Theophrast. ne Pinum quidem picis gratia urunt, præterquam marem. Sterilem enim marem nuncupant. Fœminæ verò radicem tantum accipiunt. Omnis etenim Pinus tedam in radice gerit.

A vero igitur alienum est, quod Plin. de picis materia scribit. Pix, inquit, nihil aliud est, quàm combustæ resinæ fluxus. Quare Hermol. & cum secutus Bellon. cum hac definitione picis notionem parùm explicatam esse intelligerent, dixerunt, picem esse combustæ in teda sua resinæ fluxum. Sed hæc cum Plinii verbis coincidunt, nec meliora traduntur.

Picis faciendi modum Theoph. fusissimè describit. Picem, ait, vrere [urendo elicere potius] hunc in modum consueverunt, cum locum æqualem præparaverint, & veluti atcā concursum habente, in medium diligenter pavimentarint, truncos perfillos componunt: proximè sanè compositioni carbonem facientium, præterquam quòd sine fossa opus perficiatur, lignis erectis & inter se cohercentibus, ita ut altitudinem assidue pro multitudine capiant. Quod fieri ajunt cum compositionem descripserunt circuitu centenorum octuagenorum cubitorum: altitudine verò cum plurimum sexagenorum, & centenorum, & quinquagenorum, ambabus, si teda pinguissima sit. Cum igitur teda ita construxerint, & materiam pertexerint, aliqua terra superinfusa undique, summa cum diligentia occultant, ut ignis nulla ex parte emicare possit. Pix enim petibit, si id acciderit. Succedunt autem per aditum relictum: dein eam quoque partem stipant matenæ, & obstruunt terrâ, reliquæque omnes observant, & quacunque fumum protrudi viderint, scalis scandentes, terram assidue infundunt, quò nullo pacto flamma erumpere possit. Canalis verò per medium structus acervum, picem fluentem in foveam ducit, cubitis circiter quindecim ab acervo. Pix effluens tactu frigida fit. Vritur duos dies, & totidem noctes cum plurimum: Sæpe enim posttridie ante Solis occatum exusta jam est, rogusque cessat. Id enim evenit, cum nihil reliquum est, quod amplius fluat. Totum autem tempus, quo teda uritur, vigilantes observant, ne quid ignis erumpat, et sacrificant & concelebrant precantes, ut pix sibi copiosa bonaque fiat benignitate deorum. Macedones & Idæi, qui Pinos [*τὰ δένδρα*] discernunt, & aliam Idæam [*montanam*] aliam marinam cognominant, picem fieri ajunt ex Idæa largiorem nigriorem, dulciorem, tedatiorem, in totumque faciliorem, & odore gratiorem, dum cruda sit: Ex marina autem flaviozem & crassiozem. Atque plus picis imbris frequentatis, quàm squaloribus reddi volunt: & ex hybernis, opacisque lo-

cis, plus quàm ex apricis, serenisque. Bellon. lib. de conif. alium picis coquendi modum Cretensibus receptum tradit, cuius verba hic adponimus, quibus melius ea, quæ ex Theoph. annotavimus, intelligi possint. In Creta, inquit, nostro seculo eodem fere modo picem excoquunt, parvâ ab his, quæ à Theoph. differentiâ. Furnum in sublimelatum extruunt, ad ima in angustum desinentem, quâ parte craterem paulò inferius construunt, deinde struem quandam lignorum superiniiciunt. Ignem postea desuper accendunt, qui oleosum ligni liquorem inferius subsidere ad ima compellit, qui petens exitum per meatum descendit, seque in foveam vicinam recipit, ex qua pix nigerrima emanat, quæ omnium optima censetur. Nigrior efficitur, si ligna multum sicca fuerint, & multò magis si assulatim scissa sub Solem totâ æstate permanerint. Hoc modo pix fieri solet, sed ex prima fovea ad minores transfunditur, in quibus cum refrixit, cogitur, atque induratur. Pix optima purissimaque, quam loca admodum aprica & Aquilonia præbent. Contrâ, quam opaca, horridior, limumque referens: locis enim admodum depressis atque opacis, nullo quidem pacto Picea [*Pinus pinaster*] gignitur.

Pix ut tradit Plinius duobus fit modis. Prior is est, quem à Macedonibus observari mox à Theoph. scriptum est. Posterior verò hic. Ingentibus valis terra defossis laminam ferream multis foraminibus perviam, vel ambiente canali cinctam adaptant. Super hanc, furnum extruunt, teda assulatim cæsa complent, & obturant: ac ignem accensum extrorsum circumdant. Fervescens teda picem duorum generum mittit, liquidiorè & spissiorè. Liquidior seu humidior ac primò defluens, aquæ perquam similis est. Altera spissior & crassior, quæ vasculis collecta, in quibus servatur, aceto densatur, ac cogitur.

Quæ alium ignem non experta est, quàm cuius calore fluxit, id est cruda à Theoph. sæpe dicitur: Latinis verò pix liquida, quam nonnulli Dioscoride teste Conum [*Κόνιον*] appellant. Arab. *Eerfs*, *Zefs*, aut *Kir*: Germ. *Weich Bech*: Belg. *Teer*: Gall. *Pix fondue*: It. *Pice liquida*, Hisp. *Pex liquida*. Harum prior, inquit Plin. aquæ modo canali fluens in Syria Cedrium, sive Cedria cognominatur, quia Syri cum Pineis & Piceis carerent, rarissimè Terebinthos, sæpius Cedros ad picem conficiendam urebant. Rectè igitur Diosc. Cedrium ex Cedro colligi scripsit. Et hinc meritiò Bellonii opinionem improbamus, qui ex quavis arbore resiniferâ huiusmodi fluentem liquorem Cedrium vocat. Altera autem liquida spissior, *Pix brutia* appellatur: in hoc solum à prior differens, quòd aceto aut duriturnitate spissata sit, ac colore fusco, & pinguior.

Picem autem liquidam in cortinas comedam aceto spissari, tradit Plinius. Bellon. igne spissari censet. Nos verò nihil immutandum dicimus. Aceto enim siccandi vim inesse, cuius perspicuum est.

Pix arida fit è liquida iterum cocta, cuius itidem duo genera. Coquitur enim duplici curâ. Ac unâ quidem, eò usque tantum dum ad visci crassitudinem coacta sit. Alterâ verò igne tam validâ, & tamdiu continuato, ut absumpto prorsus humore (per quem alias tenax est) arida, fragilis, ac rasilis fiat. Hæc Græcis *ἔκρηξις*: Latin. *Arida* aut sicca pix. Germ. simpliciter *Bech*: Belg. *Stec enbed*: Gall. *Pex sèche*: It. *Pice secca*: Hisp. *Pex seca*. Huius autem prior viscosa *Pice* nominatur.

Pici coquenda modus. Bellon.

Nigrior pix ex sicca teda.

Qua loca optimam picem præbeant.

Picis faciend. modus. Plin.

Teda fervens dupli. confundit picem. Liquidior. Spissior. Aceto densatur.

Pix cruda. Pix liquida. Nomina linguarum. Cedrium. Syri Pinos carent. Bellon. opinio reprobanda.

Pix brutia. Bellon. taxantur.

Pix arida. dicitur generatim. Viscida. Sicca.

Pix arida. Nomina linguarum. Viscida. Pix.

ex eo locum faciunt. Vfus autem eius duntaxat est ad naves picandas. Si quando cor de hac arbore rubri coloris montani indigentes offendunt, ipsum in assulas satis longas findunt, crassas instar pollicis, quæ candelarum loco illis inserviunt.

An Copei
P. Mart.

Fructus.

An de hac Pinu Indica P. Mart. cum ait. Gignit ex duobus arborum generibus picem insula Hispaniola, ex Pinu puta & arbore dicta Copei, quæ pix non aliter, quàm ex Pinu legitur, hæc dicant plerique stillicidio colligi comburendo eius lignum. Fructus autem eius parvus est, ut prunum, esui satis aptus.

PINEA INDA HISPANIS.

CAP. VII.

Pinea Indica
Hispan.
Boniam.
Indica.
Hyayama.
Hyayagua.

Spinosa
planta.

Color.

Odor.

Cortex.

Magnitudo.

Cera.

Folium.
Dorata.
Vires &
vires.
Appetit.
Genera.

Hydrog.
Hyayagua.
Boniam.

Hyayama.

Cultura.

DIGBY S. Oviedus, ait Cardanus, cui fides habetur. Is refert in Peru insula fructum esse omnium qui edi possint præstantissimum: quem Pineam Hispani à formæ similitudine; Indi Boniam, seu Hyayama vocant, atque è cuius genere sit, qui Hyayagua nominatur. Esse eni fructum pulcherrimum, gustu jucundissimum, odore suavissimum, ut ex quinque sensibus tres in eo maximè delectentur. Oriri autem ex planta spinosa, referturque Pineam figurâ, sed in summo vertice germen asperum, Liliij caudicis quasi instar prominere: colore Mali Medici esse, dum acerbus sit, & dum maturuerit, odorem Cotonei, adeoque valdè, ut unus ex his cubiculum totum redolere faciat. Corticem ut Pineis, inæqualem & inutilem, sed tamen non ut Pineis apertum, verum alio modo fructum ipsum mundari atque diuidi: Magnitudinem, qualis Medicis malis. Peronibusque: Odorem verò et si Cotoneo similis sit, gratiorem tamen, quod adulterinus, ac mixtus fragrantia variâ videatur: Succo præterea abundare, carnemque æqualem illi esse atque solidam, plantamque (ut dictum) spinosam, folio amplo: Vnicuique verò fructui caulem suum subici: maturefcere autem spacio mensium decem: quod si ante maturitatem præcidatur, plantam ipsam nulli vltui præterquam impinguanda terere utilem esse. Caulem, qui supra fructum sit, detractum plantatumque, genus suum renovare: folia verò similia Cardui, sed longiora, tenuioraque. Non seruari vltra 15. dies, & edendo pyrimolcati speciem referre: suscitare appetentiam extinctam. Eundem tamen saporem vini ingratum reddere, & bilem gignere credi: adeo nihil in humanis absolutum esse.

Multa autem illius tradit genera, acida, acerbata, alteriusque saporis, velut etiam in Pyris, aliisque fructibus, cæli, solique varietate & specie diversa, tum ipsarum plantarum cultu: habere & filia veluti Cardui albi, ob quæ dentibus noceat. Et neque aquam potam post ipsum sapere, adeo ut hydropicos, absterrendo à potu, iuvare possit. Ex his etiam Hyayagua, albam intus & vinosam, sed saporis esse acerbioris: Boniam, dulcem & ipsam albam, sed aliquantulum stuporiferam referre imaginem: ambas etiam has rotundiores: Hyayama verò oblongiorem, lutei coloris, intus obsecrari: atque hanc omnium præstantissimam.

Additque rustici operam maximè fructum hunc sentire videri, quando agrestes cultis longè sint inferiores. Immaturos verò decerptas quandoque vsque in Hispaniam transferri: attamen cum in propria arbore non maturuerint, gratia maio-

rem partem amittere: germina quoque translata Tempera corrupta fuisse. Esse verò humidum, addit Cardanus. in hoc fructu tennè, tum pingue, tum aqueum, ostendit copia succi, fragrans odor, brevis vita: & quod marcescat citò.

PINEÆ NVCIS SPECIES

MELINKEN.

CAP. VIII.

NARRAT Thevetus Notum mare Indici insulam innumeris fructibus abundare, inter quos, qui ipsorum lingua Melinken nominatur, magnus est, nucis pineæ specie, cortice luteo, quo spoliata carnem & in particulas confectam si degustaveris, saccharum ore continere dixeris, cum pauxilla nucis Moschatae portioncula permixtum. Hoc Barbari præsertim ad sedandam sitim utuntur.

Locus.
Ad clausum.
Descriptio.
Cera.

Vilus.
Similis
Mela.
Arbor Mela.
lentum.

Fructui Nana satis similis est, nisi quod Melinken in arbore provenit, Mori serè procentate, nigro cortice vestitus, folio quadantenus rubescens, longitudine & latitudine folii Angelicæ. Nana autem planta est foliis lunco similis, nunquam ad tantam altitudinem crescens, de qua lib. 26.

PINEI CONI FACIE FRVC.

TVS EXOTICVS.

CAP. IX.



Pediculo minimi digiti serè re crassitudine, rufo, duro atque lignoso, folia mutuo incubitu adnascuntur digitum serè longa, firma, substantiâ lignosa, triquetra, principio angustiore, reliqua parte latiora, & fastigio tenus recurva, numerosisque squamulis foliaceis lucentibus, nigrisque vestita. Hæc pars quæ recurva, modico inflexu separatur, ita ut fructum esse squamosum suspicio sit. Folia quæ intus delitescunt, extimis breviora, & densiore dictorum foliorum stipatu obsepta. Per quorum longitudinem extimam costâ insignis angulum faciens excurrit, parte internâ carinata, Sapor nonnihil amaricatus, non sine adstrictione nidorulenta, ac si fructus in fumo esset exsiccatus. Partes ex comestione, dentiumque attritu hærent, quod argumento est, substantiam nonnihil esse viscosam.

Descriptio.
Folia.

Squamula.

Sapor.

Fructum hunc communicavit nobis chariss. frater C. Bauh. qui eum coni speciem quodammodo gereret, ut ex figura, colore, & foliorum mutuo incubitu videre est, coni facie fructum

Substantia
Inferiora
matura.





incorrupta magis ac emori contumax, quam Laricis. Sed dicamus Plinium in illo loco Laricem non intellexisse, sed duntaxat arbores resiniferas Theophrasto cognitae Abietem, Piceam, & Pinum quæ duabus prioribus materie præstat. Sed rogabit porro aliquis, quomodo Larici convenit, eam nec ardere, nec carbonem facere, nec ignis vi consumi: item nec florere, nec fructum ferre, contrarium siquidem hodie ei eveniat, ac magis ipsi Pino: imò nulla arbor reperitur, quæ vi ignis ut lapides resistere valeat? His respondetur Plinium hæc non ex sua observatione habuisse, verum temerè ab aliis tradita, ceu alia multa, historiarum verè loco accepisse, eiusque loco retulisse. Nunc quod restare videtur, non negamus Plinium quædam Larici assignasse, quæ de Pinu Theophr. dicit, & quibus hoc maximè urget, eius morbum esse, ut teda fiat, qui certè proprius Pini morbus est: ac sic fatemur cum Pinum & Laricem inter se confudisse, cum idem etiam arguat vis & facultas illa foliorum Laricis, quam Diosc. Pini foliis adscripsit.

Cæterum, figura Dodonæi Gall. non placet, nec quod dicit folia esse *dehiquescentes*, dissecta. In hist. autem Lat. errorem agnovit, ac sic correxit: folia ab uno tuberculo multa simul coherentia. Pingit verò is arborem & ramulum qui omitti potuisset.

Laricem, inquit Turnerus quavis Diosc. non describat, Plinius tamè id facit, sed non usque veritatem assequitur. Recentiores, attestante quotidiana experientia, Laricis lignum, non minus quam aliarum fomitem ignibus præbere scripserunt. At Veteres ut Pallad. Vitruv. & ex his quoque Plinius non ardere Laricem, nec carbonem facere prodiderunt. Hic præterea sempiterna habere folia scripsit, quod utrumque falsum esse deprehenditur. Aut ergo errarunt illi, aut hodie vera Larix incognita est. Sed nulla ferè videtur notior. Quod autem Plinius ait ab Homero Laricem enumerari, id lapsui memorie Goropius condonandum censet. Siquidem Poëta de Larice ne literulam adiecerit. Cæterum Stumpf. Laricis lignum duplex esse tradit, quemadmodum Laricis fungum Agaricum dictum, marem & feminam, quod nondum affirmaverim.

Iosias Simlerus hanc Theophrasto & Græciæ ignotam testatur, propriam autem Alpibus Valesianis: folia verò contra quam Plin. asserat, qui *trunku* Theophrasti Laricem trāsulisse videatur, Autumno amittere scribit. Ego contra non Autumno, sed Vere folia decidua observavi.

Prodit etiam Solerius eandem Dioscoridi ad eoque ipsi Theoph. ignotam fuisse: additque errasse Diosc. Lanceam resinam Piceæ existimantem: ac Plinium Laricem & Piceam quoque confudisse. Ipse autem Solerio ut & aliis ad stipulat Gesner. hort. Laricem, inquit, Scaliger Græciæ ignotam prodidit. Theoph. quidem ignota fuit, aut sub *σιν* nomine comprehensa secundum Gazam, qui tamen alibi Piceam vertit, tanquam generale nomen ad utramque arborem. Lacuna, qui figuram Bellonii non admodum commodam exhibet, Ruellium merito reprehendit, quodd ei folia non decidua tribuat.

Lob. & Penz Adv. Obs. & Ic. Pl. *Larix*, cuius etiam figura in Icon. sub titulo Cedri Libani & Palestinz præcelz.

Andr. Cæsalp. in Tridentinis montibus Pini Tom. I.

silvestris differentiam reperiri, cui soli folia Hieme decidant, eximie proceritatis: cortice valde crasso, rimosoque intus rubente: ramis & caudice gradatim procedentibus, adnatis multis, more Salicis, lentis, colore luteo, odore non iniucundo, foliis densis, oblongis, mollibus, comosis, Pineis angustioribus, & minimè aculeatis: conis cupressinis admodum similibus cui & similis existat, cum novella sit odore non ingrato: cui v. flores incunte Vere emergant in cacuminibus in purpura valde rubentes, odoratique: materies durissima, præsertim in medutillio rubescens, in hac solum Agaricū reperiri: resinam fundere liquidā, quæ pro Terebenthina vendatur: atque hanc Laricem vocari. Et ita Laricem describit Cæsalpinus arguens & ipse Plinium, quodd ipsi Larici tribuat, quæ Theophrastus Pino. Quæ verò paulò post Larici adscribit, ex Plinio (quamvis eius mentionem non faciat) desumit. Dari autem Marem & feminam ait: in Macedonia quidem masculam vti ad Picem: feminæ radices tantum. Verum hæc non Larici, sed ipsi Pino Theoph. adscripsit, nec quidem apud Plinium legimus.

Ex eo autem quodd Plin. omnia [quædam] Larici adscribat, quæ Theoph. *πλιν* tribuit, factum esse arbitrat Clusius, ut perpetuam comam ipsi concesserit; contrarium quidem ipsa experientia nos docente. Is etiam à Theoph. non esse descriptam Laricem confirmat: ait enim Gaza Laricem, nihil aliud quam *σιν* esse (quam Pinum silv. esse aut Piceam aliquam silvestrem Bellonii antea diximus) licet eodem *σιν* vocabulo & Piceam & Laricem interdum interpretetur.

Larix, Græcè similiter adp. multis, ceu Fuchsis, Matth. Dod. Clus. & aliis; *Larix* quoque Lat. Offic. & vulgo *Larix*, Germ. *Ein Lerchbaum* Belg. *Lorberdooim* Gall. *Malese* Dod. & *Arbre retirant a un Pin ou Sapin*. Ital. ac Hisp. *Larice* Dod. & *Alerce* ut apud Clus. nonnulli asserunt, qui nullam in Hispania nascentem vidiisse meminit: item *Larice* Matth. Angl. *Lardtree* / Boh. *Orin* / Hung. ut Nomenclator Pannon. tradit *Doros senyo* / *Bibol* / terebintina *Lezom*.

Digna Larix arbor, quam *langvam* dicas, *robustam*, *impenetrabile lignum*, *incorruptam*, *ter squamosam*, *cariem nescientem*, *pondus valde sustinentem*, *Valesianam*, ac montes amantem.

Ambrunense territorium aded frequentem nutrit Laricem, ut nullo sumptu comparari possit, & integrum plaustrum vix asse Gallico constet. Tanta etiam nunc in Rhæticis Alpibus eius est frequentia, quanta unquam antea fuerit, atque aded iisdem locis, unde Tyberius Cæsar Romani advehi iussit ad Naumachiarum pontem concremarum restituendum. Apud Sedunenses sive Valesianos abundat. Si quispiam tum in Vallancem [locum absque dubio à Valle & Larice vocatum] tum in Briançonam appulerit, multas quidem illo Larices videbit, sed totum diem ante forsitan peragravit, quàm ei contingat, ut vel unam Agari feram offendat. In Viennensi saltu, tum aliis montibus, Alpibus vicinis, exceptis summis iugis, abundare Laricem scribit Clusius. Habemus quoque Laricem Montbelgardi in horto E. C. quam accepinus ex montibus Italia vicinis, quæ unica ex duodecim evasit.

Coni Autumno maturescunt.

Minimè in eius temperamento, Fuchsis auctore, ignis & aëris, humoris autem terreni plurimū. Hinc cum non habeat spatia foraminum, quæ possit ignis penetrare, sit ut eius vim (quem;

Defect. Car.
[ab].
Cortice.
Rami.

Folia.
Coma.

Flora.

Agaricus.
Resina.

Cæsalp. no.
Larix.

Larix fo.
[ab].

Larix Gal.
[ab].

Synonyma
in
linguam.

Epitheta.

Locus.

Tempus.
Temperamentum.

Plin. dicitur.

Plin. com.
[ab].

Dod. nota.
[ab].

Plinius la.
[ab].

Laricis fo.
[ab].
Stumpf.
[ab].

Locus.

Simler. no.
[ab].

Dioscor. no.
[ab].
Plin.

Plin. [ab].
[ab].

Ruell. re.
[ab].

Plin. [ab].

Vites. admodum paulò antè diximus reuocari, nec patitur ab eo citò lèdi.

Pannus. Adstrictoriam itaque facultatem, eius folia & cortices, ut Picea [& vivans Diosc.] obtinent. Laticis lignum magnifici aduersus elephantiam scribit Stumpsius; Similerus contra lepram. Reperitur in caudice vetustissime Larici, medulle vice, album quoddam corio persimile, quod pro

Sanguinis fluxio.
Vjus.
Pale. constringendis & agglutinandis vulneribus ac compellendo sanguine (undecunque fluxerit Amat.) multi usurpant. Iam verò, ut testis est Clusius, sunt ex ea vinetorum pedamenta & pali circa Neapolim, & iupra Badenses [Austria]

Canalis. thermas, totoque illo tractu, ut quæ corruptioni mundi sit obnoxia: item longissimi canales, tectis supponendi, & aptandi, ad pluviam & imbres ex his accidentes accipiendum: sunt enim commodissimi: nam cum firmà & solidà materie constent, diutissime Solis ardoribus & aliis aëris iniuriis resistere possunt, nec finduntur aut vitium contrahunt, eaque de causa non Piceis, nec alterius inductione egent. Horum magna copia Viennam advehitur quinquaginta pedum, aut maiore longitudine. Venalèque exponuntur ad portam Carinthiacam, quæ proxima est thermis Badensibus. Structurarum pondera, firmissimè & diuissimè sustinet, idquè Baptista Albertus adnotasse scribit, cum alibi, tum apud Venetias ex vetustis operibus. Vetus est opinio, à Plinio quoque

**Opinio Ge-
terum re-
probatur.** literis prodita, eam non ardere, nec carbonem facere, neque alio modo ignis vi consumi quàm lapides. Sed falsam fuisse hanc persuasionem inde constat, quòd apud Valesianos quibusdam in locis non alia ligna in usum foci adhibentur, ac

Carbonem. alicubi etiam in Alpibus ad ferrarias fodinas carbonem ex ea sunt.

AGARICVM.

Descriptio. Concretu fungoso Larici adnascitur Agaricò, nunc maioribus, nunc minoribus massis conglobatum, leve, candoris nivei, in farinam digitorum attritu friabile, sapore primum dulci, tandem amaricante. Reprobum, & candore cedit, magisque nigrescat, & minus facillè friatur: pondere etiam vincit. Vtrumque verò obvestit callosus cortex. Icona una cum Larice arbore iam antè est exhibita.

Si autem consulueris Veterum memoriam de Agarico videbis circa hoc Recentiorum à Veteribus discrepantes penitus opiniones.

Agaricum.
Diosc.
Radix. Agaricum inquit Dioscorides, radix fertur Sylphii similis, quæ non ita densa superficie, velut Sylphium, sed tota rara est. Duo eius genera sunt, alterum mas, alterum fœmina. Præstat, hæc strias rectas intus præferens. At mas rotundus est, & undique compactus. Sapor utriusque similis, ab initio dulcis, deinde ex distributione amarescens. Nascentur in Agaria Sarmatica regione. Et quidam plantæ radicem esse dicunt: Quidam in truncis arborum ex putrefactione, velut fungi, nasci tradunt. Nascentur etiam in Galatia Asia, & Cilicia in Cedris, sed friabile & infirmum.

Agaricum
nigrum. &c. Agarici verò nigri meminit idem de leth. cap. 36. his verbis: Veratrum album, & Thapsia, & Elaterium, & Agaricum nigrum, suffocationem inducunt, aut nimiam purgationem.

Agaricum
Plin. Agaricum, inquit Plinius, ut fungus nascitur in arboribus circa Bosphorum, colore candido. datur obolis iij. contritum, cum binis cyathis aceti mulsi. Id quod in Galatia [vetus Gallatia] nascitur, infirmus habetur. Præterea mas (spis-

sior, amariorque. Hic & capitis dolores facit. Fœmina solutior, initio gustus dulcis, mox in amaritudinem transit. Ita Plinius. Vetus tamen Codex pro Gallatia, habet Gallia. Et sanè in Gallia nasci hodie certum est, in Delphinatu maximè, imò etiam in Alpibus Germaniæ, ubi pessimo errore Dannelschwam, quasi fungus Pinorum, aut potius Abietum appellatur.

Officinis notissimum est Agaricum, & nomen retinet, quod ab Agaria regione ductum esse verisimile est.

De Agarico ita scribit GALEN. de Antid. lib. 1. cap. 14. Agaricum fraudem nullam admittit, de quo illud modo dicere sufficit, quod est ab Abietibus ante nos proditum. Optimum id Agaricum esse, quod levissimum esset: densum verò, grave, & lignosum abiectum. Quod autem inter hæc medium est, quantum signis, tantum & virtute ab utrisque distabit. Idem libro de Simpl. med. ipsi attributo: Agaricum ab arboribus excrevit, prout tubera, vel Bolei. Et est fractu leve, & quasi vanum: est pallidum valde & aspectu subrubrum: ut penitus subalbidum, non dissimile fusuri: gustui initio videtur dulce, sed ex lento evadit amarissimum. Quod autem est optimum, in Ponto maximè invenitur. Quod autem in aliis locis nascitur, multum est ineptius.

Paucis, at sufficientibus sanè verbis, ortum, genus, & delectum eius describit Mesues, lib. 2. de med. simpl. purg. dicens: Agaricus medicamentum efficax oritur in truncis arborum magnarum, vetustate iam putrescentium, & etofarum, tanquam earum vel Apostema, vel fungus. Est autem hic duplex mas & fœmina. Mas est maior, præsertim qui longus, niger, durus, densus, gravis, & qui in fragmentis, seu villos nervorum ostendit. Fœmina, si rotundior, alba, porosa, & valde rara, & frangi facilis, levis, dulcis primo gustatu, mox amara & styptica, est melior, præcipuè summa sui corporis parte. Nam stupes, quòd ligni putrefacti aliquid præferat, malus est, & erolus Agaricus.

Cordus in Diosc. Agaricus fungi genus, Germanis (quoniam plerumque in Abiete nascitur) Dannelschwam vocatur. Hæc ille inibi: Vbi minus prudenter ab imprudente & minus animi autoris intelligente, aut assequente, sequentia sunt annotata: Potius Lerschenschwam à Larice vocandus: Non assecutus est, inquam, mentem autoris. Licet enim Autor, ab Abiete, Etymologiam nominis, Dannelschwam/derivet: non ideo negat Lerschenschwam/ à Larice vocandum. Quod comprobant, quæ idem in Obs. silva postentau reliquit, inquit: Agaricus in Picea silvestri, Tada, Abiete & Larice: sed omnium optimus Larignus, hic enim solus est in usu Medicis.

Helffric, in onom. nimis generaliter Agaricum Boleyschwam germ. vocat.

Ineptit Lonic, qui Agaricum Dioscor. Fungum Abietum [Dannelschwam] vocare audeat. Ego sanè in Abiete Agaricum nunquam observavi.

Theod. Dorstib. easdem ineptias tradit. Eius etiam icon nullam arborem ritè exprimit.

Agaricum veteres Familiare medicamentum dicebant, non quia famulis propter copiam facilitatemque tribui solet, ut vult Io. Bodin. sed quia benignè evacuabat.

Confudit Iod. Galia Agaricum cum Antirrhino, tribuens utriusque eandem vires.

Fallopium, qui ignotum fuisse scribit quid ellicere possit, quod eorum abii radicem, alii

Mas dolor
res caput
facit
Plinius leon
refertur.

In Pice.

Eryman.

Agaricum
Galien.

Delectur.

Gal.

Optimum
in Ponto.

Agaricum
Mesues.

Duplex.

Mas.

Fœmina.
Delectur.

Fungus.
In Abiete
Videtur
Cordus.

In Tada.
Abiete, &
Larice.

Helffric.

mor.

Lenic. or.
ror.

Dorstib. or.
dargitur.

Familiars

medica-

mentum.

Bodin. su-

gularior

Alaria cap.

fusus.

An quo-

rum igno-

rantur.



Errat mul-
tum.

Porta re-
preh.

Cedrus Li-
bani.
Chithram
Arab.

Ligna An-
serpian
adferunt.
Lonicera
cru.

Acquiroca

Cedrus Li-
bani
Arbor Gua.

Juniperum.

Cedrus
Phoenicea
sive Oxyce-
drus.
Sabinum.
Abhel O-
rientis.
Elemis.

Citrus.
Citra ma-
lus.

Nabea sive
Palmyra
Athenas
quibusda.
Cedrus Ly-
cia folio
rosula.
Santalum.

Vires.
Cedrinum
Disce.

Tussis.
Atenfer.
Lepus ma-
rinus
Venenum.

Tempera-
mentum.

Hanc etiam non rite cognovisse Cordum, A-
matum, Apollinem, Ruellum, & Gorraxum,
ut nec ipsum Dodonæum, facile animadvertent,
qui eorum scripta considerabunt. Indistincte
etiam Porta de Cedro sic scribit: Aliunt Cedrum
fructum ferre lignosis thecis inductum & sapore
adstringentem.

Hanc Gesn. de Hortis Germ. recte Cedrum
& arborem coniferam vocat.

Examinandum quoque proponimus, ad Go-
ropius per Chithram vel Chachram Arabum Ce-
dum Libani intelligat, vel Thuiam. Hac z-
tate, inquit ille, magna Cedri ligni, quod sua-
vissimo odore spirat, copia ex Hesperio promon-
torio, aliisque locis, partim circa, partim ul-
tra Ocea um sitis, Antuerpiam adfertur. Nec
verò Cedrina modò, sed aliarum quoque arbo-
rum odoratissimarum materia.

Sed hoc adhuc monendum. Quod Lonicera
sub titulo Cedrebaum/uisq. Cedrus, figuram
Oxycedri ex Matthiolo habeat, nec distinguat.
Cedrum arborem ab Oxycedro. Cedruque co-
num exhibeat pro alia planta, ut postea dicitur.

N Cedri recte sunt Aequivocationes, propo-
sito nostro, quod nos equidem existimamus,
recensitas circa veterum sententias, suscipimus.
At quia eadem supersunt, tempestivum est, ut
eas nunc tradamus. Cedri itaque nomine quo-
niam comprehendit diversas plantas compenimus,
de prima & celeberrima Libani montis, sive sa-
cratissima literarum primum dicimus Cedro. Est
autem arbor vita, quae existimatur Cedrus At-
lantica & Thyia. Quidam verò volunt, Junipe-
rum esse Cedrum. Contendunt alii Cedri no-
men oblinere Juniperi genus, quod vocant Ce-
dum Phoeniceam, sive Oxycedrum. Bellonius
scribit, quod Theriaca Cedri ramos admittat,
quod de minoris Cedri ramis est intelligendum.

Cedrus Atlantica dicitur à nonnullis de S. hinc,
de qua postea suo trademus capite. Gulandinus
inquit an Abhel Orientis sit Cedrus & Thyia.
Nunc Cordo resina Elemi, est Cedri lacryma,
de qua nos scripsimus lib. 5 post M. arborum,
cuius lacrymam esse quidam volunt. Apud Pl-
nium lib. 16. c. 12. Acer operum elegantia & sub-
tilitate Cedro est secundum. Hist. Lugd. tenet
cum Hermolao legendum Citro. Fuerunt quo-
que, qui est narunt Citri Mali arborem esse Ce-
dum Libani, ut demonstratum lib. 1. cap. 25. Dio-
scoridi sanè & Athenaeo Citrus pomifera dicitur
videtur. Petrus Mart. Nabex, sive Paluro A-
thenae creditur nomen Cedri Libani tribuit ut vi-
dere est, lib. 6. Cedum Lyciam quorundam so-
lo retulit (de qua Celsus lib. 3. cap. 58.) Sabinam
vulgè in maritimis, Theophrastus Juniperum vo-
cat, licet ab aliis Cedrum vocari testetur. San-
talum tandem in Officinis quibusdam usurpati
pro Cedro, dictum est lib. 4. de Santalo, quem
etiam carpit Bellonius.

Restat ut de fructus usu & facultate dicamus.
Cedrides (Dioscor. verba sunt) porro vocantur
Cedri arboris, fructus. Vim habent calefacien-
di stomacho incommoat: Auxiliantur tamen
tussi, convulsis, ruptis, urinae stercidias, &
menses ducunt cum pipere trito potæ. Ad le-
poris etiam marini potum cum vino sumun-
tur. Fugant item bestias venenatas si corpus ex
ipsis cum adipe, aut medulla cervina oblinatur.
Admiscantur quoque in Antidotos.

Cedrus ex Gal. simpl. med. lib. 7. specie du-
plex est: altera fruticosa Juniperis adsimilis al-
tera arbor non exigua, utraque est calidæ, sic-
caeque temperaturæ tertio quodammodo ordinis

secundum utrumque. Porro Cedrides (nam
ita fructum Cedri nuncupant) moderatores vi-
res obtinent, quam Cedria, adeò ut comedi
quoque possint. Attamen si liberalius utare,
capiti dolorem inferent, ardoremque ac mor-
sum in ventre percipies. Confirmat eadem
Plinius dicens: Cedrides, hoc est, fructus Ce-
dri, tussim sanant, urinam cient, alvum sistunt,
vilescque sunt ruptis, convulsis, spasticis, stran-
guræ, ut & vulvis admoti, & contra lepores ma-
rinos, atque etiam collectionibus, ac magnis in-
flammationibus.

Cedrinum, Juniperinum, Cupressinum, Lau-
rinum, Pineum & Abiegnum vinu simili ratione
coccinari docet nos Dioscorides. Arboru, scilicet
fructus edunt calidam recens materiem oportet
assulose dividere, & Soli aut balneo, ignive admo-
vere, ut exudent, congioq; vini minâ vna n permi-
scere, atque ita duorum mensium spatio linere:
tum demum transfundere, Soli exponere, tan-
demque recondere. Porro factorum huiusmo-
di unorum vasa impleri debent: namque illa
non expletis vasis accedunt. Nihilominus medi-
cata vina recte valentibus haud quaquam idonea.
Ceterum isthæ omnia excalefaciunt, urinam
cient & leviter adstringunt. Laurinum tamen
vehementius exalefacit. Fit quoque vinum è
Cedri maiori fructu, in unum musti congium ad-
dito baccarum contusarum minæ semille. Sed
diebus quadraginta insolari, ac iis exactis, defæ-
catum in vasa transferri debet. Fit & à baccis
Juniperi vinum, similiter ut è Cedri fructu ad
eandem valens.

CEDRIA VETERVM.

Consequentiâ partium maxime allesti de Ce-
dria veterum tractare constituimus. Notabis
igitur hic Cedri à Cedri lacrymâ esse: quod com-
probat Plinius his verbis: Cedrus magna, quam
Cedrelaten vocat, dat picem, quæ Cedria vocatur.

Cassius Hemina vetustissimus Annalium Autor,
quarto eorum libro ut tradit Plinius lib. 13. cap.
13. prodidit Cneum Terentium Scribam agrum
suum in Ianiculo repastinantem offendisse arcam
in qua Numa, qui Romæ regnavit, situs fuisset,
atque in eadem libros eius repertos P. Cornelio
L. F. Cetego, M. Belio Q. F. Pamphilo Coss. ad
quos à regno Numæ colliguntur anni D. XXXV:
& hos fuisse è charta, maiore etiamnum miraculo,
quod tot infossi duraverunt annis. Mirabantur
alii, inquit Hemina, quo modo illi libri durare
potuissent. Ille tamen rationem reddebat, dicens
se arbitrari tunc non attingisse, eoique non
computruisse, propterea quod libri Cedriati fu-
issent. In illis autem libris scriptæ erant Philoso-
phie Pythagoricæ: qui quod Philosophiæ scripta
essent, à Q. Petilio Pratore combusti fuere.

Sic etiam scribit Vitruvius ex Cedro Oleum na-
ci, quo Libri aliarum res peruntur & à tineis & carie
non læduntur. Ad quod pertinere videtur illud
Persij Satyra prima. — Et Cedro digna loquutus.

Item illud Ovidij:

Nec ritulus murio, nec Cedro charta notetur.

Fit (testis est Plinius) Oleum ex malis Cedri,
quod Cedrelæon vocant.

Cedria, quod placet Dioscoridi, optima est tras-
sa, perlucida, gravis odoris, quæ dum effunditur
gutratum, non dissipata coit.

De Cedria hoc scriptum reliquit Hermol. co-
roll. 111. Cedria modò pix Cedri, modò Cedri
resina vocatur, è Cedro magna, quæ Cedrelate
dicitur: nihilque aliud est, si propriè loquendum
sit, quam cruda Cedri lacryma. Cedrium verò

Cedrides.

Caput li-
dant.

Vinum.

Vinum in
Confirma-
dum
E ligno.

Causa.

Bene Ca-
lentibus

monia.

Vires & u-

E fructu.

Libri Ce-
driati.

Cedria de-
lectus ex
Disce.

Cedria va-
ria signifi-
catione.

Cedrium.

Pix.
Arbor quæ rursus.
succus Cedri est, & teda eius concisa qui primus atque modò fluxerit in canali: nam sequens liquor *pix* iam, non Cedrium est. Sed confundunt Auctores, nunc pro resina: nunc pro sudore cedrum: nunc pro pice: nunc etiam pro Oleo Cedrino Cedriam & Cedrum tradentes, quod minima tamen est nocentia, siquidem omnibus his, quanquã diversis, eadem tamen natura inest.

Cedrea
Ced. & T. aulo
Cedria ex quodam arboris resina.
Columella Cedrium liquorem vocavit. Galenus & Paulus, non Cedriam, sed Cedream vocabant.

Cedria (docente Bellonio de arborib. conf. lib. 1.) ex quavis resiniferarum materia, modò pinguis sit, promiscuè fieri potest. Sed non quemadmodum quavis Picea Cedriam facit, neque quavis Cedrus pinguis est. Ex Larice porro, modò materia pinguis sit, Cedriam facimus. Ex Cupressillo quoque, atque etiam Betula Cedriam fieri posse asseveratur. Omnium deterri-
Oleum de Cade.
Karrannum.
Serbin. & Serapio.
ma, quæ ex Iunipero sit: eam vulgus Oleum de Cade vocat. Vulgus nostrum Rothomagense, Lutetia & Lugduni, apud quos copiosissima est unde advecta, Karrannum vocat. Cedriam ex teda fieri Plin. libro sexto cap. 11. his verbis testatur: *Pix* liquida, inquit, in Europa & Tarda coquitur. Hocia Syria Cedru vocatur. Avicennas sua lingua Serbin vocat, sed Serapio Karran. Turcarum vulgus hodie, ut Gallorū quoque, Karrannum.

Et alibi: Cedriam & Cedri oleum pro eodem cum Galeno 7. simpl. habet: nihilque aliud esse scribit, quàm recentiorum muniam quã condita olim fuerint corpora. Galeno vero Cedriam vocari modò resinam, modò lachrymam, modò picem, modò suo nomine Cedriam. Nam illam, inquit, quæ ex Cedro arbore manat, Resinam appellat, seu crudam lachrymam, ad discriminandum, quæ coquitur.

Quæ autem, inquit idem, à Cedro proficiuntur, aut spontè effluunt, ut resina, aut lachryma: aut arte parantur, ut Cedria. Sed hæc vi ignis elicitur, quæ re vera à Turcis melius multò, quàm à Cretensibus perficitur. Sunt qui ex Cedria picem faciunt. Vulgus Galliarum habet aliquid, quod Cedria, aut pici liquida profus respondeat: Duobus autem nominibus id appellare solet. Vno modo *Hulle de Cade*: alio vero, *du Tac*. Ex variis materiis fieri consuevit, veluti Iunipero, Fraxino, Sabina, Cedro, & eiusmodi lignis adhuc viventibus. Indigenæ Avignonenses, Provinciales, & Linguoscitones, eo maxime oleo utuntur, quod ex Phœnicea, & Lycia Cedro fit, & duobus nominibus *de Cade* *Sabin* vocant. Id autem quo nostri hic in Gallia Celtica utuntur, quod Tacum vocant, verius è lignis Iuniperorum perfici videtur, idque à morbo ovium, cui *mederi* solet, nomen habet. Idem etiam de medicamento funere. lib. 1. cap. 3. hæc addit. Cedria, medicamentum quod ex Tarda sumitur, mortuorum vitam quidam appellavere. Manat, inquit Matthiolus in Dioscoridem, ab arbore maioris Cedri etiam resina, quæ propriè Cedri dicitur, utilis ad multos in Medicina usus: Sed hanc ad nos non adferunt Cyprii, neque mercatores, qui ex Syria mercimonia convehunt, tamen regiones illæ plurimis (ut ajunt) Cedris maioribus scateant. Petrus Bellonius lib. 3. de medicamento funere, Item lib. de conf. arb. putat non modò Cedrum Cedriam fundere, sed & Piceam, Tardam, Laricem, Cupressum, Iuniperum & Betulam. Quinetiam suis male excogitatis Cedris eas omnes facultates assignavit, quas Diosc. Galen. & alii quàm plurimi auctores Cedria duntaxat reddiderunt: adeo ut magno &

Tacum.
Sic a montanorum.

Bellon. re. prob.
videndo errore dixerit suis hæc Cedrias defuncta corpora conservare, quemadmodum ea conservat legitima Cedria, quasi idem quonque velit, quod Picea, Pinus, Larix, Cupressus, Iuniperus, & Betula nullis prorsus facultatibus inter se differant. Fuchsius lib. de comp. med. quem postremo locupletatum excudit, in compot. Mithridatis, pro Cedria, quando ea non potest inveniri, lachrymam Abietis substituendam præcipit, ratus utique eandem utrique facultatem inesse. At ego quidem Galenum secutus, malim Ladanum substitui, donec ab aliis optiora proferantur, quorum meliori iudicio subscribendum sit. Neque ineptè fortassis Iuniperinum gummi illius vicem supplere poterit: quandoquidem constat omnibus rei herbariæ studiosis tantam inter Cedrum & Iuniperum esse similitudinem, ut altera ab altera vix discerni posset, nisi ea esset differentia, quæ in bacis utriusque manifesta deprehenditur. Cedri liquor, ut Græcis *andela*, ita etiam Latinis Cedria dicitur, Arab. Kitran, sive Alkitran, Ital. Cedria. Ex quibus ita dictis manifestum est Matthiolum nescire, ex qua arbore proficiat Cedria, videtur autem existimare ex minore fieri, cum ait: Cedri differentiam à Iunipero ex bacis deprehendi. Deinde si Cedria est ex minore Cedro baccifera, quid attinet eam querere in Syria, cum ea sit propius & valde frequens?

Cedria substituta hæc observavimus. In Fuchsi Arziballomeno pro Cedria, fructus Cedri substituitur, ubi demonstrandum erat, cuius Cedri fructus sumendus: puto intelligi debere Oxycedri: an vero bene substituitur, considerandum. Cedrio d. d. inquit Galenus, in Asia in frigidis capitibus affectibus aut in declinatione calidiorum, rustici eius penuria pressi, Pistaczo, id est, pice & oleo mistis, liquidam formam utuntur. Cedri gummi meminit Fuchsius in antid. Mithrid. & pro eo lachrymam Abietis substituendam præcipit, ratus utique eandem utrique facultatem inesse: at ego (dicit Matthiolus) quidem Galenum secutus, malim Ladanum substituere. Tract. quid pro quo? Pro Cedria, & Pice liquida, Ladanum. Fuch. inter sua Antibal. Ladanum quoque pro Cedria substituit. Cedri lachryma vide Gummi Elemi, Gesnerus in Cordum. Cedri lacrymaz loco, ut licebit liquore germanicè *Dügel* dicto, qui ex Betula elicitur, Gesn. in Cordum. Ex Bellonio ante annotavimus ex Betula Cedriam fieri posse, sicut ex quavis resinifera materia, modò pinguis sit: Verum quæ pinguedo est in Betula? non negamus tamen eius succum in quibusdam supplere posse Cedriam. Videant itaque Lectores sententiam Matthioli ante positam de Cedria Bellonii. Cedriam facimus ex cupressillo, inquit Bellonius. Cedria deterriima ex Iunipero, auctore Bellonio, quam vulgus Oleum de Cade vocat. Non habetur, inquit Lacuna, Cedria legitima, cum qua maximam similitudinem habet, Oleum Iuniperi dictum in Castilia Miera. Calsalp. Ex lignis Iuniperi montani (vulgari ligno superposito liquor extrahitur, qui Oleum de Iunipero vocatur apud Mesuem. Si hoc pro Cedria veteremus, puto non minorem in eo efficaciam futuram, quàm si ex magna Cedro haberemus. Matthiolo, ut ante dictum, non ineptè fortassis Iuniperinum Gummi, Cedriam supplere poterit.

Vim habet Cedria (inquit Diosc.) quæ vivencia quidem corrumpit, mortua vero corpora conservat. Unde etiam mortui vitam quidam ipsam appellaverunt. Sed & vestes, & pelles corrumpit, inmensa sua caliditate ac facit. Commoda autem est ad

Cedria substituta & æquivalentes.
Cedri fructus.
Oxycedrus.
Pistaczo.
Abietis resina.
Ladanum.
Elemi.
Betula seu com.
Bellon. re.
Cupressum.
Oleum de Cade.
Iuniperum.
Mortui vi.

Vifum a-
cus auris
cydantium
morbo co-
modo
Vi et in
Angina.

Elephantia-
fis.

Oleum ad
quadrup-
dum mor-
bos.

Cedri suc-
cus.
Ad lumen.
Ad cada-
vera.

Vestes cor-
rumpit.
Animalia
necat.
Non Gren-
dum in An-
gina et in
dilatibus.
Dentes.
Aurium
Germet.
Phthiriasis.
Venenum
leporis.
Elephan-
tiasis.
Oculus.
Pulmonis
Ulcer.
Piffellam
Scabi com-
tra serpen-
tes.

Bacca.
Plin. nat.

Cedria.

Cedri O-
leum.

Septica.

est ad oclaria medicamenta, vt quæ illa vi-
sum acuat, & albugines ac cicatrices deleat. Cum
aceto verò instillata, vermes in auribus necat, &
cum Hyssopi decocto infusa, sonitus ac sibila se-
dat. Et in cava dentium indita, dentem frangit,
& dolorem sedat. Idem facit etiam si cum aceto
colluatur. In anginis etiam illinitur, & tonsilla-
rum inflammationibus opitulatur. Pediculos
item & lendes oblita perdit. Cerastra verò ser-
pentis [veres] moribus cum sale imposita auxi-
liatur. Et aduersus marini leporis potum, cum
passo sumpta auxilio est. Prodest & Elephan-
tias laborantibus, si delingatur, aut oblinatur.
Purgat quoque vlcerain pulmone, eaque sanat,
si cyathi mellea sorbeatur. Ea autem optima est,
quæ crassa est ac pellucida, gravis odoris, & quæ
guatim emanans permanet & non diffunditur.
Vermes & Ascaridas perdit, per clysterem infi-
sa. Fit & Oleum ex ipsa quod separatur à ce-
dria, si ita, velut de Pice distillatum est, in coctura
pura lana supertendatur. Hoc ad eadem facit,
ad quæ etiam ipsa cedria. Privatim verò qua-
drupedum, & canum ac boum scabiem curat.
Rictos etiam in ipsis perdit, & ulcerationes,
quæ ex tonsura ipsorum oboruntur, ad cicatri-
cem perducit. Fuligo verò ex ipsa colligenda est,
velut ex pice, quæ eandem cum illa vim habet.

Plinio annotante cedrus magna, quam cedre-
laten vocant, dat picem, quæ cedria vocatur,
dentium doloribus volissimam, frangit enim
eos, & extrahit, ac dolores sedat. Cedri succus
ex ea quomodo fieret, diximus, magni ad lu-
mina visus, nec capitis dolorem inferret. Desun-
cta corpora incorrupta ævis seruat, videntia cor-
rumpit; mira differentia? cum vitam auferat spi-
rantibus, defunctis pro vita est. Vestes quoque
corrumpit, & animalia necat.

Ob hoc non censeam in anginis hoc remedio
utendum, neque in cruditatibus, quod suaserit
aliqui: Dentes quoque colluere ex aceto in
dolore timuerim, uel gravitati, aut vermibus
aurium instillare. Phthiriasis perungere eo non
dubitarim, utique porriginis. Snadent & con-
tra venenum Leporis marini bibere in passio. Pa-
cilius in Elephantias illinitur. Et ulcera sordida
& excrecentia in ipsis aures quidam & oculorum
albugines, caliginisque inunxere eo. Et con-
tra pulmonis ulcera cyathum eius sorbere ius-
serunt. Item aduersus tinea [fortè Tannias CH.]
Fit ex eo & oleum, quod pissellxon vocant, ve-
hementioris ad omnia eadem usus. Cedri scobe
serpentes fugari certum est: Item baccis tritis
cum oleo, si qui perungantur. Cedrides, hoc est,
fructus Cedri ruffim sanant.


Hæc nos capite de Iuniperis posuimus, cum
quibus nobis videtur Plinius confudisse Cedrum
magnam, ea enim non habet baccas. Ac etiam
miramur Plinium non reprehendere usum succi
Cedri ad ulcera pulmonum, uti fecit in anginis,
& cruditatibus: nam Galenus Cedriam ulcera
irritare, & phlegmonem excitare, immò quod
plus est, septicam esse tradit 7. simpl. Mollem
itaque carnem promptè citràque dolorem putre-
facit, sicut alia omnia, quæ cum eiusdem sint in
calefaciendo ordinis, adiunctam etiam habent
substantiæ tenuitatem. Ac in duris plusculo eget
tempore, & vix effectum potest consequi. Por-
rò talia omnia medicamenta, septica vocantur,
& septa: sed inter se maioris, minorisque ra-
tione diffident. Est autem in hoc genere medi-
camentorum ex primo & infirmissimo ordine Ce-
dria: pleræque enim eorum admodum sunt effi-

Tom. I.

cacia. Talia mortuorum corporum carnes cor-
rumpunt: at Cedria exsiccat, simulque à corru-
ptione turetur corpora demortua, utpote humi-
ditates eorum superfluas depascens: ceterum so-
lida corpora haud attingens: At in viventibus
calor ipse, qui in corporibus est, Cedriæ vires
adaugens, causa efficitur, ut teneræ ab ea carnes
deurantur. Nec mirum videri debet, si cum
tanta polleat potentia, lendes, pediculos, & ti-
neas, & in auribus natos vermes interficere va-
leat, ac fortim mortuum eiciat. Alia multa e-
iusmodi particulatim efficit: Itaque argumen-
tum est ipsam valenter excalefacere, sicut ubi
dentium foraminibus instillatur. Siquidem do-
lores eorum mitigat, sed & ipsos confringit. Ex-
tenuat quoque oculorum cicatrices: & visus he-
betudini ab humorum crassitudine ortæ medetur.
Porro quod eius est pinguisimum, & ad un-
guem oleosum, quod suspensus supra eum, dum
coquitur, Lanis excipitur, ac colligitur, tota Ce-
dria tenuis quidem est: sed minis acris, quan-
quam non minis excalefaciens. Eandem quippe
rationem habet ad id, quod reliquum est Ce-
driæ, crassius illud videlicet, quam Oleum ad a-
murcam. Porro illud, utpote crassius, est mor-
daciùs, & maiore apertendi facultate præditum.
Itaque & ulcera irritat, phlegmonemque illis ex-
citât. Porro oleola illa Cedria aded clementibus
est viribus, ut etiam plebei, experientiâ docen-
te, vulnera ovibus occasione tondendi à forfice
facta, illa illita sanent, atque etiam eâ & ad ovium
scabiem & ad rictos utantur.

Vinum autem Cedrites, ut nobis Author est
Dioscorides, ita paratur. Cedria aqua dulci lava-
tur, & singula doli cyatho uno prostantur, &
sic musto replentur. Calefacit hoc vinum & at-
tenuat, tussis veteri conveniens citra febrem,
Thoracis item doloribus, & laterum torminibus,
ulceribus in alvo & intestinis, pectore suppuratis,
hydropicis, hystericeis, feminis uteri stran-
gulatu vexatis. Facit & ad lumbricos, & ad rigo-
res. Auxiliatur commotis à bestiis venenatis, &
animalia reptilia ac serpentes necat. Aurium
quoque dolores instillatum sanat. Cedrites verò
vinum Hippocratis, de quo antè, idem esse cum
Cedrite hoc Dioscoridis scribit Cornarius, quod
consideratione non vacat: quid si Hipp. intelligit
vinum paratum ex baccis, vel ramentis Cedri Crenæ?

CEDRVS MAGNA SIVE LI- BANI CONIFERA. CAP. XV.



Cedrus Libani Descript.
Cens.
Cui ab annis
multis servamus
conos, ramos, li-
gnū. Coni qua-
tuor pollicibus
altiores, octo-
nos in ambitu
circa basin colli-
gunt, paulatim
in obusum tur-
binem fastigia-
ti, squamis com-
pacti selescunciam
circiter latis, un-
ctam altis, me-
diocriter crassis,
ruffis, per extre-
ma exstata pla-
tis alia alius si-
nūta subeunte, vt
Aa

te, ut quot sunt circa circum circa agmina, totidem
zonis præcincti videantur: inferior autem vniuersusque
ex his squamis pars Lambdoides mucrone suo
hæstæ adnascitur, iugo clauo medium pecturen-
te, in valles laterales declivi, totidem consimi-
libus ex aduerso valleculis respondentibus, quæ
totidè recipiunt nucas, pomaceis, aut pyraceis
granis duplo, triplove maiores, foris non ablinili,
rutilante quadam resinâ, durâ, sed fragili, vehe-
menter odoratâ, evidenter atro, siccâ, quantum
unicuique vncialis triquetra tenuisque membra-
na affigitur, papilionis alam egregiè referens,
ita quidem, ut duræ membranæ, uni squamæ
maiori, averso inculcu, respondeant. Ceterum
pediculus cont. validus existit, uncialis &
textualis longitudinis, crassitudine fere extre-
mi articuli digiti minimi, obliquus, aut in-
curvus, cortice rugoso, & squamulis exiguis
(ut in Pino & Liriodendro) subinde loricatus. Ra-
mus, quem habeo, pollice crassior, cortice
crasso, rugoso, foris fusco, intus rufio vestitur,
materie dura, alba, ipse ramulos satis crebros di-
visus. Lignum verò in assamenta iam confor-
matum, colore est undique rufio, qualem in
Pyr ligno subinde conspiciamus) pediculis re-
ctis hirsute, solidum satis, media tamen inter fi-
bras spatia inania, ut lignum quernum, osten-
dens, nullam caviem, nullam terebinthem sen-
tiens. Hæc domo meâ petita, ubi tres conos
unico ramo hærentes habuimus à Valerando
Dorez. Ceterum qui cominus in natali suo
loco terræ hærentem arborem observant, eam
ita nobis depingunt ut *Rauvolfium*, Arbor est
Cedrus Libani perpetuo virens robustis ramis
brachiata, origias aliquot crassa, ad sum-
mam Abietum nostrarum proceritatem assur-
gens, quanto autem maiores accreverint rami,
quorum pondere gravatus caudex se inclinat,
tantum de arboris rectitudine decedit: Rami (ut
& coni magni, rotundi) sursum spectant, longi,
tam pulchro ordine dispositi, ac si artificis ma-
nus relectos æquatè apposuisse sic ut
eminus etiam circinatus æqualiter dispositorum
orbis egregiè appareat: ex quo etiam, ante-
quam cominus contempleris, facili inter hæc,
aliasque resiniferas arbores discrimen, notes li-
cet: ceteroqui magna huic cum Larice simili-
tudo, potissimum in foliis, quæ parva, angusta,
conferta, in exerto sulcello sulco, clavis Musci
terrestres longitudine & crassitie simili: quæ, ut
ait Belopius, ab vno furculo exorsa quadragin-
ta, vel quinquaginta simul, serie quadam in or-
dinem disposita, furculam radiantia, pictoris pe-
nicillum referre videntur, odorata, subacida, &
cum levi amaritudine adstringentia. Sola cedre-
late inter arbores, demptâ Abiete, conos in cer-
lum tendentes mittit, qui quidem Abiegnis si-
miles, crassiores, duriores, ac multo maiores,
quinum, vel senum digitorum turbinati, com-
pacti squamarum compressarum congerie coa-
gmentati, atque obtusi, ex cinereo fulvi, conis
Pinalis quique graciliores, tam firmiter ramo adhæ-
rentes, ut à parente divelli non possint, nisi
avulsâ arboris parte: Coni porro hiantes se pan-
dunt, ac paulatim diffusi rotibus & pluviis de-
cidunt, relicto in ramo pediculo firmo & tereti.
Semen habet Abieti simile, non vinaceo ma-
ius, dulcis saporis, ut Piceæ, ad cuius latus oleo-
sum quidpiam, includitur odoratissimum. Pe-
diculus squammam non prius exiit, quam co-
nus duos annos excesserit, quem integrum an-
num fert, antequam maturecat, quod Hieme

potissimum fieri solet. Duas profert resinas, quemadmodum & Abies, alteram in tuberculis
albam, nihil prorsus amarulentam, nec gravis
odoris: alteram sua sponte exudantem, quæ cum
retorrida sit, naribus admodum Fraga redolet, o-
dorataque gustatur percipitur, sed ita pertinaci-
ter dentibus ipset, ut non nisi cum difficul-
tate auferatur. In monte Libani tantum 24. sup-
putavi. Ex hac Libani montis Cedro Salomon
templum Hierosolymitanum extruendum fecit.

De hac etiam B. L. O. N. Obser. In cacumine
montis Libani ostenduntur cedri altissimi, si-
miles his, quibus Salomon extruendum tem-
plum curavit diuturnitatis ergo. Hæc sola ar-
bor cum Abiete fructum habet sursum vergen-
tem. Fert magnos conos, duos, Pini conis simi-
les, ni essent leviores. Item lib. 1. In monte Li-
bani Cedri viginti & octo plus minus. Cedros,
quas in Ariano & Tauro vidimus, eandem cum
prædictis similitudinem habere comperimus: Hoc
affirmare possum, Cedrum magnam nusquam in
Creta nasci. Audivi tamen à quibusdam fide di-
gnis hominibus, Cedrum magnam supra Niccam
in montibus nasci. Et hæc est Cedrus alta, & ce-
drelate, etiam à Theophrasto tradita: A Diosc.
etiam cap. de Agar. item cap. de Cedro. Nec non
in facis literis pro Cedro Libani & Salomonis:
Ut & à Plinio lib. 16. cap. 39. à quo confunditur
serpenumero cum Oxycedris, siue Cedris utrius-
que: de maiori autem loquitur Plinius, quum
ait Cedram proferre, & cum collocat inter La-
rices.

MELCHIOR Lussy, Eques, Præfectus, siue
Landes Amman in Underwalden in sua peregrina-
tione Hierosolymitana cap. 13. narrat se spatio
tredecim horarum ascendisse montem Libanum,
& pervenisse ad locum Cedris consitum, quos
peroptabat videre: se autem reperisse Cedros,
Mirumque esse tantas arbores & tam pulchras
ibi provenire supra rupes. Istud autem mirabi-
lius esse nullum posse numerare eas, licet pauca
sint, sed quæ eas supputasse, quæ integræ & viren-
tes erant, ac comperisse 13. alios 24. alios 25. Tra-
ditque præterea hanc arborem celebrari in facis
literis: Ac hinc comparari Divam Virginem Ma-
riam: cum dicitur, Exaltata sum quasi Cedrus in
Libano: Arbores esse magnas & altas, sex aut
septem homines vix amplecti posse truncos: eas
ferre conos similes conis Piceæ [den Forcken]
sed maiores, semper virentes esse arbores. Quan-
vis infideles cupiant perdere, manere integras.
Salomonem excellenciam huius arboris cogno-
visse, ideo non sine causa ex loco prædicto (sci-
licet Libano) desumpsisse huius arboris ligna ad
templi Hierosolymitani ædificium. Se vidisse ibi
veteres arbores à longo tempore deiectas, incor-
ruptas, quæ similes erant truncis Fraxini, Eschen,
aut Aceris, Alhorn. Ac tandem datos fuisse sin-
gulis ramos cum duobus conis, dictumque fuisse
alio etiam in loco huius montis provenire hanc
Cedrum arborem, sed iam dictâ minorem.

Anguill. Cedrum Hebræorum & Sacrarum Li-
terarum: quidam existimant Laricem esse masculu-
lam Plinio, verum non video, quomodo id dici
possit: Si autem ita res se habeat: aliam dicere
non possum, quàm Cedrum, cuius meminit
Theophrastus, dicens in Syria nasci. Existi-
mo Dioscoridem, cum dixit Cedri fructum esse
similem Myrto, voluisse dicere potius Piceæ. Hac
ratione iuxta nostram opinionem Cedrus Dio-
scoridis, erit eadem cum Cedro sacrarum pagi-
narum,

Dodo-

Resina duo:

Cedri Sa-
lomonis.Coni sur-
sum ver-
gentes.
In Libano
pauci Ce-
dri.In Creta
non nasci-
tur.Cedrus
Theoph.
Diosc. Sa-
lomon. Plin.
Plum. cr-
re.
Oxycedrus.
Cedrus
minor.Mirum de
Cedro Li-
bani.Larix ma-
scula Pl-
nio.Diosc. cor-
rigitur.

Dodonæo, Cedrus magna, Cedrus maior conifera. Græcis *κίσσος*: Latinis similiter Cedrum: Plin. lib. 24. cap. 5. Cedrelatem nominat, quasi Cedri Abietem, aut Cedrinam Abietem, tum ad differentiam minoris Cedri, tum quod Abietem valde referat.

Apud Matth. in Diosc. hæc habentur Cedri arboris Theophrasto, Plinio, & Galeno duplex est genus, nempe maius & minus.

Et in Epit. Cedrus, duum geneturum est, maior & minor. Maioris duo genera, quemadmodum & minoris. Proceræ arbor est, Abietis perquam similis. Quæ in minoris genere est floret, & fructum non fert. Altera verò contrà, nunquam floret, sed conos tamen profert, Cupressi longi majores. Resinam fundit laudatissimam.

Idem Matthiolum reliquit suam reprehensionem Dioscoridis in post. com. Ital. quod miror: si enim lectio rectè restituta, à Matthiolo quæ occasio reprehensionis? Iconem exhibet in qua conii placent, bene respondentes nostris conis, quorum mentionem antè fecimus: an verò folia sint disposita prout pingit, non sine occasione dubitamus, quando quidem aliter longè disposita pinguntur apud Rauvvolffium, qui arborem virentem vidit: ille etiam nobis videtur suo nomine & nimium securè scribere duo genera esse, & cætera, quæ in Epitome tradit, de hac arbore, ab eo non visa, nec observata: Camerarius in Epitome modò dicta, & in hist. Germ. eius Iconem mutavit, quæ partim desumpta videtur ex Rauvvolffio, contra tamen eius historiam: folia non sunt Abietis modo disposita, sed multa simul ex uno veluti nodo, prout demonstrat nostra Icon, quæ nobis absentibus est facta ad Iconem Camerarii: sed minus concinnè.

Matthiolum Cedrum magnam falsò bacciferam cum Dioscoride statuit, eum conum eam gerere Guiland. in epistola ad Rosarium comprobat. Ante omnia, inquit, conveniens est docere Cedrum magnam à Cedro simpliciter dictà, quæ propriè Oxycedros vocatur, & Iunipero differre. Hanc siquidem & Iuniperum eandem esse arborem non recentiores solum, sed etiam veteres quidam opinati sunt. Nōne quæ de Iunipero Theoph. refert, Plinius Cedro magnæ tribuit? Mirum minus videri debet Gazam Cedrum apud Arist. Iuniperum convertisse. Illud fortasse levis cuiquam videri possit, Plinium Cedrum magnam cum Iunipero confudisse. Quis nisi vesanus non animadvertit Cedrum hanc eandem esse arborem cum illa, quam Theoph. fructum Myrti baccis æqualem ferre scriptum reliquit? Cedrus, inquit Theoph. nodosa est, halosa, & tortuosa, Iunipero non absimilis, verum brevior. Sed quid quæso, egregii magnificique ex arbore Iunipero humiliore, nodosà adhuc, halosà, & materie tortuosà constante strui poterit? trabesne, quibus magna ædium moles incumbit? an malus, quo nihil solidius, nihil firmitus in navi esse concedet? an denique templorum valvæ, columnæ, tecta, deorum simulachra? profectò nihil horum, ut Guiland. fert opinio. Quare alterius fuisse generis Cedrum istam nobilem fatendum est. Narrat porro Plinius Cedrum maximam in Cypro ad undecimem Demetrii succisam 130. pedum, crassitudinis verò ad trium hominum complexum. Comprobat id imprimis Theoph. Cedros in montibus Syriæ cum longitudine, tum crassitudine præstantissimas exire, quippe quæ aded crassescant, ut sint quas ulnæ hominum quatuor nequeant amplecti. Cæterum Cedrum hanc Lar-

icem esse, vel inde perspicuum fieri credit Guiland. quod in hodiernum usque diem Larix copiosissimè in Libano nascatur, & altitudine excellat. Quod autem eum maximè movet, ut Cedrum Laricem credat, illud est, quia Dioscor. Agaricum *ἀγάρικον* nasci perhibet. At Agaricum in nullius alterius arboris trunco præterquam unius Laricis gigni, notius, quàm ut pluribus demonstrare sit necesse, dicit. Proinde corrigendum Plinium ubi legit: Galliarum glandiferæ maximè arbores Agaricum ferunt. Scribendum autem, Galliarum coniferæ, aut resiniferæ maximè arbores, Agaricum ferunt. Nam glandiferæ nullo modo genuinum Agaricum producere possunt, quicquid dicat Brassavolus. Huc accedit quod Plinius toto opere semel *κίσσος* Laricem convertit, ut subolevisse Plinium sibi firmiter persuadeat, Cedrum quam Cedrelaten vocat, rectè Latinis, Laricem nuncupari, nec transversum quidem digitum arbores hæc à se discedere. Habes quid somniet Guil. de Cedro magna, quàm falsò Laricem pronunciat. Larici folia decidunt, Cedrus magna perpetuò viret. Rami Laricis dorsum propendent, Cedri magnæ sursù spectant.

Paulus verò Hess. Defens. II. pro Guill. increpans Matthiolum, quod neget se scripsisse Cedrum magnam bacciferam ait, Nōne cum Dioscorides Cedrum magnam bacciferam facit, ipse pro Cedro plantam bacciferam, per subiectam oculis Iconem proponit? Sed dicit Cedrum minorem, non maiorem eam esse, quàm ille baccis onustam depingit. Quasi verò Cedrus Phœnicea minoris Cedri genus sit, quàm maiori Cedro esse adscribendam liquidd, Dioscoridis testimonio, contra quàm censet Plinius, comprobatur. Etenim Dioscorides Cedrum magnam baccas Myrti magnitudine ferre ait, quàm notam Plinius falsò minori Cedro reddidit, cumque maioris Cedri eodem loco duo fastigia proponit, non maiorem Cedrum, sed minorem, imò ne Cedrum quidem, sed Iuniperum attingit, cui sanè Iunipero notas illas omnes, à Plinio Cedro maiori ibi redditas, Theoph. assignat, qui etiam Iuniperum eodem lib. Cedrum vocari ait, unde Plinii errorem profluxisse dubium non est. Sed utriusque auctoris verba antè recitavimus, ex quibus palàm est, confudisse Plinium duarum plantarum, Cedri sc. & Iuniperi, notas, idque nullo alio argumento, quàm quod Iuniperum à Græcis Cedrum quoque dici apud Theophrastum legisset, & quæ propriè Cedrus erat *κίσσος*, id est, Iuniperum etiam ab iisdem vocari in Theriacis Nicandri invenisset.

Verficulus eius hic est: Nec te remedium lateat Polii herbæ, aut Cedri Arceuthis: quæ vox in communi significationis æstimatione, Iuniperi bacca nunc est, & nihilominus ille, cum Cedrum dixisset, à Iuniperi appellatione baccam intulit, quàm *κίσσος* dicturus erat. Quod sit, ut pro comperto habendum sit, Cedrum, Iuniperumque mutua invicem appellatione quondam dici & significari solitas: quod eiusdem Nicandri antiquus interpret testatus est, dicens: *κίσσος* vocari fructum Cedri, quoniam & arbor ipsa *κίσσος* dicatur: quæ voce posteriores in Iunipero tantum usi sunt. Proinde mirum minus videri debet, & Theodorum illum Gazam *κίσσος* apud Arist. animal. 7. cap. 3. & Theoph. lib. 4. de caus. pl. cap. 23. Iuniperum convertisse. Cæterum ut Plinius Cedrum in magnam & parvam divideret, quod neminem ex Latinis Plinio antiquioribus, cuius monumenta ad nostram ætatem pervenerunt, fecisse constat, in causa fuit, vel quia Diosc. Iunipe-

Agaricum:

Plin. corrigatur.

Brassavolus taxatur

Guiland. notatur.

Matth. taxatur. Cedrus magna non est bacciferæ.

Cedrus Phœnicea magna.

Plin. reprobat.

Iuniperus.

Cedrus arceuthis.

Cedrus Iuniperum quondam appellata.

*Galen. er-
ror.*

rum in magnam & parvam discrevit, vel quis alius quispiam Plinio vetulior, Cedrum, quæ Iuniperus erat, eadem differentiâ maioris & minoris separavit. Nam qui Cedrum propriè dictam in magnam & parvam ante Galenum diremerit, ignoramus, ceteri eundem Galenum in Hippocedro, seu Cedro magnam eisdem erroribus, in quos Dioscorides prolapsus est, implicitum esse videamus, & Iuniperos Dioscoridis, nihil à Cedris Theophrasti differre putamus. Hactenus ille.

*An Cedrum
an Abietem
species?
negatur.*

Inter Cardanum & Bellonium non parva controversia est, siue illa arbor, quam in Libano vidit Bellon. pro Cedro, vera Cedrus, an potius Abietis quædam species? Argumenta negantia veram Cedrum possunt esse huiusmodi. Primum. Ista est Cedrus, quam Theoph. lib. 3. cap. 12.

ex sententia Veterum proponit: ut & quam Dioscorides, quæ scilicet arbor est magna, ex qua Cedria colligitur fructu Iuniperi. At hæc differentiæ quæ apud Theoph. significanter ad differentiam Iuniperinæ Oxycedrum & Cedrum simpliciter dictam arguunt, Arbori quam Bell. in Libano vidit non conveniunt. Ergo. Arg. 2. Cedrus Cedrides baccas fert non conos, authoribus

Theophrast. Diosc. & Galeno. 3. Specie sunt, inò genere differentes arbores baccifera & conifera, non itaque in unum genus proximum aut speciem cogenda. 4. Ad Abietes & Larices pertinet arbor Libani, non ergo ad Cedri genus.

*Abietis vel
Laricis ge-
nus.*

5. Cedrinum oleum ex baccis fit, non ex conis arboris Libani. 6. Quæ arbor in lectione sacra apud Latinos & Græcos Cedrus Libani dicitur,

Orus.

ea Hebraicè vocatur Orus. At hæc vox Pinum, vel Abietem, vel Laricem, vel Ornum magis signat, quàm Cedrum Theophrasti. Immo Rau-

*Larici spe-
cies.*

volff. Cedri Libani iudex oculatus, indicat Larici similem esse, ut sit species quædam Laricis & non Cedri. Controversiæ igitur iudicium est, inquit Libavius, arborem Libani Cedrum Larignam, vel Laricis speciem esse, & Cedri nomen aliunde accepisse, cum à Cedris propriè dictis toto genere diffet. Atque ut Cedrus Iuniperina appellabatur olim, ita Larix hæc Cedrina, vel Cedrus Larigna.

*Cedrus Li-
bania.
Theoph. &
Dioscoridis
ignota.*

Apollo rad. non. vocat hanc arborem Cedrum Libaniam, Hebraicamque: dicens, nos posse facile assequi hanc non cognovisse, nec describere voluisse Theophrastum, vel illum secutum Dioscoridem: Pinum verò Iuniperis semen Cupressi simile addidisse, ac ad Libaniam, Hebraicamque Cedrum alluisse solis capillatus, Laricis, Piceisve brevioribus, minime tamen aculeatus.

*Pro rano
Pini pingu-
Cedrus co-
nus.
Laricis
ovum. &
Ryffus.
Cedrus
Hebraica.
Pet. Cresc.
figmentum.*

Lonicerus pingit conum Cedri, cum cono Pini, nec ab eo distinguit, quàm benè autem, iudicent lectores. Riffus quoque sub nomine Nucis Pini pingit in suis in Diosc. commentariis fructum Cedri Hebraicæ. Sic Pet. Crescent. pro Cedro, nescio quos floccos pingit. An Lacunæ Cedrus maior in insula Cypro proveniens, ex qua Salomon templum ædificavit?

Castor. Durant. *videtur*, Cedrus, Cedrolate proveniens in Syria in monte Libani.

*Cedrus Pa-
lestina.
Matth. nar.
Lob. radar-
gumur.
Cedrus Sy-
riaca.*

An Cæsalpino fuerit Cedrus Libani & Magna, considerent lectores, & quam Cedrum intelligat per magnam, & per Syriacam Theophrasti, de quibus antea. Lob. & Penz Adv. Cedrus Libania & Palestina, præcisa Græcis, minùs verè à Matthiolo delineata. Lobelius in postremis figuram aliam proponit: sed si vera, quàm in te prior eius melior sit, quàm Matthioli, non animadvertimus. Had. Iun. Cedrus, Cedrus conifera, *videtur* etiam

Plin. *videtur*, *videtur* Nicand. interp. Arab. Serbin. Cedarbaum / Belg. Cedarboom / Gal. Cedre, Cedre du Liban, Ital. Cedro, Hisp. Alorze, Angl. Cedar tree. Et hæc est quam Hist. Lugd. Cedrum Phœniceam quoque appellat, atque eam parvam Theophrast. [ut Plin. interpretatus sit] Gazam ineptè Punicam dixisse, à Phœnice, quæ Syriæ pars, à qua etiam Syriaca. Cedrolate quoque nuncupari, quia proceritate *videtur* æquet: Dendrolibanum in Geoponicis. Pediculum per medium coni tractum, à quo post biennium squammæ defluunt, malè Bellonium scribere vocari *bastulam* à Plinio, cum illi *offula* legatur, non *hastula*, & Cedri nulla fiat mentio, sed Piceæ. Vium & vires videnda inter ea, quæ de Cedro diximus.

*Cedrolate
res Eryman.
Dendrolate.
baum.
Hastula
Plin.
Bastula. re-
proch.
Plin. respo-
sione.*

CUPRESSVS

CAP. XVI.



Inter arbores Description
coniferas & resiniferas iure cõ-
numeratur, pro-
cero liquidem, recto, crassoq;
caudice surgit Cedrus.
Cupressus, cortice ferè spado-
ceo, materie Materie.
firma, solida, odorata: super
medium in ramos abit, mo-
tam concursa suo effigiantes:
folia Cedri retu-
sa, aut Sabinae Folia.
imbricatum con-
nexa, perpetuè Gæthula.
virentia: galbuli luglandis nu-

ci pulvinato calice testæ æquales confragosi, rimas agunt in clavata tubera dehiscences, inter quorum commissuras semina continentur rufa, sublonga, altera parte rotunda, altera acuminata, semiculmo latiora, medullâ donata. Sapor acerbus, qui potissimum in conis elucet. Lignum pallidum, aut rubescens, nec cariem sentit, nec terebinthem, firmum, durum, vndulis nonnihil crispatum, micis saturationibus, nunc longis transversisque, nunc parvis, punctotum instar, variantibus. Illi Odor suavis: sapor verò vix utilis excellens, præterquam in cortice, qui evidenter linguæ offert adtinctionem cum amarore, eoque haud ingrato in veteri quod excessit tringinta annos.

Cæsalpinus sic describit: Cupressus arbor est Descri. Ca-
quam iuxta sacras ædes serunt ornatus gratia, in salpino.
rectitudine tantum crescens, more Abietis & Piceæ: ramis dense circumvestientibus, modò fastigiatis: quæ forma vocatur: modò ad latera sparsis, quæ mas: foliis nullis, sed ipsamet germina tenuiter Foeniculi modo scissa: folia videntur pulposa, insunt tamen in nuper nascentibus foliola brevia, acutave, sed hæc in adultis degenerant in brevissimas veluti squamas totos furculos convestientes: amentaceum quid exile fert, in summis germinibus, conum Nucis magnitudi-
ne ex crassis & lignosis squamis constantem, quibus

*Semina.
Sapor.
Lignum.*

Odor.

*Descri. Ca-
quam iuxta
sacras ædes
serunt ornatus
gratia, in
salpino.*

Conum.

Semina. bus dehiscences parva quædam semina decidunt. *Lignum.* Lignum odoratum, & resinosum, non sentiens putredinem.

Malis for- Olim nonnullos simplicium medicamentorum
malis Investigatores in dubium vertisse constat, num
malis Cupressus mas ex semina quoque proveniret. Sed
malis adhuc ipso Theophrasto id attestant plerumque
malis Cupressum quoque ex semina marem provenire
malis affirmant. Neque hæc inter proceras cretæque
malis brevem habet vitam. Mas omnino infæcundus
malis est, & semina pleræque steriles. Arborum quo-
malis que quarundam semina [scilicet *δυσκλινὰ καὶ ὑπερ-
parva.* parvula, vixque visu percipienda sunt, seu Cu-
malis pressi. Huius enim fructus non id totum est, quod
malis pilæ speciem gerit, sed quod cono innascitur,
malis prætenue [αἰσθητὴ] exile [δυσκλινὴ] & quasi Laricis
malis [αἰσθητὴ] seminiproximum: id verò pilula sua de-
malis hiscente evolat, & legi proinde non nisi ab ex-
malis perto homine potest. Exemplaria Aldinum &
malis Basileense legunt *πυρρὰ*: Gaza verò Laricis, uti
malis scriptis *πυρρὰ* Laricem interpretatur. Scaliger verò
malis legit *πυρρὰ*, furfuraceum, quod an bene resti-
malis tutum adhuc dicere non possum, quia semen Cu-
malis pressi maturum non tale: præterea comparat fru-
malis ctum Cupressi cum fructu *πυρρὰ*. Seminum ve-
malis rò ipforum nullus terminus est: Alia. n. cū pulpis
malis [cum eo quod ambit] defluunt: alia verò ut Pini
malis Piceæ & omnium Coniferarum Gontis adhuc
malis pendentibus prosiliunt, vasaque ipsa inania re-
malis linquunt: In istis verò ut in aliis omnibus perpe-
malis tuò virentibus serò perficiuntur: suntque exilia
malis membranacea. Huic aliisque in quibus aliquid
malis inest pinguedinis ut Oleæ & Cedro ligna Austri-
malis no Cælo exudant quod quidem prodigium &
malis ostentum esse creditur. Punica enim, & Ficus,
malis & Vitis, auctu faciles: Palma & Cupressus diffi-
malis ciles. Cupressus cæteris quidem in locis semine pro-
malis venit, in Creta autem insula etiam trunco, ut
malis montosa in Tarra. Apud has enim Cupressus cæ-
malis dta [καρπώδης] est, quæ ex casura [αὐτὴν] ger-
malis minat modis omnibus præcisa: nam & ab terra.
malis & parte media, & superba: alicubi etiam ex radi-
malis cibus germinat, sed rarò. Viret ex urbanis Cu-
malis pressus quoque perpetuò. In Cyrenensi autem
malis optimè prodit, oleumque plurimum fit. Cupres-
malis sum verò loca servida magis habent, ut Creta, Ly-
malis cia, Rhodus. Huic solum carnosum. Quin &
malis minus sæcundæ sæcundioribus, & deterius fru-
malis ctificantes, prohius fructificatibus magna ex par-
malis te firmiores, nisi aliquo in genere mas fructuo-
malis sior esse soleat, ut alias quædam affirmant, & Cu-
malis pressum. Natura quidem perpetua Cupressus,
malis sed inter cæteras diuturnior videtur: itaque in
malis Epheso cupressina materies, ex qua valvæ templi
malis nuper constructi Dianæ, quatuor ætates reservata
malis duravit. Sola hæc nitorem etiam recipit, idèque
malis ex hac condere opetum lautiora consuevere. Ex
malis reliquis post Cupressum ac Thuiam, Aliæ planta-
malis rum magis simum & aquam diligunt, alia minus:
malis ut Cupressus, quæ nullo pacto simum nec aquam
malis concupiscit, sed etiam emori dicitur, si copiosè
malis novella tingeretur. Itaque in Creta insula montibus
malis Idæis, Leucisque vocatis super summa, quibus
malis nix nunquam deest, Cupressum comperiri affir-
malis mant. Et hæc sunt, quæ passim reperire licet apud
malis Theophrastum, ex translatione Gæzæ.

Malis for- Quæ verò iam sequuntur, ex Plinio collegi-
malis mus. Cupressus advena, & difficillimè nascen-
malis tum fuit, ut de quâ verbosius, sæpiusque quàm
malis de omnibus aliis, prodiderit Cato. Natu mo-
malis rosa, fructu supervacua, baccis torva, folio ama-
malis ra, odore violenta, ac ne umbra quidem gratio-
malis Tom. I.

sa, materie rara, ut penè fruticosi generis, Diu
sæcra, & idèd tenebri signo ad domos posita. For-
mina sterilis diu. Metæ demùm aspectu non re-
pudiata, distinguendis tantùm Pinorum ordini-
bus: nunc verò consilis facta in densitate parie-
tum, coërcitæque gracilitate perpetuò tenera.
Trahitur etiam in picturas opere historiali: ve-
natus classisve, & imagines rerum tenuifolia,
brevique & virenti supervestiens. Duo genera
earum. Metæ in fastigium convoluta, quæ & se-
mina appellatur. Mas spargit extra se ramos, de-
putaturque & accipit vitem. Vtraque autem im-
mittitur in perticas, afferèrve amputatione ra-
morum, qui xiii. anno denariis singulis vaneunt.
Quæstuosissima in saturatione silva, vulgòque
dotem Filarum antiqui plantaria appellabant.
Huic patria insula Creta, quanquam Cato Ta-
rentinam eam appellat, credo, quòd primùm eò
venerit. Et in Anaria succisa, regerminat. Sed
in Creta quocunque loco terram moverit quis-
piam, nisi seratur alia, hæc gignitur, protinusque
emicat. Illa verò etiam non appellato solo, ac
spontè, maximèque in Idæis montibus, & quos
Albos vocant, summisque iugis, unde nives nun-
quam absunt, plurima: quod miremur, alibi non
nisi in tepore proveniens, & nutricem magno-
perè fastidians. Nec terræ tantùm natura circa
has refert, aut perpetui cæli, verùm & quædam
temporaria vis. Imbres aliquæ plerumque semi-
na afferunt, & certo fluunt genere, aliquando
etiam incognito: quod accidit Cyrenicæ regio-
ni, cùm primùm ibi Læserpitium natum est: ut in
herbarum natura dicemus. Nata est & silva urbi
ci proxima imbre piceo, crassòque circiter urbis
Romæ annum cccxxx. In Oriente post Te-
rebinthum & Lentiscum optimam tenuissimam-
que fundit resinam Cupressus, acerrimam sapore.
Fit & ex hac Oleum, quod Carynon vocant.
Hæc verò aquis odit, ut Iuglans, Castanea, La-
burnum. Sed nec decidunt folia Cupressi, quæ
carnosa sunt. Trifera est & Cupressus. Namque
baccæ eius colliguntur mense Ianuario, & Maio,
& Septembri, ternasque earum gerit magnitudi-
nes. Cariem vetustatèque non sentit Cupres-
sus, nec rimam fissuramque spontè capit, unde
maximè æterna putatur. Sicut valvæ sunt & Cu-
pressi, & iam quadringentis propè annis durat
inateria omnis novæ similis. Hoc quoque notan-
dum valvæ in glutinis compage quadriennio fuisse.
Cupressus in eas electa, quoniam præter cæte-
ra uno in genere materiz nitor maximè valeat æ-
ternus. Nonne simulachrum Vejovis in arce &
Cupressi durat, à condita urbe quingentesimo
primo anno dicatum? siquidem adversus cariem
tineasque firmissima. Minimis granis constat se-
men Cupressi, ut vix percipi quædam possint,
non omittendo naturæ miraculo, è tam parvo
gigni arbores, tanto maiore Tritici & Hordei
grano ne quis Fabam reputer. Ergo è Cupressi
semina (mas enim ut diximus non gignit) pilu-
la collectæ, quibus docui, mensibus siccantur
Sole, ruptæque emittunt semen, formicis mixtè
expetitur: ampliato etiam miraculo, tantuli ani-
malis cibo absumi natalem tantarum arborum.
Seritur mense Aprili, area æquata Cylandris, aut
volgiolis, densum: terræque cribris supercernitur
pollicis crassitudine. Contra immane pondus at-
tollere se non valet, retorqueturque sub terra.
Ob hoc parcutur vestigiis. Leniter rigatur à Solis
occasu in trinis diebus, ut æqualiter bibat, donec
erumpant. Differuntur post annum dodrantali
filo, custodata temperie, ut viridi cælo serantur,

*Materia
rara,
Famula.*

Tenfilis.

*Duo genera
Plantæ.*

*Vitem vici
m.
afferat.*

*Silva de
filarum.
Plantæ tria
Creta.
Tarentina
Carani.*

Spontanea.

Locus:

Refina.

*Oleum.
Aquis odit
Folia non
decidunt.
Folia car-
nosa.
Trifera.
Baccæ.
Cariem
vetusta-
tèque non
sentit.
Valvæ ani-
miffima.*

*Simula-
chrum ap-
taquissimè.*

*Grana par-
va.*

*Malis feri-
la.
Formicarum
cibus.
Secundis cæ-
pus & me-
dus.*

Mirum de ac sine aura. Mirumque dictu, periculum ea
Cupressi. tantum die est, si roraverit quantulumcunque
Culturam imbre, aut si afflaverit. De reliquo tuti sunt,
ad. perpetua securitate, aquasque postea odere. Nec
aquam solum aspernatur, sed & fumum, & cir-
cumfoluram amputationemque, & omnia re-
media odit: quinetiam necatur. Hanc quidam
Cupressus Creticam dixerunt. Floret post Laurum Cupres-
Cretica. sus. Haecenus Plinius.
Florendi
tempus. Ineptè scribit Matthioli, cuiusque figmentum
Matth. & secutus Lacuna, Cupressi semen aded minutis gra-
Lacuna. m- nis nasci, ut atomis comparari possit, atque ob id
tantur xprè perspicui, suam temeritatem demonstrantes,
talia enim non viderunt semina: ea si in conis
considerassent, non sanè talia scripsissent, aut si
saltem legissent, quod scribit Scaliger, contra
Theophrastum, cum abuti nostris sensibus. Se-
Theophr. mina namque, quod in descriptione diximus, sunt
re- mansula, sublonga, semiculmo latiora. Meri-
prehendo- to igitur in Hist. Germ. tantam seminum tenuita-
tem. tem omisit, quæ tactu non possint, ne dum visu
distingui.
Dad. Icones Dodon. Lat. in fol. duas habet Icones, primæ ti-
dua tulusest Cupressus, alteri Cupressi ramus cum
Belloni fructu, quæ Lobelij est. Apud Bellonium pra-
taxat. va est Icon. Sic Pet. Cresc. pro Cupressillo nescio
P. Cresc. quæ sarcimina ramis affingit.
mur. Cupressum Virgil. Cyparissum vocat, Offic.
Nomina Cupressum, Græci κυπρίδιον & κυπρίδιον. German.
linguarum Cypressenbaum / Belg. Cypressenboom. Gall. Cy-
pres, Ital. Cypressu & Cupressu, Hisp. Castil. & Angl.
Cypres. Bohem. Cypriß, Hung. Cypressus. Arab.
(addit Lacuna) Serin, Catal. Ciprés, Portug. Al-
preste.
Etymon. Dicitur autem κυπρίδιον, ἀπὸ τοῦ κύμῳ παρίδιον,
à partu ramulorum parilium (ut inquit Didy-
mus) vel quod ex æquo & ramos & fructus creet.
Charact. Vocatas etiam cupressillos, æternus idem prodidit,
quod nobis essent oblectamento, vel quod cha-
rites nobis aspectu sint iucundo.
Munf. no- Non rectè interpretatus est Munsterus illud
tidur. Ezech. 31. ubi Hebraicè scribitur Erez, vertit e-
nim ipse Cedrum, cum tamen scriptum sit Græcè
κυπρίδιον. Vbi postea Cant. 1. legitur Hebr. Bero-
chim, scribit Forsterius esse, qui velint Cupressum,
ipse autem intelligit Kaxinum, ut copiosius an-
notatum alibi. Fructum Cupressi, Theophrasti
& Dioscor. anth. d. 4. p. 1. motus Turnebus, οὐκ ἔστι
τὸ κυπρίδιον, sed Galbulum Cupressi vocat, ac idèd
Fructus Vartonem emendandum putat, qui Galbulum
equia. vocet, dicens lib. 1. c. 40. Semina quædam ad o-
Varro cor- riendum sunt usque aded parva, ut sint obscura,
vigtur. ut Cupressi, non enim Galbuli, qui nascuntur,
tandem pilæ parvæ corticis (corticis) id semen
sunt, sed in his intus primigenia semina dedit na-
tura. Melius igitur faciunt, qui Noces appellant,
aut pilulas Cupressi cum officinis. Germ. fauch-
vorn Cypressenbaum. Belg. Cypressnoße, Gallicè,
Noix de Cypres, Ital. Nocciuolo di Cypresso, Hisp. El
agalla del Cypres. Alius Cupressi scobem & ra-
menta maxillatam, aliàs etiam oreloquum vocat.
Nux aut Eam cum Poeta nominabimus coniferam, lavem,
pilula Cu- acutam, arduam, teneram, plorantem, alticomam, ro-
pressi. rantem, odorantem, viridantem, celsam, nigram, odorife-
ram, deplorantem, viridantem, Srygiam, & cum O-
vidio feralem:
Funeris ara mihi ferali cincta Cupressu.
ut & acutam,
Vallis erat piceis & acuta densa Cupressu
cum Sylio messiam:
At forte decem missas ad busta Cupressos,
Funereas.

Dicitur etiam eadem *funesta*, ed quod & tardè
crescat & succisa non repullulet: quapropter fu-
nebris ligno ante defunctorum ædes eam posuere
Maiores, vnde Daniel Cerot.

I puer & postea funesta cinge cupressu.
Licebit & *triseram* cupressum cognominare, ter
liquidem in anno fructus eius colliguntur, Janua-
rio scilicet, Maio, & Septembri.

Cæterum, uno cupressi nomine *ma* & *sumina*
comprehenditur. Cupressu similis quoque *Thya*,
seu cupressus silvestris Theoph. cuius fructum
esse *Abbel orientalem* credimus, de quo mox. Cæ-
salpini autem Sabinam, vulgarem arborem in ma-
ritimis, crassiorē Iunipero, quam Dioscoridem
in codice Hermolai Iuniperum maiorem vocare
ait, seu cupressum silvestrem, Theophrastum et-
iam Iuniperum, licet ab aliis cedrum vocari te-
stetur Dioscorides, nos cedrum Lyciam retulim
Belloni facimus. Thuia item apud Theoph. au-
thore Cæsalpino, ad cupressum reduci oportere
videtur, de qua hoc lib. cap. de Thuia & cedro
Atlantis montis. chamæcyparissum etiam, quasi
punilam cupressum vocant, vulgè *da Cypres*,
quod quasi sit cupressi arboris. Sunt qui hanc
Abrotanum feminam esse putent, de qua suo lo-
co, sub chamæcyparillo.

Frater C. Bauh. misit nobis Lutetia arbusculas
Cupressi quas plantavimus in horto Ill. C. VV.
Montbelgardi. Lutetia sanè copiosas & pul-
chras vidimus arbores magnas variis in hortis.
Monspelii abundat ad magnam excresecens altitu-
dinem, ferens nuces Autumno, quæ durant per
totam Hyemem & Aestatem. In Italia etiam
frequentem observavimus, ut Venetiis, Patavij,
Mantue, Veronæ in cœnobio al frati d. S. Ioan-
de monte, ubi vestigia antiqui Theatri apparent.
Lugduno Io. Vimart insignis Pharmacopæus mi-
sit ramos, quos plantavi in horto Ill. C. VV. Te-
ste Turnero in Anglia in horto, cui Sion nomen,
copiosa. Odere [inquit Matth.] Cupressi flumi-
na, lacus, omneque aquosus tractus, quo sit, ut
in eiusmodi locis sata, statim inarescat. Quod
si rectè scivisset Adamus Lonicerus, non tam
facile, ut puto, scripsisset, Cupressum humidis
gaudere locis. Hinc rectè Bellon. Cupressus ta-
meti advena & difficillimè nascentium fuerit, ta-
men nunc tam mares, quam feminas vulgè sa-
tas, præcipuè apud Turcas, non in hortis modò,
in quibus ubique cæpère propagari, verum etiam
in agris feri & collibus solere comperio, ita ut cir-
ca Byzantium colles Cupressis pubescere videas,
quemadmodum etiam in vineis & sepibus. In
Creta Cupressorum silvas nequaquam compe-
rias, sed sparsum hic unam, ibi aliam in abruptis-
simis locis, aquas enim odit. Bellonio assentitur
C. Bauh. apud Matth. ita scribens: Cupressus apud
Italos in cœmeteriis colitur, cum funebribus arbor
olim fuerit habita: plurimas vidimus non longè
Patavio in colle circa Eremitarum cœnobium:
apud nos [Basilæ] sæpe licet ex semine germina-
rit Iuniperinis foliis, non tamen ad aliquam alti-
tudinem pervenit. Cupressus, inquit Dioscor. ad-
stringit, refrigerat. Cuius folia cum passo & mo-
dica Myrrha pota, vesica, fluidæ & urinæ difficul-
tati auxiliantur. Pilulæ verò contusæ, & cum vi-
no potæ, ad sanguinis reiectionem, & dysente-
riam, alvi fluxionem, erectâ cervicis spirationem,
& tussim commodant. Sed & decoctum ipsarum
idem facit. Mollunt etiam duricias, contusæ cum
Ficu, & polypos narium sanant. Removent item
scabtos ungues, cum aceto coctæ & cum lupinis
tritæ. Comprimunt & intestinorum Hernias im-
positæ

Folia. posita. Sed & folia eadem faciunt. Putantur etiam
Culices. culices fugare pilula cum coma suffita. At folia
Vulnera. trita imposita, vulnera glutinant: suppressunt &
 sanguinem. Cum aceto autem trita, capillos tuncunt.
Capilli. Imponuntur etiam per se, & cum polenta
Erysipelas. ignibus sacris, herpeti proserpenti, Carbunculis
Herpes. & oculorum inflammationibus. In ceratum vero
Carbunculus. ammixta si imponantur, stomachum corroborant.
Unguentum. Eadem serè a Galeno traduntur: Cupressi folia,
Galenus. gemina, pilula, recentes & molles, magna vlce-
Vlcera. ra conglutinant, in duris corporibus: ex quo cla-
Temperamentum. rum est, quod resiccandi vim habeat absque in-
 igni acrimonia, aut caliditate, sicut certè & gustus
 testificatur. Apparet enim in ea levis quedam
 acrimonia, sed plurima amaritudo, multoq; etiam
 plus acerbitalis in tota planta est. Tanta ei inest
 acrimonia, caliditasque, quanta satis sic deducen-
 da in altum acerbitali, ita ut nullam tamen mor-
 dicationem, aut caliditatem in corporibus effi-
 ciat. Proinde in alio latentes in flaccidis putre-
 scentibusque affectibus humiditates innoxie, tu-
 toque depalcitur, atque absorbit, cum quæ cale-
 faciunt simul, desiccantque, eas quidem quæ
 contentæ sunt, absorbant, ceterum acrimonia &
 caliditate alias attrahant. Sic enterocelicos iuvat:
 siquidem exsiccant, roburque addit, corporis par-
 tibus præ humiditate laxis: Quidam ea utuntur
 ad carbunculos & herpes, polenta miscentes,
 tanquam absorbente citra excalesfactionem eos
 morbos facientem humiditatem. Sunt qui ad Ery-
 sipelata utantur, admixta nimirum polenta cum
 aqua aut oxycrato aquoso. Cupressini vini facien-
 di modum docet Dioscor. cap. de Cedro antiquo-
 rum. Semina Cupressi (autore Plinio) foliis tu-
 sis si infusa, non sunt vermiculis obnoxia, nec
 si interlunio serantur: Cupressinum oleum eos-
 dem effectus habet, quos Myrteum & Citreum.

Enterocelis. Eius vero (teste Cornario) scobem & ramenta
 Cupressi ad corporis bonum colorem inducendū
 vtiuntur cum oleo. Ligni etiam usus aliquando ex
 Italia petiunt ad mentas & tabulas & alveolos ex-
 tornandos, & maxime odoris gratia. Sed & effi-
 caciores sunt nuges, inquit Lonicerus, foliis: so-
 lia ex aceto decocta ad urinæ odorem bibuntur.
Carbunculus. Galbuli recentes contusi vino traserantur, quod
Herpes. hæmoptoicis benefacit bibitum. Nuges ex aceto
Erysipelas. decoctæ doli dentium subveniunt. Contusi
 corticis pulvisculus ex aqua Sâbuci stillatitia ebi-
 bitus calculum tam vesicæ, quam renum pellit.
 Tradit Matth. Cupressi folia in vino cocta, addi-
 ta pauxilla Myrtha, ebibita auxiliari involuntariæ
 mictioni, & stranguriæ. Quæstuosissima, ait Bel-
 lon. Cretensibus esse solet Cupressus, quod eius
 materiam assam externis divendant. Caudices
 Cupressorum Cretensium ex crassitie comproba-
 bis, quod vel arcas ex asseribus quatuor pedum
 latas videre possis. Cum autem Cupressi materies
 oleosa, & veluti resinacea sit, pici faciendæ, Tedæ
 modo, idonea esse creditur, quæ vel ex hoc maxi-
 mè laudatur, quod neque vetustatem, neque cari-
 em sentiat, & bonum semper odorem spirat. Sed
 hoc habet peculiare in Creta, quod ab incolis
 succisa, ex cespite tamen regerminat, ut nepotes,
 stolonesque ex radicibus cedræ silvæ modo pro-
 creantur, qui tandem in maximas arbores excre-
 scunt.

Scobis. Nunc quod periculi plenum est, monere sanè
Lignum. oportet. Credere scilicet eis, qui de plantis scri-
 bunt, nec Medici sunt. Si Michael Neander Me-
 dicus fuisset, ille priusquam categoricè Physi-
 ces suæ part. I. scripisset, cupressi lignum frigidū
 esse, id degustasset, olfecisset, ac considerasset,

quæ Galenus scripsit de temperamento eius, &
 quæ Plinius de resina, quam acerrimam esse sta-
 tuit. Inter ligna frigida etiam recenset VVecke-
 rus cupressi lignum, cum tamen insignis odor &
 acrimonia demonstret esse calidum.


Latitudo. affertur.

Cedra filia. Cedra filia.

Stranguria. Cedra filia.

ABHEL FRUCTVS ORIEN- TALIS.

CAP. XVII.



CVILANDI-
 NVS nuper
 in Syria, Egypto
 & Arabia anno-
 tavit, ac Bellunē-
 sis alicubi literis
 commentatus est,
 Abhel fructū esse
 in toto Oriente
 notissimum, pilu-
 larū cupressi ma-
 gnitudine, colore
 ruffo in nigrum
 declivi, qui ex ar-
 bore sui generis
 Cupresso simili-
 ma decerpitur:
 Vim ei eliciendi
 menstrua, & fe-
 tus emortuos ex
 utero eliciendi,
 longè omniū va-

*Abhel Ori-
entalis.*

Fig.

lidissimam: Ni verò *Θείον* vel *Θύον*, vel *Θύα*, Tro-
 getes, Citrum, & Cedrus arbor ab Homero, The-
 oph. Diosc. Strabone, Plin. Martiale, & Dione
 historico appelleretur, nihil se porro de ea explo-
 ratum habere: Avicennam & Serapionem Ab-
 hel Sabinæ fructum si pronuncient, longius à ve-
 ritatis agnitione descissere, quod vniversus ho-
 die Oriens arborem toto cælo ab vtrique Saba-
 na disparatam Abhel appellare soleat. Hinc fa-
 cilè Clusius in Guilandini sententiam concessit,
 plurimum ad Thyiæ historiam à Theophrasto
 proditam, accedere arborem, cuius fructus Ab-
 hel: Talem autem Habbel nomine insignitum
 fructum sibi dedisse scribit Bernhardum Paluda-
 num Enchusianum Poliatrum è peregrinatione
 sua Syriaca & Aegyptiaca reducem. Eundem et-
 iam fructum Abhel Thyiæ Theophrasti tribuit
 Camerarius.

*Thya. Tro-
getes. Ci-
trum. Ce-
dus.*

*Avicenna
& Sera-
pion Ab-
hel non
Sabina
fructus.
Abhel ad
Thyiæ The-
ophr. acce-
dit.*

THYIA ET CEDRVS ATLAN- TIS MONTIS.

CAP. XVIII.

INCOGNITA hodierno die lateret, ni ex Histo-
 riis palam fieret. Quare non piget pro virili
 studio lectori eam ex veteribus & recentiori-
 bus manifestare. Homerus igitur: Odys. 9. hæc
 pauca literis consignavit.

*Τινάδι δ' ὀδύνης,
 κάδ' ἐκ τ' ἐλπίας οὐκ ἔδρα' ἵππον ὀδύνης.
 De longinquo autem odor,
 Cedrique sicca Thyique per insulam spirabant
 ardentium.*

Ac mirum quidem alicui hoc videri posset, cur di-
 cat ardentium, cum Theophrasto teste, perpetuò
 vireat ex silvestribus *Θύα*, & sic eius natura ad

*Perpetuò
vireat.*

	ardendum minus idonea sit & habilis. Sed mirari cessabit, si fructum eius Fabæ magnitudine resinosum esse & sulphureum, ut & arborē ipsam, ex Theophrasto intelligat [<i>EruSinen</i> Plin. odore jucundiorē: Gaza verò, qui vertit sulphureum, legit <i>Orosinen</i> Dalech.]	congerie, quas ob id à similitudine <i>Apiatæ</i> vocant. Summa verò omnium in colore. Hic maxime multi placet, suis resurgens venis. Posthæc amplitudo est iam totius caudicis, ac iuvant plura quoque in vna mensa vitia. Item lignæ venæ similitudo, vel coloris & quibus maxime obnoxias fecere æstus ventique, rimæ, aut capillamenta rimas imitata. Postea murena [melius Murthena, vel Murrhina] ac nigro transcurrens limite, variisque corticum punctis apprehensus Papaverum modo, & in totum atro propior color, maculæve discolorēs. Viti des terra condiunt Barbari, & illinunt cera. Artifices verò fumanti acervis imponunt septenis diebus, totidem intermissis: mirumque, ponderi quantum ita detrahant. Naufragia docuere nuper, hanc quoque materiam siccata mari, duritie incorrupta spissari, nec ullo modo vehementius. Nutriuntur optime, splendescuntque manu siccata siccata à balneis maxime: nec à vivis læduntur, ut his genitæ. Inter pauca nitidioris vitæ instrumenta hæc arbor est: quapropter insidendum ei quoque paulum videtur.	<i>Apiata.</i>
<i>Thua Theophr.</i>	Locus. Cæterum est hæc tardissimo ferè omnium germine. Montium enim cacuminibus, locisque algētib, quamvis excelsa, enascitur. Sed hunc locum (inquit Bellon.) de Thua arbore, mendā carere non puto, quod quivis facile percipiet, si Græcum exemplar contulerit. Siquidem quod à Theophrasto Thuium, ab aliis verò Thua appellatur, apud Ammonis Phanum atque in Cyrenensi agro nascitur, formā Cupressi simile, cum ramis, tum foliis, candice, fructūque: vel potius ceu Cupressas silvestris. Copiosum, vel ubi vrbis hoc tempore est, comperiti affirmant: atque etiam memotant contignationes quasdam vetustissimas Thuiæ: perdurat enim materies hæc incorrupta omnino. Radice huius arboris nihil crispus, eaque pretiosa opera conficiunt. Huius quoque ligni meminit Dioscorides, qui dicit: Agallochum lignum est, quod ex India & Arabia affertur Thyino ligno simile, punctis notatum [<i>Thy. Ait.</i> , Matth. Sed legendum forte <i>Thy. Ait.</i>]. Nam huius vocabuli nullam mentionem faciunt, nec Oribasius, nec Paulus, nec Serapio [Fuchs. <i>Thy. Ait.</i> , constrictum, compactum.	Locum Plin. correctum.	
<i>Excelsa. Gaza Ger. fio suspensa.</i>	Locus. Fusiis Cedrum montis Atlas & Thyam arborem prosequitur Plin. l. 13. c. 15. Atlas, inquit, mons peculiari proditur silva. Confines ei Mauri, quibus plurimæ arbor Cedri [Citri legendum vult Goropius] & mensarum infania, quas foemine vis contra margaritas regeant. Extat hodie M. Ciceronis in illa paupertate, & quod magis mirum est, illo ævo emptæ H. S. X. Memoratur & Galli Asinij, H. S. XI. Venundatæ sunt & dux, Iuba rege vendente: quarum alteri pretium fuit H. S. XV. alteri paulū minus. Internit nuper incendio à Cethegis descendens, H. S. XIII. permittatā latifundij taxatione, si quis prædia tanti mercari malit. Magnitudo amplissima adhuc fuit, vnius commissæ ex orbibus dimidiatis duobus, à rege Mauritaniæ Ptolomæo, quatuor pedum & semi-pedis per medium ambitum, crassitudine quadrantali: maiusque miraculum in ea est artis latente iunctura, quam potuisset esse naturæ solidæ. Item à Nomio Tiberij Cæsaris Liberto cognomen trahentis, tribus sicilicis infra quatuor pedes, totidemque infra semi-pedem crassitudinis. Quæ in re non omittendum videtur: Tiberio principi mensam quatuor pedes sextante & sicilico excedentem, tota verò crassitudine sescunciali, operimento laminæ vestitam fuisse, cum tam opima Nomio liberto eius esset, cuius materia erat Tuber. hoc est, radice vitium, maximeque in eo laudatum, quod sub terra totum fuerit, & ramis quàm quæ supernè, quæque gignuntur etiam in ramis: proprièque quod tanti emitur, arborum vitium est, quarum amplitudo ac radices attigant possunt ex orbibus. Sunt autem Cupressi feminæ etiamnum silvestri similes folio, odore, candice. Anchoranum mons vocatur ceteris Mauritaniæ, qui laudatissimam dedit Cedrum, iam exhaustus. Mensis præcipua dos in venæ et ipsa, vel in vertice variis. Illud oblongo evenit discursu, ideoque <i>Tigrina</i> appellantur. Hoc intorto, & ideo tales <i>Pantherina</i> vocantur. Sunt & vendatū crispæ, maiore gratiâ, si pavonum caudæ oculos imitentur: magna verò post hæc gratia extra prædictas crispis, densa veluti grana	<i>Papavera.</i>	
<i>Thua Plin.</i>	Arbor Cedri. Sed Citri. Proxima Circea radantur littora terre, Dives inaccessus ubi Solis Filia lucos Asiduo resonat cantu, testisque superbi Vrit odoratam nocturna in lumina Cedrum.	<i>Dalech. Plin. niam vocat de Circe & Calypso. Cedrus vocatur in Kirghis.</i>	
<i>Ciceronis mensa.</i>	notante Dalech.] Circes, quam Deam volebat intelligi, magno errore eorum, qui odoramenta in eo vocabulo accipiunt, cum præsertim [in versibus Homericis ineptè Plinius pro voce Græca <i>Σύνη</i> , Laricem interpretatur] eodem versu cedrum [Laricemve, Guiland. legit. Vide Leopardi lib. 8. & Virgilium:	<i>Plinij error.</i>	
<i>Mensuram amplitudo.</i>	<i>Ribora nec cuncta, & olentem scindere Cedrum, Nec planstrum cessant vestire gemensibus Orni.</i> apud Athenæum p. 131. vers. 8. Empedocles <i>Λίσκη</i> vocat, suaviter olentem.	<i>Leopardi Cedrum.</i>	
<i>Materia Tuber.</i>	<i>Συώνη τ' ἀρχαία Συώνη, Ἀλφάρη Συώνη.</i> Dalech.] Laricemque unà tradat: in quo manifestum est de arboribus tantum locutum. Theophrastus, qui primus à magni Alexandri ætate scribit, quæ circa urbis Romæ quadringentesimum quadragesimum gesta sunt annum, magnamiam huic arbori honorem tribuit, memoratas ex eo referens templorum veterum contignationes, quandamque immortalitatem materis in lætis, contra vitia omne [omnia M. & C.H.] incorruptæ. Radice nihil crispus, nec aliunde pretiosiora opera. Præcipuam autem esse eam arborem [mirum, cum idem Theophr. scribat hist. lib. 4. cap. 1. Thuiam in montium cacuminibus, & locis algidis nasci.] circa Hammonis delubrum. Nasci & in interiore [inferiore M.] cytenaice patte. De mensis tamen tacuit, & aliàs nullius ante ciceronianam vetustior est memoria: ex quo novitiæ [quæ novitiæ apparent C.H. quæ novitiæ apparet M.] apparent. Alia est arbor [citriam, sive Assyriam malum intelligit, Dalech.] eodem nomine, malum ferens [tenens M.] execratum aliquibus odore & amaritudine, aliis expetitur, domos etiam decorans, nec dicenda verbosius. Huius arboris mentionem fecisse videtur Virgil. idque asserente Dalechampro:	<i>Libani Syon.</i>	
<i>Cupressi similis odorata.</i>		<i>Thyoph. quæ vocatur Plin.</i>	
<i>Tigrina. Pantherina.</i>		<i>F. f. Thuiæ.</i>	
		<i>Radix crispæ, & pretiosa.</i>	
		<i>Locus.</i>	
		<i>Ciceronis mensa.</i>	
		<i>Alia arbor: Circea arbor.</i>	
		<i>Malum execratum.</i>	
		<i>Medio</i>	

Malam fo-

Media sunt tristes succos, tardumque saporem
Felicum mali, quo non praesentius ullum
Potale si quando seiva infecere moverea.

Sed nemo inficias ibit arborem, ex qua celebres
mensae fiebant, & Thuiam, & Thuium, *Thuium*, *Thuium*,
& *Thuium*, alibi etiam *Thuium*, *Thuium*, & *Thuium* passim &
citrum & Trogetem, à Theoph. & Plinio, vel
Roberto Constantino teste, dictam esse, quibus
addit Gesnerus idioma Germanicum *Ein frömb-*
der wolgeschmackter baum / cui proximum sit
lignum, quod Galli *Madaram* vel *Madrum* vo-
cent, quod idem vult Ruell. An verò tale li-
gnum extet odoratum, quod in Gallia Gallicè
dicatur *Madré*, videant qui eam inhabitant, nos
equidem tale quod ignoramus. *Thuium* verò cum
diphthongo legi, confirmat Gorop. in Vertumno
apud Diosc. cap. de croco, qui Ruellium erroris
quoque merito inculcat, quod eo loco, longè ab
autoris mente aberrans verterit. Gaze etiam per-
peram transfert Tyam, ut & in codice Theo-
phrastii *Thuium* corruptè legitur.

Madarum
Ruell. sa-
natur.Gaza no-
natur.Plinius
plumbarum
cognovit.

Plinij error.

Trogetem.

Ceterum, inquit Anguillara, Cedrus Atlanti-
ca, non mihi videtur alia quam Thuiam, vel Thuiam,
quamvis in diversis capitibus de iis scripserit Plin-
ius: ille enim plantas non cognovit, sed ex
diversis libris sua concinnavit. In Plinio de Thuiam
error ab eo commissus, vel textus corruptus: di-
cit enim Homero notam arborem Trogetem, quæ
aliis dicitur Thuiam, quod falsum, siquidem Ho-
merus non meminit Trogetes [necid dicit Plin.]
sed Thuiam: Dicit præterea Homerum intellexisse
cedrum & Laricem, quod etiam falsum.

Eiusdem opinionis cum Anguill. est Matthio-
lus, dicens in Diosc. cum magnis figuris: Sunt qui
dicant, & rectè quidem cedrum Atlanticam à

Thuiam à
Cedro At-
lantica ni-
hil differit.
Plin. redar-
guitur.Homero no-
ta.Probeniana
editio re-
preh.Error quo-
rundam.Bellon. no-
natur.

Thuiam sive Thuiam de qua Theophr. nihil differre.
Quamobrem Plinium redarguunt, quod simul ac
de cedro Atlantica differuit, illic caput pro-
prium de Thuiam scripserit, tanquam de arbore
diversa, verum longè aliter se habet sententia
nostra: nam diligenter Plinij lectionem enu-
cleantibus palam apertissimè sit, Thuiam Plin-
io nil aliud designare, quam Atlanticam ce-
dram. In antiquis codicibus Plinianis Thuiam
caput à Mauritana cedro separatam non est,
quod manifestè arguit, Plinium adhuc cedri hi-
storiæ prosequi de Thuiam agentem, quemad-
modum & ipsa verba clarissimè indicant, quæ in
aliquibus codicibus ita habent: Nota etiam Ho-
mero fuit, Trogete vocatur, ab aliis Thuiam, id est,
eadem cedrus nota etiam fuit Homero, quam a-
lij Trogetem, alij Thuiam appellant. Ideoque
perperam egerunt, qui in Frobeniana editione
Thuiam sive Thuiam caput ab Atlantica cedro divi-
serunt, haud rectè Plinium intelligentes. Ac
præterea lectionem eius corrumpunt, ubi se e-
mendasse crediderant. Iustè itaque nostro iu-
dicio reprehendit Matth. eos, qui caput de ce-
dro Atlantica separarunt à Thuiam. Displicet et-
iam nobis apud Bellonium & in editione Lugdu-
nensi pro Trogete, legi Thuiam græcè: nullibi e-
nim, quod observaverimus, legitur Trogete,
quam hoc Plinij capite. Cornarius, Cordus,
Gesnerus, Brunfelsius, Matthiolus, Anguillara, &
Calspinus, meminerunt Trogetes, sed nullum
aliud locum citant, quam Plinij antè dictum.

Thuiam igno-
ta.Plinij la-
psus.

Animadvertes, inquit Scaliger Thuiam igno-
tam nobis, nisi ex historia Theophrastea: cum a-
lias species enumeraret, quod & alibi fecit. Est
& aliud, quod à Plinio animadvertas. Ait ille in
deliciis apud Homericam circen usum fuisse
Thuiam arboris ad utendum. ceterum non apud

circen, sed apud calypso factum legas in quinto
Vlyssæ. Fecellit tantum viti memoriam lectio Vir-
giliana, in qua cedri usus eiusmodi attribuitur
circes deliciis. Eam autem indiligentiam pri-
mus Hermolaus sequutus est, cum autem usque
ad Ruellium omnes.

Circen ex
Calypso.Hermolaus
natur.Thuiam apud
Plinium.

In codice Pliniano veteri, Thuiam scriptum est, &
in veteri Homérico *Thuiam*. recentiores verò partim
Thuiam legunt, partim *Thuiam*. Hactenus Scaligeri verba
retulimus.

Nunc calspinus: Ad cupressum reduci oportere
videtur Thuiam apud Theoph. Plin. verò scribit
hanc Cedrum ab Homero Trogetem vocari, ab aliis
Thuiam celebrem. Laudatissimam fert mons An-
choratus citioris Mauritaniæ, præcipua dos
mensis in vena cuspis, &c. Plura cap. de arbore
vitæ, ibidemque Etymologiam.

Cupressus
natur.
Thuiam.
Cedrum.
Locus.

De Thuiam, sive Thuiam varix sunt opiniones, qua-
rum una est de arbore Abhel Orientis, de qua iam
dictum. Scribit Lacuna in Diosc. pro Aracatide
semen Thuiam demonstrari Plinianæ, verum scitu
admodum difficile, quam intelligat plantam pro
Aracatide, ut dicitur suo loco. Ex Sabina Thuiam
quidam faciunt, et olim teste Goropio, ponebatur
Sabina in suffumigia pro Thuiam arbore odorife-
ra. Cedrum Lyciam plantam teste Bellonio,
Thuiam Theoph. existimant. Arbor vitæ mul-
tis est Thuiam, ubi multa notatu digna de Thuiam ex
Goropio occurrunt, ut Etymologia. Dubitat
Cordus an Guaiacum fortè Trogetes seu Thuiam,
seu Citrum, de quo lib. 4. *Thuiam* apud Diosc. cap.
de Croco, non intelligenda de mortario, teste
Bellon. & aliis.

Acquiroca
Abhel O-
rientis.
Aracatide.

Sabina.

Cedrus
Lycia.
Arbor vitæ.

Guaiacum.

Mortarium.

BRUTA PLINIO.

CAP. XIX.

Tanta mortalibus suarum rerum satietas est,
& alienarum aviditas, ut petant [inquit Plin.
lib. 12. cap. 17.] in Helimæos arborem Brutam
[Brutum C. H.] Cupressi fusæ similem, exalbi-
dis ramis, iucundi odoris accensam & cum mira-
culo historiis Claudii Cæsaris prædicatam. Folia
eius inspergere potionibus Parthos tradit. Odo-
rem esse proximum Cedro, tumumque eius con-
tra ligna [quæ noxium & venenatum, vel gravem
& iniucundum accensa odorem mittunt] exida-
lia remedio. Nasitur ultra Pasitigrin in finibus
oppidi Sitacæ. [opimis Scytræ. Vet. præve oppi-
di Scytræ C. H.] monte Zagro [Scantio. Vet.
Schantro C. H.]

Bruta.
Brutum.

Vitis.

Locus.

Ruellius qui more suo eadem ex Plinio tran-
scripsit, quamvis nomen eius subiceat, addit:
Brutes arbor est soli Orienti cognita, neque La-
tinis aded celebrata. Sunt qui hanc in Europa,
atque aded Gallia iam nasci existiment, esseque
alterum Sabinae genus: nec profectò longè ab ea
dissidere.

Ruell. sa-
natur.Sabina fo-
cunda.

Nos quidem colligimus Ruellium intelligere
Bellonij Sabinae alteram bacciferam, quam Bru-
tes putat, & arborem vitæ nominat, cuius descri-
ptionem posuimus cap. de Sabina.

Brutes Be-
lon.
Arbor vitæ.

Bellonio subscribit Clus. dum dicit: Non de-
sunt, qui arborem vitæ, ad arborem Brutam Plin-
ij referunt, quam describere videtur

Arbor Filii-
ci similis.

Oviedus, faciens arborem
Filici similem,

ARBOR VITÆ, SIVE PARADISIACA
VVLGÒ DICTA, ODORATA AD
Sabinam accedens.


CAP. XX.

Descriptio

Caudex.

Materia.

Rami.



Folia.

Flores.

Squamæ.

Semina.

Coni.

Odor.

Arbor Vita.

Sabinæ
Lutetianæ.Cedri In-
dia alis-
ma.

Quamquam non inqui-
lina elegans hæc
arbor, faciliè ta-
men cælo, solo-
que nostro af-
fuescit, sic ut in
iustæ proceritatis
arborem excre-
scat, caudice re-
cto, nodoso, cor-
tice cinereo aut
rubente, mate-
rie Abiegnâ resi-
nosâ: ramis per-
petuâ comâ vi-
rentibus, & a-
larum modo ex-
pansis, qui in a-
liis ramulos pla-
nos alternatim
è latere succres-

centes divisi, abeunt denud in multa, oblonga
folia, numerosis foliolis compressis, quaterna me-
dium gibbosum complectentia ex ramulorum ex-
tremis, aut paulò citrà. Vere oriuntur flores pu-
silli, flavescentes, quorum nonnulli deinde in
conos parvos sublongos, Pinei nuclei magnitu-
dine efformantur, è sex tenellis squamulis
compactos, initio virides, deinde pallescentes,
postremò ubi planè maturuerunt nigricantes, qui
in quatuor carinas dehiscentes, semina ostentant
sublonga, quaterna, plerumque paleacea, medio
paululum extuberante, in quo medulla acris &
amariusculi saporis. Coni hi non nisi detracti ferè,
aut tabidi pediculo excidunt. Huius autem
plantæ odor nobis non est gratus, de quo hæc
Clusius: Tota arbor graviter odorata est reliquas
congeneres longè superans odore, quem, si quis
folium digitis nonnihil duntaxat confricaverit,
faciliè eluere non possit. Hunc autem non modò
viridis ex se exhalat, sed etiam multus in annis ex-
cisa & resiccata retinet.

Arbor porro de qua nunc agimus, & quam
icone exhibemus, passim *Arbor vita* dicitur, quã-
vis hic titulus aliis pluribus arboribus conveniat.
Ni multum labat memoria, huius meminit Bello-
nius, nomine arboris vitæ, quæ provenit Lute-
tiæ, & aliis locis. Sed obscurè admodum, uti co-
piose demonstrabimus cap. de Sabina, de hac
tractavit Bellonius, & cum secutus Cardanus de
varietate rerum lib. 6. cap. 20. ubi meminit Sabinæ
Lutetianæ Bellonii, & arboris vitæ. Illud mo-
dò notandum hanc arborem à quamplurimis
cum aliis confundi. Considerandum tamen
an hæc arbor non tradatur à Francisco Loupez, &
M. Fournier, cum scribunt: In India provenit
arbor valde alta, odorata, Cedrumque referens.
An etiam à Iacobo le Moine de Florida agente,
qui meminit Insulæ, in qua erant tantum celsis-
simæ Cedri, quapropter ea Cedrorum Insula
cognominata? An verò ab Oviedo cum de Filici
Hispanicæ simili arbore?

Thevetus etiam videtur eam agnovisse in sua
America, quando ait: In Canadâ silvestres ho-

mines cum nives sunt sat profundæ, exploratâ
viâ cervorum, figunt in ea Cedri ramos [qui per-
petuò virent] retium modo: sub quibus se oc-
cultant armati. Cervi autem allecti viriditate &
tritâ viâ ed veniunt, ubi excipiuntur à silvestri-
bus hominibus. Et: Hoc silvestribus singulare,
quum laborant febribus, aut aliis interioribus
morbis, eos assumere folia arboris valde similis
Cedris quæ reperiuntur in monte Lugdunensi, &
ius exprimere, ac bibere: nec dubitandum intra
24. horas, quemcunque morbum etiam inuete-
ratum hoc potu curari, prout sæpius Christiani
experti sunt, & in has regiones [nempe Galliam]
plantam attulerunt. Item alio in loco: In insula
Ellores abundat species Cedri arboris, quæ silve-
stribus hominibus nominatur *Oracatin*, ex cuius
ligno varia pulcherrima utensilia parantur: quod
sit valde odoriferum putredini non obnoxium
sive in aqua, sive in terra. Hæc Thevetus qui no-
stro iudicio de vna & eadem planta scribit, quam-
vis separet. Quænam enim obsecro Cedrus, quæ
provenit in Lugdunensi territorio? Provenire
quidem audimus Pini silv. genus.

An porro, quod suspicamur, Cedrus Tho-
mæ Hariot cuius in histor. Virginæ, mentionem
fecit?

Celebratur Arbor vitæ à Libavio quando di-
cit: Citrus vel Cedrus Atlantica aliis cognomen-
tis nuncupatur *Aethiopica, Mauræ, Maurasiaca, Ly-
bica, Hesperia, Cyrenaica, Hammonia*: vnde Mar-
tialis.

Gemmantes primâ fulgent resudine lecti

Et Maurasiaca pondera rara Citri.

Lucanus scribit Cleopatram mensas exhibuisse,
quarum pedamenta fuerint eburnea, orbes ex
præstantissima Citro, quæ Trogetes & Thya
dicebatur.

Dentibus hic nives scilicet Atlante sylva

Impesere orbes, quales ad Casaria ora

Nec capto venere iuba.

Quia autem nascebatur olim in finibus Cyrenæ-
cæ iuxta Hammonem & in Atlante, iam dicta no-
mina sibi assuit. *Africa incolæ* etiam à nonnullis
dicta: & Hesperis ab occasu non ab hortis filia-
rum Atlantis.

Est alia arbor Medica, inquit Lemn. in con-
stituta de lignis Sethim, etiam vocata Citrus, sed
quæ Mala aurea non profert, silvestri Cupresso,
aut Cedro non absimilis, ut nonnulli existiment
esse *Sethim*. Lignum est à canie, teredine, vermi-
culisque alienum, nec villo suo corruptioni ob-
noxium. Hæc de ista Thya seu Citro. Si ex ar-
gumento cognationis naturalis iudicandum est,
ad hanc referendæ sunt Cupressus mas & femi-
na & Citrus Atlantica minor, ut Arbor vitæ. Sed
arborescit vitæ teste Clusio, plurimi Theophrasti
existimant. Quamvis non desint (inquit
hist. lib. 5. cap. 5.) qui ad arborem Brutam Plinij
referant, Cupresso fusæ similem. Hæc quidem ar-
bor [vitæ nimirum] ad Cupressum nonnihil ac-
cedit: verum ramos sursum non attollit, quem-
admodum illa, sed in planas veluti alas expan-
sas, in latitudinem diffundit: Huius item folia
tametsi ex foliolis squammatim compacta, omni-
nò plana sunt, non rotunda, uti Cupresso, Iuni-
pero maiori, Sabinæ: nec rotunditatem contra-
bunt, antè quàm in ramos excrecant. Galli
Arbre de vie, hoc est, arborem vitæ nuncupant, ne-
scio quâ ratione ducti, nisi fortè ob immortalem
eius comam, quam habet, aut odoris eius vohe-
mentiam, quam salubrem esse existimant, hoc
nomen indidarint. Vulgus Herbariorum &
Thuiam

*Thua plu-
ra genera.* Thuiam & arborem vitæ appellat. Nonnulli plu-
ra genera Thuiæ constituunt, & hanc arborem
ternum genus esse volunt.

*Cedrus pro
Citro apud
Plin. mali.* Nunc Goropij hac de re sententiam audiamus.
Longè, inquit, à Plinij sententia discedunt, qui
eo capite, quo de monstruosi pretij mensis tra-
ctat, Cedrum pro Citro scripserunt. Criedide-
rim Romanos arbores, è qua cispamateria se-
cabatur, principid Citrum nominasse, ac voce
Chitram. Africana, nonnihil corrupta, Chitram, vel ut alij
legunt Chatram. Significatur enim hac voce A-
rabibus Cedrus. Quamobrem cum Pœni Chi-
tram pronuntiarent, & in Cedrorum genere ar-
boris illud genus, è cuius nodis mensæ fiebant,
collocarent, Romani Citrum nominarunt. Ignari
verò Cedrum, &c.

*Thuiam de-
dicta.* Et paulò post Nos igitur in ea sumus opinione
Thuiam Theophrasti esse Cedrum, sive Cedre-
lata masculam. Romani melius fecissent si
mensas Cedrinæ nominassent. Thuia tandem
genus de causâ ita vocatur: Altera, quod in sa-
crificiis Thuiæ loco habetur: altera, quoniam
[Cimbris] Thehui & inde Thui, nihil aliud est,
quàm custodia. Perderat, Theophrasto teste,
materies hac omnino incorrupta, unde meritò
arborem vitæ vocant. In Plinij & Homeri codi-
cibus Sior, non Sior, ut plerique habent, legen-
dum: An verò per diphthongum scripserit Ho-
merus, an non, id necdum puto satis liquere. Ap-
ud Dioscorid. in cap. de Croco Sior cum diphthongo
legimus, quo loco Ruellius mortarium verut,
longè ab auctoris mente aberrans. Thuium tan-
dem sive Thua dicas, quam sacra litera ex India
adferri dicunt, eam Theophrastus ex Cyrenaica,
Plinius ab Atlante & Anchorario Mauritaniz
monte adferri scribunt. Concludit tandem di-
scors: ad templum Salomonis non solum aurum
ex Atlantico orbe petebatur, sed ligna quoque
Thyina eadem navigatione adferebantur, quæ an
ex Atlanticis silebus, è quibus post à Romanis
magnis sumptibus petita legimus, an ex orbe
quoque Opher advecta sint, cum utrumque
commodè fieri potuerit, ignoro.

Arbor Sui. Gesnerus quoque huius arboris recordatus est,
his verbis: *Arborem vitæ* à quibusdam vocari, Lute-
tia revertens nuper amicus quidam mihi retulit:
cuius ramulum ostendebat, ex America transla-
tam dicens, & in horto quodam Lutetiz à Petro
Bellonio sibi demonstratam. Sabinæ videtur ge-
nus, quod quidam Bruton esse volunt, simillima-
que Cupressi: sed hanc fert dissimilem, odora-
tam tamen & nigriorem: folia Salviam olent. Ve-
rùm Gesnerus, Bellonium imitatus, confundit
hanc plantam cum alia quadam: Siquidem Arbor
vitæ non fert baccas, sed veluti oblongos mini-
mos conos, qui semine maturo conorum modo
dehiscunt: hanc arborem Bellon. de conif. vocavit

*Thyina li-
gua in
templo Sa-
lomonis.* Arborem vitæ & Sabinam & Brutes secundum,
cuius duas descriptiones ponit, quas posuimus
capite de Sabina.

*Arbor Gi-
ta.* Lyciam Cedrum, (aiunt Lob. & Pen. Adv.) jam
diu vidimus Lutetiz in quibusdam hortis folio
Cupressi compresso, semper virentibus squamulis,
loricatis capitulis, semen Laricis claudenti-
bus: Belgicis herbariorum viretis hodie notissi-
ma *Arboris vitæ* nomine. Eius folia trita suavissi-
mum fundunt odorem. Ibi tradebant quandam
bacciferam Cedrum Lyciam. Mirum autem, quid
sibi voluerint autores Adversariorum: primò cum
sua Lycia Cedro baccifera Lutetiz visa, quum
nunc aliam eodem nomine tradant, quæ nullas
baccas fert. Quæ in Advers. dicuntur de Aegy-

*Sabina De-
dicta.* ptia Sabina Bononiensi, & de Abrotano pere-
grino Cupressi foliis videntur aliquatenus con-
venire cum arbore vitæ. Ex iam itaque adductis
luce meridiana clarius patet, neque Lobelio &
Penz bene notam fuisse hanc arborem.
Dicitur & arbor vitæ (inquit Dod.) Thuiæ Theo-
phrastu, aut Plinij Bruta esse, quod asserere non
fuerit facile. Novi omnibus nova stirps habenda
est.
An Arbor vitæ, arbor de qua scribit Levinus
Apollonius Peruana sua regione, dum dicit: Mi-
ri odoris arborum ligna cremantur, ex quibus
dum cortices detrahuntur, tam acri odore adeps
defluit, ut oleum nares, cerebrumque deterumet
afficiat; illita verò defunctis, aut guttis instillata
(quemadmodum Cupressi permanens resina)
perpetuò ab vermiculorum iniuria, canèque,
mortuorum cadavera vindicat.
Tabernamont. Arbor vitæ, Brunn deß Lebens/
Hist. verò Lugd. Thuiæ genus tertium, Arbor vitæ
Gallis, *Luteux paradisica arbor.* Vocatur à Camer. *Paradisica*
in hort. Thuiæ sive Thyæ, vulgò arbor vitæ, ut
Galli nominant. Goropius in suo Vertumno, Ar-
borem vitæ sive Thuiam cum Cedro antiquorum
conjungit & allegat Virgilij verbum:
Virens odoratam nocturna ad lumina Cedrum.
C. Bauh. apud Math. In classem Cedrorum re-
fert arborem vitæ. Multis videtur Thuiæ Theo-
phrastu, alij ad Brutam Plinij referunt, licet pau-
cissima notæ Pliniane, nostræ conveniant. Arbu-
scula est admodum odorata, perpetuò virens, al-
titudine virum longè superans: flores ut in Cu-
presso. Hæc ex Canadas Septentrionalis Ameri-
cæ provincia in Galliam primò illata & Francis-
co Regi Arboris vitæ nomine donata, quam Lu-
tetiz cum essemus, ex regio horto, quem Io. Ro-
binus colit, accepimus.
Primum Clusio conspecta hæc arbor in horto *Locus:*
regio *Fountainbleau*, non procul Aurelianâ Gal-
lorum, eò ex America Septentrionali ora, *Canada*
dicta, delata, Gallorum imperium obtinente
Francisco huius hominis primo, litterarum o-
melum summo Mæcenate, nec antè, ut existi-
mat, Europæ cognita. Deinde apud Doctissimū
Virum Nicolaum Rassium Regis Chirurgum, qui
primus sua opera eam Belgio communicavit, ubi
nunc adeò frequens est, ut nullus sit rei herbariæ
studiosus, qui eam in suo horto non aliat: inde
porro in pluresq; Germaniæ hortos transit: fa-
cilè enim rami depaßi radices agunt, quemad-
modum sæpè est expertus, præsertim loco um-
broso & feruli, pinguique solo. Nascitur etiam *Radices*
semine: sed tenellæ plantæ antè quàm in ramos *facile agit.*
dividantur & explicentur, Oxycedrum, Junipe-
rūque maiorem primū enatas admodum æ-
mulantur. Frigoris patientissima est: Hieme tamen *Semina na-
scitur.*
fuscum & fuliginosum colorem contrahentibus *Frigitur*
foliis, quæ novo Vere pristinum nitorem & viri-
ditatem recipiunt. Sed & Cameratio primū à
Rassio missa, facilè semine nascitur, & surculis
propagatur, fertque Hiemem parùm stramine vel
simili re munita. Seri autem debet in vasis terra *Sarici*
optima & cribrata plenis, ut semen quarta parte
digni eâ tegatur. Cum verò rigare opus est, terra
lintheo imposito irriganda, alioqui semina sursum
ascendunt & nudantur: quod etiam in aliis obser-
vandum est. Novellæ plantulæ à Sole meridiano *Cultura:*
per maiores æstus defendenda, atque hæc ratione
plurimas arbusculas brevi consequi possumus:
Nobis autem primū visa opera fratris Bauh. qui
misit Lutetiâ nomine *Arboris Paradisi*, quam plan-
tavimus in horto Illust. Cels. VV. ea excrevit *Arbor Pa-
radisi.*

*Sabina De-
dicta.* ptia Sabina Bononiensi, & de Abrotano pere-
grino Cupressi foliis videntur aliquatenus con-
venire cum arbore vitæ. Ex iam itaque adductis
luce meridiana clarius patet, neque Lobelio &
Penz bene notam fuisse hanc arborem.

Dicitur & arbor vitæ (inquit Dod.) Thuiæ Theo-
phrastu, aut Plinij Bruta esse, quod asserere non
fuerit facile. Novi omnibus nova stirps habenda
est.

An Arbor vitæ, arbor de qua scribit Levinus
Apollonius Peruana sua regione, dum dicit: Mi-
ri odoris arborum ligna cremantur, ex quibus
dum cortices detrahuntur, tam acri odore adeps
defluit, ut oleum nares, cerebrumque deterumet
afficiat; illita verò defunctis, aut guttis instillata
(quemadmodum Cupressi permanens resina)
perpetuò ab vermiculorum iniuria, canèque,
mortuorum cadavera vindicat.

Tabernamont. Arbor vitæ, Brunn deß Lebens/
Hist. verò Lugd. Thuiæ genus tertium, Arbor vitæ
Gallis, *Luteux paradisica arbor.* Vocatur à Camer. *Paradisica*
in hort. Thuiæ sive Thyæ, vulgò arbor vitæ, ut
Galli nominant. Goropius in suo Vertumno, Ar-
borem vitæ sive Thuiam cum Cedro antiquorum
conjungit & allegat Virgilij verbum:

Virens odoratam nocturna ad lumina Cedrum.

C. Bauh. apud Math. In classem Cedrorum re-
fert arborem vitæ. Multis videtur Thuiæ Theo-
phrastu, alij ad Brutam Plinij referunt, licet pau-
cissima notæ Pliniane, nostræ conveniant. Arbu-
scula est admodum odorata, perpetuò virens, al-
titudine virum longè superans: flores ut in Cu-
presso. Hæc ex Canadas Septentrionalis Ameri-
cæ provincia in Galliam primò illata & Francis-
co Regi Arboris vitæ nomine donata, quam Lu-
tetiz cum essemus, ex regio horto, quem Io. Ro-
binus colit, accepimus.

Primum Clusio conspecta hæc arbor in horto *Locus:*
regio *Fountainbleau*, non procul Aurelianâ Gal-
lorum, eò ex America Septentrionali ora, *Canada*
dicta, delata, Gallorum imperium obtinente
Francisco huius hominis primo, litterarum o-
melum summo Mæcenate, nec antè, ut existi-
mat, Europæ cognita. Deinde apud Doctissimū
Virum Nicolaum Rassium Regis Chirurgum, qui
primus sua opera eam Belgio communicavit, ubi
nunc adeò frequens est, ut nullus sit rei herbariæ
studiosus, qui eam in suo horto non aliat: inde
porro in pluresq; Germaniæ hortos transit: fa-
cilè enim rami depaßi radices agunt, quemad-
modum sæpè est expertus, præsertim loco um-
broso & feruli, pinguique solo. Nascitur etiam *Radices*
semine: sed tenellæ plantæ antè quàm in ramos *facile agit.*
dividantur & explicentur, Oxycedrum, Junipe-
rūque maiorem primū enatas admodum æ-
mulantur. Frigoris patientissima est: Hieme tamen *Semina na-
scitur.*
fuscum & fuliginosum colorem contrahentibus *Frigitur*
foliis, quæ novo Vere pristinum nitorem & viri-
ditatem recipiunt. Sed & Cameratio primū à
Rassio missa, facilè semine nascitur, & surculis
propagatur, fertque Hiemem parùm stramine vel
simili re munita. Seri autem debet in vasis terra *Sarici*
optima & cribrata plenis, ut semen quarta parte
digni eâ tegatur. Cum verò rigare opus est, terra
lintheo imposito irriganda, alioqui semina sursum
ascendunt & nudantur: quod etiam in aliis obser-
vandum est. Novellæ plantulæ à Sole meridiano *Cultura:*
per maiores æstus defendenda, atque hæc ratione
plurimas arbusculas brevi consequi possumus:
Nobis autem primū visa opera fratris Bauh. qui
misit Lutetiâ nomine *Arboris Paradisi*, quam plan-
tavimus in horto Illust. Cels. VV. ea excrevit *Arbor Pa-
radisi.*

*Sabina De-
dicta.* ptia Sabina Bononiensi, & de Abrotano pere-
grino Cupressi foliis videntur aliquatenus con-
venire cum arbore vitæ. Ex iam itaque adductis
luce meridiana clarius patet, neque Lobelio &
Penz bene notam fuisse hanc arborem.

Dicitur & arbor vitæ (inquit Dod.) Thuiæ Theo-
phrastu, aut Plinij Bruta esse, quod asserere non
fuerit facile. Novi omnibus nova stirps habenda
est.
An Arbor vitæ, arbor de qua scribit Levinus
Apollonius Peruana sua regione, dum dicit: Mi-
ri odoris arborum ligna cremantur, ex quibus
dum cortices detrahuntur, tam acri odore adeps
defluit, ut oleum nares, cerebrumque deterumet
afficiat; illita verò defunctis, aut guttis instillata
(quemadmodum Cupressi permanens resina)
perpetuò ab vermiculorum iniuria, canèque,
mortuorum cadavera vindicat.
Tabernamont. Arbor vitæ, Brunn deß Lebens/
Hist. verò Lugd. Thuiæ genus tertium, Arbor vitæ
Gallis, *Luteux paradisica arbor.* Vocatur à Camer. *Paradisica*
in hort. Thuiæ sive Thyæ, vulgò arbor vitæ, ut
Galli nominant. Goropius in suo Vertumno, Ar-
borem vitæ sive Thuiam cum Cedro antiquorum
conjungit & allegat Virgilij verbum:
Virens odoratam nocturna ad lumina Cedrum.
C. Bauh. apud Math. In classem Cedrorum re-
fert arborem vitæ. Multis videtur Thuiæ Theo-
phrastu, alij ad Brutam Plinij referunt, licet pau-
cissima notæ Pliniane, nostræ conveniant. Arbu-
scula est admodum odorata, perpetuò virens, al-
titudine virum longè superans: flores ut in Cu-
presso. Hæc ex Canadas Septentrionalis Ameri-
cæ provincia in Galliam primò illata & Francis-
co Regi Arboris vitæ nomine donata, quam Lu-
tetiz cum essemus, ex regio horto, quem Io. Ro-
binus colit, accepimus.
Primum Clusio conspecta hæc arbor in horto *Locus:*
regio *Fountainbleau*, non procul Aurelianâ Gal-
lorum, eò ex America Septentrionali ora, *Canada*
dicta, delata, Gallorum imperium obtinente
Francisco huius hominis primo, litterarum o-
melum summo Mæcenate, nec antè, ut existi-
mat, Europæ cognita. Deinde apud Doctissimū
Virum Nicolaum Rassium Regis Chirurgum, qui
primus sua opera eam Belgio communicavit, ubi
nunc adeò frequens est, ut nullus sit rei herbariæ
studiosus, qui eam in suo horto non aliat: inde
porro in pluresq; Germaniæ hortos transit: fa-
cilè enim rami depaßi radices agunt, quemad-
modum sæpè est expertus, præsertim loco um-
broso & feruli, pinguique solo. Nascitur etiam *Radices*
semine: sed tenellæ plantæ antè quàm in ramos *facile agit.*
dividantur & explicentur, Oxycedrum, Junipe-
rūque maiorem primū enatas admodum æ-
mulantur. Frigoris patientissima est: Hieme tamen *Semina na-
scitur.*
fuscum & fuliginosum colorem contrahentibus *Frigitur*
foliis, quæ novo Vere pristinum nitorem & viri-
ditatem recipiunt. Sed & Cameratio primū à
Rassio missa, facilè semine nascitur, & surculis
propagatur, fertque Hiemem parùm stramine vel
simili re munita. Seri autem debet in vasis terra *Sarici*
optima & cribrata plenis, ut semen quarta parte
digni eâ tegatur. Cum verò rigare opus est, terra
lintheo imposito irriganda, alioqui semina sursum
ascendunt & nudantur: quod etiam in aliis obser-
vandum est. Novellæ plantulæ à Sole meridiano *Cultura:*
per maiores æstus defendenda, atque hæc ratione
plurimas arbusculas brevi consequi possumus:
Nobis autem primū visa opera fratris Bauh. qui
misit Lutetiâ nomine *Arboris Paradisi*, quam plan-
tavimus in horto Illust. Cels. VV. ea excrevit *Arbor Pa-
radisi.*

in arborem pulchram, semper virentem, quæ ex ramis facile radicitur, ac Hiemem commodè sine nocumento perfert: non tamen profundè radicitur, quin oportet maiores fulcire, ne à vento deiciantur, ut accidit nostræ primæ arbori quæ anno 1604. deiecta fuit, licet palis retineretur. Habet Basilea D. Felix Platerus in suo horto per me missam. Stutgardia etiam pulchras vidi arbores. Ex sapore & odore [autore Tabern.] facile colligitur hanc arborem calidæ & siccæ temperiei esse. Non dubium Clusio, quin ad pleraque sit utilis: nemo verò illius facultates suo xvo prodidit, quod sciat. Cum tamen magnam habeat partium tennitatem, & amaritudinē sit, verisimile est digerendi & abstergendi facultate præditā esse. Hæc arbor, inquit Camer. in pretio habenda est, non solum propter eius odoris fragrantiam, cuius contusi ramuli naribus impositi, quandoque sanguinem eliciunt, sed etiam propter alias eius facultates non contemnendas. Elicitur quoque ex ea aqua & oleum per Chymica organa, vtile ad dolores podagricos, ritè impositum.

Tempera-
mentum.
Vius.

Digerit.
Abstergit.

Aqua. O-
leum
Dolores po-
dagrici.

SABINA BACCIFERA ET STERILIS.

CAP. XXI.

Descriptio

Humilis.

Vulgatior.
Folia My-
rtica.

Folia Cu-
pressæ.

Caudex.
Oder. Sa-
por.


Bacca.

Tubercula.

Apex.

Bacca ma-
tura.

Floris mul-
ti.



dentia, ex tribus, quatuor, aut quinque exiguis,

viridantibus tuberculis, instar Myrmecia verru-
cæ parvulæ, composita. Quandoquidem autem
Lobel. tres species facit, eius descriptiones hic su-
biciemus: Boreales, Meridianique horti, præser-
tim in Claustis Vestalium, Sabinam vulgariorē
alunt, longè notissimam Tamarisci foliis, sed
rigidioribus, pungentibus, retrumque odorem
halantibus, perpetuè virentibus, & baccarum ex-
pertibus. Vulgatæ sterili Sabinæ (quæ tamen
flosculos ex herbido luteos promit) ortu, totaque
facie simillima, sed foliis paulò minus acuto, mi-
nùsque rigido, & pungente, bacca line grano re-
sinoso, Iunipero nostrati pari & concolorē. No-
stra virēta Belgica cultiora hanc alunt munere lo-
Muroni. Altera superiori coniungenda, ramu-
lorum exilitate & foliorum lenitate donata, di-
versa: media inter Sabinas & Cedros Phœniceas,
foliis Sabinæ aut Cupressi vocatas, videtur: sed
folia tenuiora & delicatiora, minimè aspera &
pungentia sunt. Fructus Iuniperi minoris par-
tis, similis & concolor. Natalibus gaudet montosis
Calabriæ & Apuliæ, ni labat memoria.

Nostræ Sabinæ icon emptionis, demonstrat tan-
tūm baccifera ramum, cum foliis non spinosis
qualem variis in locis etiam spontaneam observa-
vimus. Alteram autem sterilem ex Marth. de-
sumplimus.

Ceterum Sabinam in genere novisse Diosco-
ridem, ex sequentibus eius verbis didicimus.
Baryton, aliqui Baryton appellant nonnulli Bary-
ton, Barathron & Baron. Eius species duæ sunt.
Alteram foliis est similis Cupressi, sed spin-
osior & graveolens, acris & servida. Est autem ar-
bor curta & in latitudinem magis se fundens. Et
quidam foliis eius ad suffitus utuntur. Altera My-
rticæ [Tamarisci] foliis similis est. Plinio Herba
Sabina Brathy appellata à Græcis, duorum gen-
erum est. Altera Tamarisci similis folio: altera Cu-
pressi. Quare quidam Creticam Cupressum di-
xerunt. Est tamen & Selago appellata, similis her-
ba Sabinæ. Sabina herba propagine seritur & a-
vullione. Tradunt facie vini, aut è parietibus la-
tere tuso, mirè ali. Huic semen nullum.

Dioscorides hoc loco (inquit Herm.) Baryton
vocari Savinam tradit à nonnullis. Ut fortasse de
hac intelligant Scriptores, præsertimque Diodo-
rus, cum in Arabia nasci dicunt Boraton Iunipe-
rum, Cedrumque, quasi Boraton pro Baryto, vel
contra exemplariorum vitio legatur. Testatur
Ruellius Sabinam nomen ubique retinere, ac in
quibusdam Gallia tractibus Savinieram nomina-
ri. Hæc (ait ille) Brutes arbor est, soli Orienti
cognita, neque Latinis adeò celebrata. Sunt qui
hanc in Europa atque adeò Gallia iam nasci exis-
timent, esseque alterum Sabinæ genus: nec pro-
fectò longè ab ea dissidet. Addunt & quadamte-
nus tum odore, tum colore immutatam, quia &
cælum & solum inventu quoque mutaverit. Huc
facit etiam, quod rudimentum nominis Græci
Brathys luxatis literis, & aspiratione sumnota vi-
deatur elucere. Quodnam autem sit Sabinæ se-
cundum genus Ruellio, quod Brutes existimat,
investigandum. Videtur intelligere Sabinam se-
cundam, quam habet Bellonius, quam etiam
Brutes putat. Perpendendum insuper an eam
intelligat Ruell. quam Bellon Arborem vitæ no-
minat, de qua suo proprio capite.

Nunc subiiciamus, quæ traduntur à Bellon. co-
nif. arb. de Sabinis duabus: scribit autem: Itali
quemadmodum & multi incolæ Epyri & magna
Græciæ pars non itudens agriculturæ, paucas
alunt in hortis herbas, præter eas, ex quibus pro-
ventum

Sabina tres
Lobel.

Vulgatior.

2.

3.

Sabina spe-
cies hinc
Diosc.

Brathy Ba-
ryton.

Cupressi
folia.

Tamarisci
folia.

Brathy Pl-
mo.

Cupressi.

Cretica.

Selago.

Secundus
modus.

Semen ca-
ret.

Baryton.

Brutes.

Sabina al-
terum ge-
nus.

Brutes.

Sabina se-
cundum
genus Ruell-
io quod.

Brutes.

Sabina se-
cundum
genus Ruell-
io quod.

Brutes.

Sabina se-
cundum
genus Ruell-
io quod.

Brutes.

Sabina se-
cundum
genus Ruell-
io quod.

Brutes.

Sabina se-
cundum
genus Ruell-
io quod.

Brutes.

ventum sentiant. Idem neque Sabiam primam neque alteram, i. e. neque sativam, neque silvestrem bene norunt. Ambas autem suapro sponte nascuntur in montis Amani & Olympi Phrygiæ cacuminibus videmus. Norin hortis sativam tantum colimus. Fugorum patientissima est Sabina, idem ea nobis feliciter prodeunt, culta altius attollitur. Silvestris huius comam dispersit. Priscæ Sabiam arborem dividentes in primam & secundam partebantur: de primam dictum est. Alterius autem Sabia folium, Cupressum aut Tamariacis simile est. Hæc namque modo ab authoribus detrahi solet, quos sine non plurimam odorior, quod eam arborem herba nomine vocaverunt. Non erit quoque mirum, si eam amara silvestres sint, alteram cultam dixerim, quam vulgus nostrum agnoscit: altera inculcamentis nostris vltoribus sabbatibus inuisam. Ut autem Sabiam alteram hæc, qualem in montis Tauro excelsum vertice descripsimus, prosequamur, adiciendum fuit aliam frequentiore arborem, quam Sabiam utramque videri non posse. Sylvas hæc de se in summis Amani & Olympi montibus faciunt, in quibus nullam arborem præter has copiosiores videas. Altera Sabia tota facie Iuniperum maiorem refert, nisi latoribus ramis prædita esset, & magis divulsis: appendices multas in ramis, ut Sapius produceret, atque eundem in nascendo, quem Taxus, morem servaret. Resinam profert in caudice, ut Iuniperus utraque, eodemque modo resinam commanducata, eam in os pulverulenta diffunditur, nec amplius cogitur. Idem hæc in re similis est gummi Iuniperi minoris. Resinas inter se contuli, quæ quidem plurimum distare mihi videntur. Siquidem maioris Iuniperi resina Mastiches, vel Terebinthina in modum ore cumulat, & nunquam in ore dissolvitur, aut divelli potest. Præterea Iuniperi maioris resina insigniter amara est. Transiorem resinam Sabia altera habet, duram ut Iuniperi, veluti fumo tactam. Arboris caudex sinuosus est, crassior plerumque, quam ut vitæ in ulnas capiat. Corticem Vitis habet modice crassum, rufum, materiam foris albam, intus veluti gilvum, cui nullam aliam similem repetimus. Est enim ei veluti induratus quidam rubor degenerans in subnigrum. Perpetua comæ viret, suis scissibus gravidam Hyeme competitur, sed Lentisci naturam servat, quod fructus perpetuo in arbori insideant, decedentibus scilicet anniculis, cum alii iam ad maturitatem pervenerint. Fructus autem, qui non perfecte maturaverint, egregie videntur. Cum autem ad maturitatem devenierint, ex atro in cyaneum degenerant. Arbor ipsa elegantissimo vitæ nitet, quæ tota fructibus nigris fugilatur. Est autem arbor feracissima, cuius baccæ vix Cedridibus crassiores evadunt. Arbor Amygdali bene magnæ altitudinem petit, multum ad Cupressum sativam accedens, sed crassiori caudice constat [nam silvestres in Creta sativæ crassiores sunt.] Huius folia omnino Cupressi correspondissent, frequentiora tamen sunt. Idem si arbor à longè spectetur, etiam à quovis perito à Cupressi vix agnosceretur, siquidem illa seminibus vidua fuerit, nisi attentè inspiciatur. Atque cum eam primùm inspexissem, nihil de hoc dubitans, Cupressum esse censebam. Cum autem aliam postea suis baccis, quas in ramis singulares profert, onustam vidissem, ea omne dubium sustulit. Folia eius gustatu amara sentiuntur, aromaque olent, resinaceum quiddam præ se ferentia. Os leviter ex-

calesciunt bacca, quæ in huius extremis ramulorum succulis ostuntur, ita ut perpetuo singulis quivis succulus suam tantummodò ferat, & eam rotundam. Hæc merulis & turdis gravissimus cibus, amara est & subodora, & ut dixi, ex ciano subnigra. Habitat ramorum & foliorum in arbore Filix quodammodo similis est. Filix enim cum servat ritum, ut folium appianatum esse diceret, & veluti compressum, quod & ramis Cedri maioris accidit. Florem non promit, sed statim seminis rudimentum apparet. Quæ tum ad lignum huius attinet. Agbam in Myria in ea urbe, quæ Isonium vocatur, vulgo Cogna, cum inter urendum Iuniperi maioris & Cedri Phœnicis, & Sabia alterius ligna, quæ si multum contuli non in quærens, quæ unumquodque ab alio dignoscerem, ut potè quorum tanta sit affinitas, ut eorum trum ex indutibus vicinis in urbes allata ligna nullo ex se se diffinitione dignosci possint. Nam in Asia apud Comicum & Isonium nullum istis frequentius intusendum occurrat. Eorum singulorum, ut periculum facerem, unumquodque gustavi, usque carbonem seci, sed id frustra. Cum verò in eum locum pervenissem, ubi magna horum lignorum strues asserviebantur, ex foliis tantummodum cuiusque discrimen deprehendi, quod tam exiguum est, ut vix etiam à perito lignario. Artifice interosci possit. Eorum namque tum caudex, tum rami vitæ per se cortice obducuntur, rubro, tenuissimos longos supra se invicem iunctos, diceret. Omnia autem materies intus rubet, in gyris albit, carbonem seu lignum faciunt, materies levis sunt igni exaruit, quæ facilis, quam Piceæ truncus, tardi facies sunt. Sed Sabia hæc multo magis quam cetera ad testudines faciendas Turcis expecta, quod in vias nunquam diffundatur. Hanc autem excavare totam, ex eodem ligni sculto testudinem perficientes, medioerem quidem illam, nostris tamen quaternis aliquanto maiorem. Plinius arborem soli Orienti, neque Latini celebratam tradidit, præterea nomine, Cupressi, folia similem, albicantibus ramis, odore Cedri, cum accenditur, quam ego Sabiam alteram esse interpretor. Eam fortassis, quam Theophrastus Thuiam vocavit, Dioscorides alteram Sabiam nominat. Notæ certè omnes, quæ supra dictæ arboribus tribuantur Brutes appellatæ, omnino tum illis conveniunt, quæ ego Sabia altera præterea ante tribuebam. Huius alterius Sabia arboris iam in Europa atque adeo in Gallia, multis (ut paulò infra scribam) locis videntur, in Regia potissimum Pontanæ blæ, quam ille, qui Francisco Galliarum regi attulit, vitæ arborem cognominavit. Ex hac arbore, cum adhuc exigua admodum existeret, ramulos vulsumus: quos cum olim Renatus Bellayus Episcopus Cenomanensis, qui unice rei herbariæ studebat, nostræ operæ accepisset, eorum alterum domi suæ coniecit, alterum verò in hortis divæ Mariæ Lutetiæ, qui usque ed excrevit, seque à Solo erexit, ut proceritate longè parentem vicerit. Est & arbor alia in eiusdem loci hortis regis enata, quam Piceastrum esse assevero, cum tamen prædicto nomine (Arboris vitæ) ab eo, qui Regi donarat, appellata fuerit. Nunc videndum est an notæ huius arboris vitæ, cum eadem, quam iam in Asia, & monte Tauro observaveram, conveniant, quæ multam nostræ operæ Galliarum horti vident. Ea rectos promerere ramos: nisi parumper ad foliorum productionem reflecteretur. Ramos mittit geniculo bene robusto, ætissime caudicem am-

Cibus Tur-

Filix simi-
la.
Folium ap-
planatum.
Cedrus
maior.
Flores carot.
Lignum.

Locus

Corde.

Sabia al-
terius vici.

Brutes.

Thuiam
Theoph.
Sabia al-
tera Diosc.

Locus:

Arbor vitæ.

Piceastrum.

Alia de
scripta.

*Folia ap-
planata.*

placentes, in quibus folia Cupresso similia es-
sent, nisi supra invicem sessilia, & compacti-
nucamento procumbent. Ramus totus cum
foliis appianatus videtur esse, eo, inquam, modo,
tandem si quis studio cum praelo presserit. Arbor
hæc in tantam altitudinem apud Fontanæbrum
excrevit, ut quamvis nondum nonum excesse-
re annum, brachio tamen elato à quolibet pro-
cero homine vix possit ad eius cacumen pertingi:
Ea nondum semina prompsit. Gustata folia a-
mara sentiuntur & odorata, maxime ad Salviam
accidentia. De cortice nihil adhuc certi tradi
potest, quoad utriusque vastitatem excrevit.
Hæc Bellonius, quæ ceteram nostram nullo mo-
do recusant.

*Sabinæ ar-
bor.*

Arbor itaque vitæ postrema, quam describit
Bellonius, nullas fert baccas, sed veluti parvos
conos, etiam non potest esse eius Sabina altera,
cui baccæ sunt: Quod præterea scribit de sua Sa-
bina altera folio filicis veluti appianato, ac cæte-
ra omnia de odore, & aliis, exceptis baccis, con-
venire cum ea arbore, quæ Parisiis dicitur ar-
bor vitæ: an extet inter eam natura talis arbor ali-
qua odorata, baccifera, indicent docti, nulla no-
bis vis, nec audita: suspicamur Bellonium igno-
re quid scribat, & confundere diversas plantas:
nec existimamus ei visam arborem vitæ in horro-
regio, quæ nullas tulerit baccas. Capite de Ar-
bore vitæ, huius Sabina, secundæ fecimus men-
tionem ex Gelsio, qui eam arborem vitæ vo-
cat, & ex America translata, male addens, bac-
cam ferre, quod ex Bellonio desumptum vide-
tur. Quæ autem Bellonius scripsit de altera Ar-
bore vitæ, quæ Pinaster, & de impostura, nos
posuimus capite de Pino Combro.

*Cardan.
arbor.*

Obscurè admodum Cardanus Bellonium secu-
tus huius arboris [Sabina: Lutetianæ Bellonii], &
arboris vitæ] meminit, dicens: Est etiam Lutetia
Sabina genus (ut etiam Bellon. refert) quam qui-
dam Bruson esse volunt: simillima est Cupresso, ut
ab ea distinguatur, sed baccam fert dissimi-
lem, odoratam tamen ac nigriorem, folia Salviam
olent: unde ferunt, Tartaros spargere pulverem
super cibos. Vocant ob id quidam vitæ arborem,
forte quod in contignationibus nullum vitium hoc
lignum sentiat: eaque Turcæ vtuntur. Ex hoc aut
Cedri genere ferme est ea planta apud Indos oc-
cidentales Cumanæ provincie, cuius tabulis si
naves conficiantur, non sentiunt teredinem, ma-
lum illi regioni ingens: hæc, quæ reponuntur,
omnia bene olent: quod verò mirum dictu est,
equia tantum amaronis contrahunt, ut esui in-
grata reddantur.

Sabina.

Sabina planta est (ait Matth.) in Italia vulgaris
notitia, illa scilicet quæ à Dioscoride primo generi assi-
gnatur, foliis Cupresso similis, spinosior. Verum
eius folia non adeo plenè virent, ut Cupressi, &
in cacumine aculeata conspiciuntur. Quod ta-
men sæpe peritis negotium exhibet. Cæterum
non desunt, qui plantam, cuius imaginem dedi-
mus, negent legitimam Sabinam esse, hoc, ni fal-
lor, argumento, quod hæc baccas proferat, qua-
rum in sua Diosc. non meminit. Unde factum est,
ut quidam putaverint, eam maiorem Iuniperum
esse, alij verò Thuiam, quam Theophrastus me-
morie prodidit lib. & cap. 5. de hist. pl. Verum utri-
que meo iudicio in errore versantur. Illi qui-
dem, quod hæc planta nec folio, nec flore, nec
fructu, non materia, non odore, neque sapore,
non cæteris denique notis Iuniperum referat.
Hi verò, quod Thuiam, ut est apud Theophra-
stum, nascatur apud Ammonis delubrum, atque

*Chamae-
qui Sabi-
nam de-
gant.*

*Iuniperum
maior.
Thuiam.*

*Thuiam
2407.*

in Cyrenensi agro formâ Cupresso similis cum
ramis, tum foliis, caudice, fructuque: vel potius,
cum Cupressus silvestris. Præterea quoddam, videntem
scribit, Thuiam materiam omnino incorruptam præ-
dare, nihil eius radice crispius sit, atque simila-
ra ex ea fieri qui scilicet sunt folia, quemadmo-
dum ex Cedro Cupresso, Loto, & Buxo. Hæc au-
tem arbor conos, seu galbulas non fert Cupressi
modo, sed baccas: caudice non abollitur longè,
sed eo brevi contenta est, materie non constat
incorruptæ, solidaque, sed caducâ & fungosâ: non
ut Thuiam peculiaribus locis gaudet, sed ubique se-
re locorum nascitur, ut hinc magis atque eviden-
tius discrimen in his plantis appareat, quam ut il-
lorum error, qui eas eam facit Thuiam, pluri-
bus explodi mereatur.

Sed certe relinquatur, ut miremur eos, qui stir-
pem hanc quam depicimus exhibemus, veram Sa-
binam esse insciantur, cum nullis careat notis ex
his, quas illi Diosc. reddidit. Ea enim arbor con-
spicitur coarctæ brevitatis, quæ in latitudinem
magis effunditur, foliis Cupresso similis, spinosior
tamen: quin & gravius olet, & acris, fervensque
sentitur. Atqui illud nobis obicitur, quod Diosc.
in describenda Sabina nullam baccarum mentio-
nem fecerit: id meheculæ quod legatur non fe-
cit. Sed quid dicent illi, si in quam plurimis plan-
tis ex his etiam, quæ ab omnibus legitimæ habentur,
plures notæ, & eæ quidem præcipue, non-
nunquam desiderantur: quas nimirum Diosco-
ridem omisisse credendum est, vel quod plantæ
eæ essent aliqui vulgò cognitæ, vel quod eas
earum partes non satis exploratas haberet, vel
alias ob causas, quas prosequi non est hic locus,
quarum omnium aliqua facile potuit esse: cum
Sabina baccas non adnotatas reliquerit. Addam
& id, fortasse ex eo evenisse, quod Sabina fre-
quentior sterilibus occurrat, quam fructifera. Nam
(ut equidem fateri possum) inter innumeras Sa-
binæ plantas, quas vatus in locis mihi videre con-
tigit, tres duntaxat memini me observasse, quæ
baccas ferrent, & eas quidem rubentes, ac Iuni-
perinis maiores. Id quod me quandoque addu-
xit, ut putaverim in hoc Sabina genere marem &
fœminam reperiri: atque alteram raram esse in
Italia, quemadmodum eam quoque rarè vidimus,
quam Dioscorides secundo loco representavit,
Tamarici foliis similem, non autem aculeatam.
Ex his igitur, merito colligendum esse arbitror,
hanc nostram Sabinam esse legitimam, ut quæ
non solum notis Dioscoridis delineationis pul-
chre respondeat, sed etiam facultatibus.

Porro Petrus Bellon. de arboribus coniferis
differens, his ineptè satis, meo quidem iudicio,
Sabinam admiscet, atque in ea describenda, quam
secundo loco ponit Dioscorides, mihi non pa-
rum hallucinatus deprehenditur, quod constan-
ter affirmaverit, se vidisse frequentissimum, hoc
Sabina genus in Amano & Olympo Phrygiæ
montibus, totâ facie Iuniperum maiorem refe-
rens, magnitudine Amygdalæ arboris maioris,
foliis Cupresso per omnia similibus, baccis per
maturitatem in cæruleo nigricantibus, & caudi-
ce resinam ferente. Etenim Dioscor. non tradit,
quæ sit huius plantæ facies, & quæ magnitudo,
sed eam in foliis tantum à priori variare scriptum
reliquit. Quod non alia de causa autorem hunc
fecisse reor, quam quoddam sciret, nullum utriusque
esse in reliquis notis discrimen. Sed quod hanc
rem turpiter confuderit Bellonius, vel ex eo ma-
nifestum esse putô, quod quam plantam nunc
Dioscoridis alteram Sabinam asserit, eandem pau-
lo post

*Sabinam
vulgarem
esse Sabinam.*

*Baccæ rub-
entes Iu-
niperum
maiores.*

*Sabina Tama-
rici fo-
liis, non ac-
uleata, &
rara.
Bellonius.*

Id post arborem illam constituit, quam Plinius Brutam appellat, quasi Plinius non meminerit utriusque Sabinæ. Quod autem idem Bellonius primum Sabinæ genus, eam arborem suspicetur, quam Theophrastus Thuiam nominat, non miror: nam & alij idem sentiunt. Verum hanc opinionem improbavimus. Adhuc bacciferam Sabinam Guilandinus si nunquam vidit, cur Fuchsium & Matthæolum reprehendit: Matthæolum scio ego è baccifera ramo suam pinxisse Sabinam, nec vereor quin etiam Fuchsius suam quoque ex viva planta delineari curaverit. Sed huiusce censuram inanem pronunciant Avicenna ac etiam Serapio, qui de Sabinæ baccis apertissime meminere, & in medicum usum vertere.

Matthæolus obscurior in post. com. Ital. positis duabus figuris, dicit duas esse species, vnam sterilem magis vulgarem: alteram fructiferam in Italia raram, odore minus gravi, eiusque duas facit differentias, vni enim baccas rubras, ac Juniperinis maiores, alteri purpureas [Turchinas.] Nos autem non intelligimus Matthæolum, cum ait baccas Sabinæ rubentes, ac Juniperinis maiores, tales enim in Sabina non observavimus & illæ quas vidimus, sunt ferè concolores, & eiusdem quasi magnitudinis cum Juniperinis, unde minores potius dixerimus, quam maiores: ac veremur ne confundat Cedrum quibusdam dictam Lycā cum Sabina. Sed quod magis miramur in postremis com. facit manifestè tres species.

Camerarius in Matthioli hist. Genu. duas posuit alias figuras, addens in Liguria, & in sinibus Galliz iuxta Narbonam in monte Cetho inveniri Sabinam baccis rubris, crebris, alibi ex coruleo nigricantibus. Nos quidem non otiosi fuimus motus Cethi spectatores, sed ibi nobis sola Cedrus retulit Bellonii observata, cui baccæ rubræ.

Qui Matthioli patrocinium suscepit ex Diosc. duplicem facit, alteram vulgatiorem folio Tamarisci, alteram folio Cupressi, quas in eo convenire dicit, quod immortalicomā vireant, & utraque baccas ferat nigras Juniperinis similes: nullam enim esse quæ sterilis omnino sit, sibi persuadet, quod falsum. Eam quidem, quæ surculis feritur, rariis fructum proferte scribit. Is Sabinam nostram vulgatiorem folio Myricæ, Sabinam secundam folio Tamarisci vocat: Sabinam Brunfels. Fuchsius, Dodonæus Sabinam minorem Gesn. hort. Savinam Lonic. Savinam matrem, Sabinam minorem Lob. Sabinam Tamarici similem Hist. Lugdunensis. Alteram Sabinam nostram folio Cupressi, nominat Sabinam primam Dioscoridis. Sab. maiorem Gesn. Sab. alteram Dod. Sab. fructiferam Cast. Genuinam bacciferam atrocaruleam Lob. Sab. folio Cupressi similem Cord. in Dioscor. Cupresso similem Hist. Lugd. bacciferam Camer. feminam maiorem Tabern.

Matthæolum adhuc oppugnat Guilandinus cui Paulus Hestus patrocinatur, ita differens: Nihil mihi attulisse videtur Matthæolus hoc in loco, quod Guilandinus non multò antè in Theone suo circumscripterit, iis verbis: Ceterum Sabinam, quam ego cum Plinio sterilem esse auguror, ipse fructiferam cum Fuchsio pingit: quanquam me non præterit Arabum eam re sententia. Vide quot mysteria Guilandinus arctissimis verbis concluserit. Sabinam fructiferam esse negat, ductus autoritate & experientia, neque tamen interim ignorasse se, aliter sentire Mauritanæ factionis scriptores demonstrat. Matthæolus verò Plinii nomen tempestivè præterit, & sententiam suam Avicennæ & Serapionis auctoritate stabilire co-

nat, ac si non apertissime Serapio, quem ille errori suo patrocinari putat: sterilem esse Sabinam & omni fructu carentem cap. 280. simplicis medicinæ scripserit, Abbel, id est, Sabina, inquit, quæ & Brathys dicitur, non habet fructum. His calculum adiunctione quotidiana experientia, & Plinii testimonium, quibus Sabinam semine carere liquidd comprobatur. Iam verò Sabinam nullum unquam fructum expulisse, norunt omnes, qui veram legitimamque Sabinam terræ hærentem observarunt. Reliquum est, ut quæ ab Avicenna de Sabina dicuntur, pari gravitate expendamus, quem profectò tantum abest, ut fructiferam eam esse asseruisse sentiamus, ut contra etiam affirmare non dubitemus, nusquam id apud illum toto suo volumine legi. Quod autem Matthæolo apud ipsum imposuisse videtur, illud est, quod cum Sabinam à Mauritanis Abbel vocari apud Serapionem legisset, & Avicennam Abbel, fructum Alharar definitum observasset, Alharar idem esse, quod Abbel ratus, Sabinam de Avicennæ sententia fructiferam esse voluit. Verum Avicennæ Abbel, inquit, fructus est Alharar, similis Alzarar, hoc est, Abbel fructus est Juniperi, similis Mespilo. Cum verò paulò post Abbel duo fastigia constituit, non sanè Juniperum describit, quam alibi sub nomine Harar, in magnam & parvam distinguit, sed utramque Sabinam cum Abbel confundit, haud secus, atque cap. 666. Scheam quoque, hoc est, Abrotanum, vel certè Absinthium aliquod rursus cum duobus Sabinæ generibus gravi & pudendo errore permiscet. In simili huic lapsu Serapionem incidisse palam est, quem Matthæolus quoque in Mespilorum historia adnotavit, quod Sorbi titulo autor ille, omnia referat, quæ de utroque Mespilorum genere scripsit Dioscorides. Præterea si Abbel Sabinæ fructus esset, turpiter admodum semetipsum Avicennæ dedisset, qui idem per idem definire instituisse. Et hæc Paulus Hestus in Apologia pro Guilandino.

Sed & Gesnero teste coll. stirp. Sabina femina, rudimenta quædam germinum exiguum, seu flosculos subluteos ostendit, quadripartitos, albicantes.

Sabina tandem vera [ut rectè Cæsalpino videtur] arbuscula est brevis, carumine & omnibus ramis deorsum inflexis in terram, ut in quodam genere Juniperi contingit: folia Cupressi videntur, nisi squamulæ auctiores essent, odore acris fructum non vidimus: Dioscorides duas affert, vnam quam modo descripsimus, & alteram Tamarici similem.

Lobel. obseru. & Icon. Plantin. tres Sabinæ figuras habent, quarum vni utulus, Sabina: Alteri, Genuina Sabina baccifera atrocarulea: Tertix verò, Sabina baccata altera, grano item atrocaruleo, in montosis Calabria & Apulia.

Monstruosi autem nobis videntur flores à Lobelio appicti: sunt enim à nobis ubique locorum & quocunque tempore, minimi lutei, & veluti Iuli in extremitatibus observati.

Ex omnibus autem huc usque allatis colligere licet Sabinæ nomen à variis de variis dici plantis. Et primò de Sabina vulgari sterili, & baccifera. Rursus de Sabina vera & baccifera Bellonii, quam confundit cum arbore vitæ. Sabinam præterea vulgarem, arborem in maritimis nascentem Cæsalpinus dixit. Arbor vitæ etiam à quibusdam Sabina falsò putatur. Testatur Matthæolus, se vidisse, qui herbam inodoram fumerent pro Sabina,

Sabina sterili.

Abbel.
Brathys.

Sabina legitima carere semine.

Abbel.

Alharar.

Harar.

Schea.

Avicenna error Abbelianum cum Sabina confundentis.

Serap. error.

Sorbus.

Mespilo.

Avicenna.

notatur.

Sabina femina.

Sabina vera Cæsalpino.

Sabina trocones Libyæ.

Lobelii icon monstruosa.

Abbelianum.

Sabina.

Vulgaria.

Sabina.

Baccifera.

Arbor vitæ.

Cedrus
Lycia, flos
retusa Bellonij
linguæ.

Locus &
tempus.

Vires & u-
sus.
ex Diosc.
Flora.
Carbunculi

Termin pol-
lor.

Temper-
mentum
ex Galeno.

Gal. sarsa-
tur.

Palabra.

Putredine

Absterge.
Menses
mens.

Fatus.

nos Muscum repentem, inquit, Tragi intelligimus. Ad extremum à nonnullis Cedrus Lycia, sive retusa Bellonij dicitur.

Sabina Latinis dicta à Sabinorum regione, in qua multum nasceretur, Græcis *Βάβυλ*, Latin. etiam Savina, Savinera, & Trago teste, Neticion, German. *Semenbaum* / *Seuenpalmen* / Belg. *Seuenboom* / Bohem. *Blastersta chmogfa*, Angl. *Savin*, Gall. *Savinier*, Ital. *Sabina*, Hisp. *yerva Sabina*. Castil. & Portug. *Savina*. Arab. *Abel*, *Abbel*, seu *Albarar*. Herbarum *Sabinam* Latini appellantur *Βάβυλ* Græcis dictam, etiamsi herba non sit, nec etiam frutex, sed iustæ ferè magnitudinis arbor.

Habemus plantam in horto Illust. Exc. Celsi. Montbelgardi ex ramis à me collectis ex arbore mediocris magnitudinis in horto generi mei Theobaldi Noblot, Pharmacopœi Illust. E. Celsi. qui fuit aliquando hortus Medici simul ac Pharmacopœi Montbelg. Florentem sæpius vidi, verum in ea nullas unquam baccas observavi. Sterilis etiam manet à me variis in locis plantata. In hortum transtuli Sabinæ ramos ex Brunicoff. Castello, ubi multis baccis gravidam observavi. In horto nostro fert etiam baccas. In Burgundia in Castello Beveuge onustam baccis multis, foliis non spinosis collegi. Habui Basileæ in horto satis magnam, interdum bacciferam: Tubingæ Sabinam vidi spontaneam cum multis baccis, foliis partim spinosis, partim non spinosis. Sabinas pulcherrimas exhibentes varias animalium figuras, alias etiam topiarias, præterea eius arbores duas magnas vidi Veronæ, nec alibi pulchriores. Apud D. Alexandrum Serratum Medicum insignem, apud quem varia & plurima scelerata erant, Ferrariæ in monasterio S. Dominici à l'Angeli, Patavij, Genevæ, & Lugduni præclaras Sabinæ plantas intuebar. Gesnero autem Sabinas baccas profert Septembri.

Ambarum [Sabinarum] autore Dioscor. folia ulcera pacendo proserpentia sistunt, & inflammationes imposita mitigant. Cum melle verò induta, nigritias & sordes depurgant, & carbunculos circumscribunt. At cum vino pota etiam sanguinem per urinas ducunt, & fetus extrudunt. Idem faciunt etiam apposita & suffita. Ammifcentur etiam calefacientibus unguentis, & privativè glaucino. Sabina, inquit Gal. ex numero etiam fortiter exsiccatum, idque secundum tres qualitates, quas in gustu præ se fert, similiter Cupresso, nisi quod ea & acrior est, & ut sic dixerim, magis aromatica, seu odoratior. Nostra Sabina contra Galenum nobis videtur multò gravioris odoris, quàm Cupressi ac etiam ingrati. Igitur huius, quam modò dixi, qualitas est particeps, nempe acrimonie consistentis in temperamento calido, propterea amaritudinis & adstrictionis obcurioris, quàm in Cupresso. Quantum enim ipsa Cupressum superat in acrimonia, tantum ab ipso superatur in adstrictione. Quod manifestum est, ex eo quod omnino calidior est Cupresso, vnde etiam potentius digerit. Itaque glutinare nequit vulnera, ob siccitatis & caliditatis robur. Nam utriusque illi tantum inest, ut etiam tendat, & inflammationem afferat. At putredinibus similiter Cupresso accommodari potest, maxime ubi rebeliores fuerint & duriores. Nam hæc citra noxam vim medicamenti perferunt. Quin & quæ atra sunt reddita, & admodum sordida, ea cum melle expurgat. Carbunculos item solvit. Porro essentia tenuitate menses quoque provocat, ut si quid aliud, & sanguinem, per urinas movere. Factum etiam vi-

ventem interficit, & mortuum eiecit. Est autem hoc medicamen tertij ordinis tum exalefacientium, tum desiccantium, ex numero eorum, quæ vel maxime tenuium sunt partium. Ex hoc utique nomine unguentis inditur, & maxime glaucino, & in multas antidotos iniicitur. Quidam verò etiam Cinnamomi vice duplum eius subiciunt. Est enim extenuandi & digerendi facultatis, si epotum fuerit. Hæc Galenus.

Ad Plinium accedamus. Sabina à multis in suffitus pro thure assumitur. In medicamentis verò duplicato pondere eisdem affectus habere, quos Cinnamomum, traditur. Collectiones minuit, & nomas compescit. Illita ulcera purgat, & Partus emortuos extrahit suffitu. Illinitur igni sacro & carbunculis. Cum melle & vino pota regio morbo medetur. Gallinæ generis picuitas fumo eius herbæ sanari tradunt.

Sed hæc de Sabina Tragus. Est & Sabinæ herbæ in medicandis iumentis haud contemnendus usus, eam enim purgari consueverunt iumenta. Sed prudenter medicamentis è Sabina petitis uti convenit, propter strenuas eius in exsiccando & calefaciendo facultates. Folia Sabinæ herbæ in pulverem redacta, ex melle illita, fluentibus ulceribus medentur, nomas sistunt, & collectiones mitigant. Cum pinguedine verò lacti supernatante (Germani *Milchsaum* vocant) temperata scabiei capitis puerorum vnicè profunt. Sabinæ recentia folia tusa, ac phagedenis (Germani *den murr* vocant) imposita, eas enecare dicuntur. Aqua è foliis Sabinæ destillata maculas faciei absterget, & ut quidam asserunt, vertigini conducit. Montbelgardi utuntur venatores curandam scabiem canum.

SELAGO.

CAP. XXII.

BRATHY Sabinæ, Cupressi folio, similis est herba Selago appellata (inquit Plin. lib. 24. c. 11.) quæ legitur sine ferro dextra manu pertunicam, qua (quæ M.) sinistra exiit, velut à furante, candida veste vestito, purèque (purèque Dalech.) lotis, nudis pedibus; sacro facto prius, quàm legatur, pane (ex pane Dal.) vinòque. Fertur in mappa nova. Hanc contra omnem perniciem habendam prodidit Druidæ Gallorum, & contra omnia oculorum vitia fumum eius prodesset. Hucusque Plinius.

Cæterum, Selaginem quidam suspicantur In-niperum minorem Alpinam. Non desunt quoque, qui Cedrum minorem, quæ Retusa Bellonio dicitur, Selaginem existiment. Interpret præterea Theophrasti de causis lib. 2. cap. 7. Coronopodem reddidit Selaginem. Selago tandem existimata videtur Matthiolo Muscus terrestris repens Tragi.

DE IVNIPERO IN GENERE.

CAP. XXIII.

TECTIS (inquit Theophr.) Materia huius fabricis idonea, tum subdialibus, tum obruendis sub terram: durat enim immunis à putredine. At Macedoniz incolæ, ne illam quidem florere arbitrantur. Nonnulli Duplicem esse dicunt, & alteram florere quidem, sed fructum non ferre: alteram

Temper.

Cinnamo-
mo / abster-
gentur.

Vires ex
Plinio.

Noma.

Gallinæ
generis
picuita.

Purgat iu-
menta.

Scabiei ca-
pitis.
Phagedena
Aqua ad
vertiginem.
Canum
scabiem.

Descriptio

Superflua:

Pu:

Aequivoca
Inniperum
minor.
Cedrus re-
tusa Bell-
onij.

Muscu
terrestris
repens.

Tecta.
Materia
Durat.
Duplex in-
niperum
Theophr.
Fructum
non ferre.

alterum non florere, sed protinus fructum ostendere, ut Ficum grossos. Toto anno fructum habere videtur, quippe cum novus anni exacti fructum occupet, Nascitur hæc quidem sed non proceræ. Huic porrò cortex sponte detrahitur, etque humor etiam in lachrymæ modum gignitur. Cedro Punicea excellior Juniperus, folium eius quoque mollius nasci videtur, &c.

Hæc paululum immutans Plinius ita tradit: Nec Juniperi florent. Quidam earum duo genera tradunt. Alteram florere, nec fructum ferre. Quæ verò non floreat, ferre protinus, baccis subnascentibus, quæ biennio hæreant. Sed id falsum, omnibusque iis duræ facies semper. Et lib. 24. c. 8. Juniperus Cedro affinitus, & eius duo genera altera maior, altera minor. Montes amat, nec folia decidunt Junipero: annifera habetur, novusque fructus in hac cum annotino pendet. Cuius vetustatemque non sentit. Junipero eadem virtus quæ Cedro, vasta hæc in Hispania, maximaque bæccæ eius. Medulla ubicunque solidior etiam, quàm Cedrus. Et hæc passim apud Plinium legimus.

Dioscoridi Juniperus (*αἰνιδία*) alia parva, alia magna est. Acres autem ambræ, & urinam cientes & calefacientes, sufficitque bestias venenatas sugentes. Fructus ipsarum alter Nucis (pro *αἰνιδία* legendum fortè *αἰνιδία*, id est, Fabæ, ut habet Serapio. Corn.) magnitudine reperitur: alter Nucis ponticæ æqualis, rotundus, odoratus, dulcis dum manducatur & subamarus, qui *αἰνιδία* (Juniperi bæccæ) appellatur. Sed inter spuria Dioscor. Juniperum parvum alij *αἰνιδία* vocant, alij *Μεσσηνέμ*, alij *Ακαλίδεμ*, Aphri *Ζεῦνσιπερ*, Egyptii *Λιβύμ*, Romani *Juniperum*, Galli *Ιπικελλίν*. Juniperum magnam, alij *Κυπρῆσσημ* agrysem appellant, alij *Μεσσηνέμ*, alij *Ακατέραν*, Romani *Juniperum*. Est autem hæc plurimis nota, similis Cupresso. Nascitur plerumque in asperis, ac maritimis locis.

Anguillara ostendit, Juniperum Dioscoridis ac nostram, vnam esse ex Cedris Theophrasti, ac in eo errasse Dioscoridem.

Cedrum magnam & Juniperum eandem esse arbores non recentiores solum (inquit Guiliad.) sed etiam veteres quidam opinati sunt. Idem præterea Dioscoridem etiam Cedrum magnam cum Junipero confudisse demonstrare conatur. Ad eundem etiam modum, notante Gesnero, Cedrum Galenus Juniperum appellat: Et è contrà: Vnde mirum videri non debet Gazam *Κίδων* aquæ Arist. & Theophr. Juniperum vertisse.

Paulus Hæssel etiam in defensione Guiliandina, Cedros Theophrasti, esse Dioscoridis Juniperos assent: idq. ex Plinij verbis colligi posse scribit.

Apollo sibi persuadet Cedrum Theophrasti esse fructu Juniperino, & ex hac Cedro olim trabes, statuas, ac columnas extructas. Ita ut videatur idem ferè sentire, quod Cordus. An verò tam magnæ Juniperi in Syria reperiantur discutendum relinquo iis, qui in Syria fuere. Clusius quidem observavit in Hispania maximas.

Ad æquivoca quod attinet: Juniperus vulgaris baccis parvis purpureis, Cæsalpino dicitur. *Juniperus montana*, *ma* & *semina* ab eo etiam reperta fructu flavo. Cedrus phœnicæ Bellonio, quibusdam dicitur Juniperus maior, Cæsalpino autem Juniperus marina & Juniperus minor Dioscoridis. Sabina vulgaris, arborem in maritimis Dioscorides in codice Hermolai Juniperum maiorem vocat, seu Cupressum silvestrem Theophrasti, licet ab aliis Ce-

drum vocari testetur. Ac contendit idem c. 58. Plinium per Oxycedrum videri intelligere Juniperum montanum, id est, vulgarem nostram.

JUNIPERUS VULGARIS BACCIS PARVIS, PURPUREIS.



PLERUMQUE Descriptio. denso ramorū stipatu fruticat durat Juniperus, aliquando in iustæ magnitudinis arborem adolefcit, caudice tamē non multū crasso, cortice sabro & deciduo, rubente, matere humida, nonnihil etiā rubefcente, maxime si siccata fuerit, odore resinoso grato: ramuli in fasciculos multos dividuntur, minucibus foliis sæper vitentibus, aculeatisque armati, rigidi, asperæque glandis, inferre vitentibus splendidis, raro vniā longioribus, sæpè brevioribus, valde angustis (Cæsalp. Picæ robustioribus & magis pungentibus:) Baccæ per ramos sparse numerosæ, rotundæ, umbilico in tres radios, totidem seminum loculos ostendentes, distincto donatæ, duplo maiores granis Piperis, primum virentes, per maturitatem atroceruleæ, aut nigre, in quarum singulis grana tria oblonga, triangula (nonnunquam quatuor Cæsalp.) pulpâ nonnihil ruffa, involuta, sapore acido, resinoso, cum quadam dulcedine, tactu quoque ubi inveterarint, glutinoso & oleoso: pro flore tribus foliolis minutissimis, obseptum insidet futuræ bæccæ rudimentum, tam exiguum, ut non nisi à diligenter inspicienti agnoscatur, unde scripsit Cæsalpinus. Quæ fructum fert, non floret.

Per reliqua similis est huius Juniperus, quæ forma dici potest, flores producent plurimos, aliis, quæ fors tulit, sparsos per ramulos; aliis confertos, conorum exiguorum instar habentes, purpurâ cum croceo mixtâ pictos, ex plurimis corpusculis rotundis, Papaveris semine minoribus, pulvisculo farinaceo factis compactiles, intercedentibus raris quibusdam viridantibus, acuminatis foliolis, squammatim corpuscula dicta obtegentibus: Videas autem cum dehiscunt, effigiem capituli Equisei florentis, vnicuique squammatæ adnatis apicibus ruffis, Cæsalp. vocat flosculos amentaceos, exiles. Cæterum, tantum florum apparatus, quasi ad ostentationem comparatum, nullus fructus sequitur, sed in auras abiens, pulvisculus vanam baccarum spem eludit.

Vulgarem itaque Juniperum duplicem novimus, vnam quidem bæccas ferentem, alteram flores tantum, quam quis seminam dixerit, ut ex modo dictis liquidd sit. Miramur autē diligentem alias Botanicum Eunicum Cordum hosce flores non observasse: Dicit enim in Diosc. Juniperus minor altera, cuius duplex genus, vñu florens sine fructu, aliud non florens, fructum tamen ferens.

Duplex autem Juniperi, altera florens, altera sine fructu. Cordus in Juniperi flore sine fructu, fructum ferens, non florens.

Cedrus magna. Magna Cedrus Iunipero proceræ perquam simili est, caudice recto, aculeatis foliis, fructus eadem forma & magnitudine: in summa nihil aliud est, quam peregrina Iuniperus. Hinc nonnulli veterum, quemadmodum etiam recentiorum, Cedrum cum Iunipero proceræ confundunt, utramque Cedrum appellantes. Sed verba Cordiatis manifestè demonstrant, illi non cognitam veram Cedrum, ac ipsammet Iuniperum cum Cedris confundere.

Dioscoridi suspecta. Notat Cornarius, quod Iuniperus utraque satis frequens sit in his regionibus. Non tamen hæc ad eam magnitudinem proveniant, quam Diosc. expressit, alterius Iuniperi fructus Nutis magnitudine, alterius Nucis ponticæ. Certe Serapio, inquit, non Nucis, sed Fabæ, ut fortassis pro voce *Nucis* vocem ipse legent, & omnino legere oporteat. Plinius etiam de aliapenitæ Iunipero loqui videtur, quæ nostrate, dum dicit: Iunipero eadem virtus, quæ Cedro, vasta hæc in Hispania. Quod etiam Vernigo, sive Vernix, Lachryma, aut Gummi Iuniperi sit, falsò à Lacura, Matth. Cæsalp. & alius quibusdam allicitur. Nam fictitia res est Vernix.

Theriacalis lutea. Maio mente tenuissimus ac luteus pulvis à Iuniperis in auras avolare conspicitur inquit Tragus, quod semen [florem] illius esse animadvertit. Post hunc, quem diximus pulverem, bæccæ prorumpunt exiguae, virides, quæ altero demum atino, Autumno appetente, quod illi tempus maturitatis est, ceruleo tinguntur colore, gustu quadantenus dulces, admixta amaritudine, odorem gratissimum spirantes. E' nucleis lapidosi, qui in his bæccis continentur, novæ Iuniperi plantula fruticant. Foliis vestitur Iuniperus angustis, oblongis, aculeatis, acutis, & ad Rosmarini folia formâ suâ accedentibus, sed magis exiguis & acuminatis. Radices Iuniperi multifidæ, corticæque puniceo obductæ, per summa terræ sparguntur, quod & Theoph. lib. 3. cap. 7. annotavit. Bæccæ Iuniperi non vnius sunt generis. In quibusdam enim grandes, in aliis exiguas, in his dulces, in illis prorsus amaras, alias denique planè rotundas, quasdam oblongas, & acuminatas videas. Quæcunque in Iunipero cernuntur, odorata sunt. Primum namque humor, qui è Iunipero, si lædatur, dum in succo suo fuerit, effluit; deinde radices & caudices aridi; tertio bæccæ recentes & maturæ; postremo folia acuminata gratissimum spirant odorem. Iuniperi arbor maio mente cum pluviosa fuerit tempestas, luteam è cortice sudat lachrymam, quæ magna in copia, tanquam lunci exigui, arbori adhæret, nec magnopere odorata est, sicut supra de altera gumma, quæ vulneratâ arbore profluit, audivimus. Alterum Iuniperi genus apud nos haud nascitur, Petvenerunt autem ad manus meas, bæccæ rotunda & rubra, quæ dicebantur Iunipero maiore procreata. Iuniperi bæccas, Germani nonnulli [Austriaci] quod sciam] Bramerbeer / à turdis, quos Bramer Vogel nominant, appellant, qui Hieme cibos suos in arboribus Iuniperorum quæruunt & inveniunt. Et hinc vulgare ænigma, quo quæritur quæ sit avis quæ pabulo tritimo vescatur? Iuniperi enim bæccæ tertio demum anno maturefcere creduntur.

Turdorum cibum. Gesnerus de coll. Stirp. repetens verba Tragi de pulvere luteo, qui dicitur semen, non animadvertit legendum florem, ut habet Hist. Germ. & non semen. Ipse etiam textus Tragi demonstrat id, cum postea dicit, è nucleis fruticare plantulas.

Turn. Iuniperi duas species Dioscorid. maiorem sc. & minorem, solâ magnitudine differendi. Reperiuntur, teste Matthiolo, Græci Diosc. codices, ut etiam annotatum reliquit Marcellus, in quibus Iuniperi Caput depravatam legitur, quibusdam additis, quæ Diosc. doctrinam minime sapiant. Siquidem nec Galenam, nec item Paulum, minusque Serapionem memoriæ prodidisse constat, ramenta ligni Iuniperi e pota homines perdere, præsertim cum eius bæccæ contra serpentium ictus efficacissime devorentur, bibaturque acillatur solorum succus ad viperarum morsus. Adde etiam quod hæc periculo id omnino falsum esse deprehendatur.

Maior inquit idem, & minor Iuniperi species in plurimis Italix locis reperitur. Tuscia Vibanas alit, quæ in proceram arborem assurgunt, ac visuntur frequentes in Agro Senensi, quarum fructus silvestris, & crassior, & dulcior habetur. Iuniperi materies ad centenarios annos incorrupta perdurat. Sic namque Poeta: *Addam & Iuniperos; carie impenetrabilem abnr.* Proinde iussit Annibal (ut Plin. tradidit) templum Dianæ Ephesiacæ Iuniperinis trabibus extrui. Igitur mirari non licet, si Chymistæ asseverant, carbonem Iuniperinum accensum, & suo cinere obutum, ignem integro anno fovere. Proferat ex se Iuniperus gummi, quod & Sandarachâ etiam & Vernicem appellant. Sed hoc falsò asserit Matthiolo, ut iam ante dixit Corn. In post. com. Ital. invenitur in eos, qui volunt Iuniperos Dioscoridis esse Cedros Theophrasti. In hist. verò germ. statuit eius duo genera, parvum & magnum: Ac Maus invenit tantum in Hetruria, & ferre Sandaracham. Iuniperum autem dici Latine, quod Iuniores & novellos pariat fructus.

Hoc in loco figuram novam ponit Cam. ad hist. germ. Matthioli Iuniperi minoris titulo, quamvis tamen non mala Matthioli. Non autem prætereundum nos in nostro Plinio inveniri Iuniperum peperisse Iuniperinis trabibus, non autem iussisse extrui, quod Matthiolo tradidit Iuniperum minor, & secunda Dioscoridis Cedrus, de qua ipse scribit, demonstrant, Anguill. teste; arborem eandem, cum Iunipero vulgari, cui parvi fructus, Fabæ communis: omnes vocant Ginepri. Vnde verò Iuniperus Petro de Crescentiis *Zaniperum* dicatur, cuius tres sunt species, nobis non constat.

Lob. & Pena Adv. *Iuniperus vulgarior.* Obs. & Ic. Plant. apud nos, Iuniperus: Camer. in hort. *Iuniperum nostrum*, quâ nullum ligni genus carbonem præbet, qui diutius ignem conservent, vnde similitudo sumpta, Psalmo 20, Sagittæ potentis acutæ, cum carbonibus [Iuniperinis] desolatoriis. Tab. *Iuniperus bæccifera*. Idem in hist. duas ponit figuras, cum tamen una satis fecisset Clusio Iuniperus vulgaris excelsior, supra Segobiam, de qua Plin. Vasta hæc in Hispania nascitur.

Finiamus cum Cæsalpino: Iuniperus arbuscula est, fruticosa potius generis, tamen lachrymam gignens resinolam, Vernicem vulgò appellant, Fabris & Pictoribus utilem ad tectoria cum oleo. Iuniperi duo summa genera, vnum in montibus magis, & argentibus locis, fructu magnitudine Myrti, in maturitate nigro: flosculus eius generis nigricat. Alterum in maritimis, fructu magnitudine Avellanae magnitudine, in maturitate flavo. Reperi & montanum fructu flavo. Dioscorides non Iuniperum, sed Cedrum appellat, Iuniperi modo bæccæ ferentem, Myrti magnitudine rotundas. Plinius verò per *Oxycedrum* sive Iuniperum

Iuniperi species duas
Turnero.
Diosc. caput de Iunipero depravatam.

Ramenta.
Bæccæ.

Arborum
proceræ.
Duram.

Carbo Iuniperi ignem per annum feret.

Sandarachâ.
Vernix.
Matth. nos.
Cedrus.
Diosc.

Eryman.

Matth. lib. 7.
Iuniperus minor Diosc.

Ginepri.
Zaniperum.
Petr. Cresc.
triplex.

Similitudo.

Iuniperus bæccifera.
Tab. nostræ.

Vernix.

Iuniperi dua Cæsalpino.

Iuniperi fructus flavo.

Oxycedrum Plin.

rum

ceribus, quibus à consione interdum infestantur, adprimè utile. Perhibet Cam. ad Hist. Germ. interiora baccarum Iuniperi maioris, cum utilitate Medicos Africanos exhibere loco Guaiaci ad luen venercam. Esse porro eximium ad calculum præsidium, si recipias: Baccar. Iunip. Vnc. sem. Hisce in phiala tantum affundas Spiritus vini, quantum baccas operire valeat: sicque obturata phiala, quatuor dies stent, subinde agitando. Exactis quatuor diebus excoletur vini spiritus expressis bene baccis: alisque recentibus baccis affusum, quatuor rursus exacto, colato: hoc tertio iterandum: spiritus vini reseruetur, optimè repositus: & urgente calculo huius cochlearia duo ex vino albo calidè propinentur: innoxque in semicupio, cui infusum Maluæ & Chamaemeli decoctum, tenuioram sedeat: Illinatur subinde facies, manu aquaros. aut vino Cretico ad arcendam lassitudinem, quoad emicatur calculus, quod dubio procul accidit. Cavendum internum, ne statim à cibo, pleno adhuc ventriculo, aut astricta alvo semicupium ingrediatur æger. Ad menses ciendos: R. Baccarum Iuniperi Manip. ij. confusis affunde album generosumque vinum. Coquantur ad medias. Colato vino adde Croci pulverati Drach. j. hoc uti incipiet, quo tempore expectari debent menses, quotidieque manè, continuatis quibusdam diebus, haultum bonum bibet. Prodest tamen prius, si necesse videbitur, Saphenam vitramque aperire. Baccarum Iuniperi decocto ex aceto vini rubri, utiliter colluuntur dentes dolentes. Ad diuturnarum febrium rigores, R. Bacc. Iunip. Ruta. Salvæ an. Manip. j. affunde aq. lib. 4. coq. ad tertias. duabus ante accessionem horis statuino ventriculo sumat Theriacis bonæ Drach. ij. ex vino albo calente: post horam in sudatorio exutus penitis, papilionem, vel peripetalina subeat, affusaque dicta decoctione, calculis duobus tribusve candentibus in pelvi, cui superstitabit, toto corpore vaporem excipiat, quoad sudet, sudoreque deterio componat se in lecto calido cooperatus, ita fiet ut indies sentiam, rigor minuat, tandemque penitis desinat. Non est autem hoc medicamento prius utendum, quam corpus antè sit ex docti Medici consilio præparatum, purgatique. Contra podagram, paralytum & contractiones. R. Iuniperi lignum incisum minutum abraso cortice in aqua coque: ac decocto in una inlideto ieiunus, purgato prius corpore. Si contra podagram vteris, præstiterit nondum præsentibus doloribus præcautionis loco uti.

Vin diureticam in Iuniperi baccis (inquit Iac. Cargill.) earumque oleo in me expertus sum sæpius manifestam, & tum ex illis paucas devoratas, tum panem huius guttula unctum evidenter violarum odore urinas imbueret, non secus ac Terebinthinam vulgarem, eiusque oleum stillatitium: cuius vim talem sæpius pro cathedra referebat, Cl. D. D. Felix Platerus Politer Basilienensis. Comprobatur hæc eadem baccarum vis Iuniperarum diuretica à Cl. V. D. D. Tobia Pipachio, Professore Viennensi Excellentissimo, si cum generoso vino albo decoquantur, eiusque decocti singulo manè, sumpto etiam cibo aliquo) haultus calculosis propinetur. Ut autem vinum hoc cum palato gratiam ineat, huic saccharum ebibituris admisceri iubet.

Nunc, ut nobis auctor est Casalpini, ex lignis Iuniperi montana, igne superposito liquor etiam extrahitur, qui Oleum de Iunipero vocatur apud Mesum, efficacissimum ad cutis infe-

ctiones & alia multa: Si hoc pro Cedra uteremur, puto non minorem in eo efficaciam futuram, quam si ex magna Cedro haberemus. Ex fructibus quoque oleum extrahitur per sublimationem prius vino mædetactis, qua operatione & aqua & Oleum elicitur: Aqua ad calculum renum & vesicæ prodest: urinam & menses elicit, singulis diebus pota à duabus uncis ad tres; extrahit quoque sortum mortuum uncis quatuor bibita: & adverteatur venenis: Oleum efficacius ad omnia prædicta: extrinsecus quoque inungitur ad frigidum articulum dolores, & tetra ulcera. Recipitur in aqua ardente adiectis aliis quibusdam aromatis, & pugnantis adversus putredinem pestilentem, ut ex omni miscella aqua iterum distilletur, præsentaneum remedium in febre pestilenti, exhibita à drachmis duabus, usque ad quatuor cum totidem uncis aquæ Acetosæ pauld ante accessionem: Nam veluti fulgur propellit ab internis, & dissipat malignam putredinem, nunc sudores movendo, nunc urinam copiosam, nec aliam insensibilem excretionem, repetitur aut potio utque ad tres vices. Ex fructibus isdem, aut Iuniperi marini, cum maturi sunt, vino remolitis exprimitur liquor, qui Saccharo exceptus, utilisimus in tempore pestis: præservat eum, & ex pulmone ac pectore educit purulenta.

Notat tandem Hercules Saxonia, decocto Iuniperi plures uni, tanquam suis alexipharmaco, cum tamen Rondeletius Dioscoridis autoritate motus, radicis usum, tanquam veneficum, improbet, & solos fructus admittat: Scaliger tamen contra Card. exerc. 186. ait Afros Medicos, uti huius radicis decocto ad luen expugnandam feliciter, redd. tque causam, cur non sit venefica, licet Diosc. illam venenatam protulerit. Aut enim aliam esse corticis radicis facultatem, aliam vero substantiæ medullaris. Corticem vero cuius virtus recipitur in decocto, aut non esse venenatam. Itaque si fortasse distitui fueritis his medicamentis, quæ præstantiora putantur, Iuniperi decoctum non improbabatur, & si radices fuerint suspectæ, sumantur folia & fructus, vel semina, hæcque infusio sic: R. Fol. Iunip. Manip. vj. Sem. Iunip. Manip. iij. infundantur in aq. lib. xii. bulliant ad consumptionem medietatis facta expressione servetur Syrupus, quantitas sit Vnc. 8. cum ea vivendi ratione quæ in ligno.

Accipiendum quoque præcipit Io. de monte Exper. quantatem Nucis Iuglandis cineris ramorum Iuniperi cum baccis, ponendam in linteolum suspendendamque in vino, ut de ea bibat æger cum voluerit. Hocque remedio usum esse Martinum Gurbert Colonæ, qui diu fuerit hydropicus, & tumidus, ac ei multum profuisse. Oleum baccarum conferre difficulter urinam reddentibus, & calculosis & Cerevisia calidà potissimum in balneo sumptum. Accipiendas porro summities Iuniperi, & coquendas in aqua, donec ea tubra omnino, reddatur tandem verò balnea in semicupio ad umbilicum usque quotidie, quantum fieri poterit, calidèque horis tribus faciendæ, ac si hoc ad decem dies fecerit, sanatum in a calculo.

Succus extractus è baccis Iuniperi, ad duodecim annos servari potest (inquit Evonymi The-saurus) si ritè sit confectus.

Valeat ad calculi præservationem, expertus enim est eius usum in multis, qui antehac graviter laborabant, & multa prophylactica adhibuerant, à nullo tamen tantopere sunt, atque ab hoc adiuv. Calidum quidem medicamentum est, ideoque re-

Cedra
substituenda
confer
Casalp.

Oleum ex
fructib.
Aqua ad
calculum.
Vino Me-
ser.

Arteris
Vitis.

Refert.

Iunip. ma-
rina.

De Iunipe-
ri radice
Germ. Rondelet.
not.

Lucus Gerd
vna.

Cum in
baccis ad
Hydropem.

Oleum
baccarum.
Vino diff-
cubas.
Balneum
ad calculum.

Succus
baccarum.

Calculi.

Cinereo
substitu-
tur.
Lucus Gerd.
vna.
Calculi.

Menses.

Dentes.

Febres.

Cantho.

Podagra.
Paralytis.
Ligatura.

Ex diure-
tica.

Vina vel
autem ad-
vata.

Vinum.

Ex lignis
Iuniperi
Montana
Liquor.
Cuius.

cant, Narb. Cade, Oleum eius de Cade, Hispan. Miera.

*Juniperus
maritima.*

*Juniperus
maritima.*

Catalpinoduniperi alterum genus in maritimis, fructu Nucis Avellanæ magnitudine, in maturitate flavo, magna ex parte crassius, quam Juniperus montana [vulgaris]. Dioscorides Juniperum minorem vocat, sed Avellanæ magnitudine.

Goropius Cedro minores Juniperinis cognatas statuit. Tabernemont. Cedrum Phœnicem Matthioli dicit: Cederbaum ad Phœnicia. Idem rursus Juniperum maiorem Germanicam, gross Teusch Wierholder / ex qua in Gallia oleum de Cade, & Gummi Sandarach, seu Vernix. Existimantis Compilatoris ponere duas figuras vnius plantæ, ac de his iudicari, ille etiam non demonstrat ubi videtur, nec diligenter deservit aut discrimen tradit.

*Compil. re-
preh.*

*Cedrus
maritima.*

Licet eandem appellatur Cedrus minor, quæ provenit in quibusdam locis Italiæ in montibus similis Junipero, fructu tamen rubro maiore. Exant inquit, qui Juniperum maiorem putant.

*Locus.
Maxima.*

Provenientem observavit Clusius, pluresque Hispaniæ, & Narbonensis Gallie asperis locis. Nusquam autem maiorem se vidisse meminit, quam super Segobiam, & Guadaram, iunere Maduciano, ubi in prope altitudinem, cum crassitudine corporis humani truncum æquante, excrevit.

*Viscum.
Locus.*

Ego vero Oxycedri Belloni baccas accepi à fratre Caspato Bath. nomine Juniperi maritimi, quas in horto Ill. E. C. Montbelgardii seminari: Ea mihi primum visa fuerat Monspelij, ubi et modo abundat, quo Juniperus vulgaris circa Balileam, & Montbelgardum, quam ibi non vidi. Monspelio vero nobis delata arbor, & plantata Montbelgardii in horto Ill. C. VV. baccis toto anno gravida.

*Vfus.
Trabes.*

Ex trunco Juniperi, annotante Clusio, adium trabes & contignationes Hispaniæ incolæ faciunt. Addit præterea ex eo fieri oleum, quod Narbonenses Huile de Cade appellant, capitis scabiei, perhorumque scabiei & ulceribus, quibus à consuta non minus quam infestantur, adprimè utile. Id Oleum Cedri simile est. Catalpino ex fructibus Juniperi maioris, cum maturi sunt, vino remollitis exprimitur liquor, qui Saccharo exceptus utilissimus: ut pote qui ex pulmone & pectore educit purulentia: ac tempore pestis præservatur loco esse potest.

*Oleum simile
de Cade.
Scabies.*

Liquor.

VISCUM OXYCEDRI.

*Locus.
Descript.*

IN Hispania (inquit Clus.) in Oxycedri ramis mense Octobri, observabam plantulam, digitilongitudine, instar visci, ramosam, geniculatam, viridem, interdum flavescens, ramulis Myricæ, recentioribus, sive eius plantæ, quam nonnulli Salicorniam, Mompeliani Sempervivum matinum vocant, sed paullo minoribus constans, quorum extremis interdum veluti fructus inhaeret, Musci, qui in arboribus, aut saxis nascitur, fructui persimilis; acido autem & perquam adstringente gustu tota plantula hæc est, Oxycedro, veluti Viscum in aliis arboribus, inspiciens.

Viscum.

Camer. apud Matth. Germ. Visci genus in Cedro phœnicea, cuius meminit Clusius.

VERNIX SIVE SANDARACHA Arabum.

*Descript.
Color siccus
et.*

Vernix in stiris longas densatur in pallido flavescens, Succini colore & perspicuitate,

fragiles, quæque dentibus friatæ nequaquam denud coquant, sapore nullo evidente, odore, ubi adoleat, resinoso.

*Oder res-
inosus.*

Cæterum, Arabes Gandaron & Sandaracham vernicem vocant, & exponunt esse gummi arboris Juniperi, simile Carabe. Quare diligenter observandum est his, qui illos sequuntur, ne pro salutari medicamento, Sandaracham Græcorum perniciosum pharvacum agnoscant. Deinde ex vernice Juniperi lachryma etiam factam vernicem cum Linisemini oleo fieri dicunt, & sic Succinum cum Juniperi lachryma confundunt.

*Gandaron.
Juniperi-
nam &
mi.
Observa-
tio.*

Corn. in Diosc. Profert ex Juniperi gummi Mastiche simile, quod & Sandaracham & Vernicem appellant. Hoc primum cum intetur, can-

*Sandaracha.
Ver-
na Arab.*

dido splendescit colore, senescens vero in cinereum abit. Porro haud ignorandum est, hanc Arabum Sandaracham à Dioscoridis Sandaracha, perquam longe dissidere. Namque Græcis Sandaracha est fossilis. Verum hæc Sandarachæ nomenclatio, in gummi Juniperi injecta fuit à Medicis, qui Mauritanos secuti, Sandarax Arabicum nomen (sic enim Arabes Juniperi gummi vocant) in Sandaracham converterunt. Quamobrem illud adnotandum esse videtur, quod ubi Arabes, Sandaracham medicamentis inferendam esse præcipiunt, Gummi Juniperi immiscendum intelligunt, ubi vero Græci de Sandaracha fit mentio, fossilis illa, græsa & Auripigmento similis, est intelligenda: non desunt tamen, qui velint Mauritanorum Sandaracham, non esse gummi Juniperi, sed Oxycedri. Quorum æquidem iudicio censet Matthioli subscribendum: etenim præci admodum sunt, qui non putent Oxycedrum esse Juniperum maiorem: aded ut plerique vulgare, illam ab hac nesciant distinguere.

*Sandaracha Diosc.
alia à Sandarachæ
Arabum.*

Sandarax.

*Sandaracha Arab.
quibusdam
Oxycedri
Gummi.*

Tradit Plin. lib. 13. cap. 11. plura gummi genera, ubi Gummi Juniperinum ad nihil utile esse scribit. Cuius tamen frequens usus in medicamentis contrariū indicat, & quod hoc sincero & puro ex lini semine pressio sit vernix liquidus, cuius est usus ad illustrandas picturas, & ad nitorem ferri conservandum: utilis etiam ad ambusta, est præcipuus ad dolores, & tumores hæmorrhoidum. Græce dicitur *χρυσή* *χρυσή* *χρυσή*. Lat. gummi Juniperi, Mauritanis Sandarax, Italis gummi de Gæpro, Germ. Derris, Hipp. Vernix, Gall. Vernix.

*Vfus Gummi
Juniperi
vini, quam-
vis nullum
exhibet
plu.*

*Nomina
linguæ.*

Ex Cedro phœnicea gummi exsudat durum, perspicuum, ut Mastiche. Noster, inquit Bellan. de conf. falsæ Sandaracham (Græcorum putat alii vernicem nominant) quibus tanta inter se affinitas est, ut si commixta simul essent, vix discernerentur, nisi hac nota ab eo deprehendatur Mastichen, quod Mastiche commixta ore con- gummi autem Cedri diffunditur & in partes tenuissimas redigitur, quod in ore amplius non coit. Gummi Mastiche simile, quod eo Junipero fuit, & Vernix dicitur, aut Sandarax Arabicæ, vocamus, inquit Lacuna, vulgo in Castilia Græsa.

*Cedrus
Phœnicia.
Sandarachæ,
Ver-
na.
Sandarachæ
Arabum
et Mastiche
digno-
m.*

*Græsa La-
cina.
Vernix.*

Gummi Oxycedri, ut & Juniperi, vulgus Vernicem appellat, Hist. Lugd. Juniperus (ait Cæsalp.) tenuem lachrymam fundit, resinofam, Vernicem vulgo appellant, fabris & pictoribus utilem ad tinctoria cum oleo. Sed quam bene hi sentiant, considerandum proponimus. Siquidem opinionem hanc de Vernice pictorum, refutare videtur Cornarius, cuius verba antè posuimus.

*Error mul-
torum.*

A quamplurimis autem Vernix, siue Sandarax Acquivoca Arabum, & gummi Juniperi arboris, de una eademque re & habetur & dicitur. Sicut & Succinum Cornario, dum dicit: In Curiensis littoris tractu, maxime tamen in Dantiaca Prussie urbe,

Vires &
Sap.
Diffusio
Mes.
Mensum
proflusa.
Animalia
Ventre.
Nervorum
resolutio.
Excretionis
sanguinis.
Hamorrhoi
des.
Fistula.
Dentes.

succinum cum Lini semine, videlicet eius oleo, in id, quod Vernicem, sive Verniginem vocant, non pictoribus & multis opificibus familiarem, & quæ Bituminis usum hodie in plerisque locis præbet apparatus. Sandaracha de stillatione suspendit (Scapulus est oratio) menium profluvia sistit, sinus exsiccatur immisus, haustus vero pituitam, quæ ventriculo & intestinis hæret: tinea & cetera ventris animalia necat: nervorum resolutionibus, quas humores frigidi contraxerint, opitulatur: capitis distillationes sistit differt: et idem exsuperis sanguinis excretionem opprimat, & hamorrhoidas fluentes sistit: additum calido, tumen utero sedis rimas coarctet & hiantibus frigore manuum, pedumque fissuris sic succurrit. In summa calfacit & siccit primo recessu. Sandaracha (pergit Matth.) sicca proprietate quadam facit ad dentium dolorem. Invenitur carbonibus, sumusque per siphunculum excipit dens male affectus. Vel eius decocto calido ex ore os colluitur. Vel r. Rosæ Chamæ. Oregani. Manip. sem. Vernicis sic. drach. ij. coquantur in mensura vna vini, dimidia acet, ad tertiam. Excolati liquoris cochlear vnum ore contineatur calidum, subinde expuendum, denuoque continuatus vicibus iterandum. Vel Recip. Vinum Malvaticum, quod chalybem candentem resinxerit, huic tantundem affunde spiritus vini, vernicis sicæ pulverem parum addo. Hæc miscella calida d. lentem dentem foveto. Efficacius tamen ad prædicta oleum è gummi stillatitium. Sic Vernix cum albumine ovi mista, fronti & temporibus induta, hamorrhagiam narium sistit. Cum albo ovi & Thure ventriculo imposita, vomitum compescit, alviq; profluvium.

Hamorrhoi
des maxime.
Vernix.

JUNIPERVS MAXIMA IL.

C. A.

CAP. XXV.

Juniperus
Sylvestris.



Junip. syl.
vica ma-
xima.

JUNIPERVS
Iquiunt Lob. & Pena Adv. Ex Italia quidam habuimus plantas, non dispares fronde & figura Oxycanthi, sive acule Junipero, sed fructus erat teres, oblongior, medio-cri Olivæ par. lisdem in Obl. & Ic. Pl. Juniperus maxima Illyrica, cærulea bacca, videtur Dioscoridis maior Juniperus, aut congener. Tabern. Juniperus maior Illyrica. Hist.

Lugd. Juniperus maior.

CEDRVS LYCIA RETVSA BELLONIO DIGTA.

CAP. XXVI.

Descript.

CEDRVS Lycia in monte Cethi ipsi observata, arbor est pumila, tricubitalis, nec, an



alibi maior. scilicet: Cortice subrubro, odore Cupressi, grato: sapore adstringente amarescente cum acrimonia, lentis & flexilibus ramis. Folia cupressinis simili, vel nihil similius, vel Sabinae, interdum longiuscula, aculeata, seu lupulini vulgaris: nonnunquam vni-que generis, in eodem ramulo folia videas: ut plurimum tamé

Cortex.
Oder.
Sapor.

Rami.
Folia.

Bacca.

Oder.

Nachi.

Medulla.

Classi de script.

Juniperus maior Classi.

Cortex.

Cortex.

Folia.

Fructus.

Sapor & odor.

Grana.

Medulla.

Temper.

Folia.

Adulter.

Planta in metamorphosi.

Spinae Co-rost.

Cedrus Lycia sive retusa. Theophr.

Errata in textum.

Cupressina: in ramulorum extremitate bacca parva, etiam cum conis Cupressinis tuberculis nonnullis quodammodo similes, odore baccarum Juniperi resinoso, ac cum quadam amaritudine: quæ ubi adoluerunt eblorescunt rubens, magnitudine interdum ad Oxycedri baccas accedentes, à quibus sicet vix dignoscantur, nisi abessent lineæ triquetra, quæ in Oxycedrinis pulchre conspiciuntur: nucleos, seu grana tria continent parva, striata, resinosa, in quibus medulla alba, Oryza quodammodo similis: in Oxycedrinis autem terni esse solent nuclei maiores.

Descriptio Clusij videtur nobis digna, quæ hic ponatur, quæ cuiusmodi est: Juniperus, quam majorem appello, frutex est humanæ altitudinem raro superans, caudice contorto, non recto, multis ramis prædito, scabro cortice: folia habet carnosa, & ex continua quaternorum foliorum mutud connexionum serie composita, quemadmodum Cupressis: flores Junipero vulgari, & Oxycedro similes, flavos, sed extremis foliis inflorescentes, ut in Cupresso & Thuia: quibus succedit fructus baccarum magnitudine Myrti, rotundus, primùm viridis, deinde ad phœniceum colorem tendens, qui maturitate non nihil mollescit, sapore & odore Juniperi baccis simili, qui terni, aut quaterni, vel etiam plura grana oblonga & striata habet, medullam albam & resinam olentem continet. Vere floret, fructumque diu retinet, antequam matureseat, ut Juniperus. Primùm semine natus hic frutex, & adhuc tener, folia habet omnino dissimilia, utpote quæ alterius Juniperi folia imitentur, nisi breviora & paulo molliora essent: cum vero iam tertium, aut quatum annum attingit, rotunda & cupressæ folia efformare incipit, ut inferiores ramipungentibus & acutis foliis, summi vero obtusis & rotundis onusti interdum conspiciantur. Quam metamorphosin nisi quis diligenter observaverit, facile in errorem induci possit, ut credat adolescentem à iam adultam diversam plantam esse.

Ceterum, hæc Cedrus interdum spinosa est, qualem Matthioli pingit: quandoque non spinosa. Nos ramum habemus unum cum, alterum vero sine spinis. Scribit Bellon. de conf. Lyciam Cedrum plerosque eam, quam Theoph. Thuiam appellat, existimare: se vero Cedrum Lyciam retulam vocare maluisse, propter folia dubio procul obtusa. Miratus sum, inquit, Pharmacopœorum & Medicorum Epidauri interitum, qui cum

Cedrus Lycia sive retusa. Theophr.

Errata in textum.

Errata in textum.

Errata in textum.

Sabina foliis subrotundis.

verè Sabina careant, in Officiis pro Sabina u-
nantur, quo errore video, magnam Græciæ par-
tem, Illyriæ, Epyri, atque etiam Venetias ipsas
infestari. Circa Massiliam vulgus *Masseine* vo-
cat, Avinionenses *Decade Serbin*, apud Sirpon-
tem verò versus Massiliam, *Cotranum* voce Ara-
bica appellatur. Putavimus foris Bellon. Cedrum
Lyciam, quam retusam vocat, Plinio *Selaginem*
dictam. At Theophrasti interpretes *Selaginem* pro
Coronopode vertit. Cordus aliquando cum
eum comitaretur & Lyciam Cedrum offendis-
sent Thuiam esse coniecit, atque eum amicus ra-
mos impertiretur, Lyciam offerre asseribat.

Selago Plin.

Coronopus.

Thuiam, non est.

Cedrus phœnicea.

Bellon. no-

tatur.

Matth. re-

preh.

blem Obs. Cedrum parvam folio retulo nomi-
nat, ac alibi eam tradit nomine Cedrorum par-
varum Lyciarum, folio pungente, quæ Græcis di-
cantur *Oxycedri*, quibus contrariæ sūt Cedri
phœniceæ, quæ folia habeant retula. Sed videant
lectores, quomodo sūp̄ius oblitus à contrarie-
tate eximi possit Bellonius.

Castorei l-

comet bina.

Suspiciamus quoque Matthiolum non bene
distinxisse Sabina à Lycia Cedro, sed eam ea
miscuisse, dicit enim Lyciam vocatam ab illo, qui
Moravia attulit Sabina. Deinde tribuit uni
Sabina, in post. scilicet com. Ital. baccas rubentes.
Hinc forte Durantes occasionem sumpsit, quod
ad *Castorei l-*, Sabina fructiferam appellat. Ab
eodem verò scilicet Castore Dur. dux Icones v-
nius plantæ exhibentur, meliorem autem eam
censemur, cui titulus *Sabina fructifera*.

Sabina r.

Smyrithi

gluchi.

An Anguill. Sabina secunda in Slavonia inco-
lis *Smyrithi Gluchi*.

Cedrus Ly-

cia.

Thya non

est.

Dodonæ hæc *Oxycedrus Lycia* dicitur. Al-
tera humilis, *Cedrus Lycia* ex retulo folio, *ad-*
u- Theoph. Plinio similiter Lycia Cedrus di-
gitur. Sunt qui & *duar*, sive Thiam esse existi-
mant: sed Thya autore Theoph. non modò cau-
dice, foliis & ramis, sed & fructu Cupressi simi-
lis.

Gesnero de hort. Cedri species altera, *Cedrus Lycia*
Bellon.

Cedrus Lycia Adv. iamdiu Lutetia visam qui-
busdam hortis, folio Juniperi multò minore, ad
Sabina accedente, baccæ phœniceæ minores:
videgetur Belloni Sabina altera, nisi Lob. Obs.
pro ea plantam pinget, quæ non fert baccas,
ac etiam non bene scripta fateatur dum ali-
ter legi vult. Qui fuerit Lutetia, rem perpen-
dat.

Sabina

baccata.

Cedrus

phœn.

Oxycedrus

Sabina

maior.

Lob. & Pena Adv. & Icon. Plant. *Sabina baccata*.
Obs. & Icon. Plant. *Cedrus phœnicea altera* Pliny
& Theoph. *Oxycedrus folio Cupressi, aut Sabina maior*
Monspeliensis. Item Obs. & Icon. Plant. *Cedrus*
phœnicea media, Juniperus maior folio Cupressi, inter
notha Dioleoridis Clusio. Hæc superiori plan-
tilis, sed omnia longè minora. In adversariis
nostris Sabina baccatam dixeramus: melius ta-
men quadrare videtur cum altera Cedro minori
Theoph. Meo tempore Mespeliensibus voca-
batur *Oxycedrus folio Cupressi*. 3. *Cedrus phœnicea*
minor, eodem modo fructicans.

Lobel. in Adv. utrumque genus foliorum pin-
git, quamvis non in omnibus placeat eius figura.
Clusius unicam tradit speciem. Testis est C.
Bauh. Plantinum duas habere figuras unius
plantæ, nempe Sabina baccifera & Cedri phœ-
niceæ medix. Illi verò quam sagit Cedrum phœ-
niceam alteram, multò maior est, potissimum
fructu, & longè etiam ætior, ea quam habeo,
folius non ut Monspeliensis ex vitore luteis, sed
ex vitore nigricantibus. Fructus etiam triplo
Monspeliensis maior.

Tom. I.

Juniperi duo genera veteres constituunt ma-
ius & minus. Dioscor. unius fructum Nucis lu-
glandis magnitudine interdum augeri: alterius
verò Nuce m ponticam æquare ait: cum tamen
reliqui Junipero fructum non maiorem, quàm
Myrto tribuant: sed nec ipse cap. de Cedro. Con-
venit optime hic frutex cum Junipero maiore
Dioscoridis inter spuria reiecto & dicto. *Junipe-*
rus maior aliquibus silvestris Cupressus. Nisi quis for-
tè ad Cedrum minorem alteram, quam Theoph.
& Plinius phœniceam vocari scribunt, referre
malit. Nonnulli ex Neotericis Sabina baccifera
nomine appellant, cum tamen à Sabina mul-
tū differat odore & forma. Sunt qui *Oxycedrum*
folio Sabina appellant. Galli Bellonio teste Ser-
bin. Quam ali pro Cedro Lycia exhibent, meo
iudicio [Clusij] nihil aliud est, quàm novella Ju-
niperi maioris, sive Cedri minoris phœniceæ
plantæ, quæ baccas proferre non solet, donec
Tamaricis, sive Cupressi folia contraxerit, licet
non desint, qui quatuor Thuiæ genus ex eaf-
cere non vereantur. Hispani à Junipero non di-
cernunt, sed eodem vocabulo *Erebra* vocant.

Camer. ad Hist. Matth. ponit novam figuram,
sub titulo *Cederbaum*. Cedrus Lycia foliis cu-
pressinis non spinosis: Matthioli autem erat cum
omnibus foliis spinosis. Tab. 16. & Hist. videtur
nobis unius plantæ duas ponere figuras, unam
sub Cedro Phœnicea, & alteram sub Sabina fer-
mina maiore, quamvis descriptio variet.

Frater C. Bauh. mihi Patavio ex hortis Muzini-
gi ramum attulit hoc nomine, Sabina baccifera
quibusdam, Cedrus Guilandino: in eodem ra-
mo folia Cupressina retusa, & Juniperina aculeata.
Monspelijs dum essem, imperiti quidam Sabina
vocabant.

Hist. Lugd. Cedrum tertiam, taram sanè & e-
gregiam plantam, Matthiolo in Moravia monti-
bus nascentem, quidam Thuiam Massiliensem
esse putant, negligentius depictam.

Bellonio circa Massiliam affatum provenire di-
citur, quemadmodum & apud Avinionenses, a-
pud quos frequentissima est. Clusio autem nasci-
tur in Tyrtheni maritimis, veluti inter Calpen &
Malacam Bætica oræ maritima, & Gallie item Nar-
bonensis. Semina mihi Patavio à fratre C. Bauh.
missa, terra mandavi in hortis illi. C. V. Vult. Obser-
vavi in Italia Bononia baccis gravidam mense A-
prili in hortis Nobilis di Gonzadini, maiorem
Monspeliaca quam Monspelijs ægis reperi in
monte Cetho, mense Aprili baccis cæcis coniso-
nullam.

JUNIPERVS ALPINA.

CAP. XXVII.

EX Delphinatu olim Lugdunum mihi allatus
est Juniperi Alpina ramus (quam quidam
Selaginem existimabant) rugoso, nigricanteque,
cortice amictus, multus adnatis furculis filius,
tamque denso foliorum agmine stipatus, ut vix
ramuli possint conspici. Sunt autem ea bre-
viora, latioraque, quàm in Junipero vulgari,
suprà viridantia, infrà glauca, baccæ non min-
dum numerosæ, quàm in vulgari, eisque pares, per
maturitatem item ex nigro glauca.

Nobis ut videtur eam Clusius in Pannon. &
post. Hist. sequentibus depingit, ac describit: E-
legantem, inquit, Juniperum pungentibus foliis

Descriptio
Classis.

Ram.

Folia.

Color.

Flor.

Fructus.

Locus.

Facies.



in Austroratum
Alpium quibus-
dam iugis mihi
primū obler-
vatam huc ad-
iungam.

Cubitalē al-
titudinem ea
non excedit, sed
depressa est, &
quasi humi spā-
gitur, multoque
crassioribus &
brevioribus con-
stat ramis, quā
vulgaris, lentis
etiam, fractūque
conuincibus,
& contortis: te-
nellos ramos
ambiūt terna fo-

lia, aequaliter se per nascentia, ut in vulgari, verū
latiora, breviora, crassiora, nec minus, quā illa,
pungentia: colore interius ex caeruleo candican-
te, exterius viridi: florem non conspicit: fru-
ctum autem in ramulis gestat vulgari similem,
paud tamen (ut mihi quidem videbatur) longio-
rem, antequā plenam maturitatem consequa-
tur: deinde, ubi maturuit, nigrum, eisdemque
cum illo saporis. Crescit in scopulis Durrens
stein & Erscher / quibus duntaxat locis inueni-
bam Augusto mense pauculas stirpes fructu ma-
turo & immaturo onustas. Gustus autem indica-
bat, facultates à vulgari non ab similes possidere.
Haecenus Clus.

ETALCHE

CAP. XXVIII.

ARBOR est magna, spinosa, foliis Juniperi.
quae gummi simile Mastichi emittit: eo A-
fricani adulterant Mastichen, quia odore & non-
nihil colore Mastichen refert. In Namidia li-
gnum album, in Lybia violaceum & nigerrimum,
in Aethiopia nigerrimum, quod vocant
Itali Sangu, ex quibus parant instrumenta musica.
Violaceum lignum est in usu inter Medicos, ad
curandum morbum Neapolitanum, ut refert Leo
Afric. lib. 9.

Eiusdem meminisse Scalig. videtur exerc. 18.
part. 19. his verbis: Grandiorem Juniperum, quae
Cedrum maxime emulatur, Harar vocant Ara-
bes, Afri nominant Etalch. Eius medulla in Nu-
tuidia candida, in Aethiopia nigra, in Lybia pur-
purea: quae in robem comminuta dicuntur Afri
Medici felicissimo successu, vice Guaiaci ad mor-
bum Indicum profligandam uti. Nimium autem
nostro quidem iudicio, obscure loquitur Scalig-
ger, non enim constat ex verbis ipsius, quam ar-
borem intelligat, cum eam non describat.

Hac eadem arbor apud Hist. Lugd. ex Scalige-
to grandior Juniperus dicitur, Harar Arabibus,
Aphris Etalch: Ea tamen in descriptione novae
partis Africae Etalch se legisse ait, sibi prorsus
videri esse Oxycedrum: ac meminisse eius The-
votum sub nomine arboris Elabehen quae in insula
Cicant provenit valde spinosa & Junipero simi-
lis.

Non porro inficias ibimus, si nonnulli statuere
velint, hanc nostram arborem eandem fortassis

esse cum Hermolai in Diosc. lib. 1. cap. 108. Capida, ^{Ar Capida}
arbores Junipero virtute simili, quam à Catone ^{Hermol.}
ita dictam invenit ad lotum movendam: nec
quid sit dicere coniectura potest.

LIGNVM EXOTICVM ANO.

CAP. XXIX.

ANNO à nato Christo 1601. mittebat ad Clu- ^{Descriptio}
sum, Petrus Gasetus Iacobi frater ligni ca-



iustam fragmen-
tum pedalis lon-
gitudinis, crassum
in ambitu uncias
pene tredecim,
cuiusque diame-
ter uncia quatuor
cum semelle: con-
tortum sive tor-
tuosum, latis cras-
so, lavi tamen,
cortice tectum, ^{Corte.}
sed qui totus resi-
na cuiusdam sub-
flavi coloris gru-
mis quasi tessella-
tim dispositis, ef-
fet oblitus, quae o- ^{Obli.}
doris quidem, si i-
gnis admoventur,
non iniucundi, &
qui Mastichen re-

doleret, digitis autem non nihil attrita, valde
friabilis esset. Ligni materies gravis, dura, firma, ^{Materies.}
& candicans.

Ceterum à Cheiturgo, qui fragmentum attu-
lerat, intelligebat, arborem, ex qua resectum
fuerat, non esse proceram, sed ad octo circiter
pedum altitudinem assurgere, lacque sepe in
multos ramos spinosos spargere, & folia habere ^{Folia}
instar foliorum spinae appendicis dissecta, magis
tamen virentia, & ad foliorum Ruteae colorem
accedentia. Nullius autem usus apud incolās esse
hanc arborem arbitrat, nisi quod crassiores il-
lius ramos ad quinque pedum longitudinem re-
sectos, viginti, aut plures coniunctim in terram
figebant, deinde eos, subiectis fidei libris incen-
debant ad resinae ignis calore liquefcentem & ^{Resina.}
diffluentem excipiendum, quae picis vice suas
cymbas illinebant & stiparent.

Crescebat autem ea arbor, referente Cheitur-
go, in ea Americae parte, quae Puma el Rey nuncu-
patur.

An porro affinis arbori Etalch in Africa na-
scenti, cuius meminisse Ioannes Leo lib. 9. Descri-
ptionis Africae? Verum & arboris magnitudo, &
foliorum forma refragari videntur, nisi Cheitur-
gus lux arboris notas recte exprimere non qui-
verit.

THVS.

CAP. XXX.

PRÆTERea, more nostro, notiori-
bus nobis, Abiete, Picea, Tazo, Pino, Lari-
ce, Cedro, Cupresso, Sabina, & Junipero, ad
alia transcundum, exotica scilicet, quae etiam
se-

Sangu.
Lignum
Violaceum

Junip. ma-
ior.

Harar.
Etalch.

Oxycedr.
succed.
Scalig. no-
tatur.

Descriptio



Flamma:

Oder.

Sapor.

Color.

Thuris mam-
mosum, &
masculum.Manna
Thuris.
Item.Thuris
Libani
Veteribus.
Folia Pyri.
Myrrha
arbor.Folium
Laurinum.
Locus.

Lachryma.

Collectio.

Alia deseri-
ptio.
Folia &
fructus Len-
tisci.

resinā vel gummi
in se habent,
Thurs, Sarcocō-
lam, Myrrham,
Stacten, Carpi-
num, Bdellium,
Bemojū. Am-
bram, Caphu-
ram, Syracem,
& alia quādam
disinterenda.

Sicca autem,
at pinguior tamē
est. Thurs la-
chrymā, quā
Mastiche statim
quē in luculen-
tam, perunā-
cēmque flām-
mam exardet,
odore multo im-

becilliore, sed nihil per incendium stil-
lat, ut Mastiche: dentibus statim friatur, veram
friatura non cogitur denuo, ut Mastiche, neque
ut ea liberē volutari potest, cum dentibus, co-
rūque præsepibus adhærescat. Sapore est ama-
ro & modicē acri, non ingrato tamen, Cæsalpi-
no adstringente, subamaro: colore est ex albo
fulvescente, minūque pellucet, quā Mastiche
colore candicante, aut subrufo, translucente que-
re, hās singulares, aliās gemellæ testiculos aut
mammas prout ex maiores, minoresve fuerint, i-
mitantur, unde & Mammosi & Masculi Thurs co-
gnomina interdum quaternæ, aut quinz, ma-
gnitudine Ciceris, Avellanæ, & maiores, adhi-
rentes nonnunquam suo cortici, unde exsuda-
runt: friatura verō immundior ex grumorum at-
ritu decussa, Manna Thurs apud Græcos appel-
latur.

Item, quæ à nobis exhibetur, ex Theveto de-
sumpta est, folia autem non respondentia, quæ
à autoribus diversis de hac arbore scribuntur,
ut ex sequentibus videre licebit: fidem eius re-
linquimus eius autoribus: posteris, qui in Ara-
biam devenient, confiderent.

Theophrastus interea scribit, Myrrh, arbor
non magna, quinis fere cubitis attollitur, ramosa:
folium autem habet simile Pyro, & colore planē
herbaceo, ut Rhus, corticem verō lavem omni
ex parte, ut Laurum. Myrrhæ minoris altitudo,
sed eam fruticosior est. Abi verō qui se vidisse
affirmant, de magnitudine fere non consentiunt.

Neutram earum arborum magnam referunt, mi-
norem verō Myrrhæ, & humiliorem. Folium au-
tem habere Thurs. Sed huius Laurinum & lave
folium. Esse autem & radices & ramos incisos,
sed alios veluti securi percussos videri, alios te-
nuiore incisas habere. Lachrymam verō a-
liam decidere, aliam arbori inhære. Alicubi
subiectas tegetes [Lachrymam] ex Palmis contextas,
alicubi solum tantum circumspavimentatum &
putum esse. Thurs, quod tegete exciperetur,
putum esse ac perlucidum: quod terra, minū:
quod arboribus inhæreret, ferro deradi, & coru-
cem idē nonnullis adiungi. Montem univer-
sum Sabæis divisum. Alij verō quidam aiunt,
arborem Thurs similem esse Lentisco, & fructum
quoque Lentisci, folium verō subrubrum. Thurs
recentium arborum candidius esse, minūque o-
doratum. Veterum magis flavum odoratiūque,
Myrrhæ autem similem. Sola hic arbor omnem
penitis cultum naturā aspernatur. Quidam di-

cunt suavius Thurs in Arabia nasci, pulchrius ve-
rō in vicinis insulis, in quibus hæc arbores pro-
venit. Quoddam aded magna gleba consi-
sit, ut mole sua manum implere, pondere verō
plutquam tertiam partem minū æquare possit.
Hæc de Thurs Theophrastus, cuius historiam
ex Plinio quoque describere, non iniucundum
fuerit.

Arboris Thurs quæ sit facies non constat, & locum
nullo enim Launo, quod equidem sciam (inquit
Plin.) tradit. Græcorum verō exempla variant:
Alij folio Pyri minore dantaxat, herbidi coloris
ptodidēre. Alij Lentisco similem subrubro folio,
quidam Terebinthum esse, & hoc visum Anti-
gono Regi, allato frutice. Iuba rex is volumi-
nibus, quæ scripsit ad Cæsam Cæsarem, Augusti
filium ardorem tamā Arabiæ, tradit contorti
esse caudicis, ramis Aceris, maxime Pontici: ac
succum Anisygdalæ modo emittere, talēque in
Germaniā apparere, & in Egypto sacis studio
Ptolemaeorum Regnantium. Cortice Lauri esse
constat, quidam & folium simile dixere. Talis
certē fuit arbor Sardibus: Nam & Alæ Reges se-
rendi curam habuere. Qui mea ætate Legati ex
Arabia venerunt, omnia incertiora fecerunt,
quod iure miremur, virgineam Thurs ad nos
commissantibus, quibus credi potest, matrem
quoque teretem enod: fruticem truncos. Apud
nos adulteratur. Resinæ candidæ gemmæ per-
quam simili. Probatum candore, amplitudine,
fragilitate, carbone, ut statim ardeat: item ne
dentem recipiat potius, quā in micis frietur.
Prima videretur Thurs, Carphentum: Secunda,
Dathaitum vocant. Quod ex eo rotunditate
gutta pendit, Masculum vocamus, eam aliās
non ferēmas vocetur, ubi non sit semina. Ma-
sculum alijs putant à specie testium dictum, præ-
cipua autem grana est Mammosa, eam hæc
lachrymā priore, consecuta alla miscuit se. Græci
Stagoniam & Atomum tali modo appellant, mi-
norem autem, Orobian. Micæ concolli elias,
Mannam vocant.

Thurs, inquit Dioscorides in ea gignitur Ara-
bia, quæ Thursera cognominatur. Primatum
tenet in eo genere masculum, quod Stagoniam
vocatur, naturaliter rotundum. Hæc autem
tale non solum, album & fractum, idus
pingue, & ad suffitum accensum statim ar-
det. Ac Andream suffulvum est, & lividum
colore. Fit etiam ex industria rotundum. Se-
cant enim ipsum in quadrangula frusta, & in fi-
stula coniectum tandem volutant, donec rotun-
dam figuram acquirat. Tale verō tempore fla-
vescit, & lectum, aut Syagrum appellatur. Se-
cundum locum habet Arabicum, & quodam Spi-
lo nascitur, quod aliqui Cypisum vocant, & mi-
nus, ac fulvius existit. Dicitur & quoddam Amo-
mites, alioqui album quidem, sed quod dum mol-
latur, velut Mastiche remittit. Adulteratur om-
ne Thurs fraude tractatum cum Resina Pineæ &
gummi. Verum facilis est dignotio. Gummi enim
incensum in flammam non exardescit: Resina
verō in fumum abit. Thurs autem ardet. Sed &
odor adulteratum prodit.

Cortex Thurs præteritissus, pinguis, & o-
doratus, recens lavis, & non scabebat, aut mem-
bris obitus. Adulteratur ammixto cortice
Strobilino aut Pineo. Sed & horum, index ignis
est. Reliqui enim accensi non ardent, sed citra
odorem in fumum abeunt. At Thurs cortex ar-
det, & cum odoris gratia sufficit. Virtus autem &
hic, velut ipsum Thurs. Manna Thurs Manna
Thuris.

In Arabia

Magna
gleba.Locum
qualis ar-
bor.Folia Pyri.
Folia Len-
tisci.Terebin-
thum.
Caudice
contorto.Locus.
Rami A-
ceris.Succus.
Cortex &
folia Lauri.

Virga.

Adulterium.
Delectum.Vindemia
brua.
Carpho-
entum.Dathai-
tum.

Masculum.

Stagonia.
Atomum.
Orobia.

Manna.

Genera.
Stagoniam.Quomodo
per adu-
lterium ro-
tundum fit.Syagrum.
Arabicum.Cypisum.
Amomites.Adulter-
ium.

Cortex.

Adulterium.

Manna
Thuris.

non probatur alba, pura, & granulosa. Quidam adulterantes ipsam commiscunt resinam Pini crebratam, & farinam pollinem aut etiam Thuris cor-
 uicem confusum. Sed & hac igne deperden-
 duntur. Neque enim equaliter & pari vigore ar-
 debit, ut aereum vaporem emittat, sed fuligino-
 sum, & non purum: Sed & odoris gratia mixtum
 quendam odorem naribus offeret.

Delectum
Galeno.

Galeno etiam Thus optimum, quod masculu-
 lum dicitur, subtile, rotundum, & naturaliter
 leve, fragile, & si pinlatur, in miculas minores,
 ut sabulum dissipatur, & quod ad ignem cito at-
 tenditur, ac odorem suavem, & copiosum emit-
 tit. Adulteratur resina pityna, & gummi &
 Thure commistis, & fit in speciem sinceri Thuris
 fortis. Idem & Manna adulterant aliqui, laxi-
 gata resina pityna, vel farina, & cortice Thuris:
 & cortice nuclei Pinei. Sed deprehenduntur ita
 Thus enim quod resinam, vel gummi habet, si
 masticeretur, fit quasi mastiche, & ad ignem non
 cito accenditur, nec talem odorem habet. Simi-
 liter & Manna; & cortex, si sincerus non sit, tar-
 dius & fumosius incenduntur. Idem quoque li-
 bro de Simplic. med. hac habet. Thus, lachryma est
 arboris, quae in Arabia & India nascitur, quae
 Graece *ῥηῖν* dicitur, quod ergo de Arabia ar-
 bore manat, candidius est, quod de Indica, sub-
 rufum. Verum utrumque Masculum appellatur.
 Est & tertium minutum valde & rufum, de quo
 maximè Manna conficitur.

Adulterium.

Locus.

Olibanum.
Kender.
Thus unde
dicitur.
Tim.
Dendroli-
banus.
Libanotis.
Libanotis
unde de-
bit.
Fakula.
Cracorum.

Hoc aut à verbo Graeco *ῥηῖν*, sacrificio: aut ex-
 te à tuis glebis, (aut, quod non aspernandum
 à contrito corde, quo offerri solet) ita ut sine
 aspiratione Tus Latine scribi debeat, deducitur.
 Arbor ipsa Libanos & Dendrolibanos: Lachryma
 vero Libanotis à Galeno dicitur. Euripides con-
 tra Libanum pro Lachryma, Libanoton pro ar-
 bore Thuris accipit. Auveng Assyrio, cui no-
 men esset Libanos, in hunc gentem converso,
 dictam Graeci fabulantur, quem Deos studiosissi-
 mè colentem invidi occiderunt, hinc nihil esse
 Dii Thure gratius. Orii apud Sabzos Larim-
 num suffitu odoratissimum tradit Strabo: nec
 tamen quid & quale sit demonstrat.

Manna
Thuris.
Manna
depravata
apud Plin-
ium.
A Thure.
Manna
differt.
Thuris
Chondros.
Thuris
granum.
Aethalon.
Ethalon.
Petrus Cri-
nitus re-
dargatur.

Habetur ergo Manna Thuris & cortex [quod
 Thure dicitur] Manna Thuris (inquit Hermol. est
 Hypophisma: quod Plinius micas conculsu-
 interpretatus est, ubi depravata dictione, Mam-
 mas non Manna vulgo legitur. Differt à Thure
 Manna, quod plus adstringit propter corticis fra-
 gmenta, quae remanent. Nam quod Thuris
 Chondros à Graecis dicitur: Nos Plantum secuti
 Thuris granum interpretamur. Subiungit idem
 coroll. seq. 87. Fuligo Thuris, Graece *ῥηῖν*, &
 Aethalon, & Ethalon nominata. Ait Manna Liba-
 ni, dicit Monardus, Dioscoridis, non est nostra
 recentiorum Manna, ut voluit Petrus Crinitus l.
 honesta voluptate.

Cortex
Thuris.

Marcell.
reprob.

Manna
differentia

Serapion
error &
mala.

De Cortice Thuris ita Amatus lib. 1. cap. 74.
 huic negotio dicato, tradit, dicens: Cortex Thu-
 ris, si corticosum Thus, lachryma Thure crusta
 coniuncta dicitur, quae constringendi ac exsic-
 candi vires potentiores, quam Thus habet, unde
 Marcellum Virgilium in hac re non rectè sensisse
 dicendum est, quum dicit, quod in cortice Thu-
 ris laudatur, Thus est. Item ita differit: Manna
 Thuris Officinatum Olibanum est, non vero A-
 rabum Manna. Quum huic laxandi, & ac sub-
 ducendi alvum vis inhæreat: illi vero adstringen-
 di potius: unde Serapio hac non animadvertens,
 utramque ineptè admodum confundit. At quum
 in hac re (ut Amati verbis utar) perplexior sit

controversa, quam quae paucis explicari queat,
 non absurdum mihi fore videtur, si de Cornarij, &
 Casalpini verba hac de re hic subiecerim, ut studio-
 si iuvenes legendo veritatem eliciant.

Manna
Thuris.

Vocantur igitur grana & micæ, quæ ex magnis
 Thuris glebis, una cum ipsius Thuris cortice ex-
 cutiuntur: & in hoc ipso Manna præstat Thuri,
 quæ ex amixto cortice modicum quiddam ad-
 stringentis facultatis est adepta, ut docet Galenus,
 item in Gal. lib. 5. de comp. med. sec. loc. cap. 1.
 Thus *ῥηῖν*, non sectum, hoc est, masculum, &
 natura sua rotundum: quo. I. enim arte fit rotun-
 dum, *ῥηῖν* dicitur: appellantur & hæc genera
 Thuris. Item etiam lib. 10. cap. 3. *ῥηῖν*, velut
 exemplar habet: posset tamen non minus rectè
ῥηῖν, id est, masculi, legi. Idem enim
 Thus est, quod & masculum & non sectum ap-
 pellatur. Hæc Cornarius, sequuntur autem
 quæ Casalpinus memorie prodidit. Hodie ad
 nos, inquit, neque cortex per se advehitur,
 neque Thurisamenta, quæ Mannam vocant, se-
 parata à Thure. Quondam cum arte confinge-
 retur rotundum, acritione pulverem fieri oport-
 rebat: idcirco separatim vendebant, sed promi-
 scue nunc cum Thure cortices venduntur & re-
 tinentur: Probatum autem cartilaginosa Man-
 na, id est, consistentia cartilaginea, non pulve-
 rentata, ut Chondri, quam Alicam vocamus.
 Recentiores nomine Manna non Thuris retri-
 mentum intelligunt, sed rorem melleum, quo ad
 purgationes utuntur.

Arum.

Eucum.

Timon.

Arum.

Gal. res.

Arum.

Cortem.

Manna

Thuris.

Delectum

Libanotis

Rob

Cender.

Kender.

Arbor de

plea.

Manna

Melato.

Protum.

Arbor de

libanotis.

Folius Lib

Thuris.

Arum

Guiland.

taxum.

Garcias de aromat. tradit, Thus Arabibus *ῥηῖν*
 vocari, Avicennæ vero *Cender*, resinam, Se-
 rap. *Kender*, corrupto vocabulo. A Libanis et-
 iam se intellexisse arborem, quæ Thus producit
 duplicem, esse: alteram montanam, alteram in
 planis nascentem: montanam optimum Thus
 profert: in planis vero nigrum & improbum,
 quo cum aliarum arborum resinis permixto na-
 vescent & oblinant. Atque has arbores illius
 Provincia Regi cedere, nec cuiquam colligere
 Thus licitum esse, nisi Regis permisso, Condu-
 te vero ad Negotiatores ex Adem, Xael, & aliis
 Arabiz locis, & cum Rege de Thuris quantitate,
 quam avecturi sint, de pretio convenire solere,
 modo laudatum sit & legitimum, & quod ipsi
 masculum vocent, cum Melato appellare. Lauda-
 tissimi autem inde etiam delati, vile esse pretium,
 centenas enim libras duobus duntaxat Laptari-
 cis autem emi, improbumque interdum cum o-
 ptimo misceri, cui nonnumquam & corticem fra-
 gmentaria reant atque huc deferri, sed vile
 mihi esse pretij. Thus idem nullam aliam adulter-
 tionem visse. Nam quis quæso, inquit, id ad-
 ulterare vellet, cum tam vile cinatur? Ac Thuris
 tandem arborem humilem esse & folia habere
 Lentisco similia. Sed hoc ultimum dictum infir-
 mat Theophrasti auctoritas, qui Thuris arborem
 folio Pyri, ut etiam Lauri, esse dixit.

Quis nunc cum Guilandino statuerit Abietes
 in Arabia Thure manare? Theoph. sanè Diosc. &
 Plinius, cum Neotericis peritioribus arborem sui
 generis verius pronuntiant.

Pestinatiter nimium, nostro equidem iudi-
 cio, assent Casalpinus, arborem Thuris, quam
 Barbari Olibanum appellant ex nostris neminem
 vidisse, apudque Antiquos solum Theoph. de-
 scripsisse.

Casalp.

Thevetus à Garcia dissidens, scribit arborem
 Thuriferam Pinus resiniferam referre, & succum
 fundere, qui tempore durefcit, & Thus vocatur
 cum

Pino similis

Thuris.

cum

Locus. cum quo granula reperiuntur arenæ aut sabulo similia, quæ *Mannam Thuri* vocent. Multas autem insulas & regiones huius esse feraces, non solam Arabiam: & quibusdam in locis tam vulgarem esse, quam Aurantiæ Malum in Galliæ Provincia: Thus tamen quod in Arabia crecat, & à *Peber* & *Fortach* regni Aden oppidis deferatur, ut olim, ita etiam hodie, præstantissimum haberi, quod à prisca magna cum superstitione colligebatur. Id verò duplex esse: Vnum, quod æstate, & quamdiu Sol sub cane est, colligitur, candicans, purum, nitidum, pellucidum: alterum, quod Vere, rubescens, pondere, pretio, bonitate, & viribus superiore multo inferius, quia illud maturius, & à Sole sub cortice sua arboris magis excoctum esse videatur. Ac Arabes cultis arbores vulnerare, ut copiosior liquor effluat, quem *Albuncor* vocant. Nec non etiam ex his arboribus quasdam sexaginta Thuris libras, & eo plus emittere. Ex his a. quæ Thevetus scribit, nihil minus convenit, quam quod ipsemet tradit arborem Thuriferam Pinus resinifera referre: Iconem enim nostræ quæ ex eo desumpta est, cum Pinis nulla est similitudo.

Nomina. Thus ab Avicenna *Olibanum*, à Rhase verò Thus dictum. *Alfar* & *Alharir* Græcis dicitur, Lat. Thus, quod & arborem significat, & lachrymam, quam particulatim Gerni. *Weyrauch*. Belg. *Weyrood*. Gall. *Encens*. Ital. *Incenso*. Hisp. *Encenso*, Boh. *Badidlo* nominem.

Epitheta. Quia porro lachryma hæc in divinis quoque sacrificiis & templorum suffimentis adhibetur, ided variis eam Poëtæ Epithetis adornarunt, qualia sunt, Thus pium, votivum, sacrum, vaporosum, odorum, redolens, fragrans, odoratum, fumans. A loco quoque Panchaium, Sabzum, Eoum, Nilicum, Nabatheum, Panichzum &c. vocant: Sabell.

Sacrificiis Nabatheæ foci dant Thura ministri.
Ovid. Metam.

Templa tibi statuum: solvam tibi Thuri honores,
Gignitur etiam Thus (Theoph. sermo est) in regione Arabum media (Theod. legit *ulou*, alij *uion*.) Nascuntur Thuris & Myrtæ arbores, aliz super montem, aliz in radice montis, locis in eam rem exculis. Quamobrem aliz coluntur, aliz non. Montem autem aiunt præaltum esse & arboribus densum & nive tegi solitum. Amnes quoque de eo in plana fluere. Thus autem sub cane ferventissimis diebus incidi referunt. Quod & ex Plinio constat dicente. Meti semel anno solebat, minore occasione vendendi: iam quæstus alteram vindemiam affert, prius atque naturalis vindemia canis circa ortum flagrantissimo aestu, incidentibus, quæ maxime videatur esse prægnans, tenuissimisque tendi cortex, Autumno legitur in æstivo partu. Secunda vindemia est Vere, ad eam Hyeme corticibus incisis. Quidam & in insulis melius putant gigni. Iuba in insulis negat nasci Thura præter Arabiam, nullis, ac ne Arabiæ quidem universæ. Thuris arborem ab omnibus Arabibus non videri scribit idem Plinius: ac M.M.M. [Amatus legit C.C.C.] non amplius esse familiarum quæ ius per successiones id sibi vendicent: quæ etiam ob id Sacre vocentur: nullo præterea sceminarum, funerumve congressu possunt cum incidant eas arbores aut metant: ac ita religione merces augeri. Eilæque tandem qui promiscuum iis populis ius in sylvis esse existiment: alios verò qui per vices annorum dividi.

Tradidit Dioscorides (testis est Marth.) præter

Arabicum inveniri & *Indicum*, id tamen flavescere, quod indicat Thus & in aliis regionibus nasci præter illud, quod ex Arabia devehitur. Quod cum Theoph. & Plinius satis competum haberent, quamvis prius scripsissent, Thus præter Arabiam nullis gigni: dixere tamen postea, quod ex reliis acceperant, id etiam nasci in quibusdam insulis: quod etiam bene annotat Hermolaus concludi posse ex Ovidio in Fastis dicente:

Thura nec Euphrates, nec miserat India Cossam.

Ex Garcia quoque per universam Indiam Thus non nasci certissimum est: cum quicquid Thuris hic constituitur, & hinc in Lusitaniam invehitur, ex Arabia deferatur. Non possum ergo non mirari, inquit ipse, à quo Dioscorides (quem tamen & Avicenna sequutus est) Thus in India nasci acceperit. De Arabibus minus mirum, qui nigricantem colorem, quo Thus Indicum præditum esse vult Dioscorides, Indum plerumque vocant, ut ex Myrobalano nigro, quem Indum appellant, patet. Thus solum provenit apud Arabes. Scribunt tamen Hispani in novo Orbe etiam Thus inveniri, sed penes eos sit fides, ego certo de eo nihil pronunciare possum. Nunc Thus, vel Amati auctoritate, ex regione Syr apud Indos cognominata ad nos portatur.

Sed relictis disceptationibus, ad vires nos accingamus. Potest itaque, prout Diosc. in presenti loco testatur, calefacere, adstringere, ea quæ pupillis tenebras obducunt depurgare: cava vlcera replere, & ad cicatricem perducere, vulnera cruenta glutinare: omnem sanguinis eruptionem, & eam, quæ ex Cerebri membranis contingit, cohibere. Mitigat etiam vlcera maligna circa sedem, & reliquas partes, tritum cum lacte & lineamento exceptum: Verrucas formicarias & impetigines in principio tollit, cum aceto & pice illitum. Ambusta item & periones sanat, cum adipe porcino, aut asserino. Vlceris capitis manantia cum nitro affictum sanat: Et vnguium reducias cum melle: & aures contusas cum pice. Verum ad reliquos aurium dolores, cum vino dulci infunditur. Prodest etiam mammis à partu inflammatis, cum Cimolia & Rosaceo illitum. Vtiliter itidem ammiscetur medicamentis, quæ ad arteriam & vlcera præparantur. Et sanguinem spuentibus potum prodest. At si à sanis bibatur, insaniam inducit: Copiosius autem cum vino potum, etiam occidit. Vritur Thus in fictili puro positum, & lactensum à grumo de lucerna accenso, donec exuratur. Oportet autem post perfectam vitionem operculo integere, donec fuerit exinctum. Sic enim in cinerem non redigitur. Quidam æneum vas cavum in medio perforatum ollæ superponunt, ad fuliginem excipiendam. Alij in ollam crudam immisum, luto oblita ollam, in fornace vrit. Torretur etiam in fictili novo carbonibus ignitis, donec non amplius bullas edit, neque pinguedinem aut vaporem emitut. Facile autem frangitur, quod combustum non est.

Porro autem Cortex Thuris vim habet eandem, quam Thus, efficacior tamen est, & magis adstringit. Quare potius magis commodat sanguinem spuentibus, & fluidis affectionibus appositus. Facit etiam ad oculorum cicatrices, cavitatesque ac sordes. Torrefactus autem etiam ad scabras lippitudines facit. Manna tandem vim eandem habet, quam Thus, sed magis remissè: Fuligo autem mitigandi inflammationes oculorum, sistendi fluxiones, repurgandi vlcera, & explendi cava, cõpescendiq; carcinomata. Fuliginem porro

Thus non provenit in India auctore Garcia.

Thus cur Indicum dicitur? An in novo Orbe proveniat.

Vires & usus.

Vlcera.

Cerebri membrana.

Sedis vlceris.

Verruca.

Ambusta.

Periones.

Vlcera capitis.

Vnguium.

Aures.

Mamma.

Vascula.

Putum insaniam facit.

Lethalis.

Thus Græci modus.

Cortex Thuri.

Oculi.

Manna.

Fuligo.

Fuliginis præparatio.

no.

ita facito. Grumum Thuris singulatum forcipe comprehensum & de lucerna accensum, in novam fictilem cavam ollam imposito. Deinde zincum vas concavum in medio perforatum & probe exterius superposito, & juxta alteram ipsius partem, aut utrasque, lapillos quatuor digitorum altitudinis subicito, ut an vratur appareat, & ut locus sit semper alios grumos supponendi, prius quam prior penitus extingatur. Et hoc facito, donec satis multam fuliginem te collegisse putaveris. Assidue tamen spongia ex frigida aqua externas znei vasis partes detergeto. Ita enim omnis fuligo inhaerebit, si non nimio seruore vas ipsum incalefeat: alioqui ob levitatem delabens fuligo, Thuris cineri ammiscetur. Derasa itaque priore fuligine, idem quousque collibuerit facito. Sed & vsti Thuris cinerem seorsum colligito. Eodem modo paratur etiam fuligo ex Myrrha, & Resina, ac Styrae. Et ad eadem commodum sunt. Sed & ex reliquis lachrymis fuliginem similiter colligito.

Galenus per totam eius doctrinam, tanquam constringente medicamento in omnibus suis adstrictoribus medicamentis & compositionibus vitur, velut apparebit ex mox adducendis eius aliquot locis. De simplicibus lib. 7. sicut & lib. de oculis part. 5. cap. 5. dicit: Thus excafcit ordine secundo, desiccatur primo, habet quoque adstringens pusillum, sed minimum manifesta est adstrictio: Cortex eius evidenter adstringit: proinde sane strenue quoque desiccatur, aded, ut ex secundo sit ordine completo desiccantium. Est autem

crassiorum partium, quam ipsum Thus, & minime particeps acrimonie. Ob has ergo tum facultates, tum qualitates multus est eius usus apud Medicos in hamoptoicis, stomachicis, celiacis, ac dysentericis, non tantum iis, quae extrinsecus applicantur, ipsum admiscentes, sed & iis, quae intro in corpus sumuntur. Fuligo eius tum siccioris, tum calidioris est facultatis, quam ipsum Thus, aded ut ad tertium usque excessum perveniat. Habet verò etiam abstersorium quiddam. Itaque & eo nomine expurgare, & implere, quae in oculis consistunt, ulcera videtur, velut & quae ex Myrrha, & quae ex Styrae. Lib. autem 5. M. cap. 4. Est Manna medicamentum quod magis, quam Thus adstringat. Thus verò, quam Manna, magis emplasticum. Itaque magis tenax, ac (ut sic dicam) resinosis deligas Thus, oportet, cum magis emplasticum esse medicamentum studebis: id sane tum mollius est, tum albidius, tum quod mansum ritu Aloës & Mannae non comminuitur, sed partes suas sibi cohaerentes defendit, veluti Chia Mastiche. Idem lib. 3. M. cap. 3. Thus igitur ut ad humani corporis naturam, eiusmodi obtinet temperamentum, quod cum temperatis & mediis naturis consentit, humidiores autem paulò liberalius siccatur, sicuti rursum iis, quae ad summum sunt siccæ, paulò est humidius. Merito itaque Thus in quibusdam tum ulceribus, tum natutis, pus quidem movet, carnem non producit: in quibusdam etiam carnem producit. Itaque si observaveris, rationi respondere eventa deprehendes. In humidioris namque natura carnem producere potest, in siccioris non potest. Præterea in modicè humidis ulceribus, carnem efficere potest: in iis, quae præhumida sunt, non potest. Lib. quoque 13. M. cap. 5. Post excisam cutem, medicamento, quod Graeci Mannam vocant, affectam partem implebimus. Est autem ea purgamentum Thuris, levi adstrictione prædita, atque hoc nomine etiam Thure ipso ad nonnulla

utilior. Thus enim puris tantum movendi facultatem obtinet, utpote nullam adstringendi vim habens. Magisque id facit, quod pinguius ex eo est, & magis albicans: sicut etiam, quod flavum ex eo magis est, validius siccatur. Mannæ verò etiam corticis Thuris paululum est admixtum: unde scilicet, adstringendi vim habet. Ipse verò cortex Thuris, tum adstringit, tum siccatur insigniter. Itaque etiam ad moderatiores sanguinis perfusiones eo vitur solo, sicuti etiam ad valentiores solo vsto, sed tunc & cribrato, & in molliissimum pulverem redacto. Lib. 5. de comp. med. sec. loc. cap. 1. Thus concoquit & pus movet, si tanquam ad probe temperatam naturam respicimus, &c. Ipsi autem Galeno author fuit, magnus ille & admirandus Hipp. lib. 2. de fract. qui vtebatur Manna Thuris ad fracturam & contusionem narium, quæ de re hæc Galenus. Ad id quod inde etiam tenax esse hoc subactum farinæ velle Hippocratem, manifestum est: quod si huiusmodi non sit, Mannam ipsi, aut gummi misceri iubet. Manna autem Thuris succensio ac pollen nuncupatur, quæ si non assuerit, Thus ipsum, quod pinguius sit sumptum terere ad hunc usum poteris. Ego porro cum neque Thus, neque Gummi suppetere, liquidam resinam, quæ forte aderat, adhibui. Sed si hæc quoque desit, melle utendum est. Satius tamen est, si Mannam, aut Gummi imponamus: quippe cum mel, & resina quodammodo calefaciant, id quod inter initia inutile est.

Ceterum quod Diosc. dicit, facile frangi Thus, quod combustum non est, de eo dictum accipit. Corn. quod & vti & torteri dixit Dioscorides. Torrefactum itaque Thus, quod combustum non est, facile frangitur. Est enim inter boni Thuris notas, ut fragile sit, & non velut Mastiche remittat, dum molitur: aut ut Plin. ait, ne dentem recipiat potius, quam in micæ frangatur. Porro quod Diosc. dicit, non accipiendum est seminarum fluxionibus solum, subactum sive appositum commodare, sed omnibus etiam fluidis affectionibus: quum Galenus etiam de celiacis & dysentericis id testetur. Intelligenda autem est vox *trahere* in voce *frangi*. Mannæ etiam non remissioris, quam ipsiusmet Thuri esse vim dicit Gal. contra Dioscor. Meth. lib. 13. sed aliquantò intentam magis, maxime in adstringendo, ob corticis Thuris ammixtionem. Et hoc ipsum idem Galen. 5. Meth. apertius declarat, ubi Mannam aliquando pro Thure se accepisse ait. Et mannæ magis adstringens medicamentum testatur, Thus autem maiorem meatus obducendi vim habere, quam Mannam.

Mathiolus qui & ipse ex professo de plantis scripsit, thure, cui admixtum sit acrum & Oleum Olivarum, cutem malam, scabiola & leprosam, si a balneo inungatur, puram & politam reddit. Cum vino dulci & calido in aures ulcerosas infuso, dolores tollit. Contra vomitiones verò recipit Thus, Mastichen & Aloën, singulorum partes æquales, conterit in pulverem, hocque albo ovi & rosarum aquæ mixtum, stomacho imponit. Thus cum lacte non sine utilitate, faciei a Sole combustæ inungit. Ad tenelium Thus solum, vel adhibita pice nigra in ignitos carbonem inicit, & fuliginem per postiora ascendere sinit. Contra lippitudinem certissimum experimentum, recipit Thus album, huiusque particulam cuspidi cultri imponit, & ad candelam inecndit: incensum aqua Rosacea duo-

Thuris cinis.

Temperamentum
Galenus.
Cortex.

Usus inter-
nus.

Fuligo.

Oculorum
Ulcer.

Manna.
Thus.

In quibus
producat
carnem, vel
pus.

Manna.

duorum cochlearium extinguit, extinctum iterum incendit, ac aqua Rosarum vicissim mergit, idque trigies iterat. Tum demum mixtum aquae Rosaceae & lactis mulieris unius cochlearis, oculis instillat: lenit non solum dolores: verum etiam fluxum & rubedinem tollit. Szpidus probatum est, inquit. Verum si necessitas exigit, prius venam tundit, & corpus purgat. Et quoniam Dioscorides dixerit, Thus in secunda valetudine haustum, insaniam facere, & largius cum vino sumptum interficere, hinc Avicennam erratim credit, qui & depravatis sensibus, & abolita memoriae Thus opem ferre tradiderit.

Avicenna
notat.

Confidimus.

Nos consulimus, ut nulli affectui interno prescribatur: nec etiam in suffumigiis, si vera scripsit Diosc. de eius natura, quicquid dicat inferius Apollo. Sunt nobis alia tutiora medicamenta, pro roboranda memoria, & adversus alios praevalentes affectus internos.

Pergit Matth. In Galeni loco citato non solum Gerardi Gaudani versio reprehendenda (quod tamen interpreti vitio minime dandum est) sed etiam in Graecis tum ipsius Galeni, tum Pauli codicibus communis lectio depravata videtur, quippe ubi in Thuris capite legitur apud Galenum, *ἡ θύρισ ἀπὸ τοῦ θυρίου*, & de puris *ἡ θύρις ἀπὸ τοῦ θυρίου*, hoc est, ut vertit Gerardus, Ramus eius tum siccioris, tum calidioris est facultatis, quam ipsum Thus, rectius legendum putavimus: *ἡ θύρις ἀπὸ τοῦ θυρίου*, hoc est, Fuligo eius. Quae quidem lectio, primo Dioscoridis testimonio comprobatur: qui praeterquam quod ramorum non meminit, ipsi Thuris fulgini, non ramis, tum expurgandi, tum implendi, quae in oculis consistunt ulcera, facultatem inesse testatur. Deinde Galeni ipsius lib. 7. de fulig. scribentis, Thuris fuligine utuntur, in ocularias medicinas mista. Ac etiam Serapionis: qui cum hunc Galeni locum suo tempore legitimum, & incorruptum haberet, quae hoc Galeni loco nostra aetate de Thuris ramo leguntur, ea ipse Galeno accepta referens, de Thuris fumo seu fuligine legit. Nec non ipsius Aetij rametis Paulus, vel sua vel Librariorum culpa hic menda non vacet.

Galenus
Pauli lectio
depravata.
Fuligo.

Locum Galeni
restituimus.

De hoc vero & Amatus vir non mediocriter doctus, inter recentiores connumerandus, ita loquitur: Thuris maximus est usus in lustrandis mortuorum cadaveribus, & mirum dictum, ut hic mos per omnes aetates inter omnes fere gentes & religiones inoleverit.

Vnde sic Stat. 1. Theb.

Coniungat ara cumale cur Thuris Eoi
Leta calet.

Et Ovid.

Aspicit ara proceres, vestivaque Thura piorum.

Non deest, inquit Apollo, nigrum Thus omnium ignavissimum, quo tamen in ceratis, aliisque extra admoventis, ne dicam uti, sed abuti conuevere, ac si topica humanae vitae emolumento futura negentur, quum tamen ex detractione hoc compositis, vulnera non coalescant, non cicatricem ducant, & putredini obnoxia reddantur. Quidam etiam rubrum Thus, in Indaganti memoriae prodidere. Ceterum in Latino volumine Matthiolus, Avicennam errasse sibi persuasit; quod depravatis sensibus, & abolita memoriae Thus opem prestare tradidit, quum ex Dioscoride in secunda valetudine haustum, insaniam faciat, & largius cum vino sumptum interficiat.

Garcias autem de Thoris usu haec scribit. Mulrus est Thuris usus apud Medicos Indicos in un-

guentis & suffimentis. Nonnunquam & in corpus assumitur ad varios capitis affectus, & alvi profluvia. Sed maxima Thuris pars hinc in Olivarum regionem exportatur (quoniam isthic plurimum eo utuntur) & in regiones Malacae vicinas.

Alvi profluvia
Sunt

Potius ad memoriam hic revocandum est, quod praeter Dioscoridem, Thus in secunda valetudine haustum insaniam inovere, nullus alius Graecorum scriptorum, quod Hist. Lugd. sciat, prodiderit. Contra vero Avicenna notat, Thus conferre rationi, ipsamque corroborare, & esse quosdam, quibus praecipitur, ut eius infusum bibere assuescant ieiuni, sed eius usum plurimum dolorem capitis excitare. Nec Dioscoridi omni ex parte contrarius Avicenna: Si enim ille dixit, Thus largius cum vino potum, interficere. Avicenna etiam usum eius plurimum cum vino interficere pronuntiavit ac similiter cum aceto. Vnde etiam Serapio locum Dioscoridis sic convertit: Et quando bibunt de eo sani, parum meliorat eos, sed si nimis cum vino biberint, inducit insaniam, & amplius cum vino occidit.

Diosc. locum
suspectum.


Diosc. corruptum.

Pulvis ex Thure carnem gignit (inquit Clem. Clementin. lib. 1. de Med. mat. virt. & compos. cap. 7.) & cooperit ossa denudata, post digestionem & absterisionem saniei, & maxime valet in fracturacranij. R. thuris, Sarcocollae, Ireos, sanguinis Draconis, Myrrhae, Aristolochiae longae ana drach. sem. fiat pulvis. Electuarius vero (teste eodem cap. 5.) Thurinum constringit vomitum & fluxum, calefacit & confortat omnia membra, & virtutes naturales, reducit gustum, & resolvit ventositatem. R. Granor. Myrti unc. ii. Fl. Roris marini. drach. j. Myrobal. Indor. Embl. Bellyne. adustor. ana. drach. j. & sem. thuris, Rosar. Costi, Spicae, Nucis Mosch. Calami. arom. Garryophylli. Macis, Cardamomi. Nasturtij. Balauft. Cort. Citri, Fol. tamarisc. ana. drach. j. Zingib. drach. sem. Bull. parum in opum. vino, & exsiccentur & postea bulliant cum succo Citoniorum in olla vitreata & exsiccentur & subtilissime terantur & conficiantur cum miva Citoniorum, vel Sapa, & dentur drach. ii. cum aq. chalybeata.

Pulvis ex
Thure.

Electuarius.

THURIS LIMPIDI FOLIA



R Arum est folium, & quod spectatorem in sui admirationem rapiat, & Floridâ sine nomine delatâ, glabrâ, pediculo fibroso, & fungoso, & quâ parte à matre avulsus fuit, canulato, quatuor fere unciam, à quo ad extremum porrigitur dodranteale folium, latitudinis circiter vncialis, venulis retis striatum, ex fusco rubescens

Descriptio
folii.

Locus:

nonnihil, ex geminis commissum membranis

Ad lustrandum
mortuorum
cadaverum.

Thus nigrum.

Contra
asthma
tum pro
Avicenna.

HISTORIAE PLANTARVM.

continuis, infundibulum (cuius apex ad pediculum) faciens, atque ita gemina illa tunica à cucullato vertice tantam efficiunt cavitatem, quantum ipsarum est latitudo: paulatim verò descendendo minorem relinquunt, sic ut pediculum versus cavitatis ultra medium non protendatur, coeuntibus in reliquo medio tunicis. Pars folij suprema in latere scissa, situm histionis deformem ostentat, supra quem quod superest foli cucullum imitatur. Interior infundibuli facies rufa est, & hirsuta.

Descript.
Lobel.
Thurn.

Conuenit autem hoc folium, cum eo, quod Lobel. & Penà in Adv. pingunt & describunt in hunc modum. Thuris limpidi, pellucidi & resinæ Cedrix æmuli, nitorem puritatemque Succini affecti, nobis & visendi & habendi fuit copia multis in locis, quod non perperam Dioscoridis notis quadrat, si notas, usumque perpendas: nam & dum adoletur suavissimum habet odorem, & vulneribus, tumoribusque, discutiendi vi, nonnulla relictà adstrictione, ad robur partis, opem certam fert. Rupellæ occidui maris quadriennium ferme est, cum doctus Medicus Launatus nos gummi istius glebis, arboris fructu & folio donavit: assererat nihil tamen, sed sibi relatum à nautis utrumque, trunci Pino similis lobolem esse: at folium, quia valde quàm rarum, neque dum ab ullo depictum, hic dedimus, magis scissitatur, siue resiniferæ plantæ, quàm asserunt. Est namque, quod rarè contingit aliis, ab imo pediculo ad summum usque cuculli verticem duplicatum, quasi ex glumis conflatum tenuibus tunicis, vagina scilicet palmum longa, instar infundibuli, hiantis histionis speciem præ se ferentis, supernè v. galeata videtur, quod de floribus Napelli & Lorichitide, non de foliis vllis, memorant auctores. Hæc Adversaria, ex quibus petita figuram, cum nostra coniunctam, damus.

Thurn.

Descript.
folij.

Thurn.

SARCOCOLLA OFFICINARVM.

CAP. XXXI.

Descript.

Sarcocollæ grumi, albicantes, aut ex albo rufi sunt, spongiosi, micis lucentibus subinde mistis: globosarum lachrymarum fragmina Pisi, aut paræ Avellanæ magnitudine, tantà est enim fragilitas, ut in pulverem crassiusculum, vel concussu leui frictur. Saporis amari cum quadam ingrata dulcedine obscura: Sub dente lentescit, & candellæ admota primùm bullat, postmodum in claram flammam exardet: admista reperiuntur aliquando folia ex candido flavescentia, Tithymali Mirsinitis folia sicca egregiè reserentia.

Sapor.

Descript.
Casalp.

Hanc Casalp. sic describit: Sarcocolla inter lachrymas affertur minutissimis guttis constans, veluti sudore concreto, friabilis, subcandida, aut subrufa: sapore subamaro ac medicamentofo; in igne difficile ardet: attollitur in spumam, odore ingrato: de ea Diosc. Plin. & Mes.

Thuri simili
in Diosc.
Vires.
Adulterium.
Descript.
Plinio.

Dioscoridi lachryma est arboris in Perside nascentis, similis Thuri tenui, subfulva [ad ruborem inclinans] in gustu amara. Vm habet glutinandi vulnera, & cohibendi fluxiones. Miscetur & Emplastis: adulteratur gummi ammixto. Verùm Plinio ea potius alba laudatur. Scribit enim esse qui & Sarcocollam spinæ lachrymam putent, polini Thuri similem, cum quadam acrimonia dulcem [in hoc à Dioscoridis & Gæleni placitis maxime abscedit Plinius.] Cum vino tusam listere

Vires.

fluxiones; illini infantibus: vetustate & hanc maxime nigrescere: meliorem verò quò candidorem. Lachrymam hanc, inquit Matthiolas, Sarcocollam dixere Græci: quoniam sicut glutinum lignum, ita hæc sauciata exulteratamve corporis carnem agglutinet. Quæ autem ad nos advehitur, non omnis legitima est: quippe quòd ea plerumque (ut de aliis quoque pluribus lachrymis, resinis, & liquoribus fieri superius diximus) gummi, & alterius generis lachrymis adulterata deferatur, & talis in officinis inueniatur. Verùm fraus gustu facile deprehenditur: quandoquidem, quæ amara non est adulterium lenit.

Plinio ad stipulam videtur Mesue dicens: Sarcocolla, est arboris fruticosæ, spinosæ, ramis nodosis arbori impressis, gummi album, Thuris modo, vel pallidum, idque amarum, & ob id valentius. Calfacit ordine secundo, siccatur minùs, coquit, terget, aperit, digerit, vulnera etiam vetera, putrida terget, carne implet, glutinat [unde illi nomen.] Purgat pituitam crudam, & humores alios crassos, præcipuè à cerebro nervis, iunctis, ut ischio, & pulmonibus. Oh id lenibus, pituitosis, asthmaticis, cussientibus prodest, sed calvitium accersit, corpus impinguat, & sperma auget. Diosc. Ophthalmiam & lippitudinem, & alios oculorum morbos, mirè iuvat nutrita in vase vitreo dies quinque in lacte asinæ, novo quotidie assuta. Aurium ulceri putrido, & sanioso utiliter imponitur, linamentum multa mersum, & pulvere huius inspersum. Datur cum Zingibere & Cardamomo, ut citius & valentius agat, vel his Catapotis Haly senis. Sarcocollæ ʒij. Turbith. ʒiij. Medullæ Colocynthidis Zingiberis an. drach. j. ʒ. Salis gestivæ drach. j. Sarcocollæ in aqua Rosarum solutâ, fiant pilulæ in dicta opera efficacissimæ. Ventrículo calido & bilioso est nocentissima Sarcocolla: ob id vitanda picrocholis est: aliis datur à drach. j. ad ij.

Sed notas has habet in hunc textum Sylvius. Quòd carnem glutinet Græcis dicta, tanquam sit carnis colla, nam vulnera glutinat, & sine morfu siccatur Gal. Albam rufæ præfert Plin. & annis nigrescere scribit. Aliis primo aut citius calida videtur, nam Dioscoridi subamara, Plinio cum quadam acrimonia dulcis, Galeno emplastica, & parum amara dicitur, siccans sine morfu. Sperma verò augere, non legit in Diosc. Ophthalmias discutere expertus est Manardus, ubi hæc constitunt: initio enim cum vino fluxiones oculorum sistit Dioscoridi & Plinio. Inquit præterea, Sarcocollæ veteres tantum vti sunt foris, purgatricem autem vim non dederunt, quæ etiam hodie parum est cognita. Si purgat, & ventriculo calido est noxia, impinguare videtur tantum per accidens: vacuus scilicet excrementis, probam nutritionem impediens, id quod aliis purgantibus est commune: sed dum correctæ est lacte asinino, calida humida evadit, ac ob id semen augere & promovere potest. Hanc dies quinque asinino lacte, in dies mutando, macerant: post aqua Rosarum dissolvunt, ut castigent. Huc usque Sylvius.

Sarcocolla
quæ opti-
ma est
Mesue.

Temperamentum.
Vires.
Humores
crassi.

Asthma.
Sperma.
Oculorum
morbi.

Aurium ul-
ceri.

Pilula de
Sarcocolla.

Nomen

Græcis
de dicuntur.
Anni
græ.

Emplasti-
ca.
Ophthal-
mia.

Purgandi
vires
vires
græ.

Corrigere.

MYRRHA IN GENERE.

CAP. XXXII.

TRIA aut saltem vno plura Myrrhæ genera etiam Veteribus fuisse cognita, Hippocratem de superstitione & natura mulebri latis continuis

Genera.

*Smyrna
prima.
Myrrha
Calenia.*

demonstrare ducimus, dicentem: *Smyrna* *Myrrha*, aut Myrrham Caloniam suffite convenire rosceto affuso ad vteri proidentiam.

*Arbor
rabra.*

Ceterum, ut quæ, & quot sint Myrrhæ genera clarius fiat, in genere nonnulla de his præmittere conveniet, initium petitis à Dioscoride. Est igitur linte Myrrha lachryma arboris, nascentis in Arabia, similis Spinæ Egyptiacæ. Quæ ubi inciditur, defluit lachryma in substatas tegetes, partim etiam circum truncum concrevit. Et quædam ex ipsa Pediasimos appellatur, pinguis, quæ duro exprimitur, lacte excipitur: quædam Gabyre a pinguis, in secundis ac pingtibus locis nascentis, quæ etiam multam stactem rennet. Præmas obtinet Troglodytica, à regione ipsam producente appellata, quæ subviridis

*Pediasimos
Stacte.*

Gabyria.

Troglodytica.

Alba, mollis.

[*Myrrha*], melius ut puto vestendum subalbidâ Cæsalp. pellucida & mordax est. Colligitur etiam quædam alba, quæ post Troglodyticam numeratur, mollis ut Bællium, gravi aliquantulum odore, in apricis locis proveniens. Quædam Caucaalis vocatur, exoleta [*Myrrha*] nigra, tosta [*Myrrha*]. Pessima verò inter omnes Ergasima appellatur, friabilis, non pinguis, acris, & asper, & viribus gummi referta. Sed Ammonea [*Myrrha*] vocatur reprobatur. Sed & expressiones ex ipsis sunt, à pinguis odorata & pingues: à siccis, neque pingues, neque odorata, sed inefficaces, eo quod oleum assumpserunt in efformando. Adulteratur gummi macerato in Myrrhæ cremore. Elige recentem, friabilem, levem, undequaque concolorem, & quæ infrangendo, albas, ad unguum speciem, leves strias intus habeat, & quæ in parvam glebam coacta est, amaram, odoratam, aciem. Quæ verò gravis est, & colore Piceæ [*Myrrha* vide sub proprio titulo] inutilis est. Hæc Diosc. qui Smyrnam semen dicit esse saporem Myrrhæ. Et: inventi stytiacis lachrymam gummi similem, pellucidam, Myrrham odore rescentem.

Caucaalis.

Ergasima.

Ammonea.

Adulteratur.

Delectus.

Amara.

Smyrna.

Smyrna.

Smyrna.

Smyrna.

Smyrna.

Smyrna.

Smyrna.

Smyrna.

Smyrna.

Smyrna.

Smyrna.

Smyrna.

Smyrna.

Smyrna.

Smyrna.

Smyrna.

Smyrna.

Smyrna.

Smyrna.

Smyrna.

Smyrna.

Smyrna.

Smyrna.

Smyrna.

Smyrna.

Smyrna.

Smyrna.

Smyrna.

remque: caudice duro, contortoque iuxta terram, crassioraque suri hominis. Corticem verò habere levem, similem *Myrrha*. Alios verò qui se vidisse affirmant, de magnitudine, fore non consentire, neutram earum arborum magnam referre, minorem verò Myrrham, & humiliorem. Folium habere thuris. Sed huius Laurinum & leve [*Myrrha*], Myrrhæ autem aculeatum & non leve: Folium etiam simile habere Vitis [*Myrrha*], Hermolaus & Ruellius suspicantur cum Plinio legendum *Myrrha* *Myrrha*, & spinis horridum, ut *Myrrha*. Esse autem & caudices & ramis incisos, sed alios veluti securi percussos videri: alios tenuiores, incisuras habere. Lachrymā verò alia decidere, aliam arbori inherere. Aliubi substatas tegetes ex palnis contextas alibi solum circum pavum purum esse.

*Caudex.
Cortex.*

*Folium
Thuris.*

*Locus:
Maxima
fidelitatis
exemplar.*

Saba.

*Arbor
similis
Terebinthi.
Thuris.
Ligna.*

Stacte.

*Myrrha
Galien.*

Delectus.

*Myrrha
Galien.*

*Myrrha
Galien.*

*Myrrha
Troglodytica.*

Tradit præterea idem Theophrastus montem universum Sabæis divisum. Hosque illic loci Dominos esse, iustitiaque mutua degerere, quamobrem nullum suis arbores custodire. Unde & thurs & Myrrham sese largè ad naves, cum solitudo [*Myrrha*] foret, deportasse. Eisdem quoque audivisse, Myrrham, thursque collectam, undique ad Solis delubrum convehere, quod Sabaorum sit sanctum non inter omnia regionis illius, ac cultus Arabes amatos habere, lingulisque suum thurs accervant, & Myrrham eodem modo relinquere, postea super acceptam tabulā, scriptam habente multitudinem mensuratum & pretij, quod pro singulis mensuris ponendum sit. Mercatores verò venientes illuc, tabellas advenire, eiusque quod placuerit, uniuscuique fuisse, pretium in eodem ponere loco, unde merces acceperint, sacerdotem deinde venire, partemque tertiam pretij Deo accepta, reliquam ibidem relinquere: idque servaturum Domnis, donec acceptum venerint. Item hanc arbores similem esse terebintho, alios etiam quosdam dicere: Alios verò opinari esse terebinthum. Dicere eos, qui ab Arabibus thurs advenire, attulisse se ligna huius arboris Antigono, quæ nihil differant à terebintho, sed hos quidem alteri ignorantia quoque longè quidem maiore laborare, quæ thurs & Myrrham ex eadem arbore nasci putant. Myrrham adhuc aliam quandam Bactriam, aliam scythiam, probantque meliorem gustu, & postea concolorem accipi. De thurs & Myrrha hæc se accepisse. Ac tandem testatur ex Hippocrate nasci lachrymam similem Myrrhæ, quam quidam binum Myrrham dicant.

Galeno (lib. de simpl. med. facult.) Myrrha lachryma est arboris eiusdem nominis, quæ maxime in Arabia invenitur, quæque aliquo loco incisa, hanc ipsam lachrymam emittit. Est ei optima Myrrha, quæ mundissima & tacta quidem aspera, & arida, & fragilis, & levis, & globulis pusillis, extrinsecus uno colore, intrinsecus deinde subnigra, & veluti venulas habens albicantes, odore suavi, gustu amara & excalescens. Hanc in montibus inveniri scribit. Colligi alteram etiam Myrrham in planis, quæ & ipsa sit melior & pingior, quamque expungere in liquorem soleant. Quod illius quasi mundissimum est, in vascula reponi, & Græcis Myrrham appellari. Verum, omnem esse stypticam, & acrem, & excalescentiam. Huius itaque effectus vehementer commovere posse. Hanc nequam cogniti difficilem hisce, qui prius viderint. Novisse tamen opus esse, Myrrham, quam vulgò Troglodyticam appellant, anidotis ido-

*Tempus
inveniri.*

Locus.

Cultura.

*Descriptio
Myrrha
arboris.*

Cornarius in notis in Diosc. asserit Abdo legimus pro amara, non solum hic, sed etiam multis in locis, apud alios Græcos Medicos. Vnde potest Galeno, Aetio, Paulo atque aliis. *Myrrha* autem loco, ubi nascitur, appellatur est Myrrha, velut Gal. lib. de antidotis testatur, eandem asserens esse Troglodyticam ac Minnezam. Unde magis mirum est. Inquit, Dioscoridei tradere Troglodyticam Myrrham primam tenere, Minnezam, Ammoneam illi dictam, verò reprobam esse: Cum etiam Plinius lib. cap. 16. Troglodyticam primam faciat, inter Myrrhæ genera, Erythream verò & Minnezam secundam, quibus generibus adhuc alia quatuor deinceps annunciat. Idem etiam Plinius [*Myrrha*] Thys Minnezam, à Minnezorum pago dictum tradit, eiusdem lib. cap. 14. ut etiam & Minnezam, & non Ammoneam Myrrham appellari, quum in iisdem conveniant locis, Thurs & Myrrha, eodem teste. Sed nobis mirum sanè videtur, quomodo fieri poterit, ut tot locis mendum sit.

Theophrastus Myrrham sub cane, ferventissimisque diebus incidi refert. Locum autem ubi gignatur Myrrha esse regionem Arabum mediam [*Myrrha*] circa Sabe & Adramytā, & Citibana, & Mamati. Nasci quidem Myrrhæ arbores quoque alias super montem, alias in radice montis, locis in eam rem exculcis. Quamobrem alias coli, alias non. Montem autem præaltum esse & arboribus densum [*Myrrha*] & nive tegi solitum. Amnes quoque de eo in plana fluere. Myrrham minorem altitudine [*Thuris* scilicet] fruticosa-

<i>Mimna</i>	mena esse. Hanc quidem <i>myrra</i> vocant, à loco, in quo optima nasci feratur. Maxime vero hanc bene olere, nec <i>Opocalpasum</i> quicquam adinsum habere.	aromatum praestantissimum, myrrhae ingenuae Sielos sacros quingentos & Cinamomi odorati dimidium eius, id est, ducentos & quinquaginta: & calami odorati ducentos & quinquaginta, & Cassiae quingentos, prout est pondus sacrum: Et olei olivae Hinem. Et parabis ex illo Oleum vinctonis sacrae, vnguentum vnguentariae opere vnguentariae: Oleum vinctonis sacrae esto: Eoque vnguentorum conventus, & arcam testimonij. Et paulo post. Edixit Iehova Moysi: Accipe tibi aromata Saccen & Onychen & Galbanum, Nardi folium cum Spicis, & Thus purum: vnu quodvis solum cum altero solo esto: Et parabis ex eo suffitum, &c. <i>Rescripta sacra sunt vobis. Et Euan-gelij secundum Iohannem cap. 19.</i> Venit autem Nicodemus, qui venerat ad Iesum nocte prima, ferens nistrum Myrrhae & aloes libras quasi centum. Meminit huius ad extremum D. Hieron ad principium expl. Pl. 44. Myrrha & gnetta, & cassia à vestimentis tuis. Quotidie Christo offert Myrrham, Christi bonus odor es & propterea Saccen, id est, Stellam, vel Guttam exhibes Domino. Narrant & ij, qui aromatum novae virtutes, Saccen sorem esse Myrrhae. At ubi in nostris Codicibus Scriptum est Gutta vel Saccen, in Hebraeo Ahaloth legitur.
<i>Opocalpasum</i>		
<i>Myrrha Plinio</i>	Nunc historiam arboris Myrrham ferentis quam haecenus recitati diminutam dereliquerunt, Plin. cap. 13. lib. 2. complet, dicens: Myrrham in insulae silvis [cum thure] permixta arbore nasci tradidere aliqui, plures separatim. Quippe multis in locis Arabiae gignitur, ut apparebit in generibus. Convehitur & ex insulis laudata, petuntque eam etiam ad Troglodytici Sabaei transitu maris. Satura quoque provenit, multum sylvestri praelata. Gaudet raris atque ablaqueationibus, melior radice refrigerata. Arbori altitudo ad quinque cubita, nec sine spina, caudice duro & intorto, crassiore, quam thuris, & ab radice etiam, quam reliqua sui parte, corticem levem, similemque unedoni [rhopi Adrachae] scabrum alij, spinosumque dixerunt. Foliis Olivae, verum crispis & aculeatis. Iuba Olusatris. Aliqui similem Juniperi, scabriorem tantum, spinisque horridam, folio rotundiore, sed sapore Juniperi. Nec non suere, qui & thuris arbore, utrumque nasci mentirentur. Acciduntur bis & ipsae, iisdemque temporibus, sed à radice usque ad ramos, qui valent. Sudat autem sponte priusquam incidatur, Saccen dicta, cui nulla praefertur. Ab hac sativa, & in sylvestri quoque melior sativa. Non dant ex Myrrha portiones Deo, quoniam & apud illos nascitur. Regi tamen Gebanitarum quartas partes eius pendunt. Ceterò passim à vulgo coemptam, in solles confarcunt, ipsique Vnguentarij degerunt, haud difficulter odoris atque pinguedinis argumentis.	Sed tempestivum, ut aquivocationes, adulterina & substituta adumbremus. Volunt itaque intelligi & Myrrham Saccen, & Succam, vel liquorem Myrrhae, de quo mox: Alij vero Myrrham Beroicam. Adhuc quidam Myrrhae genus censent, ut suo capite paulo post demonstrabitur. Sub suo titulo quoque de Myrrha venenata (<i>Opocalpasum</i> Galeno dicta, & quae cum Myrrha reperitur) tractabitur, quae & ipsa nonnunquam pro legitima Myrrha habetur. Praeterea Belzurnum quidam Myrrha Troglodyticam existimant, quae opinio displicet. Animi insuper Indicum, quidam Myrrham Mineam, sive Ammineam putant, ut Amatus, quibus non assentimur. Nunc & Myrrhae Saccen rex, inquit Syri. Syrax rubradicitur Arabum familiae. Adhuc dicit: Myrrha Saccen multo rarior ipsa Myrrha est, nam quae Syrax liquida vulgo dicitur, si vera esset, Myrrha fuerit Saccen: sed cum odore sit teperrimo, à Myrrha alienissima res est. Hae insuper (teste Diosc. & Plin.) adulteratur Gummi, ut ante demonstratum, quod nos saepius observavimus, ac vidimus ignaros pharmacopoeos, diligentes promeliori Myrrha: verum id facile distingui potest: gustatum liquidum amarum non est, vel patum vitum crepitat, nec liquefit, lucidius quoque quam Myrrha, quod aqua liquefit, ac viscidum redditur. Sed & ante ex Plinio ostendimus, adulterari lentis glebis, Cucumeris succo, & spuma argenti, ubi etiam traditur, quomodo adulterium deprehendi queat. Scribit & Theophrastus ex Hippocelino nasci lachrynam similem Myrrhae, quam alij omnino dicant Myrrham. Plura qui volent hae de re legat librum vmbelliferarum capite de Hippocelino.
<i>Locus</i>		
<i>Sacca</i>		
<i>Arbori descript.</i>		
<i>Folio Oleo aculeato. Olusatris. Juniperi.</i>		
<i>Adulteratio quorundam. Incipit.</i>		
<i>Sacca sua dai sponte</i>		
<i>Genera</i>	Genera vero complura Myrrhae. Troglodytica sylvestrium prima: sequens Minea, in qua & Aramitica est & Ansantis Gebanitarum regno. tertia Dianitis. Quarta Collatitia. Quinta Sembracena, à civitate regni Sabaeorum mari proxima. Sexta, quam Dulatum [Dulyrin CH.] vocant. Est & candida uno tantum loco, quae in Messalum Oppidum confertur. Probatum troglodytica pinguedine, & quod aspectu aridior est, sordidaque ac barbara, sed acior ceteris. Sembracena praedicta caret vitiis, ante alias hilaris, sed viribus tenuis. In plenum autem probatio est minutis glebis, nec rotundis, in concretu albicantis succi, & tabescentis: utque fracta candidos ungues habeat, gustu leviter amara. Secunda bonitas intus variis. Pessima intus nigra: peior si etiam foris. Praeterea occasione ementium varia. Adulteratur lentis glebis, & gummi. Item Cucumeris succo amaritudinis causa, sicut ponderis, spuma argenti. Reliqua vitia deprehenduntur sapore gummi dente lentiscentis. Fallacissime autem adulteratur Indica Myrrha, quae ibi de quadam spina colligitur. Hoc solum penus India affert facili distinctione. Requiescit hinc Plin.	Acquirocacio. Adulterium. Substitutum. Myrrhae Saccen. Myrrhae Beroica. Opocalpasum. Belzurnum. Animi. Syrax rubra. Syrax ligunda. Adulteratur Gummi. Lentis glebis. Cucumeris succo. Spuma argenti. Amygdala amara. Piper nigrum.
<i>Troglodytica</i>		
<i>Minea</i>		
<i>Dianitis</i>		
<i>Collatitia</i>		
<i>Sembracena</i>		
<i>Dulatum</i>		
<i>Candida</i>		
<i>Troglodytica</i>		
<i>Sembracena</i>		
<i>Delictus</i>		
<i>Vitae alibi</i>		
<i>Levis amara</i>		
<i>Pessima</i>		
<i>Adulteratio</i>		
<i>Detegenda</i>		
<i>Adulteratio</i>		
<i>Indica</i>		
<i>Myrrhae</i>	Nominata haec quoque Myrrha in sacris paginis: Vnde Ecclesiastici cap. 24. Tanquam Cinamomum & tanquam pila aromatica, & tanquam Myrrha electa emisti odorem bonum. Tanquam Galbanum, & Onyx, & Saccen, utque Thuris odor in tabernaculo. Exod. cap. 30. Tu autem accipe tibi	

Nomina Myrrha, graecis *quercu*. Arab. *Lar*, *Mar*, seu *Mur*,
ling. Myrrha laevis. Myrrhen germanis, & Myrrha cal-
 lis, India sola. *Mir*. Hispanis.

Epitheta. A Poësis cognominatur *arab*, *Achaia*, *Affrica*,
 regione *Orontea* & *Orontis* ab *Oronte*, *Cynthia*
 & *Cynarcha* patre cui concubuit, ac idem etiam
libidinosa, *incesta*, *scelerata*, *levis*, *maulosa*, & *la-*
chrymata: adhuc *pinguis*, *salva*, *olea*, *stilla*, *stil-*
lans & *decora*. Fabulantes autem Poëtae fuisse
Fabula. Myrrham hanc *Cynacem* Cypriorum regis filiam, qui
 patri suo concubuit: ex eoque coitu suscep-
 it Adonidem, qui postea cum patre facinus
 committeret, in plantam sui nominis Deorum
 commutatione commutata sit. De hoc incestu
 Ovid. lib. ii.

*Incipit obscuro genitor sua viscera lectis,
 Parvumque super uentem leuat, horum utrumque timentem.
 Plena patris uisceribus, excidit, & impia dicit
 Semina ferre uera, & semine quod eriminat.*
 De eadem Prop. lib. ii.

*Crimen & illa, sui patris facinus senecta,
 Arboris in frondes condita Myrrha nova.*

Vires & v- Myrrhae vires refert Dioscorides his verbis
lus. Vinum habet calefaciendi, soporem inducendi,
 glutinandi, licendi, adstringendi, molliet etiam
 uterum conclusum & apertum. Dicit item menses
 & fetus eeleriter cum Absinthio, aut Lupino-
rum cremore, aut Rince succo apposita. Sumitur
 etiam & pro cataplasmo magnitudine Fabae,

Thorax. tussim veterem, & græci cecivice spirationem, &
Incessana. lateris ac thoracis dolorem, salique solutionem,
Febres. & dysenterias. Solut quoque rigores, duabus
 horis ante accessionem cum Pipere & aqua ma-
 gnitudine Fabae pota. Arteriae etiam asperitatem,
 & vocis rauitatem contrigit, linguae supposita, &
 succo inde deglutito. Necat & lumbricos, & ad
 hunc grauiorem manducant. Ad alarum do-
 lores [?] illinitur cum alumine liquido. Si ve-
 fo cum vino & oleo colluatur, dentes & gingi-
 vas corroborat. Inspecta quoque, vulnera in ca-
 pite glutinat. Et contusas aures, & denudata os-
 sa, cum cochleari carne inposita sanat. Et pure
 fluentes ac inflammatae aures, cum Papaveris
 succo, Castoreo ac Glaucio illita. Ad varos au-
 tem cum Cassia & melle illinitur, & impetigines
 detritæ cum aceto. Destinos item capillos cum
 Ladano & vino, & Myrteo oleo illita corrobo-
 rat. Ad hanc quoque duras desultationes, nap-
 hris cum penna illis. Replet ulcera in oculis, &
 albugines, ac ea, quæ pupillæ tenebras obun-
 dunt, seaspentatos detrit. Fit & uligo & Myr-
 tha similiter, ut ex Thure, velut innox ostende-
 mus, ad eadem quoque commodans. Ac verò
 Beotica Myrrha, &c. vide postea.

Arteria. Galenus cilium de Myrrha scripsit, hoc de eius
 facultate & usu litens mandavit: Myrrha secun-
 di ordinis est, tum excalefacientium, tum desic-
 cantium. Itaque capitum vulneribus illita gluti-
 nare ea potest. Inest & amaritas non pauca, per
 quam fixum & lumbricos, tum enecat, tum e-
 icit. Adest hinc ei & abstergerendi potentia. Sic i-
 gittur ocularibus miscetur facultatibus, utique
 quæ ad ulcera & crassas cicatrices præparantur.
 Eadem de causa inditur & medicamentis, quæ ad
 tussim veterem & asthma, siue anhelationem ex-
 hibentur, non tamen arteriam exasperat, ut
 sunt abstergentium nonnulla. Verum adeo mo-
 deratam obtinet absterlionem, ut nonnulli eam
 arteriatis, quam vocant, medicamentis, commi-
 sceant, tanquam insufficientes excalefaciens, & de-
 siccat medicamentum.

Lumbrici. Alii Myrrha non ex omni parte beata. Scimus

Dentes. Myrrhae vires refert Dioscorides his verbis
Vulnera. Vinum habet calefaciendi, soporem inducendi,
Aures. glutinandi, licendi, adstringendi, molliet etiam
 uterum conclusum & apertum. Dicit item menses
 & fetus eeleriter cum Absinthio, aut Lupino-
 rum cremore, aut Rince succo apposita. Sumitur
 etiam & pro cataplasmo magnitudine Fabae,

Thorax. tussim veterem, & græci cecivice spirationem, &
Incessana. lateris ac thoracis dolorem, salique solutionem,
Febres. & dysenterias. Solut quoque rigores, duabus
 horis ante accessionem cum Pipere & aqua ma-
 gnitudine Fabae pota. Arteriae etiam asperitatem,
 & vocis rauitatem contrigit, linguae supposita, &
 succo inde deglutito. Necat & lumbricos, & ad
 hunc grauiorem manducant. Ad alarum do-
 lores [?] illinitur cum alumine liquido. Si ve-
 fo cum vino & oleo colluatur, dentes & gingi-
 vas corroborat. Inspecta quoque, vulnera in ca-
 pite glutinat. Et contusas aures, & denudata os-
 sa, cum cochleari carne inposita sanat. Et pure
 fluentes ac inflammatae aures, cum Papaveris
 succo, Castoreo ac Glaucio illita. Ad varos au-
 tem cum Cassia & melle illinitur, & impetigines
 detritæ cum aceto. Destinos item capillos cum
 Ladano & vino, & Myrteo oleo illita corrobo-
 rat. Ad hanc quoque duras desultationes, nap-
 hris cum penna illis. Replet ulcera in oculis, &
 albugines, ac ea, quæ pupillæ tenebras obun-
 dunt, seaspentatos detrit. Fit & uligo & Myr-
 tha similiter, ut ex Thure, velut innox ostende-
 mus, ad eadem quoque commodans. Ac verò
 Beotica Myrrha, &c. vide postea.

Arteria. Galenus cilium de Myrrha scripsit, hoc de eius
 facultate & usu litens mandavit: Myrrha secun-
 di ordinis est, tum excalefacientium, tum desic-
 cantium. Itaque capitum vulneribus illita gluti-
 nare ea potest. Inest & amaritas non pauca, per
 quam fixum & lumbricos, tum enecat, tum e-
 icit. Adest hinc ei & abstergerendi potentia. Sic i-
 gittur ocularibus miscetur facultatibus, utique
 quæ ad ulcera & crassas cicatrices præparantur.
 Eadem de causa inditur & medicamentis, quæ ad
 tussim veterem & asthma, siue anhelationem ex-
 hibentur, non tamen arteriam exasperat, ut
 sunt abstergentium nonnulla. Verum adeo mo-
 deratam obtinet absterlionem, ut nonnulli eam
 arteriatis, quam vocant, medicamentis, commi-
 sceant, tanquam insufficientes excalefaciens, & de-
 siccat medicamentum.

Lumbrici. Alii Myrrha non ex omni parte beata. Scimus

Dentes. Myrrhae vires refert Dioscorides his verbis
Vulnera. Vinum habet calefaciendi, soporem inducendi,
Aures. glutinandi, licendi, adstringendi, molliet etiam
 uterum conclusum & apertum. Dicit item menses
 & fetus eeleriter cum Absinthio, aut Lupino-
 rum cremore, aut Rince succo apposita. Sumitur
 etiam & pro cataplasmo magnitudine Fabae,

Thorax. tussim veterem, & græci cecivice spirationem, &
Incessana. lateris ac thoracis dolorem, salique solutionem,
Febres. & dysenterias. Solut quoque rigores, duabus
 horis ante accessionem cum Pipere & aqua ma-
 gnitudine Fabae pota. Arteriae etiam asperitatem,
 & vocis rauitatem contrigit, linguae supposita, &
 succo inde deglutito. Necat & lumbricos, & ad
 hunc grauiorem manducant. Ad alarum do-
 lores [?] illinitur cum alumine liquido. Si ve-
 fo cum vino & oleo colluatur, dentes & gingi-
 vas corroborat. Inspecta quoque, vulnera in ca-
 pite glutinat. Et contusas aures, & denudata os-
 sa, cum cochleari carne inposita sanat. Et pure
 fluentes ac inflammatae aures, cum Papaveris
 succo, Castoreo ac Glaucio illita. Ad varos au-
 tem cum Cassia & melle illinitur, & impetigines
 detritæ cum aceto. Destinos item capillos cum
 Ladano & vino, & Myrteo oleo illita corrobo-
 rat. Ad hanc quoque duras desultationes, nap-
 hris cum penna illis. Replet ulcera in oculis, &
 albugines, ac ea, quæ pupillæ tenebras obun-
 dunt, seaspentatos detrit. Fit & uligo & Myr-
 tha similiter, ut ex Thure, velut innox ostende-
 mus, ad eadem quoque commodans. Ac verò
 Beotica Myrrha, &c. vide postea.

Arteria. Galenus cilium de Myrrha scripsit, hoc de eius
 facultate & usu litens mandavit: Myrrha secun-
 di ordinis est, tum excalefacientium, tum desic-
 cantium. Itaque capitum vulneribus illita gluti-
 nare ea potest. Inest & amaritas non pauca, per
 quam fixum & lumbricos, tum enecat, tum e-
 icit. Adest hinc ei & abstergerendi potentia. Sic i-
 gittur ocularibus miscetur facultatibus, utique
 quæ ad ulcera & crassas cicatrices præparantur.
 Eadem de causa inditur & medicamentis, quæ ad
 tussim veterem & asthma, siue anhelationem ex-
 hibentur, non tamen arteriam exasperat, ut
 sunt abstergentium nonnulla. Verum adeo mo-
 deratam obtinet absterlionem, ut nonnulli eam
 arteriatis, quam vocant, medicamentis, commi-
 sceant, tanquam insufficientes excalefaciens, & de-
 siccat medicamentum.

Lumbrici. Alii Myrrha non ex omni parte beata. Scimus

Dentes. Myrrhae vires refert Dioscorides his verbis
Vulnera. Vinum habet calefaciendi, soporem inducendi,
Aures. glutinandi, licendi, adstringendi, molliet etiam
 uterum conclusum & apertum. Dicit item menses
 & fetus eeleriter cum Absinthio, aut Lupino-
 rum cremore, aut Rince succo apposita. Sumitur
 etiam & pro cataplasmo magnitudine Fabae,

Thorax. tussim veterem, & græci cecivice spirationem, &
Incessana. lateris ac thoracis dolorem, salique solutionem,
Febres. & dysenterias. Solut quoque rigores, duabus
 horis ante accessionem cum Pipere & aqua ma-
 gnitudine Fabae pota. Arteriae etiam asperitatem,
 & vocis rauitatem contrigit, linguae supposita, &
 succo inde deglutito. Necat & lumbricos, & ad
 hunc grauiorem manducant. Ad alarum do-
 lores [?] illinitur cum alumine liquido. Si ve-
 fo cum vino & oleo colluatur, dentes & gingi-
 vas corroborat. Inspecta quoque, vulnera in ca-
 pite glutinat. Et contusas aures, & denudata os-
 sa, cum cochleari carne inposita sanat. Et pure
 fluentes ac inflammatae aures, cum Papaveris
 succo, Castoreo ac Glaucio illita. Ad varos au-
 tem cum Cassia & melle illinitur, & impetigines
 detritæ cum aceto. Destinos item capillos cum
 Ladano & vino, & Myrteo oleo illita corrobo-
 rat. Ad hanc quoque duras desultationes, nap-
 hris cum penna illis. Replet ulcera in oculis, &
 albugines, ac ea, quæ pupillæ tenebras obun-
 dunt, seaspentatos detrit. Fit & uligo & Myr-
 tha similiter, ut ex Thure, velut innox ostende-
 mus, ad eadem quoque commodans. Ac verò
 Beotica Myrrha, &c. vide postea.

Arteria. Galenus cilium de Myrrha scripsit, hoc de eius
 facultate & usu litens mandavit: Myrrha secun-
 di ordinis est, tum excalefacientium, tum desic-
 cantium. Itaque capitum vulneribus illita gluti-
 nare ea potest. Inest & amaritas non pauca, per
 quam fixum & lumbricos, tum enecat, tum e-
 icit. Adest hinc ei & abstergerendi potentia. Sic i-
 gittur ocularibus miscetur facultatibus, utique
 quæ ad ulcera & crassas cicatrices præparantur.
 Eadem de causa inditur & medicamentis, quæ ad
 tussim veterem & asthma, siue anhelationem ex-
 hibentur, non tamen arteriam exasperat, ut
 sunt abstergentium nonnulla. Verum adeo mo-
 deratam obtinet absterlionem, ut nonnulli eam
 arteriatis, quam vocant, medicamentis, commi-
 sceant, tanquam insufficientes excalefaciens, & de-
 siccat medicamentum.

Lumbrici. Alii Myrrha non ex omni parte beata. Scimus

Dentes. Myrrhae vires refert Dioscorides his verbis
Vulnera. Vinum habet calefaciendi, soporem inducendi,
Aures. glutinandi, licendi, adstringendi, molliet etiam
 uterum conclusum & apertum. Dicit item menses
 & fetus eeleriter cum Absinthio, aut Lupino-
 rum cremore, aut Rince succo apposita. Sumitur
 etiam & pro cataplasmo magnitudine Fabae,

Thorax. tussim veterem, & græci cecivice spirationem, &
Incessana. lateris ac thoracis dolorem, salique solutionem,
Febres. & dysenterias. Solut quoque rigores, duabus
 horis ante accessionem cum Pipere & aqua ma-
 gnitudine Fabae pota. Arteriae etiam asperitatem,
 & vocis rauitatem contrigit, linguae supposita, &
 succo inde deglutito. Necat & lumbricos, & ad
 hunc grauiorem manducant. Ad alarum do-
 lores [?] illinitur cum alumine liquido. Si ve-
 fo cum vino & oleo colluatur, dentes & gingi-
 vas corroborat. Inspecta quoque, vulnera in ca-
 pite glutinat. Et contusas aures, & denudata os-
 sa, cum cochleari carne inposita sanat. Et pure
 fluentes ac inflammatae aures, cum Papaveris
 succo, Castoreo ac Glaucio illita. Ad varos au-
 tem cum Cassia & melle illinitur, & impetigines
 detritæ cum aceto. Destinos item capillos cum
 Ladano & vino, & Myrteo oleo illita corrobo-
 rat. Ad hanc quoque duras desultationes, nap-
 hris cum penna illis. Replet ulcera in oculis, &
 albugines, ac ea, quæ pupillæ tenebras obun-
 dunt, seaspentatos detrit. Fit & uligo & Myr-
 tha similiter, ut ex Thure, velut innox ostende-
 mus, ad eadem quoque commodans. Ac verò
 Beotica Myrrha, &c. vide postea.

enim cum Galeno Myrrha odorem plurimis co-
 tam fanis dolorem capitis inducere, quare san-
 eos ipsos, qui iam caput dolent, non parum of-
 fendet. Pusulas oculorum mundificat, ut idem

Galenus testatur, qui iubet ad podagram acci-
 pere Myrrham *Mar* vocatam, herbamque Polica-
 tem, aut pyracæum mystri mensura ex aceto, &
 pedes illinere. Dat præterea consilium, ut ad

temporum actotius capitis dolorem citra mani-
 festas causas obortum, Myrrham vino quam o-
 primo intam, & ad succi prisanæ crassitudinem
 redactam illinas. Myrrham ungento preciosissi-
 mo intam similiter adhibeas. In pueris autem,

incipit dolentibus, Myrrha cum oleo inta uti-
 ris. Admonet tandem opera præcium esse, scire,
 in quantum facultas ipsius sit concoctoria hu-
 morum præter naturam, & vitiosorum, in tam-
 tum quam convenienter, amulceri. In quan-
 tum autem medicamentaria sit, non convenien-
 ter. Verum paucitatem eius ad concoctiones

quippiam conferre, qualitatis autem peregrini-
 tatem non apparere, utpote victum ab odoratis.
 Se itaque hoc pharmacum etiam sine Myrrha
 præparare consueville, ad securitatem perducere
 semper tentantem usum omnium pharmaco-
 rum, præsertim ubi in acuta febri taliquid exhi-
 beretur. Laudatissima, Plinio teste, apud pri-
 scos vina erant Myrrha odore condita, ut appa-
 ret in Plauti fabula, quæ Persa inscribitur. Me-
 minit quoque Sabros, cibos Thuris ligno co-
 xisse, alios Myrrha. Myrrha citra adstrictionem
 (ad Actum) non instrenuè discutit ac humidi-
 tates consumit.

Se itaque hoc pharmacum etiam sine Myrrha
 præparare consueville, ad securitatem perducere
 semper tentantem usum omnium pharmaco-
 rum, præsertim ubi in acuta febri taliquid exhi-
 beretur. Laudatissima, Plinio teste, apud pri-
 scos vina erant Myrrha odore condita, ut appa-
 ret in Plauti fabula, quæ Persa inscribitur. Me-
 minit quoque Sabros, cibos Thuris ligno co-
 xisse, alios Myrrha. Myrrha citra adstrictionem
 (ad Actum) non instrenuè discutit ac humidi-
 tates consumit.

Se itaque hoc pharmacum etiam sine Myrrha
 præparare consueville, ad securitatem perducere
 semper tentantem usum omnium pharmaco-
 rum, præsertim ubi in acuta febri taliquid exhi-
 beretur. Laudatissima, Plinio teste, apud pri-
 scos vina erant Myrrha odore condita, ut appa-
 ret in Plauti fabula, quæ Persa inscribitur. Me-
 minit quoque Sabros, cibos Thuris ligno co-
 xisse, alios Myrrha. Myrrha citra adstrictionem
 (ad Actum) non instrenuè discutit ac humidi-
 tates consumit.

Se itaque hoc pharmacum etiam sine Myrrha
 præparare consueville, ad securitatem perducere
 semper tentantem usum omnium pharmaco-
 rum, præsertim ubi in acuta febri taliquid exhi-
 beretur. Laudatissima, Plinio teste, apud pri-
 scos vina erant Myrrha odore condita, ut appa-
 ret in Plauti fabula, quæ Persa inscribitur. Me-
 minit quoque Sabros, cibos Thuris ligno co-
 xisse, alios Myrrha. Myrrha citra adstrictionem
 (ad Actum) non instrenuè discutit ac humidi-
 tates consumit.

Se itaque hoc pharmacum etiam sine Myrrha
 præparare consueville, ad securitatem perducere
 semper tentantem usum omnium pharmaco-
 rum, præsertim ubi in acuta febri taliquid exhi-
 beretur. Laudatissima, Plinio teste, apud pri-
 scos vina erant Myrrha odore condita, ut appa-
 ret in Plauti fabula, quæ Persa inscribitur. Me-
 minit quoque Sabros, cibos Thuris ligno co-
 xisse, alios Myrrha. Myrrha citra adstrictionem
 (ad Actum) non instrenuè discutit ac humidi-
 tates consumit.

Se itaque hoc pharmacum etiam sine Myrrha
 præparare consueville, ad securitatem perducere
 semper tentantem usum omnium pharmaco-
 rum, præsertim ubi in acuta febri taliquid exhi-
 beretur. Laudatissima, Plinio teste, apud pri-
 scos vina erant Myrrha odore condita, ut appa-
 ret in Plauti fabula, quæ Persa inscribitur. Me-
 minit quoque Sabros, cibos Thuris ligno co-
 xisse, alios Myrrha. Myrrha citra adstrictionem
 (ad Actum) non instrenuè discutit ac humidi-
 tates consumit.

Se itaque hoc pharmacum etiam sine Myrrha
 præparare consueville, ad securitatem perducere
 semper tentantem usum omnium pharmaco-
 rum, præsertim ubi in acuta febri taliquid exhi-
 beretur. Laudatissima, Plinio teste, apud pri-
 scos vina erant Myrrha odore condita, ut appa-
 ret in Plauti fabula, quæ Persa inscribitur. Me-
 minit quoque Sabros, cibos Thuris ligno co-
 xisse, alios Myrrha. Myrrha citra adstrictionem
 (ad Actum) non instrenuè discutit ac humidi-
 tates consumit.

Se itaque hoc pharmacum etiam sine Myrrha
 præparare consueville, ad securitatem perducere
 semper tentantem usum omnium pharmaco-
 rum, præsertim ubi in acuta febri taliquid exhi-
 beretur. Laudatissima, Plinio teste, apud pri-
 scos vina erant Myrrha odore condita, ut appa-
 ret in Plauti fabula, quæ Persa inscribitur. Me-
 minit quoque Sabros, cibos Thuris ligno co-
 xisse, alios Myrrha. Myrrha citra adstrictionem
 (ad Actum) non instrenuè discutit ac humidi-
 tates consumit.

Se itaque hoc pharmacum etiam sine Myrrha
 præparare consueville, ad securitatem perducere
 semper tentantem usum omnium pharmaco-
 rum, præsertim ubi in acuta febri taliquid exhi-
 beretur. Laudatissima, Plinio teste, apud pri-
 scos vina erant Myrrha odore condita, ut appa-
 ret in Plauti fabula, quæ Persa inscribitur. Me-
 minit quoque Sabros, cibos Thuris ligno co-
 xisse, alios Myrrha. Myrrha citra adstrictionem
 (ad Actum) non instrenuè discutit ac humidi-
 tates consumit.

Se itaque hoc pharmacum etiam sine Myrrha
 præparare consueville, ad securitatem perducere
 semper tentantem usum omnium pharmaco-
 rum, præsertim ubi in acuta febri taliquid exhi-
 beretur. Laudatissima, Plinio teste, apud pri-
 scos vina erant Myrrha odore condita, ut appa-
 ret in Plauti fabula, quæ Persa inscribitur. Me-
 minit quoque Sabros, cibos Thuris ligno co-
 xisse, alios Myrrha. Myrrha citra adstrictionem
 (ad Actum) non instrenuè discutit ac humidi-
 tates consumit.

Se itaque hoc pharmacum etiam sine Myrrha
 præparare consueville, ad securitatem perducere
 semper tentantem usum omnium pharmaco-
 rum, præsertim ubi in acuta febri taliquid exhi-
 beretur. Laudatissima, Plinio teste, apud pri-
 scos vina erant Myrrha odore condita, ut appa-
 ret in Plauti fabula, quæ Persa inscribitur. Me-
 minit quoque Sabros, cibos Thuris ligno co-
 xisse, alios Myrrha. Myrrha citra adstrictionem
 (ad Actum) non instrenuè discutit ac humidi-
 tates consumit.

Se itaque hoc pharmacum etiam sine Myrrha
 præparare consueville, ad securitatem perducere
 semper tentantem usum omnium pharmaco-
 rum, præsertim ubi in acuta febri taliquid exhi-
 beretur. Laudatissima, Plinio teste, apud pri-
 scos vina erant Myrrha odore condita, ut appa-
 ret in Plauti fabula, quæ Persa inscribitur. Me-
 minit quoque Sabros, cibos Thuris ligno co-
 xisse, alios Myrrha. Myrrha citra adstrictionem
 (ad Actum) non instrenuè discutit ac humidi-
 tates consumit.

Se itaque hoc pharmacum etiam sine Myrrha
 præparare consueville, ad securitatem perducere
 semper tentantem usum omnium pharmaco-
 rum, præsertim ubi in acuta febri taliquid exhi-
 beretur. Laudatissima, Plinio teste, apud pri-
 scos vina erant Myrrha odore condita, ut appa-
 ret in Plauti fabula, quæ Persa inscribitur. Me-
 minit quoque Sabros, cibos Thuris ligno co-
 xisse, alios Myrrha. Myrrha citra adstrictionem
 (ad Actum) non instrenuè discutit ac humidi-
 tates consumit.

Se itaque hoc pharmacum etiam sine Myrrha
 præparare consueville, ad securitatem perducere
 semper tentantem usum omnium pharmaco-
 rum, præsertim ubi in acuta febri taliquid exhi-
 beretur. Laudatissima, Plinio teste, apud pri-
 scos vina erant Myrrha odore condita, ut appa-
 ret in Plauti fabula, quæ Persa inscribitur. Me-
 minit quoque Sabros, cibos Thuris ligno co-
 xisse, alios Myrrha. Myrrha citra adstrictionem
 (ad Actum) non instrenuè discutit ac humidi-
 tates consumit.

Se itaque hoc pharmacum etiam sine Myrrha
 præparare consueville, ad securitatem perducere
 semper tentantem usum omnium pharmaco-
 rum, præsertim ubi in acuta febri taliquid exhi-
 beretur. Laudatissima, Plinio teste, apud pri-
 scos vina erant Myrrha odore condita, ut appa-
 ret in Plauti fabula, quæ Persa inscribitur. Me-
 minit quoque Sabros, cibos Thuris ligno co-
 xisse, alios Myrrha. Myrrha citra adstrictionem
 (ad Actum) non instrenuè discutit ac humidi-
 tates consumit.

Se itaque hoc pharmacum etiam sine Myrrha
 præparare consueville, ad securitatem perducere
 semper tentantem usum omnium pharmaco-
 rum, præsertim ubi in acuta febri taliquid exhi-
 beretur. Laudatissima, Plinio teste, apud pri-
 scos vina erant Myrrha odore condita, ut appa-
 ret in Plauti fabula, quæ Persa inscribitur. Me-
 minit quoque Sabros, cibos Thuris ligno co-
 xisse, alios Myrrha. Myrrha citra adstrictionem
 (ad Actum) non instrenuè discutit ac humidi-
 tates consumit.

Se itaque hoc pharmacum etiam sine Myrrha
 præparare consueville, ad securitatem perducere
 semper tentantem usum omnium pharmaco-
 rum, præsertim ubi in acuta febri taliquid exhi-
 beretur. Laudatissima, Plinio teste, apud pri-
 scos vina erant Myrrha odore condita, ut appa-
 ret in Plauti fabula, quæ Persa inscribitur. Me-
 minit quoque Sabros, cibos Thuris ligno co-
 xisse, alios Myrrha. Myrrha citra adstrictionem
 (ad Actum) non instrenuè discutit ac humidi-
 tates consumit.

Se itaque hoc pharmacum etiam sine Myrrha
 præparare consueville, ad securitatem perducere
 semper tentantem usum omnium pharmaco-
 rum, præsertim ubi in acuta febri taliquid exhi-
 beretur. Laudatissima, Plinio teste, apud pri-
 scos vina erant Myrrha odore condita, ut appa-
 ret in Plauti fabula, quæ Persa inscribitur. Me-
 minit quoque Sabros, cibos Thuris ligno co-
 xisse, alios Myrrha. Myrrha citra adstrictionem
 (ad Actum) non instrenuè discutit ac humidi-
 tates consumit.

Se itaque hoc pharmacum etiam sine Myrrha
 præparare consueville, ad securitatem perducere
 semper tentantem usum omnium pharmaco-
 rum, præsertim ubi in acuta febri taliquid exhi-
 beretur. Laudatissima, Plinio teste, apud pri-
 scos vina erant Myrrha odore condita, ut appa-
 ret in Plauti fabula, quæ Persa inscribitur. Me-
 minit quoque Sabros, cibos Thuris ligno co-
 xisse, alios Myrrha. Myrrha citra adstrictionem
 (ad Actum) non instrenuè discutit ac humidi-
 tates consumit.

Se itaque hoc pharmacum etiam sine Myrrha
 præparare consueville, ad securitatem perducere
 semper tentantem usum omnium pharmaco-
 rum, præsertim ubi in acuta febri taliquid exhi-
 beretur. Laudatissima, Plinio teste, apud pri-
 scos vina erant Myrrha odore condita, ut appa-
 ret in Plauti fabula, quæ Persa inscribitur. Me-
 minit quoque Sabros, cibos Thuris ligno co-
 xisse, alios Myrrha. Myrrha citra adstrictionem
 (ad Actum) non instrenuè discutit ac humidi-
 tates consumit.

dentur, quam Myrrhæ, uera de causa Bdellij, potius, quam Myrrhæ species quibusdam esse putetur. Quicquid autem sit, constat non esse optimam, nec inter Myrrhas determinam. Apparet autem, eam esse Myrrhæ speciem, quæ *Caucalis* Dioscoridi nominatur. Quippe hæc *Myrrha*, hoc est, ultra tempestiuitatem suam producta, bonitatem suam amisit & exoletorum more areolat, nigraque ac torrida exiit.

Fuchsius assentitur Cronemburg, supra antidotum Hermagogam, dicens: Eligenda Myrrha non usualis nostra, quam esse suspicor Dioscoridis *Caucalis* & *Ergasine* cognominatam, genuina enim caremus. Galenus omnibus [Myrrhis] prætulit *Minzam*, Diosc. *Amminzam* damnavit, de diverso scilicet Myrrhæ genere loquentes, ut ego arbitror. Audio nunc legitimam Myrrham ad nos aduehi, sed tam paucam, ut hætenus non viderim.

Cronemburgio subscribitur Ioan. Agric. ita scribens: Myrrha, quam nos habemus, ea est, quæ secundo loco à Diosc. scribitur & *Caucalis* vocatur. Ipsi verò ad stipulatur Iodoc. V Villich. in sua Dialectica, & Brunfels. in suo libello de conf. Med. in cognosc. simpl. duminquit: Myrrha vera non habetur, nisi fortè nostra communis sit, quæ à Dioscoride dicitur *Caucalis* sive *Ergasine*.

Myrrha rubra Actuario (inquit Sylv.) *Myrrha* & *Myrrha* verax eadem. Improbatur autem *Myrrha* nomine Dioscoridi: Galeno autem eligitur *Troglodytis*, quæ & *Minza* dicitur à regione ubi præstantissimam gigni affirmant. Ea gracillima est odoris, & nullo vitata liquore. Myrrhæ igitur Officinarum omnino adulterata parum utilis est usus in sumendis.

Hic dicit Corn. ex hætenus dictis Myrrham vulgò esse notam, sed generà Dioscoride præscripta manere ignota. At iam lectis neglectis intelligat Matthiolum, cui Myrrha, quæ ex Alexandria Egypti hac ætate ad nos affertur, admodum sanè ab ea differt, quam inter præstantissimas Myrrhæ species recensuit Diosc. Quippe universa serè Myrrha, quæ in Officinarum usu habetur, ut omnibus qualitatibus, ac notis destituitur, quibus optima commendatur. Verum si cupiam fortasse videretur & hæc inter Myrrhæ species esse recipienda (quod tamen non satis compertum habeo): aut *Caucalis*, aut *Ergasine*, esse crediderim, aut potius, quam Plinius ex India deferri ait, cum hæc ceteris deterioribus habeantur, certoque sciamus ex India in Alexandriam Myrrham importari. Nam ea, quæ plurima ad nos affertur, non modò siccæ, nigraque est, sed etiam retorrida, macilenta, & cavo quodam situ obducta: & quamquam inter huiusmodi globulos aliquod quandoque reperitur fragmentum, quod & clarum sit, & pellucens, contractum, tamen diversicolor apparet. Ecquid magis? nec gustus insigniter amarum, nec Myrrhæ odore præditum sentitur. Quo fit, ut credere liceat, eiusmodi Myrrham, aut è deterioribus esse, aut gummi aliquius, aliorumque mistorum adulterio minimè vacare. Ceterum electam Myrrham iam ad nos aduehi scimus, quæ & legitima, & probatissima esse censetur. Verum ea hætenus tam rara est, ut non nisi ad ostentationem aservetur, & ad aliarum dignoscendarum regulam. Adhuc Brassavolo Ferrariensi animus inclinare videtur, ut existimet Myrrham, Officinis vulgarem Bdellium esse. Cui haudquaquam assequendum putaverim: siquidem Myrrha hæc

pellucens adeò non est, nec Tannino gluino similis, ut Bdellium esse tradit Dioscorides. Et licet quædam nostratis Myrrhæ frusta quandoque translucida reperiantur, sunt tamen potius hæc (ut dictum est) gummi adulteria, quam Myrrha, vel Bdellium: nempe gustu maleficium detegitur. Præterea Bdellium incensum, Dioscoridis testimonio, odorem unguibus odoratis similem spirat, quod in nostrate Myrrha nunquam, factio periculo, sum consecutus. Huic etiam alia accedit ratio, quæ magis ac magis Brassavoli animum immutare poterit: quod scilicet Bdellium diu digius ductum, tractumque faciliè lentescat, & contractum pingue spectetur. Myrrha verò, quæ Officinis venditur, digitorum attritu conteritur, & si frangatur, perquam arida sese offert. Ceterum improbavit Dioscorides, omniumque Myrrhæ specierum determinam iudicavit, quæ aliquibus *Minza*, aliis *Aminea* vocatur, quam cum Galenus probaverit lib. 1. de Ann. omnibusque *Troglodytis* prætulit, factum est, ut existimarent quidam, in hoc loco Dioscoridis codici mendum subesse. Sed cum in Dioscoride Græco legatur *Aminea*, & in Galeno *Minza*, ego potius crediderim, eam non idem Myrrhæ genus intellexisse. Quò fit, ut faciliè crediderim nostri usus Myrrham, Indicam esse: namque per mare rubrum, & inde per Caropanas (ut dicunt) Alexandriam importatur. Postremo illud etiam notandum est, quod (ut Galenus inquit) Myrrha semper medicamentis est commiscenda, cum ab igne tolluntur: quippe, quæ coqui minimè patitur, velut etiam Thus & Aloë.

Sed quid Val. Cord. sentiat, audiamus. Iamdu dum, inquit, de Myrrha incidit controversia negantibus etiam doctissimis viris nos veram Myrrham habere. Qui verò res ipsas diligenter inquisiverit, non poterit non videre, quod non tantum mediocri, verum etiam optima Myrrha afferatur, quamvis hoc hæcarius. Quod autem non frequenter contingat, sola in causa est Aromatopolarum, quos hodie Materialistas vocant, ignavia & infertia. Hi enim cum partim etiam in Alexandriam navigent, faciliè possent optima quæque eligere & adportare.

Sed quid sit illud Officinarum Belzoin, ab his Ben Iudam dictum scire haud dubiè malles (inquit Lang.) Troglodyte præstantiorem Myrrham electam arbitror, quæ nem ex arboris in Arabia, Egypti spinæ similitudine nascentis, lachryma, cuius cortice inciso, in substratas palmeas tegetes, liquor eius defluit, aut in trunco arboris adeò tenaciter concrevit, ut una cum cortice avellatur, quem in Benzoi crebrò quoque conspiciamus. Habet sanè omnes Myrrhæ electæ proprietates, est namque friabile: & fractum, in eo candida humanis unguibus similes, maculæ effulgent, ac (ut Ecclesiastes ait) fragrantissimum Deorum in templis suffragium, Egypti ex tali Myrrha & Bdellio, humani unguis colorem referente componebant: quod Damocrates *ῥῶς* appellat. At nostra vulgaris Myrrha incensa, planè viroso odore foetet: quam adeò ab optima Myrrha degenerem, à Diosc. Ergasinem dici arbitror. Sed etiam haud ignoro, te amaritudinem Myrrhæ in Benzoi requirere, quod commasticatum plùs dulcescit, quam amarescit. Verum scias, amaritudinem illam non omnibus Myrrhæ speciebus inesse. Nam Troglodytica leniter in ore lentescit, & (ut Diosc. ait) erosione quadam linguam pungit. Nec ob id quod amaritudinis expers sit, inferre poteris, Belzoin

Caucalis
Diosc.

Ergasine

Caucalis

Ergasine

Myrrha
Serax A-
lunario.

Taxatur
Cornar.

Myrrha
delata
Alexand.

Caucalis
Ergasine

Indica

Myrrha
lecta ad
nos adue-
ritur.

Bdellium
Brassavolo
Brassavolo
lupus.

Dioscoridis
Myrrha

Minza
Aminea

Diosc. larm
Myrrha

Myrrha
Gulcanus
Indica

Myrrha
Myrrha

Myrrha
Serax A-
lunario.

Belzoin
Ben Iudam

Ergasine

Belzoin esse Assam dulcem: quum hæc apud Serapionem & Avicennam à Græcorum Lasepicio nihil differat: quod non amplius extare, satis, superque probavimus. Quod si Officinatum Belzoin Myrrham dulcem appellare voles, nil moror: solet enim natura sæpe in rebus eiusdem speciei ad voluptatem, contrariis saporum qualitatibus ludere. Nam si Poma & Mala Punica, atque Arantia, tam dulcia, quam acetosa, Amygdalas item tam dulces, quam amaras, procreat: quid obsecro obstat potest, quin etiam Myrrham tam dulcem, quam amaram procreet? Nihil certe: proinde obsecro, ut meam de Silphio, Assa dulci, & Myrrha & Belzoin censuram, ad commutationes tuos referas: illorumque iudicium quamprimum ad nos referbas. Hæc Langius.

Monachi verò, tenentes aliam opinionem, inquirunt. Veram Myrrham nunquam volumus videre: Nam illud, quo communiter pro Myrrha utuntur aromatarij, non esse Myrrham, nec Myrrhæ speciem, facillimè ab inquirentibus deprehenditur. Nam ubi amaritudo, insupportabilis? ubi odor suavissimus? Et quod Myrrha amara, inmodè amarissima sit, non solum per Dioscoridem, & alios medicos auctores, verum etiam & per sacrum Evangelij Marci textum probatur, cum legitur, quod Servator nostro, Christo, dederunt myrrhatum vinum, quod cum gustasset, propter amaritudinem insupportabilem (ut nonnulli sancti viri contemplantur) non accepit. Et quod Myrrha sit odoratissima, bonum videlicet odorem spirans, & per eosdem auctores, & per sacros codices passim probari potest. Hæc autem falsè vocata Myrrha malè olet, & amaritudo eius est valde debilis. Aliquorum iudicium non est spernendum, qui dicunt istam Officinatum Myrrham, esse Bdellij speciem. Et hæc Myrrhæ (ut testantur omnes inde digni auctores) sunt plura genera & species, hæc tamen, quam falsè diximus vocari Myrrham (liquidem Myrrha est) ea certè est, quæ à Dioscoride Ergastum cognominatur, quæ omnium est deteriora: vel ea ab eodem auctore damnata Aminnea dicta: quoniam aliarum specierum nulle posse nobis non videtur. Stacte igitur, loco Myrrhæ, admittenda est. Hæc Monachi, qui plura tradunt in Hist. nostra generali cap. de Syriacis, quæ videre ibidem poteris.

Nos verò de Belzuino postea agemus, quod quicquid dicat Auctor nullo modo Myrrham exillimamus, cum Monachis & Langio: nec Stacte ex eo fieri potest, quæ respondeat Stacte veræ. Dum Langius (ut postea dicitur) vult Benzoinum esse Myrrham, reuocet Myrrham vulgarem, quam virosolum odorem dicit habere, & non suavissimum. Verum vulgarem Myrrham propter odorem graviores & non omnibus gratum, non censemus reuocandam: in legimus liquidem Myrrha non requiritur ita suavis, qualis Benzoini, cum dicat Diosc. tantum, esse *δωδύκην*: quod idem de Onychæ sive vngue, ut etiam de radice Alepiadis, & de foliis Aristolochiæ rotundæ. Quod ad locum Ecclesiastici, quem citant tum Langius, tum Monachi, non videtur facere ad approbandum Belzuinū, vel ad reuocandam Myrrham vulgarem, ut utriusque volunt, ex eo enim, & altero, qui est in Exodo, argumentum desumimus, quo ostendimus nostram Myrrham ob odorem non usque adeò suavem nostris naribus, non esse reuocandam. Si inter aromata pretiosa ad vnguentum tam pretiosum & ad odores sumebantur Galbanum & Onyx (quæ quidem odorata sunt, sed nobis non suavia, & quibus fortè nunc nolle

uti, etiam Thure nollent uti delicates:) verisimilius eos assumpsisse Myrrham, potissimum qualem descripsimus, quæ nostro sæculo rarior: quæ sanè non iniucundi odoris nobis videtur collata ad prædicta, licet aliquid gravitatis habeat, quæ quibdam non est odiosa, ut antiquis non fuit, quamvis fortè delicatulis minis grata, quales fuerunt Monachi, qui dixerunt malè olere. Itaque nullo modo sumendum Benzoinum, maxime cum nullam amaritudinem habeat, ipso etiam Langio teste, quod vnum ex signis bonitatis est Dioscoridi. Quod ad argumentum Monachorum de amaritudine, ob quam respuunt Myrrham vulgarem, dicentes esse valde debilem, ac debere esse amaritudinis insupportabilis, ut dicunt fuisse vinum, quod oblatum fuerit Christo, Salvatori nostro, ac propterea non bibisse. Nolumus video, qui dixerit Myrrhæ insupportabilem amaritudinem, nec etiam apud D. Marcum dicitur enim ait: *Καὶ εἰδὼς αὐτὸς οὐκ ἐποιεῖσθαι τὸν οἶνον ἐπὶ τὸ ξάδι*. Hic non dicitur cur Salvator noster Iesus Christus non biberit: quumquam verisimile sit, quandoquidem apud Matth. scriptum. Dederunt ei acetum cum felle mistum, & quum gustasset, noluit bibere.

Purissima (scribit Garc. arom.) adfertur etiam ex Arabia ad nos Myrrha, quæ Indis & la dicitur: tum etiam ex regione Abessin, quæ Aethiopia est. Qualis verò sit arbor, quæ eam profert, aut quæ ratione resina eliciatur, nunquam scire potui. Intellexi dumtaxat à quodam mercatore, qui in Melinde, & Mosambique negotiabatur, tum à quodam Sacrifico Aethiopix, Episcopoque Armenio, genus esse quoddam hominum montanum & sylvestre, quos *Bodvins* vocant, linguæque puræ Arabica, quæ nonnihil ad Chaldaicam, aut Syriacam antiquam accedat, uti perhibent. Id inquam hominum genus Myrrham in Brava & Magadaxo terrestris itinere adfert, & à Chaldaei regione sic illis vocata se adferre asserit.

Notat Hist. Lugd. Pliniam, dicitque eam magnam Myrrhæ Historiæ partem ex Theophrasto mutuatum esse. Ac negare plerosque Myrrham genuinam ad nos adferri.

Perhibent Lobel & Pena Myrrham, quæ suaviter & odore fluentis, vnguentaria dicitur, nomen indicare lachrymæ: multam esse huius affinitatem cum Bdellio. Myrrhā item nos non carere certum esse, & hanc ab illo non tam specio; quam accidentibus distare. Vtrum autem Bdellium præferendum sit, ambigunt. Frustra verò (addunt) velitari scriptores istos, & de colore testagani Herbario Senenli. Nam se vidisse in Officina Guillelmi Driesli periti Pharmacopœi Antuerpiensis.

Credite Cæsalpinus, quod Indica Myrrha [Plinio] è Spina quadam ibidem colligatur, tantò deterior, ut facilis sit distinctio: quod hoc nomine vendatur hodie lachrymā, non in pastillos coacta, sed dissoluta in parva fragmenta, colore ruffo, aut livido, nigroque, gustu amara, odore parvo, non iucundo, idè solis Medicis in usu: non Vnguentarius: Et quæ vili pretio vendatur. Putat Indicam Myrrham esse à Plinio vocatam, sed facili distinctione, ac huiusmodi etiam apud Dioscoridem esse genera improbata. At Myrrham, unde exprimitur Stacte, rem odoratam esse, hodieque Belzoi vocari. Nos verò diximus antè Myrrham veram adferri, sed sæpius adulteratam cum Gummi, quæ minus amara, quicquid dicat Cæsalpinus ex Plinio, meliorem verò esse gustu leviter amarā: Dioscorides enim dixit simpliciter *μυρρίνην*.

Dd

Myrrha dulcis.

Myrrha vulgaris non est vera Monachi.

Odor suavisissimus. Amarissima.

Vinum myrrhatum Sal. Satoris datur.

Bdellium.

Ergastum.

Aminnea.

Stacte pro Myrrha.

Contra Langium, Aromatum & Monachos.

Benzoinum non sumendum.

Ex Arabia.

Abessin. Ex Aethiopia.

Locus.

Notatur Plin.

Myrrha unde dicta Lachrym.

Myrrha cum Bdellio magna affinitas.

Vulgaris Myrrha est Indica Plinio.

Cæsalpin. notatur.

veram Myrrham fœspite natura amarâ appar-
et ex ipſomet Plinio, dicente: adulterari gummi
& Cucumeris ſucco, amaritudinis cauſâ: Forſe
Plinius dixit meliorem leuiter amarâ, reſpectu
adulterâ. cum Succo Cucumeris ſilv. Amara
efficeret vera Myrrha, & non ſine amaritudine,
vt Benzoi, quod Myrrham vult Cæſalp. Myr-
ſham verò amarâ eſſe, videtur etiam id demon-
ſtrare, quòd aduerſus lumbricos præſcribat Dio-
ſcorides. Quinimò Monachi volunt veram
Myrrham eſſe inſupportabilis, vt aiunt, amari-
tudinis, allegantes Saluatoreſ multum propte-
rea non voſuiſſe bibere vinum *ignatium*: non
tamen, vt antè dixi, concedo requiri tantam aperi-
tudinem in Myrrha. Nomina recitauimus,
dum Myrrhæ Hiftoriam in genere proſequere-
mur.

Vires & Myrrha quoque vires ex veteribus, iam antè
afus. posuimus, quare superest, ut, quæ recentiores de
his scriptis mandarunt, annotemus.

Conducit igitur hæc (vt author est Matth.) hydropicis, cum Agrimonis potâ. Iubet præterea quartanarios sumere drach. j. Myrrhæ, cum Piperis tantundem, & bibere cum vino Maluatico ca-

lido horâ vnâ ante febris paroxysmum, quo e-po-
to se contineant in lecto ad sudandum, id cer si
faciant, febre[m] mitiorem euadere, veltolli. Myr-

Remedia.
Rugas faciei.
rhæ vſus eſt in modicæ ſentis repugnauibus venenis, ac pellit arcere eorū putredinem. Si nū-
lier rugas arcere voluerit à facie: accipiat laminā
ferrī novā aut patellā, quam ignitam reddat,
deinde os vino repleat, ac ſubiū ignito ferro
aſpergat, caput conperiat panno, ac vaporem in
faciem recipiat. Poſtea iterum accendatur ſerum
& ſuperimicatur cauſtulum bonæ Myrrhæ, ac reci-
piat in faciem vaporem ſub panno, quem deinde
tati faciei ſuperliget, ac ſuperdormiat, ſi hoc
bis in menſe egerit, non eſt quod vereatur ru-
gas. Myrrha lachryma arboris in Arabia naſcen-

Alarū sudores.
Tadisa.

*Florus Gref-
ca.*
*Fontanus
not.*

Oleum.
Chiragra.
Uscutruera
Ruga.

Myrrhinum oleum paratum ab aliquibus paratur, contra Chiragram, & Podagram. Cicatrices insuper delet. A regis quoque faciem frequens eius illimentum præservat. Conficis id autem hoc modo. Coquito ovum donec coctum, durum fiat, partitor secundum longitudinem, in duas partes aequales, vasellum exarito, ac Myrrham eius loco pulverisatam imponere, ac in cellam vinariam, aut alium locum humidum, dum Myrrham diffuset, ac oleum fiat, reponito.

Medic. faciens
oleum.

Electuarium.
Morbi stomachi.
Oppilationes.
Ventrositas.
Putred.
Dolores intestinum.
Trochisci.

Electuarium ex Myrrha (inquit Clem. Clemen-
tinus). sanat veteres morbos stomachi, he-
patis, & splenis, remouet oppilationes, resoluit
ventositates, & humores aquosos: prohibet pu-
tredinem, digerit crassos humores, & sedat dolo-
res intestinorum. *Myrrh. drach. ij. Croci,*
Acoti, Bacc. Lauri, an. drach. ij. Sem. Dauri, Apii,
Ameos, Fœnic. Siler. mont. Card. half. Trium
Piper. Cinam. Cassia, Squinanth. Costi, Spica,
Mentha, marrub. an. drach. j. Confice cum me-
le spumato, & da drach. ij. cum vino calido. Fro-
chisci ex Myrrha provocant menstrua, & sedant

passiones, quæ ex retentione menstruorum pro-
veniunt. R. myrrh. drach. ij. Farinæ Lupinor.
drach. v. Fol. Rutæ, Menthar. Pulv. Cymin. Ru-
ber tinct. Afilæ sæculi Scrapini, Opoponac. an.
drach. ij. Fac Throchisc. cum succo Cichor. min. i. e.
Panis porc. & da drach. ij. cum coctione seminis
luniperi. Unguentum ex myrrha prohibet san-
guinem & putredinem, generat carnem, & citò
consolidat plagas. R. myrrh. Aloës, Thuris, Sar-
cocollan, unc. sem. mellis Gumati unc. iiij. vini
alb. bott. vnc. ij. Coq. cum facilitate vsque ad spis-
situdinem; sed si velles consumere carnem super-
fluam eminentem, vel mortuam, adde Vitrìoli
drach. ij. Constat (inquit Ruell.) è myrrha
unguentum quibus Perficis dicatum, quod illi
capite, seu diadematis vice prestabant, sed adde-
batur myrrha habiles appellata, quam multo pre-
tiosioremyrrhâ Dinonensi scilicet.

MYRRHA, POETICAL

A Rhoris cuiusdam in Bœotia nascendi svt no-
bis author est Dioscori. ^{Radic. Di.} ^{of. Coradi.}
Eligh augeatam, quæ odoris paria. ^{Y u.} ^{Smilis est}
Myrris. Vm habet, olef. ciend., molliend.,
diffundend.: Vtiliter etiam in suffitu misce-
tur.

Bœoticam myrrham necesse est, ac Cordus si-
mplex lachrymam esse. Quomodo enim
proprie vocata Myrrha arboris sui nominis la-
chryma est, quæ in aqua dissolvitur; hoc addo ut à
resinosis lachrymis, quæ in aqua minimè resol-
vuntur, distingui possit: sic etiam par est Bœoti-
cam Myrrham, ex aliquius arboris parte aliqua
manare: non enim frustra, sed ob similitudinem
substantiæ & qualitatis, quas cum Myrrha possit
minis, quæ eadem habet, Myrrha vocabulo
appellata fuit. In hoc verb. Dioscor. exemplari,
quod Marcellus Virgilius interpretatus est, clare
legitur Bœoticam Myrrham nascentem quâdam in

legit, ex eo autem Myrrham hanc esse, quoniam in
Beroia arboris radicem esse, sed male quantum
mihi videtur: neque hic interpretatur culpa, ve-
rum exemplaris. Graeci vitio libant, in quo sic
scriptum reperitur: *ἡ βέρωια αὐτῆς ἐστὶν ἡ δὲ ἐν τῇ
βέρωια αὐτῆς γινώσκουσι πρὸς τὴν ἀπὸ τῆς
βέρωια αὐτῆς γινώσκουσι πρὸς τὴν ἀπὸ τῆς*
rū myrrha est arboris cuiusdam in Beroia pal-
centis radix incisa. Fuisse autem alium, veso-
rum ordinem & sensum in hoc capite Serapio in-
dicat, cum in myrrha capite sitit. Sed myrrha,
quae est ex terra, quae dicitur Laptaceno. [Bero-
ia] abscinditur ex radice arboris, quae est in ter-
ra.

visillis. Sic ille hoc Diotesc. caput reddidit, nec
dicit Botanicam, & yrrhacanthum esse radicem;
sed ex radice confectis, quæ in modum solent in
omissione elicti reliquit liquores. Nec non nobiscum sen-
sit suis commentariis Marcell. Virg. interpret.
Irrhacanthum cuius hodie omnino non cognosci-
tur. Sed hic auctor Cordus est, & modum dilu-
ta fides. Separatum probat, idcirco considerandum
proponimus an veram scribat Irrhacanthum lachry-
mam quæ in aqua dissolvatur, & non resinam;
Nos facit contrarium sentimus.

De Boregia Myrtilis quod dicitur Martialis,
non habet, quod aetate sua (ut arbitratur) omni-
bus incognita.

MYRRHARBOR BELLONIO

IN Palaestina Roms frutex sanctus provent,
quem existimamus ab antiquis non descri-
ptum

Arboris
Myrrha
Descript.

prum : suspicari sumus, esse arborem Myrrhæ : contorto est caudice, denso, horrentibusque spinis obfuso, folia habens Acaciæ similia, sed paulo minorâ. Bellonius Observat. lib. 2. cap. 80.

DE STACTE IN GENERE.

Stacte m.
guentum.
Delectum.

STACTE, ut apud Diosc. videre est, appellatur recentis Myrrhæ, cum modica aqua contusa, & per organum expressa, pinguitudo, [n. 1. 1. 1.] Odorata est valde, & preuosa, & per se ipsam est unguentum, quod Stacte appellatur. Probatum quæ oleum amixtum non habet, & quæ in minima portione plurimam vim possidet, atque hanc calefacientiam, ad Myrrhæ & unguentorum calefacientiam proportionem.

Plinius l.
2. de stirpib.
lib. 12.

Quæ Plinius de Stacte prodidit, eadem leguntur apud Cæm. qui ita scribit : Quandoquidem Stacte ipsa per se ipsam unguentum est, & Myrrhæ (ut Plinius ait) per se unguentum facit, sine oleo, Stacte ita enim legendum est, & non Stactea) duntaxat, alioqui nimiam amaritudinem affert : inde adeo inter unguenta Diosc. de ea tractat. Et de arboribus Myrrhæ idem Plinius : Sudant, inquit, sponte præ se quam incidantur, Stactes diſſant, cui nulla præfertur. At contra hoc Diosc. non eam Stactem appellari dicit, quam sudant arbores, sed pinguitudinem recentis Myrrhæ cum modica aqua contusa, & per organum expressa, ut ita videtur Diosc. Plinius Stactem ignorasse. Plinius autem Dioscoridis Stactem improbat, ut quæ cum Stacte non sit, sed expressam amaritudinem afferat. Theoph. lib. 9.

Stacte Pl.
nus dicitur
a. Descript.

duas Myrrhæ species facit, alteram Stactem, alteram Plactem. Hanc equidem ut arbitror, quod in grupuntæ gleba non efformaretur, velut idem de Thure dixit, ut manum mole sua impelleret, & pondere tertium unam partem excederet. Vnde etiam Diosc. in Narcisso, & Irino, Myrrhæ genus adducere iussit. Hodie porro Stactem Officinæ, & Arabum Medici Styriacem liquidum vocant, quum Græci unum saltem Styriacem agnoscant : Stactem autem pro Balsamiliquore in Arabibus assument.

Theoph. lib.
9. Myrrhæ.

Sed unde quæso colligit Corn. nimiam amaritudinem Stacte expressæ, non hinc invenimus apud Plinium. Pars natecne quoque Plinius exprimit Stactem, iudare ex arbore Myrrhæ, ait (scilicet Diosc.) Brodeus lib. 2. cap. 2. Non autem ex ipsa Myrrhæ. Quod Basilus in Pl. 4. 6. 1. firmat, qui Stactem Myrrhæ tenuissimæ genus esse scribit. Quod enim primo effluit, in Stactem seponitur, quod crassum restat, Myrrhæ vocatur.

Styrax li-
quidum.

Stacte autem ex Ruellio dicitur, quoniam è stillatitâ duntaxat fiat. Hodie Stactem Officinæ & Medicorum vulgus Styriacem liquidum appellant, cum sit tulle Myrrhæ recentis pinguisissimus flos. Factionis Mauritanicæ aut Arabicæ familiarum auctores erant Dioscoridis testimonium in Styriace liquido. Styriacem pro Stacte usurparunt, vel nominis vicinitate falsi, vel quod duo Styracis (sic loquuntur) statuunt genera, liquidi & seci, qui recentioribus Calamita dicitur, cum Græci quicunque de Styriace quicquam prodiderint, nunc duntaxat meminerint.

Corn. natus.
Plin. re-
preh.

Stacte (Amatus enim quoque audiendus) pinguedo recentis Myrrhæ est, quæ hodie omnium votis Serapionem imitantium, Storax liquida est, quæ odoratissima pretiosissimaque ad paranda poma odorifera, & suffutis, Unguentariis, passim

Stacte m.
de.

Error e
Mysorena
norum.

Tom. 1.

Styrax li-
quida.

utuntur : apud verò Plal. nistam, ut multi putant, Gutta, sive lachryma nominatur, quum legitur : Gutta. Propterea unxit te DEVS, DEVS tuus, oleo lachrymæ, præ confortibus tuis : Myrrhâ, & Guttâ, & Cassiâ. At reverà textus Davidicus non ita habet, ut Hebraica veritas indicat ; quem ita ad verbum Munsterus vertit : Dilexisti iusticiam, & odisti impietatem : propterea unxit te DEVS, DEVS tuus, oleo lachrymæ præ confortibus tuis, Myrrham, Aloë, & Kezân (redolent) omnia vestimenta tua. Hactenus Munsteri interpretatio, in qua, mea quidem sententia, optime verbum (redolent) supplet, & ex ea satis constat, Hieronymum, non bene Guttam pro Ahalod interpretatum, quum vox ipsa claret Agallochum Græcorum esse, Romanorum verò lignum Aloës. Vnde Munsterus emendandus à me quoque venit, quum verbum Ahalod, Aloën vertit, cum reverà lignum Aloës, & non Aloë dicere debuisset : nam Aloë succus herbarum est quem Hebræi sua voce Aloë appellant, Ahalod verò lignum Aloës est, quumobrem Munsterus rectius hic interpretaretur, dicendo, Myrrham, lignum Aloës & Kezân (redolent) omnia vestimenta tua : sed quid per Kezân intelligere debeamus, quia Munsterus vocem istam, inconvertibilem relinquit, dicamus, quod multi Rabbinorum, locum istum enarrantem, per Kezân, sive Kezâm Costum intelligunt, sed reverà non sine ingenui, ne dicam pudendo errore, quum Costus apud Hebræos Kerah dicatur. Est igitur Quezân, Cassia, quæ à Cinnamomo, ut diximus distat, in quam sententiam, vox ipsa Hebraica legentem trahit, quum Cassia à Caziad derivata fuit, adeo ut loco Kezâm, Cassiam interpretari liceat.

Ahalod.

Agalloch.
Ahalod non
est ille co-
ra Mun-
sterum.

Aloë He-
braic.

Kezâm.

Kezân ex
Kezâm
Rabini nō
bene Costus
bene Costus
bene Costus
bene Costus.

Quezân
est Cassia.

Et quamvis iam multa satis de Stacte hic adscripta sint, non videtur tamen plura notatu digna hic subigere. Monachis itaque verba facienti locum offerimus. Stacte autem, ut probari potest per Serapionem & alios plures, illa est, quæ ab ipso Serapione, Styrax, sive major Storax liquidum appellatur. Nam ipse Serapio cap. de Storace, quod incipit Miha (Storax) primum loquitur auctoritate Isaac ben Amram, de pluribus speciebus Storacis. Hinc cum loquitur de liquida, auctoritate Dioscoridis : capitulum ipsius Dioscoridis de Stacte, ad litteram ponit. Vnde quod Græci Stactem, Arabes Storacem liquidam vocant, item ipse Serapio cap. de Myrrhæ, cuius principium est Lex ait : Et est de ipsa res, quæ dicitur Bathnâs, & est grossa, à qua egreditur Miha id est, Storax liquida, quoniam exprimitur, & dicitur Mirnastactem. Mirnastactem dixit, quasi diceret Myrrhæ, sive Myrrham Stactem. Ex quibus patet Græcorum Stactem, Storacem liquidam Arabum esse. Etenim Storax apud Arabes est species Myrrhæ liquidæ, quam Miham vocant. Vnde Haliabbas etiam in 1. pract. cap. 41. ait, Storaca, & est species Miha. Quamobrem nihil dubites apponere pro Myrrhæ, optimam (si habes) Styriacem liquidam, id est, Stactem Myrrhæ, vel Storacem liquidam, veram, ab optima Storace expressam. Vel si non habes liquidam veram, præsentem apponito, & erit melius, quam hoc, quod pro Myrrhæ venditur, quodque ignoramus quid sit.

Miha.
Mirnastactem.
Stacte Græcorum.

Myrrhæ
substantia.

Myrrhæ
qua venditur,
ignorat
mus quid
sit.

Brassæ folia
redargu-
tur per d.
losum.

Ita porro Aloisius Mundella, ne eius desideres verba, inquit : Si verâ & pinguisissimâ Myrrhâ, ex qua Stactem fieri certum est, caremus, rationi consentaneum est, Stacte etiam verâ nos carere : fieri enim hanc ex Pediasmo, & Gabýrea, quæ

Syrax liquidus, sunt Myrrhae species, Diosc. tradidit. Syrax autem hic noster liquidus, Staete esse non potest, cum nullam gustui amaritudinem adferat, quemadmodum ipse [Brassavola] in sua etiam annotasti: neque ita ut Staete vehementer odorifer sit. Congruum eam videretur, cum Staete pinguitudo Myrrhae sit, Myrrhaeque amaritudinem praeferat, & odorem vehementem: Staeten quoque ambas illas qualitates penitus, vel certe multum earum repraesentare. Adde etiam, quod Syrax liquidus subviridis non est, quo colore prima omnium Troglodytica Myrrha à Diosc. describitur, cuius coloris quoque Staeten esse debere existimamus. Ruellius praeterea Syracem liquidam non esse Staeten, ut Medicorum vulgus opinatur, ostendit: verum infirmioribus quidem rationibus: non enim id, quod assumpsit, confirmat, & contrarium destruit: sed tantum causam erroris Arabum, vicinitatem nominis fuisse dicit, vel quia duo Storacis [sic enim loquuntur illi] genera, liquidi & sicci statuerunt, qui recentioribus Calamita dicitur, cum antiqui de uno tantum genere agant. Quare Ruellius si rectè dispicio, quod resellendum suscepit, his non confutat rationibus, Syracem scilicet liquidam non esse Staeten. Quocirca opinio illa, cui favere videtur, quod Syrax hic noster liquidus vulgaris, Staete sit, non valde nobis probatur, nisi & Staetes verè saporem, odorem, & colorem [ut scripti] manifestè reddiderit.

Syrax liquidus, Nec aspernandus Cordus, qui à dextis Alosii stat, dicens: Anomus Musa, Syracem liquidam, Staeten esse constanter affirmat, sed malè in eo quidem iudicio. Sunt enim naturè penitus diversae Syracis & Myrrhae arbores: & huius lachryma in aqua resolvitur, illius vero in oleo, vel oleo simili humore tantum. Myrrha praeterea optima ex aqua fit. Staete per se in igno emittit. Syrax verò liquida admodum parva. Quare cum ex plurima Myrrha quantumvis bona, minimum exprimitur Staetes, & Storax liquida longè minoris [quamquam Myrrha etiam longè vilissimo] veneat, nemo temerè affirmabit, eam Staeten esse. Quod si non fuis, illic hoc argumentum contradicentibus videbitur, electa Myrrha, Staeten expressimus: quae vix aliqua reperitur, quae diutius & latius oleat, odore aromatum modo iucundo. Sed propter gravitatem aliquam sensarum irreparentem, facile somnum conciliat. Possunt nostri exemplo volentes, si veram Myrrham, eamque optimam eligant, non magno labore eam exprimere. Nam vulgò hodie apud nos non exprimitur, ob recentis Myrrhae inopiam, sed in Arabia Mecha copiosè adhuc confici negotiatores referunt.

Tandem his ita dictis, proxima sunt illa, quae Matthioli refert, dicens: Staete Serapioni quemadmodum & reliquis Mauritanis, panterque Officinis Syrax liquidus appellatur, cuius copia non solum Venetis ubique venalis habetur, sed & in omnibus fere Officiis reperitur, quae medicamentorum componendorum artem exercent. Quod autem Staete Myrrha sit liquidus vocatus Syrax, facile probat Serapio: quippe qui capite de Syrace Calamita, liquidum Syracem ex Myrrha, primùm aqua conspersa, ac deinde expressa, fieri tradidit: qua in re Dioscoridem ad unguem imitatur. Cui quidem sententiae, illi ad stipulatur, quod liquidus Syrax de legitimo sanè liquor sit perquam odoratus, & gustui non obscurè amarus. Porro animadvertendum est, quod hoc pro sincerum haud facile invenias, ut sermè

evenit cum ceteris medicamentis, quae ex Alexandria Aegypti, vel Syria ad nos convehuntur. Siquidem cum omnia haec per Mauritanorum, Turcicorum, Indorumque manus transeant, qui nobis Christicolis semper dolos, fraudesque ingulunt, acceptum Deis sacrificium facere sibi persuadent, cum nos aliqua in re fallere possunt. Ceterum, mea quidem fert opinio, si sinceram Staeten nancisci possemus, non alienum fore, ipsam in Myrrha locum substituere. Sed certè perquam difficile erit legitimam inveniri: nisi forte vera Staete liquor ille, de quo superius in Balsami commentatione diximus. Huc usque Matth.

Staeten demum praeparabat pro Thonaca Valerandus Douffez ex Myrrha à nobis descripta modo, quo praescribit Diosc. quam tunc calefaciebat ad expressionem, quae sanè satis iucundi odoris, & amaram experiebatur. Vnde non immerito quondam Lucretius,

Aur Aniaracini blandum, Staeteque liquorem.
Columella.

Et melior Staete penetrat Achaia Myrrha.
Finem facit Fuchs de compos. med. lib. 1. Myrrha Staete, i. e. stillatitia, non est nisi expressa recentis Myrrhae pinguitudo. Siquidem ex Myrrha recente pingui & solo latiore nata, largior exudar, ac extillat: dein cum aqua pauca tunditur, ac raris expremitur, amaritudine praecipua, odoratissima, preuolissima, minima proportione efficacissima: Arabibus & recentioribus Syrax, vel ut ipsi loquuntur Storax liquidus appellatur, id quod ex historia virorumque authorum tum Graecorum, tum Arabum facile patet.

Staete igitur, ut ex haecenus dictis colligere potest, est proprie & communissimè dicitur de liquore Myrrhae, de quo dictum. Quare frustra se torquet Matth. dubitans an Balsamum sit Staete. Antonius vero Musa Syracem liquidam Staeten esse constanter affirmat: sed malè vel Cordi iudicio. Ruellio etiam teste, Staeten Officinarum & Medicorum vulgus Syracem liquidam quoque appellant, de qua postea. Amatus insuper malè statuit nezuinum esse Myrrham.

Nec Ruellium praeterit Graecos etiam interduci Staeten pro lixivio, quod cineris clotio est, usurpasse, sed vel addere, vel subaudire.

Staete, Gutta, & pinguis sinus Ros Myrrhae. Nomina: Graecis: *Myrrha*: Hisp. *Syracem liquida*: Ital. *Storace liquida*: Germ. *Storax*.

CARPASVS ET OPOCAR-

CAP. XXXIII.

QUAMQUAM minime constet quid Carpasus & Opocarpasum veteribus sit, non tamen praeteribimus, quin annotemus id, quod Diosc. Gal. Aëcius, Aegineta, Plin. Hermol. Rob. Const. Gorth. Matth. Corn. & Amatus de his posteritatu transierunt.

In sit Diosc. in Alexipharm. cap. 3. Epotus, quoque Carpasi succus [i. e. *Carpasi*] soporem inducit, ac repentinam strangulationem infert. Adjuvantur itidem, qui hunc hauserunt epotus citius remedia. Sed ut Galen. lib. 1. de antid. cap. 12. perhibet, in optima Myrrha [i. e. *Myrrha*] Opocarpasum reperitur, quod tamen à Myrrha differt. At Opocarpasum exitialis est, multosque nos forte quadam vidimus, nostrae aetatis decursum in

*Opocalpasum exis-
ale Myr-
tha adu-
sum.*
Oculis.
Exitale.
Capilli.
ri, quod Myrrham, cui Opocalpasum admistum esse nesciebant, assumpsissent. De industria namque qui Antidotos conficiunt, tanquam optimam talem Myrrham imponebant, eod quod viderant ipsam in collyriis optimam fuisse medicinam. Nempe saniem absque mordicatione extenuat, & interdum incipientes oculorum suffusiones, & adhuc tenues aufert. Atque sive in Emplastrum, sive in Ceratum, sive in extenuans aliquod medicamentum foris imponendum, talem Myrrham coniicies, remedij vim augebis. At intra corpus assumpta exitum affert. Succo huius illine [Capillos] & manebunt crispi ac nigri.

*Nocumen-
ta.*
*Remedi-
um.*
Nunc quid Aëtius apporet, percipiamus: Carpati succus potatus soporem graviores inducit, & sensus hebetat absque dolore, exudationem etiam facit & repentinam suffocationem cum exituosa saniei reiectione. Opem verò sentiunt ex his, quibus curantur, qui Cicutam hauserunt & toxicum, atque item Ephemerum.

Carpesia.
Nec recedit ab his Paulus Aegineta, dicens: Et [ὁ τῆς καρπείας ὄντος.] Carpesia liquor potus, soporem & strangulatum precipitem inducit. Eodem remedio, quo & Cicuta, auxiliatur.

*Reme-
dium.*
Sed Plin. Alinino lacte potio vengna restinguit, peculiariter, si Opocarpasum [Dalech. Opocarpasum, Diosc. Aët. Aegin.] potum sit. Qui & contra Doryenium echini maximè prodesse scribit, & iis qui [Dalech. Carpati] Gal. & Diosc.] bibeant, præcipuè eius iure sumpto [præcipuè iure sumpti Dal.] Hermol. quoque apud Plinium (& iis, qui succum Carpathi biberint) legit succum Carpathi non Carpathi: quem Diosc. & ceteri Opocarpasum & Opocarpasum appellant inter venena. Adstruit præterea, quod cinis crematorum muricum potus contra Opocarpasum [Dalech. Opocarpasum ali] antidoti vicem obtineat. Legit idem contra Doryenium aut Opocarpasum, & non Doryenium aut Opocarpasum. Esse autem Opocarpasum id, quod Plinius aliquando succum vocavit Carpathi. Apud Diosc. verò ait Opocarpasum, h. e. lac Carpathi, sive Carpathi, ut Diosc. appellet, sive Carpathia, & Carpesia, ut Paulus, ex eodemne sint genere, an diverso non constare. Illud certum esse inter delecta venena ponere succum. Notat Rob. Const. apud Plinium succum Carpathi, pro Carpathi: & Opocarpasum, pro Opocarpasum legi. Apud Paulum verò pro Carpathi, corruptè scriptum esse Carpathi: palam quoque apud Galenum depravatè legi Carpathi. Sed Diosc. & Gorrh. legit, definiens succum esse quendam venenatum & frigidum. Quid autem sit Carpathi non constare: Hoc vnum certum esse, non esse, quod dicitur Carpesium, sed maximè diversum.

*Les.
Carpesia.
Carpesia.*
*Carpesia
male apud
Paulum.*
*Carpesia
non est.*
Quodnam hodie plantæ genus nobis Carpathi dici possit, fateor [inquit Matth.] me ignorare. Paulus Carpesiam vocat. Si quis asseret Opocalpasum, de quo scripsit Gal. lib. 1. de antid. & Opocarpasum à Dioscor. descriptum, vnum & idem esse medicamentum, is, meo iudicio, rem, veniunt, acutè tetigisset. Licet idem Galenus non Opocalpasum, sed Carpathi mentionem faciat, tum lib. 1. comp. med. lib. 1. tum lib. 5.

*Carpesia
falsè.*
Hanc Matthioli sententiam recipit Cornarius, cuius etiam testimonio, falsè Carpathi legitur apud Paulum. Quamvis in Galeni exemplis vulgaris Carpathi legatur: tamen non dubium est, ipsum de eodem Carpathi succo loqui, de quo Paulus, Aët. & Plin. Sed quæ de Calpaso mens Amati sit tandem percipe. Galeni tempore Myrrha adulterabatur succo arboris Calpasi dictæ, &

de succus iste Opocalpasus dicitur, omnino venenosus, & vitæ humanæ adversarius: quæ verò arbor sit Calpasus dicta, aut eius succus, non opus est scire, cum humano generi inimica. Ecquid? divinatorne vel somniat Amatus, ne dicam infans? Galenus non declarat, an succus sit arboris, vel herbar. Opus mehercle scire foret, quale sit Opocalpasum, quo adulteratur Myrrha evitandi periculi causâ, idè decebat Galenum ostendere, discrimen inter Myrrham & Opocalpasum, ut posteri ab ea cavere possent: quinimò utile fuisset indicasse symptomata, quæ assumpto Opocalpaso subsequuta essent.

Meinnetimus autem ex iam dictis, quod Carpati succus, ab Opocarpaso, aut Opocalpaso, non aliter quàm nominum duntaxat varietate differat. Aut vana prorsus est illorum opinio, qui credidere [inquit Matth.] Carpalum, Carpesiam, & Carpesium vnam & eandem esse plantam. Nos de Carpesia Hist. nost. gener. lib. 17. iuxta Valerianus. Quæ tandem planta sit Carpalum, nondum apud Græcos invenit. Corn. reperit tamen ex Barbaris, qui Carpalum, sive Carpalum arboris esse dicant, quæ item Oxyacantha vocatur. Sed incerta res est: nec satis tutum Barbaris de Græca voce pronuntiantibus fidem habere.

BDELLIUM.

CAP. XXXIV.



BDELLIUM veri Descript.
Nominis magnas habeo glebas, Taurino glutini, ut habet Dioscor. aliquatenus similes, colore, inquam, ex fusco nonnihil rufescente, concretionèq; quæquam hac molli & tenaci, ad gummi magis accedente: sapore sub amaro est, multum tamen à Myrrha relinquitur. Odorem non insuavem spirat, flammamq; concipit, & quidem

perstinacem, licet cum crepitu. In superficie granula exsudantis glebæ hinc inde apparent. In glebarum mediis subinde digitalis crassitudinis bacilli reperiuntur, spinosi. Exterior facies glebarum aliquando Myrrham vulgarem refert, coloris ferruginei, sed non tam intensi amaroris. Aliæ glebæ pro Bdellio adulterino exhibitæ, nigricantes, micis [scindantur] pellucenibus, aliqui visus aciem nequaquam admittentes, consistentiæ & sapore gummi, cuius modo tenaciter dentibus hærent: concipiunt tamen flammam, relicto interim crassamento copioso.

Bdellium, Βδέλλιον, quod alij Βδέλλιον, alij Βδέλλιον nominant, lachryma est Officinarum trivialis, Saracenica [quædam potius, ut habent Plin. Galen. Onbas. Matth.] arboris, quæ tamen raro bona, & sincera, qualis à Diosc. describitur, habetur:

cilè colligi possit, quid intelligat Diosc. Eò ta-
men inclinatur animus, ut putem humanum un-
guem intelligi, quod Plinius de Bdellio differens
Bactriano ungues reddat candidos. Id quod vi-
detur etiam Bdellio assignasse Damocrates in suis
carminibus, quibus cyphos compositionem ce-
cinit, & quæ à Galeno referuntur. Bdellium tuum
Qualcebone, cum nigro sit colore, nec ulli in
parte pellucidum, nec suffitu odoratum, sed vi-
rus potius redolens, cur id legimum dicam non
habeo. Quandoquidem sola amaritudo, quæ illi
inest, ut cæteris scilicet lachrymis, ac resinis, non
sufficit, aliis non ad stipulantibus notis, ut adul-
terinum hoc Bdellium, legitimum faciamus. Ha-
ceterus Matth. apud quem C. Bauh. has sex diffe-
rentias habet: 1. Maioribus glebis rufum, &
cû frangitur in plurimos grumulos dissiliens,
mediocriter splendens: 2. Minoribus glebis sub-
fufum, intus rufum, cû frangitur in duas par-
tes quasi dissectum se dividens, translucens, den-
sum, lentum, glutinosum, pingue & lachrymas
albas calido in loco emittens: 3. Nigrum, intus
nigro rufum, glutinosum, mediam inter Thui
& gummi Cerasorum qualitatem respiciens: 4. Ni-
grum quoque, sed intus fufum, purpureo colo-
re, maxime translucens, molle, glutinosum,
Cerasi gummi simile, eiusdemque saporis: 5. Co-
lore & sapore puori simile, sed intus pallidus, aut
candicantibus maculis distinguitur: 6. Palli-
dum, aut candidum, grumulis oblongis, medio-
cibus, multis, longis, guttis densatis concre-
tum, amarum, ingratum, omnibus speciebus a-
cerrimum. Eligendum porro scribit in quovis
genere, aspectu cû frangitur, nitidum, cornu,
aut taurino glutini simile, magis translucent,
pinguius & mollius, cû hoc recens indicium sit.

Myrrha verum Bdellium præferendum sit, me-
riò ambigunt Lob. & Pena. Etenim quod Bdel-
lium putatur, quia certo sciunt, & à Rondeletio
experimentis persuasum, optime viribus Myr-
rhæ respondere, putant illud Myrrha legem ef-
se, nec vulgare rationis momentum istud. I on-
dinum superiore anno allatæ multæ peregrinæ
merces fuere, inter quas quamplurimos huiusce
ligni succulos expiscari sunt, solidâ substantiâ cor-
tice duro, nigricante, spinis multis & rigidis, cras-
sifusculis, horrentes, quibus multa copia Bdellij
erat aggregata, intus, forisque valdequam, amari:
cætera descriptioni Dioscoridis perquam similia.
Idem aiunt alibi Bdellium, quasi olidum puti-
dumve dictum. Qui de odore eius velitantur, sci-
unt accipiendum Bdellium suffitu Zedæ, sive o-
doratum, dici à Diosc. quemadmodum vnguis o-
doratus, Castoreum, Muscus, Styrax liquida, Ca-
phura, aliæque multa, quæ velementer fœtent,
aut ingrata sunt. Cû Myrrha & Bdellium pro-
ximè alteram spinosâ arbor describatur, & gum-
mi aded simile effigie fundat, voluerunt qui-
dam, non nisi tanquam sylvestrem à Saliva Myr-
rhæ distare Bdellium. Porro Myrrha descriptio,
quam dant, non est ita diversa ab ea, quam Pli-
nius Bdellij scripto reliquit, Bdellium notissimam
arborem, nigram, magnitudine Oleæ, folio Ro-
boris, fructu Caprifici, naturæque. Quem Capri-
fici quadantenus effigie fructum, industria peri-
tissimi exoticarum plantarum Clusij in versioni-
bus à Garcia habemus. Obi. autem Bdellium &
Bdellij fructum nuncupant. Hist. insuper Belg.
Fructus, quem Clusius adellium suspicatur, quem-
admodum ipse nuper monuit, videtur Cucio-
phori esse, quem ad librum de arom. in hunc de-

scribit modum: Juglandis Nucis magnitudine,
aut etiam amphior, triangulari ferè formâ, oblon-
giore tamen, & ad Ficum quoddammodo acce-
dente, odoratus, colore subcinereo, densissi-
mo putamine, quod prægnans esse, & nucleum
continere videtur.

Figura nostra, quam proponimus, est ex Lobe-
lio. Nos simile sanè lignum spinosum, cum adel-
lio à nobis descripto, observavimus. De fructu
pro adellio exhibito, sub Cucio-phoro tradetur.
In Iconibus Plantin. figura Ligni & spinæ adellij,
malè posita est sub titulo Laccæ. Exhibet ico-
nem Hist. Lugd. sub hac inscriptione, Myrrha aut
adellij suo succulo spinoso hærens. Pena Herb.
ant. lo. Cuba tradit adellium Serapioni Arab. vo-
cari *Metalyend*, & provenire in Hispania. Ex hac
arbore provenire gummi dictum de Meka: de
adellio proveniente in Meka, scriptum esse Ge-
nes. 2. In Paradyso arbor cuius fructus est satis
dulcis: Esse etiam adellium Indicum, ac adultera-
ri gummi Cerasorum aut Pyrorum. Herb. Cu-
bæ pro adellij icone habet monstrum figmen-
tum. Neque in Pyris nos observavimus Gummi.
adellium porro in Hispania provenire Euch. Ro-
els. quoque scribit, & Hispanicum in his frigi-
dum esse, Indicum verò calidum: sed his quem
hæc de re aligent, non habent. Quò gentium
adellium exilatum voluit?

Bdellium quidem ab aliquibus (teste Plinio) AEquiro-
cedunt Scordastus arbor, & multi gummi adellij,
cuius cortice idem adulterant. Dicitur Arabibus
adellium de Meccha arboris fructus Avicennæ.
Serapioni autem de Meccha arbore Iunci folio.
Audit Cæsalp. in Sicilia ex Palmis his (quas Cæsalio-
nes vulgò dicunt) effluere gummi odoratum, quod
genus adellij fuerit apud Arabes. Habetur tan-
dem adellium Cucio-phoros.

Quidam somniant communem Myrrham
legitimam esse adellium, teste Matthiolo. Sunt
qui Anine verum adellium esse putant, inquit
Clusius, ob multas, quas habet cum adellij hi-
storia notas communes, de quibus suo loco di-
cimus. Olivo teste pro adellio alij intelligunt
Carbunculos, & alij Crystallum. Mast. pro adel-
lio in comp. Cyphos Damocratis Belzuinum
supponendum censet: Nec abs re factum ipsi vi-
debitur si adellij loco selectissimus addatur Sty-
rax. Quidam docti Medici Galienus, inter quos à
Clusio Rondeletius censetur, existimant posse
adellio substitui Propolis. Si quis præterea ho-
nò caruerit adellio, Galeni consilio in istis succi-
dancis (Amato cum allegante, eius loco arborum
muscio utatur. Codex Galeni scriptus de sup-
pos. med. in adellij penuria Sphagnum suppo-
nit, sed cum nulla sit Sphagani Musci arboris)
cum adellio communis facultas, id sanè cum Mat-
th. probare non possum. Cornarus in compos.
Cyphos, ubi vnguinum adellij meminit Diosco-
rides, loco vnguinum adellij apud Aetium v-
nguem odoratum immiscet.

Bdellium, ut nobis author est Dioscorides, &
lescit, & emollit duritias, turgentia guttura, hu-
midasque herthas (*βερρυχθηδον* & *βερρυχθηδον*) discu-
tit, cum ieiuna saliva dilutum (*βερρυχθηδον*) impositum.
Vulvæ spiracula laxat appositum & suffitu, & pac-
tus humiditatemque omnes extrahit, calculos po-
tus communuit, vnam movet, rufientibus & à
serpente percussis vtilissimè (*βερρυχθηδον*, vtiliter) da-
tur. Valet ad rupta, vulla, laterum dolores, & dis-
cursantes spiritus. Malagmatis interitur, quæ con-
tra duritias, & nervorum nodos profunt: consu-
sum verò resolvitur. *βερρυχθηδον* vino, aut aqua calida.

Scyphosoma

Figure 1

**Franchers-
Is.**

Thanks.

Galenus verò idellij facultates describens, ita inquit: idellium, quod Scythicum nominant, quod sanè & arsius est, & resinofum magis, emollientis admodum est, & efficacis virtutis: at alterum, nempe Arabicum, quod dilucidius est, magis deâccat, quàm emollientia. Igitur quod recens & humidum est, & contusum faciliè mollescit, & ad omnia, ad quæ Scythicū idoneum est: at quod antiquius est, & admodum gustu amarum & acre, & siccum, ab eorum, quæ indurata emolliunt, mediocritate recedit. Utuntur autem quidam illis, & potissimum Arabico, & ad bronchoceas & hydroceas, saliva maturâ, ieiunâque, subigentes vt emplastri consistentiam accipiat. Porro Arabicum & calculos renum in potu sumptum frangere apparet, tum viuas ciete, & crudorum flatuum discursus, | cæterea laterum dolores & rupturas perlanare. Idellio etiâ maximè pro laxandis atque emolliendis tumorib. vtuntur.

BELENIZAN AVT BELENZAN

AYERREHOIS.

CAP. XXXV.

Nominum saltem, si res non altere confinitas
effecit, ut quidam, auctore Garcia, *Belenzan*
existunt esse *Benivinum*, quæ quidem opinio
ei non placet, ut mox apparebit ex eo capite, de
Benivino.

Cæterum Belenizan [ve tradit Averrh.] aut Belenizan, siue Petrosan, exsiccantem & calefacientem in secundo excessu habet facultatem, stomachum humidum & languescentem exsiccatur & roboratur, oris odorem commendat, partes corporis confirmat, & venereum excitat.

Quod ex hac adeo lucida & brevi historia per-
suadere sibi non potest Garcias, esse Benivi quod
sequenti capite describitur, quod si quis tamen
contra sentiat, per ipsum licet.

BENIOINVUM, CVIVS ARBOR

FOLIO CITRI.

CAP. XXXVI.

* Benzoin
resin.
Color.

Project.
Description

Order.

Control.

Arber e
Garcia.

**Conder
Felix C.**

RESINA nomine Benioini Officiis cognita, magis constat glebis inæqualibus, puris, nec vlla ferè sordè vt plurimum infectis: colore sunt massa aliàs rutilante, aliàs magis ad albedinem vergente, & creberrimis ceu vnguib, aut Amygdalarum striatura remissa: verum in rutilis istis massis obscurius lucens vngues, in aliis candidi admodum, sed non ita pellucidi: substantia omnibus satis compacta, sed vel attritu digitorum in pulverem friari potest, nec quæ sub denubus lentescat, saporis ferè expert, verum odor suavissimus, qui accenso vegetior. Eadem interdum adhærescens, invenitur coctæ, qui magis satis æboris suspicionem iniicit, fors rugosus, ad cinereum inclinans, substantiâ compactâ, colore intrinsecus ruffo, ceu Canelle, qui gustanti nihil præter siccitatem quandam offerre videtur. Hæc nobis de Resinâ ista nobilissimæ compacta.

Arboris faciem tradit Garcias: Arbor, inquit, Benivifera proceræ est, vafte, pulchra, magnam fpargens umbram, ob ramorum frequentiam, quos pulcherrimo ordine digeffos, & in ætemelatos habet. Caudice eft craffo, materie prædura & limba. Eius folia parum aceto condita, parti.

adhuc adhaerentia accepi : minora sunt et agra-
tum Cici, sive Limonii foliis, non tamen adeo
virentia, sed parte adversa candicantia, quae ve-
rò in ipsis maioribus ramis nascuntur, ad Salicis
folia magis accedere videntur, latiora tamen sunt,
sed minus longa. Vulnerantur arbores, ut gum-
mi, quod est Benivi de *Bonina*, emittant, quod
est ex provincia Bayrros, idque praestantius est eo,
quod in Sian nascitur : natum verò in Sian reli-
quis generibus praestantius est.

Benivi plura sunt genera. Id autem maxime mercatoribus expetitur, quod Amygdaloides vocant, quodque vngues, seu maculas candidas admixtas habet, Amygdalarum instar : quod enim pluribus huiusmodi maculis abundat, tanto prestantius habetur. Maxime id provenit in Sian, & eius contermina Mirtaban. Erant illæ provincie supra regnum Malacam ad fluminem Arx & Manan in Oceanum Indicum influxum supra Gangeticum sinum. Eius meminisse puto Antonium Musam, idque permixta eius radicum scobe adferri asserere: sed falso, quandoquidem vnum idemque est gummi, aliud videlicet crassiori consistentiâ, aliud liquidiori, & aliud non plene durâ, quæ deinde à Sole exusta magis albet. Id Benivi sic exsiccatum nonnunquam in farinam resolvitur, quam Musa radicum scobem esse putavit.

Aliud genus nigrius invenitur in Laia & Samatra, quod vilioris est pretii. Est & genus nigrum in Samatra novendis arboribus profutens, quod ab odore grato *Benivi de Boninas* vocant, id superiore decuplo carius est: quod sapidis existimavi nihil aliud esse, quam *Benivi* cum cum *Syrace* liquida, quam *Chinenses Rosamalba* vocant, permixtum, quod volui semel experiri, mixto *Benivi* cum *Syrace* liquida. Sed licet *Benivi* sic permixtum vulgari odoratius esset, odoris tamen fragrantia & suavitate à *Benivi de Boninas* superabatur.

Cæterum neri i è novellis plantis profluens Amygdaloide odoratus est, causam esse puto, quod gummum multum nativæ suæ fragrantie virtute amittat, ut ferè reliqua huiusmodi. Sed quia candidum elegans est, nigrum verò & novellum odoratis, utrumque permiscere solent, ut odoris fragrantie etiam elegantiam concilient.

Atque quodque odorata non est semivinum, tam
metti nonnulli docti vici in ea fuerint sententia.

Nunc illud restat, ut nostram sententiam his
argumentis comprobemus.

Nenunem venivi inquam in condimenta rece-
pisse certum est; Asæ verò sætidæ frequenter
vltus condiendis cibis apud Indos. Althæmæ
ma pars Lasæ (Asæ sætidæ) ex India ultra Gan-
gen advchitur. Venivi verò, quod in Indiam ad-
fertur, quodque Amygdaloides vocant, nascitur
in Samatæ & Sian [non in Armenia, aut Syria
Africæ, aut Cyrenæ] eiusque maxima pars huc
convehitur: deinde in Arabiam, Persiam, & A-
siam minorem defertur, atque etiam [vt ex viro-
rum fide dignorum relatu intellexi] in Pala-
nam, Syriam, Armeniam & Africam. Anton
Musæ imposuerunt igitur i Lusitani, qui incolæ
apud quos nascitur venivi, id gummi etiam nunc
Lasæpitium vocare significarunt: quandoquid
ab indigenis *Comuham* appellatur. Ad Ruell
autem obiectionem, quem capite de Lasæ, *Im-
peratoriam*, *Lasæ gallicum*, atque *Officinatum* *Ban-
vinum* esse, contendere scripsi, sic respondeo. Cui-
us inter reliquas Imperatoris facultates hanc
tribuat, vel libidines extinguat: in Lasæ veni
demonstratum sit eo veti ad venerem excitat

Artemisia
scorpioides
Locus.

Beauveria
Beauveria
Beauveria
Beauveria

Alfred S. ...
...

Notas:

~~Revised~~
- 18.

Chief:

Benjamin et
-muelle par
-muelle.

5. *16. 11. 1991*

Don't miss
any essential
features for

Lafayette

Remedy

**Experiments
Conducted.**

1992

Letter of

h-folletur.

Imperatoria Lasctis genus esse non potest.

Nostrum Benivi veteribus ignotum fuisse omnino puto: siquidem nec Graecorum quempiam, neque quempiam Arabum hoc describere mentiri. Veteribus etiam Iudaeis ignotum fuisse, ex eo conicere licet, quod neque David, neque Salomon eius meminerunt, tamen odores & sumenta summo per e commendarunt.

Fieri autem potest ut Ruellius in eo, quod Benivi, Ben Iudaeum vocat, lapsus fuerit nominum affinitate, debueritque potius nuncupare *Beniazoy*, id est, filium de laza, ubi plurimum nascitur.

Scribit Mediolanensis quidam naler Benivi in monte Paropanisio, & praeter Macedones quosdam, qui in Monte Caucaio, odoratissimi, nostrorumque multis praestantissimae vidisse afferre hanc. Ludovicum etiam Romanum citat.

Ego vero neque huc Mediolanensi, neque illis Macedonibus facile crediderim, quandoquidem videre licet huc commeantes tot Thraces (quos *du Rumes* vocant) & tot Turcos, qui Benivi mortuum gratia hinc transfuehant: quos, si apud eos, Benivi nasceretur, alias potius merces, quae maioris essent emolumenti & questus, transportaretur credibile est. Fieri autem potest, ut illi Macedones Syracem pro Benivi intellexerint: sed tamen nullibi Syracem nasci scimus, praeterquam in Aethiopia, ubi etiam Myrrha reperitur.

Benivi genera vocantur *Chinensis* *Cominham*, ab Arabibus *Beniazoy*, quasi dicas Thus de laza, quod haec regio primum Arabibus innotuerit, Arabes enim Thus *Lovan* dicunt, Guzarate & Decan incolae, *Ido*.

Scaligeri descriptio, quae est exercit. non parum variat, tam autem integrum hic subiciamus: Est mihi, inquit, arboris ipsius furculus, in meis Mutarum thesauris, etiamnum aliquid de Beniovin retinens ac spirans. Quin compressus nonnihil leni succi, qualis est Beniovin, remittitur. Quem a Ioa. Valada ex India delatum dono accepit. Is, ait, arborum esse, Amygdaliferae, folio longiore: nullum ferre fructum, praeter oblongas siliquas, compressas, oleo plenas, non semine: quo ex oleo ipsa conficiunt Beniovin. Surculi confectio molliolenta, striata, qualis foliis Caricis, aut Palmae arefactis.

Beniovin & in Java habetur (Linschot. testimonio) sed copiosissime in Baros & Speriamen, quae duo sunt loca in insula Sumatrae Indiae Orientalis. Appellatur ab incolis *Miguan* vel *Comignan*. Beniovin alium quoque care vendunt, ac ipsum etiam Caxas in Java. Pari enim pondere vendunt, nec dispari pretio. Nigrum vero triplo carius venditur quam Caxas. Est & genus quoddam ibi quod Beniovin vocant *Auendado*, fragile, atque fragile, quales ferè sunt Amygdalae contusae, quod ceteris bonitate praestat. Omnium vilissimum crescit in *Palmaban*, & Sumatra.

Meminit etiam huius Alois. Mund. in exam. ad Brall. Quam recte agant, inquiriens, hi (e quorum numero est etiam Hieron. Eugub.) qui eo, quod belzuinum vocant, Myrrae loco utuntur, viderint ipsi: certum enim est (ut alia omittam) omnis illud amaritudinis expertum esse.

Officinae hodie duos habent succos spissos quos aliqui gummi esse putant: alterum vocant Asam dulcem, alterum Asam fetidam. Hos ego inquit Corn. esse credo Silphij succos, sed unde allatos, non satis constat. Cyrenaeum sita reate interisse scribit Plinius, nisi fortassis polles re-

natum fuerit. Inde certe dulcem Asam esse verisimile esset, sicut ex Medico & Synaco fetidam. Nam Medicum & Synacum Silphij succum Dioscor. virosi & graveolentis odoris esse testatur, sicut Cyrenaeum lenis & grati. Ex Indicis navigationibus hodie utrumque ad nos afferri satis notum est. Nam illorum lingua belzoi nominant, quod Latine sit Laseer, ipsi naucae testantur. Et Asa vocem ex Laseere esse corruptam minime dubium est. Fetidam propter graveolentiam, nostri vulgo *Merda Diaboli* appellant.

Ruell. acivinum Officinis, sive Ben Indsum, quod Iudaei patens huius, mittit ad nos prolem suam. Andern. libello de peste vocat simpliciter *Ben* & *Ben Iudaeum* ac ibidem etiam per Asam dulcem, sive Laseeritum incellgit acivinum: in catal. vero Franc. belzoinum & belzoinum.

Cord. in Diosc. erroris eos accusat, qui Asam dulcem, sive belzoi, verum Laseeritum esse putant, in quorum numero est Ruellius, qui acivinum pro belzoinum scripsit & interpretatus est prolem Iudaei parentis, cum tamen ex India adferatur. Idem in hist. belz. ubi, sive ac zoi, quod etiam Asa dulcis appellatur. Lang. vero de belzoino sententiam vide ante caput de Myrrha.

Cetero, beniovin (pergit Scal. in Card. exerc. 12.) quod vos Itali *belzoi* dicunt, falsò putant esse Laseer ab India: nec verum est, quodammodo Variomano scriptum in suis Navigationibus de Laseere fieri belzoin ac qui Latinum fecit, incertam addit audaciter manifestam.

Costa in Leadem ferè tradit de *Beniovin* (ita enim cum Garcia vocat, quae Garcias, reprehendens Ruellium, Musam, & Mediolanensem, negantque esse Asam, vel Laseeritum, ac addens Matthiolum dicere, se veritate victum, coactum mutare sententiam: ut & Monachos in Mesitem dicere Cancamum non cognitum, quamvis aliqui belzoinum existiment. Cancamum adhuc non esse belzoin, ut bene annotavit Amatus. Atque etiam apud Valleriolam Laseeritum Indici Lachrymam, vulgo belzoin vocant.

Lob. & Pena Adv. belzoin recentiorum non est succus Cyrenaeus, sed inventum recentioribus, & a Cancamo differt. Et alibi belzoin non est Cancamum Diosc. Licet censent Angul. & Montano persuasus belzoin esse Cancamum. Si quidem is dicat epist. 1. Cancamum pronuntio cum Montano nihil aliud esse, quam belzoinum, & corruptum textum ubi dicitur sapore iugundo, quod demonstrari potest ex Paulo, & Serapione, ut etiam ostendit Matthiolum. Sed animus inclinat Agricola Laseeritum lachrymam illam esse, & se belzuinum vocatam.

Agricola partes suscepit Math. quas postea infumavit. Credidimus iam dudum Laseeritum lachrymam nihil aliud esse, quam illud iugundi ac suavis odoris gummi, quod Pharmacopoeis atque Unguentariis belzoinum nominatur. Verum cum postea cepissem Laseeritum ac Laseeris historiam diligentius examinare, facile in aliam deductus sum opinionem. Id gummi, quod Sepias belzoinum dicunt, meo quidem iudicio; verum Silphij liquorem mentietur potius, quam sit. Valdi cornices, qui plerumque belzoino implicati repenuntur, arguunt id arboris magnae potius, quam ferulaceae plantae lachrymam esse: quod etiam nuper recitit mihi quidam Medicus Cyrenaeus, qui belzoinum nostrum in Cypro ex arbore sauis procera manare affirmavit. Quid autem veteribus fuerit gummi illud elegantissi-

Veteribus ignotum

Ruell. Laseer. Ben in. dam.

Locus.

Lud. Rom. 100.

Cominham Lavanioy.

Scalig. de f. ripit.

Miguan. Comignan.

Caxas.

Auendado.

Substientia Myrrha.

Asa dulcis. Silphij.

Belzoi.

Merda.

Diaboli.

Ben Iudaei.

Ben.

Asa.

Ruell. error.

Laseer non.

Error quod innotum.

Beniovin.

Cancamum non est Laseeritum.

Angul. not. quod Cancamum cum Montano.

Beniovin esse belzoin.

Laseeritum.

Belzoinum non est ferulaceae planta.

Ex arbore sauis.

HISTORIAE PLANTARVM.

inum, quod benzoinum appellant, mihi hactenus incompertum est. Non enim est, ut quidam volunt, probatissima Myrrha. Idem hinc. Germ. benzoinum pretiosum est gummi & odorum ex India, alio nomine Asa dulcis dictum ad differentiam Asa fetidae. Sunt enim, qui hoc gummi, Laserpitium esse putent, sed falsum.

*Laserti-
tium falsum.* Camer. ad Matth. Arbor, quae benzoinum fert, magna & procera est: folia minora, quam Limonium, altera parte incana: locum autem, ubi provenit, non facile est adire, quam magno agmine armatorum propter Tigrides.

*Matth. re-
preh.
Non Laser.* Ex Theoph. & Diosc. didici Turnerus & Matthiolum, & quicumque benzoinum putant esse Laser dulcis Cyrenaicum, graviter errare. Theophrasto enim & Dioscoridi Laserpitium herba est, quotannis interiens, saltem quoad caulem, & succum, cuius succus, exsiccatum sit Laser. Scimus autem ex fragmentis ramulorum ligneorum admixtis, cum experientia Ludovici Romani (quem etiam etiam Matthiolum, alius scilicet contra seipsum arma subministrans) benzoinum, sive benzoinum, & sinam esse arboris cuiusdam, non autem herbae lachrymam. Quod autem ad Asam fetidam, non negaverim esse Laser Medicum aut Syriacum, ut Matthiolum & alij docuerunt.

Asa fetida. Amato praeterea benzoinum non est Cancanum, sed Arabum Asa odorifera, quam ipse Silphium, sive Laserpitium odoratum vocat, praecipue subnigrum, quod Lusitani à *Bumma* appellant.

*Benzoinum
Amygdalinum.* Diffinit praeterea lachryma ex arbore incisa, quae Myrrha dicitur. Aliquando tamen in truncis ipsius arboris, lachryma ipsa concrevit. Quae omnibus praestantior est Troglodytica, hodie apud Lusitanos, simul & reliquos Hispanos in Officinis, sub nomine benzoini Amygdalini, recepta, levis, subnigra, undique sibi concolor, fragilis, quae contracta, album quid, ungues humanos, vel Amygdalas dealbatas referens ostendit: unde Lusitani qui ex India eam adferunt, benzoinum Amygdalinum vocant, ut inter eam & alteram nigram, proprie benzoinum b. nigrum, sive ut illi dicunt, à boninas differentiam ponant, de quo cap. de Laserpitio sermo agitur. Verum inest huic, de qua agimus lachryma, Myrrha Troglodytica, quam Hispani benzoinum Amygdalinum (ut dixi) vocant, sapor amarus, odor vero bonus, sed ita acer & vehemens, ac intensus, ut omnes assistentes, quum ex ea suffusiones hunc, in sternutamenta prorumpant, quae de causa indies ab Hispanis magis despiciunt, delicatioribus odoramentis abundantibus. Hanc odorem coniectans Diosc. gravem odorem Myrrham habere dicit. Gal. vero lib. de Antid. eam gratissimi odoris esse tradit, quem ita esse deprehendimus, intensiorem tamen: sed animadvertendum, quod Gal. ibidem à Diosc. discrepat, quia Myrrham Mineam à regione, in qua nascitur, sic dicitur, praestantissimam facit, quam tamen Diosc. ut improbam, & ceteris Myrrhae speciebus peiorem, derelinquit. Hanc vero lachrymam benzoinum Amygdalinum dictum, raro aut nunquam Italia vidit, quae de causa non mirum est, si Marnardus vir diligentissimus lib. 1. suar. epist. dixerit, non solum optimam, sed etiam bonam Myrrham caremus: ex hac vero Myrrhae specie *Stallo* praecipue conficitur, ac destillatur cum colore, tum odore & sapore illi maxime conveniens. Ceterum vulgata & communis Myrrha, Diosc. Cautalis est, arida, colore nigro, & velut ab igne torrida, quae ex

*Gal. de re-
par. à Dio-
scorido.* *Minea.* *Adversus
Marnard.* *Stallo.* *Vulgata.* *Cautalis.
Locus.*

India quoque, praecipue insula *Fenica* dicta ad nos adfertur. Hanc vero falso nonnulli bellum apud Diosc. esse contendunt.

Quid Amatus intelligat difficile est scire: dubitamus enim, an eam intelligat, quam nos exhibemus pro Myrrha Troglodytica, quia dicit vocari benzoinum Amygdalinum, quamquam capite de Laserpitio aliud habeat, quod dicit vocari benzoinum boninas, quod quidem dulce est, ac à Langio existimatum Myrrha, cui Spinioni se opposuit Aloisius Mundella. Nox tamen, quas tribuit Amatus suo benzoino Amygdalino, vera Myrrhae conveniunt, quam exhibemus. Monachi in Mesuem dicunt, se nunquam vidisse Myrrham, & eam, quae vultur aromatari, non esse eandem Myrrham, quod si sit, esse Ergasiam: autem praeterea non spernendum iudicium eorum, qui dicunt vulgarem Myrrham esse bellii speciem. Baechanellus dicit nos veram Myrrham non habere, nisi forte nostram, Cautalis sit, vel Ergasine Diosc.

Quicquid porro dicat Amatus, non existimo, in benzoino Amygdalino, vulgo vocato, reperiri ullam amaritudinem, quod & alij testantur, nec ullum benzoinum amarum novi: quae occasio, ut nullo modo Myrrham censcam, nec etiam verisimile est, Laserpitium, sive Silphium esse, cum herba fuerit. Bellii autem arbori, inepte etiam germanicum nomen *Maisterburg* additum. Langio etiam & Monachus non assentior, ut antè indicatum, benzoinum esse Myrrham. Odoratum Asa genitum, inquit Apollo, à paucis annis illustres medicamentaria indagatores, id quod Laser Cyrenaicum, vulgo benzoinum, multo ante Cardanus & illustrarunt, & approbaverunt. Matthiolum tamen priorem suam opinionem contraxit, benzoinum haud esse Laserem odoratum primum ex Sabone defendit. Vbi vero Laser, vel Asa, sive succus Cyrenaeus simpliciter scribitur, benzoinum accipiendum. Montuo Asa dulcis, & Benzoinum dicitur: Cardano & Gualtero Asa dulcis, Benzoinum, Benzoinum.

Toxites in Onom. phitol. Benguin / Wolrie dender Laser / Wilder Giansbaum / arb. tre-
mula arbor Giansi sylvestris Aspalathus, arbor Cr-
sinus, Aetaraub, Asa dulcis, Asa odorata, Azarath,
Dursifibam Arabi. Pharmacopoeum Poxitem de-
scribit compositionem cuiusdam medicamenti in-
ta instituentem, quod tot plantis hic misceat.
An Saracen. de peste Laser Indicum seu li-
quor Cyrenaeus Arabum interpretibus Asa di-
citur?

Asam dulcem à secula distinguunt Avicennas: Verumque autem vicem supplere potest benzoinum nostrum: nec est Laser ipsum, ut plerique falso arbitrantur.

Varignana in Secretis de Asa aliquid. Verum ego existimo Varignanam nescivisse quid esset Asa.

Disp. Colonien. Asa dulcis, Benzoinum Taproba-
na insula hodie Idem. Asa corrupte denomina-
ta à Lasere videtur: est autem duplex, videlicet
aromatica & odorata Asa, & fetida. Asa aromati-
ca seu odorata est Laser seu Silphij opus, sive liquor Cyrenaeus, seu potius Indicus hoc tem-
pere. Etiam Indicus etiam Mesue laudatur.
Nam ex Taproba insula in mari Indico usum
hodie à Lusitanis convehitur teste Lud. Romano.
benzoi indigenus dictus. Hae ex Sylvio. Sed fa-
tus est latere Laserem, seu Laserpitium, seu Silphium
non extare amplius, quod praegnantibus ratio-
bus lo. Lang. docet in epist. med. Asa quoque dul-

*Bellium
falsum.* *Amatus
dubius.* *Laserti-
tium
Benzoi-
num.* *Myrrha
Langia.* *Monachi
Mesuem
vulgare.* *Ergasine.
Falsum
Myrrha
Bellii spe-
ciem.* *Cautalis.
Ergasine.* *Amat. ut
latet.
Laserem
nunciam.* *Matth. m-
tatur.
Laser.* *Asa
dulcis.
Succus Cy-
renaeus.* *Asa odorata.
Arbor tre-
mula.* *Arb. Gra-
nati silv.* *Aspalathus
Arbor Cy-
renaeus.* *Toxites in-
preh.* *Sarcasmi.* *Asa dulcis
Benzoinum
Duplex A-
sa.* *Asa ara-
matica
Liquor In-
dicus.* *Laser non
amplius
est.*

cis seu benzoin, quod apud Serap. & Avic. à Grecorum Lasepitio nihil differat, Laseis succus esse non potest. Secundò Lud. Rom. refert belzoin esse gummi arboris, atque Laseis non arbor, sed Serap. & Avic. veteribus est. Quid vero Officinatum Belzoin sive *Affa dulcis* sit, indicabitur paulò post.

Harib. in Ench. Liquor Cyrenaticus aut Indicus non extat in Officinis: Nam is, quem illi ostentant pro Indico & Cyrenatico liquore, quem gummi benzoin vocant, potius est, selectissima Myrrha. Quamquam non desint, qui hunc liquorem, quem Officina peculiari nomine Assam odoratam vocant, legitimum esse negent, quod Affa odorata apud Indos in vasis condendorum ciborum veniat, benzoinum.

Fuchsio de comp. med. Cyrenaticus liquor, Officinis Medicorum Affa dulcis & belzoin, vel belzoin, & belzippum nominatur. Sed qui sub hoc nomine in Officinis proferat, non legitimum, aut saltem quarundam rerum accessione depravatus, quod necacet, neque mordax sit. Præstaret itaque, inquit, succo Lasepitii, Germanici, quod *Med. gestantibus* nominant, posui ad compositionem medicamentorum. Ego quidem contra Fuchsi belzoin non putavi depravatum: sed quia non ell opus Lasepitii: ideo etiam non habet signa.

Camerario apud Matthei Germ. Benzoin vocatur Affa dulcis, de quo legi possit Garcia.

Adolpho Oecomi in phary. Aladulcis, & Benzoin, Benzoin & Benzoin, Laseis.

Ac. Ital. refutat eorum opinionem, qui volunt Affa odoratam esse Benginum atque inter illos Antonium Musam.

Tabern. apud V. Vartung. *Aladulcis*, Benzoinum, Affa dulcis, Officinatum, sive Benzoin vel Affa dulcis.

Hadriano in Nom. *Laseis* Cyrenaticum id est *benzoin*, vulgò *Affa dulcis*, odorata & gummi Benzoinum, Belg. Benzoin.

Rheginus in exercit. *Affa odorata*, pro liquore Syrenatico Galeno usurpatur: Myropoli, inquit ille, Benzoin appellant: Laseis, aut Lasepitium non est. Idem: Laseis liquor duplex: prior quidem Affa odorata Galeno liquor Cyrenaticus dictus, & Benzoinum vulgare Medicis. Ex arbore ferulaceo frutice, non ex herba erumpit utraque Lachryma, sive liquor, cum plerumque cortex adherens vitatur: quod nusquam apprehenditur in barbarum succis, nisi adulteratis. Sed quàm bene sibi constet Rheginus apparet ex iam annotatis & magis apparet in Laseis.

Lacuna in Laseis, Arab. *Alreb* & Affa Castill. Benzoin & Benzoin. Liquor Cyrenaticus Benzoin existimatur.

Monachi huc usque non viderunt propriam & veram odoriferam Affam. Equamvis aliqui, ut Manardus & Brassavolus, velint Benzoin vulgò vocatum esse Affam odoriferam, tamen hoc illis non clarè constat.

Bacchanel. in conf. Affa odorata, Laseis odoratus vulgò dicitur Benzoin. Notat verd non haberi Affam dulcem, & se eius loco succum Glyzyrhizæ ponere, seu potius Belzoin.

Belzoin vulgò appellari Lachrymam ex Oriente advectam: Colligi ex arbore in India ut vult Lud. Rom. aut Lasepitium esse apud Antiquos credere non possum, ait Celsipinus: Hæc præterea addēs Lachrymam odoratiorem appellant Belgioinum de Boninas: suspicor Myrrham esse. De Myrrha Theophrast. Dioscor. similiter tradit Lachrymam Arabice arboris, Myrrha, unde exprimitur Sta-

te, res odorata est, quam Unguentarii in folles confarciunt, digeruntque odoris ac pinguedinis argumentis, ut inquit Plinius. Hæc hodie Belzoin vocatur, alias *Bengiosum*: deest quidem amantudo, gustu enim suavis potius est, quod cum his, quæ à Theophrast. traduntur, convenit. Nos verd Myrrham amaram esse demonstravimus capite de Myrrha, & ideo non potest esse Belzoinum, ut vult Celsip. & alii: Gelsnero in cata]. pl. *Laseis*: Lasepitium: cuius altera species odorata *Affa dulcis* dicitur, sive *Benzoinum*, quasi *Benzoinum* ex sententia Ruellii. At mihi sanè veris arboris Lachryma videtur.

RESINA AMERICANA SIVE CARTHAGINENSIS NOVI ORBIS.

CAP. XXXVII.

DESCRIP. *Resina Americana* nomine Resina, à Descript. D. Paludano communicata Ill. E. C. Aqua nos habuimus, flammescit, odore ferè Picis, sapore lubacri. Hinc forte eadem, eodem nomine ab eodem D. Paludano data, consistens odore & sapore haud ita absumit, colore rufo, perspicua, cum prior visis aciem non transmutat.

Memoit Monard. Resina Carthaginensis, quæ an eadem sit, cum iam dicta, asserere non audeamus, de ea hæc tradit. Nunc etiam nobis mittit Carthago, novi Orbis provincia, resinam quandam purissimam, & odoratissimam, Abiegnam aut Terbinthinam Venetis multò præstantiorem, usdem scilicet, sive maioribus prædictam quam in selectissima Terbinthina. Experientia docuit, nihil iniqui nervorum, articulorum, pedumque vulneribus, & antiquis ulceribus: magna etiam comestio, ea elota & preparata matronæ sibi faciem oblinunt.

LIQUIDAMBAR RESINA ARBORIS OCOSOT NIETA, FOLIS HEDERÆ, ODORIS STYRACIS LIQUIDÆ.

CAP. XXXVIII.

DESCRIP. *Liquidambar* nomine data à D. Paludano Resina, missa Ill. C. VVig. & qualibui, ceram mollie imitatur, coloris ferè melini, non nihil obscuri, odore Styrcis liquidi remissiore, tum accensa, tum non accensa, sapore quoque non absimili. De hac aptem resina ac eius arbore hæc tradit Monard.

Resina, quam Liquidambar, & oleum quiddam, quod oleum de Liquidambar vocamus, ad nos ex Hispania nova adferuntur, utrumque odoratissimum, præsertim oleum, quod delicatioris & suavioris odoris est. Est verd Liquidambar resina effluens in eis arboribus, vastæ magnitudinis, pulchris & ramolis, quarum folia Hederaceis similia sunt, Ocosot Indi vocant, cortice crasso cinereo, qui incisus aut vulneratus effluit Liquidambar emulatur, cum cortex comminutus, odoris causa admisceatur, ut scilicet suavis & diutius spiret in suffutibus. Vbi nascuntur eiusmodi arbores, fragrantissimus est æter odor, aded ut Hispani primum eò appellentes, istuc aromata nasci, atque aded eas aromatiferas esse arbores existimarent. Tanta quantitate in Hispaniam infertur Liquidambar, ut mercium vicem suppleat, vitibus & dolis eo impletis: eo etenim hic vitatur, in-

Resina
substantia
et m. h. j.

Fuchs. nota
est.

Benzoinum

Laseis
et m. Cyrenaticum
et m. affa dulcis

Rhegin. sibi
non constat

Benzoini
substantia

Lasepitium

Myrrha

Descript.

Resina
Liquidambar
Locus.

Arbor.
Hederacea
folia.
Ocosot.

Odor.

Quantitas

Syracis suffibus, odoramentis, pastillis, Syracis liquida loco, cuius odor proxime ad hunc accedit: aded autem validus est, ut celari, etiam suffibus non additum, non possit, & totas ades, si eius sit copia, atque aded plateas suo odore repleat.

Vitis. Plurimus in Medicina illius usus, nam calefacit, roborat, resolvit, & anodinum est. Cerebrum, per se illitum, aut aliis aromatis mixtum, roborat, & doloribus liberat, omnigenosque dolores à causa frigida, emplastri modo impositum, mitigat. Ventriculo adprimere utile, stomachici instar adhibitur: etenim ipsum roborat, concoctionem iuvat, digerit, concoquit, & appetentiam excitat. Cum Syracis, Apibani, & Moschi momento mixtum Emplastrum consistentia, & scuti forma super alutam extensum, omnibus praedictis morbis maxime prodest. Calidum in fine secundum gradum, humidum in primo. Ex eo recens collecto, & sic reposito, ubi per se tenuior eius substantia stillare possit, oleum quod de Liquidambar nuncupant, elicitur, multo perfectissimum, illoque longe suavius. Sunt qui expressione etiam eliciant, ut maiorem quantitatem colligant. Nam chirothecis imbuendis plurimum absumitur. Utile est medicamentum ad plerisque morbos frigidos, nam calefacit, resolvit & omnem tumorem emollit: itaque uteri tumoribus & obstructions prodest, mensesque provocat: calidum ferè tertio gradu. Sciendum tamen est, plerique liquidam istam Syracem ex India inferre, non proinde bonam, quoniam & ramis eius arboris comminutis & coctis pinguedinem innatantem colligunt venduntque pro legitimo.

Emplastrum. Eius arboris pampini & summitates in fasciculos collecti, vestibus & stragulis ab Indis inferuntur, odoris gratia, in eumque usum Hispanis etiam vendunt.

Liquidambar. Advehitur [inquit Clus. apud Monard.] Hispaniam, totius non dicam Barbae, sed etiam Hispaniae celeberrimum emporium, olei quoddam genus ex America, subrubri coloris, cuius mirabiles praedicant effectus in omnibus uteri morbis.

Oleum. Id oleum de Liquidambar nuncupant, eius sane odoris ferè, qui Ambrae odorem a nullo. Id verò ex eo liquore exprimitur, quem de Ococoll arbore stillare, Mexicana historia tradit in hunc modum. Inter arbores Mexicanas memoratur & Ococoll arbor praegranda & venusta foliis Hederæ similibus. Huius liquor, quem Liquidambar nuncupant, vulnera curat, atque cum corticis ipsius polline permixtus, elegans, odoratumque suffimentum praebet.

Expressio ad Chirothecas. Ceterum ad Storacis genera reduci posse videtur Calsalpino, quod ex India Occidentali affertur Liquidambar vocatum. Resina liquida valde odorata apprehensis & arboris corticibus simillimo odore Syracis. Eius arborem in nova Hispania magnam tradunt: frequentibus ramis ac foliis Hederæ, crasso cortice, quo inciso lachryma funditur praedicta: ex hac recenti stillare tradunt per se oleum quoddam odoratum, ac exprimit quoque ut maiorem quantitatem habeant, sed minus perfectum quo chirothecas insciunt.

Vitis. Hist. Lugd. Liquidambar esse dicit ex Ococoll arbore, sed qualis sit ea arbor, non demonstrat.

Arbor foliis Hederæ. Hist. Lugd. Liquidambar esse dicit ex Ococoll arbore, sed qualis sit ea arbor, non demonstrat.

Oleum spississimum. Hist. Lugd. Liquidambar esse dicit ex Ococoll arbore, sed qualis sit ea arbor, non demonstrat.

Ococal arbor. Hist. Lugd. Liquidambar esse dicit ex Ococoll arbore, sed qualis sit ea arbor, non demonstrat.

Arbor foliis Hederæ. Hist. Lugd. Liquidambar esse dicit ex Ococoll arbore, sed qualis sit ea arbor, non demonstrat.

Oleum spississimum. Hist. Lugd. Liquidambar esse dicit ex Ococoll arbore, sed qualis sit ea arbor, non demonstrat.

Ococal arbor. Hist. Lugd. Liquidambar esse dicit ex Ococoll arbore, sed qualis sit ea arbor, non demonstrat.

Arbor foliis Hederæ. Hist. Lugd. Liquidambar esse dicit ex Ococoll arbore, sed qualis sit ea arbor, non demonstrat.

Oleum spississimum. Hist. Lugd. Liquidambar esse dicit ex Ococoll arbore, sed qualis sit ea arbor, non demonstrat.

Ococal arbor. Hist. Lugd. Liquidambar esse dicit ex Ococoll arbore, sed qualis sit ea arbor, non demonstrat.

Arbor foliis Hederæ. Hist. Lugd. Liquidambar esse dicit ex Ococoll arbore, sed qualis sit ea arbor, non demonstrat.

Oleum spississimum. Hist. Lugd. Liquidambar esse dicit ex Ococoll arbore, sed qualis sit ea arbor, non demonstrat.

seris (quæ neque Pinus, neque Cupressi dici possunt) Pino Alioribus & Cupressi modo rebus. In harum arborum cacumine vesiculae quaedam enascuntur magnæ & parvæ, quibus confra-ctis guttatim stillat liquor admirandus, quem Indi diligenter conchis excipiunt, sed tanto labore & molestia, ut multi viri exiguum admodum quantitatem possint cogere.

Hanc Monardes author descriptionis, ex versione Clusij Resinam abiegnam inscribit, & ex eo Hist. Lugd. quæ Indicæ nomen adiungit.

Eius usus est in omnibus ad quæ Balsamum convenit, siquidem vulnera optime curat: dolores ex materia frigida & sarulenta progenitos mitigat. Vult etiam stomachi vires ab humore frigido, aut flatibus, sumpta ex modico vino alio.

CANCAMVM.

CAP. XL.

DE Cancamo [inquit Cornar.] Paulus inter simplicia idem, quod Dioscor. tradit. Sed pro voce *Cancamo*, quæ gravem ac virosam odorem significat, habet *Canam*, quæ odoratum ac gratum odorem indicat. Serapio cum Arabum gente Medica, *Laccam* appellat, & Dioscoridis & Pauli verba citat. Citat etiam Galeni de Laccæ verba, quæ ego neque in Græco exemplari repeno, neque in Latina nostræ, magna ex parte, translationis editione habentur. Recipitur tamen in multis Arabum compositionibus, & eam, quæ *Distacca* appellatur, de se cognominat. Et Officinis quoque hodie satis hæc nota est. Galenus *Canam* quidem radicem habet, rem à Cancamo diversissimam. Sed non Cancam, sed Cacanilegendum esse, ex Paulo constat, qui eadem de ipso lib. inter simplicia tradit, quæ Galenus habet. Quid verò sit Cacanum, & an idem sit, quod Bacanum, utrumque enim reperitur lib. 3. Dolabellarum cap. 46. considerandum proponimus in Paulum & Eginetam.

Cancamum huc usque, Laccam quidam esse putarunt. Horum mirus error deprehenditur, quum Cancamum gummi odoriferum sit, Laccæ autem non gummi arboris, aut plantæ alicuius: sed potius formicarum alatarum sterces (ut Amarus quoque attestatur) favagove, velut cera aspum. Sed hæc de Laccæ hoc loco sufficient, & ad institutum nostrum, hoc est, an Cancamum sit benzoinum (quod voluerunt aliqui, inter quos est Anguilara, & olim Amarus,) revertamur. Cancamum igitur benzoinum non est, ut receptum canam, inquit Amarus. benzoinum liquidum Silphium, sive Lascipium odoratum nostrum est, præcipue subnigrum, cum quodam robore. Vult tandem Amarus Cancamum esse gummi quoddam, quod Animum vocetur. Sed quæ ferus autoritate hoc asserat, satemur non latere. Nos de Animo cap. sequenti.

Gesnerus hoc in loco non probat eos qui Cancamum apud Dioscor. per e. aspiratum scribunt. Mirum autem, inquit, nullam huius lachrymæ mentionem à Galeno fieri. Ex confinio Caisæ Cannamque & Cancamum & Turum inveni novit Plinius, nec alibi plura. Serapio & alij Arabes sic appellant: Laccam vertunt interpretes. Sed quæ hodie in Officinis Laccæ vocatur, nec odorata est, nec similes habere vires videtur. Ego Cancam, sive Laccæ [ut vertunt Arabes] loco, medica-

ABIEGNA RESINA INDICA LIQUIDA.

CAP. XXXIX.

Locus. IN novi orbis continente colligitur liquor sive resina, quam Abiegnam vocant, ex arboribus

Cancamus
(*obstia.*
pan.
Asomacho
repreh.

medicamentis, Myrrhā potius iniecerim. Monachi autem [teste Amato] qui nuper Antidotarium exposuerunt, alia mente circutiverunt, delirante, quum in compositione Dialaceæ, dicant: Si defecerit Cancamum sive Lacca, eius loco iniciatur lachryma sanguinis Draconis. Quanto verò errore, omnes norunt, quam Lacca appetitiva sit, & mentes provocet: sanguis verò Draconis tantum abest, ut aperiat, ut potius mirum modo constringat.

Nomina
linguar. Cancamum Garzab. in Hisp. & Lusit. An.
me blanc, Acab. Sa. Luch. Othom. Luch.

Locus. Loci & vicum inter niter etiam Paulus lib. 7. suæ Medicinæ, dicens: Cinnamon Lachryna est arboris in Arabia Myrrhæ similis, odore grato, quæ etiam ad suffragium utuntur.

Viscias est obesos extenuare, & intertemperare & aperire obstrueta. Cancamum, inquit Dioscorides, Arabici ligni lachryma est, Myrrha quodammodo similis, virosi gustus, quam ad iustimenta usurpant. Vestes eo additis Styrace & Myrrha suffiuntur, datur lienosis, comitialibus & suspensiosis: mentes cum aqua multa pellit, oculorum cicatrices confestim emendat: ac vino madefactum, eorum medetur hebetudinibus, adversus gingivas humore pręgnantes non aliud efficacius, ut & ad dolores dentium ac per plūsculos diesternū nobolorū nō pondere: ex aqua aut aceto mulso bibi quā obesos extenuat.

NIME ET COPAL

CAP. WILL

A N. & mentionem fecit Amat. Lusit. lib. 1.
enar. in Diosc. his verbis: Cancamum Dio-
scoridis est gummi quoddam, quod ex Guinea
Mina, Africave, & insulis illi circumiacentibus
Lusitani nostri advehunt, *Amum* appellant, quod
testantur decidere ex proceris arboribus
quibus folia Myrti, unum album, alterum subni-
grum, Myrti quodammodo simile, odoratum,
quod Diosc. inter Myrti species, tanquam im-
probam commemorat, & *Mineam*, à terra unde
præcipue nascitur, cum appellat: quanquam Se-
rapio *Amineam* nominet: unde Lusitani voce
corrupta, pro *Minga*, vel *Aminea*, *Amum* vo-
cant. Hanc vero assertionem primò adstruxit
fotus Gallus, & *Canea* num esse dixit.

Sed ad memoriam hic revocandum est, quod non solum Galeno in antidotis Myrrha Minea, vel *Animum* dicta cognita fuerit, sed hodie quoque in Lusitania & universa Hispania paucis immutatis literis habeatur, *Animum* *Animum* appellatis, cuius duo genera, album, & nigrum. Nam album Cancannum esse ex aristoto didicimus: nigrum verò Minea Myrrha Dioscoridis est. An verò Minea hæc regio, Mina hodie dicta, Regi Lusitaniz parens sit, Cosmographis inquirendum relinquo. Scio enim in hac regione, *Animum* optimum quoque reperiri, à quo quottannis Lusitani nostri in Portugalliam adferunt. Galenus verò Mineam Myrrham inter cæteras species præcipuam collocavit, quâ de causâ in illo textu libri de Antidotis, aut in Dioscoridis, mendum esse suspicor, quum Dioscorides ex diametro contradicat.

Amatis ergo, [non aspernandis aliis botanicis] Anime plantam Cancamum esse scriptum reliquit, sed, [quod citra ullum animi pathema dixerim,] non sine menda, quoniam in Anime
Tom. I.

Cancrum notas non comperimus, ut ex Dioscoridis verbis percipitur, quæ habent: *Σαρκινὸν οὐδὲν εὐκρινὲς ὁμοειδὲς ἄλλοις*. Sed Anime proprie Residuum potius, aliisque appellaveris, quàm Cusani.

Est Græcorum Cancanum nunc si quis Gar-
cias, sententiâ, id quod nos anime vocamus,
quod in Lusitaniam ex Æthiopia, Arabiz sin-
u, advehitur. Hallucinantur, qui Anime in
Brasiliâna regione inveniri contendunt, & genus
illud picis, sive bitaminis, resinæve, in Sinu, ut
aitur, non procul à Maluccis reperitur, Anime
eile credunt. Nâm eius picis multâ copia huc ex
Sennar, aliisque regionibus advehitur, qua pi-
cendis navibus utuntur. Sed nec colore prædictum
est Cancanum simili, & dicitur taxat resinam, aut
quodvis vulgare gummiolet.

Confirmat Clusius apud Garcum Amari dus
Anime, ac insuper certum addit, quod pallidum
est & resinaceum, res irridumque. Omnia ve-
rò, ait, iucundum in suffumigis spirant odorem,
idèmq; videntur temperamentum sortita. Po-
steriora dud degustata magis fucare & amare-
reprehenduntur. Autem est Animam Amatus
voces, nescio. Dioscor. habet Amaream. Non
desunt, qui Anime legitimum Adellum esse pa-
tiant, ob multis, quis habet, notas, cum feli-

non est, quidd, ut Celsipinus inquit, 'Stade quordam cum oleo Syracino ex Alexandria adferebatur sub nōmine Balsami: sed postea defuit, cum ex India Occidentali novu n' genus Balsami affertur coe'it. Sola autem expressa Myrtha affertur glebis magnis coacta. Ex hoc genere videtur esse; quod vidg' *Amme* vocatur à nostris quasi *Aminza* Myrtha: Ex Oriente affertur duprum generum, *adonis* *fragvis*, quibus Vnguentarij utuntur. Vap'n candidum: alterum durum: album autem præstantius. Referunt Hispani in India Occidentali, in suis hētīs odoratis loco Thuris sacerdotes uti quoddam candida resina, quam *Copal* vocant, translucida magnis glebis. Origi & *Amme* flavius, in granulis Thuri simile: valde autem odoratum est & flavo. Dioscorides autem inter reprobatas Myrthas *Aminzam* vocat: sed Galenus Minēam, ut Plinius appellat, quam & cæteris præfert, quia ei non admittum est Opocipatum, quod est genus venenū.

Duo, ait Monardus, resinarum genera multa in
similia ex Hispania nova adferuntur, quorum u-
num *Copal* vocatur, alterum *Anime*. *Copal* resina
est ad modum candida & transparentis, magnis fra-
gmentis Dactyli valde transparentis haud diffi-
milibus: satis oligrata, sed non perinde ut *Ani-
me*. *Anime* arboris est lachryma, seu resina alba,
ad *Thuris* colorem nonnihil vergens, verum
Copal magis oleaginosa. Defertur granis *Thu-
ris*, sed crassioribus, quæ contracta luteo colo-
rem ostendunt instar resinæ: gratissimi & suavissi-
mi odoris est, & prunis imposita facile consu-
mitur. Differt ab *Anime Orientali*, quod neque
tam candidum, neque tam lucidum sit. Orientale
etiam magnis fragmentis adfertur transparentibus,
ita ut nonnulli *Carabe*, seu *Succini* specie
esse suspicati sint, cum nihil sit minus.

*Folia Myr-
si.
Anacardium
occidentale,
Anacardium
subincanum,
Myrica.*

Самостоятельно.

**Ayrha
Aimed Gel
classen.**

[illegible]

1992. 1993.

Cancer

Pax sive
bitumen.
refinaur en
Sirène.

Temper-
ature
Bd. Name.

State,

Basissystem
Mengen

Admission

Copy.

Орскан
1918.

Copied

Answer: *Answer*

Anime Oriental

Carab
for Succ
ADULTS

- Copal.** Anime fragmento, quod aliquot uncias pendebat donatum esse ab Hugone Morgano Pharmacopola Londinensi. Gomara porro in Mexicana historia, duo Copala genera facit, alterum rugosum, quod *Celochiopalli* vocari dicit, molle, Thuri simile: alterum multo præstantius, *Copalcahuetl*, quod plerique Myrrham existimant: liquor scilicet albus, qui vulneratâ arbore guttatim stillat ac statim concrevit.
- Synonyma.** Hist. Lugd. p. 1791. nomina hæc habet: *Copal*, *Anime*, *Anime Occidentale*, *Animaam Myrrham* esse putat Hermol.
- Viros.** Lusitanorum mulieres *Animo* maxime pro suffumigis, & Medici contra dolores à frigidityte ortos præcipue utuntur, maxime capitis, ut Amatum adnotasse legimus. Confirmatur hoc idem testimonio Manardis, dicentis: Huius usus est in plerisque, sed capitis præsertim morbis, à frigidityte provenientibus, & de fluxionibus purgationes sub ætheribus, cubiculis per Hyemem (etenim ætheri purgat) & capitis operimentis, dormire sub noctem volentibus, sufficit: quin etiam ipso capite, si qui Cephalæ & Hemicrania laborant: nam caput roborat. Miscetur emplastris & cerotis: ubi roborare, & frigidos humores, statimque dissolvere opus est. Thuris vicem supplet, cum in suffutibus, tum in iam dictis. Cerebrum roborat emplastri modo adhibitum, atque etiam ipsum ventriculum reliquæque partes nervosæ, cerati modo, tertia parte cere admixta: atque sic gestatum diutius, & subinde renovatum, frigiditytem è quacunque corporis parte elicit. Calidum est secundo gradu, humidum primo.
- Thuris vicem supplet.**
- Temperamentum.**

ANIMES SPECIES AD SUCCINVM
LUTEVM ACCIDENS.

CAP. XLII.

- Descriptio.** INTER Animas Paludani & Copal medio se habet modo ad vulgare succinum proximè accedens, à quo tamen duritie parum vincitur, croceo hila nore colore tincta, & *Animes Paludani* modo pellucida: sub dente in grumos minutissimos dissilit, & candelæ ardenti admota non ita promptè liquefit, ut *Copal*: quo tamen flammam & luculentiorē & peruginaciorem fovet, minutissimas bullas eructans, odore non multum differens, quo & ardendi modo magis refert Animam à Paludano missam. Hanc misit Antuerpia Coldenbergius.
- Color.**

ANIME SIMILIS RESINA EX
ALBO FLAVESCENS.

CAP. XLIII.

- Descriptio.** PETRVS Garetus dedit, Clusio scribente Exoticorum lib. 4. cap. 8. resinam delatam ex longinqua navigatione anno 1600. quæ Succino non absimilis erat, transparent & lucida, pendè instar Anime Americanorum, cuius fortasse genus: color ex albo flavescens, odor non iniucundus, sapor amariusculus, deinde actiusculus: in micæ potius dissiliebat, quàm ut dentibus cederet, aut ore retenta, mollesceret: igni tamen admota, liquebat, flammamque concipiebat & ardebat.

ANIME ALBA PERLUCIDA.

CAP. XLIV.

- Descriptio.** ANIMES alba nomine peregrinam quandam resinam Ill. C. V. Vir. misit D. Paludanus, unde & specimen asservo. Succini nostratis consistentia paullo fragilior, Vernicis solidæ, seu Sandarachæ arborum modo, nonnihil albicans, & pellucens, vieti modo, sapore Vernici non absimili odore, cum adoletur, Mastiches: nec penitus vivo carboni imposita, flammam concipit, liquefit & evanescit, crassamentum quoddam resinarum more relinquit, sub dentibus dissilit, nec facile coit, eâ ratione, quâ Sandaracha. Anno 1605. ex Anglia rediens Gener Cherlerus attulit magnum fragmentum cum inscriptione *Anime*.
- Sapor.**
- Odor.**

ANIME COLORE COLOPHONIE.

CAP. XLV.

- Descriptio.** IMPURIOR hæc *Anime*, cæteris speciebus, Colophonix aut Taurocolle colore, obfcura quàmque acies oculi nequaquam penetraverit: vnguibz quibusdam ferè nigricantibus resperfa, Colophonix concretionē, flammam & promptam & pertinacem concipit, reliquarumque more ardendo bullit, bullis tamen maioribus: gustantis saporem quendam austerum imprimat: odor acutior paullo videtur & ingrator, quàm reliquarum specierum. Hanc habui Antuerpiâ à Coldenbergio.
- Sapor.**

ANIMES SPECIES ALBA
COPAL INDIS.

CAP. XLVI.

- Descriptio.** COPAL Americanorum & Animas quartæ nomine missa Antuerpiâ à Coldenbergio resina, fusa videtur: ita cylindri sulphurei fusilis portionem refert semicircularem: externâ parte gibbâ, coloris albi: internâ, flavi: concretionē densa, Animas à D. Paludano missæ, sed non ut illa, visus aciem transmittens: et interim diffractæ micæ pellucidæ sint: flammam promptè concipit, nisi hanc præriperet liquatio: odore iucundiore, quàm resina strobilina, sed ad Animas Paludani gratiam non accedente, nescio quid tamen Styracem redolente: sub dente lentescit Mastiches modo, nec adhærescit, & albescit, sapore grato. Gener Cherlerus ex Anglia redux attulit similem resinam, anno 1605. cum hac inscriptione: Animas alba à D. Garetto fragmentum satis magnum semicirculare.
- Odor.**

AMBARVM.

CAP. XLVII.

- Descriptio.** NON desunt Monardi, qui Ambar ex fructu quodam ad maris litus nascente heri dicunt, qui mensibus Aprili & Maio maturefcit, & odoratus sit, quem decidentem vorant Balzæ: quasi fructus in alimentum cedens, aliud quàm sanguinem & carnem generare possit. Hæc Monardes, qui nobis præbet occasionem scribendi de Ambaro.

Ambaro, & tradenda eius historix, in hoc Botanico nostro opere.

Ambari ergo [quantum quidem colligere licet] Simeon Sethi, Aëtius, Avicennas, & Serapio cum Averrhoë ex veteribus meminerunt. Ex Neotericis autem Ferdinandus Lopez, Iulius Cæsar Scaliger, Garcias, Monardes & Clusius. Quorum quidem circa huius generationem discrepans est opinio. Alij siquidem sperma Balenæ esse asserunt: alij belluæ cuiusdam marinx excrementum, aut maris spumam, [quæ sanè opinioniones ratione carent, quod nullum Ambarum invenitur, ubi frequentissime sunt Balenæ, & ubi fluctuum reciprocatione spuma plurima excitatur,] alij bituminis modo ex maris alveo emicare: quæ opinio melior, & veritati magis consona prærisque visa est.

Inter Græcos autem solus Simeon Sethi & Aëtius huius recordati sunt, è quibus prior bituminis modo è fontibus suis manare assent, pessimumque id esse, quod à piscibus devoretur. Inde convellitur, inquit Monardes, eorum opinio, qui Balenarum sperma esse asserunt, ex eo decepti, quod interdum in Balenarum ventriculis invenitur, quæ illud aquis inpatans nonnunquam devorant, alimentum esse existimantes. Verum est, mox tempore Balenarum circa Canarias, quas Fortunatas Insulas putant, captam, in qua inventæ sunt plus quam quatuor Ambari atrovæ, [ponderis apud Hispanos genus, quod viginti quinque libras pendet,] sive centenz libræ: postea tamen infinitas Balenas, cum suis catulis interfecerunt, sed nihil Ambari in eis inventum est. Sed & qui ex Florida adveniant, referunt Balenas in illo mari versari: quas tametsi cum suis catulis necarint, in neutris Ambram reperisse. Illos catulos porro Americani summa dextentate in hunc modum capere solent. Sumpto longo & forti fune, cui innexus sit laqueus, cymbam ingreditur Americanus, & Balenæ cum suis catulis adveniendi obviam progreditur: uni ex catulis vicinior factus insiluit, & laqueo rostrum induit. Illic id sentiens catulus in altum se mergit una cum Americano ipsum amplexante [summi etenim natatores sunt Americani, diuque in aqua persistere queunt] Balenæ autem catulo respirare volenti, summi aquor repetere necessè est: interea Americanus per eius nares, sive meatus illos, quibus respicit, cunem vel parillum acuminatum pugno adigit, ut minimè excuti possit: deinde laxato fune suam cymbam conscendens illum subsequitur, donec obstructus meatibus respirare nequens, suffocetur, & in terram eliciatur. Lucunda sanè at non minis periculosa est ista venatio: sed aded industriæ & agiles sunt isti Americani, ut etiam *Caymanem* [Lacerti, sive Crocodili genus est, binos & triginta pedes longum, ferocissimum omnium quæ in mari versantur, belluarum] unus Americanus occidere queat.

Ex Arabibus verò Avicenna lib. xii. cap. 67. & Serapio lib. simpl. cap. 196. scriptum reliquerunt, fungorum in rupibus & arboribus more Ambarum in mari generari, & tempestatibus unà cum laxis interdum in litus eici: quæ sententia verisimilior est reliquis ab Avicenna productis. Nam multum flantibus Euris, magna eius copia *Sofalam*, & in insulas *Comaro*, *Dempoxa*, *Mosambicam*, totumque cum tractum elicitur. *Maldiva* insulis quæ ad Orientem spectant. Flantibus verò Favoniis, copiose invenitur in insulis, quæ vulgò de *Maldiva* nuncupantur corrupto vocabulo,

cum de *Nalediva* dicendum sit: etenim *nale* lingua Malibrica significat quatuor, & *Diva* insulam: *Nalediva* igitur pronunciandum eras: quasi dicas, Quatuor insulas, simili planè ratione, quæ *Angediva* vocamus eas insulas, quæ à *Anga*, Orientalis Indix emporio, duodecim leucis distant, quod quinque sine numero conterminant, *Anga* enim eorum lingua quinque est. Sed hæc præter institutum: non potui tamen harum non meminisse, cum in *Maldiva* mentionem incidissem.

Scribunt iisdem locis suprè citatis, Ambarum devorari à peste quodam *Azel* nuncupato, sed qui eo devorato statim extinguatur. Hinc deinde undis fluctuantem regionis illius incolæ stans in sicum trahunt, eoque exenterato Ambarum colligunt: verum omne improbare, præter id, quod spinæ adhærescit, id enim pro temporis diuturnitate putum & legitimum esse. Sed hæc eorum opinio erronea mihi videtur. Nam veluti certum est animalia quæere alimentum naturæ suæ conveniens, & minimè noxium, nisi forte cibis introitis ad nitro decipiantur, quemadmodum mures fallere solent: sic etiam hancquam verisimile videtur, hunc piscem Ambram venari, si eo devorato sit periturus. Imò cum Ambarum sit ex eorum numero, quæ maxime cordis vires reficiunt, dixerim hunc piscem præsentatorem esse venenum quandoquidem tam extraneo medicamento devorato perire.

Scribit Averrhoës 5. coll. cap. 36. Caphura genus inveniri natum in maris alveo, quod deinde aquis supernaret: laudatissimum verò id censet, quod Arabibus *Ascap* dicitur. Quam verò eius opinio à veritate sit aliena, & tanto vitio, insigni quæ Philosopho indigna, clarius est, quam ut multis demonstrari debeat: primum quod Caphuram in mari nasci dicat, deinde, quod eandem, quæ frigida est & sicca tertio gradu, Ambari genus faciat, quod calidum & siccum constituit, secundo ordine.

Cæterum ex Neotericis Ferdinandus Lopez de Castagneda, qui rerum à Lusitanis in India Orientali gestarum historiam scripsit. lib. 4. cap. 35. dicit, selectissimam Ambram in insula *Maldiva* inveniri, cuius generationem cum fieri tradat diversam ab ea, quam ceteri scribunt, non abs re futurum existimavi, si, quæ de generatione Ambræ tradit ex Italico sermone à Clusio conversa, hic subicerem.

Maiores insulæ de *Maldiva*, Archipelagi illius interioris, multas odoríferas herbas producant, quas depastum veniunt magnæ quædam aves ab incolis *Anacangrispa* nuncupata. Istæ aves in rupibus & scopulis earum insularum secundum maris litus sitis versantes & aggregatæ, *Sercus* egerunt, quod *Ambra* est, cuius tria genera faciunt: unum album, ipsis scopulis, ubi egestum est, inhærens, quod probatissimè censet, & *Panahambar*, h. e. auream Ambram appellant, maioris quam reliquas pretii, quod pauca quantitate & maiore difficultate reperitur: quam alia duo genera, quæ cineracei & nigri sunt coloris, ac ex alio originem trahunt. Ex istis quos dixi scopulis, tempestatum vehementia temporis successu, magnis fragmentis in mare cadit hæc Ambra, & in litus elicitur: id *Coambar* dicitur, id est, aquæ Ambra, quoniam aquarum fluctibus valde cluca, magnam suæ probitatis partem perdidit. Tertium, quod nigrum, *Maniambra* vocant, quod significat piscis Ambram: nigredinem enim contraxisse existimant, quod à Balenis, aut aliis pi-

Gummi de-
lectum.
gummi fuit et gustu amarum, translucentum,
Taurina glutinis in os, intus pingue, lique-
scens facile (Græcus codex *adulterum* addit, id est,
quod facile mollescit,) ligni ac fordis expers, sus-
titu odoratum, unguis simile. Est etiamnum
Bdellij genus, sordidum, nigrum, uberioribus
glebulis in offas convolutum, Aspalathi odore (in
Basil. cod. *adulterum*; quidam *adulterum* addit, vel po-
tius *adulterum*). Celsus ait Serapio non *adulterum*
legit, id est, coactum in massam, sed *adulterum*
legit, id est, odore Aspalathi. Hoc Galenus Scoti-
cum vocari tradit ex India advectum. Defertur
etiam à Petra oppido siccum, resinolum, subli-
dum, sed facultate secundum. Adulteratur gum-
mi, sed ita adulteratum, non perinde gustui ama-
ritudinem repræsentat, necque adeo suffitioni-
bus odoratum.

Diminutam & hic dereliquerunt historiam
Diosc. & Galen. arboris ferentis Bdellium, quam
Plin. lib. 12. cap. 9. complevit, dicens: Vicina est
Bactriana, in qua Bdellium nominatissimum. Ar-
bor nigra est, magnitudine Oleæ, folio Roboris,
fructu Caprifici naturæque. Gummi alij Brochon
appellant, alij Malachram, alij Mâdâcon. Ni-
grum verò & in offas convolutum Hadrobolon.
Esse autem debet translucentum simile ceræ, odo-
ratum, & cum fricatur pingue, gustu amarum ci-
tra acorem. In sacris vino perfusum odoratius.
Nascitur & in Arabia, Indiæque, & Media ac Ba-
bylone. Aliqui Peraticum vocant ex Media ad-
vectum. Facilius hoc & crustosius, amariusque.
At Indicum humidius, ac gummosum. Adultera-
tur Amygdalæ nuce. Cætera eius genera cortice
Scordasii. Ità vocatur arbor æmula gummi. Sed
deprehenduntur odore, colore, pondere, gustu,
igne. Bactriano nidor siccus, multique candidi
ungues. Præterea suum pondus, quod gravius
esse, aut levius non debeat. Pretium sincero in
libras x. terni. Gentes supradictas Persis atin-
git, rubro mari (quod ibi Persicum vocavimus)
longè in terra æstus agente, mirà arborum natu-
rà. Namerosa sale, inæstis derelictisque simi-
les, sicco litore radicibus nudis polyporum mo-
do amplexu steriles harenas spectantur. Exdem
mari adveniente fluctibus pollatæ, resistunt im-
mobiles. Quin & pleno æstu operiuntur totæ, ap-
parètque argumentis rerum asperitate aquarum
illas ali. Magnitudo miranda est, species similis
unedonis, pomum Amygdalis extrà, intus con-
tortis nucleis.

Bdellium
Savracem-
cum.
Bactrianum
Arabicum
Scythicum
Diosc. lectum
ambiguum.
Cæterò, Bdellium (inquit Corn.) & re, & no-
mine, retinent Officinae. Sed appellationes Sar-
vacem, si tamen hæc rectè in Diosc. legitur, & in
Bactriani apud Plinium, & Arabici & Scythici apud
Galenum & Medicos Græcos exoleverunt. Quod
verò nigrum, crassarum glebarum esse Diosc. di-
xit, & Aspalathi odore, hoc est, *adulterum*, *adulterum*
legendum est, in *adulterum* *adulterum* legendum
est, aut *adulterum*, id est, in massam coactum, ut sit,
quod Plin. dixit, Nigrum & in offas convolutum
hadrobolum, atque sic altera vox alteram expo-
nat: aut si potius hoc accipiendum, ut ipse *adulterum*
vobem, in offas convolutum exponat. De o-
dore certè Aspalathi non adiecit. Et hoc tamen
Aspalathi odorem habere potuit, sicut id, de quo
prius dixit, Onychis. Sed & hic ambiguum est,
quod Diosc. dixit, *adulterum* *adulterum*, *adulterum*
quoniam Plinius dicat, Bactriano nidor siccus, mul-
tique candidi unguis. Quod Diosc. dixit, in sus-
fita odoratum est, Onychi simile, de nulla alia si-
militudine accipio, quàm ea, quæ odoris est in
suffitu Bdellij, ad eum odorem, qui ex Onychis

Indici conchilij testæ suffitu emergit. Et hinc a-
ded Bdellium Onyx appellatur variis in locis a-
pud Gal. Posset autem huius odoris experimen-
tum facile sumi, si vitrum Onychem haberemus.
Quo modo verò multi illi candidi unguis in Plin-
io intelligi ac excusari possint, ex commentariis
nostris cognosci potest, Nam ad unguis huma-
nos nequaquam referendos illos esse, quod à mul-
tis factum est, docuimus, quoniam nulla penitus
unguium similitudo Bdellio conspiciatur. Pro
Bdellio etiam *adulterum* sermone genere habetur
apud eundem Galenum.

Quod Diosc. unguis simile dixit (inquit Celsus.)
de colore intelligit Plinius, non de odore, ut
multi verunt. Arabes autem Bdellium duplex tra-
dunt, appellantes unum Bdellium de Mecca, arbo-
ris fructum, ut tradit Avic. Alterum Bdellium lu-
daicum, lachrymam ipsam, forte quia in suffitu-
gis usurparetur a Iudæis, scribiturque à Moysè in
Paradiso voluptatis oriri. Serapio duplici men-
tione de Bdellio agit, unâ inter Palmas: de qua
nos tractamus, sub titulo: Palma minor Iuncifera.
Altera verò mentione Bdellium Iudaicum ap-
pellans, gummi esse tradit, tantum scribens, quæ
apud Dioscoridem & Galenum de Bdellio scri-
buntur.

Notandum venit, Bdellium hodie non Scy-
thicum, aut Arabicum Myropolæ appellare, sed
Iudaicum potius, sub *adulterum* nomine Olivus de eo
quoque mentionem facit, qui dicit: Bdellium lu-
daicum, lucidum & fulgore coruscans, pusquam
videram præclaris illis notis insigni, nisi in A-
pollineo sacro Calceolarij. Lachrymam arbo-
ris Saracenice verè appellaveris. Non desunt,
qui non admittant Moysi sententiam asserentis,
aurum quidem purum nasci in Phisonde fluviò,
Græci vocant Getram & cum eo gigni Bdellium,
pro quo alij intelligunt Carbunculos, & alij Cri-
stallum, nescientes Iudaicam esse plantam, quæ
& fructum, & gummi proferat. Vox Hebraica
sonat Bdellium: placet itaque antiqua lectio. Eius
fructus hodie ita pisdem ex Iudæa caput ad nos
devehit: quem Antonius Cortusius Dodonæo
miserat. De Bdellio Plinium consulito. Arabes
plurimum de eo ineptire videntur. Sed fructus
eius magnitudine Nucis Juglandis est, odoratus,
at putamine durissimo.

Sed sum nobis Matthæolus de Bdellio men-
tem hic recludit verbis. Bdellium. Mauritani
Molochil, Molochal, Mochel, aut Mochel. Si nostro
tempore in Italiam importatur, aded rarum est,
ut ad ostentationem tantum asservetur, vel ad a-
dulterini & reprobati normam. Credidit quid-
dam, hoc vulgare Bdellium, cuius passim in Offi-
cinis est usus, constare partim ex nigro, quod In-
dia mittit, partim verò ex eo Arabici generis, quod
siccum & resinolum, ævén (que ex Petra defertur,
cum tamen parum, vel nihil amaroris sentiat),
est potius opinandum adulterinum esse. Huius,
quo passim utimur, plura quidem habentur ge-
nera, vidi nigrum, resinolum, odore sordidum,
Laseri quadantenus simile: aliud translucentum,
utpote taurinum glutinum, amaroris expers: Translu-
centum aded vulgari Myrtæ persimile, ut ab
ea vix dignosci possit. Quæ omnia genera tametsi
illegitima censeantur, Officinæ tamen, tanquam
legitima passim usurpantur. Serapio Diosc. Bdellium
appellavit Iudaicum, licet Saracenica arbo-
ris lectio admitti possit, quod Saraca urbs sit in
Arabia: Non tamen improbanda videtur lectio
Arabice arboris. Plinius, Galenus & Oribasius me-
minerunt Bdellij Arabici. Per *adulterum*, non fa-
cile

Onyx.

De colore
Onychi in-
telligendū.
Bdellium
duplex.
Bdellium
de Mecca.
Bdellium
Iudaicum.
Serapio de
Bdellio.
Palma.Bdellium
Iudaicum
offic.Arboris Sar-
acenice
lachryma.
Moysi de
Bdellio.
Bdellij di-
versæ expe-
ritæ.Bdellij fru-
ctus.Nomen
Maurita-
nica.Eius quæ-
ritur.Bdellij ge-
nera plura
genera.
Bdellium
nigrum.
Translu-
centum.
Myrtæ si-
mile.Diosc. illud
fratrum.

Adellum
Scythicum
Arabicum
Branchocela
Tumores

Galenus verò adellij facultates describens, ita inquit: adellium, quod Scythicum nominant, quod sanè & acrius est, & resinofum magis, emollientis admodum est, & efficacis virtutis: at alterum, nempe Arabicum, quod dilucidius est, magis deſiccet, quàm emollientia. Igitur quod recens & humidum est, & contusum facile mollescit, & ad omnia, ad quæ Scythicum idoneum est, quod antiquius est, & admodum gustu amarum & acre, & sicum, ab eorum, quæ indurata emolliunt, mediocritate recedit. Utuntur autem quidam illis, & potissimum Arabico, & ad bronchoceas & hydroceas, saliva matutina, ieiuniaque, subigentes ut emplastri consistentiam accipiat. Porro Arabicum & calculos renum in potu sumptum frangere apparet, cum urinas ciere, & crudorum flatuum discursus, præterea laterum dolores & rupturas perlanaro. Adellio etià maximè pro laxandis atque emolliendis tumorib. vultur.

BELENIZAN AVT BELENZAN AVERRHOIS.

CAP. XXXV.

Nominum saltem, si res non aliter confinitas effecit, ut quidam, auctore Garcia, *Belenzan* existiment esse *Benivinum*, quæ quidem opinio ei non placet, ut mox apparebit ex eo capite, de *Benivino*.

Ceterum *Belenizan* [ut tradit Averrh.] aut *Belenzan*, sive *Perrizan*, exsiccantem & calefacientem in secundo excessu habet facultatem, stomachum humidum & languescens exsiccet & roborat, oris odorem commendat, partes corporis confirmat, & venerem excitat.

Sed ex hac adeo succincta & brevi historia persuadere sibi non potest Garcia, esse *Benivi* quod sequenti capite describitur, quod si quis tamen contra sentiat, per ipsum licet.

BENIOINVM, CVIVS ARBOR FOLIO CITRI.

CAP. XXXVI.

Benioini
refina
Color
Fugues
Substantia
Odor
Cortex

RESINA nomine Benioini Officinis cognita, magis constat glebis inæqualibus, puris, nec vllaferè fordeve plurimum infectis: colore sunt massæ aliæ rutilante, aliæ magis ad albedinem vergente, & creberrimè seu vnguibus, aut Amygdalarum striata remissa: verum in rutilis illis massis gubernalis lucens vngues, in aliis candidi admodum, sed non ita pellucidi: substantia omnibus satis compacta, sed vel attritu digitorum in pulverem friari potius, nec quæ sub dentibus lentescat, saporis ferè expers, verum odor suavissimus, qui accenso vegetior. Eadem interdum adhærescens invenitur cortex, qui magis satis arboris suspicionem inducit, foris rugosus, ad cinereum inclinans, substantiâ compactâ, colore intrinsecus rufus ceu Cancellæ, qui gustanti nihil præter siccitatem quandam offerre videtur. Hæc nobis de Resina ista nobilissima comperta.

Arboris faciem tradit Garcia: Arbor, inquit, *Benivifera* procera est, vasta, pulchra, magnam spargens umbram, ob ramorum frequentiam, quos pulcherrimo ordine digestos, & in ærem elatos habet. Caudice est crasso, materie prædura & firma. Eius folia parum aceto condita, partem

adhuc adhaerentia accepi: minora sunt ea aliquotum Citri, sive Limoni foliis, non tamen adeo virentia, sed parte adversâ candicantia, quæ verò in ipsis maioribus ramis nascuntur, ad Salicis folia magis accedere videntur, latiora tamen sunt, sed minis longa. Vulnerantur arbores, ut gummi, quod est *Benivi de Benina*, emittant, quod est ex provincia Bayrros, idque præstantius est eo, quod in Sian nascitur: natum verò in Sian reliquis generibus præstantius est.

Benivi plura sunt genera. Id autem maximè mercatoribus expetitur, quod Amygdaloides vocant, quodque vngues, seu maculas candidas admixtas habet Amygdalarum instar: quod enim pluribus huiusmodi maculis abundat, tanto præstantius habetur. Maximè id provenit in Sian, & eius contemina Mirtaban. Erant illa provincia supra regnum Malacam ad fluminem Arx & Menan in Oceanum Indicum influxum supra Gangeticum sinum. Eius meminisse puto Antonium Musam, idque permixta eius radicum scobe adferri asserere: sed falsò, quandoquidem unum idem quæ est gummi, aliud videlicet crassiori consistentiâ, aliud liquidiori, & aliud non plenè durâ, quæ deinde à Sole exsiccata magis albet. Id *Benivi* sic exsiccatum nonnunquam in farinam resolvitur, quam Musa radicum scobem esse putat.

Aliud genus nigrum invenitur in Laoa & Samatra, quod vilioris est pretii. Et & genus nigrum in Samatra novellis arboribus profutens, quod ab odore grato *Benivi de Benina* vocant, id superiore decuplo carius est: quod sapidis existimavi nihil aliud esse, quàm *Benivi* cum cum Scyrace liquida, quam Chineses *Rocamatha* vocant, permixtum, quod volui semel experiri, mixto *Benivi* cum Scyrace liquida. Sed licet *Benivi* sic permixtum vulgari odoratius esset, odoris tamen fragrantia & suavitate à *Benivi de Benina* superabatur.

Ceterum *Benivi* à novellis plantis profutens Amygdaloide odoratius est, causam esse puto, quod gummi multumnavæ suæ fragrantia vetustate amittat, ut ferè reliqua huiusmodi. Sed quia candidum elegantius est, nigrum verò & novellum odoratius, utrumque permiscere solent, ut odoris fragrantia etiam elegantiam concilient.

Atque quoque odorata non est *Benivinum*, etiam si nonnulli docti viri ea fuerint sententia.

Nunc illud restat, ut nostram sententiam firmis argumentis comprobemus.

Nenunem *Benivi* unquam in condimenta accepisse certum est: Atque verò ferè frequenter illius condimenti tibus apud Indos. Adhæc materia pars Lasere (Atque ferè ex India ultra Gangem advchitur. *Benivi* verò, quod in Indiam adfertur, quodque Amygdaloides vocant, nascitur in Samatra & Sian [non in Armenia, aut Syria, Africa, aut Cyrene] eiusque maxima pars huc convchitur: deinde in Arabiam, Persiam, & Asiam minorem defertur, atque etiam [ut ex vitorum fide dignorum relato intellexi] in Palistinam, Syriam, Armeniam & Africam. Anton. Musæ imposuerunt igitur i Lusitani, qui incolæ, apud quos nascitur *Benivi*, id gummi etiam novum Laserepium vocare significarunt: quandoquidè ab indigenis *Comitabam* appellatur. Ad Ruellii autem obiectionem, quem capite de Lasere, Imperatoriam, Lasere gallicum, atque Officinarium *Benivinum* esse, contendere scripsi, sic respondeo. Cuius inter reliquas Imperatoris facultates hanc illi tribuat, ut libidines extinguat: in Lasere verò demonstratum sit eo uti ad venerem excitandam.

Imperatoria Laceris genus esse non potest.

*Pluribus
ignotum*

Nostrum Benivi veteribus ignotum fuisse omnino puto: siquidem nec Graecorum quempiam, neque quempiam Arabum hoc describere meriti. Veteribus etiam Iudaeis ignotum fuisse, ex eo conuicte licet, quod neque David, neque Salomon eius meminerunt, tamen odores & sumenta summopere commendarunt.

*Ruell. lo-
psm.
Ben in-
dam.*

Fieri autem potest ut Ruellius (in eo, quod Benivi, Ben Iudaeum vocat) lapsus fuerit nominum affinitate, debueritque potius nuncupare *Beniasoy*, id est, filium de laza, ubi plurimum nascitur.

Locus.

Scribit Mediolanensis quidam nasci Benivi in mote Paropamisso, & preter Macedones quosdam, qui in Monte Cauca, odoratissimum, nostris, que multo praestantius se vidisse asserunt, Ludovicum etiam Romanum citat.

*Lud. Rom.
not.*

Ego vero neque huc Mediolanensis, neque illi Macedones facile crediderim, quandoquidem videre licet huc commeantes tot Thraces (quos illi *Rumies* vocant) & tot Turcos, qui Benivi mercium gratia hinc transfuehant: quos, si apud eos, Benivi nasceretur, alias potius merces, quae maioris essent emolumenti & quaestus, transportaretur credibile est. Fieri autem potest, ut illi Macedones Syracem pro Benivi intellexerint: sed tamen nullibi Syracem nasci scimus, praeterquam in Aethiopia, ubi etiam Myrrha reperitur.

*Cominham
Lavanioy.*

Benivi genera vocantur *Chinenisibus Cominham*, ab Arabibus *Lavanioy*, quasi dicas Thus de laon, quod huc regio primum Arabibus innotuerit, Arabes enim Thus *Lavanioy* dicunt, Guzarate & Decan incolae, *l'do*.

*Scalig. de
f. ripio.*

Scaligeri descriptio, quae est exercitio, non parum variat, eam autem integram hic subiciimus: Est mihi, inquit, arboris ipsius sarculus, in meis Mutarum thesauris, etiamnum aliquid de Beniovin retinens ac spirans. Quin compressus nonnihil leni succi, qualis est Beniovin, remittit: Quem a Ioa. Valada ex India delatum dono accepit Is, ait, arborum esse, Amygdali simile, folio longiore: nullum ferre fructum, praeter oblongas liliquas, compressas, oleo plenas, non semine: quo ex oleo spiritato conficiunt Beniovin. Surculi confecti molli, lenta, striata, qualis foliis Caricis, aut Palmae arefactis.

*Mignan.
Comignan.*

Beniovin & in *l'vala* habetur (Linschor. testimonio) sed copiosissime in *Baros* & *Speriamen*, quae duo sunt insulae Sumatrae Indiae Orientalis. Appellatur ab incolis *Mignan* vel *Comignan*.

Caxas.

Beniovin albius, quod care vendunt, et ipsum etiam Caxas in lava. Pari enim pondere vendunt, nec dispari pretio. Nigram vero triplo carius vendit quam Caxas. Est & genus quoddam ubi quod Beniovin vocant *Amendado*, fragile, atque friabile, quales ferè sunt Amygdalae contusae, quod exeris bonitate praestat. Omnium vilissimum crevit in *Palmban*, & *Sumatra*.

Amendado.

Meminit etiam huius Alois. Mund. in exam. ad Brass. Quam recte agant, inueniens, hi (e quorum numero est etiam Hieron. Eugub.) qui eo, quod belzium vocant, Myrrae loco utuntur, viderint ipsi: certum enim est (ut alia omittam) omnis illud amaritudinis expertus esse.

*Substancia
Asyrrha.*

Officinae hodie duos habent succos spissos quos aliqui gummi esse putant: alterum vocant *Asam dulce*, alterum *Asam fetidum*. Hos ego inquit Corn. esse credo Silphij succos, sed unde allatos, non satis constat. Cyrenaicum sua aetate interisse scribit Plinius, nisi fortassis postea re-

*Asa dulce
Silphij
mo.*

natum fuerit. Inde certe dulce *Asam* esse verisimile esset, sicut ex Medico & Syriaco fecundum. Nam Medicum & Syriacum Silphij succum Dioscor. virosi & graveolentis odoris esse testatur, sicut Cyrenaicum lenis & grati. Ex Indicis navigationibus hodie utrumque ad nos afferri satis notum est. Nam illorum lingua belzoi nominari, quod Latinis sit *Laser*, ipsi nautae testantur. Et *Asa* vocem ex *Laser* esse corruptam minime dubium est. Fetidum propter graveolentiam, nostri vulgo *Merdam Diaboli* appellant.

Ruell. beniovinum Officinis, sive *Ben Iudaeum*, quod Iudaei patens huius, mittit ad nos prolem suam. Andern. libello de peste vocat simpliciter *Ben* & *Ben Iudaeum* ac ibidem etiam per *Asam dulce*, sive *Laserpitium* intelligit beniovinum: in catal. vero Franc. belzoinum & belzoinum.

Belzoi.

*Merdam
Diaboli.
Ben Iudae.*

Ben.

Asa.

*Ruell. tr.
181.*

Cord. in Diosc. erroris eos accusat, qui *Asam dulce*, sive *benzoi*, verum *Laserpitium* esse putant, in quorum numero est Ruellius, qui beniovinum pro benzoinum scripsit & interpretatus est prolem Iudaei parentis, cum tamen ex India adferatur. Idem in hist. benz. uia, sive *benzoi*, quod etiam *Asa dulce* appellatur. Langj. vero de beniovin sententiam vide ante caput de Myrrha.

Cetero, beniovin (pergit Scalig. in Card. exerc. 142.) quod vos Itali *Belzoi* dicitis, falsò putant esse *Laser* ab India: nec verum est, quod aunte: à Varotmano scriptum in suis Navigationibus de *Laser* fieri beniovin ac qui Latinum fecit, indicium addit audaciter manifestam.

*Laser non
est.*

*Error quo-
randam.*

Costa it. eadem ferè trad. de *Benzoino* (ita enim cum Garcia vocat) quae *Garcias*, reprehendens Ruellium, Musam, & Mediolanensem, negansque esse *Asam*, vel *Laserpitium*, ac addens *Matthiolum* dicere, se veritate victum, coactum mutare sententiam: ut & Monachos in *Mesitem* dicere *Cancamum* non cognitum, quamvis aliqui belzoinum existiment. *Cancamum* adhuc non esse belzoin, ut bene annotavit Amatus. Atque etiam apud *Valeriolam* *Laserpitium* Indici *Lachrymam*, vulgo *beniovin* vocari.

Benzoino.

Lob. & Pena Adv. benzoin recentiorum non est succus Cyrenaicus, sed inventum recentioribus, & à *Cancamum* differt. Et alibi benzoin non est *Cancamum* Diosc. Licet censent *Anguilara*, à *Montano* persuasus benzoin esse *Cancamum*. Si quidem, is dicat epist. *Cancamum* pronuntio cum *Montano* nihil aliud esse, quam belzoinum, & corruptum textum ubi dicitur sapore iucundo, quod demonstrari potest ex *Paulo*, & *Serapione*, ut etiam ostendit *Matthiolum*. Sed animus inclinat *Agricola* *Laserpitium* lachrymam illam esse, & se belzoinum vocatam.

*Cancamum
non est.
Laserpitium.*

*Anguil.
not. quo
Cancamum
cum
Montano
Benzoino
esse dicit.*

Agricola partes suscepit *Matth.* quas postea infirmat. Credidimus iam dudum *Laserpitium* lachrymam nihil aliud esse, quam illud iucundi ac suavis odoris gummi, quod *Pharmacopoeis* atque *Vnguentariis* belzoinum nominatur. Verum cum postea cepissem *Laserpitium* ac *Laseris* historiam diligentius examinare, facile in aliam deductus sum opinionem. Id gummi, quod *Seplasia* belzoinum dicunt, meo quidem iudicio, verum *Silphij* liquorem mentietur potius, quam sit *Validi cortices*, qui plerumque belzoino implicati reperiuntur, argunt id arboris magnae potius, quam ferulaceae plantae lachrymam esse: quod etiam nuper retulit mihi quidam Medicus Cyrenus, qui belzoinum nostrum in Cyprio ex arbore satis proceram manare affirmavit. Quid autem veteribus fuerit gummi illud elegantissi-

Laserpitium.

*Belzoinum
non est fo-
rulacon
planta.*

*Ex arbore
proceram.*

nam, quod benzoinum appellant, mihi hactenus incompertum est. Non enim est, ut quidam volunt, probatissima Myrrha. Idem hult. Germ. benzoinum pretiosum est gummi & odorum ex India, alio nomine Asa dulcis dictum ad differentiam Asa fetidae. Sunt enim, qui hoc gummi, Laserpitij esse putent, sed falsò.

Laserpitium falsum
Camer. ad Math. Arbor, quæ benzoinum fert, magna & procera est: folia minora, quàm Limonium, alterà parte incana: locum autem, ubi provenit, non facile est adire, quàm magnò agmine armatorum propter Tigides.

Matthiolum pro Non Laser.
Ex Theoph. & Diosc. didici Turnerus, Matthiolum, & quicumque benzoinum putant esse Laser dulce Cyrenaicum, graviter errare. Theophrasto enim & Dioscoridi Laserpitium herba est, quantannis interiens, talem quoad caudem, & lumbicatas, cuius succus, exsiccatu sit Laser. Scimus autem ex fragmentis ramulorum ligneorum admissis, tum experientia Ludovici Romani (quem citat etiam Matthiolum; aliis scilicet contra seipsum arma subministrans) benzoinum, sive benzoinum, resinam esse arboris cuiusdam, non autem herbae lachrymam. Quod autem ad Asa dulcis, non negaverim esse Laser Medicum aut Syriacum, ut Matthiolum & alij docuerunt.

Affasum da
Amato præterea benzoinum non est Cancamum, sed Arabum Asa odorifera, quam ipse Silphium, si ve Laserpitium odoratum vocat, præcipue subnigrum, quod Lusitani à *Bunum* appellant.

Benzoinum Amygdalinum.
Diffluit præterea lachryma ex arbore incisa, quæ Myrrha dicitur. Aliquando tamen in truncis ipsius arboris, lachryma ipsa coarctetur. Quæ omnibus præstantior est Troglodytica, hodie apud Lusitanos, simul & reliquos Hispanos in Officinis, sub nomine benzoini Amygdalini, reposita, levis, subnigra, undique sibi concolor, fragilis, quæ confracta, album quid, ungues humanos, vel Amygdalas dealbatas referens ostendit: unde Lusitani qui ex India eam adferunt, benzoinum Amygdalinum vocant, ut inter eam & alteram nigram, propriè benzoinum b. n. n. sive ut illi dicunt, à boninas differentiant ponant, de quo cap. de Laserpitio sermo agitur. Verum inest huic, de qua agimus lachryma, Myrrha Troglodytica, quam Hispani benzoinum Amygdalinum (ut dixi) vocant, sapor amarus, odor verò bonus, sed ita acer & vehemens, ac intensus, ut omnes assidentes, quum ex ea suffusiones hunc, in stertens mentes prorumpant, qua de causa indies ab Hispanis magis despiciunt, delicatioribus odoramentis abundantibus. Hunc odorem conuolvens Diosc. gravem odorem Myrrham habere dicit. Gal. verò lib. 1. de Antid. eam gratissimè odoris esse tradit, quem ita esse deprehendimus, intensiorem tamen: sed animadvertendum, quod Gal. ibidem à Diosc. discrepat, quia Myrrham Mineam à regione, in qua nascitur, sic dictam, præstantissimam facit, quam tamen Diosc. ut improbam, & ceteris Myrrhæ speciebus peiorem, derelinquit. Hanc verò lachrymam benzoinum Amygdalinum dictum, raro aut nunquam Italia vidit, qua de causa non mirum est, si Manardus vir diligentissimus lib. 4. suar. epist. dixerit, non solum optimam, sed etiam bonam Myrrham ceteris: ex hac verò Myrrhæ specie Strabo præcipue conficitur, ac destillatur cum colore, tum odore & sapore illi maximè conveniens. Ceterum vulgata & communis Myrrha, Diosc. Cautalis est, arida, colore nigro, & velut ab igne torrea, quæ ex

Gal. differat à Diosc. florida.
Mineam.
Adversus Manard.
Strabo.
Vulgata.
Cautalis. Locus.

India quoque, præcipue insula *Farica* dicta ad nos adfertur. Hanc vero falsò nonnulli adellum a pnd Diosc. esse contendunt.

Benzoinum falso.
Amatus dubius.
Laserpitium.
Benzoinum.
Myrrha Langia.
Quid Amatus intelligat difficile est scire: dubitamus enim, an eam intelligat, quam nos exhibemus pro Myrrhæ Troglodytica, quia dicit vocari benzoinum Amygdalinum, quamquam capite de Laserpitio aliud habeat, quod dicit vocari benzoinum boninas, quod quidem dulce est, ac à Langio existimatum Myrrhæ, cui Spinnioni se opposuit Aloisius Mundella. Notæ tamen, quas tribuit Amatus suo benzoino Amygdalino, verè Myrrhæ conveniunt, quam exhibemus. Monachi in Mesuem dicunt, se nunquam vidisse Myrrham, & eam, quæ vultur aromatari, non esse speciem Myrrhæ, quod si sit, esse Engasnam: autem præterea non spernendum iudicium eorum, qui dicunt vulgarem Myrrham esse adelli speciem. Bacchinellus dicit nos veram Myrrham non habere, nisi fortè nostra, Cautalis sit, vel Engasine Diosc.

Monachi reserunt vulgarem.
Engasina.
Vulgata.
Myrrha adellus speciei.
Cautalis.
Engasina.
Quicquid porro dicat Amatus, non existimo, in benzoino Amygdalino, vulgò vocato, reperiri ullam amaritudinem, quod & alij testantur, nec ullum benzoinum amarum novi: quæ occasio, ut nullo modo Myrrham censeam, nec etiam verisimile est, Laserpitium, si ve Silphium esse, cum herba fuerit. Adelli autem arbori, ineptè etiam germanicè nomen *Maisterburg* additum. Langio etiam & Monachis non assentior, ut antè indicatum, benzoinum esse Myrrham. Odoratum Asa genis, inquit Apollo, à paucis annis illustres medicæ materię indagatores, id quod Laser Cyrenaicum, vulgò benzoinum, multò ante Cardanum & illustrarunt, & approbaverunt. Matthiolum tamen priori suæ opinioni contrarius, benzoinum haud esse Laserem odoratum primum ex Strabone defendit. Vbi verò Laser, vel Asa, si ve succus Cyrenæicus simpliciter scribitur, benzoinum accipiendum. Montano Asa dicta, & Benzoinum dicitur: Cardano & Guaihero Asa dulcis, Benzoinum, Benzoin.

Matthiolum.
Laser.
Asa.
Succus Cyrenæicus.
Asa dulcis.
Arbor troglodytica.
Arb. Granari sit.
Aspalathus.
Arbor Cyrenæica.
Taxus repch.
Sarcocolla.
Foxites in Onom. phitol, Benguin / Wolries chender Laser / Wilder Granarbaum / Arb. troglodytica, arbor Granari silvestris Aspalathus, arbor Cyrenæica, Azatarach, Asa dulcis, Asa odorata, Azarab, Quassiam Arabi. Pharmacopœum Positem de xeris compositionem cuiusdam medicamenti in ra instituentem, quicquid plantis hic misceat.

An Sarcoc. de pelle Laser Indicum seu li quor Cyrenæicus Arabum interpretibus Asa dicitur?

Asam dulcem à fetida distinguere Avicennas: Vnusque autem videri supplere potest benzoinum nostrum: nec est Laser ipsum, ut plerique falsò arbitrantur.

Varignana in Secretis de Asa aliquid. Vtrum ego existimo. Varignanam nescivisse quid esset Asa.

Asa dulcis.
Benzoinum.
Duplex Asa.
Asa aromatica.
Liquor troglodyticus.
Laser ben.
Amatus ex lat.
Diosc. Colonien. Asa dulcis, Benzoin ex Taprobana insula hodie. Idem, Asa corruptè denominata à Lasere videtur: est autem duplex, videlicet aromatica & odorata Asa, & fetida. Asa aromatica seu odorata est Lasensis seu Silphij opps, si ve liquor Cyrenæicus, sed potius Indicus hoc tempore. Etenim Indicus etiam Mesue laudatur. Nam ex Taprobana insula in mare Indicum hodie à Lusitanis convehitur teste Lud. Ro. nanno benzoini indigenis dictus. Hæc ex Sylyio. Sed fructus est sateri Laserem, seu Laserpitium, seu Silphium non extare amplius, quod prægnantibus rationibus Io. Lang. docet in epistola. Asa itaque dul-

cis seu benzoin, quod apud Serap. & Avic. Græcorum Laserpitio nihil differat, Lasers succus esse non potest. Secundò Lud. Rom. refert belzoin esse gummi arboris, atque Laler non arbor, sed *Serap. in d. x. am. veteribus est.* Quid vero Officinatum *Belzoin* sive *assa dulcis* sit, indicabitur paulò post.

Harsh. in Ench. Liqueor Cyrenæicus aut Indicus non extat in Officinis: Nam is, quem illæ ostentant pro Indico & Cyrenæico liquore, quem gummi benzoi vocant, potius est selectissima Myrrha. Quamquam non desit, qui hunc liquorem, quem Officinæ peculiariter imine Assam odoratam vocant, legitimum esse negent, quod *Assa* odorata apud Indos in usus condendorum ciborum veniat, benzoinimum.

Fuchsio de comp. med. Cyrenæicus liquore, Officinis Medicorum *Assa dulcis* & *belzoe*, vel *belzoin*, & *belzupum* nominatur. Sed qui sub hoc nomine in Officinis proferat, non legitimus, aut saltem quarundam rerum accessione depravatus, quod necacer, neque mordax sit. Præstaret itaque, inquit, succo Laserpitii, Germanici, quod *Ma* gestantibus, immixtum, ad compositionem medicamentorum. Ego quidem contra Fuchsi *belzoe* non putari depravatum: sed quia non est opus Laserpitij: ideo etiam non habet signa.

Camærio apud Matthei Germ. Benzoi vocatur *Assa dulcis*, de quo legi possit Garcias.

Adolpho Oecon in pharma. *Assa dulcis*, *Oziri* *Sino*, Benzoi & Benioi, Lazer.

Ac. Ital. refutat eorum opinionem, qui volunt *Assam* odoratam esse Benginum atque inter illos Antonium Musam.

Tabern. apud V Virung. *Assa dulcis*, *Beniovinum*, *Assa dulcis* Officinæ, *Assant* *Beniovinum* vel *Assa dulcis*.

Hadriano in Nom. *Laser* Cyrenæicum inde nominatur, vulgò *Assa dulcis*, *Assa* & *gummi Benzoinum*, Belg. *Beniovinum*.

Rheginus in exercit. *Assa odorata*, pro liquore Syrenæico Galeno usurpatur: Myrtopis, inquit ille, Benzoin appellatur: Laser, aut Laserpitium non est. Idem: Lasers liquor duplex: prior quidem *Assa* odorata Galeno liquor Cyrenæicus dictus, & Benzoinum vulgare Medicis. Ex arbore, aut ferulaceo frutice non ex herba erumpit utraque Lachryma, sive liquor, cum plerumque cortex adhærens visatur: quod nusquam apprehenditur in herbarum succis, nisi adulteratis. Sed quam bene sibi consitet Rheginus apparet ex iam annotatis & magis apparet in l. i. de re.

Lacuna in re. *Laser*, Arab. *Alrich* & *Assa* Castell. *Beniovinum* & *Beniovinum*. Liquor Cyrenæicus Benzoin existimatur.

Monachi huc usque non viderunt propriam & veram odoriferam *Assam*. Equamvis aliqui, ut Manardus & Strassavolus, velint Benzoin vulgò vocatum esse *Assam* odoriferam, tamen hoc illis non clarè constat.

Bacchanel. in conf. *Assa* odorata, Laser odoratum vulgò dicitur *Belzoinum*. Notat verd non haberi *Assam* dulcem, & se eius loco succum Glyzyrrhizæ ponere, seu potius Belzoino.

Belzoi vulgò appellari Lachrymam ex Oriente advectam: Colligi ex arbore in India ut vult Lud. Rom. aut Laserpitium esse apud Antiquos credere non possum, ait Casalpini: Hæc præterea addēs Lachrymam odoratiorem appellant Belgioanum de Boninas: suspicor Myrrham esse. De Myrrha Theophrast. Dioscor. similiter tradit Lachrymam Arabice arboris, Myrrha, unde exprimitur *Stea*

ste; fer odorata est, quam Unguentarii in folles confarciant, digeruntque odoris ac pinguedinis argumentis, ut inquit Plinius. Hæc hodie *Belzoi* vocatur, alibi *Bengioanum*: deest quidem amantudo, gustu enim suavis potius est, quod cum his, quæ à Theophrast. traduntur, convenit. Nos verd Myrrham amaram esse demonstravimus capite de Myrrha, & ideo non potest esse Belzoinum, ut vult Casalp. & alii: Gesnero in catal. pl. *Laser*: *Laserpitium*: cuius altera species odorata *Assa* dulcis dicitur, sive *Beniovinum*, quasi *Beniovinum* ex sententia Ruellii. At mihi sanè verius arboris Lachryma videtur.

RESINA AMERICANA SIVE CARTHAGINENSIS NOVI ORBIS.

CAP. XXXVII.

LACAR YMA. Americanæ nomine Resina, à D. Paludano communicata Ill. E. C. à qua nos habuimus, flammescit, odore ferè Picis, sapore subacri. Hinc forte eadem, eodem nomine, ab eodem D. Paludano data, consistentior odore & sapore haud ita absimili, colore rutilo, perspicua, cum prior visus aciem non transmutat.

Memoit Monard. Resina Carthaginensis, quæ an eadem sit, cum iam dicta, asserere non audeamus, de ea hæc tradit. Nunc etiam nobis nuntiat Carthago, novi Orbis provincia, resinam quandam purissimam, & odoratissimam, Abiegnam aut Terobinthinam Venetæ multo præstantiorem, nihil sicutatibus, & maioribus prædictam quam in selectissima Terobinthina. Experientia docuit, utiliter in nervorum, articularum, pedumque vulneribus, & antiquis ulceribus: magna etiam commodo, ea elota & præparata matronæ sibi faciem oblinunt.

LIQVIDAMBAR RESINA ARBORIS

Oculis nieta, totius Hederæ, odore Styrcis liquidæ.

CAP. XXXVIII.

LIQVIDA Ambra nomine data à D. Paludano Resina, missa Ill. C. VViri à qua habui, ceram mollitie imitatur, coloris ferè melini, non nihil obscuri, odore Styrcis liquidi remissiore, tum accensa, tum non accensa, sapore quoque non absimili. De hac autem resina ac eius arbore hæc tradit Monard.

Resina, quam Liquidambar, & oleum quiddam, quod oleum de Liquidambar vocamus, ad nos ex Hispania nova adferuntur, utrumque odoratissimum, præsertim oleum, quod delicatioris & suavioris odoris est. Est verd Liquidambar resina affluens incisis arboribus, vastæ magnitudinis pulchris & ramosis, quarum folia Hederaceis similia sunt, *Oculi* Indi vocant, cortice crasso cinereo, qui incisus aut vulneratus effluit Liquidambar emulitur, cui cortex comminutus, odoris causa admiscetur, ut scilicet suavis & diutius spiret in sustinibus. Vbi nascuntur eiusmodi arbores, fragrantissimus est aeris odor, adeo ut Hispani primum ed appellentes, istæ aromata nasci, atque adeo eas aromatiferas esse arbores existimarent. Tanta quantitate in Hispaniam infertur Liquidambar, ut mercium vicem suppleat, vasis & dolisco impletis; eo etenim hic videtur, in

Myrrha.

Resina
substantia
in. n. 10.Fuchsio
nar.

Benzoinum.

Laser.
Cyrenæicum
Assa dulcis.Rhegin. sibi
non constat.Benzoini
substantia.

Laserpitium.

Myrrha.

Descript.

Resina
Liquidambar
Locus.Arbor.
Hederacea
folia.
Oculi.

Oculi.

Quantitas.

Syracis liquida sub-
stantia, odoropentia, possilis, Syracis liqui-
da loco, cuius odor proxime ad hunc accedit: a-
ded autem validus est, ut celari, etiam suffribus
non additum, non possit, & totas res, si eius su-
copia, atque aded plateas suo odore repleat.

Vitis. Plurimus in Medicina illius usus, nam calefa-
cit, roborat, resolvit, & anodinum est. Cerebrum
per se illitum, aut aliis aromatibus mixtum, robo-
rat, & doloribus liberat, omnigenosque dolores
à causa frigida, emplastri modo impositum, miti-
gat. Ventriculo adprimè utile, stomachici instar

Emplastrum. adhibitur: etenim ipsum roborat, concoctio-
nem iuvat, digerit, concoquit, & appetentiam
excitat. Cum Syracis, Ambra, & Moschimo-
mento mixtum Emplastri consistentia, & scuti
forma super alutam extensum, omnibus prædi-
ctis morbis maximè prodest. Calidum in fine se-
cundi gradus, humidum in primo. Ex eo recens
collecto, & sic reposito, ubi per se tenuior eius
substantia stillare possit, oleum quod de Liqui-
dambar nuncupant, elicitur, multo perfectissi-
mum, illoque longè suavius. Sunt qui expres-
sione etiam eliciant, ut maiorem quantitatem
colligant. Nam chirothecis imbuendis plurimum
absumitur. Vile est medicamentum ad pleros-
que morbos frigidos, nam calefacit, resolvit & om-
nem tumorem emollit: itaque uteri tumoribus
& obstructions prodest, mensesque provo-
cat: calidum ferè tertio gradu. Sciendum tamen
est, plerumque liquidam istam Syracem ex India
inferre, non proinde bonam, quoniam à tamis
eius arboris comminutis & coctis pinguedinem
innatantem colligunt venduntque pro legitimo.

*Liquidam-
bar.* Eius arboris pampini & summitates in fasciculos
collecti, vestibis & stragulis ab Indis inferun-
tur, odoris gratia, in eumque usum Hispanis et-
iam vendunt.

Oleum. Advehitur [inquit Clus. apud Monard.] Hi-
spalim, totius non dicam Beticæ, sed etiam Hi-
spaniæ celeberrimum emporium, olei quoddam
genus ex America, subrossi coloris, cuius mira-
biles prædicant effectus in omnibus uteri morbis.

*Expressio
ad Chiro-
thecas.* Id oleum de Liquidambar nuncupant, eius sanè
odori ferè, qui Ambra odorem simuletur. Id
verò ex eo liquore exprimitur, quem de Ocofol
arbore stillare, Mexicana historia tradit in huius mo-
dum. Inter arbores Mexicanas memoratur & Ocofol
arbor prægrandis & venusta foliis Hederae simi-
libus. Huius liquor, quem Liquidambar nun-
cupant, vulnera curat, atque cum corticis ipsius
polline permixtus, elegans, odoratumque suffi-
mentum præbet.

Tempera. Caterum ad Storacis genera reduci posse vi-
detur Celsalpino, quod ex India Occidentali af-
fertur Liquidambrum vocatum. Resina liquida
valde odorata appetentis & arboris corticibus
simillimo odore Syracis. Eius arborem in nova
Hispania magnam tradunt: frequentibus ramis
ac foliis Hederae, crasso cortice, quo inciso la-
chryma funditur prædicta: ex hac recenti stillare
tradunt per se oleum quoddam odoratum, ac ex-
primi quoque ut maiorem quantitatem habeant,
sed minùs perfectum quo chirothecas insciunt.

Adulteriu. Hist. Lugd. Liquidambar esse dicit ex Ocofol ar-
bore, sed quæ sit ea arbor, non demonstrat.

*Usus iun-
murum
arboru.*

Locus.

Vitis.

*Hedera fo-
lia.*

*Syracis
genus.*

*Liquidam-
brum.*

*Arbor foliis
Hedera.*

*Oleum offi-
ci stillam.*

*Ocofol ar-
bor.*

feris (quæ neque Pinus, neque Cupressi dici
possunt) Pino altioribus & Cupressi modo re-
ctis. In harum arborum cacumine vesiculæ qua-
dam enascuntur magnæ & parvæ, quibus confra-
ctis guttatim stillat liquor admirandus, quem Indi
diligenter conchis excipiunt, sed tanto labore &
molestiâ, ut multi viri exiguam admodum quanti-
tatem possint cogere.

Hanc Monardes author descriptionis, ex ver-
sione Clusij Resinam abiegnam inscribit, & ex eo
Hist. Lugd. quæ Indicè nomen adiungit.

Eius usus est in omnibus ad quæ Balsamum
convenit, siquidem vulnera optime curat: dolo-
res ex materia frigida & sterculata progenito
mugit. Vult etiam stomachi vitis ab humi-
re frigido, aut flatibus, sumpta ex modico vino
albo.

CANCAMVM.

CAP. XL.

DE Cancamo [inquit Cornar.] Paulus inter
simplicia idem, quod Dioscor. tradit. Sed pro
voce *Cancamo*, quæ gravem ac virosam odorem
significat, habet *Lacca*, quæ odoratum ac gra-
tum odorem indicat. Serapio cum Arabum gen-
te Medica, *Laccam* appellat, & Dioscoridis & Pau-
li verba citat. Citat etiam Galeni de Laccæ ver-
ba, quæ ego neque in Græco exemplari repento,
neque in Latina nostræ, magna ex parte, transla-
tionis editione habentur. Recipitur totum in
multas Arabum compositiones, & etiam, quæ
Distalla appellatur, de se cognominat. Et Offi-
cinis quoque hodie satis hæc nota est. Galenus
quidem radicem habet, rem à Cancamo
diversissimam. Sed non Cancam, sed *Cacantle-*
gendum esse, ex Paulo constat, qui eadem de i-
plo lib. inter simplicia tradit, quæ Galenus ha-
bet. Quid verò sit *Cacantum*, & an idem sit,
quod *Bacantum*, utrumque enim reperitur lib. 1.
Dolbellarum cap. 46. considerandum proponi-
mus in Paulum Aginetam.

Cacantle-
gendum esse, ex Paulo constat, qui eadem de i-
plo lib. inter simplicia tradit, quæ Galenus ha-
bet. Quid verò sit *Cacantum*, & an idem sit,
quod *Bacantum*, utrumque enim reperitur lib. 1.
Dolbellarum cap. 46. considerandum proponi-
mus in Paulum Aginetam.

Cancamum huc usque, *Laccam* quidam esse
putarunt. Horum mirus error deprehenditur,
quum Cancamum gummi odoriterum sit, *Lacca*
autem non gummi arboris, aut plantæ alicuius:
sed potius formicarum alatarum sterces (ut Ama-
rus quoque attestatur) savagovo, velut cera a-
pum. Sed hæc de *Lacca* hoc loco sufficiant, & ad
institutum nostrum, hoc est, an Cancamum sit
benzoinum (quod voluerunt aliqui inter quos
est Anguillara, & olim Amatus,) revertamur.

Cancamum igitur benzoinum non est, ut rece-
ptui canam, inquit Amatus. benzoinum liqui-
dem Sulphurum, sive *Laserpitium* odoratum no-
strum est, præcipue subnigrum, cum quodam ru-
bore. Vult tandem Amatus Cancamum esse gum-
mi quoddam, quod Animum vocetur. Sed quæ
fretus autoritate hoc asserat, fatemur noslatere.
Nos de *Anime* cap. sequenti.

Gesnerus hoc in loco non probat eos qui Can-
chamum apud Dioscor. per e aspiratum scribunt:
Mirum autem, inquit, nullam huius lachrymæ
mentionem à Galeno fieri. Ex confinio Casie
Cinnamique & Cancamum & Turum in vena no-
væ Plinius, nec alibi plura. Serapio & alij Arabes
sic appellant: *Laccam* vertunt interpretes. Sed
quæ hodie in Officinis *Lacca* vocatur, nec odo-
rata est, nec similes habere vires videtur. Ego
Cancamum, sive *Lacca* [ut vertunt Arabes] loco,
medica-

ABIEGNA RESINA INDICA LI- QUIDA.

CAP. XXXIX.

Locus. IN novi orbis continente colligitur liquor sive
resina, quam Abiegnam vocant, ex arboribus

Refina a-
biegna.
Indica.

Vitis.

Vitis.

Stomachus.

Stomachus.

Stomachus.

Stomachus.

Stomachus.

Stomachus.

Stomachus.

Stomachus.

Stomachus.

Stomachus.

Stomachus.

Stomachus.

Stomachus.

Stomachus.

Stomachus.

Stomachus.

Stomachus.

Stomachus.

Stomachus.

Stomachus.

Stomachus.

Stomachus.

Stomachus.

Stomachus.

Stomachus.

Stomachus.

Stomachus.

Stomachus.

Stomachus.

Stomachus.

Stomachus.

Stomachus.

Stomachus.

Stomachus.

Stomachus.

Stomachus.

Stomachus.

Stomachus.

Stomachus.

Stomachus.

Stomachus.

Stomachus.

Stomachus.

Stomachus.

Stomachus.

Stomachus.

Stomachus.

Stomachus.

Stomachus.

Stomachus.

Stomachus.

Cancamum (substitu-
tum.
Monachi
repreh.
Nominis
linguar.
Locus.
Vid.
in medicamentis, Myrrham potius iniecerim. Mo-
nachi autem [teste Amato] qui nuper Antido-
tarium exposuerunt, alia mente excutunt, de-
litanteve, quam in compositione Dialaxe, di-
cant: Si defecerit Cancamum sive Lacca, eius lo-
co iniciatur lachryma sanguinis Draconis. Quan-
to vero errore, omnes notant, quam Lacca aperiti-
va sit, & menses provocet: sanguis vero Dra-
conis tantum abest, ut aperiat, ut potius modo
constringat.

Cancamum Græcè *καγκάμιον*, Hisp. & Lusit. *Ani-
me blanc*, Arab. *Sac*, *Lach*, Officinis *Lacca*.

Loci & virtutis mentio nitebatur Pailus lib. 7. suæ
Medicinae, dicens: Cancamum lachryma est ar-
boris in Arabia Myrrhæ similis, odore grato, quæ
etiam ad lussitum utuntur.

Viserius est obesos extenuare, absterpere &
aperire obstruenda. Cancamum, inquit Diosco-
rides, Arabici ligni lachryma est, Myrrhæ quodam-
modo similis, virosi gustus, quam ad lussimenta
usurpant. Vestes eo additis Sytracæ & Myrrhæ
suffiuntur, datur lienosis, comitialibus & suspi-
riosis: menses cum aqua mulla pellit, oculorum
cicatrices corsestis emendat: ac vino madefa-
ctum, eorum medetur hebetudinibus, adversus
gingivas humore prægnantes non aliud effica-
cius, ut & ad dolores dentium ac per plussculos
dies ternum obolorum non pondere: ex aqua aut a-
ceto multo bibulum obesos extenuat.

ANIME ET COPAL.

CAP. XXX.

ANIME mentionem fecit Amat. Lusit. lib. 1.
enar. in Dioscoridis verbis: Cancamum Dio-
scoridis est gummi quoddam, quod ex Guinea
Mina, Africæve, & insulis illi circumiacentibus
Lusitani nostri advehunt, *Animum* appellantes,
quod testantur decidere ex proceris arboribus
quibus folia Myrti, unum album, alterum subni-
grum, Myrrhæ quodammodo simile, odoratum,
quod Dioscor. inter Myrrhæ species, tanquam im-
probam commemorat, & Mineam, à terra unde
præcipue nascitur, eam appellat: quanquam Se-
rapio Amineam nominet, unde Lusitani voce
corrupta, pro Minea, vel Aminea, *Animum* vo-
cant. Hanc vero assertionem primò adstruxit Ari-
stotus Gallus, & Cancamum esse dixit.

Sed ad memoriam hic revocandum est, quod
non solum Gileno in antidotis Myrrha Minea,
vel Aminea dicta cognita fuerit, sed hodie quo-
que in Lusitania & universa Hispania paucis im-
mutatis literis habeatur, *Gummi Animum* appel-
lantibus, cuius duo genera, album, & nigrum.
Nam album Cancamum esse ex aristoto didici-
mus: nigrum vero Minea Myrrha Dioscoridis
est. An vero Minea hæc regio, Mina hodie di-
cta, Regi Lusitanie parens sit, Cosmographis in-
quirendum relinquo. Scio enim in hac regione,
Animum optimum quoque reperiri, à qua quo-
tannis Lusitani nostri in Portugalliam adferunt.
Galenus vero Mineam Myrrham inter ceteras
species præcipuam collocavit, quæ de causâ in illo
textu libri de Antidotis, aut in Dioscoridis,
mendum esse suspicor, quam Dioscorides ex dia-
metro contradicat.

Amatus ergo, [non aspernans aliâs botani-
cus] Anime plantam Cancamum esse scriptum
reliquit, sed, [quod citra ullum animi pathema
dixerim,] non sine menda, quam in Anime
Tom. I.

Cancamum notas non comperiamus, ut ex Diosco-
ridis verbis percipitur, quæ ita habent: *καγκάμιον*,
quodammodo Myrrhæ simile. Sed Anime
proprie Resinam potius aliquis appellaverit
quam Gummi.

Erre Græcorum Cancamum mea [inquit Gar-
cias] sententiâ, id quod nos *Anime* vocamus,
quod in Lusitaniam ex Æthiopia, Arabiz sinu
ma, advehitur. Hallucinantur, qui Anime in
Brasiliæ regione inveniri contendunt, & genus
illud picis, sive bituminis, resinæve, in *Sirum*, ut
aiunt, non procul à Maluccis reperiunt, Anime
esse credunt. Nâm eius picis multa copia huc ex
Samarâ, aliisque regionibus advehitur, qua pi-
candis navibus utuntur. Sed nec colore præditum
est Cancamum simili, & durat ut resinam, aut
quodvis vulgare gummi olet.

Confirmat Clusius apud Græcos *Amari dus*
Anime, ac insuper *tertium* addit, quod pallidum
est & resinaceum, retortidumque. Omnia ve-
rò, ait, iucundum in suffumigis spirant odorem,
idemque videntur temperamentum ferre. Po-
stetiora dùm degustata magis siccare & amarelesce-
re deprehenduntur. *Anime* cur *Animum* Amatus
vocet, nescio. Dioscor. habet *Animum*. Non
desunt, qui Anime legitimum *Bdellium* esse pu-
tant, ob multas, quas habet, notas, cum *Bdel-
lij* historia communes. Vnum tamen prætere-

non est, quod, ut Casalpinus inquit, Stacte
quoddam cum oleo Syriaco ex Alexandria ad-
ferebatur sub nomine Balsami: sed postea de-
fuit, cum ex India Occidentali novum genus Balsami
afferri coepit. Sola autem expressa Myrrhæ af-
feruntur glebis magnis coacta. Ex hoc genere vide-
tur esse, quod vulgè *Anime* vocatur à nostris qua-
si *Aminæ* Myrrhæ: Ex Oriente affertur duorum
generum, odoris suavis, quibus Unguentarij ut-
untur. Vaporem candidum: alterum flavum: al-
bum autem præstantius. Referunt Hispani in In-
dia Occidentali, in suffimentis odoratis loco
Thuris sacerdotes, uti quadam candida resina,
quam *Copal* vocant, translucenta magnis glebis.
Orni & Anime flavius, in granulis Thuri simile:
valde autem odoratum est & suave. Dioscori-
des autem inter reprobatas Myrrhas, *Aminæ* vocat:
sed Galenus Mineam, ut Plinius appellat,
quam & ceteris præfert, quia ei non admittum
est *Opocarpasum*, quod est genus veneni.

Duo, ait Monardus, resinarum genera multa
similia ex Hispania nova adferuntur, quorum u-
num *Copal* vocatur, alterum *Anime*. *Copal* resina
est ad nodum candida & transparentis, magnis fra-
gmentis Diacitri valde transparentis haud diffi-
milibus: citis odorata, sed non perinde ut Ani-
me. *Anime* arboris est lachryma, seu resina alba,
ad Thuris colorem nonnihil vergens, verum
Copal magis oleaginosa. Defertur granis Thu-
ris, sed crassioribus, quæ contracta luteum colo-
rem ostendunt instar resinæ: gratissimi & suavissi-
mi odoris est, & prunis imposita facile consu-
mitur. Differt ab Anime Orientali, quod neque
tam candidum, neque tam lucidum sit. Orientale
item magnis fragmentis adfertur transparentibus,
ita ut nonnulli Carabe, seu Succini spe-
ciem esse suspicari sint, cum nihil sit minus.

Hermolaus ait Anime colligi vicinis locis pa-
go, in quo Thus nascitur, & ab illius pagi nomi-
ne Anime dici.

Novæ Hispaniæ Anime colligitur ex arboribus
mediocri magnitudinis, vulnereatis, non aliter,
quam Thus, aut Mastiche.

Scribit Clusius se nobilioris illius Orientalis
E.

*Folia Myr-
ti.*
Animum
album.
Animum
subnigrum.
Myrrha.

Cancamum.

Myrrha
Minea vel
Aminea.

Animum
Gummi
album *Cā-*
camum.
Nigrum.
Myrrha.

Amat. not.

Cancamum.

Pix sive
bitumen.
resinae in
Sirum.

Tempera-
mentum
Bdellium.

Stacte.

Balsamum
Myrrha.

Anime.

Copal.

Opocarpasum.

Copal.

Anime.

Anime O-
rientalis.

Carabe
seu Succini
speciem.

- Copal.** Anime fragmento, quod aliquot uncias pendebat donatum esse ab Hugone Morgano Pharmacopola Londinensi. Gomera porro in Mexicana historia, duo Copala genera facit, alterum rugosum, quod *Cilochiopalli* vocari dicit, molle, Thuri simile: alterum multo præstantius, *Copalcahualti*, quod plerique Myrrham existimant: liquor scilicet albus, qui vulnerata arbore guttatum stillat ac statim concreuit.
- Synonyma.** Hist. Lugd. p. 1791. nomina hæc habet: *Copal*, *Anime*, *Anime Occidentale*, *Animeam*, *Myrrham* esse putat Herbol.
- Vires.** Lusitanorum mulieres *Animo* maxime pro suffumigiis, & Medici contra dolores à frigidityte ortos præcipue utuntur, maxime capitis, ut Amatum adnotalle legimus. Confirmatur hoc edem testimonio Manardis, dicentis: Huius usus est in plerisque, sed capitis præsertim morbis, à frigidityte provenientibus, & de fluxionibus purgationes subsequenubus, cubiculis per Hyemem (etenim æthere purgat) & capitis operimentis, dormire sub noctem volentibus, sufficit: quin etiam ipso capite, si qui Cephalæ & Hemicræpiæ laborant: nam caput roborat. Miscetur emplastris & cerotis: ubi roborare, & frigidos humores, statimque dissolvere opus est. Thuris vicem supplet, cum in suffutibus, tum in iam dictis. Cerebrum roborat emplastri modo adhibitum, atque etiam ipsum ventriculum reliquasque partes nervosas, cerati modo, tertia parte cere admixta: atque sic gestatum diuini, & subinde renovatum, frigiditytem è quacunque corporis parte elicit. Calidum est secundo gradu, humidum primo.
- Thuris vicem supplet.**
- Temperamentum.**

ANIMES SPECIES AD SYCCINVM LUTEVM ACCEDENS.

CAP. XLII.

- Descriptio.** INTER *Animen* Paludani & *Copal* medio se habet modo ad vulgare succinum proximè accedens, à quo tamen duritie parum vincitur, croceo hilarior colore tincta, & *Animes* Paludani modo pellucida: sub dente in grumos minutissimos dissilit, & candelæ ardenti admota non ita promptè liquefit, ut *Copal*: quo tamen flammam & luculentiorē & pergraciorē fovet, minutissimas bullas eructans, odore non multum differens, quo & ardendi modo magis refert *Animen* à Paludano missam. Hanc misit Antuerpia Coldenbergius.
- Color.**

ANIME SIMILIS RESINA EX ALBO FLAVESCENS.

CAP. XLIII.

- Descriptio.** PETRVS Garetus dedit, Clusio scribente Exoticorum lib. 4. cap. 8. resinam delatam ex longinqua navigatione anno 1600. quæ Succino non ablimilis erat, transpatens & lucida, penè instar *Anime* Americanorum, cuius fortasse genus: color ex albo flavescens, odor non iniucundus, sapor amariuscule, deinde acriuscule: in micæ potius dissiliebat, quàm ut dentibus cederet, aut ore retenta, mollesceret: igni tamen admota, liquebat, flammamque concipiebat & ardebat.

ANIME ALBA PERLVCIDA.

CAP. XLIV.

- Descriptio.** ANIMES alba nomine peregrinam quandam resinam Ill. C. V. Viri. milit. D. Paludanus, unde & specimen asservo. Succini nostratis consistentia paullo fragilior, Vernicis solidæ, seu Sandarachæ arborum modo, nonnihil albicans, & pellucens, vitri modo, sapore Vernici non ablimili odore, cum adoleatur, Mastiches: nec penitus vivo carboni imposita, flammam concipit, liquefit & evanescit, crassamentum quoddam resinarum more relinquit, sub dentibus dissilit, nec facile coit, eâ ratione, quâ Sandaracha. Anno 1605. ex Anglia rediens Gener Cherlerus attulit magnum fragmentum cum inscriptione *Anime*.
- Sapor.**
- Odor.**

ANIME COLORE COLOPHONIE.

CAP. XLV.

- Descriptio.** IMPURIOR hæc *Anime*, cæteris speciebus, Colophoniz aut Taurocollæ colore, obscura quàmque acies oculi nequaquam penetraverit: vngibus quibusdam fere nigricantibus resperfa, Colophoniz concretionē, flammam & promptam & pertinacem concipit, reliquarumque more ardendo bullit, bullis tamen maioribus: gustanti saporem quendam austerum imprimat: odor acutior paullo videtur & ingrator, quàm reliquarum specierum. Hanc habui Antuerpiâ à Coldenbergio.
- Sapor.**

ANIMES SPECIES ALBA COPAL INDIS.

CAP. XLVI.

- Descriptio.** COPAL Americanorum & *Animes* quartæ nomine missa Antuerpiâ à Coldenbergio resina, fusa videtur: ita cylindri sulphurei fusilis portionem refert semicircularem: externâ parte gibbâ, coloris albi: internâ, flavi: concretionē densâ, *Animes* à D. Paludano missæ, sed non ut illa, visus aciem transmittens: et si interim diffractæ micæ pellucidæ sint: flammam promptè concipit, nisi hanc præriperet liquatio: odore iucundiorē, quàm resina Itrobilina, sed ad *Animes* Paludani gratiam non accedente, nescio quid tamen Styracem redolente: sub dente lenesceat Mastiches modo, nec adhærescit, & albescit, sapore grato. Gener Cherlerus ex Anglia redux attulit similem resinam, anno 1605. cum hac inscriptione: *Animes* alba à D. Garetto fragmentum fuit magnum semicirculare.
- Odor.**

AMBARVM.

CAP. XLVII.

- Descriptio.** NON desunt Monardi, qui Ambar ex fructu quodam ad maris litus nascente fieri dicunt, qui mensibus Aprilis & Maio maturefcit, & odoratus sit, quem decidenter vorant Balanzæ: quasi fructus in alimentum cedens, aliud quàm sanguinem & carnem generare possit. Hæc Monardes, qui nobis præbet occasionem scribendi de Ambar.

Ambaro, & tradenda eius historiz, in hoc Botanico nostro opere.

Ambari ergo [quantum quidem colligere licet] Simeon Sethi, Aëtius, Avicennas, & Serapio cum Averrhoë ex veteribus meminerunt. Ex Neotericis autem Ferdinandus Lopez, Iulius Cæsar Scaliger, Garcias, Monardes & Clusius. Quorum quidem circa huius generationem discrepans est opinio. Alij siquidem sperma Balenæ esse asserunt: alij hællux cuiusdam marinis excrementum, aut maris spumam, [quæ sanè opinioniones ratione carent, quod nullum Ambarum inveniatur, ubi frequentissime sunt Balenæ, & ubi fluctuum reciprocatione spuma plurima excitatur,] alij bituminis modo ex maris alveo eminare: quæ opinio melior, & veritati magis consona planisque visa est.

Inter Græcos autem solus Simeon Sethi & Aëtius huius recordati sunt, & quibus prior Bituminis modo de fontibus suis manare assent, pessimumque id esse, quod à piscibus devoratur. Inde convehitur, inquit Monardes, eorum opinio, qui Balenarum sperma esse asserunt, ex eo decepti, quod interdum in Balenarum ventriculis inveniatur, quæ illud aquis imbutans nonnunquam devorant, alimentum esse existimantes. Verum est, meo tempore Balenarum circa Canarias, quas Fortunatas Insulas putant, captam, in qua inventæ sunt plus quam quatuor Ambari atrores, [ponderis apud Hispanos genus, quod viginti quinque libras pender,] sive centenz librarum: postea tamen infinitas Balenas, cum suis catulis interfecerunt, sed nihil Ambari in eis inventum est. Sed & qui ex Florida adventant, referunt Balenas in illo mari versari: quas tamen cum suis catulis necant, in neutris Ambarum repensse. Illos catulos porro Americani summa dextentate in hunc modum capere solent. Sumpto longo & forti fune, cui innexus sit laqueus, cymbam ingreditur Americanus, & Balenæ cum suis catulis advenienti obviam progreditur: uni ex catulis vicinior factus insiliit, & laqueo rostrum induit. Illic id sentiens catulus in altum se mergit una cum Americano ipsum amplexante [summi etenim natatores sunt Americani, diuque in aqua peristere queunt] Balenæ autem catulo respirare volenti, summi aquor repetere necesse est: interea Americanus per eius nates, sive meatus illos, quibus respicit, cuneum vel paululum acuminatum pugno adigit, ut minime excuti possit: deinde laxato fune suam cymbam conscendens illum subsequitur, donec obstructis meatibus respirare nequens, suffocetur, & in terram eliciatur. Iucunda sanè at non minus periculosa est ista venatio: sed aded industriæ & agiles sunt isti Americani, ut etiam Caymanem [Lacerti, sive Crocodili genus est, binos & triginta pedes longum, ferocissimum omnium quæ in mari versantur, belluarum] unus Americanus occidere queat.

Ex Arabibus verò Avicenna lib. xii. cap. 27. & Serapio lib. simpl. cap. 196. scriptum reliquerunt, fungorum in rupibus & arboribus more Ambarum in mari generari, & tempestatibus undæ cum laxis interdum in littus eici: quæ sententia verisimilior est reliquis ab Avicenna productis. Nam multum flantibus Euris, magna eius copia Sessalæ, & in insulas Comaro, Demopæ, Mosambicæ, totumque cum tractum elicitur. & Maldivæ insulis quæ ad Orientem spectant. Flantibus verò Favoniis, copiosè invenitur in insulis, quæ vulgò de Maldiva nuncupantur corrupto vocabulo,

Tom. I.

cum de Naldiva dicendum sit: etenim nase lingua Malabrica significat quatuor, & Diva insulam: Naldiva igitur pronunciandum erit: quasi dicas, Quatuor insulas, simili planè ratione, quæ Angediva vocamus eas insulas, quæ à Gæ, Orientalis Indiz emporio, duodecim leucis distant, quod quinque sunt numero conterminæ, æge enim eorum lingua quinque est. Sed hæc præter institutum: non potui tamen harum non meminisse, cum in Maldiva mentionem incidissem.

Scribunt iisdem locis suprà citatis, Ambarum devorari à pisce quodam Azel nuncupato, sed qui eo devorato statim extinguitur. Hinc deinde undis fluctuantem regionis illius incolæ ancis in sicum trahunt, eoque exenterato Ambarum colligunt: verum nonne improbare, præter id, quod spinæ a therses, id enim pro temporis diuturnitate purum, & legitimum esse. Sed hæc eorum opinio erronea mihi videtur. Nam veluti certum est animalia quæere alimentum nature suæ conveniens, & minime noxium, nisi forte cibis intortis ad nito decipiantur, quemadmodum mures fallere solemus: sic etiam si quandoquam verisimile videtur, hunc piscem Ambarum venari, si eo devorato sit periturus. Imò cum Ambarum sit ex eorum numero, quæ maxime cordis vires reficiunt, dixerim hunc piscem præsentem esse venenum, quandoquidem tam eximio medicamento devorato perit.

Scribit Averrhoës 5. coll. cap. 36. Caphuræ genus inveniri natum in maris alveo, quod deinde aquis supernatet: laudatissimum verò id censet, quod Arabibus Ascap dicitur. Quam verò eius opinio à veritate sit aliena, & tanto vitio, insignique Philosopho indigna, clarius est, quam ut multis demonstrari debeat: primum quod Caphuram in mari nasci dicat, deinde, quod eandem, quæ frigida est & sicca tertio gradu, Ambari genus faciat, quod calidum & sicum constituit secundo ordine.

Cæterum ex Neotericis Ferdinandus Lopez de Castagneda, qui rerum à Lusitanis in India Orientali gestarum historiam scripsit. lib. 4. cap. 35. dicit, selectissimam Ambram in insula Maldiva inveniri, cuius generationem cum fieri tradat diversam, ab ea, quam ceteri scribunt, non absere futurum existimavi, si, quæ de generatione Ambræ tradit ex Italico sermone à Clusio conversa, hic subicerem.

Maiores insulæ de Maldiva, Archipelagi illius interioris, multas odoríferas herbas producant, quas depastum veniunt magnæ quædam aves ab incolis Anacogrissas nuncupant. Istæ aves in rupibus & scopulis earum insularum secundum maris litus sitis versantes & aggregatæ, stercus egerunt, quod Ambræ est, cuius tria genera faciunt: unum album, ipsis scopulis, uti egestum est, inhærens, quod probatissimè censet, & Panahambar, h. e. auream Ambram appellant, maioris quam reliquæ pretii, quod pauca quantitate & maiore difficultate reperitur, quam alia duo genera, quæ cineracei & nigri sunt coloris, ac ex alio originem trahunt. Ex illis quos dixi scopulis, tempestatum vehementia temporis successu, magnis fragmentis in mare cadit hæc Ambræ, & de Combar littus elicitur: id Combar dicitur, id est, aquæ Ambræ, quoniam aquarum fluctibus valde eluta, magnam suæ probitatis partem perdidit. Tertium, quod nigrum, Maniambar vocant, quod significat piscis Ambram: nigredinem enim contraxisse existimant, quod à Balenæ, aut aliis pi-

Ec 2

Vatia circa Ambari generum opinio. Sperma: Balenæ. Excrementum bellæ. Maris spuma.

Simeon.

Ambarum est sperma Balenæ.

Averrhoës prob.

Stercus.

Stercus.

Maniambar.

In mari generantur.

scibus inter istas insulas versantibus devoratum fuerit, qui illud concoquere non valentes, cursus evomerunt: id autem est omnium vilissimum, quia penè totam facultatem amisit. Hæc Castagneda.

Alia opinio Garcia de Ambaro hæc est. Veluti pro regionum natura terra interdum rubra est, ut Bolus armenus, interdum candida, ut Creta, nunquam nigricans: sic verisimile est, aut insulas, aut terras similis cum Ambaro formæ inveniri, quod terra sit aut fuggosa, aut alterius generis. Quod verum esse testatur, magna eius, quæ reperitur, quantitas. Siquidem interdum inventa sunt fragmenta humanæ magnitudinis, interdum nonaginta palmorum longitudinis, duo de viginti latitudinis. Affirmant nonnulli se Insulam ex puro Ambaro vidisse, eamque postea requirerent, nusquam comparuisse. Restat vero est plerumque avium rostris, quas in eo ridulari credibile est: ac interdum conchyliis, testisque ostreorum permixtum invenitur, quæ contactu Ambaro adherent.

Varia est, pergit Manardes, circa Ambari originem opinio: sed verissimum est, Bithyniæ genus esse, ex fontibus in alto mari manans, quod ad præpositum, illico densatur, ut solent pleraque, quæ sub marinis aquis tenella & mollia sunt, at aqua exempta, durantur, ut Corallium, Succinum.

Quid possit sit legitimum Ambarum, atque quo modo nascatur, dicam, ait Clusius, quod Francoforti ad Mœnum anno 1593. paulò ante meum ex ea urbe abitum, mihi referebat vir probata fidei, mihiq; amicus D. Servatius Maref, Bithundis, qui multas regiones peragraverat, Ambarique, Moschi, Gemmarum & similitum rerum mercaturam exercuerat. Quam enim de Ambaro inter nos sermo incidisset, ille ad me, Exploratūne habes quidpiam de Ambaro? Non inquam, præterea quæ ex Garcia Aromatum historia, & libello Nicolai Monardis de simpl. med. è novo Orbe delatis didici. Legi, inquit, utrumque illum, quidem à te Latinum factum, hunc vero Hispanico sermone divulgatum. Sed quid aliud adferunt, quam authorum dubia testimonia, qui excurrentes, tanquam in tenebris versantur? Mihi autem crede, Ambarum nihil aliud esse, quam crecrementa quædam in ventriculo Balenæ verè mælo tempore collecta, verè inquam, quia plerique Cetaceos alios pisces, ut Orcadem, Phæterem & similes magnis dentibus præditos Balenæ appellatione donant. Balena autem legitima, nullos dentes habet, sed integros pisces vorat, & mollibus inprimis delectatur, ut Polypis, Sapiis & similibus, quibus in ventriculo non bene confectis, necesse est, multam viscidam materiam in eo generari, quam postea simul congestam, & ventriculum nimis gravantem, vel singulis annis, vel breviori temporis spatio reiecit. Ista materia tamdiu in ventriculo adservata, dein reiecta, & mari innatans, Ambarum est, in quo interdum Polyporum devoratorum rostellæ deprehenduntur. Si Balenæ, liberato iam recens ab illa materia ventriculo, capiantur, nullum Ambarum habere reperientur, si aliquantò post reiectam materiam, aliquid quidem habebunt, sed deterius, nec probè excocti, atque ita paulatim crescens illa materia congesta, probitate vetustate acquirit, ut si, ante quam ventriculus illa materia liberatus sit, Balena capiat, plurimum & optimum reperietur. In aliorum verò Cetaceorum, quos antè retuli, ventriculo, frustra

requiritur, itaque nihil mirum, si qui capros conserunt, Balenas esse existimantes, nihil Ambari in illorum ventriculo repererunt. Probat autem allerebat Ambarum, cineraceo quodammodo colore præditum, illud verò optimum esse notæ indicium, si eius fragmentum candenti ferro, laminæve ferreæ bene calefactæ, aut cultello applicatum, veluti in oleum resolvatur, quod nanibus admodum suavem odorem spiraret. Monardes etiam optimi delectus esse tradit, quod ad rubedinem non nihil tendit, albumque non æquè bonum asserit, nigrum verò deterrimum facit.

Eius autem pretium, ut nobis auctor est Garcia, intenditur pro fragmentorum magnitudine: quanto enim maius est fragmentum, tanto eius intensius est pretium, non secus atque in geminis. Sed quicquam pleris venditur, quam in Sinarum regione. Cum enim à nostris Lusitanis eius exigua copia ad delata esset, pretium fuit mille quingenti assari in singula Cate, quod apud eos ponderis genus est, pendens viginti uncias. Huius lucri cupiditate deinde alij mercatores ellecti, tantam Ambari ad detulerunt copiam, ut hæc multò vilioris æstimeretur.

Subiungamus modò nonnulla vocabula, quæ apud Serapionem & Avicennam occurrunt. Magnam eius copiam ex regione Zing Serap. libr. simpl. cap. 196. adferri asserit. Hæc est Salsala. Nam Zing aut Zangne Persis aut Arabibus idem significat, quod niger Latinis: & quoniam totus ille maritimus Ethiopie tractus à Nigris incolitur, Serapionem Zuinge vocat. Sic Avicenna lib. 2. cap. 63. epitheton illi addit Almendeli, quasi de Melinda: item Selachiticum (posteriora exemplaria habent Aleleheii,) à Zeilan fortè laudatissima totius Orientis insula, quam falsò urbem esse Lacuna comm. in Dioscorid. existimavit, cum sit insula multis urbibus excolta.

Ambarum Latinis, Ambar Arabibus dicitur. Nomina, quo nomine omnibus quas sciam [Garcias] nationibus notum est, aut immutato duntaxat paululum vocabulo. Sed quid adhuc Hadrian. Iun. percipere quælo Garcia. Maris flos, inquit, vocatur, æstæ æstæ, sperma Ceti, vel Balenarum Officinis, & Ambar subalbidum, Germ. Waldrath, Baldrath, quasi præsentaneam opem adferens, Belg. Walschor, quod sonat Balenarum crecrementum genitale, sive semen.

Locus assignatur varius. Anno 1555. circa promontorium Comorim, quod è regione insularum de Maldiva est, fragmentum trium serè millium pondo repertum est: sed cum is, qui invenerat, picem, aut bituminis genus esse existimaret, vili admodum vendidit. Maximum verò quod unquam viderim (inquit Garcia) fragmentum, quindecim libras pendebat. Sed qui in Ethiopiam commercii causa navigant, multò maiora fragmenta se vidisse affirmant: totus enim ille Ethiopie tractus, à Salsala ad Brava usque, Ambaro abundat. Nunc mittit Florida novi orbis provincia Ambar, quod vocant Griseum, idque in litus eiectum invenitur à Canaveral ad promontorium usque D. Helenæ.

Vires perscringit, Garcia dicens: Nota est Manardis contradictio, qui in Electario de Gemmis dist. 1. in compos. Med. Ambarum rem novam esse affirmat, eamque non magno æstimat, sed paulò post in Electario Diambra ibidem, quasi sui oblitus, hanc compositionem ob Ambarum multis

Insula ex
Ambaro.

Ambar bi-
tumen est.

Ambarum
legitimum.

Crecrementum
Balenæ
non vera.

Dale. 2. m.

Prelim.

Vires & r.
tus.

multis laudibus effert, eoque se in mulierum & senum morbis saepenumero uti asserit. Ac magna in aestimatione esse apud opulentiores Indos asserit, ut pote quo tibiis permixto frequenter utuntur medicamenti loco. Excalescit, resolvit, roborat, quocunque tandem modo applicetur: nam calidi est temperamentum & sicci, cum pinguedine quadam, quâ emolliendi facilitate praeditum est. Variæ sunt Ambari facultates: nam cum oleo florum Mali Arantii, sive Alsyri in calente mortario permixtum, & unguenti modo capiti illitum, illius dolorem levat, cerebrum corroborat & nervos, & frigidos, qui infarcti sunt, humores resolvit: ad eadem efficax, emplastri modo cum Alypta muscata assidue gestatum. Eius folius, aut cum Moscho & ligno Aloës permixti, olfactu cerebrum roboratur, memoria augetur, spiritus vigor & cordis vires reficiuntur: ideoque in pestis contagiis illius odor adprimè utilis est: nec minùs his, qui frigidis defluxionibus vexantur, convenit, si caput tegmina, atque etiam cubiculum, ubi dormiunt, per Hiemem eo suffiantur: Maxime prodest senibus, quod illorum spiritus vegetet, cor & cerebrum roboret, & crassos, lentosque humores, quibus plurimum abundant, extenuet, sive cubi indatur, sive vestes suffiantur, sive cerebro, cordisque regioni applicetur, sive vino, quo sibi faciem, & manus ablunt, permisceatur. Scobi Magnetis, Galbanoque miscetur, & emplastri modo mulierum umbilico impositum, uterum suo loco retinet, & reliquos eius morbos profligat, eius autem assiduus odoratus prodest uteri procidentis: suffocationibus verò, in Liquidambar dissolutum, ex xylo exceptum, uterique ori impositum. Sterilitatis à frigidis humoribus ortæ, hac compositione mederi soleo, quæ recipit Ambari partes duas, rasuræ Eboris tenuissimè tritæ unam, pulveris ligni Aloës partem dimidiam, cum Algali momento: sunt catapota, quorum tria pendentia & singulis triduis dabuntur, & emplastrum umbilico, possum uteri colo imponetur, purgatis tamen prius uti decet. Ex eo, alypta moschata, & styracis sit emplastrum scuti formâ, quod stomacho adpositum, ipsum doloribus liberat & excalescit. Ex eadem massa factæ pilulæ, & manè sumptæ, flatus discutunt, concoctionem iuvant, & appetentiam excitant: idem præstat ex vino odorifero manè sumptæ hæc massa. Tritum Ambar, & cerâ flavâ exceptum, cordis regioni utilissimè imponitur, ad sedandos dolores è flatibus, aut alia quavis causâ (modò calida non sit) provenientes. Eadem ratione, quâ sensibus, melancholiâ laborantibus etiam convenit, & paralyticis, si eo aut eius mixtura suffiantur, aut cerebrum totâque spina eo inungantur: etenim Ambar præ cæteris medicamentis nervos & cerebrum roborat. Quinetiam epilepticis sumus illius, naribus exceptus, convenit, siquidem illos excitat, & si assidue id odoratur, non tam faciliè, neque tam vehementer eo morbo corripiuntur. Illud admiratione dignum, quod Simeon Sethi scribit: Si quis Ambar odoratur antequam vinum bibat, eum veluti ebrium fieri: si verò iniiciatur vino maximè inebriare.

POPULO SIMILIS TOCOTGEBIT, CUI
RESINA THYRS CANDIDIOR.

CAP. XLVIII.

REFERT Fragosus in India Occidentali arborem inveniri Tocot-guebit, i. e. lignum
Tom. I.

desiderii, seu exoptatum dictum, Populo similem, summi candoris, cuius materies ob candorem, levorem & splendorem, summe expetebatur ad idola fabricanda. Sub eius cortice nascitur gummi, seu Resina Thuri nostro similis, sed candidior, & minoribus fragmentis, quo isthic utuntur, ut nos Thure. Clus. apud Monardem post Copal & Anime ponit hanc arborem, non tamen candentem sicutum Copal. Observandum autem Tacamahacam dici similem Populo. Est & apud Lobel. Populus novi orbis, de qua nos histor. nostr. lib. præced. 8. cap. Consideretur sequens Resina.

CARANNÆ GARCIE NOMINE
DATA RESINA.

CAP. XLIX.

Dominus Volmarus Pharmacopœus Eslingensis insignis, dedit anno 1581. Carannæ Garcie nomine, Resinam Galbani coloris durissimam, quæ etsi friata pulverem remitteret luteum, lentescere tamen: resinæ Strobilini odore: nidorem, cum flammis adoleatur, reddens ferè Animæ.

De hac Monard. Caragna Indis dicta & Hispanis, resina, colore Tacamahacæ, paulò limpidior, odore simili, sed graviore. Alibi in vers. Clus. Caranna medicamentum novum est, quod decem annis elapsis primum allatum est, & oleaginosa, ideoque tenax sine multa adglutinatione, & colliquatione. Colligitur vulneratis arboribus. Est & alia quædam prior, & Crystalli modo limpidâ, multo præstantior, viliore & odorator.

Hist. Lugd. Caragna etiam dicitur.

Ex Continentis parte interiore per Caragnæ Locum. & Nunc DEI deserti scripsit Monard.

Ea videntur Indi in tumoribus & omnis generis doloribus. Ad eosdem morbos laudatur, quos Tacamahaca curare solet, & minore temporis spatio vires suas exerit: sic ut quos Tacamahaca non curant, Caranna sanat. Exemplum vidimus in eo, qui ob humeri cruciatus iam multo tempore brachium movere non poterat, tamen Tacamahaca usus esset: sed postquam Caranna vi coepit, triduo sanitati restitutus est. Mira est eius vis in iuncturarum doloribus: nam imposita, faciliè illos curat, modò nulla sit calidiorum humorum influxio. Tumores inveteratos dissolvit, defluxiones humorum frigidiorum, aut mixtorum sistit: ad quosvis nervorum & cerebri dolores valde utilis, vulneraque recentia, nervorum præsertim & iuncturarum nullo alio admixto medicamento sanat. Defluxiones in oculos, & alias partes reprimat, pone aures, ac temporibus imposita. Excedit secundum caloris gradum.

SANDARACHÆ SIVE VERNICI
QUIBUSDAM DICTO, AC Mastiche accedens Resina.

CAP. L.

EST nobis resina delata anno 1605. ex Angliæ per generum Chederum cum hac inscriptione: Lacryma suavis spirans: Anime speciem. CLD.D. David Selinus Medicus Londinensis existimabat: mihi sanè odor illius resinæ gratus videtur ut ligni, quod Thuri vocant, minùs tamen placet: igitur accenso, faciliè liquefit & con-

Ex 3

Lignum de
fidery
Populo si-
milis.

Thuri si-
milis.

Caranna
resina.
Def.

Caragna.

Vires.
Tumores.

Dolor iun-
cturarum.

Pulvera:

Defluxio-
Tempera-
mentum.

Sterilitas.

Melancholia.
Paralytic.

Nervi Cerebri.

Ebrietatem
avocatur.

Tocot-guebit.

sumitur: cortex cui adharet, non crassus, sapore percipitur nonnihil salunginoso, resina parvi grumuli valde friabiles, qui dentibus facile atteruntur, ferè similes Mastiche, minùs tamen albi, sed flavi, lucidi, ad Sandaracham accedentes.

Terebinth.

Perpendenda resina arboris Terebinthi, de qua ante. A nostra resina non videtur multum differre, si non eadem, ac sequens etiam ex Clusio Mastichina resina non valde ab similibus.

MASTICHINÆ RESINÆ NON VALE AB SIMILIBUS SUCCIS.

CAP. LI.

Descriptio

TRADITUR à Clusio Exot. lib. 4. cap. 8. resina ci data, per Petrum Garcum ex longinqua navigatione anni 1560. Mastichina autem resina, inquit, non valde ab similibus erat textus hic succus, nuntius tamen albus, friabilis, ut resina, manibus tamen emollitus, aut ore retentus saliquantisper lentescerebat, nec à grati odoris deprehenderebatur, ut neque etiam saporis, aliquantulum tamen acris, igni admotus, flammam etiam corripiebat, quæ statim exstingueretur, atque instar cere liquecebat. Erat etiam hic succus, siue verius resina, foliis quibusdam involuta; quibus recentem fluentem exceptam fuisse verisimile est.

AMBRÆ FACIE RESINA

CAP. LII.

*Descriptio
color.*

QUI ex India anno 1601. redibant Batavi nau- tæ, autore Clusio. Exot. lib. 4. cap. 6. Magnam resinæ cuiusdam fragmentum afferebant, quod libram & sex uncias pendebat, coloris ex fusco cineraceo, & plerisque partibus Ambra odorata colorem referentis, sic ut qui ab arbore detraherent, legitimam Ambra esse sibi persuaderent: resinaceus tamen odor, licet non ingratus, ab ea opinione illos dimovere debuerat.

In quem autem usum adhiberent, ignorabat honestissimus vir Franciscus Peninus, civis Amstelredamensis, qui ab illis redemerat, & permittebat ut describere possem.

ELECTRUM SIVE SUCCINUM IN GENERE.

CAP. LIII.

*Electrum
Succinum
Carabe d.
lambrium.*

MVITI inquit Amat. verbis Dioscoridis in- ter crediderunt Electrum, siue Succinum, quod Carabe Arabes appellant, & vulgus Alambrum, Populi gummi esse, non animadvertentes, Dioscoridem aliorum opinione verba illa retulisse, & ut falsa reliquisse, minimeque approbasse.

*Mendacia
de Succino.*

Ut autem planius noscatur, ait Plinius, quam mentiti sint authores de Succino, verba eorum hæc subiiciam. Proximum igitur locum in deliciis feminarum tamen adhuc tantum, eandemque omnia hæc, quam gemine, auctoritatem, sanè maiorem aliquibus de causis crystallina & muricina, rigidi [frigidi vet.] potius utraque. In Succinis causam ne delicia quidem adhuc excogitaverunt. Ocasio est vanitas Græcorum diligen-

ter. Legentes modò equè perspetiantur me de ortu eorum dicere, cum hoc quoque inter sit vitæ, scire posteros, quicquid illi prodidit mirandum. Phæthontis fulmine icta, sorores luctu mutatas in arbores Populos, lachrymis Electrum omnibus annis fundere iuxta Eridanum amnem, quem Padum vocamus: & Electrum appellatum, quoniam Sol vocatus sit Elector, plurimi Poetæ dixerunt, primique ut, ait Aeschylus, Philoxenus, Nicander, Euripides, Sætyrus. Quod esse falsum, Italicæ testimonio patet. Diligentiores eorum, Electridas insulas in mari Adriatico esse dixerunt, ad quas dilaberetur Padus. Quæ appellatione nullas unquam ibi fuisse, certum est: nec verò ullas ibi appositas esse, in quas quicquam cursu Padi devenire possit. Nam quod Aeschylus in Iberia, hoc est, in Hispania, Eridanum esse dixit, eundemque appellari Rhodanum, Euripides rursus & Apollonius, in Adriatico littore consuere Rhodanum & Padum, feliciorem veniam facit ignorati Sætyri in tanta Orbis ignorantia. Modestiores, sed æquè falsum, prodidit in extremis Adriatici sinûs rupibus in vis arbores stare, quæ Canis ortu hoc effunderent gummi. Theophrastus in Liguria effodi dixit. Phæthontem in Aethiopia Hammonis obuisse: ob id delubrum ibi esse atque oraculum, electrumque gigni. Philemon fossile esse, & in Scythia erui duobus locis: candidum atque cerei coloris, quod vocaretur Electrum: in alio loco fulvum, quod appellaretur Salsiternicum. Democritus Lyncurion id vocat, & hinc ex urina Lyncum bestiarum, & maribus fulvum & igneum, è foetibus languidius atque candidum. Alij dixerunt Langosium, & esse in Italia bene Langosium: Zenothemus Langosium vocat eadem, & circa Padum vitam affirmat. Sudmes arborem, quæ gignat in Liguria. In eadem sententia & Metrodorus fuit. Sotacus credidit in Britannia arboribus effluere, quas Electridas vocavit. Pytheas Guttonibus Germaniæ genti, accoli æstuarium Oceani Mentonomon nomine, spatio stadiorum sex millium: ab hoc diei navigatione insulam abesse Abalum: illud verò fluctibus advehi, & esse concreti maris purgamentum: incolas pro ligno ad ignem vi eo, proximisque Teutonibus vendere. Huic & Timæus credidit, sed insulam Baltiam vocavit. Philemon negavit flammam ab Electro reddi. Niceas radiorum Solis succum intelligi voluit. Hos circa occasum credit vehementiores in terram actos: pinguem sudorem in ea parte Oceani relinquere, deinde æstibus in Germanorum littora eici. Et in Ægypto nasci simili modo; & vocari Sacal: item in India, gratiusque Thure esse Indis. In Syria quoque feminas verticillos inde facere, & vocare haspaga, quia folia & paleæ, vestiumque simbras rapiat. Theophrastus Oceano id exfluente ad Pyrenæi promontorium eici: quod & Xenocrates credidit, qui de iis nuperrimè scripsit. Vivit adhuc Asarubas, qui tradidit iuxta Atlanticum mare esse lacum Cephisida, quem Mauri vocant Electrum. Hunc Sole excalescens limo dare Electrum fluitans. Mnesias Africæ locum Sicyonem appellatum, & Crætan amnem in Oceanum effluentem è lacu, in quo aves, quas Meleagridas & Penelopas vocat, vivere. Ibi nasci ratione eadem, quæ supra dictum est, de Electride lacu. Theophrastus dicit, iuxta Syriam magnam hortum Hesperidum esse, ex quo in Stagnum cadat, colligi verò à virginibus Hesperidum. Ctesias Indis flumen esse Hypobarum, quo vocabulo significetur omnia vasa ferre bona: fuerit

*Portarum
fabula.*

*Fossile in
Scythia.
Candidum
Electrum.
Fulvum
Salsiternicum.
Lyncurion.*

Langosium.

*Fluitat
arboribus.*

*Concreti
maris pur-
gamentum.*

*Sacal de
India.*

*Haspaga
feminae
simbras.*

*limo mag-
is.*

Ex arboribus.

Thiolum.
Succinum.Sophocles
notat me.Lachry-
mae arboris.

Locus.

Cilicium
Germania.E medulla
arboris.Vires &
vires.
Tensile.Armo-
succino.Glebae
librarum.Liquidum
destillat.Genera
Succini.

fluere à Septentrione in exortivum Oceanum iuxta montem silvestrem arboribus Electrum ferentibus. Arborea estaphytoras vocari, qua appellatione significetur prae dulcis suavitatis. Michridates in Germania littonibus esse insulam vocarique eam Olerictam: Cedri genere livofam: inde defluere in petras. Xenocrates non Succinum tantum in Italia, verum etiam Thiolum vocari, à Scythis verò Sacrum, quoniam & ibi nascatur. Alios putare in Numidia gigni. Super omnes est Sophocles Tragicus Poeta, quod eundem miror tanta gravitate cothurni, & praeterea vitæ famâ, alias principe loco genitus Athenis, rebus gestis, exercitum ducto. Ille ultra Indiam fieri dixit è lachrymis Meleagridum avium. Meleagrum deffluentem.

Quod & credidisse eum, vel sperasse alius persuaderi posse, quis non miratur, quæve pueritiam tam impentam posse repenti, quæ avium ploratus annuos credat, laetymæve tam grandes, avēsque è Græcia, ubi Meleager perit, ploratum ille in Indos? Quid ergo non multa quæ fabulosa produnt Poeta: Sed hoc eam re, quæ quotidie invehatur atque abundet, & hoc mendacium coarguat, sermone quæ dixisse summa hominum contemptum est, & intoleranda mendaciorum unpunitas. Idem rursus eodem libro 37. cap. seq. de ortu & medicinis, & generibus & luxuria luccis orum, inquit: Certum est gigni in Insulis Septentrionalis Oceani, & à Germanis appellari Glesum: itaque & à nostris unam insulam ob id Glesianam appellatam, Germanico Cæsare ibi claudibus rem gerente, Austrariam à Barbaris dictam. Nascitur autem defluente medulla pini generis arboribus, ut gummi in Cerasis, resina pincis. Erumpit humore abundantia: densius rigore, vel tepore autumnali. Cum intumescens affusit apert ex insulis, certe in litora expellitur, ita volatile, ut pendere videatur, atque coacti ferre in vado: quod arboris luccum esse pini, nostri crediderunt, ob id succinum appellant. Pinea autem arboris esse indicio est pincus in attritu odor, & quoddam accensum tectum modo ac ridore flagret. Affertur à Germanis in Pannoniam maxime Provinciam. Inde Veneti primum, quos Græci Henetos vocant rei famam scire, proximi Pannonia, id accipientes circa mare Adriaticum. Pado vero annexa fabule videtur causa, hodieque transpadanarum agrestibus formis, monilium vite succina gestantibus, maxime decoris gratia, sed & Medicinæ: quando consillis creditur resistere, & facium vitis, vario genere aquarum iuxta illos infestante guttura ac vicinas carnes. D. C. ferè M. pass. à Carnuto Pannoniæ abest litus id Germaniæ, ex quo invehitur, per cognitum nuper. Vidit enim eques Romanus missus ad id comparandum à Juliano curante gladiatorum munus Nerolis principis, qui hæc commercia & litora peragravit tanta copia inventa, ut retia arcendis feris podium protegentia Succinis notarentur, arma verò & libitina, totiusque vnius diei apparatus esset è Succino. Maximum pondus is glebæ attulit 11. librarum. Nasci & in India certum est. Archelaus, qui regnavit in Cappadocia, illinc coruice inharrente tradit advehi rude, polirique adipe suis lactentis incustum. Liquidum primò destillare, argumentum est quædam, intus translucentia, ut formicæ: aut culices, lacertæque, quas adhæsisse musteo non est dubium, & inclusas indurescenti. Genera eius plura. Candida odoris præstantissimi. Sed nechus, nec cereis pretium, Fulvis ma-

ior autoritas. Ex his etiam amplior translucentibus, præterquam si nimio ardore flagrent, imaginemque lineam inesse, non ignem, placet. Summa laus Falernis à vini colore dictis, molli fulgore perspicuis. Sunt & in quibus decocti mellis lenitas placeat. Verum hoc quoque notum fieri oportet, quocunque libeat, tingi hædorum sero & Anchusæ radice: quippe etiam conchylio immiscuntur. Caterum attritu digitorum accepti coloris anima trahunt in se paleas ac folia anda ac phylas, & magnes lapis ferrum Rameta quoque eius in oleo addita flagrant delucidius, duntaxatque, quam linei medulla. Taxatio in delenscunt, ut hominis quamvis parva effigies, vivorum hominum videnturque pretium superet, propterea ut castigatio una non sit satis. In Corinthiis & placet, auro, argentoque misto, in exlatis & ingenia. Murchinorum & Crystalli linorum diximus gratiam: uniones, quod capite circumferuntur, gemmae digitis: in omnibus denique aliis vitis ostentatio, aut usus placet: in Succinis delenscunt tantum conscientia. Domitius Nero in ceteris vitæ suæ portenis, capillos quoque coniugis suæ Poppæ in hoc nomen adoptaverat, quodam etiam carmine Succinæ appellando. Et quoniam nullis vitis desunt pretiosa nomina, ex eo testis quidam hic colos caput expeti à matronis. Vitis tamen Succinorum invenitur aliquis in medicina: sed non ob hoc formis placet. Infantibus ad alligari amuleti ratione prodest. Calistratus & cuiusque ætati contra lymphationes prodesse tradit, & urinae difficultatibus potum, ad alligatumque. Hic & differentiam novam attulit appellando Chryseletrum, quasi coloris aurei, & maturo gratissimo aspectu, rapacissimum ignem, & si iuxta fuerint, celestine ardescens. Hoc collo ad alligatum, mederi febribus & morbis: vitum cum melle ac rosaceo aurum vitis: & si cum melle Attico conteratur, oculorum quoque obscuritatibus. Stomachi etiam vitis vel per se farina eius sumpti, vel cum Mustiche ex aqua pota. Succina etiam gemmas, quæ sunt translucente, adulterandis magnam habent locum, maxime Amethystis, cum omni, ut diximus, colore tingantur. Hæcenus Plinius.

Huius verba. (pergit Amat.) vera esse hodie cognoscimus, quum in mari Germanico, Baltheo dicto, Electrum sive Succinum, ex quo precule sive coronæ fiunt, colligatur, & nusquam alibi: quod verò gummi arboris pinea simile sit, ipsius in attritu pincus odor attestatur, imò qui apud Germanos in urbe libera Dantisco, nobis iam reserati sunt, tanquam de re conspecta iudicium suum ferebant, nec in aliis à Plinio dissidebant. Nascitur enim Electrum, liquidum, tanquam Pini resina, quod quum musteum fuit, formicas, mullas, paleas, & alia rapit, quæ omnia postea in eo densata, videntur, ut Martialis hoc disticho complexus est:

Quum Phæchæntem formica vagatur in umbra

Implicuit tenuem succina gutta feram.

Vario porro colore Electrum reperitur, quoddam se festucas & paleas trahit, velut magnes ferrum.

Hallucinatur Manardus Ferrariensis, & alij quibus facile Tragus subscripserit, qui sine authoritate & ratione contendunt, Succinum longè maiorem rem esse videri, quam quæ ex arboribus exudare, destillare, durari ac coire in Electrum soleat, quum pondus in mari nasci existimari possit.

Ec 4

Plinius Cæ-
didum.
Cereum.
Fulvum.
Translucent

Falernum.

Attrahunt
paleas.

Pretium.

Amuleti.

Lymphatio.
Urina.Chrysele-
trum, ab
alligato.Febres.
Aures.
Oculi.
Stomachus.

Impostura.

Omni colo-
re tingun-
tur.Plinius de
materia
Succini
subscribit
Amat.Crona
precaria.Manardus
& Tragus
repreh.

Sed de re sibi ignota, non est quid multa verba
fugiant.

Cordum audamus, multis hac de re differen-
tem Succinum, quod Graeci *ἰκτὴρ*, & fabuloso
nomine *ἰκτὴρ*, Arabes *Karabē*, & *Kakabre*,
Galli *Ambram*, seu *Ambram Citrinam*, Germani Ve-
teres *Glesum*, recentiores *Agstein* & *Bernstein*,
Sudani *Gentar* appellant: inter praecipua nume-
ratur, quae Deus ad hominum usum condidit,
Medicinae pariter & luxui, multisque aliis usibus
materiam praebens: quamvis nostra aetate magis
tuendae sanitati, quam luxuriae inserviat. Nostri
Succino, à proprietatibus, quas habet, nomina
indidère. Siquidem veteres Germani *Glesum* d
appellant, quod si interpretaris, vitreum sonat:
quoniam vitri instar lucem transmittit. Vitrum
enim *Glas* & vitreum *Glesen* dicimus. *Ag-*
stein autem, id est, *Gagatem lapidem* id vocamus:
quoniam à *Gagate* nigro, materia, viribus, & aliis
proprietatibus nihil differat. *Bernstein* verò,
hoc est, ardens lapis nominatur, quoniam accen-
sum ardeat. Est autem res omnibus agnita, &
paratu facilis, praesertim cereum & pellucidum,
quod Romani à vini colore, *Falernum* cogno-
minant. Candidum verò, cui olim nulla fuit au-
thoritas, quoniam parcius gignitur, nunc auri
pretium aequat. Vera sunt quae Plinius iam antè
prodidit, excepto eo, quod *Pinei* generis arbo-
rum resinam esse credat, ut paulò post ostende-
mus. Nam quod ad originem [materiam & gene-
rationem] eius attinet, nullus unquam autho-
rum vera tradidit. Ideò rem incundam maximè
que necessariam, & cognita dignissimam produ-
tuos nos arbitramur, si de natalibus, causis & o-
rigine eius, nostrum quoque sententiam protu-
lerimus: de qua cum multis doctis, praesertim
Georgio Agricola Medico, naturalium rerum o-
mnium sagacissimo & prudentissimo indagatore,
multos iam annos contulimus, eamque longa de-
liberatione utrinque ita perpendimus, ne quid-
quam de origine eius temere pronunciaremus.

Gagatem
stein

Lapis ar-
dens.
Cereum &
pellucidum.
Falernum.
Candidum.
Plin. nota-
tur.

paris non
habenda fi-
dei.

Editurus est propediem Georgius Agricola, inter
alia, quae de ortu & materia fossilium rerum con-
scripsit, etiam suum de Succino iudicium, cui nos
hoc commentario subscribimus: existimamus au-
tem nobis hominibus Germanis, Succinum in
nostro Orbe genitum quotidie attrectantibus,
eiusque naturam quotidiano usu & experientia
cognoscentibus, potius alias gentes fidem habi-
turas, quam Graecis, qui relicta Philo-
sophia in
consideratione, ad figmenta absurdissima, & an-
iles, & plerumque pueriles fabulae sunt conversi:
res longe pulcherrimam, cuius cognitionem in-
genio allequi desperabant, ludibriis & levibus
figmentis conspurcantes. Quae quidem in re non
tam hominibus innotuerunt, quam suam in con-
fingendis nugis levitatem, & Electri ignorantiam
prodiderunt: quamvis Graius ingenium, quamvis
Graius ore rotundo Musaliqui dederit. Et si au-
tem palam sit, ubi reperiatur Succinum, tamen
quia & loca, & natales perspecta habere ad rei
cognitionem non parum faciat, decrevimus hoc
de Electro commentario, primum indicare ubi
legatur, & ad qua litora plurimum, & quomodo
feratur: deinde ostendemus non esse succum, ne-
que Gummi, neque resinam, quomodocunque
eas appellent, arborum: postremo materiam eius,
& quid sit, explicabimus. Et haec quidem ea qua
licebit brevitate, ne si longius de eo dissereri-
mus, commentarius hic finem suum modumque
excedat.

Vltus.

Codanus sinus appellatur Plinio immensi-

mus, à saevo immenso monte, nec Rhiphaei
monte, qui ad Cimbrorum usque promontu-
rium excurrent, repositus est insulis, quarum cla-
rissima sit Scandinavia, incompete olim magni-
tudinis, nunc verò classibus nostris negotiatori-
bus & milibus cognita & perlustrata tota: qui
non insulam, sed peninsulam pluribus Isthmis
coherentem affirmant. In eo sinu inter Cimbri-
cam Chersonesum & Scandinaviam spatia sunt
insulae: *Burchana*, *Austravia*, & *Etavia*, olim voca-
te: ad quas fluctibus pelli Electrum Romanis o-
lim classes deprehenderunt. Idemque eam, quam
Germani *Austraviam* vocabant, Romani *Glesia-*
nam, hoc est, *Electridem* dixerunt. Quinetiam
praeter hanc plures aliae *Glesariae* nominatae sunt.
Universum autem mare, quod Codanus sinus am-
plectitur, *Succinum* habet, quod fluctibus nunc re-
tro ad Scandinaviam, Norvegiæ, Sueciæ & Gothiæ
litora agit: nunc ad insulas, at ipsi etiam depre-
hendimus: nam & nos quoque illud in *Bur-*
thana, *Austravia*, & *Scandinaviz* litoribus
invenimus. Nunc ad nostra litora, videlicet
Cimbriæ Chersonesi, ducatus *Melchelsburgiaci*,
Pomeraniae, *Prussiae*, *Samelandiae* & *Livoniae*.
Sed quamvis toto hoc nostro maritimo tractu
non raro legatur *Succinum*, exiguum tamen id est,
in parvas micæ concretum. Plurimum verò, &
maximis glebis constans, ad *Samelandiam* expel-
litur, quæ *Prussiae* vicina est regio, & *Prussiae* Ducis
paret: ad eam tanta copia tempestatibus fertur,
ut tot terrarum Orbi satisfacere possit, quantum-
vis multis visibus expetitur. Atqui non ad to-
tum *Samelandiam* litus tanta vis Electri expelli-
tur, sed ad eum tractum tantum, quem Germani
Granauiſche vocant, non longè à pago *Su-*
dayis & *Samelandis* *Kraxepelle* dicto, quod re-
tinctum significat. Nudi enim homines retia ve-
nienti *Succino* appendentes, sepius fluctibus re-
tincti obruuntur, unde pago nomen patriæ lin-
guâ fecerunt. Locus autem quo tanta eius copia
colligitur, praet tantum decem millia passuum, h. e.
duo Germanica miliaria. Habent eius piscationis
gnarum signa & indicia, quibus venturi Electri
copiam aestimant. Sunt aliae quaedam diverſi ge-
neris, sed maximè quaedam cordis exigui imagi-
nem referentes, & vesicarum modo inflatae: qua-
si copiosae ad litus ferantur, plurimum *Succini* ad-
ventare certum, his enim insolitum tanquam
retibus capitur. Cum verò parcius hæc algæ lit-
tus appulerint, minus succini insequitur. Flucti-
bus deinde ereptum, *Dantiscum* vehitur: quæ
vrbis praeterquam quod totius *Prussiae* caput sit,
etiam celeberrimum est emporium. Vbi primum
cerus venditur negotiatoribus, ex pacto pre-
tium pro certa mensura, secundum glebatum ma-
gnitudinem, Principi numerantibus. Rude ad-
huc ut colligitur, asperum, scabrumque est tota
superficie, nec quidquam attrahit, quantumvis
caleſcat: levigatum verò & politum, primum ca-
pere incipit, qui ex attritu caleſcto admoventur
furculos. Nam alia quaecunque ratione praeter
confrictionem caleſcens, perinde ut rude, ra-
pere nequit, quas proprietates neminem antea
prodidisse ſcimus. Nos autem id idem affirma-
mus, quoniam sepius eius rei periculum fecimus.
Porro longum foret, omnia statuta legesque *Suc-*
cini gratia latas enumerare, quia alij ex nostris
hæc attigerunt. Nos autem quæ antea tradita
sunt relinquentes, quod illi praeteriverant, indi-
cabitur. Nam neque hoc referre neceſſarium
existimamus, quot habeat *Succinum* colore diffe-
rentias, & quantum utilitatem hominibus adse-

Manius
copat.

Succinum
rude.

ret, non in Medicina tantum, in qua signum
sum habet: verum etiam in mechanicis artibus, in
quibus multo maiorem. Nunc autem antequam
quid sit explicemus, quid non sit, ostendendum
duximus: aliis succum, aliis gummi, aliis resinam,
aliis terram, aliis lapidem esse consentientibus.
Nam hae opiniones multa iam secula hominum
mentes detinent. Sed lecturos istarum opinio-
num consultationem prius non velle oportet. Succi,
gummi, resinae, terra, & lapides, d. reserentiam,
materiam, qualitatem, & alias, quas habent, pro-
prietates: ita scilicet dicta intelligent & distribu-
bunt. Succum autem cuiuscunque arboris, aut
plantae non esse *Succinum*, sed neque vinam ali-
cuius animalis, sivei & vitis substantia: & quali-
tates ostendunt. Constat enim utrumque aqueo
humore: qui etsi Solis, aut ignis calore densetur,
aquae tamen qualicunque insusus diluitur, idcirco
in mare delapsa, quamprimum dissolverentur.
Succinum vero contrariae naturae, nam liquidum
in mare primum insit, mox densatur. At hic
locum non habet, quod dicitur, salem adlunge-
re & densare succos, quod remota concedat, cui
salis natura perspecta est. Sali enim adest den-
sandi facultas, sed non tanta ut liquidum succum
denset: atque exiguam vis nequaquam est
propter imbibendi aqueum, vel similem humo-
rem, potentiam. Sali enim propriissima natura
est, facillime aquam, vinum, vel tale quiddam
imbibere, & in tali quopiam humore dissolvi.
Quapropter, quod conspersas carnes & cetera de-
fat, & solidiores reddit: per accidens fit, non
propria, aut distillandi facultate, sed quia car-
nes, & cetera fecerunt, aqua succo turgentibus,
suum suum sal combibendum dimittunt, quo
fit ut haec demum, sicca, duraque & idem densio-
ra evadant. Succi vero aliqui cum nihil habeant
terreae consistunt, qualem carnes & cetera, sed
toti aqueo humore consent, huiusmodi, quae
appetit imbibente, minime densatur. Si autem si-
miles permanent, si terrena sit, nec calida aeris con-
sistit: si vero tibi da aut humidiora, quod io-
res evadunt, tale humidum aerem imbibente,
& succo, cui mixtus est, communicante:
quod manifeste omnes, etiam densati coactura,
aut sole, ostendunt succi, si sol adhibeatur. Con-
tinuo enim humescunt & dissolvunt, maxime hu-
midum & frigidum aeris constitutione. Ergo si ari-
dus sal succos etiam spissos liquidiores red-
dit, quanto magis liquidus sal, cum mare est, li-
quidos succos dissolvit & penitus dissipat. Si
etiam densatus succus esset *Succinum*, aquae in-
coctum dissolveretur, cum Aloe vulgaris, Hypo-
cistis & eiusmodi: sed etiam si quis integro avo
in aqua, aut vino decoquat, nihil penitus tamen
eliquari potest. Adipi vero, aut oleo incoctum
dissolvitur, quod alienissimum est succis, qui
aquei sunt. Est itaque *Succinum* pinguis substantia,
& a succis diversissima. Quod autem etiam gum-
mi non sit, ostendunt argumenta, quae iam de
succis attulimus. Nam haec quoque, cuiuscunque
sint generis, in quovis aquoso humore dissolvun-
tur, in oleo vero minime: eadem, penitus ut
densati succi, turbida & humida aeris temperie
humescunt & dissolvunt, nec sine ratione, cum
viscosi & concreti calore succi existant. Quidquid
enim siccitate densatur, humido resolvi potest.
Qui vero resinam contendunt, propius ad ma-
teriam similitudinem & naturam eius accedunt.
Quoniam modum enim resinae pingues sunt, & ac-
centae flammam, oleoque incoctae dissolvuntur
omnes, ita etiam *Succinum* flammam accensum ar-

det, & in oleo si decoquatur, resolvitur, & accen-
sum flagrat. Resinam tamen non esse, statim for-
ma glebarum ostendit. Resina enim partim pan-
talem distillant, & in parvas miccas, guttasque
concreverunt, ut nullo, lumpen proccera, quam
Sindracam Arabes vocant: Thusnaticulum, &
quod Orabias, ab Erui figura & magnitudine,
vocatur. Partim pluribus guttis, longo tem-
poris intervallo collectis, in massas scabras, po-
tolas, & cavernosas concreverunt, ut Pini, Aie-
lis, Piceae, Piceastrae, & eiusmodi arborum: quam-
vis & haec frequenter in parvas miccas lesantur.
Succinum genuino diversus est a resina habitus: ne-
que enim in guttas oblongas densatur, quae ex
arbore saepe pendisse indicarent, neque in scabra,
cavernosaeque, & guttis compacta fragmenta con-
lecta, sed solidas glebas. Glebarum nec am magni-
tudo resinam esse negat: siquidem Plinius Ro-
mam allatam esse scribit tredecim librarum pon-
dere, per libram duodecim uncias intelligens.
Nos vero scimus multo maiores interdum inve-
niri: & nonnullam etiam in continente ultra
viginti millia passuum a littore maris excitari: & in
fundamentis edificiorum effusa, quidam undecim,
& tredecim est unciarum pondus. Haec maxi-
mum glebae pondus nostram mentem inventa li-
bram fuit septendecim & unciarum quatuordecim.

Haec autem grandes glebae oculis splendidiore
a magnatibus apud nos expetuntur, quae modum
olim apud Romanos ex Oriente Mar-
thimum, quod & ipsi a sine dubio ad Summum a re-
ferri debet, ut Georg. Agricola in suis libris de re-
bus metallicis indicabit. Puerile autem est crede-
re, in tantis glebas comites resinae aliquam:
ac multo puerilius, credere tantum ex arboribus
desluere posse resinam, ut maris, & littora & ter-
ram in Continente impleat. Reclamat etiam ex-
perientia, nulla enim praesens in nostro litore
sunt Pini generis, aut resiniferae arbores, a Cim-
briis, extremo promontorio usque ad Scandi-
naviam Isthmum, quo Asiae majori cohaeret, h. e.
toto illo immensi sinu Codano, nulla enim teme-
re in litore arbores, praeter Alnos, & Corylos,
visuntur. Oderunt etiam natura resiniferae omnes
salinum, aut mari iugum, solum. Simili modo
neque in Norvegia, neque Scandinavia minoris,
neque Succae litonibus, ullo, videtur resinifera,
aut Pini generis arbor, quatenus nos eam gram
lustravimus, & quatenus publicis, & negotiato-
ribus nostris cognita est, qui quotidie legunt
Scandinaviam littora. In montibus vero procul a
mari magna sunt Tadarum, Ab etum, & Picea-
strorum silva. Sed ex his impossibile est ad mare
delabi resinam. Praeterea si in juvenis caubus sta-
rent haec arbores, ut aliqui veterum prodidere, in
terram & ripes delaberetur resina. Et si maxime
ex rhipibus resina raperetur, ut Plinius credidit,
sordidum totum esset, calculis, acenis, solis &
aliis rebus mixtum, sed rarissime reperitur, quod
tale quippiam complectatur. At neque hoc ra-
tioni consentaneum est, ex arboribus & precipi-
tis in mare procul a litore destillare: tum enim
paullum & guttasim destillaret, & in parvas ta-
tum guttas densaretur: sed impossibile est tot in
precipitiis stare arbores, ut tantum resinae stan-
dant. Adde si hoc modo distillaret, neque ra-
has, neque lacertas, neque formicas, muscas, cu-
beas, aut quidquam tale complecteretur. Mirum
etiam esset, si resina sit, non inveniri in eo Pini
generis folia, cum in aliis resinis sua folia frequen-
ter deprehendantur. Esset etiam praeter naturam
eo loco resinam in tantam soliditatem densari,

Maxima
Succini
gleba Cor.

Succinum
non est suc-
cus, non
vinum.

Liquidum
in mare in-
sistit.
Sali non co-
densat.

Resina non
est.

cumque vis alia resina, siue frigida, siue calida aqua densata, maxime salsa, arida, friabilisque evadant, ac sponte dissiliant. Quod si olfactum consulas, exere nullum resinæ odorem percipies, sed medium quendam inter Bitumen & Aurum, quæ res in terra gignuntur. Quod autem paleas, & alia similia attrahit, magnum est argumentum, multum id à resina differre. Nulla enim præstat resina. Differunt etiam viribus Resina, & Succinum. Nam hoc præter alia, quibus ab illis discrepat, etiam comitales suffitu deprehendit, & eos collapsos excitat, quod in ulla unquam deprehensum est resina. Facit etiam ad nostrum argumentum coloria diversitas: nam si certæ alicuius arboris resina esset, eundem semper colorem haberet, ut Terebinthi, Laricis, Lentisci, Abietis, Pini, & aliarum resinarum, quæ semper sui sunt similes, Succinum vero nunc sero simile, nunc cereus, nunc fulvus, nunc turbidus, nunc omnino pellucidus, nunc niveus, nunc ex quibusdam eorum, aut simul omnibus mixtus, & ceu convolutus, nunc omnino niger est color. Nam gages ille lapis paleas attrahens nihil est aliud, quàm nigrum Succinum: quare eodem cum Germani vocabulo, quo aliud Succinum appellant, adiecto coloris discrimine. Necesse igitur est, rem diversissimam à resina esse. Quapropter non possum non Græcorum vanum commentum carpere, qui etiam certa nomina arboribus, Succinum ferentibus, indidère, eas alias Electrides, alias Aphitacoras, nominantium, quo vocabulo Indis prædulcis suavis significetur. Omitto reliquas fabulas, quibus ipsi suam vanitatem, & inconstantiam palam fecerint. Qui autem resina non esse contendunt, lapidem esse contendunt: quoniam vulgo Germanis, lapidis nomine veniat: sed nihil in eo est, quod cum lapide comune habeat: lapides enim omnes terreni sunt, nec quicquam in igne omittunt, nisi alterius cuiusdam rei participes sint, neque accenduntur, neque in pinguedine aliqua dissolvuntur, aut igne in sublime feruntur, neque leves sunt, ut aquæ innatent: quæ omnia succino sunt propria: quod usque ad tenuitatem à terræna lapidum materia distat, ut certa ratione totum in vaporem & liquidissimum oleum dissolvi queat, quod nemo ante nos invenit, aut tentavit: variis enim ingressi viis sumus, ut naturam, originem, & materiam eius investigaremus. Præter eos, qui lapidem esse credunt, sunt & qui terram esse dicant: quod ne per somnium quidem alicui in mentem potuisse venire sperassemus. Quoniam verò hæc opinio his annis à multis est accepta, usdem est confutanda argumentis, quibus lapidem non esse probavimus, quamvis id paucis verbis egerimus cum non existimemus, sanæ mentis, & iudicii homines, ed erroris delabi posse, ut lapidem esse credant. Decessit hoc anno, cum hæc conderemus, admodum confectus ætate Gregorius Dunckerus, vir haud vulgari experientia præditus: qui multa etiam in Succino observavit, quæ nostrum de eo iudicium confirmant: tam in eum errorem incidit, ut crederet, Succinum veteribus Samiam terram fuisse dictam, regionum nominibus deceptus: nam hæc Germaniæ ora, quam Esflui habitant, hodie Sameland nostris, h. e. Samia regio vocatur, perinde ut Samus insula, in Aegeo mari sita. Nihil enim commune Succinum cum figulina creta habet, qualis est Samia terra, ex qua factæ ollæ, igne in lapidis duritiem coquantur, nulla sui amissa parte, ut alia quævis figulina terra. Succinum verò ignis impatientissimum

existit: flamma enim accensum ed usque flagrat, donec totum in fuliginem abeat: prunis autem impositum æque ut flamma accensum consumatur, siquidem totum in vaporem resolvitur.

Porro hætenus eorum consuevimus opiniones, qui Succinum, aut succum, aut gummi, aut resinam, aut terram, aut lapidem esse tradiderunt: quamvis plurima, quæ ad rem facerent, reliquerimus: maxime quod ad deluendam Scriptorum auctoritatem pertinet. Nos verò minime nuda auctoritate, sed rationibus & argumentis rem tractandam esse censuimus. Nam quod Solinus scribit, Germanico Caesare omnes Germaniæ oras scrutante, compertam esse arborem Pinci generis, cuius medulla Autumni tempore Succino lachrymet, falsum penitus est, ut ea, quæ antea diximus, testantur: quemadmodum & hoc, quod tradit: Germanicum Caesarem omnes Germaniæ oras scrutatum esse, Quæ autem Solinus de Succino scripsit, è Plinio excerptis, quibus suum addidit commentum.

Restat igitur nunc, ut nostram de materia, & origine eius, sententiam, rerum naturæ studiosi communicemus, qui semper credidimus, Succinum liquorem esse à terra in mare fluentem, arcanas ac nondum compertas causas parriciter in eam, quam præ se fert, soliditatem durefcientem, quod Georgius Agricola etiam sentit, & Gregorius Dunckerus, cuius modò mentionem fecimus, omnino affirmat, natione Samelandus, qui in eo littore, ad quod maxime expellitur, ultra quinquaginta tres annos vixit, maximæque curæ tota vitæ suæ ed incubuit, ut originem & materiam eius perdisceret. Nam hie eos quoque reprehendit, qui arborum lachrymam esse prodiderunt, clarisque verbis dicit, liquidum primò esse liquorem à terra in mare fluentem. Quod, tanquam certissimum, omnibus est amplectendum. Adsupulantur nostræ sententiæ etiam Veterum nonnulli, ceu Nicias, Philemon, Ailubas, & Mnesias, quos Plinius citat. Nicias enim Solis radiorum succum esse Succinum tradidit, quos circa Occasum vehementiores in terram actos credidit pinguem sudorem in ea parte Oceani relinquere: qui deinde in Germanorum littora eimeretur, haud absurdâ opinione. Non quod hic succus ipsis Solaribus radiis, nihil præter qualitatem existentibus, insit: sed quod radiorum fervore, pinguis ille terræ sudor foras eliceretur: quod plarisque in locis apud nos ætatis calore, & Veris, Autumni quoque tempore in liquido Bitumine deprehendimus: cuius speciem Succinum quoque esse diximus. Bitumen enim hoc in temporis latens, paulatim foras Sole terram calefaciente, & pinguedinem eius eliquate in lacus, puteos, rivulos emanat: Hyeme vero præclatis terræ meatibus, & densata pinguedine nihil profusum manat. Philemon fossile esse & in Scythia esse prodidit, candidi, cerei, & fulvi coloris: procul dubio comperta scribens. Nam in Parthia quoque & Germania Mithina, quæ absque dubio Succini genus sunt, è terra effodiuntur, quæ nullus unquam resinam credidit. Quare cum fossile sit Succinum, quæ est amenia resinam id esse concedere, cum apud nos quoque sapissime grandes glebæ inter atandum excitentur, & è puteorum, & ædificiorum fundamentis eruantur, multis à liquore passuum millibus? Nos tamen eas ibi minime natas, sed in terra, magis ut plerisque in locis contigit, longius à Continente recedente, relictas iudicamus, quamvis plarisque ibi genitas credant, in quorum numero etiam fuit, Gregorius Dunckerus

Differentia
Resinarum
& Succini.

Gages
nigrum est
Succinum.

Græci vocant
prob.

Lapis non
est.

Nam est terra.

Dunckeri
error.

Solinus falsus
lucet.

Liquor est à
terra in
mare fluens.

Arborum
lachryma
non est.

Solis radiis
succum suum.

Nicias &
Philemon.

Fossile in
Scythia.

Amenia
quædam.

kerus. Aslarubas, qui Plinio scribente adhuc vi-
xit, aperius rem prodidit, tradens: iuxta Atlan-
ticum mare esse lacum Cephisida, quem Mauri
Electrum vocent, huncq; Sole excalescentem à limo
dare *Electrum* nitens. Aslarubaz subscibit Mne-
has, locum quendam Aphricæ Sicyonem vocans,
& Cratim amnem in Oceanum affluentem è la-
cu, ibi eadem ratione nasci, quâ in Cephiside la-
cu Aslarubaz tradidit. Nos utrumque verissima
scripsisse credimus, non vanis argumentis indu-
cti: primum quidem, quoniam apud nos eodem
modo Sole excalescent Lacunæ & Putei, è limo
emittunt Bitumen aquæ innatans. Deinde quo-
niam certò comperimus etiam in Aphrica repen-
ti *Succinum*: idque ea parte, quâ Canarias spectat
insulas. Nam eam Aphricæ oram Atlanticum ma-
re alluit: Misit ad nos ex Antuerpia Aphricani
Succini unam atque alteram glebam Gruningus
natione Frisius (qui ea loca lustravit, & ipse id in
ripa fluminis cuiusdam ibidem legit) nostrati ad-
dedit similem, ut dignosci nequeat, quas inter cæ-
tera, quæ chara nobis sunt, ad libentius reposui-
mus, quoniam & Mnesiz & Aslarubaz fidem &
authoritatem firmam nobis faciunt. Quare imme-
ritò Plinius eorum tradita, aliorum Græcorum
commentis adnumerasse videtur. Gigni autem in
terra Aphricanum *Succinum* quoque, nec esse ar-
borum resinam, vel inde perspicuum est, quo-
niam nostrati simillimum colore, substantiâ, &
qualitatibus eum sit, eandem quoque originis
causam habere necesse est. Si igitur Piceæ, aut Pi-
nei generis arborum resina esset, quales arbores
in Septentrione videntur, necesse esset etiam in
ea Aphricæ ora easdem nasci arbores, quæ simi-
lem & eiusdem speciei resinam lachrymarentur.
Cum verò experientia constet, nulli ibi resini-
feris similes provenire arbores, non male ratio-
cinamur, ad resinam minime esse. Quæ enim ibi pro-
veniunt arbores, nostratibus dissimilissimæ sunt, ut
referunt, qui ea loca inspexerunt. Præcipue autem
abundant Sandali, Brasiliæ, Guaiaci, & cæ, quæ
sanguinem Draconis dictam lachrymam fundunt:
multæque aliæ nostris, quia nondum usus alicuius
gratiâ expetuntur, incognitæ. Etsi autem
Gregorius Duncerus quoque deprehenderit, è
terra fluentem liquorem esse, non tamen ex-
plicat, cuius generis, cuiusve substantiæ, aut natu-
ræ sit hic liquor, quod nobis est nunc dicendum.

*Liquores omnes, seu fontes, qui è terra, ac
montibus fluunt, ad duo præcipue referuntur ge-
nera, aut enim aquei sunt, aut olei modo pingues.*
Aquei autem multum differunt secundum terra-
rum, per quas fluunt, diversas qualitates, hinc
alibi dulces, alibi nitrosi, alibi salsi, alibi Chalcen-
tho infecti sentiuntur: ad nullum autem horum
referri potest *Succinum*: quare necesse est ad alte-
rum liquoris genus id pertinere, quod pingue ex-
istit, & Olei æmulum. Liquor autem hic pin-
guis, suum apud authores nomen habet, nempe
Bituminis, cuius species solidum, & liquidum;
quæ & ipsa in plures differentias dividuntur. Es-
se autem Bituminis genus *Succinum*, eius mate-
ria, colores, odor, medica vis, & ignis rapacitas,
manifestè convincunt. Substantiam enim si con-
sideres, deprehendes pinguem, flammam facile
concupientem, æquæ ut Bitumen. Atqui antea à
nobis dictum est, pinguem terræ liquorem Bitu-
men esse, talem autem consistentiam *Succinum*
habet. Quamvis præter Bitumen etiam aliud
quidpiam in terra genitum pingue sit, videlicet
Sulphur. Sed ad hoc referri non debet, quoniam
metallum est medicamentum, pluribus à *Succi-*

no differens. Colores etiam *Succino* totidem, quos *Colores*
Bituminis: est enim nigrum quoddam, Gagates
& Thracius lapis dictum, ut vulgare Bitumen: est
fuscum in purpurea, ut Iudæum Bitumen. Et can-
didum quoddam, ut candida Naphtha. Est ful-
vum & perspicuum quoddam, ut Naphtha fulva,
quæ liquidissimum est Bitumen. Si autem olis-
etum consulas, manifestè Bituminis qualitatem
odore percipies. Quid verò suavius oleat alio
Bitumine, puritati substantiæ referendum est,
quâ tantum à vulgari differt. Vires etiam origi-
nem, & materiam eius produnt, de quibus pau-
lò post, ut etiam de quotidiano eius in re dome-
stica, & mechanicis artibus usu, qui & ipse Bitu-
minis genus esse testatur. Et certe eius genus, ut
Callistratus Plinio citante prodidit, Chrysele-
ctum vocatum, quod sit rapacissimum ignum
& si iuxta fuerit, celerimè exardescens. Quod
de nulla unquam alia re authores tradiderunt,
quàm Naphthæ, quæ Bitumen est liquidissimum:
in hunc enim modum de Naphtha Dioscorides
quoque scriptum reliquit: vim habet rapacem i-
gnis: adeo etiam, ut ex intervallo rapiat illum:
idcirco cum Callistratus id *Succino* tribuat, quod
Naphthæ sit proprium, quis alteri, quæ sit Bitumi-
nis generi adscribat? Accedit postremo notum diu-
vicinitas, ubicunque enim *Succinum*, ibidem et-
iam Bitumen gignitur, ut in Perside, Parthia, Car-
mania, Aegypto, Mauritania, & nostro Septen-
trione. Omnium autem argumentorum, quæ
tam adduximus, firmissimum est, quod interdum
molle adhuc & flexile invenitur: interdum om-
nino liquidum, in superficie solum tenui crusta
vestitum. Inventum est ante paucos annos in Rus-
siæ litore oblonga gleba siccæ figura, cuius alte-
rum cornu mollis ceræ instar flexile fuit. Quin &
ipsi Lypsiæ apud vinculum nostrum loantem
Rathum Pharmacopolam, in *Succino* è Prussia re-
center allato, septimo hinc anno, invenimus
glebam, in qua conclusa, ut in ovo veterascens,
humidus adhuc fluctuabat liquor. Dedit itaque
rei antea non compertæ novitæ glebam contre-
gimus, tenui crusta lepidissimam, & prorsus li-
quidum humorem continentem: deprehendi-
mus autem crustam *Succino* vulgari similem, li-
quorem verò Naphthæ fulvæ, id est, Petroleo si-
mitem, paulò tamen crassiorem, odorem succi-
num prunis impositum omnino referentem, &
nihil minus, quàm resinæ alicuius habitum præse-
rentem. Cogitantibus igitur nobis per quam re-
solutionem partes, quibus constat *Succinum*, ab
invicem discretæ palam fieri possent: tandem hoc
anno attem invenimus, quâ id fieri posset: depre-
hendimus igitur in hac arte, in partes, & elemen-
ta sua resolutum magna ex parte in Bitumen
transire, vero Iudæo Bitumini adeo simile,
ut neque colore, neque pondere, neque substan-
tiâ, neque odore, nec quacunque alia notâ ab eo
distingui possit. Quin & ipsi nos ista [id] digno-
scere haud possemus, nisi [si] Iudæi Alphati
glebulis misceretur: ut autem alia omittamus,
etiam confractum, seu alarum & pennarum fi-
bras Iudæi modo ostendit. Quapropter cum
substantiæ similitudo, colores, odoris qualitas,
virium proportio, ignis rapacitas, natalium vic-
nitas, quotidianus usus, & manibus nostris at-
tractata, sensibusque diiudicata materia, & sin-
gulari arte deprehensum in eo Bitumen, *Succinum*
Bitumini cognatum esse testentur, nec ulla sit no-
ta, quæ repugnet: clarum tandem & perspicuum
est, neque resinam, neque gummi, neque arbo-
rum succum, neque unnam, neque lapidem, ne-

à limo la-
cus Cephisi-
da.

Locum.

Plin. taxa-
bit.

Liquor de
Sic.

Aquei.

Oleum.
Bitumen.
Succinum
genus.

Crassum
ita.

Chrysele-
ctum
Naph-
tha
Diosco-
ridis.

Nota.

Ne sit in-
ter lum.
Liquidum
quandocumque.

Ipsa Succo-
ni resolutum.

que terram esse : sed purissimum, levisimum , o-
ptimum sui generis munimen . Quemadmodum
& Ambra, & Cinnamon, quod huius loci non est
multis demonstrare argumens. Porro quâ ra-
tione laceratis, ranas, culices, muscas, & alia in-
secta, quæ in eo transluent, atque in talia et
iam medicamenta quædam, cœ Alumina, Chal-
canthique venas, quas ipsi in eo deprehendimus,
involvat, & complectant, hoc commentatio præ-
terimus, quemadmodum & hoc, an in ipso nasci-
vado, aut litore, an utroque loco eius sint fon-
tes. Hic usque Cordus.

Chrysoph.
S. 100.
Chrysoph.
S. 100.
S. 100.
S. 100.
S. 100.
S. 100.
S. 100.
S. 100.
S. 100.
S. 100.
S. 100.
S. 100.
S. 100.
S. 100.
S. 100.
S. 100.
S. 100.
S. 100.
S. 100.
S. 100.
S. 100.
S. 100.
S. 100.
S. 100.
S. 100.
S. 100.
S. 100.
S. 100.
S. 100.
S. 100.
S. 100.
S. 100.
S. 100.
S. 100.
S. 100.
S. 100.
S. 100.
S. 100.
S. 100.
S. 100.
S. 100.
S. 100.
S. 100.
S. 100.
S. 100.
S. 100.
S. 100.
S. 100.
S. 100.
S. 100.
S. 100.
S. 100.
S. 100.
S. 100.
S. 100.
S. 100.
S. 100.
S. 100.
S. 100.
S. 100.
S. 100.
S. 100.
S. 100.
S. 100.
S. 100.
S. 100.
S. 100.
S. 100.
S. 100.
S. 100.
S. 100.
S. 100.
S. 100.
S. 100.
S. 100.
S. 100.
S. 100.
S. 100.
S. 100.
S. 100.
S. 100.
S. 100.
S. 100.
S. 100.
S. 100.
S. 100.
S. 100.
S. 100.
S. 100.
S. 100.
S. 100.
S. 100.
S. 100.
S. 100.
S. 100.
S. 100.
S. 100.
S. 100.
S. 100.
S. 100.
S. 100.
S. 100.
S. 100.
S. 100.
S. 100.
S. 100.
S. 100.
S. 100.
S. 100.
S. 100.
S. 100.
S. 100.
S. 100.
S. 100.
S. 100.
S. 100.
S. 100.
S. 100.
S. 100.

rique, quas adhuc fuisse musteo non est dubium, & inclufas durifcenti. Nec Poëta Virgilius in alta lententia fuisse videtur, dum in Pharmaceutia dixit.

Pinguis Corribus sident Electra Myrica.
In eodem portu Curienfis littoris tractu, quem
vulgo den *Burischen Strand* appellant, maxi-
mè tamen in Dantiaco Prussie urbe *Succinum*
cum Lini semine, in quod Vernicem live Ver-
niginem vocant, rem pictoribus, & multis opifi-
cibus familiaritatem, & quæ vitæ utilis usum hodie
is plerisque locis præbet, apparatus. Sic autem
Plinius de succumino scripsit. In reliquo usu tra-
mentis illius est, firmatque ei contra ignes. Dixi-
mus & tingi linteas ex eo statuas & illini. Pincit
in ferratis fabrorum officinis, tingendo ferro,
clavorumque capitibus, & multis aliis ulibus. Ex
quo argumento vel toto, aliqua *Succinum cum Bitu-
mine affurum* asseri potest. Verùm quod bitumi-
nis sit genus quoddam ipsum Succinum, & ipsum
aded penitus bitumen, quod pinguis sit terræ
succus alter: Nam *Alumen* & eius genera, alie-
rum ab hoc faciunt illi: hoc mihi nondum per-
suaserunt ipsi, qui nuper hoc editis scriptis asse-
ruerunt. Neque enim de effusè aded larga ac va-
ria magnificæ naturæ liberalitate, ita parcè & il-
liberaliter iudicare convenit, & tam multas ac
varias res, quas illi recensent, sub unum illud bi-
tuminis genus contrahere, ita ut nomina solun-
illa exstant. Porro *Succinum* Arabes Carabe ap-
pellare satis constat, quæ vox aut ex Græca *καρυ-
βδην* corrupta est, aut idem, quod illa significat, rap-
tum videlicet palcarum, qui etiam *καρυβδην* no-
mine intelligitur. Sed idem Arabes *Gandarôn* ac
Sandaracham, Vernicem vocant, & exponunt pl-
se gummi Arboris Iuniperi, simile Carabe. Quare
diligenter observandum est his, qui illos sequun-
tur, ne pro salutari medicamento, *Sandaracham*
Græcorum peritiosum Pharmacum agnoscant.
Deinde ex Vernice Iuniperi lachryma, etiam fa-
ctitiam Vernicem cum Lini seminis oleo fieri di-
cunt, & sic Succinum cum Iuniperi lachryma
confundunt. Nam de Succino intelligendum
est, ex quo Vernix paratur, cum oleo seminis Li-
ni.

Chrysoph.
sperm.
Lycop.
pterid. mon.

Lyncurium

Disf. m. m.

Locus.

Ch. 1. 1. 1.

Music.

Results:

Abstract.

Arborum
succus.
Pini gene-
ris arbor.

*Pinus gen-
sae nobis.*

Foreign and
Lenses
of Service

Carole
Gardner

Gundara,
Sundera-
che
Verna.

Arabis c.

Succession
from 1944
port Lacey
1944

Amber,
Succinum.
Camphora,
Electrum.

500,

Panel

Sadržaj
 Sadržaj
 i. Priloge

Deposits:

Succinum (Inquit Guil. Gilb. de Magnete) Graeci vocant *ἀλεξάντερ*, quia ad se paleas trahit, attritu calefactum, inde *ἀλεξάντερ* dicitur, & *χρυσόπετρος*, ab auro colore. Mauri vero Carabem appellant, quia solebant in sacrificiis, & Deorum cultu ipsum libare. Carab enim significat offerre Arabicè: ita Carabe, res oblata. Non capiens paleas, ut Scaliger ex Abahali citat ex lingua Arabica, vel Persica. *Ambra* etiam nonnulli appellant, praefertim *Succinum Indicum* & *Aethiopicum*. *Succinum* quasi succum, Sudavienfes seu Sudini Gevites appellant, quasi genitum terra. Explosis Veterum erroribus de natura, eiusque origine, constat *Succinum* maximè ex parte ex mari provenire. Colligunt rustici in Sudinis Prussia, etiam in Britannia nostrae littore aliquando reperitur. Non solum *Succinum* & *Gagates* (ut illi putant) allicunt corpusculas sed & Adamas, Sapphiras, Carbunculos, & gemma. Allicunt haec omnia non festucas modo, & paleas, sed metalla omnia, ligna, folia, lapides, terras, aquam ipsam, & oleum: omniaque, quae sensibus nostris subiacent, aut solida sunt: quanguam scribant non attrahere *Succinum* (nisi paleas & ramenta quaedam), quare falso Alexander Aphrodisiensis dicit de *Succino*, quod tantum siccas attrahat paleas, & non folia Ocymi. *Succinum* non calore allicit, ut Cardanus & Pictorius existimant: nec à singula aliqua proprietate substantiae, aut familiaritate. *Succinum* in maiori mole positum si fuerit, allicit: in minori & impuri sine frictione non videtur allicere. Quæri potest cur *Succinum* aquam alliceret, cum aqua in superficie posita, actionem tollit: scilicet, quia aliud est in exortu ipsius suppressum, aliud emissum restinguere. Ita & sicum rarum, tenuissimumque, citò supra *Succinum*, postquam incitatum fuerit, impositum, attractionem corporis impedit: at si in mediis intervallis impositum fuerit, non penitus obstat. Humor etiam in vapido aëre, & omnis ab ore afflatus, tum aqua imposita vires restinguit illi. At oleum, quod leve purumque est non impedit: nam et si calido digito oleo imbuta *Succinum* affricetur, tamen trahit. At *Succinum* si illud à frictione perfolium fuerit aqua vitæ, non allicit.

Hadrian. Iunium adeamus, qui in nomenclatura sua *Succinum* inter lapides connumerat, dicens: Plinio lachryma, vel resina arborum odoratarum, Pini & Pinastri præsertim, cui rei indicio est odor similis cum accenditur, attrituque. **Electrum** Ovidius. **Glessum** veteres dixere, à translucida vitri in modum specie. *ἀλεξάντερ*, *χρυσόπετρος*, *ἀλεξάντερ* & *ἀλεξάντερ* Plinio, quod folia, paleas, plumasque ad se rapiat, attritu concepta caloris vi. Dicitur & *λεξάντερ*, *λεξάντερ*, ut vult Strabo lib. 4. velut à lyncis lotio natus, quod aggesta terra obruit animal, quasi humano id ului invideat, in quo Theophrastus dissentire videtur, qui *Lyncurium* trahere ad modum *Electri*, non paleas modo, sed bracteas etiam metalli, scribit in lib. de lapid. ita ut inter ea discrimen manifestum ponat: quin & *Electrum* lapidem esse in Liguria fossilem idem ait, sed quam verè nescio. Vocatur & *λεξάντερ* *ἀλεξάντερ* apud Poetas, quasi lachryma Solis filiarum, quas exstillarint in morte Phaëtonis fratris. Carabe Officinis vocatur. *Succinigenus* primum (quod scemine differentia insignit Theophrastus) flavius est, & pellucidius, quod *Glessum* & *Glastum* Germani dixerunt, hodie *Agstein*, illis vocatur, & *Bornstein*. Belg. *Amer* / *offi* *Imber* / Gal. *Ambra*, Ital. *Ambra gialla*, *Ambra* Tom. I.

Alicona, Hisp. *Estarimente*, *Ambra*. Alterum genus album, & obscurum, quod spurium & bastardum vocitant Germani.

Gagates Plin. vel **Gangitis**, lapis odore gravi, quiustus sulphureum Plinio, vel bituminosum odorem. Orpheo & Dioscoridi vomit. *ἀλεξάντερ*, *χρυσόπετρος* Nicand. Alem. *Gagastein* / *Agastein* / *Bornstein* / *Bernstein* / Belg. *Agber* / Gal. *Agathe* Hisp. *Agavaje*. Thracius lapis, *Gagatidis* species est apud Nicandrum, quem aqua accendit, oleum restinguit, nigri coloris. *ἀλεξάντερ*, Alem. *Schwarzer Agberstein* / oder *Bornstein*. Belg. *Schwart Agber*. Locum & tempus hactenus dicta per spiculum edunt.

Vicera glutinat, molit, sufficit, olfactuque, vulvæ strangulatione correptis mulieribus succurrit. Comitiales prunis impolito deprehendit, & deprehensos rursum restituit. Menfes cit, venenis adversatur. Concretum in thorace sanguinem discutit & resolvit: dysenteria laborantibus succurrit. Tussis, & à capite in subiectas partes destillationes, suffitu sistit: dentium dolores mulcet. Omnes denique facultates nostri in *Succino* celebrant, quas veteres bituminis speciebus adscripserunt præterque has alie etiam *Succino* tribuuntur, quas consule præterimus (inquit Cord.) quonia neas Veteres non nominat recensuerunt, sed in genere indicaverunt. Quod enim facit calculos extenuat, & Ictericis medetur, *Succinum*, exantheas, attenuandis, astergendi, aperienti, & discutienti facultatibus procedit: quas Bituminis auctores assignant. Hoc præterea, clavorum capita, ac alia ferramenta in nigrum colorem tinguntur, in quem usum multi nostrorum ubi abundat, *Succinum* recipiunt. Expetuntur etiam lucernarum luminibus, ut Bitumen, ramentaculis. Rapax admodum est ignium. Utuntur Medici ad omnes fluxiones sistendas, seu sanguinis, seu humorum: ad vomitus compescendos, & destillationes: potu, & suffitu aerem pestilentem fugat. Pastilli ex hoc olim fiebant pro isteda sanguinis fluxione apud Græcos, quos Arabes sub nomine Caraber pro eodem effectu construunt, & in officinis hodiernis positi habentur. Valet autem flavum *Electrum* ad multa, nam pueris pro amuleto contra fascinationes appenditur, contra dysuriam quoque bibitur. Album vero cum aqua stillata à Raphaë Nephritum curat ebibitum, nec minus cordis tremori, & orthopnea prædest: nam inspectum rhagadibus, dolorem & pruritum præsentis auxilio mitigare traditur.

Non sat erit attulisse vires atque facultates ipsius *Succini*, de oleo etiam agendum, in quo multo efficaciores: nam quicquid efficacie & virtutis inest, quinque, sex, vel septem *Succini* libris, in unam libram facile redigi potest: unde superat sua facultate omnes Aquas vitæ, omne aurum potabile, hæc Evonymus Gelsi. ubi alia multa circa præparationem, & circa vasa ad Olei extractionem traduntur, quæ volumus recensere brevitati studentes: verum ea, quæ Tyrocinium chymicum habet, his verbis accipe: Digere lbj. *Succini* criti, in vini albi lbj. Tum adde manipulum salis præparati: destilla per retortam: servatis ignis gradibus. Rectificatur bis destillando, cum sale tantum. Sacrum hoc Oleum olim appellatum fuit, ob vires eius eximias, quas cum per se, cum cum aliis mixtum, præstat: in Epilepsia, Apoplexia, Melancholia spasmus, vertigine, peste, calculo, frigidis capitis defluxionibus, animi deliquis, ictero, difficultate respirandi, dysuria, uteri itran-

Gagates

Vires

vires

Vires

Vires

Vires

Vires

Vires

Vires

Vires

Vires

Vires

Vires

Vires

Vires

Vires

Vires

Vires

Vires

Vires

Vires

Vires

Vires

Vires

Vires

Vires

Vires

Vires

Vires

Vires

Vires

Vires

Vires

Vires

Vires

Vires

Vires

Vires

Vires

Vires

Vires

Vires

Vires

Vires

Vires

Vires

Vires

Vires

Vires

Vires

Vires

Vires

Vires

Vires

Vires

Vires

Vires

Vires

Vires

Vires

Vires

Vires

Vires

Vires

gulationibus, mensium retentionibus, fluore matris albo, vermibus, & febribus.

CAPHURA QVAE SALICIS FOLIO DICTVR.

CAP. LIV.

Descriptio IN panes, faciles ingentes, coacta importatur, pellucidos & candidos totos, factusj Nutri, in-
stat, qui pulsu oham tinuam edunt argutum, substantia pinguiscula, & quae facile flammam concipiat, quam in medijs etiam aquis inextinguibilem perunaciter tenet, sub dentibus lentescens, & exigua portione totum os veluti inflammans odore vehementi.

Serapion Kafir, seu **Camphra** gummi est arboris in India montanis nascentis, tenerae, subnigrae. Proventus eius ruberionis praesagium est, ex cerebro totum, sulgetro, & terra motu. Eius species **Camphra** infusa de Peris & Insulis Pazar. Prima est **Camphra** Ribach, quae sponte sua ex arbore fluxit, colore rubeo, quae sublimatione destituitur, non enim adepta à Rege Ribach, qui primus integravit. Proxima bonitate est, quae **Fan- sen** dicitur, deinde **Carab** nominata.

Avicenna species Camphorae sunt, **Alansari** & **Aracie**, deinde **Alzeid** & **Alseid**, & est alba, quae permixta ligno suo, quidam dixerunt arborem magnam, sub cuius umbra morantur plurima animalia, ut **Alvemus**, seu **Alvemer** [Lupus Cervarius interpretatur Bellunensis] certo anni tempore. Lignum sapidis vidi album, fragile, leve, cum vestigijs Camphorae in rimis.

Adulterium. Camphuram Mistiche, ardenti aqua, Zedoaria, quae a Lusitani scribit Matthiolus, ac esse gummi arboris cuiusdam in India nascentis, tanta magnitudine, ut sub eius umbra hominum centuriae recondi possint. Fuchium quidem putare Camphuram esse Biuminis Indici genus. Sed dissentire ab eo opinionem suam: quandoquidem nec Serapionis, nec aliorum quorumcunque hanc fuisse sententiam existimet. Praeterea oscitanter nimum de hac scripsisse Platearium: quippe qui Camphuram gummi arboris esse inficietur: Dioscoridis & complurium testimonio ex succo cuiusdam herbae fieri tradens. Quod profecto falsum sit, cum nullibi Camphura meminerit Dioscorides. Eam autem esse Gummi, non solum Avicennae & Serapionis testimonio probari, sed & Lusitanorum, qui nostro aera per Meridiem ad Calicut Orientalis Indiae emporium navigant. Arabibus

Kaphor, seu **Casur**, recentioribus Graecis **Καφύρα**. Lat. **Caphura**. Ital. **Caphura**. Germ. **Champfer**. Boh. **Basse**. Legimus autem Caphorae probationem hanc tradit. In calido pane furno recentissime sublato, bipartitoque manibus scisso, Camphura ponatur. Quod si humore madet, sincera est argumentum: si contra perareseat, spuria & falsitas signum. Ceterum nisi diligenter asseruetur, ex operculatis etiam capsulis nonnunquam evanescit: itaque saepe deluduntur. Septuaginta. Asservatur tamen secure vase marmoreo, aut Alabastro: Lini & Psylli semine sepulta. Nec desunt, quidam Piperis felicijs asservari putent, quod nec plane comprobandum videtur. Venetias Camphoram omnem rudem important, ibique igne & arte vitreis organis, ut candescat & pelluceat, elaboratur.

Lacune Alcamphor, dicitur Latinis **Caphura**, antiquis Graecis incognitum gummi, provenit

in magna arbore Indiae. **Garcie** de arom. Caput & Casur omnibus Arabibus. Caphure nec Galenus, nec ququam veterum Graecorum meminit praeter Aetium, tamen in Serapionis vulgata exemplaria. Dioscoridis auctoritatem citent, falsd enim id illis accessit. Est autem duorum generum, de Burneo, & de Chiana advehitur. Caphura de Burneo nunquam usque ad nostras regiones penetravit, saltem cum illis essent, videre non contigit: nec id mirum, quandoquidem huius libra tantum emittit, quanta centena libra eius, quae ex Chiana adfertur, quae secundum genus est, quae in Europam deferretur, in panes orbiculares coacta quinque digitorum diametri. Et quoniam ita coacta est, compositum medicamentum videtur, non simplex. Ea Caphura de Burneo, quae magnitudine est Mil. j. aut paulo maior, maxima ex parte vilior est. Constituunt enim **Gentiles**, & **Bananes**, & **Araber**, qui eam emunt, eius genera quatuor. Namque dividunt in caput, in pectus, in crura, & in pedes. Eius, quae ex capite est, libra, pendit **pardani** octoginta [est vero **pardani** moneta aurea apud Indos genus, quod conficit decem regales Castellanos] quae ex pectore aureis viginti: quae ex cruribus, duodecim: quae ex pedibus, quatuor, aut ad summum quinque. Curiosiores nonnulli, quatuor instrumenta cupres sumunt inaequalibus foraminibus pertusa [qualia, qui uniones vendunt, habere solent] & per ea Caphoram transmittunt. Eaque per instrumentum maiuscula foramina conueniens transmissa est, certum habet pretium: quae per instrumentum minoribus foraminibus pertusum transmissa est, aliud etiam pendit pretium. In ea vero discernenda adeo sunt experti **Bananes**, ut ut Caphoram Caphuram permixtam dextere distinguere norint, pretiumque iustum imponere, nec facile inveniatur, qui eos fallere possit. Multa nascitur haec Caphura in Burneo, Banros, Samatra, & Paten. Nomina autem locorum, in quibus Serapio & Avicenna nasci tradunt, magna ex parte sunt corrupta. Nam quam Serapio lib. i. simpl. cap. 4. de Panlor vocat, est de Paten in Samatra insula: quam Avicenna lib. 2. cap. 3. Alcuze appellat, de Sonda esse potest, quae insula est Malacca vicina: quam vero Serapio ex regione Cakra advehi tradit, corruptum est vocabulum, de be- bique de Malacca dicere, quandoquidem in Banros, loco Malacca vicino, nascitur.

Mohendum ex Clusio, quod postrema editionis exemplaria non meminerint **Alansari**, sed **Alansari** duntaxat, & **Aracie**, deinde **Alzeid** & **Alseid**.

in magna arbore Indiae.

Garcie de arom. Caput & Casur omnibus Arabibus. Caphure nec Galenus, nec ququam veterum Graecorum meminit praeter Aetium, tamen in Serapionis vulgata exemplaria. Dioscoridis auctoritatem citent, falsd enim id illis accessit. Est autem duorum generum, de Burneo, & de Chiana advehitur. Caphura de Burneo nunquam usque ad nostras regiones penetravit, saltem cum illis essent, videre non contigit: nec id mirum, quandoquidem huius libra tantum emittit, quanta centena libra eius, quae ex Chiana adfertur, quae secundum genus est, quae in Europam deferretur, in panes orbiculares coacta quinque digitorum diametri. Et quoniam ita coacta est, compositum medicamentum videtur, non simplex. Ea Caphura de Burneo, quae magnitudine est Mil. j. aut paulo maior, maxima ex parte vilior est. Constituunt enim **Gentiles**, & **Bananes**, & **Araber**, qui eam emunt, eius genera quatuor. Namque dividunt in caput, in pectus, in crura, & in pedes. Eius, quae ex capite est, libra, pendit **pardani** octoginta [est vero **pardani** moneta aurea apud Indos genus, quod conficit decem regales Castellanos] quae ex pectore aureis viginti: quae ex cruribus, duodecim: quae ex pedibus, quatuor, aut ad summum quinque. Curiosiores nonnulli, quatuor instrumenta cupres sumunt inaequalibus foraminibus pertusa [qualia, qui uniones vendunt, habere solent] & per ea Caphoram transmittunt. Eaque per instrumentum maiuscula foramina conueniens transmissa est, certum habet pretium: quae per instrumentum minoribus foraminibus pertusum transmissa est, aliud etiam pendit pretium. In ea vero discernenda adeo sunt experti **Bananes**, ut ut Caphoram Caphuram permixtam dextere distinguere norint, pretiumque iustum imponere, nec facile inveniatur, qui eos fallere possit. Multa nascitur haec Caphura in Burneo, Banros, Samatra, & Paten. Nomina autem locorum, in quibus Serapio & Avicenna nasci tradunt, magna ex parte sunt corrupta. Nam quam Serapio lib. i. simpl. cap. 4. de Panlor vocat, est de Paten in Samatra insula: quam Avicenna lib. 2. cap. 3. Alcuze appellat, de Sonda esse potest, quae insula est Malacca vicina: quam vero Serapio ex regione Cakra advehi tradit, corruptum est vocabulum, de be- bique de Malacca dicere, quandoquidem in Banros, loco Malacca vicino, nascitur.

Mohendum ex Clusio, quod postrema editionis exemplaria non meminerint **Alansari**, sed **Alansari** duntaxat, & **Aracie**, deinde **Alzeid** & **Alseid**.

Est autem Caphura [pergit **Garcias**] gummi, non medulla, aut cor, ut Avicenna loco supra citato, & alij quidam putant, quod in medullam ligni cadens deinde extrahitur, aut per rimas exudat. Id vidi in mensa ex Caphura arbore constructa, apud Pharmacopolam quendam, deinde in ligno quodam semoris crassitie donato Gubernatori Domino Ioanni de Crasto, denique in tabella palmum lata apud quendam mercatorem. Non tamen negaverim, quin interdum in arboris concavum decadat. Principio vero exudat admodum candida sine rubentibus, aut nigricantibus maculis: non autem organis educitur, veluti quidam scripserunt, neque ad candorem, conciliandum decoquitur, ut falsd Avicennae & Serapioni persuasum est. Pro certo mihi relatum est, solere quemlibet prodire huius colligendae gratis, quia ubi cucurbitam implerent, si quis validior hunc cum murebita viderit, illic cum

in magna arbore Indiae. **Garcie** de arom. Caput & Casur omnibus Arabibus. Caphure nec Galenus, nec ququam veterum Graecorum meminit praeter Aetium, tamen in Serapionis vulgata exemplaria. Dioscoridis auctoritatem citent, falsd enim id illis accessit. Est autem duorum generum, de Burneo, & de Chiana advehitur. Caphura de Burneo nunquam usque ad nostras regiones penetravit, saltem cum illis essent, videre non contigit: nec id mirum, quandoquidem huius libra tantum emittit, quanta centena libra eius, quae ex Chiana adfertur, quae secundum genus est, quae in Europam deferretur, in panes orbiculares coacta quinque digitorum diametri. Et quoniam ita coacta est, compositum medicamentum videtur, non simplex. Ea Caphura de Burneo, quae magnitudine est Mil. j. aut paulo maior, maxima ex parte vilior est. Constituunt enim **Gentiles**, & **Bananes**, & **Araber**, qui eam emunt, eius genera quatuor. Namque dividunt in caput, in pectus, in crura, & in pedes. Eius, quae ex capite est, libra, pendit **pardani** octoginta [est vero **pardani** moneta aurea apud Indos genus, quod conficit decem regales Castellanos] quae ex pectore aureis viginti: quae ex cruribus, duodecim: quae ex pedibus, quatuor, aut ad summum quinque. Curiosiores nonnulli, quatuor instrumenta cupres sumunt inaequalibus foraminibus pertusa [qualia, qui uniones vendunt, habere solent] & per ea Caphoram transmittunt. Eaque per instrumentum maiuscula foramina conueniens transmissa est, certum habet pretium: quae per instrumentum minoribus foraminibus pertusum transmissa est, aliud etiam pendit pretium. In ea vero discernenda adeo sunt experti **Bananes**, ut ut Caphoram Caphuram permixtam dextere distinguere norint, pretiumque iustum imponere, nec facile inveniatur, qui eos fallere possit. Multa nascitur haec Caphura in Burneo, Banros, Samatra, & Paten. Nomina autem locorum, in quibus Serapio & Avicenna nasci tradunt, magna ex parte sunt corrupta. Nam quam Serapio lib. i. simpl. cap. 4. de Panlor vocat, est de Paten in Samatra insula: quam Avicenna lib. 2. cap. 3. Alcuze appellat, de Sonda esse potest, quae insula est Malacca vicina: quam vero Serapio ex regione Cakra advehi tradit, corruptum est vocabulum, de be- bique de Malacca dicere, quandoquidem in Banros, loco Malacca vicino, nascitur.

Mohendum ex Clusio, quod postrema editionis exemplaria non meminerint **Alansari**, sed **Alansari** duntaxat, & **Aracie**, deinde **Alzeid** & **Alseid**.

Est autem Caphura [pergit **Garcias**] gummi, non medulla, aut cor, ut Avicenna loco supra citato, & alij quidam putant, quod in medullam ligni cadens deinde extrahitur, aut per rimas exudat. Id vidi in mensa ex Caphura arbore constructa, apud Pharmacopolam quendam, deinde in ligno quodam semoris crassitie donato Gubernatori Domino Ioanni de Crasto, denique in tabella palmum lata apud quendam mercatorem. Non tamen negaverim, quin interdum in arboris concavum decadat. Principio vero exudat admodum candida sine rubentibus, aut nigricantibus maculis: non autem organis educitur, veluti quidam scripserunt, neque ad candorem, conciliandum decoquitur, ut falsd Avicennae & Serapioni persuasum est. Pro certo mihi relatum est, solere quemlibet prodire huius colligendae gratis, quia ubi cucurbitam implerent, si quis validior hunc cum murebita viderit, illic cum

in magna arbore Indiae. **Garcie** de arom. Caput & Casur omnibus Arabibus. Caphure nec Galenus, nec ququam veterum Graecorum meminit praeter Aetium, tamen in Serapionis vulgata exemplaria. Dioscoridis auctoritatem citent, falsd enim id illis accessit. Est autem duorum generum, de Burneo, & de Chiana advehitur. Caphura de Burneo nunquam usque ad nostras regiones penetravit, saltem cum illis essent, videre non contigit: nec id mirum, quandoquidem huius libra tantum emittit, quanta centena libra eius, quae ex Chiana adfertur, quae secundum genus est, quae in Europam deferretur, in panes orbiculares coacta quinque digitorum diametri. Et quoniam ita coacta est, compositum medicamentum videtur, non simplex. Ea Caphura de Burneo, quae magnitudine est Mil. j. aut paulo maior, maxima ex parte vilior est. Constituunt enim **Gentiles**, & **Bananes**, & **Araber**, qui eam emunt, eius genera quatuor. Namque dividunt in caput, in pectus, in crura, & in pedes. Eius, quae ex capite est, libra, pendit **pardani** octoginta [est vero **pardani** moneta aurea apud Indos genus, quod conficit decem regales Castellanos] quae ex pectore aureis viginti: quae ex cruribus, duodecim: quae ex pedibus, quatuor, aut ad summum quinque. Curiosiores nonnulli, quatuor instrumenta cupres sumunt inaequalibus foraminibus pertusa [qualia, qui uniones vendunt, habere solent] & per ea Caphoram transmittunt. Eaque per instrumentum maiuscula foramina conueniens transmissa est, certum habet pretium: quae per instrumentum minoribus foraminibus pertusum transmissa est, aliud etiam pendit pretium. In ea vero discernenda adeo sunt experti **Bananes**, ut ut Caphoram Caphuram permixtam dextere distinguere norint, pretiumque iustum imponere, nec facile inveniatur, qui eos fallere possit. Multa nascitur haec Caphura in Burneo, Banros, Samatra, & Paten. Nomina autem locorum, in quibus Serapio & Avicenna nasci tradunt, magna ex parte sunt corrupta. Nam quam Serapio lib. i. simpl. cap. 4. de Panlor vocat, est de Paten in Samatra insula: quam Avicenna lib. 2. cap. 3. Alcuze appellat, de Sonda esse potest, quae insula est Malacca vicina: quam vero Serapio ex regione Cakra advehi tradit, corruptum est vocabulum, de be- bique de Malacca dicere, quandoquidem in Banros, loco Malacca vicino, nascitur.

Mohendum ex Clusio, quod postrema editionis exemplaria non meminerint **Alansari**, sed **Alansari** duntaxat, & **Aracie**, deinde **Alzeid** & **Alseid**.

Est autem Caphura [pergit **Garcias**] gummi, non medulla, aut cor, ut Avicenna loco supra citato, & alij quidam putant, quod in medullam ligni cadens deinde extrahitur, aut per rimas exudat. Id vidi in mensa ex Caphura arbore constructa, apud Pharmacopolam quendam, deinde in ligno quodam semoris crassitie donato Gubernatori Domino Ioanni de Crasto, denique in tabella palmum lata apud quendam mercatorem. Non tamen negaverim, quin interdum in arboris concavum decadat. Principio vero exudat admodum candida sine rubentibus, aut nigricantibus maculis: non autem organis educitur, veluti quidam scripserunt, neque ad candorem, conciliandum decoquitur, ut falsd Avicennae & Serapioni persuasum est. Pro certo mihi relatum est, solere quemlibet prodire huius colligendae gratis, quia ubi cucurbitam implerent, si quis validior hunc cum murebita viderit, illic cum

in magna arbore Indiae. **Garcie** de arom. Caput & Casur omnibus Arabibus. Caphure nec Galenus, nec ququam veterum Graecorum meminit praeter Aetium, tamen in Serapionis vulgata exemplaria. Dioscoridis auctoritatem citent, falsd enim id illis accessit. Est autem duorum generum, de Burneo, & de Chiana advehitur. Caphura de Burneo nunquam usque ad nostras regiones penetravit, saltem cum illis essent, videre non contigit: nec id mirum, quandoquidem huius libra tantum emittit, quanta centena libra eius, quae ex Chiana adfertur, quae secundum genus est, quae in Europam deferretur, in panes orbiculares coacta quinque digitorum diametri. Et quoniam ita coacta est, compositum medicamentum videtur, non simplex. Ea Caphura de Burneo, quae magnitudine est Mil. j. aut paulo maior, maxima ex parte vilior est. Constituunt enim **Gentiles**, & **Bananes**, & **Araber**, qui eam emunt, eius genera quatuor. Namque dividunt in caput, in pectus, in crura, & in pedes. Eius, quae ex capite est, libra, pendit **pardani** octoginta [est vero **pardani** moneta aurea apud Indos genus, quod conficit decem regales Castellanos] quae ex pectore aureis viginti: quae ex cruribus, duodecim: quae ex pedibus, quatuor, aut ad summum quinque. Curiosiores nonnulli, quatuor instrumenta cupres sumunt inaequalibus foraminibus pertusa [qualia, qui uniones vendunt, habere solent] & per ea Caphoram transmittunt. Eaque per instrumentum maiuscula foramina conueniens transmissa est, certum habet pretium: quae per instrumentum minoribus foraminibus pertusum transmissa est, aliud etiam pendit pretium. In ea vero discernenda adeo sunt experti **Bananes**, ut ut Caphoram Caphuram permixtam dextere distinguere norint, pretiumque iustum imponere, nec facile inveniatur, qui eos fallere possit. Multa nascitur haec Caphura in Burneo, Banros, Samatra, & Paten. Nomina autem locorum, in quibus Serapio & Avicenna nasci tradunt, magna ex parte sunt corrupta. Nam quam Serapio lib. i. simpl. cap. 4. de Panlor vocat, est de Paten in Samatra insula: quam Avicenna lib. 2. cap. 3. Alcuze appellat, de Sonda esse potest, quae insula est Malacca vicina: quam vero Serapio ex regione Cakra advehi tradit, corruptum est vocabulum, de be- bique de Malacca dicere, quandoquidem in Banros, loco Malacca vicino, nascitur.

Mohendum ex Clusio, quod postrema editionis exemplaria non meminerint **Alansari**, sed **Alansari** duntaxat, & **Aracie**, deinde **Alzeid** & **Alseid**.

Caphura adulterii Chanderros gummi. Lignis scobis.

impune posse occidere & cucurbitam auferre, fortuna nimirum id illis [ut aiunt] elargiente. Quæ ex Burneo adfertur, plerumque admista habet minutissima lapidum fragmenta, aut gummi quoddam *Chanderros* illis vocatum, Succino crudo persimile, aut ligni cuiusdam scobem. Sed facile maleficiū deprehenditur. Nullam præter hæc adulterandi rationem novi. Nam si interdum rubentibus, aut nigricantibus maculis conspersa videtur: id vitium ex sordidarum & impurarum manuum contrectatione, aut ex madore contrahi affirmant. Sed facile à *Baneanis* id vitium emendatur: Siquidem in panno lineo colligatam, in calidam aquam clàm demittunt, addito sapone & Limonum succo, deinde probe elotam in umbra siccant: sic multò candidior redditur, pondere multum imminuto. Id ab amico quodam *Baneane* fieri vidi, qui hoc arcanum mihi credidit.

Modus dealbandi Caphoram.

Duo generis scripturae et m. serpentis.

Vtriusque generis meminisse videtur Serapio, loco supra citato: sed obscure admodum, cum ait maiorem quantitatem esse de *Hariz*, minorem tamen esse, quàm quæ à *Sin* adfertur. Quod sic intelligendum puto, maiorem quantitatem ex *Chinco* adferri, maioriq; formâ esse, quàm quæ ex *Burneo* advehitur: quandoquidem eius quantitas drachma maior non invenitur: panes verò, sive orbiculi ex *Chinco* allati quatuor sunt unciarum aut ampliores. A viris fide dignis mihi relatum est, arborem esse Nuci luglandi similem, foliis tamen candicantibus, Salignis similibus, fructum, verò aut florem haudquaquam se vidisse, fieri tamen posse, ut utrumque ferat. Illud autem certò scio, materiam esse cinerei coloris, fagineæ ferè similem, interdum nigriorem, nec eam quidè levem, aut fungosam, ut retulit Avicenna (nisi fortè ætate iam caducam & emortuam viderit) sed mediocriter solidam. Addunt plerique vastam & præaltam esse arborem, laissimè sese fundentem, & aspectu perpulchram.

Avicenna error.

Fabula de umbra. Fabula de somnia.

Fabulosum est, quod ad eius umbram omne animantium genus confugere aiunt, ut ferociora animalia evitent. Nec minùs fabulosum, quod quidã, Serapionem secuti, scribunt, huius largioris proventus augurium esse, cum frequentibus fulgetris cælum coruscet, aut crebro tonitru perstrepat. Nam cum Insula *Samatra* [quam nonnulli *Taprobanam* putant] & circumiacentia loca *Lineæ æquinoctiali* vicina sint: multis tonitribus subiecta sint necesse est, eamque ob causam singulis diebus imbres aut leves pluvias habent. Singulis itaque annis *Caphura* abundare debebat. Ex quibus perspicuum est, tonitru largioris *Caphuræ* proveniendæ causam, aut indicium non esse. Nonnullis *Caphura de China*, composita videtur, ex eius parte, quæ ex *Burneo* advehitur. Affirmarunt præterea mihi, panes illos orbiculares, qui ex *China* advehuntur, compositos esse, quoniam *Caphura de Burneo* in *Chinco* deferatur, idè incolis expetita, ut eam alteri viliori permiscuant. Cui opinioni suffragatur *Baneanes de Cambaya*, qui pro arcano dicunt, deficiente *Caphura de Burneo*, solè se eius exiguum quantitatem cum multa *Chinensi* commiscere, eamque falsò de *Burneo* nuncupare. Addunt item isti *Baneanes*, *Chinensem Chapuram* compositum esse medicamentum, quod temporis lapsu evaporet, & corrumpatur, *Caphuram* verò de *Burneo* minime.

Caphura Chinensis Compositum medicamentum.

Contra Manard.

Mihi sanè compositum medicamentum non videtur, tamen *Manard*, in comp. Med. dist. 8. contra sentire videatur. Sin verò sit, ex duobus *Caphuræ* generibus consari necesse est. Nan tamen evaporet, non est tamen admodum contru-

Tom. I.

prioni obnoxia: quod indicium est, minime compositam, aut fictitiam esse, quandoquidem composita longè facilius corrumpi soleant. Si enim *Rhabbarum* vix quadrimestre illud, quo in hac regione pluit, ferre potest, multum sanè est *Chinensem Caphuram* incorruptam hic in India manere.

Avenrois 5. Coll. cap. 56. aliud *Caphura* genus facit, longè à superioribus diversum, scribitque *Ambarum*, eius *Caphura* genus esse. Cum autem eius opinionem cap. de *Ambaro* satis abundè confutaverimus, plura de his agere supervacaneum esse iudico.

Scribit *Andreas Bellunensis* in suo Dictionario secundum Arabes, aquam *Caphuram* ex arbore *Caphuræ* stillare, eamque cum arbore calidam esse tertio ordine. De hac aqua à multis eum Medicis, tum mercatoribus sciscitatus sum, neminem tamen invenire licuit, qui eam se vidisse asseteret. Quare facile adducor, ut credam *Bellunensem* cum in hac aqua describenda, tum in eius temperamento, lapsum esse.

Scribit *Ruellius* lib. 1. cap. 21. & hunc per omnia secutus *Martialis* in lib. 1. Diol. cap. 75. uterque verò ex *Serapione*, hanc *Caphuram* ceteris bonitate præstare, quæ à Rege quodam *Rihab* (qui primus dealbandæ *Caphuræ* ratione adinvent) *Riachina* sit denominata. Ego verò, ut id credam, adduci non possum, quandoquidem *Indiæ* Reges potentiores sunt, quàm ut tali mangonio operam dare opus habeant. Hactenus *Garcias*.

Nos verò considerandum proponimus, an *M. Fume* in hist. ge. ner. *Indiæ* occid. lib. 3. capit. 55. *Copei* in *Beroly* Insula arbor ferens *Camphoram*, ab arbore *Papyracea Copei* differens, vel eadem sit, cum *Caphura* arbore, quæ à *Garcia* folio *Salicis* exhibetur.

Port. Hist. Gal. L. 13. part. 8. Omnes Insulæ *Molucenses* producant, *Camphoram*, gummi stillans, Insulanis dictam *Capar*. Arbor pulchra, frondosa, proveniens in montibus mari vicinis, ligno levi, ramis tenuibus: *Camphoræ* autem quatuor species: una inter ligni fibras, similis squamis parvis alicuius metalli: altera extra corticem resinæ instar, Gummi modo adhærens, notata parvis maculis rubris, postea omnino albescit, melior & purior præcedenti. Tertia, nigrior, minoris pretij. Quarta, vilissima, quia sordida ligni fragmentis, quibus adhæret, magnitudine *Amygdalæ*, aut *Fabæ*.

Linshot. Camphor, aliàs *Casur* appellatum reperitur in *Bantam* *Indiæ* Orientalis, ad quem locum ex *Baras* advehitur, in forma placentarum parvarum, coloris albi: Asportatur etiam ex *Borneo*, *Bandarmachen*, & *Lane*, magnitudine seminis *Mili*, aut ad summum ovorum formæ earum quod ceteris bonitate præstat. *Chinenses* in dictis locis copiosè emunt, & in *Chinam* vehitur. Emitur autem ponderis quodam genere, ipsis *Cate* dicto.

In genere [Populi] videntur esse arbores, quæ *Camphoram* ferunt (ait *Cæsalp.* in *India* Orientali: nam & nostris bituminosus quidam liquor nascitur, quem in *Electrum* densari, *Dioscorides* testatus est: & *Plinius* de *Betula* bitumen in *Gallia* excoqui scripsit. Videtur autem *Camphora* è genere *Bituminis* esse, quoniam rapacissimè ignem excipit, & ardet in aqua substantia gummi similis, candidissima & translucida: odore valido, non ingrato, facillimè evanescit in auram, nisi in loco frigido & concluso servetur. Arabes *Caphur* vocant, & recentiores *Græci Caphoram*.

Caphura Avenrois.

Ambarum.

Aqua Caphurata.

Bellunensis.

Ruellius.

Copei.

Gummi Capar. Lignum. Camphora 4 species.

Camphor. Locus.

Mili magnitudine.

Populi genus.

Electrum.

Camphora. Descrip.

FF 2

Recensitis hactenus diversis diversorum authorum opinionibus, restat ut dicamus, quid Hist. Lugd. sentiat. *Caphor*, inquit, seu *Casur*, recentioribus Graecis *καπύρα*, ut etiam Latinis, Gallis, *Camphre*: de hac (nostro adstipulante iudicio) certis Garcias, quam Avicennas iudicat.

Temperamentum. Facultates primus exposuit Serapio, scribens: *Camphora frigida est, & sicca in tertio gradu, confert calefactis, & cephalalgia calida nari- bus obiecta, per se, aut cum aqua rosacea, aut Santalis, odore quoque furores venereos coër- cet, maior vis potest: moimentum eius commi- stum ventrem stringentibus in Cholera morbo, eorum vim auget: Camphoræ usus canos accelerat.*

Vires. Errhinum ex duobus eius granis cum aqua La- ctuca, calidam cerebri intemperiem contempe- rat, ac somnum conciliat, narium hemorrhagiam sistit trita ex Omphacio: undecunque manan- te a sanguinem cohibet: nimius Camphoræ usus vigilas facit, potu sumpta renes refrigerat & ve- fica: morbos frigidos, in frigidis potissimum partibus generat. Credidit igitur Serapio & Avicenna, Camphoram tertio abscessu & siccare, & refrigerare: quæ tamen, cum vehementer ar- deat, ac etiam in aquam proiecta conflagret, & sit perquam odore odorata, & aded tenuium par- tium, ut sæpe per se in auram evanescat, illis re- clamat Math. Quo fit, ut quis suspicari possit, aut legitimam Camphoram ad nos non aduehi, aut hoc loco Arabum monumenta (ut in aliis quamplurimis) esse vitata. Circumlitionibus im- ponitur ad cutis nitorem conciliandum, & ad ar- cendas tam vulnere, quam ulcerum inflamma- tiones, Erysipelata extinguit, & adversus gonor- rhœam, & albas vulvæ fluxiones efficax est, cum Succino, & aqua Nymphææ hausta. Idem præ- stat pubi, seu uno ventri, testibus, renibusque illita: quæ tamen antea Psyllij seminis spissamen- to, aut Omphacio, aut Solani succo probè sit macerata. Sanguinem è naribus profluentem si- sistit, aut cum Vitisæ semine immixta, aut ex maioris Sedi & Plantaginis succo fronti circumlita. Colly- riū ad calidas oculorū lippitudines utiliter im- ponitur. Renibus ac testibus illita Venerē extinguit, corpora à putredine præservat: proinde commodè antidotis miscetur, quæ contra venena, veneno- rum animalium ictum, & pestilentes affectus conficiuntur. Novi, qui hac Antidoto à peste immunes se præstiterunt. *z. Camph. drach. j. Zedoariæ in pulv. redactæ unc. sem. sacculo lineo excepta in cantharo vini suspendunt. Cuius vini bibitur quotidie manè haustus unus calidus. Va- rignana multum tribuit Camphoræ in calidis pe- stiferis febribus, Eius gr. 3. aut 4. cum Syrupis quo- tidianis exhibens: putredinem enim arceat, hæ- rum febrium causam. Possent quoque Campho- ræ grana duo ex Syrupi de Papavere unc. j. sem. Aqu. Lactuc. unc. iij. somni tempore propinari.*

Cephalalgia. Dissolvitur Camphora gutta vini ardentis, aut Amygdalis. Camphoræ granum unum aut alterum ex vini ardentis gutta dissolutæ, aquæ Cardui be- nediicti, Tormentillæ, vel Portulacæ cochlearia tria, miscentur, lumbricos puerorum bibita po- terit pellunt. *z. Tormentill. Bistortæ, ana. drach. ij. Cinamomi, Galang. Caryophyll. ana. drachm. sem. in pulverem redacta in vino veteri deco- quantur: Vino colato affunde Camphoræ drach. sem. De hoc vino aliquot dies manè haustus ca- lidus, sanguinis fluorem qualemcumque tam mu- lierum, quam virorum sistit. Acetum, in quo dis- coxerit Camphora, calidum ore retentum, facit ad dentium dolores. Rhasis Camphoram æsti-*

mat odore frigidam & frigidæ temperaturæ, Sed ego Leon. Jacchius puto Veteres, de alio succo, vel gummi loquutos, quam nos modò habea- mus: quocunque enim modo examines, calidam invenies. Nihil est æquè ignibile, unde inextin- guibilem serè ignis materiam ad bellum parant. Sed & Rondeletius in Pharmacop. in Elect. de succo Rosarum, Caphuram calidam esse & te- nuum partium asserit: quæ, si pura sit, species sit Aspalathi: si spuria, sublimatio Mastiches. Ca- phuram præterea ex Electuario de succo Rosa- rum expungendam censet, quia nimis tenuium sit partium, & calefaciat potius, quam refrigeret, quod inutile sit ad bilem: ingrato enim odore suo Caphura hic non convenit, Tenuitas verò partium in medicamentis solventibus est fugien- da. Nun̄ deducit ad cor, & per abditissimas ven- triculi partes purgans medicamentum, quod est ex genere venenosorum. Caphuram tandem frigidam esse docet Garcias Arom. hist. lib. 1. cap. 9. hæc scribens. Rhases de re med. lib. 3. cap. 22. eam frigidam & humidam, A vicenna verò, quem pleri- que sequuntur, lib. 2. cap. 134. frigidam & siccam tertio ordine constituit. Ego autem in ea ali- quando opinione cum multis recentioribus fui, Caphuram calidam esse, ob illum odorem & par- tium tenuitatem, quibus prædita est. Sed postea- quam experimento didici Ophthalmis & oculo- rum inflammationibus, tum etiam ambustis im- positam, nivis frigiditatem retulisse, illic sententiam mutavi. Adde, quod omnes, apud quos nascitur, frigidam asserant. Neque verò huic sen- tentiæ repugnat quod odorata sit, quandoquid- dem ob partium tenuitatem facillè evaporat & exhalat, qui in superficie est odor, contra quam in Santalo & Rosa, quæ ob suam adstrictionem odorem in se retinent. Refert Avicenna vigilas excitare Caphuram. Quæ fieri autem id potest, quandoquidem ipsius testimonio frigida est, so- leantque frigida somnum conciliare? Somnum quidem inducit foris, aut intus exigua quantitate usurpata. Siquis verò sæpius odoratur, & nari- bus adhibeat, cerebrum exsiccat, & vigilas creat. Magnus eius usus est his regionibus, cum multis in rebus, tum etiam in cibis.

Nullus equidem nobis facillè persuadebit vul- gare Camphoram refrigerare, nisi per accidens, sua tenuitate: si namque iungatur frigidis, ea ad profundiora loca deducet, hæcque ratione, non quidem per se, sed frigida deducendo, refrigerabit. Miramur autem Matthiolum, credentem calidam esse Camphoram, commendare in multis morbis calidis, ut ad vulnere, & ulcerum inflamma- tiones, erysipelata, fluorem sanguinis, ac ad calidas oculorum lippitudines, in quibus affectibus noli- mus uti, quicquid dicat Garcias.

Finem huic historiæ Cæsalpinus imponat, di- cens: dimisso sensu rationem querunt, qui con- tendunt Camphoram non esse arboris lachry- mam, sed rem fossilem inter genera Bituminis, ut Naphtha, neque temperamenti frigidi & succi, re- fragrantæ scilicet odoris vehementiæ, & miræ fa- miliaritate cum igne, sed calidi & sicci, nam etiam eius nimius usus vigilas facit, teste Serapione & Avicenna. At quid prohibet sub exhalatione te- nuissima, quæ calida & sicca est, latere frigidam substantiam: quæ extincta exhalationis flammula ob tenuitatem minimè utentem agat, & peni- tils, quod profundius ob tenuitatem exhalatio- nis penetraverit? vigilas autem nimio usu effi- cere non est absurdum, ut in senectute. Philoso- phi sanè considerationem non excludit, quomo- do

Aspalathi species. Ex El. rosa- ro tollendo Caphura.

Temperamentum.

Garcia re- figurat.

An somnum conciliat?

In cibis.

Matth. vol.

Cæsalpin.

de exhalatio tenuissima calida & sicca sub frigida
laxa substantia.

CAPURA RESINA.

CAP. LV.

CENUS quoddam resinæ prodidit Qualcebe-
nus ad Matthiolum, quod Constantinopoli
li Persa mercatore Capura viva est cognomi-
natum. Venerem in primis stimulare contraria vir-
tute ab Arabibus attributa Caplura, idem mer-
ceptor referebat. Odoræ tunc, saporque non me-
diocrem caliditatem possidere tantum testantur.
Hanc, Matthiolus ait, vivam Capuram plurimi
facio. Cogitabo posthac, an lexima sit Stacte,
nam adeo odore placet, ut credam non obscuræ
facultatis esse medicamentum.

Capura
viva.
Ad Genu-
rham.

Capura
viva.
Stacte.

STYRAX ARBOR ET LA-
CHRYMA.

CAP. LVI.

Descrip.

Caudex.
Cortex, Fo-
lius.

Flos.
Fructus.



STYRAX ar-
bor Malo Co-
toneo, simili
caudice, candi-
diori cortice
Czsalpin. folio
etiam est Mali
Oxydoniz mino-
re, subrotundo,
vel in obtusum
mucronem desi-
nente, subtus ca-
nâ lantigine pu-
bescente, supe-
rius glabro & vi-
ridi: Flores fert
in novellis fur-
culis Araneis
câdos, plures &
simul iunctos,
pluribus foliolis

constantes, odoratos. Fructum magnitudi-
ne Avellanæ æqualem, incanum, callo
fulco, amariante, qui in duas, tres, quatuorve
carinas dehiscens, exhibet lignosum ossiculum
buxei coloris, nucleum claudens aliquando un-
cum, quatuor lineis sulcatum, aliquando gemi-
num, angulosum, interdum & ternum. Medul-
la, Czsalpino autore, insavis interna.

Cordus fructum ut reperitur, cum Syrace sic
describit: Nux Syracina globosæ figuræ fructus
est, mediocris Avellanæ magnitudine, duplici
cortice, nucleoque constans: exterior cortex car-
nosâ substantiâ, & in viridi casto colore, supre-
mum Amygdalæ putamen refert, is in maturita-
te tribus rimis in tres partes dehiscit: alterum li-
gnosum, durum, flavum, aut subruffum corti-
cem ostendens, quo contineatur nucleus pinguis,
oleosus, gustu acris, odoratus & resinose Syra-
cis qualitatibus respondens, sed multo acrior, &
fauces scarificans.

De Syrace arbore, eiusque Lachrymâ apud
Theophrastum, quod equidem sciâmus, nihil
habetur. Est autem hæc arbor, Dioscoride & Pli-
nio testibus, Malo Cotoneo similis. Nunc Sera-

Describi-
tur fructus
a Cordo.
Nux
Amygda-
lis.
Cortex ca-
rnosus.

Arbor qua-
li Diosc.
Plinio.

pio fructum tribuit candidum, Avellanâ maiore,
Pruni albi similem, duplici cortice.

Sed liceat hîc de eius resina ex Veterum sen-
tentis quædam annotare, cum præsertim diver-
sa authorum dicta, controversiam parere videan-
tur.

Dioscor. duplicem tradit, dicens: Præstat au-
tem, qui flavus est, & pinguis, ac resinosus, & qui
grumos habet subalbicantes, & qui quàm diutius
simè in odoris graua perseverat, & dum molitur,
melleam quandam humiditatem remittit. Talis
autem est Catabalites [Marcellus dicit potius le-
gendum Gabalitem, ut habet Plin. & Onbal] &
Psidiacus & Cilicius. Vultus est niger & friabilis,
& fursuri similis. Invenitur etiam lachryma gum-
mi similis, pellucida, Myrrham odore referens.
Sed hæc pauca gignunt. Adulterant: ipsum admi-
xta arboris scobe, quæ vermiculis eroditur, &
melle ac lini unguentis fæce, & quibusdam aliis.
Quidam ceram, aut adipem aromatis indutum,
in ferventissimo Sole vna cum Syrace molliunt,
& per colum ampis foraminibus præditum, in
rovan frigidam exprimunt, & vermiculos elimi-
gant, ac vendunt, vermicularem Syracem appel-
lantes: Talem verò imperiti, velut sincerum pro-
bant, non considerantes odoris vigorem. Acis
enim est, qui adulteratus non est.

Plinius cap. 25. lib. 12. primam tantum descri-
bens, non discessit à Dioscoride, sic enim habet:
Proxima Iudeæ Syria Phœnicen Syracem gignit,
circa Gabala & Marathinta, & Casium Seleucia
montem. Arbor est eodem nomine, Cotoneo
Malo similis, lachrymæ ex austero iucundioris, in-
tus similitudo harundinis, succo prægnaus. In
hanc circa Canis ortum advolant pennati vermi-
culi erodentes, ob id in scobe sordescit. Syrax lau-
datur post supra dicta ex Psidia, Sidone: Cypro,
Cilicia: Creta minime. Ex Amano Syria Medicis,
sed unguentarius magis. Colos in quacunque na-
tione præfertur rufus, & pinguis lentus: dete-
rior fursurius, & cano sibi obductus. Adultera-
tur Cedri resinâ, vel gummi, aliâ melle, aut
Amygdalis amaris: omniâque ea deprehendun-
tur gustu. Præterea optimo xix. Exit & in Pam-
philiâ, sed aridior, minusque succosus. Eiusdem
verò libri capite 17. hæc habentur: Ex Syria reve-
hant Syracem acris odore eius in facis abigentes
suorum fastidium.

Sed veri Syracis verum odorem notat Gal. de
antid. lib. 1. cap. 14. quando ait: Manifestum in-
super est, Syracem, qui in calamis è Pamphiliâ
apporatur, Andromachum præcipere. Particu-
laris autem illæ Syrax nascitur, tantumque ab
hoc vulgari distat, quantum à vino, quod in Ca-
bernis venditur, Falernum. Accipere verò Sy-
racem oportet, maxime psidum, quem & odo-
rem, & saporem quoque vehementissimum habere,
perspicuum est. Serapionis verba paulo post apud
Czsalpinum invenies. De Syrace quoque La-
chrymâ apud Theophrastum nil reperitur, præ-
terquam lib. 9. capit. 7. quod sit inter odora-
ta: quæ unguentis permisceri sumptuosissimis
soleant.

Cæterum quid Hermolao videatur de Syrace,
præsertim verò de eius qualitatibus dicendum.
Qualitatem non unam esse Syraci, argumen-
to sunt cognomina, in compositione medica-
rum frequentia Chrymasias, Calamitis, Aspros, Chyma-
h. e. [ut puto] candicans. Chymatias Arabes in-
terpretantur eum, qui rarus inventu, & gummi
similis describitur. Idem Calamitin: quanquam
harundine sua mixtus ipso nomine significatur,

Delectus.

Syrax Ca-
tabalites.
Psidiacus.
Cilicius.
Niger.
Syrax fi-
mili gum-
mi. Myr-
ra odor.
Adulteris.

Syrax.
Vermicula-
ris.

Delectus.
Arbori fo-
riferum.

Vermicula-
ris.
Delectus.
Locus.

Calor.

Adulteris.

Præterea.

Delectus.

Calamitis.

reliquis præstantior fuit. Atque hinc est, quod in hodiernum usque diem vlitatum sit Medicis, ut Syraci semper Calamita nomen adiungant, præstantiorem significare volentes. Hic revera liquidus fuit, & dicebatur, quanquam diversus ab eo, qui ita Arabibus nominatur. Hodie affertur delut. Hic incandescens & rufescentes grumos, seu micæ concrevit, & sicus dicitur, hodieque adfertur. Huic Calamitæ Syraci interdum liquida resina & oleum additur, & fit Syrax, qualis officinarum liquidus, de quo postea. Quoties autem in Græcorum libris Syracis fit mentio, semper Calamites inaudiendus erit.

Sed vnde clarissimus meus præceptor Fuchsius colligat, Calamitem Syracem liquidum fuisse, nescio: Galeno Calamites præstantissimus est: præstans autem grumos habet teste Diosc. Calamitus ex Pamphilia affertur, qui verò in Pamphilia provenit, teste Plinio, aridus: ego sane Syracis lachrymas a scobe mundas, pulcherrimas vidi Lugduni, & adhuc habeo odoratissimas, de quibus postea sub titulo Storacis Calamitæ officinarum. Merito igitur reprehensus fuit hac in parte Fuchsius, per Matthiolum. Idem Fuchsius ex Arabum, & recentiorum traditione, tres sunt Syracæ: una liquidum, qui est Myrrha Stacte altera rubem, qui nihil aliud est, quam exterior cortex, fuscus & aridus, qui post lachrymam subactam & expressam remanet, quod Serapion confirmat: Tertium est Lachryma Syracis, quæ ex eius nominis arbore exsudat.

Cronephurgo quoque probatur, quod paulò ante Fuchsius annotavit, quod sc. quovisunque simpliciter est, datur Syrax, Calamites, live aridus intelligatur. Anstoteles, inquit, Dioscorides, Plinius, Galenus, & ceteri distinctim Syracem habent non per liquorem & sicum, sed per proprias quasdam quabitates. In 1. bernis Storax vocatur, & vehementer ignavus, & plurimum habetur. In Aipta Moschata live Syracis Calamitæ & rubem nomine intelligitur, rubicundior colore, aut sex illius, aut quod ex Myrrha exprimitur, Magma.

Scribunt Monachi in Annot. Med. cens. dist. 2. cap. 62. Storacem, live Syracem (quod rectius ut diximus) non esse aliud, quam speciem Myrrhæ: siquidem Dioscorides post descriptionem speciem Myrrhæ immèdiatè subjunxit capitulum de Syracæ. Serapion autem capitulo de Storacæ, ad auctoritatem Diosc. descripto, sub nomine Storacis liquida comprehendit caput Dioscoridis de Stacte, quæ est pinguitudo Myrrhæ: cui continuo subiunxit capitulum dicti Dioscoridis de Syracæ, ubi dicit: Et Storax est species Meba, live Miha, Miha, autem, sive Meba secundum ipsum, est Storax liquida. Et quæ ex Myrrha exprimitur debet hinc intelligi scilicet Stacte, quæ etiam Myrrha liquida potest dici, nam alter non erit consonum. Myrrha verò non liquida a ipso Serapione vocatur, Ler & Bathnasas. Vnde idem Serapio cap. de Myrrha, secundum auctoritatem Dioscor. dicit: Et est de ipsa res, quæ dicitur Bathnasas, & est grossa, à qua egreditur Miha, id est, Storax liquida, quando exprimitur, & dicitur Mirnastacte. Et est de ea, quæ dicitur Aizon, & est pinguis multum: & arbor est in terra, quæ dicitur Parthemia, & est pinguis, & quando exprimitur succus, egreditur velut Storax multum. Hac Serapio. Ex quibus patet, quod Syrax, i.e. Storax, non multum elongatur à Myrrha, & per consequens potest dici species Myrrhæ. Etiam Diosc. cap. de Syracæ dicit, quod in-

venitur Syrax, live Syracis lachryma perlucida, & Myrrhæ amula. Etiam per ipsos Authores probatur, quod tam de speciebus Myrrhæ, quam de Syracæ liquor exprimitur, velut mel. Sed liquor Myrrhæ à Græcis Stacte dicitur. Liquorem autem Syracem à Diosc. non scribitur particulare nomen, bene autem potest subintelligi mel Syracem. Arabes verò, teste ipso Serapione virumque liquorem Storacem liquidum appellant Syrax autem liquida est Myrrha, i.e. Stacte, parum, aut nihil differt à Myrrha in odore, sapore, & virtute. Et sicut Myrrha est odorator, amarior & præstantior Syracæ, ita Stacte, i.e. mel Myrrhæ, est odorator, amarior, nec non & nobilior Syracemelle. Quamobrem Storax liquida, quam aliqui Sigiam vocant, quæ & pro vera Storacæ liquida videntur omnes, non potest esse Myrrha (Stacte) ut voluit Bravolus, & recentiorum nonnulli. Non enim habet conditiones Stactis. Nos enim opinati sumus potius esse mel Syracis, adulteratum tamen, quam Stacte Myrrhæ. Syrax autem, live Storax non liquida, ut communis opinio Medicorum tenet, est ipsa, quæ vtimur, quæ vulgò dicitur Storax Calamita, & per varios auctores legitur Syrax, Storax sicca & Ambra, seu Lubne, aut Lubne, seu Storax Heremitarum, & Thymbrum, & Storax, & alius pluribus nominibus appellatur. Quamvis sit & alia Storacis species, quæ peculiari nomine Storax rubea nuncupatur, ut in conscriptione Aiptæ Moschata Nicolai legitur, ubi ingreditur & Storax Calamita, & Storax rubea. Et propriè est ista, quæ assimilatur Maci, quæ scribitur à Serapione, quod est exterior cortex fructus ipsius Storacis. Doctor autem noster in præsentis descriptione petit Storacem liquidam, ut Rhazes: filius Serap. autem habet simpliciter Stactem. Sed quia (ut dictum est supra) Arabes tam Stactem, quam mel Syracem, Storacem liquidum vocant, Stactem tanquam meliorem speciem Storacis liquidæ nos hinc apponendam esse consulimus. Vbi autem queritur mel Storacis, manifestè intelligitur, Stactem non esse apponendam. Sed quia Stacte vera nomine hac nostra tempestate haberi potest, vel si habetur (quod haud credimus) non caret plurimis adulterationum vitis, eius loco utendum melle Syracis puro censemus. Stactem purum vel Syracis non invenitur, Storax sicca pro eo erit commodissima: quoniam (ut diximus) habet filius Serapionis, per Storacem absolute descriptam, semper intelligitur sicca. Præterea auctor non hac descriptione etiam Myrrham petit, quæ vera nos carere supra diximus in Sagabonæ, & quod pro ea debemus sumere Stactem. Hic autem (quia Stacte non habetur) dicimus, quod loco Myrrhæ post Stactem, melius est substituere bonam Storacem Calamitam, quam illam, falsò vocatam Myrrham. Et secundum aliquos gummi Hedera optimum, in Myrrhæ vicem apponere non vituperamus, tamen Myrrham perfectè supplere nequeat, neque cum eo comparari.

Tradit Matthiol. Syracem passim in Italia Syracem Calamitam appellari. Ac Manardum ait, ubi in Dioscoridis codice legitur Storax, existimasse potius legendum esse Calamites. Neque probasse lectionem mutandam in Galiten, quemadmodum Marcellus fecerit. Sed profectò magis Marcelli sententiam probandam videri. Quippe quæ Plinii testimonio comprobetur. Cum etiam ei adscriptetur Oribasii

codex manu-scriptus. Fuchsilum porro Styracem
Calamitem liquidum fuisse censuisse: Verum in
hoc à veritate discessisse.

Lacuna sunt hæc: *Syrax*, Castil. & Portug.
Iberaque, Catalonæ *toraco*. Ex hac Ballarium ex
 nova Hispania.

Ex Amato hæc traduntur: *Cabalites* (ut optime Marcell. interpretatur) legendum, non verò *Casabites*, vel *Calamites*. In hanc quoque lectionem eunt *Hermol.* & *Ruell.* Nostis temporibus *Sinceris* ex *Zana*, apud *Indos* insula, *Syrax* portatur.

1. Serapio, inquit Celsipinus, *Syracem* dividit in
liquidum, & *siccum*: per *liquidum* intelligit, mo-
 do oleum ex nucleis extractum. modo ipsam ar-
 boris *lachrymam*, modo stillarum humorem &
 recentu Myrrha extra. quem Dioscor. Sta-
 2. *cyra* vocat: per *siccum*, intelligit corticem fru-
 ctus, postquam expressum est oleum.

Calamita
citrina.
Storacis li-
quidum ni-
grum.
Storacis sic-
cum.
Lachryma
spontanea.

Avicenna similiter humidum & siccum esse. Hu-
midi autem unum sponte fluentem ex arbore, co-
loris citrini, quem Storacem Calamitam vocant.
Alterum per decoctionem, coloris nigri, quem
Storacem liquidum appellant: Feces autem Sto-
racem siccum esse. Quæ Avicennæ explicatio vi-
detur magis cum Dioscori consentire, ut quædam
sit arboris lachryma, sponte fluens, quæ cum in

ligni scobe repenatur, veluti seprota redditur: congeri enim circa caudicem multam scobem erodentibus vermiculis testatur Strabo. Quidam artificio extrahitur per decoctionem, ex Styra-
 cis lignis, aut ipsamet scobe per ignem refudat Sty-
 rax liquidus, quem Dioscor. Oleum Styracinum
 vocat, ipsa vero scobs exsiccata & retorrída, Sty-
 rax sicca est. Nigrum Dioscor. damnat.

Hodie tria eade habentur: nam arboris lachry-
ma, non sine scobe quadam, Syrrax cognomine
Calamita, tanquam optima ad suffumigia preuo-
sa venit. Arida quoque ipsa scobis modo rufa, quæ
laudatur, modò nigra, quæ damnaur, fimiliter
ad suffimenta odorata. Syrraciniùm verd oleum
vendebatur Balsami loco ex Syria advectum: sed
desuit posteaquam novum genus Balsami ferri
cepit ex Occidente: liquor autem ille putridus,
et ad febrem, iuvare quodammodo valet.

quo ad scabiem inungendam utuntur, viliſſimo
etiam pretio, quamvis Storax liquidus vulgò ap-
pelletur, aliena omnino res est. Forè Elcomeli
Dioscoridis, quod è pinguitudine furculorum
fieriſcenbit, annuldam arboris in Syria: ex qua
ſpontè manat oleum melle craſſius; ſapore
dulci; ad purgationes aptum, addens acce quoque
fieri oleum è pinguedine furculorum, optimum
verus, pingue, non culbidum. Teſtantur autem:
vulgèrem Storacem liquidam, ex decoctione
quorundam furculorum in aqua fieri.

Car. sty. 429, his verbis: Quid ex Styrace emanaret liquor, ac veluti stratum extillaret, Styraex dicta videtur. Eius seracissimus ille tractus Galloprovinciæ, qui à trium Mariæ sororum Fano antiquissimo, ad forum Iulumque porrigitur: est namque prope oppidum Solarium collis latissimus & opertus frequenti Styraçe, nullidum illic cognita, quam pitho nos, iuvenisque, multis tum Pharmacopœis & studiosis, tum Monspessuli professoribus ostendimus: nam iamdiu videramus Venetiis in Franciscanorum horto: truncus

Descriptio ipse similis Betulae ligno, aut Mali Cotoneae: folia utraque minora, & quam Cotoneae minus rigida, minusque aversa parte cana: flos albidus, Arantiae magnitudine, non odore. Baccarum multarum Staphylodendri magnitudine, rotundiorum.

*Fig. Sty-
racinum.*

*Locus.
Oder acris.*

Serpentes.

Delectus.

Vires.

Menses.

*Strumas.
Venena.*

Oleum.

*Quantitas
delet.*

Oleum.

commodat fuligo Syracis ad eadem, ad quæ etiam
Thuris fuligo. Quod verò ex ipso præparatur in
Syria Syracinum unguentum calefacit, & mollit
fortiter. Capitis tamen dolores inducit, & gravi-
tatem ac soporem efficit. Galenus & Paulus præ-
ter iam dicta à Dioscoride, nulla tradunt. Autho-
re Plinio, ex Syria revehant Syracem, acris odore
eius in focis abigentes suorum fastidium. Cæterò,
non alia ligni genera sunt in usu, quàm odorata:
Cibòsque Sabæi coquunt Thuris ligno, alij Myr-
rhæ, oppidorum, vicorùmque non alia, quàm ex
aris fumo, atque nidore, ad eam nulla est voluptas,
quæ non assiduitate sui fastidium pariat. Eundem
ad serpentes fugandas urunt in odoriferis silvis
frequentissimas. Syracis autem naturam in pe-
reginis arboribus exposuimus. Placet præter il-
la, quæ diximus, maximè pinguis, purus, albi-
cantibus fragmentis. Medetur usui, faucibus, pe-
ctoris vitis, vulvæ præclusæ, duritiæve laboranti.
Ciet mentes potu. appositivæ, alvum mollit. In-
venio potu medico tristitiam animi resolvi, lar-
giore contrahi. Sonitus aurium emendat infusus,
strumas illitus, nervorùmque nodos. Adversa-
tur venenis, quæ frigore nocent, idèd & Cicutæ.
Serapio exteriorem Syracis arboris corticem
mandi, quamvis amarum: ex interno autem nu-
cleo oleum exprimi perhibet. Sylv. de compos.
mod. Syracis drach. j. miscet ex Andromacho ar-
teriacæ. Syrax, Crocus, Myrrha, quantitate
sunt deleteria: nam largiùs pota quædam, dement-
ant: quædam mortem inferunt, sed mensurà
aptà aliis mista iuvant. Syracis & Zedæi, Hispanum
cognominatum Actuatio in Trochisco Neapolitæ.
Oleum Syracis, quod optimè sedat dolorem
ventris puerorum, recipit Ol. Aneth. Camomill.
ana. vnc. iij. Ol. Rut. Syrac. liquid. ana. vnc. sem.
pulp. Cymin. vnc. j. quæ parùm bullire sinuntur,
servanturque ad usum.

STYRAX CALAMITA OFFICI- NARVM IMPURIOR ET purior.

STYRACIS fursurose plerùmque adferuntur
Smassæ, & scobe ligni sordidatæ, in his tamen
genuinus Syrax reperitur, qualem habemus,
patis constans grumis, relucens, colore ful-
vo, vel ruffo, saturatioreque, sub dente lentescen-
tibus, caloreque ductilibus, ceræ instar, sapore
non ingrato, odore fragrant, potissimum ubi
prunis iniectæ fuerint, vel micæ solæ, vel ut sunt
scobe adulteratæ, flammam verò ex facillimè con-
cipiunt, & clazo incendio lucent.

Lugduni & Genevæ habuimus pro paranda
Theriaca Valerandi Dourez, cuius protector pu-
blicè fuit: quæ sanè mundæ, pulcherrimæ, odorau-
simæ: etiam post plurimos annos.

STYRAX LIQUIDVS RVBER OFFICINARVM.

STYRAX liquidus melleæ & tenacis substantiæ
est, coloris fusci, aut ex fusco rubentis, aut ex
cinereo fusci, odore valido, atque ob vehemen-
tiam serè ingrato, in quo tamen videtur appa-
re, remissus ille Syracis calamitæ odor, multò ta-
men magis, si linguæ admoveatur conspicuus,
dum in nares inde pauca quantitate anathymia-
sis ascendit, sapore autem acrisculo.

Cordus Hist. pl. sic describit: Syrax liquidus,

qui ad nos pervenit, liquidæ aut Lariceæ resine
consistentiam & crassitudinem habet: colorem
in cinereo candicantem: odorem Syraci simi-
lem, vehementem, acrem, & gravem, præsertim
cùm prunis imponitur, per se latius spirat, quàm
prædictus Syrax, propter liquidioris substan-
tiam. Idem natus non est, sed fit additis paucis
Calamitæ Storacis, copiosiore, laricea resina, oleo,
& vino, simulque coctis, expressis, atque cùm re-
frigerit, donec candorem acquirat, ligneo pistil-
lo agitat: Ex ea mixtura duo resulant, videli-
cet Syrax liquidus, & oleum Syracinum: dimis-
sis enim uno atque altero mense, quod deinde
tenuissimum, liquidissimum, atque odoratissi-
mum in mixtorum illorum medicaminum sub-
stantia fuerit, à crassiore discedit, eidemque ad
fundum valis descendenti, superius innatat oleo
crassior, lariceæ resine liquidior, colore fulva &
pellucida, Syracinum oleum appellata, quæ à
rel. quo auferitur, & separatim versatur, reliquum
verò rursus agitur, ut candorem induat. Eli-
git in liquido Syrace odoratissimum, odore ad
purum Syracem prorsus accedentem, sed multò
vehementius & gravius redolentem, colore can-
dicantem in cinereo. Oleum Syracinum ad
nos rarissime affertur, in quo probatur fulvum,
pellucidum, odoratissimum, & gravius, quàm li-
quida Syrax redolens, & quod lentum, sequa-
cissimùmque fuerit, dum ab intincto digito de-
fluens dependet.

Petrus Bellon. (inquit Gesnerus) scripsit mihi
se à Lusitano quodam Pharmacopola didicisse
Syracem liquidam à verâ Syrace omnino discre-
pare, esseque resinam è peculiar: quadam arbo-
re manantem in monte Fium inter Galliam & Hi-
spaniam. Hac itaque ratione dux sunt liquidæ
Syracis species.

Ait Fuchs de comp. med. lib. i. Syracem liqui-
dum, qui in Officinis prostat, quum teterrimo
propemodum sit odore, legitimum, aut sincerum
esse nequire: ut & Syrace Calamitæ interdum li-
quidam resinam & oleum addi, ut liquidior fa-
ctus magis redoleat, & viliori pretio vendatur:
qualis est, qui in Officinis Medicorum sub Syra-
cis liquidi nomine hodie prostat.

An Amato, Staete Serapionis, Officinis Syrax
liquidus, cuius copia non solum Venetiis, sed &
in omnibus serè officinis coarctatur?

Hodie porro Staeten Officinæ & Barbari Me-
dici Syracem liquidam vocant, teste Cornario,
quæ Græci unum saltem Syracem agnoscant: Sta-
eten autem pro Balsami liquore in ἀνθρακωδωρ
assumant.

Sed licet species quædam, quæ adhuc in offici-
nis invenitur, Syracis, quem liquidam vocant,
nihil aliud sit, inquit Clusius, iuxta doctiorum o-
pinionem quàm Staete expressa antiquorum. Ni-
hilominus tamen retinet aliquem odorem Syra-
cis Calamitæ, sed potentior est, & odoris vehe-
mentioris, quod efficit, ut existencem, esse posse
resinam liquidioris Syracis, cùm aqua sit per-
mixta Myrrha, sæpe enim evenit in eadem arbo-
re una liquidior altera.

Monachis in Mes. ut existimo, Storax liquida,
quam aliqui Sigiam, quæ non est Mel Myrrha, id
est, Staete, ut voluit Braslavolus & recentiorum
nonnulli: cætera videant Lectores antè ex verbis
Monachorum, quæ sub Syrace iam tradita sunt.

Garcias Arom. lib. i. cap. 5. sapius existimavit il-
lud Bonius de Boninas nihil aliud esse, quàm Beni-
vicum Syrace liquida, quam Chineses Rosamal-
la vocent permixtum, quoniam eius odor ali-

Color O...

Vnde fac.

*Oleum Sy-
racinum.*

*Delectus
Syracis li-
quidi.*

*Delectus o-
leum.*

*Syrax li-
quida. Re-
sina dicitur
à Syra-
ce.
Locus.*

*Syrax li-
quidus
quid?*

Staete.

*Storax li-
quida.
Non est
Staete ut
Gult. Bras-
lavolus.*

*Beni-
vicum de
Boninas.*

*Syrax li-
quidus.*

*Styracis li-
quida & ca-
lida odor
aut ferat.*

Locus.

quantum ad Benivi de Boninas accederet: cām-
que ob causam id aliquando experiri voluit, mi-
xto Benivi cum Syrace liquida. Sed licet id Be-
nivi sic permixtum vulgari odoratus esset, odoris
tamen fragrantia & suavitate à Benivi de Boninas
superabatur. Multis quoque malè olent Syrax
liquida & Algah propter validum odorem, cūm
tamen maxima ex parte odorata sint. Fieri au-
tem potest ut illi Macedones Syracem pro Beni-
vi intellexerint, tamen nullibi Syracem nasci sci-
mus, præterquam in Æthiopia, ubi etiam Myr-
ha reperitur.

Cæterum liquor ille Cæsalpini putridus, quo
ad scabiem inungendam utuntur, vilissimo etiā
pretio, quamvis Storax liquidus vulgò appelle-
tur, aliena omnino res est. Fortè Ælcomeli Diol-
cor. De Syracino autem oleo, quod solebat ven-
di pro Balsamo, & desit adferri, vide antè ex Cæ-
salpino.

VSVB ARBOR GVM MI FERENS.

CAP. LVII.

*Cabovine-
st.*

Curia.

Vsub.

de Vsub.

Scipsit Thevetus de Francia Antarctica c. 32.
homines sylvestres Americanos, quum invi-
tentur ad computationes *Cabovine*, priusquam
ex suis pagis discedant, detrahare corticem cuius-
dam arboris, cuius interior pars sit rubra, lutea,
aut alterius coloris, quem conscindant in minu-
tas partes, & gummi postea extrahere ex arbore,
quam vocent *Vsub*, ac totum corpus eo inunge-
re: quod ad vulnera etiam utile, ut sibi experien-
tia compertum.

Clusius dubitat an *Vsub* Thenei idem sit, cum
suo *Vsub*, de quo proximè.

Considerandum quæ de *Bixa Ovidi* annota-
vimus ex Clusio historiz nostræ lib. 12. & lib. 3.
post Sanguinem draconis, de Succo rubro colore
insiciente.

VSVC ET GYP SVCCVS ATER INVOLVTVS MYSA FOLIIS, Anethi ferè odoris.

CAP. LVIII.

Descript.

Vsub.

ANNO 1599. mittebat ad me (inquit Clus.
Exot.) Amstelrodamo honestissimus vir
VValichius Syvertz succum, cui adscripta erant
nomina *Vsub* & *Gyp*, Musæ foliis involutum, atrum,
splendentem, non iniucundi tamen odoris, sed
qui ad Anethinum quodammodo accederet.
Hoc uti solere incolas assererat, ad suffumigia,
tetrūque cadaverum fœtorem tollendum, toto
illo tempore, quo cadavera domi retinere pro
consuetudine solent. Isto etiam inducunt arbo-
rum cortices ventri applicandos in eius dolori-
bus.

ALOES SIMILIS SVCCVS IRAI- TUCH ET AIAYVE INVOLVTVS MYSA foliis, gravis odoris ad picandum.

CAP. LIX.

Descript.

EODEM anno idem Syvertz mittebat alium
succum, Iratuch & Aiayve appellatum, non

valdè dissimilem Aloës succo, tum colore, tum
substantiā, gravis odoris, qui recens & liqui-
dior, Musæ tenerioribus foliis fuerat exceptus:
nam iis adhuc involutum accipiebat Clusius. Illo
naviculas & scaphas induci ab inquilinis, refere-
bat, quemadmodum à nostris pice fieri solet. An
verò ex aliqua arbore fluat, aut bituminis instar
è terra emanet, nihil erat adscriptum.

SVCCVS VEL RESINA ASPHAL- TO SIMILIS, ANETHI ferè odore.

CAP. LX.

AMSTELREDAMI anno 1600. honestus vir
Petrus Garecus dabat Clusio aliquot succos
concretos nuper delatos ex longinqua naviga-
tione, quorum primus ater prorsus erat haud
secus ac Asphaltum, durus & solidus, illoque
ut apparebat] usi ferant nautæ ad fili stamina, pi-
cis, aut ceræ, vice, inducenda: manibus enim ali-
quantisper emollitus lentior fiebat, nec iniucun-
dum spirabat odorem, anethinum enim quidpiā
respiebat, nec ingratum habebat saporem, illum
tamen acriusculum, flammæ verò admotus, non
secus ac resina quædam liquebat. Observabat
porro hunc succum, sive quis malit resinam
appellare, denubius cedere & mollescere, ore
retentum.

SVCCVS ALTER, ACRIS SVB- STANTIA SOLIDIOR.

PRIORI non valdè dissimilis erat hic succus,
substantiā tamen solidiore constabat, ut quæ
in micæ potius dissiliret, quam manibus emolli-
posset, imò ne longo quidem tempore in ore re-
tentus ullam unguis impressionem admittere vo-
lebat: nullum in eo gratum odorem Clusius ob-
servare poterat, sed quandam duntaxat acrimo-
niam. Exot. lib. 4. c. 8.

SVCCVS TERTIVS ATER, ALBIS MICIS.

TERTIVS etiam ater, quasdam tamen
albas micæ insperatas habebat: licet autem
superiore impurius & magis retortidus videretur,
unguis tamen impressionem admitterebat, nec
ingrati erat odoris, illius etiam sapor non-
nullā acrimoniā præditus: manducatus, den-
tibus cedebat: igni etiam admotus, liquebat
& flammam concipiebat. Clus. lib. & c. modò
citatis.

TACAMAHACA POPVLO SIMILIS FRUCTV, COLORE similis Præonia.

CAP. LX.

AD resiniferas meritò referenda est Tacama-
haca dicta, coloris rutili parum, partim flavi
pallidioris, veluti ex unguibus diversis compacta,
resinæ strobilinae concretionem, bullatis tamen
scrobiculis alicubi cava: sub dente in pulverem
dissili-

Sapor.

Olor.

Descriptio
arboris.

Locus.

Vires.

Tumores.

Vires.

Descriptio
medic.Dolor den-
tium.Ventricu-
lus.

Aschia.

Nervi.

distit primum, mox rursum recolligitur, lente-
scensque pro arbitrio ducitur: sapore amari-
cante, haud ingrato & aromatico. Suffusa incundum
spirat odorem, Mastiches ferè æmulum, minus
vehementem & suaviorem, nulloque relictò
crassamento consumitur. Porro importatur, ut
mihi quidem nancisci contigit, Cucutibano cor-
tice comprehensa, punctulis nigricantibus ex-
terna parte notato, intrinsecus innumeris scro-
biculis, non usque adeò profundis, veluti forami-
nulentis.

Camer. in hort. Tacamahaca. Monardi de med.
ex Occid. Ind. lib. cap. 2. in versione Clusij Tac-
mahaca Indorum & Hispanorum resina est, quæ ef-
fluit vulnerata arbore magna, Populo æquali, o-
doratissima, colore est Galbani (nec desunt, qui
idem esse putent) unguitibus albis, uti Ammonia-
cent, cuius nectus colore est seminis Peronitæ.

Gummi Tacamahaca, ait Linthottanus, in par-
te quadam Insula, Indis Orientalibus reperitur. Pro-
fluit è cætera arbore, cuius folia sunt longa, angu-
staque. Proctus magnitudine Prunorum nostrat-
ium. Ipsum verò Gummi colore est albo, odoris
suavissimi, ac proinde in magno pretio.

Hist. Lugd. Tacamahacani affecti scribit ex Hi-
spania nova.

Magni est apud Indos usus in quocunque af-
fectu, præsertim in omnis generis tumoribus in
quacunque corporis parte: siquidem melleæ re-
solvit, maturat, & dissipat. Omnem compescit
dolorem ex humore frigido, aut flatibus natum,
uten inflammatione laborantes suffitu naribus ex-
cepto revocat. emplastri modosi umbilico inda-
catur, matricem sistit, ac efficacius id præstat addi-
ta Ambra & Moscho. Expertissimum creditur re-
medium contra defluxiones quasvis, sistit enim:
rheumatismos in oculos, faciem, aliasque partes
subiectas, si titillum in utramque aurem, aut
eius duntaxat lateris, indatur, in quod destillatio
incumbit, aut temporibus emplastri in morem
applicetur. Dolorem dentium levat, foramini
dentis corrupti imposta: contra dolorem omni-
plata, & distentiones cæcæ induta confert.
Ventriculum roborat, appetentiam revocat, con-
coctionem adjuvat, flatulque dissipat emplastrum
de Tacamahaca, cum triciente Styraçis & pauca
Ambra eodemque modo & capiti inductum, do-
lores cerebri plussigat, eique robur addit, plur-
imum confert dolori rheumatico, & iuncturarum,
præsertim ex frigida admitta causa orto, parti indu-
cta, cum resolutione, attritionem quandam ha-
bet coniunctam: neque enim contusa, & convul-

siones perfrangit. Denique vulgaris eius in omni
dolore usus. Ego (Monardes) trientem certæ fla-
vis adido. Cavebis tamen in principio inflamma-
tionum & tumorum p. n. calidorum, quorum ta-
men reliquis discutiendis apprimè utilis est. Ca-
lida est in principio tertij gradus, & adstrictione
vehementi, & vi roborandi: sicca verò in secun-
do. De Tacamahaca ita Ioannes Posthius p. m.
ceteris.

Ind. mar. an lenit si Tacamahaca podagræ

Et omne corporis parhas.

Illam ego præstulerim, quas vendit in India, gem-
ma,

Arabique Gæzæ omnibus

Nam qui diu in validis non præstat artus

Tristisque sensu liberos.

VISCI INSTAR SUCCVS.

CAP. LXII.

Succus concreti magnum fragmentum ad
Clus. mittebat Londino lac. Garetus, cuius
frequentem in Exot. facit mentionem. Erat ve-
rò is succus, dum adhuc recens & lentus, circa
bacillum pedalis longitudinis, multiplex circum-
volutione adaptus, donec in brachialem crassitu-
dinem evaderet: varius erat eius color, nam ex
parte non nihil candidabat, ex parte cineraceus,
ex parte nigricans erat, durus & firmus quem ta-
men igni expositum liquefcere & lentum fieri
intelligebat, visci instar, quo aucupes ad capiendas
aviculas uti solent: atque rem ita se habere expe-
riebatur Clusius. Vnde porro allatus, & ad quam
rem utilis esset, nihil adscriptum.

Cæterum bisniso post mittebat ad eundem
idem Garetus similis succi concreti, multiplex spi-
ra circa bacillum convoluti fragmentum, quinque
unciarum longitudinis, & novem uncias ambi-
tu comprehendens, quippe cuius diameter penè
triū unciam esset, externâ parte omnino fu-
scus, ex frequenti, ut putat manuum contrecta-
tione, internâ verò candicans, siccus admodum
& fractu adeò contumax, ut lignum veriùs, quanti
succus censeri posset, igni tamen admotus statim
flammam concipiens, in nigrum & lentum liquo-
rem resolvebatur, instar Visci, valde lentum & re-
nacissimum, nullius initio manifesti sa-
poris sed paulò post acrimoniæ
cuiusdam non expertus.

Cautio.

Temperat.

Descriptio

Cautio

Similis
succus eius


Color.

Lignum.

Sapor.

FINIS LIBRI NONI.





HISTORIÆ

PLANTARVM

LIBER DECIMVS.


DE ARBORIBVS ET FRVTICIBVS SCOPARIIS.

DEDIMUS cuique arborum generi, naturā quadam consimiliū, suam propriam quasi tributū. Nunc & Scapularis producimus, unā classē, quā ipsos unius & quasi in consortium quadam cōgūt rerum patens natura, ne scilicet dissimiles dedisse videamur.


DE MYRICA SIVE TAMARICE IN GENERE.

Cap. I.

Tanager
 and Blue
 Jay
 Lark



S. artem. sub-
negligens.

 ENIMVS ad Scopariarum & Ericarum nobile decus, Myricam siue Tamaricem, quam Dioscor. tradidit esse arborem [H-
Syl] vulgò cognitam, quæ apud
pigras & stagnantes aquas ena-
scitur, fructumque quasi florem
ferat, compage multicoloris [Sic ut dicitur ad-
d-
on. Boissier 23] in cisternis] Ægyptum Syriamque
satiâ quandam gignere, sylvestri cetera qui-
dem similem, & fructum parere Galle proximum,
gusto inæqualiter adstringentem.

Tamarix
lynnam du-
plex Theo-
phrast.
Asyrbine
pro lynn-
am ex-
per.

Tamaricis inueniunt & Theophrast. hist. pl. his
verbis: Addunt etiam Tamaricis [*amaricans*] lignum
non ut apud nos imbecillum, sed validum sicut
ligneum, aut aliquid ferme materiae huiusmodi,
ibidem [scilicet in Tylo Arabiae insula] compendi.
Videtur autem nobis Theophr. hoc in loco de-
monstrare duo genera Tamaricis: vnum ligno
valido, alterum imbecillo. Inueniunt autem porro
plantas quasdam communes, & quasi vitam an-
cipitem agentes [*amipia*] vt *myricum* [Gaza Myr-
tum male, legendum enim, *myricum*, quae incipit
vix potius, quam Myricus, de qua hoc nondum
obseruamus.] Myricam etiam Amphibion facit
Basilus Magnus, vt quae inter aquatiles nume-
retur, & copiosa sit in desertis, ac propterea di-
uum illum Hieroniam haud iniuria huic & simi-
libus stirpibus hominum improbiore, ancipitel-
que mores similes esse dicere:

Semen 20:
 811.

Sed Plinium adeamque qui Tamaricem inter eas arbores numerat quæ arborum solè nullum ferunt fructum, hoc est, ne semen quidem, scopis innascentem. Is præterea scribit Myricen & Italiam ferre, quam alii Tamaricem vocent : insigne in hac esse, quodd Satiua tantum ferat, Gallæ similem

fructum. In Syria & Aegypto copiosam hanc esse, cuique lignum infelicia appellatur, quæ tamen infelicia sunt Græcæ. Ad hæc Tamarici sola non decidere & carnosa est, quo in loco ego quidam ex summo Plinij loqui de Tamarice arbuta, verum non observavi ullam Tamariscum folis non decedentibus.

Contra Dioscoridem etiam & fide quidem
Plinius Myricam / Siquidem Myrica eadem est
cum Tamarice / pullum fructum . h. e. ne semen
quidem ferre proptereaque à vulgo infelicem ar-
borem appellari scribit, spemque quidem sui ve-
lut immerito lib. 24. cap. 9. Saeva Tamarici / du-
plicem enim constituit, sive raram / quam sterili-
lem, & sativam minorem / seu rariorem / ignota mi-
norem gaila tribuit rursumque dum Tamarice vi-
res persequitur, seminis peculiariter usum minimè
prætermittit. Ceterum Plinius Myricam à Lenæo
etiam Ericam vocari scribit, ut miris mirum sit
vulgus Medicorum Myricam etiamnum malè E-
ricam / Seyden / appellare.

Hippocrates in *libro de morbis* bish ibet, qua voce Cornutus Myricam accipit, ut falsis infra dicitur. Scribit Theophrastus Myricam folium habere carnosum & densum. Plinius etiam in genere de Plantarum foliis scribens, Cupressum inquit & Myricam folio esse carnosum, quod non est ita accipiendum, ac si singula nec le folia essent carnosum, sed ita appellari, quod confertim in ramis nascantur.

Corpus in Diolcor. & ex eo Cesp. Bauh. qui tam-
men eum non citat, sed pro suis vendicat, Tima-
ricem dultm generum esse statuit. Alteram sa-
uam & proceram [arboresc. Cesp. Bauh. facit] in
Aegypto nascentem : Et alteram humilem [syl-
uestrem, quæ frutex lignosus C. Bauh.] quam di-

Infelaria
f. nov.
i. p. 11.

תלמוד בבלי

1. *Phylogenetic relationships* – The phylogenetic relationships among the studied taxa were determined using the maximum parsimony (MP) method. The MP analysis was performed using the software package PAUP 4.0 (Felsenstein, 1999). The heuristic search was performed using 1000 random

Arctar 1:
felix

E 7562 m
 1700000
 1700000

1. *Agave*
 2. *Agave*
 3. *Agave*

С. Билин
и др.

Abstract

10. 11. 1944
 11. 11. 1944
 12. 11. 1944

Galina

Tom. I.

Gg

minutina voce Tamariscum vocat, cuiusque in Germania duplex genus inueniri ait: alterum solidiore ligno, medullaque admodum exili, & foliis tenuioribus, copiose ad Rhenum circa Argentoratam nascens: alterum ampliore medulla, foliis latiusculis, lignoque non usque adeo solido, quod frequens in Danubii & VVerrachii ripis in Vindelicis proueniat, praesertim iuxta Augustam. Hæc Cordus.

*Myrica
Narbonensis
Germanica
Aegyptia*

Addit Capud Matth. differre Narbonensem à Germanicâ, illam exiguos habere flosculos, non papposos sed rotundos, ex albo puniceos, & acinulis subsiliens: alterum autem ampliore medulla, foliis latiusculis, lignoque non usque adeo solido, quod frequens in Danubii & VVerrachii ripis in Vindelicis proueniat, praesertim iuxta Augustam. Hæc Cordus.

Vatidica

Legitur apud Nicandri interpretem in theriacis, Apollinem Vates sanxisse mirifica pronunciare mortalibus futura, virgis myricinis vtentes: ac propterea hunc fruticem Nicander *Marin*, vatem vocat. Apollo inde in Lesbo tenebat manu virgas myricinas, quare *Myricem* dictus. Et plerique locis virgarum vi Dion antiquos fuisse vaticinos scriptum reliquit. Legimus praeterea Magos virgas vertisse in Dracones, & miracula à Mose vi virgarum facta, quæ certo diuino afflatu fiebant, non magico, vt impiè Plin. opinatus fuit, magices factionem à Mose memorans.

*Plin. impia
opinio*

Epitheta

Poetae suis epithetis Myricam non tam adornant, quam ipsi detrahunt, non enim perpetuè est *renuis, fragilis, tenera, sterilis, sylvestris, parua, & humilis*. Virgil.

*Nomina
linguar.*

Non omnes arbuta inuani, humilesque Myrica. *ΜΥΡΙΧΗ*, Lat. etiam Myrica, Myrica Tamarix in Corintho, nonnullis etiam *Amarix*, Plin. etiam *Tamarix* in Achaia *Bria sylu.* Trago. Hist. Lugd. & Clusio, sed falluntur meo iudicio, nec id Plin. lib. 13. c. 21. asserit. Offic. *Tamariscum*: Octauio Horatiano *Myrica*, Arab. *Tarfa* seu *Carfa*. Scrap. *Carmezit*, Auerb. *Alcarphar*. Germ. *Tamarisckenbaum* oder *holz* / *Portz* / aut *Birthenbentz*. Belg. *Tamariscken boom* / Gall. *Tamarisque*. Ital. *Tamarice*, *Tamarigio*, aut *Altarse*. Hisp. *Taray*, Castell. *Tamariz*, Catal. *Tamaril*, Portug. *Tamargueira*, Lacun. Angl. *Tamarick tree* Bob. *Tamaryssif*.

Aequiuoc.

Et vt iam Tamaricis siue Myricæ æquiuoca dicamus, quod vnum reliquum est: Tamarix siue Myrica Narbonensis & Italica, cum Tamarice Germanica fruticosa itemque Tamarice Aegyptiæ gallifera male à quibusdam commiscetur. Ericam quoque nonnulli confundunt cum Tamarice, vt alibi demonstratum. Turnerus annotat, cum scribat Theophr. & Diosc. Ericam folio esse Myricæ, toto cælo errare Londinenses, quod cortices Sorbi Aucupariæ pro Myricæ corticibus, usurpent, cum nulla eis intercedat similitudo: Imò, inquit idem, rectius Erica [cortex radiceis] substituetur Myricæ, quam Sorbus, quod Dioscorides eam proximè Myricæ subiungat, solitus plantas facie & viribus consimiles coniungere, & quod apud Aeginetam in remediis splenicis sæpè legatur Erica. Minus congruè ponitur pro Myricâ Marina. Tandem apud Dodon. Gall. ignaris quibusdam Pharmacopœis Taxus Tamariscus est. At ab vniuersalibus ad particularia descendamus.

*Myrica
Marina
Tamarix*

TAMARIX MAIOR SIVE ARBOREA NARBONENSIS.

*Descriptio
Ericæ facie*

Vigilantem prorsum, inquit Pen. & Lob. Aduersâ facieque Ericæ videas, præcipuè in-



signis & mani- locu-
timis Gallo- rasi
provinciæ & Tamarix.
Lio Venetorū,
in cotonei ma-
gnitudinem,
caudicemque
abire, & quo ad
splenes detor-
nantur porula.
Narbonensi au-
tem ramosi et-
gui flosculi, nec
papposi, sed ro-
tundi Oleæ, ex
albo puniceos
sunt, & acinuli
quos interdum
totum triduum
Soli obiectos
obseruauimus
subsiliens &

*Narbonensis
descriptio*

tripudiantes, vermicello intus orto agitante, & tripudii autore, qui pertusis & desiliensibus tandem granis foras prodibat. Hanc sic describit: Myrica sylvestris magna ex parte tantummodò fruticat, interdum in vastam arborem adolescit: scabro caudicis cortice, ramorum verò puniceo: folia habet Cupressi, aut Ericæ humilis vulgaris, coloris ex viridi ad cinereum tendentis: flores extremis ramis in oblongis pediculis confertos & racematim compactos exiguos foris purpurascentes, cum expansi sunt, candidos, quinque foliolis constantes: qui deinde in exiguum semen tomento inuolutum efformantur, exiguis veluti valvulis inclusum, quibus maturitate dehiscens effluit, vt in Salice, Populo & similibus. Ter plerumque in anno floret, Vere, Aestate, Autumno: recentibus floribus semen iam euanescentes semper subsequens.

*Descriptio
Clusio.
Myrica
sylu.
Cortice
Folia.*

Flor.

Germa.

*Ter flor.
Plin. error*

Hanc Plinius inter eas recenset, quæ nullam fructum, imò ne semen quidem proferunt: cum tamen Dioscorides illi fructum tribuat compage muscosum.

Myrica, quæ alibi tepentur in hortis minor credita, non alia est, quam sylvestris, in loca mitiora translata. Cuius rei certo sunt indicio fructus & flores, quos omnino sylvestribus similes profert. Vmbra arboris, insigni proceritate, sæpè per Aestatem Romæ se Matth. oblectatum fuisse recordatur ad Tiberis ripas, in hortulo quodam hospitalis S. Spiritus: quæ etsi domestica haberetur ab omnibus: florem tamen & fructum se- rebat sylvestri similem. Myrica radices pro odorata cassia venditabant impostores. Sed postquam fraus à penitis medicæ materis vitis deprehensa est, eius in officinis vltus penitus exoleuit. Camer. in hort. & Hist. Matth. posuit nouam figuram & vocat Myricam, siue Tamaricem Gallicam & primam: meminit eius ex Pena & Lobelio. De qua Tamarice siue Myrica loquatur Lacuna non demonstrat, licet figuram Matthioli habeat. Lob. & Penz Adu. & Icon. Plant. Tamariscus Narbonensis. Clus. Hisp. & in fol. Myrica sylvestris prima. Pann. Gallica aut Hispanica Tamarix. Alpin. Tamaricis sylvestre genus, Italix notissimum. Lac. Theod. Hist. Lugd. & C. Bauh. apud Matth. [cui & Myricæ & Tamariscus Narbonensis] Tamarix Narbonensis.

*Myrica
sylu.*

*Arbor
magna
Romæ.*

*Pro cassia
odorata.
Radice vi-
dela.*

*Tamarix
Gallica.*

Myrica circa Monspelium Gesn. hort. Myrica Cæsalp. Dodon. Lat. in fol. huius iconem exhibet, utulo, Tamarix ramulus cum floribus. Eam tamen

*Locus &
tempus.*

men à Germanica fruticosa non distinguit. Tamarix autore Fuchſio Lugduni impreſſo in Gallia Narbonenſi luxuriat, nunc etiam in hortis regiis, quos ſons Bellæ aquæ irrigat & in hortis Bellai Pauſienſis Epilcopi. Eſt & inſignis proceritatis Romæ ad Tiberis ripas in hortulo quodam Hoſpitalis S. Spiritus : item in fluminum ripis frequentiffima in Italia.

Droſc. nov. Quare non potuit Matthiol. non mirari Dioſcoridem: quippe qui dicat tantùm naſci Myricam apud paludes ac reſides aquas, cùm oppoſitum ſanè veniat in Italia. Quod ipſum ſæpiùs adduxit ut crediderit aut Dioſcoridis codicem hoc loco deprauatum eſſe, aut in Græcia ſecus quàm in Italia Myricam oriri. Naſcitur plerumque iuxta flumina, aliquando ſaus etiam procul ab illis. Obſeruabat & in Narbonenſi Gallia Cluſi ſtagno Volcarum vicinam: nuſquam tamen ampliorem vidiffe meminit, quàm ſupra Madritium Regum Hiſpaniæ Regiam, planitie multis huiusmodi arboribus conſita, non procul à fluminum Xaragma & Henares confluentibus ſub Comopluto: Hiſpanis, *Alcala de Henares* nuncupato, quod flumini Henares eam urbem alluat: magnæ tamen iſtæ arbores, quas hominis vlna amplecti vix potuiſſet, diuerſum florem non ferunt ab eo, qui in fruticantibus duntaxat Tamaricibus prouenit. Frequens etiã hæc eſt Belgicis hortis. Nuſquam eam, neque in Hiſpania, neque in Gallia, perpetuã comã virentem vidit, ſed nouo Vere ſingulis annis, noua foliorum germina proferentem. Myricam Gallicam diu in hortis durare, modò Hyeme reponatur, teſtatur Camer. Is etiam huius Tamaricis magnas vidit arbores Monſpelii atque Lutetiz.

TAMARIX GERMANICA, SIVE
MINOR FRUTICOSA.

Deſcriptio

Radix.

Cortex.


Folia

Color

Flos.

Caliculi.

Pappus.
Semen.



A Quas amat Tamariscus noſtras, radice craſſa, & quæ æquet craſſitudine, coruice craſſiſculo inſigniter amaro teſta, quæ multam ſtolonum veluti ſegetem emittit virgultorum fragilium, purpureſcente cortice obduſtorum, & in frequentes ramos diuiſorũ: per quos folia longã coherent ſerie, Ericæ vulgaris, maiora quàm Tamaricis

Monſpelienſis, duplici verſu aſcendentia, coloris ſerè glauſi, ſapore adſtringenti, longitudinis palmaris aut ſemipedalis: Flores ſpicatum in extremis ramulis digeſti, ſoliolis conſtant externis vireſcentibus, aliis purpureſcentibus, apicibus in medio luteolis: ſequuntur calyculi, ſiue pericarpia mucronata, triquetra, quibus dehiſcentibus pappus euolat deliciffimus, candidiſſimus, appenſo ſemine minutiffimo, coloris rari.

Cluſius qui eam vocat Myricæ ſpeciem alteram
Tom. I

& Myricam Pannonicam, ait magnum eſſe fruticem, nunquam arboſeſcentem, brumam tamen ferentem, flores ex albo purpureſcentes, quinque ſoliolis conſtare Gallicæ Myricæ maioribus: virgas acquirere craſſiores, quàm arboreæ: ex manuſculorum foliorum, ſurculos ambientium, aliis, enaſci alios ramulos, qui ſint exiguis foliis onuſti.

Tamariscum fruticem lignoſum pingit Tragus vocans eum cum Lacuna ac Geſn. hort. Myricam Fuchſ. Tamaricem ſylueſtrem: Dodon. Gall. Myricam humilem, *perit Tamarix*, Tabern. & Dodon. Lat. in ſol. Tamaricem: Turner. Myricam [hi duo iconem Fuchſii habent, quæ nobis videtur nimis arborea, nec ita prouenientem obſeruauimus.] Tamariscum Germanicam cognominat Lob. Adn. & Icon. Plant. Hiſt. Lugd. & Caſp. Bauh. apud Matthiol. cui & Myrica prima dicitur. Cord. in Dioſcor. Tamaricem humilem, in hiſt. Tamariscum ſæminam. Lobel. Obſ. Anguill. Lonnic. Brunſelf. Tamaricem. Quam Amatus intelligat Tamariscum neſcimus. pictura ei appoſita eſt Tamaricis minoris. Camer. hort. Myrica ſiue Tamariscus altera: ad Matthiol. Germ. Tamarix ſecunda vulgaris: à qua Cluſi Pannonicam ſeparat, quam minorem fruticoſam vocamus, quod non exiſtimamus faciendum.

Copioſè ad flumen Drãſen, ante D. Hippolyti urbem, vulgò S. Pelren nuncupatum, octo à Vienna Auſtriæ inferioris vrbe milliaribus diſtantiſſimè creſcit: ad amnem etiam Schwarze, oppidum Neufirſche alluens binis ſupra Neapolini Auſtriæ milliaribus, præſertim arenofiſ illis locis, quæ hyeme ab iis amnibus inundantur. Obſeruatur & circa ipſam Auſtriæ Metropolim Viennam, iuxta Danubium arenofiſ illis locis, qui Pontibus longis [den langen Prücken] adiacent. Extra pagum quoque Doernbach non procul à ſylua in riguis conſpicitur.

Floret Maio & Iunio ac deinceps tota ſerè æſtate flores & ſemen proferre non deſinit. Huic ſimilem, quibuſdam Germaniæ locis ad Rhenum flumiſ, & in Tyrolenſi comitatu naſci intelligit Cluſ. Frequentem etiam vidit ante paucos annos Londini in aliquot hortis. Miror Lobelium ſcribere plerumque in hortis Angliæ bramã perire, cùm, autore Turnero in Anglia non creſcat. Fuchſ. copioſam vidit in Germania ad Rhenum & Harum. Turnerus præterea in Italia in iſula inter Francolinum & Venetias: in Rhetiz lapidoſo quodam loco, quem Rhenus interdum quotannis inundat. Camer. in hort. pag. 103. Tamariscus ſiue Myrica in Germania paſſim ad Danubii ripas creſcit, non ſacilè culturam hortenſem recipit, niſi ad aquas collocata. Secus profluenteſ amnes, ac quandoque exorbitanteſ fluuios, non rarè etiam circa paludes [naſcitur inquit Dodon.] ſolo frequenter ſaxoſo: humidiores ſiquidem & lapidoſos amat tractus. Feliciter in horto E. C. Montb. prouenit, plantata floret, & flores in pappos reſoluuntur. Quum eſſem Horburgi curauit adferendas plantas ex ripa Rheni, ubi abundat, aliquot annis durauit, tandem perit iterum inde delata durat & ſemen profert, ex qua etiam in horto proueniunt plantulæ. Vidi ſatis magnam & copioſam ad Rhenum propè Briſacum urbem & circa N. oburgum inter Briſacum & Baſileam. Frater Caſp. Bauhinus copioſam inuenit in Hünningen ad Rheni litus non longè à Baſilea. Vidi adferenteſ Baſileam, virentem, Pharmacopœis. Obſeruati non longè à Geneva florentem Iunior Tiguri, Lugduni Patavii. E. ſepatam Salisburgentem Tamariceo luxuria-

Myrica
Pannonica
Cluſi

Locum

Tempus

re augmento esse possunt doliola, quæ Viennam usque inde venalia è ligno eius artificiosè concinnata deferuntur.

TAMARISCUS ÆGYPTIA GALLIFERA.

Descriptio



Locus.

Carbo.

Pasa
Fructus
Sylva Gallia.

Synonyma

Arbo
Tamarix
Syrus.

Locus.

Vires Ta-
maricum.

Tamaricis domesticū genus, in Aegypto, authore Alpino, spectatur, proceritate, figuræ admodum à sylvestri diuersum, quod ad magnæ Oliuæ magnitudinem crescat, audiōque etiam supra Ægyptum in loco Sabie ab iis populis vocato, crescere ad magnæ Quercus magnitudinem, cuius ex lignis carbones faciūt, quibus tota Ægyptus & Arabia vititur, ex quo etiam ligno multa vasa conficiunt, ad multorum ægotantium vsum. Folia fert sylvestris Tamarisci foliis proxima tamen longiora, & graciliora, apparentque multa capillamenta viridia, qualia in aliquibus equisetis visuntur, ramo appensa, semper virentia, fructus fert paucos, raros, virides, Nucum magnitudine, duros, lignosos, sine nucleo, & videntur eiusdem substantiæ esse cum gallis: omnes verò figura inter se differunt, quanquam in omnibus aspera & inæqualis obseruetur, quando alii longi, alii breues, alii rotundi, alii lati, alii crassi, alii que graciles existant.

Tamaricem hanc Dioscorides, siue satiuam aut urbanam nominat, & fructum ait proferre, Gallis persimilem, gustu inæqualiter adstringentem. Tamarices præaltas, & aliarum arborum instar magnas, se Pet. Bellon. Obseru. vidisse refert: & locis quidem quandoque humidis secus flumina: non raro verò etiam in aridis & sabulosis, vbi nulla alia nasceretur arbor, quæ Gallas, incolis Chermeset dictas, subinde ad eò multas è ramis dependentes ferrent, vt onere earum grauataz ferè faulcerent. Alpino dicitur alterum Tamaricis seu Tamarisci domesticum genus, Arbo vocatum in Aegypto: Fuch. Hist. Myrice siue Tamarix altera satius in Syria & Aegypto. Clusius Myricam satiuam à Dioscoridiore vocatam nunquam conspexit. Dodon. Gall. Tamarix magna arborefcens, fructum instar gallæ proferens, Neoterici adhuc incognita. Camer. apud Matth. Germ. Tamaricis genus satiuum Dioscoridis, quod inuenit Bellonius in Aegypto, vbi humida amat & arenosa.

In Aegypto autem ac Syria hanc gigni, author est Dioscorides, in Tylo & Arabiz insula Theophrastus. Quorum, inquit, lignum, non vt apud nos Græcos imbecillum, sed validum veluti Ili-gnum [arbores] aut aliud quoddam forte.

Verum ennuero, cum omnia, quæ hactenus tractauerimus ad Theoreticam disciplinam spectare videantur: Et nos ob solam scientiam, quantum quidem possibile semper fuerit, ne mi-

nima dicta velimus, ideòque ad operationem, tanquam ad communem finem, nostra dirigamus, iure merito, Vires & vsus, quibus amissa hominis sanitas, instauratur, præter quod conseruatur, hoc in loco dicenda superflua. Fructu gallæ proximo, inæqualiter adstringente gustu conuenienter vititur Dioscorides, vice gallæ in mediaminibus oculorum, oritque. Datur cruentæ excretionis in potu, & cæliacis, & contra profluvia seminarum, regium morbum, & phalangiorum morsus: illitus tumores inhibet. Cortex in eisdem vsus adhibetur. Decoctum foliorum cum vino potum, lienem absumit, ad dolorem dentium in collutionibus salutare, & mulieribus fluxioni vuluæ opportunis in deflectionibus, phthiriasi, lendibulque circumfusum prodest: abundantiam seminarum sistit impositus arboris cinis: potioris calices à caudice lienosis molliuntur, quo datus in his potus proficiat. Myrica dicitur apud Plinium sanari Carcinoma, in vino decocta tritaque cum melle illita. Ad lienem præcipua est, si succus eius expressus in vino bibatur. Adeòque mirabilem eius Antipathiam contra solum hoc viscerum faciunt, vt afferunt, si ex alueis factis bibant sues, sine liene inueniri. Et idem homini quoque splenetico cibum potumque dant in vasis ex ea factis. Grauis author in medicina, virgam ex ea defractam, vt neque terram neque ferrum attingeret, sed & ventris dolores, assueuerat impositam, ita vt unica cinis & que corpori apprimeretur. Lignum autem & flos, & folia, & cortex in eisdem vsus adhibentur, quanquam remissiora. Datur sanguinem reicientibus cortex tritus, & contra profluvia seminarum, cæliacis quoque. Idem cusus impositusque collectiones omnes inhibet. Folis exprimitur succus adhæc eadem, & in vino decoquuntur, ipsa verò adiecto melle gangrenas illinuntur. Decoctum eorum in vino potum, vel impositum cum rosaceo & cera eas sedat. Sic & epynectidas sanat. Ad dentium dolorem, auriumque, decoctum eorum salutare est: radix ad eadem: similiter & folia. Hæc amplius ad ea quæ sepe impo-
nuntur cum polenta. Semen dicitur pondere aduersus phalangia & araneos habere. Cum oleo vero pingui surunculis imponitur. Efficax & contra serpentium idus, præterquam aspidum. Nec non morbo regio, phthiriasi, lendibulque decoctum insutum prodest, abundantiusque mulierum sistit. Cinis arboris ad omnia eadem prodest. Aiant si bouis castrati vrinæ itamiscatur, velin potu velin cibo, Venerem finiri. Carboque ex eo genere vrinæ eà restinctus in umbra conditur: idem cum libeat accendere, resoluitur. Magi & id ex spadonis vrina fieri tradiderunt.

Myrice iuxta Galenum abstergens est ac incidens facultatis absque perspicua desiccatione: habet verò etiam adstrictionem nonnullam. Has ob qualitates siculacis & que ad nodum prodest lieni indurato decocta cum aceto, aut vino: siue radice, siue foliis, siue extremis ramulis decoctis. Sinat porò dentium dolores. Cæterum fructus & cortex non paucam sortita sunt adstrictionem, adeò vt gallæ Omphactidi proxime sint, nisi quia acerbitas euidentis est in galla, & Myricæ fructui temperatura inest inæqualis: immixta enim est naturæ eius multa partium tenuitas, atque vis abstergendi: quod sanè gallæ non accidit. Attamen vbi galla ad manum sortè non erit, ea villicet ad omnia, ad quæ illa vrimur: ad eadem & cortex. Porò Myricæ combustæ cinis admodum delicatioris facultatis est, plurimam habens abstergendi

Galla My-
ricæ
Oculi.
Argins
morb. Ve-
næ.
Tamarix.
Cortex &
Foliorum
decoct.
Lien. Dolor
dentium.
Lendeb.
Colicæ.

Carcinoma.

Mira de
Myrica.
Sues fuit
liene.
Spleneticæ.

Ventris do-
lor.

Sanguis.
Profluvia
seminarum.
Sues fuit
liene.
Gangrena.
Epynectidas.

Aurium
dolor.
Radix.
Serpentis.
Dofu sem-
inum.
Furunculi
Serpentis
idus.
Phthiriasi.

Cinis.

Téperam.

Lien. Dolor.
Galla.

Myrica
ma.

ERICA IN GENERE.

CAP. II.

Quoniam de Tamariscis iam verba fecimus, de Ericis deinceps disseramus. Erica siquidem (P. 100) Dioscoridi lib. primo arbor est fruticosa, similis Myricæ (Mueck) sed multo minor, minus flore ubi apes utuntur, mel non bonum efficiunt. Huius coma & flos imposita, serpentum morsus sanant: lib. verd. 3. *Corn* esse scribit folio Ericæ pinguiore ac minore. Contra Theophrastus inter frutices numerat, qui cacuminibus fructum ferunt. Ericen quoque apud Plinium lib. 14. cap. 9. Græci vocant fruticem non multum à Myricæ differentem, colore, Ronismatini & penè folio. Hunc aduersari serpentibus tradunt. Idem Plin. lib. 11. memoriz prodidit post primos Autumni imbres Ericem [Erithacem C. H.] solam florere in sylvis, ac ad æquinoctium quidem plurimam esse: Athenienses *Tetralicem* appellare, Eubœam verdè *Sisaram* (Sisaron alii cum Varrone) quam putent apibus gratissimam, fortassis quia nulla tunc alia sit (florum) copia.

Dalechampsius notat Plinium, ac dicit aliam esse spinosam & aculeatis foliis pungentem *Tetralicem*, Theophrasto cap. 4. lib. 6. hist. memoratam.

Quod apud Hermol. habetur Theophrastum quemdam fruticem appellare *Tetralicem*, non *Tetradicem*, falsum est. Sed *Tetralicis* æquiuocationes & Theophr. verba petes ex lib. Hist. n. 27. Is porro Ericen apud Venetos *Tamaricen* siue *Amaricen* vocari scribit. Quod si verum, non absque graui errore duas distinctas plantas confundunt. Alii *Quadrangulam*, *Quadratam*, & *Amaricum* (nam & Columella flores *Amaricinos* dixit, pro quo rectius *Ericos* legi posse existimat Tragus, imitatione Pliniana) vocant. Sed errat Tragus qui Dioscoridis *Ericam* *Genistellam* esse credit.

Confidenter nimis Anguillaræ non videntur veræ quæ demonstrantur *Ericæ*. Nomenclator Hadr. Iunius confundit *Ericam* cum *Brya sylvestri* Plinij, qui nostro iudicio, eas ab inuicem voce distinctas [&] diuersa esse tradit, ita enim inquit lib. 13. cap. 21. *Tragion* fruticem sola Creta insula gignit: *Tragion* & *Asia* fert, siue *Scorpionem* &c. *Myricen* & *Italia*, quam alii *Tamaricen* vocant: *Achaia* autem *Bryam sylvestrem*. Adde Plinium *Bryæ* non meminisse alibi, ubi de *Ericæ* nominibus egit, nec hoc capite *Ericam* nominare. Nimiùm etiam audacter *Tetralicem* Theophrast. vocat, quæ ab ipso inter *Carduos* recensetur, quamque alibi separatim nominat. Ipsum quoque annotare decebat officinas, quibus *Genistella* dicatur. Is præterea *Ericen* & *Ericam* in genere vocari scribit. Græcè *ἔρις*, Germ. *Beyden*, Belg. *Beyde*, Gall. *Brière*, *Bryere*, Ital. *Erica*, Hisp. *Quieta*, Angl. addit *Lob.* *Beth*, Boh. *Weca*, Matthiol.

Nomine *Ericæ* plures hodie plantæ occurrunt, quas recensere placitum esto. Est autem uti ex iam dictis colligere licet, & ex dicendis clarius fiet, duum generum. Quorum primum *Tamarisci* folio est. Ex huius duæ sunt species, scilicet *Erica vulgaris* humilis semper virens, flore purpureo & albo. *Erica tomentosa* & incana foliis. Alterum *Cortus* est foliis, duum quoque generum: quorum vnum *bacciferum* de quo lib. 5. alterum non *bacciferum*, de quo hoc lib. Est hoc plu-

tergendi & incidendi facultatem, paucillam adstringendi. Sues si quando ætate splenis incremento laborant, ut succurri scribit Columella, si abricentur canales ex Tamaricibus, & Rusco, repleanturque aqua, & deinde fluentibus adinuocantur: quippe ligni succus medicabilis, epotus intestinorum tumorem compescit. Sed forte legendum ut monet Thyrs. ex Ruellio, canales Tamaricis è trunco & non è Rusco, qualem habet *Tamarix* maior arboræa. Quod verdè Diosc. & Plinius de vasis & calicibus ex ea factis dicunt, hoc aliquantè propius hodie, teste Cornatio, tatur, ab his qui in superiore ad Rhenum Germania vina Tamariscina appellata, ex virgulis Tamaricis præparant, quæ splenicis vtiliter bibuntur. Quanquam apud Constantinum Cæsarem Cognatiarum translationis in eundem usum vini prunis Myricæ superfusi potus magis probetur. Hippocr. porro eum lib. 2. m. m. *οξυακ* bibi habet, Corn. ea voce Myricam accipit, ac posteriore quidem loco ad suffitus, ubi vteri transmoti presserint, probat: priore verdè ubi peritacioni facit eorum fluxus. Porro Myricæ cinerem omnia ulcerationis exustione contrita, efficaciter cæcare auctor est Serapio. Folia quoque, ut notat Matthiolus ex Alcanzio Arabe simul cum tota planta foris se gidas collectiones inhihent, ac reprænuunt. Elephantiasim ex lienis vitio obortam Myricæ radicem decoctum & cum passis viuis epotum figat: id quod se vidisse ait in duabus mulieribus, quæ hac labe laborant. Ex quo illi persuasum est id non incongruum in Gilicape ite fore medicamentum, Guaiaco forsitan ligno non absimile. Vltus, inquit Prosp. Alpin. de plant. Aegypti cap. 9. Tamarici tum in Aegypto, tum magis supra Aegyptum, ubi harum arborum copiosus est prouentus, est, ad ignem maior, quando ferè nulla alia ligna ad comburendum habeant. Folia huiusce arboris usum habent ad lienem induratum obstruendum, & refrigeratum. Vasaque ex ligno, ut dictum est, conficiuntur, quibus lienosi uti consueverunt: ob eorumque multam, quæ ex hoc ligno habetur, ad id morbi genus vilitatem mirari non debemus si Plinius (quod tamen fabulosum est) dixerit, Sues assuetos cibum capere in vasis è ligno Tamarisci confectis, Lienem carere: mulieres decocto ex cortice parato utuntur per osumpto, ad sistendas menstruas purgationes, ex quo parant etiam infusiones, & clysteribus in vterum inieciunt decoctum. Idem quoque fructus facere aiunt si siquidem utuntur in sputo sanguinis, in Lienteriis & in mensibus plus iusto fluentibus, atque hæmorrhoidarum immodico fluxu: dentes etiam commotos atque colabentes ipsorum decocto firmant: atque in iis concitatum dolorem demulcent. Utuntur etiam ad oculorum lippitudines incipientes, in collyriis, atque ad omnia vlcera. Cinis quoque corticem & fructuum vlcera curat. De ligno verdè multi decoctum, non secus quam nostri ex ligno Indo ad curandam Luem *Colicam* facere soleant, parant, quod exhibent leprosis, scabiosis, atque aliis multis, pustulis & vlcerebus affectis, scilicet cum succello. Idemque faciunt in Melancholicis, Ictericis nigris, & Hydropicis ex refrigerato, obstruendo ac indurato liene concitatis. Ex Arabum dictis rectè Turnero videtur Matthiolus colligere, vtiliter posse contra luem ventrem præparari Myricam sicuti paratur Guaiacum. Non autem in eam duntaxat usum præparari vult Torn. sed etiam aduersus omnes morbos splenicis. Probatur verdè ipsi vinum Myricæ.

Tom. I.

Arbor Dioscor.

Myrica foliata.

Vicia

Corn folio

Erica

Gracorum.

Colore cor.

folio Rorij.

marini.

Erica. Eri-

thaca.

Tetralix

Sisara.

Pliniana.

natur.

Tetralix.

spinos.

Hermol.

Lapsus.

Tamarix.

Amaris.

Venetorum

error.

Tragion.

ror.

Anguill.

reprehendi-

tur.

Hadrian

Iunij.

plex lapsus

Nomina

Linguarum

Acquiroca

Erica duo

genera.

Tamarisci

folio

Erica vulgaris

Erica to-

mentosa fo-

liis

Cortus folio

Bacciferum.

Non Bacciferum.

Gg 3

*Species pl.
res.
Erica flore
alba
Purpura-
scent.
Exaltat.
purpurea.
Dendr.
arboresc.
flore luteo-
arboresc.
flore pur-
pur.
Ex rubro
purpuraso.
flore.
Flore luteo-
te purpu-
reo
arboresc.
flore qua-
ternis
Pannon. ca-
pit. Thym.
anglicana
cap. h. su-
m.
Peregrina
Tamaris-
cus.
Pannonia
pallidus
Vitis Idae
apocyn. ra-
dis
Sesamoides
minima
Tarentula-
re
Helianthe
tenuifolia.
Genistella
aculeata.
Genista an-
guis.
Rosmarini
na. (g.)*

Vireo

nium specierum magnitudine, foliorum & florum formâ, coloremque inter se differentium. Alia enim est Erica flore albo. Alia foliis quaternis flore purpurascens. Alia item foliis quaternis floribus herbaceis, deinde ex albo purpurascens: & alia multiflora. Variat à dictis arborescens floribus luteolis, vel herbaceis minimis. Ludit item arborescens Monspell. flore purpurascens, ramulis ternis. Humilior est ramulis ternis floribus saturationibus purpureis. Diversa est quoque ramis & foliis Coriis, ternis floribus ex rubro purpurascens maioribus. Nec vna ex iam dictis est, foliis Coriis flore purpureo dilu- tiore coloris. Recedit ab his Brabantica folio Coriis humilior quaternis. Degenerat parua foliis Coriis quaternis, flore herbaceo, foliaceis capitulis. Nec eadem est parua Pannonica foliis ternis, flore carneo, capitulis Thymi. Est & parua Anglicana capitulis hirsutis. Ad ipsam autem Græcorum, Ericam seu Eriam Latinorum referen- das esse has omnes plantas, præsertim ad id ge- nus quod est Coriis folio, censemus. His se iun- git Erica peregrina Lobeli, ac eiusdem peregrina altera, nempe Ericæ ramis & foliis Coriis ter- nis floribus ex rubro purpurascens maioribus, luteis affinis, cum suffrutice Tamaris- cus nuncupato.

Ceterum Ericam confundi cum Tamarisco di- ximus antè. Cur præterea Matth. Vacciniam palu- strem, Ericam bacciferam indigiter, vide lib. 5. Erica baccifera latifolia Tabernæ. An Vitis Idae affinis radix Idae, de qua lib. 15. Erica Alexan- drina Italorum traditur lib. 26. sub Sesamoide inop- ore Dalechampii.

Erica Alexandrina, Sesamoides maior, est ea her- ba, quæ Tarentulaire appellatur, de qua lib. 3. Erica minima, Chrysanthemis Lobeli, est nobis He- lianthe tenuifolia, de quo lib. 13. Genistellam aculeatam Ruellius apud Tragum Ericam quo- rundam esse tradit, magno sanè errore. Genistam [angulosam] ad Ericam Dioscoridis pertinere se- cure nimis Tragus credidit. Rosmarinum sylve- strem, teste Matthiolo, volunt aliqui esse Ericam Dioscoridis, sed falluntur. Ex his igitur palam est plura esse Ericæ genera, de quibus in posterum agemus.

Vires prosequitur Galen. Ericæ, inquit, dige- rendi per habitum facultatem obtinet. Flore eius potissimum ac foliis utendum: Addit Paulus lib. 7. Eriam vi pollere discutiente citra rationem.

ERICA VULGARIS, HUMILIS

SEMPER VIRENS, FLORE PUR-
PUREA & ALBO.

*Descriptio
Radix.
Virgula
Color
Folium
Flosculi
Culm.*

Eritæ humilis est nostra vulgaris Erica, ra-
dicibus longissimis, fractis contumacibus,
spadiceis, virgula numerosa, lignosa, dura,
quadrantalibus, aut cubitalibus, longioraque, ramosi,
colore ipidem spadiceo, prædita, vel in nigro ru-
bescentia: folia frequentia, semper virentia, qua-
tuor verticulis squammatum incumbensum fo-
liorum minimorum constant, ut supernè deor-
sum inspicienti cruces continuz videantur, ad
Cupressum & Tamaricem accedunt, quæ, ut ait
Clusius, temporis successu in ramulos efforman-
tur: flosculi veluti spicam exprimentes secun-
dum ramulos à medio ad summum usque pro-
pendent bullati quodam modo, purpurascen-
tes, vel, ut ait Clusius, elegantissimo purpura
dilutioris colore, interdum albi Trago perbreui-

bus petiolis appensi, à quatuor foliis compo-
nuntur, quorum medium occupant apices rufi.

Fuchii figura non placet, folia enim sunt la-
tiora: Isin Hist. Ericam vocat, in Icon. verò Ericam.

Buchan. in Hist. Scot. Ericæ meminit, ut ait
Camerarius, ex qua lecti parantur, unde suspica-
mur Ericam potius intelligendam esse minorem,
de qua hoc capite agimus, quàm Italianam.

Erica à nostris ait Cornar. ac cum eo Cordus
Seyde appellatur, quanquam Lenxus apud Pli-
nium Myricam etiam Encam vocet, & ob simili-
tudinem quandam, vrasque inter se confundat,
quod ipsum Palladius lib. 12. cap. 8. fecisse quoque
cognoscitur, ubi de Tamarisco tradit, quod Plin.
l. 11. cap. 16. de Erica dixit.

Dodon. Gall. dubitat an fortè sit Selago Pli-
nii.

Is assentitur Tragus, qui Myricam Hieremix
[Arcar. cap. 17.] de hac planta interpretantur.
Concludit autem Tamarisci exiguum genus esse:
nec enim Ericam nostram eam esse opinatur,
quam Veteres hoc nomine appellauerunt, sed Ge-
nistellam, qua in re errat. Est hac Ericarum i. ge-
nus Clusio. Hist. & post. Hist. Eryca Myrica seu
Tamaricis folio, quam Hist. Quiribuela. Lusit.
Queiro appellari scribit. Germ. Seyden. Hungar.
Teli. i. e. Hiemale viride.

Lob. & Pena Adu. Erica vulgaris folio Myricæ,
saxosis tamen Angliæ occidua exilior, tota sesqui-
palmaris, sed densior fruticans &c. Obs. Vulga-
rior humilis Septentrionalium & Meridionalium
Erica folio Myricæ. Turner. Erica Dioscoridis.
Thal. Harc. Erica vulgaris: Eadem tenetior ac so-
liolis multò tenuioribus.

Cæsalp. Scopa frutex in incultis, foliolis perpe-
tuis, flosculi concavi, ut in Arbutio albi aut purpu-
rantes. Eius differentia plures: nam quædam
flosculos in quatuor particulas dissectos fert, que-
dam tanquam minuta granula habet, virentia, que
nequaquam debescunt: frutice quoque distans,
magnitudine & paruitate, & inter eas quædam
ramos humi stratos fert circa stagna maritima.

Frustra ponit duas figuras Taberna, vnam titu-
lo Erica: alteram, Erica alba. Gesner. de collect.
stirp. Erica vel Selago. Item in Catal. plant. Erica.
Officinis Genistella. Genistellæ nomen non pla-
cet: Ea enim multum differt ab Erica. Nescio an
ab Erica vulgari differat, quàm Gesnerus de coll.
stirp. vocat Ericam montanæ.

Euch. Roëlin in Herb. Seyd. Erica, Myrica
Robert. Constant. in Lexico hanc recipere vide-
tur, cum ait, Herbariorum consensus Ericam esse
prodit, quæ vulgò Bruyera.

Matthiol. Erica ab incolis Gorticensis agri Gri-
æ vocata. Dodon. Latin fol. Erica prior. Hist.
Lugd. Erica. Matthiol. Dodon. Gall. Corda in
Dioscor. Lonic. & Camer. in Epit. & Hist. Matth.
Germ. Erica. C. Bauh. apud eundem Erica. folio
Tamarisci. Erica Dioscoridis.

Ceterum, ex adductis autoribus hanc pro ve-
ra ac propria Veterum Erica recipiunt, Corp.
Cord. Dodon. Turner. Euch. Roëlin. Rob.
Const. Matthiol. & Cæsp. Bauhinus. Nos autem
Dioscor. & Veterum Ericam asserere non ausi-
mus quia Dioscor. ait *stigma dequidit*, ita excre-
scens, ut possit dici fruticosa arbor. Nondum
præterea observauimus, nescimus an competant
folia, quæ vult esse Coridi similia. Matthiol. qui-
dem & Cæsalp. Erica meminere excrecentis,
quæ Scopa dicitur: verum considerandum an be-
ne distinguant à vulgari humili Ericæ arboreas.
Cæsalpinus sanè dum dicit plures differre cotias, no-
stra,

*Erica pal-
lida.*

Erica Selago.

*Myrica
Hircania.*

*Tamaris-
cus
Eriæ Tragi.*

*Hiemale
Viride.*

*Scopa.
Dioscoridis
Cæsalp.*

*Taberna.
Erica.
Selago.*

*Erica mon-
tana.*

*Erica mon-
tana.*

Arce abborat nomine Scopæ potissimum intelligi-
gere videatur: Lædiores, si possunt, in Casalpino
sepius videntur vulgari & ceteris adiungant.

**Locus &
Tempus.**

Erica vulgaris abundat circa Montbelgardum.
Plurima in hortu Ill. E. O. non prodegit. Flore al-
bo aliquando repertæ inter Montbelgardum &
Belfordum, quæ etiam plantata in hortu perit.
Locus vicinis florere Junio & Augusto. Basilea a-
bundat. Erica Genesum ad montem Galenæ re-
peri. Monspelii in sylva Argemont. Cherlerus
Gener attulit ex Alpibus Spiegel. Septentriona-
libus, autore Clusio, regionibus maxime fami-
liaris, locis incultis, rariis in cultu dicitur proce-
dit. Bisquidem florere, sed maiore ex parte Au-
gustino tantum, hæc nonnunquam etiam Vere:
Erica folio Myricæ pulcherrima plantam proinde
solitudinibus obars, frequentissima per Panno-
niam nascitur.

**Vires &
Vires.**

Hactenus descriptionem, nomina, tempus &
locum abunde diximus, nunc ad vires deuenia-
mus. Recentiores (inquit Fuchs.) Herbarii præter
antiquæ Veterum sententia commemoratas, facili-
tates alias addunt, nimirum florum decoctum, lū-
dorum ac ventris dolores, lenire posse. Succum ex
foliis, floribusque elicatum, oculis imbecilibus
putatim instillatum, aut foris inunctum confert.
Sicca Erica ingentes Ovium greges saluberrimo
poculo nutrit, & à pulmonis, lienis, iecorisque
obstructionibus præservat: harum si carnes Ga-
lenus gustasset, ait Gorop. inter laudatissimas eas
enumerasset. Nec mel quod de floribus legunt
apes, tam aspernandum est quam Dioscorides
& Plinius scripserunt, Erica præsertim flores tu-
mores & collectiones circa caloris alicuius in-
commodum digerunt. Ericeta Scotiæ, referen-
te Jac. Cargillo, præterquam quod in vastis solitu-
dinibus ovium gregibus pabulum præbent, sup-
plent in ignibus fouendis sæpe lignorum vicem.
Materiam è terra pulla intulcato stramine ex aqua
subacta leviter, & alternis Ericæ stratis, extor-
sam vtrinque spectantibus comis, concurrenti-
bus in medio lignosis radicibus, parietes tum ca-
sæum rusticarum, tum hortorum artificiosè ex-
struunt, qui vinculo straminis & Ericæ nec pluvias
metuentes, nec atteritium iumentorum affri-
ctibus concussi in multos annos durant. Aquam
à floribus Ericæ distillatam colica laborantibus,
præsertim si calor & sitis adsint, vtiliter exhiberi
expectus est Tragus. Eadem ruborem oculorum
tolle & dolorem illorum mitigat. Quidam è re-
centibus Ericæ floribus, somenta & balnea sudato-
ria faciunt podagricis & paralyticis mem-
bris: persuadent namque sibi hoc pacto inuete-
ratos & viscosos humores, unde morbus articulo-
rum oritur, dissolui & discuti. In Meturia longè
magis adolefcit Erica, fiuntque ex ea Scopæ apu-
sime ad mundandas ædes. Aqua in qua Erica de-
cocta sit, sumpta tepida tam manè quam vespèri,
triginta dies quinque vnciarum pondete tribus
horis ante cibum, valet ad vesicæ calculos com-
minuendos & expellendos. Verùm post id tem-
pus malè affecti in balneum decoctionis eius-
dem plantæ ingredi, atque inibi dum morantur,
super Ericam decoctam sedere debent, idque plu-
ries repetendum est. Equidem noui aliquos, in-
quit Matthiolus, qui seruata victus ratione, hoc
tantum potu vesicæ calculum in minutas partes
comminutum eiecerunt. Sunt qui ex recentibus
Ericæ floribus balneum sudatorium adornent ad
podagram, quo affirmant viscidam materiam, do-
loris articularis causam, dissipari. Camer. Erica vi
facie non abluat à Tamariæ, ita à multis eodem

Tom. I.

modum splendentem & colligendum & cæcendum con-
surgendum videtur. Succus dolores oculorum
compellit impositus. Foliorum Ericæ succus oeu-
lorum imbecillitatem sanat, si oculis instilletur.
Meminit, dum Monspelii ageret Clusius clariss.
virum D. Rondeletium, Regium tum professio-
rem, magno successu vsum fuisse oleo ex Erica
floribus confecto ad tollendos herpes faciei &
tam inueteratos totam faciem occupantes.

Observat.

Monemus hoc in loco considerandum esse,
vtrum omnes arbores Ericæ easdem facultates
habeant, & quæ potissimum ex arboreis Diosco-
ridis & Galeni sit. Illud etiam observandum
præcipimus, an quæ Matthiolus recenset de viti-
bus Ericæ, competant arboreis potius. Clusius
vires iam adscriptas subnectit arboreis, non ta-
men demonstrat, cui potissimum conueniant.
Stutgardia pro Ericis cum Bombyces inuadent
volunt parietes Erica vulgari adornant.

Clusius in
notat.

Arce.

ERICA MYRICÆ FOLIO, TOMEN- TOSIS ET INCANIS FOLIIS, Clusio.

Erica Myricæ folio, priori est per omnia
similis, paulò elatior, foliis tomentosis & in-
cans, flore etiam paulò dilatiore, quam Chus.
inuenit locis incultis, supra Windeloram Regum
Angliæ Regiam. Hanc asseruamus inter nostras
siccas, ad quam annotatum inneminus similem
huic plantæ esse Anglicanam hirsutam Caspari
Bauhino.

Erica
maior.

ERICA FOLIIS CORIOS, FLORE ALBO.

Alterum Ericæ genus, diuerso à superiore
est folio: etenim Myricæ folio non respon-

Descriptio



det. sed Corin,
foliorum formâ
& situ admo-
dum æmulatur.
Istius autem ge-
neris multæ sunt
species, magni-
tudine, foliorum
& floris formâ,
coloreque inter
se differentes.
Prima igitur o-
mnium quas un-
quam Clus. con-
spexit, maxima;
humidam Alti-
tudinem inter-
dum superat;
fruticosa admo-
dum, ligno du-
ro, ex rubro ni-
gro casto: foliis
exilib' & breui-

bus, quaterno ordine ramos obliuibus, gustu
admodum adstringente: flore copioso, racema-
tim penè totos ramulos occupante; interdum
maiores rami pedali longitudine omni con-
spiciantur: est autem is flos, concavus, velut exiguû
cymbalum, oblongus, odoratus, pulcher, albus.

Clus. Hisp. & Hist. post. Erica Coris folio. Erica
alterius generis prima, Lusitanis Azorga voca-
ta. Lob. Obs. & Icon. Plant. Erica maior flore albo;

Gg 4

prima Clusii. Hist. Lugd. Erica prima omnium maxima Clusii, Erica prima Matthioli, quam nos aliò referimus. Tabern. Erica Clus. 1.

Locus & Tempus.

Nascitur in Lusitaniae solitudinibus inter Vlyssipponem & Conimbricam celebrem eius Regni Academiam. Inueniebam etiam circa Tagum decimo ab Vlyssipponem milliari. Floret Nouembri, Decembri, & Ianuario.

ERICA, FOLIIS CORIOS QVATERNIS, flore purpurascete.

Descriptio

Rami.
Color.
Folia.
Flores.

Eiusdem ferè altitudinis cum prima, etiam fruticosa, tenuioribus ramis tamen eiusdem coloris, foliis Corios similiter exilibus, quaternis, ramulos amplectentibus, quorum extremis insident flores oblongiusculi, superioribus similes, colore purpurascetes. Tota etiam adstrictionis particeps.

Aequiuoca

Clus. Hist. & Hist. post. Erica Coris folio secunda. Lob. Obs. Et Icon. Plant. Erica maior floribus purpurantibus, & cum Hist. Lugd. & Tabern. Erica secunda Clusii: Dodon. in sol. Erica altera.

Locus & Tempus.

Prouenit isdem, quibus prima [folio Coris] locis: illa etiam frequentior & eodem tempore floret.

ERICA FOLIIS CORIOS QVATERNIS, floribus herbaceis, deinde ex albo purpurascenibus.

Descriptio
Folia

Flores.

Color.

Synonyma

Præcedentibus admodum similis, sed paulò humilior: Folia maiora & latiuscula aliquantulum, nigrioraque habet, quaternis ordinibus circum ramulos nascentia, flores plurimos per intervalla, secundum ramulorum longitudinem nascentes, superioribus formâ similes, primum herbacei coloris, deinde ex albo purpurascetes. Tota etiam adstrictoria facultate prædita.

Clus. Hist. & Hist. post. Erica Coris folio tertia. Lob. Obs. & Icon. Plant. Erica maior floribus herbaceis purpurantibus & cum Hist. Lugd. & Tabern. Erica 3. Clusii.

Locus & Tempus.

Supra Vlyssipponem frequens inter superiores, pluribus tamen locis occurrit, ut etiam citra Tagum. Floret autem Decembri & Ianuario.

ERICA FOLIIS CORIOS MVLTIFLORA.

Descriptio

Folia



Inter Ericas imo assecas, est vna à duabus Monspessulanis arborecentibus diuersa, qualem nullâ vidi figurâ exprimi apud Clusium. Huius sanè folia abietina dicas, multis tamè numeris minora, nec enim multò longiora & latiora sunt, quam in Leone Matthioli. In siccis superiori parte vna veluti costa apparet, in inferiori duæ, crebra

admodum sunt folia, quæ in ramulis velligis relinquunt, qualia in Abiete, vel potius Pino relicta cernuntur, ramuli enim non remanent poli illis decidentibus, ut in Monspelianna nostra arborecente, faciliè etiam decidunt, extremitates ramulorum abundant copiosissimis floribus simul iunctis, ultra folia eminentibus, hi flores plures veluti ex paruis nodis erumpunt, & pediculis paruis & tenuibus pendentes, minores quàm in Monspessulana arborecente, maiores tamen quàm in ea quæ in Italia à nobis visa, magis etiam hiare videntur, ac ex his apices multi prominent. Siccam nostram conferens cum omnibus descriptionibus & iconibus cui aptius respondeat, quàm Ericæ à Matthiolo depictæ sine descriptione, quàm ait sibi missam à Fallopio, nullam video. Quum in similem Ericam incident Lectores, perpendent, an eadem sit, de qua sequentes locuti sunt, vel diuersa.

Flores.

Clusius in Hist. & Hist. post. hanc videtur tradere pro Ericæ Coris folio secunda alterâ specie, de qua ait: Non multum absimilis Ericæ, Coris folio quæ Narbonensi agro frequens, longiore paulò & copiosiore folio, flore purpureo minore & extremis ramulis confertim stipato.

Huius iconem exhibere videtur Matthiol. in Dioscor. titulo: Erica alia, Et in post. corn. Ital. & Hist. Germ. Welsche Heyde, Erica Italica. Camer. in hort. Erica maior & procerior Italica, cuius meminisse ait Buchananum in Hist. Scotica, quam ego ad vulgarem minorem refero. Hist. Lugd. Erica altera à Matthiolo depicta, quæ fortasse non minus, quàm superior Ericam alteram referat &c. Eius florem apes conlectari potius credibile est quàm superioris &c. Item postea, secunda Clusii fere similis est Narbonensi agro frequens, longiore paulò, & copiosiore folio, flore purpureo minore &c. Hæc videtur Matthioli esse Erica à Fallopio missa. Tabern. Erica secunda Matthioli, Heyd. Castor. imo Erica arbuscula non multum differens à Tamansco, in Tuscia ex ea scopas parant & vocant vulgò Ericam scopariam. Erica secunda ramos habet subtiliores, folia longiora &c. Lob. & Pena Aduers. Erica maior Narbonensium Chamaepitys folio quam si quandam pedibus triuisset in Italia Matthiolus, neutiquam Fallopio: eo plantam peregrinam acceptam tulisset. Obs. Erica juniperi folio, densè fruticans Narbonensis, Erica secunda altera Clusii, & Matthioli secunda Casp. Bauhin. apud Matthiol.

Erica scoparia.

Matthiol.

Erica scoparia.

ERICA ARBORESCENS, FLORIBVS luteolis vel herbaceis minimis.

Ericam hanc ex argumento arborecentem nominamus: in arborem enim excrestat, ligno duro: folia longiora, quàm in arborecente nostra purpurascete: quæ facillimè decidunt: flores lutei, vel virentes, valde parui. Hæc subsistua opera aliquando obiter memoriæ causa annotauimus: quare pleniorẽ Clusii descriptionem subiicimus. Fruticosa est, duorum cubitorum altitudine, nonnunquam amplior, ligno fragili, foliis tenuibus & minutis, ut in Corrida prima ferè, viridibus, quæ in ramis nonnihil desiccatis faciliè desiliunt: istius floris reliquis minor est, exuus etiam & coloris herbacei. Nonnunquam extremis ramulis capitula ex multis foliis compacta gignit, non multum absimilia his, quæ in vulgari & duriore Thymo aliquando conspiciuntur.

Descriptio
Lignum.
Folia.

Descriptio
Clusii

Folia.
Flor.

Clus.

Synonyma Clus. Hisp. & Hist. post. *Erica Coris folio quarta*, Lusitanis *Yrs & Yguerra*: Hisp. *Breca* vocata. Lob. Obs. & Icon. Plant. *Erica scoparia*, flosculis item herbaceis. Videndum an ad quartam Clusii *Ericam* sit referenda *Phana* Græcorum Bellonii Obs. vel ad aliam. Hist. Lugdunensis, *Ericam quartam* Clusii, malè eandem facit cum ea, quam ipsa Hist. pro quarta & depinxit & descripsit. Si quidem quarta Historiæ Lugdunensis, *Erica* Monspelulana flore est purpureo, Clusii autem coloris herbacei. Tabern. *Erica quarta* Clusii *Reybe*. An Cæsalpini *Scopa*, granula minuta, non dehiscens habens?

Locus


Observauimus nos in sylua Aegremont, prope Monspelium, vnde etiam attulit Gener Cherlerus. Recordamur quoque eandem, vel similem, admodum florentem vidisse nos mense Aprili, in Italiæ monte Apennino, inter Florentiam & Bononiam. Chariss. Frater Casp. Bauhinus attulit nobis ramulos, Patavii collectos, in monte Rua, in quibus apparent capitula Thymi à Clusio descripti, & ramuli terni & quaterni ordine additis his nominibus *Ficula* Patavii, *Selago* Plinii, *Pirrhæ* Theophrasti Guiland. Gener Cherlerus p.m. attulit Nemauso: cum foliis in capitula glomeratis. Vulgaris est, autore Clusio, toti Hispaniæ & Aquitanie: namque spatiosis illis solitudinibus & incultis locis supra Burdigalam nullum ferè aliud virgultum conspicitur. Nota est etiam Galliæ Narbonensi, scopis faciendis maximè idonea. Veris tempore & sub hyemem floret.

Capitula
Thymi.
Ficula
Patavina.
Selago
Plinii.
Pirrhæ
Theophr.

ERICA ARBORESCENS MONSP. FLORE purpurascens ramulis ternis.

Descriptio

Ramuli.



Floris.

Descriptio
Clusii.

Ram.

Folia.

Floris.

Color.

Synonyma

subiungere quæ ejusmodi est: Minor hæc est superioribus, cubitali tantum altitudine plerumque, ramis gracilibus fruticosa, quos terni per intervalla ramuli arabiunt, ternis foliis admodum exhibitis circa illos disposito quodam ordine & serie nascentibus, flores plurimos habet, superioribus paulò maiores: & confertis circum ramulos longis pediculis inhzrentes, colore purpureo obsole-

tion. Clus. Hisp. & Hist. post. *Erica Coris folio quinta*. An Hist. Lugd. *Erica* quantum genus in agro Monspelulano, flore *Ericæ* vulgaris exiguo purpureo? Est autem hæc *Erica* quarta Monsp. non

exactè picta in Historia: an huc referenda sit, vel ad sequentem dubito: quam verò *Ericam* arborescentem flore purpureo voco, optimè quadrat figuræ à Clusio positæ pro quinta: alioqui descriptio sextæ non malè conveniret. Monspelii collectam descripsi. Hist. Lugd. *Erica quinta* Clusii minor, ternis foliis, flore coloris purpurei obsole-

toris. Lob. Obs. Icon. Plant. & Tabern. *Erica quinta* Clusii. *Erica* hæc arborescens in montibus Galliæ Narbonensis circa Gangem & Esperon florere visa mense Octobri: incultis Lusitanie locis supra Vysipponem frequens: florebat isthuc Decembri.

Hisp. Lugd.
Icon.

Locus
Icon.

ERICA RAMVLIS TERNIS ELORIBVS saturationibus purpureis.

Similis admodum quintæ, paulò tamen humilior, neque fruticosa, sed omnes ferè virgæ seu tenues ramos à radice proferens singulares, cortice cinereo obductos, quos ambiunt ordine terna ramulorum rudimenta, seu germina ex multis foliis confertim nascentibus constantia, nigrioris quàm alte rius coloris: flores concavi, iam postremò descriptæ floribus formâ similes, colore saturationis purpureæ elegantissimo, è longis pediculis verticillato ambitu per intervalla, & è summis ramis dependent.

Clus. Hisp. & Hist. post. *Erica Coris folio sexta*. Lob. Obs. *Erica* pumila densè fruticans calyculato Vnedonis flore: Eadem varians flore albo Icon. Plant. *Erica* pumila calyculato Vnedonis flore. Hist. Lugd. & Tabern. *Erica sexta* Clusii. Hanc *Ericam* aliquando collegi, ni fallor, cum essem Monspelii, pulchram plantam, Attulit nobis etiam Gener Cherlerus ex Galliæ Narbonensi. Nascentem hanc conspexit Clusius, in Castella veteri Hispaniæ, tum in Galliâ supra Lutetiam, & in Angliâ supra Windesforam, mense Septembris florentem.

Descript.
Ram.
Folia.
Floris.

ERICA RAMIS ET FOLIIS CORIOS ternis, Floribus ex rubro purpurascens maioribus.

Cubitali ferè est altitudine, fruticosa etiam & tenuibus ramulis prædita, qui terni semper circa maiores ex intervallis nascuntur: folia similiter etiam terna nascuntur, exigua quidem, sed latiora quàm in reliquis supradictis, inferiore parte nonnihil candicante, hirsuta & gustu adstringente: summi ramuli ad foliorum ex ortus verticillatum exornantur, per intervalla ternis semper floribus æquali distantia semper inter se nascentibus, & in vnam partem spectantibus, maioribus quàm in reliquis generibus, concavis, prominulo magis ventre, colore ex rubro purpurascens, novem numero, duodecim, quindecim aut pluribus. Semen huic quale in reliquis superius descriptis (exceptis bacciferis) exiguum nigricans.

Est hæc *Erica Coris folio*, Clusio in Hisp. 8. in post. Hist. 12. *Lemerinba* Lusitanis dicta. Lob. Obs. Hist. Lugd. *Erica octava* Clusii.

Fallitur Tabern. qui *Ericam* hanc, septimam Clusii facit. Est enim Clusio in Hisp. 8. in fol. 12. nec enim eam in Pannoniis posuit.

Isdem cum *Erica baccifera* Lusitanica Lusitanie arenosis locis crescit vix plurimum. Floret Octobri mense, & subinde semen exiguum, nigricans profert.

Descript.
Ramuli.
Folia.
Floris.

Color.

Synon.

Tabern. la
Hus.

Locus & tempus

ERICA FOLIIS CORIOS FLORE PUR-
pureo dilutionis coloris.

Descriptio **M**ultos teretes humique procumbentes ra-
Rami. mos habet, pedales, interdum etiam cubi-
Folia. tales, et atro purpurascens. Hos plurima graci-
lia ambiunt foliola, Tertiarum foliis penè similia,
paullò tamen longiora, quaternis plerumque, interdum
quinis versib. ordine disposita, adstringente gustu:
Flosculi. flosculi in summis ramulis oblongi, concavi, purpurei
dilutionis coloris, ex quatuor foliolis eiusdem se-
Semen. re coloris prodeuntes, qui maturi & resiccati, ni-
gricans & minutum semen continent: radix du-
ra, lignosa, in diuersa tendens, ipsi tamen pro-
cumbentes rami, humique diffusi, tenues, capil-
larisque fibras nonnunquam agunt.

Locus & Tempus. Copiosè admodum crescit supra Seehoff in
ascensu Berrenalben magno miliari Germanico
supra Garingam: inueniebam etiam inter saxa &
scopulos in ipsis Durnstein/ Seecalben, atque a-
liarum Styriacarum & Austriacarum Alpium præ-
altis iugis, ubi Iunio & etiam seriùs floret. Inter
Pragam & Noribergam etiam Iunio florentem
colligebam.

ERICA BRABANTICA FOLIO CORIS
HIRSVTO QUATERNIS.

Descriptio **H**aud multum ab Erica ramis & foliis Co-
Ramos. rios ternis, floribus ex rubro purpurascen-
tibus, foliorum forma differens plerisque Bra-
Folia. bantiz & Geldriz locis crescit: nonnullis item
Castellæ veteris, præsertim circa collem, la pen-
ne de Francia vulgè appellatum, in quo Mo-
nasterium Dux Virginie sacrum, pedibus so-
lummodò fruticans virgis, tenuibus, ex ruto
nigricantibus, frequentibus eas cingentibus so-
Flores. liis, quaternis ordine dispositis, superiore ordine
angustioribus & Thymi vulgaris minoribus, hir-
sutis tamen & pilosis: summis ramulis plerum-
que dependent, quini aut seni flores simul iun-
cti, Lili conuallium floribus similes, paulò ta-
men oblongiores, neque adeò ventricosi sicut
prioris flores, coloris ut plurimum ex rubro
dilutius purpurascens, interdum etiam albi. Flo-
Tempus. ret Vere & Autumno.

Clus. in Hisp. Erica Coris folio nona: in post.
Hist. decima tertia.

Dodon. Gall. Erica altera, Erica sine dubio
species. Lob. Obs. Erica pumila altera Belgarum,
nona Clusii. Hist. Lugd. Erica tertia Dodonzi:
Erica alia humilis, ex quibus scopæ Gallis sunt.
Item postea Erica nona Clusii. Ast fallitur Hist.
Lugdun. vocando hanc tertiam Dodonzi Gallici,
cùm duas faciat tantum species.

ERICA PARVA FOLIIS CO-
RIOS QUATERNIS, FLORE HER-
baceo, foliaceis ca-
pitulis.

Descriptio **P**edalem altitudinem raro superat, magna
Folia. ex parte humi procumbit, foliis quaternis,
ramulos contrario exortu semper ambi-
Flores. bus: flores secundum ramulorum summam lon-
gitudinem inter folia dependent, cani, pusilli,
in quatuor angulos desinentes, herbaceo colo-
Radix. re præditi, deinde semen. Radix etiam dura &
lignosa.

Synonyma Clus. in Hisp. Erica Coris folio quartæ alia spe-
cies minor. In Pannon. Erica tertia. In Hist.
post. Erica Coris folio 8. Lob. Obs. Erica altera
Clusii superioribus minor, cubitali tantum alti-
tudine. Hist. Lugd. Erica quartæ Clusii similis

sed minor, flore herbaceo.

Maxima copia nascitur in ascensu montis illius, **Locus & tempus.**
qui superandus est iis qui Gamirga ad Seehoff/
vicinæque loca proficisci cupiunt, quo loco &
florentem & foliacea capitula proferentem Au-
gusto mense collegit Clusius, nusquam alibi sibi
conspicam. Quartæ genus esse videtur pumi-
lam.


ERICA PARVA PANNONICA, FOLIIS
CORIOS TERNIS, FLORE CARNEO,
capitulis Thymi.

Descriptio **A**equali cum priore hæc excrescit altitudine
Virgula. [pedali,] tenuibusque virgulis prædita,
humis diffusa, ex purpureo nigricantibus, quæ
summa parte in multos plerumque ramulos di-
Folia. uidi solent: folia in ordines & versus digesta, ut
in reliquis, tenuia admodum, Ericæ sextæ in Hi-
spania & Gallia nascentis foliis similia, terna sem-
per, quemadmodum in illa, æquali inter se situ
ambiant: summi ramuli onusti sunt concavis &
Flosculi. oblongis flosculis extrema parte in quatuor an-
gulos lectis, coloris cum quatuor illis foliolis
vnde enascuntur, carnei, octonis staminibus ni-
Semen. gricantibus, styloque purpurascens è medio
flosculo emergentibus: semen maturitate nigri-
cans exiguum habet: radicem alii similem ligno-
sam. Adnascuntur interdum huius etiam ramu-
Capitula. lis viridia capitula, è latioribus foliolis compa-
cta, capitulorum Thymi modo.

Clusii Erica Pannonica quarta, quam in post.
Hist. nonam facit, inuenitur apud arcem Strich-
stein in sylua illi imminente, quæ ad Seneberg ex
arce iter est, aliâ item ad sinistram oppidi Neus-
kirch syluâ, & nonnullis montanis Pannoniæ
syluis. Floret vix plurimum Aprilis & Maio, quo
tempore aspectu iucundissima est.

Eandem ni fallor olim inueni in monte Rha-
tiaz Nombrey & Burmy: frutex erat parvus ut Erica
Vngarica, flores cærulei mense Iunio. Tunc re-
positi nomine Chamæpeuces.

Ericæ tertiarum Cortusi nomine ex montibus
Helvetiarum fruticem valde paruum attulit Frater,
Ericæ Rhatizæ similem, si non eandem: folia si-
quidem similia, creberrima, latiuscula, glabra:
cauliculi non apparent ita albicantes: flosculi et-
iam multò minores, herbacei, qui nondum ex-
pansi videntur.

ERICA ANGLICANA PARVA CAPI-
TULIS HIRSVTIS.


Descriptio **E**ricæ nomi-
ne siccam
accepimus plā-
tam, à Domino
Petro Turnero
Anglo. Tota
pulchella, vix
dodrantalibus, ra-
Rami. muli tenues,
Folia. multi: folia
admodum bre-
uia, crebra, in
ambitu hirsuta,
ex modicis in-
terualis ceu
geniculis terna
vel quaterna: in
summitate ca-
pitula bis fura.

ERICA PEREGRINA BRANCIO-
NIS LOBELII.ERICA FOLII CORIOS AFFE-
NIS PLANTA.

Locus.

Folium.

Flosculi.



tem, peregrinam appellavit. Est & altera Erica
Lobeli, de qua vide Obser. pag. 623.

PRAETER om-
nes haec
differentias, est
quidam rarior
species, in vr-
ceis pentili-
hūque hortis
Dom. Joannis
Brancionis fru-
ticans, cetera-
rum ritu, folio
longiusculo &
iuxta ramos
flosculis pur-
purantibus, si
bene meminit
Lob. Obs. qua-
ternis foliolis
constantibus.

Nescit unde
delata, eoque
propter rarita-

Erica ramis & foliis Corios ternis, floribus ex
nigro purpurascentibus maioribus fruticem
affinem, Lugdunum ex Hispaniis à Barone Ger-
mano allatum vidimus: descriptionem. a. quam
tum concepimus, adponimus, ne quis fallatur,
si diversa esset forte planta: Folia igitur satis cre-
bra sunt parva, quodammodo Erica Monspe-
liensi similia, sensim latiuscula euadentia, su-
perne viridantia, pilis paucis ac minimis pube-
scentia, inferne incana, nonnihil adstringentia,
non sine aliqua acrimonia: Verum illa foliorum
crebritas non est perpetua: quidam enim ramuli
cum paucis foliis producuntur, quibus insident
aliquot pulchri flores, sursum spectantes, satis
magni, in medio nonnihil aperti.

Descriptio
Folia.

Flora.

TAMOXO SVFFRUTEX CLVSIO.

Svffrutex quem Hispani, authore Clusio, Ta-
moxo appellant, assurgit pedali altitudine, fre-
quentibus ramusculis praeditus, qui foliolis adeo
exiguīs & confertis onusti sunt, ut nullum ferè li-
gnum conspiciatur: ea ex cinereo virescunt, &
extremae sunt amaritudinis. Ceterum in insulis
nascitur.

FINIS LIBRI DECIMI





HISTORIAE UNIVERSALIS PLANTARVM LIBER VNDICESIMVS.

(CXXI)

ARBORES, FRUTICES ET SUFFRUTICES SILIQUOSI, ET LEGV-
MINOSI FLORIBVS, SPINIS CARENTES ATQVE SPINOSI,
AC HIS QVÆDAM SIMILES.

PERSTAREMVS in Arborum historia, si non Fruticum, & humiliorum Suffruticum consimilium
natura egisset transgressi. Proxime dicantur nostrates potissimum siliquosi, quibus si non omnibus ma-
gnitudo, at p[ro]mo consimilis facies & nomen est consimile, aut certe proximam: his proinde simul
redditis, una species præsentiatur, iidem capituli circumscribantur, ut sub siliquosarum tribum merito
inducti videantur.

LABURNVM, ARBOR TRIFOLIA ANAGYRIDIS SIMILIS.

CAP. I.

Descriptio

Folia

Flora



bina à lateribus, quantum nostratum pallidum, in
quo apices crocei, complexu suo coerescunt. Nul-
Tom. I.

lum in hoc fertorem siue foliis siue floribus, ani-
maduertimus.

Arbor hæc fruticosa est, aut frutex arbore scens,
inquit Solertius de Cytiso tractans, cuius quatuor-
te vnam altitudine, caudice non admodum
crasso, ramis hinc & inde diffusis. Nonnun-
quam frutice si tantum spectatur (quia plerumq[ue]
ceditur, & Coryli modo ab imo caudice reget-
minata) stolidæ innumeros ab vna radice sun-
dens, longos rectos, ex viridi candicantes, Vi-
ticis virgis similes, ex quibus per certa intervalla
erumpunt folia terna, longo pediculo nitentia,
Viticis foliis similiter leuia, superne viridia, infer-
ne candicantia, hæc apud prope totorum pedicu-
los emergunt flores lutei, quales flores Geniste
aut Brassicæ, longis pediculis in equalitate pen-
dentes, rarioreque illa ac vix longa textura cubi-
talem æquant longitudinem, apibus ingratu.
Floribus decussis succedunt cornicula, siliquæ-
ue, plurimum hortenium siliquis similes, compres-
siores, fractæ contumaces. In exsertis ac non-
nunquam intermediis spatii continetur semen
Lenis magnitudine, ex latitudine subrotundum,
uno loco quâ siliqua per petalum hæret, tanul-
lum excavatum, tenuis prorsus effigie, quod ante-
quam in tutorem virescat, post maturitatem va-
rium, durum, & ob siccitatem splendidum.

De hoc Plinius. Altitudo hæc arbor est, nec vul-
go nota, dura ac candida materie, cuius florem
cubitalem longitudine (floris cubitalem longi-
tudinem, aliis) apes non attingunt: odit aquas.

Cord. in Hist. sub Trifolia arbore Laburnum
H h

Plin. de
Laburno.
Macerius.
Trifolia
arbor.

Cytisus.
Laburnum.
Anagyris.
Aburnum.

Hebeni (o-
cunda spe-
cies Theophr.
Locus.

Anagyris
Alpina.

Locus.
Pala dura-
biles.

Apes non
tangunt.
Atinus.

Anagyris
altera mi-
nor, monti-
na atque.
Non La-
burnum
contra Ger-
manos Cytis-
genus
Eghelus.
Contra
Anguillaram
non esse La-
burnum.

Matthioli
notatur.

describit, cui quidem iconem apposuit, ibidem-
que annotavit, Cytisum quorundam esse, Labur-
num Plinij, & Anagyris alteram maiorem Matthioli.
Laburnum Plinij, multi volunt esse plantam in
locis Italicis dictam Eghelo & Giegano: verum eo-
rum opinioni non assentitur Anguillara, sed po-
tius dixerit Hebeni secundam speciem Theophra-
sti. Onne siquidem Hebenum, quo Venetus vocatur,
sit ex medullis huius Eghani, quod adferatur
ex Syria & Cypro, quodque hodie adhuc vocetur
Hebenum.

Geln. hort. Anagyris Alpina, Laburnum Plinij.

Laburnum, inquit Bellon. de negl. c. 1c. quod
Galli *Abours* vocant, alio abunde nascitur om-
nibus montibus atque Alpibus. D. Claudio, Cham-
bery & Lausanna vicinis, ut rustici palis ex eo con-
fectis suos agros teptant, nam materies est dura-
bilis. Iam nonnullis flosculi videri etiam, sed non
sine errore Cytisus nuncupatur (aliunde enim
Cytisi semen nobis comparavimus). Florem ha-
bet cubitalem, flavum, quem apes nunquam at-
tingunt. Ex eius materia fiunt arcus nigri, rursus
albi.

Matth. in Diosc. Anagyris altera, Anagyris minor,
Anagyris montana, Eghelo, non Laburnum Plinij, nec
Cytisi montani genus, ut vult Gesnerus. Idem
narratur Gesnerum, in suo libro quadrup. vbi con-
tendit arborem, quam rursus Tridentina Eghelum
vocant, esse Laburnum, non fuisse memorem illo-
rum verborum, quibus paulo ante asseruerat De-
mocrati testimonio, apes nunquam desore, Cytisi
pabulo contingente. Anguillaram etiam in
posse. com. Ital. & Lat. reprehendit quod mino-
rem Anagyris, quam Ananiensem Eghenum, vel
Eghelum vocant, vocis tantum similitudine fretus,
secundum Ebeni genus (rudenda sane opinio-
ne) Theophrasti esse censet. Cum Eghenus sit
tidissima sit planta. Ex verbis autem Matthioli
satis apparet, ei non notum fuisse discrimen inter
Eghenum suum, siue Anagyridem alteram, & ve-
ram Anagyridem Eghenam etiam nos fortorem il-
lum, quem ei adhuc in Hist. Germ. ascribit, non
animadvertimus.

Camer. ad Epit. Matth. iconem novam addo
quam etiam retinet in eisdem Hist. Germ. cum
hac consilia: et si Author (Matthiolus) duas Ana-
gyridis species faciat, Veteres tamen vnius dun-
taxat meminerunt, cuius folia forteant: alterius
vero Anagyridis Matthioli folia nequaquam for-
teant, & hyemem apud nos in hortis perferit, & a
nonnullis, ut Colutea, Welschlinen appellatur,
propter semen. Sunt qui velint Anagyris al-
teram Laburnum esse Plinij, ac mea quidem senten-
tia, at in Epit. non aberrant, cum hoc digni, reiq;
herbaria penitus se in monte iura cubito longiores
florum racemos invenisse referant.

Anagyris altera siue minor, Græcè αἰὲς, vel
αἰὲς, Ital. Anagyris minore, Ananienibus in agro Tri-
dentino, Eghelo dicitur & Anornello: & hinc ait
Dodon. Gall. Laburnum, non Anagyris aut Lo-
tus est, ut quidam existimarunt. Et Lat. in fol.
Eghelo, frutex Anagyris haud multum dissimilis,
non raro arboreus: folio Trifolij: floribus lu-
teis, racematim palmi longitudine digestis: sili-
quis ac semine, ut Anagyris: frutex ipse non
modò gravis, sed omni destitutus est odore.

Cast. Dm. Anagyris minor. Lobel. & Penn.
Adv. Minus fortentem Anagyris, vel Laburnum,
seu Anagyridem non fortentem nonnulli autem
mant esse Laburnum Plinij, quod valde verifi-
mile. Lob. Obi. & Ic. Plant. Anagyris minus for-
tens. Cytisus secundus Theophr. Gualdino.

Tabern. Baumbonen, Anagyris secunda. Mald.
Lonic. Laburni figuntur pro Medici: & La-
burni Italicum nomen Eghelo tribuit Anagyri-
di.

Arborem eam quam ab Alpibus & montibus
serotianum Delphinatibus & Sabaudia vmbroso-
rum & silvorum, lapiulque siccorum indige-
nis, voce ex Laburno detorta *Albur* & *Aulbur*
nuncupari, scribit Dalechampius, testè Plinij
Laburnum esse putat, quamvis Matth. Anagyris
Diosc. esse existimet. Cum Anagyris Dioscor. sit
perquam gravis odore frutex, Laburni vltima nec
flores, nec folia forteant: Illius semen in opent-
culis longis (exsertitur maxime) huius in brevis
contineatur: Folia, maiora, latiorque habeat
quam Anagyris: cum Alpina sit arbor, materie
dura, ideoque palis apta, nec flores eius apes at-
tingant, quia nullus Anagyridi, ac Laburno certe
Plinius tribuit, quæ hic depicta arborem non
Anagyris, sed Laburnum esse testantur.

In eadem sunt sententia Cornus & Gesnerus
quam reprehendit Matthiolus. Laburni, inquit,
materies a Plinio candida describitur, non con-
tra medullitudo nigra, corticetenus lutea, modo
Guaiaci, qualis Egheli materies cernitur.

Ad hæc Eghelus arbor est omnibus fere cog-
nita, ut de Laburno refert Plinius. Iam vero Egheli
flores, qui in arbore ramorum instar pendent, pal-
mi longitudinem non excedunt, quos Laburno
Plinius cubitales tribuit. Postremo, illud expe-
rientia compertum, quod Apes Egheli flores non
aspiciunt. Hæc sententia nostra labefacta-
re, aut infirmare non possunt. Laburnum enim
hic Matthiolus accepit, quod secundum seu-
nus Anagyridis genus ipse constituit, quodque
rursus Tridentina vocant Eghelo. At quod Gesnerus
Laburnum, quodque nos intelligimus, primum
est a Matthiolo positum ac depictum Anagyridis
genus, ut ex praefata apparet, & quod minus ap-
pellat, ut paulo ante indicavimus. Hæc opinio
quæ adscripta optimè convenit, minime
vero ea quæ secundo Anagyridis generis ipse ad-
scripsit. Quod si nostra Gesnerique sententia La-
burnum Plinij sit ea arbor quam hic propo-
nimus, & quam Matthiolus pro primo Anagyridis
genere depinxit. Cur non secundum eiusdem
Matthioli Anagyridis genus, alterum etiam La-
burnum iure diceretur, cum similes natales habeat,
foliorum figuram, frumque similes, vires fere
eadem, ac materiam similiter duram.

Maior & Iunio mensibus grato in montibus
spectaculo floret. Licet enim ante hoc tempus
Anagyridis siue Laburni nostri generis simili: fo-
lio est non forteante, nec ingratum saporis, Trifolij
pratensis fere. Hæc cornicula prodeunt Geniste
ramuli, in quibus semen continetur, semina
eiusdem Geniste magnitudinis, sed oblongius,
Phaseoli modo, coloris subnigro.

Matthiolus igitur duas Anagyridis species de-
pinxit, quas non Anagyridis, sed Laburni spe-
cies esse ita demonstravit Dalechampius. Verum
duo Laburnia esse vix puto, sed duas figuras vi-
nius Laburni apud Matthiolum, qui confudit
meo iudicio Anagyridis historiam cum Labur-
no.

Arbor Italia videtur quibusdam esse vel Labur-
num, vel eius species: a Laburno tamen pluri-
mum differt, quoniam Laburnum Alpina est ar-
bor, flore nonnunquam cubitali, quæ arbori huius
non conveniunt.

Laburni semen missum mihi fuit Scordaria. Locus &
nomine Schwarz Linum, quod optime pro-
nitia

nit in horto Ill. E. C. Montisbelgardi: excrevit in
maiores arbores, quarum truncus ad crassitu-
dinem cruris, quæ hiemem facile tolerant. Ob-
servavimus cum essemus Genevæ in monte *Sal-*
ve & Thuyri florens Julio: Itinere Genevæ Lug-
dunum inter *Sardon & S. Jean le vieux* in Sabau-
dia florens Aprilis: Patavij in horto publico, Bo-
noniæ in montibus Apenninis, ubi mense Aprilis
flores nondum erant aperti, in itinere Floren-
tiam. Parmæ florens in horto Nob. lis Antonij
Lalace in montibus circa *Clareval* Burgundiæ:
Basileæ in horto D. *Fellicis Plateri*: Lugduni ha-
bui in horto ex seminibus satis: Huius semen
mihi missum à D. *Raffo Lutetia*, nomine *Labur-*
ni, & à fratre C. *Bauhino* cum hac inscriptione:
Anagyris seu Lingua avis horti *Fuscari*. D. *Chri-*
stoph. Schwartz præfectus Ill. Ducis *V. Vittem-*
bergici misit mihi nomine *Loti arboni*.
Cum essem Patavij D. *Preßburger* annotat
esse *Laburnum* Plinij, *Ebenum* & *Cytisum* se-
cundum *Theophr. Guilandino*. Omnia posse
præstare quæ *Anagyris* scribit *Matth. Camer.*
verò dicit odore murescere, ac plantæ cine-
rem ad calculum commendari. Verum cum hi
illi odorem ingratum tribuant, & nostrum *La-*
burnum eo destituatur, ambigunt vires mure
confundere videntur. Sæpenumero *Laburnum*,
ob ligni duntiem & nigrotem pro *Ebeno* variet,
ex quo pulchre sunt pectinum theæ.

ANAGYRIS VETERIBVS.

CAP. II.

Acopos.
Delcript.
Diosc.

Agnaco-
pon.

Apud Gre-
cos Prober-
bium.

Magnum.

A *Nagyris* quam alij *Anagyris*, alij *Anagyris* [Og-
bas. *Ελκυστο*] vocant auctore *Dioscorides*, fru-
tex [δένδρον] est arboris instar, folius & virgis Vi-
tici [αγρι] affinis, [δένδρον] perquam gravis o-
dore: flore Brassicæ, [αγρι] Plin. Oleris] se-
mine longis corniculis [αγρι] renibus figura
simili, versicolore ac solido, quod uva mature-
sciente durefcit [αγρι]. V. [αγρι] alius [αγρι]
[αγρι]. Inter Notha [αγρι] *Anagyris*
Plinio quam alij *Acopon* [Acopionem] vo-
cant, fruticosa est, gravis odore, flore oleris: Se-
men in corniculis non brevibus gignit, simile
renibus, quod durefcit [αγρι] maturefciente *Diosc.*
per melle: in quibus cum *Diosc.* consensit. Ni-
hil enim refert, an per melle, an uva mature-
sciente, semen durefcere dicas. Ceterum *Anagy-*
ris odore terro [αγρι] *Anagyris* moves, [αγρι] *Anagyris*
peperit, contra eum, qui in suam ipsius perni-
ciem quæpiam irritat, ut obfutura commoveat,
& sibi ipsi malorum autor sit. Vnde verò dicta sit
parcemia varè nariatur ab autoribus. Alij ad
fruticis naturam referunt, cuius hic sit mentio,
quem *Magnum* quidam appellant: nonnulli *Ac-*
opon: medicamentum quidem efficacem, verum
odorem maiorem in modum gravi: maxime si ma-
nu teratur: cuius fructus gustatus vehementer
vomitus promovet. Vnde vel ab odoris mole-
stia, quæ carpentem consequitur, adagium du-
ctum videri potest (quandoquidem & *Acopi* vo-
cabulum indidem apparet repertum) vel à concu-
tandi vomitus efficacia. Sunt qui dicant *Anagy-*
rum locum esse in *Attica*, qui ad tribum pertineat
Erechtheidem, auctore *Stephano*, ubi frutex qui-
dam gravissimi odoris plurimus proveniat: ut *An-*
agyrum pro frutice non secus accipiamus quam
Anagyrum pro *Elleboro*. Rursum alij *Anagy-*
rum genus quendam existimant, qui propter

violatum sacellum suum vicinos omnes funditus
everterit. atque huius adagij mentionem fieri a-
pud *Aristophanem* in *Lyfistrat*.

Cur autem *Anagyridem* alij *Acopon* voca-
verint, non satis certam *Marcellius*, ex nominis
interpretatione & vi rationem habet. *Acopa* e-
nim communi nomine à *Græcis* cuncta illa reme-
dia dicta sunt, quæ contra lassitudines in antiqua
Medicina conficiebantur: sic dicta quoniam con-
tra labores [αγρι], lassitudines sive defatigationes
in usu essent.

Appellatio autem hæc *Anacopos* [Agnacopos]
ex vitice [Agno] & *Acopo* facta est: quoniam Vi-
tici virgas *Anagyris* habet.

Rob. Const. in *Lex. Agrorum*, [αγρι], [αγρι]
[αγρι] *Diosc.* & *Gal.* [αγρι] *Suidæ* (quamvis *Ni-*
cander aliter) *Nautæa* apud *Plautum* & *Festum*:
Anagyris Plinij. Sed non possum satis mirari,
quid velit *Constantinus*, quod *Onogyrum* fa-
ciat herbam, ac eandem quam *Anagyris*, & re-
mittat ad *Anagyris*, de qua antè egerat, quæ
non est herba, sed frutex arborefcens. Cur et-
iam *Anagyris* dicit esse *Nautæam* *Plauti* & *Festi*:
auctorem non habet, cum *Plautus* manifestè di-
cat herbam, ut sub *Nautæa* monstrabitur, in cuius
descriptione nihil commune cum *Anagyride*.
Onagyris etiam *Nicandri*, non responderet *An-*
agyridi, cum sit ferrata. *Anagyris* frutex trifolius,
ferrens, malè existimatur & dicitur quibusdam
Laburnum. Considerandum etiam quam plan-
tam pro *Malva terrestri*, genere pedis *Columbi-*
ni, quod *Pandect.* *Anagyris* *Gal.* 6. simpl. vocari
scribit, intelligat. *Anagyris* *Ruellio* Recentiori-
bus *Malva terrestris*, quod humi *Malvæ* modo ja-
ceat, dicitur, rusticis putidum lignum. Quid *Ruell.*
& cum eo *Gonth. Ryff.* & *Gesnerus* intelligant
per suam *Anagyridem* considerandum: Omnia,
quæ scribit præter modum dicta sunt consarcinata
ex *Plinio* & *Diosc.* ac *Hermolao*: Quod ait hu-
mi jacere suam *Malvam* non convenit cum *An-*
agyride vera: Si per rusticos, suos *Gallos* intelli-
git, nec etiam convenit: *Anagyris* enim non est
vulgaris in *Gallia*, ut ei rustici proprium nomen
indere potuerint.

Ignorant Officina *Anagyris*, inquit *Corn.* nec
satis inter *Herbarios* constat de ea: nam qui *Mal-*
vam terrestrem vocant, eos ego penitus nihil
docere puto: Quæ verò planta vulgè *Lignum sa-*
tidum dicitur, ab *Anagyris* longissime differt. Quæ
planta sit *Lignum satidum* perquirant lectores.
Ceterum *Anagyris* *Cornario* est, quam vocat
Scheffbeebium, de qua sub *Alno nigra* *Hist.* n.
g. lib. 5. ubi ostendimus absurdam esse opinio-
nem.

Onogyrum *Nicandri* quidam interpretantur
Anagyris, cum tamen non respondeat ei, ut di-
cetur capite de *Onogyro*.

Nautæam sunt qui existimant eandem cum *An-*
agyride, ut postea dicitur, sub titulo de *Nau-*
teæ, cum tamen sit herba diversa.

Anagyris voluerunt quidam esse *Vulvariam*, *Arriples*
quam *Arriples* fatidam nominamus.

Anagyris sunt qui putent *Evonymum*.

ONOGYROS.

HERBA asperfa & spinosa *Onogyros* *Nican-*
dri, cuius usus aduersus venena, ut inquit
Rob. Const. in *Lex.* alias [αγρι] [αγρι], *Anagyris*.
[αγρι] *Diosc.* & *Gal.* 6. simpl. [αγρι] *Sui-*
dæ, & *Nautæa* *Plauto* cognominatur. Prescribit
Hb 1



Culor. quorum sinu apiculi plusculi emicant, flori con-
Silique. colores. Floribus succedunt siliquæ digitali
 longitudine, pollicari verò latitudine, cartilagi-
 nez in quibus terna aut quaterna semina, non-
 nunquam plura, satis magna, exiguis phaseolis
Stem. similia, renis formâ, quæ initio albescent, deinde co-
 lorem purpurascens contrahunt, tandem per
 maturitatem ex cæruleo nigricant: ut aptissime
 Dioscorides *περικλιν* dixerit, cum in eodem tru-
 ctu non benè maturo tres differentes colores
 subinde conspiciantur, ut diligenter notavit Cla-
 sius.

Descriptio Anagyris ita describit Marcellus in Dioscor.
Marcelli. Floret Maio & Junio mensibus grato inter alios
Locus & frutices per silvas spectaculo, multoque flore,
tempus. quem flauum ex longinquo ostendit, prætereun-
flor. tium oculos faciliè in se conuertens: & si abesset
 ingratus odor, quo meritò spreus, damnatusque
 est, antiquorum coronas primus nobilitasset.

Odor. Fruticosa stirps magis quam arbore est. Nos tamen
Stirps fr- vidimus tonsurâ, putationeque coactam ad legi-
tuca. timam arboris altitudinem crescere. Nullumque
 florente eâ latius spectaculum, aut siluæ, aut agri,
 si fortè consita in eis fuerit, ostendunt. Respon-
 dent autem eius naturæ omnia ea, quæ in Hist. à
 Diosc. illi tribuuntur.

Anagyris Descriptam plantam existimo legitimam Ana-
Veterum. gyris, Diosc. Plin. Galen. Pauli, Ægynetz. Ex re-
Error quo- centionibus nonnulli Anagyris duo genera po-
ruendum. suerunt, verum me iudice Bened. Curt. lib. hort.
 rectè alterum ab antiquo [hoc nostro] arbore
 aliam existimauit. Tametti [inquit Clus.] non-
 nulli [ut Matth.] plura Anagyris genera se vidisse
 referant, ego vnicum legitimum quale videlicet
 à Veteribus descriptum est, tantum obseruasse in-
 genuè profiteor. Et licet Honor. Bell. se in Creta
 passim, locus vias differentem Anagyrin ab ea,
 quam hic describo obseruasse dicat, quæ rotun-
 diora proferat folia: non tamen ob sola folia quæ
 parum variant, diuersam existimo faciendam,
 cum præsertim exosus odor, & facultates à Vete-
 ribus huic adscriptæ, eandem esse clarè demon-
 strent. Facilius etiam naturæ lapsus in foliis, quam
 in viribus.

Anagyris Pandect. Anagyrin Columbinæ pedis speciem
Vna folium. esse fatetur: sed Dioscoride perlecto, nullam si-
 militudinem habere percepit Brassav. quippe A-
 nagyris folia & virgas Viticis, id est, Agni casti
 habet, Pes verò Columbinus Maluæ foliorum æ-
 mula. Credo in Hist. addita est figura Tragi, ac
 adscriptum, Tragi esse Fabam inuersam, vel (ut
 alij nominare malunt) *scutellari*.

Anagyris Anagyris Turnero ramis & foliis Agni casti I-
Vna folium. talici: verum folia maiora breuioraque sunt, ter-
 na duntaxat iuncta, cum Agnus quina semper
 coniuncta habeat, odore vehementer fetido.

Anagyris Anguill. Anagyris in Apulia vocata *Faba inuer-*
Faba in- sa & *Faba lupina*.
sa. An Mattheolo in Diosc. *αἰνυρ*? Item in post.
 com. Ital. & Lat. & Hist. Germ. Anagyris maior,
 vel prima: Fructus enim descriptio videtur con-
 uenire. Bellon. Obs. Anagyris: In Creta vulgò A-
 nagyros. Hist. Gall. lib. 6. cap. 66. Græcè *Αἰνυρ*:
 Latin. *Anagyris*, Gallic. *Bois puant*. Idem Histor.
 Latin. *Αἰνυρ* aut *Αἰνυρ*. Thes. ling. Latin.
 perperam Anagyrin Eghelo nominat, dum
 scribit: Anagyris herba est, quæ odore tetra pro-
 nerbium peperit, in eos iactari solitum, qui ob-
 futura sibi commouent, vulgò Eghelo. Cast. Du-
 rant. Anagyris, Anagyris maior. Amat. in Diosc.
 Anagyris Galeni.

Anagyris Lonic. sui non memor, vocat modò *Οβαντε*

Anagyris bonen & Baumbonen / Lat. *Fabam inuersam*: iam
 alibi figuram aliam habet, appellans *Stines-*
Stines- dendbaum Anagyrin Acopon Latin. *Lignum pu-*
ridum & quibusdam *Maluam terrestrem*. Sed pro
 suo more omnia confundit, figura non conuenit:
 nomen Maluæ ad quid? licet Pandectarius sit v-
 sus.

Gesnerus Gesnerus hort. Anagyris, quæ & Anagyrus &
 Onogyrus: Anagyris inquit is prope Arelaten
 gignitur, Matthiolo ignota ex sententia Dale-
 champii, ut qui pro ea Laburnum duplex osten-
 dent: Ea etiam quam Bened. Aret. putat Anagy-
 rin Laburnum Plinii est floribus luteis, oblonga
 serie dependentibus, cuius lignum apes fugere, &
 Plinius tradit, & à rusticis Sabaudia audiui. Ve-
 nemis vidi arborem similiter trifoliam, sed diuersa
 foliorum specie, quæ mecum attuli, fortè conge-
 neres fuerunt. Nec rectè Anagyris Indica, voca-
 tus fructus Fabiformis secundi generis à quibus-
 dam creditur.

Lacuna Lacuna de Anagyride nihil habet præter verba
 Dioscor. Figura & cætera pertinent ad Labur-
 num.

Camier Camier. Hort. Anagyris prima Planto, ut puta-
 tur, Nautea.

Nos Nos sub titulo de Nautea diximus eius de-
 scriptionem ex Paulo Dracono Anagyridi non
 conuenire.

Lob. & Pena Lob. & Pena Adu. Obs. & Icon. Pl. Anagyris
 ferida arborefcens, Anagyris Diosc.

Crisp. Crisp. Anagyrin quam aliqui Falcotiam vo-
 cant, Diosc. describit.

Apud Plinium Apud Plinium Anagyros, non multum ab hac
 necedere videtur colytea apud Theophrast. quasi
 Anagyris quædam magna sit, minore tamen se-
 mine.

Hist. Lugd. Hist. Lugd. duas figuras habet vnius plantæ
 sub his titulis, 1. Anagyris Dodonæ, 2. Anagyris
 vera ex agro Arelateni.

Tabern. Tabern. quàm benè distinguat à Laburno
 videant lectores, Matthiolum imitatur.

Aræus Aræus Gr. & Lat. dicitur, & *Αἰνυρ*: Clus.
 Herbariorum *Faba inuersa*, quo nomine Venetiis
 in Aromaticorum officinis, semen eius ex Creta de-
 latum prostat, Germ. *Baumbonen* & *Gewand-*
bonen bonen: Dici etiam potest non præter rationem
Stinesdendbaum, *Arbor ferida*, ut à Lonicero no-
 minatur, summè enim fetet, unde ortum com-
 mune dictum, *Monera Anagyridem* Gall. *Bois puant*:
 Ital. *Anagyris*, & *Faba lupina* Lob. Posset Angl. ap-
 pellari, ut Turn. *Beane trifolyc*.

Anagyris Anagyris in hortulo [Tiguri] colit folio forti-
 do. Turn. Anagyrin in Anglia, quod sciat, non vi-
 dit. Ex semine (quod dederat Theobaldus No-
 blot Pharmacopœus Gener meus) natam alij
 Montbelgardi quæ primo anno excreuit ad
 cubitalem altitudinem. Vbi aliquot annis durauit,
 tandem gelu confecta perit. Vidi Montpelii, Ti-
 guri apud præceptorem Gesnerum: item Patani
 Februario & Martio virentem, apud Vlysem Al-
 drandum cum siliquis. Primum omnium hunc
 fruticem nascentem Clusius inueniebat primò ab
 Arelate lapide, saxoso quodam colle, qui dicitur
 D. Antonii, monente D. Guillelmo Rondeletio.
 Deinde frequentem circa Hispalim totius Bæticæ
 Emporium celeberrimū, tum etiam ad Mundam,
 Malacam & Valentiam. Floret isthic Ianuario &
 Februario, æstate semen maturefcit. Huius por-
 rō ligni matrix siue cor, non nigricat sed nonni-
 hil potius pallescit. Bellonio ingredienti hortum
 simplicium Pontificis Romæ, Anagyris sit obuia,
 quam Scipio Pontificis Simplicita in *Beluodere*:
 J. R. 1603

semine natam aluit, & ex illa integram sepem construxit.

Vires.
Tumores.
Partes.
Menses.

Teneta sine recentia eius folia trita, inquit Dioscorides, tumores illi reprimunt: si partus hæreat, & secundæ mensēque morentur drachmæ pondere sicca bibuntur in passio: sic & suspensio dantur & contra dolores capitis in vino, amuleti etiam instar difficulter parientibus adalligantur, sed à partu statim auferri oportet. Radicis cortex concoquendus discutiendusque adhibetur. Semen commanducatum vomitiones vehementer cit. Hac Diole. In quibus verba ista, Radicis cortex concoquentis &c. aliter vertit Ruellius quàm Græca significant. *ἡ ῥίζη χυλὸς διασφί, καὶ ἰσχυρὸς*. Id est radicis succus, discuit & concoquit. Plinius: Folia collectionibus imponuntur, discutitque parientibus adalligantur, ita ut à partu statim auferantur. Quod si scetus emortuus hæreat, & secundæ mensēque morentur, drachmæ pondere bibuntur in passio folia. Sic & suspensio dantur, & in vino vetere ad phalangiorum morsus. Radix discutiendis concoquendisque adhibetur. Semen commanducatum vomitiones facit. In his Plinius in quibusdā à Dioscoride dissentit: illi enim radix, huic radicis succus discuit & concoquit: Galeno & Oribasio radicis cortex, nisi quis dicat quod Plinius simpliciter de radice, Galenus de radicis cortice dixerit, fieri posse, ut in Dioscoride cum Ruellio *ἡ ῥίζη φανερὸς* & non *ἡ ῥίζη χυλὸς* legendus sit. Quod verò sequitur multò maioris est momenti: In vino vetere folia dari ad phalangiorum morsus Plinius ait, Dioscorides *καὶ αἱ ῥίζαι σὺν ὀπῳ* id est ad capitis dolorem in vino, ita ut vox *καὶ αἱ ῥίζαι* pro voce *καὶ αἱ ῥίζαι* in Plinio supposita sit, aut in Dioscoride pro *καὶ αἱ ῥίζαι* voce, *καὶ αἱ ῥίζαι* legere oporteat. At certe verisimilius est [ut testis est Corn.] in Dioscoride *καὶ αἱ ῥίζαι* pro *καὶ αἱ ῥίζαι* legendum esse. Quid enim Anagyridis folia quæ subacta sunt, excalefacientis ac incidentis facultatis, ad capitis dolores valere possunt? Proclivius quidem fuit, ut vox *καὶ αἱ ῥίζαι* in Diosc. pro *καὶ αἱ ῥίζαι* supponeretur, quàm ut Plinius *καὶ αἱ ῥίζαι* pro *καὶ αἱ ῥίζαι* verteret.

Dysuria.
Alph. Emp.
menses.

Galenus de Anagyridis natura hæc scripsit. Anagysis frutex est graviter olens, & digerentis excalefacientis ac incidentis facultatis. Sed folia etiamnum virentia cum propter humiditatis admissionem minùs sint actia, idcirco tumentia reprimunt. At resiccata incidentis sunt, excalefacientis ac incidentis facultatis. Similem ferè facultatem habet radicis cortex. Semen autem est magis subtilium partium. Sed & vomitum provocat. Eadem omnino Oribasius quoque habet. Alph. emp. ad dysuriam Anagyridis grana triginta septem cum cōdito à balneo pota commendat. Sed si semen vomitum mouet, ut facili crediderim, quis exhibeat triginta septem grana ad dysuriam, ego tantam quantitatem experiri nolim, alterique experimētum committere malim. Si præterea Onogytos Nicandri est idem cum Anagyride, ut aliquos vellem antè ostendimus, ea à stratis arcebit serpentes. Per Onogytum tamen, ut dictum, non videtur intelligi Anagysis: non negatim propterea eam aduersari venenatis animalibus: scribit enim Aegineta in genere fuffitum graveolentium valere ad præservandum à venenarum ei aculantibus animalibus. Accidit interdum, ut Capræ & oves in Creta fame vexatæ huius folia depascant, licet odor sit ingratisissimus, & postea ex harum lacte caseus conficiatur: quo si fortè ignarus aliquis vescatur, aut lac bibat, statim excidentur tum vehemētissimi vomitus, tum fluxus ventris; & cum hoc sæpius accidat, multi in discrimen vitæ veniant: quam ob causam frutex hic omnibus sit exolus.

Emetic.
Fluxus vē.
træ.

CYTISVS IN GENERE.

CAP. III.

IN tanta Cytisi varietate in genere ex Veteribus & Neotericis pertractandum.

Cytisum igitur Theophrastus adeo insensum [χαλκόν] ceteris esse plantis ait, ut subrepto alimento ferè omnes enecet: eiusque medullam tam duram esse ac spissam, [quod Arum cognominant,] ut proximè ad Ebenum accedere videatur. Frutex [δάμνη] est autore Dioscoride, albus in totum, velut Rhamnus [ῥάμνος] ramos producens cubitales & maiores: folia Fœnugræco aut Loto Trifolio [τρίφυλον ἢ λωτὸν τετραλόφυλον] similia, sed minora, & maius dorsum habentia, quæ dum digito conteruntur Erucam [ῥαβδον] redolent, in gustu verò Cicer vinde [ἡ ἑλάνθη χαλκή] referunt. Folia vim habent refrigeratorem, [ὑποψυχνόν], addit Lac. & *στυραλὴν* gustu adstringentem ac oedemata inter initia discutiunt, si cum pane trita illinantur. Eorum quoque decoctum urinam potui ciet. Cæterum, nonnulli, quod Apes allicit, eum prope Alvearia serunt. Frutex Cytisus ab Aristomacho Atheniensi, ut videre est apud Plinium, [qui eadem ferè cum Varrone & Columella tradit, ex quibus sua fortè desumpsit] miris laudibus prædicatus pabulo ovium, aridus verò etiam suum. Vitilias [ad valetudinem & suginam Dal.] quæ Eruo sed ocyor satietas, perquam modico pinguescente quadrupede, ita ut iumenta hordeum spernant. Non ex alio pabulo lactis maior copia, aut melior, supra omnia pecorum à morbis omni usu præstante. Quin & nutricibus in defectu lactis aridum, atque in aqua decoctum, potui cum vino dari iubet [iuvat, & M.] firmiores, celetioresque tradens infantes fore. Viridem etiam Gallinis, aut si aruerit, madefactum. Apes quoque nunquam defore Cytisi pabulo contingente, promittunt Democ. & Aristomachus. Nec aliud minoris impendij est. Seritur cum Hordeo, aut Vere [Eruo Dal.] semine, ut Porrum *εὐκρεσίδας*, [ramo Pomum malè vertit Plin.] vel caule Autumno ante brumam. Si semine madidum, & si desint imbres, lacum spargitur [rigatur quindecim proximis diebus Colum.] Plantæ cubitales transferuntur scrobe pedali. Seritur per [post vet.] æquinoctia teneto frutice. Perficitur triennio. Demetitur verno æquinoctio [nam tota Hieme floret, Dal.] cum florere desit, vel pueri, vel anis vilissimâ operâ. Canus aspectu [vtraque Cytisus: est enim sativa & altera suæ sponctis, Colum.] breviterque si quis similitudinem exprimere velit, angustioris [amplioris vet.] Trifolii frutex. Datur animalibus post biduum semper. Hieme, madefacti [aridum enim maiores vires habet, & nimis satiat] satiant equos denz libz, & portione minora animalia: obiterque inter ordines Allium & Cæpe feri fertile est. Inventus hic frutex in Cythno insula, inde translatus est in omnes Cycladas, mox in vrbes Græcas, magno casei proventu: propter quod maxime miror rarum esse in Italia. Non æstuum, non frigor, non grandinum, aut nivis iniuriam expavescit. Adicit Higinus, ne hostium quidem, propter nullam gratiam ligni. Galenus etiam lib. de An-

Theophr. de
Cytisa.
ἡ ἐκ δούλα
Ebem.
Diosc. de
Cytisa.
Rhamnus fo-
milis.
Diosc. illi
frutur.

Oder Eruc.
ca.
Cassia Co-
cinea.
Vires & v-
sus.

Diosc. de
Cytisa le-
lito
Oedema-
ta.

Vrina.
Apra.
Plan. Cytis-
sus.

Suavia & v-
sus pab-
ulum.
Plan. allo-
frutur.
Vitilias.

Lac.

Apra.

Apra.

Sarri.
Plan. ar-
ror.

Cultura.

Tempus.

Trifolij fo-
cie.
Exhibendi
ratio.

Locum.

Locum.

Rarus in
Italia.
Cytis. Ga-
lino.

de An-

Locus. de Antid. Cytisum fruticem esse, scribit his verbis. In Mytia, qua parte nostrae Provinciae finitima est, tractus occurrit quem *Bruton* nominant, in quo locus est Cytiso plenus, ex cuius floribus plurimum mellis apes excerpere vno ore tradunt. Fruticosa verò planta est, eam altitudinem attingens, ad quam Myrti crescunt. Folia verò, inquit 7. simpl. digerendi facultatem obtinent, aquosa tepida facultate ammixtam, sicut & Malve folia. Hæc Galenus. Herba vel frutetum, quod maximè circa sepes vinearum nascitur, ait Marc. Med. Empiricus, Latine Cytisus dicitur, virgulus est subortus, vel curvis: foliis oblongis, benè virentibus: floribus conclusis, oblongis albis, vel galbancis, benè olentibus, i.e. mellito odore: frutetum ipsum semper virens, ætate atque Hieme. Verùm, ut Dodonæo videtur, hac descriptione Marcellus alium delineat Cytisum, à Græcorum nostro differentem, quem non iumentorum pabulo laudat, aut ad lactis copiam augendam commendat, sed mirum esse remedium tradit adversus isch adem & arthritum. Ast nec ipse Dodon. fovea ne effugit, quam fecit. Recitans enim Veterum verba, non demonstrat quam intelligat. Basil. lib. in Thes. vocans Cytisum *Weisslee* & *Spizille* / *Loto* similem, & capris fruticem gratum, nesci quid scribat.

Marcellus. Cornar. uti videtur in his Cytisum aut nunquam ad Germanos transiisse, aut dudum petiisse credit, ex eo, quod Papius iam suo tempore rarum in Italia fuisse dixerit: tantum abest ut ab illo persuadeat, in Germania nihil eorum posse nasci, quod rarum sit in Italia.

Cytisus arbor Strab. Strabo contra Dioscoridem, Plinium, & Galenum Cytisum arborem esse velle videtur, eam siquidem cum Balsamo arbore odorata similem facit. Quæ forte occasio, cur hanc arbusculæ propiorem Cornarius esse dixerit: quod quidem ex eo colligi posse putat, quod Plinius ait nullam gratiam ligni esse. Quam enim nulla sit ligni gratia, ramos omnino producere oportere sibi persuadet lignosos, non velut in herba teneros & molles. Sed nec arborem esse, nec arbusculæ propiorem, Virgilius ostendit dum in Buc. Eclog. 1. ait.

— non me pascente, Capella
florentem Cytisum & Salices carpetis amaras. Eclog. 9.
Sic Cytiso pasta distentent ubera vacca. Eclog. 10.
Nec Cytiso sunt arantur apes, nec fronde Capella.
Virgilius, inquam, satis indicat his versibus, nec arborem esse, nec arbusculæ herbam propiorem. Non enim solent Capræ, nec possent, si solerent, florentes arbores depascere. Quare nec illud Cornarii valebit, quando Plinius ait, nullam esse ligni gratiam, ramos omnino producere oportere lignosos. imò contrarium potius verum erit, nullam esse ligni gratiam, ramos ferre vimineos & lentos quibus capellæ saturari nequeant. Esse, a. capris Cytisum desideratum pabulum lepidè expressit Theocritus.

Adapium. H' αἰετὸν κύνων, ὁ κύνων τῶν αἰετῶν δούλη.
Capra Cytisum, lupus capellam sequitur.
Amatus ut hanc difficultatem effugiat, concludit Cytisum, & inter arbores, & inter frutices, siue herbas censeri posse, generisque differentiâ, à Plinio distingui, ut in arbore, sœmneo utatur, in frutice, masculino, quod sanè observatione non dignum. Cytiso in feminino genere vitur Columella, in masculino Theocritus & alij passim, ut Rob. Const. in Lex. qui & αἰετὸν ab Hesychio vocari scribit. Theocritus etiam hunc fruticem κύνων; nonnulli κύνων, alij κύνων. A Cythno, Tom. I.

aut ut alij, à Cithisa insula nomen, authore Servio habet. Inter Dioscoridis verba hæc in quibusdam codicibus falsò adscota reperuntur, 2. filios Telinen, Triphyllon alios, alios Lotum grandem.

Cytisi Dioscoridis descriptio tam accurata non est, ut ex ea verus Cytisus cunctis innotuerit, quo factum est, ut diuersi authores diuersos exhibuerint Cytisos.

Cytisi nomine donatæ sunt sequentes plantæ.

Cytisus siliqua incurua folio candicante à Marantha descriptus de quo proximè.

Cytisus Hisp. Clus. folio virente.

Cytisus montis Calcaris.

Cytisus Hisp. Clus. 1.

Cytisus spicato flore.

Cytisus 3. Hisp. Clus. non breui pediculo.

Cytisus hirsuta.

Cytisus Pann. Clus. omnia incana.

Cytisi 2. Pannon. Clus. species altera, hirsuta valde.

Cytisus Pann. 3. Clus. sparsis ramis.

Cytisi Pannon. 3. Clus. species altera, lupinis ramulis.

Cytisus siliqua angusta glabra.

Cytisus glabra lata siliqua.

Cytisi genus flore purpureo.

Cytisi facie Alysson fruticans.


In hac quidem multitudine de Cytiso, licet indicare difficile sit, quis legitimus Cytisus Veteribus descriptus, petiores tamen eum existimant esse, quem Marantha proponit. Cæterum, nemo, uti spero, inficias ibit, quin quos enumeravi frutices ad Cytisi genera etiam referri debeant.

Præter has tamen alie quædam occurrunt plantæ, Cytisi titulo gaudentes, quas à prædictis merito seiunximus. Autore Dodonæo, *Trifolium fruticans*, siue *palemonium* quorundam, non benè Cytisus à plerisque appellatur. Laburnum quibusdam Cytisus dicitur. Quidam putarunt Coluteam multis dictam esse Cytisum. Cytisi cognata est Colutea scorpioides authore Clusio. Camerarius putat Dorycnium Monspelii existimatum, esse Cytiso Columellæ cognatum. Trifolium candidum Dodon. à quibusdam dicitur Cytisus Columellæ, de quo lib. Hist. n. g. 17. de Trifolii herbaceis. Quidam volunt Marcelli Empirici ac etiam Diosc. Columellæ & Virgili Cytisum esse Trifolium quoddam magnum. Tragus scribit repudiandam sententiam eorum qui Trifolium præteritense, Cytisum interpretantur. Trifolium candidum Dodon. rectum. Melilotum vulgarem quidam Cytisum Veterum esse contendunt, inquit Dodonæus, verum non veritatem assecuti videntur. Ruellius scribit se vereri ne Marcellus Cytisum pro Medica viderit. Lotus sativa, odorata, quibusdam censetur Cytisus, quod aliis displicet.

CYTISVS SILIQA INCURVA, FOLIO CANDICANTE.

CYTISVS quam hic exhibemus, pulcher Descrip. Cest frutex, qui primo anno à satu mihi in cubitalem altitudinem excreuit, cubitali quoque & recta radice, alioqui ad cubitos aliquot assurgens, totus candicans, in ramos tenues dimissus, foliis ternis retusis & non nihil fissis, quæ sustinent longiores pediculi, quam in cæteris Cytis. Flores ex longis pediculis multi, parui, lutei, Genistæ pilosæ floribus proximi, Hb 4

Siliqua.

Marantha
descriptio.Alimento
Myrti.
Folia.Oder Eruc-
ta
Gustus.
Flas. Color.

quos sequuntur
siliquæ, pulchre,
late circumsta-
ntæ.

Maranth. in
hunc modum
describit: Cytis-
us frutex, totus
candidus est,
eandem altitudinem
attingens, ad quâ
Myrtus crescit.
Folia singulis pe-
diculis terna, sed
ramulosa profert
[quod Plinius
expressit,] quæ si
digitis terantur,
odorem Erucæ
proximum, gu-
stata verò Cicer
recens emulatur.

Florem recludit in ramulorum cacuminibus la-
tum, aspectuque pulcherrimum, colore luteum,
sed saturato, quemadmodum quæ pro Caltha o-
stendi solet, & arantiorum cortex. Siliquas pro-
ducit contortas, unâ & nonnunquam pluribus
spicis, paruas, in quibus semina parua, vix ineun-
te ætate maturefcentia. Caudex nigrum cor re-
tinet, Ebeni simillimum, Vassacietra ab artifi-
bus nuncupatum.

Quod verò Cor retineat Cytisus nigrum, ar-
bitratur Marantha euenire ratione vetustatis,
hocque Veteribus, sicuti & multa alia, incomper-
tum fuisse: Hisce siquidem Lectorem adhorta-
tur: Cum de Cytiso leges, in eius trunci medio
nigrum colorem contineri, Ebeni similem, caue,
de quacunque intelligas, quia non nisi in inue-
teratis, caudicem crassissimum habentibus, par-
tem nigram mediam reperies, quanquam in
adolescente, tenerrimoque adhuc frutice quæ-
siens, non dubium est, quin Cytisus semper tibi
incognita futura sit. Scit esse Cytisum totum
candidum (color enim in herbis ait loci ratione
permutatur) ut non immerito illam Rhamno
Dioscorides comparauerit, hoc tamen habet,
dum in suo natali loco permanet: nam transplan-
tata candidum illum colorem multa ex parte a-
mittit, ut virentem potius, quam candicantem
diceret, quæ nota deperdita sui cognitionem
facile præpedire posset his, qui ex loco id fieri ne-
scierint.

Matth. in Diosc. cum magn. fig. Lat. & in Ital.
Cytisi plantam misit Jac. Anton. Cortulus, legiti-
mam referentem Cytisum omnibus notis, mate-
rie ligni nigra, & Ebeni modo firmissima. Hist.
Germ. & Epit. cum add. Camer. Cytisus, *almon*, Ital.
Cytiso, Germ. Geyßflee.

Dodon. Lat. in fol. Cytisus, ut existimatur.

An Anguill. Cytisus flexibilis, species foliis
albis & lucidis, ut argentum, respondens aliqua-
tenus Barbæ Iovis Plinij.

Lob. Obs. & Icon. Plant. Cytisus Maranthæ &
Matthioli.

Cytisum à Matthiolo exhibitam misit ad Ca-
mer. ut ipse in Hist. Matth. Germ. scribit, Bartolo-
mæus Marantha nomine Cytisi Galeni, ex eo lo-
co cuius etiam meminit Galenus: Tabiis nimi-
rum, non longè Surrento & Vesuvio monte.

Chus. qui in genere Cytisum, Hung. Zausch vo-
cati ait, legitimam Cytisum veteribus descriptam,
cum peritioribus rectè sentit, eam esse, quam

Marantha proponit.

Portæ Cytisi figura intortis siliquis instar ca-
pratum cornu, non in omnibus nobis proba-
tur.

Lignum Rhodium, quod Matthiol. Oliua-
strum, nonnulli Agallochu n vocant, à quampli-
rimis etiam pro legitimo Aspalatho in Theriacis
vulgaratum, non est: neque olez, & multò minus
Aspalathi, sed veræ & legitimæ Cytisi, perouam
similis Cytiso à Marantha descripto, sic ut eun-
dem esse, nunc credat Honor. Bell. & se quoque
errasse deprehendat, quando Cytisum Creticum,
vulgarè vocatum, legitimum fuisse putauit.
Nam differt ab hoc foliis, quæ longiora & angu-
stiora sunt, neque semper vno pediculo terna si-
mul profert, sed quaterna & quina, ut nuper ob-
seruavi, seménque non in siliquis, sed Trifolij
modo profert: Hanc ob causam, non amplius
Cytisum, sed Ebenum Creticum vocandam hanc
stirpem censet. Materies enim ligni plurimùm
ad Ebenum accedit, colore nigro, splendore, &
duritie.

Monendi lectores, nobis valde suspectam
Aspalathum Creticam Alpini, de qua egimus L. 4.
Veremur enim ne huius Cytisi tribuat dotes
Aspalatho, Luculentus accedit testis veram Cy-
tisum iam inuentam esse, Jac. Dalechampius: Is
ita plantam depingit: Cytisus in hortis Francisca-
norum Lugduni visitur, frutex vltimam altus, ra-
mis multus, canis, folio perpetuo sænugraci, flo-
re pisi, luteo, nigris maculis compuncto. Ego
autem nullum inuenio præter Robertum Con-
stantinum, qui tradat vllam Cytisum, flore ni-
gris maculis compuncto: quid si descripsit Cytisi
florem sicum, quem scio interdum nigrescere,
nisi diligenter siccetur: quod autem ait flore pi-
si, dubium mouet, an Maranthæ Cytisum intelli-
gat, is enim valde paruus, quamuis figura pisi
esse dici possit.

Matthiolum cum deprehendisset Cytisum non
herbam, sed fruticem esse Myrti magnitudine a-
pud Galenum legisset, imò inter arbores recen-
seri à Plinio & Strabone inuenisset, Cytisi plan-
tam à Cortulo missam pingendam curauit, quam
legitimum Cytisum notis omnibus referre rectè
putat, ligni materie nigra, & Ebeni modo firmis-
sima, quod de Cytiso Theophrastus & Plinius
tradidit. At non Cytisum, sed Medicæ spe-
ciem esse malè autumant cum Hist. Lugd. quidam
Herbarij.

Tabern. Cytisus cornutus Geshornet / Geyß-
flee.

1. Gerard. Angl. Cytisus 7. cornutus. The hore-
ned shrub Trefoleye.

Marantha hunc fruticem sæpius collegit pro-
pe Neapolim in colle quodam, quâ ad Nesidem
insulam itur. Oritur hic frutex, Honorio Bello re-
ferente, in Insulis Rhodo propinquis, & Rho-
do ipsâ, unde ramos & truncos accepit, frequen-
tius tamen in parua quadam Insula prope Rho-
dum sita, cui nomen Astachida, ubi singulis an-
nis quamplurimi caduntur trunci [mercimoniū
enim non vile est] Rhodumque, & Pathmon, &
Constantinopolim, aliâque loca adportantur. Ra-
mulum primū ex Italia mihi attulit Frater C. Bauh.
ex horto Patavino, à D. Cortulo nominata fue-
rit Cytisus. Ex semine mihi prouenit Monsbel-
gardii in hort. Illust. E. C. VVirtemb. Pforzheimæ
apud insignem Pharmacopœum Grunnigerum
vidi pulchram arbusculam aliquot cubitorum,
florentem & siliquas ferentem mense Octobri,
iam testam ad vitandam hyemis iniuriam, unde
nobis.

Lignum
Rhodium,
Oliuastrum,
Agallochu
Aspalathum.Cytisus Co-
rni.Cytisum
Creticum,
Archeu-
xylon.Ebenum
Creticum.Aspalathum
Creticum
Alpini.
CytisusRobertus
Constantinus.

Matth. 10.

Locum.

Tempus.











to Domini Doctoris Felicis Plateri, & I. Herzmā Pharmacop. ac Argentinae in horto Domini Frederici Meier, à quo habui semina Montbelgardi ferenda in hortum Illust. Excel. Cell. V. Virtemb.

**CYTISI GENVS MISSVM, NO-
MINE EBENI SECUNDI, FLO-
ribus purpureis.**

Descrip.

Virgula.

Folia.

Flores.



FRVTICO-
SAM quan-
dam plantam
Ebeni secundi
nomine dona-
runt Itali, vir-
gulis lentis, te-
ribus, cano la-
rugine pube-
scentibus, per
quas folia cog-
spiciuntur, vi-
cialibus pedicu-
lis appensa, ter-
na, cythorum
modo longa, ac-
uta, villosa, al-
bida. Flores in
spicam dige-
stos, pariter ac
Trifolium maius,
sive cythus

Tragi, gerit, purpurantes, ex folliculo lanugino-
so candicante, in plumatas cuspides definentes,
vnicuique verò folliculo folium subicitur, acu-
minatum: Semen involucre Trifolii bituminoli
clauditur, album, oblongum, ad Miliū vulgare
are dens.

Semen.

Ebeni
Candida.

Josephus Casabona Ducis Florentini hortula-
nus mihi semen, cum hac inscriptione, *Ebeni Can-
dida*. Frutex cythus alter Candia, vel Ebenus
floribus purpureis, in catalogo horu Bemb. Pa-
latini.

Descriptio
Bell.

Folia.

Flores.

De hoc cythi genere existimamus Honor. Bel-
lium hac scribere Epistola ad Clusium. cythus
creticus frutex est totus obliquus, ad quatuor aut
quinque cubitorum altitudinem allurgens: folia
profuit terpa simul iuncta, argentea, Trifolii x-
mula, dorso aliquantulum prominente: flores
Trifolii maioris, adhuc tamen maiores, rubros in
quibus intermixti sunt albi quidam villi, qui Scru-
thiocamelis pennas, easque in minutissimas partes
duplas simulantur, ea ratione flos elegantissimus
apparet: videtur enim ex purpura & argento
quodammodo formatus: succedunt semina Mi-
lio maiora: materies ligni nigra, durissimaque
est, cortex cinereus, & totus profundis scissuris
plenus, oritur ubique in asperis collium lo-
cis & precipitiis, vocaturque vulgò, *apxodgion*,
quod nobile lignum sonat. Hunc fruticem cy-
thum, & fortasse legitimum esse iudico.

Semen.
Materies.

Locus.

Laudandus candor & veritatis studium, stir-
pium diligentissimi & peritissimi Honor. Belli,
dum ait, se errasse nunc deprehendere, quando
cythum Creticum *apxodgion* vocatum, legiti-
mum fuisse putaverit. Nam differre ab hoc folijs,
quae angustiora & longiora sunt, neque semper
vno pediculo terpa simul, sed quaterna & quina,
semenque non in siliquis, sed Trifolii modo pro-
ferre, hancque ob causam non amplius cythum,
sed Ebenum creticam vocandam hanc stirpem
centendam, materiem enim ligni plurimam ac-

cedente colore nigro, splendore & duritie.

Genet. Cheilurus attulit nobis pulchros ramos
cum flore ex Horto Florentino Mag. Ducis He-
truriz. Prius verò semine Florentino à Casabo-
na mihi prouenerat nobis in horto Ill. E. C. Vir-
temb.

CYTISI FACIE ALYSSON

FRUTICANS QUORVM-
dam, Lob.



PER quam pa-
ridm notus
hic perelegans,
& parum fre-
quens exoticus
frutex, nisi cul-
tioribus Belgii
viretis, ubi flo-
ribus luteis
leucois minoris,
Aestate lucet, &
sparsis numero-
sis, anfractuosis
Polemonii stria-
tis coliculis: Fo-
lia cythi habi-
tiora, albida,
hispida, cetaceis
pilis rigida: ra-
dice lignosa, du-
riore: & in folli-
culis semine.

Lob. Obs. & Icon. Plant. vocat Cythi facie
Alysson fruticans quorundam. Tabern. Icon. &
Hist. Cythus adulterinus, Alysson fruticans,
Vermeenter Weissflee. Gerard. Cythus adulteri-
nus, sive Alysson fruticans Bastard (scrub Tree
foile. mst. Lugd. cythus facie Alysson quorun-
dam, Lobelii.

Alysson fra-
ticans.

**TRIFOLIUM FRUTICANS,
QUIBUSDAM POLEMONIUM
flore luteo**



Vario im-
plexu ser-
pens alba, ac
ex pluribus pro-
germinat locis:
vnde inhabita-
tales. extingunt
rami, angulosi,
virides: in qui-
bus alternatim
sarculi surgunt,
folia producen-
tes, lato virore
splendentia, ter-
na ferè, ut in
Trifolij: singu-
lae portiones ad
Rutæ vulgaris
portiones acce-
dunt: sapore in-
grato & seruido.
In ramulorum

extremis, flores oriuntur lasini sive vel Arthri-
ticæ, sive Prunulæ veris, quinquepartiti, lutei:
lis





Color. quorum siu apiculi plusculi emicant, flori con-
siluam. colores. Floribus succedunt siliquæ digitali
 longitudine, pollicari verò latitudine, cartilagi-
 neæ in quibus terna aut quaterna semina, non-
 nunquam plura, satis magna, exiguis phascolis
 similia, tenuis formâ, quæ initio albescent, deinde co-
 lorem purpurascens contrahunt, tandem per
 maturitatem ex cæruleo nigrescent: ut aptissime
 Dioscorides *πικνίδα* dixerit, cum in eodem fru-
 ctu non bene maturo tres differentes colores
 subinde conspiciantur, ut diligenter notauit Clu-
 sius.

Descriptio Anagyris ita describit Marcellus in Dioscor.
Marcelli. Floret Maio & Iunio mensibus grato inter alios
Locus & frutices per silvas spectaculo, multoque flore,
tempus. quem fluum ex longinquo ostendit, prætereun-
Flor. tum oculos facile in se conuertens: & si abesset
 ingratus odor, quo merito spreus, damnatusque
 est, antiquorum coronas primus nobilitasset.
Odor. Fruticosa stirps magis quam arbor est. Nos tamen
 vidimus tonsurâ, putationeque coactam ad legi-
 timam arboris altitudinem crescere. Nullumque
 florente eâ latius spectaculum, aut siluæ, aut agri,
 si fortè confita in eis fuerit, ostendunt. Respon-
 dent autem eius naturæ omnia ea, quæ in Hist. à
 Dioscor. illi tribuuntur.

Anagyris Descriptam plantam existimo legitimam Ana-
Veterum. gyris, Diosc. Plin. Galen. Pauli, Ægyptæ. Ex re-
Error quo- centionibus nonnulli Anagyris duo genera po-
ruindam. suerunt, verum me iudice Bened. Curt. lib. hort.
 rectè alterum ab antiquo (hoc nostro) arborem
 aliam existimauit. Tamen [inquit Clus.] non-
 nulli [ut Matth.] plura Anagyris genera se vidisse
 referant, ego vnicum legitimum quale videlicet
 à Veteribus descriptum est, tantum obseruasse in-
 genne profiteor. Et licet Honor. Bell. se in Creta
 passum, secus vias differentem Anagyrin ab ea,
 quam hic describo obseruasse dicat, quæ rotun-
 diora proferat folia: non tamen ob sola folia quæ
 parum variant, diuersam existimo faciendam,
 cum præsertim exosus odor, & facultates à Vete-
 ribus huic adscriptæ, eandem esse clarè demon-
 strent. Facilius etiam naturæ locus in foliis, quam
 in viribus.

De Creta Pandet. Anagyrin Columbinæ pedis speciem
Indis roma- esse fatetur: sed Dioscoride perlecto, nullam si-
more falso. militudinem habere percepit Braslav. quippe A-
 nagyris folia & virgas Vitis, id est, Agni casti
 habet, Pes verò Columbinus Maluæ foliorum æ-
 mula. Cordo in Hist. addita est figura Tragi, ac
 adscriptum, Tragi esse Fabam inuersam, vel (ut
 alij nominare malunt) scordam.

Pes Colum- Anagyris Turnero ramis & foliis Agni casti I-
binus. tahici: verum folia maiora breuioraque sunt, ter-
Faba in- naduntaxat iuncta, cum Agnus quina semper
uerfa sine coniuncta habeat, odore vehementer foetido.

scordam. Anguill. Anagyris in Apulia vocata *Faba inuer-*
sa & *Faba lupina*.

Faba lupi- An Matthiolo in Diosc. *ἀνὰ γυρί*. Item in post.
na. com. Ital. & Lat. & Hist. Germ. Anagyris maior,
 vel prima: Fructus enim descriptio videtur con-
 uenire. Bellon. Obs. Anagyris: In Creta vulgò A-
 nagyris. Hist. Gall. lib. 6. cap. 66. Græcè *ἀνὰ γυρί*:
 Latin. *Anagyris*, Gallic. *Bois puant*. Idem Hist. Gal.
 Latin. *ἀνὰ γυρί* aut *ἀνὰ γυρί*. Theſ. ling. Latin.
 perperam Anagyrin Eghelo nominat, dum
 scribit: Anagyris herba est, quæ odore tetro pro-
 uerbium peperit, in eos iactari solitum, qui ob-
 futura sibi commouent, vulgò Eghelo. Cast. Du-
 rant. Anagyris, Anagyris maior. Amat. in Diosc.
 Anagyris Galeni.

Lonic. sui non memor, vocat modò *Θευαντε*

bonen & Baumbonen / Lat. *Faba inuersa*: Iam
 alibi figuram aliam habet, appellans *Scind-*
endbaum Anagyrin Acopon Latin. *Lignum pu-*
ridum & quibusdam *Maluam terrestrem*. Sed pro
 suo more omnia confundit, figura non conuenit:
 nomen Maluæ ad quid? licet Pandectarius sit v-
 sus.

Gesnerus hort. Anagyris, quæ & Anagyrus &
 Onogyrus: Anagyris inquit is prope Arelaten
 gignitur, Matthiolo ignota ex sententia Dale-
 champii, ut qui pro ea Laburnum duplex osten-
 derit: Ea etiam quam Bened. Aret. putat Anagy-
 rin Laburnum Plinii est floribus luteis, oblonga
 serie dependentibus, cuius lignum apes fugere, &
 Plinius tradit, & à rusticis Sabandiz audiui. Ve-
 nemis vidi arborem similitè trifoliam, sed diuersa
 foliorum specie, quæ mecum attuli, fortè conge-
 neres fuerint. Nec rectè Anagyris Indica, voca-
 tus fructus Fabiformis secundi generis à quibus-
 dam creditur.

Lacuna de Anagyride nihil habet præter verba
 Dioscor. Figura & cætera pertinent ad Labur-
 num.

Camier. Hort. Anagyris prima Plauto, ut puta-
 tur, Nautea.

Nos sub titulo de Nautea diximus eius de-
 scriptionem ex Paulo Dracone Anagyridi non
 convenire.

Lob. & Pena Adu. Obs. & Icon. PL. Anagyris
 ferida arborens, Anagyris Diosc.

Cæsalp. Anagyrin quam aliqui Faleolariam vo-
 cant, Diosc. describit.

Apud Plinium Anagyras, non multum ab hac
 recedere videtur colyrea apud Theophrast. quasi
 Anagyris quædam magnâ sit, minore tamen se-
 mine.

Hist. Logd. duas figuras habet vnius plantæ,
 sub his titulis, 1. Anagyris Dodonæ, 2. Anagyris
 vera ex agro Arelatensi.

Tabern. quàm bene distinguit à Laburno
 videant lectores, Matthiolum imitatur.

ἀνὰ γυρί Gr. & Lat. dicitur, & *ἀνὰ γυρί*: Clus.
 Herbariorum *Faba inuersa*, quo nomine Venetis
 in Aromatariorum officinis, semen eius ex Creta de-
 latum prostat, Germ. Baumbonen & Germani-
 bonen: Dici etiam potest non præter rationem
Scindendbaum, *Arbor ferida*, ut à Lonicero no-
 minatur, summè enim foetet, unde ortum com-
 mune dictum, *Monere Anagrydem*: Gall. *Bois puant*:
 Ital. *Anagyris*, & *Faba lupina* Lob. Possit Angl. ap-
 pellari, ait Turn. Beane trifolys.

Anagyrin in hortulo [Tiguri] colit folio forti-
 do. Turn. Anagyrin in Anglia, quod sciat, non vi-
 dit. Ex semine (quod dederat Theobaldus No-
 blot Pharmacopæus Gener meus) natam alus
 Montbelgardi quæ primo anno excreuit ad
 cubitalem altitudinem. Vbi aliquot annis durauit,
 tandem gelu confecta perit. Vidi Monspelii, Ti-
 guri apud præceptorem Gesnerum: item Patavij
 Febuario & Martio virentem, apud Vlysses Al-
 drandum cum siliquis. Primum omnium hunc
 fruticem nascentem Clusius inueniebat primò ab
 Arelate lapide, saxoso quodam colle, qui dicitur
 D. Antonij, monente D. Guillelmo Rondeletio.
 Deinde frequentem circa Hispalim totius Beticæ
 Emporium celeberrimū, tum etiam ad Mundam,
 Malacam & Valentiam. Floret isthic Ianuario &
 Febuario, æstate semen maturescit. Huius por-
 rō ligni matrix siue cor, non nigricat sed nonni-
 hil potius pallescit. Bellonio ingredienti hortum
 simplicium Pontificis Romæ, Anagyris sit obuia,
 quam Scipio Pontificis Simplicista in Beluedero
 habet.

semine natam aluit, & ex illa integram septem construxit.

Vires.
Tumores.
Partum.
Menses.

Tenera siue recentia eius folia trita, inquit Dioscorides, tumores illitu reprimunt: si partus hæreat, & secundæ mensēque morentur drachmæ pondere sicca bibuntur in passo: sic & suspensio dantur & contra dolores capitis in vino, amuleti etiam instar difficulter patientibus adalligantur, sed à partu statim auferri oportet. Radicis cortex concoquendis discutiendisque adhibetur. Semen commanducatum vomitiones vehementer cit. Hæc Diosc. In quibus verba ista, Radicis cortex concoquendus &c. aliter vertit Ruellius quàm Græca significant: *ἡ ῥίζη χυλὸς διασφί, καὶ ἰσχυρὸς*. Id est radicis succus, discuit & concoquit. Plinius: Folia collectionibus imponuntur, difficulterque patientibus adalligantur, ita ut à partu statim auferantur. Quod si foetus emortuus hæreat, & secundæ mensēque morentur, drachmæ pondere bibuntur in passo folia. Sic & suspensio dantur, & in vino vetere ad phalangiorum morsus. Radix discutiendis concoquendisque adhibetur. Semen commanducatum vomitiones facit. In his Plinius in quibusdā à Dioscoride dissentit: illi enim radix, huic radicis succus discuit & concoquit: Galeno & Oribasio radicis cortex, nisi quis dicat quod Plinius simpliciter de radice, Galenus de radicis cortice dixerit, fieri posse, ut in Dioscoride cum Ruellio *ἡ ῥίζη φανερὸς* & non *ἡ ῥίζη χυλὸς* legendus sit. Quod verò sequitur multo maioris est momenti: In vino vetere folia dari ad phalangiorum morsus Plinius ait, Dioscorides *πρὸς τὴν κεφαλῆς* id est ad capitis dolorem in vino, ita ut vox *κεφαλῆς* pro voce *κεφαλῆς* in Plinio supposita sit, aut in Dioscoride pro *κεφαλῆς* voce, *τὴν κεφαλῆς* legere oporteat. At certe verisimilius est [ut testis est Corn.] in Dioscoride *τὴν κεφαλῆς* pro *κεφαλῆς* legendum esse. Quid enim Anagyridis folia quæ subacta sunt, excalefacientis ac incidentis facultatis, ad capitis dolores valere possunt? Proclivius quidem fuit, ut vox *κεφαλῆς* in Diosc. pro *τὴν κεφαλῆς* supponeretur, quàm ut Plinius *τὴν κεφαλῆς* pro *κεφαλῆς* verteret.

Galenus de Anagyridis natura hæc scripsit. Anagiris frutex est graviter olens, & digerentis excalefacientis ac incidentis facultatis. Sed folia etiamnum virentia cum propter humiditatis admissionem minus sint acia, idcirco tumentia reprimunt. At resiccata incidentis sunt, excalefacientis ac incidentis facultatis. Similem ferè facultatem habet radicis cortex. Semen autem est magis subtilium partium. Sed & vomitum provocat. Eadem omnino Oribasius quoque habet. Alph. emp. ad dysuriam Anagyridis grana triginta septem cum cōdito à balneo pota commendat. Sed si semen vomitum mouet, ut facili crediderim, quis exhibeat triginta septem grana ad dysuriam, ego tantam quantitatem experiri nolim, alterique experimētum committere malim. Si præterea Onogytos Nicandri est idem cum Anagyride, ut aliquos vellem antè ostendimus, ea à stratis arcebit serpentes. Per Onogytum tamen, ut dictum, non videtur intelligi Anagiris: non negarim propterea eam aduersari venenatis animalibus: scribit enim Ægineta in genere suffitum graveolentium valere ad præseruandum à venenorum eiulantibus animalibus. Accidit interdum, ut Capræ & oves in Creta fame vexatæ huius folia depascant, licet odoris sit ingratiissimi, & postea ex harum lacte caseus conficiatur: quo si fortè ignarus aliquis vescatur, aut lac bibat, statim excidentur tum vehe-

Dysuria.
Alph. Emp.
potat.

Contra Ge.
venenata
animalia.

mentissimi vomitus, tum fluxus ventris, & cum hoc æpissimè accidat, multi in disorimen vitæ veniant: quam ob causam frutex hic omnibus sit exolus.

Vomitus.
Fluxus ventris.

CYTISVS IN GENERE.

CAP. III.

IN tanta Cytisi varietate in genere ex Veteribus & Neotericis pertractandum.

Cytisum igitur Theophrastus ad cō insensum [χαλκω] ceteris esse plantis ait, ut subrepto alimento ferè omnes enecet: eiusque medullam tam duram esse ac spissam, [quod *Artum* cognominent,] ut proximè ad Ebenum accedere videatur. Frutex [ἄμυγ] est autore Dioscoride, albus in totum, velut Rhamnus [ῥάμνος] ramos producens cubitales & maiores: folia Fœnugræco aut Loto Trifolio [τρίφυλον ἢ λοτὸν τετραλόλον] similia, sed minora, & maius dorsum habentia, quæ dum digito conteruntur Erucam [ἑρῦκα] redolent, in gustu verò Cicer viride [ἰσχυρὸν χαλκω] referunt. Folia vim habent refrigeratorem, [ὑποκρύπτειν], addit Lac. & *σποτύλιον* gustu adstringentem ac oedemata inter initia discutiunt, si cum pane trita illinantur. Eorum quoque decoctum vrinam potui ciet. Ceterum, nonnulli, quod Apes alliciat, cum propè Alvearia tetunt. Frutex Cytisus ab Aristomacho Atheniensi, ut videre est apud Plinium, [qui eadem ferè cum Varrone & Columella tradit, ex quibus sua sortè desumpsit] miris laudibus prædicatus pabulo ovium, aridus verò etiam suum. Utilitas [ad valetudinem & suginam Dal.] quæ Erucæ, sed ocyor satietas, perquam modico pinguescente quadrupede, ita ut iumenta hordeum spernant. Non ex alio pabulo lactis maior copia, aut melior, supra omnia pecorum à morbis omni usu præstante. Quin & nutribus in defectu lactis aridum, atque in aqua decoctum, potui cum vino dari iubet [inuatur, & M.] firmiores, celerioresque tradens infantes fore. Viridem etiam Gallinis, aut si aruerit, madefactum. Apes quoque nunquam defore Cytisi pabulo contingente, promittunt Democr. & Aristomachus. Nec aliud minoris impendij est. Seritur cum Hordeo, aut Vere [Eruc Dal.] semine, ut Porrum *ἑρῦκα*, [ramo Pomum malè vertit Plin.] vel caule Autumno ante brumam. Si semine madidum, & si desint imbres, situm spargitur [rigatur quindecim proximis diebus Colum.] Plantæ cubitales transferuntur scrobe pedali. Seritur per [post vet.] æquinoctia tenero frutice. Perficitur tritico. Demetur verno æquinoctio [nam tota Hieme floret, Dal.] cum florere desit, vel pueri, vel ands vilissimæ operæ. Canus aspectu [vtraque Cytisus: est enim sativa & altera suæ sponis, Colum.] breviterque si quis similitudinem exprimere velit, angustioris [amplioris vet.] Trifolij frutex. Datur animalibus post biduum semper. Hieme, madefacti [aridum enim maiores vires habet, & nimis satiat] satiant equos denz libz, & portione minora animalia: obiterque inter ordines Allium & Cape feri fertile est. Inventus hic frutex in Cythno insula, inde translatus est in omnes Cycladas, mox in vrbes Græcas, magno casei proventu: propter quod maximè miror rarum esse in Italia. Non æstuum, non frigor, non grandinum, aut nivis inturiam expavescit. Adicit Higinus, ne hostium quidem, propter nullam gratiam ligni. Galenus etiam lib. de An-

Theophr. de
Cytis.
Medulla
Ebena.
Diosc. de
Cytis.
Rhamnus
fruticosa.
Diosc. de
fruticosa.

Odor Erucæ.
Gustum Ciceris.
Vires & v. sus.

Diosc. de
Cytis.
Aristomach.
Oedemata.

Vrina.
Apes.
Plin. Cytisus.

Sanguis.
Quam pabulum.
Plin. suginam.

Fruticosa.
Viridis.

Apes.

Sativa.

Plin. arbor.

Colum.

Tempus.


Trifolij facies.
Eubendi ratio.

Locum.

Rarus in Italia.
Cytisus.



Siliqua.

Marantha
descriptio.Altera
Myrti.
Folia.Oder Er-
ta
Gustus.
Flos. Color.

quos sequuntur
siliquae pulchrae,
late circumscis-
sae.

Maranth. in
hunc modum
describit: Cytis-
us frutex, totus
candidus est,
eam altitudinem
attingens, ad quam
Myrtus crescit.
Folia singulis pe-
diculis terna, sed
ramulosa profert
[quod Plinius
expressit], quae si
digitis terantur,
odorem Erucae
proximum, gu-
stata verò Cicer
recens emulatur.

Florem recludit in ramulorum cacuminibus la-
tum, aspectuque pulcherrimum, colore luteum,
sed saturato, quemadmodum quae pro Caltha o-
stendi solet, & arantiorum cortex. Siliquas pro-
ducit contortas, una & nonnunquam pluribus
spicis, paruas, in quibus semina parua, vix ineun-
te aestate maturefcentia. Caudex nigrum cor re-
tinet, Ebena simillimum, Vastacietra ab artifici-
bus nuncupatum.

Quod verò Cor retineat Cytisus nigrum, ar-
bitratur Marantha euenire ratione vetustatis,
hocque Veteribus, sicuti & multa alia, incomper-
tum fuisse: Hicce siquidem Lectorem adhorta-
tur: Cum de Cytiso leges, in eius trunci medio
nigrum colorem contineri, Ebena similem, caue,
de quacunque intelligas, quia non nisi in inue-
teratis, caudicem crassissimum habentibus, par-
tem nigram mediam reperies, quanquam in
adolescente, tenerrimoque adhuc frutice quae-
sientis, non dubium est, quin Cytisus semper tibi
incognita futura sit. Scit esse Cytisum totum
candidum (color enim in herbis aut loci ratione
permutatur) ut non immerito illam Rhamno
Dioscorides comparauerit, hoc tamen habet,
dum in suo natali loco permanet: nam transplan-
tata candidum illum colorem multa ex parte a-
mittit, ut virentem potius, quam candicantem
diceret, quae nota deperdita sui cognitionem
facile praepedire posset his, qui ex loco id fieri ne-
scierunt.

Matth. in Diosc. cum magn. fig. Lat. & in Ital.
Cytisi plantam misit lac. Anton. Cortulus, legiti-
mam referentem Cytisum omnibus notis, mate-
rie ligni nigra, & Ebena modo firmissima. Hist.
Germ. & Epit. cum add. Camer. Cytisus, ximon, Ital.
Cytiso, Germ. Geyfflee.

Dodon. Lat. in fol. Cytisus, ut existimatur.

An Anguill. Cytisus flexibilis, species foliis
albis & lucidis, ut argentum, respondens aliqua-
tenus Barbae Iovis Plinij.

Lob. Obs. & Icon. Plant. Cytisus Maranthae &
Matthioli.

Cytisum à Matthiolo exhibitum misit ad Ca-
mer. ut ipse in Hist. Matth. Germ. scribit, Bartolo-
mazus Marantha nomine Cytisi Galeni, ex eo lo-
co cuius etiam meminit Galenus: Tabiis nimi-
rum, non longè Surrento & Vesuvio monte.

Clus. qui in genere Cytisum, Hung. Zanzib vo-
cati ait, legitimam Cytisum veteribus descriptam,
cum peritioribus rectè sensit, eam esse, quam

Marantha proponit.

Portae Cytisi figura intortis siliquis instat ca-
pratum cornu, non in omnibus nobis proba-
tur.

Lignum Rhodium, quod Matthiol. Oliua-
strum, nonnulli Agallochum vocant, à quamplu-
rimis etiam pro legitimo Aspalatho in Theriacis
vulgaratum, non est: neque olez, & multò minus
Aspalathi, sed vera & legitima Cytisi, perquam
similis Cytiso à Marantha descripto, sic ut eun-
dem esse, nunc credat Honor. Bell. & se quoque
errasse deprehendat, quando Cytisum Creticum,
v. g. nigrum vocatum, legitimum fuisse putavit.
Nam differt ab hoc foliis, quae longiora & angu-
stiora sunt, neque semper uno pediculo terna si-
mul profert, sed quaterna & quina, ut nuper ob-
seruavi, seminaque non in siliquis, sed Trifolij
modo profert: Hanc ob causam, non amplius
Cytisum, sed Ebenum Creticum vocandam hanc
speciem censet. Materies enim ligni plurimum
ad Ebenum accedit, colore nigro, splendore, &
duritie.

Monendi lectores, nobis valde suspectam
Aspalathum Creticam Alpini, de qua egimus l. 4.
Veremur enim ne huius Cytisi tribuat dotes
Aspalatho, Luculentus accedit testis veram Cy-
tisum iam inuentam esse, Jac. Dalechampius: Is
ita plantam depingit: Cytisus in hortis Francisca-
norum Lugduni visitur, frutex vltimam altus, ra-
mis multis, canis, folio perpetuo saenugraci, flo-
re pisi, luteo, nigris maculis punctato. Ego
autem nullum inuenio praeter Robertum Con-
stantinum, qui tradat vltimam Cytisum, flore ni-
gris maculis punctato: quid si descripsit Cytisi
florem sicum, quem scio interdum nigrescere,
nisi diligenter siccetur: quod autem ait flore pi-
si, dubium mouet, an Maranthae Cytisum intelli-
gat, is enim valde parus, quamvis figura pisi
esse dici possit.

Matthiolum cum deprehendisset Cytisum non
herbam, sed fruticem esse Myrti magnitudine a-
pud Galenum legisset, imò inter arbores recent-
iori à Plinio & Strabone inuenisset, Cytisi plan-
tam à Cortulo missam pingendam curauit, quam
legitimum Cytisum notis omnibus referre rectè
putat, ligni materie nigra, & Ebena modo firmis-
sima, quod de Cytiso Theophrastus & Plinius
tradidit. At non Cytisum, sed Medicæ spe-
ciem esse malè autumant cum Hist. Lugd. quidam
Herbarij.

Tabern. Cytisus cornutus Geshornet / Geyff-
lee.

I. Gerard. Angl. Cytisus 7. cornutus. The borne
ned shrub Trefolyc.

Marantha hunc fruticem saepius collegit pro-
pe Neapolim in colle quodam, quæ ad Nesidem
insulam itur. Oritur hic frutex, Honorio Bello re-
ferente, in Insulis Rhodo propinquis, & Rho-
do ipsa, unde ramos & truncos accepit, frequen-
tius tamen in parua quadam Insula prope Rho-
dum sita, cui nomen Astachida, ubi singulis an-
nis quamplurimi caduntur trunci [mercimoniū
enim non vile est] Rhodumque, & Pathmon, &
Constantinopolim, aliisque loca adportantur. Ra-
mulum primū ex Italia mihi attulit Frater C. Bauh.
ex horto Patavino, à D. Cortulo nominata fue-
rit Cytisus. Ex semine mihi prouenit Montbel-
gardii in hort. Illust. E. C. V. Virtemb. Pfezheimæ
apud insignem Pharmacopœum Grunnigerum
vidi pulchram arbusculam aliquot cubitorum,
florentem & siliquas ferentem mense Octobri,
iam tectam ad vitandam hyemis iniuriam, unde
nobis.

Lignum
Rhodium.
Oliuastrum.
Agallochum.
Aspalathum.Cytisus bo-
na.Cytisum
Creticum.
Archaeum.
xylon.Ebenum
Creticum.Aspalathum
Creticum
Alpinum.
CytisusRobertus
Constantinus.

Matthiolum.

Locum.

Tempus.















nobis non placet: eo quod siliquas Sennæ tumidas fuisse aut esse, animaduertere hactenus nobis non licuerit.

Candido, in fastigiis & viola adsumili emicante est flore qui in nigras abit, & incuruas instar Genistæ siliquas: Semine abundantum lato, ac incano, quod à me, inquit Tragus, aliquando satum, plantulas Sennæ protulit.

Locus.

Sena alioquin ex Italia in Germaniam magna in copia deportatur, nam in illis regionibus sicut & in Gallia sponte sua gignitur, præstantissima vero ex Alexandria deferretur. Ea luteos profert flores, alteri vulgari similes. A Theophrasto descripta est, Liparæ peculiarem speciem asserente. Quod vero quidam Senam Delphinium, seu Alypon, aut Peplium Dioscori esse dicit, tene, nihil uemouet, quominus Sennam cum Ruellio Coluteam Theophrasti cum Euchar. Rostk. esse statiam. Galienus hanc *Sagaren* adier vocans *Serap. Habbanisa*, Mesue *Albazemer*, A tu minus fructum siliquosum appellat. Ex his autem Tragi verbis satis apparet eum in seculis Coluteam cum Sena. In Gallia an proueniat nescio, nec in eadem aliud nomen habet quam Sena. Præterea italicam ab Orientali distinguit floris colore: vni namque candidum, alteri luteum siliqua tribuit, quæ distinctio an sit vera considerandum.

Delphinium.
Alypon.
Peplum.

Trag. repro-
batur.

Delphinium.

Non deesse autem qui Senam Mauritanis vocitam Delphinium esse credant attestatur Matth. quorum ingratum error euident. Constat enim Sennæ Mauritanicæ folia sapore Fabarum esse prædita: flores ei emicant aurei, veluti Brassicæ, purpureis intercurrentibus venulis: quibus succedunt folliculi falcati in quibus semen continetur in nigro subuirescens.

Ruell. Senam eam arborem esse existimuit, quam Theophrast. Coluteam appellat & *magnus error putauit Senam non herbam esse, sed arborem.*

Sena Alexandria.

Ceterum è Sena, ea magis præstat, quæ ex Alexandria Egypti vel ex Syria afferatur: quæ de Sena cõmuni & viliori sentire, quæ minor & efficacior est Alexandrinæ, Gesner. hort. Marantha dicit. Si Dioscor. vult Delphinii folia Delphinorum effigiem representare, reprehendendi sunt, quia Senam Arabum Delphinium esse credunt, quia folliculos, habet contortos Delphinorum effigie: quæquam minus culpandi sunt, qui eundem Delphinium plantam esse volunt, quæ Consolida regalis vulgò dicitur: quæque à Fuchsio pro Eranthemone depingitur: hi enim contextum tantum deprauatum ita emendant, vt Similitudo [Delphini ad flores referatur:] delphini ad flores referant, non ad folia. Verum illi nullo pacto contextum immutantes, quod foliis tribuendum est, folliculis tribuunt, neque aduertunt florum colorem non purpureum, sed luteum Senam habere, nullamque ex aliis rebus adesse, neque facultates respondere. Senam ergo Arabum, qui volunt esse Delphinium, Delphinorum effigiem ad folliculos non ad folia, vt Dioscorides deducunt.

Sena non est Delphinium.

Exandres.

Manifestus error volentium Senam esse Theophrast. Coluteam, quæ arbor est, cum Sena herba sit, quæ seritur, non vltra annum restitibilis.

Senam nonnulli apud Io. Agricolam Alipon Dioscoridis, quidam Empetron, Marcell. Delphinium indicat, Sefondron à quibusdam cognominatum quoddam hominem sospitet. Verum nec Alypon, nec Empetron, nec Delphinium est.

Sena ab antiquis nunquam descripta est, nam & Auertroes nouam herbam esse adstruit, & præcisignotam. Si apud Dioscor. lib. 3. capite de

Androsace legèdum est *Androsace*, nihil aliud monstrare posse existimat Anguill. pro Androsace quam Senam vulgarem Lob. & Penz. *Androsace* placet ab Arabum Alba sentire, Sennæ detortam esse dictionem.

Senam Officinæ potius è fundo vernaculo, nēpe Orientis emporia, petunt, eamque plurimū ciunt, quam italicam, duas autem foliorum distentiones aut varietates habent inter se à distictis plantis Sennæ: probitius & laudatius ad purgationes (*Finnam* vocant) est oblongius, acutus, Myrti maioris effigie: alterum rotundius, prectiosius, quod vilius habetur: non secus atque Myrtus maior & minor, foliis videntur hæc duo inter se distare, vt præstantius sit folium domesticæ: alterum lyuestris Sennæ. Ad perscrutandum autem alterutrum datum esse siliqua multum spai illa iteroris caprini aut ouini faciunt, quæ frequentior inter Sennæ Orientalis folia folliculos & quilibet passim ad nos allata reperiuntur, vbi emporiis prostant: sentitur namque & adolefcit probatior in simeto, quillo inibi. Flores expallido luteo sunt, rubelli veltigis venosi, graciles caules pedem & sesquipedem alti. Arabum & Aduarii Sena *Senæ* & *Sylæ*. Nescimus quæ de re Anguillæ Senam & Cassicham hanculat &c. Obliquior videtur Lobelius in distinctione Sennæ: nobis vero sit verisimile Senam domesticam maiorem esse siliuolam laudat tamen eam quæ tenuiori folio, quæ crediderimus minorem Florentinam, quæ tantopere quidem animaduertere potuimus. Tab. & Gerard. *Sena Orientalis*, Item *Sena Sylæ* semine paulo nigrore, quam Alexandrinæ, facultate etiam imbecilliori. Senam italicam annuam esse plantam Camer. hort. scribit, ac folia postea contrahere, sicut multa alia eius generis leguminosa: Alexandrinam ne quidē in Italia vera annum dura, ideoque pro frutice haberi non posse. De Sena item quidam Galeno Metuen adscribere, quæ ille ne somniaserit quidem.

Porro apud Matthioli. Germ. *Senæ* esse species: Sena tradit, atque vnam dici *Orientalis* aut *Alexandrinam*, folio longiusculo Myrto ferè simili: Siliqua crassiuscula, semine multo albidior quam in aliis: quæ torsiones minis excitat quam italicæ: Eamque rursus duplicem *Mechinam*, ex *Mechina* delatam, præstantissimam folio longiusculo, angustio nonnihil acuto & crassiusculo colore ex luteo virenti: Alteram denotinatam à loco vbi proueniat *Serra*, quæ paulo viliori pretio vendatur, nec præcedentis bonitatem assequatur, melior tamen sit *italica*, folio latiore & rotundior, re, ac semine nigricante: Sena si simpliciter scribatur assumenda folia & siliquas. Is duas habet figuras: prior est qualis nostra Fuchsiana foliis rotundioribus, quam vocat Senam vulgarem, altera, cui titulus est *Sena Alexandria*, cui folia sunt acuta: verum differt ab omnibus figuris, quas hactenus vidimus, ac ipsius Tabern. in fine enim pediculorum folia sine striâ pinguntur quæ Cordus Sennæ denegat: Nos tamen pingimus Sennæ ex hinc pro Orientali, & folium dictum pro Sena Florentina.

G. Baub. apud Matthioli. Sena duplex est, vna rotundifolia, altera acutioribus foliis.

Planta, autem Matthioli effingoris impatientissima: ob idque feri vult Maio nec vltra Autunnum perdurat, siquidem (ut pluries expertus sum) pridè sata facillè frigore deperditur, lenius verò Hyemem similiter non tolerat. Seritur vt vult Dodon. in Syria & Aegypto: item in Italia, Prouincia, ac Narbonensi Gallia. Apud Germanos & Belgas

Androsace
Sena vult
dicitur

Sena diffi-
rentia.

Senæ

Sena Ori-
entalis.

Anguillæ
causatur.
Cassichæ.

1.
2.
Sena Italica.

Alexandri-
na.

Mesue
nata.

Alexandri-
na.

Sena ex-
lat.

Mechina.

Serra.

Sena simpl.

Locus &
tempus.



vellet exspectare maturitatem, caderent prius omnia folia, & si aliqui folliculi habentur maturi, sunt certe illi tantum quos reliquerunt pro noua semente.

Sena triplex usus.
Dosis in sub-
stantia.

Sena triplex usus: vel n. Foliorum eius pulvis ad drach. ij. exhibetur. Fallop. exhibet puluerem foliorum Senae, vna cum Cassia optima cum succellu à duobus scrupulis ascendendo vsq; ad quatuor: vel in vino aut alio conuenienti liquore folia à drachmis tribus, ad vnciam semis per noctem macerata propinantur. Mirum, inquit Brissav. anno 1538. Caninam appetentiam Ferratiz fuisse morbum Epidemicum, & potius fuisse ex atra bile, os ventriculi occupante, quam ex acida pituita. Omnes autem quos curavi [fuere autem non pauci] ex infusione Senae sanitati restituti sunt. Vel denique ex his decoctum cum vnc. 7. paratur. Qui difficilem habent aluum nec minus raro constipatam, ij decoquunt fol. Senae vnc. 5. cum prunis & passulis. Huius decoctionem lumant, aluumque lubricum continuo habebunt.

Appetentia
canina.

In infuso-
ne.

In decoctio-
ne.

COLUTEA VESICARIA.

Descript.

Materia.

Cortex.

Silva.



Flora.

Matt. no-
tatur.
Folliculi.

Matt. ca-
notatur.

Colutea nostris regionibus arbor est culta, non magna, in multos ramos diuisa, materie serè Sabuci, duriore intus non medullata, sed caua, cortice gemino, exteriori cinereo, interiore viridi vestita: folia multa, nouem vel vndecim ad costam vnam aligata, vt plurimum opposita: glycyrrhizæ, Hedysari, aut Senae modo, sed Senae

foliis molliora, rotundiora, nec in acutum mucronem desinentia, supernè glabra magisque viridantia, infernè albiora, & hirsuta, gustu amaro: flores ex longo pediculo multi, vt in Pisis & Cicerculis, crocei, formà similes praedictorum floribus & Genistæ angulosæ ac rotundæ, non quinquepartiti, vt olim pingebantur à Matthiolo: quibus decidentib. succrescunt folliculi membranei, pellucidi, interdum rubentes, spiritu veluti quodam distendentes, turgidi, ita vt pressu digitorum cum crepitu, eliso aëre, dissiliant: in quibus continentur semina ad folliculi suturam tanquam costam, quæ maturo semine dehisce, pediculis breuib. appensa, formà renis, ante maturitatem, lutea, sapore Fabarum seu Pisorum, per maturitatem minora, Lentesc. xanulantia quodammodo, minora tamen, nec ita rotunda, nigra serè, dura, compressa, lacunà in medio praedita, saporem pristinum retinentia: amaritudinem in eis non sentimus vt perhibet Matthioli.

Nostram Coluteam Theophrast. esse, quam describit hist. lib. 3. cap. 17. Adhuc asserere non ausim, nec sit mihi verisimile oues ex fructu pinguescere, (quod voluit Theophrast.) si semen vomitiones cit [vt affirmat Matthioli.] & folia pur-

gent. Quæ Theophrast. de Colutea scripsit, iam antè tradita sunt. Ruellius Coluteam cum Sena confundit. Idem etiam facit Tragus: Senam tamen melius nouit. Fuch. Colutea officinis innotuit. Germani Welschlinfen appellant. Galli Baguenaudier. Differt à Sena magnitudine, siquidem maior est, vt pote quæ quadrennio Theophr. teste se in arborem efferat. Ac etiam quod siliquæ illius magis turgido spiritu distendantur.

Matthioli. in Dioscor. attestatur lib. 3. cap. 70. Ruellium deceptum Senam eam esse arborem existimare quam Theophr. Coluteam appellat: ratum verò esse Senam non herbam, sed Arborem, Coluteam vocatam, & easdem plantam esse: Fuch. sium plantam hanc non. Colyteam sed Coluteam à suo se errore vindicantem, appellandam censere, & rectè quidem suo iudicio: nam Colyteam longè aliam esse ab illa Theophrast. teste. Ceterum non deesse qui sibi persuadeant atque etiam scriptis tradant [vt Gesnerus in lib. de quadrup.] se Cytisum vidisse, legisseque in Italia in silvis aliisque silu. locis: Sed quantum ex eorum scriptis colligi possit, eos decipi. Ac Gesnerum, cum scribit ex autoritate Democriti Cytisum apibus aduersari, non esse memorem eorum quæ paulo ante asseruit. Art. in Hist. Germ. Colutea Theophrasti Schaffinsen, non est Sena vt

quidam Neoterici existimant: circa purgati- cem facultatem hæret, quam ei attributam putat ab is qui Sennam putabant. Colutea arbor est, quam nonnulli rei rusticæ scriptores, Alburnum appellant: Itali verò & nonnulli Hispanorum, Aorna vocant, quam quum primò vidit Amatus, Senam esse putauerat: Sed quum postea Senam herbam, & non arborem esse deprehendit, ab ea discessit opinione: Non definit tamen vnum fateri quod Colytea à Theophrasto descripta Sena magis videatur, quam Colutea conuenire. Matthioli. in Apol. Amatum reprehendit, Alburnum plantam non esse, sed partem tantum arboris, teste Plinio Colyteam utramque Theophrast. arborem esse, non herbam. Lonic. titulo, Senet/Theophrast. Colutea, Welschlinfen, malam iconem habet. Gesn. hort. Colutea Theophr. quorundam, nonnullorum Sena syluestris, quam non rectè Germ. quidam vocant Verbrüte Buchle. Senam sylu. vocare mauult: non quod verè gentilis sit Sena, sed quia magnam in foliis ac vmbis similitudinem habet: soluit enim aluum paulo minus efficaciter, quam ipsa Sena. In Cat. pl. Cytisus, Basileæ dictus frutex Verbrüte Buchle. Colutea arbor Theophrast. vulgò Sena, vt placet Ruellio, Trifolium maius &c. Et de coll. plant. Colytea Fuch. Sed vel solum nomen Trifolii satis demonstrat Plantam de qua hic agitur non esse Cytisum. Dodon. Hist. Gall. Theophrasti Colutea Lat. Cytisus, vt Columellæ, Varroni, Palladio, & Virgilio, Gallis Baguenaudier. Germ. Welschlinfen/Belg. Lombaertschlinfen / à quibusdam ignaris, Senetbaum. Hist. Lat. in fol. Colutea Theophrast. Falluntur qui Semen esse rentur. Prior figura Dodonzi ex Fuch. in postremis non astringit Cytisum, vt olim faciebat, & bene. Levin. Lemn. l. 3. de occult. nat. cap. 9. Sena. Nec magis Theophrast. Colutea arbor Liparæ peculiaris potest esse vulgaris Sena, ait Robert. Const. apud Amat. quam vocamus etiam Baguenaudier, quia hæc frutex humilis est, illa verò arbor procera.

Idem in Lexico Colutea arbor est quam vulgò Baguenaudier vocamus. Ratio Constantini quæ reicit Coluteam non nobis satisfacit: magna expe est varietas plantarum pro ratione locorum vbi

Ruellius en-
ter.

Ruellius en-
ter.
Sena.

Cytisus.

Cytisus.
Fuch. sine
alburnum.

Orfuerus
notatur.
Cytisus.

Vires.

Alburnum.

Aorna.

Sena.

Colutea
Amatus ar-
bor.

Sena sylu.

Cytisus.

Gesnerus
notatur.

Cytisus.

Theophr.
corrigimus.





COLUTEAE PARVA SPECIES, POLY-
GALA VALENTINA CLUS.Descriptio
Virgulae.

Folia.

Flosculi.

Siliqua
Icon.Clus. de
scriptis.Virgula
Folia.

Flores.

Siliqua
Semen.Polygala 2.
Clus.Polygala
Coronilla
del Rey
Melilotus
de Murcia.Corona re-
gia.
Colutea
minima.

MINOR est Scorpioides de Colutea nostrati, duris, lignosisque virgulis, crebris veluti geniculatis: foliola quoque minora multis numeris, crassa, tribus, duabusve coniugationibus disposita, imparitatem faciente extremo coliculi fastigio, flosculi circumscissiles. Corollam imitanti, ut in Meliloto nobili Tragi, dimidio minores,

crocei. Siliquae Coluteae Scorpioidis angulosae, geniculatae, breviores: figura à nobis posita est ex Guar. quae quodammodo exprimit plantam à nobis descriptam: non tamen in omnibus placet, quia in ramos non diuisa: putamus eandem cum Clusii Polygala Valentina prima & secunda. Prima sic descripta: Cytiso subiaciunda est elegans planta, quam nusquam alibi, quam in Hispania observavi. Fruticosa est haec planta, bipos palmos alta, multas ferens virgulas lentas, sparsae aut tunc instar: folia singulis costis inhaerent impari plerumque numero, quina, septena, aut plura, Lenticulae similia, magis tamen carnea, & ad Rutae colorem accedentia, adstringentia & ingrati gustus: flores Meliloti similes, lutei, coronae in modum, summi virgulis [quae magna ex parte nuda sunt, & maturo semine exarecere solent] insident: incurtae, deinde, longae & teretes succedunt siliquae, tribus aut quatuor internodiis distinctae, quae semen continent durum, oblongiusculum, nigrum, ingrati saporis: radix longa, dura, lenta, crassiuscula est. Polygala secunda huic admodum similia est, maioribus virgis, firmiter, & utraque rubentibus, maioribus etiam viridioribus, frequentioribus & carnosius foliis: maioribus & dilutioris coloris floribus: siliquis etiam paulo crassioribus: semine vero omnino simili.

Clus. Hist. & Hist. post. Polygala Valentina r. Salmanticensibus Coronilla del Rey vulgo appellata, quali Sertima regia, quae istis Officinae Meliloti vice utuntur, Granatensibus & Murcianis Lenticula, id est Lenticula dicta, Valentinis Polygala appellata.

Lob. Observ. Coluteae Scorpioidis varietas: Colutea Scorpioides coronata: Coronilla del Rey Hispanorum: A superiore [intellige vulgarem Coluteam Scorpioidem] non nisi exilitate, & floribus speciosioribus, hilarioribusque corollam fertulamque auream effigiantibus differens, unde Hispanis Corona Regia dicta fuit: Belgij hortis cultioribus frequens. Item Obs. & Icon. Plant. Coronella siue Colutea minima Polygala Valentina prima Clusii, surrectis foliis, Rutulae coloribus, alioqui assimilis ceteris [Coluteae Scorpioidis] spithameo cauliculo Belgis hortensis.

Effigiem suae 2. Clusius non habet, nec etiam Lob. cui prima est.

Nostra figura, respondet aliquomodo primae Clusii, seu minimae Lobelii, ambo enim eandem habent. Tabern. Icon. & Hist. Colutea Scorpioides 4. minor. Et Polygala Valentina Clusii. Duas figuras planè similes ponit Tabern. nec scio quid in re differant nisi quod vni subiungit portionem veluti trunci, prior planè imitatur figuram Clusii, cui tamen alium imposuit titulum. Existimo vñus plantae duas factas icones ex Clusio, quod animadvertens Compiler, ut videretur aliquid scire, diuersas fecit plantas & duobus diuersis capitibus posuit. Gerard. Colutea minima siue Coronilla. Item Colutea siue Polygala Valentina Clusii. Gerardus imitatur Compil. Tabern.

An Ponz in Baldo Lotus enneaphyllon Dalechampi, quo multi ex Pharmacopoeis Veronensibus pro vera Meliloti utuntur. Optarem videre Melilotum hanc Ponz: Lotus enneaphyllon Dalechampi suspicor, eandem cum Polygala Cortusi & Matthioli gratum erit si Pona aliquam nobis mittat, aut utramque plantam.

Genet. Cherlerus attulit mihi Monspelio Coluteae vel Polygalae parvam speciem, collectam Iunio cum flore & siliquis in plano campo Lupum versus. Polygalae. Clusii, perpetuo viret, floret, Aprilis, Maio & Iunio, semen vero Iulio maturum est. Inuenit etiam Februarius & Septembris florentem. Apes ex eius flore plurimum mellis colligere creduntur. Agro Salmanticensi, Murciae & Valentino regnis, locis arenosis & collibus declivibus observavit. Secunda in collibus siluosis Valentiae Hispaniae vicinis inuenitur, viret perpetuo & diutissime floret, & Vere & Autumno. Aluntur etiam prima & secunda in Belgicis hortis.

COLUTEA CAULE GENISTAE
FUNGOSO.

MONSPELIENSIS nobis oblatum est ramus cubitalis, Genistae Hispanicae frangitidine, crassitieque, dilute virens, nudus, fungosus ex palmarum distantia in ramos diuicatus. Quae ram commissuris foliis haerent quina Polygalae Valg. Clus. crassitie, angustiora longioraque. Externis ramis flosculi insident dictae Polygalae quoque, exigui satis

in orbem coaggesti. Succedunt siliquae angustae articulatae, ut in Scorpioides folio Portulacae, in tenuissimum ut Scorpiionis simillimum spiculum terminatae.

Huic apprimè competit descriptio Clusii sub nomine Polygalae tertiae, quae sic habet. Inuenitur in Valentia Hispaniae vrbis maritimis Poly.

Tabern. no-
tatur.Gerard. no-
tatur.Lotus en-
neaphyll.
Melilotus.Locus &
tempus.Apes me-
lita.Descriptio
Ramus.

Folia.

Flosculi.

Siliqua.

Polygala 3
Clusii.

Descriptio
Virga
Folia
Flos.

gala tertia, oblonga, lentis, fungosis, seu medullosis & omnino virentibus virgis praedita, quas rara oblepiunt folia, superioribus adhuc crassiora & molliora: flos secundae par: semen observare non potui.

COLUTEAE FOLII ANIL NOMINATVM.

Descriptio

Ramulus



Nil plantae
in Asia.

SUNT nobis nomine Anil ramuli duo pedales, similes ferè ramis Cytisi latè siliqua, rigidi, incani ac ferè argentei, in folia diuisi Coluteae vulgaris ovata, glauca, quinquefolia communiter, rarius trifolia, ex communi Costa incana. De flore & semine nihil certi nobis constat. Facies tamen Plantae, sitis insinuat ad Cohuteas referri posse. Alia verò planta pro Nil & Anil tradetur post statidem hist. post. lib. 21. ubi etiam sunt equivocationes.

SOPHERA ALPINI.

Descriptio
Ramus.

Folia.



Flores.

Caprarum folia accedant, tamen magnitudine tunc figura, quippe praeditis angustiora, acutiore longiorque sunt, qualia Alpinus pingit. Quod an in adultis conueniat, an loci varietate, nondum nobis compertum est. Ex foliorum porro diuisura flores uncialibus pediculis prodeunt crocei, bini aut terni, sex foliis constantes, saturationibus nervulis delineati, in medio stamina plurima ruffa oblonga. Cassiae floribus non male contulit Alpinus, cui inodori dicuntur: nec quis male etiam formam eorum cum Capparis floribus conse-

ret, si colorum excipiat: Succedunt siliquae admodum speciose digitum longae obtusae in extremo, utrinque commissurarum flavescentes, per media spadiceae, cellulis plurima, quinquaginta circiter, Alpino verò quatuor aut quinque continentes semina lentis magnitudine atque, colore, compressa, angulo acuto donata, sapore sicut & folia amaro, admodum ingrato.

Alpin. de pl. Aegypti, Sopheram suam sic describit. Sophera est planta fruticosa, cubitalis altitudinis, galegae proxima, duris ramis, foliis Myrti, tenuioribus multis, utrinque ordinatim alae appendis: flores fert croceos, Cassiae florum amulos, inodoros: ex quibus Siliquae paruae promanant, quatuor aut quinque semina habentes, Sesban planè similia. Aiunt semina esse venenum hominibus.

Eandem plantam sic describit ni fallimur Camer. hort. Hoxocoquomachit (sub quo Barbaro vel Indico nomine fuit Florentiam & inde Norimbergam missa:) folia habet propemodum Fraxinellae, vel potius eodem ferè modo quo Cassia siliquosa prodit, nullo in costae extremitate imparitatem faciente folio. Caules & ramuli & foliorum ora rubent, flores flauis sunt, Cassiae floribus similes. Hinc emergunt siliquae oblongae, Cylindraceae, exterius per maturitatem fuscae, intus purpureascentes, fuscis granis distentae. Radix nigro cortice obducitur, quo abrado flavescit, & fibris plurimis constat, viuitque sex tantum menses, gelu impetientissima planta, & apicum Vulturumque expositum locum deliderans, alioquin nec flosculos explicat, nec spem frugis facit. Odor illi grauissimus & planè abominandus, sapor subtilis non ingratus cum aliqua adstrictione, penè uti Chebulorum, minus tamen astringens: radices verò amarum & Polypodii saporem repraesentans cum dulcedine aliqua, nisi quod non ita siliquae quiddam sapiat. Folia explicat Oriente Sole, cadente remittit & in se contrahuntur peritura videatur, iis qui antea non obleruarunt & hoc quidem cum aliis quibusdam leguminosis habet commune. Sed hoc imprimis notatu dignum, alarum cauis, quae parte caulem amplectitur lauior costarum extremitas, innascenti verruculas paruas rubentes, quae intensissimo aestu exudant liquorem candidum, purum, pellucidum, vbi minutis margaritis referret, si paulò maior eius copia emitteretur. Viscosus is est ac dulcissimus, adeoque à muscis avidissime expentur. Inesse huic plantae vim quādam planè peculiarem, nemo negat qui semel attentius paulò ipsam cōsiderauerit. Quandoquidem porro Honorius Bellus suam Sopheram diuersam ab Alpini Sophera existimat, totam eius descriptionem [in qua multa notatu digna] proponimus. Sophera, inquit, est ad duorum, triumve cubitorum altitudinem affurgens, caule firmo, recto, fibroso, multos ramos ramos è foliorum alis vndique spargente, in quibus folia Myrti foliis similia quidem, vetum angustiora, alata, hoc est, in ligno pediculo utrinque sita contrariis semper inter se petiolis, numeroque paria, ut in Lentisci folio conspici licet, supernè latè virentia, infernè verò saturā viriditate praedita, grauius olentia, vesperti, supernā folii parte quā petiolo inhaerent, coeuntia, infernā parte terram spectante, sicque clausa tota nocte permanent, manè verò circa Solis ortum denudè expanduntur: croceos fert flores inodoros, plures in vno ramulo pendentes, multaque intus stamina cum siliquae rudimento continentes, in caulis & ramorum summitatibus nascentes, quibus succedunt siliquae rotundae.

Descriptio
Alpinus.
Ramus.
Folia.
Flores.

Horaeque
marit.

Folia.

Flores.
Siliquae.

Radix.

Odor.
Sapor.

Ferrucula.
Liquor.

Descriptio
Bellus.
Caulis.

Siliqua.


Radix.
Descriptio
rebus
notis.Locus &
tempus.

enda, digitum longe & caelum spectantes, plurima semina continentes rotunda, aliquantulum compressa: non omnes tamen siliquæ ad perfectionem veniunt, sed plurima antè decidunt. Elegans planta est, diutissimeque floret, subinde novos & retentes flores proferens semperque virens: radicem habet multifidam, lignosam. Semine primum nata, duo, ut observavi, duntaxat profert folia, deinde quatuor, longo pediculo inhzrentia, vtrinque bina, postea sex, vtrinque ter, atque ita deinceps quemadmodum caulis augetur, foliorum numerus crescit, eaque maiora apparent: duodecimum tamen numerum non excedunt ea quæ caulem ambiunt, hoc est, vtrinque sena: nam ramorum folia tamen eodem modo numero crescant, decimum tamen non superant, quina videlicet vtrinque. Hieme (quam satis commodè terre posse videtur, si diligens aliqua cura adhibeatur & loco quidem calidiore & à ventis libere adseruetur, faciliè à ventis præsertim septentrionalibus læditur, qui folia & flores exsiccant: ea tamen, licet siccissima, à ramis non defluunt, ut in multis nativis plantis observo, imò ferè statim nova folia & ramos proferre cœperunt. Hoc eodem nomine Alpinus plantam tam superius descripsit, quæ tamen plurimum (inquit Boiss.) ab hac differt videtur, ut ex ipsius descriptione & icone colligere licet.

Sophera vidimus Basileæ Anno 1595. Augusti sine penè florentem in horto Domini Iacobi Zvingeri, ea sunt rotundioribus foliolis: ramum etiam habuimus datum per Dominum Iacobum Mieg, puto Basileæ collectum, eisdem foliolis elusum: ramum vidi apud fratrem Casp. Bauhinum cum flore, in quo quædam foliola angustiora paulo. Sophera autem missa per Dominum Honorium Bellum ex Creta, cum fratri, tum Domino Zvingero foliola habet angusta & longiuscula, prout pinguntur apud Alpinum.

TAXOCOQVAMOCLIT
INDICVM.

Siliqua.

Calor.
Semina.

SOLAM siliquam habemus; Taxocoquamoclit Indici nomine datam, non recordamur à quo, sed pulcherrimam, bivalvem, palmo longiorem, semunciali latitudine, in stylum acuminatum desinentem, eodemque modo ad pediculi annexum angustam, compressam, coloris per mediam aream semini contento respon-

dentem, colore ferè spadiceo, obscuriore, quam ambit circumiecta orbita satis lata, coloris ex fusco cinerei: atque huic cortici subest, veluti in leguminosis, pellicula tenuis membranea, coloris ex albido subfusci creberrimis transversis interstitiis inæqualis, pro semine numero totide veluti cellulas facientibus, & in nostra quidem siliqua

Tom. I.

semina comprehendebantur vigintiquatuor Genistæ vulgaris seminibus similia, lucida, dura, ex rotundo oblonga, coloris fulci, dilutioris area in vtraque facie medium obsidente. Ex vicinitate nominis existimaret quispiam nostrum Taxocoquamoclit idem esse cum Camerarii Hoxocoquamoclit, de quo capite præcedenti verum ei siliqua Cylindracea & oblonga, huic autem nostro compressa valdeque longa.

Hoxocoquamoclit, diversa planta.

IOVIS BARBA PVLCHRE
LVCINÆ.

VAGÆ qui dem significationis est Barba Iovis, quam nos hic pro suffrutice quodam accipimus: cuius materiem duram atque lignosam ferè, incanum & lanuginosum tegit cortex, rami huic frequentes satis, folia quinque aut sex, aut septem etiam coniugationibus contexta, quarum singularia Lentis foliis, paria villosa, argenteo

Descriptio Materiet.

colore fulgent, ex pediculi foliorum ala, appendices singulares exoriantur lanuginosæ, quarum extremis inhzrent aceruatim congesti flosculi, lutei, quorum singuli non magnitudine, sed formâ Genistæ flores æmulantur. Nos cubitalem habemus caulem.

Flosculi.

Hist. Lugd. sic describit, Fruticosa est arbuscula, magnitudine hominis, ramis densissimis, folio Lentisci, argenteo, sic collocato, ut lateribus folia paria sint, impar autem foliis versum claudat: coma in opere caputrio tonsilis, & in candidatam spissa, elegantissimi aspectus, si quis in hortis lætæ, vestiendis arearum viarumque marginibus, ut à nobis de Lauendula fieri solet, flore in summis ramis copioso, coaceruato velut in cymulum, luteo, Genistæ simili, si sumas singulas quasque flosis coaceruati partes.

Flos.

Hist. Lugd. Frutex, Iovis Barbam Plinii putant. Anguill. Barba Iovis Plinii aliquomodo conveniens in Monte nigro, propè Luornam in Tuscania, foliis dispositis Lentis modo, candidis, nitentibus angustioribus, flore luteo, flexilibus ramis. Hæc planta olim nobis pro Dorycnio Diosc. & Argentina nonnullorum Metis data per Dom. Santalbinum Medicum.

Dorycnium Argentina.

Per Dominum Kentzium collecta Florentiæ & Locus & Patavii in horto Bembi, nomine Barba Iovis, missa tempus. etiam fratri Casp. Bauhino ex Italia pro Barba Iovis Plinii. Dominus Agerius dedit collectam in Hetrurio monte Nigro ad litus maris Thyrrheni. Gignitur in lapidosis, & saxosis locis maritimis, præsertim montibus ad littora positiss. Pulcherrimam hanc plantam mons Setius (hodie cap de Sette vocant) ab Agatha & Bluetris non admodum semotus nutrit.

motus nutrit.

K k

SESBA, FOLIIS

MEDVSARI.

Descriptio **S**esba specioso assurgit, veluti virgulto, recto, tereti, fistuloso, tuberculis asperiusculis obdito, medulla fusto, quod ex longiusculis intervalis in ramis diuiditur. Folia sunt longa foliorum serie alternisecus stipata, foliorum Hedydari alterius Dodon. similem, angustiorum, pallide virentium, subpinguium: foliorum conjugationes supputauimus. Per quorum media nervulus excurrit, aucta parte lineam atrouirentem exprimens. Ex aliarum vero geniculis pediculi prominent luteo croceis, atris punctulis conspersis floribus conspicui, Genistae ferè similibus, racematim digestis. Quos excipiunt siliquae digito longiores, angustissimae, in acutissimum mucronem desinentes, ac quibusdam internodiis articulatum torosae. In quibus semen oblongum, spadiceum ad Foenugraeci semen aliquo modo accedens: cuius sapor acris linguam vellicans calore suo.

Siliqua. Alpin. Sesban frutex Myrti magnitudinae. Ex Anil semine Alexandria misso [cuius planta istuc magno in usu est] nata, Clusio apud Garciam, stirpis, Lentis seu Coluteae minoris foliis, flore luteo sparti Graecorum (quod Hispani Retama vocant) omnino simili. Postquam enim Alpini librum Clusio videre contigit, animaduertit semen missum pro Anil Sesban fuisse, ac eius fortè errore, qui mittebat, nomen Anil ascriptum esse pro Sesban.

Anil. In Aegypto ab Alpino obseruata & inde ad Italos illata. Nobis ramulum frater Casp. Bauhinus elegantissimum in horto Nobiliss. Bembi Patavino lectum communicauit. Anno autem 1599. in horto Montheigardensi sita crenit ad quatuor cubitorum altitudinem, floruitque Augusto & Septembri: Basileae vidi in horto Domini Jac. Zwingeri.

Tempus. Aegyptii, referente Alpino, his fructibus sepes suas texunt ad agrorum distinctionem: stomachi humiditatem semen eius absorbet, eumque roborat.

Vires & sua. Pulsis ex docto alui fluxum, mensiumque immoderata profluvia refrinat: Omnes denique vacuationes immodicas cohibet. Sed quum sit acris nolim cum Alpino experiri ad prohibendum fluxum nimium mensium. Doryenium [Doryenium] Doryenium in genere, quod Crataeus Halicacabum aut Caleam [Halicacabum] vocat, frutex est auctore Dioscor. Olea super prodeunti (Calea) similis, nascitur in petris non procul à Mari, ramis cubito brevioribus, foliis Oleae (Calea) similibus colore, ac minoribus firmioribusque (angustioribus autem & longioribus aliis, Lac. in vet. cod.) ac vehementer asperis, flore candido, folliculis in cacumine densis, ceu Cicentis, in quib. quina, serave minuta semina, rotunda, exigui Erui magnitudine, laeua, firma & versicolori: radix ad digitum crassitudinem & cubiti longitudinem adolescit. Et hoc quoque somniferum (Doryenium) esse creditur: Copiosius verò hautum, enecare,

Non desunt qui dicant eius semen in amatoria (Doryenium) expeti.

De eo fusè & obicure Nicander. Haec verò Scholiastes. Doryenium, inquit, quod etiam Melissophyllum (Melissophyllum) vocatur, Sylvestris planta est. Caela liquorem destillat similem lacti secundum aspectum, & odorem, & gustum. Unde etiam difficile iudicatu est bibenti, verum lac sit, aut non. Demophon autem nominis rationem afferens, dixit ita vocari, quod haec simile sit secundum sublationem (scilicet è medio) Lysimachus verò Hippocraticus quod lignum sit pruritus mouens, iis qui eo vti sunt.

D. symptomataibus quae Doryenio epoto contingere soleant, item remedia, quibus succurrendum, ita scribit Dioscorides lib. 9. Alexiph. in praemio.

Doryenium [quod aliqui Solanum manicum (Solanum manicum), hoc est, furiosum appellant] seporum, veluti lactis saporem gustui representat, crebros singultus dicit, linguarum humiditatem (singultus apud Paulum in Aldino Cod. Epitome Nicander ait (Solanum manicum) Sar.) conciliat & effusionem sanguinis reiectionem concitat: ipsi verò potionati musosa quadam perinde atque dysenterici aluo egerunt. Itaque antequam aliquod hisce symptomatis superueniat, auxilio sunt antea dicta: vomitus, inquam, Clyster, & quaecunque potum venenum expellere apta nata sunt. Priuatim iis opulantur, aqua mulsa, lac asininum, aut caprinum, ac dulce vinum, quod quidem tepidum cum Aniso (Aniso) bibatur, Amygdalarum armarum, (quod dicitur in Aldino) & elixa Gallinacea pectoris. Quin etiam omnis generis Conchyliis, cruda pariter ac cocta, esse (edere) salutare est. Conueniunt & Locustae marinae (Locustae) & Gammari (Gammari) ac potum eorundem iusculum. Idem de parab. ait Contra Doryenium succurrunt Lac passum tepidum, gallinacei pectoris elixi triti succus haustus, ipsumque ius epotum: echini denique conchae, purpurae, squillae, pinnae, (Squillae, pinnae, Geln. uelut, omnia) pectines, buccinae, seu cruda seu elixa comedantur. Consideratis symptomatibus, quae superueniunt post assumptum Doryenium, placet exhibitio Olei dulcis cum lacto sine iure Gallinaceo.

Plin. Doryenium ita tradit, ut à Solano manico vix videatur distinguere. Quare eius verba repetes ex Historiae nostrae Universalis libro trigésimo quarto, capite de Solanis.

Doryenium, attestante Galeno, temperamento Papaueri simile est, & Mandragorae, ac ceteris, quae parera habent refrigerandi potentiam: excellit & frigiditate aquae: quamobrem pauculum quidem, saporem conciliat, plusculum verò sumptum interimit.

Potum quidem, gustum ceu lactis representat, singultus crebros facit, inquit Paulus, linguarum humiditatem, & cumulatam sanguinis eductionem, per aluum mucosa feruntur simillima terminosis. Auxilio sunt (antequam horum aliquot fuerit secutum) vomitus & clyster, & quaecunque potum venenum possunt excernere. Proprie autem ipsi succurrit aqua mulsa, aut Lac Asininum, Capillumve, & dulce vinum tepidum cum Anisi modico potum: item Amygdalarum, & elixa gallinarum pectorisidem praestant Conchyliis cruda pariter & cocta, in cibo, adhuc Locustae marinae & Gammari,

Gammari. Gammari, & ius ex ipsis esculentum potui assumptum.

Quamquam vires Dorycnii & Solani furiosi similes sint, ipsæ tamen inter se diuersæ à Diosc. describuntur.

Galenus quoque de Dorycnio agens, simile id temperamento facit Papaueri & Mandragoræ, & aliis ita frigesfaciendi vi præditis, ut in quo obtineat aquosa frigiditas valde efficax.

Nullus ex Veteribus tum Græcis, tum Latinis, teste Cordo, Dorycnium descripsit præter Diosc. qui historiam eius ex Crateua desumpsit.

Plin. m. ror.

Plinius & alii quidam crediderunt Dorycnium idem esse cum Solano furioso, quod falsum esse Nicander, Dioscor. & plures alii testantur. Rob. Const. in Lexico notat *Δορυχνιον* Diosc. & *Δορυχνιον* Gal. & Nicander. *Δορυχνιον* dicitur apud Suidam, & Hesych. corruptè *Δορυχνιον*.

Dorycnium Dorycnium Hesych. m. ror.

Matthiolo, Dorycnium hæcenus non contigit inuenire.

Brunf. onom. rectè Dorycnium siue Dorychnium aliud à Solano somnifero tradit, sic dictum, fortasse, quod cuspides telorum inficere mos esset illo.

Dorycnium cur di. sum? Corrh. re. prestandu. Dorycnium Greuini Solanum furiosum.

Corrhæus contra, malè ex Dioscor. dicit Dorycnium idem esse cum Solano furioso, quum Dioscor. tantum dicat Solanum manicum quod etiam Dorychnium vocant.

Matthiolo [inquit Greuinus] nequaquam consentit id quod Græci appellant Solanum furile fuisse Dorycnium. Si tamen quæ Diosc. & Theoph. & Plinius scripserunt considerare volumus, re ipsa profecto comperiemus, aut errasse Dioscor. aut Dorycnium simile aliquid Solano furioso habere &c. Matth. insinuat: nemo tamen hinc inferre debet ex lib. 6. cum idem sensisse, sed quod aliqui tantum ita vocarint. Hoc tamen Matth. responsum non viquequaque satisfacit, nam ea quæ Theoph. & Plinius de Dorycnio literis tradiderunt, à Diosc. de Solano furioso dicuntur. Tamen quod sub finem præmii idem ex sua sententia & non alterum affirmare videtur. Auicenna Vuam vulpinam vocat, quod, ut ego existimo, Acinos ferat Vux non dissimiles, quemadmodum Diosc. in ipsius descriptione affirmat. Dicitur etiam Solanum furiosum, quod, in eo qui id in potu acceperit furorem commouet: idque præstat non ob qualitates suas, quæ frigide sunt & sicce, sed ob innatam, & peculiarem malignitatem: tantum enim abest, ut frigus furorem excitet, quin potius egrum somnolentum & grauem reddit, sicut alibi diximus. Nicander tamen in descriptione Accidentium, quæ ab hoc veneno veniunt, furoris non meminit. Hæc Greuinus obtrudit. Verum Theophr. non meminit Dorycnii, sed tantum Strychni. Vires à Diosc. attributæ lib. 4. cap. 75. conueniunt sanè cum viribus attributis à Theophr. Strychno ac etiam ab ipsomet, capite præcedenti Solano Manico, quæ vires sanè planè repugnant viribus quas Diosc. lib. 6. cap. 6. Dorycnio attribuit, ac etiam Nicander, ut fortè liceat suspicari lib. 4. Diosc. malè additas vires Dorycnio competentes: nec vilo modo concludi potest Dorycnium & Solanum manicum eandem plantam: Greuin. aut non legit textum Græcum in fine præmij aut non intelligit: ait enim Dioscor. *αγαλινον*. Vbi obsecro scripsit Diosc. Dorycnium acinos ferre. Greuinus confundit Dorycnium Nicandri cum Solano verè dicto furioso aut manico Diosc. & Theophr. licet omnia ea quæ Nicander scribit ex Diosc. l. 6. de Dorycnio planè non respondeant, sed manifestè demonstrent a-

Vux Lupi. na. Solanum furiosum.

Greuini falsum.

liam plantam à Solano furioso: hæc occasio ut Greuinus, dum vult diuersarum plantarum, diuersas vires conciliare frustra se torqueat. Quomodo Dorycnium Nicandri intestina exulcerans, abradens &c. [Greuini verbis utar] præstabit, quod Plinius scribit, ut inter dormiendum cum formosis puellis, &c. innocentiss. dicitur venenum, quod dicit Plinius de suo Dorycnio diuerso à Nicandri & Dioscoridis. Vt igitur [authore Sarac.] instirpinum historia Dioscor. Anazarbus Dorycnium & Solanum manicum distinxit & ceu diuersas plantas diuersis descripsit capitibus, ita & lib. 6. cap. 75. Altero, utriusque veneni diuersis capitibus propria & peculiaria tradit remedia: quæ tamen omnia hoc loco vni Dorycnio accommodantur. Atque vel hinc patet, Dioscoridem hunc libri de venenis authorem, alium ab illo Anazarbo extitisse.

Scribit Cornar. sibi videri communem esse appellationem Dorycnii, omnibus is, quibus hactenus & tela tingentur. Appellamus Dorycnium Monspelientè & Hispanicum, non Anguillare, ut visum Clusio: nec Veterum, ut Gesnero, de quo mox. Est & Dorycnio Hispanico congener Clusio, de quo proximè. Dorycnium habet Cassibona, quod nos Trifolium album rectum inscribitus. Dorycnii nomine nobis aliquando data Iouis Barba, de qua paulò antè dictum. Lob. & Pena scribunt, quoddam Phylliream harioleum Dorycnium, quod non probant, quæ de se vide l. 1. n. g. lib. 5. Pro Dorycnio aliqui, inquit Gesner. de hortis, habent suffruticem quendam montanum quæm Vitis Idææ speciem putamus. Cæsalp. & Ferd. Imperator Dorycnium est, quod Dalechampio dicitur Cneorum album: eiusdem etiam nomine Dorycnii meminit Clusius, quod Dorycnium nō negamus, cuius historia à nobis posita est in fine l. 5. Dorycnio est & cōgener quædā plāta Cæsalpino foliis nigrioribus, de qua libro modò dicto. Cordus pro Dorycnio Nicandri exhibet Halicacabum peregrinum, quod improbant Gesnerus, Matthiolo & Lobelius, ut dicitur lib. 15. de Scandentibus. Dorycnio multum simile Anguill. Trifolium Halicacabum, quibusdam satis ineptè Dorycnium authore Camerario appellatum, de quo agemus Hist. n. lib. 17. Dorycnii appellationem, inquit Cornarius, Plinius Solano furioso attribuit. Inter Diosc. reiecit. Halicacabus, aliis Dorycnium dicitur, infra tamen etiam lib. 1. cap. 12. de lethalibus medicamentis, Dorycnion appellari dicit, Solanum furiosum. Quartum Solanum [Gessnerus] per me quidem esto, inquit Teogus, quod *Δορυχνιον* Plinii, quo cuspides tingebantur, de hac planta lib. 23. inter Attriplices. Quibusdam etiam Dorycnium de Lunaria & Pyrethro dici suo loco hac in nostra Generali Histor. dicitur.

Aequiroca

Dorycnium Monsp.

Dorycnio Hispan. congener Clusio Trifol. album rectum. Iouis Barba. Phyllirea.

Vitis Idæa.

Cneorum album. Doda.

Dorycnio congener Cæsalp. Halicacabum peregr.

Trifolium Halicacabum.

Solanum furiosum. Dorycnium de Solano Attriplex. Asia. Pes Anserinum. Lunaria. Pyrethrum.

DORICNIUM MONSPESSVLANVM FRUTICOSVM.

DORICNIUM Crateuz Monspeli vocabant Fruticem totum albidum ad sesquicubiti altitudinem exetescere solitum, cuius nouelli adhuc ramuli obsequiosi, fractuque contumaces existunt, adulescentes aut loco asperiore nati, multum durefcunt, folia ex intervallis, terna, quaterna, sena, radiata, sine pediculis adherent, oblonga, angusta, alba lanugine pubescentia; Clusio adstringentis gustus. Flores extremis ramulorum innascuntur in orbem glomerati, albi, quorum singulares ad Trifolij pratensis albi flores accedunt;

Dorycnium Crateua. Descriptio

Ramuli. Folia.

Flores.





Suder.

Scabies.

Venit.

Podagra.
Vrina.

Struma.

Temper.

Hydrops.

Purgatio.

Semen.

Flores.

Lixiuum.

Podagra.


Ischia.
Bronchocele.Vomitum
moer.Flores
Syl.

minis per se tertia parte drachmæ sumpta, ad sudorem interim eliciendum contesto corpore. Apes flores Genistæ amant, sed mellatio ex illis facta improbat. Opiliones quidem è Genistâ vnguentum conficiunt, quod Scabiei ouium medetur. Calidior & siccat in altero ordine, id quod Fuchsi amaritudo quam gustata refert, & eius facultates abundè docent. Sparto & Genistâ, non obstante, quod forma nonnulli distent, eadem inest facultas, ut enim spartum pituitam per superna & inferna purgare potest, sic etiam Genistâ. Hinc aded sic ut eius seminis hodierno tempore contra Podagram magnus sit usus. Vrinam etiam amaritudinis ratione mouet, & qui impidendi & extenuandi facultatem habet, lapidem in renibus, tum in vesica constringere, ut etiam recensiores tradunt, potest. Strumas denique, alijs tumores discutere posse idem scribunt. Calida & sicca, auctori Dodonæo, proximè ad tertium gradum abstergit ac partes tenues habet. Folia, ramuli & summitates Genistæ, cocta in vino aut aqua, pulia sunt hydropicis, ac omnibus obstructionibus hepatis, splenis, renum, aut vesicæ, partim enim purgât & pellit omnes humores serosos & aquosos ac superfluos, per aluum partim per urinam. Eadem præstat semen sumptum pondere circiter drachmæ vnius. Denique eadem facultates habet quas Genistâ Hispanica, ac idem eius in morbis vniuersè potest, qui Genistâ Hispanicæ. Genistâ Germanica sub finem Aprilis aut Maio mense floret, atque tunc rudimenta florum adhuc virentia, prius videlicet quam Lutea fiant, decerpta, muria aut sale condiuntur, quæ postea elota & decocta, Capparum in obsoniis loco habentur, nec minore, cum suauitate manduntur: ac languentem excitant appetentiam, & hepatis ac lienis infarctus expediunt. Paratur ex Genistæ ramulorum ac virgultorum aridorum & combustorum cinere, cum vino tenui albo, cuiusmodi Rhenanum est, Lixiuum, quod ad Cachexiam & Leucophlegmatiam à nonnullis valdè commendatur: & potenter quidem aquosos ac serosos humores cum vrina & per vesicam expellit: sed & acrimonia sua interna viscera quandoque lædit & exedit. Purgat, ut vult Matthioli. Genistæ semen non minùs potenter ferè quàm spartum aut Helleborus drachmæ vnius & seminis pondere ex hydromelite ventriculo ieiuno sumptum. Quare eius magnus est hodie vsus contra podagram: potenter enim per aluum educit lentos viscidosque humores ex quibus podagra generatur. Virgulæ cum folijs in aceto dies aliquot maceratz & contusz, succum reddunt, cuius si quis semunciam bibat, non paruum sentiet emolumentum contra dolorem ischiadicum. Semen Bronchocele, omnemque tumorem discutit. Genistâ cum axungia contusa, gonagram perfricat. Semine Genistæ Scopariæ vomitum, non lecus ac Spartio Diosc. sapius duarum vnciarum decocto propinato, citra magnam contentionein mouit Lobelius. Verùm flores recens decerptos sapissimè quamplurimos, & per se acetariis inditos, vorat plebecula Aruerniz, & Aquitaniz, maxima copia, innocuos non modò, sed etiam admodum gustu suaves: nec quicquam vomitionis nauææue vilius, aut commotionis mouere solitos. Quin apud Brabantios germinantes condiuntur, sale & aceto flores, mensisque inferuntur, Capparum, Olearumve pari commendatione: creduntur enim non modò cordi vires, ac stomacho appetitum augere, sed etiam obstructions referare, & calculum frangere. Idcirco falluntur, falluntque

qui hosce flores officinis vomitioni mouenda sicandos præcipiunt, rati istam Genistam esse Dioscor. Ellebori suppar deiectionum Spartum: non enim deiectione insigni, sed tantum leuiore conatu excludunt, qui eorum vel Seminis decoctum hauserunt.

Flores moer
vires
marum.
Spartum.

GENISTA CVM RAPO



Fruticosa stirps Genistæ est, caules, aut potius tenues caudices, habet lignosos, à quibus plurimæ tenues sparguntur virgulæ, angulosa, virentes, lente & flexi neque faciles, non raro quoque in alias diuisa, circa quas folia exigua, obscure virentia, & floculi elegantissimi colbre, lutei, & tandem siliquæ planz, per maturitatem nigricantes veluti Phaselis, siue Bonæ, à Dodonæo

Describe.

Caulis.

Virgula.

Folia.

Floculi.

Siliqua.

Semen.

Radix.

Rapum.

Orobanch.

Genista parua.

Rapum.

Orobanch.

Limodori.

dictæ, in quibus semina plana dura, subrusta, lentibus minora. Radix dura & lignosa, fibras quasdam obliquas subinde à se demittit. Attollitur autem Genistâ frequenter in facta magnam altitudinem, hominis staturam attingens: floribus hæc multis sæpe grauida: quandoque verò humilis permanet, quæ raro florifera. Huius verò radicem fibris adnascitur quod Rapum appellant Genistæ. Est autem hoc tuberosum quoddam, turbinatum, subnigricantibus squamis opertum, pulpa interiore sublutea, à quo caulis assurgit dorante breuior, floribus circa fastigium, subcandidis, Lamii ferè æmulis, succedentibus oblongis, crassis, teretibus, non tamen magnis, loculis, in quibus semina minutissima & superuacanea. Totâ autem facie istud orobanchen Dioscor. refert: hoc solo ab eo differens, quod nò inter legumina exeat: sed è fibris radicis Genistæ quib. abhærescit.

Dodon. gall. Genistâ parua, non differens à maiore nisi quod non excedat altitudinem trium pedum, ad huius radicem reperitur planta Belgis dicta, Brenrape, Lat. Rapum Genistæ, & Rapa Genistæ, Gall. Naueau de Genestre, hoc procul dubio species Orobanche & Limodori. Lat. in sol. Genistâ cum Rapo. Olim Dodonæus nò iunxerat Rapum Genistæ, ipsi Genistæ, nunc autem iungit: præterea olim differentem faciebat Orobanchen à Rapo, nunc tantum separat, à nascendi loco: licet nobis persuadeamus eius Genistam eandem cum angulosa, quia tamen nūquam vidimus cum Rapo, ac præterea ipse non meminerit trium foliorum ex vno pediculo in sua Genistâ, ac minorem dicat, nos eius picturam proposuimus, quam sculptor corruptit potissimum in floribus Rapi Genistæ.

Lob. & Pena Adu. vocant, Herbariorum Rapum Genistæ siue Hypopartium æquum, floribus galeatis Tragorchidis Radicibus. Genistæ & Genistellæ adnascitur quasi soboles spuria: sed specie videntia & raritate, extremum non abistile ortu, concretu,

Hypopartium.

concretu, incremento, caule & effigie Hypocystidis vel Orobanchæ. Obseru. Hippospartum Rapum Genistæ. Icon. plant. Genista Scoparia vulgi. Item Hypogenista, Rapum Genistæ à similitudine. Lobel. in Obseru. & Icon. Iungit Rapum Genistæ Scopariæ vt Dodon. in qua folia non sunt trifolia.

Gerard. Angl. Rapum Genistæ, Brenrape Orobanchæ, qui ponit pro Rapo Genistæ iconem propositam à Tabern. uulgo Orobanchæ secundæ.

Clus. Pann. Orobanchella maior, quam Belgæ, quoniam ad Genistæ vulgaris radices interdum nascitur, Rapum Genistæ cognominant. Vngaris *Misgytheria*, id est, missilis candela siue cereus dicta. Et Hist. post. Orobanchæ omnium maxima, quam, quia apud Belgas sæpius Genistæ vulgaris radices innascitur, Herbariorum turba Rapum Genistæ appellat. Vide plura sub Orobanchæ.

Camer. ad Marthiol. Germ. Orobanchæ genus ad Genistam provenire solitum, vulgò Rapum Genistæ dictum, quod Clus. Passion. Orobanchæ maiorem vocat.

Genista, autore Dodon. parva prouenit locis ficcis ac glareosis secus itinera, nonnunquam in syluis. Rapum Genistæ reperitur in terra sterili, macra & arenosa, ad Genistæ parua radices quæ ad perfectionem non venit, & quæ non fert flores, sit patet: inuenitur mense Iunio & Iulio Rapum Genistæ aduulsi Lobel. in Flandriæ, Galliz, & Angliæ locis maiore Genista scatentibus, alioqui frustra quæsitum & diu alibi. At Sabaudiz & Pedemontani colles parua feracissimi, etiam itud copiosum fundunt. Rapum Genistæ Belgarum Clusio passim multis Austriæ & Pannoniæ syluis nascitur.

Rapum Genistæ habetur apud Dodonæum à nonnullis Empeiricis recentioribus pro summo remedio aduersus calculum, ad mouendas vrinas, decoctum in vino deinde potum: vt enim aiunt, soluit renum obstructions, producit ac prouocat vrinam, calculum frangit ac arenulas pellit. Succus recens glutinat ac sanat omnia vulnera recentia & abstergit deteriora ac fordida reddit: vsus esse potest ad alia viscera maligna, abstergit enim ac ad sanitatem producit. Vt autem succus melius conseruetur, postquam ex radicibus receptibus erit expressus, Soli exponendus donec crassescat, aut additur aliquid mellis, & Soli exponitur: hinc enim melior erit ac commodior extergendis vulneribus & vlcibus putridis. Potest etiam ex radicibus semisiccis extrahi Oleum utile ad omnia ad quæ confert succus. Hoc Oleum delet omnes maculas, ac faciei exanthemata, ac totius corporis, sæpius illitum. Ait Clus. & post eum Camer. qui tamen eum nominare non dignatur more suo, puluerem cum calido vino exhibitum insigne medicamentum aduersus colicum dolorem, nonnullos credere. Rapum Genistæ magnis votis & peregrinationibus Chymistas Maio mense venari scribit Lob. Ad vtriusque Genistæ radices, subiectosq; teneriores asparagos cum radicibus siue appendicibus à Genista auellendis alembico indunt: & inde igne Oleum eliciunt, ad calculos perquam celebre.

TINCTORIVS FLOS

Radice lignosa densa viminum seges fruticat, tenuium, cubitalium & longiorum, tere: Tom. I.

cium: quibus alternatim adnascuntur folia, Hys. Folia sopsi, maiora, interdum paria, supra infraque a-



trouentia, satuo-
lemore manden-
tis os implentia:
flores in thyrsis
lutei, genistæ an-
gulosæ minores;
quorum singulis
appositi: siliques
vnciam longæ, la-
tusculæ, glabræ;
in quibus multa
semina parua.

Ruell. hanc *Lysimachion* & *Rusticorum* *Corneolam* vocat, quo etiam nomine in humilis tam inuestiri ait: insectorum *Oliginus* optimè notam. Hinc præterea *Corneolæ*

vulgò nota singulis inesse notis, quas *Lysimachion* tribuit: *Lytron*, in Diosc. idem eundem Plin. in alio nomine appellat tradit, quod putetur pro *Luteo* deperitum. Nunc, vt Vitruuius author sit, eos qui non possint *Chrylocolla* vii, herbæ, quæ *Luteum* appellatur, *Corneolum* in dæ-
re, ac viridissimo vii colore: Et eadem esse *Lysimachiz* siue *Lytron*, siue *Luteum* vocat apud insectos vsus: nam cæruleo colore, quo elastum tingat, eam superinducentes, viridem efficere colorem: per se autem luteum vel flauum præbere: solere enim pictores ex luteo & cæruleo contritus viridem efficere colorem. Addit porro rura nonnullam hunc florem luteum non à colore, quo tingat, sed à flore potius, qui luteo micet conspectu, Aquatilem *Soliam* appellare. Ruellius ergo affirmat hanc *Lysimachiam* esse, quamvis inibi aliam verius tradat. An eidem *Acipitris* pps, vulgò *Corneola* dictus, solio *Salicis* serè pusillæ, flore subluteo, cum siliquis *Ciceti* similibus, in quibus semen *Cordo* in Diosc. *Lysimachium* *Leoniceum* *Corneola* putatum, qua tinctores viridem colorem inficiunt. Cui sententiæ Ruellium subscribere dicit, quamvis post aliam herbam *Lysimachium* esse putet. Sed *Cordus* illis nullo modo assentire potest, qui *Corneolam* *Lysimachion* esse putent. Quoniam *Corneola* fruticosa herba sit, quæ à Germanis *Gilbtraut* appellatur, in editis, nec aquosis nascentis. Ruellium reprehendit *Cordus* quod loco dicto putet *Lytri* vocabulum corruptum esse à *Luteo*, cum nequaquam ibi Vitruuius per *Luteum* *Lysimachium* intelligat, quod *Lytron* etiam appelletur, sed sui generis herbam.

Florem tinctorium depingit & describit *Tragus* sub nomine *Ferula*, quam etiam florem tinctorium vocat & *Thapsiam*, & malè à *Spartion* referri posse credit quod *Gilbferbblumen* interpretatur. Vtrum autem *Ferula* Veterum sit, in præsentia quidem nec asserit, neque negat. *Ferulam* tamen nuncupauit. Quæ opinioniones vsque aded erroneæ sunt, vt refutationem non mereantur. Credat quousque velit *Spartion* id esse, ex quo Asia lina piscatoria conficere solita est.

Fuchsius Hist. Tinctorium florem appellat, Ger. *Gilboder* *Strichfarb blumen* & *Ackerpfirumen* nonnullorum. Gall. *Herbe à iaulnier*. Is quum apud illum esset *Genistellam* non acu- K k 4

Corneola.

Lysimachium.
Lytron.
Luteum.
Chrylocolla.
Solia aquatica.Lysimachium Leoniceum.
Corneola.
Ruell. & Lytri.
Lonic. rep.

Ferula.

Spartium.
Piscatoria lina.





Tindarium perè contenderit. Is alibi *Tindarium* *florem* appellat, quem *germ. Nesterpfrimmen* dicant.

Apud Cordum in Hist. Icon Tragi malè ponitur pro *Genista angulosa* Cordi.

Genista *germ.* *Chama.* *spartium.* *Chama.* *nista.* *Genista.* *terreftra.* *Gen. sagi.* *lob.* *Gen. gra.* *minna.* *lob. nota.* *ter.*

Gesner. hort. *genista* genus, *Chamaespartium*. Clusius Pannon. & Hist. post. *Chamaegenista altera*, *germ. Erdpfrimmen* id est, *terrestres Genista*, nonnullis *sagittalis* *Genista*: plano, eoque altero, ex altero nascente folio, quod deinde in cauliculum conuertitur.

Lob. & Pena Ad. *Genistella graminea montana*, *Spartia herbula*. Obseru. *Genistella montana*, *genistella angulosa* Cordi, *Genista sagittalis* nuperorum. *Chamaespartium* Tragi & caput in Aduersariis luxatum. Item Plant. *Genistella montana*, *genistella* Cordi non est, perperam ita nuncupat. Figura in Aduer. posita non est melior quam Tragi.

Hist. Lugd. *Chamaespartium* Tragi.

Gesnerus eius picturam descriptioni apud Cordum apposuit. Sed si eam *genistam* *angulosam* Cordi esse existimauit, eam non laus inspexisse videtur.

1. Tab. icon. & Hist. *Chamaespartium* 1. *Chamaespartium*. 2. & *Chamaespartium* 3. Narbonensis *Spanisch Erdpfrimmen*.

Frustra Compil. Tab. figuras tres habet, secunda ad Tragi iconem facta videtur, quam non bonam esse ex Tragi descriptione facile est colligere: tertia autem ad Lobelii imaginem efficta, Lobelius tamen non distinguit suam à Tragianam sed eadem facit, verum hæc industria Compil. qui, consideratis tantum figuris, tres proponit icones vnius plantæ, quasi diuersæ sint, quia descriptiones non intellexit plantarum: In omnibus iconibus Tabern. displicet caules non esse foliatis & simbricatos.

Gerardus *notatur.*

Gerard. Angl. *Genistella globulata*, *Glebe* *Greene weede*: *Genistella Lag. poides maior*. hæc *foale Greene weede*, *Genistella Lagopoides minor*, *Small Green weed with haced foote flowers*. Gerardus tribus iconibus affingit novos titulos, quasi essent diuersæ plantæ.

Geneuz audiui rusticum vocantem hanc plantam, *de la spargelle*. Camer. hort. *Genista sagittalis Pannonica*. Lonicerus *Chamaespartium*. Dodon. in Lat. in fol. *Genista* nonnullis à *germ. Erdpfrimmen* hoc est, *Chamaegenista*. Nescio cur Dod. assumpserit figuram quam Lobelius posuit pro *Chamaegenista* *hispanica*.

Locus & tempus.

Multis in locis prouenit circa Montbelgardum: Obseruauit geneuz in Thuri. Basileæ florentem Mense Maio: Monspelii, Lugduni *au bû, de la bonne allemande*. In Alsatia, in Hercynia sylua, in Italia. *Spartea herbula* Lobelij paucis duntaxat montium celsiorum conuallibus aridis obuia, ut Calcati montis Narbonensis propter Coenobium: in Germaniæ etiam arduis multo longiores spargens culmos: Eam videre est virentem etiamnum Londini. Olim hæc plâculam apud Heluetios, cum istac iter faceret, & quibusdam germaniæ locis se collegisse meminit Clusius. Deinde in Pannonia spontè copiosè nascentem obseruabat in sylua *Stemetunynas* Ill. D. Balchazaris de Bathyan urbi & acri minutissimæ proxima, atque supra Sopronium urbem vulgè *Oedenburg* dictam, Austriacis: sed omniū affluentissimè inter Saktur-nya Ill. Comitibus de Zrinio munitissimam arcem & *Findam* Magnifici Dn. Michaelis de Zed arcem in collibus: & nunc proximè in sylua quadam militari circiter infra Francosortum, ad sinistram Mœni fluminis. *Chamaespartium* colles aprici in uelu abundant, crescit in colle iuxta Limagû

fluuium infra Wetigam Monasterium proximè. Vnus & Hi flores puerorum quoque crepundiis & cunctis temporibus interuiunt. Et quantum Trago quidem videtur, temperamentum Orobi & Fœnogræci obtinent.

GENISTELLA HERBACEA PLATYPHYLLOS.



Baro quidam *germanus* ex Hispaniis reuersus Lugdunum attulit plantam, quam *genistam* *Platypyllos* voco, insignis sane frutex aliquid affinitatis habens cum *Chamaespartio* Tragi, ramuli constant latissimis fimbriis, ipsius, veluti foliis, per interualla distinctis, dices folia è foliis enasci, ut in Ficu Indica vulgè dicta, ad vnumquodque interitum sunt veluti tres cuspi-

Locus. *Descriptio.*

Ramuli.

Folia.

Flora.

Flora.

des, ex vno aliud oritur folium, oriuntur etiam alii ramuli eodem modo distincti. In ramulorum summitatibus sunt flores similes quodammodo aliis *Genistis*, hiantes, lutei, exterius pilis multis candicantes: saporem in planta manifestum non sentio: hanc verò Lugduni ante 40 annos curauit depingendam.

Eam sic describit Clusius: *Chamaegenista* peregrina vix palmari magnitudine asurgebat; admodum tamen fruticosa, foliis *Chamaez* proximis, breuioribus, duris & carnosissimis, aliquantulum in ambitu sinuosis & crispis, rigidiusculisque, vno ex altero è medio folii neruo prodeunte quodammodum in superiore, interdum etiam binis, ternisque simul exorientibus: hic verò neruus paulatim intumescit, & in ramulum conuertitur, sic cum tota planta foliosa sit, & non nisi foliis constare videatur, fit tandem admodum fruticosa: in extremis istis foliis quini, senive, aut plures flores simul iuncti, ex villosis calyculis nascuntur, minores quam in *genista*, aurei planè coloris, nisi bina inferiora folia incana lanugine pubescerent. Florentem duntaxat colligebam quo, dicam loco, mense Martio. Postea tamen relicatas plantas mactus sum pedales aut ampliores.

Lobel. Obi. & Icon. *Genistella pinnata altera* *Hispanica*. *Chamaegenista peregrina* Clusii. Hist. Lugd. *Chamaegenista peregrina* Clusii, quam Lobelius pingendam curauit. Tabern. *Chamaespartium versum* *Spanisch Erdpfrimmen*. Gerard. Anglo. *genistella pinnata*, *wie ged Greene weede*. Dodon. Lat. in fol. *genista humilis*, quoad Iconem, quæ eadem est cum ea quam Lobelius posuit pro *hispanica*, descriptio autem est vulgaris *Chamaegenistæ*.

Synonyma. *Genistella pinnata.*

Chamaegenistam peregrinam in solis Valentini regni locis incultis & alpeis obseruauit florentem Clusius Mense Maio.

GENISTA

THE

LIBRARY

OF

THE

UNIVERSITY

OF

THE

STATE

OF

NEW

YORK

1877

1878

1879

1880

1881

1882






GENISTA RADIATA SIVE
STELLARIS.

Descriptio

Caulis.

Folia.

Flores.

Cassia-
gnea
Genista Al-
pina.
Scopa Plinij

Genista, quæ radiatam siue stellatam vocamus, pulchra est planta, ramosa: Caulis vnus in tres diuiditur ramos, hirsutus in alios bis, aut ter, aut quater, semper terrores inter nodia duas uncias longa: folia ad vnumquodque geniculum sex verticillatim cauli circumposita, vt in Galio vel Aparine, latiora quàm Galii & molliora,

incana, hirsuta, vti tota planta in viminum valde tenerorum angulosorumque extremis flores densi genistarum, eo ordine quo in Vulneraria rustica, lutei, si rectè memini.

Hist. Lugd. dicitur, genista Iluensis. C. Bauh. frater his nominibus appositus ex Horto Patavino attulit: *Cassia lignea Officinarum*, & Plinii Guilandino: *Genista Alpina* Recentiorum: *Scopa* Plinii.


GENISTA ACULEATA FOLIOSA.

Descriptio

Rami.

Folia.

Spina.



Horridus frutex est genistella aculeata, genistella trifoliâ angulosâ minor, densis tamen ramis fruticans, in quibus folia hirsuta alternò posita nascuntur, genistæ vulgaris formâ, acuminata: sed præter folia longis creberrimisque spinis minacibus armatur, maioresque spinæ minorum sobolem infesto mucrone pungentium è lateribus pariunt: flores

lutei spicati Floris tinctorii vulgaris, semen exiguis siliquis: Radix lenta & sublutea.

An Cæsalp. suffrutex Coronæolz similis, altior: ramulis obsequiosis, lanuginosisque, qui anno secundo aculeis rectis armantur, quibus alii à latere insunt aculei: vt in ea, quam Spinam Christi vocant: folia fert Polygoni: flores genistæ, minutos: siliquas breues & latas Lentis modo, in quibus pauca semina continentur. Tota planta sapore austero & glutinoso prædita est cum modica amaritudine: nascitur inuinculis, & hume-

Tom. I.

ctis. Videtur hæc apud Dioscoridem esse alterum *Acacia* genus, quod in Cappadocia & Ponto nascitur.

Fuchsius asserit genistellam, Germ. appellari posse, die Stechend Ginstl/ Erdpfrimmen / oder fleisch Stechblumen, Gall. *Peris gener*: Est qui non sine magno errore pro genista vtantur. Item qui Rosmarinum aculeatum nominant. Clus. Pannon. & Hist. post. genistæ species à nonnullis genistella speciosa nominata, Vngaris *Islezi*, hoc est, aculeata, Stechend pfrimmen. Gesner. de hortis genista vel genistella aculeata, Dodon. Gall. & Lat. in sol. genistella vel genestella, Belg. Stechend Eroni/ Gall. *gener picquant*. Mihi autem cum in Italia essem, quidam vocabant *Tetrachin* & *Acacia alteram* Diosc. Alii *Rosmarinum aculeatum* Diosc. Lob. & Pen. Adu. genistella aculeata, è radice exigua, virgas graciles, rectas, complures, spinulis infestas submittebat, foliolo Thy-mi vel Elicæ: flore luteo pallente, genistæ minore: etiamque breuiore, rotundiorè que siliqua, & semine Erui subruffo. Observ. & Icon. Plant. genistella aculeata fortè Vlex Plinii.

Figura Tragi minùs placet, nec etiam aridet in omnibus Lobeliana siue Dodonæ: Descriptio Lobelii competit penè nostræ genistæ spinosæ, *Alpalathoidi*.

Hist. Lugd. genistella Tabern. genistella aculeata, fleisch Stechend pfrimmen. Gerard. Angl. *genistella aculeata*, Needle furzes or penie whinnie.

Genistella aculeata prouenit in comitatu Mont-belg. Obseruavi Genevæ eam esse, circa montem *Salene* florentem Iunio, Lugduni cum foliis mense Octobri, Basileæ multis in locis. Frater C. Bauhinus in itinere Basilea versus Augustam Rauracorum. Eam etiam vidi iuxta Mafmunster, Tubingæ in Ducatu VVirtembergico, In Italiæ montibus Euganeis. Non vbiq; hoc genus genistæ reperiri, testis est Tragus, sed in arenosis ac saxosis duntaxat locis prouenit, vt & in sylua quam vocant den ydar ad Mosellam & in Vuasgoia. Fuchf. Nascitur in arenosis locis secus vias. Pluribus per Brabantiam locis incurrit, non nihil humentibus, sed incultis quoque ac neglectis. Per Pannoniam vulgarissima: Frequens circa Francofurtum & multis aliis Germaniæ atque Belgicæ locis.

Sunt qui non sine magno errore pro genista vtantur, quum facultatibus diuersis prædita sit: Maio mense flores luteos producit, quibus pastæ apes improbum mel conficiunt. Adstringentem cum amaritudine facultatem possidet: ac proinde valenter, simulque citra mordacitatem exiccantem. Semen eius serpentibus aduersari tradunt. Decoctum foliorum, pro fluxu mensesuorum sistit. Idem etiam potum Ventris fluxu succurrit. Et, vt rem in pauca contraham, idem genistella, quod Hippuris potest.

SCORPIVS SPINOSVS VETERIBVS.

Intet spinosa authore Theophrasto: Scorpius [scorpius, Gaza Nepa] simpliciter est spina, Non enim vllum habet folium, præter spinam: radicem verò simplicem & breuem [μωρίπρην & ῥαχίπρην] profundamque [βαθύπρην], quod quidem male. Quomodo enim potest esse radice breui, eademque profunda? Quare melius Scalig. legit *διήπρην*, rectamque. Idem lib. 9. c. 14. Scribit de radice Scorpii, vbi Gaza quoque vertit Nepæ: *ve-*

L 2

rum ea alterius plantæ est, nempe Telipho-
ni, quod alii Scorpionem appellant, de qua scribit c.
19. eiusdem libri. Nos autem hist. n. g. lib. 34. de
Aconito. De Plinii Tragio [Tragon legendum
volunt Sarrac. & Gesner.] quem Asia fert siue
Scorpione vepre, vide cap. de Trago Veterum:
vbi ostendimus nos dissentire à Sarraceno existi-
mante Tragon hunc Plinii eundem esse cum
Scorpione Spinoso Theophrasti, quamvis conce-
damus Plinium fortè non benè distinguere Scor-
pionem Theophrasti à Trago. Meminit tamen Pli-
nius lib. 21. cap. 15. Scorpi ex Theophrasto, dum
ait: Spinosarum multæ species. In totum spina
est Asparagus & Scorpio, nullum habet folium.
Item lib. 22. cap. 15. Ex argumento nomen accepit
Scorpius [Scorpioides Dal. de Scorpiode vi-
de hist. n. g. l. decimo septimo.] Est & alia eiusdem
nominis effe&usque, sine foliis, Asparagi caule,
in cacumine aculeum habens & inde nomen. Et
hanc Dal. ait esse Tragon Dioscoridis, quam &
Traganon vocant, & Scorpium tradit. Ego ta-
men existimo de Scorpione Theophrasti potius
loquutum esse Dioscoridem. Est alia herba Tra-
gos eidem Plinio lib. 27. cap. 13. quam alii Scorpionem
vocant, de qua vide cap. de Trago Veterum. In-
eptè putavit Hermolaus Asparagum & Scorpio-
nem unam esse plantam quod apparet ex Theo-
phrasti. & Plinio.

Asparagus

GENISTELLA MONTIS VENTOSI SPINOSA.

Descrip.

Genista lan-
tea.

Rami.

Folia.

Flores.



ri genistella spinosa angustioribus: flores in sum-
mitatibus aliquot aurei, maiores quàm in prædi-
cta genista. Si hæc non est particularis genista,
certè egregia est varietas, quæ nobis ubi videri
mereri propriam iconem,

GENISTELLÆ SPINOSÆ AFFI- NIS NEPA QUIBUSDAM.

Descrip.
Spina pro
folio.

Rami.

Nepa senticosus frutex pro folio Spinaam ge-
nit muctone pungentem, creberrimam,
longitudine inæquali, luniperinis foliis angustio-
rem, & noua spinarum minorum sobole fecun-
dam, viridantem, striatam, sæpè glabram, alias
pilo breui obsitam, quo & obduci sunt rami sel-



quicubiales
striati, & non-
nunquam hirsu-
ti, talis fuit Ne-
pa Valerandi, à
qua non dissimi-
lis, pro Bononiæ-
si Nepa delata,
quæ sanè mul-
tùm habent si-
militudinis cum
genistella acu-
leata foliosa vul-
gari quo tempo-
re foliis destitu-
tur.

Nepa quoque
mihi visa Bono-
niæ Anno 1563.
concolor, & pla-
nè similis, nisi
quod Spina erat

longiores, minùs rotundæ, & firmæ, quàm in
Aspalatho Monspeliensi, sed angulosæ, quæ in a-
liis subdiuiduntur, in summitate ramulorum mē-
se Aprilis apparebant florum pediculi, & veluti ca-
lyces hirsuti. Videtur hic frutex variare pro Anni
tempore, ac pro ætate. Is enim nobis prouenit
in horto, nomine Nepæ satus, sed primo anno ac-
secundo omninò respondebat figuræ Lobelij, cu-
ius ramulum in nostra tabella curauimus pingē-
dum ex Valerandi Dourez planta sicca: tertio an-
no accedebat ad iconem Dodonæi genistæ spino-
sæ nomine exhibitam, nulla folia nobis apparue-
runt. Icon autem nostra facta est ex ramis tri-
bus nobis ex Anglia missis, in quorum vno sunt
in summitate veluti folia latiuscula, hirsuta, in a-
culeum desinentia, in altero flores lutei, maiores
quàm in genista spinosa vulgari, ex breui pedicu-
lo multi simul inter spinas, non ex longiusculis ra-
mis foliosis & sine spinis, vt in genista aculeata
foliosa vulgari: in tertio ramo inter spinas erant
siliquæ latiusculæ, compressæ, breues, nigre, hir-
sutæ, calycibus foliosis æquè ferè longis obte&æ,
in quibus semina bina deprehendimus.

Est & apud nos (Gallos inquit Ruell.) fruticis
genus in montibus & asperis nascens, quo & se-
pes tam viuas quàm stru&iles etiam rustici sti-
pant. Is vice foliorum spinarum armatur vallo,
flore luteo, siliqua breui, in qua pauca semina la-
te clauduntur, rura nostra luncum marinum vel
potius Iomarinum appellant, cui aliquantùm ad-
stipulari Paliuri delineatio videtur, an tamen Pa-
liurus sit non ausim asserere, quòd ei spina pro fo-
lio sit. Quam autem officinæ genistellam vocant,
Græci quantùm aliqui suspicantur Ericen, humilior
tantùm & exilior: colore Marini roris & penè fo-
lio, flore luteo, semine rufo, quod serpentibus
aduersari tradunt. Sunt qui hanc esse putant quæ
Galli Rosmarinum vel Iomarinum appellant, Li-
banotidis folio, sed rigido ac pungente &c. Hæc
ille qui an vnā vel duas plantas intelligat confi-
deres ipse. Nostræ genistellæ affini Nepæ, Spi-
na pro folio est.

Dodon. Gall. qui genistam spinosam & genistam
sylv. Belg. Gaspeldorm vocat, negatque esse Tra-
gacantham, id est, Hircispinam aut Paliurum, vt
quidam putarint, tribuit ei siliquas similes Geni-
stæ, non tamen tales pingit in Hist. Lat. in folio.
Is præterea in folio suam descriptionem compo-
nit ex sua priore Gallica & ex Clusij Scorpione i.
Hispanico. Miror item apud Dodonæum Scor-
pij

Nepa Va-
lerandi.Nepa Bo-
noniæ.Variæ fi-
gurae.
Icon Lob-
elij.Icon Dodo-
næi.Icon nostra.
Folia.

Flores.

Siliqua.

Locus.

Vitis.

Semina.

Iuncus ma-
rinus.Iomarinum.
Paliurus.

Erica.

Rosmari-
nus.

Genista

Spinosa.

Tragacantham.

Paliurus.

non est.

Dodonæus

natus.





Vires & Floribus quidam apud Lobelium lubentes ad iſterum viridem vtuntur, & toto cremio calfaciunt furnos. Alpalathi floribus prioris cum Saccharo fermentatis, Salmanticenſes ad firmandas & reſtaurandas collapſas vires vtuntur, Cluſ.


ASPALATHVS ABROTONI FACIE INCAANA.

Deſcriptio AD cubiti nonnunquam magnitudinem accedit Alpalathi 2. genus tertium Cluſii, *Malada* Cantabris vocatum: plerumque tamen minus & pedali tantum altitudine, totum etiam tenerius: ramuli in multo plures ſpinas diuifi, & iſte denud in alias, ſic vt ſingulæ ſpinæ totidem folia Abrotoni multifida videantur, niſi aculei obſiſterent, qui, niſi quis accuratius conſideret, viz animaduertuntur: ex ramulorum lateribus exiſtunt alii Vere prodeunt ramuſculi incani & h. r. ſi. ti, quibus adnata ſunt folia mollia & incana Lenticis, ſed maiora quàm in primo genere: & in ſummis iſtis ramuſculis flores ſeni aut octoni geniftæ aut Pii formæ, ſed maiores, quàm in primo, colore luteo.

Locus. In Cantabris ſolum ad radices Pyrenæorum, quæ Hiſpaniam ſpectant, tertio à Victoria militari.

ASPALATHO MONSPELIANO AFFINIS SCORPIVS L. CLVSIO.

Deſcriptio



Deſcriptio ſpina. AD Scorpium quæ Gaza Nepam interpretatur, inquit Cluſius, etiam ſecundum Scorpii genus accedere videtur, quod pedis altitudinem raro ſuperat, totum denſiſſimis ſpinis horrens, quæ non conſuſo ordine, vt in ſuperiore naſcuntur, ſed ſcixiem quandam ſeruant, & ſemper cõtrario inter ſe exortu binæ naſcuntur,

virentes quidem, ſed languidiùs quàm ſuperioris, neque aliz ex aliis: lumnis ramulis inhzrent binæ aut terni flores ſuperiori ſimiles, lutei coloris, menſe Martio: quo tempore exiguas, breuesque ſiliquas, vel potius ſemina Erni magnitudine, includit membranâ quadam multâ, incanâque lanugine hirsutâ, deprehendebat denſiſſimis ipſius plantæ ſpinis occultata, ut ex ſuperiore ætate deciderant: aded verd canescebant, vt initio aranearum telas eſſe exiſtimaret: radix ſingularis, ſed in plures deinde propagines ſparſa, dura & lignoſa eſt.

Flora. Hoc genus Granatenſes *Melino* vocant. An Echinopoda cuius Bellus meminit plurimum certè Cluſio ad illam accedere videtur.

Geniſta ſpinoſa. Dodon. Lat. in ſol. *Geniſta ſpinoſa* altera Icon. Geniſtam vocat Dodonæus præter mentem Cluſii.

Tom. I.

ſi, cuius Icon à Dodonæo propoſita.

Lobel. Obſ. & Icon. Plant. *Geniſta*, *Spartum ſpinoſum alterum*. Scorpius 2. Cluſii. Debetur hæc Nepæ Carolo Cluſio, qui eam primus ab altero Spartio ſpinoſo diſtinxit.


Hist. Lugd. *Scorpius Theophrasti* [ſive Alpalatho Monſpeliano] *affinis*, vel *idem Scorpius* à Cluſio deſcriptus. Fallitur Compiler. Non enim parum diuerſum, & non eundem oſtendit manifeſtè ſeminiſ deſcriptio.

Tabern. Icon. & Hiſt. Scorpius 3. *Scorpius* f. aut. Eccc Compiler. Tabern. vocat fruticem Germ. *frut*.

Gerard. *geniſta* 1. *ſpinoſa maior*. *Urcatſürze buſch*.

Collibus Granatæ vicinis itinere Cordubeniſi Locum duntaxat, nec vſquam alibi Cluſio conſpectum.

GENISTA ERINACEA.



Planè noua, Deſcriptio

& tota elegans eſt hæc planta dodranthalis, in orbem per ſolum d. ſpina. ſa, multis ſpinis virentibus, ſive aculeis horrida. flores geniſtæ, ex cœruleo purpureſcentes, minores, calyculis incluſi hiſpidis, villoſis, omnino ſerè incanis, binæ aut terni ſimul ſemper cõiuncti: foliola interdum, dum floret, producit, ſed raro, eaque

per pauca. Lenticulæ ſimilia, quæ cùm breui marceſcant & decidant, tota planta maxima ex parte ſine foliis ſpectatur, & multiplici ſpinarum vallo Erinaceum in ſe conuolutum repræſentat: radix lignoſa & magna eſt pro plantæ porportione.

Incolæ *eriz* vocant, hoc eſt, *Erinaceum*, quoniam Erinaceum animal terreſtre, dum in orbem ſe contrahit, aut maruin, aculeorum & ſpinarum vallo planè æmulatur: quæ aded cauſa ſuit, vt illi Erinaceæ nomen inderem, donec commodius aliquod ex veteribus Scriptoribus dare poſſimus. An verd incolæ ad modicum aliquem vſum adhibeant, non intellexi.

Lobel. Obſ. & Icon. Plant. ſub falſo titulo huius Iconem habet. Eſt autem iſ titulus *Spartum aphyllon* fruticoſum iuncis aculeis, lunatis capitulis. Hic enim inſcriptione in *Aduerſariis*, geniſtam ſive Spartum noſtrum purgens exhibuerat antè. Erroris huius cauſa eſt, quia vnâ eandemque plantam eſſe, ſibi ita imaginariè perſuadet, vt mox dicemus.

Hist. Lugd. *Erinacea* Cluſii. Tabern. Icon. qui nõ nouit diſcernere inter fruticem & herbam vocat *Scorpium* 4. *Scorpius* frut.

Gerard. *geniſta ſpinoſa* humilis diuerſe orloſe ſurze.

Nāſcitur regno Valentino, affluenter verd circa *Siete aguas* oppidulum, ſeptimo ab vrbe Valentia militari, Madruano itinere, aſperis locis &

h l 4



Spina.
Flores.

Tempus.

Radix.

Scorpius.
Clupe.

re, absque foliis: diuisus tamen in exiguos frequentesque ramulos: hique rursus in spinas durissimas breues viridantes: intra quos ut plurimum aliz subnascuntur: flores florentes ex albo flauescerent, quidam etiam ad purpuram accedentes. Floret mense Septembri. Decidunt postea flores nullum post se relinquentes fructum [quantum quidem obseruatione nostra confes- qui potuimus] exceptis quibusdam ceu vasculorum specie, figura oliuari, in quibus tamen nihil reperitur. Radice vnica & simplice vitur, haud magna valde.

Si Anguillari non tradidisset Acaciam alteram, quæ videtur conuenire cum Aspalatho secundo Monspeliensium hanc ed referendam fortè putarem, considerandum an sit Scorpius primus Clusii diuersus ab Aspalatho Monspeliensi secundo, quem suspicamus genisteille spinose affinem, Nepam quibusdam dictam.

AGVL ET ALHAGI ARABIBVS PLANTA SPINOSA MANNAM resiciens.

Descriptio

Spina.

Flores.

Siliqua.

Semen.

Manna.

Sarcoti.

Folia.
Radix.Synonyma
Agul.
Alhagi.

Algul.

Locus.



FRutex est cubitalis, aut altior, densissimo, spinarum acutissimarum gracilium flexiliumque stipatu refertus: Ex quibus plurimi pendunt flores rubelli: eis deciditibus succedunt siliquæ rubentes, quales in Scorpio Monspeliensi me vidisse memini, semine concolori sactæ. Ex hac Halepi incolæ nouum quoddam Mannæ genus legunt, cuius gra-

na Coriandro nostro maiora paulo, adeoque figura & sapore Mannæ nostræ Larceæ persimilis. Surculis porro infinis propemodum donatur teretibus, & à trunco eleganti ordine hinc inde sparsis, maiori ferè parte Cuscuta obstitis, velut in Thymo. Folia ad spinarum exortum hærent oblonga Polygoni figurâ, cinerea: radix satis longa, purpurea. De Manna in Alhagi vel Agul proueniente scripsimus lib. 8. cap. de melle aërio siue Manna sub titulo: Manna Italice Tereniabin aut Trungebin.

Ravvolf. Arabibus Agul & Alhagi frutex, ex quo colligunt Persæ Manna: supra spinosos autem frutices prouenire Mannam testantur Serap. Auicenna, ac etiam Clusius in epit. Indis um plantarum. Idem Icon. Peregrinus frutex Ethiopibus Agul & Algul, supra quem potissimum cadit in Persia Manna, quam ipsi *Transchibin*, Arabes autem *Teneriabin* & *Trangibin* nominant.

Hist. Lugd. app. Planta rara spinosa Maurorum *Alhagi*, *Agul*, & *Algul*. Manna quæ his arboribus inhabitat, *Tiriambiabin* à Costa vocatur, qui & Carduis insidere scribit.

Prouenit in Persia & circa Halepum: & circa Kacka urbem Mesopotamiæ.

Folia eius calidæ sunt sicæque naturæ. Horum usus incolis ad purgandum, quibus se purgaturis manipulus vnus ex aqua coctus, in singulas doses sufficit.

Vires.

TRAGVS VETERIBVS.

Nilli noui si hodie adhuc plures de Trago Vetterum habeantur opiniones, cum iam prioribus, auctore Dioscoride *Τράγον* aliqui *ερίων*, *Τράγον*, *αλι τραγαν* [quasi edule dicas, vet. *κοινον* *ερίων*, *Scorpius*.] *Coccum* baphicam addit Sarrac.] vocant. Est autem ut Diosc. prodidit, frutex pusillus [*ερίων*] in maria nis maximè nascens, per terram sparsus [*ερίων* *ερίων*, quibus Vetus caret] oblongus, at non ita magnus, palmi altitudine, aut paulò amplior: & is quidem sine foliis est: circa ramos autem hærentes habet velut acinos pusillos, rufos, tritici grani magnitudine, summa parte acuminatos, numerosos, gustuque admodum adstringentes. Racemorum acini decem ex vino potu cæliacis, feminisque fluore laborantibus auxiliantur. Sunt & qui tulos digerunt in pastillos, quò facilius assuerunt, isque ita vtuntur.

Diosc. Scorp.
illustratur.
Tragum.
Scorpius.Tragum.
Coccum baphicam.Locus.
Diosc. locum
refertur.
Sine foliis.
Acini.
Triticea
grana.
Vires.
Diosc.

Eandem hunc Dioscoridis Tragum ita depingit Plinius. *Tragion* & *Asia* fert, siue *Scorpio* nem veprem [imò Iunci genus *Dalech.*] sine foliis, racemus rubentibus [subeuntibus *M.*] ad Medicinæ usum. Idem alibi, Est & alia herba *Tragos*, quam aliqui *Scorpio* vocant, semipedem alta, laticosa, sine foliis, pusillis racemis rubentibus, grano Tritici, acuto cacumine & ipsa in maritimis nascens. Huius ramorum decem aut duodecim cacumina trita [huius racemorum acini decem triti, legend. ex Diosc.] ex vino pota [poti] Cæliacis, Dysentericis, sanguinem excreantibus, mensiumque abundantia auxiliantur. *Dalech.* apud Plinium lib. 22. cap. 15. vbi Plinius ait: Est & alia eiusdem nominis scilicet *Scorpii* & scribit intelligi *Tragon* Dioscoridis, nos autem quia dubitamus num potius intellexerit *Scorpio* nem siue *Nepam*, ut etiam censet Sarrac. Theophrasti totum locum sub *Scorpio* ne Veterum posuimus.

Cæterò, *Tragum* de multis plantis dici, ita demonstrat. *Tragus* siue *Scorpius* Diosc. dicitur de *Vua marina* vulgò, quem verum censemus *Tragum*. Et hæc opinio fuit *Dalechampi* & *Gesneri*, nec displicet *Clusio*, nec etiam *Lobelio*. Apud *Castorem* *Durantem* pro *Trago* siue *Vua marina*, posita est *Icon* *Tragacanthæ*: de qua paulò post Plinius auctore *Cæsalpi* miscuit *Tragon* Dioscoridis cum *Scorpio* *Theophrasti*, quem *Nepam* interpretatur *Gaza*, de ea opinione vide *Hist. n. g. lib. 17.* titulo *Tragus Cæsalpini*. De *Trago* *Matthioli*, qui à plerisque, ac à me reicitur, & *Tragus* *Matth.* pungentibus foliis inscribitur, ægetur suo loco. *Cali* Amato est *Tragus*, quæ opinio meritò non placet *Cæsalpi*. *Salicornia* *Dodonæo* est species *Tragi*, quam opinionem non probonec etiam *Cæsalpinus*: *Tragos* *Euratio* *Cordo* & filio *Valerio* & *Leonicerio* est *Sedum minus* flore candido, quæ sententia à me eiicitur. *Tragus* *sylu. Cordo*, mihi *Sedum folio circinato*. De his quatuor lib. 35. *Ruellium* hallucinatum esse scribit *Amatus* quum *Tragum* *Iunci* speciem esse dixerit, cui quoque *Matthioli* subscripsit. *Tragi* genus minus & alterum grandius *Cæsalpini*, vide *Hist. n. g. lib. 17.* post *Trifolium album* rectum. Inter spuria nomina Dioscoridis, inuenio *Tragion* alterum dici *Tragon*, quidam volunt *Fraxinellam* *Hist.*

Tragi.
quæ uoca-
tiones.
Tragus si-
ue Vua
marina.Tragacanthæ
Icon.Scorpius
Theophr.
Tragus
Matth. pū-
gentibus
foliis.
Cali geni-
cinatum.Sedum mi-
nus flore
candido.
Sedum folio
circinato.Iunci spe-
cies.
Tragi duo
Cæsalp.

Fraxinella

HISTORIAE PLANTARVM.

ing. lib. 10. Tragos de Erineo arbore diuersa à Ficcu apud Gesnerum quadrip. Ex Caelio Tragos videtur etiam panis nomen fuisse Gesner. quad. Dodon. de purgantibus asserit Trago Dulcichi- num dici, quod nos Trafi appellamus, de quo hist. n. g. lib. 18. Tragos inter frumentacea de quo Dio- scor. lib. 2. & Sarrac. in Icholiis. De hac hist. n. g. lib. etiam 18.

TRAGVS SIVE VVA MARINA.

Descript.



Medulla.

Tragus fru-
tex parvus,
vix interdum
palmum exce-
dens, nonnun-
quam cubitalis,
stipite lignoso,
simplici, qui
post ex vno ve-
ri capite com-
plices profert
ramos viridates,
striatos, fractu
cōtumaces, ad-
stringentes, me-
dullā viscosā
[quæ resiccata
rubescit] ple-
nos, crebris ge-
niculis interce-
ptos, inque fre-
quentes ramu-

los rursus diuiduos, quibus ex articulis dur-
taxat est exortus: atque in his quidem nec folia
nec foliorum vlla comparent vestigia: Verū ē
geniculis Equiseti modo prodeuntes ramuli, flo-
res in summo sustinent glomeratim congestos,
multos, paruos, luteos: in fructum abituros Rubi.
Moris similem, ex acinis rubris compactilem, sa-
pore dulci, nec ita tamen vt Mora, gratum edulem
tamen: Hisce semina insunt gemella, oblonga,
qua se mutuo spectant, plana, alterā parte leuiter
in gibbum protuberantia.

Flares.

Fructus
super.

Seemen.

Anguill. Croton Commentatoris Nicandri. An
Matth. in post. com. Lat. & Italcum mag. fig. Coda
di Canallu 4. id est Equisetum quartum, pingit nec
describit. An Gortzen del. med. πῆζον, Herba-
riorum luncus marinus, ab eis quibus πῆζον vo-
catus. An Gesn. in Cat. pl. πῆζον? Vbi Castor
Durant. πῆζον & πῆζον nominat, ibi descriptio
est Vuz marinz, Icon autem Tragacanthæ. Sarrac-
eno non possū concedere Tragum seu Scorpionem
Plinii lib. 21. cap. 15. esse Scorpionem Theophras-
ti siue Nepam, quia acinos rubentes ei tribuit,
quod Theophrast. de suo Scorpio non scribit: Plin-
ius fortē non bene veprem dixit, non distin-
guens Tragon Dioscor. à Scorpio Theophrasti.
Hist. Lugd. Tragus siue Scorpium marinus Dale-
champij. Item Equisetum quartum Matthioli. l.
10. cap. 67. Item Osteocollon, quod fracta ossa
ferruminet. Abundat Hist. duabus figuris & de-
scriptionibus, quæ certo indicio sunt Compilato-
rem Historiæ non nouisse plātas, ac idē ignoras-
se quid pingeret aut scriberet. Ruslici vocant
Mora marina, quæ occasio vt olim appellari Ru-
bium marinum donec à Domino Dalechampio &
Gesn. intellexi esse Tragon Dioscor. quæ sanē o-
pinio placet: quamquam non intelligam quid ve-
lit Dioscor. cum de Tragi fructu ait ὀζύς τε & ἄγρυ.
Gesnerus olim annotauerat ad Anguillatam, vbi

Robur ma-
rinum.
Tragus
Diosc.

de Crotonē ait: An Polygoni species Gesnēro. Polygoni
Camer. hort. Tragus Vva marina, cuius icon ex sp. Gesn.
Gesneriano typo deprompta. Sciat autem Ca-
mer. Gesneri figuram factam esse ad meam plan-
tam siccam. Cusp. Bauh. Phyt. Vva marina 2. siue
minor. Item Vva terra Osteocollon Lugd. idem
cum præcedenti aut certē eius species aliqua. Ta-
bern. icon. Vva marina Mompeliaca Meertrauben
von Mompelien. Clusius vocat Polygonum
quattuor minus, Vuam marinam, raisius de mer
Galliz Narbonensis: Meo tempore, inquit, peri-
tiores ad Dioscoridis Tragum siue Tragum lib. 4. Tra-
descriptum referebant: cuius sanē aliquot notæ
non ineptē huic plantæ quadrant: Nonnulli po-
stea ad Androsacen retulerunt Bellonium secuti,
qui lib. 1. obseru. cap. 41. de Androsace agens, hanc
inuere videtur. Anguillara Crotonis cuius Ni-
candri interpres mentionem facit) nomine hanc
ni fallor, describit editione duodecima. Multis ve-
rō notis, primum præsertim huius plantæ genus,
mihi cum Polygono quarto Plinii quadrare vide-
tur, quod describit lib. 27. cap. 11. Posset tamen
ad eiusdem Ephedram fortē etiam referri, quæ
quibusdam Anabasis etiam dicitur. Hanc Bello-
nius lib. 1. & 3. obseru. arbores consendere dicit, cu-
ius fructum, Androsaces similem, rubrum edidisse
refert. Ego verò hanc solam plantam ferē na-
scentem, & sese sustententem, neque vllō admi-
niculo egentem inueniebam. Fuit quando Lo-
bel. & Pena, Tragum, Androsacen opinati fuerūt:
sed illos retinuit Pliniana versio, quæ hic accu-
rior quàm quæuis alia. Idem alibi dubitant, An
racemosa Equiseti facie planta, sit Tragos vel Tra-
ganon Dioscoridis: & postea, Traganon vocant,
prostitunturque Mompelii Raisius de mer seu ma-
rinam Vuam vocari. Lobel. Obseru. Tragos siue
Vva marina maior. Num Equisetum quartum
Matthioli, depictum non descriptum? An Cro-
ton Nicandri Anguillaræ? Titulum Lobelii huc re-
fero, non figuram, quæ sequentis Tragi est: Vva
marina Mompeliensis.

Vva mari-
na.

Tragus.

Androsace.
Croton.

Polygonum
4. Plinii.
Ephedra.

Tragus.

Androsace.
Traganon.

Mompelii Tragos, frutex copiosè prouenit a-
pud mare: Florentem vidi vere, & fructum feren-
tem mense Augusto & Autumno. Hanc ean-
dem plantam vidi Bernæ in horto Benedicti Are-
tij: Basileæ durat à plurimis annis in horto D. Iac.
Zvingeri. Montbelgardi aliquando mihi proue-
nit in horto Ill. E.C. Frater obseruauit Mompel-
suli florere Maio & Iunio. Reinaudetus Phar-
macopœus misit hoc titulo ex Prouincia, Planta
marina Equiseto similis: Gener Cherlerus pul-
chras plantas attulit Mompelio. D. Doldius
misit plantulam Norimbergæ. Frequentem inue-
niebat Clusius in colle quodam à Salmantica mi-
liari, longissimè à mari, quod equidem satis mira-
ri non potuit, cum antea copiosum obseruasset
locis maritimis, & toto illo tractu inter stagnum
Volcarum & Mare Mediterraneum supra Perant
& Megalman ad montem vsque Selium.

Locus &
tempus.

Vires antè recensuimus ex Diosc. quæ videntur
meliùs conuenire surculis quàm acinis.

Vires.

TRAGVS SIVE VVA MARINA MAIOR.

Humana interdum altitudine fruticat, Sparti.
quod Hispani Rotama vocant, modo, bra-
chialis crassitudinis aliquando stipite, oblongis
ramis, nigricantibus, qui deinde multas virgulas
ferunt pedales, tenues, multis internodiis distin-
ctas, vt Equisetum ferè, propendentes, sine foliis,
admodum

Descriptio

Rami.
Virga.

Locus. Nascentur plurima circa *Guadia & la vencia el peral*, Granatensis regno, in collibus, arido, & inutili solo, nec alio loco conspexit Clusius.

TRAGACANTHA RAUVOLFII.

Descriptio **T**ragacantha altera Rauwolfii, paulò humilior est primà, persimilis tamen, nisi quòd strobilos fert luteos, confertos pediculis longis hærentes, quorum singulares rotundis & flavescentibus folliculis insident. Tertia altitudo par, virgæ robustæ rubentiores, in quibus conspiciuntur alba lanuginosa Poterii capitula, purpureis strobilis ornata.

Inter Icones Rauwolfii No. 281. Spitz Traganthæ aliud genus. Hist. Lugd. in Append. Traganthæ alterum genus.

POTERIVM ANTIQVIS.

Poterion Iones, quod apud Dioscoridem, Neurada vocant. Frutex est magnus, ramos habens longos, molles, lori modo lentos, tennes, Traganthæ similes: folia parva, rotunda. Totus autem frutex tenuem lanosam lanuginem oblitam habet, & est spinosus. Flores sunt parvi, albi. Fructum autem fert gustu odoratum, & acrem, inutilem. Nascentur in palustribus, & locis terre editioris. Radices subsunt duorum, aut trium cubitorum, robustæ, nervosæ, quæ ad terram refectæ lachrymam remittunt gummi similem. Hæ contusæ & in cataplasmate impositæ, nervos dissectos & vulnera glutinant. Sed & decoctu nipsarum porum, nervorum affectionibus conuenit. Sunt & ranis venena, rubetis maxime, vidimusque, inquit Plinius, Pysillos in certamine patinis candefactas admittentes, ocyore etiam quàm aspidum perniciem. Auxiliatur eis Phrynion in vino pota: aliqui Neurada appellant, alij Poterion, floribus parvis, radicibus multis, nervosis bene olentibus. Item postea: Poterion, aut ut alii vocant Phrynion vel Neuras, largè fruticat, spinis retortida, lanugine spissa, foliis parvis, rotundis, ramulis longis, mollibus, lentis, tenuibus, flore longo, herbacei coloris: seminis nullus usus, sed gustu est acuto & odorato. Inuenitur in aquosis collibus. Radices habet duas aut tres, binè cubitorum in altitudinem, nervosas, candidas, firmas. Circumsoditur Autumno, & præciso frutice dat succum gummi similem. Radix mira vulneribus sanandis traditur, præcipueque nervis vel præcisis illita. Decoctum quoque cum melle potum, dissolutiones nervorum, & infirmitates, & incisuras tuuat. Ego, inquit Cornarius, non aliam plantam Poterion esse sentio, quàm eam spinam aculeantem, quæ à nostris Prunus sylu. [Schleedorn] appellatur, cui & parvi albi flores sunt, & reliqua omnia Poterii à Diosc. attributa, maxime tamen fructus gustu odoratus, velut Dioscor. ait, κατὰ τὴν δόξαν, ὡς δὲ αὐτὸν ἔχει. His enim locis de Græcis conuersis Plinius non cognovisse videtur, quæ planta Poterion esset: alioqui enim priore loco non flores parvos, quæ αὐτὸν μὲν legit, ei attribuisse: posteriore verò flores longos, còsque herbacei coloris, velut qui αὐτὸν μὲν λέγει, legere: quum recte lectio sit, αὐτὸν μὲν λέγει, velut Diosc. habet. Plinius huius velut ignarus κατὰ Diosc. semen dixit & δεικνύει acutum reddidit, quum neque acutus, neque δεικνύει propriè sit, sed σφύρον.

Cornarius malè sibi persuadens Prunum sylvestrem esse Poterium Plinium videtur nobis sine causa redarguere, quòd δεικνύει dixerit acutum: si Plinius ignoravit Poterium ipsi etiam fuit incognitum, non enim potest esse: Prunus sylvestris, ut indicatum lib. 2. cap. de Pruno. Galenus Neurada, quam aliqui Poterion vocant, siccantem citra mordacitatem vim habere ait, ut nervos dissectos glutinare credatur. Sunt autem, inquit, radices eius maxime tales. Et sanè etiam decoctum ipsarum quidam his qui ex affectis nervis laborant exhibent. Ceterum, quòd nervis peramica sit nipa & vocarunt, & Poterion forte, quia potrix paludosi, rigique soli amans sit.

Iam diximus Cornarium malè existimasse Prunum sylvestrem esse Poterium. Pimpinella spinosa, ut paulò pòst dicitur à quibusdam censetur Poterion, quod non placet Honorio Bello, nec nobis.

Clusius pro Poterio exhibet Traganthæ genus, de quo paulò ante.

Lobelius assent Poterium Mitthioli nihil aliud esse quàm Tragantham, quæ & nostra est opinio.

Aiunt, inquit Anguill. Poterion reperiri in Cantania & Messina Siciliæ, verum quia eam plantam nos viderim, nihil præterea dicere possum.

Palustria vaccinia siue Oxycoccum Cordi, sunt auctore Loechio, Poterion Dalechampi.

POTERIVM QVIBVSDAM SIVE PIMPINELLA SPINOSA.

Lignosis ramulis pæmaribus & longioribus, densissimè fruticabat mihi in horto, cancellata ramulorum minorum & spinarum brevium rigidarumque agmine patuli, cortice rubente & hirsuto: foliola pimpinellæ linguiformis, multò minora, hirsuta, eadem incisura in alæ formam disposita costæ adherent à spinis diversæ, subtus glauca, superius saturatè virentia. Natali verò solo hærentem plantam Rauwolfius in Hodeper. scribit, fruticem peregrinum spinosum, caulibus cubitalibus densè fruticare, multis in terram procumbentibus ramis, pleròque verò omnes stolonos statim ex radice rubente, saporis sicci & nonnihil amaricantis oriri, cortice tectos, exteriorè incano tenero, cui alius subsit rubeus: foliis esse tenellis longiusculis in pediculis ordine ex aduerso positis, supernis utrinque virentibus, infernè cinereis, nostræ pimpinellæ linguiformis similibus: flores primo Vere conspici herbacei coloris, stellatos, parvos, quibus succedant bæccæ exiguæ, albicantes, cum paucillo rubore, ordine quodam ad ramos sessiles, his nostri bæccis haud absimiles, conspicuo adhuc in vniuscuiusque bæccæ umbilico flore.

De hac planta hæc tradit Honorius Bellus in Epist. ad Clusium. Elegantissima planta, quam [nisi fallor] nonnulli Poterion perperam appellant, alii pimpinellam spinosam. Planta hæc perpetuò in Creta viret, multòque annos durat, in orbem diffusa, in vno pediculo folia plura utrinque disposita, quæ cùm Autumno primùm erumpunt in se contracta videntur; & Aspleni folia quodammodo imitantur, sed longè minora, quæ tamen successu temporis maiora apparent, & pimpinellam Sorbastellam vocatam foliorum positu & diuisuris æmulantur, minora verò sunt. Tota plantæ æbris figuris & tenuibus spinis scatet: semina Rubi aut Mori imitantur, plures e-

Plinius ex-
casatur &
Corni re-
prehendi-
tur.

Prunus syl-
vest. non est
Poterion.
Tempera-
mentum.
Nervus.

Vires Neu-
ras Galen-
us

Neuras

vide.

Poterio cur

Prunus syl-

Pimpinella

spinosa

Traganthæ

iba.

Locus.

Vaccinia
palustris.

Descriptio

Ramuli.
Spina.
Folia.

Descriptio
Rauwolfii.
Caulis.

Rami.

Folia.

Floris.
Bacca.

Descriptio
Bellii.

Spina. Se-
mina.

Flores?

Epithym.

Locus.

Thymus.

Thymus.

Thymus.

Thymus.

Stoebe

Bellan.

Hippophaes

Rauvolf.

mutatur.

Poterion.

Mazius.

Stimida.

Bellan.

Sanguifor.

ba spinosa.

Hist. Lugd.

mutatur.

Calici si-

ne Aeracia

Theophr.

Contra

Clusium.

Citra Ca-

merarium.

Afinida.

Chalcama.

Stoebe.

Locus &

recipus.

Poterion.

enim simul congesti sunt, initio virides, postea ad rufum tendentes: flores paruos, carnosos ex viridi rufescentes multosque simul congestos profert. Super hanc stirpem nascitur Epithymum, quemadmodum super Thymum usdem collibus frequentissime inuenitur, in quibus & Thymum & Thymbra & Asparagus proneniunt, nunquam autem inuenitur palustris. Adstringendi vi pollet, vulgariterque in tota Graecia *cozinda* vocatur. Quid autem sit Dioscoridis Stoebe, & Phleos Theophrasti, [non Phleum quod à Phleos diuersum] Stoebe Plutarchi, & Stoebe Aetii, ut cum Hononio sentimus, dicemus ibi, ubi de Veterum Stoebe & Phleo scripserimus.

Planta à Rauuolffio hic descripta *Tripoli* ab incolis in itiner. lib. 2. cap. 12. pag. 286. & 287. de plantis *Bellan* vocatur: ex stimat autem is esse *Hippophaes* Dioscor. propter figuram. Vires non est expertus, nec succum. Idem inter icon. Num. 287. Peregrinam spinam Aethiopibus *Bellan* dictam scribit, proponens dubiè, An *Hippophaes* Dioscor. Sed *Hippophaes* Dioscoridis esse non potest *Bellan*, cui non sunt folia Oleæ, nec succus lacteus, nec facultas purgandi sed contraria adstringendi.

Lob. & Pena Adu. *Poterion* aut *Néon*. Oheru. *Poterion* Cypriis *Mazius* & *stimida*. Icon. pl. *Poterion*. Hist. Lugd. *Poterion* *Penz* & *Lobelii*: Item in append. Maurorum *Bellan* fortasse *Sanguiforba* spinosa. Item lib. 4. cap. 31. *Poterion* *Penz* & *Lobelii*. Existimamus *Coupil*. Hist. Lugd. non admodum peritum stirpius, confudisse cum *Lobelii* *Poterio* *Vaccinia palustris* quæ quondam *Dalec. Poterion* censuit, tute *Lobelio*: Nobis etiam non sit verisimile *Pimpinella* spinosam loco modo dicendo prouenire. *Dalechampius*. inquit *Clusius*: *Poterion* in *Allobrogibus* propè *Muram* oppidulum *Gratianopoli* vicinum in siluosis conuallibus reperiri ait. Sed si eam intelligit à plantâ quæ pierisque *Poterii* nomine donatur, vereor, ut suam opinionem legitimis rationibus tueri possit: quippe cum ea planta penitus à *Tragacantha* differat: nonnullis *Pimpinella* spinosa appellatur: Nonnunquam etiam mihi missum eius semen *Stoebes* *Theophrasti* nomine, & vulgò adhuc ipsam plantam in *Creta* vocari *Aeracis* *asibida* scriptum. *Anguill.* videtur ad *χέρνικον* siue *Aeraciam* *Theophrasti*. referre. Quandoquidem autem *Pimpinella* spinosa, folia non habet *Lentis*, nec fundit Lac, nobis non videtur *Aeracia* *Anguillæ*: hac in parte igitur dissentimus à *Clusio* & *Camerario* hort. dicente: *Afinida* *Cretensium* à *causu* ut quidam putant corrupto nomine *Pimpinella* spinosa, forsitan *Chalcama* & *Aeracia* *Anguillæ*. *Poterion* *Lobelii* idem cum *Pimpinella* spinosa. *Hort. Patau.* *Stoebe* quorundam *Afinida*.

In decliu montis *Libani* parte nasci vidit *Rauuolffius*, *Augusto* satum prouenire, sed hyeme perire. *Lobelius* primum vidit in quadam areola horti *Patauini* opera *Guilandini*: Deinde ex *Australi* tractu *Pedemontanæ* regionis vulsum ipsi misit *Pharmacop.* *Massiliensis* *Iacobus Reinaudetus*. Priusquam scriberet *Lob. & Pena* multis annis *Poterii* nomine *Dominus Cortufus* *Patauii* demonstrauit plantam siccam & viridem, quæ hic erat etiam in horto publico virens *Martio*. *Dominus Cortufus* alebat in vase, folia accedebant ad *Sanguiforbam*: sed minora, multa, spinæ etiam multæ longæ, plantæ altitudo vix ad quinque digitos proueniebat. *Montbelgardi* fata in *Horto* *III. E. C.* quæ primum autè animæ morte-

rem prouenientem, dubitabam an esset *Sanguiforba*: reposita, hieme perit. *Frater Casp. Bauhinus* mihi indicauit *Cortuso* esse *Chachion* & *Aeraciam* *Anguillæ*. Ex *Burgundia* missum mihi semen nomine *Afinida* *Cretensium*. Semen mihi præterea missum *Stutgardia* ex seminibus ab *Hortulano Ducis Florentiæ* missis cum hoc titulo: *Pimpinella* spinosa an *Stoebe* vera *Cretica*.

Stiuida facultas est adstringentis & adhuc in sanandis alui fluxibus indistinctè à rusticis *Cretensibus* usurpatur. Nam eius in aqua decoctionem ieiuni bibunt, & à morbo ut aiunt liberantur, *Bellus*.

Calici

Et Anguillæ

Pimpinella

Spinosa

Stoebe Cretica

Vires & u-

sus

Alui fluxus

Descriptum

HIPPOPHAES ANGVILLARÆ

ET DODONÆI, SIVE SPINA

purgatrix.



Hippophaes inquit *Anguillæ*, epist. 8. *Sabulosis* *Peloponnesi* maritimis, quæ nunc *Morea* dicitur, *Vires* oritur, cuius radix ob vehementem vim purgandi quibusdam spinæ purgantis radice nominatur, suffrutex est spinis durissimis: spargit se in comam rotundam, albam: folia Oleæ longiora, angustiora & teneriora:

nec florem, nec fructum vidi, fortè eum offendendi non erat tempus: radices palmos longiores, lacteum succum frangendo fundunt amarissimum, odore graui, similem plantam in *Italia* non reperi.

Dodon. *Latin* fol. *hippophaes* ex *Cod. Cxf.* *hippophaes Anguillæ*, *hippophaes* *Dioscoridis* & *Plinii*. *Lobel. & Pena Adu.* *Hippophaes*, *hippophaestum* vocatur vulgò *Spina purgatoria*. *Casp. Bauh. Phyt.* *hippophaes* ex *Cod. Cxf.* *Dodon.* *Anguill.* non nouim. *Hist. Lugd.* *hippophaes* *Dodon.* & *Anguill.*

Radix.

Odor.

Descriptio

Spina.

Folia.


HIPPOPHAESTVM, QVORVMDAM

DALECHAMPIO.

Spina hic depicta, ad *Dalechamp*. *Hippophaes* *Siti* nomine missa est, à *Melita* insula, de qua apud *Hist. Lugd.* nihil allerit, sed lectoribus liberam iudicandipotestatem relinquit. Est autè spina candida, diffusis huc illuc ramulis, aut potius spinis, sparsa: flore exiguo, albo, veluti racematim congesto. An *Cathartica* sit, an succus lacteus purgatorius, radice, caulibus, foliis exprimat, asseuerare non potest, quoniam arida missa est planta, nulla adiuncta nutrientis historia.

ECHL





HISTORIAE UNIVERSALIS PLANTARVM LIBER DVODECIMVS





QVI EST ARBORVM SILIQVOSARVM RARIORVM,
HISQVE SIMILIVM.

EST & Siliquosus arboribus sua tribus. Ut frustra Vereres plerique fuisse videantur, qui siliquis legumi-
nis tantum tribuerint. Quamquam & Plinius, & Columella, & Galenus Siliquam arborem per emi-
nentiam ita dictam utique agnoverint. Est sane Siliqua ^{ex parte} Græcis, omne f. siliolum seu integumentum,
potissimum oblongum atque binalue, quod grana in se continet, ordine quodam disposita, aut tale quid si-
mile. Nam in arboribus varietas quadam observatur. Itaque bonis anibus ad exequendas eas accingamur.

SILIQVAE ARBOR, SIVE CERATIA.

CAP. I.



Ram. cui fructus
cornu modo intor-
tus, siliquæ & ^{Erym.} ^{xyen's}
nomen fecit, calidio-
nis soli amantior,
crasso, ut tradunt,
caudice, in magnam

excrefcit altitudinem, latè ramos spar-
gens, longos, firmos: folia in alam
disposita, (Clus. alata ut Terebinthi
aut Pistaciz, maiora) quorum singu-
laria breui pediculo ad costam an-
nexa, subrotunda, tres uncias, plùs mi-
nùs lata, paulò longiora, crassa, rigi-
da, nervosa: crebris obliquis venulis
in margines excurrentibus, superiùs
atro virore splendent, inferiùs Nou.
& Decéb. iulum instar iuglandis ferè
in flores ex rubro purpurascètes sese
aperientem emittunt: deinde siliquæ
non tantùm digito indici æquales,
sed & altero interdum longiores, la-
tis & in ipsa desideremus aliquid: Si enim flores
sunt tales, & eo ordine quo Camer. exprimit, in
ipsius icone siliquæ non videntur foliis scitè ap-
pensæ. Præterea si flores sunt racemosi nec figu-
ra Matthiol. Lobel. & aliorum bona erit, in quibus
singulares siliquæ ex ramis pendent de breuibz
pediculis: Est nobis solum in ^{Siliqua} ^{tribinas} diuisum alas,
datum Bononiz anno 1563. per celeberrimum Me-
dicum, omnisque naturæ scientissimum, professorem
excellentiſſimum Dominum Vlyſſem Aldro-
andum.

tiores, modicè intortæ, compressæ, cal-
lo dulci, edulci, semina claudunt membranis di-
stincta, seminibus Cassiæ solutiùs ferè æqualia, mi-
nora tamen, colore spadiceo obscuriore, compres-
sa modicè, altero sine in acumen leuiter desinente,
altero latiusculo, pulpâ buxæa, dura, & leguminosi
quid respiciente.

Nostra icon nobis absentibus facta est ad ico-
nem Alpini, quæ parum placet. Quare aliam ex
Camer. apud Matthiol. Germ. eiusdem Epitome
proponimus iconem, quæ meliùs allubescit, quam-

Tom. I.

Mm

Palpa se-
men.

Dioscoridi dicitur Siliqua [*κισσός*], uti etiam in Evangelio Dni Lucæ cap. 15. in parabola de Acolasto seu filio prodigo, qui cum porcis vesci *κισσός* dicitur, quod male in versione Germanica Träberen/id est Vinacea, redditur, vel Frisch/ ut habet Tigurina, id est, fursus. Non enim Gallibendē conuerterunt *Eserces*: & Itali *le siorae*. Horat. *vinis siliquis & pane secundo*.

Siliqua.
Ceraunia.
Theophr.
Ficus Aegyptia.
Sylva Aegyptia.
Ceraunia.

Siliquam, ait Theophrastus, grandibus ex ramis [*ἀκραιφνέως*] fruticare dicunt. Hæc [*ἡ κισσός*] enim fructum, vel ex iis fert, sed non multum: vocant enim Siliquam [*κισσός*] ex qua Ficus Aegyptiæ appellata [*συγγαμνὴ ἀδύττη κισσός*] producit. Fico Cypriæ similis est, quam Iones Ceroniam vocant: nam & ipsa caudice maximam fructus partem expellit, ramis autem [ut diximus] paucum fert fructum, Siliquosum verò [*κισσός*] quem aliqui Ficum Aegyptiæ vocant errantes, (nulla siquidem penitus in Aegypto, sed in Syria nascitur, & in Ionia circa Cnidum, Rhodumque) foliis semper comantibus, flore candido & olente gravissimè, radice leuiter sublimi, atque omnino plantigera imis partibus est, superius tamen subarscens: Fructum anniculum simul, & novum habet: altero namque detracto post Canis ortum, protinus alterum gigni patescit: gignitur enim Vix modo indiseretus, atque uniformis: tum auctus circa Arcturum, & Aequinoctium floret: dehinc hyeme exacta, durat usque ad canis ortum.

Siliqua.
Græca.
Ceraunia.

Columell. huius obiter meminit: Siliqua Græca, inquit, quam quidem *κισσός* vocant ante brumam per Autumnum serenda.

Ceraunia.
Ficus Aegyptia.

De hac Plin. lib. 13. c. 8. Similis his [Fici Aegyptiæ Cypriæ] Siliqua quam Iones Cerauniā vocant, trūco & ipsa ferulis, sed pomo Siliquæ [Siliquato Dalec.] Ob id quidam Aegyptiæ Ficum dixere, errore manifesto. Non enim in Aegypto nascitur, sed in Syria, Ioniæque & circa Cnidum, atque in Rhodo, semper comantibus foliis, flore candido, cum vehementia odoris: plantigera imis partibus, & idèd superficie flavescentes, succum auferente solum: pomo antecedentis anni circa canis ortus detracto, statim alterum parit: postea florem per [post] Arcturum hyeme fortis enutrit. Ad hæc lib. 15. cap. 24. Haud procul abesse videntur [a Castaneis] & perdulces siliquæ, nisi quod in iis cortex ipse manditur, digitorum hominis longitudo illis, & interim falcata pollicari latitudine. Ceratia quorum tertia syllaba per litteram T & scribitur & pronuntiatur, nihil habet cum Cerasiis, per S. scriptis, similitudinis, monente Galeno. Scribit Hermol. Georgium Tiphernatem Ceraunium in Strabone pessimè interpretatum esse Siliquastrum. Gatinaria pro Xylocarata, vel Xara, vel Squila legendum putat & rectè, Siliquam. Arbitratus est aliquando Gesnerus, Siliquam, *κισσός* & *κισσόνια* à Ceronia [*κισσός*] longè aliam esse arborem, cui opinioni non adhæreo, sed Clusium sequor, qui nullo discrimine eandem esse censet. Siliquas autem Græcis esse *κισσός* & *κισσόνια*, attestatur Cornarius, & hinc Xylocaratas officinas corruptâ voce appellare: Esse autem fructus arboris quæ *κισσός* vocetur.

Xylocarata offic.

Siliquæ, inquit Matth. quæ Græcis *κισσός* dicuntur, in Italia officinis vulgè Carobe, & Cambole: in regno Neapolitano Salequa vulgè nominant, vocabulo nimirum à Siliqua detorto. Arabicè Charub. Germ. Sanct Johansbrodt. Hisp. Alfarabas, Gall. Carouge. Aliud Siliquarum genus quod Ficum Aegyptiæ cognominant scriptis

Charub.
Arab.
Ficus Aegyptia.

tradiderunt Theophr. & Plinius de quibus mihi differendum non proposui, quod Italici non cognoscantur. Hæc ille, qui mihi videtur parum considerasse verba Theophrasti & Plinii, quæ iam recitauimus, qui putant Siliquam siue Ceroniam, aliquibus Ficum Aegyptiæ dictam, diuersam à Siliqua siue Ceratia.

Et hanc erroneam Matthioli opinionem secuti sunt Cæsalpinus & C. Bauh. suspicantes Theophrast. & Plinium intellexisse Cassiam purgatricem, quæ longè diuersa, ut patet ex collatione utriusque descriptionis: nempe Ceratiz & Cassiæ, uti postea cap. de Cassia monemus. Merito igitur Dalech. scribit apud Plinium: Siliqua hæc nostra Carotria est. Falluntur qui arborem Iudæ esse putant, quoniam arboris eius ruber flos est, non albus, qui præterea Cassiam nostram fistularem opinantur non minus quàm illi decipiuntur. Est enim illi flos luteus, teste Theophrasto. Dalechampii sententiam equidem probamus: sed eius argumentum non validum, arbor enim Iudæ fert etiam flores albos, teste Clusio.

Cæsalp. & C. Bauh. notantur.

Cassia purgatrix non est Siliqua. Arbor Iudæ non est siliqua.

Dalech. not.

Lonicerus Sanct Johansbrodt/ quasi panem S. Iohannis diceret, Græcè Ceratiam, Latine Siliquam: & sic etiam Cordus in Diosc. Lacuna & Castor vocant. Scaliger in Theophr. Carabam. Turn. part. 2. Siliqua. Angl. Carob vel Beane tree, fructus Carob coddes vel Carob beano: malè Angli interpretes noui testamenti verterunt Coddes simpliciter, hoc enim vocabulum omni legumini commune est.

Panis S. Iohannis.

Caroba. Error interpret. noui Testamenti.

Apud Turnerum pro Siliqua malè posita est figura Piperis Siliquastrum. Anguill. describit, dicens, Siliquam arborem vocari Carobe, & Cornacchie marine. Lob. & Penz Adu. *κισσός*, Siliqua Carobe, Carobia Aduarii, & vulgè Prouincialium, antiquorum *κισσόνια*. Obseru. *κισσός* Siliqua: Gall. & Prouincialibus Carobe à Chaldæis, sic etiam dicta. Angl. Siliqua tree / Ital. Siliqua & Carobe, Hisp. Algarrouas. Icon. Plant. & Tabern. Ceratia siliqua. Prosp. Alpin. Siliqua dulcis, Carob, vel Carnab ab Aegyptiis dicta. Camer. hort. Siliqua siue Ceratia. Dodon. Gall. & Lat. in fol. *Ceratonia arborem* vocat. Hisp. Garono: *κισσός* autem, siliquam, aut Siliquam dulcem, in offic. nonnullis Xylocarata: in aliis Carobe aut Carobele vocibus Italicis: ab Apulis verò Salequa vocatur: Hisp. Alfarabas, aut Algarouas, & absque articulo Garonas. Cæsalp. Siliquam arborem appellat, Carrubiam. Clus. Siliqua, Græcis *κισσός*: Arborem Gall. Carouge, fructum Carouges: Ger. fructum cum Belgis S. Johansbrodt/ Hisp. arb. Algarouas & Garono, & fructum: Garonas, Hungari Germanos imitantur, vocantque fructum *Szent Lajos Renyere*, id est, D. Iohannis panem.

Turneri error.

Quia autem in Siliquæ, arboris propriè dictæ, tractatione versamur, scire hoc in loco conuenit, Arbores Iudæ Clusium Siliquæ sylu. nomen indidisse, non quod Siliquæ Veteribus descriptio similis sit, sed quod nonnullis Hispaniæ locis vulgari nomine appelleretur. Cassia purgatoria à pluribus Siliqua Aegyptia, Indica, aut purgatrix cognominatur. Siliqua Gellii & Serui in Flaminiciis, quæ est Rhododendron siliquastrum Dalechampii nobis Nerium vocatur. Azadarach arborem Bellon. Siliquam nominat, quod merito miratur Gesn. hort. cum baccas non Siliquas ferat, vide lib. 5. Siliquam Theophrasti Monardo & Hermolao Smilacem hortensem Dioscoridis cum Trago & aliis esse reor. Siliquam verò Columellæ, cum eodem & aliis Fœnugracum facio. de his lib. 17.

Aequivoca tractatione versamur, scire hoc in loco conuenit, Arbores Iudæ Clusium Siliquæ sylu. nomen indidisse.

Cassia purgatoria.

Nerium. Azadarach.

Smilax hortensis. Fœnugracum.

Nascun-



lensis : An hæc nostra Ficus Indica inquit Clusius? Nos *Mangia* hic ponimus propter affinitatem nominis cum *Mangle*, cum qua etiam arbore respondere videntur, quæ Ferdinandus Lopez tradit.


CASSIA PURGATRIX.

CAP. II.

Descriptio

Folia.

Elixi.



Cassia fistularis sepius mihi è semine natæ plantulæ, folio Nucis Juglandis, oblongo mucronato: flores longis tenuibus pediculis herent, plures iuncti veluti racematim ex ligula, eo modo, quo flores Laburni, foliis ea latitudine, ut vngue tegas, striatis, è quibus stamina longa emicant, quibus apices sulcati insident: ex his

Siliqua. nondum planè delapsis succrescunt Siliquæ, quæ paulatim grandæscunt, ad cubitorum duum longitudinem cylindricæ formæ, digitum transversum in diametro habent, colore nigricante, in quibus secundum longitudinem commissurarum veluti vestigia apparent spadicea, altera quidem parte duo, altera tria, intrinsecus membranulis ordine dispositis, intercipitur pulpa Eclysinatis consistentia, dulcis, nigricans, atque una semen Tamarindo grano minus, compressius, coloris fulvi, ex oblongo rotundum, durum, nitida superficie, quod medium secat striæ rubra singularis: ramulis gemella semina inter parietes huiusce veluti intergerinos inveniuntur.

Alpin. de scriptis. **Truncum.** **Cortex.** **Folia.** Actuar. arborem non attingit, aut Siliquam eius ita describit. Nigra Cassia est fructus fistulosus, teres, oblongusque, concretum intus humorem ferens, non una coalescentem continuitate, sed ex intervallo intercedentibus lignosis tenuibusque membranulis septum, seminalibus granis, figurâ & specie non dissimilibus, quæ cognita nobis Siliqua profert. Porro non tantum ramos foliaque Nucis proxima scribit Alpinus, sed & truncum, cui cortex sit planus, mollis & cinericeus, qualis omnino in crescente Nuce spectatur: Folia multa, plura quàm in Nuce, alata, ex quinque coniugationibus contexta, duplo Nucis foliis longiora, & in extremo aculeata [vel potius acuminata,] floribus colorem adscribit aureum, Cæsalpinus album, odorem valde gratum præsertim Oriente Sole, quo fiat ut Aegypti diluculo per Cassiarum loca deambulare sepius odoris causâ consueverint, quod aurâ à Cassii eximium ac gratissimum odorem spirantibus, ad ipsos delatâ, oblectentur, nasci autem Siliquas primæ contortas, pærque maturitatem denuò dirigi: Quæ Pelusii in arboribus leguntur, corticem habere crassiores, & parum intus substantiæ continere: Cayenas verò & Alexandinas coruæ

Floris.
Colore flo.
in variat.
Casalp.

Siliqua.

constare tenuiori, multaque substantiâ intus plenas, ex quo hæc cæteris omnibus bonitate præferantur. Et has duplicis esse differentiæ: etenim alias subrubras, quas *Abes* vocent, à calore illiusce gentis, æterni, quæ sint omnium optimæ: & alias nigras.

Est huius folium Pyri folio ferè simile, inquit Monardus: flos verò exiguus, albus, quinque foliis constans, ex quo enascuntur oblongæ Cassiæ Siliquæ.

Folius, ut tradit Acoſta, Mali Persici similibus est, nonnunquam angustioribus, locis præsertim siccioribus natus: floribus luteolis, aut flavis: arbor ipsa Amygdalæ magnitudinem æquat.

Gardæ verò folius est Mali Persici [non similibus] angustioribus tamen aliquantulum, & virentibus: floribus Genistæ perquam similibus, luteis, Caryophylium odore referentibus: Quibus decidantibus succedunt oblongæ siliquæ, virentes admodum ante maturitatem, [non rubentes, ut Lac. Gartas] quæ maturitate nigredinem consequuntur, Monard.

Acoſt. & Gard. eidem longitudine interdum quinque palmorum, nonnunquam infra binos palmos.

Persicæ Mali folia quodammodo æmulantur, si singularia separe, inquit Clusius: Quoniam verò coniugatione bina semper in oblongo nervo nascuntur, & summa ala postremum impari numerum faciunt, commodius meo iudicio, comparassent cum Fraxini foliis, aut similibus arborum, quæ alata folia ferre solent, & integra plerumque abicere confluerant, quemadmodum Iuglans, Sorbus, Rhus, Ceratia, &c.

Cæterum dispiciendum est, an stirps hæc Veteribus fuerit cognita, cuiusve historia literarum monumentis mandata.

Ad Theophrastum igitur quod attinet, non videtur huius meminisse, nisi simpliciter, quod tamen non credimus lib. 4. cap. 5. Arbor Indica, cui fructum longum, nec rectum, sed conortum, cibo dulcem adscribit: sed morsus in alio, difficultatē facientem intestinum: ob quod Alexander ne quis mandaret interdixit. Vide Hist. nostr. lib. 1. post Ficum Indicam, Arbores Indicas.

De Eiarxamber, id est, Cassia fistula ita scribit Serapio. Sunt canne concavæ, quarum color est rubeus, ad nigredinem declivis, & intra ipsas sunt Laminae ex carne nigra, & parietes dividentes inter eas, & inter Laminam & Laminam sunt grana Xylocaractæ & eiusdem magnitudinis, quorum color est inter glaucedinem & ruborem, & Cassia quidem asseritur ex India & Babylonia, & terra Achemem. Et electa ex ea est illa, quæ est in Cana sua interius nigra, & gravis, & lucida, & qued de ipsa utimur, est cor vel caro eius interior.

Auc. Cassiam fistulam [Chaiarlander] duplicem facit. Dicit enim aliam *Kebuliam*, etiam *Aegyptiam*, Meliorem esse illam, quæ sumitur à Cana, & quæ est splendidior & pinguior: Et meliorem Cannam ipsius esse illam, quæ splendida est & plana.

Cassia genus est, quam ætas nostra, inquit Hermol. cognomento fistulæ appellat, & ab aromatica lignea discriminat, Veteribus ignotam. Quare scire oportet, si quando Cassiam Syringa [fistulam à Diosc. *μαρτὰ αλεξ*], lata fistula nuncupata] apud antiquos Græcos legere contigerit, non pro ea capiendam esse, quæ nunc [ex Arabibus] *Cassia fistula* dicitur, colore rubro nigra, Lami-

Eiarxamber Serapio.

Grana Xylocaractæ Locut.

Delectum vj. cor. dis. Sel. carnis.

Chaiarlander.

Auc. diff. rentia Delectum pulpa.

Canna don. lectus.

Laminis intus carnosiss, quas parietinæ discludunt, seminibus Siliquæ Ceratiz, ad deueniendam bilem vltam mirè valens: Inuenio, apud Græcos autem qui Paulum & Oribasium ita loquentes induxit. Cassia Syrix aduersus flauam bilem prodest: & item eos qui præter naturam palleſcunt: item Anginas & Laterum dolores & peripneumonicos: Hæc Paulus. At Oribasius refrigerari eâ inquit iecinoris calores inieperatos. Hanc recentiores Græci calidam & humidam abſceſſu primo perhibent, idem ferè Mauritanii de Cassia quâ bilis per aluum detrahitur, & quæ propterea Cathartica dici potest.

Cassia Syrix.

Cassia Cathartica.

Fistula non bene dicitur.

Cassia Syrix, Veteribus ignota.

Cassia fistulacea, Calamus, Camma.

Cassia nunc appellatur parum rectè *Fistula* nomen adiectum comprobat Marcellus: ait enim Siliquæ magis quàm *Fistula* nomen illi congruere: Veteres eam ignorasse aut vti noluisse.

Ignorant autem fuisse Dioscoridis, Plinii, & Galeni ætatibus Cassiam testatur Ruell. qui à Recentioribus Græcis Cassiam Syringodem, id est, fistulaceam: ab Actuario *Cassiam nigram*: ab aliquibus *Calamum*, id est, Arundinem seu potius *Indicam Cannam* nominari scribit.

Curtius scit esse Cassiam Syringodem (*fistularem*) arborem, non fruticem, itaque etiam vulgaris Iuglandis magnitudine, ex illorum monumentis qui eam viderunt & delinearunt, vocari Cassiam Catharticam, & Aegyptiam Siliquam, multos eam arbitrari, quæ antiquis Lignea Cassia dicta sit, quæ tamen subscribentibus Monachis in Meluem eiusdem generis cum Cassia fistula non est, quæ antiquis Græcis incognita fuit. Idem tamen scriptum quandoque reperiri aiunt, siue impressum, Cassia fistula, ubi debeat intelligi Cassia lignea, ut e.g. in Antidot. Nicol. in el. quod inſtituitur Anudotum hæmagogum &c. quoniam plures sint species Cassiæ lignæ, ut alibi ex Galeno ostentum.

Cardan. Siliquam Indam, Cassiam nostram vocat.

Apud Syluium Cassiæ cortex, *ὄρεος & ῥαβίας*, Cassia Aegyptia, Cassia Cathartica (purgatrix) Cassia fistula Arabum veteribus Græcis indicta, recentiorum Cassia Syringodes (fistulacea & nigra Actuarius) (scribenti passim *καρδίας καὶ ῥαβίας τὸ ὄρεος*, à quo bellè describitur,) Synonyma sunt.

Cord. in Dioscor. Cassia fistula in usum Medicum ab Arabibus introducta, à recentioribus Græcis Cassia nigra appellata, cuius fructum Aristobulus Fabam Indicam vocat: Item hist. Siliqua Indica Veterum, Fabia Indica Recentiorum, Cassia solutiva seu laxativa.

Siliqua Indica, Fabia Indica.

Fuch. de comp. med. *Cassia purgatrix & Aegyptia*. Nicolao *Fistula & fistularis*.

Quando Galen. de antid. plures enumerat Cassiæ species, & præcisè ab aliquibus fistulam dictam, quam iunior Andromach. reſciendam cenſet, ne quis tam æmulus aut fatuus sit, ut Cassiam illam fistulam cum hac Arabum & Officinarum solvente Siliqua Aegyptia dicta confundat, prudenter monet Amatus, Ac etiam Theod. Dorsthenius: præsertim quum multum inter se differant, cuius inaninaduertentiâ multi, quum Cassiam pro euocandis mensibus legebant, non Cassiam illam Græcorum, sed potius Siliquæ huius purgantis cortices, mulieribus non sine ingenti periculo propinabant, ut Leonicens prius aperuit.

Siliqua Aegyptia.

Elter. Med.

Siliqua purgans.

Amari deſcriptio. Lignum fistulaceum.

Arbor Cassiam fistularem ferens procera est, inquit Amatus, foliis Nucis, per ordinem veluti in Fraxino dispositis, cui cortex cinericeus coloris, quo detractò rubicat in superficie lignum solidum, intus nigrum, quod dum vritur pellissimè

Tom. I.

olet. Ceratium propter semina, quæ huic Siliquæ Aegyptiæ, Cassia fistularis dictæ, seminibus sunt similia, Cassia fistularis appellanda non est, quamquam omnino non abs re esset, affirmare Siliquæ arborem, speciem Cassiæ huius fistularis esse, unde non immeritò quidam Cassiam fistularem, Siliquam Aegyptiam appellant: Imò Federicus à Rocha, sola tantum ratione has arbores differre putat, propter siliquas, quas maximam habere similitudinem ait, & vrasque in arbore eodem modo pendere.

Non est Cassia Veterum inquit Corn. quæ hodie Cassia fistula vocatur, & cui fructus ad cornu similitudinem teres ac longus est, nigram habens intus medullam, quam etiam atramentum vocat, membranis distinctam, & nucleis talibus, quales in Siliqua quam vulgus *panem S. Ioannis* vocat, cernuntur.

Cassia fistula.

Cum in Aegypto tanta proueniat copia arborum Cassiæ, mirabatur Bellonius Veteres eius nullo modo meminisse: ut & Theophrastum, qui penè de omnibus reliquis plantis Aegypti locutus sit, eius non meminisse: nisi t. capite lib. 4. eius mentionem fecerit, ubi ait sibi relatum, tantæ magnitudinis arbores ibi prouenire, ut tres homines non possint amplecti. Suspecto autem eius inde prohibetur, quod Cassiæ arbores ibi sint crassitudinis & altitudinis Nucum Iuglandium, simulque solum habeant.

Arbor maxima Theophrast.

A Matthioli. in Dioscor. vocatur *Cassia fistularis*, Aegyptiaca Siliqua Recentiorum quorundam, cuius arbor inter viles proceras annuenerari possit, materie solidâ, compactâque: cortice tenui, buxo colore, medullâs vero nigra, non secus ac Ebenum, siue Guaiacum: R. cente grauitèr olente, sicca tamen minime: folio Siliquæ, sed magis in acutum tendente, cortice cineritio: radicibus magnis Iuglandis modo: à ramis siliquis pendentibus prælongis, teretibus, densis, nigra dulcique medullâ repletis, non ut in ossibus continuâ, sed crebris lignosisque membranis distinctâ: inhzente unicuique membranz semine duro, Siliquarum semini aded simili, ut alterum ab altero discerni non possit: ex quo cum non errasse putauerit, qui crediderit has plantas esse congeneres. Sed quicquid dicat Matthioli, atramentum semina in Siliqua arbore non sunt ita similia Cassiæ seminibus, quin facile discernantur: is enim sunt minora, & diuersi coloris: Apud Matthioli. olim nulli appicti flores, in Italicis verò & Germ. Hist. additi, non tamen eo ordine quo oportebat, flores enim non sunt singulares, sed multi dependentes ex longo pediculo, eo modo quo Laburno: particulares alioqui flores satis commodè expressi essent in Matthioli si haberent apices multos.

Siliqua maxima.

Cortex.

Matthioli.

Matthioli.

Camer. hort. Cassia Aegyptia siue purgans. Epit. & Hist. Matthioli. Germ. [ubi pulchram appoluit figuram particularium florum] Cassia solutiva.

Flores aliquando communicavi Gesnero, Florentiæ mihi siccos datos, cuius rei testimonium extat in eius epist. quadam ad Ottonem ubi ait. Cassiæ Aegyptiæ florem vnum atque alterum attulerat mihi ex India Ioh. Bauhinus, quem pingendum curavi: Matthioli editio Germ. flores aliquot habet, sed non ita bene pictos, neque in sua serie. Idem de hort. Cassia fistula, seu nigra, Alexandrina, Siliqua Indica. Castor falsam Matthioli figuram habet. Alpini figura placet, si flores particulares exprimerentur. Tabern. malam habet figuram. Apud Theodor. Dorst. similiter inepta icon, quam pro Cassia lignea pos-

Matth. notatur.

Theod. Dorst. notatur.

M in 3

mit, Cassia fistula dicitur. Monardo, à Costa: & Garciz Cassia solutina.

Euch. Roess. Euch. Roess. per Cassiam fistulam, Cassiam solutiuam intelligit, verum pictura eius mala: i neptè præterea Cassiz fistulæ semina cum Pæo rix feminibus comparat. Leoni Afric. figuramibi videtur falsa. Dodon. Lat. in fol. Cassia nigra Veteribus incognita, vel adeò neglectim habita, vt eius non meminerint.

Siliqua. Lobel. Obseru. Cassia purgatrix: Officinis, Ciallis, Germ. Belgis, Italis, Anglis Cassia: Hisp. *Canma fistula*. Icon. Plant. Siliqua, aut Cassia purgatrix Arabum, Carobius similis. Figura non bona, nec etiam Dodonzi.

Folia Mori. Cæsalp. Cassia, cuius Siliquæ afferuntur ex Alexandria, meliores & ex Occidentali India, tradunt arborem in Aegypto nasci crassissimam: foliis quadantenus Mori, aut Nucis Iuglandis, [nos vidimus ex semine nuper natam folia Siliquæ produxisse] flore lato, candido: copioso fructu, vt præ pondere rumpantur rami, nisi ante maturitatem leuentur. In India traditur arbor Pyri magnitudine: foliis Persici angustioribus, & virentioribus: foliis [floribus lego] Genistæ luteis, odore Gamophylli, quibus decidentibus Siliquæ longæ subnascuntur &c. Videtur Theophr. hanc intellexisse, cum Siliquas quasdam Ficus Aegyptias appellari scribit, & fructum anniculum nouum expectare, subnasci autè nouellum fructum sub Cane: postquam alter detractus fuerit, veluti racemum vniformem, qui in Autumno explicetur in flores candidos, deinde per Hyemem vtque in Aestatem enutriti: folio perpetuo. Quæ omnia magis Cassiz conueniunt, quàm Siliquæ supradictæ. Plinius quoque tanquam alteram videtur intellexisse, cum de Ceronia appellata, transcribit ex Theophrasto ea, quæ dicta sunt. Hæc Cæsalpinus, cuius opinio erronea. Non enim Theophr. libro quarto capite secundo. Et ex eo Plinius, intellexit Cassiam purgatricem, sed Ceroniam siue Siliquam, vbi ea describitur & non diuersa planta: Vbi etiam obseruat Cæsalpinus albo flore non demonstrat: Fortè Cæsalpinus id scribit, quia existimabat à Theophrasto traditam, cur dicat folium à Theophrasto perpetuum dictum magis conuenire Cassiz quàm Siliquæ, nescimus: Certum est Ceroniam folio esse perpetuo: Cassiam Aegyptiam foliis quadantenus Mori, aut Nucis Iuglandis, & produsse foliis Siliquæ mirum est: folia enim trium harum arborum multifariam inter se differunt: à nobis satis seminibus lapidis prouenerunt plantulæ, in quibus folia acuminata, qualia pinguntur ab Alpino & in figura nostra emptitia, non rotunda vt Siliquæ, quod ille ait. Quid si Cæsalpinus seuerit Ceratoniam pro Cassia, vel vtamque, & prouenerit tantum Ceratoniam, quæ melius durat faciliusque prouenit, quàm Cassia: illud etiam considerandum, an Indica Cassia differat foliis Persici ab Aegyptia, flore non differre iam ex Alpino [qui in Aegypto aurei coloris esse scribit] demonstratum, quamuis differentem, nempe coloris lutei dicat Cæsalpinus. Theophrasti & verba Plinii demonstrant manifestè Cassiam diuersam: Siliquæ enim non ex trunco, vel ex ramis crassioribus, sed ex extremitatibus, ex longo pediculo, Laburni vel Anagyridis modo. Idem nobiscum sentit Dalechampi cum scribit, falli qui Plinii Siliquam Ceratoniam, Cassiam fistularem nostram putent, Cassiz florem luteum esse, non album.

Cassia pinn. Hist. Lugd. *Cassia pinnata*, Lat. Cassia nigra, Me-

dici, Sepalsiarique Arabum, à quibus inuenta est, sectatores, Cassiam fistulam vocant, alii Cassiam solutiuam, alii Siliquam Aegyptiam, siue Catharticam. Italica Cassia & vulgò Canuella, Germ. Zimmetröcklin/ Hisp. *Canela*, Gallis, *Casse*. Compilerator Hist. Lugdunensis ineptè adscribit Siliquæ Aegyptiæ, siue Cassiz nigra, siue Cathartica, vulgò dictæ etiam Cassiz fistulæ, Canellæ appellationes, & Zimmetröcklin.

Porro, à Costa & Garciz testibus, Arab. vulgari-ter dicitur *Hiarxamber*, vt & Perlis, atque Turcis, asserit tamen Cogecela Medicus Persa, hoc vocabulum merè Perlicum, Arabicum verò legitimum esse Gazatfalus: in Malauar Comdaca, vel Condaca: in Canara *Banasinga*, *Hasinga* & *Banasinga*, in Decan & à Bramenis *Banasinga*, arbor verò *Bana*, & *Bahso*, quemadmodum & in Canara, in Guzarate & à Mauritanis regnum Decan incolentibus *Gramala*, seu *Gramalla*. Cæsp. Bauh. dum apud Matthiolum non citato Cæsalp. annotat [an Cassiam purgatricem intellexerit Theophr. cum Siliquas quasdam Ficus Aegyptias appellari scribit] sinistram opinionem Cæsalp. propriam facit, quod non fecisset si textum Græcum consulisset, & Cæsalpini nomine eam opinionem introduxisset, vti debebat, siue bonam siue malam.

Cassia Cathartica partim in India, partim in Aegypto nascitur folio Iuglandis. Alexandriæ sibi visam Ponticus Facinus Hermolao retulit. Negotatores in hortis Alexandriæ nascentem proferunt, iam & Asiæ communis facta dicitur. Scribitur & apud nos, [Venetianos] verum frustra: quia nec ad frugem peruenit & celeriter opprimitur. Ruellius & Curtius alienis pennis se ornantes, hæc de loco transcribunt suo nomine. Insula Divorum Dominici & Ioannis de Portu diuite, tantà quantitate nobis transmittunt Cassiam solutiuam, vt non modò Hispaniæ, sed etiam toti Europæ, atque adeò vniuerso orbi sufficiat: nam & in Orientem, vnde deferri solebat, plures naues eà onustæ vehuntur, quàm Cantabri ferrum mittunt. Multa Cassia solutiuam nascitur in Cayro, & plerisque aliis Prouinciis tum Orientalis tum Occidui Indiz. Præfertur tamen quæ ex Orientali delata est, quæque locis ad Septentrionem magis vergentibus nascitur. Tanta est eius frequentia in Cambaya, vnde præstantissimam aduehunt, vt vnus Candil [quingentarum & viginti duarum librarum pondus hoc est] pretium, non æstimetur pluri quàm nummo aureo, qui trecentos & sexaginta maravedis [æteos obolos Hispanicos valet. In montibus verò Cranganor, & per vniuersam Prouinciā Malabar [quando eius maximum pretium] singulæ libræ viginti maravedis redimi possunt, hoc est, paulò pluri quàm dimidio regali Castellano, siue batzio Germanico. Nascitur in Malauar, Canara, cuius prouinciz est Goa, Decan, Guzarate, præstantissima tamen & durabilior locis ad Septentrionem magis vergentibus, vt in Cambaya. Inuenitur & in Cayro, tum in Malaca, Sofala, Sian, totòque tractu. Hanc non nisi syluestribus spontè factam, vidi, inquit Garcias, in Americā tamen, [quam falsò Indiam Occidentalem appellant, quandoquidem vnica sic India ab Indo flumine denominata, Veteribus cognita] intelligo è syluestribus locis tralatam esse in hortos & agros, ita vt nunc islic frequentissima sit. Fortunatiores tamen nostros Lusitanos puto, apud quos sine satone tantà copiā nascitur, vt vnus Candil, hoc est, quingentarum & viginti duarum librarum pretium non excedat, decem regales Castellanos, qui

Locus & tempus.

Ruell. & Curt. nos. Cassia solutina.

Candil.

Cassia sponte nascitur.

Error infusus, qui pene communis.

Candil quid sit.

Pardoon. qui constituunt aureum Indicum Pardoon nuncupatum. Camer. scribit si semina bene macerentur proveniunt instar Siliquarum. Arborem florere incipere mense Iunio, florere toto mense Iulio Alexandria & Cayri tradit Alpinus: Pelusij verò, nunc Damiatæ, mense etiam Septembri florere vidit. Cannæ vel fistulæ totis anni spatio maturantur, totoque anno in arbore manent, quas Aegyptij Iunio tantum Cayri colligunt, quo tempore multæ parvæ recenter ex primis floribus productæ virides spectantur, Phascolorum siliquis valde similes: quæ paulò post crescentes, paulatim viridem colorem in nigrum commutant. Quæ in America reperiuntur arbores, Cassiam ferentes, non ita præstant ut Aegyptiaca aut Arabica autore Theueto; Ad litus à Sumatra dictum, Cassia fistula crescit admodum ingenti copia in sylvis, ut ex ea multitudine, teste Linchottano, naues onerariæ repleri possent, sed non colligitur ab incolis. Arbores celsæ sunt & patulæ ex quibus dependent Ceratiorum instar Siliquæ, virentes aut Cinereæ: Sed quæ maturæ factæ, sunt spadiceæ. Crescit copiosè in Sunda.

Vires & Temperamentum. Cassia fistula, autore Mesue, calido frigido temperata, nisi quod paulò est calidior, humida primo gradu, clementer & innoxie à ventriculo bilem & pituitam purgat leniendo, febribus inde ortis confert, sanguinem hac ratione puriorem reddit, ac eius sanguinis & bilis fluxu acrimoniam frangit, resolvit thoracis pulmonis & asperæ arteriæ phlegmonas, easque partes lenit, ipsa morbus expers, situm sedat, præsertim sumpta cum succo Itrybi, vel Cichorii, vel Solani arte depurato, Intemperiem denique renum calidam mitigat, cum diureticis sumpta & Glycyrrhizæ decocto, ob idque calculum in his gigni prohibet. Si autem viscera sunt sicciora, Cassiæ lubricitas augenda est oleo Amygdalarum dulcium: si debilia & lubrica sint, minuenda Myrobalanis vel Rhabarbaro, vel aqua cum Mastiche cocta, vel spica addita: Si ad vias Urinarias ferri eam volumus, vetrica misceantur. Quoniam verò tardius & imbecillius purgat, acre aliquid (quale Thymum, Hysopum) actionem intendens, misceatur, aut potius aliquid medicamentorum valenter purgantium: efficaciusque purgat, hæc, si ex sero lactis propiñetur. Tam est benignum & innoxium hoc medicamentum, ut omni ætati & ipsis etiam pueris, & prægnantibus tutè sumatur. Sapor eius est dulcis, inquit Aben Melusi, & virtus eius prompta est, quod ipsa est æqualis complexionis: Et virtus eius triplex est, virtus quæ extinguit acuitatem sanguinis, & sedat apostemata dura, quæ sunt in gingivis & gutture, quod sit ex ea gargarisma, & confert ictericæ, & dolori hepatis. Et proprietates eius est purgare cholera adustam, & mollificare ventrem mediocri mollificatione, & dosis eius est à drach. iij. usque ad decem: mundificat nervos. Rhasis: Melior ex ea est, quando extrahitur à Canna, & est æqualis inter caliditatem & frigiditatem, laxat ventrem cum temperamento, confert apostematibus calidis, & maximè gutturis, & declinat ad caliditatem, plus quam ad frigiditatem, admodum ut ferè perueniat ad principium primi gradus, & deservit de Babilonia & Albasra.

Corrosiva. Amygdalarum dulcium: si debilia & lubrica sint, minuenda Myrobalanis vel Rhabarbaro, vel aqua cum Mastiche cocta, vel spica addita: Si ad vias Urinarias ferri eam volumus, vetrica misceantur. Quoniam verò tardius & imbecillius purgat, acre aliquid (quale Thymum, Hysopum) actionem intendens, misceatur, aut potius aliquid medicamentorum valenter purgantium: efficaciusque purgat, hæc, si ex sero lactis propiñetur. Tam est benignum & innoxium hoc medicamentum, ut omni ætati & ipsis etiam pueris, & prægnantibus tutè sumatur. Sapor eius est dulcis, inquit Aben Melusi, & virtus eius prompta est, quod ipsa est æqualis complexionis: Et virtus eius triplex est, virtus quæ extinguit acuitatem sanguinis, & sedat apostemata dura, quæ sunt in gingivis & gutture, quod sit ex ea gargarisma, & confert ictericæ, & dolori hepatis. Et proprietates eius est purgare cholera adustam, & mollificare ventrem mediocri mollificatione, & dosis eius est à drach. iij. usque ad decem: mundificat nervos. Rhasis: Melior ex ea est, quando extrahitur à Canna, & est æqualis inter caliditatem & frigiditatem, laxat ventrem cum temperamento, confert apostematibus calidis, & maximè gutturis, & declinat ad caliditatem, plus quam ad frigiditatem, admodum ut ferè perueniat ad principium primi gradus, & deservit de Babilonia & Albasra.

Omnia conueniunt etiam prægnantibus. Triplex virtus à Ben Mesuasi. *Affectus gingivæ & gutturis.* A bar vulgari.

Dosis. Rhasis. *Delectus.* Apostemata.

Temperamentum. Vires & Virtus. *Gargarisma.* *Articuli.* *Articuli.*

cum mucilagine Psyllij dissoluta præfocioni confert. Mundificat hepar & confert ictericæ & dolori hepatis. Est lenificativa ventris: Et educit cholera adustam & phlegma: & soluit sine nocumento, & absque mordicatione, adeo quod ipsa est conueniens prægnantibus, & soluit eas. Loco eius ponitur pondus ipsius de Teneriabin: & triplum ponderis ipsius de carne passæ: & octava ponderis ipsius de Turbith: & quandoque ponitur loco passularum succus Liquiritiæ: Cassia ut docet Actuarius, tribus vel quatuor drachmis vix mouet aluum: fluxum bilem, sed magis retortidam, & quæ iam in atram degenerauit, extrahit, quinetiam pituitam educit medicamentum: præbemus quibus potentius medicamentum aliud dari non potest: nimirum pueris & fœminis vtero ferentibus, commoditate & necessitate urgente representamus, & iis quibus exuperans febris reliquorum medicaminum usus respuit. Temperatos, inquit Monardus, illos efficit, qui Cassia vtuntur: utilis maximè in renum & vrinæ morbo, duabus horis ante cœnam sumpta: Defluxionibus prodest, duabus à cœna horis. Assiduus illius usus ante prandium aut cœnam calculi generationem prohibet. Foris cum Amygdalarum dulcium oleo illita, graues pulmonum & renum dolores mitigat. Dosis pulpæ eius est a. 3. 9. ad fescunciam usque: non exempta verò, quatuor vnciarum. Lenit, resolvit, sanguinem depurat, eiusque & bilis calorem infringit. Humida est in primo gradu, ad calorem, sed mitem tendens. Porro huius flos duobus modis condiri solet, nempe aut cum Saccharo tritus, rosati Sacchari modo: vel flos integer Saccharo exceptus, & vna coctus: vtraque ratione bene sapit, & sine molestia euacuat, sumptus ad duarum aut trium vnciarum pondus: si aliquod inest vitium, inde accidit, quod vilior Saccharo excipitur: eosdem effectus præbet, quos ipsa fructus pulpa. Ceterum, eos qui Cassiam solutiuam ad ventrem leniendum & euacuandas faeces præsentant, admonitos volo, ait idem ille, ut eam breui admodum spatio ante prandium sumendam esse præcipiant, nempe ad summum dimidia hora, quoniam cum cibus mixta, simul cum illis facultates exierit, eaque ratione facilius & sine molestia opus suum molitur, quod minimè facere potest, quæ duabus aut tribus horis ante cibum sumitur, ut hodie vulgè fit, quoniam cibi sumptionem differendo, peragere suum opus cupit: & cum sit valde debilis, prorsus in vapores resoluitur, per vniuersum corpus sese diffundentes: & si diutius cibus differatur, in alimentum conuertitur: quod multorum annorum, quibus medicina feci, experientia didici: propterea semper illam solummodo dimidia ad summum horam ante cibum exhibere soleo: faciliusque est eius operatio: si verò multis horis ante cibum datur, parum admodum euacuat: Purgantia verò medicamenta cum cibus permisceri, autor est Hippocrates multis locis, atque etiam Galenus in commentariis. Verum quidem est, multis horis ante cibum dari solere, quando non euacuare, sed vapores, duntaxat per renes & reliquum corpus diffundi cupimus. Cassiam salubrem perhibet Sylius sanis & ægris, ad aluum clementer leniendam, quouis tempore tutam, etiam initio epularum, aut paulò ante cœnam: hodie dari cortice, membranæ, & seminibus per cribrum purgatam, ab Vncia dimidia ad fescunciam, vel drach. 10. manè vel ante cœnam: sed paulò ante pastus duos, tres quatuorue proximos, drachmis duabus vel tribus: his, quibus sit aluus natura pueri.

*Cassia
condita.
Semen an
purgat*

grior : Inquem vsum quibusdam iucundius sit
pulpam latè cultelli cuspidè exceptam deuorare:
conditam Saccharo ab Indigenis dum recens sit
ostendere Lusitanos & Venetos : Quam autem
vim purgatoriam tribuit Monardus [Syluius im-
ponit Monardo, apud eum hæc non legimus, sed
apud Fallopium] semini ipsius [maiorem scilicet
quàm pulpæ ipsi] non recipiendam confirmare
Musam suam multiplici experimento, se periculum
nondum fecisse. Corticem verò eius ad mouen-
dos menses, aut partum iuuandum inefficacio-
rem esse multò, quàm Cassiam aromaticam.

Mirum Ambrosium Parzum insignem alioqui
Chirurgum Regium & alios plures adhuc præ-
scribere cortices Cassiæ fistularis, ut vocant, ad
facilitandum partum, licet à pluribus præmoni-
ti id potius obistere & obesse, quàm prodesse in-
tellexerint.

*Matth. re-
prob.*

Hallucinantur, ceu antè insinuatum, qui Cas-
siæ fistulæ [Græcorum antiquorum] loco, Sili-
quam Aegyptiam siue Cassiam solutiuam vulgò
dictam medicamentis admiscunt, Mauritanos se-
cuti, liquidem Serapio, Auicennas, Mesuésque,
siue sitiporum, siue Interpretum lapsus, inquit
Matth. Cassiam nigram, Cassiam fistulam voca-
uere : certè crediderim dici posse in omnibus iis
medicamentis à Mauritanis inuentis [quibus
verbis excluduntur compositiones eorum à Græ-
cis transcriptæ] quæ Cassiam fistulam expetunt,
solutiuam illam esse inferendam, nisi Medici in
eum errorem labi velint, in quem Leoniceus
quodam incurrisse testatur, qui ad commouen-
dos menses, difficiles partus, remorantésque se-
cundinas, Cassiæ deiectionis corticibus, odoratæ
loco utebantur. Sed nimis temerè Matthiolus
Serapionem, Auicennam, Mesuémque erroris in-
culcat: Mauritani loco Cassiæ fistulæ Græcorum
non admiscunt Cassiam solutiuam, sed id facti-
tunt imperiti quidam, non animaduertentes Cas-
siam solutiuam ab illis quoque fistulam nuncu-
pari. Ipsum distinguere potius decebat, inter
Græcorum antiquorum Cassiam fistulam, quæ est
Cassia odorata à Dioscoride, & Galeno descripta,
& inter Cassiam fistulam Arabum, iuniorumque
quorundam Græcorum, [ut Aëtii & Nicoli
Myrepsi] quæ est Cassia purgatrix. Nunquid
poterit Cassia hæc eadem ratione, quæ Cassia Ga-
leni fistula dici meretur? Sed exterius illita Erysip-
elas exstinguit, cæterasque inflammationes, quæ
cuti tenus emergunt.

*Inflamma-
tiones.*

*Picra pul-
uer.*

Sunt è recentioribus Medicis qui eam nun-
quam suis ægotantibus exhibent, ni Picræ pul-
uerem admisceant, quod consultè factum existi-
mat Matthiolus, præsertim si ventriculi & intesti-
norum imbecillitas adsit. Ego verò malim separa-
tim dare alternis diebus, mirè enim ingrata Cas-
sia cum Hiera. Post illius sumptionem cibum non
quidem statim: sed aliquanto & exiguo post tem-
pore exhiberi optimum esse existimat Mundella,
quem sequitur Amatus quamuis eum non nomi-
net.

*Error quo-
rundam.*

Quod de Cassiis aliqui dixere optimas cannas
manibus conculcas sonum non edere, ibi planè
falsum observatur [teste Alpino:] quando omnes
recentes motz sonum edant, atque etiam in ar-
boribus Cannas à ventis motas, seminibus intus
motis, multum sonum edere, quotidie prope eas
habitantes audiant. Quod etiam dulces Siliquæ
faciunt. Quæ verò ex Cassiis non sonant ab Aeg-
yptiis vituperantur opinantibus id ob aqueam
humiditatem intus collectam vitiatâ pulpâ acci-
dere.

*Sonum a-
dunt.
Delectum.*

Neque immaturæ colliguntur ut aliqui refe-
runt, emuntur verò sæpe sæpius ab aduenis mer-
catoribus senio confectis, cum ingens copia sæpe
in ædibus ad eam rem parata, annos ad vsque
quadraginta conseruetur: collectas enim ex ar-
bore continuè in opportuna loca sic includunt,
ut nullus aer ingrediatur, cum ex minimo aeris
contactu Cassiæ corrumpantur. Hincque læpili-
simè ad nos vetustate vitiatæ ac etiam acidæ mit-
ti solent: quamobrem monitos esse velim omnes
Medicos ac Pharmacopœos ne posthac se decipi
sinant, & semper ex illis seligant recentes, qua-
rum substantia subdulcis est, antiquasque acidum
ponticumque laporem sapientes effugiant. Aegy-
ptii Cassiis non vtuntur recentibus, sed saltem
post quartum mensem: quandoquidem iuniores
recentioresque inutiles, neque à noxa immu-
nes obseruantur. Vtuntur verò nostri quoque
fistularum pulpa vel in bolis, vel in potio-
ne parata. Est hæc pulpa quoad calorem tempe-
rata, atque humida supra primum gradum, bi-
lemque ac etiam pituitam à stomacho, atque ven-
is mesenterii educit, & sanguinem calidiorem
contemperat atque puriorem reddit. Abyssina
vocata cæteris præfertur ad morbos biliosos, ac
melancholicos, præcipuèque in affectibus pecto-
ris à distillatione acutorum humorum concitatis,
quibus mirè subuenit: pulpa hac cum Saccharo
candido, & Liquiritia pro secreto vii solent, ad
renum vesicæque vitia: renum enim extinguit
immodicum calorem, humoresque ab his parti-
bus abstergit, atque per urinam expellit, proin-
de ipsius frequenti vtu homines se à calculis præ-
cauent. Eà etiam vtuntur ad tussim antiquam
dispnoeam, asthma & orthopnæam, cum Agarico,
pro calidis articulorum doloribus, maximeque in
podagra dolentibus partibus emplastri modo i-
psam adhibent, nec non ad calidas inflammatio-
nes eodem modo eius vsum sequuntur: Siliquas
verò Cassiarum, proinde ac Phaseoli paruas viti-
des, in aqua prius parum ebullitas, & mox in
vmbra ab humiditate siccatas Saccharo vel melle
condiunt, atque ad vsum seruant puerorum de-
licatarumque mulierum, exhibent verò ad sum-
mum eas vsque ad uncias quatuor, & ad unciam
in pueris, hisque vtuntur ad eosdem nuper dictos
affectus. Errare eos scribit Camer. qui existiment
semina Cassiæ purgate, quia potius adstringant,
nec credendum esse cortices Siliquarum eius mo-
uere menses & pellere secundinas. Quibus nau-
seabundus est ventriculus, iis ex sententia Ta-
bern. non est danda Cassia, sicut nec iis quibus
ventriculus imbecillis & humidus aut quos diar-
rhoea tenet, aded autem clementer purgat, ut vix
præterquam ex ventriculo aut ex paulò vltiori-
bus visceribus trahat, in ardentibus febribus &
imbecillitatibus, consultum est, id quod multis
familiare, ante venæ sectionem corpus Cassia
purgare: primas verò tenet, inter cholagoga. V-
tiliter quinetiam datur in Thoracis morbis, quos
salsi catarrhi concitarunt, ad calorem commi-
stamque bilem mitigandam, educendamque: pro-
dest etiam hepatis calidiori, aduersusque omnes
febres ardentes, tempore potissimum calidiore.
Sunt qui eà quoque contra vrinæ ardorem vtan-
tur, id quod tamen Fallopio vehementer displi-
cet, plus nocere quàm prodesse asserenti, quod
bilem magis ad vesicam ducat, esse enim diureti-
cam: extra tamen hunc morbum, rectè posse in
calida renum & vesicæ intemperie vsurpari. Cas-
siam extractam duplo plus euacuare, & eò magis
etiam si in ipsa optunè conterantur & misceantur
semina

*Referuntur
ad 40.
annos.*

*Aeris con-
tactu cor-
rumpuntur.*

*Recentes e-
legendæ.*

*Vsu apud
Aegyptios.*

*Pulpa.
Siliq. puri-
ta.*

*Thoracis
affectus.*

Secretum.

Renes.

*Præserua-
tio à calculo.*

Arthritis.

*Siliquæ
conditæ.*

Dysp.

*Semina in
purgant.*

*Febris ar-
dens.*

Thorax.

Ardor F.

*rina non
conuenit.*

*Cassia tra-
cta.*

*Semen pur-
gat.* semina tradit Fallopius, eò quòd in omni parte lignosa robustior sit euscandì facultas, quàm in pulpa ipsa, id quod se expertum saepe, & casu primum in duabus Simis inuenisse scribit: Ait præterea Cassiam in officinis vilitatam vnam haberi ex Caisro, nigriorem & maiorem: & alteram ex Alexandria rubicundiorē & minorem. Ex ambabus autem eligendas esse maturas: maturitatem quidem aut immaturitatem, non ex rubedine & nigredine, ex paruitate & magnitudine: sed ex aciditate diiudicandam esse: si enim mordet valde fauces, indicari quòd sit matura: decipi verò eos, qui contrarium teneant, pronunciat. Pulpa Cassiæ recens extracta in vulgari est usu, in grauioribus capitis affectibus, quàm etiam Lenitium singulare & benignum planè medicamentum existimat. Sed in me ipso, ut Quercetanus, sapienter contrarium sum expertus, qui nunquam ea sum usus, quin grauior illa fuerim immutatus, quod plerisque aliis eiusdem mei temperamenti accidisse etiam animaduerti. Cùm enim Cassia sapore sit dulcis, faciliè bilem in bilioso temperamento, ut & Manna. Adde etiam si ex ea in balneo vaporoso proliciatur distillatione aqua, ex illa promanare (ut ex melle) aquam mirum in modum fortem, acrem & mordacem, atque adeò summè calefacientem. Idcirco cùm usurpabitur Cassiæ usus: id summa cautione & circumspectè faciendum est: exploratà videlicet vniuersalique naturà & constitutione, cui ea prescribitur, siquidem pituitosus, & obeli & crassi corporis constitutione præditus eger, eò uti tutè possit: alius verò citra noxam & commodè nequaquam queat. Non vbiq; aut semper in omni subiecto illius usus est recipiendus: ac ne pleuritis quidem etià omnibus aliis purgantibus, illis interdicitur, ea tuta est, licet benignum & temperatum, inter alia omnia, iudicetur esse medicamentum. Quin etiam eiusdem pulpà solà exhibità, vsque adeò ventriculus distenditur & intumescit, ut magnà flatuum copià perturbetur, ac vehementer torqueatur, quod ea ventibus valde noxium & perniciosum est. Si autem ea in maiori etiam dosi, aliquo apto decocto & idoneo diluatur, decoctumque clarificetur ac colo traiciatur, electo vnà syrup. de Cichorio cum Rhabarb. aut Symp. ros. solut. melius agitur cum ægris quibus propinatur ex Medicorum nonnullorum sententia.

*Cassia ex-
hibenda
ratio.* Scipius miratus est. Garcias Mònardum in lib. simpl. Alesue scripsisse grana sive semina huius Cassiæ, purgatorià facultate prædita esse, cùm tamen potius adstringentem facultatem obuinere videantur quàm solutiuam. Illud verò omni reprehensione dignum est quod ait Sepulveda, nimirum ad mouendos menses, difficilisque partus, remorantisque secundinas, decoctum corticum harum siliquarum cum Artemisia propinari, aut ex Ovo sorbili cum vncis quatuor mellis exhiberi. Nam, etsi demus, magno, ut ipse ait, successu propinatum esse huiusmodi medicamentum, Artemisiæ potius facultatem hos effectus præbuisse conseruamus, quàm harum siliquarum cortices tale quid præstuisse, qui frigidi & siccī sunt temperamenti. Huc adde secundinas scipius etiam sine medicamento reici, naturæ propria vi. Nam quod Auicenna lib. 2. cap. 197. præscribit ad partus difficultatem, multi non abs re suspectum habent locum: censetque Bellunenſis in contextu Cucumerem siccum reponi debere. Hanc ob causam statuerunt Doctiores, Cassiam solutiuam intelligendam esse, quotiescunque

Cassiæ meminisset in purgante medicamento, reliquis locis Cassiam ligneam denotari.

Ridiculum verò est quod de Lusitanis quibusdam, idem profert, qui crediderunt plerosque huius regionis homines continuà alui solutione laborare, quòd boues, quarum carnibus vescerentur, Cassiam solutiuam depascerent. Nam arbores altiores sunt quàm vt à bobus depasci possint, neque tanta est copia arborum, vt numerum infinitum vaccarum (siquidem multas isti alunt, nullius verò carnibus indigenæ vescuntur) alere possint. Deinde cùm cortice prædita sit Siliqua, verisimile est (etià si pertingere possent) vaccas graminis pabulum, quod semper ferè hic virescit, istarum siliquarum auiditate non relicturas.

Maran. meth. Sepiasarij (frandem hanc aperiente Marantha) Cassiam Catharticam viginolis quibusdam latebris, cauernisque reponunt: quidam etiam arena opertam quotidie aqua aspergunt: vel per aliquod spatium singulis diebus aqua mactant, quò plenior fiat, atque ob imbibitum humorem recens etiam appareat: quæ deinde deuorata, flatus, tormina, aliæque idgen^a symptomata elicit, quæ perpetuò illam plùs nimis concomitantur. Vnde & siapte natura fluctuosam esse hodierni Medici existimant, [namque ob id etiam eam Cinnamon, aut Di. Camni Cretici, aut An. sorum, aliorumque, quæ flatus dissipare solent, adiectione corrigunt] & tamen neque Meſueus, neque Actuarius tale ei incommodum tribuunt.

*Stulea de
Cassia (v-
lutra per-
suasio.*


*Impostura
Pharmacopolarum.*

Corrigenda.

CERATIVM MONOCOCCON

INDICVM.

CAP. III.



R Arum hūc fructū primus nobis exhibuit D. Thomas Platerus vir eruditā solertiā in inuestigandis singularibus solertissimus, idēq; Medicus, dono acceptum à Robino Regio hortulano. Fructus est quinque vncias longus, duas ferè latus, pediculo breui, crasso, firmo, nō fructui superficie tenus inserto, sed cortici continuo. Cortex

Descriptio

Cortex.

potèd crassus (Taleri crassitudinem superans) extimā facie spadicea, rugosa, quadam sui parte pellucēte, cum quibusdam verrucosis tuberculis: internā fusca, puluerulenta digitorum contactum fusca quadam fuligine, veluti vstilago (quæ è fructus superficie) inficiens. Ipsi exterius corticis substantia, veluti ex arenosis quibusdam micis firmiter adeò compactilis est, vt sine vi quadam rumpere haud ita sit facile. Quod cauitatem replet intus, non faba est, aut Phasiolus, sed Phalloides fungosus quidam fructus, internæ atque conuexæ corticis cauitati exterius respon-

Substantia

Phalloides.

Color. dens magnitudine, ut integer fructus agitatus, somnium intus edat: puluerulentus quoque est, teres, modicè recurvus, ex fungosa quadam materie compactus, colore fulco, intus forisque, sapor fatuus, nec olfactu dignus, priusquam aperuisse-
Sapor. mus Siliquam suspicabamur esse Phaseoli Brasili-
ani, cum quo similitudinem aliquam habet.

TAMARINDI.

CAP. IV.

Descript.

Radix.

Siqua.

Folia.

Ramuli.

Silya.

Sapor.

Semina.

Nervi sine
Villis.Siliqua
alpina.

tenuioribus, quibus semina alterum ab altero se-
parantur, color verò seminibus pulchrè spadiceus, moles maior quàm Cassia fistularis semi-
nibus, quibus rotundiora & latiora sunt, minùs compressa quàm Cassia, licet & quadrata inue-
niantur, utriusque faciei superficiem corticosam area circularis pingit: sapor strenuè huic adstrin-
gens, adhuc pulpæ commisti reperitur nervi cartilaginei, duri, qui secundum longitudinem commissurarum, in siliquis videntur producti, fert enim teste Alpino, siliquas crassas, primò vi-
rides, tandem per maturitatem cinericeas, pul-
pam cum seminibus ut descripsimus continen-
tes.

Eodem scribente, Arbor est Pruni magnitudi-

ne, ramis densis Myrti: flores albi, Mali Auran-
ti floribus perquam similes, è quorum medio
exerunt quatuor fila alba & tenuissima, ex quibus
siliquæ producuntur. Mirabile, inquit idem, hoc
habet hæc planta, quod eius folia Solem semper
sequuntur, Siliquæ sequia dicuntur: nam ipso
Occidente omnia in se clauduntur, eodémque
oriante aperiantur, atque hæc motio tantam vim
habere in iis observatur, ut Siliquas dum habent
Occidente Sole, easdem foliis in se arctissimè
claudant & retinere spectentur, eodémq; oriante
aperiantur, Siliquasque relinquunt.

Quare qui cum Monachis sibi persuadent no-
stros Tamarindos non esse veros, sed pulpam
prunorum cum seminibus Cassia, non parum
falluntur, ut nobiscum sentiunt Garcias & Aco-
sta: si conferrent semina illa cum iis quæ Tama-
rindis admixta, animaduertent, longè diuersa,
nempe maiora, nigriora, non ita plana, ac habere
veluti formam cordis in medio, cum semina Cas-
sia sint æqualia, & vndique vnius coloris: Ad-
de quod Cassia & Tamarindorum semina nostrat
etiam solo commissa d uerlas plantulas, mul-
timque inter se dissimiles producant. Nam Cas-
sia tenellæ plantæ latitulum, acuminatum,
Glycyrrhizæ quadamtenus simile folium habent:
at verò Tamarindorum prima germinatio, simile
omniò folium ostendit, quale depingitur & de-
scribitur Alpino, Sesban videlicet, ut dictum, seu
Orobi Matiholi.

Arbor est, inquit Garcias, Fraxini, aut Iuglan-
dis, Castanæve amplitudine, materie firma, non
fungosa siue spongiosa: rami foliis ornati multis
minutisque incisis, palmi magnitudine: fructus
in arcus aut digiti incurui figuram efformatur.
Huius immaturi cortex vitet, siccatus verò cine-
reus est, & facillè auellitur: nucleos intus continet
satiatorum Lupinorum magnitudine, quodammodo rotundos, sed planos, colore fuluos,
sed laues: quibus abiectis pulpæ vltus est, quæ
lenta & viscida est. Sed illud obseruatione di-
gnum, quod hic fructus in arbore adhuc pen-
dens noctu foliis sese inuoluat vitandi frigoris
causa, interdum verò sese expediat, & è medio
foliorum emergat. Acidus est dum vitet, sed ta-
men ea aciditas suauitate non caret.

Sunt Tamarindi, ut tradit Acoſta, fructus ele-
gantis & aspectu pulchræ arboris, Castanæ aut
Ceratiorum arboris magnitudine, multis ramis
præditus, & foliis latam umbram præbentibus,
materie solidâ admodum: folia filicis feminæ
foliis persimilia, dilutè virentia, valde elegantia,
gustu acido, gratoque, è quibus condimentum
fit [Salsam vocant] perinde atque è petroseli-
no: flores candidi, aureæ Mali similibus admo-
dum similes formâ exteriori, & odore: attamen
odonis foliis constant, quorum quatuor inte-
riora alba sunt & crassiora, velut Mali aureæ flo-
rum folia, quatuor verò exteriora tenuiora, &
bina ex his eleganti nervo radiata: è medio flo-
re quatuor enascuntur, stamina cornicularum
modo inflexa, candida & tenuia. Fructus ad-
modum similis est Ceratiis, [Tamarindorum su-
ctus descriptio verior apud Garciam conspicitur,
Clusius.] foris virens in initio. deinde per siccita-
tem cinereus, continens officula, rotunda
Cassia solutius modo, aut paruis Lupinis similia,
dura admodum, & colore nitido terreo, hand-
quaquam flauo, quemadmodum nonnulli refe-
runt.

Nunc superest, ut ex Authorum Arabum scri-
ptis hoc medicamentum examinemus, cum Ve-
tenbus

Flora.

Mirm de
bac arbor.
FoliaNostri Tamarindi
Geri sunt.
Error quorundam.

Salsa.



ut potentiùs refrigerent. Non colati quoque dantur, quando potentiùs ille ardor extinguendus est. Addunt quidam Prunorum par pondus. Mediocriter coqui [viribus seruatis] possunt, si opus est, quas tamen immodica coctio adimittit. Ob id verò quòd imbecilliter purgant, ab vncijs duabus ad quinque propinantur. Annos tres seruantur in vase vitreato bene obstrueto, & in locum purum & persatulem seposito, nisi externus vel calor vel humor putredinis initium ipsis attulerit. Serap. ex sententia Aben Mesuaz dicit Tamarindos frigidos in tertio gradu, ut antè notatum in eius verbis. Tamarindi secundum Auicennam frigidi sunt & siccii in secundo: de his opinio est, quòd confortent cor. Videtur tamen quòd illud proprium sit in habentibus malam complexionem, ad naturam cholericam declinantem. Etiam temperant in frigidando & à cholera mundant cum virtute solutiva, quam habent. Purca & Arabes à state longinquum iter suscepturi, ait Bellon. Tamarindos coemunt, magni in Turcia vsus, sic ut nullus elabatur annus, quin Caïri plusquam ter millenarum librarum veneant, non medicinarum, sed sitis restinguendæ gratia. Lectu & notatur tanè dignissimum quod M. B. Ven. narrat, cum inquit, Sunt in regno *Gozarab* plurimi piratæ, qui quum mercatores ceperint, cogunt eos bibere Tamarindos cum aqua maris, & illic fluxum ventris patiuntur. Quod idè faciunt, quia Mercatores, quando procul Piratas aduentare vident, solent deglutire margaritas & lapides pretiosiores, ne illis per Piratas eripiantur, sed illi horum astutiam non ignorantes, cogunt eos illic egerere glutinosos lapides.

Hic fructus probè sumptus quibusdam morbis est presentissimum remedium, ut recitat Gabr. Fallop. de Medic. purg. simpl. his verbis, Ego soleo Tamarindorum pulpam exhibere felicissimo cum successu in Gonorrhœa biliosa, quando volo extinguere feruorem sanguinis & bilis. Exhibeo autem Tamarindos non solos, sed mixtos cum Cassia, ut v. g. Accipio duas drachmas pulpæ Tamarindorum & misceo cum vncia floris Cassiæ, & si velim magis adstringere, commisceo dimidium scrupulum corticis seminum Tamarindorum, redigendo, scilicet, corticem illorum seminum in puluerem. Plurimis mederi morbis Tamarindum Alpinus fusiè his verbis demonstrat. Videntur folijs, in pueris, ad vermès necandos, atque etiam ipsorum, vel infuso, vel decocto ad soluendam aluum, acida sunt folia atque gustui non insauia. Arabes coniungunt Siliquas seu Cannas huius arboris paruas ac virides saccharo vel melle *Carrub*, tum etiam grandiores factas atque maturas, coniungunt ipsarum pulpam saccharo, quam per itinera, quæ in desertis Africa locis conficiunt, secum viatores deferunt. Quæ sæpè, calefacti ac ex calore itineris inflammationi valdè sitientes refrigerantur, atque sitim restinguunt, per aluum plurimum calidorum humorum subducentes atque vacuantes. In febribus verò pestilentibus, atque omnibus alijs ex putridis exurentibus, aquam in qua multa copia Tamarindorum infusa fuerit cum saccharo bibunt: potus siquidem sitientibus ex calore iucundissimus est, maximèque refrigerat & sitim extinguit. Ad omnes denique febres putridas à biliosis exustisque humoribus concitatas, & ad hepatitis atque renum calefactiones ac inflammationes, præterea ad Gonorrhœam vsus Tamarindorum frequentant. Plurimum illis expurgatis vtor, inquit Garcias, cum saccharo, atque id maio-

ri cum successu, quàm si Syrupus acetoso vteret. Soleo etiam plerumque ægros Tamarindorum infusione purgare. Tamarindorum v. g. quatuor vnciæ aqua frigida aut stillatio intubi liquore macerentur per tres horas, deinde facta expressione eximantur Tamarindi, quos modico saccharo inpersos vtiliter exhibeo, euacuant enim ex parte biliosum humorem, atque pituitosum incidant & attenuant. Huius regionis incolæ sine molestia sese purgant Tamarindis cum oleo Nucis Indicæ sumptis. Medici verò Indici, folia Tamarindorum trita partibus corporis erysipelate infectis imponunt. Nos hîc Tamarindis acetu loco vtimur, gravior enim palato est eorum aciditas, præsertim maturorum. Deferuntur in Arabiam, Persiam, Asiam minorem, & Lusitaniam sale conditi, ut temporis iniuriam meliùs ferre possint. Ego verò sine sale domi asseruare cum suo cortice soleo. Fit ex iis recentibus cum saccharo conferva, præclarum proculdubio medicamentum ad digerendos & expurgandos humores, nec minùs palato gratum, Tamarindorum stillatio liquore pro digestivo aliquando vsus sum: verum cum nimis dulcem & insipidum ferè inuenerim, eo vti desii. Caterùm Tamarindi ex Arabum testimonio refrigerant & exsiccant tertio ordine, tametsi aliquot exemplaria Mesuaz, sed mendosa, secundo ordine refrigerantium & siccantium collocent. Tamarindi infundi solent pondere vnc. iiii. in qua frigida, aut stillatio Intybi liquore per tres horas, ut facta expressione exempti, inpersique modico saccharo propinantur ad purgandos biliosos humores & pituitosos incidendos & attenuandos. De Tamarindis ita Posthius:

Et modicè siccis, modicèque refrigerat horum

Pulpa, reseruatque acidum gustanti grata saporem,

Et valet ardentes purgando euincere febres.

Nec sicco pede transigenda quæ de Tamarindo Christophorus A Costa Arom. lib. præclare recenset. Sola pulpa vtimur, quæ non nihil lenta & viscida est, iucunda tamen aciditate grata, tametsi nonnulli indigenæ afferant officula assata & in pollinem redacta ex oxygala in alui profluuijs vtiliter exhiberi: Folia trita partibus Erysipelate infectis imponunt, atque etiam circa phlegmonas ad arcendum qui insuit humorem: iisdem cum sale Ormuziano phlegmonas resoluunt, & cum cineribus ex Canibaiâ pituitosos & melancholicos tumores: vsu compertum est huius arboris umbram sub eâ dormientibus non minùs noxiam esse, quàm arboris Iuglandis. Illud pro conclusione monendum videbatur, quomodo per numeros præscribantur apud Felicem Platerum Tamarindi, quum ad nos non soleant adferri integri: sed vt ego suspicor lapsus erit Typographicus, nec industrius & perito Viro imputandus, quid si legendum Sebesten, de febribus pag. 158. 2. Prunor. Damasc. n. x. Tamarind. n. xii.

TAMARINDI SEMINIS FACIE FRUCTVS INDICVS.

CAP. V.

Tamarindi seminis maioris ferè figurâ, fructum Indicum ab Illustrissimæ Dominæ nostræ Sybillæ Anhaltinæ Ducissæ V. Virtembergicæ muni-

Tamar. in d. conferva.

Aqua stillatio Tamarindorum.

Infuso.

Pulpa dolens.

Officula: Alui profluuium, Folia.

Phlegmon.

Platerum not.

Ad renum inflammationem.







cum priore confundit, dum semen omnino Lenticule simile facit. Est ergo duplex Spina Aegyptia, & hec quæ etiam Acacia vocatur, & altera quæ etiam Arabica dicitur: Et apparet Actium hac parte aberrasse, dum ait: Spina Aegyptia ex qua Acacia præparatur, adstringendi & siccandi vim habet: Quare & fluxui muliebri prodest, & ulceræ sedis insuflata ad cicatricem perducit. Est enim alia Spina Aegyptia, ex qua Acacia fit: alia item Spina Aegyptia & Arabica dicta, quæ vires illas habet, velut etiam Galenus tradit. Duas itaque diuersas plantas Actius in verba deceptus in vnam confundit. Idem lapsus contigit etiam Plinio. Sed hac parte minus laborandum nobis hodie, qui Acaciam hanc nullam habemus, & penitus ignoramus.

An Cornar. Plinio faciat iniuriam, examinabimus, ubi agemus de Spina Aegyptia. Quod de Acanthi natali solo Virgilius tradit [& hancas semper frondentis Acanthi] clarissimum ficere affirmat Marantha, cum non locutum fuisse de Melamphylo [vide Brancam Vrsinam] quandoquidem hæc ubique gentium oriatur, nedum in India. Ceterum, in non leuem suspicionem duxit Maraptham Plinius, ut crederet Acanthum hanc esse Ebeni speciem, de qua Plin. lib. 12. cap. 4. verba fecerit, nam eam cap. 4. locutus sit de Ebeni altera specie, quæ fruticosa sit Cytisi modo, & statim cap. 5. subdat: Ibi & spina similis, sed deprehensa lucernis, igni protinus transiliente: sibi videri spinam Acanthi nomen exprimere. Hocque spinæ genus idem esse ipsi videtur, quod Dioscoridis Sciamina aut Spina lignea: quæ ob similitudinem pro Ebena venibant: quod discernebatur ex eo, quod fungosa erant, & in purpureas hastulas resoluebantur: unde fortè propterea lucernis apta erant & ignis rapacia.

Seruius arboris genus esse in Aegypto semper frondentis scribit: sed quæ id coniectura affectus sit non declarat: In hoc etiam tiores cogitent. Ex Acacia quadam Aegypti spina, ex cuius semine sen fructu, interdum & solis, inquit Rysf. & ex eo Syluius Acacia succus exprimitur, manat gummi in vermiculorum speciem contractum, vini modo perlucidum, refrigerat, densat. Huius non ineminit Galen. in Acacia lib. 5. simpl. uti nec Acacia mentionem facit pauld post in Acanthia Aegyptia seu Arabica (quo nonne solo Dioscoridi vocatur:) unde colligas licet, Acaciam & Acantham Aegyptiam seu Arabicam diuersas esse in Aegypto spinas arbores. Tamen in lib. comp. phar. part. frequenter leges nupus absolute Tragacanthæ coniunctum pro Gummi Arabico, quod nupus Dioscoridi vocat, lib. 7. comp. phar. part. à Thebis opinor Aegypti centifloribus, uti etiam Babylonicum quibudam dicitur, à Babylone Aegypti Arabiam attingentis, nupus dicitur, à Galieno per sepe Actuius vocat.

Fuchs. de comp. med. Acacia vera succus, eius fructus decerpitur è spina, unde Arabicum Gummi manat. Hæc hodie raro aut nunquam habetur.

Matthioli sententia, Syluius manifestè aberrasse deprehenditur, quandoquidem Galeno Acanthia Aegyptia arbor utique non est, sed herba è Carduorum genere, quemadmodum & Dioscoridi libro 3. cap. 2. dicitur, hoc est, spinæ albae similis, quam Mauritanii *Sachan* appellant. Quocirca eo capite Acacia meminisse Galenum omnino fuisse absurdum. Errasse eos idem crediderit, qui sibi persuaferunt Arabicam spinam, cuius hæc meminit Dioscor. eam aculeatam esse arborem,

quam Acaciam vocant: Arabicam spinam non esse Acaciam, ut Ruellius hallucinetur: Plinium lib. 24. cap. 12. alteram ab altera separasse. Veram autem Acaciam non fuisse notam. Matthiolo satis demonstrat falsa figura, quam posuit in post. com. Ital. de qua pauld post loquens. In Hist. Germ. pro prima Acacia nihil demonstrat: dicit quidem Gummi Arabicum esse Acacia gummi, sed non nostrum Arabicum, quod ex diuersis arboribus congregari solentur etiam cum in Hist. Germ. quam ante secundam Acaciam vocauit, simpliciter Acaciam nominare.

Serapionis caput, aiunt Monachi, qui cum pluribus aliis dicit arborem Acacia (quam ipse Spinam Babylonicam vocat) producere Gummi Arabicum, idem est cum Dioscoridis capite de Acacia, hoc excepto, quod Dioscorides pro Babylonica, scribit Aegyptia, & dicit producere gummi: sed non nominat: Andreas Bellenensis autem in suis interpretationibus, in littera Alcarad, dicit sic: Alcarad vel alcharad, est fructus arboris spinosæ in Aegypto & in regione dicta Bassera, & talis arbor ab Aegyptiis appellatur *Sitah*: & licet ex hac arbore colligatur gummi simile Arabico, tamen Gummi Arabicum est illud, quod colligitur ex arbore dicta *Amgailam*, & Acacia fit ex fructu arboris *Serap*: qui fructus, *Alcharad* appellatur. & est fructus Agypticus in vaginis: hæc ille. Ex dictis igitur contigit dubitare, an sit verum Gummi Arabicum, quo vtimur, & an arbor Acacia ferat illud, ut Serapio scribit: siue sit altera arbor, ut Bellenensis tradit. Ex si est verum Gummi Arabicum (quo vtimur) productum ex arbore Acacia: Unde ergo est, quod de ipso gummi exportatur tanta copia, & de Acacia, siue ex fincibus, unde ipsa conficitur, nihil prætere Serap. cap. de gummi Arabico, dicit idem quod dicit Dioscor. prælo cap. de Acacia, præter quod [ut diximus] Dioscor. non specificat Arabicum. Aiunt enim ipsum esse simile vermiculis in figura sua, & quod aliquid ex eo est, ut vitrum translucens & aliud candidum. Hæc Monachi, quibus non magis assentimur quam Matthiolo: nostro seculo inueniuntur Siliquæ & Spinæ cum Gummi Arabico vulgari quod melius conuenit descriptioni Veterum, quam Tragacanthæ quicquid censeant Monachi, Matthioli, Collegium Florentinum & Eucardus, qui Gummi Arabicum idem putat cum Tragacantha.

Hist. Lugdun. *Acanthia*, Acacia, Arabi *Achachie*. Theophr. *Acanthia* simpliciter id est, spina, & *Acanthia* Spina Aegyptia vocata, ita ut Acacia nomine & Spinam, & succum ex fructu spinæ expressum accipiamus: spina verò Aegyptia appellatione ipsam arborem Acaciam intelligamus. Acacia, inquit Dioscor. in Aegypto nascitur, Spina arboris instat, & rursum, Alterum genus in Cappadocia, Pontoque. Plinius lib. 24. cap. 12. Spinam Arabicam, ab Acacia Spina distinxit. Actius, qui Spinam Aegyptiam vocat, ex qua Acacia præparetur, duas diuersas plantas in vnam confundit. Plinius alteram Acaciae speciem, quam in Cappadocia & Ponto nasci ait Dioscorides, Galatiam appellat, & cum priore, Aegyptia scilicet, confundit. Scire oportet Gummi Arabicum Officinis dictum, multum à Spinæ Aegyptiæ gummi differre. Hæc Hist. Lugd. Ausim ego contra asserere Gummi Arabicum plurimarum officinarum à multis annis esse Spinæ Acaciae, id ut dictum demonstrantibus spinis & seminibus de Gummi vermiculato à me crebro obseruatis.

Robert. Const. in Lexico *Acanthia* Spinæ arboreæ genus

Actius not.

Plin. me.
Acaciam
nullam habemus.

Acanthi
baccæ.

Ebeni speciem
autem.

Spina pro
lucerna.
Spina Acanthi
Sciamina
Diosc.
Spina lignea.
Acacia.

Gummi
vermicula.
tum.

Gummi A.
rabicum.
nupus dicitur
Babylonicum
quibudam dicitur
à Babylone
Aegypti Arabiam
attingentis, nupus dicitur
à Galieno
per sepe Actuius
vocat.

Syluius not.
Acacia
Aegypti.

Est herba
non arbor.

Matthioli
error.

Spina Babylonica.
Gummi Arabicum.

Alcarad.
Alcharad.
Setan.

Amgailam
Setan.

Dubium
Monachorum.

Monachi
notantur.

Acanthia
Theophr.

Acacia duplex
grum
Diosc.
Spina Arabica.
Acacia non est.
Actius error.
Plinius error.

Gummi Arabicum.

Hist. Lugd.
refellitur.

gentis Dioscoridi, *Geminata* Herba medicinalis dicta.

Gribafis
Acacia
Arbor

Non ignorat Amatus, *Gribafis* & *Acacia* Acaciae arbutulam cum Arabica sine Aegyptia spina, idem facere, quos *Ruellius* secutus sit, sed non sine errore. Reprehendit Agricola Dioscoridem, quod in Aegypto solum nasci memorat, quum tamen & alibi proveniat: Nam & Syriam spinam dici constare: Errare etiam insuper eos dicit qui Acaciam fieri putent ex spina Arabica: Gummi Arabicum, quod à quibusdam Babylonicum dicatur, Serapionem ex arbore Acacia promanare scribere, quæ sit spina Aegyptia cuius meminerit Plinius lib. 13. cap. 11. Latine igitur vocari hoc gummi, Acaciae gummi, vel gummi Aegyptiacæ spinæ.

Frisch. car.
quar
Helsticus.

Frischlinus, qui Acaciam modò fruticem (*Dornbusch*) modò arborem Aegyptiacam spinosam appellat minus attentè successu è pomis exprimi scribit. Acacia arbor non fert poma, sed iliquis è quibus succus exprimi potest.

Frischlini errorem sequitur *Helsticus*, qui & ipse non novit Arabicum gummi esse ex eadem arbore.

Equivoca

Ad Acaciae æquivocationes & substituta ordine deveniamus. *Acacia* huiusmodi vera, ab *Acacia* India, *Tamarindus* Cordi dicta, non parum variat, de hac iam dictum. *Acacia* Matthioli nihil aliud esse quam *Tamarindus* arborem, cui apparet spinæ obtemperant, proutquam quilibet à scriptis mandavit de qua postea suo capite. Multa tamen crediderunt esse *Acacia* Prunum sylvestrem (*Schlehen dorn* *Acacia* Germanicam vocat, *Dodon.*) sed hi maxime in errore versantur.

Tamarindus
Arbor
Indica

Prunus
Sylva

Succus Prunus
Sylva

Et hinc magno errore perstratum est *Eustachius* & *Euchar. Ræss. Hanch. Guidoni, Plateario* & nonnullis *Acacia* esse succum *Prunellorum* sylvestrium. Nobiscum sentit *Cordus* in *Dioscor. Trag. Lonic. Brunell. Is. Agric. Hermol. & plures alii*. Est & *Acacia* altera Veteribus ut *Dioscoridi*, quæ multis dicitur frutex trifolius, qui alius ceu & nobis existimatur *Aspalathus* *serena* de qua *Hist. n. lib. 4.* Considerandum an *Aspalathus* *Acacia* altera *similis* *Sorpes* *Theophrasti*, sit *Aspalathus* 2. *Montepellianum* de qua *Hist. n. lib. eodem*. *Acacia* (mutata litera c. in l.) est *Camer. in hortu* *San. lurtus caruleus*.

Acacia alba

Aspalathus
serena

Aspalathus
serena

Acacia
serena

Substituta
Succus
Prunorum
Sylva

Substituit maior pars Medicorum & Officina- rum *Acacia* deficiente succo, *Prunorum* (sive *Prunorum*) [quem nonnulli *Acacia* Officinæ vocant, male] quorum sententiæ neutiquam subser- bendum, licet *Matthiol. in Hist. Germ. Acacia* scribat. Quod mirum cum in prioribus in *Dioscor. com.* Veterum potius opinionem sequatur, ut

Hypocistis

Dioscoridis, qui eius vice tum folia *Rhois*, tum *Lentisci* foliorum succum, tum *Hypocistiden* medicamentis admiscet, quibus utendum potius fuerit. Cum *Dioscoride* *Acacia* loco supponunt *Hypocistin* *Avic. Sylu. Fuchlin antibal. Col- leg. Florent. Placot. Borgar. Matthiol. in epist. 1. Lacuna in Dioscor. Monachi in Mef. Fernel. M. M. Fauard. in Gal. de simpl. Camer. in Hist. Matthiol. Germ. Cronenburg. Hist. Lugd. & Antid. Romanum: Succum Lentisci, Avic. Mat- thiol. Lacuna. Monachi in Mef. Apollorad. 1. Gal. de subst. Camer. apud. Matth. Germ. Cronenburg. & Hist. Lugdenensis: *Rhois* folia, *Matthiol. in Dioscor. Placot. Lacuna, Brassau. Bacchanel. Io. Agric. Cronenburg. & Hist. Lug- dunensis: Pulpam Rhois, Collegium Floren- tinum & Borgarucus: Succum seminis aut folio- rum Monachi in Mef. & Apollorad. Non placet tan-**

Succus
Lentisci

Rhois folia

Rhois pulpa



Rhois semina

Rhois folia

Tom. 1.

dem Ioubertum *Acacia* substituit Gummi Ara- bicum: quod (licet ex eadem planta, ex qua *Acacia*, proveniat) tum sapore, tum viribus mul- tum differat. Sed hæc breviter annotasse suffi- ciat.

ACACIA VERA.



Acaciae plā- *Descriptio*
tam ado-
lescentiore

ex semine na-
tam Patavi vi-
di, spinis hor-
rentem, simili-
bus fere spinis
Crespini, que
Berbens vulgò
dicitur eodem-
que ferè ordine
dispositis, binis
ut plurimum si-
mul natis, à
semiticundura-
tatis, albis,
corticis ex nigro
cinereo, ligno
ex luteo paret-
centis, foliis ad
Lentis tel a oc-
cidentibus pin-
nam, multis ad
eandem vnam
adherentibus:

in pollice, teste
Athenio, possis
agere 150. folia:
Siliquæ, quas
hactenus habe-
re conigit, Lu-
pini Siliquis
quodammodo
similes, nigricæ-
tes siue luteæ,
compressæ an-
gusto isthmo in-
terceptæ, (an
pluribus quam
duobus solet
isthmis distin-
gui, *Avicenna* &
non habeo quod

dicam) eoque fragili, vnicuique loculo ad latera
apertis semen inest vnicum, minus quam *Carthi-
biæ* siue *Siliquæ*, spadiceum, circulo in vnguem
ducto, veluti in *Tamarindis* notatum, oblongum,
dentium contemptrici duricie in eo medulla. Cæ-
terum, *Siliquam* intrinsecus succingit pellicula
rufficiens inter quam & extimum corticem con-
cretus liquor apparet, qualis ferè in *Cassia*, sed
valde paucus. Flores pulcherrimi sunt spherica
rotunditate: globuli magnitudinis maioris *Pisi*,
qui constant veluti lanugine molli, ex se pulve-
rem remittentes, coloris sunt flavo, pediculi singu-
lorum globulorum, tenues, unciales: *Alpinus*
aut odore ille non ingrato *Cayri* quidem flavo,
vel pallido: In montanis verdè *Arabie*, albo: Ar-
borem magnitudine *Mori*, ramisque esse latius ex-
pansis, caudice *Pruni*, trunco equali.

De *Acacia* loquitur *Rauwolf.* cum ait: *Circa*
Halepum conspicitur *Spinosis* frutex *Acaciae*, qui

Semen.

Medulla
Liquor.
Floris.

Odor.
Lacuna
Coloris
Locor.

Nn 3

Descriptio
Ran. Vellf.
Odores a-
gricola.
Ramuli.
Spina.
Folia.
Siliqua.

incolis dicitur *Schack* & Arabib, *Schamus*, in his par-
tibus parum est & humilis, potissimum in aruis,
ubi non minus odiosus eorum agricolis, quam
Filix & Anonis sunt nostris: ramuli sunt citherei,
curui, spinæ eis multæ similes Rosarum spinis.
Foliola Tragacanthæ, plumæ modo dispositæ, vt
in Filice fœmina, flores in ea non vidi, Siliquæ
eius sunt externæ fuscæ, crassiores & rotundio-
res Faba, internæ fungosæ, quæ continent duo
aurea rubentia semina, prope urbem Bir ad Eu-
phratem inueni Acaciā, maiorem arbore & fru-
ctu quàm alius in locis: Item in Arabia ad Euphra-
tem genus cum rotundis fuscis siliquis, quod
Schack & *Schamus* Arabibus dicitur, circa Babylo-
nem in arena.

Semen.
Acacia Ga-
mali.

Gummi A-
rabicum.
Serbum.

Ebenum.
Gummi A-
rabicum.

Locus.
Gummi A-
rabicum.
Siliqua est A-
cacia.

Est Acacia, inquit Cord. in Dioscor. secundum
omnes Græcos, Latinos & Arabes Scriptores, in
Aegypto nascens arbuscula, cuius Siliquæ in
Gummi Arabico vocato, quod ex Acacia arbore
manat, sæpè à me inuenta: Gummi verò eius af-
fertur, non succus: In margine scribitur, *Serbum*
in sacris Litteris vocatur: Acantha simpliciter
Theophrasto. Venditur hodie non minùs quàm
olum, Indica & Aegyptiaca spinæ, hoc est, Acaciæ
materia pro Ebena, quæ propter similitudinem
facile ementibus imponit: Gummi eius Arabicum
cognominatum.

Acacia, ait Bellon. Obseru. Constantinopoli
Angia vocatur: Inueniuntur eius arbores cir-
ca mare rubrum, ex quibus colligitur ab Ara-
bibus gummi id quo vtimur in Europa in atra-
mento & coloribus conficiendis, licet quidam
Recentiorum aliter senserint: recensetur Acacia
inter arbores semper virentes. Figura Bellonii
infeliciter picta, in qua nec folia, nec Siliquæ be-
ne exprimuntur: foliis depingitur sine sili-
quis à Dodonzo. Castor. Durant. in fine Herba-
rii inter figuras Acacia Alexandrina. Lacuna in
Diosc. pro Acacia figuram habet, quæ non placet.
Fuchl. Hist. Hispanica Antwerp. impressa p. 557.
Iconem habet cum hoc titulo *argia*, Acaciæ nu-
per erumpentis rudimentum. Et Verdadero *ar-
bor del Acacia*. Anguill. Acacia prima: Item A-
canthus Theophrasti, Acacia Dioscor. Dodon.
Gall. Acacia Aegyptia: Lat. in fol. Acacia, quæ &
Aegyptia Spina, cuiusque Gummi in officinis A-
rabicum gummi dicatur. Lobel. Spina Acacia, Spi-
na Arabica Diosc. Hist. Lugd. cui Acacia Aegy-
ptiaca dicitur, notat *Argia* dici ab *argia* quod est
acu, vnde Acacia quasi acuta: Apud Plinium
lib. 24. cap. 12. legendum, Spinæ Aegyptiæ landes
in odorum loco diximus, Arabica spissat &c. Eum
enim huic Spinæ omnia, quæ à Dioscor. Arabice
tributa sunt, rectè adscribere: de Aegyptia Spi-
na Plinii locum citantem Ruellium in Spinæ Ara-
bice Historia, Spinam Aegyptiam & Arabicam
pro eadem planta non sine errore usurpare.

Caner. Epit. ad Matth. Acacia, & ad eiusdem
Hist. Germ. Acacia prima. Eandem locis iam di-
ctis, sub signatura crucis ad Acaciam alteram
proponit, quam Bellonii esse ait in Hist. Germ.
quod falsum: Bellonius enim suæ nullas Siliquas
appigit, quam tamen & ipsam malè expressit.

Semen Aca-
cia.
M. M. Fe-
minæ.

Alpino Acacia [quam *Saur* Argypii appel-
lant]: Huius arboris mas atque fœmina reper-
tur. Mas spinis horridis, fructus non edit: fœmi-
na spinis paucioribus mollioribusque referta est,
eisque intra ramos non habet, sed extrà tantum.
Errant qui putant gummi quam arborem hanc
ferre multi meminerunt, apud nos vtique non
reperiri, neque ex Aegypto veram comportari,
quod ipsam forma vermiculati constare Dioscori-

des prodiderit: hoc enim certò scio me sæpissimè
Gummam hanc, quam falsè aliarum arborum si-
miles esse aunt, hisce manibus Cayri in virida-
riis multis Acaciæ Arboribus refertis, ex ipsorum
truncis multam colligisse.

Gummi in
Aegypto &
Acacia.

Guilland. multos non potest non vehementer
admirari, qui nesciant Acaciæ verum succum huc
ex Aegypto quotidie comportari. Nunc enim
pauci Pharmacopolæ existunt Patauii ac Vene-
tiis, qui hunc succum ignorent. Neque minùs
etiā miratur nonnullos, quod hanc plantam
non à clarissimorum Consulium Venetorum Me-
dicis vel Pharmacopolis, in Aegypto multos an-
nos versatis acceperint, potius quàm ex Græcia,
quam Acaciæ feracem fuisse nemo Antiquorum
dixit, veluti multi, quod in Aegypto hæc planta
vivat, spinam Aegyptiam ipsam nominarunt.

Acacia Ga-
mali succum
in Italia.

Huiusmodi itaque plantæ genus non ex Græ-
cia, vt Matthiolus Bizuntio se habuisse ait, in quo
tamen non parum fuit deceptus, sed ab Aegypto
foret petendum: Acaciæ igitur Matthioli imagi-
nem planè falsam esse notissimum est.

Matthioli.

C. Bauh. apud Matth. Acacia Aegyptiaca.

Ignota hæcenus quidem multis, nunc verò in
Italico solo hospitatur, nec aëris inclementiam
horret. Duplex genus Acanthi à Theophr. po-
nitur, duasque esse Acacias Dioscoridis Anguill.
contendit, cuius auctoritatem, plurimi faciendam
censeo.

Acanthi
duplex po-
nit Theophr.

Acaciam seminaui in horto Illust. Exc. Celsit.
semen missum fuit Lutetiā per insignem Chirur-
gum Regium Dom. Rasse, cum hoc titulo, *Acacia
Bizanti*: Fruticem ex semine natum vidi olim Pa-
tauii: Vidi etiā siccam plantam, apud clarissi-
mum Cortusum cum siliquis Lupinis similibus.
Valerandus Dourez Venetiis cum esset, ex sili-
quis viridibus ed allatis, expresserat succum
quem gustavi, sapore austero & graui, colore ni-
gro, tenacem. Cum gummi Arabico pellucido si-
ue Scolicoide albicante sapiens Lugduni reperi
spinas & semina, quæ manifestè indicant ex Aca-
cia illud colligi Gummi. Habeo etiā ramulum
huius fruticis à Fratre Bauh. datum, quem ait Hie-
rosolymā reportatum. Siliquæ mihi datæ fuerunt
Patauii à Ioan. Genuensi Pharmacopœo. Dom.
Cortusus misit mihi Patauii ferendum, cum hac
inscriptione, *Acacia Alessandrina*: & Paludanus
cum hoc titulo: *Carat Acacia*. Honorius Bellus
ex cortice Cidonia misit Fratri C. Bauh. qui me
ramulo donauit, & postea etiā mihi, scribens:
Mitto Acaciæ folia & flores, quos hic nunc Cy-
donia profert sphaerica rotunditate sunt & pul-
cherrimi, pediculo vno flos vnus exit, & citò in
terram decidit: plantam ad sex cubitos se attol-
lentem alo, quæ nondum semen produxit. In
Aegypti locis à mari remotis Acaciæ arbores, co-
piosissimæ autem, teste Alpino, in montibus
Sinay penes rubrum mare positæ, proueniunt: Fœ-
mina arbor est fœcundissima, florereque orien-
tibus pleiadibus, Nouembri mense incipit, &
rursum iisdem occidentibus, scil. mense Martio:
hisque in anno fructus fert atque maturat. Bel-
lon. lib. 2. cap. 56. In Arabia ad mare rubrum, circa
Sues in deserto sterili, nulla planta ibi prouenit
præter arbores Acaciæ, quæ ibi abundant, ex qui-
bus Arabes diligenter Gummi colligunt.

Locus &
tempus.

Carat.

Acacia, [id est succus] vim habet, authore Dio-
scoride, adstringentem, refrigerantem: succus
commodus est ad oculorum medicamenta, & i-
gnes sacros, herpetas, perniones, pterygia & vl-
cera in ore. Sed & oculos procidentes continet
& fluxum muliebrem, [Mensium abundantiam
gustit,

Virex & v-
sus.

Oculi.
Ignes sacros.
Vlcera.

*Ruellii de-
prunata
lucio
Vierm.
Alnus.
Capilli.
Lam. ad o-
culorum
medicamē-
ta
Vitis.
Tortur.
Decoctum
spina.
Galen. ex-
plicatur.* sistit, malè Ruellius Plinium imitatus H. St. Lugd.) cohibet, & utrum prolabentem reprimat: al- uumque fluentem sistit, potus & infusus: Capil- los item nigros facit. Lauatur etiam ad oculorum medicamenta tritus cum aqua, ita ut quod super- stat, diffundatur donec pura aqua supersit, atque sic in pastillos efformatur. Vnus quo- que in cruda olla cum ipso fictili in camino. Tor- retur eadem super prunas suspensa, vitra exlus- fletur. At spinæ decoctum affusum, articulos so- lutos compingit. Dicit Galen. plantam ipsam Acaciæ acerbam esse & fructum & succum, qui lotus quidem imbecillior & minus mordax red- datur, ut pote acrimoniam quandam in lauat- ne deponens (id est vehementius astringentem vim,) quæ contracta corpora distrahit, ac veluti dilacerat. Ea scilicet vis aquæ persusione dilui- tur & obtunditur. Sic locum hunc exponit Da- lech. omnis enim acrimonie prorsus expertus est Acacia, (etiam si Galeno credamus partes qualis- dam calidas in eius substantiam mixtas esse) porro si parti alicui sanæ illinatur, protinus eam & siccio- rem & contractam efficit, nullum quidem calo- ris sensum inuehens, sed, nec frigoris admodum valentem. Unde constat medicamen id esse frigi- dum & terrosum, amista quadam etiam essentia aquea. Et sanè coniectura est, non esse simile, verum qualisdam in se dispersas habere partes te- nues & calidas, quæ in ipsa ablutione se segre- gentur. Estque tertii ordinis viscantium & secun- di refrigerantium, ubi quidem elotum fuerit, ab- que eo verò primi. Et hinc Aetius ait Spinam Aegyptiam, ex qua Acacia præparatur, adstin- gendi ac siccandi vim habere, quare & fluxui mu- liebri prodest, & vlcera sedis insufflata ad cicatri- cem perducit. Aegypti apud Bellonium ad ornā- da coria vtuntur siliquis Acaciæ, quas vendunt copiose in Officinis Cætrinis: In Arabia longa per- tica decutiunt folia quæ arctibus edenda præbent. Aegyptij ex obseruatione Alpini, Acaciæ arboris vtuntur succo, ex siliquis in maturis expresso vel etiam ex floribus, foliis, vel ex fructibus etiam. Succus huius vsus apud eos frequentissimus & ad oculos roborandos, atque ab inflammationibus quæ ibi sunt frequentissimæ, tuendos: ad oris au- rumque omnia vlcera. Nec non ad labiorum fis- suras. Ad dentes collabentes roborandos, atque firmandos, succo in puluerem redacto, post ab- lutionem ex decocto eiusdem succi, vel foliorum vel florum parato, factam, vtuntur supra gingiuas alperfo, ab eo dentibus confectis. Sanguinem spuentib* drachmam iungulo manè aliquo liquo- re dissolutam, potandam offerunt: Miræque ad quæcunque sanguinis fluxionem firmandam sem- per vires habuisse apud eos cognitum est. Ego se- pissimè hoc solo auxilio multas mulieres ab im- modico vteri profluuiio penè mortuas reuixisse, atque sanatas fuisse, certò scio. In iis quidem quæ has immodicas patiuntur vacuationes, Clysteri- bus ex Acaciæ foliorum florumque decocto para- tis, in uterum iniectis vtuntur. Atque etiam suc- co puluerizato prædicto, cum decocto dissoluta, atque immisso. In alui fluxionibus eodem tum clysteres frequentant, tum per os succum feliciter exhibent. Ad aluum utrumque foras prociden- tem, succo dissoluta cum foliorum florumque de- cocto, nihil habent præstantius ac frequentius quo vtuntur. Ad eos qui ex quacunque causa ar- ticulos debiles habent, fomentum ex iisdem om- nibus paratum, pro præsentaneo auxilio habent. Neq; immeritò, cum n. Acacia præualidissima ad- stringendi vi prædita sit, omnes eius fomento v-

tuntur, ad defendendos articulos ab humorum decursu, atque non nimis in iisdem tumefa- ctis atque inflammatis, præsertim in principio dum humores adhuc in cursu existunt. Hincque vsus ad podagricos dolores se- quentissimus est, maximamque vim habet Acacia, ut à podagricis incurfibus homines præferret. Non desunt, qui ad ea mala non modo foris fomenti vel balnei modo Acacia vtuntur, verum etiam succi modi- cum, per os sumere ante fluxionis tempus per a- liquot dies consuecunt, ut ipse interit viz, an- gustiores factæ minùs curæ humorum pateant. Aliqui etiam ex succo Acaciæ atque aceto Linimentum parant, ad liniendos articulos de- bilitatos, quo sanè munificè eos roborant ac fir- mant. Multi recentè à podagra tentati, vsu assiduo Acaciæ planè conualuerunt, qui singulis die- bus per horam ad minùs pedes in decoctum Aca- ciæ calidum detinebant, eoque fomentabantur, pedesque absterfos, Linimento ex succo Acaciæ, opobalsamo, acetoque parato etiam inungebant. Ad pulsedorum aliarumque debiliū partium vlcera didiculi, succi aqua pluries Loti pulueriza- ti vsus est illis familiarissimus: decocto etiam v- tuntur ad exsiccandas pustulas omnes præsertim- que Gallicas, sed decoctum parant etiam cum modico ligni Guaiaci: in pueris etiam ad achores in capite Orientes, & decocto & puluere vtun- tur. Non possum autem cum Baptista Cordoni- chio probare Aucennam & Mesuem, qui aiunt in laxata Colu nelli, caput ulnendum esse cum suc- co Acaciæ, nam hic succus intemperiem capitis frigidam magis augere potest.

GUMMI ARABICVM SIVE ACATIAE.

Gummi hodie Arabicum nominatum, grumis concretum vilitur, Nucis ponticæ aut lu- gundis magnitudine, vel etiam sex luglandium (ut mihi conigit aliquando in offic. Basiliensi, affinis mei Ioh. Iacobi Frey Aromatarum inuenire) cum adherente cortice cinereo, globosis, aliis contortis, in se conuolutum erucam imitantibus, pellucidis, ex flauo pallescentibus aut omninò flauis aut rutilis, extrema parte ferè rugosis & ve- luticoriosis, fragilibus quæ n. Tragacanthæ, lentescunt tamen & manibus adhærescentibus, sapore dulcisculo, humorem in qua maceratur le- torem vitæ conciliantibus. Committit re- periantur spinæ & semina, Lenticulis aut Lupi- nis similia, ut Lugduni sæpius obseruari quæ ma- nifestò indicant ipsum ex Acacia colligi vt ante dictum. Gummi [arab.] ex spina [arab.] videli- cet Acaciæ nasci auctor est Dioscorides: prætere- verò vermiculatum (arab. musid li) vitrum refe-rens [arab.] pellucidum [arab.] ligni expert [arab.] Proximum esse candidum [arab.] Resi- nosum verò ac sordidum [arab.] in-utile [arab.] censei.

Plinius hæc & alia quædam ita recenset. Gummi optimum esse ex Aegypcia spina conuenit, ver- miculatum, odore glauco, purum, sine cortice, dentibus adhærens, precium eius in libras xiii. (Denarios tres. Serap. Arabicum nuncupat, quod ex Arabia suo tempore apportaretur: Ga- lenus verò de comp. med. xxiij vocat, Gummi Arabicum ait Agricola à quibusdam vocari Baby- lonicum à nonnullis Sarracenicum. Gummi ex Acacia spina nasci Dioscor. tradit, quod Corn. non aliud esse meritò credit, quàm quod Arabicum officinæ vocant. Multa enim gummi genera sunt,

Articuli.

Podagra

Succus int-
cio sum-
tur.Linimen-
tum
Articuli
Podagra.Vlcera pu-
dendorum.Pustula
Gallica.Achores.
Arb. 17
Mesues mo-
datur.

Descript.

Magni-
tudo.

Forma.

Color.

Qualitas
Substantia
Sapor.

Synonyma

Gummi
ex spina.
Dioscorides
Illustratur
Delectus.

Delectus

Plinio.

Precium.

Gummi A-

rabicum

Serap.

Babyloni-

cum

Sarraceni-

cum.

Gummi A-

rab. Offic.

& in diuersis arboribus proueniunt. Quibus omnibus in communi succandi & meatus obducendi vim Galenus attribuit, & quod asperitates sanant: maximè tamen hæ facultates in hoc ex Acacia spina gummi habentur. Et Plinius ex Ægyptia Spina Gummi optimum esse dicit, quod apud Galenum lib. 4. *ἡ ἀκασία* etiam simpliciter gummi appellatur, itémque Thebaicum & Alexandrinum, velut in comm. eiusdem ostenditur.

Gummi Alexandrinum.

Negat Matth. Gummi Arabicum ex Acacia esse.

Succinum Topatium. Chrysopatium, Beryllum.

Scire etiamnum conuenit, tradit Matth. Gummi, quod ab arbore Acacia manat, idem Serapioni, Arabicum nuncupari, quod ab Arabia regione, Ægypto contermina, suo tempore importaretur: Sed animaduertere oportere, quod Arabicum vulgaris usus gummi, tenet hanc falsam opinionem etiam Hist. Lugdun. longè quidem ab illo differt, quod ab Acacia colligitur, namque illud non contractis vermiculis simile, sed in ramis versicoloribus conspici, quorum alii luccinum, alii topatium, alii chrysopatium, alii beryllum colore & nitore, referunt. Quod autem Gummi Acaciae desit, illud argumento esse posset, quod ipsa quoque legitima Acacia hætenus, quod sciat, non defertur. Nam si hoc quo utimur, sincerum legitimūque Acaciae esset Gummi, procul dubio ipsa quoque Acacia ad nos conueheretur, cum longè magis in paranda Theriaca, aliisque componendis medicamentis expetatur, quàm gummi. Vulgare igitur gummi, illud equidem esse existimaui, quod Græcis gummi simpliciter vocatur. In quam sententiam adduxit eum Galenus, siquidem lib. 7. simpl. medic. sic inquit. Gummi lachryma est congelata, concretæque in truncis arborum, ipsam fundentium, velut resina quoque in multis visitur plantis, quæ resinam fundere possunt. Ceterum, quod exiccatione Emplasticaeque sit facultatis, constat. Hæc Galenus. Ex cuius verbis palam est, Gummi sic in vniuersum Græcis appellatum, nostrum Gummi esse, vulgò Arabicum dictum. Quod quidem [quantum sensum iudicio consequi potest Matth.] ex pluribus arborum Gummi miscellaneum est. Cuius rei, manifestum indicio sunt, eum grumorum formæ diuersitas, tum colorum varietas. Huc etiam accedit quod Galenus vnica nomenclatione, omnium earum arborum Gummi comprehendit, quæ resinam non proferunt. Quamobrem omnino explodenda videtur eorum sententia, qui, vbi Græci Gummi absolutè scriptum relinquunt, illud Gummi intelligendum esse contendunt, quod è Spina Ægyptia manat. Galenus lib. 7. de comp. med. per genera, Acaciae gummi *ἡ ἀκασία* vocat, hoc fortasse argumento, quod scripserit Theophr. ingentem huiusce spinæ sylvam esse in agro Thebano: Sed cum ad nos non perferatur Acacia, nec etiam eius gummi importari credendum est. Matth. Hist. Germ. Acacia, Ger. Ægyptische schortendorn. Errant, qui Arabicum officinis dictum Gummi Acaciae esse arbitrantur.

Gummi miscellaneum.

Gummi Latia significatio. Error quorundam Gummi absolute.

Gummi Thebaicum.

Error quorundam. Matth. not.

Sed fallit Matthioli in post. comm. Italicis pro Acacia ponens arborem Iudæ cui appictæ falsè spinæ: Ei non assentior dum reicit nostrum Gummi, spinæ & semina Acaciae veræ in eo repta satis demonstrant, ad nos adferri verum: *ἡ ἀκασία*, *ἡ ἀκασία*, *ἡ ἀκασία*. Quod Acacia à mercatoribus non adferatur, perinde ut Gummi, sit ignorantia & negligentia Medicorum & Pharmacopæorum, qui non expetunt à mercatoribus: ut vendibilia eis nota potius aduehant, quàm incognita & non expetita.

Loubertium.

Miror dubitare loubertum an reperiatur Gum-

mi Arabicum, quod abundabat in Emporjjs, cum suam pharmaciam scribebat.

Prosper. Alpin. hoc de Acacia notandum monet, nimirum inultos errasse, qui putarent gummi, quam arborem hanc ferre multi meminerunt, non reperiri, neque ex Ægypto veram comportari, quod ipsam formam vermiculari constare Dioscor. prodiderit, Gummiæque hanc quam falsè Arabicam appellant, dicant esse similem potius aliarum arborum, quippe Cerasorum, Prunorum, Persicorum, Pomoium, Pyrorumque gummi. Sed, quod, pace Dioscoridis dixerit, non tota, sed paucissima, vermiculari formâ spectetur, neque tota alba & clara. Gummas Acaciae figura atque colore plerisque Cerasorum, Prunorumve gummi haud dissimiles vidit. Scit totam gummarum quantitatem, quæ ex Ægypto conuehitur esse Acaciae arborum: quando nulla ibi arbor sit excepta hac quæ gummas educat: ac Ægyptus & Arabia Prunis, Cerasis atque Pomis careat.

Error multorum Gummi.

Arabis falsa.

Diosc. not.

Hist. Lugdun. Gummi Arabicum Officinis dictum, multum à spinæ Ægyptiæ Gummi differt.

Gummi Arabicum vermiculatum quod ex Arabia defertur, habet Calceolarius (non illud officinarum vulgi) à Serapione decantatum, quod notandum cenfeo, inquit Olius, & inter potiora referendum. Quid? Gummi Officinarum non fuit hætenus diuersum ab Arabico, ut tenet Olius, quamuis nonnunquam sordidum, cum quo etiam vermiculatum reperiebatur: præfractiones an morosiores, qui Sepalsiarum Gummi Arabicum ex Acacia colligi pertinaciter negant: Quod Acacia destituimur, nil aliud quàm questus & compendii sui studiosos arguit, mercatoribus Ægypti vtitata est, hodièque Græca appellatio *ἡ ἀκασία*.

Gummi Arabicum de Officinarum diuersum.

Olius not.

Vim habet Gummi meatus obducendi, acia medicamenta, quibus commiscetur hebetandi. Et in ambustis pustulas excitari non sinit, illitum cum uno autore Dioscoride.

Vires Ambusta.

DE ACACIA SECUNDA VITIBVS.

Altera quoque Acacia, eodem Dioscoride auctore, in Cappadocia & Ponto prouenit, similis Ægyptiæ, multo tamen minor, & ad humum depressa, at tenerior, sed spina aculeorum specie obsita, folia habens Rutæ similia. Semen autem in folliculis coniunctis, trium aut quatuor capacibus, minus lente.

Locus Descript.

Falsa Semen.

Vires.

Hæc ipsa tota in succum expressa adstringit, verum inferior est facultate, & ad ocularia medicamenta inepta.

CARDEM SIVE ACACIA DIOSCORIDIS QVIBVS DAM.

Halepi in mercatorum Tabernis nomine Cardem, reperit Rauuolffius, venales siliquas, Castaneæ modo fuscas quæ duos aut tres sacculos habent compressos, & in vnoquoque est semen rubens simile Balsaminæ nostræ mari: maximè adferuntur ex Ægypto: quidam existimant veram Dioscoridis Acaciam [putamus legendum Acaciam] quod affirmare non possum, quandoquidem rutex mihi incognitus est.

Locus: Siliquæ Semen.

Acacia Diosc.

ACA-

ACACIÆ COGNATA PLANTA.

Descriptio
Sarcocollis
Acacis.

Quædam Acaciz congener est foliis & spinis luteis concoloribus, cui Sarcocollis tortiles per crebra interualla geminis aculeis donantur, cornua limacis exerta referentibus, interque, citra exiles foliola Acaciz primæ positi & similitudine gerunt. Lob. & Pena Adu.

Folia.

ACACIÆ COGNATA ALIA.

EX Peruvianis Insulis aliaque non foliolis dissimilis, in viminibus sesquipedalibus, spinulis aduncis donatur, concoloribus Vix crispæ, sed exilioribus. Adu. Lob. & Penz.

CERCIS VETERIBVS ET
ÆQVIVOCA.

Cercis
Theophr.

Cercis æquiva, arbor annua semina in siliquis inclusa continet, inquit Theophrast. lib. 8. cap. 8. Libro tamen 3. cap. 14. Cercidem [Alpinam Populum Gaza interpretatur,] particulatim describens, siliquarum non meminit. Alpina (Lybica quibusdam) Populo albæ non absimilis, cum magnitudine tum verò ramis albicantibus sparsis, folio Hederæ, sed parte alterâ sine angulo, alterâ oblongo, neque angulum exeunte acutum: colore parte resupina, ptonaque ferme simili: pediculo prolixo, tenuique annexo, quamobrem non erecto, sed inflexo, cortice asperiori, quam Populus alba, scabriorique quam Pyrus sylvestris. De Cercide Plinius nihil, teste Scaligero.

Cercis
Alpina
Populus
Gaza.

Rami.
Folia.

Color.

Cercis.

Acquiro-
ca.

Judaica
Arbor.
Siliqua
filia.

Populus.

Herba.

Cercidem priorem Theophrasti multi censent Arborem Iudæ, siue Iudaicam arborem, de qua mox dicetur. Eadem videtur Cæsalpino Siliqua sylvestris, quam Cercin appellatam scribit, ob circinatam solum rotunditatem, quæ tamen in siliquis fert. Alteram apud eundem Theophrastum Cercin, & apud Aristot. anim. lib. 8. cap. 5. & Hesichium de populo, quidam Lybicam, quidam Alpinam Populum faciunt, de qua alibi. Hermol. in Dioscor. ait: Herba quædam Cercis est, è qua radii fiunt textoribus, unde & nomen.

IYDAICA ARBOR.


Descriptio
Magnitudinis
Rami.

Flores.

Sapor.

Siliqua.

Iydaica arbor vix nisi culta arboream magnitudinem assequitur, neglecta, inquit Clusius, & spontè nascens, plerumque inter frutices potius quam arbores censenda est. Ratiore fert ramos alternatim ex lateribus nascentes, cortice ex purpure nigricante tectos: primo Vere flores erumpunt, ante folia plures coaceruati, amœni, purpurantes, breuibz nigricantibus pediculis hærentes, Pisorum ferè, vel Genistæ Clusio, floribus similes, quinque foliis contexti, quibus duo inferiora magnitudinem superant, reliqua tria superiora, simul iuncta apicibus è medio multis emicantibus, saporis subdulcis & nonnihil acidi: floribus & succedunt siliquæ, vncialibus & longioribus pediculis pendulæ, palmari aut sesquipalmari longitudine, membranaceæ, purpurascens,



compressæ, vanciam ferè latæ, in quibus semina coloris spadicæ, dura, Lætibz maiora, oblonga: folia circinatæ rotunditatis, Afari, subinde maiora multò, nervosa, vti Aristolochiarum Clusio & dura, superius virent, inferius inalbescant. Eodem autore aliud genus inuenitur per omnia præcedenti ferè simile præter florè, qui candicat potius quam purpureascit.

Gesnerus de hortis dicit, Arborem Iudæ plerumque Siliquas rectas ferre, non falcatas: nec nucamentum, sed, vt Dodonæus pingit, florem quasi leguminis, vel ut anagyris: quamobrem acuratiùs hæc perpendent, qui arbores istas Lutetia viderint.

Quo nomine hæc arbor Veteribus sit appellata teste, Clusio, non faciliè dictu est. Nonnulli ad Cercin priorem Theophr. referunt. Alii etiam ad alteram, quam Gaza alpinam reddidit, quæ nihil aliud est, quam Populus Lybica. Plinius lib. 31. c. 2. meminit Siliquæ sylu. quam purpureum florem ferre ait: an verò hæc nostra sit, difficile est vnicâ illâ notâ iudicare. Montpelii peritiores rei herbariæ referunt ad Colyteam Theophrast. lib. 3. cap. 17. descriptam & 14. cuius notas Arboris Iudæ plurimum conuenire Clus. quidem affirmat, sed de his ampliùs cogitandum. Qui putant Plinii siliquam, quæ dicta fuit Ficus Aegyptia, esse arborem Iudæ, falluntur. Petrus Bellon. in l. 1. de admirab. operum antiq. & rerum suscipiendarum præstantia cap. 17. agens de arboribus sepulchris inferi solitis, id est, quorum vñs maximè in rebus funebribus fuit: peculiare inquit, est arboris genus sterilis, idè antiquo nomine carens, quæ cum eximia pulchritudinis florem lo Vere producat, Turcis tantoperè commendatur, vt nullum Byzantii aut Adrianopoli Cœmeterium videas, quod non hac constum sit. Eam autem quoniam Siliquas pro fructu edit, Siliqua stri nomine appellamus. Idem de cult. prob. 6. scribit inter siliquosas arbores & frutices siliquas ferentes, Arborem Iudæ vulgò nuncupatam comperimus. probl. 3. in catalogo arborum propositarum regi, Arbores Iudæ, quas Græci vulgò Couchonchias nuncupât unde Fabagines & Siliquastræ dictæ. Locis iam citatis Bellon. de arbore Iudæ loquutum existimemus, sed quale illud sit Siliquastrum, primo loco dictum, considerandum quod Siliquas pro fructu gerat & sterile sit, quasi Siliqua non sit fructus: libro de cultura nullam arborem inter Siliquosas recenset quæ respondeat, præter arborem Iudæ, cui appropinquat falsò spinæ.

Acaciz imaginem Constantinopoli ad se detulisse Augerium de Busbeck Flandrum ait Matthiolus, quæ omnibus suis partibus, notisque, veram legitimamque Acaciam imitata sit. Floribus ex albo purpurascens, & siliquis, & semine

















INDEX.

<i>Aspalathus Abrotomi facie incana</i>	403.p.2	<i>Caphura qua salicis foliis dicitur</i>	398.p.2
<i>Aspalathus Mompeliano affinis scorpius, secunda Clusio</i>		<i>Caprificus</i>	342.p.2
<i>Ibid.</i>		<i>Caphura resina</i>	342.p.2
<i>Aspalatho affinis Tragum, forte Rhamni species ex Can-</i>		<i>Carambolus Acofta</i>	177.p.2
<i>dia Valerandi Douras</i>	404.p.2	<i>Carandus Indica arbuti facie</i>	88.p.2
<i>Aspalatho secunda Monf. f. m. Scorpio, seu Noya</i>		<i>Caranna Garcia nomine data resina</i>	329.p.2
<i>Anguil. flore ex albo pallescens, vel ad purpuram</i>		<i>Cerdem fua Acacia Dioscor. quibusdam</i>	432.p.2
<i>accedens</i>	<i>Ibid.</i>	<i>Cercapoli</i>	105.p.2
<i>Anacardi facie Myrti</i>	918.p.p.	<i>Caries lignorum</i>	345.p.2
<i>Anellana Byzantina</i>	270.p.p.	<i>Carpasus & Opocarpasus</i>	315.p.2
<i>Anellana Indica maior Cortusi nigricans</i>	294.p.p.	<i>Caryophylli Indici</i>	423.p.p.
<i>Anellana Indica maior subrufa Clusio</i>	424.p.p.	<i>Caryophyllorum resina</i>	429.p.p.
<i>Anellana Indica pro Balsami fructu missa, eiusque spe-</i>		<i>Caryophyllo aromatico similis fructus</i>	<i>Ibid.</i>
<i>cies alia minor</i>	<i>Ibid.</i>	<i>Cassia Mofyitica nomine datus Cortex</i>	451.p.p.
<i>Anellana Indica Mehemethene Cortusi</i>	307.p.p.	<i>Cassia lignea fusca Aromatica, Cinnamomum ex Sar-</i>	
<i>Anellana India Mehemethene valde similis fructus</i>		<i>maria dicta</i>	<i>Ibid.</i>
<i>Ibid.</i>		<i>Cassia lignea fusca Aromatici & glutinosi saporis.</i>	<i>Ibid.</i>
<i>Anellana Indica peculiaris Camerarii</i>	<i>Ibid.</i>	<i>Cassia lignea fusca aromatica acrior</i>	452.p.p.
<i>Anellana Indica villosa furaminata</i>	308.p.p.	<i>Cassia externa parte insipida</i>	<i>Ibid.</i>
<i>Anellana Mehemethene Cortusi species alia, nuda &</i>		<i>Cassia an forte Vererum?</i>	<i>Ibid.</i>
<i>vestita Villo</i>	<i>Ibid.</i>	<i>Cassia Apam, Coromaria, & Poetica: & etiam de</i>	
<i>Anellana compressa facie fructus vel semen</i>	314.p.p.	<i>Cneero</i>	457.p.p.
<i>Anellana purgatrix nouis Orbis</i>	322.p.p.	<i>Cassia lignea Mompelienstem</i>	458.p.p.
<i>Aurantio simili fructu arbor</i>	306.p.p.	<i>Cassia officinarum adulcerina</i>	459.p.p.
<i>Aurantii forma, coloris Cineracei fructus, strepitum</i>		<i>Cassia adulcerina vel Pseudocassia nomine datus cor-</i>	
<i>edens</i>	332.p.p.	<i>tex</i>	460.p.p.
B			
<i>Bacca cuiusdam prae grandis officulum</i>	331.p.p.	<i>Cassia purgatrix</i>	460.p.p.
<i>Balaustia Hispanica</i>	82.p.p.	<i>Castanea</i>	112.p.2
<i>Balsami Peruniani fructus Clusio</i>	294.p.p.	<i>Castanea humilis racemosa</i>	127.p.2
<i>Balsami Peruniani Fructus Mera forma</i>	295.p.p.	<i>Castanella peregrina</i>	<i>Ibid.</i>
<i>Balsamum ex Peru</i>	<i>Ibid.</i>	<i>Castanea equina folio multifido</i>	118.p.2
<i>Balsamum de Tolu</i>	296.p.p.	<i>Castanea Peruniana</i>	119.p.2
<i>Balsamum nouum fructu racemoso</i>	297.p.p.	<i>Castanea purgatrix</i>	<i>Ibid.</i>
<i>Balsamum verum, Xylabalsamum, Carpobalsamum, O-</i>		<i>Castanea species fructus peregrinus</i>	<i>Ibid.</i>
<i>pobalsamum</i>	298.p.p.	<i>Castanea fructu Leucome.</i>	<i>Ibid.</i>
<i>Balsamum certarum quarundam plantarum quas Copal-</i>		<i>Cedrus, atque de ea Antiquorum sententia</i>	273.p.2
<i>bas vocant</i>	306.p.p.	<i>Cedria Vererum</i>	275.p.2
<i>Babab, sine Abano Clusio</i>	119.p.p.	<i>Cedrus magna siue Libani conifera</i>	277.p.2
<i>Bavaco fructus e pluribus nucibus, arboru Hura</i>	333.p.p.	<i>Cedrus Atlantis Mauris</i>	283.p.2
<i>Bellium</i>	317.p.2	<i>Cedrus Phoenicea siue Oxycedrus</i>	297.p.2
<i>Belenian aut Belenzan Auerrais</i>	320.p.2	<i>Cedrus Lycia reclusa Bellonio dicta</i>	300.p.2
<i>Benioinum obvolutum folio, maximum.</i>	153.p.p.	<i>Cetarium monococcon Indicum</i>	421.p.2
<i>Benioinum cuius arbor folio Citri</i>	320.p.2	<i>Cerasus in genere</i>	116.p.p.
<i>Bor Indica fructu Iniubino</i>	44.p.2	<i>Cerasus syluestris fructu rubro & nigro</i>	220.p.p.
<i>Berberis vulgo quo & Oxia cantaba putata</i>	52.p.2	<i>Cerasa duracena oblonga</i>	221.p.p.
<i>Berre, Berelle</i>	437.p.p.	<i>Cerasa acida rubella</i>	<i>Ibid.</i>
<i>Betula</i>	148.p.2	<i>Cerasa acida nigricantia, salidiora, tardius maturif-</i>	
<i>Bixa Oniedi</i>	440.p.2	<i>centia</i>	<i>Ibid.</i>
<i>Bon vel, Bao Arbor</i>	422.p.p.	<i>Cerasus pumila</i>	222.p.p.
<i>Briandones Indici, fructus rubentes, acidi</i>	89.p.p.	<i>Cerasus flore pleno</i>	223.p.p.
<i>Brisachter China</i>	112.p.p.	<i>Cerasus vno pediculo plura ferens</i>	<i>Ibid.</i>
<i>Bruca Plinii</i>	185.p.2	<i>Cerasus racemosa</i>	<i>Ibid.</i>
<i>Buna, Bunnu, & Bonchos Arabum</i>	421.p.p.	<i>Cerasus syluestris amara, Mabaleb putata</i>	227.p.p.
		<i>Cerasus racemosa quibusdam, aliis Padus</i>	228.p.p.
		<i>Cerasi fructu Lotus arbor</i>	<i>Ibid.</i>
		<i>Cercis Vereribus, & aquinoca</i>	433.p.2
C			
<i>Cacao simili fructus</i>	291.p.p.	<i>Chalcas</i>	
<i>Cacao America, seu Anellana Mexicana</i>	<i>Ibid.</i>	<i>Chamamestilus</i>	72.p.p.
<i>Cachis</i>	118.p.p.	<i>Chamabuxus, siue chamepycus quibusdam</i>	524.p.p.
<i>Caion</i>	336.p.p.	<i>Chamacerasus montis generosi</i>	229.p.p.
<i>Calaf, seu Ban Alpini</i>	220.p.2	<i>Chamascus</i>	128.p.p.
<i>Cancanum</i>	324.p.2	<i>Champe flores Indici</i>	107.p.p.
<i>Canella Acofta</i>	436.p.p.	<i>Chamariphes officula non dissimilis sed maior, orbica-</i>	
<i>Canell. fructus quibusdam, nobis porius folij Indi</i>	<i>Ibid.</i>	<i>laris pend</i>	244.p.p.
<i>Canella seu Cinnamomum vulgare</i>	445.p.p.	<i>Chamariphe peregrina</i>	371.p.p.
<i>Canella crassiore cortice</i>	451.p.p.	<i>Chamariphes forte Folium</i>	372.p.p.
<i>Canella ad Cinnamomum vulgare accedens</i>	<i>Ibid.</i>	<i>Chamei Acofta fol. Pyri</i>	88.p.p.
<i>Canella alba quorundam</i>	461.p.p.	<i>Chivos Theueti</i>	112.p.p.
<i>Canella folio mali Punica</i>	455.p.p.	<i>Choyne Americana</i>	<i>Ibid.</i>
<i>Canella peruniana fructu pileo simili, & alia ei simili</i>		<i>Cinnamomum & Cassia: atque de his placita Antiquo-</i>	
<i>arbor.</i>	<i>Ibid.</i>	<i>rum</i>	440.p.p.
			<i>Cinna-</i>



INDEX

<i>Fructus Indicus Pyrisformis, granis luteis nigris, cucur- bitanis secundi generis</i>	114.p.p.	<i>Fructus Indicus echinatus, sonorus</i>	ibid.
<i>Fructus similis nuci Persica, nucleo venenato</i>	171.	<i>Fructus exotici Stramonio modo, tuberculis obfusi</i>	327.p.p.
<i>p.p.</i>		<i>Fructus peregrinus novem nervis distinctus</i>	ibid.
<i>Fructus hirsutus Amygdalam referens</i>	181.p.p.	<i>Fructus peregrinus, orbicularis, novem nervis distin- ctus minor cum officulo anguloso</i>	ibid.
<i>Fructus exotici hirsutus Amygdali facie</i>	184.p.p.	<i>Fructus peregrinus, orbicularis, semi nervis distinctus</i>	ibid.
<i>Fructus Pruni facie, e Guinea, in quo semina</i>	188.	<i>Fructus peregrinus, exiguus, orbicularis cum sex nervis</i>	ibid.
<i>p.p.</i>		<i>Fructus Guyanensis ovalis, cineraceus</i>	ibidem
<i>Fructus sonorus, acidus, pruni parvi magnitudine</i>	ibid.	<i>Fructus reticulato corio peregrinus</i>	328.p.p.
<i>Fructus Pentagonus, vel Officulum</i>	210.p.p.	<i>Fructus exotici Hamia instar angulosus</i>	ibidem
<i>Fructus exotici non valde dissimilis Myrobalani ni- gri officulo</i>	ibid.	<i>Fructus exotici cinereus, cum lignis & tuberculis da- tis</i>	ibid.
<i>Fructus Indus admirabilis</i>	266.p.p.	<i>Fructus Malo Aurantio reficcato similis, semine, auro co- loris, octo nervis distinctus</i>	329.p.p.
<i>Fructus Brasiliensis in permittisus</i>	291.p.p.	<i>Fructus Indicus rotundus, tuberculis operatus, niger</i>	ibid.
<i>Fructus Amygdaloides nitidus peregrinus</i>	292.p.p.	<i>Fructus exotici duobus angulis distinctus</i>	ibid.
<i>Fructus Peruanus Amygdaloides, sub terra nascens</i>	ib.	<i>Fructus Hepaticus Indicus</i>	ibidem
<i>Fructus exotici prona parte in arcum elatus, sapina planus, fuscus</i>	293.p.p.	<i>Fructus Indicus decussatus</i>	330.p.p.
<i>Fructus binalis Indicus niger</i>	294.p.p.	<i>Fructus alter quatuor sulcis distinctus</i>	ibid.
<i>Fructus accedens nuci Cypote, orbicularis, laevis, spadiceo coloris</i>	ibid.p.p.	<i>Fructus orbicularis fere, cum tribus sulcis & tribus fo- raminibus.</i>	ibidem
<i>Fructus Inglestis fere magnitudine, durissimus, Indus Caraiti, sapore nuci M. scabata</i>	308.p.p.	<i>Fructus orbicularis fere forma, fusci coloris</i>	ibid.
<i>Fructus peregrinus onatus similis lapidi Indico</i>	309.	<i>Fructus planus, rugosus, niger, semina cum inano</i>	332.p.p.
<i>p.p.</i>		<i>Fructus inferna parte planus, membrana spadiceo colo- ris rectus</i>	ibid.
<i>Fructus fuscus, durus, striatus, strepitum edens</i>	309.p.p.	<i>Fructus officula terna, aut quaterna simul iuncta, cor- tice non valet duro, rugoso, cineraceoque coloris</i>	332.p.p.
<i>Fructus exotici sicut similis</i>	310.p.p.	<i>Fructus ulina officulum referens, rugosum cum tribus linis</i>	ibid.
<i>Fructus Pyrisformis, rugosus, niger, duro corio testis</i>	310.p.p.	<i>Fructus planus subpurpureus, nucleo imponit amaro</i>	334.p.p.
<i>Fructus Pyrisformis laevis, spadiceo coloris, fragili cortice rectus</i>	ibid.	<i>Fructus exotici inaequalis, fusci coloris</i>	ibidem
<i>Fructus peregrinus sulcatus</i>	ibid.	<i>Fructus rotus niger, binis foraminibus insignitus</i>	ib.p.p.
<i>Fructus omnino rotundus, luteus, non splendens cum suo frutice</i>	311.p.p.	<i>Fructus orbicularis, peregrinus, cum granis nuci vici- nae similibus</i>	342.p.p.
<i>Fructus peregrinus tanquam tornis elaboratus, argen- teus</i>	312.p.p.	<i>Fructus exotici, laevis, compressus, calore suberis</i>	342.p.p.
<i>Fructus peregrinus tanquam tornis elaboratus, flavus</i>	ibid.	<i>p.p.</i>	
<i>Fructus Indicus tanquam tornis elaboratus, viridis</i>	312.p.p.	<i>Fructus quadrangulus, niger, cum membrana minime a</i>	351.p.p.
<i>p.p.</i>		<i>Fructus peregrini duntaxat nucleus</i>	357.p.p.
<i>Fructus peregrinus Clavus durissimus, aliisque similis</i>	ibid.	<i>Fructus una parte fissilis, velut sulcis distinctus instar nuci Fausel</i>	392.p.p.
<i>Fructus peregrinus orbicularis, cuspidatus</i>	ibid.	<i>Fructus peregrinus tetragonus</i>	397.p.p.
<i>Fructus similis Lauri Bacca</i>	ibid.	<i>Fructus peregrinus crassus, in quo magnus nucleus</i>	398.p.p.
<i>Fructus rugosus, parvus, granis, orbicularis a pene figura, quasi compressa</i>	315.p.p.	<i>Fructus peregrinus Abiogna nuci persimilis</i>	ibid.
<i>Fructus planus, forma cordis, cum multis tuberculis</i>	ib.	<i>Fructus peregrini nucleus</i>	ibidem
<i>Fructus orbicularis, perpolitus, unguone glandis</i>	ibid.	<i>Fructus exotici Inglestis fere facie sulcatus, tubero- sus</i>	399.p.p.
<i>Fructus sublongus, cortice duro, fusca rectus Epidermi- do</i>	314.p.p.	<i>Fructus Canna de Bengala creditus</i>	400.p.p.
<i>Fructus Indicus, vel nucleus luteus parvus, Anellana oblonga facie, compressus</i>	ibid.	<i>Fructus peregrinus elegans squammosus</i>	ibidem
<i>Fructus dissentericus flavus</i>	316.p.p.	<i>Fructus Insulae Baly, Pyris forma, asper</i>	401.p.p.
<i>Fructus Indicus granulatus, vel tuberosus minor</i>	ibid.	<i>Fructus peregrinus tetragonus</i>	ibidem
<i>Fructus Pyrisformis fuscus, laevis, striatus, cum coronula, in quo nucleus</i>	317.p.p.	<i>Fructus Caryophyllo Aromatico similis</i>	429.p.p.
<i>Fructus triangularis fissuratus ostendens</i>	ibid.	<i>Fructus redolens Caryophyllos</i>	430.p.p.
<i>Fructus Berberis</i>	323.p.p.	<i>Fructus Camella quibusdam nobis potius foliis Indis</i>	436.p.p.
<i>Fructus quodammodo similis glandi iliguae, cortice fra- gili</i>	ibid.	<i>p.p.</i>	
<i>Fructus Indicus villosus, parvus</i>	ibid.	<i>Fructus peregrinus ex Bengala</i>	436.p.p.
<i>Fructus Indicus cui parvi fere forma</i>	324.p.p.		
<i>Fructus exotici officulum aliud</i>	ib.		
<i>Fructus Indicus Corni figura</i>	325.p.p.		
<i>Fructus Indici officulum perelegans</i>	ibid.		
<i>Fructus orbicularis, crassi corticem, tuberculosi, nigri co- loris</i>	ibid.		
<i>Fructus multifariam fissus</i>	326.p.p.		
<i>Fructus Indicus Inglestis similis, tuberosus</i>	ibid.		
<i>Fructus Indicus ovalis rugosus</i>	ibid.		
<i>Fructus exotici, oblongus, angulosus, cineraceus</i>	ibid.		
		<i>Galla & alia Quercuum excrementa</i>	82.p.2
		<i>Galla maxima exotica</i>	82.p.2
		<i>Galla tertia provinciales, Myrica</i>	ibidem
		<i>Galla Orientales, & alia diversa</i>	83.p.2
		<i>Galla Isriaca</i>	ibidem
		<i>Galla fungum quodammodo exprimens</i>	ib.
		<i>Galla Indica</i>	84.p.2



INDEX

Lycium fructu Agriahali Aegyptium folio Buxi 62.p.2

M

<i>Macocquer Virginianum</i>	234.p.p.
<i>Maier Dioscor. & Gracorum</i>	262.p.p.
<i>Malabarum & saluum Indum Officinarum</i>	430.p.p.
<i>Malus de Malis</i>	26.p.p.
<i>Mali sylvestres</i>	Ibid.
<i>Malis Syria & Gomortiba</i>	27.p.p.
<i>Malus Cotonea</i>	Ibid.
<i>Malus Coronea sylvestris</i>	35.p.p.
<i>Malus Punica</i>	76.p.p.
<i>Punica Balaustifera</i>	82.p.p.
<i>Balaustia Hispanica</i>	Ibid.
<i>Mala Medica qua etiam Persica vel Citria dicuntur, veterum & recentiorum sententia, & differentia in genere</i>	90.p.p.
<i>Malus Citria, cum fructu magno, & mediocri</i>	94.p.p.
<i>Malus Limonia</i>	96.p.p.
<i>Malus Arantia</i>	97.p.p.
<i>Malus aurea foliis fragrantibus</i>	153.p.p.
<i>Malus persica</i>	157.p.p.
<i>Malus persica Hispanica Melocotonea quorundam</i>	162.p.p.
<i>Mala Armeniaca minora</i>	167.p.p.
<i>Mala Armeniaca maiora</i>	Ibid.
<i>Mamay arbor</i>	172.p.p.
<i>Mangas sine Amba</i>	173.p.p.
<i>Mangle Pyri foliis cum filiquis longa sicut Indica affinis</i>	415.p.2.
<i>Mangostans</i>	180.p.p.
<i>Man sine Manna sacrum litterarum</i>	188.p.2.
<i>Manna Laricea sine Brianfona</i>	191.p.2.
<i>Manna Calabrina Fraxini & Orni.</i>	192.p.p.
<i>Manna Orientalis Mastichina</i>	198.p.2.
<i>Manna Xirqueff Indica ex arbore Quest. & Siracost</i>	199.p.2.
<i>Manna Indica Tiviniabin, aut Trunghim</i>	Ibid.
<i>Manna Indica Calabrina persimilis</i>	200.p.2.
<i>Manna Indica mellis Candido similis</i>	Ibid.
<i>Manna adulterina</i>	Ibid.
<i>Mannarum equina</i>	Ibid.
<i>Manibi Lerii</i>	292.p.p.
<i>Mel aerum, Manna, Terebinthin, & Saccharum Album in genere</i>	180.p.2.
<i>Mel Cedrinum</i>	190.p.2.
<i>Melo cortopis arbor Cydonii facie</i>	106.p.p.
<i>Mespilus, de Mespilo, Epimelide, Vnedone, Amamelide, Homomelide, Oromelide & Hypomelide, & de Mespilo aronia in specie</i>	66.p.p.
<i>Mespilus Aronia Veterum</i>	67.p.p.
<i>Mespilus vulgaris</i>	69.p.p.
<i>Mespilus Officulis leni coloris spadicis, Lata Guinea</i>	72.p.p.
<i>Mespilo valde similis fructu sine granis</i>	Ibid.
<i>Mespilo valde similis fructu Americanus</i>	Ibid.
<i>Mespilus Chamameispilus</i>	72.p.p.
<i>Mogori flores, odoris florum mali aucta</i>	107.p.p.
<i>Molle</i>	334.p.p.
<i>Mollis arboris resina similes, fanticuli odore</i>	335.p.p.
<i>Morm, Morm nigra</i>	118.p.p.
<i>Moringa Lencis folio, fructu magno anguloso in quo semina Erui</i>	435.p.2.
<i>Muniacum Arbor</i>	169.p.p.
<i>Musa</i>	148.p.p.
<i>Musa arbor</i>	Ibid.
<i>Musa cum fructu</i>	Ibid.
<i>Myrrha in Genere</i>	308.p.2.
<i>Myrrha</i>	311.p.2.
<i>Myrrha Boeotica</i>	314.p.2.

Myrrha Arbor Bellonia

<i>Myrica in genere</i>	149.p.2.
<i>Myrobalani Arabum in genere</i>	201.p.p.
<i>Myrobalani Indica, nigra, sine nucleis, Citrina, Chebula, Citrinis similes, nigricantes, Emblica, cingentis Nucleum habentes, angulosa, Bellerica, rotundiores</i>	Ibid.
<i>Myrobalani Indica nigra sine nucleis.</i>	204.p.p.
<i>Myrobalani Citrina</i>	205.p.p.
<i>Myrobalani Chebula Citrinis similes nigricantes</i>	Ibid.
<i>Myrobalani Emblica</i>	206.p.p.
<i>Myrobalani Bellerica rotundiores</i>	Ibid.
<i>Myrobalani species Rarioris</i>	209.p.p.
<i>Myrobalani facie fructus Indici</i>	Ibid.
<i>Myrobalani virentes</i>	210.p.p.
<i>Myrobalano Citrino aliquomodo similis fructus canis</i>	Ibid.
<i>Myrobalani nigri officulis non valde dissimilis fructus exotici</i>	210.p.p.
<i>Myrobalani officulis similis angulosus</i>	Ibid.
<i>Myrtus de Myrtis in Genere</i>	307.p.p.
<i>Myrtus vulgaris nigra & alba, sarina & sylvestris</i>	310.p.p.
<i>Myrtus Boetica Larifolia Domestica</i>	312.p.p.
<i>Myrtus exotica angustifolia</i>	Ibid.
<i>Myrtus Larifolia Belgica, forte Romana</i>	312.p.p.
<i>Myrtus Tarentina</i>	Ibid.
<i>Myrtus angustifolia Minor</i>	314.p.p.
<i>Pseudomyrtus Belloni</i>	318.p.p.
<i>Myrtidantium</i>	314.p.p.
<i>Myrti facie Avatori</i>	318.p.p.
<i>Myrtillus grandis, quibusdam Visis Idas magis</i>	318.p.p.
<i>Myxa seu Sebestem</i>	197.p.p.
<i>Myxa Domestica</i>	198.p.p.
<i>Myxa sylvestris</i>	Ibid.

N

<i>Nabca folio Rhamni vel Iniuba</i>	39.p.2.
<i>Nautica</i>	304.p.2.
<i>Nicaragua pomum nuce rotunda</i>	210.p.p.
<i>Nimbo folio & fructu olea</i>	27.p.p.
<i>Nux luglans</i>	242.p.p.
<i>Nux Carya seu Euboica Theophrasti</i>	251.p.p.
<i>Nux Indica non bisform luglandi similis</i>	252.p.p.
<i>Nux Coulcoul</i>	255.p.p.
<i>Nux Aromatica vulgo Moschata</i>	Ibid.
<i>Nax Arabum, aut cortex Aromaticum</i>	260.p.p.
<i>Nax Aromatica famina</i>	264.p.p.
<i>Nux Aromatica</i>	265.p.p.
<i>Nucula exotica pistaci facie</i>	290.p.p.
<i>Nucula peregrina alia</i>	Ibid.
<i>Nux sine Officulis Cypote, simile Nuci Balsami Peruaniani</i>	294.p.p.
<i>Nux sine Officulis, fructus ex Palmarum genere</i>	303.p.p.
<i>Nux Indica pulchra, cui vugnis albus.</i>	309.p.p.
<i>Nucula Indica Lobel. & Pena</i>	310.p.p.
<i>Nucula Indica peculiaris</i>	Ibid.
<i>Nucula Indica ab Hercule Saxonia missa</i>	Ibid.
<i>Nux purgatrix similis spherula saponaria, fusca</i>	313.p.p.
<i>Nuces insane Belgis prunula insana, putamine fusca, officulo membranaceo nigro, cum macula alba</i>	315.p.p.
<i>Nucula ex Guinea</i>	316.p.p.
<i>Nucula Indica alia</i>	Ibid.
<i>Nucula Indica globosa, sonora</i>	317.p.p.
<i>Nucula pyriformis Indica & sonora</i>	Ibid.
<i>Nucula</i>	



INDEX.

<i>Pinus sylvestris</i> , vel ut Bellinus vocat, <i>Picea sylvestris</i> , vel <i>Picea planities Cotyrensis</i> , <i>Distia montana</i> , <i>Gallogracia</i> & <i>Olympi</i>	256.p.2.
<i>Pinus sylvestris</i> Mugha sine Crum	ibid.
<i>Pinus sylvestris</i> maritima Comu semiter vallis adba- xantibus	257.p.2.
<i>Pinus maritima</i> <i>Theophrasti</i> <i>Labellia</i>	258.p.2.
<i>Pinus maritima</i> altera <i>Matthioli</i>	ibid.
<i>Pinaster</i> <i>terreus</i> <i>Hispanicus</i> <i>pumilus</i>	ibidem
<i>Pinus</i> <i>resina</i>	ibidem
<i>Pinus</i> <i>Indica</i> ex qua <i>Ere</i>	263.p.2.
<i>Pinus</i> <i>Inda</i> <i>Hispania</i>	264.p.2.
<i>Pinus</i> <i>Nucis</i> <i>species</i> <i>Malenken</i>	ibidem
<i>Pinus</i> <i>Comi</i> <i>facie</i> <i>fructus</i> <i>exotici</i>	ibidem
<i>Pinus</i> <i>forma</i> <i>Cibage</i>	265.p.2.
<i>Pinus</i> <i>nucis</i> <i>similis</i> <i>Indicus</i> <i>fructus</i>	389.p.2.
<i>Pitys</i> <i>Veteribus</i>	247.p.2.
<i>Pix</i> in <i>Genere</i> .	261.p.2.
<i>Platanus</i>	170.p.2.
<i>Planta</i> <i>globulorum</i> <i>saponariorum</i>	313.p.2.
<i>Poma</i> <i>Adami</i>	99.p.2.
<i>Pomum</i> <i>Nicaragua</i> <i>nucis</i> <i>rotunda</i>	210.p.2.
<i>Polygonum</i> <i>maritimum</i> <i>angustifolium</i> <i>Dalechampi</i>	460.
<i>P. p.</i>	
<i>Populus</i> <i>Nigra</i> <i>ALGISOX</i>	155.p.2.
<i>Populus</i> <i>Alba</i> <i>AETNA</i>	160.p.2.
<i>Populus</i> <i>Alba</i> <i>foliis</i> <i>minore</i>	ibid.
<i>Populus</i> <i>Libyca</i> , <i>ex</i> <i>Theophrasti</i>	163.p.2.
<i>Populus</i> <i>non</i> <i>Orbu</i>	164.p.2.
<i>P. scirpus</i> <i>Antiquis</i>	409.p.2.
<i>Pteridium</i> <i>quibusdam</i> <i>sive</i> <i>Pimpinella</i> <i>spinosa</i>	ibid.
<i>Prunus</i> <i>satina</i>	184.p.2.
<i>Prunus</i> <i>Mirbalanus</i> <i>dicta</i>	189.p.2.
<i>Prunus</i> <i>Amigdalina</i>	190.p.2.
<i>Prunus</i> <i>sylvestris</i>	193.p.2.
<i>Pseudomyrica</i> <i>Bellonii</i>	518.p.2.
<i>Pyracantha</i> <i>quibusdam</i>	51.p.2.
<i>Pyrus</i>	35.p.2.
<i>Pyraster</i> <i>sen</i> <i>Pyrus</i> <i>sylvestris</i>	57.p.2.
<i>Pyrus</i> <i>Polyvulvaria</i>	59.p.2.
<i>Pyrus</i> <i>lanugine</i> <i>falsa</i> <i>Theophr.</i>	59.p.2.
<i>Pyrus</i> <i>falsa</i> <i>Agnae</i>	107.p.2.

Q

<i>Quercus</i> : de <i>Quercu</i> & <i>Robore</i> in <i>Genere</i>	63.p.2.
<i>Quercus</i> <i>vulgaris</i> <i>brevibus</i> <i>ac</i> <i>longis</i> <i>pediculis</i>	70.
<i>Q. p.</i>	
<i>Quercus</i> <i>latifolia</i> <i>exotica</i> <i>Clusi</i> , vel <i>rara</i>	74.p.2.
<i>Quercus</i> <i>Burgundica</i> , <i>calyce</i> <i>hispida</i>	78.p.2.
<i>Quercum</i> <i>extremum</i> <i>a</i> , <i>ac</i> <i>primum</i> <i>de</i> <i>Galla</i>	81.p.2.
<i>Quercum</i> <i>lapis</i>	83.p.2.
<i>Quercum</i> <i>Cotens</i>	86.p.2.
<i>Quercum</i> <i>extremum</i> <i>f</i> <i>ngosum</i>	ibid.
<i>Quercum</i> <i>extremum</i> <i>lanatum</i>	ibid.
<i>Quercum</i> <i>capicula</i> <i>squamata</i>	ibid.
<i>Quercus</i> <i>album</i> <i>extremum</i> <i>facie</i> <i>nucula</i>	ibid.
<i>Quercum</i> <i>squamata</i> <i>candida</i> <i>caduca</i>	ibid.
<i>Quercus</i> <i>extremum</i> <i>cuberosum</i>	87.p.2.
<i>Quercum</i> <i>nodi</i> <i>sen</i> <i>verruca</i>	ibidem
<i>Quercus</i> <i>albumen</i>	ibidem
<i>Quercus</i> <i>Agaricus</i> <i>vel</i> <i>fungus</i>	ibid.
<i>Quercina</i> <i>vna</i>	ibidem
<i>Quercus</i> <i>extremum</i> <i>purgans</i>	88.p.2.
<i>Quercum</i> & <i>aliam</i> <i>arborum</i> <i>mensuri</i>	ib.
<i>Quercus</i> <i>liquor</i> <i>melles</i>	89.p.2.
<i>Quercus</i> & <i>cactarum</i> <i>arborum</i> <i>visus</i>	ibid.

R

<i>Resina</i> <i>Americana</i> <i>sive</i> <i>Carthaginensis</i> <i>noni</i> <i>Orbi</i>	223.p.2.
--	----------

<i>Resina</i> <i>liquidambar</i> , <i>arboris</i> <i>Ocotele</i> <i>dicta</i> , <i>foliis</i> <i>Medetis</i> , <i>odore</i> <i>Stryacis</i> <i>liquida</i>	ibid.
<i>Resina</i> <i>abiegnis</i> <i>Indica</i> <i>liquida</i>	324.p.2.
<i>Resina</i> <i>facie</i> <i>ambra</i>	330.p.2.
<i>Resina</i> <i>Caryophyllorum</i>	429.p.2.
<i>Resina</i> <i>Blami</i>	355.p.2.
<i>Rhamnus</i>	29.p.2.
<i>Rhamnus</i> <i>corrice</i> <i>albo</i> <i>Manfeliensis</i>	31.p.2.
<i>Rhamni</i> <i>primi</i> <i>species</i> <i>altera</i> <i>Clusi</i>	32.p.2.
<i>Rhamnus</i> <i>vel</i> <i>Oleaster</i> <i>Germanicus</i>	33.p.2.
<i>Rhamnus</i> <i>terreus</i> <i>Clusi</i>	35.p.2.
<i>Rhamnus</i> <i>sive</i> <i>Palmaris</i> , <i>foliis</i> <i>imbricatis</i>	ibid.
<i>Rhamni</i> <i>folio</i> <i>Nabca</i>	18.p.2.
<i>Rhamnus</i> <i>Catharticus</i>	95.p.2.
<i>Rhamnus</i> <i>sibiricus</i> <i>pumilus</i> <i>Pannon.</i> <i>I. Clus.</i>	96.p.2.
<i>Rhamnus</i> <i>sibiricus</i> <i>Pannon.</i> <i>secundus</i>	97.p.2.
<i>Rhamnus</i> <i>Bavarius</i> <i>Dalechampi</i>	ibid.
<i>Robur</i> . <i>I. Clusi.</i>	75.p.2.
<i>Robur</i> <i>II. Clus.</i>	ibid.
<i>Robur</i> <i>III. Clus.</i>	76.p.2.
<i>Robur</i> <i>IV. Clus.</i>	ibid.
<i>Robur</i> <i>V. Clusi</i>	ibid.
<i>Robur</i> <i>VI. Clusi</i>	ibid.
<i>Robur</i> <i>VII. Clusi</i>	ibid.

S

<i>Sabina</i> <i>baccifera</i> & <i>sterilis</i>	188.p.2.
<i>Sassa</i> <i>Syrorum</i> <i>salvia</i> <i>species</i> & <i>Alagum</i>	419.p.2.
<i>Salices</i>	109.p.2.
<i>Salix</i> <i>maxima</i> , <i>fragilis</i> , <i>alba</i> , <i>hirsuta</i>	212.p.2.
<i>Salix</i> <i>pumila</i> , <i>angustifolia</i> , <i>inferne</i> <i>lanuginosa</i>	ibid.
<i>Salix</i> <i>angusta</i> & <i>longissima</i> <i>foliis</i> , <i>crispis</i> , <i>suber</i> <i>al-</i> <i>cantibus</i>	ibid.
<i>Salix</i> <i>tenuior</i> <i>foliis</i> <i>minore</i> , <i>veroque</i> <i>glabra</i> , <i>fragilis</i>	213.p.2.
<i>Salix</i> <i>racemi</i> <i>seu</i> <i>nucamenta</i> , <i>rose</i> , & <i>capicula</i> <i>squam-</i> <i>ata</i>	ibid.
<i>Salix</i> <i>pumila</i> <i>angustifolia</i> , <i>prima</i> <i>parte</i> <i>cinnosa</i>	ibid.
<i>Salix</i> <i>humilis</i> <i>repens</i> <i>angustifolia</i> <i>Lob.</i>	214.p.2.
<i>Salix</i> <i>lutea</i> <i>tenuior</i> , <i>satina</i> , <i>viminea</i>	ibid.
<i>Salix</i> <i>sponsanea</i> , <i>fragilis</i> , <i>amygdalino</i> <i>foliis</i> , <i>auriculata</i> , & <i>non</i> <i>auriculata</i>	ibid.
<i>Salix</i> <i>rubra</i> <i>minime</i> <i>fragilis</i> , <i>foliis</i> <i>longis</i> , <i>angustis</i>	215.p.2.
<i>Salix</i> <i>latifolia</i> <i>inferne</i> <i>hirsuta</i>	ibid.
<i>Salix</i> <i>latifolia</i> <i>non</i> <i>hirsuta</i> , <i>cum</i> <i>Gallio</i>	216.p.2.
<i>Salix</i> <i>pumila</i> <i>latifolia</i> <i>prior</i> & <i>secunda</i> <i>Clusi</i>	ibid.
<i>Salix</i> <i>pumila</i> <i>foliis</i> <i>veroque</i> <i>glabra</i>	217.p.2.
<i>Salix</i> <i>pumila</i> <i>foliis</i> <i>rotunda</i>	ibid.
de <i>Salicibus</i> in <i>genere</i>	ibid.
<i>Salix</i> <i>genus</i> <i>dictum</i> <i>Garb</i> <i>Mentorum</i>	222.p.2.
<i>Sambaca</i>	111.p.2.
<i>Sambuca</i>	95.p.2.
<i>Sambucus</i> <i>vulgaris</i>	96.p.2.
<i>Sambucus</i> <i>fungus</i>	97.p.2.
<i>Sambucus</i> <i>laciniata</i>	ibid.
<i>Sambucus</i> <i>herbacea</i> , <i>sive</i> <i>Ebulus</i>	ibid.
<i>Sambucus</i> <i>racemosa</i> , <i>acinis</i> <i>rubris</i>	98.p.2.
<i>Sambucus</i> <i>aquatica</i>	99.p.2.
<i>Sambucus</i> <i>rosea</i>	99.p.2.
<i>Sandarache</i> <i>sive</i> <i>vernici</i> <i>quibusdam</i> <i>dicta</i> & <i>Massiche</i> <i>accidens</i> <i>resina</i>	329.p.2.
<i>Santalum</i>	486.p.2.
<i>Santalum</i> <i>citrinum</i>	ibid.
<i>Santalum</i> <i>album</i>	ibid.
<i>Santalum</i> <i>album</i>	489.p.2.
<i>Sancalo</i> <i>albo</i> <i>simile</i> <i>lignum</i> <i>Sembrane</i>	ibid.
<i>Santalus</i> <i>Adulterina</i> <i>Crotica</i> <i>sive</i> <i>Abelicea</i>	490.p.2.
<i>Saponaria</i> <i>Spherula</i> <i>arboris</i> <i>Filici</i> - <i>folia</i>	491.p.2.
<i>Sarcocolla</i> <i>officinarum</i>	108.p.2.
<i>Sassafras</i> <i>sive</i> <i>lignum</i> <i>Pannum</i>	483.p.2.
<i>Scorpius</i> <i>spinosis</i> <i>Veteribus</i>	399.p.2.
<i>Sentragi</i>	

INDEX.

<i>Sebesten seu Mixa.</i>	197.p.2
<i>Seitaragi Arabum, eiusque substantia & aquivoca</i>	462.p.2
<i>Sel Serapium, & Anicenna</i>	291.p.2
<i>Selago</i>	292.p.2
<i>Semen, Tamarindi semini simile, una extremitate den-</i>	315.p.2
<i>ratum</i>	315.p.2
<i>Semen fructus exotici forte cucurbitacei</i>	377.p.2
<i>Sena</i>	386.p.2
<i>Sesban foliis Hedysari</i>	209.p.2
<i>Siler veteribus</i>	415.p.2
<i>Siliqua arbor sine Ceratia</i>	435.p.2
<i>Siliqua parva Indica, semine oblongo, nigro,</i>	438.p.2
<i>Siliqua semine Colusca</i>	ibid.
<i>Siliqua Thymariis odore</i>	ibid.
<i>Siracost & Manna xirquest Indica ex Arbore Quest</i>	197.p.2
<i>Siri Gara Gamber Indis, pastilli ex Faisel</i>	393.p.2
<i>Smilax glandifera veterum</i>	101.p.2
<i>Smilax Dalechampi</i>	ibid.
<i>Sepiera Alpina</i>	384.p.2
<i>Sorbus</i>	39.p.2
<i>Sorbus aucuparia</i>	62.p.2
<i>de Sorbo Terminali, & Crataga Theophrasti</i>	63.p.2
<i>Sorbus Alpina</i>	65.p.2
<i>Spartium Hispanicum, lobis rotundiusculis, flore lu-</i>	397.p.2
<i>tes</i>	398.p.2
<i>Spartium Hispanicum flore candido</i>	398.p.2
<i>Spina Burgi & Alacerus</i>	342.p.2
<i>Spina Burgi Monspeliensis</i>	ibid.
<i>Spina oleum proferens, & alia spina</i>	36.p.2
<i>Spodium Arabum & Tabaxir</i>	221.p.2
<i>De Statte in genere</i>	315.p.2
<i>Scaphilodendron</i>	274.p.2
<i>Seyrax arbor & lacryma</i>	342.p.2
<i>Seyrax calamitba officinarum, impurius & purior</i>	345.p.2
<i>Seyrax liquidus ruber officinarum</i>	ibid.
<i>Siber latifolium</i>	103.p.2
<i>Succinum sine Electrum in genere</i>	330.p.2
<i>Succus, seu Gummi, aut potius resinas Cinnabaris colo-</i>	405.p.2
<i>re inficiens</i>	ibid.
<i>Succus rubro colore inficiens an Ouedi Bixar</i>	ibid.
<i>Succus mastichina resina non valde abfimili</i>	330.p.2
<i>Succus Iracub & Aianus, aloes similis, inuolutus Musa</i>	346.p.2
<i>sa foliis, gravis odoris, ad picandum</i>	346.p.2
<i>Succus vel resina Asphaltis, similis anethi sepe odore</i>	ibid.
<i>ibid.</i>	ibid.
<i>Succum alter, acris, substantia solidiore,</i>	ibid.
<i>Succum tertium acris: albis micis</i>	ibid.
<i>Succum visci instar</i>	347.p.2
<i>Sycamore, Ficus Cypria</i>	124.p.2
<i>Eius Species</i>	ibid.
<i>Sycamore similis Arbor</i>	128.p.2
<i>Syringa flore albo</i>	203.p.2
<i>Syringa alba similis capitula, odore striis notata</i>	204.p.2
<i>Syringa flore Carules, sine Lilac</i>	ibid.

T.

<i>Tabaxir sine Mambu arbor, Tabaxir folio olea</i>	222.p.2
<i>Tacori folia, Draconis Arbori similia</i>	405.p.2
<i>Tacamahaca populo similis fructu, colore similis Pao-</i>	346.p.2
<i>nia</i>	350.p.2
<i>Tamarix maior sine arborea Narbonensis</i>	351.p.2
<i>Tamarix Germanica sine minor fruticosa</i>	352.p.2
<i>Tamariscus Aegyptia Gallifera</i>	422.p.2
<i>Tamarindi.</i>	424.p.2
<i>Tamarindi seminis facie fructus Indicus</i>	360.p.2
<i>Tamoxo subfrutex Clusio</i>	481.p.2
<i>Tamaragbene radix odorata</i>	481.p.2

<i>Taxus</i>	241.p.2
<i>Taxococcomodit Indicum</i>	385.p.2
<i>Terebinthus Indica maior fructu rotundo</i>	278.p.2
<i>Terebinthus Indica fructu paruo, ad corculum acer-</i>	279.p.2
<i>dente</i>	ibid.
<i>Terebinthus</i>	ibid.
<i>Terebynthia resina, & de eius viribus.</i>	282.p.2
<i>Thun</i>	302.p.2
<i>Thuria limpidi folium</i>	307.p.2
<i>Thuya & Cedrus Atlantica montis</i>	283.p.2
<i>Thymiana sine Seyrax rubra officinarum, & Naphthi</i>	481.p.2
<i>Tianchessofculi Indici</i>	107.p.2
<i>Tilia vulgaris Platyphyllos</i>	133.p.2
<i>Tilia folio minore</i>	137.p.2
<i>Tilia maximo folio</i>	ibid.
<i>Tinctorem flor</i>	391.p.2
<i>Tuorgerid populo simile, cui resina buris candidior</i>	229.p.2
<i>Tragus veteribus</i>	409.p.2
<i>Tragus sine una Marina</i>	406.p.2
<i>Tragus sine una Marina minus</i>	ibid.
<i>Tragacantha Veteribus</i>	407.p.2
<i>Tragacantha Massiliensis</i>	ibid.
<i>Tragacantha Gummi</i>	408.p.2
<i>Tragacantha alba, Poterium forte Clusio</i>	ibid.
<i>Tragacantha Rauuulsi</i>	409.p.2
<i>Trifolium fruticans, quibusdam Polemonium</i>	374.p.2
<i>Trifolium frutex Genista folio</i>	375.p.2

V.

<i>Vaccinia palustris, sine oxycocum</i>	227.p.2
<i>Varicorameri, rugosa glandis simile fructu</i>	333.p.2
<i>Vernix sine Sendaracha Arabum</i>	299.p.2
<i>Vibebasou Theveti</i>	122.p.2
<i>Violarum arbor Indica</i>	107.p.2
<i>Viscum Indicum</i>	295.p.2
<i>Viscum Indicum aliud</i>	ibid.
<i>Viscum oxycedri</i>	299.p.2
<i>Vitis Idæa magna quibusdam, sine Myrtium grandis</i>	518.p.2
<i>Vitis Idæa fructu nigro</i>	519.p.2
<i>Vitis Idæa angulosa</i>	520.p.2
<i>Vitis Idæa semper virens fructu rubro</i>	522.p.2
<i>Vitis Idæa affinis poty-folia montana</i>	227.p.2
<i>Vitum</i>	139.p.2
<i>Vitum excremento accedens fructu peregrinum</i>	145.p.2
<i>Vitum arbor gummi ferens</i>	346.p.2
<i>Vitum & Cip succum acris inuolutum Musa folijs, anethi se-</i>	ibid.
<i>re odoris</i>	ibid.
<i>Vua Crispa sine Grossularia</i>	47.p.2
<i>Vua urti, & radix Idæa putata</i>	523.p.2

X.

<i>Xylon sine Gossipium herbaceum</i>	343.p.2
<i>Xylon arboreum</i>	346.p.2
<i>Xylon Brasiliense</i>	347.p.2

Z.

<i>Zaccen Hierichuntica, folijs olea</i>	29.p.2
<i>Zarnabi & Arnabo</i>	220.p.2
<i>Ziziphum Cappadocica, quibusdam olea Bodernica</i>	27.p.2
<i>Zizipha sativa & sylvestris</i>	40.p.2

Soli Deo Gloria in Aeternum.
Amen.



S.N. IV. 3

